

欽定四庫全書

子部  
蘭臺軌範  
目錄  
卷一

詳校官太醫院院使臣張肇基

洗馬臣王坦修覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣倪景寬



痰癘	濕	卷四	癰閉利淋	霍亂 <small>筋 附轉</small>	感冒	傷寒	卷三	欽定四庫全書	虛勞	痿	風	卷二	通治方	卷一	欽定四庫全書	子部五
痢	暍			瘧	寒熱	百合		蘭臺軌範	消症 <small>中 附強</small>	厥	痺歷節				醫家類	



臣 等謹案蘭臺軌範八卷	婦人          小兒	卷八	雜病	情志卧夢	疫癘鬼疰	卷七	諸痛 <small>頭心胃 腰腹</small>	欽定四庫全書	積聚癥痞	卷六	噎膈嘔吐 <small>附關 格</small>	肺痿 <small>附肺 癰</small>	喘	卷五	咳嗽 <small>附肺 脹</small>	癲狂癇
		五竅病 <small>耳目鼻 口齒</small>	諸疸 <small>附黃 汗</small>	脚氣 <small>附轉 筋</small>	蘭臺軌範	蟲 <small>附狐 惑</small>	泄瀉	諸血	臑脹水腫	疝	痰飲					



<p>國朝徐大椿撰大椿持論以張機所傳為主謂為古之經方唐人所傳已有合有不合宋元以後則彌失古法故是編所錄病論惟取靈樞素問難經金匱要略傷寒論隋巢元方病源唐孫思邈千金方王燾外臺秘要而止所錄諸方亦多取於諸書而宋以後方則采其義有可推試多獲效者其去取最為謹嚴每方之下多有附註論配合之旨與施用之宜</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>於疑似出入之間辨別尤悉較諸家方書但云主治某症而不言其所以然者特為精密獨其天性好奇頗信服食之說故所註本草於久服延年之論皆無所駁正而此書所列通治方中於千金鍾乳粉局方玉霜圓之類金石燥烈之藥往往取之是其通中之一蔽觀是書者亦不可不知所短焉乾隆四十三年三月恭校上</p>
--	------------------------	--





蘭臺軌範原序

欲治病者必先識病之名能識病名而後求其病之所由生知其所由生又當辨其生之因各不同而病狀所由異然後考其治之之法一病必有主方一方必有主藥或病名同而病因異或病因同而病症異則又各有主方各有主藥千變萬化之中實有一定不移之法即或有加減出入而紀律井然先聖後聖其揆一也自南陽夫子以後此道漸微六朝以降傳書絕少迨唐人外

欽定四庫全書

蘭臺軌範

臺千金不過哀集古方未能原本內經精通病變然病名尚能確指藥味猶多精切自宋以還無非陰陽氣血寒熱補瀉諸膚廓籠統之談其一病之主方主藥茫然不曉亦間有分門立類先述病原後講治法其議論則襍亂無統其方藥則浮泛不經已如雲中望月霧裏看花彷彿想像而已至於近世則惟記通治之方數首藥名數十種以治萬病全不知病之各有定名方之各有法度藥之各有專能中無定見隨心所憶姑且一試動





凡例

一每病先叙病原首內經次金匱傷寒次病源千金外  
臺宋以後亦間有採者前人已言之論則後者不錄  
若一病之中為病不一則即詳著於總名之下不復  
另立病名方之次第亦然

一一病必有一方專治者名曰主方而一病又有幾種  
每種亦各有主方此先聖相傳之法莫之能易也俱  
載本病之下其有此病之主方而他病亦可用者則

欽定四庫全書

蘭臺軌範

他病下祇載方名并治法註云見某病門以便翻閱  
一專治一病為主方如一方而所治之病甚多者則為  
通治之方先立通治方一卷以俟隨症揀用變而通  
之全在乎人服食養生皆在其中矣

一金匱諸方非南陽所自造乃上古聖人相傳之方所  
謂經方是也此乃羣方之祖神妙淵微不可思議分  
載於各症之下學者當精思熟識以為準的

一傷寒一科宜將傷寒論諸條字字體認其一百十三





方亦當字字參悟余已將一百十三方編成類方一書矣此書無病不載豈可獨遺傷寒故畧取六經主病之方隨症分錄其外諸方兼治襍病者俱分載各症條下蓋傷寒諸方當時本不專治傷寒南陽取以治傷寒之變症耳學者當合金匱傷寒兩書相參並觀乃能深通其義而所投輒效矣

一後世諸方其精實切病者皆附於古方之後其有將古方增減一二味即另立方名者殊屬僭妄蓋加減

欽定四庫全書

蘭臺軌範

之法稍知醫理者皆能之若易一二味即自名一方則方名不可勝窮矣今一概不錄或有襍藥竒法據稱得之秘傳而其理不可解則有效有害皆未可知一概不錄或方中有難得之藥及無人能識之藥并違禁之藥如胎骨之類一概不錄其有飛鍊禁咒等方既乏師承又屬渺茫一概不錄至於大藥重劑藥品既多修治艱鉅此乃服食之大藥非救病之急劑學者平時查考以廣見聞可也一概不錄學務窮經志切



師古不尚竒功祇求實效此書之志如是而已

一凡事最忌耳食孔子所謂道聽而塗說也如治浮火者當引火歸元乃指腎臟虛寒火不能納非治實火及別臟之火也如類中風用地黃引子乃治少陰純虛之痺症非治風火痰厥之中風也如暑天用大順散乃治夏日貪冷中寒之症非治暑熱正病也如大便不通用蘆薈丸乃治廣腸堅結諸藥不效之病非治津枯液燥之病也虛勞用建中湯乃治陽虛脉遲之症非治陰虛火旺之症也近人耳聞有此數方並不細審病因惘然施用受禍必烈集中俱為標出此外不止一端學者所當痛省

欽定四庫全書

蘭臺軌範

一通天地人之謂儒百家藝術皆士大夫所宜究心况疾病乃身命所關豈可輕以諉人此集溯本窮源簡括明備人人易曉病者醫者對症尋方互相考証則是非立辨不致以性命輕擲未始非衛生之一助云



欽定四庫全書

蘭臺軌範卷一

吳江徐大椿撰

通治方

雖云通治亦當細切病情不得籠統施用也

小建中湯

全匱

虛勞裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠

疼手足煩熱咽乾口燥此湯主之

桂枝

三兩  
去皮

甘草

三兩  
炙

大棗

十二  
枚

芍藥

六兩

生薑

三兩

膠飴

一升

欽定四庫全書

蘭臺軌範

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火

消解溫服一升日三服

此方治陰寒陽衰之虛勞正與陰虛火旺之病相反庸醫

誤用害人甚多此咽乾口燥乃津液少非有火也

黃芪建中湯

全匱

虛勞裏急諸不足者主之

於小建中湯內加黃芪一兩半餘依前法

大建中湯

治內虛裏急少氣手足厥冷小腹攣急

或腹滿弦急不能食起即微汗陰縮或腹中寒痛不

堪口乾精出或手足乍寒乍熱而煩冤酸痛不能以



立	黃芪 當歸 桂心 芍藥 人參	甘草 <small>各一錢</small> 半夏 <small>炮</small> 黑附子 <small>炮各二錢半</small>	右藥每服五錢加薑三片棗二枚煎服 <small>此非金匱大建中湯金匱大</small>	<small>方入腹痛門 桂枝去皮即桂心非近時所用之肉桂心也 此方兼治下焦虛寒之症不但建立中宮</small>	炙甘草湯 <small>傷寒論一名復脈湯</small> 治虛勞不足汗出而悶脈結悸行	動如常不出百日危急者十一日死	甘草 <small>四兩</small> 桂枝 生薑 <small>各三兩</small> 麥門冬 <small>半斤</small> 麻仁 <small>半</small>	欽定四庫全書 蘭臺軌範	阿膠 人參 <small>各二兩</small> 大棗 <small>三十枚</small> 生地黃 <small>一斤</small>	右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓內	膠消盡溫服一升日三服 <small>此治血脉空竭方用酒所以和血脉凡脉見結悸</small>	八味地黄丸 <small>崔氏</small> 虛勞腰痛少腹拘急小便不利者主	之及婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚息者此	名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利小便	則愈此亦主之
---	----------------------------	--	--	---	--	----------------	---	----------------	--	----------------------	---	--	----------------------	----------------------	--------



當歸 三兩 生薑 五兩 羊肉 一斤	疝虛勞不足	當歸生薑羊肉湯 <small>金匱</small> 治產後腹中疝痛并治腹中寒	於前方去肉桂附子餘依前法 <small>此方錢氏專治小兒</small>	熱等症	腿痿軟自汗盜汗便血諸血失音水泛為痰血虛發	壅痰嗽頭目眩暈眼花耳聾咽乾舌痛齒牙不固腰	六味地黄丸 <small>錢氏</small> 治腎陰不足發熱作渴小便淋閉氣	欽定四庫全書 蘭臺軌範	於前八味丸加車前子牛膝各一兩餘依前法	腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱症	資生腎氣丸 治肺腎虛腰重脚輕小便不利或肚	右八味為末煉蜜丸如桐子大酒下十五丸日再服 <small>此方亦治脚氣乃驅邪水以益正水之法也 此方 專利小便水去而陰不傷扶陽而火不升製方之妙 固非一端但近人以此一方治天 下之病則又大失此方之義矣</small>	乾地黄 <small>八兩九蒸為度搗膏</small> 乾山藥 山萸肉 <small>各四兩</small> 丹皮	白茯苓 澤瀉 <small>各三兩</small> 桂枝 附子 <small>各一兩</small>
-------------------------	-------	---	--------------------------------------	-----	----------------------	----------------------	---	----------------	--------------------	------------------	-------------------------	---	--	---



<p>右以水八升煮取三升溫服七合日三服若寒多者加生薑成一斤痛多而嘔者加陳皮二兩白朮一兩如加生薑等者亦加水五升煮取三升二合服之<small>不精</small></p> <p><small>足者補之以味此方是也</small></p>	<p>竹葉石羔湯<small>傷寒論</small> 治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者</p> <p>竹葉 二把 石羔 一斤 半夏 半斤 人參 三兩 甘草 二兩</p> <p>麥門冬 一升 粳米 半升</p>	<p>右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟湯</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭臺軌範</p>	<p>成去米溫服一升日三服<small>集驗載此方加生薑治嘔最良此治三陽餘熱未盡凡大病之後必有留熱總宜清解後人俱概用峻補以留其邪則元氣不能驟復愈虛矣亦</small></p> <p>治傷暑發渴脉虛<small>暑病有虛熱者宜之若吐逆聲亂之症則大誤矣</small></p>	<p>脾約丸<small>金匱即</small> 治腸胃熱燥大便秘結</p> <p>麻仁 五兩 大黃 一斤 厚朴 薑炒 枳實 麩炒 芍藥 五兩</p> <p>杏仁 五兩</p>	<p>右為末蜜丸梧子大臨睡用白湯送下二十九大便</p>	<p>利即止<small>此潤腸之方</small></p>
--	--	-----------------------------	---------------------------	--	--	-----------------------------	--------------------------------



<p>四君子湯 治面色痿白言語輕微四肢無力脉來 虛弱者若內傷虛熱或飲食難化須加炮薑</p>	<p>人參 白朮 茯苓 甘草 <small>各二錢</small></p>	<p>右加薑棗水煎服 <small>此補脾之 主方</small></p>	<p>五味異功散 <small>錢氏</small> 調理脾胃 於四君子湯加陳皮一錢為末每服二錢白湯調服</p>	<p>七味白朮散 治一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保 養衰老及治酒積嘔噦</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範 於四君子湯加藿香半兩葛根一兩木香二錢半為 末每服二錢白湯調下</p>	<p>六君子湯 治氣虛有痰脾虛臌脹 即前方加陳皮半夏餘依前法更加藿香砂仁為香</p>	<p>砂六君子湯 獨參湯 治元氣大虛昏厥脉微欲絕及婦人崩產</p>	<p>脫血血暈 人參 <small>分兩隨 人隨症</small></p>
---	---	---	--	---	---	--	---------------------------------------	---



右一味須上揀者濃煎頓服待元氣漸回隨證加減  
此一時急救之法服後即當隨症用藥

參附湯 治陰陽血氣暴脫證

人參 一兩 附子 製五錢

右加薑棗水煎服 此亦急救之方 本方去人參加黃芪名芪

附湯

保元湯

黃芪 三錢 人參 二錢 甘草 一錢 肉桂 春夏二三分 秋冬六七分

欽定四庫全書

蘭臺軌範

右四味水煎服 氣血虛寒者用之純虛寒之痘症亦用此乃宋以後之方故肉桂止用

二三分為氣分引藥乃厚桂非桂枝也

生脉飲 醫錄 治熱傷元氣氣短倦怠口渴出汗

人參 五錢 麥門冬 五味子 各三錢

右三味水煎服 此方傷暑之後存其津液膚醫即以之治暑病誤甚觀方下治症並無一

字治暑邪者此即於復脉湯內取參麥二味以止汗故復加五味子近人不論何病每用此方收住邪

氣殺人無算

歸脾湯 濟生 治思慮傷脾或健忘怔忡驚悸盜汗寤而







冬月加熟薑 五錢

右為末煮羯羊肉搗為丸桐子大淡鹽湯下

經有明文此方最為合度後人以溫補治痿則相反矣痿症又有屬痰濕風寒外邪者此方又非所宜

資生丸 治婦人妊娠三月脾虛嘔吐或胎滑不固

兼丈夫調中養胃饑能使飽飽能使饑神妙難述

人參 三兩 茯苓 二兩 雲木 三兩 山藥 二兩 薏仁 一兩

蓮肉 二兩 芡實 一兩 甘草 一兩 陳皮 麥蘖

神麩 各二兩 砂仁 一兩 白豆蔻 八錢 桔梗 一兩 藿香 一兩

欽定四庫全書

蘭臺軌範

川黃連 四錢 白扁豆 山查 各一兩半

右十八味為細末煉蜜丸彈子大每服二丸米飲下

此方治懷孕氣阻用兼消兼補之法意亦可取今人不論何因為總治脾胃之藥則失製方之義矣藥

味太襟全無法度姑存之以備一格

龜鹿二仙膠 大補精髓益氣養神

鹿角 十斤 龜板 五斤 以上二味另熬膏 枸杞子

甘州者三十兩 人參 十五兩

右用鉛罈如法熬膠初服酒化一錢五分漸加至三



<p>錢空心下 <small>精不足者補之以味而龜鹿又能通督任填補之法此為最穩</small></p>	<p>三才封髓丹 <small>寶鑑</small> 除心火益腎水滋陰養血潤補不燥</p>	<p>天冬 熟地 人參 <small>各五錢</small> 黃柏 <small>三兩</small> 砂仁 <small>一兩</small></p>	<p>甘草 <small>錢 炙七錢</small></p>	<p>右為末麵糊丸梧子大每服五十九丸用菝蓉半兩切</p>	<p>作片酒浸一宿次日煎三四沸空心食前送下 <small>此補陰氣</small></p>	<p><small>之方虛人老人便結者為宜</small></p>	<p>七寶美髯丹 <small>邵應節</small> 補腎氣烏鬚髮延年益壽</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>何首烏 <small>赤白雌雄各一斤</small> 牛膝 <small>八兩以何首烏先用米泔水</small></p>	<p><small>切作大片用黑豆鋪一層却鋪牛膝一層重相間上鋪豆覆之以</small></p>	<p><small>鋪豆一層却鋪牛膝一層重相間上鋪豆覆之以</small></p>	<p><small>豆熟為度去豆晒乾次日如前</small> 破故紙 <small>半斤酒浸洗</small></p>	<p><small>用生豆蒸如法蒸七次去豆用</small> 白茯苓 <small>半斤用人乳拌</small></p>	<p><small>同炒無聲為度去芝蔴</small> 當歸 <small>半斤去頭</small> 菟絲子 <small>半斤酒浸一宿洗</small> 枸杞</p>	<p>赤茯苓 <small>半斤黑牛乳</small> 菟絲子 <small>半斤酒浸一宿洗</small> 枸杞</p>	<p>子 <small>半斤去蒂枯者</small></p>	<p>右共為末蜜丸龍眼大每日空心嚼二三丸溫酒或米湯白鹽湯皆可下製法不可犯鐵器 <small>此補腎血之方</small></p>
---	---	--	--------------------------------	------------------------------	---	-----------------------------------	--	-----------------------------------	---	---	---	---	--	--	---	--------------------------------	--



<p>無比山藥丸 <small>千金</small> 治丈夫以虛百損五勞七傷頭痛目眩支厥或煩熱或脾疼腰臑不隨飲食不生肌肉或少食而脹滿體無光澤陽氣衰絕陰氣不行</p>	<p>熟地 <small>酒浸</small> 赤石脂 巴戟 <small>去心</small> 茯苓 牛膝 <small>酒</small></p>	<p><small>浸</small> 山茱萸肉 澤瀉 <small>各三兩</small> 乾山藥 <small>二兩</small> 五味子 <small>六兩</small></p>	<p><small>兩</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸</small> 兔絲子 杜仲 <small>炒各三兩</small></p>	<p>右藥煉蜜丸桐子大每服二十九至三十九食前溫酒或米飲下服七日後令人身健體潤面光音響為</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>驗此藥通中入腦鼻必酸疼勿怪 <small>此收攝腎氣之方最為穩妥</small></p>	<p>還少丹 <small>楊氏</small> 大補心腎脾胃虛寒飲食少思發熱盜汗</p>	<p>遺精白濁及真氣虧損肌體羸瘦肢節倦怠等症</p>	<p>山藥 牛膝 遠志 山萸肉 茯苓</p>	<p>五味子 楮實子 巴戟 <small>酒浸</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸</small></p>	<p>石菖蒲 杜仲 <small>薑汁酒</small> 茴香 <small>各一兩</small> 枸杞子 熟</p>	<p>地 <small>各二兩</small></p>	<p>右共為細末煉蜜同棗肉為丸梧子大每服三十九</p>
--	---	--	--	---	------------------------	---	---	----------------------------	------------------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------



溫酒或鹽湯下日三服

此交通心腎之方

羊腎丸

治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈伸不

利夢寐驚悸小便不利

熟地

杜仲

兔絲子

另研

石斛

黃芪

續斷

肉桂

牛膝

磁石

煨醋淬

沉香

五加皮

山藥

炒各一兩

右為末雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊杵丸

梧子大每服七十九空心鹽湯送下

此降納腎氣之方

欽定四庫全書

蘭臺軌範

羊肉粥方

養老書

治老人虛損羸瘦助陽壯筋骨

羊肉 二斤

黃芪

一兩生用

人參

二兩

白茯苓

一兩

大棗

五枚

粳米

三合加生薑少許尤佳入核桃去穢氣亦可

右先以肉去脂皮取精膂肉留四兩細切餘一斤十

二兩以水五大盞并黃芪等煎取汁三盞去滓入米

煮粥臨熟下切生肉更煮入五味調和空心服之

此古

人服食之方也

三才丸

潔古

治脾肺虛咳嗽



津嚥下或薑湯送下 <small>此心神恍惚而有痰者宜之</small>	右為末餅糊丸菘豆大硃砂為衣每服七八十九吐	石菖蒲 六錢	砂 另研各五錢 金箔 二十片 麝香 一錢 琥珀 三錢 茯苓 七錢	半棗仁 炒 柏子仁 去油各三兩 人參 胆星 硃	當歸 一兩 川芎 粉甘草 各一兩 生地 一兩 遠志 二兩	秘方補心丸 治心虛手振	葛蒲四錢無五味子一方有甘草川連	欽定四庫全書 蘭臺軌範	右為末煉蜜丸如椒目大白湯下 <small>此養心之方</small> 一方有石	酸棗仁 各一兩 生地 四兩 柏子仁 一兩	錢當歸 五味子 麥冬 天冬 丹參	人參 白茯苓 元參 桔梗 遠志 各五	天王補心丹 <small>道藏</small> 治心血不足神志不寧津液枯竭健	忘怔忡大便不利口舌生瘡等證	人參 天門冬 地黄 各等分	右為末煉蜜丸空心服 <small>此方與嗽症非宜必上下純虛而不嗽者可用</small>
--	----------------------	--------	--	-------------------------------------	--	-------------	-----------------	----------------	--	----------------------------	------------------	--------------------	--	---------------	---------------	--



黑地黄丸 治陽盛陰衰脾胃不足房室虛損形瘦

無力面多青黃而無常色此補腎益胃之劑也

蒼朮 一斤 油浸熟地 一斤 五味子 半斤 乾薑 五錢 秋冬一兩 夏七錢

右為末棗肉丸梧子大食前米飲服百丸治血虛久

痔甚妙 按此治脫血脾寒之聖藥 乾薑當泡淡炒黑用

元精丹 北方黑氣入通於腎開竅於二陰藏精於

腎味鹹其類水其病在骨此藥主之

血餘 自己髮及父子一本者及少壯男女髮揀去黃 白色者用灰湯洗二三次以大皂角四兩搥碎

欽定四庫全書

蘭臺軌範

煮水洗淨務期無油氣為佳將髮扯斷晒乾每洗髮 一斤用川椒四兩揀去梗核於大鍋內髮一層椒一

層和勻以中鍋蓋鹽泥固濟勿令泄氣桑柴火慢 煮三炷香即退火待冷取出約重四兩有餘於無風

處研為 何首烏 製法如前七寶美髯 細末 丹法取淨末一斤 黑芝蔴 九蒸九

末八 女貞實 四兩 破故紙 炒取淨 生地 酒浸杵 膏入藥熟地

同上製 旱蓮艸 桑葚 各取淨汁熬 各八兩 各取四兩 胡桃仁 二兩 研膏

膠棗 二兩 槐角子 入牛胆內 百日四兩

右以藥末和諸膏和勻加煉蜜一斤入石臼杵千餘

下為丸梧子大每服六十九空心用首烏釀酒二三



杯送下日三服

諸品皆色黑之藥專補腎血此治便後脫血之神方也

青州白丸 局方

治一切風及小兒驚風婦人血風大人

頭風

南星 三兩

白附子 二兩

半夏 七兩

川烏 半兩各

生用

右為細末放磁器中日晒夜露春五夏三秋七冬十

日以糯米粉煮粥丸薑湯下風症溫酒下驚風薄荷

湯下

此四味宜水研取漿澄粉晒露七日去水作丸此治風痰之要藥

指迷茯苓丸

治中脘留伏痰飲臂痛難舉手足不

欽定四庫全書

蘭臺軌範

得轉移

茯苓 二兩

半夏 一兩

枳殼 半兩

風化硝 二錢

右為末薑汁和丸桐子大每服三十丸薑湯下

按方極和

平而義精效速方內半夏宜生研澄粉用

威喜丸

局方

治飲食積滯蟲痞脹滿久痢久瘧沉冷積

寒

廣木香

肉豆蔻

各四錢

乾薑

泡炒二錢五分

巴豆

二十粒去皮心

及油炒研

杏仁

四十粒去皮尖研

百草霜

五錢加茯苓亦可





<p>右前四味為末入百草霜同研後入杏仁巴豆霜研</p>	<p>黃蠟一兩五錢酒煮一時去酒將蠟入麻油七錢溶</p>	<p>化拌藥研勻乘熱丸如菉豆大每服二三十丸</p>	<p><small>義最精凡治積新病宜急下以病宜緩下此方治以患寒積之症乃緩下法也</small></p>	<p>靈砂 <small>局方</small> 治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮墜升降陰陽</p>	<p>和五臟助元氣</p>	<p>水銀 一斤 硫黃 四兩</p>	<p>右二味用新鐵銚炒成砂子或有烟焰即以醋洒候</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>研細入水火鼎醋調赤石脂封口鐵線扎縛曬乾鹽</p>	<p>泥固濟用炭二十斤煨如鼎子烈筆蘸赤石脂頻抹</p>	<p>其處火盡為度經宿取出研為細末糯米糊為丸如</p>	<p>麻子大每服三丸空心棗湯米飲并花水人參湯任</p>	<p>下量病輕重增至五七丸 <small>此鎮墜之藥若用黑錫丹則此方可不備</small></p>	<p>二神丸 <small>本事方</small> 治腰痛腎虛全不進食</p>	<p>破故紙 <small>炒四兩</small> 肉豆蔻 <small>生二兩</small></p>	<p>右為末用大棗四十枚生薑四兩同煎糜爛去薑棗</p>
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--	---	---------------	--------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	---	--	-----------------------------



<p>核皮研膏入藥末丸鹽湯下 <small>此治腎家有寒濕之方</small> 本方加五</p>	<p>味子吳茱萸各二兩為四神丸</p>	<p>導赤散 <small>錢氏</small> 治心熱口糜舌瘡小便黃赤莖中作痛熱</p>	<p>淋不利</p>	<p>生地 木通 甘草梢 <small>各等分</small></p>	<p>右三味水煎服 <small>此瀉心火從小腸中出也</small></p>	<p>亡血脫血方 <small>千金翼</small> 治亡血脫血鼻頭白色唇白去血無力者</p>	<p>力者</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>生地黃 <small>十斤</small></p>	<p>右一味搗以酒一斗絞取汁令極盡去渣微火煎減</p>	<p>半內白蜜五升棗膏一升以攪之勿止令可丸酒服</p>	<p>如雞子一丸日三以服不已老而更少萬病除愈千</p>	<p>金又以此二味加阿膠甘草作煎服亦可用</p>	<p>當歸補血湯 <small>寶鑑</small> 治男婦血虛似白虎証肌熱面赤煩</p>	<p>渴引飲脉來洪大而虛重按則微</p>	<p>當歸 <small>二錢</small> 黃芪 <small>一兩</small></p>
--	---------------------	---	------------	-------------------------------------	---	--	-----------	------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---	----------------------	--



右二味水煎服 <small>此補表血之方</small>	益血潤腸丸 治津液亡大腸秘老人虛人皆可服	并祛風養血	熟地 <small>六兩</small> 杏仁 <small>炒</small> 麻仁 <small>各三兩以上</small> 枳殼 當	歸 橘紅 <small>淨各二兩五錢</small> 阿膠 肉蓯蓉 <small>各一兩半</small> 蘇子	荆芥 <small>各一兩</small>	右為末以前三味膏同杵千餘下仍加蜜丸梧子大 每服五六十九丸空心白湯下 <small>此脾約丸之變法</small>	欽定四庫全書 蘭臺軌範	芎藭膠艾湯 <small>金匱</small> 婦人有漏下者有半產後因續下血 不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛為胞阻膠 艾湯主之	芎藭 阿膠 甘草 <small>各二兩</small> 艾葉 當歸 <small>各三兩</small>	芍藥 <small>四兩</small> 乾地黄 <small>六兩</small>	右六味水五升清酒三升合煮取三升去渣內膠令 消盡溫服一升日三服不差更作	四物湯 <small>局方</small> 治一切血熱血虛血燥諸証
---------------------------------	-------------------------	-------	---	--	-----------------------	--	----------------	--	--	--	---------------------------------------	-----------------------------------



<p>當歸 熟地 各三錢 川芎 一錢五分 白芍 二錢 酒炒</p>	<p>右四味水煎服 此血病之主方</p>	<p>八珍湯 治心肺虛損氣血兩虛</p>	<p>即四君子湯合四物湯餘依上法</p>	<p>十全大補湯 局方 治男子婦人諸虛不足五勞七傷不</p>	<p>進飲食以病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜</p>	<p>夢遺精面色痿黃脚膝無力</p>	<p>即八珍湯加桂心陳皮</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範 人參養營湯 局方 治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食</p>	<p>少作瀉</p>	<p>人參 白朮 茯苓 甘草 黃芪</p>	<p>陳皮 當歸 熟地 白芍 桂心 各一錢 七分 半 一錢 一錢</p>	<p>遠志 五分 五味子 七分 半</p>	<p>右十二味加薑三片大棗二枚 此即十全大補湯去 川芎加五味遠志黃</p>	<p>芪以生 心血</p>	<p>柴胡四物湯 保命 治日以虛勞微有寒熱脉沉而數</p>
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------	------------------	--	------------	-----------------------	--------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------	-------------------------------



<p>川芎 當歸 白芍 熟地 <small>各一錢五分</small> 柴</p> <p>胡 <small>一錢</small> 人參 黃芪 甘草 半夏 <small>各三錢</small></p> <p>右為末水煎服 <small>柴胡加入補藥俱不相合獨此為宜柴胡疎通少陽調和營衛非專於散也風</small></p>	<p>兔絲子丸 <small>和劑</small> 治腎氣虛損五勞七傷脚膝痠疼面目</p>	<p>鯿黑目眩耳鳴心冲氣短時有盜汗小便數滑</p>	<p>兔絲子 鹿茸 <small>酥炙去毛</small> 澤瀉 石龍芮 <small>去土淨再用水洗</small></p>	<p>桂枝 附子 <small>各一兩</small> 石斛 熟地 茯苓</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>牛膝 <small>酒浸焙</small> 山萸肉 續斷 防風 杜仲</p>	<p>肉蓯蓉 <small>酒浸焙</small> 補骨脂 <small>酒炒</small> 華澄茄 巴戟</p>	<p>沉香 茴香 <small>炒各七分</small> 五味子 川芎 桑螵</p>	<p>蛸 <small>酒浸炒</small> 覆盆子 <small>各五錢</small></p>	<p>右為細末酒煮麪糊為丸梧子大每服三十九溫酒下或鹽湯下 <small>此等方不過陰陽兼補之法泛而無統近時補劑盡如此然能多而不雜尚屬</small></p>	<p>菴蓉兔絲子丸 此方不寒不熱助陰生子</p>
---	---	---------------------------	---	--	--------------------	---	--	--	--	--	--------------------------



<p>肉蓯蓉 <small>一兩</small> 覆盆子 <small>三錢</small> 蛇麻子 川芎 當</p>	<p>歸 兔絲子 <small>各一兩</small> 白芍 <small>一兩</small> 牡蠣 <small>鹽泥</small> 烏鯽魚</p>	<p>骨 <small>各八錢</small> 五味子 防風 <small>各六錢</small> 艾葉 <small>三錢</small> 條芩 <small>五錢</small></p>	<p>右為末煉蜜丸如梧子大每服三四十九鹽湯下早</p>	<p>晚皆可服 <small>此乃婦人濕經之主方也</small></p>	<p>餌木方 <small>千金翼</small></p>	<p>生術削去皮炭火急炙令熟空肚飽食之全無藥氣</p>	<p>可以當食不假山糧惟飲水神秘之勿傳 <small>真於米尤佳此服食</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>服牛乳方 <small>千金翼</small> 能補虛破氣</p>	<p>牛乳 <small>三升</small> 華撥 <small>半兩末</small> 之綿裹</p>	<p>右二味於銅器中水三升和乳合煎取三升頓服日</p>	<p>三七日除一切氣</p>	<p>生地黄煎 <small>外臺</small> 主補虛損填骨髓長肌肉去客熱</p>	<p>生地汁 <small>五升</small> 棗膏 <small>六合</small> 白蜜 <small>七合</small> 酒 <small>一升</small> 牛酥 <small>四合</small></p>	<p>生薑汁 <small>二合</small> 紫蘇子 <small>一升</small> 絞取汁 鹿角膠 <small>四兩</small> 炙末</p>
---	---	---	-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---	--------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------	----------------	---	---	---



右煎地黄等六味汁三分減一內蜜調入膠末候煎  
成以器盛之酒和服

阿伽陀藥千金翼主諸種病及將息服法久服益人神色

無諸病方此等即所謂海上奇方如紫金錠之類其所治之症皆與本草不相合而確有神驗

真不可思議也

紫檀用蘇木亦可小蘗一名山石榴鬱金胡椒

各五兩

右為末水和內白中更搗一萬杵丸好陰乾用諸

欽定四庫全書

蘭臺軌範

咽喉口中熱瘡以水煮升麻湯下桐子大一丸旦服  
之諸面腫心悶因風起者煮防風湯服一丸諸四體  
酸疼或寒或熱麻黃湯一丸諸蠱下部有瘡吞一丸  
又煮艾槐白皮湯研一丸灌下部諸卒死冷水服二  
丸諸被壓擣當心帶一丸又水研一丸三服諸被蛇  
及惡獸等毒以麝香如相思子研藥一丸服并以紫  
檀磨汁和藥塗患處諸被鬼撓亂失心癲狂艾汁下  
如無青艾乾艾取汁亦可并隨身帶一丸諸傳尸水







盜汗方 <small>外臺</small> 麻黃根 牡礪 <small>各三錢</small> 黃芪 人參 <small>各三兩</small> 龍骨	枸杞根白皮 <small>各四兩</small> 大棗 <small>七枚</small> 右以水六升煮取二升五合分六服	止汗紅粉 麻黃根 牡礪 <small>各一兩</small> 赤石脂 龍骨 <small>各五錢</small> 右為末以絹袋盛貯如朴粉用之	當歸六黃湯 治陰虛有火盜汗發熱 欽定四庫全書 蘭臺軌範	當歸 生地 熟地 黃芩 黃連	黃柏 <small>等分</small> 黃芪 <small>加倍</small> 右水煎服 <small>九止汗方內俱可加浮麥大棗</small>	麥門冬湯 <small>三因</small> 治漏氣因上焦傷風開其腠理上焦之	氣慄悍滑疾遇開即出經氣失道邪氣內著故有是症	麥冬 生蘆根 竹茹 白朮 <small>各五錢</small> 甘草 <small>炙</small>	茯苓 <small>各二兩</small> 人參 陳皮 葳蕤 <small>各三兩</small>
--	--	---	--------------------------------------	----------------------------	--	---	-----------------------	---	--



右九味每服四錢薑五片陳米一撮煎熱服不論冬夏頭汗  
自出謂之漏風  
俗名蒸籠頭

二賢散 治積塊進飲食

橘紅 一斤  
甘草 四兩  
鹽 五錢

右以水煮爛晒乾為末淡鹽湯下有塊加薑黃半兩  
同前藥煮氣滯加香附二兩氣虛加沉香半兩另入  
噤口痢加蓮肉二兩

逍遙散 局方 治肝家血虛火旺頭痛目眩頰赤口苦倦

欽定四庫全書

蘭臺軌範

怠煩渴抑鬱不樂兩肋作痛寒熱小腹重墜婦人經  
水不調脉弦大而虛

芍藥 酒炒 當歸 白朮 炒 茯苓 甘草 炙

柴胡 各二錢 本方加丹皮梔子即加味逍遙散加煨薑

三片薄荷少許煎服 此疎達肝脾之方

平胃散 東垣 治濕淫於內脾胃不能剋制有積飲痞膈

中滿者

蒼朮 五斤米泔浸七日 陳皮 去白 厚朴 各三斤薑汁炒 甘草 三十兩



<p>右為末每服二錢薑湯下日三服或水煎每服五錢</p>	<p>如小便赤澁加茯苓澤瀉米穀不化飲食傷多加枳</p>	<p>殼胃中氣不快心下痞氣加枳殼木香心下痞悶腹</p>	<p>脹者加厚朴甘草減半遇夏加炒黃芩遇雨水濕潤</p>	<p>時加茯苓澤瀉如有痰涎加半夏陳皮咳嗽飲食減</p>	<p>少脉細加當歸黃芪脉洪大緩加黃芩黃連大便硬</p>	<p>加大黃三錢芒硝三錢先嚼麩炒桃仁爛以藥送下</p>	<p>本方加皂礬即皂礬平胃丸 <small>消食積 蟲痞</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>五苓散 <small>金匱</small> 治瘦人臍下有悸吐涎沫而癩眩此水也</p>	<p>此方主之 <small>此乃散方近人用以作湯往往鮮效</small></p>	<p>澤瀉 <small>一兩一分</small> 猪苓 <small>去皮</small> 白朮 <small>各三錢</small> 茯苓 <small>各三錢</small> 桂 <small>二分</small> <small>去皮</small></p>	<p>右五味為末白飲服方寸七日三服多飲暖水汗出</p>	<p>愈 <small>傷寒論以此方治太陽表裏未清之症所謂表裏者經與府也故此方為利膀胱水道之主藥</small></p>	<p>二陳湯 <small>局方</small> 治肥盛之人濕痰為患喘嗽脹滿</p>	<p>半夏 <small>製</small> 茯苓 <small>各三錢</small> 陳皮 <small>二錢</small> 甘草 <small>一錢</small> <small>去白</small></p>	<p>右四味加薑三片水煎服</p>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	------------------------	---	---	--	-----------------------------	--	--	--	-------------------



<p>枳木丸 治痞積消食強胃 <small>金匱名枳木湯治心中堅大如盤</small></p> <p>枳實 一兩 白朮 二兩</p> <p>右用荷葉裹燒飯為丸桐子大每服五十丸加木香</p>	<p>砂仁即香砂枳木丸 <small>方本金匱張潔古變其法成丸</small></p>	<p>瀉黃散 治脾胃伏火口燥唇乾口瘡口臭煩渴</p> <p>藿香 七錢 山梔 一兩 甘草 二兩 防風 四兩</p>	<p>保和丸 <small>丹溪</small> 治食積酒積</p> <p>右四味同蜜酒炒為末每二錢煎服 <small>其妙在用蜜酒炒</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p> <p>山查 二兩 半夏 薑製 橘紅 神麴 麥芽</p>	<p>茯苓 兩 各一 連翹 萊菔子 炒 黃連 兩 各半</p> <p>右為末水丸加白朮二兩名大安丸 <small>此治脾胃濕火氣阻之方</small></p>	<p>加減思食丸 治脾胃俱虛水穀不化胸膈痞悶腹</p> <p>脇時脹食減嗜卧口苦無味虛羸少氣胸中有寒飲</p>	<p>食不下反胃惡心及病後心虛不勝穀氣食不服常</p> <p>並宜服之</p>	<p>神麴 炒黃 麥芽 炒黃 各 烏梅 四兩 乾木瓜 半兩 白茯苓</p>
--	---	---	---	--	---	---	---	---------------------------------------



<p>苓 甘草 炒各二錢半</p>	<p>右為末蜜丸櫻桃大每服一丸細嚼白湯送下如渴</p>	<p>時噙化一丸 <small>此收納胃氣之方用烏梅木瓜甚巧</small></p>	<p>越鞠湯丸 <small>丹溪</small> 治一切濕痰食火氣血諸鬱</p>	<p>香附 蒼朮 換芎 <small>各二兩</small> 神麴 山梔仁 <small>各一兩</small></p>	<p>右以水煎服或作丸菴豆大每服百丸白滾湯下</p>	<p>四磨飲 <small>濟生</small> 治七情傷感上氣喘急胸膈不快妨悶不</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>食</p>	<p>人參 栝榔 沉香 天台烏藥</p>	<p>右四味各濃磨水取七分煎三五沸空心溫服 <small>濃汁使藥</small></p>	<p>存留胸中不即下達亦古製方之法也</p>	<p>紗香丸 <small>局方</small> 治時疾傷寒解五毒治潮熱積熱及小兒</p>	<p>驚癇百病</p>	<p>巴豆 <small>三百十五粒去殼心膜炒熱研如麵按巴豆太多宜酌減</small> 牛黃 龍腦 研</p>	<p>膩粉 麝香 <small>研各三兩</small> 辰砂 <small>研飛九兩</small> 金箔 <small>研片十</small></p>
-------------------	-----------------------------	--	---	--	----------------------------	---	--------------------	----------	----------------------	---	------------------------	---	-------------	---	---



<p>藿香正氣散 <small>局方</small> 治外受四時不正之氣內停飲食頭</p>	<p>可化開服則三分一丸之大丸不能下嚥 宜作一分一丸之小丸每服三丸為妥</p>	<p>用針刺一孔冷水浸少時服之其效更速 <small>凡用蠟丸之藥既不</small></p>	<p>一服取轉下一切惡毒涎并藥丸瀉下如要藥即行</p>	<p>服一丸或分作三丸亦可并用龍腦膩粉米飲調下</p>	<p>八日至半月日未安醫所不明證候脉息交亂者可</p>	<p>時疾陰陽氣交結伏毒氣胃中喘燥眼赤潮發經七</p>	<p>用金銀薄荷湯下更量歲數加減如男婦因病傷寒</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>大二丸諸積食積頰赤煩躁睡卧不寧驚哭瀉痢並</p>	<p>驚癇急慢驚風涎潮搐搦用龍腦膩粉蜜湯下菴豆</p>	<p>吐血悶亂煩躁欲死者用生人血下立愈小兒百病</p>	<p>毒風痰伏痞吐逆等症并用膩粉龍腦米飲下中毒</p>	<p>痢下血黃連湯調膩粉少許如患酒毒食毒茶毒氣</p>	<p>熱口乾面赤大小便不通大黃炙甘草湯下一丸毒</p>	<p>兩作三十丸如治潮熱積熱傷寒結胸發黃狂走踈</p>	<p>右合研勻煉黃蠟六兩入白蜜三分同煉勻為丸每</p>
---	---	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



<p>痛寒熱或霍亂吐泄或作瘧疾</p>	<p>厚朴 陳皮 桔梗 半夏<small>各二兩</small> 甘草<small>一兩</small></p>	<p>大腹皮<small>換檳榔亦可</small> 白芷 茯苓 蘇葉<small>各三兩</small> 藿香</p>	<p>三兩</p>	<p>右十味加薑棗水煎熱服 <small>此方可治時疫</small></p>	<p>天水散 <small>河間一名益元散</small> 治夏時中暑熱傷元氣內外俱</p>	<p>熱無氣以動煩渴欲飲腸胃枯涸者又能催生下乳</p>	<p>積聚水畜裏急後重暑注下迫者宜之</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>桂府滑石<small>六兩</small> 甘草<small>一兩</small> 辰砂<small>三錢</small></p>	<p>右為細末新汲水一碗調服三錢 <small>滑利清涼通達水道而不傷陰所以</small></p>	<p>佳為</p>	<p>二氣丹 <small>局方</small> 治內虛裏寒胸腹滿痛泄利無度嘔吐自</p>	<p>汗小便不禁陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰症霍亂</p>	<p>轉筋以下冷痢少氣羸困一切虛寒痼冷</p>	<p>肉桂 硫黃<small>細研各二錢半</small> 乾薑<small>炮</small> 硃砂<small>另研為衣各二錢</small> 黑</p>	<p>附子<small>製五錢</small></p>
---------------------	--	--	-----------	---	--	-----------------------------	------------------------	--------------------	--	--	-----------	---	-----------------------------	-------------------------	---	-----------------------------



四物二連湯 <small>元戎</small> 治血虛五心煩熱晝則明了夜則發	疎風清火 之品也	右為末每服三錢加竹葉生蜜煎 <small>此瀉中上二焦之火即調胃承氣加</small>	薄荷 梔子 <small>各一兩</small>	連翹 <small>四兩</small> 大黃 <small>酒浸</small> 芒硝 甘草 <small>各二兩</small> 黃芩 <small>酒炒</small>	狂及小兒驚風痘瘡黑陷	眩口瘡唇裂吐血衄血大小便秘諸風癰癤發斑發	涼膈散 <small>局方</small> 治心火上盛中焦燥實煩躁口渴目赤頭	欽定四庫全書 蘭臺軌範	右三味水煎服	黃芩 大黃 黃連 <small>各等分</small>	三黃湯 <small>本事方</small> 治三焦實熱一切有餘火症大便秘結者	右為末每服一二錢入粳米百粒水煎 <small>此方能治肺中之飲</small>	桑皮 <small>炒</small> 地骨皮 <small>各一兩</small> 甘草 <small>五錢</small>	瀉白散 <small>錢乙</small> 治肺熱咳嗽	右為末麵糊丸桐子大每服三十九艾湯或鹽湯下 <small>此治下焦無陽積寒犯腎之症</small>
--	-------------	--	--------------------------------	---	------------	----------------------	--	----------------	--------	--------------------------------------	---	--	--	-----------------------------------	---





<p>熱</p>	<p>當歸 白芍<small>炒</small> 生地<small>各一兩</small> 川芎<small>七分</small> 黃連<small>炒五分</small></p>	<p>胡黃連<small>三分</small></p>	<p>右六味水煎服<small>血中有實熱此方主之</small></p>	<p>左金丸 治肝藏火實左脇作痛</p>	<p>黃連<small>六兩</small> 吳茱萸<small>一兩</small> <small>洗泡</small></p>	<p>右為末作丸<small>吳茱萸仲景用以治嘔逆吐涎等症脇痛亦痰飲為害也兩脇皆屬於肝此方亦</small></p>	<p>不專治左脇</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>龍胆瀉肝湯<small>局方</small> 治脇痛口苦耳聾耳腫筋痿陰濕熱</p>	<p>癢陰腫白濁洩血</p>	<p>龍胆<small>酒炒三分</small> 黃芩<small>炒</small> 梔子<small>酒炒</small> 澤瀉<small>一錢</small> 木通</p>	<p>車前子<small>各五分</small> 當歸<small>酒洗三分</small> 柴胡<small>一錢</small> 甘草 生地</p>	<p>酒炒各三分</p>	<p>右十味水煎服<small>此瀉中上焦之火純用苦味</small></p>	<p>甘露飲<small>局方</small> 治丈夫小兒胃中客熱牙宣齒爛目垂欲閉饑不欲食及目赤腫痛口瘡咽腫瘡疹已發未發</p>
----------	--	-----------------------------	---------------------------------------	----------------------	---	--	--------------	--------------------	--	----------------	--	--	--------------	---	--



又療脾胃濕熱醉飽房勞黃疸腹滿或時身熱並宜服之	
枇杷葉	熟地
生地	天冬
麥冬	枳殼
石斛	茵陳
甘草 <small>炙</small>	黃芩 <small>各</small>
黃芩 <small>各</small>	黃芩 <small>等</small>
右為末每二錢水一盞煎七分去滓食後臨卧温服	本事方去麥冬加犀角名加減甘露飲 <small>此乃以散作飲者</small>
清心蓮子飲 <small>局方</small>	治心虛有熱小便赤澀
欽定四庫全書	蘭臺軌範
黃芩	麥門冬 <small>去心</small>
子 <small>各半</small>	地骨皮
石蓮肉 <small>去心</small>	甘草 <small>炙</small>
白茯苓 <small>去皮</small>	車前
黃芪 <small>蜜炙</small>	人參 <small>各</small>
半錢	右剉散每三錢另用麥冬十粒水煎八分水中沉冷
空心服發熱加柴胡薄荷 <small>亦以散作飲者</small>	瀉熱梔子煎 <small>外臺</small>
梔子 <small>二十枚</small>	治胆府實熱精神不守
竹茹 <small>一兩</small>	香鼓 <small>六合</small>
大青	橘 <small>各二</small>
赤	蜜 <small>三合</small>



<p>右六味以水六升煮取一升七合去滓下蜜再微煎 二三沸分再服</p>	<p>大順散 <small>局方</small> 治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不 分霍亂嘔吐藏腑不調</p>	<p>甘草 <small>三十斤 剉寸長</small> 乾薑 <small>杏仁 去皮</small> 肉桂 <small>去麤皮 各四斤</small></p>	<p>右先將甘草用白砂糖炒及八分黃熟次入乾薑同 炒令薑裂次入杏仁又同炒候不作聲為度篩淨後 入肉桂一處搗為散每服二錢水煎溫服如煩躁并</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>花水調下不拘時沸湯調亦得 <small>此治暑天內傷冷飲 之症非治暑也又甘 草多於諸藥八倍亦非法此等病百不得一偶用之 耳而製藥四十二斤又止服二錢其意何居其方本 不足取而後之庸醫竟以此治燥火 之暑病殺人無算故錄此以証其非</small></p>	<p>十精丸 <small>又名保真丸 元和紀用經</small></p>	<p>兔絲子 <small>人精長陰發陽 酒浸一宿濕搗</small> 甘菊花 <small>月精二味 春加一倍</small> 五加皮 <small>草</small></p>	<p>益肌去 <small>木精明目通 氣二味夏加</small> 白朮 <small>日精長 肉</small> 人參 <small>藥精 鎮心</small></p>	<p>療驚癇 <small>二 石斛 <small>山精治筋骨如 金釵者酥炙</small></small> 鹿茸 <small>益精酥炙 痛</small> 肉</p>	<p>茯苓 <small>地精破癥消食 酒浸一宿蒸用</small> 巴戟 <small>天精治精冷益智紫色者 去心酒浸一宿四味冬加</small></p>
--	---	--	---	------------------------	--	---	---	---	---	--



<p>右十味等分隨四季各加分兩為末煉蜜丸梧桐子 大空心溫酒或鹽湯下二十五粒至三十粒忌牛肉</p>	<p>生葱 <small>此世所謂丹藥也溫平補益</small></p>	<p>成煉鍾乳粉 <small>千金翼</small> 主五勞七傷效逆上氣治寒嗽通音</p>	<p>聲明日益精安五藏通百節利九竅下乳汁益氣補</p>	<p>虛療脚弱冷疼下焦傷竭強陰以服延年益壽令人</p>	<p>有子</p>	<p>鍾乳 <small>不拘多少</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>右取韶州鍾乳顏色明淨光澤者不拘多少置鍾乳 於金銀器中即以大鐺著水沉金銀器於鐺中煮之 常令如魚眼沸水減即添薄乳三日三夜麤厚管者</p>	<p>七日七夜候乳色變黃白即熟如疑生更煮滿十日 最佳出金銀器中更著清水更煮經半日許即出之 水色清不變則止即於磁鉢中用玉錘著水研之每</p>	<p>日著水攪令勻勿使著錘鉢勿使纖塵入內研覺乾 溢即更添水常令如稀米泔狀乳細者皆浮在上麓</p>
--	--------------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------	------------------------	---	---	--



<p>者沉在下復繞鎚鉢四邊研之狀若乳汁研指上如書中白魚膩即成澄取曝乾每服秤半兩分為三服用溫酒調下空腹服更量病輕重加減服之亦可和為丸服之</p> <p><small>此鎮心強腎之聖藥唐人最重之</small></p>	<p>玉霜圓 <small>局方</small> 治真氣虛憊下焦傷竭臍腹弦急腰脚疼痛精神困倦面色枯槁或亡血盜汗遺瀝失精二便滑數肌消陽痿以服續骨聯筋秘精堅髓安魂定魄輕身壯陽</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭臺軌範</p>	<p>白龍骨 <small>一斤細搗羅研水飛三次晒乾用黑</small> 牡蠣 <small>煨</small></p>	<p>成粉紫稍花 <small>如無以木賊</small> 牛膝 <small>酒浸炙</small> 磁石 <small>醋淬</small> 紫巴</p>	<p>戟 <small>穿心</small> 澤瀉 <small>酒浸一宿炙</small> 石斛 <small>炙</small> 硃砂 <small>研飛</small> 肉蓯蓉 <small>去皮</small></p>	<p>酒浸一宿炙 茴香 <small>微炒</small> 肉桂 <small>去皮各</small> 兔絲子 <small>酒浸一</small></p>	<p>杵為末 鹿茸 <small>半兩酒浸一伏</small> 韭子 <small>微炒</small> 天雄 <small>十兩酒浸</small></p>	<p>地坑以炭燒赤速去火令淨以醋二升沃於坑候乾乘熱便投天雄在內以盆合土攤之經宿後取出去</p>	<p>皮 齊</p>	<p>右為細末煉酒蜜各半和圓如桐子大每服三十九</p>
---	---	---------------------------	--	---	---	--	---	---	------------	-----------------------------



黑錫	破故紙	沉香	水氣脚氣上攻或卒暴中風痰潮上膈等症	頭目及奔豚上氣兩脇膨脹并陰陽氣不升降五種	黑錫丹	響應	氣從上也少頃藥力至而漸逐惡物入腹下腸效如	欽定四庫全書	右四味為細末水丸川椒大量人大小用之用溫水	礞石滾痰丸	空心晚食前溫酒下
硫黃	肉豆蔻	附子	肉桂	肉桂	治脾元以冷上實下虛胸中痰飲或上攻	之主方	下結痰	蘭臺軌範	一口送過咽即仰卧令藥徐徐而下半日不可飲食	養生	按此藥滋精納氣腎中
與黑錫結炒	金鈴子	胡蘆巴	各半	各半					勿起身行動言語待藥氣自胃口漸下二腸然後動	主論	陽虛者最宜亦丹藥也
子各三兩	木香	茵香	兩	兩					作飲食服後喉間稠黏壅滯不快此藥力相攻故痰	酒蒸各	
	各一								作飲食服後喉間稠黏壅滯不快此藥力相攻故痰	八兩	
									勿起身行動言語待藥氣自胃口漸下二腸然後動	礞石	
									一口送過咽即仰卧令藥徐徐而下半日不可飲食	埋地內七日	
									勿起身行動言語待藥氣自胃口漸下二腸然後動	沉香	
									一口送過咽即仰卧令藥徐徐而下半日不可飲食	五錢	



<p>右為末同研酒煮麵糊為丸梧子大陰乾以布袋擦          令光瑩每服四十九丸薑湯下 <small>此鎮納上越之陽氣為醫家必備之要藥按</small></p>	<p><small>黑錫成砂最難加水銀少許為妙</small></p>	<p>龍腦雞蘇丸 <small>局方</small> 治上焦熱除煩解勞去肺熱咳衄血</p>	<p>熱驚悸脾胃熱口甘吐血肝胆熱泣出口苦腎熱神</p>	<p>志不定上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血崩</p>	<p>薄荷 一斤 生地 <small>另為末六兩</small> 黃芩 新蒲黃 <small>炒</small> 麥冬</p>	<p>阿膠 <small>炒</small> 人參 <small>俱為末</small> 木通 銀柴胡 <small>各二兩木通沸</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p><small>湯浸一日</small> 甘草 <small>一兩</small> 黃連 <small>一兩</small></p>	<p>右為末好蜜二斤先煎一二沸然後下生地末不住</p>	<p>手攪時加木通柴胡汁慢火熬膏勿令火緊膏成然</p>	<p>後加藥末和丸豌豆大每服二十九丸白湯下 <small>此方製法精妙</small></p>	<p>虛勞虛煩梔子湯下肺熱黃芩湯下心熱悸動恍惚</p>	<p>人參湯下衄血吐血麥冬湯下肝熱防風湯下腎熱</p>	<p>黃柏湯下已上並食後臨卧服治五淋及婦人漏下</p>	<p>車前湯下痰嗽者生薑湯下莖中痛者蒲黃滑石水</p>
--	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------	---	---	-----------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



一鍾調下氣逆橘皮湯下室女虛勞寒熱潮作柴胡	人參湯下	生地末不若鮮者一斤同蜜熬成膏尤妙此方能治血中之熱骨蒸病最宜惟薄荷太多宜減十分之九想製方之人所用薄荷乃他處之薄荷非蘇州之真龍腦也真龍腦芳烈透腦發洩太過反有所害故醫者不可不知藥也	至寶丹	局方	治中惡氣絕中風不語中諸物毒熱疫煩	躁氣喘吐逆難產悶亂死胎不下以上並用童便一	合生薑自然汁三五滴和溫化下三圓至五丸神效	又治心肺積熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍惚	欽定四庫全書	蘭臺軌範	頭目昏眩口乾不眠傷寒狂語並治之	生烏犀屑	生玳瑁屑	琥珀	硃砂	雄黃	龍腦	麝香	牛黃	安息香	一兩半為末酒研飛淨一兩熬膏用永安息尤妙	銀箔金箔	各五十片	研細為衣	右將生犀玳瑁為細末入餘藥研勻將安息香膏重	湯煮凝成後入諸藥中和搜成劑丸如桐子大用人	參湯化下三丸至五丸又治小兒諸癇急驚心熱卒	中客忤不得眠煩躁風涎搐搦每二歲兒服二丸人
----------------------	------	---	-----	----	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	------	-----------------	------	------	----	----	----	----	----	----	-----	---------------------	------	------	------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------





<p>參湯下本事方中多人參南星天竺黃<small>安神定魄必備之方真神也</small>丹</p>	<p>蘇合香丸<small>局方</small>療傳屍骨蒸殭殍肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣瘴癘赤白暴利瘀血月閉痲痺丁</p>	<p>腫驚癇小兒吐乳大人狐狸等疾</p> <p>蘇合香油<small>五錢入安息香內</small>安息香<small>一兩另為末用無灰酒半斤熬膏</small>丁香</p>	<p>青木香 白檀香 沉香 華撥</p> <p>香附子 訶子<small>煨取肉</small>烏犀<small>鎊</small>硃砂<small>水飛各一兩</small>薰陸</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭臺軌範</p> <p>香 片腦<small>研各五錢</small>麝香<small>七錢半</small></p>	<p>右為細末入安息香膏煉蜜和劑圓如芡實大每四</p> <p>丸空心用沸湯化下溫酒下亦得<small>此辟邪驅穢之聖方惟冰麝太多宜</small></p>	<p>減大</p> <p>瓊玉膏<small>申先</small>治虛勞乾效</p>	<p>生地黄<small>四斤若取鮮生</small>白茯苓<small>十二兩</small>白蜜<small>二斤</small>人參</p> <p>六兩有加沉香血</p> <p>珀粉各一錢五分</p>	<p>右以地黄汁同蜜熬沸用絹濾過將參茯苓為細末入</p>
---	---	---	--	--	---	--	---	------------------------------



兩各	一	防風	葛根	虎脛骨	當歸	血	黃芩	茯苓	香附	元參	白朮	骨碎補	白蔻	安息香	黑附子	研另	丁香	乳香	殭蚕	天南星	青皮	木香	沉香	細辛	赤芍	沒藥	藿香	烏藥	黃連	熟地	大黃	麻黃	貫仲	炙草	羌活	官桂	草烏	天麻	全蝎	首烏	龜板	欽定四庫全書	蘭臺軌範	白花蛇	烏稍蛇	威靈仙	兩頭尖	大活絡丹	治一切中風癱瘓痿痺痰厥拘攣疼痛	癰疽流注跌撲損傷小兒驚癇婦人停經	紙紮口以蠟封固懸井中一日取起仍煮半日湯調	砂鍋內以長流水沒瓶頸桑柴火煮三晝夜取出換	服	此方別本製法各殊此為血症第一方按乾淮	生地四斤浸透可取自然汁一斤若浙地則十斤	祇取自然汁一斤須三十斤方可配諸	藥故修合之法當隨時隨地變通也
----	---	----	----	-----	----	---	----	----	----	----	----	-----	----	-----	-----	----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------	------	-----	-----	-----	-----	------	-----------------	------------------	----------------------	----------------------	---	--------------------	---------------------	-----------------	----------------



<p>蝎<small>另研</small> 七錢 地龍<small>炙</small> 犀角 麝香<small>另研</small> 松脂<small>各五錢</small> 牛</p>	<p>黃<small>另研</small> 片腦<small>另研各一錢五分</small> 人參<small>三兩</small></p>	<p>右共五十味為末蜜丸如桂圓核大金箔為衣陳酒</p>	<p>送下<small>頑痰惡風熱毒瘰癧入於經絡非此方不能透達凡治肢體大症必備之藥也方書亦有活絡丹祇用地龍乳香等四五味此乃治藜藿人實邪之方不堪用也</small></p>	<p>紫雪<small>局方</small> 療脚氣口中生瘡狂易叫走瘴疫毒厲卒死</p>	<p>溫瘧五尸五注心腹諸疾疔痛及解諸熱毒藥邪熱</p>	<p>卒黃等症并解蠱毒鬼魅野道熱毒又治小兒驚癇</p>	<p>百病</p>	<p>黃金<small>一百兩</small> 寒水石 磁石 石膏 滑石<small>各三斤</small></p>	<p>以上並搗碎用水一斛煮至四斗去滓入下藥</p>	<p>羚羊角屑 犀角屑 青木香 沉香<small>各五斤</small></p>	<p>丁香<small>一兩</small> 元參 升麻<small>各一斤</small> 甘草<small>八兩</small> 以上入前</p>	<p>藥汁中再煮取一斗五升去渣入下藥 朴硝<small>十斤</small></p>	<p>硝石<small>四斤</small> 二味入前藥汁中微火上煎柳木篦攪不</p>	<p>住手候有七升投在木盆中半日欲凝入下藥 麝</p>
---	--	-----------------------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------	--	---------------------------	--	---	--	---	-----------------------------

欽定四庫全書

蘭臺軌範



之類見之 <small>此秘藥中之第一方也 用藥之奇不可思議或加入硃砂雄黃各五錢尤效</small>	杵數百下不得令婦人孝服人不具手足人及雞犬	於端午七夕重陽合如欲急用辰日亦得於木白中	右各研細末和勻以糯米粥為劑每料分作四十粒	洗焙 一兩	去殼用紙包裹換紙研數十次去盡油無油成霜二兩	麝香 三錢	紅芽大戟	山茨菰 <small>去皮洗淨 焙二兩</small>	川文蛤 <small>一名五梧子 搥破 洗刮內桴二兩</small>	千金子	鬼胎鬼氣並宜服之	欽定四庫全書 蘭臺軌範	發背魚臍瘡腫百蟲蛇犬所傷男子婦人癩邪狂走	痘赤眼瘡癩熱毒上攻或自縊溺水打撲傷損癰疽	牛馬河豚等毒及時行瘟疫山嵐瘴癘纏喉風痺黃	解毒萬病丹 <small>一名紫 金錠</small>	治一切藥毒菰子鼠莽惡菌疫死	消解其效如神	臟無藥可治此能	百兩以飛金一萬頁代之尤妙 邪火毒火穿經入	則藥力方厚丁香用二兩余所合者皆然方中黃金	勻磁器收藏藥成霜雪紫色水調下 <small>按二硝太多當 只用十分之一</small>	香當門子 <small>一兩二 錢半</small>	硃砂 <small>三兩</small>	上藥入前藥中攪調令
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------	-----------------------	----------	------	--------------------------------	---------------------------------------	-----	----------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------	---------------	--------	---------	----------------------	----------------------	--	-------------------------------	-------------------------	-----------





欽定四庫全書

子部  
蘭臺軌範卷二

詳校官太醫院院使臣張肇基

洗馬臣王坦修覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官助教臣羅萬選

騰錄監生臣倪景寬



欽定四庫全書

蘭臺軌範卷二

吳江徐大椿撰

風

靈素

素問風論黃帝問曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癘風或為偏枯或為風也其病各異其名不同或內至五臟六腑不知其解願聞其說岐伯對

欽定四庫全書

蘭臺軌範

曰風氣藏於皮膚之間內不得通外不得泄風者善行而數變腠理開則洒然寒閉則熱而悶其寒也則衰食飲其熱也則消肌肉故使人怵慄而不能食名曰寒熱風氣與陽明入胃循脈而上至目內眥其人肥則風氣不得外泄則為熱中而目黃人瘦則外泄而寒則為寒中而泣出風氣與太陽俱入行諸脈俞散於分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉憤臄而有瘍衛風有所凝而不行是故其肉有不仁也癘者有營氣熱腑其



氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脈而不  
去名曰癘風或名寒熱以春甲乙傷於風者為肝風以夏  
丙丁傷於風者為心風以季夏戊己傷於邪者為痺風以  
秋庚辛中於邪者為肺風以冬壬癸中於邪者為腎風風  
中五臟六腑之俞亦為臟腑之風各入其門戶所中則為  
偏風風氣循風腑而上則為腦風風入係頭則為目風眼  
寒飲酒中風則為漏風入房汗出中風則為內風新沐中  
風則為首風久風入中則為腸風飧泄外在腠理則為泄

欽定四庫全書

蘭臺軌範

風故風者百病之長也至其變化乃為他病也肺風之狀  
多汗惡風色餅然白時欬短氣晝日則差暮則甚診在眉  
上其色白心風之狀多汗惡風焦絕善怒嚇赤色病甚則  
言不可快診在口其色赤肝風之狀多汗惡風善悲色微  
蒼噤乾善怒時憎女子診目下其色青脾風之狀多汗惡  
風身體怠惰四肢不欲動色薄微黃不嗜食診在鼻上其  
色黃腎風之狀多汗惡風面龐然浮腫脊痛不能正立其  
色炤隱曲不利診在肌上其色黑胃風之狀頸多汗惡風





食飲不下膈塞不通腹善滿失衣則臑脹食寒則泄診形

瘦而腹大首風之狀頭面多汗惡風當先風一日則病甚

頭痛不可以出內至其風日則病少愈漏風之狀或多汗

常不可單衣食則汗出甚則身汗喘息惡風衣常濡口乾

善渴不能勞事泄風之狀多汗汗出泄衣上口中乾上漬

其風不能勞事身體盡痛則寒

諸風病狀各殊其多汗惡風則傷風畏風傷風自汗

凡七情六淫之病必有現症能辨症斷不至誤治也

平人氣象論面腫曰風

風厥勞風 評熱病論岐伯曰汗出而身熱者風也汗

欽定四庫全書

蘭臺軌範

出而煩滿不解者厥也病名曰風厥

氣逆甚即名風厥

帝曰願

卒聞之岐伯曰巨陽生氣故先受邪少陰與其為表裏

也得熱則上從之從之則厥也

必少陰之氣上乃能厥

帝曰治之

奈何岐伯曰表裏刺之飲之服湯帝曰勞風為病何如

岐伯曰勞風法在肺下其為病也使人強上冥視唾出

若涕惡風而振寒此為勞風之病帝曰治之奈何岐伯

曰以救俛仰巨陽引精者三日中年者五日不精者七

日欬出青黃涕其狀如膿大如彈丸從口中若鼻中出



不出則傷肺傷肺則死也 此等病最當體認若誤以為肺癰肺痿則失之遠矣蓋肺  
癰乃肺生癰肺痿乃肺痿  
此則風寒入肺痰涎凝結也

酒風 病能論帝曰有病身熱解墮汗出如浴惡風少

氣此為何病岐伯曰病名曰酒風

偏枯 生氣通天論汗出偏沮使人偏枯

痺 靈樞熱病痺之為病身無痛者四肢不收智亂不

甚其言微知可治甚則不能言不可治也

### 金匱

欽定四庫全書

蘭臺軌範

夫風之為病當半身不遂或但臂不遂者此為痺脉微

而數中風使然 寸口脉浮而緊緊則為寒浮則為虛

寒虛相搏邪在皮膚浮為血虛絡脉空虚賊邪不瀉或

左或右邪氣反緩正氣即急 病在緩處故外治必塗其緩者 正氣引邪

喎僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪

入於腑即不識人邪入於臟舌即難言口吐涎 此辨症之要訣

寸口脉遲而緩遲則為寒緩則為虛榮緩則為亡血衛

緩則為中風邪氣中經則身痒而癢疹心氣不足邪氣



入中則胸滿而短氣

傷寒論

脉浮而大浮為風虛大為氣強風氣相搏必成癰疹身體為痒痒者名泄風以風為痲癩

病源

風癢 風邪之氣若先發於陰病發於五臟者其狀奄忽不知人喉裏噫噫然有聲舌強不能言發汗身軟者可治眼下及鼻人中左右上白者可治黑赤吐沫者不

欽定四庫全書

蘭臺軌範

可治汗不出體直者七日死

口噤 諸陽經筋皆在於頭三陽之筋并絡入領頰夾於口諸陽為風寒所客則筋急故口噤不開也診其脉遲者生

舌強 脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉係舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也

賊風 冬至之日有疾風從南方來名曰虛風其傷人也但痛不可按抑轉動傷風冷則骨解深痛按之乃應



骨痛也但覺身內索索冷欲得熱物熨痛處即小寬時	有汗以不去重遇冷氣相搏結成癰癰及偏枯遇風熱	相搏乃變附骨疽也	<small>附骨疽亦由風冷所致</small>	風痙 口噤不開背強而直如發癰之狀其重者耳中	策策痛卒然身體痙直者死也由風邪傷於太陽經復	遇寒濕則發痙也	<small>此與病後壞症之痙不同</small>	角弓反張 風邪傷人令腰背反折不能俛仰似角弓	者由邪入諸陽經故也	欽定四庫全書	蘭臺軌範	柔風 血氣俱虛風邪并入在於陽則皮膚緩在於陰	則腹裏急柔風之狀四肢不能收裏急不能仰	不仁 由榮氣虛衛氣實風寒入於肌肉使血氣不宣	流其狀搔之皮膚如隔衣是也	風驚悸 由心氣不足心府為風邪所乘則驚不自安	悸動不定其狀目精不轉而不得呼	刺風 由體虛膚腠開為風所侵如刃錐所刺也	蠱風 由體虛受風其風在於皮膚隱隱躍躍若畫若
-----------------------	-----------------------	----------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------	---------------------------	-----------------------	-----------	--------	------	-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	----------------	---------------------	-----------------------



刺一身盡痛侵傷氣血其動作如蠱毒也

鬚眉墮落 皆由風濕冷得之邪客於經絡與血氣相

干使榮衛不和故面色敗皮膚傷鼻柱壞鬚眉落

也

此乃癘風

惡風 風病有四百四種總不出五種黃風青風赤風

白風黑風人身有八萬尸虫若無八萬尸虫人身不成

不立復有諸惡橫病諸風害人所謂五種風生五種虫

能害於人

欽定四庫全書

蘭臺軌範

口喎 養生方云夜卧當耳勿得有孔風入耳中喜食

口喎

口喎見金匱此又是一病當內服藥而外提出風邪

外臺

風猥退 四肢不收身體疼痛肌肉虛滿骨節懈怠腰

脚緩弱由分肉流於血脉以成風水之病

躄曳 肢體弛緩不收攝也人以胃氣養肌肉經脉胃

氣衰損則經脉虛而筋肉懈惰故風邪搏於筋而使躄

曳也



風毒發 眼疼脚縱中指疼連肘邊牽心裏悶肋脹少  
氣喘氣欲絕不能食

風方

酒風

素問

治身熱懈惰汗出如浴惡風少氣

澤瀉

術

各十分

麩銜

五分

合以三指撮為後飯

麩銜

即薇銜一名無心草南人呼為無風草味苦平微寒  
主治風濕三指為一撮約二三錢飯後藥先為後飯  
按麩銜疑即鹿啣草為後飯服在飯後非飯前也  
凡古方須將神農本草細參藥性乃能深知其義

侯氏黑散

金匱

治大風四肢煩重心中惡寒不足者

欽定四庫全書

蘭臺軌範

菊花

四十分

白朮

十分

細辛

三分

茯苓

三分

牡蠣

三分

桔梗

八分

防風

十分

人參

各三分

礬石

各三分

黃芩

五分

當歸

乾薑

芎藭

桂枝

各三分

右十四味杵為散酒服方寸七日一服初服二十日

溫酒調服禁一切魚肉大蒜常宜冷服六十日止即

藥積在腹中不下也熱食即下矣冷食自能助藥力

腸腹空虛則邪易留此填  
滿空隙使邪氣不能容

風引湯

金匱

除熱癰瘤

巢氏云脚氣宜風引湯



大黃 乾薑 龍骨 <small>各四兩</small> 桂枝 <small>三兩</small> 甘草	牡蠣 <small>各二兩</small> 寒水石 滑石 赤石脂 白石	脂 紫石英 石膏 <small>各六兩</small>	右十二味杵粗篩以韋囊盛之取三指撮并花水三	升煮三沸溫服一升 <small>此乃臟腑之熱非草木之品所能散故以金石重藥清其裏</small>	防已地黃湯 <small>全匱</small> 治病如狂狀妄行獨語不休無寒熱	其脉浮	防已 <small>一分</small> 桂枝 防風 <small>各二分</small> 甘草 <small>一分</small>	欽定四庫全書 蘭臺軌範	右四味以酒一杯浸之一宿絞取汁生地黃二斤咬	咀蒸之如斗米飯以銅器盛其汁更絞地黃汁和	分再服 <small>此方他藥輕而生地獨重乃治血中之風也此等法最宜細玩凡風勝則燥又風能發</small>	<small>火故治風藥中無純用燥熱之理</small>	頭風摩散 <small>全匱</small>	大附子 <small>一枚</small> 泡鹽 <small>等分</small>	右二味為散沐了以方寸七已摩痰上令藥力行	越脾湯 <small>全匱</small> 風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出
---	---	-----------------------------------	----------------------	--	---	-----	---	----------------	----------------------	---------------------	---	------------------------------	------------------------	---	---------------------	---



無大汗者主之

麻黃 六兩 石膏 半斤 生薑 三兩 甘草 二兩 大棗 十五枚

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三

升分溫三服惡風加附子一枚本方加白朮四兩即

越脾加朮湯 越脾寒散之方也治風熱在表之症

小續命湯 千金 治卒中風欲死身體緩急口目不正舌

強不能言奄奄忽忽神精悶亂諸風服之皆驗

麻黃 防己 人參 黃芩 桂心

欽定四庫全書

蘭臺軌範

芍藥 甘草 川芎 杏仁 各一兩 防風 半兩

附子 一枚 生薑 五兩

右十二味咬咀以水一斗二升先煮麻黃三沸去沫

內諸藥煮取三升分三服不瘥更合三四劑隨人風

輕重虛實脚弱服之亦瘥恍惚者加茯神遠志骨節

疼煩有熱者去附子倍芍藥外臺加白朮一兩石膏

當歸各二兩無防己 續命為中風之主方因症加減變化由人而總不能舍此以立

法後人不知此義人自為說流弊無窮而中風一症遂十不愈一矣人參附桂何嘗不用必實見其有





寒象而後可加然尤宜於西北  
人若東南人則當詳審勿輕試

錄驗續命湯 治中風痲身體不能自收口不能言

冒昧不知痛處或拘急不得轉側

麻黃 桂枝 當歸 人參 石膏

乾薑 甘草 川芎 杏仁

各三兩

四十枚

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄覆

脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿當風并治

但伏不得卧咳逆上氣面目浮腫

虛而感風則成痲此治痲症之主方

欽定四庫全書

蘭臺軌範

近效朮附湯 治風虛頭重眩苦極不知食味暖肌

補中益精氣

白朮 附子 甘草

二兩

一枚半

泡去皮

炙

一兩

右三味剉每五錢七薑五片棗一枚水盞半煎七分

去滓溫服

此治中風後陽虛之症按古今錄驗近效二種乃唐以前之方書今全本末見外

臺中引二書之方極多金匱要畧宋人校書者往往

以本集中載方太少故亦採取二書并千金外臺之

方擇其精要者附一二方於每病之後而方首亦必

不沒其所本之書古人之不苟如此今人見其方載

入金匱中即以仲景所定之方誤矣須知之



地黃煎 <small>千金</small> 治熱風心煩悶及脾胃間熱不下食方	生地黃汁 枸杞根汁 <small>各二兩</small> 生薑汁 <small>各三升</small> 酥 <small>各三升</small>	荆瀝 竹瀝 <small>各五升</small> 天門冬 人參 <small>各八兩</small> 茯苓 <small>六兩</small>	兩 大黃 梔子 <small>各四兩</small>	右十一味搗篩五物為散先煎地黃等汁成膏內散攪勻每服一七日再漸加至三七覺利減 <small>風行必燥古人治風</small>	<small>必用潤藥乃真訣也今人反以剛燥辛熱之品治之是益其疾矣</small>	三黃湯 <small>千金</small> 治中風手足拘急百節疼痛煩熱心亂惡	欽定四庫全書 蘭臺軌範	寒經日不欲飲食	麻黃 <small>五分</small> 獨活 <small>四分</small> 細辛 黃芪 <small>各二分</small> 黃芩 <small>三分</small>	右五味以水六升煮取二升分溫三服一服小汗二服大汗心熱加大黃二分腹滿加枳實一枚氣逆加人參三分悸加牡蠣三分渴加栝蒌根三分先有寒加附子一枚 <small>此方專以驅風為治</small>	風痺方 <small>千金</small> 治手足不遂彊直	伏龍肝五升為末冷水八升攪取汁飲之能盡為善
--	---	---	----------------------------------	--	--	---	----------------	---------	---	---	----------------------------------	----------------------



蒸半身不遂方 千金

蚕沙兩石熟蒸分作直袋三枚熱盛一袋著患處如冷換熱者數易之瘥後須羊肚釀粳米葱白薑椒豉等爛煮熟吃日食一具十日止 按此法燹痺症亦良

治風懿方

竹瀝 一升 治半身不遂手足拘急身冷強直不語或

狂言角弓反張或食或不食或大小便不利 治風懿之法與

治風痺之法不相遠

欽定四庫全書

蘭臺軌範

口眼喎僻方 千金 治中風面目相引偏僻牙車急舌不

轉

牡蠣 熬 礬石 燒 附子 泡去皮 伏龍肝 等分

右四味搗篩為散以三歲雄雞血和藥敷上預候看勿令太過偏右塗左偏左塗右正則洗去之

又方

大皂莢 五兩去皮子 搗篩以三年大醋和塗緩處

又方 千金 治風著人面引口偏著耳牙車急舌不得轉



<p>生地黄汁</p> <p>竹瀝<small>各一升</small>獨活<small>三兩切</small></p>	<p>右三味合煎取一升頓服之即愈</p> <p><small>驅風舒經活血</small></p>	<p>開心肥健方<small>千金翼</small></p>	<p>人參<small>五兩</small>大猪肪<small>八枚</small></p>	<p>右二味搗人參為散猪肪煎取凝每服以人參一分</p>	<p>猪脂十分以酒半升和服之一百日骨髓充盈日記</p>	<p>千言身體潤澤去熱風冷風心頭等風月服二升半</p>	<p>即有大效</p> <p><small>此方治老人及風燥者最宜</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭臺軌範</p>	<p>一切風虛方<small>千金翼</small></p>	<p>杏仁<small>九升去尖及兩仁曝乾</small></p>	<p>右一味搗為末以水九升研濾如作粥法緩火煎令</p>	<p>如麻浮上匙取和羹粥酒內一匙服之每食即服不</p>	<p>限多少服七日後大汗出二十日後汗止慎風冷猪</p>	<p>魚雞蒜大醋一劑後諸風減差春夏恐酸少作服之</p>	<p>秋九月後煎之此法神妙可深秘之</p> <p><small>此即作杏酪之法服食最宜</small></p>	<p>竹瀝湯<small>外臺</small>治諸中風</p>
---	---	--------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------



竹瀝 <small>二升</small> 生葛根 <small>一升</small> <small>亦當用汁</small> 生薑汁 <small>三合</small>	右三味分三服日三 <small>此通經絡之法</small>	卒不得語方 <small>外臺</small>	以苦酒煮芥子薄頸一周以衣包之一日一夕乃解	癢	中風不語方 <small>寶鑑</small>	取龜尿點舌 取龜尿法置龜於新荷葉上以猪髮 鼻內戳之立出	欽定四庫全書 蘭臺軌範	地黃飲子 <small>宣明</small> 治中風舌瘖不能言足廢不能行此少 陰氣厥不至名曰風痺急當溫之	熟地 山茱萸 五味子 菴蓉 <small>酒浸</small> 石斛	麥冬 石菖蒲 遠志 茯苓 桂	心 附子 <small>炮</small> 巴戟 <small>去心</small> 薄荷 <small>七葉</small>	右十三味每服三錢生薑五片棗一枚煎服 <small>風氣甚而有火</small>	<small>多痰者忌服 此治少陰氣厥之方所謂類中風也 故全屬補腎之藥庸醫不察竟以之治一切中風之 症輕則永無愈期甚則益其病 而致死醫者病家終身不悟也</small>
---	-----------------------------------	-------------------------	----------------------	---	-------------------------	--------------------------------	----------------	--	------------------------------------	----------------	---	--	--



<p>稀涎散 <small>局方</small> 治中風牙關緊急并治單蛾雙蛾</p>	<p>江子仁 <small>六粒</small> 牙皂 <small>三錢</small> 明礬 <small>一兩</small></p>	<p>右先化開礬入二味待礬枯為末每用三分吹入喉</p>	<p>中 <small>此急救吊痰 開喉之法</small></p>	<p>稀莖丸 <small>本事</small> 治口眼喎斜偏風失音不語時時吐涎从</p>	<p>服并眼目清明髭鬚烏黑筋骨強健</p>	<p>稀莖 <small>五月中取葉及嫩枝洗九蒸九晒微焙為</small></p>	<p>末煉蜜丸桐子大溫酒或米飲下三四十九丸 <small>按余取 稀莖瀝</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p><small>汁熬膏打末為丸尤有力 此 緩治之劑非一時救病之法</small></p>	<p>控涎丹 <small>三方 三因</small></p>	<p>甘遂 <small>大戟</small> 白芥子 <small>等分</small></p>	<p>右為末煮糊丸桐子大晒乾卧時淡薑湯或熱湯下</p>	<p>五七丸至十九丸 <small>此乃下痰之方人 實症實者用之</small></p>	<p>滌痰散 <small>嚴氏</small> 治中風痰迷心竅舌強不能言</p>	<p>南星 <small>薑製</small> 半夏 <small>各二錢</small> 枳實 <small>各二錢</small> 茯苓 <small>各二錢</small> 橘紅 <small>一錢五分</small></p>	<p>石菖蒲 <small>人參</small> 竹茹 <small>七分</small> 甘草</p>
--	--	-----------------------------	--	---	-----------------------	---	--	-----------------------------------	--	-------------------------------------	---	-----------------------------	--	---	--	--



右九味加薑五片水煎服

此治心經之痰

勝金丸

本事方

治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四肢不

收風涎潮於上膈氣閉不通

生薄荷

半兩

猪牙皂角

二兩槌碎水一升二味一處浸取汁研成膏

瓜蒂

末

一兩

藜蘆

二兩

硃砂

五錢許研

右將硃砂末二分與二味研勻用膏子搜和丸如龍

眼大以硃砂一分為衣溫酒化下一丸甚者二丸以

吐為度得吐即醒不醒者不治

實見其痰在上膈則可用否則提氣上升

欽定四庫全書

蘭臺軌範

反成厥胃等疾

銀液丹

局方

治諸風痰涎蘊結心膈滿悶頭痛目運面

熱心忪痰唾稠黏精神昏□及風涎潮搐並宜服之

天南星

三分

硃砂

半兩研飛

鐵粉

水銀

各三兩結砂子膩粉

一兩 黑鉛

煉十遍秤三兩與水銀結沙為小塊同甘草十兩水煮半日候冷研

右研勻麵糊丸梧桐子大每服二丸同薄荷蜜湯下

生薑湯亦可微為度食後服如治風癩不計時候服

痰涎逆上用此鎮壓亦不可少前方提之使出此方鎮之使下隨宜施治全在辨症之確



癘風方 治眉落鼻壞徧體生瘡 出神仙感遇傳

角刺

一二升  
燒灰

大黃

九蒸  
晒

右為末再煎大黃湯服方寸七旬日即愈

青州白圓

局方見  
通治

痺歷節

靈素

靈周痺論黃帝曰願聞衆痺岐伯對曰此各在其處更發更止更居更起以右應左以左應右非能周也更發

欽定四庫全書

蘭臺軌範

更休也帝曰善願聞周痺何如岐伯對曰周痺者在於血脉之中隨脉以上隨脉以下不能左右各當其所帝曰善此痛安在何因而有名岐伯對曰風寒濕氣客於外分肉之間迫切而為沫沫得寒則聚聚則排分肉而分裂也經中無瘕字  
沫即痰也分裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則他痺發發則如是此內不在臟而外未發於皮獨居分肉之間真氣不能周故曰周痺





深痺 九鍼十二原篇八風傷人內舍於骨解腰脊節  
腠理之間為深痺

風痺 壽夭剛柔篇病在陽者命曰風病在陰者命曰

痺陰陽俱病者命曰風痺

二病之殊  
兩言而定

寒痺 壽夭剛柔篇寒痺之為病也留而不去時痛而

皮不仁

素問痺論帝問痺之安生岐伯對曰風寒濕三氣雜至

合而為痺也其風氣勝者為行痺寒氣勝者為痛痺濕

欽定四庫全書

蘭臺軌範

氣勝者為著痺也凡痺之客五臟者

客五臟痺氣入  
內而生內症矣肺

痺者煩滿喘而嘔心痺者脉不通煩則心下鼓暴上氣

而喘噎乾善噫厥氣上則恐肝痺者夜卧則驚多飲數

小便上為引如懷腎痺者善脹尻以代踵脊以代頭脾

痺者四肢解墮發欬嘔汁上為大塞腸痺者數飲而出

不得中氣喘爭時發殮泄胞痺者少腹膀胱按之內痛

若沃以湯澁於小便上為清涕陰氣者靜則神藏躁則

消亡飲食自倍腸胃乃傷淫氣喘息痺聚在肺淫氣憂



思痺聚在心淫氣遺溺痺聚在腎淫氣乏竭痺聚在肝  
淫氣肌絕痺聚在脾諸痺不已亦益內也其風氣勝者  
其人易已也帝曰痺其時有死者有疼久者有易已者  
其故何也岐伯曰其入臟者死其留連筋骨間者疼久  
其留皮膚間者易已帝曰其客於六腑者何也岐伯曰  
此亦其食飲居處為其病本也帝曰榮衛之氣亦令人  
痺乎岐伯曰榮者水穀之精氣也和調於五臟灑陳於  
六腑乃能入於脉也故循脉上下貫五臟絡六腑也衛

欽定四庫全書

蘭臺軌範

者水穀之悍氣也其氣慄疾滑利不能入於脉也故循  
皮膚之中分肉之間熏於盲膜散於胸腹逆其氣則病  
從其氣則愈不與風寒濕氣合故不為痺帝曰善痺或  
痛或不痛或不仁或寒或熱或燥或濕其故何也岐伯  
曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者病久入  
深榮衛之行滯經絡時疎故不通皮膚不營故為不仁  
其寒者陽氣少陰氣多與病相益故寒其熱者陽氣多  
陰氣少病氣勝陽遭陰故為痺熱其多汗而濡者此其



逢濕甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也帝  
曰夫痺之為病不痛何也岐伯曰痺在於骨則重在於  
脉則血凝而不流在於筋則屈不伸在於肉則不仁在  
於皮則寒故具此五者則不痛也凡痺之類逢寒則蟲  
逢熱則縱  
陰痺 至真要大論陰痺者按之不得腰脊頭頂痛時  
眩大便難陰氣不用饑不欲食欬唾則有血心如懸病  
本於腎

欽定四庫全書

蘭臺軌範

筋肌骨痺 長刺節論病在筋筋攣節痛不可以行名  
曰筋痺病在肌膚肌膚盡痛名曰肌痺病在骨骨重不  
可舉骨髓酸痛寒氣至名曰骨痺

肉苛 逆調論帝曰人之肉苛者雖近於衣絮猶尚苛  
也是為何疾岐伯曰營氣虛衛氣實也營氣虛則不仁  
衛氣虛則不用營衛俱虛則不仁且不用肉如故也人  
身與志不相有曰死

金匱



問曰血痺病從何得之師曰夫尊榮人骨肉肌膚盛重
因疲勞汗出卧不時動搖加被微風遂得之但以脉自
微澹在寸口關上小緊宜鍼引陽氣令脉和緊去則愈
寸口脉沉而弱沉即主骨弱即主筋沉即為腎弱即
為肝汗出入水中如水傷心歷節痛黃汗出故曰歷節
少陰脉浮而弱弱則血不足浮則為風風血相搏即
疼痛如掣 盛人脉澹小短氣自汗出歷節疼不可屈
伸此皆飲酒汗出當風所致 味酸則傷筋筋傷則緩
欽定四庫全書 蘭臺軌範
名曰泄醜則傷骨骨傷則痿名曰枯枯泄相搏名曰斷
泄榮氣不通衛不獨行榮衛俱微三焦無所御四屬斷
絕身體羸瘦獨足腫大黃汗出脛冷假令發熱便為歷
節也
痺歷節方
痺症方 <small>靈樞</small>
治之以馬膏膏其急者以白酒和桂以塗其緩者以
桑鈎鈎之即以生桑炭置之坎中高下以坐等以膏



熨急頰且飲美酒噉美炙肉不飲酒者自強也為之

三拊而已

馬膏馬脂也其性味甘平柔潤能養筋治痺故可以膏其急者白酒辣桂性味辛溫

能通經絡行血脉故可以塗其緩者桑之性平能利關節除風寒濕痺諸痛故以桑鈎鈎之者鈎正其口也復以生桑火炭置之坎之中高下以坐等者欲其淺深適中便於坐而得其暖也然後以前膏熨其急頰且飲之美酒噉之美酒皆助血舒筋之法也雖不善飲亦自強之三拊而已言再三拊摩其患處則病亦已矣筋骨之病總在軀殼古法多用外治今人不能知矣

寒痺熨法

靈樞

用淳酒二十升蜀椒一升乾薑一斤桂心一斤凡四

欽定四庫全書

蘭臺軌範

種皆咬咀漬酒中用綿絮一斤細白布四丈并內酒

中置酒馬矢燼中

馬矢燼中者燃馬屎而煨之也

蓋封塗勿使泄五

日五夜出布綿絮曝乾之乾後復漬以盡其汁每漬

必晬

晬周

其日乃出乾并用淳與綿絮複布為複巾

重布為巾如今之夾袋所以盛貯綿絮藥滓也

長六七尺為六七巾則用生

桑炭炙巾以熨寒痺所刺之處令熱入至於病所

熨寒

痺所刺則知先已刺過然後熨之若不刺而徒熨恐藥性不易入則刺法亦當考明

寒復炙巾

以熨之三十遍而止汗出以巾拭身亦三十遍而止



<p>黃芪桂枝五物湯 <small>金匱</small> 治血痺陰陽俱微寸口關上微</p>	<p>尺中小緊外症身體不仁如風痺狀</p>	<p>黃芪 芍藥 桂枝 <small>各三兩</small> 生薑 <small>六兩</small> 大棗 <small>十二枚</small></p>	<p>右五味以水六升煮取二升溫服七合日三服一方</p>	<p>有人參 <small>此即桂枝湯以黃芪易甘草乃衛虛營弱之方固衛即以護營</small></p>	<p>桂枝芍藥知母湯 <small>金匱</small> 治肢節疼痛身體尪羸脚腫如</p>	<p>脫頭眩短氣溫溫欲吐</p>	<p>桂枝 <small>四兩</small> 芍藥 <small>三兩</small> 甘草 麻黃 附子 <small>炮各二兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>生薑 白朮 <small>各五兩</small> 知母 <small>四兩</small></p>	<p>右九味以水七升煮取二升溫服七合日三服 <small>此為陽虛</small></p>	<p>烏頭湯 <small>金匱</small> 治歷節疼痛不可屈伸</p>	<p>麻黃 芍藥 黃芪 甘草 <small>炙各三兩</small> 烏頭 <small>三枚</small></p>	<p><small>以蜜二升煮取一升即出烏頭</small></p>	<p>右五味咬咀四味水三升煮取一升去滓內蜜煎中</p>	<p>更煎之服七合不知更服之 <small>其煎法精妙可師風寒入節非此不能通達陽</small></p>
---	-----------------------	---	-----------------------------	--	---	------------------	---	-----------------------------------	--	---	--	---	------------------------------------	-----------------------------	--



<p>氣</p>	<p>獨活寄生湯 <small>千金</small> 治風寒濕痺偏枯脚氣</p>	<p>獨活 <small>三兩</small> 桑寄生 秦艽 細辛 歸身</p>	<p>生地 白芍 川芎 桂心 茯苓</p>	<p>杜仲 牛膝 人參 甘草 <small>各等分</small> 一方有</p>	<p>防風</p>	<p>右十四味為粗末每服四錢煎服 <small>此驅風通治之方</small></p>	<p>舒筋飲 治臂痛不能舉由氣血凝滯經絡不能行</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>所致非風非濕腰以下食前服腰以上食後服</p>	<p>片薑黃 <small>二錢如無以莪木代之</small> 赤芍 當歸 海桐皮 <small>去粗</small></p>	<p>皮 白朮 <small>各一錢五分</small> 羌活 炙甘草 <small>各一錢</small></p>	<p>右七味加薑三片煎服磨冲沉香汁少許</p>	<p>拔痺膏</p>	<p>用生半夏為末同廣膠等分先用薑汁將膏煎烱調</p>	<p>入半夏塗</p>	<p>史國公酒方 <small>聖惠</small> 治中風語言塞澀手足拘攣半身不</p>
----------	--	--	-----------------------	---	-----------	---	-----------------------------	------------------------	---------------------------	---	--	-------------------------	------------	-----------------------------	-------------	---



遂痿痺不仁	當歸 <small>酒洗</small> 虎脛骨 <small>酒浸一日 焙乾醋炙</small> 羌活 鱉甲 <small>炙</small> 萆	藜 防風 秦艽 牛膝 松節 晚	蠶沙 <small>二兩</small> 枸杞子 <small>五兩</small> 茄根 <small>八兩 蒸</small>	右為粗末絹袋盛浸無灰酒一斗十日取飲	半身不遂外治方 <small>見風門</small> 大活絡丹 指迷茯苓丸 <small>見俱</small>	痿 <small>治通</small>	欽定四庫全書 蘭臺軌範	素問	素問痿論黃帝問曰五臟使人痿何也岐伯對曰肺主身之皮毛心主身之血脉肝主身之筋膜脾主身之肌肉腎主身之骨髓故肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄著則生痿躄也心氣熱而下脉厥而上上則下脉虛虛則生脉痿樞折挈脛縱而不任地也肝氣熱則胆泄口苦筋膜乾筋脉乾則脛急而攣發為筋痿脾氣熱則胃乾而渴肌肉不仁發為肉痿腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓
-------	--	-----------------	---	-------------------	---	---------------------	----------------	----	---





減發為骨痿帝曰何以得之岐伯曰肺者臟之長也為

心之蓋也有所失亡所求不得則發肺鳴鳴則肺熱葉

焦故曰五臟因肺熱葉焦發為痿躄此之謂也

痿症總屬熱而

皆關於肺後人治痿而用燥熱之藥俱誤悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽

氣內動發則心下崩數洩血也故本病曰大經空虛發

為肌痺傳為脈痿思想無窮所願不得意淫於外入房

太甚宗筋弛縱發為筋痿及為白淫故下經曰筋痿者

生於肝使內也有漸於濕以水為事若有所留居處相

欽定四庫全書  
蘭臺軌範

濕肌肉濡漬痺而不仁發為肉痿故下經曰肉痿者得

之濕地也有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣內伐

內伐則熱舍於腎腎者水臟也今水不勝火則骨枯而

髓虛故足不任身發為骨痿故下經曰骨痿者生於大

熱也黃帝曰何以別之岐伯曰肺熱者色白而毛散心

熱者色赤而絡溢肝熱者色蒼而爪枯脾熱者色黃而

肉蠕動腎熱者色黑而齒槁帝曰如夫子言可矣論言

治痿者獨取陽明何也岐伯曰陽明者五臟六腑之海



<p>主潤宗筋宗筋主束骨而利機關也衝脈者經脈之海</p>	<p>也主滲灌谿谷與陽明合於宗筋陰陽總宗筋之會會</p>	<p>於氣街<small>氣街一名氣衝足陽明經穴在毛際兩旁鼠蹊上一寸動脈處</small>而陽明為之長</p>	<p>皆屬於帶脈而絡於督脈故陽明虛則宗筋縱帶脈不</p>	<p>引故足痿不用也帝曰治之奈何岐伯曰各補其榮<small>諸經</small></p>	<p><small>所溜</small>而通其俞<small>諸經所注為俞</small>調其虛實和其順逆筋脈骨肉</p>	<p>各以其時受月則病已矣<small>時受月王冰注謂病所受之時月未知是否</small>生氣</p>	<p>通天論濕熱不攘大筋縵短小筋弛長縵短為拘弛長</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>為痿</p>	<p>難經</p>	<p>五損損於骨骨痿不能起於牀</p>	<p>痿方</p>	<p>金剛丸<small>保命</small>治腎損骨痿不能起於牀</p>	<p>葶藶<small>炒去</small>杜仲<small>絲</small>茯苓<small>酒浸</small>等分</p>	<p>右為末酒煮腰子搗丸如桐子大每服五七十九温</p>	<p>酒下</p>
------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	--	---	---	------------------------------	------------------------	-----------	-----------	---------------------	-----------	---------------------------------------	---	-----------------------------	-----------



虎骨四筋丸	局方	治脚痿						
宣木瓜	天麻	茯苓						
牛膝	各焙乾	一斤						
附子								
虎骨	各一兩	酥炙						
右以上各如法修製先將前四味用無灰酒浸春秋								
各五日夏三冬十日取出焙乾入附子虎骨共研為								
末用浸藥酒打麵糊丸梧子大每服五十丸食前鹽								
湯下								
加減四筋丸	三因	治腎肝虛熱淫於內致筋骨痿弱足						
欽定四庫全書		蘭臺軌範						
不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生氣力								
肉蓯蓉	酒浸	牛膝	酒浸	木瓜	乾	鹿茸	酥炙	熟地
五味子	酒浸	兔絲子	酒浸	各				
右為末煉蜜丸桐子大每服五十丸溫酒米飲下一								
方不用五味有杜仲								
煨腎丸	保命	治腎肝虛及脾損穀不化						
牛膝	葶藶	杜仲	炒去	白蒺藜		防風		
兔絲子	酒浸	茯苓	酒浸	葫蘆巴		破故紙	等分	



<p>桂枝 <small>減半</small></p>	<p>右為末將猪腰子製如食法搗爛蜜丸如桐子大每</p>	<p>服五七十九丸温酒送下又治腰痛不起 <small>亦治腎痿</small></p>	<p>續骨丹 <small>本事</small> 治兩脚軟弱虛羸無力及小兒不能行</p>	<p>天麻 <small>酒浸</small> 白附子 牛膝 木鱉子 <small>各半</small> 羌活</p>	<p><small>半兩</small> 烏頭 <small>一錢</small> 地龍 <small>去土</small> 乳香 <small>一分</small> 沒藥 <small>各二錢</small> 硃砂</p>	<p>一錢</p>	<p>右以生南星末一兩無灰酒炙糊丸雞頭大硃砂為</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>衣 <small>此加味活絡丹也舒筋最宜</small></p>	<p>思仙續斷圓 <small>本事</small> 治肝腎風虛氣弱脚不可踐地腰脊</p>	<p>疼痛風毒流注下經行止艱難小便餘瀝此補五臟</p>	<p>內傷調中益精涼血堅強筋骨益智輕身耐老</p>	<p>思仙朮 生地 <small>各五兩</small> 五加皮 防風 米仁</p>	<p>羌活 川斷 牛膝 <small>各三兩</small> 葶藶 <small>四兩</small></p>	<p>右為細末好酒三升化青鹽三兩用大木瓜半斤去皮子以鹽酒煮木瓜成膏杵丸如桐子大每服三四</p>
-----------------------------	-----------------------------	---	--	---	--	-----------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------	--	---	---



<p>十九空心食前温酒鹽湯下膏少和酒可也 <small>此方治下焦風</small></p>	<p><small>濕脚氣亦效 內經針痿之法獨取陽明以陽明為諸筋總會也而用藥則補腎為多以腎為筋骨之總</small></p>	<p><small>司也養其精血而逐其風痰則大畧無誤矣</small></p>	<p>虎潛丸 <small>丹溪</small> 大活絡丹 <small>以上二方俱見通治</small></p>	<p>厥</p>	<p>靈素</p>	<p>靈癩狂篇厥逆為病也足暴清胸若將裂腸若將以刀切之煩而不能食脈大小皆濇</p>	<p><small>厥之象如此甚則不知人矣</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>素厥論黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥帝曰熱厥之為</p>	<p>熱也必起於足下者何也岐伯曰陽氣起於足五指之</p>	<p>表陰脈者集於足下而聚於足心故陽氣勝則足下熱</p>	<p>也帝曰寒厥之為寒也必從五指而上於膝者何也岐</p>	<p>伯曰陰氣起於五指之裏集於膝下而聚於膝上故陰</p>	<p>氣勝則從五指至膝上寒其寒也不從外皆從內也</p>	<p>解精微論厥則目無所見夫人厥則陽氣并於上陰氣</p>
--	--	---	---	----------	-----------	--	-----------------------------------	------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------



并於下陽并於上則火獨光也陰并於下則足寒足寒則脹也 <small>厥則無不因陽氣在上若不能通陰納陽而用辛熱滋膩之藥貽害無窮</small> 調經論	血之與氣并走於上則為大厥厥則暴死氣復反則生	不反則死陽明脈解論厥逆連藏則死連經則生	瘡俳煎厥素脈解篇內奪而厥則為瘡俳此腎虛也	少陰不至者厥也肝氣當治而未得故善怒善怒者名曰煎厥 <small>劉河間地黃引子專治瘡俳</small> 生氣通天論陽氣者煩勞則	張精絕辟積於夏使人煎厥 <small>此當治肝脾之逆</small>	欽定四庫全書 蘭臺軌範	薄厥素生通天論陽氣者大怒則形氣絕而血菀於	上使人薄厥 <small>此當治血逆</small>	陽明厥素陽明脈解論陽明厥則喘而惋惋則惡人	少陰厥素脈要精微論脈俱沉細數者少陰厥也	風厥素評熱論汗出而身熱者風也汗出而煩滿不解者厥也病名曰風厥 <small>此當治風</small>	尸厥素刺繆論五絡俱竭令人身脈皆動而形無知也其狀若尸或曰尸厥
--	-----------------------	---------------------	----------------------	---	------------------------------------	----------------	----------------------	----------------------------	----------------------	---------------------	---	-------------------------------



難經

督之為病脊強而厥

金匱

問曰寸脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏血氣入臟即死入腑即愈此為卒厥何謂也師曰唇口青身冷為入臟即死如身和汗自出為入腑即愈

卒厥之症頗似

中風一或誤治死不旋踵

傷寒論

欽定四庫全書

蘭臺軌範

寸口諸微亡陽諸濡亡血諸弱發熱諸緊為寒諸乘寒者則為厥鬱冒不仁以胃無穀氣脾滯不通口急不能言戰而慄也 少陰脈不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胸膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥 少陽厥陰俱病耳聾囊縮而厥水漿不入不知人者六日死

此為寒厥

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

以下所論諸條皆指傷寒症手足逆冷而

言非氣逆不知人之厥也

傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥利



生脈不還者死 病人手足厥冷脈乍結以客氣在胸	者死 <small>虛寒</small> 下利後脈絕手足厥冷晬時脈還手足溫者	下此為亡血下之死 傷寒脈促手足厥逆者可灸之	止者死 傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者不可	熱下利厥逆躁不卧者死 傷寒發熱下利至甚厥不	胸小腹痛滿按之痛者此冷結在膀胱關元也 傷寒發	胸脇煩滿其後必便血 <small>熱入</small> 病者手足厥冷言我不結	欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	小便利色白者此熱除也欲得食其病為愈若厥而嘔	為臟厥 傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數	傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此	氣不相順接便為厥 <small>此致厥</small> 厥者手足逆冷是也 <small>此厥</small>	厥應下之而反發汗者必口傷爛赤 <small>此為</small> 凡厥者陰陽	必發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微	者知胃氣尚勝必愈 傷寒一二日至四五日而厥者	者當不能食今反能食者恐為除中食以索餅不發熱
-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--	----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------





中心中滿而煩欲食不能食者病在胸中當吐之傷寒論中  
厥症諸條有寒有熱有虛有實有寒熱互乘其變不一  
隨病異形非厥之正病也尤不可不潛心體察凡一病  
其變態不同如此何可執  
一說以人命為兒戲耶

### 厥方

尸厥方素問以竹管吹其兩耳鬢鬢別其左角之髮方

一寸燔治飲以美酒燔治燒為末也

赤圓金匱寒氣厥逆主之

茯苓各四兩洗半夏一方用桂烏頭二兩細辛一兩千金作人參

欽定四庫全書

蘭臺軌範

右六味末之內真朱為色煉蜜丸如麻子大先食酒  
飲下三丸日再夜一服不知稍增之以知為度真朱即硃砂

茯苓甘草湯傷寒論傷寒厥而心下悸者宜先治水當服

此湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也

茯苓二兩桂枝二兩生草炙一兩生薑二兩

右四味水四升煮取二升分溫三服

尸蹙方金匱治尸蹙脈動而無氣氣閉不通故靜而死



也草蒲屑內鼻兩孔中吹之令人以桂屑著舌下	白薇湯 <small>方 本事</small> 人平居無苦疾忽如死人身不動搖默默	不知人目閉不能開口瘖不能言或微知人或惡聞	人聲但如眩冒移時方寤此由出汗過多血少氣併	於陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血	還陰陽復通移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多	有之宜服	白薇 當歸 人參 甘草 <small>各一 兩 各一 錢</small>	欽定四庫全書 蘭臺軌範	右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服 <small>此病</small>	<small>最多而婦科皆不知無不誤治</small>	四逆湯 <small>傷寒論</small> 下利厥逆而惡寒者主之大汗若大下利	而冷厥者亦主之 <small>方見傷寒</small>	通脈四逆湯 <small>傷寒論</small> 下利清穀裏寒外熱汗出而厥者主	之 <small>方見通治</small> 附加減法如面色赤者加葱九莖 腹中	痛者去葱加芍藥二兩 嘔者加生薑二兩 咽痛	者去芍藥加桔梗一兩 利止脈不出者去桔梗加
---------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------	---	----------------	---------------------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--	----------------------	----------------------



人參一兩	當歸四逆湯 <small>傷寒論</small> 手足厥冷脈細欲絕者主之 <small>方見傷寒以</small>
<small>上三方皆治寒極之厥與熱厥正相反須辨之</small>	瓜蒂散
白虎湯 <small>此治熱厥二方俱見傷寒</small>	烏梅丸 <small>此治虫厥見虫門</small>
蘇	
合香丸 <small>此治氣厥</small>	四磨飲
至寶丹 <small>以上三方俱見通治</small>	
虛勞	
金匱	
夫男子平人脈大為勞極虛亦為勞 男子面色薄者	
欽定四庫全書	蘭臺軌範
主渴及亡血卒喘悸脈浮者裏虛也 男子脈虛沉弦	
無寒熱短氣裏急小便不利面赤白時目瞑兼衄少腹	
滿此為勞使之然 勞之為病其脈浮大手足煩春夏	
劇秋冬瘡陰寒精自出酸削不能行 男子脈浮弱而	
潛為無子精氣清冷 男子平人脈虛弱細微者喜盜	
汗也 人年五六十其病脈大者痺俠背行若腸鳴馬	
刀俠瘦者皆為勞得之 脈沉小遲名脫氣其人疾行	
則喘喝手足逆寒腹滿甚則澹泄食不消化也 脈弦	



而大弦則為減大則為芠減則為寒芠則為虛虛寒相  
搏此名為草婦人則半產漏下男子則亡血失精古人所謂  
虛勞皆是純虛無陽之症與近日之陰虛火旺吐血咳  
嗽者正相反誤治必斃近日吐血咳嗽之病乃是血症  
有似虛勞其實非虛勞也

### 病源

夫虛勞者五勞六極七傷是也五勞者一曰志勞二曰  
思勞三曰心勞四曰憂勞五曰瘦勞六極者一曰氣極  
二曰血極三曰筋極四曰骨極五曰肌極六曰精極七  
傷者一曰陰寒二曰陰萎三曰陰急四曰精連連五曰  
精少陰下濕六曰精清七曰小便苦數臨事不卒  
五蒸一骨蒸根在腎二脈蒸根在心三皮蒸根在肺四  
肉蒸根在脾五內蒸亦名血蒸必外寒而內熱把手附  
骨而內熱甚根在五臟六腑 又有二十三蒸各有症  
名  
肺勞者短氣面腫鼻不聞香臭 肝勞者面目乾黑口  
苦精神不守恐懼不能獨卧目視不明 心勞者忽忽

欽定四庫全書

蘭臺軌範



<p>喜忘大便苦難或時鴨糖口内生瘡 脾勞者舌苦直 不能咽唾 腎勞者背難以俛仰小便不利色赤黃而 有餘瀝莖內痛陰濕囊生瘡小腹滿急 <small>此乃五臟之勞</small></p> <p>虛勞方</p>	<p>桂枝加龍骨牡蠣湯 <small>全匱</small> 失精家少腹弦急陰頭寒目 弦 <small>一作頭</small> 髮落脈極虛芤遲為清穀亡血失精脈得 諸芤動微緊男子失精女子夢交此湯主之</p>	<p>桂枝 <small>二兩</small> 芍藥 <small>二兩</small> 生薑 <small>各三兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 大棗 <small>十二枚</small></p>	<p>龍骨 <small>各三兩</small> 牡蠣 <small>各三兩</small></p> <p>右七味以水七升煮取三升分溫三服 <small>脈極虛芤遲乃為虛寒之</small></p>	<p>薯蕷丸 <small>全匱</small> 虛勞諸不足風氣百疾主之</p> <p><small>症故用桂枝及建中等湯若嗽血而脈數者乃陰虛之症與此相反誤用必斃</small></p>	<p>薯蕷 <small>三十</small> 當歸 <small>十</small> 桂枝 <small>十</small> 麴 <small>十</small> 乾地黄 <small>十</small></p>	<p>豆黃卷 <small>各十</small> 甘草 <small>二十</small> 人參 <small>十分</small> 芎藭 <small>十分</small> 芍藥 <small>十分</small></p>	<p>白朮 <small>各五</small> 麥門冬 <small>各六</small> 柴胡 <small>六</small> 桔梗 <small>二</small> 茯苓 <small>二</small></p> <p>阿膠 <small>七</small> 杏仁 <small>六</small> 乾薑 <small>三</small> 白欬 <small>二</small> 防風 <small>二</small></p>
---	---	---	---	---	---	--	--



<p>六分 大棗 百枚 為膏</p>	<p>右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空腹酒服一</p>	<p>丸一百丸為劑</p>	<p>大黃廬虫丸 <small>金匱</small> 五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食食傷</p>	<p>憂傷飲傷房室傷饑傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾</p>	<p>血肌膚甲錯兩目暗黑此丸主之</p>	<p>大黃 <small>十分</small> 黃芩 <small>二兩</small> 甘草 <small>三兩</small> 桃仁 <small>一升</small> 杏仁 <small>一升</small></p>	<p>芍藥 <small>四兩</small> 乾地黄 <small>十兩</small> 蟬蛸 <small>一升</small> 乾漆 <small>一兩</small> 蟲虫 <small>一</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>升 水蛭 百枚 廬虫 半斤</p>	<p>右十二味末之煉蜜為丸小豆大酒飲服五丸日三</p>	<p>服 <small>血乾則結而不散非草木之品所不能下必用食血</small> <small>之虫以化之此方專治瘀血成勞之症瘀不除</small></p>	<p>則正氣永無復理故 去病即所以補虛也</p>	<p>治夢洩精方 <small>千金</small></p>	<p>韭子 <small>一升</small></p>	<p>右為末酒服方寸七日三服立效</p>	<p>羌活補體丸 <small>千金</small> 療髓虛腦痛不安胆腑中寒</p>
----------------------------	-----------------------------	---------------	---	-----------------------------	----------------------	---	---	------------------------	------------------------------	-----------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------	--



<p>羌活 川芎 當歸 各三兩 桂心 二兩 人參 四兩</p> <p>酥 一升 大麻仁 二升 蒸 棗肉 一斤 研脂 牛髓 羊髓 各一</p>	<p>右十味先篩前五味為散後用棗肉麻仁打勻再下</p>	<p>二髓及酥重湯煮之為丸桐子大酒服三十九日再服</p>	<p>肘後獺肝散 <small>金匱附方</small> 治冷勞又主鬼疰一門相染</p>	<p>獺肝 一具炙乾末之</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>右水服方寸七日三服</p>	<p>骨蒸方 <small>千金</small> 療熱骨蒸羸瘦煩悶短氣喘息兩鼻孔張</p>	<p>日西即發</p>	<p>龍胆 黃連 枳實 各一兩 梔子 二七枚 芒硝 半兩</p>	<p>青箱子 苦參 大黃 黃芩 芍藥 各半兩</p>	<p>右十一味搗篩為末煉蜜和丸如梧子大飲服十丸</p>	<p>日二服以知為度 <small>此為純寒之劑實熱者宜之</small></p>
--	-----------------------------	------------------------------	--	------------------	--------------------	------------------	---	-------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	---



救急療瘦疾方 外臺

炙甘草 三兩

右一味小便煮服 用小便奇此方亦治咽痛

口乾方 外臺 療脾熱脇痛熱滿不歇目赤不止口唇乾

裂

石膏 碎綿 生地汁 赤蜜 各一 淡竹葉 五升

右四味水一斗二升先煮竹葉取七升去滓煮石膏

取一升五合去滓納地黃汁煮二三沸下蜜煎三升

欽定四庫全書

蘭臺軌範

細服

傳屍勞方 外臺

獼猴肝 一具破 鱉甲 一枚 野狸頭 一枚 紫苑 四分 漢防

已 一兩 蜀漆 洗 麥冬 甘草 各一兩

右藥搗篩已成煉烱羊腎脂二分合蜜一分烱令和

丸桐子大每服十九丸加至十五丸日再其藥合和分

一分懸門額上一分著頭邊一分繫臂上先服頭邊

次服臂上次服門上大驗





<p>秦苧鱉甲散 <small>寶鑑</small> 治骨蒸壯熱肌肉消瘦舌紅頰赤氣</p>	<p>粗困倦盜汗</p>	<p>鱉甲 柴胡 地骨皮 <small>各一兩</small> 秦苧 知母</p>	<p>當歸 <small>各五錢</small></p>	<p>右為末每半兩入烏梅一枚青蒿五葉同煎臨卧空</p>	<p>心温服</p>	<p>秦苧扶羸湯 <small>直指</small> 治肺痿骨蒸勞嗽聲啞自汗體倦</p>	<p>鱉甲 秦苧 當歸 人參 <small>各一錢半</small> 柴胡 <small>二錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>地骨皮 紫苑 半夏 甘草 <small>各一錢</small></p>	<p>右九味加薑棗煎服</p>	<p>十味煎 <small>外臺</small> 治凡病在胸膈上者宜飽服而在夜肺既</p>	<p>居上則病在上晝宜服丸夜宜合桑白皮汁等服</p>	<p>桑白皮 <small>一升</small> 地骨皮 <small>三升</small> 二味以水七升煮取三升</p>	<p>去渣澄清 生地汁 <small>五升</small> 麥冬汁 <small>二升</small> 生薑汁 <small>一</small></p>	<p>升 竹瀝 生葛根汁 <small>各三升</small> 白蜜 <small>一升</small> 牛酥 <small>三合</small> 大</p>	<p>棗 <small>一升</small></p>
---	--------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------	--	---	------------------------	--	-----------------	---	----------------------------	---	--	---	----------------------------



右十味先煮生地以下葛根以上和煎減半則內桑皮等和煎之三分減一則內酥蜜棗等藥攪之勿停手如稠飴狀每服胡桃大一枚含之	許少	滋潤肺經此為第一薑汁宜用											
百花煎	奇類方要	治吐血咳嗽補肺											
生地汁	藕汁	黃牛乳	各一升	胡桃	十枚	黃明	細						
膠	炙燥末半兩	生薑汁	半升	乾柿	五枚	大棗	二十一						
皮核	研爛	秦艽	半兩末	蘇子	汁	杏仁	三兩						
研爛	清酒	一升	當用薄荷或蘇子	汁	杏仁	研細							
欽定四庫全書		蘭臺軌範											
右藥煎減半入好蜜四兩漫火養成入磁器服一匙	米飲調下日三	方內薑汁太多宜減去大半	人參蛤蚧散	寶鑑	治二三年間肺逆喘嗽咯吐膿血滿	面生瘡遍身黃腫	蛤蚧	一對	全者河水浸五宿逐日換水洗去腥氣酥炙黃	杏仁	五兩	甘草	炙三兩
人參	茯苓	貝母	知母	桑白皮	各二兩	右為細末磁器內盛每日如茶點服神效							



犀角紫河車丸 <small>寶鑑</small> 治傳尸勞三月必平復其餘勞症	丸至二十九丸空心食前溫酒或鹽湯下	右為細末入研令勻酒糊為丸如桐子大每服十五	蘆巴 <small>炒</small> 茯苓 <small>洗淨各一斤</small> 硃砂 <small>別研</small> 龍骨 <small>各三兩</small>	五倍子 茯苓 <small>各八兩</small> 補骨脂 <small>十兩</small> 紫巴戟 <small>去心</small> 葫	便滑數遺精白濁	節酸疼精神昏困手足多冷心忪盜汗飲食減少小	金鎖正元丹 <small>局方</small> 治真氣不足元臟虛弱四肢倦怠百	欽定四庫全書 蘭臺軌範	十九丸鹽湯下	右為末和二膏研勻酒浸煮熟丸桐子大每服三五	香 <small>一兩</small> 胡桃 <small>三十個</small> 羊腎 <small>三對切開用鹽擦炙熟搗膏</small>	茴香 葫蘆巴 破故紙 <small>炒</small> 白龍骨 <small>各一兩</small> 木	金鎖丹 <small>本事方</small> 治夢泄遺精關鎖不固	右以蓮子粉糊丸服鹽湯送下	金鎖固精丸 治夢遺滑精	芡實 蓮鬚 蒺藜 <small>各二兩</small> 龍骨 <small>一兩</small> 牡蠣 <small>煨四兩</small>
--	------------------	----------------------	--	---	---------	----------------------	---	----------------	--------	----------------------	---	--	-------------------------------------	--------------	-------------	--



傳為風消其傳為息貴死不治 氣厥論心移熱於肺	陰陽別論二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其	素氣厥論心移寒於肺肺消肺消者飲一洩二死不治	靈師傳篇胃中熱則消穀令人懸心善饑	靈素	消症 <small>附強中</small>	玉膏 生地黃煎 <small>外臺</small> 四物二連湯 <small>元戎 以上九方俱見通治</small>	大建中湯 八味地黃丸 <small>金匱</small> 人參養榮湯 <small>局方</small> 瓊	欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	小建中湯 <small>金匱</small> 黃芪建中湯 <small>金匱</small> 炙甘草湯 <small>金匱 附方</small>	如膈熱食後服重病不過一料	右為末蜜丸桐子大硃砂為衣空心溫酒服二十九	龍胆草 黃藥子 知母 <small>各二錢半</small> 芒硝 犀角	白芍 敗鼓皮心 <small>醋炙</small> 大黃 貝母	紫河車 <small>一具米泔浸一宿洗淨焙乾</small> 鱉甲 <small>酥炙</small> 桔梗 胡黃連	即消數服神效
-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	----	-----------------------	--	--	----------------------------	--	--------------	----------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--	--------



傳為鬲消

金匱

厥陰之為病消渴氣上衝心中疼熱饑而不欲食食

即吐衄下之不肯止

此症不可  
誤認衄厥

病源

夫消渴者渴不止小便多是也其病變多發癰疽此坐  
熱氣留於經絡血氣壅澁故成癰膿 內消病者不渴

而小便多是也利多不得潤養五臟臟衰則生諸病由

欽定四庫全書

蘭臺軌範

腎盛之時恣意快情致使虛耗故不渴而小便多也

強中病者莖長興盛不痿精液自出由少服五石熱住

於腎中下焦虛少壯之時血氣尚豐能制於五石及至

年衰血氣減少腎虛不復能制津液若精液竭則諸病

生矣

消症方

文蛤散

金匱

渴欲飲水不止者主之

傷寒論治心煩

肉上粟起意欲飲水反不渴者



<p>文蛤 <small>五兩</small> 上一味杵為散以沸湯五合和服方寸匕 <small>欲飲而不渴乃胸中有水而口燥也</small></p>	<p>消渴方 <small>千金</small> 栝萸根 生薑 麥冬 蘆根 <small>切各二升</small> 茅根 <small>切三</small></p>	<p>右五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服 <small>此清胃之方</small></p>	<p>茯神湯 <small>千金</small> 洩熱止渴治胃腑實熱引飲常渴者 茯神 <small>二兩</small> 栝萸根 <small>五兩</small> 生麥冬 <small>五兩</small> 萎蕤 <small>四兩</small> 知母</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範 四兩 生地黃 <small>六兩</small> 小麥 <small>二升</small> 大棗 <small>二十枚</small> 淡竹葉 <small>切三升</small></p>	<p>右九味以水三斗煮小麥竹葉取九升去渣下藥煮取四升分四服不問早晚但渴即進通治渴患熱者</p>	<p>黃連圓治渴方 <small>千金</small> 黃連 <small>一斤</small> 生地黃 <small>一斤</small></p>	<p>右二味絞地黄汁浸黃連出曝燥復內汁中令汁盡乾搗末蜜丸桐子大服二十九日三食前後無拘亦可為散酒服方寸匕 <small>此治胃中有伏火之方製法神妙本事方用冬瓜汁收入黃</small></p>	<p>可為散酒服方寸匕</p>
--	--	--	--	---	---	--	--	-----------------



連內為丸即以冬瓜汁煎大麥仁湯  
下亦仿此義則知多吃冬瓜亦妙也

桑根湯 千金 主日飲一石水方

桑根白皮 切五升入地三尺者良灸令黃黑

右一味水煮以味濃為度適寒溫任性飲戒食鹽

神效散 本事方 治渴疾飲水不止

白浮石 蛤粉 蟬脫 各等分

右細末用鯽魚胆七個調三錢服不拘時候神效

猪腎薺萘湯 千金 強中之病莖長興盛不交精液自出

欽定四庫全書

蘭臺軌範

消渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服

猪腎 一只 大豆 一升 薺萘 三兩 人參 石膏 各三兩

茯神 磁石 綿裹 知母 葛根 黃芩

甘草 栝萘根 各二兩

右十二味呶咀以水一斗五升先煮猪腎大豆取一

斗去渣下藥煮取三升分三服渴即飲之下焦熱者

夜輒合一劑病勢漸歇即止 此乃腎熱之症因藥毒所發與胃熱之消渴各

殊



蘭臺軌範卷二								欽定四庫全書	蘭臺軌範						口乾裂方 勞見虛	腎氣丸 治見通 白虎人參湯 門見暘 栝蒌瞿麥圓 淋方見 療唇
--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--	--	--	--	--	-------------	---





欽定四庫全書

子部  
蘭臺軌範卷三

詳校官太醫院院使<sub>臣</sub>張聲基

洗馬<sub>臣</sub>王坦修覆勘

總校官庶吉士<sub>臣</sub>何思鈞

校對官助教<sub>臣</sub>羅萬選

謄錄監生<sub>臣</sub>倪景寬



欽定四庫全書

蘭臺軌範卷三

吳江徐大椿撰

傷寒

素問

素熱論篇帝曰今夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆以十日以上者何也岐伯對曰巨陽者諸陽之屬也其脈連於風府故為諸陽

欽定四庫全書

蘭臺軌範

主氣也人之傷於寒也則為病熱熱雖盛不死其兩感於寒而病者必不免於死帝曰願聞其故岐伯曰傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽明主肉其脈俠鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得卧也三日少陽受之少陽主胆其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未入於臟者故可汗而已四日太陰受之太陰脈布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥



囊縮而厥水漿不入不知人六日死帝曰五臟已傷六	滿身熱不欲食譫言三日則少陽與厥陰俱病則耳聾	病則頭痛口乾而煩滿二日則陽明與太陰俱病則腹	形何如岐伯曰兩感於寒者病一日則巨陽與少陰俱	兩感 素熱論帝曰其病兩感於寒者其脈應與其病	熱也	論帝曰人傷於寒而傳為熱何也岐伯曰夫寒甚則生	滿三日者可汗而已其滿三日者可泄而已 水熱穴	欽定四庫全書	蘭臺軌範	治之奈何岐伯曰治之各通其臟脈病日衰已矣其未	日厥陰病衰囊縱小腹微下大氣皆去病日已矣帝曰	思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而噫十二	九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故則	者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈	臟不通則死矣 <small>陰脈皆連五臟故曰入臟非風寒直入臟中也</small> 其不兩感於寒	煩滿而囊縮三陰三陽五臟六腑皆受病榮衛不行五	舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝故
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------



腑不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽

明者十二經脈之長也其血氣盛故不知人三日其氣

盡故死

兩感則表裏同病

溫病暑病 素熱論凡病傷寒而成溫者先夏至日者

為病溫後夏至日者為病暑暑當與汗皆出勿止

陰陽交 素評熱病論帝問曰有病溫者汗出輒復熱

而脈躁疾不為汗衰狂言不能食病為何岐伯曰病名

陰陽交交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人所以汗出

欽定四庫全書

蘭臺軌範

者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者

是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪

氣也汗出者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也不

能食者精無俾也病而留者其壽可立而傾也且夫熱

論曰汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此不勝

其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死

不見一生雖愈必死也

遺證 素熱論帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯



曰諸遺者熱盛而強食之故有所遺也若此者皆病已  
衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也  
帝曰善治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必  
已矣帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復  
多食則遺此其禁也

難經

傷寒有幾其脈有變不然傷寒有五有中風有傷寒有  
濕溫有熱病有溫病其所苦各不同中風之脈陽浮而

欽定四庫全書

蘭臺軌範

滑陰濡而弱濕溫之脈陽濡而弱陰小而急傷寒之脈  
陰陽俱盛而緊瀦熱病之脈陰陽俱浮浮之而滑沉之  
散瀦溫病之脈行在諸經不知何經之動也各隨其經  
所在而取之傷寒有汗出而愈下之而死者有汗出而  
死下之而愈者何也然陽虛陰盛汗出而愈下之即死  
陽盛陰虛汗出而死下之而愈

陽虛陰盛者風傷衛而汗自洩寒氣在內而未出也陽盛陰虛者身熱汗閉燥火內結津液乾枯陰氣欲竭也此以有邪處為虛無邪處為盛

傷寒論六經脈症



少陽之為病口苦舌乾目眩也 尺寸俱弦者少陽受	歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也	陽明之為病胃家實也 <small>此正陽</small> 陽明居中土也萬物所	陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也	明有少陽陽明 <small>此三條皆</small> 太陽陽明者脾約是也 少	故不惡寒陽明脈大 <small>以上皆陽</small> 有太陽陽明有正陽陽	不能卧 陽明外証身熱汗自出不惡寒反惡熱也 <small>邪</small>	長者陽明受病也其脈俠鼻絡於目故身熱目疼鼻乾	欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	太陽陽明病若能食名中風不能食名中寒 尺寸俱	陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊 <small>惡</small>	數六也	陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰	名曰傷寒 發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於	風脈緩者名曰中風 惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者	病也其脈上連風府故頭項痛腰脊強 發熱汗出惡	太陽病脈浮頭項強痛而惡寒 尺寸俱浮者太陽受
-----------------------	---------------------	--	----------------------	--	--	---------------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



病也其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾 少陽中	風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則	悸而驚 傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽 <small>頭痛發熱與太陽同</small>	<small>而脈之弦</small> 三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則	汗 <small>內熱已極</small> 傷寒六七日無大熱 <small>外熱輕則</small> 其人躁煩者此	為陽去入陰也 <small>若熱輕而不煩躁則病欲退矣</small> 傷寒三日三陽為盡三	陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也	太陰之為病腹滿而嘔食不下自利益甚時腹自痛	欽定四庫全書 蘭臺軌範	尺寸俱沉細者太陰受病也其脈布胃中絡於噎故腹	滿而噎乾 傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰 <small>一同</small>	<small>太陰病而有沉細浮緩之殊蓋沉細乃太陰病脈浮緩乃太陰本脈也</small> 自利不渴者屬太	陰以臟有寒故也當溫之宜服四逆輩 <small>少陰自利而渴熱入下焦也此</small>	<small>自利而不渴寒入中焦也</small>	少陰之為病脈微細但欲寐也 <small>衛氣行於陽則寤行於陰則寐</small> 少陰病	欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也	尺寸俱沉者少陰受病也以其脈貫腎絡於肺繫舌
----------------------	-----------------------	---	---------------------------------------	---	--	----------------------	----------------------	----------------	-----------------------	--	--	---	---------------------------	--	-----------------------	----------------------



本故口燥舌乾而渴

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱饑而不欲食食則吐衄下之利不止 尺寸俱微緩者厥陰受病也以其脈循陰器終於肝故煩滿而囊縮 厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈

傷寒傳足不傳手經脈

此本陶節庵最為明晰

足太陽脈起於目內眥從頸下後項連風府行身之後終於足其外症頭疼項強腰痛骨節痛惡心發熱惡

欽定四庫全書

蘭臺軌範

寒標病宜發汗但太多則亡陽筋惕肉瞤 小便不利者當利自利者不可利利之引熱入膀胱其人如狂不可下下之為結胸

足陽明脈起於鼻頰絡於目循面下人迎入缺盆下膈屬胃行身之前終於足之厲兌穴故其症目痛鼻乾不得眠頭頰痛身熱微惡寒無汗者屬標病宜解肌身熱發渴汗出屬本病宜清熱解肌 若惡熱自汗發渴去衣被發斑發黃發狂大便秘腹滿此正陽明胃腑病也





宜下之

足少陽脈起於目銳眥上抵頭循角絡耳中循胸脇行  
身之側終於足故頭角痛目眩耳聾脇疼心下痞寒熱  
往來嘔而口苦膽熱也此經無標本只有小柴胡一湯  
和解隨症加減有三禁汗之犯太陽下之犯陽明利之  
犯少陰 脈弦數者是本經症

足太陰為三陰經首其脈始於足大指上行至腹絡於  
喉連舌本行身之前也故腹滿自利咽乾嘔吐腹滿邪

欽定四庫全書

蘭臺軌範

入脾也嘔吐脾氣不和也自利挾熱下利也咽乾脾脈  
連喉也頭不疼陰脈至頸而還也身微熱手足溫表邪  
解而傳入裏也身目俱黃標病宜平熱腹滿硬痛渴而  
喉乾小便赤大便難本病雖宜下然當分寒熱施治  
足少陰脈始於足心上行貫脊循喉絡舌本下注心胸  
行身之後也其病手足乍冷乍溫身不熱者標病二便  
不通舌乾口燥者本病此經本熱而標寒也宜急下以  
存腎水雖自利此是飲湯水所致不可疑為寒也初病



大熱至此變為厥冷者是熱深厥亦深也急下之至陰  
又難拘定法因分直中者寒症傳經者熱症大抵六經  
中惟此難辨有直中真陰者有夾陰中寒者有夾陰傷  
寒者有虛陽伏陰者有陰極發躁者有漏底傷寒者前  
二症身不熱厥冷全似少陰傳經而冷者後四症身熱  
面赤又全似陽大要口燥舌乾渴而譫語大便實者傳  
經熱症也足冷嘔吐瀉痢不渴或惡寒腹痛者直中真  
寒症也

欽定四庫全書

蘭臺軌範

足厥陰脈始於足大指上循陰器抵小腹循脇上口唇  
與督脈會於巔頂行身之側也其症煩懣囊拳消渴舌  
捲譫語大便不通而頭疼手足乍冷乍溫者此是陽經  
傳來熱邪本病宜急下若發熱惡寒狀如瘧疾此是熱  
邪在經標病宜和解若不嘔便清當有大汗至而自愈  
頭疼者以督脈會於巔頂故也 大抵熱深厥亦深  
則舌捲囊縮肝主筋也陰寒冷極亦捲縮須以口渴不渴足  
冷不冷脈沉實沉細別之厥陰屬熱者其多後人皆指  
為極寒概用溫熱誤人無算



熟讀傷寒  
論自知

傷寒六經治法方

諸方精義俱詳余所著  
傷寒類方中不更贅

桂枝湯

俱本傷  
寒論

治太陽中風頭疼發熱汗出惡風

桂枝

三兩  
去皮

芍藥

三兩  
炙

甘草

二兩  
炙

生薑

三兩  
大棗  
十二  
枚擘

右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾歎熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許通身絳絳微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑

欽定四庫全書

蘭臺軌範

若不汗更服依前法又不汗後服當小促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病証猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物

此服外感  
風寒之藥

服法俱  
當如此

麻黃湯

治太陽中寒頭身俱痛發熱無汗惡風而喘

喘

麻黃

三兩  
去節

桂枝

二兩  
去皮

甘草

一兩  
炙

杏仁

七十個  
湯  
去皮尖



葛根湯 治太陽病項背強無汗惡風者又治太陽	如桂枝法 <small>本方無麻黃若加麻黃則為葛根湯矣陳無已本誤加</small>	右六味以水一斗先煮葛根減二升去上沫內諸藥 煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘	桂枝 <small>三兩 去皮</small>	葛根 <small>四兩</small> 芍藥 <small>二兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 生薑 <small>三兩 切</small> 大棗 <small>十二 枚 擘</small>	風	桂枝加葛根湯 治太陽病項背強几几反汗出惡	欽定四庫全書 蘭臺軌範	右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥 煮取一升八合去滓溫服六合令微汗則愈	去節 各一兩 大棗 <small>四枚 擘</small> 杏仁 <small>二十四個 湯浸去 皮尖及兩仁者</small>	桂枝 <small>一兩十六 銖 去皮</small> 芍藥 <small>酒洗</small> 生薑 <small>切</small> 甘草 <small>炙</small> 麻黃	桂枝麻黃各半湯 治傷寒向愈脈微緩惡寒身癢	餘如桂枝法將息	煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥	右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥
-------------------------	--	--	--------------------------------	---	---	-------------------------	----------------	---	--	---	-------------------------	---------	----------------------	----------------------



<p>陽明合病自下利者</p>	<p>葛根 <small>四兩</small> 麻黃 <small>三兩</small> 桂枝 <small>二兩</small> 芍藥 <small>二兩</small> 甘草 <small>二兩</small></p>	<p>生薑 <small>三兩</small> 大棗 <small>十二枚</small></p>	<p>右七味咬咀以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫</p>	<p>內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須</p>	<p>啜粥餘如桂枝法將息及禁忌</p>	<p>葛根黃芩黃連湯 治太陽症誤下利遂不止喘而</p>	<p>汗出者此主之</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>葛根 <small>半斤</small> 甘草 <small>炙</small> 黃芩 <small>各二兩</small> 黃連 <small>三兩</small></p>	<p>右四味以水八升先煮葛根減二升入諸藥煮取二</p>	<p>升去滓分溫再服</p>	<p>桂枝加芍藥湯 治太陽誤下腹滿時痛屬太陰也</p>	<p>此主之大實痛者加大黃一兩即桂枝加大黃湯</p>	<p>桂枝 <small>三兩</small> 芍藥 <small>六兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 生薑 <small>三兩</small> 大棗 <small>十二枚</small></p>	<p>右五味咬咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫</p>	<p>服一升 此即桂枝湯加芍藥一倍即另成一方而以</p>
-----------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------	--------------------	--	-----------------------------	----------------	-----------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	------------------------------



病必 腹滿	大青龍湯 治太陽中風脈浮緊惡寒發熱身疼不	汗出而煩躁者	麻黃 <small>六兩</small> 去節桂枝 <small>二兩</small> 去皮甘草 <small>二兩</small> 炙杏仁 <small>四十粒</small> 去皮尖生薑 <small>三兩</small>	切 大棗 <small>十二枚</small> 擘石膏 <small>如雞子大碎</small>	右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥 煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉 撲之一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不	欽定四庫全書 蘭臺軌範	得眠也 <small>此風寒兩傷之方 按載大青龍何以不載 小青龍蓋小青龍治傷寒不解心下有水氣</small>	<small>之症非傷 寒正方也</small>	桂枝加桂湯 治燒針令其汗針處被寒核起微赤 必發奔豚灸其核上各一壯與此湯	即桂枝湯加桂二兩	小柴胡湯 治少陽中風往來寒熱胸脇苦滿心煩	喜嘔腹痛心悸頭汗出舌上胎白及婦人熱入血室 等症
----------	-------------------------	--------	---	--	--	----------------	--	------------------------------	---	----------	-------------------------	----------------------------



升日三服	右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一	枳實 <small>炙 四枚</small> 大棗 <small>十二枚</small> 芍藥 <small>三兩</small> 半夏 <small>半升</small> 生薑 <small>五兩切</small>	柴胡 <small>半斤</small> 黃芩 <small>三兩</small> 芍藥 <small>三兩</small> 半夏 <small>半升</small> 生薑 <small>五兩切</small>	急心中痞鞭而痢熱結在裏往來寒熱等症	大柴胡湯 治傷寒十餘日柴胡症仍在嘔而心下	參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩 <small>此方加減法須細稔</small>	者去人參加桂三兩溫覆取微汗愈 若效者去人	欽定四庫全書 蘭臺軌範	便不利者去黃芩加茯苓四兩 若不渴外有微熱	若脇下痞鞭去大棗加牡蠣四兩 若心下悸小	半枳萸根四兩 若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩	枳萸實一枚 若渴者去半夏加人參合前成四兩	服一升日三服 若胸中煩而不嘔去半夏人參加	右七味水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫	生薑 <small>三兩切</small> 大棗 <small>十二枚</small> 人參 甘草 <small>各三兩</small> 半夏 <small>半升</small>	柴胡 <small>半斤</small> 黃芩 人參 甘草 <small>各三兩</small> 半夏 <small>半升</small>
------	----------------------	--	---	-------------------	----------------------	---	----------------------	----------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	---



大承氣湯

治傷寒十餘日吐下後不解晡時發潮

熱獨語如見鬼狀尋衣摸牀胃中有燥屎也此下之

大黃四兩酒洗厚朴半斤去炙枳實五枚芒硝三合

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮

取二升去滓內芒硝更上微火一兩沸分溫再服得

下餘勿服胃中非存燥屎之所此言胃中者指足陽明言即所謂胃中實是也乃腸胃之總名

小承氣湯

治汗多微發熱不惡寒或小便數而大

便鞭譟語者與此湯微和胃氣

欽定四庫全書

蘭臺軌範

大黃四兩厚朴二兩去炙枳實三枚

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初

服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

調胃承氣湯

治胃氣不和不惡寒但熱腹微滿而

煩與此湯

大黃四兩清酒浸甘草二兩芒硝半斤

右三味以水三升先煮大黃甘草取一升去滓

內芒硝更上火微煮令沸少少溫服不惡寒乃外邪已盡方可下此





仲景之  
要法

桃核承氣湯

治太陽病不解熱結膀胱其人如狂

血自下下者愈其外不解者尚未可攻宜先與桂枝

解外外解已但小腹急結此主之

桃仁 五十個 去皮尖 桂枝 二兩 去皮 大黃 四兩 芒硝 甘草 各

兩二

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更上火

微沸下火先令溫服五合日三服當微利

欽定四庫全書

蘭臺軌範

抵當湯

治傷寒六七日少腹鞭小便自利其人如

狂喜忘大便黑此有蓄血

水蛭 熬 蟅虫 各三十個 去翅足 桃仁 三十個 去皮尖 大黃 三兩 酒浸

右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一升不

下再服

抵當丸

治傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利

者為有血也當下之不可餘藥

水蛭 二十個 蟅虫 二十個 桃仁 二十個 去皮尖 大黃 三兩



右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合服之  
晬時當下血若不下者更服

大陷胸湯

治表未解而醫反下之胃虛而陽氣內

陷心下有鞭舌上燥渴小有潮熱心上至少腹痛不

可近

大黃

六兩  
去皮

芒硝

一升

甘遂

一錢

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮

一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

結胸乃  
水飲為

欽定四庫全書

蘭臺軌範

患傷寒論云此為  
水結故用甘遂

大陷胸丸

治病發於陽而反下之熱入因作結胸

病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之

太早故也

大黃

半斤

葶藶子

熬

芒硝

杏仁

去皮尖熬

黑各半升

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合研如脂和散取如

彈丸一枚別搗甘遂末一錢七白蜜二合水二升煮

取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效



小陷胸湯

治病在心下按之則痛脈浮滑者

黃連

一兩

半夏

半升洗

栝蒌實

大者一個

右三味以水六升先煮栝蒌取三升去滓內諸藥煮

取二升去滓分溫三服

白虎湯

治脈滑而厥裏有熱也 又治三陽合病

腹滿身重譫語遺尿自汗出者

知母

六兩

石膏

一斤碎

甘草

二兩

粳米

六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三

欽定四庫全書

蘭臺軌範

服

陽極於內發散則路遠故從小便去之

麻黃附子細辛湯

治少陰始得病反發熱脈沉者

麻黃

去節

細辛

各二兩

附子

一枚泡去皮破八片

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮

取三升去滓溫服一升日三服

四逆散

治少陰傳經熱邪四逆或咳或悸或小便

不利或腹中痛或泄痢下重者

甘草

炙

枳實

破水漬炙乾

柴胡

芍藥

各十分



<p>右四味搗篩白飲和服方寸七日三服 效者加五味子乾薑各五分并主下痢 悸者加桂枝五分</p>	<p>小便不利者加茯苓五分 腹中痛者加附子一枚</p>	<p>炮令拆 泄痢下重者先以五升煮薤白三升煮取</p>	<p>三升去滓以散三方寸匕內湯中煮取一升半分溫</p>	<p>再服 <small>熱邪入深乃見四逆誤認為寒貽害匪細 薤白能治下重以能洩大腸之氣也</small></p>	<p>四逆湯 治脈沉體痛溫溫欲吐下利清穀手足厥</p>	<p>冷內寒外熱脈微欲絕等症</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>甘草 <small>二兩</small> 乾薑 <small>一兩</small> 附子 <small>一枚生用去皮破八片</small></p>	<p>右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可大附子一枚乾薑三兩 <small>四逆湯不可輕用一症不其即當細</small></p>	<p><small>審必諸症皆全方可決用無疑</small></p>	<p>四逆加人參湯 治痢後亡血</p>	<p>本方加人參</p>	<p>通脈四逆湯 治下痢清穀脈絕汗出而厥</p>	<p>本方加乾薑一倍</p>
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	--------------------	-----------------------------------	--	--	------------------------------------	---------------------	--------------	--------------------------	----------------



通脈四逆加豬胆汁湯 治汗出而厥脈絕拘急

本方加豬胆汁

當歸四逆湯 治手足厥冷脈細欲絕脈浮革因爾

腸鳴者

當歸 桂枝 芍藥 細辛 大棗

甘草 通草

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

此四逆症乃從太陽誤下所致非厥陰少陰之四逆也故仍以桂枝湯為主

欽定四庫全書

蘭臺軌範

理中丸及湯 治霍亂頭痛發熱身疼痛寒多不用

水者理中湯若大病瘥後喜唾以不了了胃上有寒

者用理中丸

人參 甘草 白朮 乾薑

右四味搗篩為末蜜丸如雞子黃大以沸湯數合和

一丸研碎溫服之日三服夜二服腹中未熱益至三

四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用水八升煮

取三升去滓溫服一升日三服

四逆乃溫下焦中焦之法理中為溫上焦



中焦之法各有部位也	附子瀉心湯 治心下痞而復惡寒汗出	大黃 二兩 黃連 黃芩 各一兩 附子 一枚 泡去皮 破別煮取汁	右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓內	附子汁分溫再服 治上焦用生藥故漬而不煎 附子能回陽止汗	梔子豉湯 治汗吐下後虛煩不得眠及大下之後身熱未去心中結痛或微煩者	梔子 十四枚 擘 香豉 四合 綿裹	欽定四庫全書 蘭臺軌範	右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分為二服溫進一服得吐者止後服 邪在	之分以此吐之所謂在上者因而越之也 此吐方之最和平者	真武湯 治太陽汗出不解仍發熱心悸頭眩身瞤動振振欲僻地者 又治少陰至四五日小便不利	四肢沉重疼痛自下痢此為有水氣	茯苓 芍藥 生薑 各三兩 切 白朮 二兩 附子 一枚 泡去	皮破 八片
-----------	------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------	-------------	---	---------------------------	--	----------------	-------------------------------	-------



右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服  
此治水逆之正方 若效者加五味半升細辛乾薑各一兩

若小便利者去茯苓 若下痢者去芍藥加乾薑二兩 若嘔者去附子加生薑足前成半斤

大黃黃連瀉心湯 治傷寒脈浮緊而復下之緊反

入裏則作痞按之自濡但氣痞耳此主之

大黃 二兩 黃連 一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

欽定四庫全書

蘭臺軌範

凡治下焦之補劑當多煎以熟為主治上焦之瀉劑當不煎以生為主 此亦治至高之熱邪故亦用生藥

白通湯 治少陰下痢

葱白 四莖 乾薑 一兩 附子 一枚生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服 此為寒痢

白通加豬胆汁方 治服白通湯利不止汗出而厥

逆無脈乾嘔而煩服湯後脈暴出者死微續者生

即白通湯煎成內人尿五合豬胆汁一合分溫再服



猪膚湯 少陰病下痢咽痛胸滿心煩者此主之

猪膚 一斤

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉

五合熬香和令相得温分六服 引少陰之 虛火下達

甘草湯桔梗湯 治少陰咽痛先與甘草湯不瘥與

桔梗湯

甘草 二兩

右一味以水二升煮減半去滓温服七合日二服

欽定四庫全書

蘭臺軌範

桔梗湯加桔梗一兩煎法同 此方制少陰 在上之火

瓜蒂散 治太陽病胸中痞鞭氣上冲胸不得息此

胸中有寒也又或手足厥冷脈乍緊心中煩滿不能

食病在胸中並當吐之

瓜蒂 熬 赤小豆 各一分

右二味各別搗篩為散已合治之取一錢匕以香豉

一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散温頓服

之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與





<p>之</p>	<p>麻黃升麻湯 治傷寒六七日大下後厥逆寸脈沉遲下部脈不至咽喉不利吐膿血泄痢為難治此主之</p>	<p>麻黃 <small>二兩半 去節</small> 升麻 當歸 <small>各一分</small> 知母 黃芩</p>	<p>萋蕤 <small>各十 八銖</small> 石膏 <small>碎綿</small> 白朮 乾薑 芍藥</p>	<p>天冬 <small>去心</small> 桂枝 茯苓 甘草 <small>炙各六銖</small></p>	<p>右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫內諸</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>藥煮取三升去滓分溫三服令汗出愈</p>	<p>旋復代赭湯 治傷寒汗出吐下後心下痞鞭噫氣</p>	<p>不除此主之</p>	<p>旋復花 <small>三兩</small> 人參 <small>二兩</small> 生薑 <small>五兩切</small> 半夏 <small>半升洗</small> 代赭石</p>	<p>一兩 大棗 <small>十二枚擘</small> 甘草 <small>三兩炙</small></p>	<p>右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服</p>	<p>一升日三服</p>	<p>苦酒湯 治少陰病咽中生瘡聲不出者</p>
----------	--	--	--	--	-----------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------	---	--	-----------------------------	--------------	-------------------------



半夏 洗破十枚 雞子 一枚去黃內

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火

上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑服之 製法

奇

枳實梔子豉湯 治大病瘥後勞復

枳實 三枚 梔子 十四枚 豉 一升

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子煮

取二升下豉更煮五六沸去滓溫分再服覆令微似

欽定四庫全書

蘭臺軌範

汗若有宿食者加大黃如博碁子大五六枚 大病後

醫必作虛治乃純用降氣清火之品當細參之

竹葉石膏湯 治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者

方見通治 壯火食氣 故少氣者多屬火症

燒棍散 治陰陽易病其人身重少氣少腹裏急陰

中拘攣熱上衝胸頭重不舉眼中生花膝脛拘急

右取婦人中棍近陰處剪燒灰以水和服方寸七日

三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子棍檔



<p>燒灰</p>	<p>猪胆導法 以猪胆汁加醋內穀導中</p>	<p>蜜煎導法 以蜜煎老捏作指大一條內穀導中以</p>	<p>手按之</p>	<p>右二方俱治傷寒大發汗小便利津液內竭大便雖</p>	<p>鞭不可攻之用此法</p>	<p>治男子新病起房內復者方 千金</p>	<p>取女人月經赤帛燒服方寸七亦治陰卵腫縮入腹</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>絞痛欲死</p>	<p>治交接勞復陰卵腫縮腹中絞痛便欲死方 千金</p>	<p>取所交接婦人衣服以覆男子立愈</p>	<p>竹皮湯 <small>外臺</small> 治交接勞復卵腫腹痛便絕欲死</p>	<p>青竹皮 <small>一升</small></p>	<p>右一味水三升煮五六沸絞汁頓服立愈此方范汪</p>	<p>亦治大便後勞復</p>	<p>療食勞方 <small>外臺</small></p>
-----------	----------------------------	---------------------------------	------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------	---------------------------------	-----------------------	--	------------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------------------



杏仁 五十枚

右一味以酢二升煎取服之取汗則差

治結胸灸法 本事方

巴豆 十四枚 十四寸連皮用

右搗細末用津唾和成膏填入臍心以艾灸其上腹

中有聲其病去矣不拘壯數以病退為度纔灸了便

以溫湯浸手帕拭之恐生瘡也 此法最穩凡胸中病俱可依此法外治

鵲石散 本事方 治傷寒發狂棄衣奔走踰牆上屋

欽定四庫全書

蘭臺軌範

黃連 寒水石 各等分

右為細末每服二錢濃煎甘草汁調服

鼈甲散 活人書 治傷寒八九日不瘥名曰壞症傷寒不能

治者宜此療之

升麻 前胡 去蘆 烏梅 去核 枳實 去殼炒 犀角 鎊

黃芩 各半 生地黃 各半 甘草 一分 鼈甲 去裙米醋炙

兩半

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分



去滓溫服	升麻鼈甲湯 <small>金匱</small> 陽毒之為病面赤斑斑如錦文咽喉	痛唾膿血五日可治七日不可治此湯主之	升麻 二兩 當歸 一兩 蜀椒 炒去汗 一兩 甘草 二兩 鼈甲 手	大一 雄黃 半兩 研	右六味以水四升煮取一升頓服之老小再服取汗	升麻鼈甲去雄黃蜀椒方 陰毒之為病面目青身	痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻鼈甲	欽定四庫全書 蘭臺軌範	湯去雄黃蜀椒主之 肘後千金方陽毒用升麻湯	無鼈甲有桂陰毒用甘草湯即本方無雄黃活人陽	毒升麻湯用犀角射干黃芩人參無當歸蜀椒鼈甲	雄黃 <small>蜀椒辛熱之品陽毒用而陰毒反去之 疑誤活人書加犀角等四味頗切當</small>	梔子仁湯 <small>活人書</small> 治陽毒傷寒壯熱百節疼痛	梔子仁 一兩 柴胡 一兩 升麻 一兩 黃芩 各二兩 赤芍 一兩	兩 大青 一兩 石膏 二兩 知母 一兩 甘草 半兩 杏仁 二兩	湯浸去皮尖及雙 仁者麸炒微黃
------	---	-------------------	--	---------------	----------------------	-------------------------	----------------------	----------------	-------------------------	----------------------	----------------------	--	--	---	---	-------------------



<p>右件搗為粗末每服抄四錢以水一盞入生薑半分</p>	<p>豉一百粒煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>還陽湯 <small>方 本事</small> 治陰毒面色青四肢逆冷心燥腹痛</p>	<p>用硫黃末新汲水調下良久或寒一起或熱一起更</p>	<p>看緊慢再服一二錢則為汗出差</p>	<p>萎蕤湯 <small>活人書</small> 治風濕兼療冬溫及春月中風傷寒發熱</p>	<p>頭眩痛喉咽乾舌強胸內疼痞滿腰背強</p>	<p>萎蕤 <small>三分</small> 石膏 <small>一兩</small> 白薇 麻黃 <small>湯泡焙</small> 川芎</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>葛根 <small>生者可用</small> 大羌活 <small>去蘆</small> 甘草 <small>炙</small> 杏仁 <small>去皮</small></p>	<p>仁槌碎 青木香 <small>一分冬一兩始</small></p>	<p>各半兩 春用半兩炒</p>	<p>右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎一盞日三四</p>	<p>服 <small>此清散之劑</small> 可治時疫</p>	<p>白虎加蒼朮湯 <small>方 本事</small> 治濕溫多汗</p>	<p>知母 <small>五兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 石膏 <small>一斤</small> 蒼朮 粳米 <small>各三</small></p>	<p>右為末每服四錢水一盞半煎至七分去滓取汁溫服</p>
-----------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	----------------------	--	-------------------------	--	-----------------------------------	--	--------------------------------------	------------------	-----------------------------	------------------------------------	---	---	------------------------------



黑膏 活人書

治溫毒發斑

好豉 一升

生地黃 半斤切

右二味以猪膏二斤合露之煎令三分減一絞去滓

用雄黃麝香如大豆者內中絞和盡服之毒便從皮

中出則愈

凡外感之症治之得宜六七日間無不愈者過期不愈皆治之不得其法所以或傳

經或變病種種現症不可窮極以致治法千端聚訟

不息故仲景傷寒論治傷寒之正方不過數首餘皆

誤治之變症故取治雜病之方隨症救療也按傷

寒為外感之總名傳變出入千頭萬緒仲景傷寒論

一字不可遺漏今止舉六經本症及六經主方數首

百合病

金匱

論曰百合病者百脈一宗悉致其病也意欲食復不能

食常默然欲卧不能卧欲行不能行飲食或有美時或

有不用聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸

藥不能治得藥則劇吐利如有神靈者身形如和其脈

微數每溺時頭痛者六十日乃愈若溺時頭不痛漸然

欽定四庫全書

蘭臺軌範

讀而精通之則凡為外感之病遊刃有餘矣故此集外感之方選錄甚少意有在也



者四十日愈若溺快然但頭眩者二十日愈其症或未

病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微見

者各隨症治之 百合病見於陰者以陽法救之見於

陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻

陽乃復下之此亦為逆

此等症病後得之者甚多醫者不知多方誤治以致病氣日深

不可救療始終無一人能識之者遍地皆然也 百脈一宗悉病蓋肺朝百脈故以百合治肺為主藥

### 百合病方

百合知母湯

金匱

百合病發汗後者主之

欽定四庫全書

蘭臺軌範

百合

七枚

知母

三兩切

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉

水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母取一

升去滓後合和煎取一升五合分溫再服

滑石代赭湯

金匱

百合病下之後者主之

百合

七枚

滑石

三兩碎綿裹

代赭石

如彈丸大一枚碎綿裹

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉

水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石代赭





取一升去滓後合和重煎取一升五合分溫服
百合雞子湯 <small>金匱</small> 百合病吐之後者主之
百合 <small>七枚</small> 雞子黃 <small>一枚</small>
右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉
水二升煎取一升去滓內雞子黃攪勻煎五分溫服
百合地黄湯 <small>金匱</small> 百合病不經吐下發汗病形如初者
主之
百合 <small>七枚</small> 生地黄汁 <small>一升</small>
欽定四庫全書
蘭臺軌範
右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉
水二升煎取一升去滓內地黃汁煎取一升五合分
溫再服中病勿更服大便常如漆
百合洗方 <small>金匱</small> 百合病一月不解變成渴者主之
百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗已食煮餅
勿以鹽豉也
栝蒌牡蠣散 <small>金匱</small> 百合病渴不差者主之
栝蒌根 牡蠣 <small>熬等分</small>



<p>右為細末飲服方寸七日三服</p>	<p>百合滑石散 <small>金匱</small> 百合病變發熱者 <small>一作發寒熱</small> 主之</p>	<p>百合 <small>一兩</small> 滑石 <small>三兩</small></p>	<p>右為散飲服方寸七日三服當微利者止服熱則除</p>	<p>感冒方 <small>附</small></p>	<p>九味羌活湯 <small>張元素方</small> 四時發散</p>	<p>羌活 防風 川芎 白芷 細辛</p>	<p>蒼朮 黃芩 甘草 生地</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>右加生薑三片葱白三莖水煎服 <small>此外感之總方惟生地不若易當歸為佳此方之分兩當因病之輕重加減故不為一定之數</small></p>	<p>敗毒散 <small>活人書</small> 治傷寒瘟疫風濕風眩拘蹇風痰頭痛目</p>	<p>眩四肢痛憎寒壯熱項強睛疼</p>	<p>羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎</p>	<p>枳殼 白茯苓 桔梗 人參 <small>各一兩</small> 甘草 <small>五錢</small></p>	<p>右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎七分溫服或沸湯點服 煩熱口渴加黃芩</p>
---------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------------------	--	--	---------------------	-----------------------	---	---



參蘇飲

易簡

治感冒風寒頭痛發熱憎寒咳嗽涕唾稠

黏胸膈滿悶脈弱無汗

人參

蘇葉

乾葛

前胡

陳皮

枳殼

茯苓

半夏

桔梗

木香

甘草

各五分

生薑

五片

大棗

一枚

右十三味水煎熱服取汗

以上三方乃感冒風寒之總法其病止在皮毛肌肉之中未入經絡故不能傳變大段驅散太陽陽明之風寒足矣其有食者則兼用消食之品可也此等症四時皆有南方最多

欽定四庫全書

蘭臺軌範

寒熱

靈素

靈口問篇帝曰人之振寒者何氣使然岐伯曰寒氣客

於皮膚陰氣盛陽氣虛故為振寒寒慄

素逆調論黃帝問曰人身非常溫也非常熱也為之熱

而煩滿者何也岐伯對曰陰氣少而陽氣勝故熱而煩

滿也帝曰人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者

何岐伯曰是人多痺氣也陽氣少陰氣多故身寒如從



水中出帝曰人有四肢熱逢風寒如灸如火者何也岐伯曰是人者陰氣虛陽氣盛四肢者陽也兩陽相得而陰氣虛少少水不能滅盛火而陽獨治獨治者不能生長也獨勝而止耳逢風寒如灸如火者是人當肉爍也帝曰人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是為何病岐伯曰是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰腎脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生於骨腎不生則髓不能滿故寒甚至骨也所以不能凍慄者肝

欽定四庫全書

蘭臺軌範

一陽也心二陽也腎孤臟也一水不能勝二火故不能凍慄病名曰骨痺是人當攣節也帝曰人之肉苛者雖近於衣絮猶尚苛也是為何疾岐伯曰榮氣虛衛氣實也榮氣虛則不仁衛氣虛則不用榮衛俱虛則不仁且不用肉如故也人身與志不相有曰死

移熱移寒 素氣厥論黃帝問曰五臟六腑寒熱相移者何岐伯曰腎移寒於脾癰腫少氣脾移寒於肝癰腫筋攣肝移寒於心狂隔中心移寒於肺肺消飲一溲二



死不治肺移寒於腎為涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之病也脾移熱於肝則為驚衄肝移熱於心則死心移熱於肺傳為鬲消肺移熱於腎傳為柔痙腎移熱於脾傳為虛腸澀死不可治胞移熱於膀胱則癰溺血膀胱移熱於小腸鬲腸不便上為口糜小腸移熱於大腸為虛痙為沉大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食亦胃移熱於胆亦曰食亦胆移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為衄蟻瞑目故得之氣厥也

欽定四庫全書

蘭臺軌範

難經

寒熱之病候之如何也然皮寒熱者皮不可近席毛髮焦鼻藁不得汗肌寒熱者皮膚痛唇口藁無汗骨寒熱者病無所安汗注不休齒藁痛 陽維為病苦寒熱

傷寒論

病人身大熱反欲近衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也



此種寒熱既非感冒亦非傷寒其淺深有皮膚骨髓之殊其以暫有歲月之異輕者有似感冒重者即變骨蒸所以內經以後諸書寒熱自有方論不入傷寒等法大段以清營中之熱為主其或有風有痰有積寒有瘵者則隨症消息之可也

### 寒熱方

四時加減柴胡湯 全匱 治五臟寒熱

柴胡 各八分 白朮 各八分 大腹枳榔 四枚并皮子用 陳皮 五分 生薑 五分 桔梗 七分

白朮增枳實夏三月又增甘草仍用枳實白朮秋三月同冬三月惟陳皮稍多

右各咬咀分為三貼一貼以水三升煮取二升分溫三服如人行四五里進一服渣再合煎一服 治寒熱總不能

欽定四庫全書

蘭臺軌範

外柴胡 寒熱以者必有積滯 分讀去聲二錢半為一分

天行熱病方 外臺 療天行三日外至七日不歇內熱令人更相染著主大青消毒湯

大青 四兩 香豉 八合熬 乾葛

梔子 各四兩 生地 一升

切 芒硝 三兩



<p>右六味切以水五升煮取二升半去滓下芒硝分三服 一方有石膏八兩忌蕪荑熱麵酒蒜等物 <small>此方專清</small></p>	<p><small>陽明之熱</small></p>	<p>苦參湯 <small>千金</small> 療天行熱病五六日以上宜服</p>	<p>苦參 <small>三兩</small> 黃芩 <small>二兩</small> 生地黄 <small>八兩</small></p>	<p>右三味切以水八升煮取二升去滓溫服半升日再服忌蕪荑</p>	<p>凝雪湯 <small>外臺</small> 療天行毒病七八日熱積胸中煩亂欲死</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>芫花 <small>一升</small></p>	<p>右一味以水三升煮取一升半漬故布薄胸上不過再三薄熱則除當溫四肢護厥逆也 <small>按本草芫花能治蠱毒消胸中</small></p>	<p><small>痰水</small></p>	<p>大黃湯 <small>外臺</small> 療天行五六日不解頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食</p>	<p>大黃 <small>胃</small> 黃連 <small>心肝</small> 黃柏 <small>腎</small> 梔子 <small>肺各半</small> <small>兩擘</small></p>	<p>右四味以水八升煮六七沸內豉一升葱白七莖煮</p>
---	----------------------------	---	--	---------------------------------	---	------------------------	-----------------------------	---	--------------------------	---	---	-----------------------------



取三升去滓分三服此許推然方神良又療傷寒已

五六日頭痛壯熱四肢煩疼取汗並宜老小忌猪肉

冷水

此三黃湯之變能除六經之熱

桃葉熏身法

外臺

水一石煮桃葉取七斗以薦席自圍衣被蓋上安桃

湯於牀簣下取熱自熏停少時當雨汗汗遍去湯待

歇速粉之并灸大椎則愈

按寒熱之因千變萬殊有屬外感有屬內傷而外感內傷之中又各不同其外有屬痰飲有屬瘀血有屬

欽定四庫全書

蘭臺軌範

積聚有屬敗症不可勝舉其治法各詳於本病條下當細審之此只錄時行熱病之數方耳

霍亂

附轉筋

傷寒論

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂問曰病

發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂

自吐下又利止復更發熱也 傷寒其脈微澁者本是

霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必利本嘔

下利者不可治也欲似大便而反失氣仍不利者屬陽





明也便必鞭十三日愈所以然者經盡故也下利後當  
便鞭鞭則能食者愈今反不能食則後經中頗能食復  
過一經能食過之一日當愈不愈者不屬陽明也吐利  
發汗脈平小煩者以新虛不勝穀氣也  
此霍亂是傷寒  
變症與霍亂本

別 症 微  
病源

霍亂者由人溫涼不調陰陽清濁二氣有相干亂之時  
其亂在於腸胃之間者因遇飲食而變發則心腹絞痛

欽定四庫全書

蘭臺軌範

其有先心痛者則先吐先腹痛者則先利心腹並痛者  
則吐利俱發挾風而實者身發熱頭痛體疼而復吐利  
虛者但吐利心腹刺痛而已亦有飲酒食肉腥膾生冷  
過度因居處不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之  
氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷則不磨不磨則水穀  
不消化亦令清濁二氣相干脾胃虛弱便則吐利水穀  
不消則心腹脹滿皆成霍亂 霍亂脈大可治微細不  
可治霍亂吐下脈微遲氣息劣口不欲言者不可治  
此霍



亂之正病  
言之最詳

乾霍亂者是冷氣搏於腸胃致飲食不消但腹滿煩亂

絞痛短氣其腸胃先挾實故不吐利名為乾霍亂也

霍亂而轉筋者由冷氣入於筋故也冷入於足之三陰

三陽則脚轉筋入於手之三陰三陽則手轉筋隨冷所

入之筋筋則轉轉者皆由邪冷之氣擊動其筋而移轉

也

按轉筋之病金匱有雞屎白散一方附脚氣條下而轉筋之症不一有平時常轉筋者有霍亂而轉筋者

欽定四庫全書

蘭臺軌範

并有轉筋入腹者當用木瓜吳茱萸等藥及外治湯熨之法以備選擇

### 霍亂轉筋方

五苓散 霍亂頭痛發熱多欲飲水者主之寒多不

用水者理中丸主之

二方俱傷寒論見通治

理中丸

此是寒霍亂之方百不得一者也誤用者害不旋踵

加減法 若臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩

吐多去朮加生薑三兩 下多者還用朮 悸者加

茯苓二兩 渴欲得水者加朮足前成四兩半 腹



<p>中痛者加人參足前成四兩半 寒者加乾薑成四兩半 腹滿者去朮加附子一枚 服湯後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣服</p>	<p>霍亂轉筋入腹極鹹作鹽湯於糟中煖漬之則差 <small>千金</small></p>	<p>又方 以醋煮青布揜脚膝冷復易之</p>	<p>又方 <small>千金</small> 治霍亂轉筋兩臂及脚胸脇諸轉筋並主之</p>	<p>香薷一把水煮令極濃服二三升即差青木香亦佳</p>	<p>廣濟高良薑湯 <small>外臺</small> 治霍亂吐痢轉筋入腹</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>高良薑 <small>四兩</small> 桂心 <small>各四兩</small></p>	<p>右二味以水七升煮取二升去滓分三服 <small>此亦治寒霍亂之方</small></p>	<p>霍亂轉筋入腹方 <small>外臺</small></p>	<p>木瓜子根皮合煎湯服之</p>	<p>茱萸湯 <small>外臺</small> 療霍亂轉筋不止</p>	<p>吳茱萸 <small>一升</small> 甘草 乾薑 <small>各二兩</small> 泡 蓼子 <small>一把</small> 亂髮 <small>一兩</small></p>	<p>燒 桂心 <small>二兩</small></p>	<p>右六味以水七升煮取二升三合去滓分溫三服</p>
---	--	------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------------------------	--	---	----------------------------------	-------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------	----------------------------



<p>灸法 <small>外臺</small> 以手拗所患脚大姆指當脚心急筋上七壯 又灸當足大姆指聚筋上七壯 又灸足大姆指 下約中一壯 又灸湧泉入腹者灸臍左二寸十四 壯 又灸股中大筋上陰一寸 轉筋四逆者灸兩 乳根黑際各一壯 轉筋欲死者灸臍上一寸十四 壯</p>	<p>藿香正氣散 <small>局方</small> 一元散 <small>河間</small> 蘇合香丸 <small>局方</small> 香薷飲</p>	<p><small>局方俱見通治</small></p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>蘭臺軌範</p>	<p>瘧</p>	<p>瘧</p>	<p>瘧</p>	<p>瘧</p>	<p>瘧</p>	<p>瘧</p>	<p>瘧</p>	<p>瘧</p>	<p>瘧</p>	<p>瘧</p>	<p>瘧</p>
--	---	------------------------------	---------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



防風 兩各一	麻黃 桂枝 芍藥 甘草 獨活	麻黃加獨活防風湯 金匱 治剛瘧	出食頃啜熱粥法	右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗汗不出食頃啜熱粥法	大棗 十二枚	栝蒌根 桂枝 芍藥 甘草 生薑	栝蒌根 二兩 桂枝 芍藥 各三兩 甘草 二兩 生薑 三兩	沉遲此湯主之	欽定四庫全書 蘭臺軌範	栝蒌桂枝湯 金匱 太陽病其症備身體強凡凡然脈反	瘧方	瘧為病胸滿口噤卧不著席脚攣急必介齒	病無汗而小便反多氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘧	陽病其症備身體強凡凡然脈反沉遲此為瘧 太陽	瘧脈按之緊如弦直上下行 瘧病有灸瘡難治 太	如蛇 暴腹脹大者為欲解脈如故反伏弦者瘧 夫	其汗者寒濕相得其表益虛即惡寒甚發其汗已其脈
-----------	----------------------------	-----------------------	---------	-----------------------------	-----------	-----------------------------	--	--------	----------------	-------------------------------	----	-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



秘不通 小便不利者有水氣其人苦渴	可發汗發汗則必便血 熱在下焦者則尿血亦令淋	淋之為病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中 淋家不	金匱	溺	胞移熱於膀胱則癰溺血 骨空論督脈為病癰痔遺	素宣明五氣論膀胱不利為癰不約為遺溺 氣厥論	癰虛則遺溺 五味篇酸走筋多食之令人癰	欽定四庫全書 蘭臺軌範	靈本輸篇三焦手少陽之脈入絡膀胱約下焦實則閉	癰閉利淋	續命湯 見中風門	葛根湯 金匱 大承氣湯 金匱 桂枝加葛湯 有汗用見 傷寒門 小	右六味每服一兩水煎 癰病乃傷寒壞症小兒得之猶有愈者其餘則百難 療一其實者或有因下而得生虛者竟無治法金匱 諸方見 效絕少
------------------	-----------------------	-----------------------	----	---	-----------------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------------	------	----------	---------------------------------	---



病源

石淋 淋而出石也腎主水水結則化為石

氣淋 腎虛膀胱熱氣脹所為也

膏淋 淋而有肥狀似膏故謂之膏淋亦曰肉淋此腎

虛不能制於肥液故與小便俱出也

勞淋 謂勞傷腎氣而生熱成淋也

血淋 熱淋之甚者則尿血心主血血之行身通遍經

絡循環腑臟勞甚則散失其常經溢滲入胞而成血淋

欽定四庫全書

蘭臺軌範

也

胞轉 其病狀臍下急痛小便不通是也或因小便應

下而強忍之或為寒熱所迫此二者俱合水氣還上氣

於胞使胞屈別不得充張外水應入不得入內洩應出

不得出外內相壅塞故令不通病至四五日乃有致死

者飽食訖應小便而忍之或飽食訖而走馬或小便急

疾走或忍水入房皆令胞轉或胞落並致死

數便為癰  
絕不便為

胞轉



尿床 小便乃水液之餘從膀胱入於胞夜卧則陽氣衰伏不能制於陰所以陰氣獨發於眠睡不覺尿出也

癃閉利淋方

栝萋瞿麥圓金匱 小便不利者有水氣其人苦渴此主

之

栝萋根二兩 茯苓三兩 薯蕷三兩 附子一枚 瞿麥一

兩

右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三丸日三服不知

欽定四庫全書

蘭臺軌範

增至七八丸以小便利腹中溫為知

滑石白魚散金匱 主小便不利

滑石二分 亂髮二分 白魚二分

右三味杵為散飲服半錢七日三服

茯苓戎鹽湯金匱 小便不利主之

茯苓半斤 白朮二兩 戎鹽一枚 丸大

右三味以水五升煮取三升分溫三服

猪苓湯金匱 脈浮發熱渴欲飲水小便不利者主之





<p>猪苓 <small>去皮</small> 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉 <small>各一兩</small></p>	<p>右五味以水四升先煮四味取二升去滓內膠烱消</p>	<p>溫服七合日三服 <small>此蓄飲之症</small></p>	<p>治諸種淋方 <small>千金</small></p>	<p>葵根 <small>八兩</small> 茅根 石首魚頭口 <small>各三兩宜用頭中骨</small> 甘草 <small>一兩</small></p>	<p><small>兩</small> 通草 <small>二兩</small> 貝子 <small>五合</small> 天麻根 <small>五兩</small></p>	<p>右七味呔咀以水一斗二升煮取五升分五服日三</p>	<p>夜二亦主石淋 <small>治石淋尤切</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>石葦散 <small>千金</small> 治血淋</p>	<p>石葦 當歸 蒲黃 芍藥</p>	<p>右四味各等分治下篩酒服方寸七日三</p>	<p>胞轉方 <small>千金</small> 治丈夫女人胞轉不得小便八九日者</p>	<p>滑石 <small>一斤</small> 寒水石 <small>一兩碎</small> 葵子 <small>一升</small></p>	<p>右三味以水一斗煮取五升盡服即利</p>	<p>療小便難方 <small>本亭</small> 治便難小腹脹不急治殺人</p>
--	-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---	---	-----------------------------	------------------------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------	--	---	------------------------	--



運臍下即通	石葦散 <small>局方</small> 治膀胱有熱淋瀝不宣或尿如豆汁或便	出砂石並治之	木通 <small>兩 對二</small> 石葦 <small>二兩 去毛</small> 滑石 白朮 瞿麥	芍藥 葵子 <small>兩 各三</small> 當歸 甘草 <small>炙</small> 王不留行	右為細末每服二錢小麥湯調下食前日二三服	藕蜜煎 <small>書 養老</small> 治老人淋病小便不利痛悶之極	藕汁 <small>五合</small> 白蜜 <small>五合</small> 生地黄汁 <small>一升</small>	欽定四庫全書 蘭臺軌範	右相和微火煎之令如錫空心含半匙漸漸下飲食	忌熱食炙肉 <small>此方亦 治血淋</small>	治石淋方 <small>千金 翼</small>	車前子 <small>二升</small> 絹袋貯以水八升煮取三升空腹頓服	之須臾當下石子宿勿食服之良	治熱淋方 <small>千金 翼</small>	白茅根 <small>四斤</small> 以水一斗五升煮取五升每服一升日	三夜二
-------	--	--------	---	---	---------------------	---------------------------------------	--	----------------	----------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------------------------	-----



<p>四汁飲 治熱淋小便赤澹疼痛</p> <p>葡萄 然汁 取自 生藕 取汁 生地 取汁 白蜜 各五合</p> <p>右和勻先把一盞銀器石器內慢火熬沸不拘時溫服</p>	<p>牛膝膏 治死血作淋</p>	<p>桃仁 尖 去皮 歸尾 兩 各一 牛膝 浸 四兩 酒 一宿 赤芍 生地 各一</p> <p>半水十鍾微火煎至二碗入麝香少許分四次空心服如夏月用涼水換此膏不壞</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p> <p>八正散 寶鑑 治諸淋</p>	<p>瞿麥 梔子 篇蓄 大黃 滑石</p>	<p>木通 車前子 甘草 錢 各一 加燈心一錢煎服</p> <p>治小便失禁方 千金 以水三升煮雞腸取一升分三服</p>	<p>家韭子丸 治遺溺及陽氣衰敗白濁遺精</p> <p>家韭子 兩 炒 六 鹿茸 酥 炙 四兩 肉蓯蓉 酒 浸 牛膝 酒 浸 熟地</p>	<p>斛 桂心 乾薑 兩 各一</p> <p>當歸 兩 各二 兔絲子 酒 浸 巴戟 兩 各一 杜仲 石</p>
--	------------------	--	--------------------------------------	-----------------------	--	---	---



右為末酒糊丸桐子大每服五十九加至百丸食前 鹽湯溫酒任下小兒遺尿者多因胞寒亦陽氣不足 也別作小丸服	夜多小便方 <small>千金翼</small> 治膀胱冷故小便至夜獨多	雞腸 <small>五具治如食法</small> 羊腎 <small>一具去脂並令乾</small> 赤石脂 <small>六兩</small> 龍骨 <small>三兩</small>	肉蓯蓉 <small>四兩</small> 川連 <small>五兩</small> 桂心 <small>二兩</small>	右七味為末每服方寸七日二服五日中作羊腎炙 一劑十日外作羊腎臙香味如常食飽與之	欽定四庫全書 蘭臺軌範	猪肚丸 治小便頻數 猪肚 <small>一個蓮子一升同煮一</small> 舶上茴香 <small>五錢</small> 破故紙	<small>一兩鹽</small> 川練子 <small>酒炒去核</small> 母丁香 <small>三錢</small> 加桑螵蛸 <small>一兩效</small>	蜜丸桐子大每服五十九空心溫酒送下	縮泉丸 治脬氣不足小便頻多	烏藥 益智仁 <small>各等分</small>	右二味為末酒煮山藥糊丸如梧子大每服五十九	空心鹽湯送下 <small>一方有覆盆子</small>
--	--------------------------------------	---	---	---	----------------	---	--	------------------	---------------	---------------------------	----------------------	------------------------------



蘭臺軌範卷三								欽定四庫全書	蘭臺軌範						治尿管 <small>千金</small> 取雞胍脰一具并腸燒末酒服男雌女雄	威喜丸 <small>治見通</small> 蒲灰散 <small>腫見水</small> 龍腦雞蘇丸 <small>崩治五淋血見通治</small>
--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--	--	--	--	--	--	--



欽定四庫全書

子部  
蘭臺軌範卷四

詳校官太醫院院使臣張肇基

洗馬臣王坦修覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣倪景寬



欽定四庫全書

蘭臺軌範卷四

吳江徐大椿撰

濕

金匱

太陽病關節疼痛而煩脈沉而細者此名濕痺濕痺之  
候小便不利大便反快但當利其小便 濕家之為病  
一身盡疼發熱身色如熏黃也

此黃與黃  
疸各別

濕家其人但

欽定四庫全書

蘭臺軌範

頭汗出背強欲得被覆向火若下之早則噦或胸滿小  
便不利 舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒渴欲得  
飲而不能飲則口燥煩也 濕家下之額上汗出微喘  
小便利者死若下利不止者亦死 風濕相搏一身盡  
疼痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗  
之病不愈者何也蓋發其汗汗大出者但風氣去濕氣  
在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微欲出汗者  
風濕俱去也 濕家病身疼發熱面黃而喘頭痛鼻塞



而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故  
鼻塞內藥鼻中則愈 內鼻之藥金匱未載俟廣求其法以補之亦不過牙皂爪蒂之類

濕方

麻黃加朮湯 金匱 濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其

汗為宜慎不可以火攻之

麻黃 三兩 去節 桂枝 二兩 去皮 甘草 炙 一兩 杏仁 七十個 去皮尖 白朮 四兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥

欽定四庫全書

蘭臺軌範

煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗 此濕家發汗之主方

防己黃芪湯 金匱 風濕脈浮身重汗出惡風者此湯主

之

防己 一兩 甘草 半兩 炒 白朮 七錢 半 黃芪 一兩一分 去蘆 惡風黃芪主之

右剉麻豆大每抄五錢七生薑四片大棗一枚水盞

半煎八分去滓溫服良久再服 喘者加麻黃半兩

胃中不和者加芍藥三分 氣上衝者加桂枝三

分 下有陳寒者加細辛三分 服後當如虫行皮





中從腰下如冰後坐被上又以一被繞腰下溫令微汗差

麻黃杏仁薏苡甘草湯 金匱 病者一身盡疼發熱日晡

所劇者名風濕此病傷於汗出當風或以傷取冷所

致也

麻黃 半兩去節湯泡 甘草 一兩炙 薏苡仁 半兩 杏仁 十個去皮尖炒

右剉麻豆大每服四錢水一盞半煮八分去滓溫服

有微汗避風

欽定四庫全書

蘭臺軌範

桂枝附子湯 金匱 傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不

能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濇者桂枝附子湯主

之若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之

桂枝 四兩去皮 生薑 三兩切 附子 三枚炮去皮破八片 甘草 二兩炙 大棗

十二枚擘

右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服

白朮附子湯 金匱

白朮 二兩 附子 一枚半泡去皮 甘草 一兩炙 生薑 一兩半切 大棗 六



枚	右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服一服覺身痺半日許再服三服多盡其人如冒狀勿怪即是木附並走皮中逐水氣未得除故耳			
甘草附子湯 <small>全匱</small>	風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者此湯主之			
甘草 <small>二兩 炙</small>	附子 <small>二枚 泡 去皮</small>	白朮 <small>二兩</small>	桂枝 <small>四兩 去皮</small>	
欽定四庫全書				
蘭臺軌範				
右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者服六七合為妙 <small>此風濕而兼寒者</small>	二妙散 <small>丹溪</small>	治筋骨疼痛因濕熱者如有氣加氣藥如血虛加血藥如痛甚以薑汁熱辣服之	黃柏 <small>炒</small>	蒼朮 <small>炒去皮</small>
右為末生薑研沸湯調服如表實氣實者少酒佐之	<small>在表之濕當散之在裏之濕當燥之諸方之義不外乎此</small>			



黑地黄丸 方見  
通治

暍

金匱

太陽中暍發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細朮遲小便已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發其汗則惡寒甚加溫針則發熱甚若下之則淋甚 此中暍乃中時行之熱氣與卒然中暑病象如霍亂者不同當別之

暍方

欽定四庫全書

蘭臺軌範

白虎人參湯 金匱

太陽中熱者暍是也汗出惡寒身熱

而渴此湯主之

知母 六兩

石膏 一斤

甘草 二兩

粳米 六合

人參 三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三

服 熱入裏則外惡寒清裏熱則惡寒自解然亦須詳審有表無表方為精密况凡屬汗出多之病無不

惡寒者以其惡寒汗出而誤認為寒用大順散等熱劑則立危矣

一物瓜蒂湯 金匱

太陽中暍身熱疼重而脈微弱此以

夏月傷冷水水行皮中所致也



瓜蒂 二十個	右剉以水一升煮取五合去滓頓服 <small>此方服之當吐</small>
香薷飲 <small>局方</small>	治暑熱乘涼飲冷陽氣為陰邪所遏頭痛發熱惡寒煩燥口渴腹滿吐瀉者
香薷 一斤	厚朴 <small>薑汁炒</small> 白扁豆 <small>炒各半斤</small>
右水煎浸冷服	<small>此治時行暑病之主方其分兩則五錢至一兩止</small>
十味香薷飲	即前方加人參甘草黃芪木瓜陳皮白朮茯苓
欽定四庫全書	蘭臺軌範
黃連香薷飲	即香薷飲加黃連 <small>四兩薑汁同炒黃色</small>
枇杷散 <small>局方</small>	治中暑伏熱煩渴引飲嘔逆惡心頭目眩暈
枇杷葉	陳皮 丁香 厚朴 <small>各五錢</small> 白茅根
麥冬	木瓜 甘草 <small>炙各一兩</small> 香茹 <small>七錢半</small>
右為末每二錢薑三片煎湯調服溫服亦可如煩燥	
井水調下小兒三歲以下服五分量大小加減	



<p>蟬酥丸 <small>秘方</small></p>	<p>茅朮 <small>各一兩</small>                  雄黃 <small>各一兩</small>                  辰砂 <small>五錢</small>                  麝香 <small>一錢</small>                  丁香</p>	<p>牙皂 <small>各三錢</small>                  蟬酥 <small>五錢</small></p>	<p>右用火酒化蟬酥打丸如鳳仙子大辰砂為衣放舌</p>	<p>底化下重者二三丸</p>	<p>千金丹 <small>秘方即人馬平安散</small></p>	<p>麝香 <small>各二錢</small>                  冰片 <small>各二錢</small>                  硃砂 <small>五錢</small>                  雄黃                  硼砂</p>	<p>硝 <small>各一兩</small>                  金箔 <small>一百張或加牛黃</small></p>	<p>欽定四庫全書                  蘭臺軌範</p>	<p>右七味為末或水服二三分或嗅少許於鼻內</p>	<p>又刮法</p>	<p>用薄錢醮香油刮胸背及臂股灣令色紫疹起為度</p>	<p>或用婦人縛髮油繩醮油刮亦可</p>	<p>紫金錠 <small>局方</small>                  蘇合丸 <small>局方</small>                  藿香正氣散 <small>局方</small>                  生脈飲</p>	<p>六一散 <small>以上俱見通治</small></p>	<p>痰癰</p>	<p>素問</p>
------------------------------	---	--	-----------------------------	-----------------	------------------------------------	---	--	---	---------------------------	------------	-----------------------------	----------------------	---	----------------------------------	-----------	-----------



瘧論黃帝問曰夫瘧瘧皆生於風其畜作有時者何也  
岐伯曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷  
腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲帝曰  
何氣使然岐伯曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移  
也陽並於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷也巨  
陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨  
寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內  
熱外內皆熱則喘而渴故欲冷飲也此皆得之夏傷於

欽定四庫全書

蘭臺軌範

暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此營氣之所舍也  
此令人汗空疎腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以  
浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行於  
陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄  
是以日作帝曰其間日作者何也岐伯曰其氣之舍深  
內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以  
間日而作也帝曰其作日晏與日早者何氣使然岐伯  
曰邪氣客於風腑循膂而下衛氣一日一夜大會於風



腑其明日日下一節故其作也晏此先客於脊背也每  
至於風腑則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作  
以此日作稍稍益晏其出於風腑日下一節二十五日  
下至骶骨二十六日入於脊內注於伏膂之內其氣上  
行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早其間日  
發者由邪氣內薄於五臟橫連募原其道遠其氣深其  
行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃作也帝曰  
夫子言衛氣每至於風腑腠理乃發發則邪氣入入則

欽定四庫全書

蘭臺軌範

病作今衛氣日下一節其氣之發也不當風腑其日作  
者奈何岐伯曰此邪氣客於頭項循膂而下者也故虛  
實不同邪中異所則不得當其風腑也故邪中於頭項  
氣至頭項而病中於背氣至背而病中於腰脊氣至腰  
脊而病中於手足氣至手足而病衛氣之所在與邪氣  
相合則病作故風無常腑衛氣之所發必開其腠理邪  
氣之所合則其腑也帝曰善夫風之與瘧也相似同類  
而風獨常在瘧得有時而休者何也岐伯曰風氣留其



<p>以秋病者寒甚以冬病者寒不甚以春病者惡風以夏</p>	<p>於六腑而有時相失不能相得故休數日乃作也 其</p>	<p>渴或不渴其故何也岐伯曰其間日者邪氣與衛氣客</p>	<p>真往而未得并者也帝曰時有間二日或至數日發或</p>	<p>陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之此</p>	<p>也陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不得入</p>	<p><small>以意</small> 岐伯曰瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始</p>	<p><small>會也</small> 曰瘧瘧 <small>內經之文亦論其理如此其實病變不同不可</small></p>	<p><small>欽定四庫全書</small> 者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名</p>	<p><small>蘭臺軌範</small> 寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘧其但熱而不寒</p>	<p>曰先熱而後寒者何也岐伯曰此先傷於風而後傷於</p>	<p>寒而後傷於風故先寒而後熱病以時作名曰寒瘧帝</p>	<p>傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於</p>	<p>理開發因遇夏氣淒滄之水寒臟於腠理皮膚之中秋</p>	<p>瘧先寒而後熱者何岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠</p>	<p>處故常在瘧氣隨經絡沉以內薄故衛氣應乃作帝曰</p>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------





<p>病者多汗 瘧脈緩大虛便宜用藥不宜用鍼凡治瘧先發如食頃乃可以治過之則失時也諸瘧而脈不見刺十指間出血去必已先視身之赤如小豆者盡取之</p> <p><small>瘧疾藥當在未來時前服刺瘧之法簡易可學不必習針法皆能之亦治瘧之要訣也</small></p>	<p>風瘧 素生氣通天論魄汗未盡形弱而氣燄穴腠以閉發為風瘧 又云夏傷於暑秋為瘧瘧</p> <p><small>二日一發者為瘧瘧瘧與</small></p>	<p>同瘧</p>	<p>似瘧 素生真要大論帝曰火熱復惡寒發熱如有瘧</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭臺軌範</p>	<p>狀或一日發或間數日發其故何也岐伯曰勝復之氣會合之時有多少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近此勝復相搏盛衰之節瘧亦同法</p> <p><small>瘧亦同法則非瘧可知</small></p>	<p>金匱</p>	<p>師曰瘧脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者下之差弦遲者可溫之弦緊者可發汗針灸也浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之 但熱不寒者</p>
--	---	-----------	------------------------------	---------------------------	---	-----------	--



邪氣內藏於心外舍分肉之間令人消燂肌肉

牡瘡 瘡多寒者名曰牡瘡 似當作牝字諸本皆作牡存考

瘡方

鼈甲煎圓 金匱 病瘡以月一日發當以十五日愈設不

差當月盡解如其不差當云何師曰此結為癥瘕名

曰瘡毋急治之宜此方

鼈甲 十一分 烏扇 三分 黃芩 三分 柴胡 六分 鼠婦 三分

乾薑 三分 大黃 三分 芍藥 五分 桂枝 三分 葶藶 一分

欽定四庫全書

蘭臺軌範

石韋 三分 厚朴 三分 牡丹 五分 瞿麥 二分 紫葳 三分

半夏 一分 人參 一分 蟲 五分 阿膠 三分 蜂窠 四分

赤消 十二分 蜣螂 六分 桃仁 二分

右二十三味為末取鍛灶下灰一斗清酒一斛五斗

浸灰候酒盡一半著鼈甲於中煮令泛爛如膠漆絞

取汁內諸藥煎為丸如梧子大空心服七丸日三服

白虎加桂枝湯 金匱 溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨

節疼煩時吐此湯主之



右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升	右七味以水一斗二升煮取六升去滓煎取三升溫服一升日二服	柴胡桂薑湯 <small>金匱</small> 治瘧寒多微有熱或但寒不熱	右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升	右七味以水一斗二升煮取六升去滓煎取三升溫服一升日二服	柴胡 <small>半斤</small> 桂枝 <small>三兩</small> 去皮 乾薑 <small>二兩</small> 栝蔞根 <small>四兩</small> 黃芩 <small>三兩</small>	柴胡 <small>八兩</small> 人參 黃芩 甘草 <small>各三兩</small> 栝蔞根 <small>四兩</small>	生薑 <small>二兩</small> 大棗 <small>十二枚</small>	欽定四庫全書 蘭臺軌範	柴胡去半夏加栝蔞湯 <small>金匱</small> 治瘧病發渴者亦治勞瘧	蜀漆半分臨發時服一錢匕	右三味杵為散未發前以漿水服半錢匕 溫瘧加	蜀漆散 <small>金匱</small> 瘧多寒者名曰牡瘧此湯主之 <small>牡宜作北</small>	蜀漆 <small>洗去腥</small> 雲母 <small>燒二日夜</small> 龍骨 <small>等分</small>	右對每五錢水一盞半盞至八分去滓溫服汗出愈 <small>內經以先熱後寒為濕瘧但熱不寒為痺瘧</small>	知母 <small>六兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 石膏 <small>一斤</small> 粳米 <small>二合</small> 桂枝 <small>三兩</small> 去皮
----------------------	----------------------------	---	----------------------	----------------------------	--	--	---	----------------	---	-------------	----------------------	---	---	--	--



日三服初服微煩復服汗出便愈

蜀漆丸 千金 主瘰癧連年不差服三七日定差方

蜀漆 知母 白薇 地骨皮 麥門冬

去心 升麻 各五分 恒山 一兩 石膏 二兩 香豉 一合 萎蕤

烏梅肉 鼈甲 各一兩 甘草

右十三味搗篩為末煉蜜和丸如桐子大空腹飲服

十九日再加至二三十丸 此方治三日瘰癧為宜

陵鯉湯 千金 主瘰癧疾江南瘴癘方

欽定四庫全書

蘭臺軌範

陵鯉甲 四十枚 烏賊魚骨 附子 泡各一兩 恒山 三兩

右五味咬咀以酒三升漬一宿未發前稍稍啜之勿

絕吐之并塗五心一日斷食過時以乃食 用生藥探吐法

療瘰癧病醫不能救者方 千金 外治截瘰癧法

以繩量病人脚圍繞足跟及五指一匝訖截斷繩取

所量繩置項上著反向背上當繩頭處中脊骨上灸

三十壯則定候看復惡寒急灸三十壯則定氏至過

發一炊以候之雖饑勿與食盡日此神驗男左足女



烏梅 <small>三個</small>	常山 <small>炒火酒</small> 知母 貝母 草果 檳榔 <small>各一錢</small>	常山飲 <small>局方</small> 治痰癰	右九味加薑三片水煎服	甘草 茯苓 白朮 草果 <small>煨</small>	青皮 厚朴 柴胡 黃芩 半夏	清脾湯 <small>濟生</small> 治熱多陽癰	諸藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服	欽定四庫全書 蘭臺軌範	右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內	牡蠣 <small>四兩</small> 麻黃 <small>四兩</small> 去節 甘草 <small>二兩</small> 蜀漆 <small>二兩</small>	牡蠣湯 <small>外臺</small> 治牡癰	頓服之後微吐差止忌生葱生菜	右一味切以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前	療癰常山湯 <small>外臺</small> 吐法	常山 <small>三兩</small>	右足
-------------------------	--	---------------------------------	------------	--	----------------------------	-----------------------------------	------------------	----------------	----------------------	--	---------------------------------	---------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------	----



小柴胡湯 <small>寒 見傷</small>	錢溫服	右以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熱每服四	草果 生薑 烏梅 大棗 甘草 <small>各等分</small>	半夏 人參 茯苓 白朮 橘紅	四獸湯 <small>易簡</small> 治食癰諸癰和胃消痰	時乃解之 <small>此即內經之法</small>	先其時一日頃用細左索繩繫束其手足十指過發	欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	集驗癰必從四肢始療方	菘菜	三二沸去滓頓服差未差更作服三服永差忌海藻	右八味各細剉以童子小便兩茶碗宿浸明旦早煎	柴胡 <small>四分</small> 知母 <small>四分</small> 大黃 <small>三分</small>	烏梅 <small>七個</small> 桃柳心 <small>各七莖</small> 葱白 <small>七莖</small> 豆豉 <small>一合</small> 甘草 <small>四</small>	烏梅引子 療溫癰勞癰	右六味加薑棗煎癰未發時面東溫服
-----------------------------	-----	----------------------	--------------------------------------	----------------	------------------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------------	------------	----	----------------------	----------------------	--	---	------------	-----------------



<p>治瘧之法不外諸方惟三日瘧則煎劑不能取效宜 病日用煎方以驅邪餘兩日用溫補以扶元氣又加 避風靜養 則庶幾矣</p>	<p>痢</p>	<p>素問</p>	<p>通評虛實論帝曰腸澼便血何如岐伯曰身熱則死寒 則生帝曰腸澼下白沫何如岐伯曰脈沉則生脈浮 則死帝曰腸澼下膿何如岐伯曰脈懸絕則死滑大則 生帝曰腸澼之屬身不熱脈不懸絕何如岐伯曰滑大</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>者曰生懸瀋者曰死以臟期之 氣厥論腎移熱於脾 傳為虛腸澼死不可治 大奇論腎脈小搏沉為腸澼 下血血溫身熱者死心肝澼亦下血二臟同病者可治 其脈小沉瀋為腸澼其身熱者死 太陰陽明論犯賊 風虛邪陽受之飲食不節起居不時者陰受之陽受之 則入六腑陰受之則入五臟入六腑則身熱不時卧上 為喘呼入五臟則填滿閉塞下為飧泄以為腸澼</p>	<p>腸紅 病也</p>
--	----------	-----------	---	------------------------	--	------------------



金匱

六腑氣絕於外者手足寒上氣脚縮五臟氣絕於內者  
痢不禁下甚者手足不仁 下痢脈沉弦者下重脈大  
者為未止脈微弱數者為欲自止雖發熱不死 下痢  
手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死少  
陰負跌陽者為順也 下痢有微熱而渴脈弱者令自  
愈 下痢渴者自愈以陽氣復而寒邪去也 下痢脈數有微熱汗出令自愈  
設脈緊為未解下痢脈數而渴者令自愈設不差必清

欽定四庫全書

蘭臺軌範

膿血以有熱故也 下痢氣者當利其小便 下痢清  
穀不可攻其表汗出必脹滿 下痢脈沉而遲其人面  
少赤身有微熱下痢清穀者必鬱冒汗出而解病人必  
微厥所以然者其面帶陽下虛故也 下痢後脈絕手  
足厥冷晬時脈還手足溫者生不還者死 下痢腹脹  
滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表 以上諸症皆屬陰寒之痢非暑毒之

痢也治法  
大相懸殊

病源





痢而赤白者是熱乘於血血滲於腸內則赤也冷氣入腸搏腸間津液凝滯則白也冷熱相交故赤白相雜重者狀如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脈薄血狀如魚脂腦世謂魚腦痢也

血痢者熱毒折於血入大腸故也

休息痢者胃腕有停飲因痢積久或冷氣或熱氣乘之氣動於飲則飲動而腸虛受之故為痢也

痢如膏由臟腑虛冷氣入於大腸成痢冷氣積腸又虛

欽定四庫全書

蘭臺軌範

滑脂凝如膏也

蠱蛀痢毒氣侵於臟腑如病蠱蛀之家痢血雜膿瘀黑有片如雞肝與血俱下是也

雜痢謂痢色無定或水穀或膿血或青或黃或赤或白變雜無常或雜色相兼而痢也挾熱則黃赤熱甚則變膿血也冷則白冷甚則青黑皆由飲食不節冷熱不調胃氣虛故變易

痢方



<p>桃花湯 <small>金匱</small> 下痢便膿血者此湯主之</p>	<p>赤石脂 <small>一斤一半剉</small> 乾薑 <small>一兩</small> 粳米 <small>一升</small></p>	<p>右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內赤石</p>	<p>脂末方寸七日三服若一服愈餘勿服 <small>此治下焦滑脫之痢</small></p>	<p>白頭翁湯 <small>金匱</small> 熱痢下重者此湯主之</p>	<p>白頭翁 黃連 黃柏 秦皮 <small>各三兩</small></p>	<p>右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈再服</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>紫參湯 <small>金匱</small> 下痢肺痛此湯主之</p>	<p>紫參 <small>半斤</small> 甘草 <small>三兩</small></p>	<p>右二味以水五升先煮紫參內甘草煮取一升半分</p>	<p>溫三服 <small>紫參疑即燭上染紅色者</small></p>	<p>訶梨勒散 <small>金匱</small> 治氣痢</p>	<p>訶梨勒 <small>十枚</small></p>	<p>右一味為散粥飲和頓服</p>	<p>甘草瀉心湯 <small>傷寒論</small> 傷寒中風醫反下之其人下痢日數</p>
---	---	-----------------------------	--	---	--	------------------------------	------------------------	---	--	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	-------------------	--



乾薑黃連黃芩人參湯 <small>論 傷寒</small>	即前方加半夏 <small>半升</small> 生薑 <small>三兩</small> 煎服法同	黃芩加半夏生薑湯 <small>論 傷寒</small>	一服 <small>此熱痢之主方</small>	右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜	黃芩 <small>三兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 芍藥 <small>各二兩</small> 大棗 <small>十二枚</small>	芩人參湯主之	欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	嘔者黃芩加半夏生薑湯 若傷寒本自寒下醫復	黃芩湯 <small>論 傷寒</small> 太陽與少陽合病自下痢者與黃芩湯若	一升日三服 <small>此治上焦不和之痢</small>	右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服	大棗 <small>十二枚</small>	甘草 <small>四兩</small> 黃芩 <small>二兩</small> 乾薑 <small>各三兩</small> 半夏 <small>半升</small> 黃連 <small>一兩</small>	安此湯主之	行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得
----------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	----------------------	--	--------	-------------------------------	----------------------	--	----------------------------------	----------------------	--------------------------	--	-------	----------------------



<p>乾薑 黃連 黃芩 人參<small>各三兩</small></p>	<p>右四味以水六升煮取二升分溫再服<small>瀉心湯以下四方皆以黃</small></p>	<p><small>芩為主而因症加減此痢疾之正方也</small></p>	<p>赤石脂禹餘糧湯<small>傷寒論</small> 傷寒服湯藥下痢不止心下痞</p>	<p>硬服瀉心湯已復以他藥下之痢不止醫以理中湯</p>	<p>與之痢益甚理中者理中焦此痢在下焦此湯主之</p>	<p>赤石脂<small>碎</small> 禹餘糧<small>碎各一斤</small></p>	<p>已上二味以水六升煮取二升去滓三服<small>下焦乃大腸之底也</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>雄黃丸 夷堅甲志云昔虞丞相自渠州被召途中</p>	<p>冒暑得疾泄瀉連月夢壁間有韻語方一紙讀之數</p>	<p>遍其詞曰毒暑在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘧</p>	<p>獨煉雄黃蒸餅和藥甘草作湯服之安樂別作治療</p>	<p>醫家大錯如方製藥服之遂愈<small>此方治暑毒痢</small></p>	<p>柴胡加芒硝湯<small>傷寒論</small> 治傷寒胸滿而嘔日晡所發潮熱</p>	<p>已而微痢先以小柴胡解外後以此主之</p>	<p>即柴胡湯方加芒硝二兩</p>
--	---	---------------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	---	--	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------	-------------------



<p>右先煮柴胡湯去滓內芒硝分溫再服不解更作</p>	<p>瓜蒞散 治五色痢久不愈者</p>	<p>瓜蒞 <small>一個以炭火煨存性蓋地上出火毒</small></p>	<p>右研細溫酒服盡</p>	<p>療熱毒痢血片臍下絞刺痛方 <small>外臺</small></p>	<p>升麻 地榆 茜草 黃連 <small>各六分</small> 犀角 <small>四分</small></p>	<p>生地 <small>八分</small> 梔子 薤白 香豉 <small>各二合</small></p>	<p>右九味水六升煮取一升五合分溫三服日再 <small>此血痢之</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>方主</p>	<p>主赤白痢方 <small>外臺</small></p>	<p>黃連 <small>二兩</small> 阿膠 <small>四片</small></p>	<p>右二味以酒二升合黃連煎十五沸去滓然後內阿</p>	<p>膠令烊溫服三升 <small>此治血熱之痢</small></p>	<p>療五疳蒸下痢方 <small>外臺</small></p>	<p>苦參 青箱 甘草 <small>炙各三兩</small></p>	<p>右三味以水四升煮取二升半分三灌即愈凡蒸但</p>
----------------------------	---------------------	---	----------------	---------------------------------------	--	---	---	-----------------------------------	-----------	--------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------



服地汁即差 <small>此兼治虫</small>	薤白湯 <small>活人書</small> 傷寒下痢如爛肉汁赤白滯下伏氣腹痛	諸熱毒並皆治之	豉 <small>半斤</small> 薤白 <small>一把</small> 梔子 <small>七枚大者破之</small>	右剉如麻豆大以水二升半先煮梔子十沸下薤白	煎至二升許下豉煎取一升二合去滓每服一湯盞	訶梨勒丸 <small>局方</small> 治腸胃積寒以痢純白或有青黑日夜	無度	欽定四庫全書 蘭臺軌範	肉豆蔻 <small>去皮</small> 木香 乾薑 <small>泡各二兩</small> 縮砂仁 訶	梨勒皮 川烏頭 <small>泡去皮</small> 白礬 <small>煨各二分</small> 龍骨 <small>洗</small> 赤	石脂 <small>各八兩</small>	右為末用粟米飯為丸如梧子大每服二十九至三	十九溫粟米飲下食前服甚者可倍加丸數 <small>此溫瀉之劑</small>	葛根湯 葛根黃芩黃連湯 當歸四逆湯	大承氣湯 小承氣湯 四逆散 四逆湯	白通加猪胆汁湯 白通湯 四逆加人
---------------------------	---	---------	---	----------------------	----------------------	--	----	----------------	---	---	-----------------------	----------------------	--	-------------------	-------------------	------------------



脈癩疾 靈癩狂篇脈癩疾者暴仆四支之脈皆脹而	下泄不治	筋癩疾 靈癩狂篇筋癩疾者身倦攣急嘔多沃沫氣	居汗出煩惋嘔多沃沫氣下泄不治	骨癩 靈癩狂篇骨癩疾者顛齒諸腠分肉皆滿而骨	大喜 狂者多食善見鬼神善笑而不發於外者得之有所	得之大恐 狂目妄見耳妄聞善呼者少氣之所生也	欽定四庫全書 蘭臺軌範	善罵詈日夜不休 狂言驚善笑好歌樂妄行不休者	饑 狂始發少卧不饑自高賢也自辯智也自尊貴也	靈癩狂篇狂始生先自悲也喜忘苦怒善恐者得之憂	靈素	癩狂癩	參湯 通脈四逆湯 猪膚湯 陽毒升麻	湯 以上十三方 俱見傷寒門 生薑瀉心湯 烏梅丸 威喜	丸 方見通治 此方 和劑名感應丸
-----------------------	------	-----------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----	-----	-------------------	----------------------------	------------------



縱脈滿盡刺之出血嘔多沃沫氣下泄不治  
素生氣通天論陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂 宣  
明五氣論五邪所亂邪入於陽則狂 調經論血并於  
陰氣并於陽故為驚狂 至真要大論諸躁狂越皆屬  
於火

通評虛實論帝曰癲疾何如岐伯曰脈搏大滑以自己  
脈小堅急死不治帝曰癲疾之脈虛實何如岐伯曰虛  
則可治實則死 陽明脈解篇岐伯曰四支者諸陽之

欽定四庫全書

蘭臺軌範

本陽盛則四支實實則能登高也帝曰其棄衣而走者  
何也岐伯曰熱盛於身故棄衣欲走也帝曰其妄言罵  
詈不避親疎而歌者何也岐伯曰陽盛則使人妄言罵  
詈不避親疎而不欲食不欲食故妄走也

陽厥怒狂 素病能論帝曰有病怒狂者此病安生岐  
伯曰陽氣者因暴折而難決故善怒也病名曰陽厥帝  
曰治之奈何岐伯曰奪其食即已使之服以生鐵洛為  
飲夫生鐵洛者下氣疾也





胎病 素奇病論帝曰人生而有病癩疾者病名曰何  
安所得之岐伯曰病名為胎病此得之在母腹中時其  
母有所大驚氣上而不下精氣并居故令子發為癩疾  
也

難經

癩疾始發意不樂僵仆直視其脈三部陰陽俱盛是也  
重陽者狂重陰者癩

病源

欽定四庫全書

蘭臺軌範

風癩 風癩者由氣血虛邪入於陰經故也又人在胎  
其母卒大驚精氣并居令子發癩其發則仆地吐涎沫  
無所覺是也 此俗名  
羊頭瘋

五癩 五癩者一曰陽癩發如死人遺尿食頃乃解二  
曰陰癩初生小時臍瘡未愈數洗浴因此得之三曰風  
癩發時眼目相引牽縱反強羊鳴食頃方解四曰濕癩  
眉頭痛身重坐熱沐頭濕結腦肺未止得之五曰馬癩  
發作時時反目口噤手足相引身體皆然



鬼魅 凡人有為鬼物所魅則好悲而心自動或心亂如醉狂言驚怖向壁悲啼夢寤喜魘或與鬼神交通病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能飲食此魅之所持也十歲以上為癩十歲以下為癩大體不外三種風驚食是也

千金

驚癩 癩分心肝脾肺腎膈腸之病及馬牛羊猪犬雞

之別 其象各有相似

欽定四庫全書

蘭臺軌範

癩狂方

生鐵落為飲 素問

生鐵落即爐冶間鎚落之鐵屑用水研浸可以為飲其屬金其氣寒而重最能墜熱開結平水火之邪故可以下氣疾除狂怒也凡藥中用鐵精鐵華粉鐵砂

鐵綉水之類皆同此意 此治怒狂之方以鎮肝為主

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯 傷寒論 治傷寒脈

浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安者



<p>即桂枝湯去芍藥加蜀漆<small>三兩洗</small>牡蠣<small>五兩</small>龍骨<small>四兩</small></p>	<p>右七味以水一斗煮取二升先煮蜀漆內諸藥煮取三升去渣溫服一升</p>	<p>柴胡加龍骨牡蠣湯<small>傷寒論</small>治傷寒下之驚煩小便不利</p>	<p>譟語身重不能轉側此湯主之</p>	<p>柴胡 龍骨 人參 茯苓 鉛丹</p>	<p>黃芩 桂枝<small>各一兩半</small>半夏<small>二合</small> 大黃<small>二兩</small> 牡蠣<small>生一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>生薑<small>一兩半</small> 大棗<small>六枚</small></p>	<p>右十二味以水八升煮取四升內大黃更煮去滓溫服一升</p>	<p>治癲狂百病<small>千金翼</small></p>	<p>大麻子<small>四升上好者</small>以水六升煮令芽生去滓煎取二升</p>	<p>空腹頓服或多言語勿怪但使人摩手足<small>煮法奇</small></p>	<p>葶苈子散<small>外臺</small>治五癰</p>	<p>猪卵<small>一具陰乾</small> 葶苈子<small>三斤</small> 牛黃<small>八分</small> 鯉魚胆<small>五分</small></p>
---	-------------------------------------	--	---------------------	-----------------------	---	------------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	--	---	---------------------------------	--



桂心 一兩 研

右五味以清酒一升漬葭苕子暴令乾盡酒止搗合

下篩酒服五分日再當醉不知稍增

抱胆丸 類方 治一切癩癘風狂或因驚恐怖畏所致及

婦人產後血虛驚氣入心并室女經脈通行驚邪蘊

結

水銀 二兩 硃砂 細研各二兩 黑鉛 一兩半 乳香 一兩

右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下硃砂乳

欽定四庫全書

蘭臺軌範

香乘熱用柳木槌研勻丸雞豆大每服一丸井花水

吞下病者得卧切莫驚動覺來即安再服一丸除根

琥珀壽星丸 局方 治心胆被驚神不守舍或痰迷心竅

恍惚健忘妄言妄見

天南星 一斤掘坑深二尺用炭火五升於坑內燒紅取出炭掃淨用好酒一斤澆將南星趁熱下

坑內用盆急蓋訖泥壅合 琥珀 四兩 硃砂 一兩 研飛

右和猪心血三個生薑汁打麵糊攪令稠粘將心血

和入藥末丸如桐子大每服五十九煎人參湯下日



三

控延丹 類方

治諸癩久不愈頑延聚散無時變生諸症

川烏 用生

半夏 湯洗

白殭蚕

炒各半兩生薑汁浸一宿

鐵粉 三錢研

全蝎

甘遂

各二錢半麵裹煨

右為細末生薑自然汁為丸如菘豆大硃砂為衣每

服十五丸食後生薑湯下忌食甘草

獨效苦丁香散

治忽患心疾癲狂不止得之驚憂

痰氣上犯心包當治其源

欽定四庫全書

蘭臺軌範

以苦丁香即瓜蒂半兩為末每服一錢井花水調滿

盞投之得大吐熟睡勿令人驚起

甘遂散

類方

治癲狂及婦女心風血邪

甘遂末一錢用猪心取三管血三條和甘遂多少和

之將心批作二片入藥在內合之綿縛外用皮紙裹

濕慢火煨熟勿令焦取藥細研碾入辰砂末一錢和

勻令作四丸每服一丸將所煨猪心煎湯化下再服

用別猪心過半日大便下惡物後服調和胃氣丸此



病乍作乍醒者甦不食迷癡者不治

苦參丸 外臺 治狂邪發惡或披頭大叫欲殺人不避水

火以苦參為末蜜丸桐子大每服十丸薄荷湯下

礞石滾痰丸 養生主論 蘇合香丸 局方 至寶丹 以上三方俱見通治

按癩癩一症其輕者不拘何方可愈重者必用鍛鍊秘方僅能有效

痰飲

金匱

問夫飲有四何謂也師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支

欽定四庫全書

蘭臺軌範

飲問曰何以異師曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有

聲謂之痰飲飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲飲

水流行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼重謂之溢

飲欬逆倚息氣短不得卧其形如腫謂之支飲 水在

心心下堅築短氣惡水不得飲 水在肺吐涎沫欲飲

水 水在脾少氣身重 水在肝脇下支滿噎而痛

水在腎心下悸 夫心下有留飲其人背寒冷如水大

留飲者脇下痛引缺盆咳嗽則輒已 胸中有留飲



<p>其人短氣而渴四肢歷節痛脈沉者有留飲 膈上病</p>	<p>痰滿喘咳吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出其人振振</p>	<p>身暈劇必有伏飲 夫病人飲水多必暴喘滿凡食少</p>	<p>飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆</p>	<p>大下後喜虛脈偏弦者飲也 病痰飲者當以溫藥和</p>	<p>之<small>溫藥和之</small>夫有支飲家以咳數歲其脈弱者可治實</p>	<p>大數者死其脈虛者必苦胃其人本有支飲在胸中故</p>	<p>也治屬飲家 夫短氣有微飲當從小便去之 病溢</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>飲者當發其汗<small>水在中當利小便水在四肢當發汗此亦總訣</small>嘔家本渴渴者</p>	<p>為欲解今反不渴心下有支飲故也 假令瘦人臍下</p>	<p>有悸吐涎沫而癩眩此水也 先渴後嘔為水停心下</p>	<p>此屬飲家<small>全部內經無一痰字然世間痰飲之病最多惟仲景大創厥論而後萬世治痰之法始備</small></p>	<p>病源</p>	<p>癖飲 由飲水多水停聚兩脇之間遇寒氣相搏則結</p>	<p>聚成塊在脇下弦亘起按之作水聲<small>飲成形者為癖</small></p>	<p>酒癖 因大飲酒後渴而引飲無度酒與飲停滯在脇</p>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------	--	------------------------------	------------------------------	--	-----------	------------------------------	--	------------------------------



肋下結聚成癖時時作痛其狀脇下氣急而痛

鬲痰 謂痰水結於胸膈之上又犯大寒使陽氣不行

令痰水結聚不散而陰氣逆上上與風痰相結上衝於

頭即令頭痛或數歲不已久之腦痛故云鬲痰頭痛若

手足寒至節即死

痰飲方

苓桂甘朮湯

金匱

心下有痰飲胸脇支滿目眩此方主

之短氣有微飲當從小便去之此主之腎氣丸亦主

欽定四庫全書

蘭臺軌範

之

茯苓

四兩

桂枝

白朮

各三兩

甘草

一兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便即利

甘遂半夏湯

金匱

病者脈伏其人欲自利利反快雖痢

心下續堅滿此為留飲欲去故也此湯主之

甘遂

大者三枚

半夏

十二枚

芍藥

五枚

甘草

如指大一枚炙一本無

右四味以水二升煮取半升去滓以蜜半升和藥汁

煎取八合頓服之

甘遂甘草同用下飲尤速





十棗湯

金匱

脈沉而弦者懸飲內痛此方主之 欬家

其脈弦為有水此主之 又支飲家欬煩胸中痛者

不卒死至一百日或一歲亦宜此湯

芫花

熬

甘遂

大戟

各等分

右三味搗篩以水一升五合先煮肥大棗十枚取八

合去滓內藥末強人服一錢七羸人服半錢平旦溫

服之不下者明日更加半錢得快之後糜粥自養

以此

散作湯法

欽定四庫全書

蘭臺軌範

小青龍湯

金匱

治心下有水氣乾嘔發熱或咳或痢少

腹滿而喘

麻黃

去節

芍藥

各三兩

五味子

半升

乾薑

甘草

炙

細辛

桂枝

去皮各三兩

半夏

半升湯洗

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥

煮取三升去滓溫服一升 若微痢者去麻黃加芫

花如雞子大熬令赤色 渴者去半夏加栝蒌根三

兩 噎者去麻黃加附子一枚泡 小便不利少腹



滿去麻黃加茯苓四兩 喘者去麻黃加杏仁半升  
去皮尖

木防己湯 金匱 膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色鰲

黑其脈沉緊得之數十日醫吐下之不愈此湯主之

虛者即愈實者三日復發復與不愈者宜此湯去石

膏加茯苓芒硝湯主之

木防己 三兩 石膏 十二枚 桂枝 二兩 人參 四兩

右四味以水六升煮取二升分溫再服

欽定四庫全書

蘭臺軌範

木防己去石膏加茯苓芒硝湯 金匱

即前方去石膏加茯苓 四兩 芒硝 三合

右五味以水六升先煮四味取二升去滓內芒硝再

微煎分溫再服微痢則愈

澤瀉湯 金匱 治心下有支飲其人苦冒眩

澤瀉 五兩 白朮 二兩

右二味以水二升煮取一升分溫再服 此亦從小便去之法也

小半夏湯 金匱 嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下



有支飲故也此湯主之

半夏 半升  
生薑 半斤

右二味以水七升煮取一升半分溫再服 此專嘔之方

小半夏加茯苓湯 治卒嘔吐心下痞膈間有水眩

悸者此湯主之

即前方加茯苓三兩 一法四兩煎法同 加茯苓而眩悸愈知茯苓治水之力

大矣

葶藶大棗瀉肺湯 金匱 治支飲不得息

欽定四庫全書

蘭臺軌範

葶藶 熬令黃色搗丸如彈子大 大棗 十二枚

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮取一升

頓服 不得息肺病也所以專治肺

桂苓五味甘草湯 金匱 欬逆倚息不得卧服小青龍已

多唾口燥寸脈沉尺脈微手足厥逆氣從小腹上冲

胸咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便

難時復冒者與此湯治其氣衝

茯苓 四兩 桂枝 四兩 甘草 炙三兩 五味子 半升



右四味以水八升煮取三升去滓分溫三服 <small>此方五味子不與乾薑同服因服小青龍之後發洩已甚而氣冲故專於欬肺也</small>	苓甘五味薑辛湯 <small>金匱</small> 衝氣即低而反更咳胸滿者用	桂苓五味甘草湯去桂加薑辛以治其咳滿	茯苓 四兩 甘草 乾薑 細辛 各三兩 五味 半升	右五味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三	苓甘五味薑辛半夏湯 <small>金匱</small> 欬滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑為熱藥也服之當遂渴而渴反	止者為支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水	茯苓 四兩 甘草 細辛 乾薑 各二兩 五味	半夏 各半升	右六味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三	苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯 <small>金匱</small> 水去嘔止其人形腫者加杏仁主之其証應內麻黃以其人遂痺故不內之若逆而內之者必厥所以然者以其人血虛麻
---	--	-------------------	--------------------------------------	---------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	--------	---------------------	--



黃發其陽故也

即前方加杏仁

半升去皮尖

煎服法同

苓甘五味加薑辛半夏杏仁大黃湯

金匱

若面熱如醉

此為胃熱上衝熏其面加大黃以痢之

即前方再加大黃

三兩

煎服法同

以上五方因症加減精義當細參

厚朴大黃湯

金匱

支飲胸滿者主之

厚朴

一尺

大黃

六兩

枳實

四枚

右三味以水五升煮取二升分溫再服

專治胸滿

欽定四庫全書

蘭臺軌範

痰飲頭痛往來寒熱方

千金翼

常山

一兩

雲母粉

二兩

右二味搗篩為散熱湯服方寸匕吐之止吐不盡更

服

赤石脂散

千金翼

痰飲吐水無時其源為冷飲過度脾胃

氣羸飲食入胃變冷水反吐不停

赤石脂

三升

右一味為散服方寸匕酒飲並可下漸加三七盡三



<p>斤終身不吐水又不利補五臟令人肥健有人患 飲諸藥不瘥服此一斤即愈</p> <p><small>本事方云此方試之神效</small></p>	<p>前胡丸 治心頭痰積宿水嘔逆不下食</p>	<p>前胡 白朮 甘草 <small>各五分</small> 麥冬 <small>去心</small> 旋復花</p>	<p>豆蔻 <small>各三分</small> 人參 <small>六分</small> 枳實 <small>炙</small> 大黃 <small>各四分</small></p>	<p>右九味為末蜜丸桐子大空腹酒下二十九丸漸加至</p>	<p>三十丸忌桃李魚蒜等物</p>	<p>范汪大甘遂丸 <small>外臺</small> 治留水从癖</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>芫花 <small>熬</small> 甘遂 葶藶 <small>熬</small> 大黃 苦參</p>	<p>大戟 芒硝 貝母 桂心 <small>各一兩</small> 杏仁 <small>三十枚</small></p>	<p>巴豆 <small>三十枚去皮心熬</small> 烏喙 <small>三分炮令拆</small></p>	<p>右十二味為末其巴豆杏仁搗如膏蜜丸如豆大服</p>	<p>二丸日三不知稍加以意將息之忌蘆笋猪肉生葱</p>	<p>礬石湯 <small>外臺</small> 治胸中痰癖頭痛不欲食及飲酒則阻痰</p>	<p>礬石 <small>一兩</small> 以水二升煮取一升內蜜半升頓服之須</p>	<p>至未吐飲少熱湯</p>
---	-------------------------	---	---	------------------------------	-------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	---	--	----------------



散	金匱	二陳湯	和劑	腎氣丸	青州白丸	六君	
大青龍湯	金匱見	傷寒	防己椒目葶藶大黃丸	金匱見	水腫	五苓	
去矣不可恃此過飲頻服取汗以損天年							
右為細末和勻每服三錢白湯調下但得微汗酒病							
白朮	各二錢	白豆蔻仁	葛花	砂仁	各五錢		
參	各一錢	猪苓	神麩	澤瀉	乾薑		
蓮花青皮	三分	木香	橘皮	白茯苓	人		
葛花解醒湯	東垣	治酒傷而成飲癖					
欽定四庫全書			蘭臺軌範				
丸如桐子大每服十九至十五丸生薑湯下食後臨							
卧服	此方製半夏之法頗妙治上膈之痰最宜						
右以半夏皂莢子為末與諸藥研勻生薑汁煮麵糊							
夏	湯洗七次用生薑一兩去皮同搗細作餅炙微黃色四兩						
辰砂	二兩	生白龍腦	半兩	皂莢子	炒黃色	白礬	光明者
器內熬汁		鈔白花	細研	天竺黃	一兩	金箔	二十片
盡冷研							
溢不利							
金珠化痰丸	局方	治胸膈煩悶涕唾稠黏痰實咳嗽咽					



<p>子湯 二賢散 <small>以上六方俱見通治</small> 小青龍加石膏湯 <small>見咳</small></p>	<p><small>痰飲之症十居三四患之者無不胃疼嘔逆乃普天</small></p>	<p>然 <small>下醫家無人能知之者人立一說治無一效言之慨</small></p>	<p>咳嗽 <small>附肺脹</small></p>	<p>靈素</p>	<p>靈樞玉版篇咳脫形身熱脈小以疾是逆也不過十五日而死矣 <small>脈小以疾訣死之法盡此四字</small></p>	<p>素問效論帝曰肺之令人咳何也岐伯曰五臟六腑皆</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>令人咳非獨肺也皮毛者肺之合也皮毛先受邪氣邪</p>	<p>氣以從其合也其寒飲食入胃從肺脈上至於肺則肺</p>	<p>寒肺寒則外內合邪因而客之則為肺咳五臟各以其</p>	<p>時受病非其時各傳以與之肺欬之狀咳而喘息有音</p>	<p>甚則唾血心欬之狀欬則心痛喉中介介如梗狀甚則</p>	<p>咽痛喉痺肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉轉</p>	<p>則兩胛下滿脾欬之狀欬則右胛下痛陰陰引肩背甚</p>	<p>則不可以動動則欬劇腎欬之狀欬則腰背相引而痛</p>
---	--	--	------------------------------	-----------	--	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------





甚則欬涎 五氣之以欬乃移於六腑脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長虫出肝欬不已則胆受之胆欬之狀欬嘔胆汁肺欬不已則大腸受之大腸欬狀咳而遺矢心欬不已則小腸受之小腸欬狀欬而失氣氣與欬俱失腎欬不已則膀胱受之膀胱欬狀欬而遺溺以欬不已則三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也 生氣通天論秋傷於濕上逆而咳 臟氣法時	欽定四庫全書	蘭臺軌範
論腎病者腹大脛腫喘欬身重 示從容論喘欬者是水氣并陽明也	金匱	
以欬數歲其脈弱者可治其脈虛者必苦冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家 上氣喘而噪者屬肺脹欲作風水發汗則愈	外臺	
十欬一曰風欬欲語因欬言不得終也二曰寒欬飲冷		



<p>食寒因之而欬也三曰支飲心下堅滿欬引四肢痛脈反遲也四曰肝欬欬而引脇下痛也五曰心欬欬而吐血引手少陰也六曰脾欬欬而涎出續續不止下引少腹也七曰肺欬欬引頸項吐涎沫也八曰腎欬耳聾無所聞引腰并臍中也九曰胆欬欬引頭痛口苦也十曰厥陰欬欬引舌本也</p>	<p>咳嗽方</p>	<p>射干麻黃湯 <small>金匱</small> 咳而上氣喉中作水雞聲此湯主之</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>射干 <small>十三枚一法三兩</small> 麻黃 生薑 <small>各四兩</small> 紫苑 欬冬</p>	<p>花 <small>各三兩</small> 五味子 <small>半升</small> 細辛 <small>三兩</small> 半夏 <small>八枚一法半升</small> 大棗 <small>七枚</small></p>	<p>右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫內諸藥取三升分溫三服</p>	<p>皂莢丸 <small>金匱</small> 欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠此方主</p>	<p>之</p>	<p>皂莢 <small>八兩刮去皮酥炙</small></p>
--	------------	---	------------------------	---	--	-------------------------------------	---	----------	----------------------------------



<p>右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三丸日三夜一服<small>稠痰粘肺不能清滌非此不可</small></p>	<p>厚朴麻黃湯 <small>金匱</small> 效而脈浮者此主之</p> <p>厚朴 <small>五兩</small> 麻黃 <small>四兩</small> 石膏 <small>如雞子大</small> 杏仁 半夏 <small>各半升</small></p>	<p>乾薑 細辛 <small>各二兩</small> 小麥 <small>一升</small> 五味子 <small>半升</small></p> <p>右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內諸藥煮取三升温服一升日三<small>脈浮風邪在表</small></p>	<p>澤漆湯 <small>金匱</small> 效而脈沉者此主之</p> <p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>半夏 <small>半升</small> 紫參 <small>五兩一作紫苑</small> 澤漆 <small>三斤以東流水五斗煮取一斗五升</small> 生薑</p> <p>白前 <small>各五兩</small> 甘草 黃芩 人參 桂枝</p>	<p>各三兩</p> <p>右九味呶咀內澤漆汁中煮取五升温服五合至夜盡<small>脈沉伏飲在裏</small></p>	<p>越婢加半夏湯 <small>金匱</small> 咳而上氣此為肺脹其人喘目如</p>	<p>脫狀脈浮大者主之</p>	<p>麻黃 <small>六兩</small> 石膏 <small>半斤</small> 生薑 <small>三兩</small> 大棗 <small>十五枚</small> 甘草 <small>二兩</small></p>
---	--	--	---	---	--	---	-----------------	--



<p>半夏 <small>半升</small></p>	<p>右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三</p>	<p>升分溫三服 <small>肺脹之喘最 多知者絕少</small></p>	<p>小青龍加石膏湯 <small>金匱</small> 肺脹咳而上氣煩躁而喘脈浮</p>	<p>者心下有水此主之</p>	<p>即小青龍加石膏二兩煎法同 <small>小青龍湯 方見痰飲</small></p>	<p>杏仁煎 <small>外臺</small> 主氣嗽</p>	<p>杏仁 <small>一斤去 皮尖</small> 糖 <small>一合疑 是飴糖</small> 酥 <small>一合</small> 生薑汁 <small>一合</small> 蜜 <small>五合</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>貝母 <small>八合另 研末</small> 蘇子 <small>一升水研 絞汁七合</small></p>	<p>右七味先搗杏仁如泥內後六味合煎如飴糖取如</p>	<p>棗大含嚥之日三但嗽發細細含之 <small>蘇子絞汁 始有力</small></p>	<p>十味丸 <small>外臺</small> 治以嗽有聲成肺癰者</p>	<p>麻黃 <small>去節</small> 白前 <small>各二 兩</small> 桑皮 <small>六兩</small> 射干 <small>四兩</small> 白薇 <small>三兩</small></p>	<p>百部 <small>五兩</small> 地黃 <small>六兩</small> 地骨皮 <small>五兩</small> 橘皮 <small>三兩</small></p>	<p>右為末蜜丸桐子大桑皮湯下十九日再服稍加至十五丸</p>
-----------------------------	-----------------------------	---	---	-----------------	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	---	---	--------------------------------



錢	阿膠 半一兩	馬兜鈴 焙	惡實 炒	甘草 一兩各	杏仁 七
補肺阿膠散	錢乙	止嗽生津			
右二味以棗二枚薑五片水煎服					
人參 一寸	胡桃 二枚不 去皮				
觀音應夢散	志夷堅	治老人虛嗽			
二合分四服	按此方治咳嗽有水聲身浮腫最妙				
右以水二斗煮魚得一斗二升去魚內藥煎取三升					
欽定四庫全書					
白前 兩各二	生薑 六兩	半夏 五兩	洗	鯉魚 五斤	
甘草 炙	厚朴 炙	麻黃 去節	茯苓	胡麻	
杏仁 蒸	貝母	桂枝 兩各三	橘皮	人參	
鯉魚湯	外臺	治上氣			
大煮三分減一以快痢為度					
右三味以水四升煮取一升去滓內葶藶子泥如棗					
葶藶 五合熬紫 色為泥	桑白皮	大棗 二十 枚			
療上氣方	外臺				



<p>右加糯米一合水煎服 <small>按此方治小兒天哮最效</small></p>	<p>清音丸 <small>統旨</small> 治咳嗽失音</p>	<p>桔梗 <small>兩</small> 訶子 <small>各一兩</small> 甘草 <small>五分</small> 礪砂 <small>三錢</small> 青黛 <small>三錢</small></p>	<p>冰片 <small>三分</small></p>	<p>右為末蜜丸龍眼大噲化一丸</p>	<p>葶藶丸 治肺氣咳嗽面目浮腫喘促不安小便赤</p>	<p>色</p>	<p>甜葶藶 <small>隔紙炒</small> 貝母 <small>煨黃色</small> 木通 <small>各一兩</small> 杏仁 防己 <small>各二</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>兩</p>	<p>右為末棗肉為丸桐子大桑白皮煎湯下五十丸</p>	<p>蘇子煎 治上氣咳嗽</p>	<p>蘇子 生薑汁 生地汁 白蜜 杏仁</p>	<p>各一升</p>	<p>右搗蘇子以地黄汁薑汁澆之以絹絞取汁更搗以</p>	<p>汁澆之絞令味盡去滓熬令杏仁微黃黑如脂又以</p>	<p>汁澆之絹絞往來六七度令味盡去滓內蜜合和置</p>
--	------------------------------------	---	-----------------------------	---------------------	-----------------------------	----------	---	-----------------------------------	----------	----------------------------	------------------	-------------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



瓦器中於湯上煎之令如飴每服方寸七日三夜一 此治 久嗽	蘇子降氣湯 <small>局方</small> 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰 涎壅盛胸膈噎塞并久年肺氣至效	蘇子 <small>各二錢半</small> 半夏 <small>各二錢半</small> 前胡 甘草 <small>炙</small> 厚朴	陳皮 <small>各八分</small> 當歸 <small>二錢</small> 沉香 <small>七分</small> 薑 <small>三片</small>	右水煎不拘時服若虛冷人加肉桂 <small>五分</small> 黃芪 <small>一錢</small>	治久嗽上氣心胸煩熱吐膿血方	欽定四庫全書 蘭臺軌範	蘇子 鹿角膠 <small>炒</small> 杏仁 <small>炒各三兩</small> 薑汁 <small>一合</small> 白蜜 <small>一</small>	蓋 生地汁 <small>一合</small>	右將前三味搗令熟入薑汁地黃汁蜜相和慢火熬	成膏磁器中密封之每服半匙許溫粥飲調下日三	四服 <small>此治寒嗽 諸病之中唯咳嗽之病因各殊而最難愈治之稍誤即貽害無窮余以此症考求四十餘年而後稍能措手故所載之方至詳至悉學者當於此潛心參究勿輕視也</small>	麥冬湯 <small>金匱見</small> 小青龍湯 葶藶大棗瀉肺湯	桂苓五味甘草湯 桂苓五味去桂加薑辛湯
----------------------------------	---	---	---	---	---------------	----------------	---	-------------------------	----------------------	----------------------	--	-------------------------------------	--------------------



又去桂加薑辛半夏湯	又去桂加薑半夏杏仁大黃湯	俱載痰 飲門 麻黃附子細辛湯	仲景方 見傷寒 烏梅丸	寶鑑見 虛勞 人參蛤蚧散	化痰丸	靈經脈篇肝所生病為狐疝	人少腹腫	欽定四庫全書	素骨空論任脈為病男子內結七疝督脈為病從少腹	上衝心而痛不得前後為衝疝	發熱寒其傳為頽疝	名心疝少腹當有形也	病源	七疝 七疝者厥疝癥疝寒疝氣疝盤疝附疝狼疝此	名七疝也厥逆心痛足寒諸飲食吐不下名曰厥疝也	腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂名曰癥疝也寒飲食	蘭臺軌範
-----------	--------------	-------------------	----------------	-----------------	-----	-------------	------	--------	-----------------------	--------------	----------	-----------	----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------





即脇下腹中盡痛名曰寒疝也腹中乍滿乍減而痛名曰氣疝也腹中痛在臍旁名曰盤疝也腹中臍下有積聚名曰附疝也小腹與陰相引而痛大便難名曰狼疝也凡七疝皆由血氣虛弱飲食寒濕不調理之所生

饑疝 陰氣在內寒氣客於足陽明手少陽之絡令食竟必饑心為之痛名曰饑疝

外臺

痛達背脊名尸疝 心下堅痛不可手迫名石疝 臍

欽定四庫全書

蘭臺軌範

下結痛女子月事不時名血疝 少腹脹滿引膀胱急

痛名脈疝 寒氣積於內上衝心如刀錐所刺四肢逆

冷或唇口變青名心疝 癩疝堅大如斗

諸疝惟癩疝最大而堅冲

起犯心即能殺人非硫黃不治

疝方

烏頭桂枝湯 金匱 治寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身

疼痛灸刺諸藥不能治者

烏頭 大者五枚熬去皮不必咬咀 以水二升煎減半去滓以桂枝



湯五合解之 <small>又一煎法</small> 令得一升後初服二合不知即服 三合又不知復加至五合其知者如醉狀得吐者為 中病
蜘蛛散 <small>金匱</small> 陰狐疝氣者偏有大小時時上下此方主 之
蜘蛛 <small>十四枚 熬焦</small> 桂枝 <small>半兩</small>
右為散取八分一七飲和服日再服蜜圓亦可 <small>俗名 偏墜</small>
大烏頭煎方 <small>金匱</small> 腹滿脈弦而緊弦則衛氣不行即惡
欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>
寒緊則不欲食邪正相搏即為寒疝遶臍痛苦發則 白津出手足厥冷其脈沉緊者此主之
烏頭 <small>大者五枚 熬 去皮不必咀</small> 水二升煮取一升去滓內蜜二升
煎令水氣盡 <small>又一煎法</small> 取二升強人服七合弱人服五合
不知明日更服不可一日再服 <small>沉寒入裏非大熱之藥不治</small>
洗陰腫核痛 <small>千金 翼</small> 治丈夫陰腫大如斗核中痛者
雄黃 <small>一兩 末</small> 礬石 <small>二兩 研</small> 甘草 <small>一尺 生</small>
右以水一斗煮二升洗之神良



多年服此藥永去病根	川練子丸 治疝氣及一切下部之疾腫痛縮小雖	藥 右為細末酒丸桐子大每服七十九酒鹽湯下 此 之 梗	胡索 <small>炒</small> 桂心 木香 <small>各一兩</small>	桃仁 <small>一兩</small> 製厚朴 木通 枳實 <small>各一兩</small> 延	橘核 <small>炒</small> 海藻 昆布 海帶 <small>各泡</small> 川練肉 <small>炒</small>	或癰腫癩爛	欽定四庫全書 蘭臺軌範	濟生橘核丸 治四種癩病卵核腫脹偏有大小或 堅硬如石痛引臍腹甚則膚囊腫脹成瘡時出黃水	疝氣他如荔枝核青鹽牽牛等俱可 加入不必因一二味之殊另名一方	右丸味為丸如桐子大或酒或薑湯下五十丸 此 方 通 治	蒸 附子 <small>泡</small> 檳榔 <small>各一兩</small> 不見火	各二兩以好酒二升葱白七根長 三四寸同煮軟去核取肉和丸 木香 訶子 <small>酒</small>	葫蘆巴 <small>四兩</small> 麝香 <small>一錢</small> 大戟 <small>半兩</small> 茴香 川棟子	麝香大戟丸 局 方 治陰癰腫脹或小腸氣痛
-----------	-------------------------	--	--	---	---	-------	----------------	---	----------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------



<p>川練子 <small>淨肉一斤分四處四兩用麵一合班貓四</small></p> <p>一合巴豆四十九粒同麸炒黃色去麸班貓不用四兩用麵一合巴戟一兩同麸炒黃色去麸巴戟不用四兩用鹽一兩茴香一合同</p> <p>炒黃色去鹽及茴香不用</p> <p>木香 <small>一兩不</small></p> <p>破故紙 <small>一兩</small></p> <p>炒香為度</p>	<p>右為末酒糊丸如桐子大每五十九鹽湯下甚者日</p> <p>進三兩服空心食前</p>	<p>硃砂圓 <small>本事</small> 有人貨疝氣藥日數千文有一國醫多金</p> <p>得之用之良驗</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭臺軌範</p>	<p>木香 沉香 巴豆肉 <small>各一兩</small> 青皮 <small>二兩</small> 銅青 <small>半兩</small></p> <p>研 硃砂 <small>一分</small></p>	<p>右上二香青皮三味細剉同巴豆慢火炒令紫色為</p> <p>度去巴豆為末入青砂二味研勻蒸餅和丸如桐子</p>	<p>大每服七丸至九丸鹽湯吞下二三服空心食前服</p> <p><small>按此方法既有理而用銅青更奇此等所謂海上方也</small></p>	<p>蟬脫散 治疔囊腫小兒坐地為蚓或蟻吹著</p>	<p>蟬脫 <small>半兩</small> 水一碗煎湯洗再溫再洗仍與五苓散加</p>
---	---	---	---------------------------	---	---	---	---------------------------	--



蘭臺軌範卷四								欽定四庫全書								<p>燈心煎服  <small>或用石  灰湯洗</small></p> <p>當歸生薑羊肉湯  <small>見通</small></p> <p>撞氣阿魏丸  <small>見嘔</small></p>
									蘭臺軌範							



欽定四庫全書

子部  
蘭臺軌範卷五

詳校官太醫院院使臣張肇基

洗馬臣王坦修覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣倪景寬



欽定四庫全書

蘭臺軌範卷五

吳江徐大椿撰

喘

素問

經脈別論夜行則喘出於腎淫氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘出於肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎與骨當是之時勇者氣行則已怯者則著

欽定四庫全書

蘭臺軌範

而為病也 陽明脈解篇陽明厥則喘而惋惋則惡人帝曰或喘而死或喘而生者何也岐伯曰厥逆連臟則死連經則生 脈要精微論肝脈搏堅而長因血在脇下令人喘逆 逆調論腎者水臟主津液主臥與喘也此句又為喘之總訣 生氣通天論因於暑汗煩則喘喝靜則多言陰陽別論陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆而起起則熏肺使人喘鳴 水熱穴論水病者下為跗腫大腹上為喘呼不得臥者標本俱病故肺為喘呼腎為水



腫肺為逆不得卧

金匱

上氣面浮腫肩息其脈浮大不治又加痢尤甚

喘方

麥冬湯

金匱

火逆上氣咽喉不利止逆下氣此主之

麥冬

七升

半夏 一升

人參

甘草

各二兩

粳米

三合

大棗

十二枚

右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜

欽定四庫全書

蘭臺軌範

一服

此即竹葉石膏湯去竹葉石膏加大棗也專清肺胃之火若火逆甚仍用竹葉石膏為妙

桂枝加厚朴杏子湯

傷寒論

喘家主之

於桂枝湯方內加厚朴

二兩

杏仁

五十個

餘依前法

麻黃杏仁甘草石膏湯

傷寒論

發汗後不可更行桂枝湯

汗出而喘無大熱者此湯主之

麻黃

四兩

杏仁

五十個

甘草

二兩

石膏

半斤碎

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥

煮取二升去滓溫服一升

即越婢湯加杏仁去蘆棗





<p>定喘湯 <small>方 振生</small> 治肺寒膈熱哮喘</p>	<p>麻黃 欵冬花 半夏 桑皮 <small>各三錢</small> 蘇子 <small>二</small></p>	<p><small>錢</small>杏仁 <small>一錢五分</small> 白果 <small>二十一枚碎炒</small> 黃芩 甘草 <small>各一錢</small></p>	<p>右以水煎徐徐服</p>	<p>皴肺丸 治喘</p>	<p>欵冬花 知母 秦艽 百部 <small>去心</small> 紫苑</p>	<p>貝母 阿膠 糯米 <small>炒各一兩</small> 杏仁 <small>另研四兩</small></p>	<p>右為末將羊肺一具先以水灌洗看容得水多少即</p>	<p>欵定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>更添些煮杏仁令沸濾過灌入肺中繫定以糯米泔</p>	<p>煮熟研爛成膏搜和前藥末杵數千下丸梧子大每</p>	<p>服五十九丸食前桑白皮煎湯下</p>	<p>清燥救肺湯 治臏鬱喘嘔</p>	<p>桑葉 <small>三錢經霜者</small> 石膏 <small>二錢半炒</small> 甘草 <small>一錢</small> 胡麻仁 <small>一錢炒研</small> 阿膠</p>	<p><small>八分</small>人參 <small>七分</small> 麥冬 <small>一錢二分</small> 杏仁 <small>七分尖炒</small> 枇杷葉 <small>一片</small></p>	<p><small>去毛</small>蜜炙</p>	<p>右九味以水一碗煎六分頻頻二三次滾熱服</p>
--	--	---	----------------	-------------------	--	--	-----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------------	---	--	----------------------------	---------------------------



<p>小青龍加石膏湯 越婢加半夏湯 <small>俱見咳嗽</small></p>	<p><small>按此二方為喘病之主方其餘衆方意不能外此即有他法必有別因當隨症增減也</small></p>	<p>麻黃湯<small>見傷寒</small> 資生腎氣丸 瀉白散<small>錢乙</small> 黑錫丸<small>俱見</small></p>	<p>治通</p>	<p><small>按黑錫丸鎮納元氣為治喘必備之藥當蓄在平時非一時所能驟合也</small></p>	<p>臑脹水腫</p>	<p>靈素</p>	<p>靈脹論黃帝問曰願聞脹之舍岐伯曰夫脹者皆在於</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>臟腑之外<small>四字總括明透</small>排臟腑而廓胸脇脹皮膚故命曰脹</p>	<p>帝曰未解其意岐伯曰夫胸腹臟腑之郭也膻中者心</p>	<p>主之宮城也胃者太倉也咽喉小腸者傳送也胃之五</p>	<p>竅者閭里門戶也廉泉玉英者津液之道也故五臟六</p>	<p>腑者各有畔界其病各有形狀營氣循脈衛氣逆為脈</p>	<p>脹衛氣並脈循分為膚脹 水脹篇黃帝問於岐伯曰</p>	<p>水與膚脹臑脹腸覃石瘦石水何以別之岐伯答曰水</p>	<p>始起也目窠上微腫如新卧起之狀其頸脈動時欬陰</p>
---	---	--	-----------	--	-------------	-----------	------------------------------	------------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>不行各有定理也至石水則在少腹之中水結不散之</p>	<p>惡氣所結故月事仍下石瘕乃胞中惡血所凝故月事</p>	<p>上至胃腕死不治<small>水為有形之物故按之即起膚脹為</small></p>	<p>腑病形篇督脈微大為石水起臍已下至小腹睡睡然</p>	<p>別論云陰陽結邪多陰少陽曰石水少腹腫 邪氣臟</p>	<p>如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下 陰陽</p>	<p>閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉衄則留止日以益大狀</p>	<p>石瘕何如岐伯曰石瘕生於胞中寒氣客於子門子門</p>	<p>以者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>蘭臺軌範</p>	<p>生其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀</p>	<p>相搏氣不得榮因有所繫癖而內著惡氣乃起瘕肉內</p>	<p>起此其候也腸覃何如岐伯曰寒氣客於腸外與衛氣</p>	<p>何如岐伯曰腹脹身皆大大與膚脹等也色蒼黃腹筋</p>	<p>盡腫皮厚按其腹實而不起腹色不變此其候也臑脹</p>	<p>伯曰膚脹者寒氣客於皮膚之間蹇蹇然不堅腹大身</p>	<p>而起如覆水之狀此其候也黃帝曰膚脹何以候之岐</p>	<p>股間寒足脛腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手</p>
------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------	-------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



症若臌脹則非氣非水臌臍皮  
肉俱堅腫邪盛正衰難為治矣

素腹中論黃帝問曰有病心腹滿旦食則不暮食此為  
何病岐伯對曰名為臌脹帝曰治之奈何岐伯曰治之  
以雞矢醴一劑知二劑已 水熱穴論黃帝問曰少陰  
何以主腎腎何以主水岐伯對曰腎者至陰也至陰者  
盛水也肺者太陰也少陰者冬脈也故其本在腎其末  
在肺皆聚水也 腎者胃之關也關門不利故聚水而  
從其類也故凡水病下為跗腫大腹上為喘呼不得卧  
欽定四庫全書  
蘭臺軌範

金匱

者標本俱病 氣厥論肺移寒於腎為涌水涌水者按  
腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之  
病也 陰陽應象大論濁氣在上則生臌脹

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其  
脈自浮外證骨節疼痛惡風皮水其脈亦浮外證跗腫  
按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗正水其脈  
沉遲外證自喘石水其脈自沉外證腹滿不喘黃汗其



脈沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿  
脈浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏風強為<sub>㖇</sub>疹  
身體為痒痒為泄風以為痲癩氣強則為水難以俛仰  
風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此為風水不  
惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此為黃汗 寸  
口脈沉滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水視人  
之目裹上微擁如蚕新卧起狀其頸脈動時時咳按其  
手足上陷而不起者風水 太陽病脈浮而緊法當骨

欽定四庫全書

蘭臺軌範

節疼痛反不疼身體反重而酸其人不渴汗出即愈此  
為風水惡寒者此為極虛發汗得之渴而不惡寒者此  
為皮水身腫而冷狀如周痺胸中窒不能食反聚痛暮  
躁不得眠此為黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此為肺  
脹其狀如腫發汗即愈然諸病此者渴而下利小便數  
者皆不可發汗 裏水者一身面目黃腫其脈沉小便  
不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也越  
婢加白朮湯主之 少陰脈緊而沉緊則為痛沉則為



水小便即難脈得諸沉當責有水身體腫重水病脈出者死 夫水病人目下有卧蚕面目鮮澤脈伏其人消渴病水腹大小便不利其脈沉絕者有水可下之 問曰病下痢後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也答曰此法當病水若小便自利及汗出者自當愈 心水者其身重而少氣不得卧煩而躁其人陰腫 肝水者其腹大不能自轉側脇下腹痛時時津液微生小便續通 肺水者其身腫小便難時時鴨澹 脾水者其腹大 欽定四庫全書 蘭臺軌範

四肢苦重津液不生但苦少氣小便難 腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈 師曰寸口脈沉而遲沉則為水遲則為寒寒水相搏跌陽脈伏水穀不化脾氣衰則驚澹胃氣衰則身腫少陽脈卑少陰脈細男子則小便不利婦人則經水不通經為血血不利則為水名血分 師曰寸口脈遲而濇遲則為寒濇為血不足跌陽脈微而遲微則



<p>為氣遲則為寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衛不利榮衛不利則腹滿脇鳴相逐氣轉膀胱榮衛俱勞陽氣不通即身冷陰氣不通即骨疼陽前通則惡寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺溺名曰氣分</p> <p><small>氣分非水病但此病無所附因血分而類及之也然金匱云氣分心下堅大如盤水飲所作則氣分似為水在氣中之病</small></p>	<p>病源</p>	<p>水分候 水分者言腎氣虛弱不能制水令水氣分散</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>蘭臺軌範</p>	<p>流布四肢故云水分但四肢皮膚虛腫聶聶而動者名水分也</p>	<p>燥水候 燥水謂水氣溢於皮膚因令腫滿以指畫肉</p>	<p>上則隱隱成文字者名曰燥水也</p>	<p><small>水腫之病千頭萬緒雖在形體而實內連臟腑不但難愈即愈最易復病復即更難再愈所以內經針水病之穴多至百外而調養亦須百日反若不若臟脹之症一愈可以不發治此症者非醫者能審定病症神而明之病者能隨時省察</small></p>	<p>臞脹水腫方</p>	<p><small>此卷載水腫之方最備但病情不同各有所宜當細辨之</small></p>
--	-----------	------------------------------	---------------	-------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------	---	--------------	--



雞矢醴方

素問

治心腹滿旦食不暮食

羯雞矢

八合研  
炒焦

無灰酒

三碗

右共煎乾至一半許用布濾取汁五更熱飲則腹鳴

辰巳時行二三次皆黑水也次日覺足面漸有縞紋

又飲一次則漸縞至膝上而病愈矣

防己茯苓湯

金匱

皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四

肢聶聶動者主之

防己

黃芪

桂枝

各三兩

甘草

二兩

茯苓

六兩

欽定四庫全書

蘭臺軌範

右五味以水六升煮取二升分溫三服

甘草麻黃湯

金匱

裏水主之

甘草

二兩

麻黃

四兩

右二味以水五升先煮麻黃去上沫內甘草煮取三

升溫服一升重覆汗出不汗再服慎風寒

麻黃附子湯

金匱

水之為病其脈沉小屬少陰浮者為

風無水虛脹者為氣水發其汗即已脈沉者宜麻黃

附子湯浮者宜杏子湯

金匱注云杏子湯未見恐是麻黃杏仁甘草石膏湯





右二味杵為散飲服方寸七日三服	蒲灰 <small>七分</small> 滑石 <small>三分</small>	蒲灰散 <small>金匱</small> 治小便不利	右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中臈即散	枳實 <small>七枚</small> 白朮 <small>二兩</small>	主之	枳朮湯 <small>金匱</small> 心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作此方	升分溫三服當汗出如蟲行皮中即愈	欽定四庫全書 蘭臺軌範	右七味以水七升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取二	細辛 <small>兩</small> 附子 <small>一枚</small>	桂枝 <small>兩</small> 生薑 <small>各三兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 大棗 <small>十二枚</small> 麻黃	如盤邊如旋杯水飲所作此方主之	桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯 <small>金匱</small> 氣分心下堅大	升半溫服八分日三服 <small>發汗為治水要訣此乃發腎水之汗也</small>	右三味以水七升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取二	麻黃 <small>三兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 附子 <small>一枚</small>
----------------	--	--------------------------------	----------------------	--	----	---	-----------------	----------------	----------------------	---	---	----------------	---	--	----------------------	--



<p>已椒蔞黃圓 <small>金匱</small> 腹滿口舌乾燥此腸間有水氣此主之</p>	<p>防己 椒目 葶藶 <small>熬</small> 大黃 <small>各一兩</small></p>	<p>右四味末之蜜丸如桐子大先食飲服一丸日三服稍增口中有津液渴者加芒硝半兩 <small>此治腸間之水外症不必有水</small></p>	<p>也 <small>象</small></p>	<p>牡蠣澤瀉散 <small>傷寒論</small> 大病差後從腰以下有水氣者主之</p>	<p>牡蠣 <small>熬</small> 澤瀉 栝蔞根 蜀漆 <small>洗去腥</small> 葶藶 <small>熬</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>商陸根 <small>熬</small> 海藻 <small>洗去鹹</small> 各等分</p>	<p>右七味異搗下篩為散更入白中治之白飲和服方寸匕小便利止後服日三</p>	<p>大腹水腫方 <small>千金</small> 治氣息不通命在旦夕者</p>	<p>牛黃 <small>二分</small> 椒目 <small>三分</small> 昆布 海藻 牽牛子</p>	<p>桂心 <small>各八分</small> 葶藶 <small>六分</small></p>	<p>右七味為末別搗葶藶如膏合和丸如桐子飲服十丸日二稍加小便利為度貞觀九年漢陽王患水醫</p>
--	--	---	---------------------------	--	---	-----------------------------------	---	---------------------------------------	---	--	---	---



所不治余處此方日夜尿一二斗五六日即瘥	麻豆湯 <small>千金</small> 治遍身腫小便澀者	麻黃 <small>二升</small> 烏豆 <small>一斗</small> 以水四斗 桑根白皮 <small>切五升</small>	右三味以豆汁內藥煮取六升一服一升日二服三	日令盡 <small>豆不多不 能取效</small>	十水丸 <small>千金</small>	第一之水先從面目腫遍一身名曰青水其根在肝	大戟主之	欽定四庫全書 蘭臺軌範	第二之水先從心腫名曰赤水其根在心葶藶主之	第三之水先從腹腫名曰黃水其根在脾甘遂主之	第四之水先從脚腫上氣而欬名曰白水其根在肺	藁本主之	第五之水先從足趺腫名曰黑水其根在腎連翹主	之	第六之水先從面至足腫名曰元水其根在胆芫花	主之
--------------------	--------------------------------	--	----------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------	------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	------	----------------------	---	----------------------	----



第七之水先從四肢起腹滿大身盡腫名曰風水其根在胃澤漆主之

第八之水先四肢小腫其腹獨大名曰石水其根在膀胱桑根白皮主之

第九之水先從小腸滿名曰暴水其根在小腸巴豆主之

第十之水乍盛乍虛乍來乍去名曰氣水其根在大腸赤小豆主之

欽定四庫全書

蘭臺軌範

右十病藥皆等分與病狀同者則倍之白蜜和先食服一丸如小豆日三欲下病者服三丸弱者當以意

節之十水之名病源亦詳載其狀今立此十方想當時本有此分別也姑存之

舟車神祐方河間治水腫水脹形氣俱實者

黑牽牛四兩 大黃二兩 酒浸 甘遂一兩 煨 橘紅 大戟

煨 芫花醋炒 青皮炒各一兩 木香五錢 檳榔五錢 輕粉

一錢

右為末水丸每服五分五更滾水下大便利三次為



<p>度若一二次不通利次日漸加至一錢若服後大便 利四五次或形氣不支則減其服三分二分俱可或 隔一二三日服一次以愈為度甚者忌鹽醬百日</p>	<p>大聖瀋川丸 <small>類方</small></p>	<p>大黃 牽牛 郁李仁 <small>各一兩</small> 木香 芒硝 <small>各三錢</small></p>	<p>錢 甘遂 <small>半錢</small></p>	<p>右為末蜜丸桐子大諒人虛實服之 <small>此下水峻劑</small></p>	<p>木香散 <small>類方</small> 治單腹脹</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>木香 青皮 白朮 薑黃 豆蔻 <small>各半兩</small></p>	<p>阿魏 華澄茄 <small>各一兩</small></p>	<p>右為末醋丸如豆大每服二十九薑湯送下</p>	<p>葶藶丸 <small>外臺</small> 治水腫及脚並虛腫</p>	<p>葶藶子 <small>半兩</small> 牽牛子 <small>半兩生熟各半</small> 澤漆葉 海藻 <small>洗去鹽炙</small></p>	<p>昆布 <small>如上炙</small> 桑根白皮 <small>炙</small> 甘遂 <small>熬</small> 椒目 郁李</p>	<p>仁 <small>各三分</small> 桂心 <small>一分</small></p>	<p>右為末蜜丸桐子大一服十五丸日再加至二十九</p>
--	--------------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	---	--	--	-----------------------------



水	浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急兼治皮水妊娠胎	五皮散 <small>局方</small> 治風濕客於脾經氣血凝滯以致面目虛	服 <small>此方治氣分亦宜</small>	右為粗末每服三錢水一盞半煎八分去滓食後溫	木香 丁香 沉香 乳香 藿香 <small>等分</small>	快心腹脹滿	治陰陽之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核中脘不	欽定四庫全書 蘭臺軌範	五香散 <small>局方</small> 升降諸氣宣利三焦疏導壅滯發散邪熱	右六味以水八升煮二升半分三服	桑白皮 茯苓 郁李仁 橘皮 海藻 <small>各四兩</small> <small>二兩</small>	赤小豆 <small>一升</small>	療患氣兼水身面腫垂死方 <small>外臺</small>	煎令可丸桐子大服五丸日三小便多為度 <small>又丸法</small>	香薷內釜中以水淹之出香薷上數寸煮濃汁去滓	療水病洪腫氣脹不消食方 <small>外臺</small>
---	----------------------	--	-----------------------------	----------------------	---	-------	----------------------	----------------	--	----------------	---	--------------------------	----------------------------------	---	----------------------	----------------------------------



調榮飲 治瘀血流滯血化為水四肢浮腫皮血赤	加至五十九丸空心人參湯送下量虛實加減之	右為末蜜丸如梧子大以麝香為衣每服二十五丸	錢各七 錢半	錢 葶蘆 郁李仁 沉香 陳皮 防己	錢 琥珀 杏仁 紫蘇 赤茯苓 澤瀉	沉香琥珀丸 治水腫一切急難症小便不通	右為末用醋調麵和覆貼腫處仍以軟綿裹住	欽定四庫全書 蘭臺軌範	大戟 芫花 甘遂 海藻	用此	敷藥 類方 治腹滿堅硬如石陰囊腫大先用甘草嚼後	治蠱脹方 方雜抄 五錢	大麥粉 五錢	右五味每三錢水煎熱服一方加白朮磨沉香木香	茯苓 等分	五加皮 地骨皮 生薑皮 大腹皮
-------------------------	---------------------	----------------------	-----------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------	----------------	----------------------	----	-------------------------------	-------------------	-----------	----------------------	----------	--------------------------



<p>紋名血分</p>	<p>蓬朮 川芎 當歸 元胡索 檳榔</p>	<p>陳皮 赤芍 桑皮<small>炒</small> 大腹皮 赤茯苓</p>	<p>苓 葶藶 瞿麥<small>各一錢</small> 大黃<small>一錢</small> 細辛 官</p>	<p>桂 甘草<small>炙各五分</small></p>	<p>右以薑棗水煎服<small>血分之病全匱有病無方此為至當</small></p>	<p>烏鯉魚湯<small>類方</small> 治水氣四肢浮腫</p>	<p>烏鯉魚 赤小豆 桑皮 白朮 陳皮</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>錢<small>各三</small> 葱白<small>五根</small></p>	<p>右以水三碗同煮不可入鹽先吃魚後服藥不拘時</p>	<p>小胃丹<small>丹溪</small></p>	<p>芫花<small>醋炒過一宿瓦器內不住手</small> 甘遂<small>麵裹長流水浸半月煮晒</small></p>	<p>乾<small>一兩</small> 大黃<small>紙裹煨勿令焦焙乾一兩半</small> 大戟<small>長流水煮</small></p>	<p>水<small>半</small> 晒 黃柏<small>三兩</small></p>	<p>右為末以白朮膏丸如蘿蔔子大臨卧津液吞下或白湯下取膈上濕痰熱積以意消息之欲痢空心服</p>
-------------	------------------------	---	---	--------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------	--------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	---	--	--	---





<p>一方加木香檳榔各半兩 <small>此即十棗湯加大黃黃柏</small></p>	<p>煨腎散 治腎家水腫</p>	<p>甘遂 <small>三錢</small> 獼猪腰子 <small>一個</small></p>	<p>右細批破少鹽椒淹透摻藥末上荷葉包裹煨燒熟</p>	<p>溫酒嚼服之</p>	<p>禹餘糧丸 治十種水氣脚膝腫上氣喘滿小便不利但是水氣悉皆治之許學士及丹溪皆云此治膨</p>	<p>脹之要藥 <small>即針砂丸又名蛇含石丸</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>蛇含石 <small>大者三兩以新鏡銚盛入炭火中燒石與銚子一般紅用鉗取蛇黃傾入醋中候冷研極</small></p>	<p><small>細末</small> 禹餘糧 <small>三兩</small> 真針砂 <small>五兩</small> <small>一處用水淘淨炒乾入銚</small></p>	<p><small>內煮醋乾為度後用銚并藥入炭火中</small> 以三物為主</p>	<p>燒紅鉗出傾藥淨磚地上候冷研細</p>	<p>其次量人虛實入下項 <small>治水多是取轉惟此三物既非大戟甘遂芫花之比又有</small></p>	<p><small>下項藥扶持故虛人老人亦可用</small> 羌活 木香 茯苓 川</p>	<p>芎 牛膝 桂心 白豆蔻 大茴香</p>	<p>蓬朮 附子 乾薑 青皮 三稜</p>	<p>白蒺藜 當歸 <small>各半兩酒浸一宿</small></p>
---	------------------	--	-----------------------------	--------------	---	---------------------------------------	-----------------------------------	--	--	---	-----------------------	--	--	------------------------	-----------------------	--------------------------------------



<p>右為末入前藥拌勻以湯浸蒸餅揆去水和藥再杵 為丸梧子大食前溫酒白湯任下三十丸至五十丸 最忌鹽一毫不可入口否則發疾愈甚但試服藥即 於小便內旋去不動臟腑病日三服兼以溫和調補</p>	<p>氣血藥助之真神方也 <small>此方兼治有形之積塊</small></p>	<p>越婢湯 <small>金匱</small> 越婢加朮湯 <small>方見風門</small> 五苓散 <small>見通</small> 甘草乾薑</p>	<p>茯苓白朮湯 <small>金匱即腎著湯見腰痛</small> 十棗湯 <small>見痰</small> 防己黃芪湯</p>	<p><small>金匱見濕門</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>肺痿 <small>附肺癰</small></p>	<p>金匱</p>	<p>問曰熱在上焦者因欬為肺痿肺痿之病從何得之師 曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難 又被快藥下痢重亡津液故得之曰寸口脈數其人嗽 口中反有濁唾涎沫者何師曰為肺痿之病若口中辟 辟燥欬即胸中隱隱痛脈反滑數此為肺癰欬唾膿血 脈數虛者為肺痿數實者為肺癰 問曰病欬逆脈之</p>
--	---	---	---	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------	--



<p>治肺冷之方非肺痿通用之方也不得誤用</p>	<p>右二味以水三升煮取一升五合去滓分溫再服 <small>此乃</small></p>	<p>甘草<small>四兩</small> 乾薑<small>二兩</small></p>	<p>渴者屬消渴</p>	<p>肺中冷必眩多涎唾甘草乾薑湯以溫之若服湯已</p>	<p>遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此為</p>	<p>甘草乾薑湯<small>金匱</small> 肺痿吐涎沫而不效者其人不渴必</p>	<p>肺痿方</p>	<p>欽定四庫全書  蘭臺軌範</p>	<p>上氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈</p>	<p><small>或未全耳</small> 上氣面浮腫肩息其脈浮大不治又加痢尤甚</p>	<p>如米粥始萌可救膿成則死<small>肺癰之疾膿成亦有愈者全在用藥變化漢時治法</small></p>	<p>唾濁沫時時振寒熱之所過血為之凝滯畜結癰膿吐</p>	<p>熱傷血脈風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多</p>	<p>寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛</p>	<p>寸口脈微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡</p>	<p>何以知此為肺癰常有膿血吐之則死其脈何類師曰</p>
--------------------------	--	--	--------------	-----------------------------	-----------------------------	--	------------	-----------------------------	--------------------------	---	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



<p>桂枝去芍藥加皂莢湯 <small>千金</small> 治肺痿吐涎沫</p>	<p>桂枝 <small>各三</small> 生薑 <small>兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 棗 <small>十五枚</small> 皂莢 <small>一枚去皮炙</small></p>	<p><small>焦</small> 右五味以水七升煮取三升分三服 <small>肺症生薑不可輕用</small></p>	<p>韋莖湯 <small>千金</small> 治欬有微熱煩滿胸中甲錯是為肺癰</p>	<p>韋莖 <small>二升</small> 薏苡仁 <small>半升</small> 桃仁 <small>五十枚</small> 瓜瓣 <small>半升</small></p>	<p>右四味以水一斗煮韋莖得五升去滓內諸藥煮取二升服一升再服當吐如膿 <small>此方最穩</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>桔梗白散 <small>外臺</small> 治欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭从从吐膿如米粥者為肺癰</p>	<p>桔梗 貝母 <small>各三分</small> 巴豆 <small>一分去皮熬令如脂</small></p>	<p>右三味為散強人飲服半錢七羸者減之病在上膈者吐膿血膈下者瀉出若下多不止飲冷水一杯則定</p>	<p>肺痿全屬內症肺癰乃係外科輕者煎藥可愈重者膿血已聚必得清火消毒提膿保肺等藥方能挽回否則不治所以金匱云始萌可救膿成則死也</p>
---	---	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	---



<p>甘草湯 <small>治肺痿 見傷寒</small> 炙甘草湯 <small>見通</small> 葶藶大棗瀉肺湯 <small>方見 痰飲</small></p>	<p>十味丸 <small>方見 咳嗽</small></p>	<p>諸血</p>	<p>靈素</p>	<p>靈玉版篇嘔血胸滿引背脈小而疾是逆也 衄而不</p>	<p>止脈大是逆也 熱病篇欬而衄汗不出出不至足者</p>	<p>死</p>	<p>血枯 素腹中論帝曰有病胸脇支滿者妨於食病至</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>蘭臺軌範</p>	<p>則先聞腥臊臭出清液先吐血四肢清目眩時時前後</p>	<p>血病名為何何以得之岐伯曰病名血枯此得之年少</p>	<p>時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事少不來</p>	<p>也</p>	<p>溺血 素氣厥論胞移熱於膀胱則癰溺血 痿論悲</p>	<p>衰大甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數</p>	<p>澀血</p>	<p>金匱</p>
---	-------------------------------------	-----------	-----------	------------------------------	------------------------------	----------	------------------------------	---------------	-------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------	------------------------------	------------------------------	-----------	-----------



夫吐血欬逆上氣其脈數而有熱不得卧者死 夫酒
客欬者必至吐血此因極飲過度所致也 師曰尺脈
浮目睛暈黃衄未止暈黃去目睛慧了知衄今止又曰
從春至夏衄者太陽從秋至冬衄者陽明 衄家不可
汗汗出必額上陷脈緊急直視不能眴不得眠 病人
面無血色無寒熱脈沉弦者衄浮弱手按之絕者下血
煩欬者必吐血 亡血不可發其表汗出即寒慄而振
瘀血 病人胸滿唇痿舌青口燥但欲漱水不欲咽無
欽定四庫全書
蘭臺軌範
寒熱脈微大來遲腹不滿其人言我滿為有瘀血 病
者如熱狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此為陰伏是
瘀血也當下之
病源
吐血有三種一曰內衄二曰肺疽三曰傷胃內衄者出
血如鼻衄但不從鼻孔出是近心肺間津出還流入胃
內出如豆汁或如衄血凝停胃裏因即滿悶便吐或去
數升乃至一斛是也肺疽者言飲酒之後毒滿便吐已



後有一合二合或半升一升是也傷胃者是飲食大飽之後胃內冷不能消化則便煩悶強嘔吐之所食之物與氣共上衝蹙因傷損胃口便吐血色鮮正赤是也 <small>此三</small>	<small>種皆是吐血</small> 凡吐血之後體恒惓惓然心裏煩躁悶亂	紛紛顛倒不安寸口脈微而弱血氣俱虛則吐血關上	脈微而芤亦吐血脈細沉者生喘咳上氣浮大者死以	不瘥面色黃黑無復血氣時寒時熱 <small>此三者乃吐血症若嗽血屬肺又是</small>	<small>一症多</small>	<small>難治</small>	欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	舌血 心臟有熱則舌上出血	九竅出血 榮衛大虛腑臟傷損血脈流散脈數不得	卧者死	汗血 肝藏血心之液為汗肝心俱傷於邪則汗血	外臺	便血 先血後便為遠血先便後血為近血	諸血方	血枯方 <small>素問</small>
--	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--	--------------------	-------------------	-------------------------------	--------------	-----------------------	-----	----------------------	----	-------------------	-----	-----------------------



右八味以水一鍾半煎七分食前服	大黃 <small>酒煨</small> 枳殼 <small>各一錢</small> 韭汁 <small>酒半盞</small>	當歸 <small>三錢</small> 白芍 <small>煨</small> 生地 <small>各一錢半</small> 紅花 桃仁 <small>炒</small>	燥	滋血潤腸湯 <small>統旨</small> 治血枯及死血在膈飲食不下大便	右三味以水三升煮取一升頓服之	大黃 <small>二兩</small> 黃連 黃芩 <small>各一兩</small>	瀉心湯 <small>金匱</small> 治心氣不足吐血衄血此湯主之	欽定四庫全書 蘭臺軌範	再服	右三味以水五升取馬通汁一升合煮取一升分溫	柏葉 <small>乾薑</small> <small>兩各三</small> 艾 <small>三把</small>	柏葉湯 <small>金匱</small> 治吐血不止	以四烏鯁骨一蔥茹二物并合之丸以雀卵大如小 豆以五丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也 <small>後飯</small> 先藥後飯也烏鯁即烏賊治女子赤白漏下令人有 子蔥茹即茜草能益精通經雀卵即麻雀卵補精血 治陰痿鮑魚即淡乾魚石 首為勝能通血脈益陰氣
----------------	--	--	---	---	----------------	---	--	----------------	----	----------------------	---	--------------------------------	---





四生丸 <small>類方</small> 治吐血衄血血熱妄行	犀角 大黃 <small>各一錢</small> 黃芩 <small>三錢</small> 黃連 <small>二錢</small> 生地 <small>四錢</small>	犀角地黃湯 主脈浮客脈芤相合血積胸中熱之 甚血在上焦此湯主之	犀角地黃湯 言滿者為無熱但依方二味不必加	者加大黃二兩黃芩三兩其人脈大來遲腹不滿自	言滿者為無熱但依方二味不必加	右四味咬咀以水九升煮取三升分三服喜妄如狂	欽定四庫全書 蘭臺軌範	犀角 <small>一兩</small> 生地黃 <small>八兩</small> 芍藥 <small>三兩</small> 丹皮 <small>二兩</small>	瘀血 蓄血者及鼻衄吐血不盡內餘瘀血大便黑面黃消	犀角地黃湯 <small>千金</small> 治傷寒及溫病應發汗而不汗之內	三即差 <small>用大黃極少不過 引生地地下達耳</small>	右二味煎地黃汁三沸內大黃末調和空腹服之日	地黃汁 <small>半斤</small> 大黃生末 <small>一方寸匕</small>	治吐血百治不瘥療十十差神驗不傳方 <small>千金</small>
---------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	---	----------------------------	---	---	----------------------	---	------------------------------------



<p>生荷葉 生艾葉 側柏葉 生地 <small>等分</small></p> <p>右搗爛丸如雞子大每服一丸水煎去滓服 <small>以丸煎湯亦一法</small></p>	<p>白芨枇杷丸 <small>戴氏</small> 治咯血</p>	<p>白芨 <small>一兩</small> 枇杷葉 <small>去毛</small> 藕節 <small>各五錢</small></p>	<p>右為細末另以阿膠五錢蛤粉炒用生地汁調之火上頓化入前藥為丸如龍眼大每服一丸 <small>此治肺血之方</small></p> <p><small>杷藕節只宜作湯為丸非法</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>皮膚血汗方 <small>聖濟</small></p>	<p>郁李仁 <small>去皮研一錢</small> 以鶯梨搗汁調下</p>	<p>汗血方 <small>經驗方</small></p>	<p>用人中白新瓦焙乾入麝香少許溫酒調服立效</p>	<p>諸竅出血方 <small>聖惠方</small></p>	<p>頭髮 敗稷 陳蓮蓬 <small>並燒灰等分</small></p>	<p>右三味每服三錢木香湯下</p>	<p>療舌上出血如孔鑽者 <small>千金</small></p>
---	------------------------------------	---	---	--------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------------------------------



煎香薷飲汁服	療舌血不止 <small>千金</small>	用槐花炒為末糝上 <small>蒲黃炭亦可糝</small>	紫霜丸 治舌上出血竅如針孔	紫金砂 <small>即露蜂房頂上實處研一兩</small> 蘆薈 <small>三錢</small> 貝母 <small>四錢</small>	右為細末蜜丸櫻桃大每服一九煎化服吐血衄血	用溫酒化服	療齒斷血出 <small>外臺</small>	欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	竹茹四兩醋浸一宿含之	療酒醉牙齒涌血 <small>外臺</small>	燒釘赤炷血孔中即止 <small>此烙法也</small>	雄黃麝香散 治牙斷腫爛出血	雄黃 血竭 白礬 <small>枯各一錢半</small> 麝香 <small>一字</small> 銅綠	輕粉 黃連 黃丹 <small>炒各一錢</small>	右共為末研勻敷患處	治牙縫出血 <small>類方</small>
--------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	---	----------------------	-------	----------------------------	-------------------------------	------------	------------------------------	----------------------------------	------------------	---	------------------------------	-----------	----------------------------



以紙緝子蘸乾蟾酥少許於血處按之立止	黃連散	治齒縫間出血吃食不得
黃連	白龍骨	牙硝
錢	各一	兩
	白礬	一分
	龍腦	一
右為細末每用少許敷牙根上		
療滿口齒血出		
枸杞子為末煎湯漱之然後吞下立止根亦可一		
方用子汁含滿口更後吃		
欽定四庫全書		
蘭臺軌範		
治牙宣方		
用棉花核煨灰擦		
療鼻瀝血三升氣欲絕方	千金	
龍骨末一棗核許微以氣吹入鼻中即斷更出者更		
吹之		
茅花湯	活人書	治鼻衄
茅花每服三錢煎服不拘時		
地黃散	元戎	治鼻衄以不愈



用亂髮燒灰入麝香少許每服一錢用米醋溫湯調	髮灰散 治血淋小便出血如尿	右為細末每服一錢用柏葉車前子煎湯下	海螵蛸 生乾地黄 赤茯苓 等分	神效方 治血淋	右為細末每服二錢入血餘燒灰二錢調服	膠 <small>炒</small> 滑石 黃芩 甘草 <small>炙各二錢</small>	茯苓 桑白皮 石韋 <small>去毛</small> 生乾地黄 阿	欽定四庫全書 蘭臺軌範	瞿麥穗 赤芍 車前子 白茅根 赤	瞿麥散 <small>奇效方</small> 治血淋尿血	龍骨末二方寸匕酒一升服之日三	療小便出血方 <small>外臺</small>	苧蔴根十枚水五升煮取二升服神驗	療淋血方 <small>外臺</small>	右等分焙乾為末蜜湯調下	生地 熟地 地骨皮 枸杞子
----------------------	---------------	-------------------	-----------------	---------	-------------------	---	------------------------------------	-------------	------------------	------------------------------	----------------	--------------------------	-----------------	------------------------	-------------	---------------



下	玉屑散 治尿血并五淋砂石疼痛不可忍受者
黃芪 人參 <small>等分</small>	右為末用蘿蔔大者切一指厚三指大四五片蜜奄 少時蘸蜜炙乾復蘸復炙盡蜜二兩為度勿令焦至
熟蘸黃芪人參末吃不以時仍以鹽湯送下 <small>製法</small>	鹿角膠丸 <small>濟生</small> 治房勞傷小便尿血
鹿角膠 <small>半兩</small> 沒藥 <small>另研</small> 油頭髮繩 <small>各三錢</small>	欽定四庫全書 蘭臺軌範
下	右為末茅根汁打麪糊丸桐子大每服五十丸鹽湯
黃土湯 <small>金匱</small> 治下血先便後血此近血也	甘草 乾地黄 白朮 附子 <small>泡</small> 阿膠
黃芩 <small>各三兩</small> 灶中黃土 <small>半斤</small>	右七味以水八升煮取三升分溫三服
赤小豆當歸散 <small>金匱</small> 治下血先血後便此遠血也	赤豆 <small>三升浸令芽出晒乾</small> 當歸 <small>三兩</small>



見三方俱傷寒	抵當湯	右搗和丸如梧子大每服五十九丸食前當歸湯下	又猪臟丸	猪臟	丸梧子大每服三五十丸食前米飲送下	良	右以黃連塞滿猪臟紮兩頭煮十分爛研細添糕糊	欽定四庫全書	先用海螵蛸炙黃去皮白者為末木賊草煎湯調下	猪臟丸	者日三	牛角鰓灰散	黃牛角鰓一具燒赤色為細末煮豉汁和二錢服重	右二味杵散漿水服方寸七日三服
大黃蠱蟲丸	抵當丸	食前當歸湯下	治痔漏下血	一條洗淨捏乾槐花	此方治婦人血崩亦		右以黃連塞滿猪臟紮兩頭煮十分爛研細添糕糊	蘭臺軌範	三日後效後用黃連二兩嫩猪臟二尺去肥	治大人小兒大便下血日以多食易饑腹不痛裏不急		外臺治卒下血	黃牛角鰓一具燒赤色為細末煮豉汁和二錢服重	右二味杵散漿水服方寸七日三服
百花煎	桃核承氣湯	治熱結膀胱小		炒為末填入臟內兩頭										
人參蛤蚧散														



三方俱  
見虛勞瓊玉膏

龍腦雞蘇丸

千金地黃湯

治亡血脫血鼻唇色白無力者方

以上四方俱見通治

噎膈嘔吐

附關格

靈素

靈結根篇太陰為開厥陰為闔少陰為樞故開折則倉

廩無所輸膈洞膈洞者取之太陰視有餘不足 上膈

篇黃帝曰氣為上膈者食飲入而還出余已知之矣蠱

為下膈

下膈名蠱似屬蠱為患當以治蠱之法治之

下膈者食晬時乃出余

欽定四庫全書

蘭臺軌範

未得其意願卒聞之岐伯曰喜怒不適食飲不節寒溫

不時則寒汁流於腸中流於腸中則蠱寒蠱寒則積聚

守於下管則腸胃充郭衛氣不營邪氣居之人食則蠱

上食蟲上食則下管虛下管虛則邪氣勝之積聚已留

留則癰成癰成則下管約其癰在管內者即而痛深其

癰在外者則癰外而痛浮癰上皮熱 五味篇苦走骨

多食之令人變嘔苦入於胃五穀之氣皆不能勝苦苦

入下脘三焦之道皆閉而不通故變嘔 四時氣篇善





嘔嘔有苦長太息心中憺憺恐人將捕之邪在胆逆在胃胆液泄則口苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔 經脈篇足太陰病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫足厥陰所生病者胸滿嘔逆

素陰陽別論一陽發病少氣善欬善泄其傳為膈 三

陽結謂之膈 至真要大論諸嘔吐皆屬於熱

關格 六節臟象論人迎一盛病在少陽二盛病在太

陽三盛病在陽明四盛以上為格陽寸口一盛病在厥

欽定四庫全書

蘭臺軌範

陰二盛病在少陰三盛病在太陰四盛以上為格陰人

迎與寸口俱盛四格以上為關格關格之脈羸不能極

於天地之精氣則死矣

此指關格之脈非病名也

### 金匱

嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈 先嘔却渴者此為

欲解先渴却嘔者為水停心下此屬飲家嘔家本渴今

反不渴者以心下有支飲故也 問曰病人脈數數為

熱當消穀引食而反嘔者何也師曰以發其汗令陽微



膈氣虛脈乃數數為客熱不能消穀胃中虛故也 跌  
陽脈浮而濇浮則為虛虛則傷脾脾傷則不磨朝食暮  
吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脈緊而濇其病難治  
病人欲吐者不可下之 嘔而脈弱小便復利身有  
微熱見厥者難治

傷寒論

脈上微頭小者則汗出下微本大者則為關格不通不  
得尿頭無汗可治有汗者死 寸口脈浮而大浮則虛

欽定四庫全書

蘭臺軌範

大為實在尺為關在寸為格關則不得小便格則吐逆  
跌陽脈伏而濇伏則吐逆水穀不化濇則食不得入

名曰關格 此乃關  
格之病

按關格之症內經傷寒論所指不同內經所云是不  
治之症傷寒論所云則卒暴之疾當於通便止嘔方  
法隨宜施  
治可也

千金

走哺 下焦熱氣逆不續嘔吐不禁

外臺



五噎 夫五噎謂一曰氣噎二曰憂噎三曰食噎四曰

勞噎五曰思噎雖有五名皆由陰陽不和三焦隔絕津

液不行憂恚嗔怒所生謂之五噎噎者噎塞不通也

氣噎 陰陽不和寒氣填於胸膈故氣噎不通令人喘

悸胸背痛也

卒食噎 由臟冷而不理津液少而不能傳行飲食也

噎膈嘔吐方

茱萸湯 金匱 嘔而胸滿者此湯主之 乾嘔吐涎沫頭

欽定四庫全書 蘭臺軌範

痛此亦主之

茱萸 一升 人參 三兩 生薑 六兩 大棗 十二枚

右四味以水五升煮取三升溫服七合日三服

生薑瀉心湯 傷寒論 治胃中不和心下痞鞭乾噎食臭脇

下有水氣腹中雷鳴下痢

生薑 四兩 甘草 炙 人參 黃芩 各三兩 半夏

乾薑 各一兩 大棗 十二枚

右七味以水一斗煮取六升去渣煎取三升溫服一



<p>升日三服 <small>生薑乾薑同用 取辛以開之</small></p>	<p>半夏瀉心湯 <small>金匱</small> 嘔而腸鳴心下痞者此湯主之</p>	<p>半夏 <small>半斤</small> 黃芩 <small>半斤</small> 乾薑 <small>半斤</small> 人參 <small>各三兩</small> 黃連 <small>一兩</small></p>	<p>大棗 <small>十二枚</small> 甘草 <small>三兩</small></p>	<p>右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服</p>	<p>一升日三服</p>	<p>黃芩加半夏生薑湯 <small>金匱</small> 乾嘔而痢者此湯主之</p>	<p>黃芩 <small>三兩</small> 甘草 <small>炙</small> 芍藥 <small>各二兩</small> 半夏 <small>半斤</small> 生薑 <small>三兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>大棗 <small>十二枚</small></p>	<p>右六味以水一斗煮取三升去渣溫服一升日再夜</p>	<p>一</p>	<p>猪苓散 <small>金匱</small> 嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思</p>	<p>水者此湯主之</p>	<p>猪苓 茯苓 白朮 <small>各等分</small></p>	<p>右三味杵為散飲服方寸七日三服 <small>傷飲惡飲此乃 常理若胸中有</small></p>	<p>水則津液下流反口乾 思水但不能多飲耳</p>
---	---	--	---	-----------------------------	--------------	---	---	------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------	---	---------------	------------------------------------	--	-------------------------------



<p>大半夏湯 <small>金匱</small> 反胃嘔吐者此湯主之</p> <p>半夏 <small>三升洗</small> 完用 人參 <small>三兩</small> 白蜜 <small>一升</small></p>	<p>右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮藥取二升半溫服一升餘分再服 <small>其妙在用 甘爛水</small></p>	<p>大黃甘草湯 <small>金匱</small> 食已即吐者此湯主之</p> <p>大黃 <small>四兩</small> 甘草 <small>一兩</small></p>	<p>右二味以水三升煮取一升分溫再服 <small>此治上焦之吐</small></p>	<p>茯苓澤瀉湯 <small>金匱</small> 胃反吐而渴欲飲水者此湯主之</p> <p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p> <p>茯苓 <small>半斤</small> 澤瀉 <small>四兩</small> 甘草 <small>三兩</small> 桂枝 <small>二兩</small> 白朮 <small>三兩</small></p>	<p>生薑 <small>四兩</small></p> <p>右六味以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取二升半</p>	<p>溫服八合日三服 <small>此治蓄飲之吐內澤瀉再煮似先煮五味後煮澤瀉</small></p>	<p>文蛤湯 <small>金匱</small> 吐後渴飲得水而貪飲者此湯主之兼主</p> <p>微風脈緊頭痛</p> <p>文蛤 <small>五兩</small> 麻黃 甘草 生薑 <small>各三兩</small> 石膏 <small>五兩</small></p>	<p>杏仁 <small>五十個</small> 大棗 <small>十二枚</small></p>
---	---	---	--	--	---	--	--	--



芍藥 二兩 桂枝 二兩 去皮 大棗 十二枚 半夏 半斤	葛根 四兩 麻黃 三兩 去黃 汁焙乾 生薑 三兩 甘草 二兩 炙	葛根加半夏湯 <small>傷寒論</small> 太陽陽明合病不下痢但嘔者主之	服之 <small>此治胃寒之吐</small>	右二味杵為散取方寸匕漿水一升半煎取七合頓	半夏 乾薑 各等分	半夏乾薑散 <small>金匱</small> 乾嘔吐逆吐涎沫此主之	欽定四庫全書 蘭臺軌範	煮半夏 小冷分四服日三夜一服止停後服 <small>此治寒飲之症內汁再煮似先</small>	右二味以水七升煮取二升內生薑汁煮取一升半	半夏 半斤 生薑汁 一斤	不噦心中憤憤然無奈者此湯主之	生薑半夏湯 <small>金匱</small> 病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦	劑煎 右七味以水六升煮取二升溫服一升汗出愈 <small>文蛤亦入</small>
---	--	--	-----------------------------	----------------------	-----------	--	----------------	--	----------------------	-----------------	----------------	--	---



<p>右八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去白沫內諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗</p>	<p>橘皮湯 <small>金匱</small> 乾嘔噦若手足厥者此湯主之</p>	<p>橘皮 <small>四兩</small> 生薑 <small>半斤</small></p> <p>右二味以水七升煮取三升溫服一升下咽即愈 <small>此治</small></p>	<p>橘皮竹茹湯 <small>金匱</small> 噦逆者此湯主之</p>	<p>橘皮 <small>二升</small> 竹茹 <small>二升</small> 大棗 <small>三十枚</small> 生薑 <small>半斤</small> 甘草 <small>五兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>人參 <small>一兩</small></p> <p>右六味以水一斗煮取三升溫服一升日三服</p>	<p>黃連湯 <small>傷寒論</small> 傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者主之</p>	<p>黃連 <small>二兩</small> 甘草 <small>炙</small> 乾薑 <small>二兩</small> 桂枝 <small>去皮各三兩</small> 人參 <small>二兩</small></p> <p>半夏 <small>半斤</small> 大棗 <small>十二枚</small></p> <p>右七味以水一斗煮取六升去渣溫服一升日三夜</p> <p>一服 <small>邪氣寒氣也故寒熱並用</small></p>
--	---	---	--	--	------------------------	---	--	---



昆布丸 治五噎咽塞食飲不下	昆布 <small>洗</small>	麥冬	天冬	訶梨勒	木通
大黃	朴硝 <small>各一兩</small>	郁李仁	桂心	百	
合 <small>各一兩</small>	羚羊角	杏仁	蘇子	射干 <small>各半兩</small>	
柴胡	陳皮	檳榔 <small>各二錢五分</small>			
右藥蜜丸桐子大熱酒下每服三十丸不拘時					
關格不通方 <small>千金翼</small>	芒硝	芍藥	杏仁 <small>各四兩</small>	枳實 <small>一兩</small>	大黃 <small>半斤</small>
欽定四庫全書			蘭臺軌範		
地黃 <small>二兩</small>					
右藥以水七升煮取三升分三服					
千金理諸噎方					
常食乾粳米飯即不噎					
又方 <small>奇方</small>					
炭末細羅丸如彈子大含少許細細咽津即下					
中風客熱噦方 <small>千金翼</small>					
竹茹 <small>四兩</small>	生米 <small>五合</small>				





右二味以水六升煮米熟服之

嘔噦方

千金翼

蘆根

五兩

以水五升煮取三升分三服兼服小兒尿

一二合良

消穀丸

千金翼

主數年不能飲食

小麥蘖

七月七日麴

各一升

乾薑

烏梅

各四兩

右四味搗篩為末煉蜜丸如桐子大空腹酒服十五

丸日再稍加至三十九其寒在胸中及反胃番心皆

欽定四庫全書

蘭臺軌範

差

卒噦

千金翼

男噦女人丁壯氣盛者噦其肺俞女子男子噦之

廣濟栝榔散

外臺

療吐酸水每食則變作醋水吐出

栝榔

十六分

人參

六分

茯苓

八分

橘皮

六分

華撥

六分

右五味搗篩為散平晨空腹生薑五六兩合皮擣絞

取汁溫內散方寸匕攪調頓服之日一服漸加至一

匕半

純薑汁服末藥斷難入口祇宜取薑汁一滴拌藥別飲送下為妥



<p>崔氏方 <small>外臺</small> 療食則吐或朝食夜吐名曰胃反或氣噎</p>	<p>不飲食數年羸削唯飲水亦同此方</p>	<p>半夏 <small>六兩</small> 人參 <small>六兩</small> 生薑 <small>一兩</small> 橘皮 <small>二兩</small> 牛涎 <small>一升</small></p>	<p>春杵頭糠 <small>一升</small> 綿裹厚朴 <small>二兩</small> 炙 羚羊角 <small>三兩</small> 割</p>	<p>右以水八升煮取三升分溫三服頻服</p>	<p>深師治噎方 <small>外臺</small></p>	<p>羚羊角 <small>兩</small> 前胡 甘草 人參 橘皮 <small>各二</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>右五味以水六升煮取三升分四服</p>	<p>反胃方 <small>本事方</small></p>	<p>驢水 <small>即驢小便</small> 日服二合後食微吐一半晡時又服二合</p>	<p>人定時食粥吐出便定</p>	<p>丁香柿蒂湯 <small>嚴氏</small> 治寒呃</p>	<p>丁香 柿蒂 <small>各二錢</small> 人參 <small>一錢</small> 生薑 <small>五片</small> 煎服</p>	<p>治冷呃方</p>	<p>刀頭子 <small>炙存性</small> 酒服錢許</p>
---	-----------------------	---	--	------------------------	--------------------------------	---	------------------------	-----------------------	-------------------------------	--	------------------	--	--	-------------	--



<p>撞氣阿魏丸 <small>局方</small>                  治五種噎疾九般心痛痞瘕氣塊冷</p>	<p>氣攻刺及脾胃停寒胸滿膨脹嘔吐酸水丈夫小腸</p>	<p>氣痛婦人氣血等疾</p>	<p>茴香 <small>炒香</small> 陳皮 <small>去白</small> 青皮 川芎 丁香皮</p>	<p>蓬莪朮 <small>泡</small> 甘草 <small>泡各</small> 縮砂仁 肉桂 <small>去粗皮</small></p>	<p>生薑 <small>四兩鹽</small> 白芷 <small>泡半</small> 胡椒 <small>二錢</small> 阿魏 <small>二錢半醋浸</small></p>	<p>丸                  右為末用阿魏丸雞頭大每藥丸一斤用硃砂七錢</p>	<p>欽定四庫全書                  蘭臺軌範</p>	<p>為衣丈夫氣痛炒鹽湯下一粒至二粒婦人血氣醋</p>	<p>湯下常服一粒爛嚼茶酒任下 <small>此方純用通氣溫熱之藥有火者不宜服</small></p>	<p><small>此卷所載方論種種各殊然皆係嘔吐反胃水飲蟲積等症非真膈病也膈病乃胃口枯槁之症百無一</small></p>	<p><small>治論中雖有格脈格症而其形象俱未詳載必臨症多乃能識其真耳</small></p>	<p>旋復代赭湯 四逆湯 小柴胡湯 <small>以上三方俱見傷寒</small></p>	<p>小半夏湯 <small>方見</small> 竹葉石膏湯 <small>加生薑見通治</small></p>	<p>泄瀉</p>	<p>靈素</p>
--	-----------------------------	-----------------	--	--	--	--	---	-----------------------------	---	--	---	---	---	-----------	-----------



靈論疾疹尺篇飧泄脈小者手足寒難已飧泄脈小手  
足溫泄易已 玉版篇其腹大脹四末清脫形泄甚逆  
也 諸病暴注下迫皆屬於熱  
素陰陽應象大論清氣在下則生飧泄 春傷於風夏  
生飧泄 濕勝則濡泄 脈要精微論久風為飧泄  
平人氣象論泄而脫血難治 玉機真臟論泄而脈大  
難治

難經

欽定四庫全書

蘭臺軌範

泄凡有五其名不同有胃泄有脾泄有大腸泄有小腸  
泄有大瘕泄名曰後重胃泄者飲食不化色黃脾泄者  
腹脹滿泄注食即嘔吐逆大腸泄者食已窘迫大便色  
白腸鳴切痛小腸泄者澀而便膿血少腹痛大瘕泄者  
裏急後重數至圜而不能便莖中痛此五泄之要法也

泄瀉方

溫脾湯

本亭方

主治錮冷在腸胃間泄瀉腹痛宜先取去

然後調治不可謂虛以養病也



固腸丸 <small>得效</small> 治臟腑滑泄晝夜無度	飲下	右為末陳米飯為丸如梧子大每服五十九丸空心米	嫩鹿茸 <small>酥炙</small> 肉豆蔻 <small>煨各</small> 生麝香 <small>另研</small> 一二盞泄作幾年矣	香茸丸 治飲酒多遂成酒泄骨立不能食但再飲	心米飲下	右為末生薑汁煮麵糊丸如梧子大每服七十九丸	欽定四庫全書 蘭臺軌範	黃 <small>炒</small> 龍骨 <small>生用</small> 白茯苓 華撥 <small>等分</small>	訶梨勒 <small>煨 麪裹</small> 附子 <small>泡</small> 肉豆蔻 <small>煨 麪裹</small> 木香 吳茱	不化	訶梨勒丸 <small>濟生</small> 治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛飲食	後人反是 千古之要訣	右六味咬咀取一兩水二鍾煎六分頓服 <small>不可謂虛以養病此</small>	厚朴 乾薑 甘草 桂心 附子 <small>各二</small>	大黃 <small>四錢</small>
---------------------------------------	----	-----------------------	---	-------------------------	------	----------------------	----------------	--	---	----	---	---------------	---	----------------------------------	----------------------



吳茱萸 御粟殼 黃連 <small>各等分</small>	右為末醋糊丸如桐子大每服三十丸空心米飲下	附子理中丸 <small>局方</small> 治脾胃冷弱心腹疼痛嘔吐瀉痢霍	亂轉筋體冷微汗手足厥冷心下逆冷滿悶腹中雷	鳴飲食不進及一切沉寒痼冷並皆治之	人參 <small>一兩</small> 附子 <small>泡一枚</small> 乾薑 <small>泡</small> 甘草 <small>炙各一兩</small> 白朮 <small>土炒二兩</small>	右為末蜜丸每藥一兩作十丸每服一丸以水一盞	化開煎至七分稍熱食前服	欽定四庫全書 蘭臺軌範	四君子湯 <small>局方</small> 六君子湯 歸脾湯 平胃散	補中益氣湯 枳實丸 <small>消痞積止泄瀉</small> 瀉黃散 五苓	散 四神丸 藿香正氣散 <small>局方</small> 四逆散 <small>上方見通治</small>	治少陰 泄瀉 大承氣湯 小承氣湯 調胃承氣湯	敗毒散 葛根湯 葛根黃芩黃連湯 <small>上方俱見</small>	傷寒 厚朴七物湯 <small>方見腹痛</small>	按泄瀉乃一時寒暖不調水穀不化或胃暑傷濕等 症當擇清澹消散之品一二劑即愈今所集方內多 脾胃虛寒以病之 方隨症酌用可也
-------------------------------------	----------------------	---	----------------------	------------------	--	----------------------	-------------	----------------	--	---	---	------------------------------------	---	---------------------------------	--





欽定四庫全書

子部  
蘭臺軌範卷六

詳校官太醫院院使臣張蔭基

洗馬臣王坦修覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣倪景寬





欽定四庫全書

蘭臺軌範卷六

吳江徐大椿撰

積聚癥痞

靈素

靈百病始生篇黃帝問於岐伯曰夫百病之始生也皆  
生於風雨寒暑清濕喜怒不節則傷臟風雨則傷  
上清濕則傷下三部之氣所傷異類願聞其會岐伯曰

欽定四庫全書

蘭臺軌範

三部之氣各不同或起於陰或起於陽請言其方喜怒  
不節則傷臟臟傷則病起於陰也清濕襲虛則病起於  
下風雨襲虛則病起於上是謂三部至於其淫泆不可  
勝數黃帝曰積之始生至其已成奈何岐伯曰積之  
始生得寒乃生四字乃成積之總訣厥乃成積也黃帝曰其成積  
奈何岐伯曰厥氣生足惋惋生脛寒脛寒則血氣凝滯  
血氣凝滯則寒氣上入於腸胃入於腸胃則膜脹膜脹  
則腸外之汁沫迫聚不得散日以成積卒然多飲食則



腸滿起居不節用力過度則絡脈傷陽絡傷則血外溢	血外溢則衄血陰絡傷則血內溢血乃溢則後血 <small>陽經為</small>	<small>之血宜涼後血為</small> 腸胃之絡傷則血溢於腸外腸外有	寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而積成矣 <small>凡積未</small>	<small>不因血</small> 卒然外中於寒若內傷於憂怒則氣上逆氣上	逆則六輸不通溫氣不行凝血蘊裏而不散津液滲	著而不去而積皆成矣 六元正紀大論大積大聚不	可犯也衰其大半而止過則死 骨空論任脈為病男	欽定四庫全書	蘭臺軌範	子內結七疝女子帶下瘦聚	息積 素奇病論帝曰病脇下滿氣逆二三歲不已是	為何病岐伯曰病名曰息積此不妨於食不可灸刺積	為導引服藥藥不能獨治也 <small>積最宜外治</small>	伏梁 靈邪氣臟腑病形篇心脈微緩為伏梁在心下	上下行時唾血 素腹中論帝曰人有身體髀股骭皆	腫環臍而痛是為何病岐伯曰病名伏梁此風根也其	氣溢於大腸而著於育育之原在臍下故環臍而痛也
-----------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



不可動之動之為水溺瀆之病

難經

病有積有聚何以別之然積者陰氣也聚者陽氣也故  
陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰  
聚故積者五臟所生聚者六腑所成也積者陰氣也其  
始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所  
窮處聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛  
無常處故以是別知積聚也 五臟之積各有名乎以

欽定四庫全書

蘭臺軌範

何月何日得之然肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯  
有頭足心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下脾  
之積名曰痞氣在胃脘腹大如盤肺之積名曰息貫在  
右脇下覆大如杯腎之積名曰賁豚發於少腹上至心  
下若豚狀或上或下無時

金匱

師曰病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病皆從  
驚發得之師曰奔豚病從少腹起上衝咽喉發作欲死



復還止皆從驚恐得之 夫瘦人繞臍痛必有風冷穀
氣不行而反下之其氣必衝不衝心下則痞 問曰病
有積有聚有滯氣何謂也師曰積者臟病也終不移聚
者腑病也發作有時展轉痛移為可治滯氣者脇下痛
按之則愈復發為滯氣 <small>積聚皆有形滯氣則無形而有氣耳</small> 病者腹滿按
之不痛為虛痛者為實可下之舌黃未下者下之黃自
去 腹滿時減復如故此為寒當與溫藥 脈緊如轉
索無常者有宿食也 薤不可共牛肉作羹食之成瘕
欽定四庫全書
蘭臺軌範
病非亦然 醋合酪食之令人血瘕
病源
瘕瘕 皆由寒溫不調飲食不化與臟氣相搏結所生
也其病不動者直名為瘕若病雖有結瘕而可推移者
名為瘕瘕瘕者假也謂虛假可動也
鼈瘕 謂腹內有瘕結如鼈之形狀有食鼈觸冷不消
生瘕者有食諸雜物得冷不消變化而作者
蟲瘕 人有多蟲而性好嚙之所嚙既多腑臟虛弱不



能消之變化生癥患者見蟲必嚙之不能禁止時從下部出亦能斃人

米癥 人有好啞米轉久彌嗜啞之若不得米則胸中清水出米不消化遂生癥結其人常思米不能飲食以則斃

腹內有人聲 有人腹內忽有人聲或學人語而相答此乃不幸致生災變非關經絡臟腑冷熱虛實所為也

服雷丸  
可愈

欽定四庫全書

蘭臺軌範

髮癥 有人因飲食內悞有頭髮隨食成癥胸喉間如有虫上下來去者是也

蛟龍病 三月八日蛟龍子生在芹菜上人食芹菜入腹變成蛟龍其病之狀發則如癩

魚癥 有人胃氣虛弱者食生魚因為冷氣所搏不能消之結成魚癥揣之有形狀如魚也

蛇癥 人有食蛇不消因腹内生蛇瘕也亦有蛇之精液誤入飲食內食之其狀常若饑而食則不下喉食至



胸內即吐出其病在腹摸揣亦有蛇狀謂蛇瘕也  
酒瘕 人有飲酒多而食穀少積久漸瘦遂常思酒不  
得則吐多睡不復能食是胃中有虫使之然名為酒瘕  
也

腹內有毛 人因飲食內誤有毛隨食入腹則漸漸羸  
瘦但此病不說別有證狀常自言因食毛以知之

積聚癥痞方

奔豚湯 金匱 奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱此主之

欽定四庫全書

蘭臺軌範

甘草 川芎 當歸 各二兩 半夏 四兩 黃芩 二兩

生葛 五兩 芍藥 二兩 生薑 四兩 甘李根白皮 一升

右九味以水二斗煮取五升溫服一升日三夜一服

茯苓桂枝甘草大棗湯 金匱 發汗後臍下悸者欲作貴

豚此湯主之

桂枝 四兩 茯苓 半斤 甘草 二兩 炙 大棗 十五枚

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮  
取三升去渣溫服一升日三服



<p>桂枝加桂湯 <small>金匱</small> 發汗後燒針令其汗針處被寒核起</p>	<p>而赤者必發黃豚 小腹上至心灸其核上各一</p>	<p>壯與此湯 <small>此灸法不循穴道亦甚易</small></p>	<p>即桂枝湯加桂二兩</p>	<p>備急丸 <small>金匱</small> 治寒氣冷食稽留胃中心腹滿痛大便不</p>	<p>通</p>	<p>大黃 乾薑 <small>各二兩</small> 巴豆 <small>一兩去皮研如脂</small></p>	<p>右先搗大黃乾薑為末內巴豆合搗千杵和蜜丸如</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>豆大藏蜜器中勿洩氣候用每服三四丸煖水或酒</p>	<p>下</p>	<p>又主中惡心腹脹滿卒痛如錐刺氣急口噤如卒死</p>	<p>者捧頭起灌令下咽須臾當差不差更與三丸當腹</p>	<p>中鳴即吐利便差若口噤者須化從鼻孔用葦管吹</p>	<p>入自下於咽 <small>此溫下之法 口噤不能服藥者亦是一法</small></p>	<p>貪食食多不消心腹堅滿痛治之方 <small>千金</small></p>	<p>鹽 一升 水 三升</p>
---	----------------------------	---------------------------------------	-----------------	---	----------	---	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	---	------------------



<p>右二味煮令鹽消分三服當吐出食便差</p>	<p>蛟龍病方 <small>全匱</small> 治春秋二時龍精帶入芹菜中人偶食</p>	<p>之為病發時手背腹滿痛不可忍</p>	<p>硬糖 <small>二三升</small> 日兩度服之吐出如蜥蜴三五枚差</p>	<p>療犬肉傷 <small>全匱</small> 治食犬肉不消心下堅或腹脹口乾大</p>	<p>渴心急發熱妄語如狂或洞下</p>	<p>杏仁 <small>一升合皮熟研用</small> 沸湯三升和汁分三服痢下肉片大</p>	<p>驗</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>療食鱠傷 <small>全匱</small> 治鱠食之在心胸間不化吐復不出速</p>	<p>下除之以成癥病</p>	<p>橘皮 <small>一兩</small> 大黃 <small>二兩</small> 朴硝 <small>二兩</small></p>	<p>右三味以水一大升煮至小升頓服即消</p>	<p>療鱠癥 <small>全匱</small> 治食鱠多不消結為癥病</p>	<p>馬鞭草搗汁飲之或以薑葉汁飲之一升亦消又可</p>	<p>服藥吐之</p>	<p>療蟲癥 <small>千金</small> 由啣蟲在腹生長為蟲癥 <small>按此病發服水銀</small></p>
-------------------------	---	----------------------	---	---	---------------------	---	----------	-----------------------------------	---	----------------	---	-------------------------	---	-----------------------------	-------------	--





故篋子 一枚  
故梳子 一枚

右二味各破為兩分先取一分燒灰末之又取一分以水五升煮取一升頓服前末盡少時當病出無所忌

療十年痲癬方 千金翼

桃仁 去皮尖雙仁煮熬 豉 乾泡去皮熬 蜀椒 去目閉口者生搗篩三升乾

薑 搗篩三升

右四味先搗桃仁如膏合搗千杵如乾可入少蜜和

欽定四庫全書

蘭臺軌範

搗令可丸如酸棗大空腹酒服三九日三仍熨法

椒熨方 千金翼

取新盆一口受一斗者鑽底上作三十餘孔孔上布椒三合椒上布鹽鹽上安紙兩重上布冷灰一升冷灰上安熱灰一升熱灰上安熱炭火如雞子大常令盆熱底安薄氈其口以板蓋上以手捉勿令落仰卧安於腹上逐病上及痛處自捉遣移熨之冷氣及癥結皆從下部中作氣出七日一易椒鹽滿三七日百



病差乃止	破癖湯 <small>千金翼</small>	白朮 <small>炙</small> 枳實 <small>炙</small> 柴胡 <small>各三兩</small>	右以水五升煮取二升分三服日三	備急熨癥方 <small>千金翼</small>	吳茱萸 <small>三升</small> 以酒和煮熱布裹熨之	廣濟療蠶癥 <small>外臺</small>	白馬尿 <small>一升五合</small> 溫服之令盡差	廣濟療米癥 <small>外臺</small> 其疾常欲食米若不得米則胸中出	清水	雞屎 <small>一升</small> 白米 <small>五合</small> 搗散用水一升頓服	療米癥羸瘦至死 <small>外臺</small>	葱白 <small>兩虎口切</small> 烏梅 <small>三十枚碎</small>	右二味以水三升宿漬烏梅使得極濃清晨噉葱白	隨飲烏梅汁盡頃之心腹煩欲吐即令出之三晨療	之當吐 Outcome 米癥差無所忌
------	------------------------	---	----------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------	--	----	--	---------------------------	---	----------------------	----------------------	--------------------



廣濟療髮癥 <small>外臺</small> 人因食誤食髮即胸間如有虫上下 惟欲飲油	油 <small>一升</small> 以香澤煎之大 <small>口</small> 鑄貯之安病人頭邊以口 鼻臨油上勿令得飲及傳之鼻面令有香氣當叫喚 取飲不得與之必疲極眠睡其髮當從口出飲油人 專守視之并石灰一裹見癥出以灰粉手捉癥抽出 須臾抽盡即是髮也 <small>奇法</small>	積塊丸 治癥瘕積聚癖塊蠱積	欽定四庫全書 蘭臺軌範	京三稜 <small>各用</small> 莪朮 <small>醋煨</small> 自然銅 <small>各燒研</small> 蛇含石 <small>各二兩</small>	雄黃 <small>各一錢</small> 蜈蚣 <small>焙研</small> 木香 <small>半錢</small> 鍊花粉 <small>用粳米醋炒一</small>	辰砂 <small>各八分</small> 沉香 <small>各八分</small> 冰片 <small>五分</small> 蘆薈	天竺黃	阿魏 <small>焙乾各</small> 全蝎 <small>四錢</small>	右為末用雄猪胆汁丸如桐子大每服七八分 <small>諸虫皆效</small>	治食索粉積方 用紫蘇煎濃汁加杏仁泥服之即散	易簡紅丸 破癥消瘕
---	---	------------------	----------------	---	--	--	-----	---	--	--------------------------	--------------



<p>蓬朮 三稜 橘皮 青皮 胡椒</p> <p>乾薑 阿魏 礬紅</p> <p>右水泛為丸每服六十九丸薑湯下又小兒脾胃之症極有神效</p>	<p>大七氣湯 治一切癥瘕</p>	<p>三稜 莪朮 <small>各煨切</small> 青皮 陳皮 <small>去白</small> 木香</p>	<p>藿香 肉桂 益智仁 甘草 <small>各七錢五分</small></p> <p>右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞食前服</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p> <p>半硫圓丸 <small>局方</small> 除積冷溫脾胃一切瘕癖大便冷閉</p>	<p>硫黃 <small>明淨好者研令極細用柳木鏈子研過</small> 半夏 <small>湯洗七次焙乾為末</small></p> <p>右等分以生薑自然汁同熬入乾蒸餅末攪和勻入</p>	<p>白內杵數百下圓如桐子大每服空心溫酒或生薑湯下十五丸至二十九丸婦人醋湯下</p>	<p>髮癥飲油方 <small>夏子奇疾方</small></p> <p>雄黃 <small>半兩</small></p> <p>右為末水調服之虫自出</p>
--	-------------------	--	---	---	---	--	---



食髮成癆方

猪脂 二升  
酒 三升

右以水煮三沸温服日三

酒鼈氣鼈血鼈方

直指方

治平時嗜酒血入於酒為酒鼈

任氣血凝於氣為氣鼈虛勞痼冷敗血襍痰為血鼈

或附脇背或隱腸腹須急治之

生硫黃末以老酒調下時時服之

此味人多畏之不敢輕服其實性甚

和緩目觀有人服數斤全無所害惟肌膚色黃而已

欽定四庫全書

蘭臺軌範

蛇癥方

千金翼

白馬尾切細酒服初服五分一七次服三分一七更

服二分一七不可頓服殺人

蛟龍病方

唐明皇襟錄云有黃門奉使交廣回太醫周顧曰此

人腹中有蛟龍上驚問對曰臣馳馬大庾嶺熱困且

渴遂飲澗水竟腹中堅痞如石周遂以石硝雄黃煮

服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲皆具此疾



遂愈	蛇瘕 <small>危氏方</small> 治面光發熱如火灸	蒜汁一盃飲之吐出如蛇即愈	腹內蛇瘕方 <small>易簡</small>	誤食菜中蛇精成蛇瘕或食蛇肉成瘕腹中常饑食物即吐以赤足蜈蚣一條炙研末酒服	血瘕方 <small>甄氏</small>	鼈甲 大黃 琥珀 <small>等分</small>	欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	右三味作散酒服二錢少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服也	虱瘕 喜食血	用極舊木梳煨灰服	婦人狐瘕方 <small>外臺</small> 因月水來或悲或驚或逢疾風暴雨被濕致成狐瘕精神恍惚令人月水不通胸脇腰背痛引陰中小便難嗜食欲吐如有孕狀其瘕手足成形者殺人未成者可治
----	--------------------------------------	--------------	----------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------	----------	---



<p>用新鼠一枚以新絮裹之黃泥固住入地坑中桑薪燒其上一日夜取出去絮入桂心末六銖為末酒服方寸匕不過一二服當自下</p>	<p>瓜蒂散 <small>金匱</small> 大承氣湯 小承氣湯 調胃承氣</p>	<p>湯 <small>以上四方俱見傷寒</small> 保和丸 <small>丹溪</small> 枳朮丸 <small>潔古</small> 皂礬平胃散</p>	<p>感應丸 <small>上方見通治</small> 阿魏撞氣丸 <small>方見</small> 蛇含石丸 <small>即禹餘糧丸見</small></p>	<p>脹 附 狐惑</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>靈樞 上膈篇虫為下膈 <small>其詳備載 膈症門</small></p>	<p>虫瘕蛟蛭 厥病篇腸中有虫瘕及蛟蛭皆不可取以小針心腸痛懷作痛腫聚往來上下行痛有休止腹熱喜渴涎出者是蛟蛭也以手聚按而堅持之無令得移以大針刺之以持之虫不動乃出針也</p>	<p>金匱</p>	<p>虻虫之為病令人吐涎心痛發作有時毒藥不止 虻</p>
--	---	--	--	---------------	--------------------	---	---	-----------	------------------------------



厥者當吐虵令病者靜而復時煩此為臟寒虵上入膈  
故煩須臾復止得食而嘔又煩者虵聞食臭出其人當  
自吐虵狐感之為病狀如傷寒默默欲眠目不得閉卧  
起不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐不欲飲食惡聞食臭  
其面目乍赤乍黑乍白

此皆傷寒餘毒所  
結濕熱生虫也

### 病源

九虫者一曰伏虫長四分二曰虵虫長一尺三曰白虫  
長一寸四曰肉虫狀如爛杏五曰肺虫狀如蚕六曰胃

欽定四庫全書

蘭臺軌範

虫狀如蝦蟆七曰弱虫狀如瓜瓣八曰赤虫狀如生肉  
九曰蟯虫至細微形如菜虫伏虫羣虫之主也虵虫貫  
心則殺人白虫相生子孫轉大長至四五尺亦能殺人  
肉虫令人煩滿肺虫令人咳嗽胃虫令人嘔逆吐喜噦弱  
虫又名膈虫令人多唾赤虫令人腸鳴蟯虫居脘腸多  
則為痔極則為癩因人瘡處以生諸癰疽癩癢病疥齧  
虫無所不為人亦不必盡有有亦不必盡多或偏無者  
此諸虫依腸胃之間若腑臟氣實則不為害若虛則能





<p>侵蝕隨其虫之動而能變成諸患也 凡蠱毒有數種          皆是變感之氣人有故造作之多取虫蛇之類以器皿          盛貯任其自相噉擊惟有一物獨在者即為之蠱便能          變感隨逐酒食為人患禍患禍於他則蠱主吉利所以          不羈之徒畜事之</p> <p>齒 是虫食齒至斷膿爛汁臭如屯之收故謂之慝</p>	<p>虫方</p>	<p>欽定四庫全書  <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>甘草粉蜜湯 <small>金匱</small>          蚘虫之為病令人吐涎心痛發作有          時毒藥不止此湯主之</p>	<p>甘草 <small>二兩</small>          粉 <small>一兩</small>          蜜 <small>四兩</small></p>	<p>右以水三升煮甘草取二升去滓內粉蜜攪令和煎          如薄粥溫服一升差即止</p>	<p>烏梅丸 治病者靜而時煩因臟寒蚘上入其膈為</p>	<p>蚘厥當吐蚘</p>	<p>烏梅 <small>三百</small>          黃連 <small>一斤</small>          黃檗 <small>六兩</small>          乾薑 <small>十兩</small>          附子 <small>六枚</small>  <small>泡</small></p>
--	-----------	--	---	---	---	-----------------------------	--------------	---



<p>蜀椒 <small>四兩 蒸</small>  <small>去汗</small> 桂枝 <small>六兩</small>  <small>兩</small> 細辛 <small>六兩</small>  人參 <small>六兩</small>  當歸 <small>四</small></p>	<p>右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸</p>	<p>之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得內白中與蜜</p>	<p>杵二千下丸如梧桐子大先食飲服十九日三服稍</p>	<p>加至二十九丸禁生冷滑物臭食等</p>	<p>療虺虫攻心腹痛 <small>千金</small></p>	<p>用石榴根搗取汁平旦服亦可水煎</p>	<p>欽定四庫全書  <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>療虫蝕下部 <small>千金</small></p>	<p>胡粉 雄黃</p>	<p>右二味各等分為末著穀道中亦治小兒</p>	<p>療傷寒慙病 <small>千金</small></p>	<p>取生雞子小頭叩出白入漆一合熟和攪令極調當  沫出更內著殼中仰吞之食頃或半日乃吐下虫劇  者再服虫盡熱除病愈</p>	<p>追虫丸 <small>八陸</small>  治一切虫積</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	--	--------------------------------	--------------	-------------------------	--------------------------------	--	---



<p>黑牽牛 <small>取頭末</small> 檳榔 <small>各八兩</small> 雷丸 <small>醋炙</small> 南木香 <small>各二兩</small> 茵</p>	<p>陳 <small>二兩</small> 大皂角 苦楝皮 <small>各一兩</small></p>	<p>右煎濃汁水為丸菘豆大大人每服四錢小兒三錢</p>	<p>或二錢或一錢半量人虛實用砂糖水吞下待追去</p>	<p>惡毒虫積二三次方以粥補之 <small>按濃煎汁水為丸原本如此必有誤字竟</small></p>	<p><small>將水泛丸可也</small></p>	<p>下虫丸 追虫取積</p>	<p>苦楝皮 <small>根皮為上樹面次之去面上粗皮</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>右為末麵糊丸彈子大如欲服藥宜戒午飯晡時預</p>	<p>食油煎雞卵餅一二個待上床時白滾湯化下一丸</p>	<p>至五更取下異虫為效</p>	<p>療寸白虫</p>	<p>榧子 檳榔 蕪荑 <small>各等分</small> 為末每二錢温酒調</p>	<p>服先吃燒牛肉脯後服食水瀉永除</p>	<p>又方</p>	<p>榧子 <small>四十九粒去皮</small> 以月上旬平旦空心服七枚日服盡虫</p>
---	---	-----------------------------	-----------------------------	---	------------------------------	-----------------	---	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------	-------------	---	-----------------------	-----------	---



<p>石榴皮 <small>東引者一握去瘡皮</small> 檳榔 <small>七枚</small></p>	<p>療百虫方 <small>外臺</small></p>	<p>右十味搗篩蜜丸以飲及酒空腹服二七丸日再服</p>	<p>枝 熬</p>	<p>蕪荑 青箱子 乾漆 <small>熬各四分</small> 亂髮 <small>如雞子燒</small> 殭蚕 <small>十二</small></p>	<p>雷丸 <small>熬</small> 橘皮 桃仁 <small>各五分</small> 狼牙 <small>六分</small> 貫衆 <small>三枚</small></p>	<p>則死</p>	<p>療蛔虫 病由勞熱傷心有虫名蛔虫長一尺貫心</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>右四味呔咀以水一斗煮取三升為三服日三</p>	<p>黃連 生薑 <small>切各十兩</small> 艾葉 <small>八兩</small> 苦參 <small>四兩</small></p>	<p>如此者為虫下食其肛肛爛盡見五臟即死矣</p>	<p>診齒無色舌上盡白甚者滿口有瘡四肢沉重喜眠</p>	<p>慝不甚洩痢而下部瘡癢不問燥濕以則殺人為病</p>	<p>熱結在腹中或遇暑濕涼氣者多生此病病亦有燥</p>	<p>療濕慝虫 <small>千金翼</small> 此症多是熱病後或以下不止或有客</p>	<p>消成水永瘥 又云食實七枚七日滿虫化為水</p>
---	-------------------------------	-----------------------------	------------	--	---	-----------	-----------------------------	--------------------	---------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	----------------------------



<p>右以水二升煎減半頓服欲服時先嚼鹿脯咽汁即進之每月一二三日吃藥必瘥以虫頭向上月三五以後不效以虫頭向下也服藥前一日莫食其虫吃藥之後或痢出或內消皆瘥忌食生膾白酒諸冷物一月餘</p>	<p>鶴虱散 <small>外臺</small> 療蛔虫心痛</p>	<p>鶴虱二分末温酢一盞和服之虫當出</p>	<p>胡粉丸 <small>外臺</small> 療心痛不可忍似蛔虫者</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>生胡麻 <small>一合</small> 胡粉 <small>半合</small> 熬搗</p>	<p>右二味先以猪肉脯一斤空腹啖咽汁勿咽肉後取</p>	<p>胡粉和胡麻搜作丸以少清酒使成頓服盡十歲以</p>	<p>上增減忌生冷猪血魚雞蒜醋等七日若是蛔虫吐</p>	<p>水者是也</p>	<p>甘草瀉心湯 <small>金匱</small> 治狐惑之為病狀如傷寒默默欲眠</p>	<p>目不閉卧起不安蝕於喉為惑蝕於陰為狐不欲飲食惡聞食臭其面目乍赤乍黑乍白蝕於上部則聲</p>
--	------------------------------------	------------------------	---	------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------	---	---



喝此湯主之蝕於下部則咽乾苦參湯洗之蝕於肛者雄黃薰之

甘草 四兩 黃芩 人參 乾薑 各三兩 黃連 一兩

大棗 十二枚 半夏 半升

右七味水一斗煮取六升去滓再煎溫服一升日三

服

苦參湯 金匱 苦參一升水一斗煎取七升去渣薰洗日

三

欽定四庫全書

蘭臺軌範

雄黃 金匱

雄黃一味為末筒瓦二枚合之燒向肛薰之

赤小豆當歸散 金匱 病者脈數無熱微煩默默但欲卧

汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日目四背黑

若能食者膿已成也此湯主之

赤小豆 三升浸令芽出曝乾 當歸

右二味杵為散漿水服方寸七日三服

療心痛欲死 外臺



<p>濃搗地黃汁和麵作冷淘不用鹽服一頓虫即出</p>	<p>蕪荑散 治虫咬心痛欲驗之大痛不可忍或吐青</p>	<p>黃綠水涎沫或吐虫發有休止</p>	<p>蕪荑 雷丸 <small>各半</small> 乾漆 <small>碎研炒烟</small></p>	<p>右共為末每服三錢調和服</p>	<p>諸痛 <small>頭心胃</small></p>	<p>靈素</p>	<p>靈終始篇病痛者陰也痛而以手按之不得者陰也</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>素舉痛論視其五色黃赤為熱白為寒青黑為痛 調</p>	<p>經論實者外堅充滿不可按之按之則痛虛者聶辟氣</p>	<p>不足按之則氣足以溫之故快然而不痛 陰陽應象</p>	<p>大論氣傷痛形氣腫故先痛而後腫者氣傷形也先腫</p>	<p>而後痛者形傷氣也 痺論痛者寒氣多也有寒故痛</p>	<p>也</p>	<p>頭痛</p>	<p>靈素</p>
----------------------------	-----------------------------	---------------------	---	--------------------	------------------------------	-----------	-----------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------	-----------	-----------



靈經脈篇足太陽膀胱脈動則病衝頭痛目似脫項如	拔脊痛腰似折髀不可以曲脰如結踞如裂是為踝厥	督脈之別名曰長強挾脊上項散頭上下當肩脾左	右別走太陽入貫膂實則脊強虛則頭重 足少陽胆	脈是主骨所生病者頭痛領痛 厥病篇真頭痛頭痛	甚腦盡痛手足寒至節死不治	素奇病論帝曰人有病頭痛以數歲不已此安得之名	為何病岐伯曰當有所犯大寒內至骨髓髓者以腦為	欽定四庫全書	蘭臺軌範	主腦逆故令頭痛齒亦痛病名曰厥逆	病源	鬲痰風厥頭痛 風痰相結上衝於頭即令頭痛數歲	不已即連腦痛手足寒至節即死	千金	卒頭痛頭痛如破非中冷又非中風是胸膈中痰厥氣	上衝名為厥頭痛吐之即差	頭痛方
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------	----	-----------------------	---------------	----	-----------------------	-------------	-----





頭痛方 千金翼

葶藶子搗末以湯淋取汁洗頭良

又方 千金翼

吳茱萸 三升 以水五升煮取三升以綿拭髮根良

厥頭痛吐方 外臺 治痰厥頭痛

但單煮茗作飲二三升許須臾適吐吐畢又飲能如是數過劇者須吐胆汁乃止不損人

石膏散 寶鑑

欽定四庫全書

蘭臺軌範

川芎 石膏 白芷 各等分

右為末每服四錢煮茶清調下 此治風火頭痛之方

透頂散 本事方 治偏正頭風夾腦風并一切頭風不問遠

年近日

細辛 三莖 瓜蒂 七分 丁香 三粒 糯米 七粒 腦子

麝香 各一黑豆大

右將腦麝研細將前四味另研細然後合研令勻封好患人在左右搖一大豆許良久出涎一升許則安



痛風餅子

聖惠

五倍子

全蝎

土狗

各八分

右為末醋丸作如錢大餅子發時再用醋潤透頂太

陽穴上灸熱貼之仍用帕子縛之啜濃茶睡覺自愈

止痛太陽丹

奇效

天南星

川芎

等分

右為末同蓮鬚葱白搗爛作餅貼太陽痛處

氣攻頭痛方

奇效

欽定四庫全書

蘭臺軌範

葶麻子

乳香

等分

右搗爛作餅貼太陽穴上如痛止急去頂上解開頭

髮出氣即去藥

治頭痛方

奇效

用大蒜一顆去皮研取汁令病人仰卧以銅筋點少

許滴鼻中急令搐入腦眼中淚出差

玉液湯

濟生

治眉稜骨痛

半夏六錢泡湯七次切片作一服加生薑十片水煎



<p>去渣納沉香末少許服</p>	<p>麤犀湯 <small>濟生</small> 治暗風頭旋眼黑昏眩倦怠痰涎壅盛骨</p>	<p>節疼痛</p>	<p>羚羊角屑 旋覆花 紫苑 石膏 甘</p>	<p>草 <small>炙各</small> 一兩 細辛 <small>半兩</small> 前胡 <small>七錢</small> 犀角屑 <small>二錢</small></p>	<p>右藥每服三錢加生薑三片大棗一枚水煎服</p>	<p>秘方貼頭風熱病</p>	<p>大黃 朴硝 <small>等分</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>右為末用井底泥捏作餅貼兩太陽穴 <small>頭風皆屬寒此獨為熱不</small></p>	<p>備可不</p>	<p>清震湯 <small>保命</small> 治頭面疙瘡增寒拘急發熱狀如傷寒 <small>雷即</small></p>	<p>風頭</p>	<p>升麻 蒼朮 <small>各四錢</small> 荷葉 <small>全者一個</small> 水煎食後服 <small>楊梅毒入頭亦</small></p>	<p><small>有此病當用治毒之方治之</small></p>	<p>治頭內如虫蛀響 此名天白蟻</p>	<p>用茶子末吹鼻中 <small>此奇病不可不知</small></p>
------------------	---	------------	-------------------------	---	---------------------------	----------------	--------------------------------	------------------------	--	------------	--	-----------	--	-----------------------------------	----------------------	---------------------------------------



玉真圓

方 本亭

治腎氣不足氣逆上行頭痛不可忍謂之

腎厥其脈舉之則弦按之則石堅

硫黃

二兩

石膏

煨通赤研

半夏

柴湯洗各一兩

硝石

一分

五分

右為細末研勻生薑汁糊丸如梧子大陰乾每服二

十九或薑湯或米飲下更灸關元穴百壯

茶調散

局方

治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞身

重及婦人血風攻症太陽穴疼

白芷

甘草

羌活

各二兩

荆芥

去梗

川芎

各四兩

欽定四庫全書

蘭臺軌範

細辛

去蘆一兩

防風

一兩半

薄荷

葉不見火八兩

右為細末每服二錢食後茶清調下常服清頭目

頭風摩散

方見風門

頭風有偏正之殊其病皆在少陽陽明之絡以毫針

刺痛處數穴立效其外有瘡毒入頭名楊梅頭痛此

心胃痛

靈樞

厥病篇厥心痛與背相控善瘕如從後觸其心偃倭者



<p>腎心痛也厥心痛痛如以錐鍼刺其心心痛甚者脾心痛也厥心痛色蒼蒼如死狀終日不得太息肝心痛也厥心痛卧若徒居心痛間動作痛益甚色不變肺心痛也真心痛手足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死</p>	<p>千金</p>	<p>胸痺令入心中堅痞急痛肌中若痺絞痛如刺不能俯仰胸前皮皆痛手不得犯短氣咳唾引痛咽塞痒燥時欲嘔吐煩悶自汗出或引背痛不治數日死</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>外臺</p>	<p>蘭臺軌範</p>	<p>九種心痛 一虫 二注 三氣 四悸 五食 六飲 七冷 八熱 九去來痛</p>	<p>惡注心痛 中惡心痛心腹絞刺奄奄欲絕</p>	<p>近人患心胃痛者甚多十人之中必有二三皆係痰飲留於心下以成飲囊發作輕重疎數雖各不同而病因一轍治法以滌飲降氣為主凡病竟有時代之不同如近三十年中咳嗽吐血者十人而五余少時此病絕少亦不可解也</p>	<p>心胃痛方</p>
--	-----------	--	---------------	-----------	-------------	--	--------------------------	--	-------------



橘枳薑湯亦主之	茯苓杏仁甘草湯 茯苓 三兩 杏仁 五十枚 甘草 一兩
茯苓杏仁甘草湯 金匱	胸痺胸中氣塞短氣此湯主之
人參湯 金匱即理中湯	藥煮數沸分溫三服
枳實厚朴桂枝枳婁湯 枳實 四枚 厚朴 四兩 薤白 半斤 桂枝 一兩 枳婁 一枚	右五味以水五升先煮枳實厚朴取二升去渣內諸藥煮數沸分溫三服
欽定四庫全書 蘭臺軌範	下逆搶心此湯主之人參湯亦主之
枳實薤桂枝湯 金匱	胸痺心中痞氣氣結在胸胸滿脇
枳實薤桂枝湯 金匱	即前方加半夏半升
枳實薤桂枝湯 金匱	胸痺不得卧心痛徹背者此湯主之
枳實薤桂枝湯 金匱	右三味同煮取三升分溫再服
枳實薤桂枝湯 金匱	氣寸口脈沉而遲關上小緊數此湯主之
枳實薤桂枝湯 金匱	枳實 半斤 薤白 七升
枳實薤桂枝湯 金匱	枳實 一枚 薤白 半斤 白酒 七升



<p>服</p> <p>右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三不差更</p>	<p>橘皮枳實生薑湯 <small>金匱</small></p> <p>橘皮 一升 枳實 三兩 生薑 半斤</p>	<p>右三味以水五升煮取二升分溫再服</p> <p>薏苡仁附子散 <small>金匱</small> 胸痺緩急者此主之</p>	<p>薏苡仁 十五兩 大附子 十枚</p> <p>右二味杵為散服方寸七日三服</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭臺軌範</p> <p>桂枝生薑枳實湯 <small>金匱</small> 心中痞諸逆心懸痛此湯主之</p>	<p>桂枝 各三兩 生薑 各三兩 枳實 五枚</p> <p>右三味以水六升煮取三升分溫三服</p>	<p>赤石脂丸 <small>金匱</small> 心痛徹背背痛徹心此主之</p> <p>蜀椒 一兩 烏頭 一分 附子 半兩 乾薑 一兩 赤脂 一兩</p>	<p>右五味末之蜜丸如梧子大先食服一丸日三服不</p> <p>知再加 <small>此治大寒之症</small></p>	<p>九痛丸 <small>金匱</small> 治九種心疼</p>
--------------------------------------	---	---	--	---	---	--	--	--



附子三兩 狼牙一兩 巴豆一兩 人參 乾

薑 菜菔各一兩

右六味末之煉蜜丸如梧子大酒下強人初服三丸

日三服弱者二丸 兼治卒中惡腹脹痛口不能言

又治連年積冷流注心胸痛并冷氣上衝落馬墜車

血疾等皆主之忌口如常法

大建中湯金匱 心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上

衝皮起出見有頭足上下痛不可觸近此主之

欽定四庫全書

蘭臺軌範

蜀椒二合 乾薑四兩 人參二兩

以水四升煮取二升去渣內膠飴一升微火煎取一

升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一

日食糜溫覆之

療胸痺心痛方千金

灸臆中百壯穴在鳩尾上一寸此灸神效百壯灸瘡愈再灸非一日滿百

也壯

熨背法千金 治胸痺心背疼痛氣悶





<p>烏頭 細辛 附子 羌活 蜀椒</p>	<p>桂心 <small>各一兩</small> 川芎 <small>一兩三錢半</small></p>	<p>右共為散以少醋拌綿裹微火炙令煖以熨背上</p>	<p>療心痛方 <small>外臺</small></p>	<p>生油半合溫服瘥 <small>此乃治虫痛之方</small></p>	<p>海蛤丸 <small>丹溪</small> 治痰飲心痛</p>	<p>海蛤 <small>燒灰為末過數日火毒散用</small> 瓜蒞仁 <small>研</small></p>	<p>右以海蛤入瓜蒞內乾濕得所為丸每服五十九</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>失笑散 <small>經驗</small> 治婦人心痛氣刺不可忍</p>	<p>五靈脂 蒲黃 <small>等分</small></p>	<p>每用二錢醋熬膏入水煎服 <small>此方治瘀血犯心</small></p>	<p>鶴蝨散 <small>外臺</small> 胡粉丸 <small>外臺</small> 療心痛如虫嚙方 <small>外臺</small> 蕪荑</p>	<p>散 <small>以上四方俱見虫門</small> 平胃散 <small>見通</small> 半夏瀉心湯 <small>見膈吐</small></p>	<p>腰痛</p>	<p>靈樞</p>	<p>經脈篇肝足厥陰也是動則病腰痛不可以俯仰終</p>
---------------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	---	--	---	----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------------------------



<p>始篇刺諸痛者其脈皆實從腰以上者手太陰陽明皆主之從腰以下者足太陰陽明皆主之病在腰者取之</p>
<p>病源</p>
<p>腎主腰脚腎經虛損風冷乘之故腰痛也又邪客於足少陰之絡令人腰痛引小腹不可以仰息診其尺脈沉主腰背痛尺寸俱浮直下此為督脈腰強痛</p>
<p>風濕腰痛 勞傷腎氣經絡既虛或因卧濕當風風寒</p>
<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>
<p>乘虛搏於腎腎經與血氣相擊而腰痛</p>
<p>腎著腰痛 腎主腰脚腎經虛則受風冷內有積水風水相搏浸積於腎腎氣內著不能宣通故令腰痛其痛狀身重腰冷腹重如帶五千錢如坐於水形狀如水不渴小便自利飲食如故从从變為水病腎濕故也</p>
<p>背倭 肝主筋而藏血血為陰氣為陽陽氣精則養神柔則養筋陰陽和同則血氣調適共相榮養也邪不能傷若虛則受風風寒搏於脊膂之筋冷則攣急故令背</p>



倭

脇痛 邪氣客於足少陽之絡令人脇痛欬汗出陰氣

擊於肝寒氣客於脈中則血泣脈急引脇與小腹診其

脈弦而急脇下如刀刺狀如飛尸至困不死脇痛屬足少陽不屬

陰足厥

腰痛方

甘薑苓朮湯金匱 腎著之病其人身體重腰中冷如坐

水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下

欽定四庫全書

蘭臺軌範

焦身勞汗出衣裏冷濕从从得之腰以下冷痛腹重

如帶五千錢

甘草 白朮各二兩 乾薑 茯苓各四兩

右四味以水五升煮取三升分溫三服腰中即溫

青娥丸局方 治腎虛為風冷所乘或處濕地或墜墮傷

損或因風寒皆令腰間似有物垂墜也悉主之

胡桃二十個去殼皮 破故紙酒炒六兩 蒜四兩熬膏 杜仲薑汁炒十六兩

右共為末丸如桐子大溫酒下婦人淡醋湯下三十



<p>丸</p>	<p>加味小柴胡湯 <small>良方</small> 治傷寒脇痛</p>	<p>柴胡 <small>二錢</small> 半夏 <small>一錢</small> 黃芩 <small>二錢</small> 人參 <small>一錢</small> 牡蠣粉 <small>一分</small></p>	<p>枳殼 <small>一錢</small> 甘草 <small>一錢</small></p>	<p>右作一服薑五片紅棗二枚煎服</p>	<p>摩腰膏 <small>丹溪</small> 治老人腰痛婦人白帶</p>	<p>附子尖 烏頭尖 南星 <small>各二錢</small> 硃砂 雄黃</p>	<p>樟腦 丁香 <small>各一錢</small> 乾薑 <small>一錢</small> 麝香 <small>大者五粒</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>右共為末蜜丸龍眼大每一丸用生薑汁化開如厚</p>	<p>粥火上烘熱放掌上摩腰中候藥盡貼腰上即烘綿</p>	<p>衣縛定腰熱如火間二日用一丸 <small>此法近有人專用此治形體之病凡</small></p>	<p><small>虛人老人頗有效驗其術甚行又此方加入倭硫</small></p>	<p><small>黃人參鹿茸沉香永安息等大補之品摩虛損及老</small></p>	<p><small>人更妙又一法以蘇油黃蠟為丸如胡桃大烘熱</small></p>	<p><small>摩腰上俟腰上熱然後紮好一丸可用數十次</small></p>	<p><small>中病亦可摩</small></p>	<p>療腰痛方 <small>良方</small> 杜仲 肉蓯蓉 破故紙 人參 當歸</p>
----------	---	--	--	----------------------	--	--	---	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---	--	---	--	-----------------------------	--



秋石	川巴戟	鹿角霜	各等分
右後末用猪腰子一個洗淨淡鹽湯泡過劈開兩邊中間勿斷細花開用前藥滲入另用稀絹一塊包裹綿紮外用小灌入酒少許紙封毋令走泄藥氣煮熟			
取食之飲醇酒三杯立愈			
又方	奇效		
胡桃肉	補骨脂	杜仲	各四兩
右作二貼每貼用水二盞煎服			
欽定四庫全書			
蘭臺軌範			
麋茸丸	本事	治腎虛腰痛	
麋茸	一兩鹿角亦可	免絲子末	一兩
右為末用羊腎一對酒煮爛去膜研和丸桐子大如羊腎少入酒糊佐之每服三五丸溫酒或鹽湯下			
藥碁子	本事	治腰腿痛氣滯	
牽牛不拘多少用新瓦入火煨得通紅便將牽牛頓在瓦上自然半生半熟不得撥動取末一兩入細研硫黃一錢同研勻分三分每用白麵一匙水和捍開			



切作碁子大五更初以水一盞煮熱連湯溫送下如  
住即已未住隔日再作予嘗有此疾每發止一服痛

止

二神丸

方 本事

左金丸

俱見  
通治

按腰痛屬虛者固多而因風寒痰濕氣阻血  
凝者亦不少一概蠻補必成痼疾不可不審

腹痛

金匱

跌陽脈微弦法當腹滿不滿者必便難兩胠疼痛此虛

欽定四庫全書

蘭臺軌範

寒從下上也當以溫藥服之 病者腹滿按之不痛為

虛痛者為實可下之舌黃者下之黃自去 腹滿時減

復如故此為寒當與溫藥 夫中寒家喜欠其人清涕

出發熱色和者善噦 中寒其人下痢以裏虛也欲噦

不能此人肚中寒 夫瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不

行而反下之其氣必衝不衝者心下則痞

傷寒論

病人不大便五六日繞臍痛煩躁發作有時者此有燥



屎故使不大便也 太陰之為病腹滿而吐食不下自  
痢益甚時腹自痛若下之必胸中結鞭 傷寒五六日  
腹中痛若轉氣下趣少腹者此欲自痢也

腹痛方

厚朴七物湯 全匱 病腹滿發熱十日脈浮而數飲食如

故此湯主之

厚朴 半斤 甘草 各三兩 大黃 十枚 枳實 五枚

桂枝 二兩 生薑 五兩

欽定四庫全書

蘭臺軌範

右七味以水一斗煮取四升溫服八合日三服嘔者  
加半夏五合下痢去大黃寒多者加生薑至半斤

附子粳米湯 全匱 腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐

此湯主之

附子 一枚 半夏 半升 甘草 一兩 大棗 十枚 粳米 半升

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日三

服

蒸臍法 亦可隨病所在蒸之外科寒症亦能蒸散



丁香	木香	半夏	南星	川烏
歸身	肉桂	麝	冰	乳香
硝	山甲	雄黃	蟾窠	白蔻
右為粗末放麵圈內上用銅皮一片多鑽細眼用艾火灸銅皮上每日十餘火滿三百六十火病除藥味亦可因症加減其藥用燒酒薑汁等拌濕				
厚朴二物湯	<small>金匱</small>	痛而閉者此湯主之		
厚朴八兩	大黃四兩	枳實五枚		
欽定四庫全書				
蘭臺軌範				
右三味以水一斗二升先煮二味取五升內大黃煮取三升溫服一服以痢為度				
大黃附子湯	<small>金匱</small>	脇下偏痛發熱其脈緊弦此寒也以溫藥下之宜此湯		
大黃三兩	附子三枚	細辛二兩		
以水五升煮取二升分溫三服強人煮取二升半分溫三服服後如人行四五里進一服				
黃連湯	<small>見嘔吐</small>	小建中湯	<small>見虛勞</small>	桂枝加大黃湯
大柴				





脚氣 <small>附轉筋</small>	湯 <small>理中湯</small> <small>四逆湯</small> <small>以上俱見傷寒</small> 蘇合丸 <small>見通治</small>	胡湯 <small>小柴胡湯</small> <small>大承氣湯</small> <small>桂枝加芍藥</small>	千金	諸經方有脚氣之論古人少有此疾 <small>脚氣之名金匱已載但患者少耳</small>	自永嘉南渡衣纓士人多有遭者有支法存仰道人等	並留意經方偏善斯術多獲全濟又宋齊之間釋門深	師述二公等諸家舊方為二十卷其脚弱一方近百餘	欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	首魏周之代蓋無此病所以姚公集驗殊不慙懃徐王	撰錄未以為意特以三方鼎峙風教未一霜露不均寒	暑不等關西河北不識此疾自聖唐開闢無外南極之	地作鎮於彼往往皆遭近來中國士大夫亦有患者良	由今代風氣混同所致耳此病先從脚起因即脛腫時	人號為脚氣深師云脚弱者即其義也 問風毒中人	隨處皆得作病何偏著於脚答曰人有五臟心脈經絡	所起在手十指餘三臟經絡所起在足十趾地之寒暑
--------------------------	---	--	----	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



風濕皆作蒸氣足常履之所以風毒之中人必先中脚  
从而不瘥徧及四肢腹背頭項經云次傳間傳是也凡  
脚氣皆感風毒所致治脚氣必兼風此乃要訣人多不即覺會因他  
病一度始發或奄然大悶經兩三日乃覺庸醫不識作  
餘病治莫不盡斃始起甚微飲食如故惟卒起脚屈弱  
不能動為異耳黃帝云緩風濕痺是也 有脚氣未覺  
而頭項臂膊已有所苦諸處未知而心腹五內已有所  
困或嘔食臭腹痛下痢二便不通衝悸不欲見光精神  
欽定四庫全書  
蘭臺軌範  
昏憤迷忘錯亂壯熱頭痛身體酷冷疼痛轉筋頑痺緩  
縱百節攣急小腹不仁等症皆脚氣狀貌也亦云風毒  
脚氣之候婦人亦爾又有產後取涼多中此毒其熱悶  
掣癢驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也又但覺臍下冷痞  
幅幅然不快小便淋瀝即是其候頑弱名緩風疼痛為  
濕痺 熱者治以冷藥冷者療以熱藥以意消息之病諸  
皆然心下急氣喘不停自汗脈促嘔吐不止者死 凡脚  
氣皆由氣實而死終無一人服藥致虛而殂故不得大





<p>脚氣腫滿 由風濕毒氣搏於腎經則腎氣不能宣通 水液使傳於小腸反漬於皮膚故腫滿也</p> <p>脚氣驚悸 由溫濕挾風毒初客膚腠後經腑臟與神 氣相搏則心驚悸也</p> <p>脚氣轉筋 靈樞四時氣篇轉筋於陽治其陽轉筋於 陰治其陰 本輸篇轉筋者立而取之可令遂已</p>	<p>脚氣方</p>	<p>礬石湯 <small>金匱</small> 治脚氣衝心</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>礬石 <small>二兩</small> 以漿水一斗五升煎浸脚良</p>	<p>第一竹瀝湯 <small>千金</small> 治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腹脹 起如腫按之不陷心中惡不欲食或患冷方</p>	<p>竹瀝 <small>五升</small> 甘草 秦艽 葛根 黄芩</p>	<p>麻黄 防己 細辛 桂心 乾薑 <small>各一兩</small></p>	<p>防風 升麻 <small>各一兩半</small> 茯苓 <small>二兩</small> 附子 <small>二枚</small> 杏仁 <small>五十枚</small></p>	<p>右十五味以水七升合竹瀝煮取三升分三服取汗</p>	<p>此脚氣主方 多治風之藥</p>
--	------------	--	------------------------	---	---	---	--	--	-----------------------------	------------------------



烏麻酒

千金

治風虛氣滿脚疼痺孿弱不能行

烏麻

五升

微熬搗酒漬一宿隨所能飲之盡更作

菜萸木瓜湯

治脚氣衝心悶亂不識人手足脈欲

絕

吳茱萸

半兩

木瓜

一兩

栝榔

二兩

生薑

五片

水煎服

蘇子粥

養老書

治老人脚氣毒悶身體不仁行履不能

紫蘇子

五合熬研細以水投取汁

粳米

四合淨

洗淘

右煮作粥臨熟下蘇汁調之空心食之日一服亦温

欽定四庫全書

蘭臺軌範

中

杉木湯

本事方

唐柳州云元和十二年二月得脚氣夜

半痞絕脇有塊大如石且死困塞不知人三日滎陽

鄭洵美杉木湯服半日食頃大小便三次氣通塊散

用杉木節一大升橘葉一升無葉以皮代之大腹栝

榔七個合子碎之童子小便三大升共煮一升半分

二服若一服得快痢停後服

栝榔散

活人書

治脚腫



<p>橘葉 <small>一大握</small> 沙木 <small>一握</small> 小便 <small>一盞</small> 酒 <small>藥煎 盞同以</small></p>	<p>右煎數沸調楨榔末二錢食後服 <small>即前方 變法</small></p>	<p>木瓜散 <small>活人書</small> 治脚氣</p>	<p>大腹皮 <small>一枚</small> 紫蘇 <small>一分</small> 乾木瓜 <small>一分</small> 甘草 <small>一分 炙</small> 木香</p>	<p><small>一分</small> 羌活 <small>一分</small></p>	<p>右細剉為散分作三服每用白水一盞煎至半盞去</p>	<p>滓通口服</p>	<p>雞屎白散 <small>金匱</small> 轉筋之為病其人臂脚直脈上下行微</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>弦轉筋入腹者</p>	<p>雞屎白一味為散取方寸匕以水六合和溫服</p>	<p>療轉筋方 <small>外臺</small></p>	<p>以鹽一升水一升半作湯洗漬良</p>	<p>延效療轉筋 <small>外臺</small> 并治渾身轉筋</p>	<p>煖水稍熱於浴斛中坐浸須臾便差如湯沃雪</p>	<p>轉筋灸法 <small>外臺</small></p>	<p>轉筋在兩臂若胸脇者灸手掌白肉際七壯 在十</p>
--	--	-----------------------------------	---	---	-----------------------------	-------------	---	-----------------------------------	---------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------



<p>指者灸手踝骨上七壯 在脛骨者灸膝下廉筋上  三壯 又法灸涌泉七壯亦可灸大都七壯 <small>穴在足大母指</small>  <small>本節內側</small> 腹脹轉筋者灸臍上一寸十四壯  <small>白肉際</small>  烏頭湯 <small>見風痺</small>  麻豆湯 <small>見水腫</small>  大活絡丹  崔氏八味丸  <small>即腎氣丸</small>  <small>俱見通治</small></p>	<p>欽定四庫全書  蘭臺軌範</p>	<p>蘭臺軌範卷六</p>
--	-------------------------	---------------



欽定四庫全書

子部  
蘭臺軌範卷七

詳校官太醫院院使臣張肇基

洗馬臣王坦修覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官學正臣湯垣

謄錄衆人臣蔡枝華





欽定四庫全書

蘭臺軌範卷七

吳江徐大椿撰

疫癘鬼症

素問

遺篇刺法論黃帝曰余聞五疫之至皆相染易無問大

小病狀相似不施救療如何可得不相移易者岐伯曰

不相染者正氣存內邪不可干避其毒氣天牝從來天牝

欽定四庫全書

蘭臺軌範

內經注云鼻也空虛能受天地之氣故曰天牝欲其來往出入復得其性氣出於腦即

不邪干氣出於腦即先想心如日欲將入於疫室先想

青氣自肝而出左行於東化作林木次想白氣自肺而

出右行於西化作戈甲次想赤氣自心而出南行於上

化作焰明次想黑氣自腎而出北行於下化作水次想

黃氣自脾而出存於中央化作土五氣護身已畢以想

頭上如北斗之煌煌然後可入於疫室又一法於春分之

日日未出而吐之又一法於雨水日後三浴以藥泄汗



病源

一歲之內節氣不和寒暑垂候或有暴風疾雨霧露不

散則民多疾疫無長少卒皆相似如有鬼厲故云疫癘

中惡 精神衰弱為鬼神之氣卒中之卒然心腹刺痛

悶亂欲死凡卒中惡腹大而滿者診其脈緊大而浮者

死緊細而浮者生 又中惡吐血數升脈沉數細者死

浮焱如疾者生

脈大段如此亦不可泥 卒然吐血多者多係中惡莫作吐血治

尸厥 陰陽逆也其狀如死猶微有息而不恒脈尚動

欽定四庫全書

蘭臺軌範

而形無知也脈沉大而滑身溫而汗此為入腑氣復自

愈若唇青身冷此為入臟即死

鬼擊 謂鬼癘之氣擊著於人也得之無漸如人以刀

矛持刺狀胸脇腹內絞急切痛不可抑按或吐血或鼻

中出血或下血一名為鬼排重者死

卒魘 魂魄外遊為他邪所執欲還未得忌火照之照

則神魂遂不復入乃死若在燈光前魘者是本由明出

不忌火



三尸諸蟲 其虫與人俱生而此虫忌血能與鬼靈相  
通常接引外邪為人患害其發作之狀或沉沉默默不  
知所苦而無處不惡或腹痛脹急或礫塊踊起或攣引  
腰脊或精神襍錯變狀多端其病大同小異但以一方  
治之者故名諸尸也

尸注 是五尸內之尸注而挾外鬼邪之氣流注身體  
令人無處不惡每節氣改變輒至大惡積月累年漸就  
頓滯以至於死死後復易旁人乃至滅門以其尸病注

欽定四庫全書

蘭臺軌範

易旁人故曰尸注

喪尸 人有年命衰弱至於喪死之處心意有所畏惡  
其身內尸虫性既忌惡便更接引外邪共為疹病其發  
亦心腹刺痛脹滿氣急但逢喪處其病則發故謂之喪  
尸

尸氣 人有觸值死尸或臨尸其尸氣入腹內與尸虫  
相接成病其發亦心腹刺痛脹滿氣急但聞尸氣則發  
故謂之尸氣



諸注 謂邪氣居住人身內故名為注又注易旁人也  
 乃有三十六種九十九種而方皆不顯其名所載有風  
 鬼轉生死邪氣寒熱冷蠱毒惡忤遁走溫喪哭殃食水  
 骨血溫痺勞微泄石產土飲以上諸注皆正氣虛而邪  
 氣傳綿也與諸尸病相近

又有九種注

一曰風注 二曰寒注 三曰氣注 四曰生注 五

曰涼注 六曰酒注 七曰食注 八曰水注 九曰

欽定四庫全書

蘭臺軌範

尸注

疫癘方

小金丹方

素問

辰砂 二兩

水磨雄黃 一兩

叶子雌黃 一兩

紫金 半兩  
愚按

以金箔同藥研之可為細末

同入合中外固了地一尺築地實不用爐不須藥制

用火二十斤煨之也七日終常令火不絕候冷七日取次

日出合子

合子即磁磳之屬

取出順日研之

順日研之謂左旋也三日



煉白沙蜜為丸如梧子大每日望東吸日華氣一口  
冰水下一丸和氣咽之服十粒無疫干也

還魂湯

金匱

救卒死客忤死

麻黃

三兩去節  
一方四兩

杏仁

去皮尖  
七十個

甘草

一兩炙千金  
用桂心二兩

右三味水八升煮取三升去渣分令咽之通治諸感  
忤 千金方云此方主卒忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕  
復覺或已無脈口禁拗不開去齒下湯湯入口不下  
者分病人髮左右足踏肩引之藥下復增取一升須

欽定四庫全書

蘭臺軌範

史立甦

又方

韭根

一把

烏梅

二七  
个

吳茱萸

半升  
炒

右三味以水一斗煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者  
生沉者死者煮取三升去滓分飲之

外臺走馬湯

金匱  
附方

治中惡心痛腹脹大便不通并通治

飛尸鬼擊

巴豆

二枚  
皮心熬去

杏仁

二枚



<p>右二味以綿纏搥令碎熱湯二合捻取自然汁飲之 當下老小量之</p>	<p>雄黃粉<small>千金</small> 治卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出 煩滿欲絕</p>	<p>雄黃一味為粉以酒服一升日三服化為水 治瘟方<small>外臺</small> 瘟疫轉相染著至滅門延及外人無收視者</p>	<p>赤小豆 鬼箭羽 鬼白 雄黃<small>研</small> 丹砂</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範 各二兩</p>	<p>右五味搗末蜜丸如小豆大服一丸可與病人同牀 辟瘟殺鬼丸<small>外臺</small></p>	<p>虎頭骨<small>五兩</small> 硃砂<small>一兩</small> 鬼白<small>一兩</small> 雄黃<small>一兩</small> 皂莢<small>一兩</small> 炙<small>一兩</small> 雌黃<small>一兩</small> 研<small>一兩</small> 蕪荑<small>一兩</small></p>	<p>右七味搗篩以蠟蜜和彈丸大絳囊盛繫臂男左女 右家中置屋四角月朔望夜半中庭燒一丸忌生血</p>	<p>物</p>
--	---	---	---	--------------------------------	--	---	--	----------



八毒赤丸 <small>寶鑑</small> 治鬼疰病	雄黃 礬石 硃砂 附子 <small>泡</small> 藜蘆	丹皮 巴豆 <small>兩各一</small> 蜈蚣 <small>一條</small> 為末蜜丸小豆大每	服五七丸冷水送下無時 <small>礬石或作礬石</small>	紫金錠 蘇合丸 <small>二方俱見通治</small>	諸疸 <small>附黃汗</small>	素問	平人氣象論溺黃赤安卧者黃疸已食如饑者胃疸目	欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	黃者曰黃疸	金匱	跌陽脈緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食即為	滿 <small>脈紫而數則有熱兼有寒故用藥亦當寒熱兼顧古方可考也</small> 尺脈浮為傷腎跌陽	緊為傷脾風寒相搏食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁	氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰	穀疸額上黑微汗出手足中熱薄暮即發膀胱急小便	自利名曰女勞疸腹如水狀不治心中懊懣而熱不能
-----------------------------	---------------------------------	--	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----	-----------------------	----------------------------	-------	----	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



食時欲吐名曰酒疸 夫病酒黃疸必小便不利其候
心中熱足下熱是其證也 酒疸心中熱欲吐者吐之
愈 酒疸下之以以爲黑疸目青面黑心中如噉蒜齏
狀大便正黑皮膚爪之不仁脈浮弱雖黑微黃故知之
黃家從濕得之一身盡發熱面黃肚熱熱在裏當下
之 黃疸之病當以十八日爲期治之十日以上瘥反
劇爲難治 疸而渴者其疸難治疸而不渴者其疸可
治發於陰部其人必嘔陽部其人振寒而發熱也 黃
欽定四庫全書
蘭臺軌範
汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已汗出又身
常暮臥盜汗出者此榮氣也若汗出已反發熱者以以
其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒
輕者以以必身暈暈即胸中痛又從腰以下必汗出下
無汗腰腕弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼痛
煩燥小便不利此爲黃汗
病源
黃病 黃病者一身盡疼發熱面色洞黃七八日後壯





熱口裏有血當下之法如狔肝狀其人少腹內急若其人眼睛澀疼鼻骨疼兩膊及項強腰背急即是患黃多大便澀但令得小便快即不慮死不用大便多多即心腹脹不存此由寒濕在表則熱蓄於脾胃腠理不開癢熱與宿穀相搏煩鬱不消則大小便不通故身體面目皆變黃也

利小便為治黃總訣

急黃 脾黃有熱穀氣鬱蒸因為熱毒所加故猝然發黃心滿氣喘命在頃刻故云急黃也

欽定四庫全書

蘭臺軌範

勞黃 脾臟中風風與痰熱相搏故令身體發黃額上黑微汗出手足中熱薄暮發膀胱急四肢煩小便自利名為勞黃

腦黃 熱邪在骨髓腦為髓海故熱氣從骨髓流入於腦則身體發黃頭痛眉疼

陰黃 陽氣伏陰氣盛熱毒加之故但身面色黃頭痛而不發熱名為陰黃

癖黃 氣水飲停滯結聚成癖因熱氣相搏則鬱蒸不



散故脇下滿痛而身發黃名為癖黃

噤黃 心脾有瘀熱心主於舌脾之絡脈出於舌下若身面發黃舌下大脈起青黑色舌噤不能語名為噤黃五色黃 凡人著五種黃其人冥漠不知東西者看其左手脈名手肝脈兩筋中其脈如有如無又看近手屈肘前臂上當有三岐脈中央者名為手肝脈兩廂者名岐脈看時若肝脈全無兩廂壞其人九死一生若中央脈近掌三指道有如不絕其人必不死

欽定四庫全書

蘭臺軌範

酒疸 虛勞之人飲酒多進穀少則胃内生熱因大醉當風入水則身目發黃心中懊痛足脛滿小便黃面發赤斑

穀疸 穀疸之狀食畢頭眩心忪怫鬱不安而發黃由失饑大食胃氣衝熏所致

女勞疸 其狀身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大勞大熱而交接即入水所致也

黑疸 黑疸之狀小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱



大便黑是也諸疸以以多變為黑疸	黃汗之為病身體洪腫發熱汗出不渴狀如風水汗染	衣正黃如藥汁其脈自沉此由脾胃有熱汗出而入水	中浴若水入汗孔中得成黃汗也	諸疸方	茵陳蒿湯 <small>全匱</small> 穀疸之為病寒熱不食食即頭眩心胸	不安以以發黃為穀疸此湯主之	茵陳蒿 <small>六兩</small> 梔子 <small>十四枚</small> 大黃 <small>二兩</small>	欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三	升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤	一宿腹減黃從小便去也	消石礬石散 <small>全匱</small> 黃家日晡所發熱而反惡寒此為女	勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作	黑疸其腹脹如水狀大便必黑時澹此女勞之病非	水也腹滿者難治此方主之	消石 礬石 <small>燒等分</small>
----------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----	--	---------------	--	----------------------------	----------------------	----------------------	------------	--	----------------------	----------------------	-------------	--------------------------



<p>右二味為散以大麥粥汁和服方寸匕日三服病隨大小便去小便正黃大便正黑是候也</p>	<p>梔子大黃湯 <small>金匱</small> 酒黃疸心中懊懣或熱痛此方主之  <small>梔子 十四枚</small> 大黃 <small>一兩</small> 枳實 <small>五枚</small> 豉 <small>一升</small></p>	<p>右四味以水六升煮取二升分溫三服</p> <p>桂枝加黃芪湯 <small>金匱</small> 諸病黃家但利其小便假令脈浮當以汗解之此方主之 亦主治黃汗</p>	<p>桂枝 <small>各二兩</small> 芍藥 <small>各二兩</small> 甘草 <small>各二兩</small> 生薑 <small>三兩</small> 大棗 <small>十二枚</small></p>	<p>欽定四庫全書  <small>黃芪 二兩</small>  <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>右六味以水八升煮取三升溫服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆取微汗不汗更服</p>	<p>猪膏髮煎 <small>金匱</small> 諸黃主之  <small>猪膏 半斤</small> 亂髮 <small>如雞子大三枚</small></p>	<p>右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出</p> <p>茵陳五苓散 <small>金匱</small> 黃疸主之  <small>茵陳膏末 一錢</small> 五苓散 <small>五分</small></p>	<p>茵陳膏末 <small>一錢</small> 五苓散 <small>五分</small></p>
--	--	---	---	--	--	---	---	---



右二味和先食飲方寸七日三服 <small>此利小便之法</small>	大黃消石湯 <small>金匱</small> 黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之	大黃 黃檗 消石 梔子 <small>各四兩 十五枚</small>	右四味以水六升煮取二升去渣內消更煮取一升	頓服 <small>黃疸變腹滿者最多此方乃下法也</small>	麻黃醇酒湯 <small>千金</small> 治黃疸	麻黃 <small>三兩</small> 以美清酒五升煮取二升半頓服盡冬月	欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	用酒春月用水	黃疸方 <small>千金</small> 治身目皆黃皮肉鞠塵出	茵陳 <small>一把</small> 梔子 <small>二十枚</small> 石膏 <small>一斤</small> 以水五升煮二升取	二升半去渣以猛火燒石膏令赤投湯中沸定服一	升覆取汗周身以粉粉之不汗更服 <small>燒石膏之義甚精妙</small>	赤苓散 <small>千金</small> 主黑疸身皮大便皆黑	赤小豆 <small>三十枚</small> 茯苓 <small>六銖</small> 雄黃 <small>一銖</small> 瓜丁 <small>四銖</small> 女萎 <small>六</small>	甘草 <small>二銖</small> 以水三升煮豆茯苓取八合搗四味為
--	--	---------------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------	--------	--	--	----------------------	---	---------------------------------------	--	--



散和半錢服之須臾當吐吐則愈亦主一切黃

寒水石散

千金翼

主肉疸飲少小便多白如泔色此病得

之從酒

寒水石

白石脂

栝萋

各五分

知母

兔絲

子

桂心

各三分

搗篩為散麥粥服五分七日三服

五日知十日差

此方不常用聊備一格

女勞疸

千金翼

治黃疸之為病日晡所發熱惡寒少腹急

體黃額黑大便黑澹洩足下熱此為女勞也腹滿者

欽定四庫全書

蘭臺軌範

難療

滑石

研

石膏

研各五兩

為散麥粥汁服方寸七日三小

便極利差

牛胆煎

千金翼

酒疸身黃麴塵出此主之

牛胆

一枚

大黃

八兩

芫花

一升

薺花

半斤

右三味以酒一升切三味漬之一宿煮減半去渣內

牛胆微火煎令可丸丸如豆大服一服日移六七尺

不知更服一丸膈上吐膈下痢或不吐痢而愈



救急三十種黃方 外臺

用雞子一顆并殼燒灰研酢一合又溫之總和頓服  
身體眼暗極黃者不過三顆鼻中虫出神效

療黃疸方 外臺

取生小麥苗搗絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四  
日便愈無小麥苗穰麥苗亦得

近效瓜蒂散 外臺 療黃疸

瓜蒂 二七枚 赤小豆 七枚 生秫米 二七枚 丁香 二七枚

欽定四庫全書

蘭臺軌範

右四味搗篩重者取如大豆二枚各著一枚鼻孔中  
痛縮鼻須臾鼻中瀝清黃水或從口中出升餘則愈

病輕者小豆大則可不愈間日復頻用效或使人以

竹筒極力吹鼻中無不死者 嗅鼻出黃水磨以前即有此法或用束腰葫蘆

內白膜研細加麝少許吹鼻亦能出水

麻黃連軹赤小豆湯 傷寒論 治傷寒瘵熱在裏身必發黃

此主之

麻黃 二兩 去節連軹 二兩 赤小豆 一升 杏仁 四十粒 甘草 二



<p>兩 生梓白皮 一升 生薑 二兩 大棗 十二枚</p>	<p>右以潦一斗先煮麻黃去沫內諸藥煮取三升分溫 三服 <small>此方治傷寒餘邪未盡之黃與諸症微別</small></p>	<p>黃芪芍藥桂枝苦酒湯 <small>金匱</small> 黃汗之為病身體腫發熱 汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如藥汁脈自沉</p>	<p>以汗出入水中浴水從汗孔入得之此湯主之 黃芪 五兩 芍藥 三兩 桂枝 三兩</p>	<p>右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升溫服一 欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以苦酒 阻故也 <small>一方以美生醢代苦酒此病在表不在裏</small></p>	<p><small>金匱等書治疸病之方最多然用之或效或不效非若他症之每發必中者何也蓋疸之重者有囊在腹中包裹黃水藥不能入非決破其囊或提其黃水出淨必不除根此等病當宗屢試屢驗和平清淡之單方治之專恃古方竟有全然不應者</small></p>	<p>小建中湯 <small>見通</small> 瓜蒂湯 <small>方見</small></p>	<p>情志卧夢 靈素</p>
---	--	--	---	---	---	--	---	--------------------





怒怒傷肝悲勝怒	<small>所勝即五行 生剋之理</small>	南方生熱在聲為笑在	陽氣象大論東方生風在聲為呼在變動為握在志為	則氣收炁則氣泄驚則氣亂勞則氣耗思則氣結 陰	生於氣也怒則氣上喜則氣緩悲則氣消恐則氣下寒	魂魄散不相得故曰惑也 素舉痛論帝曰余知百病	心者神之舍也故精神亂而不轉卒然見非常處精神	眼赤脈法於陽也故陰陽合傳而精明也目者心使也	也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白	欽定四庫全書	蘭臺軌範	者五臟六腑之精也營衛魂魄之所常營神氣之所生	精所中不相比也則精散精散則視岐視岐見兩物目	腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣邪同其精其	項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入於腦則腦轉	之精而與脈并為系上屬於腦後出於項中故邪中於	其窠氣之精為白眼肌肉之精為約束裹擷筋骨血氣	之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡	靈大惑論五臟六腑之精氣皆上注於目而為之精精
---------	-------------------------------	-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



變動為憂在志為喜喜傷心恐勝喜中央生濕在聲為	歌在變動為噦在志為思思傷脾怒勝思西方生燥在	聲為哭在變動為效在志為憂憂傷肺喜勝憂北方生	寒在聲為呻在變動為慄在志為恐恐傷腎思勝恐	調經論神有餘則笑不休神不足則悲血有餘則怒不	足則恐 血并於陰氣并於陽故為驚狂血并於陽氣	并於陰乃為炁中血并於上氣并於下心煩惋善怒血	并於下氣并於上亂而善忘	<small>以上 情志</small>	欽定四庫全書	蘭臺軌範	不卧多卧 靈邪客篇黃帝問於伯高曰夫邪氣之客	人也或令人目不瞑不卧出者何氣使然伯高曰五穀	入於胃也其糟粕津液宗氣分為三隧故宗氣積於胸	中出於喉嚨以貫心脈而行呼吸焉榮氣者泌其津液	注之於脈化以為血以榮四末內注五臟六腑以應刻	數焉衛氣者出其悍氣之慄疾而先行於四末分肉皮	膚之間而不休者也晝日行於陽夜行於陰常從足少	陰之分間行於五臟六腑今厥氣客於五臟六腑則衛
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	--------------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>氣獨衛其外行於陽不得入於陰行於陽則陽氣盛陽</p>	<p>氣盛則陽蹻陷不得入於陰陰虛故目不瞑黃帝曰善</p>	<p>治之奈何伯高曰補其不足瀉其有餘調其虛實以通</p>	<p>其道而去其邪飲以半夏湯一劑陰陽已通其卧立至</p>	<p>大惑論黃帝曰人之多卧者何氣使然岐伯曰此人</p>	<p>腸胃大而皮膚濕而分肉不解焉<small>善食人多善</small>黃帝曰</p>	<p>卒然多卧者何氣使然岐伯曰邪氣留於上焦上焦閉</p>	<p>而不通已食若飲湯衛氣留於陰而不行故卒然多</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>卧焉</p>	<p>不夜瞑不晝瞑 靈營衛生會篇黃帝曰老人之不夜</p>	<p>瞑者何氣使然少壯之人不晝瞑者何氣使然岐伯答</p>	<p>曰壯者之氣血盛其肌肉滑氣道通榮衛之行不失其</p>	<p>常故晝精而夜瞑老者之氣血衰其肌肉枯氣道滯五</p>	<p>臟之氣相搏其榮氣衰少而衛氣內伐故晝不精夜不</p>	<p>瞑 寒熱病篇陽氣盛則瞋目陰氣盛則瞑目</p>	<p>不得卧 素逆調論不得卧而息有音者是陽明之逆</p>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------



<p>也足三陽者下行今逆而上行故息有音也陽明者胃脈也胃者六腑之海其氣亦下行陽明逆不得從其道故不得卧也下經曰胃不和則卧不安此之謂也夫起居如故而息有音者此肺之絡脈逆也絡脈不得隨經上下故留經而不行絡脈之病人也微故起居如故而息有音也夫不得卧卧則喘者是水氣之客也夫水者循津液而流也腎者水臟主津液主卧與喘也</p> <p><small>以上卧按風邪入於陰經亦多卧</small></p>
<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>
<p>靈淫邪發夢篇陰氣盛則夢涉大水而恐懼陽盛則夢大火燔灼陰陽俱盛則夢相殺上盛則夢飛下盛則夢墮甚饑則夢取甚飽則夢予肝氣盛則夢怒肺氣盛則夢恐懼哭泣飛揚心氣盛則夢喜笑恐畏脾氣盛則夢歌樂身體重不舉腎氣盛則夢腰脊兩解不屬素脈要精微論短虫多則夢聚衆長虫多則夢相擊毀傷夢以上</p>
<p>情志卧夢方</p>



半夏秫米湯

靈樞

以流水千里以外者八升揚之萬遍

取其清五升煮之炊以葦薪火沸置秫米一升治半

夏五合徐炊令竭為一升半去其滓飲汁一小杯日

三稍增以知為度故其病新發者覆杯則卧汗出則

已矣久者三飲而已也

漢時一斗僅今二升余親見古銅量一枚較準如此

半夏麻黃丸

金匱

心下悸者此主之

半夏

麻黃

等分

右二味末之煉蜜丸小豆大飲服三丸日三

此治飲在心下

欽定四庫全書

蘭臺軌範

者

桂枝救逆湯

金匱

火邪者主之

桂枝

三兩 去皮

甘草

二兩 炙

生薑

三兩

牡蠣

五兩 熬

龍骨

四兩

蜀漆

三兩 去腥

大棗

十二枚

右七味末之以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸

藥煮取三升去滓溫服

黃連阿膠湯

傷寒論

治少陰病心中煩不得卧

黃連

四兩

黃芩

一兩

芍藥

二兩

阿膠

三兩

雞子黃

二



<p>枚</p>	<p>右五味以水六升先煮三物取二升去滓內阿膠烱盡少冷內雞子黃攪和溫服七合 <small>此治腎氣沖心之不得卧故清心火</small></p>	<p>酸棗仁湯 <small>全匱</small> 治虛勞虛煩不得眠</p>	<p>酸棗仁 二升 甘草 一兩 知母 茯苓 川芎 各二兩</p>	<p>右五味以水八升先煮棗仁取六升內諸藥煮取三升</p>	<p>升分溫三服 <small>同一心煩不眠而用藥迥別何醫者之多不審也 此方外臺有加乾薑者亦</small></p>	<p>溫胆湯 <small>千金</small> 治大病後虛煩不得眠此胆寒故也宜服</p>	<p>半夏 竹茹 枳實 橘皮 生薑 <small>各二兩 各二兩 三兩 四兩</small></p>	<p>甘草 一兩</p>	<p>右六味以水八升煮取二升分三服 <small>又一不服</small></p>	<p>治多忘 <small>千金</small></p>
----------	--	--	--	------------------------------	--	---	--	--------------	---	------------------------------



<p>葛蒲 二分                  茯苓                  茯神                  人參 各五分                  遠志 七分</p> <p>右五味治下篩酒服方寸七日二夜一五日後知神良</p>	<p>枕中方 千金                  治好忘</p> <p>龜甲 炙                  龍骨                  遠志 去心                  葛蒲 等分</p>	<p>右四味治下篩酒服方寸七日三常服令人大聰</p> <p>鎮心省睡益智方 千金翼</p>	<p>遠志 五十兩 去心                  益智子                  葛蒲 各八兩</p> <p>欽定四庫全書                  蘭臺軌範</p>	<p>右三味為末以淳糯米酒服方寸七一百日有效秘不令人知</p>	<p>療虛煩不可攻方 外臺</p> <p>青竹茹 二升                  以水四升煮取三升去滓分溫五服</p>	<p>梔子豉湯 見傷寒                  補心丸                  天王補心丹 道藏                  鎮心丸</p> <p>以上三方                  俱見通治</p>	<p>五竅病 耳目鼻                  口齒</p>	<p>靈樞</p>
--	--	---	---	---------------------------------	---	---	--	-----------



靈脈度篇五臟不和則七竅不通

耳

靈素  
靈厥氣篇精脫者耳聾 液脫者耳數鳴

素繆刺論邪客於手陽明之絡令人耳聾時不聞音刺

手大指次指爪甲上去端如韭葉許各一瘡立聞不已

刺中指爪甲上與肉交者立聞其不時聞者不可刺也

此乃邪氣入絡卒然所得之症故可刺 耳聾刺手陽明不已刺其通脈出

欽定四庫全書

蘭臺軌範

耳前者

病源

耳聾聵耳 津液為風熱所乘結□□成丸塞耳

耳方

補腎治五聾方 千金翼 治勞聾氣聾風聾虛聾毒聾如此

以聾耳中作聲

葶麻仁 五分 杏仁 去皮 桃仁 去皮 蠟 八分 菖蒲

磁石 兩各一 巴豆仁 一分 石鹽 三分 附子 泡 通草





<p>各半                  兩 薰陸香 一分                  松脂 二兩</p>	<p>右十二味先搗諸草石等令細別搗諸仁如脂加松                  脂及蠟合搗數千杵可丸乃止取如棗核大綿裹塞                  耳一日四五度出之轉捻不過三四度日一易之</p>	<p>菴蓉丸 <small>濟生</small>                  治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴</p>	<p>肉菴蓉 山萸肉 石龍芮 <small>一名胡</small>                  椒菜 石菖蒲</p>	<p>兔絲子 菟活 鹿茸 石斛 磁石</p>	<p>附子 <small>各一</small> 全蝎 <small>七個</small>  <small>兩</small> 麝香 <small>半字</small>  <small>去毒</small> 旋入</p>	<p>欽定四庫全書                  蘭臺軌範</p>	<p>右為末煉蜜丸梧子大每服百丸空心酒下或鹽湯                  下</p>	<p>麝香佛手散 <small>奇效</small>                  治五般耳出血水者</p>	<p>麝香 <small>少許</small> 人牙 <small>煨過存性出火毒</small>  <small>以</small> 人牙換石首魚齒亦良</p>	<p>右為細末每用少許吹耳內即乾及治小兒痘瘡出                  現壓者酒調一字服之即出</p>	<p>磁石猪腎羹 <small>養老</small>                  治老人以患耳聾養腎臟強骨氣</p>	<p>磁石 <small>一斤杵碎水淘</small>  <small>去赤汁綿裹</small> 猪腎 <small>一對去脂</small>  <small>膜細切</small></p>
--	--	--	---	------------------------	---	---	--	--	---	--	---	--



右以水五升煮磁石取二升去磁石投腎調和以葱  
豉薑椒作羹空腹食之作粥及入酒並得

通耳法 濟生

磁石 用紫者如  
豆大一塊 穿山甲 燒存性為  
末一字

右用新綿紙裹了塞耳口中銜少許鐵覺耳內如風

雨即愈一方用班毛一箇巴豆一粒研細綿裹塞耳

痛取出

按此症如有火者服清火藥腎虛  
者服補腎藥隨症施治無定方也

欽定四庫全書

蘭臺軌範

目

靈素

靈論疾診尺篇診目痛赤脈從上下者太陽病從下上  
者陽明病從外走者少陽病 決氣篇氣脫者目不明  
素解精微論夫風之中目也陽氣內守於精是火氣燔  
目故見風則泣下也

目方

七寶散 千金 主目醫經年不愈方



<p>琥珀 珠子 珊瑚 決明子 紫貝</p>	<p>石胆 馬珂<small>各一分</small> 硃砂<small>二分</small> 麩仁<small>五錢</small></p>	<p>右為細末傅目中如小豆大日三大良</p>	<p>去醫方<small>千金</small></p>	<p>貝子<small>十枚</small> 為末取如胡豆著醫上日再正仰卧令人</p>	<p>傳之如炊一石米以乃拭之有息肉者加珍珠如貝</p>	<p>子等分研如粉</p>	<p>補肝丸<small>千金</small> 主明目</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>地膚子 藍子 蒺藜子 車前子 瓜</p>	<p>子 兔絲子 菟蔚子<small>各二兩</small> 黃連<small>一兩</small> 青箱子</p>	<p>一合 大黃<small>二兩</small> 決明子 細辛 螢火虫<small>各五</small></p>	<p>桂心<small>五分</small></p>	<p>右十四味搗篩煉蜜和丸飲服如桐子大下十五丸 可加至二十九慎生冷油蒜等物眼暗神方也</p>	<p>磁味丸<small>倪微德原</small> 治神水寬大漸散昏如霧露中行漸</p>	<p>觀空中有黑花觀物成二體及內障神水淡綠色淡</p>
------------------------	--	------------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	---------------	---------------------------------	--------------------	-------------------------	--	---	----------------------------	--	--	-----------------------------



<p>白色及治耳鳴及聾</p>	<p>磁石 二兩 辰砂 一兩 神麴 三兩 生</p>	<p>右三味更以一兩水和作餅煮浮入煎藥煉蜜丸每服十丸加至三十九丸空心米湯下</p>	<p>石斛夜光丸 治神水寬大漸散昏如霧露空中有</p>	<p>黑花靚物成二神水淡綠淡白色者</p>	<p>天門冬 二兩 兔絲子 七錢 人參 茯苓 各二兩 甘菊</p>	<p>山藥 枸杞 石斛 杏仁 各七錢 草決</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>明 八錢 麥冬 熟地 生地 各一兩 肉蓯蓉</p>	<p>青箱子 羚羊角 鎊 蒺藜 川芎 甘草</p>	<p>炙 黃連 防風 枳殼 烏犀 鎊各五錢 牛膝</p>	<p>半 七錢</p>	<p>右二十四味為細末煉蜜丸如桐子大每服三十五</p>	<p>丸溫酒鹽湯送下 眼科藥不外此諸味</p>	<p>羚羊角散 局方 治風熱毒上衝眼目暴發赤腫或生瘡</p>	<p>疼痛隱澀羞明</p>
-----------------	--	---	-----------------------------	-----------------------	---	---	------------------------	--	---	--	-------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------------	---------------



右四味每用一字湯泡候溫閉目洗兩背頭以冷為	洗眼藥 <small>書 養老</small>	許調服亦得食後及臨卧時服 <small>此去醫 通治方</small>	右為末每服二錢用茶清調服或用荆芥湯入茶少	蒺藜 <small>炒去刺</small> 甘草 <small>各等分</small>	木賊草 羌活 <small>不見火</small> 荆芥 蜜蒙花 白	子 穀精草 防風 <small>不見火</small> 黃芩 <small>去土</small> 蔓荆子	欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	草決明 <small>炒</small> 甘菊花 川芎 <small>不見火</small> 蟬退 <small>洗去土</small> 山梔	眼 腫疼痛昏暗視物不明隱澁難開多生眵淚內外障	蟬花散 <small>局方</small> 治肝經蘊熱風毒上攻眼目翳膜遮睛赤	兒亦可服五分	右為細末每服一錢食後溫熱水調下日進三服小	麻 <small>各二兩</small> 決明子 <small>二十枚</small> 草龍胆 <small>去蘆</small> 山梔仁 <small>各五兩</small>	羚羊角 <small>鎊</small> 車前子 甘草 黃芩 川升
----------------------	----------------------------	--	----------------------	---	---------------------------------------	--	-------------------------------	--	------------------------	---	--------	----------------------	--	--------------------------------------



<p>度 <small>胆 入目極痛 煨用頗宜</small></p> <p>按五竅之病惟目病最多所以另有專科此集畧述內治數方以備揀取至於全體治法則當廣求眼科諸書而探討之風火時眼煎方即於丸散中擇對症之藥酌用可也</p>	<p>鼻</p>	<p>靈素</p>	<p>靈憂志無言篇人之鼻洞涕出不收者顏頰不開分氣失也</p>	<p>素五臟別篇五氣入鼻藏於心肺心肺有病而鼻為之</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>蘭臺軌範</p>	<p>不利也</p>	<p>辛頰鼻淵 素氣厥論胆移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為衄蟻瞑目 <small>蟻血汗也</small> 故得之氣厥也</p>	<p>鼻方</p>	<p>通草散 <small>千金</small> 治鼻中息肉</p>	<p>通草 <small>半兩</small> 礬石 <small>一兩</small> 真珠 <small>一銖</small></p>	<p>右三味下篩攪綿如棗核取藥如小豆著綿頭內鼻</p>	<p>中日三次 <small>真珠能去一切息肉</small></p>
---	----------	-----------	--------------------------------	--	------------	--	-----------	------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------------



<p>甌鼻方 <small>千金</small> 治鼻中息肉不得息</p>	<p>礬石 <small>燒</small> 藜蘆 <small>各半</small> 瓜蒂 <small>二七</small> 附子 <small>半兩</small></p>	<p>右四味各搗下篩合和以竹管取藥如小豆大內孔 中吹之以綿絮塞鼻中日再以愈為度 <small>吹不 如吸</small></p>	<p>消鼻痔方</p>	<p>苦丁香 甘遂 <small>各二</small> 青黛 草烏尖 枯礬</p>	<p><small>各二分半</small></p>	<p>右為細末麻油搜令硬不可爛旋丸如鼻孔大小用</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>藥內鼻內令至痔肉上每日一次</p>	<p>凌霄花散 <small>百一</small> 治酒齧鼻</p>	<p>凌霄花 山梔 <small>等分</small></p>	<p>右為末每服二錢食後茶湯調下</p>	<p>蒼耳散 治鼻流涕不止名曰鼻淵</p>	<p>辛夷仁 <small>半兩</small> 蒼耳子 <small>炒二錢半</small> 香白芷 <small>一兩</small> 薄荷 <small>五分</small></p>	<p>右為末每服二錢用葱茶湯食後調服</p>	<p>治鼻淵方 <small>本事</small></p>
---------------------------------------	---	--	-------------	---	----------------------------	-----------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------	---	------------------------	-------------------------------



手陽明	齒痛 靈襍病篇齒痛不惡清飲取足陽明惡清飲取	汁心下澹澹恐人將捕之嗑中訶訶然數唾	口苦 靈邪氣臟腑病形論胆病者善太息口苦嘔宿	靈素	口齒	選用耳痔及諸瘰肉皆同	珠 冰片 礪砂 苦丁香 以上俱可	欽定四庫全書 蘭臺軌範	鼻中瘰肉	雄黃 巴豆炭 製信 提硝	絲瓜連根處藤炙為末酒服 <small>此治鼻中有虫者</small>	又方	藿香為末用猪胆汁或牛胆汁丸每服一錢 <small>按鼻病惟鼻淵最重當博求效方不得徒恃外治法也</small>	又方	山梔子 <small>不拘多少 燒存性</small> 末之搐人鼻中立愈
-----	-----------------------	-------------------	-----------------------	----	----	------------	------------------	----------------	------	--------------	------------------------------------	----	---	----	--------------------------------------





重舌 靈終始篇重舌刺舌柱以披針也	瘖 靈憂志無言篇人卒然無音者寒氣客於厭則厭	不能發發不能下至其開閤不致故無音 肝脈驚暴	有所驚駭脈不至若瘖不治自己 <small>驚駭而瘖者與有娠之瘖皆不必治</small>	口糜 素氣厥論膀胱移熱於小腸鬲腸不便上為口	糜	齒寒 素繆刺論邪客於足陽明之經令人齟齬上齒	寒	欽定四庫全書 蘭臺軌範	病源	齟齬者 睡眠而齒相磨切也此由血氣虛風邪客於	牙車筋脈之間故因睡眠氣息喘而邪動引其筋脈故	上下齒相磨切有聲謂之齟齬	滯頤 脾冷不能收攝涎唾漬於頤也	口齒方	口甘方 <small>素問</small> 有病口甘者此五氣之溢也名曰脾痺夫	五味入口藏於胃脾為之行其精氣津液在脾故令
------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------	----	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------	-----	--	----------------------



<p>口甘也此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥</p>	<p>者也肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉</p>	<p>為消渴治之以蘭除陳氣也</p>	<p><small>蘭草性味甘寒能利水道辟不祥除胸中痰癖</small></p>	<p><small>其氣清香能生津止渴潤肌肉故可除痰積蓄熱之氣</small></p>	<p>口苦方 <small>素問</small> 有病口苦者病名胆痺夫肝者中之將也</p>	<p>取決於胆咽為之使此人者數謀慮不決故胆虛氣</p>	<p>上溢而口為之苦治之以胆募俞</p>	<p><small>數謀慮不決肝胆俱勞勞則必虛虛則氣不固故胆氣上溢而口苦胆募在肋本經之日月也胆俞在背足太陽之穴也經又云口苦取陽陵</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>泉亦胆經之穴在委中之外廉</small></p>	<p>療口瘡 <small>千金</small> 治口瘡以不差入胸中並生瘡三年已上</p>	<p>不瘥者</p>	<p>濃煎薔薇根汁含之又稍稍咽之日三夜一冬用根</p>	<p>夏用莖葉 <small>冬青葉湯亦可漱</small></p>	<p>推頰車法 <small>千金</small> 治失欠頰車蹉開張不合</p>	<p>一人以手指牽其頤以漸推之則復入矣推當疾出</p>	<p>指恐誤嚙傷人指也 <small>外塗南星末</small></p>
-----------------------------	-----------------------------	--------------------	--	---	---	-----------------------------	----------------------	--	---	---	------------	-----------------------------	------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------



口氣鼻穢方 <small>千金</small>	常以月旦日未出時從東壁取步七步回頭向垣立
含水嚙壁七遍口即美香 <small>此名禁法</small>	
口中臭方 <small>千金</small>	
細辛豆蔻含之甚良	
口香去臭方 <small>千金</small>	
井花水三升漱口吐廁中良	
治緊唇方 <small>千金</small>	
欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	
取蛇皮拭淨燒為灰敷之	
又方	
灸虎口男左女右	
塗唇方 <small>千金</small>	治唇黑腫痛癢不可忍
燒亂髮及蜂房六畜毛作灰猪脂和敷之亦治瀋唇	
刺舌法 <small>千金</small>	治舌卒腫滿口溢如吹猪胞氣息不得通
須臾不治殺人	
刺舌兩邊大脈血出勿使刺著舌下中央脈血出不	



止殺人如上治不愈或血出數升則燒鐵篋令赤熨  
瘡數過以絕血也

療舌腫方 千金 治舌腫起如猪胞

釜下墨末以酢厚傅舌上下脫去更傅須臾即消若  
先決出血汁竟傅之彌佳凡此患人皆不識或錯治  
益困殺人甚急但看其舌下自有噤虫形狀或如螻  
蛄或如蚕子細看之有頭尾其頭少白燒鑊釘烙頭  
上使熱即自消

欽定四庫全書

蘭臺軌範

療舌腫方 千金 治舌上黑有數方大如筋出血如湧泉

此心藏病

戎鹽 黃芩 黃柏 大黃 各五兩 人參

桂心 甘草 各二兩

右七味蜜丸梧子大以飲服十九日三亦燒鑊篋烙  
之

療重舌 千金 并治舌上生瘡涎出

以蒲黃末傅之不過三度差



療舌脹方 千金

用雄雞冠血盞盛浸舌咽下即縮

療舌腫脹 方 本事 治心脾壅熱生木舌腫脹

元參 升麻 大黃 犀角 甘草 各等分

右為細末每服三錢水一盞煎至五分溫服不拘時

治失音 書 養老

皂角 一挺刮去黑皮并子 蘿蔔 一個切作片

右以水二碗同煎至半碗服之不過三服便語喫却

欽定四庫全書

蘭臺軌範

蘿蔔更妙 此方乃去喉間之痰涎也

療馬喉痺 千金 治喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉痺

馬鞭草根一握 一名杜牛膝 勿中風截去兩頭搗取汁服

之

琥珀犀角膏 治咽喉

真琥珀 研 犀角 屑生用各一錢 人參 棗仁 茯苓

辰砂 研各二錢 片腦 研一錢

右為末研勻蜜為膏以磁器收貯候其疾作每服一



彈子大以麥冬濃煎湯化下一日連進五服 <small>此治陰火上炎</small>	喉腫刺法 <small>千金翼</small> 治咽痛不得息若毒氣硬咽毒攻咽喉	刺手小指爪文中出血即愈逐左右刺出血神秘立	愈一法刺兩手少商穴出血其穴在大指內廉去爪	甲如韭葉	口旁惡瘡方 <small>千金翼</small>	亂髮灰 故絮灰 黃連末 乾薑末 <small>等分</small>	欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	右四味合和為散以粉瘡上不過三遍	敷面靨方 <small>千金</small> 治黥黥烏靨令面潔白	馬珂 <small>二兩</small> 白附子 鷹屎白 珊瑚 <small>各一兩</small>	右四味研成粉和勻用人乳調每夜取傅面明旦溫	漿水洗之	又方 <small>千金</small>	李子仁為末和雞子白傅一宿即落 一方用白附子末酒和傅之即落
--	--	----------------------	----------------------	------	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------------------	--	----------------------	------	-------------------------	------------------------------



止牙痛方

蟾酥 七分

硃砂

雄黃 各三分

甘草 一分

右研極細以飛麵為丸如菜子大絲綿裹巴塞在痛處

治牙痛仙方

以羊前蹄膝合盤骨以酥塗炙黃為末入細辛末一錢雄黃末五分共三味研極細末擦患處立愈

治牙疼方

千金翼

欽定四庫全書

蘭臺軌範

蒼耳子

五升

右一味以水一斗煮取五升熱含之疼則吐吐復含不過三劑愈無子莖葉皆得用之

如神散

局方

治風牙疔牙攻疰疼痛牙斷動搖連頰浮腫

腫

露蜂房

微炙

川椒

去目及閉口  
微炒出汗

右為末每用一錢水一盞入鹽少許同煎八分乘熱

漱之冷即吐一服立效

二味炙灰為末擦亦效



細辛散 局方  
治風虫牙疼牙斷宣爛牙齒搖動腮頰浮腫

紅椒 硃砂 去殼 鶴蟲 牙皂 華撥 各半

荆芥 細辛 各一兩 白芷 川烏 各二兩

右為細末每用少許於痛處擦之有涎吐出不得咽

少時用溫水漱口頻頻擦之立有神效 治風寒牙疼之症

按牙疼有數種寒熱風火虫虛治各不同非對症則不愈故有效有不效至於喉痺一症病變各殊此屬外科病變無窮茲偶錄一二方未及萬一若欲專治此症非廣求博識不可

欽定四庫全書

蘭臺軌範

襍病

靈素

靈口問篇黃帝曰人之欠者何氣使然岐伯對曰衛氣晝日行於陽夜半則行於陰陰者主夜夜者卧陽者主上陰者主下故陰氣積於下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故數欠陽氣盡陰氣盛則目瞑陰氣盡而陽氣盛則寤矣 黃帝曰人之噦者 乾嘔為噦或云即噦氣 何氣使然岐伯曰穀入於胃胃氣上注於肺今有故寒氣





與新穀氣俱還入於胃新故相亂真邪相攻氣并相逆  
復出於胃故為噦 黃帝曰人之唏者何氣使然岐伯  
曰此陰氣盛而陽氣虛陰氣疾而陽氣徐陰氣盛而陽  
氣絕故為唏 黃帝曰人之振寒者何氣使然岐伯曰  
寒氣客於皮膚陰氣盛陽氣虛故為振寒寒慄 黃帝  
曰人之噫者噫呢何氣使然岐伯曰寒氣客於胃厥逆  
從上下散復出於胃故為噫 黃帝曰人之噦者何氣  
使然岐伯曰陽氣和利滿於心出於鼻故為噦 黃帝  
欽定四庫全書  
蘭臺軌範

曰人之譚者何氣使然岐伯曰胃不實則諸脈虛諸脈  
虛則筋脈懈惰筋脈懈惰則行陰用力氣不能復故為  
譚 黃帝曰人之哀而泣涕出者何氣使然岐伯曰心  
者五臟六腑之主也目者宗脈之所聚也上液之道也  
口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五臟  
六腑皆搖搖則宗脈感宗脈感則液道開液道開故泣  
涕出焉液者所以灌精濡空竅者也故上液之道開則  
泣泣不止則液竭液竭則精不灌精不灌則目無所見



矣 黃帝曰人之太息者何氣使然岐伯曰憂思則心	係急心係急則氣道約約則不利故太息以伸出之	黃帝曰人之涎下者何氣使然岐伯曰飲食者皆入於	胃胃中有熱則虫動虫動則胃緩胃緩則廉泉開故涎	下 黃帝曰人之耳中鳴者何氣使然岐伯曰耳者宗	脈之所聚也故胃中空則宗脈虛虛則下溜脈有所竭	者故耳鳴 黃帝曰人之自齧舌者何氣使然此厥逆	走上脈氣輩至也少陰氣至則齧舌少陽氣至則齧頰	欽定四庫全書	蘭臺軌範	陽明氣至則齧唇矣凡此十二邪者皆奇邪之走空竅	者也故邪之所在皆為不足	<small>經氣為邪所據則正氣不能復歸故為不足當引本</small>	<small>經之正氣以逐邪出外所謂正氣者即本經之氣故能</small>	<small>禦邪此指針法言之庸醫不知竟用補藥於邪氣所留</small>	<small>之經則是補住其</small>	<small>邪矣害忍言哉</small>	故上氣不足腦為之不滿耳為之苦	鳴頭為之苦傾目為之眩中氣不足溲便為之變腸為	之苦鳴下氣不足則乃為痿厥心惋 五味篇酸走筋	多食之令人癢鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之	令人洞心苦走骨多食之令人變嘔甘走肉多食之令
-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



人悶心 師傳篇岐伯曰入國問俗入家問諱上堂問	禮臨病人問所便 <small>此句為萬世辨症之秘訣</small> 黃帝曰便病人奈何岐	伯曰夫中熱消痺則便寒寒中之屬則便熱胃中熱則	消穀令人懸心善饑臍以上皮熱腸中熱則出黃如糜	臍以下皮寒 <small>按寒字當作熱字</small> 胃中寒則腹脹腸中寒則腸鳴	飧泄 <small>凡脹滿宜濕藥飧泄亦同</small> 胃中寒腸中熱則脹而且泄胃中熱	腸中寒則疾饑小腹痛脹 黃帝曰胃欲寒飲腸欲熱	飲 百病始生篇陽絡傷則血外溢血外溢則衄血陰	欽定四庫全書	絡傷則血內溢血內溢則後血腸胃之絡傷則血溢於	腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并合凝聚不得散而	積成矣 邪客篇黃帝問於岐伯曰人有八虛各何以	候岐伯答曰以候五臟黃帝曰候之奈何岐伯曰肺心	有邪其氣留於兩肘肝有邪其氣留於兩腋脾有邪其	氣留於兩髀腎有邪其氣留於兩膕凡此八虛者皆機	關之室真氣之所過血絡之所遊邪氣惡血固不得住	留住留則傷筋絡骨節機關不得屈伸故痠攣也 大
-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	---	---	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

蘭臺軌範



惑篇黃帝曰人之善饑而不嗜食者何氣使然岐伯曰  
精氣并於脾熱氣留於胃胃熱則消穀穀消故善饑胃  
氣逆上則胃脘寒故不嗜食 宣明五氣論五味所入  
酸入肝辛入肺苦入心鹹入腎甘入脾是謂五入五氣  
所病心為噫肺為欬肝為語脾為吞腎為欠為噦胃為  
氣逆為噦為恐大腸小腸為泄下焦溢為水膀胱不利  
為癰不納為遺溺胆為怒是為五病五精所并精氣并  
於心則喜并於肺則悲并於肝則憂并於脾則畏并於

欽定四庫全書

蘭臺軌範

腎則恐是為五并虛而相并者也五臟所惡心惡熱肺  
惡寒肝惡風脾惡濕腎惡燥是為五惡五臟化液心為  
汗肺為涕肝為淚脾為涎腎為唾是為五液五味所禁  
辛走氣氣病無多食辛鹹走血血病無多食鹹苦走骨  
骨病無多食苦甘走肉肉病無多食甘酸走筋筋病無  
多食酸是為五禁無令多食五病所發陰病發於骨陽  
病發於血陰病發於肉陽病發於冬陰病發於夏是為  
五發五邪所亂邪入於陽則狂邪入於陰則痺搏陽則



為癩疾搏陰則為瘡陽入之陰則靜陰出之陽則怒是  
為五亂五邪所見春得秋脈夏得冬脈長夏得春脈秋  
得夏脈冬得長夏脈名曰陰出之陽病善怒不治是謂  
五邪皆同命死不治五臟所藏心藏神肺藏魄肝藏魂  
脾藏意腎藏志是為五臟所藏五臟所主心主脈肺主  
皮肝主筋脾主肉腎主骨是謂五主五勞所傷以視傷  
血以卧傷氣以坐傷肉以立傷骨以行傷筋是謂五勞  
所傷五脈應象肝脈弦心脈鈎脾脈代肺脈毛腎脈石

欽定四庫全書

蘭臺軌範

是謂五臟之脈 至真要大論大要曰君一臣二奇之  
制也君二臣四偶之制也君二臣三奇之制也君三臣  
六偶之制也故曰近者奇之遠者偶之汗者不以奇下  
者不以偶補上治上制以緩補下治下制以急急則氣  
味厚緩則氣味薄適其至所此之謂也是故平氣之道  
近而奇偶制小其服也遠而奇偶至大其服也大則數  
少小則數多多則九之少則二之奇之不去則偶之是  
謂重方偶之不去則反佐以取之所謂寒熱溫涼反從



其病也 岐伯曰辛甘發散為陽酸苦涌泄為陰鹹味  
涌泄為陰淡味滲泄為陽六者或收或散或緩或急或  
燥或潤或奠或堅以所利而行之調其氣使其平也  
岐伯曰有毒無毒所治無主適大小為制也帝曰請言  
其制岐伯曰君一臣二制之小也君一臣三佐五制之  
中也君一臣三佐九制之大也寒者熱之熱者寒之微  
者逆之甚者從之堅者削之客者除之勞者溫之結者  
散之留者攻之燥者濡之急者緩之散者收之損者益  
欽定四庫全書  
蘭臺軌範  
之逸者行之驚者平之上之下之摩之浴之薄之切之  
開之發之適事為故 帝曰反治何謂岐伯曰熱因寒  
用寒因熱用塞因塞用通因通用必伏其所主而先其  
所因其始則同其終則異可使破積可使潰堅可使氣  
和可使必已 岐伯曰主病之謂君佐君之謂臣應臣  
之謂使非上下三品之謂也 岐伯曰諸寒之而熱者  
取之陰熱之而寒者取之陽所謂求其屬也帝曰善服  
寒而反熱服熱而反寒其故何也岐伯曰治其王氣是



以反也 五味入胃各歸所喜攻酸先入肝苦先入  
心甘先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣物化之常  
也氣增而以天之由也 陰陽應象大論因其輕而揚  
之因其重而減之因其衰而彰之形不足者溫之以氣  
精不足者補之以味其高者因而越之其下者引而竭  
之中滿者寫之於內其有邪者瀆形以為汗 五常政  
大論岐伯曰大毒治病十去其六常毒治病十去其七  
小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉果菜食

欽定四庫全書

蘭臺軌範

養盡之無使過之傷其正也不盡行復如法必先歲氣  
無伐天和 至真要大論帝曰願聞病機何如岐伯曰  
諸風掉眩皆屬於肝諸寒收引皆屬於腎諸氣臞鬱皆  
屬於肺諸濕腫滿皆屬於脾諸熱 瘧皆屬於火諸痛  
痒瘡皆屬於心諸厥固泄皆屬於下諸痿喘嘔皆屬於  
上諸禁鼓慄如喪神守皆屬於火諸痙項強皆屬於濕  
諸逆衝上皆屬於火諸脹腹大皆屬於熱諸燥狂越皆  
屬於火諸暴強直皆屬於風諸病有聲鼓之如鼓皆屬



於熱諸病肘腫疼酸驚駭皆屬於火諸轉反戾水液渾濁皆屬於熱諸病水液澄澈清冷皆屬於寒諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於熱 生氣通天論陽因而上衛外者也因於寒欲如轉樞起居如驚神氣乃浮因於暑汗煩則喘喝靜則多言體若燔炭汗出而散因於濕首如裹濕熱不攘大筋縲短小筋弛長縲短為拘弛長為痿因於氣為腫四維相代陽氣乃竭陽氣者煩勞則張精絕辟積於夏使人煎厥目盲不可以視耳閉不可以聽潰

欽定四庫全書

蘭臺軌範

潰乎若壞都汨汨乎不可止陽氣者大怒則形氣絕而血菟於上使人薄厥有傷於筋縱其若不容汗出偏沮使人偏枯汗出見濕乃生痲痺高粱之變足生大丁受如持虛勞汗當風寒薄為皴鬱乃痲陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生大僂陷脈為痿留連肉腠俞氣化薄傳為善畏及為驚駭營氣不從逆於肉理乃生癰腫魄汗未盡形弱而氣爍穴俞以閉發為風癰故風者百病之始也清靜則肉腠閉拒雖有大風





苛毒弗之能害此因時之序也 春傷於風邪氣留連  
乃為洞泄夏傷於暑秋為痲瘧秋傷於濕上逆而發  
為痿厥冬傷於寒春必溫病四時之氣更傷五臟 通  
平虛實論黃帝問曰何為虛實岐伯對曰邪氣盛則實  
精氣奪則虛 刺志論氣盛身寒得之傷寒氣虛身熱  
得之傷暑穀入多而氣少者得之有所脫血濕居下也  
穀入少而氣多者邪在胃及與肺也 玉肌真臟論黃  
帝曰余聞虛實以決死生願聞其情岐伯曰五實死五

欽定四庫全書

蘭臺軌範

虛死帝曰願聞五實五虛岐伯曰脈盛皮熱腹脹前後  
不通悶瞖此謂五實脈細皮寒氣少泄痢前後飲食不  
入此謂五虛帝曰其時有生者何也岐伯曰漿粥入胃  
泄注止則虛者活身汗得後痢則實者活此其候也  
臟氣法時論肝苦急急食甘以緩之肝欲散急食辛以  
散之用辛補之酸寫之心苦緩急食酸以收之心欲奠  
急食鹹以奠之用鹹補之甘寫之脾苦濕急食苦以燥  
之脾欲緩急食甘以緩之用苦寫之甘補之肺苦氣上



逆急食苦以泄之肺欲收急食酸以收之用酸補之辛	寫之腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣也腎	欲堅急食苦以堅之用苦補之鹹寫之 夫邪之客於	身也以勝相加至其所生而愈至其所不勝而甚至於	所生而持自得其位而起必先定五臟之脈乃言間甚	之時死生之期也 毒藥攻邪五穀為養五果為助五	畜為益五菜為充氣味合而服之以補精益氣	<small>以上皆辨病治</small>	<small>病之總訣能精通其理方能識症擇方</small>	欽定四庫全書 蘭臺軌範	解飭 素玉肌真臟論冬脈太過則令人解飭脊脈痛	而少氣不欲言 刺瘡論足少陽之瘡令入身體解飭	寒不甚熱不甚惡見人見人心惴惴然熱多汗出甚	食飭 素氣厥論大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食	飭胃移熱於胆亦曰食飭	膈洞 靈根結篇太陽為開開折則食廩無所輸膈洞	故開折者氣不足而生病 邪氣臟腑病形篇腎脈微	緩為洞洞者食不化下噎還出
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	------------	-----------------------	-----------------------	--------------



重強 素玉機真藏論脾脈不及則令人九竅不通名曰重強

齩齒 靈論疾診尺篇診齩齒痛按其陽之來有過者

熱在左左熱在右右熱在上上熱在下下熱 繆刺論

齒齩刺手陽明不已刺其脈入齒中者立已 手陽明之脈貫頰入

於齒中故當刺商陽穴不已則刺其痛脈之入齒中者按甲乙經註手陽明脈商陽二間三間合谷陽谿偏

歷濕溜七穴主齒痛

金匱

欽定四庫全書

蘭臺軌範

跌蹶 其人但能前不能却刺膻入二寸此太陽經傷也

所載雜病其方俱散見於各證條內茲不復贅按病施治無遺法矣

蘭臺軌範卷七



欽定四庫全書

子部  
蘭臺軌範卷八

詳校官太醫院院使臣張肇基

沈馬臣王坦修覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官學正臣湯垣

謄錄舉人臣蔡枝華



欽定四庫全書

蘭臺軌範卷八

吳江徐大椿撰

婦人

素問

六元正紀大論黃帝問曰婦人身重毒之何如岐伯曰  
有故無殞亦無殞也帝曰願聞其故岐伯曰大積大聚  
其可犯也衰其大半而止過者死 腹中論帝曰何以

欽定四庫全書

蘭臺軌範

知懷子之且生也岐伯曰身有病而無邪脈也 奇病  
論黃帝問曰人有重身九月而瘖此何為也岐伯曰胞  
之絡脈絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少  
陰之脈貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰  
無治也當十月復 平人氣象論婦人手少陰脈動甚  
者妊子也

難經

妊之為病其內苦結女子為瘕聚 左者為腎右者為



命門命門者諸精神之所舍原氣之所繫也男子以藏精女子以繫胞

金匱

問曰新產婦人有三病一者病瘧二者病鬱冒三者大便難何謂也曰新產血虛多汗出喜中風故令病瘧亡血復汗寒多故多鬱冒亡津液胃燥故大便難產婦鬱冒其脈微弱嘔不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥

欽定四庫全書

蘭臺軌範

孤陽上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅嘔不能食小柴胡湯主之雖當汗出不宜太過師曰產婦腹痛法當以枳實芍藥散假令不愈者此為腹中有瘀血著臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利

產後七八日無太陽証少腹堅痛此惡露不盡不大便煩燥發熱切脈微實再倍發熱日晡時煩燥者不食食則讞語至夜即愈宜大承氣湯主之熱在裏結在膀胱



也

婦人傷寒發熱經水適來書日明了暮則譫語如見鬼  
狀者此為熱入血室治之無犯胃氣及上二焦必自愈  
婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身

涼和胸脇滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也當刺

期門隨其實而取之

期門二穴在乳頭直下四寸第  
二肋端此等刺法最易學也

婦人之病因虛積冷結氣為諸經水斷絕至有歷年血  
寒積結胞門寒傷經絡凝堅在上嘔吐涎唾以成肺癰

欽定四庫全書

蘭臺軌範

形體損分在中盤結繞臍寒疝或兩脇疼痛與臟相連  
或結熱中痛在關元脈數無瘡肌若魚鱗時著男子非  
止女身在下未多經候不勻令陰掣痛少腹惡寒或引  
腰脊下根氣衝氣衝急痛膝脛疼煩奄忽眩冒狀如厥  
癩或有憂慘悲傷多嗔此皆帶下非有鬼神以則羸瘦  
脈虛多寒三十六病千變萬端審脈陰陽虛實緊弦行  
其針藥治危得安其雖同病脈各異源子當辨記勿謂  
不然



<p>問曰婦人年五十所病下痢數十日不止暮即發熱小</p>	<p>腹裏急腹滿手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病屬帶</p>	<p>下何以故曾經半產瘀血在少腹不去何以知之其証</p>	<p>唇口乾燥故知之當以溫經湯主之</p>	<p>婦人陷經漏下黑不解膠薑湯主之</p>	<p><small>方無考校本云宜是膠艾湯</small></p>	<p>婦人懷娠六七月脈弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少</p>	<p>腹如扇<small>形容惡寒之盛</small>所以然者子臟開故也當附子湯溫之</p>	<p><small>方無考</small></p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>蘭臺軌範</p>	<p>婦人傷胎懷身腹滿不得小便從腰以下重如有水氣</p>	<p>狀懷身七月太陰當養不養此心氣實當刺瀉勞宮關</p>	<p>元小便微利則愈</p>	<p>病源</p>	<p>妊娠數墮胎候 血氣虛損子臟為風冷所居則血氣</p>	<p>不足故不能養胎所以致胎數墮候妊娠而恒腰痛者</p>	<p>喜墮胎也 <small>按墮胎皆由於血熱</small></p>	<p>兩胎一死一生候 陽施陰化精盛有餘者則成兩胎</p>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------	--	---------------------------	---------------	-------------	------------------------------	------------------------------	----------------	-----------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------





其兩胎而一死者候其胎上冷是胎已死也

妊娠過年不產 由挾寒冷宿血在胞而有胎則冷血相搏令胎不長產不以時若其胎在胞日月雖多其胎翳小轉動勞羸是挾於病必過時乃產

胞轉 臍下急痛小便不通是也其病由不同胞轉及胞落並致死

帶下三十六疾 諸方說三十六疾者是十二癥九痛

七害五傷三固是也十二癥者是所下之物一如膏二

欽定四庫全書

蘭臺軌範

如青血三如紫汁四如赤皮五如膿痂六如豆汁七如

葵根羹八如凝血九如青血血似水十如米汁十一如

月浣十二經度不應期也九痛者一陰中傷痛二陰中

淋痛三小便即痛四寒冷痛五月水來腹痛六氣滿並

痛七汁出陰中如虫嚙痛八脇下皮痛九腰痛七害者

一害食二害氣三害冷四害勞五害房六害妊七害睡

五傷者一窮孔痛二中寒熱痛三小腹急牢痛四臟不

仁五子門不正引腎痛三固者一月水閉塞不通其餘



二固文缺不載

與鬼交 臟腑虛神守弱鬼氣得病之也其狀不欲見人獨言笑悲泣脈來遲伏或如鳥啄

惡阻 心中潰悶頭眩四肢煩疼懈惰不欲執作惡聞食氣欲噉食鹹酸果食多睡少起乃至三四月以上大劇者不能自勝舉也此由婦人元本虛羸血氣不足腎氣又弱兼當風食冷太過心下有痰氣挾之而有妊也子滿 此由脾胃虛弱有停水而挾以妊娠也水漬於

欽定四庫全書

蘭臺軌範

胞則令胎壞惟將產之月而脚微腫則其產易蓋胞藏水血多也初妊娠者則反壞胎

胎漏 此由衝任脈虛不能約制太陽少陰之經血也亦名胞阻漏血盡則人斃也

鬼胎 正虛則妖魅精入臟狀如懷娠

胎疸 其母臟氣熱熏蒸於胎

血分 是經血先斷而後成水病以其月水壅塞不通經血分而為水故曰血分



胞絡傷損 子臟虛冷氣下衝則陰挺出謂之下脫亦有因產用力偃氣而陰脫者

陰臭 由子臟有寒寒搏於津液蘊積氣衝於陰故變

臭也 此亦由內熱所致

子臟開 由子臟宿虛因產冷氣乘之血氣得冷不得

相容故令開也

婦人方

桂枝茯苓圓 金匱 治婦人宿有癥病經斷未及三月而

欽定四庫全書

蘭臺軌範

得漏下不止胎動在臍上者為癥瘕害妊娠六月動者前三月經水利時胎也下血者後斷三月衄也所以血不止者其癥不去故也當下其癥此主之

桂枝 丹皮 茯苓 桃仁 去皮 各等分 芍藥

右五味末之煉蜜丸如兔屎大每日食前服一丸不

知加至三丸

當歸芍藥散 金匱 治婦人懷娠腹中疴痛

當歸 三兩 芍藥 一斤 茯苓 四兩 白朮 四兩 澤瀉 半斤



白朮散 <small>金匱</small> 妊娠養胎	產胎無苦疾產後百病悉主之	右五味杵為散酒服方寸七日再服妊娠常服即易	當歸 黃芩 芍藥 芎藭 白朮 <small>各一斤 半斤</small>	當歸散 <small>金匱</small> 婦人妊娠宜常服	右三味末之蜜丸如小豆大飲服三丸加至十丸	當歸 貝母 苦參 <small>各等分</small>	當歸貝母苦參丸 <small>金匱</small> 治妊娠小便難飲食如故	欽定四庫全書 蘭臺軌範	右二味杵為散飲服方寸七日三服小便利則愈	葵子 一斤 茯苓 三兩	惡寒起即頭眩	葵子茯苓散 <small>金匱</small> 治妊娠有水氣身重小便不利洒淅	右三味末之生薑汁糊丸如梧子大飲服十丸日三	乾薑 人參 半夏 <small>各一兩 二兩</small>	乾薑人參半夏丸 <small>金匱</small> 治妊娠嘔吐不止	芎藭 三兩 杵為散取方寸匕酒和日三服
----------------------------------	--------------	----------------------	---	-------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	--	----------------	---------------------	----------------------	--------	--	----------------------	---	---	--------------------------



白朮	芎藭	蜀椒	三分 去汗牡礪			
右四味杵為散酒服一錢七日三服夜一服但苦痛加芍藥心下毒痛倍加芎藭心煩吐痛不能飲食加細辛一兩半夏大者二十枚服之後更以酸漿水服之若嘔以醋漿水服復不解者小麥汁服之以後渴者大麥粥服之病雖愈服之勿置	分兩 原本無	枳實芍藥散	金匱			
治產後腹痛煩滿不得卧	枳實	燒令黑 勿太過	芍藥	等分		
欽定四庫全書	蘭臺軌範	右二味杵為散服方寸七日三服并主癰膿以麥粥下之假令腹痛不愈此為腹中有瘀血著臍下宜下瘀血湯主之亦主經水不利	下瘀血湯	金匱		
大黃	三兩	桃仁	二十枚	蟅虫	二十枚	末之蜜和為四丸
以酒一升煎一丸取八合頓服之新血下如豚肝	丸	以	作煎又一法	按	新字當作瘀字	
竹葉湯	金匱	治產後中風發熱面正赤喘而頭痛				



半夏 一升	厚朴 三兩	茯苓 四兩	生薑 五兩	乾蘇葉 一
半夏厚朴湯 <small>金匱</small>	治婦人咽中如有炙臠			
右六味水七升煮二升半內膠令消分溫三服				
藥皮 三兩	白頭翁 兩	甘草 三兩	阿膠 兩	秦皮 三兩
黃連 二	白頭翁加甘草阿膠湯 <small>金匱</small>			
治產後下痢虛極				
有熱倍白薇 煩喘者加柏實一分				
右五味末之棗肉丸如彈子大飲服一丸日三夜二				
欽定四庫全書				
蘭臺軌範				
生竹茹 二分	石膏 二分	桂枝 一分	甘草 七分	白薇 一
竹皮大丸 <small>金匱</small>				
治婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣				
嘔者加半夏半升洗				
頸項強用大附子一枚破之如豆入前藥揚去沫				
右十味水一斗煮取二升半分溫三服溫覆取汗出				
人參	甘草 兩	附子 一枚	大棗 十五枚	生薑 五兩
竹葉 一把				
葛根 三兩				
防風				
桂枝				
桔梗				



兩	右五味水七升煮取四升分溫四服日三夜一	甘麥大棗湯 <small>金匱</small> 治婦人臟燥悲傷欲哭象如神靈所	作數欠伸此主之	甘草 <small>三兩</small> 小麥 <small>一升</small> 大棗 <small>十枚</small>	右三味水六升煮取三升分溫三服亦補脾氣	溫經湯 <small>金匱</small> 主婦人曾經半產瘀血在少腹不去其証	唇口乾燥	欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>	吳茱萸 <small>三兩</small> 當歸 <small>二兩</small> 芎藭 <small>二兩</small> 芍藥 <small>二兩</small> 人參 <small>二兩</small>	桂枝 <small>二兩</small> 阿膠 <small>二兩</small> 丹皮 <small>二兩</small> 生薑 <small>三兩</small> 甘草 <small>二兩</small>	半夏 <small>一升</small> 麥冬 <small>一升</small> 去心 水一斗煮取三升分溫三服	亦主婦人少腹寒久不受胎兼治崩中去血或月	水來過多及至期不來 <small>調經總方</small>	土瓜根散 <small>金匱</small> 治帶下經水不利少腹滿痛經一月再	見	土瓜根 芍藥 桂枝 廔虫 <small>各三兩</small>
---	--------------------	--	---------	--	--------------------	--	------	-------------------------------	---	--	--	---------------------	-------------------------------	--	---	---------------------------------



<p>右三味杵為散酒服方寸七日三服 <small>此治療血伏留</small></p>	<p>旋復花湯 <small>全匱</small> 寸口脈弦而大弦則為減大則為芤減</p>	<p>則為寒芤則為虛寒虛相搏此名曰革婦人則半產</p>	<p>漏下此湯主之</p>	<p>旋復花 <small>三兩</small> 葱 <small>十四莖</small> 新絳 <small>少許</small> 水三升煮取一升頓</p>	<p>服</p>	<p>大黃甘遂湯 <small>全匱</small> 治婦人少腹滿如敦狀小便微難而</p>	<p>不渴此為水與血俱結在血室也此主之</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p>大黃 <small>四兩</small> 甘遂 <small>二兩</small> 阿膠 <small>二兩</small></p>	<p>右三味以水三升煮取一升頓服其血當下</p>	<p>礬石丸 <small>全匱</small> 治經水閉不利臟堅癖不止中有乾血下</p>	<p>白物</p>	<p>礬石 <small>三分</small> 杏仁 <small>一分</small></p>	<p>右二味末之煉蜜丸棗核大內臟中劇者再內之</p>	<p>紅藍花酒 <small>全匱</small> 治婦人六十二種風腹中血氣刺痛</p>	<p>紅藍花 <small>一兩</small> 酒 <small>一大升</small> 煎減半頓服一半未止再服</p>
---	---	-----------------------------	---------------	---	----------	---	-------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------	---	-----------	--	----------------------------	--	---





蛇床子散

金匱

治婦人陰寒溫陰中坐藥

蛇床子一味末之以白粉少許和合相得如棗大綿

裹內之自然溫

狼牙湯

金匱

治婦人陰中生瘡蝕爛者

狼牙三兩水四升煮取半升以綿纏筋如繭絞湯瀝

陰中日四遍

三物黃芩湯

千金

治婦人在草蓐自發露得風四肢苦

煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之

欽定四庫全書

蘭臺軌範

黃芩

一兩

苦參

二兩

地黃

四兩

右三味水六升煮取二升溫服一升多吐下虫

當歸建中湯

千金

治產後虛羸不足腹中刺痛不止吸

吸少氣或苦少腹中急摩痛引腰背不能食飲產後

一月日得服四五劑為善令人強壯宜

當歸

四兩

桂枝

三兩

芍藥

六兩

生薑

三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

右六味水一斗煮取三升分溫三服一日令盡 若



草 <small>灸</small>	地榆 <small>酒洗</small>	川羌活	橘紅	白芍 <small>各五錢酒</small>	浸 炒蒲黃 <small>隔紙</small>	茯苓	桃仁 <small>各一兩去皮尖油</small>	牛膝 <small>五錢酒洗</small>	甘	當歸 <small>酒洗</small>	芎藭	香附 <small>醋炒</small>	延胡索 <small>酒炒</small>	蒼朮 <small>泔米</small>	人參	盆盛之大黃鍋粬亦鏟下入後藥同磨	再熬次下蘇木汁次下紅花汁熬成大黃膏取入瓦	斤熬之又加醋三斤次第加畢然後下黑豆汁三碗	斤文火熬之以長木筋不住手攪之成膏再加醋三	碗煎三滾 去渣取汁 米醋 <small>九斤陳者更佳</small>	將大黃末入淨鍋下米醋三	欽定四庫全書 蘭臺軌範	去豆不用將殼曬乾其汁留用	紅花 <small>三兩炒黃色入好酒三四</small>	錦紋大黃 <small>一斤為末</small>	蘇木 <small>三兩打碎用河水五碗煎汁三碗聽用</small>	大黑豆 <small>三升</small>	回生丹 此催生之聖藥	右為細末每服二錢水一盞酒二分煎七分溫服	芎藭 <small>二兩</small>	當歸 <small>二兩</small>	佛手散 <small>本事方又名芎歸湯</small>	調經	去血過多崩傷內衄不止加地黃六兩阿膠二兩	大虛者加飴糖六兩湯成內之火上煖令飴消	若
-----------------------	-------------------------	-----	----	---------------------------	-------------------------------	----	------------------------------	---------------------------	---	-------------------------	----	-------------------------	--------------------------	-------------------------	----	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------	----------------	--------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------	----	---------------------	--------------------	---



<p>炒 木瓜 青皮 各三錢 去穢炒乳香 沒藥 各二錢 益母</p>	<p>草 三兩 木香 四錢 白朮 三錢 米炒烏藥 二兩 皮 良薑 四</p>	<p>錢 馬鞭草 五錢 秋葵子 三錢 熟地 一兩 酒浸九次 山</p>	<p>稜 五錢 醋浸 五靈脂 五錢 醋煮化 山萸肉 五錢 酒浸蒸搗上</p>	<p>三十味并前黑豆殼共晒為末入石臼內 大黃膏拌</p>	<p>勻再下熟蜜一斤共搗千杵為九重二錢 七八分陰</p>	<p>乾不可火烘燻蠟為殼護之用時去蠟</p>	<p>開骨散 臨產婦交骨不開</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>當歸 五錢 龜板 三錢 醋炙研 芎藭 二錢 婦人髮 一團 水煎</p>	<p>服</p>	<p>奪命散 產後</p>	<p>沒藥 血竭 等分</p>	<p>右研為細末纔產下用童便細酒半杯煎一二沸調</p>	<p>下二錢良以再服其惡血下行便不衝上免生百疾</p>	<p>下死胎方 本亭</p>	<p>桂木 三錢 麝香當門子 一粒 全研溫酒服須臾如手</p>
--	--	---	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--	----------	---------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------------------------



推下比之用水銀等藥此不致損元氣也	交加散 <small>本事</small> 治婦人榮衛不通經脈不調腹中撮痛氣	多血少結聚為瘕產後中風	生地黄 <small>五兩研</small> 生薑 <small>五兩研</small> <small>取汁</small>	右交互用汁浸一夕各炒黃漬汁盡為度末之尋常	腹痛酒調下三錢尤不可缺	護胎方 <small>本事</small> 治妊娠時氣身熱令子不落	伏龍肝為末水調塗臍下二寸乾則易差即止 又	欽定四庫全書 蘭臺軌範	取井中泥塗心下乾則易	海蛤散 <small>本事</small> 治婦人傷寒血結胸膈揉而痛不可撫近	海蛤 滑石 甘草 <small>各一兩</small> 芒硝 <small>半兩</small>	右為末每服二錢雞子清調下	小柴胡加地黄湯 <small>本事</small> 治婦人室女傷寒發熱或發寒	熱經水適來或適斷晝則明了夜則譫語如見鬼狀	亦治產後惡露方來忽爾斷絕	柴胡 <small>一分</small> 人參 黃芩 甘草 生地黄 <small>各半</small>
------------------	--	-------------	---	----------------------	-------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	------------	--	--	--------------	--	----------------------	--------------	---



兩	右為末每用五錢水二盞生薑五片棗二枚煎至八分去渣服 <small>此即熱入血室</small>	烏雞煎圓 <small>局方</small> 治婦人胎前產後諸般疾患並皆治之	烏雄雞 <small>一隻</small> 人參 白朮 石牀 丹皮	黃芪 烏藥 草薺 延胡索 地黃	<small>熟乾者</small> 木香 琥珀 肉豆蔻 <small>各半</small> 陳皮	紅花 川烏 <small>泡</small> 海桐皮 芍藥 <small>白者</small> 附子 <small>泡</small>	欽定四庫全書 蘭臺軌範	<small>皮</small> 肉桂 <small>去粗</small> 蓬莪茂 <small>各三兩</small> 蒼朮 <small>米泔浸切</small>	右細剉用烏雄雞一隻湯搯去毛及腸肚將上藥安	放雞腹中用新瓦瓶好酒一斗同煮令乾去雞骨以	油單紙盛焙乾為細末煉蜜丸如梧子大每服三十	丸	猪蹄湯 <small>局方</small> 治乳婦氣少血衰脈澁不行絕無乳汁	猪蹄 <small>一隻</small> 木通 <small>五兩</small>	右將猪蹄淨洗依食法事治次用水一斗同木通浸
---	--	--	-----------------------------------	-----------------	---	---	----------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	---	---------------------------------------	---	----------------------



<p>煮得四五升取汁飲如乳不下再服為妙</p>	<p>紫石英丸 <small>局方</small> 治婦人久冷無子及數經墮胎經水不</p>	<p>調崩漏帶下三十六疾積聚癥瘕少腹急重小便白</p>	<p>濁</p>	<p>烏賊魚骨 <small>燒灰</small> 甘草 <small>炙</small> 柏子仁 <small>微炒</small> 山蘓 <small>各一兩半</small> 辛</p>	<p>萸仁 肉桂 <small>去粗皮</small> 卷柏 石斛 乾熟地黄</p>	<p>芎藭 牡蒙 禹餘糧 <small>醋淬七次</small> 人參</p>	<p>續斷 細辛 桑寄生 牛膝 厚朴</p>	<p>欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small></p>	<p><small>薑汁</small> 食茱萸 當歸 <small>炒</small> 川烏 <small>泡去皮臍</small> 乾薑 泡 丹</p>	<p>皮 <small>各一兩一分</small> 天門冬 <small>去心</small> 紫石英 <small>細研飛</small> 各三兩</p>	<p>右為細末煉蜜丸如梧子大每服三十九丸溫酒或米</p>	<p>飲下空心食前日二服</p>	<p>催生丹 <small>局方</small> 治產婦產育艱難或逆或橫並宜服之</p>	<p>母丁香 <small>末一錢</small> 麝香 <small>別研一錢</small> 兔腦髓 <small>臘月者去皮搗如泥</small> 乳香 <small>別研極細</small></p>	<p>右拌勻以免腦和圓如雞豆大陰乾用油紙密封貼</p>
-------------------------	---	-----------------------------	----------	--	--	---	------------------------	-----------------------------------	--	--	------------------------------	------------------	--	---	-----------------------------



<p>溫水服一丸即時產下隨男左女右手中握丸藥出是驗</p>	<p>小調經散 <small>局方</small> 治產後敗血循經流入四肢腐爛如水服此血行腫消則愈</p>	<p>沒藥 琥珀 桂心 白芍 當歸 <small>各一錢</small></p>	<p>細辛 麝香 <small>各五分</small> 為末薑汁酒各少許調服 <small>此方治血</small></p>	<p>二味參蘓丸 治產後瘀血入肺咳嗽喘急</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>人參 <small>一兩</small> 紫蘇 <small>二兩</small> 疑 <small>是蘇木</small></p>	<p>作一劑水煎服若既愈當用六君子湯以補脾胃若口鼻黑氣起急用此藥加附子五錢亦有得生者</p>	<p>紫蘇飲 <small>嚴氏</small> 治子懸腹痛或臨產驚恐氣結連日不安或大小便不利</p>	<p>當歸 甘草 大腹皮 <small>黑豆浸</small> 人參 芎藭</p>	<p>橘皮 <small>各七分</small> 白芍 <small>炒五分</small> 紫蘇 <small>一錢</small> 薑葱引水煎服</p>	<p>紫散 <small>元和紀</small> 止血崩</p>
-------------------------------	---	--	--	--------------------------	--------------------	---	--	---	---	--	----------------------------------



<p>香附子 <small>炒黑存性</small> 為末熱酒調方寸匕再服立定生末安胎</p>	<p>秦桂丸 <small>方 襍抄</small> 治婦人無子</p>	<p>秦艽 桂心 杜仲 防風 厚朴 <small>各三錢</small></p>	<p>附子 <small>生用</small> 茯苓 <small>各一兩</small> 白薇 乾薑 沙參</p>	<p>牛膝 半夏 <small>各五錢</small> 人參 一兩 細辛 一兩</p>	<p>右十四味為末煉蜜丸如菉豆大每服三十九丸空心</p>	<p>米飲任下未效再加數丸已覺有孕便不可服</p>	<p>求嗣方 <small>方 襍抄</small> 壬子日合藥別日不用名助陽丹</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>細辛 五錢 牛膝 二兩 茯苓 一兩 沒藥 四錢 吳茱萸</p>	<p>白薇 白芨 秦艽 乳香 防風</p>	<p>當歸 <small>去蘆各三錢</small> 肉桂 厚朴 石菖蒲 附</p>	<p>子 <small>各二錢</small> 人參 一錢 <small>以上二方治胞寒無子者陰虛血少者非宜</small></p>	<p>黃龍湯 <small>活人書</small> 妊娠寒熱頭疼嘿嘿不欲飲食脇下痛嘔</p>	<p>逆痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適</p>	<p>斷病後勞復餘熱不解</p>	<p>柴胡 一兩 黃芩 人參 甘草 <small>各一分</small></p>
---	--------------------------------------	--	--	---	------------------------------	---------------------------	--	--------------------	------------------------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------------	------------------	--





右四味每服五錢水一盞半煎一盞去渣溫服
桂枝湯 <small>金匱</small> 婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無
寒熱名姪娠桂枝湯主之於法六十日當有此證設
有醫治逆者却一月加吐下者則絕之 <small>見傷寒</small>
小柴胡湯 <small>金匱</small> 婦人中風七八日續來寒熱發作有時經
水適斷此為熱入血室其血必結故使如瘧狀 <small>見傷寒</small>
大承氣湯 <small>金匱</small> 產後七八日無太陽症少腹堅痛惡露
不盡不大便煩燥發熱切脈微實再倍發熱日晡時
欽定四庫全書 <small>蘭臺軌範</small>
煩燥者不食食即讞語至夜即愈熱在裏結在膀胱
也 <small>見傷寒</small>
小青龍湯 <small>金匱</small> 婦人吐涎沫醫反下之心下即痞當先
治其吐涎沫此主之 <small>見痰飲</small> 涎沫止乃治痞瀉心湯主
之 <small>見血門</small>
芎歸膠艾湯 <small>金匱</small> 治陷經漏下黑不解 <small>見通治</small>
猪鬃膏煎 <small>金匱</small> 胃氣下泄陰吹而正喧此穀氣之實也
見痘門



腎氣丸 金匱

治婦人飲食如故煩熱不得卧而反倚息

者此名轉胞不得溺也以胞系了戾故致此病但利

小便則愈

即崔氏八味丸 見通治

當歸生薑羊肉湯

金匱

治產後腹中疴痛并治腹中寒

疝虛勞不足

見通治

按婦人一切外感內傷等症與男子同無庸另立法惟經帶胎產癥瘕等疾病變多端必從調經種子等法探本索源而後可施用今因金匱要畧有治婦人方論一卷故亦畧載婦人常用之方數十首至其全體仍當取唐宋以來專門之書詳考之

欽定四庫全書

蘭臺軌範

小兒

此卷方論俱從錢氏直訣選出其外有小兒常患之症而方未備者更考他書補入治小兒之法大端畧具其所選之方藥一概全錄不必更將他卷查閱以便業幼科者專取此書誦習可也

脈法

脈弦急

氣不和

脈沉緩

傷食

脈促結

虛驚

脈浮

為風

脈沉

細

為寒

脈亂

不治

全幼心鑑云小兒一歲以前看虎口食指寅卯辰三

關以驗其病

寅卯辰即風氣命三關也

脈紋從寅關起不至卯關

者易治若連卯關者難治若寅侵卯卯侵過辰者十



不救一其脈紋見有五色如因驚必青瀉痢必紫當以類而推之一歲後則可用一指轉側辨其三部脈弦急浮沉四五歲後脈七八至而細數者為平九至者傷十至者困六至五至者為虛為寒弦緊為風癘弦急為客忤

面部症

左腮為肝右腮為肺額上為心鼻為脾額為腎若色赤者熱也宜隨症治之

欽定四庫全書

蘭臺軌範

目部症

目內色赤者心實熱淡紅者心虛熱青者肝實熱淡青者肝虛熱黃者脾實熱微黃者脾虛熱白而混者肺實熱目無睛光者腎虛也

五臟虛實寒熱

心主驚實則叫哭發熱飲水而搐虛則卧而悸動不安視其睡口中氣溫或合面睡及上竄咬牙皆心熱也心氣實則喜仰卧



肝主風實則目直大叫呵欠項急頓悶虛則咬牙多欠  
肝熱則手尋衣領及亂捻物壯熱飲水喘悶目赤發  
揚 肝有風則目連劄得心熱則發搐或筋脈牽繫而  
直視風甚則身反張強直不搐心不受熱也當補腎治  
肝  
脾主困實則困睡身熱飲水虛則吐瀉生風面白腹痛  
口中氣冷不思飲食或吐清水 呵欠多睡者脾氣虛  
而欲發驚也

欽定四庫全書

蘭臺軌範

肺主喘實則悶亂喘促有飲水者有不飲水者虛則哽  
氣長出氣 肺熱則手掐眉目鼻面 肺盛復感風寒  
則胸滿氣急喘嗽上氣 肺臟怯則唇白悶亂氣粗喘  
促哽氣者難治肺虛甚也

腎主虛無實也惟瘡疹腎實則變黑陷若胎稟虛怯神  
氣不足目無睛光面白顛解此皆難育雖育不壽或更  
加色欲變症百出愈難救療或目畏明下竄者蓋骨重  
而身縮也咬牙者腎水虛而不能制心火也



變蒸

小兒在母腹中乃生骨氣五臟六腑成而未全自生之後即長骨脈五臟六腑之神智也變者易也自內而長自下而上又身熱故已生之日後三十二日一變變每畢即情性有異於前何者長生腑臟智意故也何為三十二日長骨添精神人有三百六十五骨除手足中四十五碎骨外有三百二十自生下骨一日十段而上之十日百段三十二日計三百二十段為一遍亦曰一蒸骨之餘氣自腦分入齦中作三十二齒而齒牙有不及三十二數者由變不足其常也或二十八日即至長二十八齒以下倣此但不過三十二之數也凡一周遍乃發虛熱諸病如是十周則小蒸畢也計三百二十日生骨氣乃全而未壯也

急驚風症治

小兒急驚因聞大聲或驚而發搐搐正如故此熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱二便黃赤甚則發搐蓋熱

欽定四庫全書

蘭臺軌範



甚生風陽盛而陰虛也宜利驚丸除其痰熱不可用巴豆之藥

慢驚風症治

小兒慢驚因病後或吐瀉或藥餌傷損脾胃而肢體逆冷口鼻氣微手足痠癢昏睡露睛此脾虛生風無陽之症也 小兒初生壯熱吐衄身體強直手足抽掣目反直視是胎驚風症也

發搐症治

欽定四庫全書

蘭臺軌範

驚癇發搐男則目左視無聲右視有聲女則右視無聲左視有聲相勝故也

欲驗逆順男則握拳拇指又入食指中為順於外為逆女則又入食指為逆於外為順仍參吮乳不能類以治其母後倣此

若傷風發搐口中氣熱呵欠頓悶手足動搖

若傷食發搐身溫多睡或吐不思食

百日内發搐真者不過二三次必死假者頻發不死真



者內生驚癇假者外傷風冷血氣未實不能勝任故發  
搖

癲癇症治


凡治五癇皆隨臟治之每臟各有一獸之形並用五色  
丸治之發而重者死病甚者亦死若反折上竄其聲如  
犬症屬肝也若目瞪吐舌其聲如羊症屬心也若目直  
腹痛其聲如牛症屬脾也若驚跳反折手縱其聲如雞  
症屬肺也若肢體如尸口吐涎沫其聲如猪症屬腎也

欽定四庫全書

蘭臺軌範

附面部三指診候圖



						<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭臺軌範</p>	<p>小兒半歲之間有病以名中食三指曲按額前眉上髮際之下若三指俱熱感受風邪鼻塞氣粗三指俱冷感受風寒臟冷吐瀉若食中二指熱上熱下冷名中二指熱夾驚之候食指熱胸膈氣滿乳食不消</p> <p>附虎口三關脈症圖</p> 	<p>小兒半歲之間有病以名中食三指曲按額前眉上髮際之下若三指俱熱感受風邪鼻塞氣粗三指俱冷感受風寒臟冷吐瀉若食中二指熱上熱下冷名中二指熱夾驚之候食指熱胸膈氣滿乳食不消</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------	---	--





水鏡訣云陰陽運合男女成形已分九竅四肢乃生  
五臟六腑部位各分逆順難明若憑寸口之浮沉必  
至橫亡於孩子須明虎口辨別三關消詳用藥必無  
差誤未至三歲看虎口三關若脈見風關尚易治交  
氣關則難治交命關為死症又當辨其色如獸驚三  
關必青水驚三關必赤人驚三關必黑若紫色主瀉  
痢黃色是雷驚三關脈通度乃極驚之症必死有紋  
或青或紅如線直者是母食傷脾左右一樣者是驚

欽定四庫全書

蘭臺軌範

積齊發紋有三條白主肺傷風痰或齁齕聲青主傷  
寒及嗽紅主泄瀉有黑相兼主下痢紅多白痢黑多  
赤痢有紫相兼虎口脈亂乃氣不和也蓋脈紋見有  
五色由其病甚色能加變至於純黑者不可得而治  
矣

### 五臟瘡疹証治

小兒在胎食五臟血穢伏於命門若遇天行時熱或乳  
食所傷或驚恐所觸則其毒當出初起之候面燥腮赤



目胞亦赤呵欠頓悶乍涼乍熱咳嗽嚏噴手足稍冷驚悸多睡宜究其何臟所發察其何因所起令乳母亦須節飲食慎風寒 五臟各有一症肝臟水疱青色而小肺臟膿疱色白而大心臟癰色赤而小脾臟疹小次癰故色赤黃淺也先發膿疱後發疹子者順先疹子後癰者順反此為逆惟腎無候但見散冷耳冷是也若寒水來侮故黑陷而耳散反熱為逆也急用百祥丸牛李膏各三服不愈者死 如發潮熱三日以上出不甚多而

欽定四庫全書

蘭臺軌範

熱不止者未盡也潮熱隨出如早食潮熱不已為水疱之類也一發便出盡者重瘡夾疹者半輕半重也出稀者輕裏外微紅者輕外黑裏赤者微重外白裏黑者大重也瘡端裏黑點如針孔者勢最劇也青乾紫陷昏睡汗出煩燥熱渴腹脹啼喘二便不通者困也有大熱利小便解熱毒若紫黑乾陷或寒戰咬牙或身黃腫紫者急以百祥丸下之復惡寒不已身冷出汗耳散反熱者死症也此腎氣大旺脾虛不能制故耳下後身熱氣溫



飲水者可治以脾土勝腎寒去而溫熱也不黑者不可	下下則內虛歸腎大抵瘡疹屬陽在春夏為順秋冬為	逆冬月腎旺盛寒病多歸腎變黑又當辨春膿疱夏黑	陷秋癰子冬疹子者十活四五黑者十難救一 身熱	煩渴腹滿而喘便澁面赤悶亂大吐此當利小便不瘥	者宣風散下之若能食而痲頭焦起或未焦而喘實亦	可下之若五七日痲不焦是內熱也宣風散導之生犀	汁解之 癰疹作搐為脾虛而肝則乘心火妄動風熱	欽定四庫全書	蘭臺軌範	相搏也當瀉心肝補脾土 瘡黑而忽便膿血并痲皮	者乃脾氣實腎邪退而病安也及瀉而乳食不化者脾	虛不能制腎故難治	此即近世痘瘡之症其病與癰疹同列並無起脹成	漿收靨等說大抵宋時之瘡形治法不過如此近日	愈變愈重與癰疹絕不相類治亦迥別因知天下之	病隨時隨地變化無窮所以內經有五運六氣異法	方宜等論為醫者苟不能知天運之轉移及五方之
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



體性終有偏執之處不可以稱上工也

痘瘡無人可免自種痘之法起而小兒方有避險之路此天意好生有神人出焉造良法以救人也然人往往以種痘仍有死者疑而不敢種不知乃苗之不善非法之不善也况即有死者不過百中之一較之行惡痘十死八九者其安危相去何如也至於治痘之書自宋至今不下數十種莫不和平切近孰意邇年以來崇奉怪書不論小兒之強弱痘症之虛實概

欽定四庫全書

蘭臺軌範

以大黃數兩石膏數斤為一劑使兒真火消盡元氣大傷絕其起脹成漿之路因向其父母云此症或不能起脹或不能成漿而死至期果死其父母以為神目不知此實醫者致之死地也或幸不死則信為大黃石膏之功而此二味遂為不祧之藥矣又方中多用蜂房蝎子蟻蝻蚯蚓蚌汁等惡物成升成碗灌入兒腹以增其毒而爛其胃宛轉就死尤可痛心夫近日時醫治精壯男婦之病見用清火之藥一二錢羣



以為此寒涼之品斷不可服必當用附桂參朮獨於  
數月之小兒反用大寒大毒之藥成兩成斤俾死者  
接踵而不悔何耶醫者不足責為父母而目覩其子  
之服此毒藥以致慘死毫無疑怨則何心也

丹瘤

丹瘤之症因熱毒客於腠理搏於血氣發於皮膚當以  
白玉散塗之

傷風兼變症治二

欽定四庫全書

蘭臺軌範

傷風兼肝則發搐頓悶兼心則驚不安兼肺則喘嗽哽  
氣兼脾則困睡兼腎則目畏明各隨補其母

諸經發熱症治三

潮熱者時間發熱過時即退來日依時而發此欲發驚  
也 壯熱者常熱不已甚則發驚癇也 風熱者身熱  
而口中氣熱乃風邪外感也 溫熱者肢體微熱也  
發熱而不欲飲水者胃氣虛熱也發熱而飲水作渴喜  
冷飲食者胃氣實熱也



吐瀉症治

若吐乳瀉黃傷熱乳也吐乳瀉青傷冷乳也皆當下之

吐瀉昏倦睡不露睛者胃實熱也吐痰涎及綠水者

胃虛冷也 初生下吐因穢惡下咽故也凡初生急須

拭淨口中否則啼聲一發穢物咽下致生諸病

稀必 拭去穢物出痘

五臟內外疳症主治

凡小兒疳在內目腫腹脹瀉痢青白體瘦羸弱疳在外

欽定四庫全書

蘭臺軌範

鼻下赤爛頻揉鼻耳或肢體生瘡鼻瘡用蘭香散諸瘡

用白粉散 肝疳一名筋疳白膜遮睛或瀉血面瘦

心疳面黃頰赤身體壯熱 脾疳一名肥疳體黃瘦削

皮膚乾澁而有瘡疥腹大嗜土 腎疳一名骨疳肢體

瘦削遍生瘡疥喜卧濕地 肺疳一名氣肝喘嗽氣促

口鼻生瘡 若患潮熱當先補肝後瀉心若妄以硝黃

諸藥痢之若患癖當消磨若誤以巴豆礪砂下之及傷

寒誤下皆能成疳其初病者為熱疳久病者為冷疳冷



熱相兼者津液短少者皆因大病脾胃虧損內亡津液所致當固脾胃為主早為施治則不變敗症也

腹痛腫脹諸症

小兒腹痛體瘦面色眊白目無睛光口中氣冷不思飲食或嘔利撮口此脾土虛而寒水所侮也若口中氣溫面色黃白目無睛光或多睡惡食或大便酸臭此積病也若腹脹而悶亂喘滿者實也若不悶亂喘滿者脾虛也誤下之以致目庖腮面四肢浮腫肚腹愈脹因下而

欽定四庫全書

蘭臺軌範

喘脾氣益虛也脾虛不能勝腎水隨肺氣行於四肢如水狀若侵浮於肺即大喘也

若腎熱傳於膀胱熱甚逆於脾肺脾胃虛而不能制腎水流走四肢而身面皆腫若土勝則刑於肺故令喘也若口吐涎沫或吐清水面眊白心腹痛有時者虫痛也與癩相似但目不斜手不搐也安虫散主之

若腹中有癖不食但飲乳是也蓋小兒病此良由乳食不消伏於腹中乍冷乍熱飲水過多即蕩滌腸胃亡失



津液脾胃虛弱不能傳化水穀以致四肢羸瘦肚腹漸大而成疴矣

五臟雜症主治

喜汗者厚衣卧而額汗出也盜汗者肌肉虛而睡中汗出也胃虛汗者上至項下至臍也六陽虛汗者上至頭下至項難治

夜啼者小兒筋骨血脈未成而多哭脾臟冷而痛也當與溫中藥或花火膏主之若虛怯為冷所乘則唇青

欽定四庫全書

蘭臺軌範

驚啼者邪氣乘心也當以安神丸主之

若浴後拭臍不乾風入作瘡令兒撮口甚者是脾虛也若頻撮口是氣不和也

弄舌熱者脾臟微熱令舌絡牽緊時時舒熱或飲水者脾胃虛而津液少也兼面黃肌瘦五心煩熱者疴積也大病未已而弄舌者凶

解顛者生下顛門不合也長必多愁少笑目白精多面色眇白或體消瘦皆腎虛也





胎肥者生下豐厚目睛粉紅大便乾難時出涎水	胎熱者生下有血色時叫哭身熱淡黃目睛多赤大便	色黃急欲食乳並用浴體法主之	胎怯者生下面白肌肉瘦弱大便白水身無血色哽氣	多噦亦用浴體法	急欲乳不能食者此風邪由臍而蘊熱心脾致舌厚唇	燥不能吮乳也	龜胸龜背者由兒生下風客於脊入於骨髓致成龜背	欽定四庫全書 蘭臺軌範	若肺熱脹滿攻於胸膈即成龜胸並用龜尿點其骨節	自愈 <small>取尿法用青蓮葉安龜在上用鏡照之其尿自出</small>	失音吐瀉或大便後雖有聲而不能言又能咽物者非	失音此腎怯不能上接於陽也凡口噤不止則失音語	遲 若大病後身目皆黃者黃病也 身病背強大小	便澁一身盡黃小便黃赤此黃疸也瀉者難治 若百	日或半年不因病而身黃者胃熱胎疸也若淡黃兼白	者胃怯也 長大不行行則脚軟 齒久不生則不
---------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------	-----------------------	--------	-----------------------	----------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------



<p>固 髮久不生則不黑皆胎弱</p>	<p>小兒方</p>	<p>瀉青丸 治肝經實熱急驚搐搦</p>	<p>羌活 <small>壬乙同歸一</small> 治故用羌活 大黃 <small>瀉諸</small> 芎藭 <small>入手足厥陰</small> 山梔</p>	<p>仁 <small>瀉心火實</small> 龍胆草 <small>炒益肝胆</small> 當歸 <small>入足厥陰以</small> 防</p>	<p>風 <small>各等</small></p>	<p>右為末煉蜜丸芡實大每服半丸竹葉湯入砂糖化</p>	<p>下</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>導赤散 治小腸實熱小便秘赤</p>	<p>生地黄 <small>心與小腸之藥</small> 木通 <small>利小腸之熱故</small> 甘草 <small>生瀉心火</small></p>	<p>右為末每服一錢入淡竹葉 <small>涼心</small> 水煎</p>	<p>生犀散 治心經虛熱</p>	<p>地骨皮 赤芍藥 柴胡 乾葛 <small>各一</small> 甘草</p>	<p><small>五錢</small> 犀角 <small>二錢鎊主風熱驚癇鎮肝除心熱丹溪云犀角痘後用以散餘毒無毒而血虛者</small></p>	<p><small>宜非</small></p>	<p>右為末每服一二錢水煎</p>
---------------------	------------	----------------------	--	--	----------------------------	-----------------------------	----------	------------------------	----------------------	--	---	------------------	---	--	--------------------------	-------------------



<p>瀉黃散 治脾胃實熱</p>	<p>藿香葉 <small>入手足太陰經</small> 甘草 <small>各七錢</small> 石膏 <small>五錢</small> 瀉山</p>	<p>梔仁 <small>一兩</small> 治胃 防風 <small>三兩</small></p>	<p>右用蜜酒微炒為末每服一二錢水煎</p>	<p>五味異功散 治脾胃虛弱吐瀉不食</p>	<p>人參 茯苓 白朮 甘草 <small>炒</small> 陳皮 <small>各等分</small></p>	<p>右為末每服三錢薑棗水煎</p>	<p>益黃散 治脾土虛寒嘔吐泄瀉</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>蘭臺軌範</p>	<p>陳皮 <small>下食入太</small> 丁香 <small>各二錢</small> 訶子肉 <small>五錢</small></p>	<p><small>能開胃消食止痢</small> 甘草 <small>灸三錢</small></p>	<p>右為末每服一二錢水煎</p>	<p>瀉白散 治肺經實熱咳嗽痰喘</p>	<p>桑根白皮 <small>炒瀉肺氣之有餘</small> 地骨皮 <small>各一兩</small> 甘草 <small>灸五錢</small></p>	<p>右為末每服一二錢入粳米百粒水煎</p>	<p>阿膠散 治肺虛咳嗽口乾作渴</p>	<p>明阿膠 <small>一兩</small> 炙炒能 甘草 <small>錢</small> 馬兜鈴 <small>五錢</small> 嗽清肺補</p>
------------------	--	---	------------------------	------------------------	---	--------------------	----------------------	---------------	-------------	---	---	-------------------	----------------------	---	------------------------	----------------------	---



<p>肺</p>	<p>糯米 一兩 杏仁 七粒 去皮尖下 鼠粘子 二錢 五分</p>	<p>右為末每服二錢水煎</p>	<p>地黄丸 治腎虛解顛或行遲語遲等症</p>	<p>熟地黄 八錢 酒洗益腎 山茱萸肉 補腎 乾山藥 涼腎 瀉陰</p>	<p>中之火治足少 陰無汗之骨蒸 白茯苓 各三錢 牡丹皮 澤瀉 各</p>	<p>錢</p>	<p>右地黄杵膏餘為末加煉蜜丸如桐子大每服二三</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>十九九空心白湯送下</p>	<p>四君子湯 治脾氣虛弱飲食不化腸鳴泄瀉或嘔</p>	<p>穢吐逆</p>	<p>人參 白茯苓 白朮 甘草 各五分 水煎服</p>	<p>四物湯 治肝經血虛發熱日晡益甚或煩燥不寐</p>	<p>當歸 熟地黄 各二錢 白芍藥 一錢 芎藭 五分</p>	<p>右作二劑水煎服</p>	<p>八珍湯 治氣血俱虛或因失血過多或因剋伐元</p>
----------	---	------------------	-------------------------	--	---	----------	-----------------------------	------------------------	------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------	-----------------------------



氣以致內熱發熱肢體瘦瘁	即四物四君子二湯合服	十全大補湯 治氣血虛熱或因病後惡寒發熱或 自汗盜汗食少體倦或發熱作渴頭痛眩暈等症	即八珍湯加黃芪肉桂	六君子湯 治脾胃虛弱體瘦面黃或久患癰痢不 思乳食或嘔吐泄瀉飲食不化或時患飲食停滯或 母有前症致兒為患	欽定四庫全書 蘭臺軌範	人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏	甘草 各一錢	右每服二三錢薑棗水煎	補中益氣湯 治中氣不足困睡發熱或元氣虛弱	感冒風寒諸症或乳母勞役發熱致兒為患	黃芪 <small>炙</small> 人參 白朮 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small> 當歸	陳皮 <small>各五分</small> 升麻 柴胡 <small>各二分</small>	右七味加薑棗水煎
-------------	------------	--	-----------	---	----------------	----------------------------	-----------	------------	-------------------------	-------------------	---	--	----------



<p>香砂助胃膏 治胃寒吐瀉乳食不化</p>	<p>人參 白朮<small>炒</small> 白茯苓<small>各五錢</small> 甘草<small>炙</small> 丁香<small>各一</small></p>	<p><small>錢去胃中寒</small> 砂仁<small>四十粒下</small> 白豆蔻<small>十四粒寬胃</small> 肉豆蔻<small>煖脾胃進食</small></p> <p><small>四箇煨溫中補脾下氣運化</small> 乾山藥<small>一兩</small></p> <p><small>非比香附疎皮之駛泄也</small></p>	<p>右為末煉蜜丸芡實大每服二三丸米飲磨化</p>	<p>肥兒丸 治食積五疳頸項結核髮稀成穗發熱作</p>	<p>渴等症</p>	<p>黃連<small>炒</small> 神麴<small>炒</small> 木香<small>各一兩</small> 枳榔<small>二十箇破滯氣</small> 肉豆</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>寇<small>二兩</small> 史君子<small>酒浸</small> 麥芽<small>炒各四兩</small></p>	<p>右為末麪糊丸如麻子大每服三五十九丸米飲下良</p>	<p>以用五味異功散一服以助胃氣</p>	<p>九味蘆薈丸 治肝脾疳積體瘦熱渴大便不利或</p>	<p>療癰結核耳內生瘡等症</p>	<p>蘆薈 胡黃連 黃連 木香 蕪荑<small>炒</small></p>	<p>青皮 白雷丸 鶴虱草<small>各一兩</small> 麝香<small>三錢</small></p>	<p>右為末蒸餅糊丸如麻子大每服一二錢空心白湯</p>
------------------------	---	---	---------------------------	-----------------------------	------------	--	---------------	--	------------------------------	----------------------	-----------------------------	-------------------	--	---	-----------------------------



蘭香散	治鼻疳赤爛	參湯下	右為末以蝦蟆膏杵丸麻子大每服一二十九煎人	錢五麝香 另五分 乾蝦蟆 煮杵膏	史君子 <small>取肉</small> 一兩 胡黃連 川黃連 白蕪荑 <small>炒各</small> 二兩	如聖丸 治冷熱疳瀉	服一二十九丸米飲下	沸取出研入蘆薈麝香各二錢飯和丸如麻子大每	欽定四庫全書 蘭臺軌範	右為末填入猪胆內以線扎懸掛銚中淡漿水煮數	胡黃連 黃連 <small>各五錢</small> 硃砂 <small>二錢</small> 另研	胡黃連丸 治熱疳	右為末蜜丸如菉豆大每服三五丸煎薄荷湯下	錢半續隨子 <small>一兩</small> 去油蝦蟆 <small>三筒</small> 燒存性	木香 青黛 栝榔 肉豆蔻 麝香 <small>各一</small>	木香丸 治冷疳	下
-----	-------	-----	----------------------	---------------------------	--	--------------	-----------	----------------------	----------------	----------------------	--	-------------	---------------------	--	---	------------	---



<p>蘭香葉 <small>二錢</small> 燒灰 銅青 輕粉 <small>各五分</small> 為末乾貼</p>	<p>白粉散 治諸疔瘡</p>	<p>海螵蛸 <small>三分</small> 白芨 <small>二分</small> 輕粉 <small>一分</small></p>	<p>右為末先用漿水洗拭乾貼</p>	<p>蟾蜍丸 治無辜疔症一服虛熱退二服煩渴止三服瀉痢愈</p>	<p>蟾蜍 <small>一枚夏月溝渠中取腹大不跳不鳴身多癩者</small></p>	<p>右取糞蛆一杓置桶中以尿浸之却將蟾蜍跌死投</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>與蛆食一晝夜用布袋盛蛆置急流中一宿取出瓦</p>	<p>上焙乾為末入麝香一字粳米飯丸麻子大每服二</p>	<p>三十丸米飲下其效如神</p>	<p>蕪荑散 治虫動口內流涎</p>	<p>白蕪荑 乾漆 <small>炒各等分</small></p>	<p>右為末每服五六分米飲下</p>	<p>安虫散 治虫動心痛</p>	<p>胡粉 <small>炒黃</small> 檳榔 川練子 鶴虱 <small>各三錢</small> 枯白礬</p>
---	---------------------	--	--------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------------	--





<p>二錢 五分</p>	<p>右為末每服五六分痛時米飲調下</p>	<p>白玉散 治丹瘤</p>	<p>白土 <small>二錢五分</small> 寒水石 <small>五錢</small> 為末用米醋或新水調塗</p>	<p>柳華散 治熱毒口瘡</p>	<p>黃柏 <small>炒</small> 蒲黃 青黛 人中白 <small>煨各等分</small> 為末敷</p>	<p>仙方活命飲 治一切瘡毒未成內消已成即潰此</p>	<p>消毒排膿止痛之聖藥也若膿出而腫痛不止者元</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>氣虛也當補之</p>	<p>穿山甲 白芷 防風 沒藥 甘草</p>	<p>赤芍藥 歸尾 乳香 花粉 貝母</p>	<p><small>各一錢</small> 金銀花 <small>各三錢</small> 陳皮 皂角刺 <small>二錢</small></p>	<p>右每服二三錢酒水各半煎</p>	<p>消積丸 治食積大便酸臭發熱</p>	<p>丁香 <small>九粒</small> 縮砂 <small>十二粒</small> 巴豆 <small>二粒去皮心膜</small> 烏梅肉 <small>三箇</small></p>	<p>右為末麪糊丸黍米大每服五七丸溫水下</p>
------------------	-----------------------	----------------	--	------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------	------------------------	------------------------	---	--------------------	----------------------	--	--------------------------



保和丸 治食積 山查 二兩 神麴 二兩 半夏 茯苓 各一兩 陳皮	連翹 蘿蔔子 各五錢 右為末粥糊丸如桐子大每服一二十丸白湯下	四神丸 治脾腎稟虛泄瀉不食或乳母患此致兒為患	肉豆蔻 二兩 補骨脂 四兩 五味子 二兩 吳茱萸 一兩 右為末用水二碗生薑八兩紅棗一百枚煮熟用棗	欽定四庫全書 蘭臺軌範	肉和末丸如麻子大每服二三十丸空心食前白湯	下子母並服	五苓散 治霍亂吐瀉燥渴飲水小便不利	澤瀉 五錢 猪苓 官桂 赤茯苓 白朮 各三錢	右為末每服一二錢白湯調下	白虎湯 治傷暑煩燥身熱痰盛頭痛口燥大渴	知母 一兩 石膏 四兩 白粳米 八錢 甘草 五錢
--	--------------------------------------	---------------------------	--	----------------	----------------------	-------	----------------------	------------------------------------	--------------	------------------------	-----------------------------------



患	加味道遙散 治乳母肝脾氣血虛弱發熱致兒為患	右每服一二錢薑棗水煎	柴胡 八錢 半夏 湯泡 黃芩 人參 各三錢 甘草 炙二錢	肢煩疼寒熱往來嘔吐痰實及治中暑病瘧	小柴胡湯 治傷寒溫熱患身熱惡風頭痛項強四肢煩疼寒熱往來嘔吐痰實及治中暑病瘧	木香 三分 為末每服一二錢水煎	枳殼 麸炒 桔梗 炒 前胡 乾葛 甘草 炒各五分	欽定四庫全書 蘭臺軌範	人參 紫蘇 陳皮 半夏 茯苓	足並冷喘促痰涎	參蘓飲 治感冒風寒或腹脹少食泄瀉嘔吐或手足並冷喘促痰涎	右每服一錢水煎 此方似脫地黃一味否 則即前阿膠散方矣	阿膠 一錢 鼠粘子 二分 馬兜鈴 甘草 各五分 杏仁 七枚去 糯米 十粒 皮尖 炒	地黃清肺飲 治肺疴咳嗽痰唾稠粘	右為末每服一二錢水煎
---	--------------------------	------------	--	-------------------	---------------------------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------	----------------------------	---------	-----------------------------	----------------------------------	--	-----------------	------------



<p>當歸 白朮 茯苓 芍藥<small>炒黃各一錢</small> 柴胡</p>	<p>牡丹皮 山梔<small>炒</small> 甘草<small>炒各五分</small> 水煎服</p>	<p>龍胆瀉肝湯 治肝經濕熱或囊癰便毒小便澀滯</p>	<p>龍胆草<small>酒炒五分</small> 車前子<small>炒</small> 木通 歸尾 澤瀉</p>	<p>甘草 黃芩 生地 山梔<small>各三分</small> 水煎</p>	<p>服</p>	<p>茵陳湯 治身熱鼻乾汗出二便赤澀濕熱發黃</p>	<p>茵陳<small>六錢</small> 梔子<small>二箇</small> 大黃<small>二錢</small> 每服一錢水煎</p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>黃連香薷飲</p>	<p>香薷<small>四兩</small> 厚朴<small>二兩</small> 黃連</p>	<p>右每服一二錢將朴連同生薑炒令紫色入香薷水</p>	<p>酒各一盞煎冷服</p>	<p>金匱加減腎氣丸 治脾腎虛腰重脚輕小便不利</p>	<p>或吐腹腫脹四肢浮腫喘急痰盛已成蠱者此症多</p>	<p>因脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而變者非此藥不救</p>
---	---	-----------------------------	--	---	----------	----------------------------	---	--------------------	--------------	---	-----------------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------



<p>白茯苓 <small>三兩</small> 附子 <small>泡五錢</small> 川牛膝 肉桂 澤瀉</p>	<p>車前子 山萸肉 山藥 牡丹皮 <small>各一</small></p>	<p><small>兩</small> 熟地黄 <small>四兩</small> <small>酒拌杵碎</small></p>	<p>右為末和地黄膏加煉蜜杵丸如桐子大每服一二</p>	<p>十九丸空心米湯下</p>	<p>五色丸 治五癩</p>	<p>硃砂 <small>各五錢</small> 真珠 <small>各五錢</small> 水銀 雄黃 <small>各一錢</small> 黑鉛 <small>三兩</small> <small>同水</small></p>	<p><small>銀結成砂</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p>下 右為末煉蜜丸麻子大每服三四丸煎銀花薄荷湯</p>	<p>斷癩丹 治癩差後變症不止</p>	<p>黃芪 <small>蜜炙</small> 鈎藤鈎 細辛 甘草 <small>各五錢</small> 蛇退 <small>三寸</small></p>	<p><small>酒炙</small> 蟬蛻 <small>去土</small> 牛黃 <small>一字</small> <small>另研</small></p>	<p>右為末煮棗肉為丸麻子大每服五七丸人參煎湯</p>	<p>下</p>	<p>漏銀丸 治風涎膈熱及乳食不消腹脹喘促</p>
--	---	---	-----------------------------	-----------------	----------------	--	----------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------	---	--	-----------------------------	----------	---------------------------



<p>巴豆  <small>香 五分 另研</small>                  水銀 <small>各五錢</small>                  京墨 <small>八錢</small>  <small>醋淬研</small>                  火燒                  黑鉛 <small>二錢</small>  <small>水銀煎</small>                  麝</p>	<p>右為末陳米粥丸如菘豆大每服二三丸煎薄荷湯下</p>	<p>利驚丸 治急驚</p>	<p>天竺黃 <small>二錢</small>                  輕粉                  青黛 <small>各一錢</small>                  黑牽牛 <small>炒五錢</small></p>	<p>右為末蜜丸豌豆大每歲服一丸薄荷湯化下</p>	<p>小續命湯 治中風不省人事涎鳴失音肢體反張</p>	<p>欽定四庫全書                  蘭臺軌範</p>	<p>或時厥冷</p>	<p>麻黃 <small>去節</small>                  人參                  黃芩                  芍藥</p>	<p>甘草 <small>炒</small>                  杏仁 <small>去皮尖研</small>                  漢防已                  官桂 <small>各五錢</small>                  防風 <small>七錢</small></p>	<p><small>五分</small> 附子 <small>泡去皮臍二錢</small></p>	<p>右各另為末和勻每服一錢薑棗水煎有熱減桂附</p>	<p>鈎藤鈎飲 治吐利脾胃虧損虛風慢驚</p>	<p>鈎藤鈎 <small>三分</small>                  蟬蛻                  防風 <small>炒</small>                  人參                  麻黃</p>	<p>白僵蠶 <small>炒</small>                  天麻                  蝎尾 <small>去毒炒</small>                  甘草 <small>炙</small>                  芎</p>
---	------------------------------	----------------	---	---------------------------	-----------------------------	---	-------------	---	--	---	-----------------------------	-------------------------	---	--



人參	白朮	茯苓	黃芪	龍眼肉	各二
歸脾湯	治乳母脾經氣鬱致兒為患				
雄黃散	治痘後牙齦生疳蝕瘡				
雄黃	一錢	銅綠	二錢	同研細量瘡大小乾糝其上	
湯化下					
牛李子	一味杵汁石器內熬膏每服皂子大煎杏膠				
牛李膏	治痘瘡黑陷				
右焙乾為末水丸粟米大每服十九赤芝麻湯送下					
欽定四庫全書					
蘭臺軌範					
紅牙大戟	陰乾漿水煮熟去骨復入原汁中煮				
百祥丸	治痘瘡黑陷及嗽而吐青綠水				
荷湯化下					
右為末生蜜和膏每服一豆粒許月中兒用半粒薄					
天竺黃	二錢	麝香	二分		
天麻	錢各一	白附子		乾蝎	去毒
烏稍蛇					
大青膏	治傷風吐瀉身溫氣熱驚搐				
麝香	各二錢五分				
麝香	另研為末每服一二錢水煎				



鈎藤	天麻	茯苓	芎藭	白芍藥	二各
蟬蛻鈎藤散	治肚疼驚啼				
燈花一顆塗乳上令兒吮之					
花火膏	治夜啼				
右為末煉蜜丸芡實大每服半丸砂糖水化下					
水石	甘草	硃砂	龍腦		錢各五 一兩 二分
麥門冬	牙硝	白茯苓	乾山藥	寒	焙去心
安神丸	治邪熱驚啼心肝壯熱面黃頰赤				
湯下子母並服					
芎藭	麥芽	等分			炒各
蒼朮	神麴	香附子	山查	山梔	炒
越鞠丸	治乳母六鬱傳兒為患或胸滿吐酸齒痛				
瘡疥等症					
右薑棗水煎服加柴胡山梔名加味歸脾湯					
遠志	酸棗仁	木香	甘草		錢一錢 分三





錢 甘草	蟬蛻 各一	每服一錢燈心湯下		
羚羊角丸	治行遲			
羚羊角 錢	虎脛骨 錢	生地黃 錢	酸棗仁	
白茯苓 錢	肉桂 錢	防風 錢	當歸 錢	黃芪 錢
分 錢五				
右為末煉蜜丸每服一皂子大白湯化下				
止汗散	治睡而自汗			
故蒲扇一把燒存性研為末每服三錢溫酒調下				
欽定四庫全書	蘭臺軌範			
當歸六黃湯	治血虛不足虛火內動盜汗不止			
當歸	熟地黃	黃芪 炒	黃柏 炒	黃芩 炒
黃連	生地黃 分	各等	每服二錢水煎服	
團參湯	治心血虛熱自汗盜汗			
人參	當歸 分	各等		
右用猪心一片每服三錢水煎服				
參附湯	治稟賦不足上氣喘急自汗盜汗或病久			
陽氣脫陷急宜服之				



<p>人參 <small>五錢</small> 附子 <small>泡一兩</small> 每服一錢薑水煎</p>	<p>人參養榮湯 治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食</p>	<p>少作瀉或以病虛損口乾食少效而下痢驚熱自汗</p>	<p>白芍藥 <small>一錢五分</small> 人參 陳皮 黃芪 <small>蜜炙</small> 桂心</p>	<p>當歸 白朮 <small>炒</small> 甘草 <small>炙各一錢</small> 熟地黃 五味子</p>	<p><small>杵炒各七分</small> 遠志 <small>五分</small> 每服二三錢薑棗水煎</p>	<p>浴體法 治胎肥胎熱胎怯</p>	<p>烏蛇肉 <small>酒浸焙</small> 白礬 青黛 <small>各三錢</small> 天麻 <small>二錢</small> 蝎尾 <small>去</small></p>	<p>欽定四庫全書 蘭臺軌範</p>	<p><small>毒</small> 硃砂 <small>各五分</small> 麝香 <small>二分半</small></p>	<p>右為末桃枝一握水煎浴之勿浴背</p>	<p>神效當歸膏 治跌撲湯火等瘡不問已潰未潰</p>	<p>當歸 黃蠟 生地黄 <small>各一兩</small> 麻油 <small>六兩</small></p>	<p>右先將當歸地黃入油煎黑去渣入蠟融化候冷攪</p>	<p>勻即成膏矣 <small>以上皆直訣所載之方以下諸方皆取別本附入者</small></p>	<p>保命散 <small>秘方</small> 治一切急驚慢驚痰涎湧塞手足抽搐目</p>	<p>直神昏夜啼晝倦吐乳瀉白種種惡症</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	--	--	--	--------------------	---	--------------------	---	-----------------------	----------------------------	--	-----------------------------	--	---	------------------------



珍珠	牛黃	琥珀	胆星	白附子
<small>錢各二</small>	<small>分各三</small>	<small>五分</small>		
蟬蛻	天虫	茯苓	皂角	防風
<small>炙</small>				
茯神	天竺黃	橘紅	甘草	薄荷
<small>錢各二</small>	<small>研</small>			
硃砂	天麻	全蝎	礞石	冰
<small>錢各一</small>	<small>三錢</small>	<small>十箇酒洗焙</small>	<small>三錢</small>	
麝香	麝香			
<small>分各三</small>				
片				
右為末和勻每服一二分或用神麴糊丸麻子大每				
服一二十丸量兒大小加減鈎藤一錢薄荷三分泡				
湯下凡小兒有病即宜少與乳食若似驚風即宜斷				
欽定四庫全書				
蘭臺軌範				
乳如欲食與米飲一勺必欲食乳須先將乳擠空然				
後以空乳令吮否則乳下喉中即成頑痰雖神丹無				
效俟少安漸與乳可也				
治疳積方				
不落水雞肝酒洗同黃蠟一錢頓熟去蠟吃				
治赤瘡方				
寒水石	黃柏	黃連	大黃	鉛粉
枯礬	白礬粉	冰片	青黛	



<p>右藥隨舉幾味研麻油調塗</p>		<p>治痘出眼中方</p> <p>取田雞胆點之愈</p>		<p>治癩方</p> <p>不拘頭面遍身痛癢黃水出俱效</p>		<p>黃連 一兩</p> <p>蛇床子 五錢</p> <p>五倍子 一兩</p> <p>輕粉 三錢</p> <p>黃柏</p>		<p>五錢</p> <p>枯礬 五錢</p> <p>川椒 二錢</p> <p>冰片 一錢</p> <p>同研麻油調塗</p>		<p>治骨蒸方</p>		<p>銀柴胡 八分</p> <p>鮮骨皮 一錢</p> <p>酒洗真青蒿 八分</p> <p>川連 五分</p> <p>犀</p>		<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭臺軌範</p>		<p>角 五分</p> <p>丹皮 五分</p> <p>甘草 三分</p> <p>元參 一錢</p> <p>竹葉 二十片</p> <p>蘆</p>		<p>根 一兩</p> <p>水煎服</p>		<p>治遺尿方</p> <p>新切幼書</p>		<p>雞胫 一具</p> <p>桑螵蛸 三枚</p> <p>甘草 三分</p> <p>黃芪</p> <p>牡蠣</p>		<p>錢各五</p> <p>為粗末每用一錢水一盞煎去渣服</p>		<p>治牙疳方</p>		<p>人中白 一錢</p> <p>枯礬 三分</p> <p>紅褐子 一錢</p> <p>存性雞肫皮 二錢</p>		<p>霜梅 八分</p> <p>雄黃 五分</p> <p>硼砂 五分</p> <p>銅青 三分</p>	
--------------------	--	------------------------------	--	---------------------------------	--	---	--	--	--	-------------	--	---	--	---------------------------	--	---	--	------------------------	--	-------------------------	--	---	--	----------------------------------	--	-------------	--	--	--	---	--



右為末煎膿茶調搽吐出涎

治吐乳方

幼幼新書

蓮子心

七枚

丁香

三粒

人參

三分

右同研乳汁浸令兒吮食

治螳螂子方

即妬乳也

青黛

一錢

元明粉

三錢

硼砂

一錢

薄荷

五分

冰片

一分

分

右同研細擦口內兩頤吐出涎一日用四五次

欽定四庫全書

蘭臺軌範

自古無螳螂子之病凡小兒變蒸之候每有口內微

腫惡乳之時名曰妬乳不治自愈其或不能坐視則

用此方塗口亦易愈近日海濱妖婦造割螳螂子之

法以騙人取利強者幸愈弱者俱死惟松江蘇州最

受其害蓋小兒兩頤內外皮有兩層中空處有脂膜

一塊人人皆然割去復生妖婦以此惑人人見果有

如螳螂子者遂相信不疑死而不悔深可憐憫除蘇

松之外天下並無有生螳螂子而死者斷不可為其



<p>所愚而受害也</p> <p>損 小兒股內無力因跌而起一足不伸臂左右大小不同腰脊歪斜脊骨高起俱屬不治或久而成毒亦為廢人</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>蘭臺軌範</p>	<p>蘭臺軌範卷八</p>
---	---------------------------	---------------

