

欽定四庫全書

子部  
醫門法律卷一

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣沈清蘊

謄錄監生臣施華



欽定四庫全書

子部五

醫門法律

醫家類

提要

臣

等謹案醫門法律十二卷附寓意草四卷

國朝喻昌撰昌字嘉言南昌人所著有尚論篇

發明傷寒之理已著於錄是編又取風寒暑

濕燥火六氣及諸襍証分門別類每門先冠

以論次為法次為律法者治療之術運用之

欽定四庫全書

醫門法律

機律者明著醫之所以失而判定其罪如折

獄然蓋古來醫書惟著病源治法而多不及

施治之失即有辨明舛誤者亦僅偶然附論

而不能條條摘其咎昌此書乃專為庸醫誤

人而作其分別疑似既深明毫釐千里之謬

使臨症者不敢輕嘗其抉摘瑕疵併使執不

寒不熱不補不瀉之方苟且依違遷延致變

者皆無所遁其情狀亦可謂思患預防深得



	利人之術者矣後附寓意艸四卷皆其所治	醫案首冠論二篇一曰先議病後用藥一曰	與門人定議病症次為治驗六十二條皆反	覆推論務闡明審症用藥之所以然較各家	醫案但泛言某病用某藥愈者亦極有發明	足資開悟焉乾隆四十六年三月恭校上	總纂官 <small>臣</small> 紀昀 <small>臣</small> 陸錫熊 <small>臣</small> 孫士毅 總校官 <small>臣</small> 陸費墀	欽定四庫全書 醫門法律	
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---	----------------	--



欽定四庫全書

醫門法律卷一

南昌喻昌撰

一  
明望色之法

望色論

附律二條

喻昌曰人之五官百骸賅而存者神居之耳色者神之  
旗也神旺則色旺神衰則色衰神藏則色藏神露則色  
露帝王之色龍文鳳彩神仙之色嶽翠山光榮華之色

欽定四庫全書

醫門法律

珠明玉潤壽考之色栢古松蒼乃至貧夭之色重濁晦  
滯枯索堊鰲莫不顯呈於面而病成於內者其色之著  
見又當何如內經舉面目為望色之要謂面黃目青面  
黃目赤面黃目白面黃目黑者皆不死面青目赤面赤  
目白面青目黑面黑目白面赤目青皆死蓋以黃為中  
土之色病人面目顯黃色而不受他色所侵則吉面目  
無黃色而惟受他色所侵則凶雖目色之黃濕深熱熾  
要未可論於死生之際也然五藏善惡之色見於面者





額頰鼻頤各有分部刺熱篇謂肝熱病者左頰先赤心  
熱病者額先赤脾熱病者鼻先赤肺熱病者右頰先赤  
腎熱病者頤先赤病雖未發見赤色者刺之名曰治未  
病是則五藏分部見於面者在所加察不獨熱病為然  
矣然更有進焉則目下之精明鼻間之明堂是也經謂  
精明五色者氣之華也是五藏之精華上見為五色變  
化於精明之間某色為善某色為惡可先知也謂容色  
見上下左右各在其要是明堂上下左右可分別其色

欽定四庫全書

醫門法律

之逆從並可分別男女色之逆從故為要也察色之妙  
無以加矣仲景更出精微一法其要則在中央鼻準毋  
亦以鼻準在天為鎮星在地為中嶽木金水火四藏病  
氣必歸併於中土耶其謂鼻頭色青腹中苦冷痛者死  
此一語獨刊千古後人每恨卒病論亡莫繇仰遡淵源  
不知此語正其大旨也蓋厥陰肝木之青色挾腎水之  
寒威上徵於鼻下徵於腹是為暴病頃之亡陽而卒死  
耳其謂鼻頭色微黑者有水氣又互上句之意見黑雖



為腎陰之色微黑且無腹痛但主水氣而非暴病也謂  
色黃者胸上有寒寒字傷寒論中多指為痰言胸有積  
痰也謂色白者亡血白者肺之色肺主上焦以行營衛  
營不充則鼻色白故知亡血也謂設微赤非時者死火  
之色歸於土何遽主死然非其時而有其氣則火非生  
土之火乃尅金之火又主臟燥而死矣次補察目之法  
謂其目正圓者瘥不治次補察面五法謂色青為痛色  
黑為勞色赤為風色黃者便難色鮮明者有留飲黃色

欽定四庫全書

醫門法律

鮮明為留飲又即色黃者胸上有寒之互辭語語皆表  
章內經補其未備故可法可傳也色之善者青如翠羽  
赤如雞冠黃如蟹腹白如豕膏黑如烏羽色之惡者青  
如草茲赤如衄血黃如枳實黑如焔白如枯骨五藏有  
精華則色善無精華則色惡初非以青黑為大忌也未  
病先見惡色病必惡靈樞謂赤色出於兩顴大如拇指  
病雖小愈必卒死黑色出於天庭大如拇指必不病而  
卒死義與容色見明堂上下左右同而此為暴病耳若



夫久病之色必有受病之應肺熱病者色白而毛敗應  
之心熱病者色赤而絡脉溢應之肝熱病者色蒼而爪  
枯應之脾熱病者色黃而肉蠕動應之腎熱病者色黑  
而齒槁應之夫病應其色庸工亦多見之然冀噓枯澤  
稿於無益之日較之治未病者不啻倍蓰無算矣更有  
久見病色其人原不病者庸工且心炫而竊疑之殊不  
知此絡脉之色不足畏也蓋陰絡之色隨其經而不變  
色之變動無常者皆陽絡之色也寒多則凝泣凝泣則

欽定四庫全書

醫門法律

青黑熱多則淖澤淖澤則黃赤內經謂此皆無病何反  
怪之耶然而察色之法亦有其傳岐伯謂生於心如以  
縞裹朱生於肺如以縞裹紅生於肝如以縞裹紺生於  
脾如以縞裹括萋實生於腎如以縞裹紫縞素白也加  
於朱紅紺黃紫之上其內色耀映於外若隱若見面色  
由肌內而透於外何以異此所以察色之妙全在察神  
血以養氣氣以養神病則交病失眠之人神有饑色喪  
亡之子神有呆色氣索自神失所養耳小兒佈痘壯火



內動兩目先現水晶光不俟痘發大劑壯水以制陽光  
俾毒火一線而出不致燎原可免劫厄古今罕及此者  
因併誌之

律一條

凡診病不知察色之要如舟子不識風汛動罹覆溺鹵  
莽麓踈醫之過也

一 明聞聲之法

聞聲論 附律二條

欽定四庫全書

醫門法律

喻昌曰聲者氣之從喉舌而宣於口者也新病之人聲  
不變小病之人聲不變惟久病苛病其聲乃變迨聲變  
其病機顯呈而莫逃所可聞而知之者矣經云聞而知  
之謂之神果何脩而若是古人聞隔垣之呻吟叫哀未  
見其形先得其情若精心體驗積久誠通如瞽者之耳  
偏聰豈非不分其心於目耶然必問津於內經金匱以  
求生心變化乃始稱為神耳內經本宮商角徵羽五音  
呼笑歌哭呻五聲以叅求五藏表裏虛實之病五氣之



邪其謂肝木在音為角在聲為呼在變動為握心火在音為徵在聲為笑在變動為憂脾土在音為宮在聲為歌在變動為噦肺金在音為商在聲為哭在變動為欬腎水在音為羽在聲為呻在變動為慄變動者遷改其常志也以一聲之微分別五藏并及五藏變動以求病之善惡法非不詳然人之所以主持一身者尤在於氣與神焉經謂中盛藏滿氣勝傷恐者聲如從室中言是中氣之濕也謂言而微終日乃復言者此奪氣也謂言語善惡不避親疎者此神明之亂也是聽聲中并可得其神氣之變動義更精矣金匱復以病聲內合病情謂病人語聲寂寂然喜驚呼者骨節間病語聲喑喑然不徹者心膈間病語聲啾啾然細而長者頭中病只此三語而下中上三焦受病莫不有變動可徵妙義天開直可隔垣洞晰語聲寂寂然者不欲語而欲嘿也靜嘿統屬三陰此則顛係厥陰所主何以知之厥陰在志為驚在聲為呼病本緘默而有時驚呼故知之耳惟在厥陰

欽定四庫全書

醫門法律



病必深入下焦骨屬筋節間也喑喑然聲出不徹者聲出不揚也胸中大氣不轉出入升降之機艱而且遲是可知其病在中焦胸膈間也啾啾然細而長者謂其聲自下焦陰分而上緣足太陽主氣與足少陰為表裏所以腎邪不劑頸而還得從太陽部分達於巔頂腎之聲本為呻今腎氣從太陽經脈直攻於上則腎之呻並從太陽變動而啾啾細長為頭中病也得仲景此段更張其說而聽聲察病愈推愈廣所以書不盡言學者當自求無盡之藏矣

欽定四庫全書

醫門法律

律二條

凡聞聲不能分呼笑歌哭呻以求五藏善惡五邪所干及神氣所主之病者醫之過也

凡聞聲不別雌雄長短出於三焦何部者醫之過也

一 明辨息之法

辨息論

附律一條

喻昌曰息出於鼻其氣布於膻中膻中宗氣主上焦息



道恒與肺胃闕通或清而徐或短而促咸足以占宗氣之盛衰所以經云乳之下其動應衣宗氣泄也人顧可奔迫無度令宗氣盛喘數急有餘反成不足耶此指呼出為息之一端也其謂起居如故而息有音此肺之絡脉逆也不得卧而息有音者是陽明之逆也益見布息之氣闕通肺胃又指呼出為息之一端也呼出心肺主之吸入腎肝主之呼吸之中脾胃主之故惟脾胃所主中焦為呼吸之總持設氣積賁門不散兩阻其出入則

欽定四庫全書

醫門法律

危急存亡非常之候善養生者俾賁門之氣傳入幽門

幽門之氣傳二陰之竅而出乃不為害其上焦下焦各分呼

出吸入未可以息之一字統言其病矣此義惟仲景知

之謂息搖肩者心中堅息引胸中上氣者歎息張口短

氣者肺痿唾沫分其息顛主乎呼而不與吸並言似乎

創說不知仲景以述為作無不本之內經昌前所擬呼

出為息二端不足盡之蓋心火乘肺呼氣奔促勢有必

至呼出為心肺之陽自不得以肝腎之陰混之耳息搖



肩者肩隨息動惟火故動也息引胸中上氣欬者肺金收降之令不行上逆而欬惟火故欬也張口短氣肺痿唾沫又金受火形不治之證均以出氣之粗名為息耳然則曷不徑以呼名之耶曰呼中有吸吸中有呼剖而中分聖神所不出也但以息之出者主呼之病而息之入者主吸之病不待言矣經謂乳子中風熱喘鳴肩息以及息有音者不一而足惟其不與吸並言而吸之病轉易辨識然尚恐後人未悉復補其義云吸而微數其

欽定四庫全書

醫門法律

病在中焦實也當下之即愈虛者不治在上焦者其吸促在下焦者其吸遲此皆難治呼吸動搖振振者不治見吸微且數吸氣之往返於中焦者速此必實者下之通其中焦之壅而即愈若虛則肝腎之本不固其氣輕浮脫之於陽不可治矣昌前所指賁門幽門不下通為危急存亡非常之候者此也在上焦者其吸促以心肺之道近其真陰之虛者則從陽火而升不入於下故吸促是上焦未嘗不可候其吸也下焦者其吸遲肝腎之





道遠其元陽之衰者則困於陰邪所伏卒難升上故吸  
 遲此真陰元陽受病故皆難治若呼吸往來振振動搖  
 則營衛往返之氣已索所存呼吸一綫耳尚可為哉學  
 者先分息之出入以求病情既得其情合之愈益不爽  
 若但統論呼吸其何以分上中下三焦所主乎噫微矣

律一條

凡辨息不分呼出吸入以求病情毫釐千里醫之過也

一  
明胸中大氣之法

欽定四庫全書

醫門法律

大氣論

附律一條

喻昌曰天積氣耳地積形耳人氣以成形耳惟氣以成  
 形氣聚則形存氣散則形亡氣之關於形也豈不鉅哉  
 然而身形之中有營氣有衛氣有宗氣有藏府之氣有  
 經絡之氣各為區分其所以統攝營衛藏府經絡而令  
 充周無間環流不息通體節節皆靈者全賴胸中大氣  
 為之主持大氣之說內經嘗一言之黃帝問地之為下  
 否乎岐伯曰地為人之下太虛之中者也曰馮乎曰大



氣舉之也可見太虛寥廓而其氣充周磅礴足以包舉地之積形而四虛無著然後寒暑燥濕風火之氣六入地中而生其化設非大氣足以苞地於無外地之震崩墜陷且不可言胡以巍然中處而永生其化耶人身亦然五藏六府大經小絡晝夜循環不息必賴胸中大氣斡旋其間大氣一衰則出入廢升降息神機化滅氣立孤危矣如之何其可哉金匱亦常一言之曰營衛相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散見營衛兩不和諧氣即

欽定四庫全書

醫門法律

痺而難通必先令營衛相得其氣並行不悖後乃俟胸中大氣一轉其久病駁劣之氣始散然則大氣之關於病機若此後人不一表章非缺典乎或謂大氣即膻中之氣所以膻中為心主宣布政令臣使之官然而叅之天運膻中臣使但可盡寒暑燥濕風火六入之職必如大虛中空洞沕穆無可名象苞舉地形永奠厥中始為大氣膻中既為臣使之官有其職位矣是未可言大氣也或謂大氣即宗氣之別名宗者尊也主也十二經脉



奉之為尊主也。詎知宗氣與營氣衛氣分為三隧。既有隧之可言。即同六入地中之氣。而非空洞無著之比矣。膻中之診。即心包絡宗氣之診。在左乳下原。不與大氣混診也。然則大氣於何而診之。內經明明指出。而讀者不察耳。其謂上附上。右外以候肺內。以候胸中者。正其診也。肺主一身之氣。而治節行焉。胸中芤舉。肺氣於無外。故分其診於右寸。主氣之天部耳。金匱獨窺其微。舉胸痺心痛短氣。總發其義於一門。有謂氣分心下。堅大

欽定四庫全書

醫門法律

如盤邊如旋杯水飲所作形容。水飲久積胸中不散。傷其網縕之氣。乃至心下堅大如盤。遮蔽大氣。不得透過。祇從旁邊轉轉如旋杯之狀。正舉空洞之位。水飲占據。為言其用桂枝去芍藥加麻黃附子以通胸中陽氣者。陽主開陽。盛則有開無塞。而水飲之陰可見。現耳其治胸痺心痛。諸方率以薤白白酒為君。亦通陽之義也。若胸中之陽不虧。可損其有餘。則用枳朮湯足矣。用枳必與朮各半。可過損乎。識此以治胸中之病。寧不思過半。



乎人身神藏五形藏四合為九藏而胸中居一焉胸中雖不藏神反為五神之主孟子之善養浩然原思之歌聲若出金石其得全於天不受人損為何如今人多暴其氣而不顧迨病成復損其氣以求理如本草云枳壳損胸中至高之氣亦有明言何乃恣行無忌耶總由未識胸中為生死第一關耳特於辨息之餘補大氣論以明之

律一條

欽定四庫全書

醫門法律

凡治病傷其胸中正氣致令痞塞痺痛者此為醫咎雖自昔通弊限於不知今特著為戒律不可獲罪於冥冥矣

一 明問病之法

問病論

附律一條

喻昌曰醫仁術也仁人君子必篤於情篤於情則視人猶已問其所苦自無不到之處古人閉戶塞牖繫之病者數問其情以從其意誠以得其歡心則問者不覺煩



病者不覺厭庶可詳求本末而治無誤也如嘗貴後賤  
病名脫營嘗富後貧病名失精以及形志苦樂病同治  
異飲食起居失時過節憂愁恐懼蕩志離魂所喜所惡  
氣味偏殊所宜所忌稟性迥異不問何以相體裁方耶  
所以入國問俗入家問諱上堂問禮臨病人問所便便  
者問其居處動靜陰陽寒熱性情之宜如問其為病熱  
則便於用寒問其為病寒則便於用熱之類所謂順而  
施之也人多偏執已見逆之則拂其意順之則加其病

欽定四庫全書

醫門法律

莫如之何然苟設誠致問明告以如此則善如彼則敗  
誰甘死亡而不降心以從耶至於受病情形百端難盡  
如初病口大渴久病口中和若不問而槩以常法治之  
寧不傷人乎如未病素脾約纔病忽便利若不問而計  
日以施治寧不傷人乎如未病先有錮疾已病重添新  
患若不問而槩守成法治之寧不傷人乎如疑難證著  
意對問不得其情他事間言反呈真面若不細問而急  
遽妄投寧不傷人乎病形篇謂問其病知其處命曰工



今之稱為工者問非所問諛佞其間病者欣然樂從及  
病增更醫亦復如是乃至徬徨醫藥偶遇明者仍復不  
投此宜委曲開導如對君父未可飄然自外也更可怪  
者無知戚友探問忘其愚陋強逞明能言虛道實指火  
稱痰抑孰知其無責而易言耶坐令依傍迎合釀成末  
流無所底止良足悼矣吾徒其明以律已誠以動人共  
砥狂瀾乎

律一條

欽定四庫全書

醫門法律

凡治病不問病人所便不得其情草草診過用藥無據  
多所傷殘醫之過也

一  
明切脉之法

切脉論

附律一條

喻昌曰脉者開天闢地生人之總司有常而不間斷者  
也是故天有三垣九道而七政並行於其間若運璇璣  
者天之脉也地有九州四海而經脉會通於其間若施  
八索者地之脉也人有九藏六府十二經十五絡而營



衛充灌於其間若環轉者人之脉也上古聖神首重切脉雖精微要渺莫不顯傳然以其精微要渺也後人轉摹轉失竟成不停之絕學有志於切脉者必先凝神不分如學射者先學不瞬自為深造庶乎得心應手通於神明夫豈一蹴可幾然必下指部位分明盡破紛紜坦然由之無疑乃有豁然貫通之日否則童而習之白首不得徒以三指一按虛應故事可鄙孰甚且如心與小腸同診肺與大腸同診有識者咸共非之祇以指授無

欽定四庫全書

醫門法律

人未免姑仍其陋毋亦謂心之脉絡小腸小腸之脉絡心肺之脉絡大腸大腸之脉絡肺較他府之不相絡者此為近之耶不知此可以論病機如心移熱於小腸肺移熱於大腸之類不可以定部位也部位之分當求詳於素問而參合於靈樞部位一定胸中茅塞頓開指下精微畢透何快如之素問謂尺內兩傍則季脇也尺外以候腎尺裏以候腹中附上左外以候肝內以候鬲右外以候胃內以候脾上附上右外以候肺內以候胸中



故中而方上應胃	中央者大腸也	脾	下者脾也	肝左者膽也	直下者肝也	也	也	雷公察色之訣謂庭者首面也	靈樞面部所主五藏六府兼統無遺更何疑哉黃帝授	欽定四庫全書	尺裏以候腹二語已盡其義何自昔相傳之誤耶叅之	是以有晉至今幾千年江河不返也不知尺外以候腎	誰不讀之祇以六府茫無所屬不如叔和之脉經顯明	候頭角之氣地以候口齒之氣人以候耳目之氣後人	之天以候肺地以候胸中之氣人以候心上部之天以	謂下部之天以候肝地以候胃人以候脾胃之氣中部	者胸喉中事也下竟下者少腹腰股膝脛足中事也又	左外以候心內以候臆中前以候前後以候後上竟上
故中而方上應胃	中央者大腸也	脾	下者脾也	肝左者膽也	直下者肝也	也	也	雷公察色之訣謂庭者首面也	靈樞面部所主五藏六府兼統無遺更何疑哉黃帝授	欽定四庫全書	尺裏以候腹二語已盡其義何自昔相傳之誤耶叅之	是以有晉至今幾千年江河不返也不知尺外以候腎	誰不讀之祇以六府茫無所屬不如叔和之脉經顯明	候頭角之氣地以候口齒之氣人以候耳目之氣後人	之天以候肺地以候胸中之氣人以候心上部之天以	謂下部之天以候肝地以候胃人以候脾胃之氣中部	者胸喉中事也下竟下者少腹腰股膝脛足中事也又	左外以候心內以候臆中前以候前後以候後上竟上





<p>大腸者腎也<small>挾大腸者頰之上也四藏皆一惟腎有兩</small>  <small>於兩頰</small>當腎者臍也<small>腎與臍對故當</small>面王以上者小腸</p>	<p>也<small>面王鼻準也小腸為府應挾兩頰故</small>面王以下者膀胱</p>	<p>臍子處也<small>面王以下者人中也</small>觀面色五藏六府之應</p>	<p>迎香外顴骨下為大腸之應面王以上為小腸之應面</p>	<p>王以下為膀胱子戶之應合之尺外以候腎尺裏以候</p>	<p>腹中推論其位置一一可得指明之矣左尺為天一所</p>	<p>生之水水生肝木木生君火君火生右尺相火相火生</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>脾土脾土生肺金五藏定位原不殊但小腸當候之於</p>	<p>右尺以火從火也大腸當候之於左尺以金從水也三</p>	<p>焦屬火亦候於右腎膀胱屬水亦候於左腎一尺而水</p>	<p>火兩分一藏而四府兼屬乃天然不易之至道蓋胸中</p>	<p>屬陽腹中屬陰大腸小腸膀胱三焦所傳渣滓水液濁</p>	<p>氣皆陰惟腹中可以位置非若胃為水穀之海清氣在</p>	<p>上膽為決斷之官靜藏於肝可得位之於中焦也至於</p>	<p>上焦重重鬲膜遮蔽清虛之宇蓮花之藏惟心肺得以</p>
--	--	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



居之而諸府不預焉所謂鬲育之上中有父母者是也  
心為陽父也肺為陰母也心主血肺主氣共營衛於週  
身非父母而何然心君無為而治肺為相傳華蓋而覆  
於心上以布胸中之氣而變理其陰陽膻中為臣使包  
裹而絡於心下以寄喉舌之司而宣布其政令是心包  
為包裹心君之膜而非府矣第心火寂然不動動而傳  
之心胞即合相火設君火不動不過為相火之虛位而  
已三焦之火傳入心胞即為相火設三焦之火不上亦

欽定四庫全書

醫門法律

不過為相火之虛位而已素問謂手少陽與心主為表  
裏靈樞謂手厥陰之脉出屬心胞絡下鬲歷絡三焦手  
少陽之脉散絡心包合心主正見心包相火與手少陽  
相火為表裏故歷絡於上下而兩相輸應也心君泰寧  
則相火安然不動而膻中喜樂出焉心君擾亂則相火  
翕然從之而百度改其常焉心包所主二火之出入關  
係之重如此是以亦得分手經之一而可稱為府耳夫  
豈六府之外更添一府哉至若大腸小腸濁陰之最者



乃與心肺同列混地獄於天堂安乎不安乎豈有濁氣  
上干三焦交亂尚可稱為平人乎敢著之為法一洗從  
前之陋

律一條

凡診脉不求明師傳授徒遵往法圖一弋獲以病試手  
醫之過也

一 明合色脉之法

合色脉論

附律一條  
附辨脉十法

欽定四庫全書

醫門法律

喻昌曰合色脉之法聖神所首重治病之權輿也色者  
目之所見脉者手之所持而合之於非目非手之間總  
以靈心為質內經云上古使飭貸季理色脉而通神明  
合之金木水火土四時八風六合不離其常是則色脉  
之要可通神明直以之下合五行休王上副四時往來  
六合之間八風鼓坼不離常候咸可推其變化而前知  
况人身病機乎又云色之變化以應四時之脉此上帝  
之所貴以合於神明也所以遠死而近生是色之變化



於精明之間者合之四時之脉辨其臧否蚤已得生死之徵兆故能常遠於死而近於生也常遠於死而近於生寧不足貴乎其謂善診者察色按脉先別陰陽審清濁而知部分視喘息聽音聲而知所苦觀權衡規矩按尺寸觀浮沉滑濇而知病所生是由色脉以參合於視息聽聲相時而求病所生之高下中外矣精矣微矣要未可為中人以下者道也是以有取於上工中工下工三等上工十全九中工十全七下工十全六故云善調

欽定四庫全書

醫門法律

尺者不待於寸善調脉者不待於色又根本枝葉之分矣然必能參合三者而兼行之更為本末皆得之上工也合之維何五藏之色在王時見者春蒼夏赤長夏黃秋白冬黑五藏所主外榮之常白當肺當皮赤當心當脉黃當脾當肉青當肝當筋黑當腎當骨五藏之脉春弦夏鈎秋毛冬石強則為太過弱則為不及四時有胃曰平胃少曰病無胃曰死有胃而反見所勝之脉甚者今病微者至其所勝之時而病合其色脉而互推之此



非顯明易遵者乎仲景亦出方便法門謂寸口脉動者因其王時而動假令肝色青而返白非其時色脉見皆當病蓋兩手太陰經之脉總稱寸口因其王時而動者肝王色青其脉之動當微弦設反見赤色反得毛脉至其所不勝之時而死矣惟本王之色脉青而且弦為得春令之正此外不但白色毛脉為鬼賊即見赤黃黑之色得鈎代石之脉皆當主病特有輕重之分耳內經言法已詳仲景復以金鍼度之學者可不明哉

欽定四庫全書

醫門法律

律一條

凡治病不合色脉叅互考驗得此失彼得偏遺全祇名  
 麤工臨證模糊未具手眼醫之罪也

一 明營衛之法

營衛論

律二條附

喻昌曰營衛之義聖神所首重也靈樞謂宗氣積於上焦營氣出於中焦衛氣出於下焦謂其所從出之根柢也衛氣根於下焦陰中之微陽行至中焦從中焦之有



陰有陽者升於上焦以獨生陽氣是衛氣本清陽之氣以其出於下焦之濁陰故謂濁者為衛也人身至平旦陰盡而陽獨治目開則其氣上行於頭出於足太陽膀胱經之睛明穴故衛氣晝日外行於足手六陽經所謂陽氣者一日而主外循太陽之經穴上出為行次又謂太陽主外也衛氣剽悍不隨上焦之宗氣同行經隧而自行各經皮膚分肉之間故衛行脉外溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔也營氣根於中焦陽中之陰行至

欽定四庫全書

醫門法律

上焦隨上焦之宗氣降於下焦以生陰氣是營氣本濁陰之氣以其出於上焦之清陽故謂清者為營也營氣靜專必隨上焦之宗氣同行經隧始於手太陽肺經大淵穴而行手陽明大腸經足太陽膀胱經足少陰腎經手厥陰心胞絡手少陽三焦經足少陽膽經足厥陰肝經而又始於手太陰肺經故謂太陰主內營行脉中也衛氣晝行於陽二十五度當其王即自外而入交於營營氣夜行於陰二十五度當其王即自內而出交於衛



其往來貫注並行不悖無時或息營中有衛衛中有營設  
分之為二安所語同條共貫之妙耶營衛一有偏勝其患  
即不可勝言衛偏勝則身熱熱則腠理閉喘麤為之俛仰  
汗不出齒乾煩冤營偏勝則身寒寒則汗出身常清數慄  
而厥衛偏衰則身寒營偏衰則身熱雖亦如之然必有間  
矣若夫營衛之氣不行則水漿不入形體不仁營衛之氣  
泣除則精氣弛壞神去而不可復收是以聖人陳陰陽筋  
脈和同骨髓堅固氣血皆從如是則內外調和邪不能害

欽定四庫全書

醫門法律

耳目聰明氣立如故可見調營衛之義為人身之先務  
矣深維其機覺衛氣尤在所先焉經謂陽氣破散陰氣  
迺消亡是衛氣者保護營氣之金湯也謂審察衛氣為  
百病母是衛氣者出納病邪之喉舌也易云一陰一陽之  
謂道迺其扶陽抑陰無所不至仙道亦然噫嘻鼻氣通  
於天者也口氣通於地也人但知以口之氣養營惟知  
道者以鼻之氣養衛養營者不免縱口傷生養衛者服  
天氣可通神明兩者之月異而歲不同也豈顧問哉



附  
答營衛五問

問衛氣晝行陽二十五度豈至夜而伏耶營氣夜行陰二十五度豈至晝而伏耶曰人身晝夜循環不息只一氣耳從陰陽而分言二氣晝為陽則衛氣主之夜為陰則營氣主之衛氣夜行於陰營氣晝行於陽不當其王則不得而主之耳譬如日月之行原無分於晝夜而其經天之度則各有分矣

問營行脉中衛行脉外果孰為之分限耶曰此義前論

欽定四庫全書

醫門法律

中已明之矣更推其說天包地陽包陰氣包血自然之理也營衛同行經脉中陰自在內為陽之守陽自在外為陰之護所謂並行不悖也兵家安營將帥自然居中士卒自然衛外男女居室男自正位乎外女自正位乎內聖神亦只道其常耳

問二十二難謂經言脉有是動有所生病一脉變為二病其義至今未解曰此正論營衛主病先後也一脉變為二病者同一經脉病則變為二淺深不同也邪





入之淺氣留而不行所以衛先病也及邪入漸深而  
血壅不濡其營乃病則營病在衛病後矣使衛不先  
為是動而營何自後所生耶至仲景傷寒論太陽經  
一日而主外分風傷衛寒傷營風寒兩傷營衛而出  
脉證及治百種之變精義入神功在軒岐之上

問居常調衛之法若何曰每至日西身中陽氣之門乃  
閉即當加意謹護勿反開之經謂暮而收拒毋擾筋  
骨毋見霧露隱括調衛之義已悉收者收藏神氣於

欽定四庫全書

醫門法律

內也拒者捍拒邪氣於外也如晨門者昏閉明啓尚  
何暴客之虞哉即使逢年之虛遇月之空身中之氣  
自固虛邪亦何能中人耶

問竒經之病亦關營衛否曰竒經所主雖不同正經之  
病其關於營衛則一也其陰不能維於陰悵然自失  
志者營氣弱也陽不能維於陽溶溶不能自收持者  
衛氣衰也陽維為病苦寒熱者邪入衛而主氣也陰  
維為病苦心痛者邪入營而主血也經所謂肺衛心



營者是也陰躄為病陽緩而陰急陽病而陰不病也
陽躄為病陰緩而陽急陰病而陽不病也此等病多
於正病中兼見之惟識其為營衛之所受也則了無疑
惑矣蓋人身一氣周流無往不貫十二經脉有營衛
奇經八脉亦有營衛奇經附屬於正經界中者得以
同時並注也繇陽維陰維陽躄陰躄推之衝脉之縱
行也帶脉之橫行也任脉之前行也督脉之後行也
孰非一氣所流行耶一氣流行即得分陰分陽矣營
衛之義亦何往而不貫哉
律二條
凡營病治衛衛病治營與夫真邪不別輕病重治重病
輕治顛倒誤人醫之罪也
凡醫不能察識營衛受病淺深虛實寒熱先後之變白
首有如童稚不足數也
一 明絡脉之法
絡脉論 律一條附



喻昌曰十二經脉前賢論之詳矣而絡脉則未之及亦  
缺典也經有十二絡亦有十二絡者兜絡之義即十二  
經之外城也復有胃之大絡脾之大絡及奇經之大絡  
則又外城之通界皇華出入之總途也故又曰絡有十  
五焉十二經生十二絡十二絡生一百八十系絡系絡  
生一百八十纏絡纏絡生三萬四千孫絡自內而生出  
者愈多則愈小稍大者在俞穴肌肉間營氣所主外廓  
繇是出諸皮毛方為小絡方為衛氣所主故外邪從衛

欽定四庫全書

醫門法律

而入不遽入於營亦以絡脉纏絆之也至絡中邪盛則  
入於營矣故曰絡盛則入於經以營行經脉之中故也  
然風寒六淫外邪無形易入絡脉不能禁止而盛則入  
於經矣若營氣自內所生諸病為血為氣為痰飲為積  
聚種種有形勢不能出於絡外故經盛入絡絡盛返經  
留連不已是以有取於砭射以決出其絡中之邪今醫  
不用砭射已不足與言至巧而用藥之際不加引經透  
絡功效羈遲安得稱為良工耶至若三部九候內經原



有定位王叔和以相絡之故大小二腸候之於上心主  
之脉候之於下而不知絡脉所主者外所關者小雖是  
系絡表裏相通未可定其診象況水穀變化濁穢之府  
去膈上父母清陽之藏重重脂膜遮蔽其氣迥不相通  
豈可因外絡連屬反謂右寸之清陽上浮者為大腸脉  
沉者為肺脉經所謂藏真高於肺者乃藏真高於大腸  
矣周身之治節渾是大腸主之矣左寸之浮者為小腸  
脉沉者為心脉水中污泥反浮於蓮花之上有是理乎

欽定四庫全書

醫門法律

夫心胞之脉裏擷乎心代君主行事正如宰相統攝政  
府即當從左寸候之若分屬右尺與三焦同位忽焉入  
閣辦事忽焉遠竄遐荒一日萬幾舍樽俎而從事道路  
乎切脈論中已定其診今再論及恐安常者不加深察  
耳唯是經有十二絡有十五難經以陽躄陰躄脾之大  
絡共為十五絡遂為後世定名反遺內經胃之大絡名  
曰虛里貫膈絡肺嚠緊一段後人不敢翻越人之案遂  
謂當增為十六絡是十二經有四大絡矣豈不寃乎昌



謂陽蹻陰蹻二絡之名原誤當是共指奇經為一大絡也蓋十二經各有一絡共十二絡矣此外有胃之一大絡繇胃下直貫膈育統絡諸絡脉於上復有脾之一大絡繇脾外橫貫脇腹統絡諸絡脉於中復有奇經之一大絡繇奇經環貫諸經之絡於周身上下蓋十二絡以絡其經三大絡以絡其絡也難經原有絡脉滿溢諸經不能復拘之文是則八奇經出於十二經脈之外經脈不能拘之不待言矣昌嘗推奇經之義督脉督諸陽而行於背任脉任諸陰而行於前不相絡也衝脉直衝於胸中帶脉橫束於腰際不相絡也陽蹻陰蹻同起於足跟一循外踝一循內踝並行而鬪其捷全無相絡之意陽維陰維一起於諸陽之會一起於諸陰之交名雖曰維乃是陽自維其陽陰自維其陰非交相維絡也設陽蹻陰蹻可言二絡則陽維陰維更可言二絡矣督任衝帶俱可共言八絡矣難經又云奇經之脉如溝渠滿溢流於深湖故聖人不能圖是則奇經明等之絡夫豈有

欽定四庫全書

醫門法律



江河大經之水擬諸溝渠者哉難經又云人脈隆盛入於八脈而不環周故十二經亦不能拘之溢畜不能環流灌溉諸經者也全是經盛入絡故溢畜止在於絡不能環溉諸經也然則竒經共為一大絡夫復何疑

律一條

凡治病不明藏府經絡開口動手便錯不學無術急於求售醫之過也甚有文過飾非欺人欺天甘與下鬼同趣者此宵人之尤不足罪也

欽定四庫全書

醫門法律

附

答內經十問

問逆春氣則傷肝夏為寒變此何病也曰寒變者夏月得病之總名也緣肝木弗榮不能生其心火至夏心火當旺反衰北方腎水得以上陵其候掩抑而不光明收引而不發露得食則飽悶遇事則狐疑下利奔迫慘然不樂甚者戰慄如喪神守證與啓玄子益火之源以消陰翳似同而實大異蓋彼所謂益火之源者主君相二火而言非用黃連即用桂附而此所謂



益火之源者全在發舒肝木之鬱過與黃連桂附絕不相干也

問逆秋氣則傷肺冬為飡泄與春傷於風夏生飡泄有別否曰傷風而飡泄以風為主風者東方木也傷肺而飡泄以肺為主肺者西方金也其候各異安得比而同之風邪傷人必入空竅而空竅惟腸胃為最風既居於腸胃其導引之機如順風揚帆不俟脾之運化食入即出以故飡已即泄也不知者以為脾虛

欽定四庫全書

醫門法律

完穀不化如長夏洞泄寒中及冬月飡泄之泄反以補脾剛燥之藥助風性之勁有泄無已每至束手無策倘知從春令治之用桂枝領風從肌表而出一二劑而可愈也而秋月之傷肺傷於肺之燥也與秋傷於燥冬生咳嗽同是一病但在肺則為咳嗽在大腸則為飡泄所謂肺移熱於大腸久為腸澼者即此病也但使肺熱不傳於大腸則飡泄自止不知者惟務止泄以燥益燥吾目中所見諸大老之誤歷歷可指



也寃哉

問逆冬氣則傷腎春為痿厥同一病乎曰痿自痿厥自厥本是一病然痿者必至於厥厥者必至於痿究竟是一病也但肝氣可持則痿病先見筋脈未損則厥病先見耳肝主筋肝病則筋失所養加以夙有筋患不覺忽然而痿矣肝氣以條達為順素多鬱怒其氣不條達而橫格漸至下虛上盛氣高不返眩暈不知人而厥矣厥必氣通始甦也此皆冬時失養藏之道欽定四庫全書

醫門法律

正氣不足之病與治痰治風絕不相干治痰與風虛者益虛矣一味培補腎水生津養血聽其筋自柔和肝自條達可也若精枯氣削亦難為矣

問秋傷於濕上逆而咳發為痿厥與逆冬氣則傷腎春為痿厥有別否曰此痿厥與春月之痿厥大異秋傷於濕吾已力辨其為傷燥矣傷於燥則肺先病也咳者肺之本病其候不一上逆而咳燥之徵也至發而為痿則肺金摧乎肝木發而為厥則肺氣逆而不行





燥之極矣此蓋燥火內燔金不寒水不冷秋冬不能  
收藏與春月不能發生之故相去不亦遠乎

問逆春氣則少陽不生肝氣內變逆夏氣則太陽不長  
心氣內洞逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿逆冬氣則  
少陰不藏腎氣獨沉與前寒變等病又不同者何也  
曰前言逆春氣而夏始病此言逆春氣而春即病也  
春氣屬少陽木主生夏氣屬太陽火主長秋氣屬太  
陰金主收冬氣屬少陰水主藏春未至而木先芽夏  
未至而火先朗此為休徵春已至而木不生夏已至  
而火不長此為咎徵若春已過而不生夏已過而不  
長則死期迫矣收藏亦然肝氣內變即所謂不條達  
而橫格也心氣內洞洞開也心虛則洞然而開有人  
覺心大於身大於室少頃方定者正此病也惟心洞  
開北方寒水得乘機竊入為寒變之病非心氣內洞  
別為一病也

問寒變與煎厥皆屬夏月之病究竟何別曰寒變者南

欽定四庫全書

醫門法律



方心火無權為北方寒水所變也煎厥者北方腎水  
無權而南方心火亢甚無制也兩者天淵不可同論  
煎者火性之內燔厥者火氣之上逆即經文陽氣者  
煩勞則張精絕辟積於夏之說可見陽根於陰深藏  
腎水之中惟煩勞無度則陽張於外精絕於內延至  
夏月火王而煎厥之病生矣

問逆冬氣則少陰不藏腎氣獨沉又云味過於甘心氣  
喘滿色黑腎氣不衡此何解也曰此未經闡發之義

欽定四庫全書

醫門法律

蓋少陰主藏者也冬月水旺腎藏甚富源泉混混盈  
科而進若冬無所藏新舊不相承接有獨沉而已太  
素不解其旨至謂獨沉為沉濁何況後人耶味過於  
甘腎氣不衡註作不平亦屬膚淺蓋人身心腎相交  
水火相濟者其恒也味過於甘腎氣為土掩而不上  
交於心則心氣亦不得下交於腎所以鬱抑而為喘  
滿也腎氣不衡即腎氣獨沉之變文見心腎交則腎  
脈一高一下猶權衡然知獨沉為有權無衡也則不



衡二字恍然矣夫腎間之氣升灌於上則為榮華獨  
沉於下則為枯謝難經謂五藏脈平而死者生氣獨  
絕於內不滿五十動一止者腎氣先盡故知腎氣獨  
沉非細故也

問味過於酸肝氣以津脾氣乃絕此何解也曰此人身  
消息之所在王註牽強不合乎道夫人天真之氣全  
在於胃津液之多寡即關真氣之盛衰而胃復賴脾  
以運行其津液一藏一府相得益彰所以胃不至於

欽定四庫全書

醫門法律

過濕脾不至於過燥也觀下文味過於苦脾氣不濡  
胃氣乃厚其為脾過燥胃過濕可知然終是相連藏  
府嘿相灌滲所以脾氣但言不濡病反在胃且未甚  
也至以過酸之故助其曲直將胃中津液日漸吸引  
注之於肝轉覺肝氣津潤有餘矣肝木有餘勢必尅  
土其脾氣坐困不至於絕不已耳若胃中津液尚充  
縱脾氣不濡有濡之者在也亦安得坐斃哉

問味過於苦胃氣乃厚味過於辛精神乃央註謂厚為



強厚夾為久長豈五味中酸鹹甘多所損苦與辛多  
所益乎曰二義原不作此解王註與經文全相背謬  
觀於胃氣迺厚繇於脾氣不濡明係脾困不為胃行  
津液胃氣積而至厚也胃氣一厚容納遂少反以有  
餘成其不足更難施治今人守東垣一家之學遇胃  
病者咸用補法其有愈補愈脹者正坐此弊如西北  
之人喜食生硬麵酪迨至受病投以牽牛巴豆乃始  
暢適即香砂橘半用且不應况用參朮之補乎內經

欽定四庫全書

醫門法律

有言胃氣實則脹虛則泄蓋可知矣至精神乃夾上  
文既云筋脉沮弛明是筋脉得辛而緩散不收也况  
人之精神全貴收藏不當耗散寧有辛散既久而不  
為殃害者耶曰夾則其為病且有卒暴之虞矣相傳  
多食辛令人夭豈不然哉

問味過於鹹大骨氣勞從前無解請一明之曰身中消  
息有謂心未有不正腎未有不邪者以腎為作強之  
官也有謂腎未有不正心未有不邪者以心為情慾



<p>之府也大骨氣勞心腎兩有所涉而實有不盡然者 嘗見高僧高道棲真習定忽焉氣動精傾乃知味過 於鹹大骨氣勞之說不盡關於情慾耳蓋食鹹過多 峻補其腎腰骨高大之所其氣忽積喜於作勞氣既 勃勃內動則精闕勃勃欲開雖不見可欲而不覺闕 開莫制矣經謂強力入房腎氣乃傷高骨乃壞此固 嗜慾無節者之本病奈何清修卓練之士每於蔬菜 間多食鹹藏厚味以虧道體無有以內經之理一陳</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>其前者及病已成而食淡齋長年累月自苦亦足補 偏救敝然不如當日味勿過鹹之超矣因并及之</p>	<p>申明內經法律<small>律一條</small> 發明內經二條</p>	<p>凡病有標本更有似標之本似本之標若不明辨陰陽 逆從指標為本指本為標指似標者為標似本者為 本迷亂經常倒施鍼藥醫之罪也</p>	<p>治病必求其本</p>	<p>萬事萬變皆本陰陽而病機藥性脉息論治則最切</p>
--	------------------------	---	--	---	---------------	-----------------------------



於此故凡治病者在必求其本或本於陰或本於陽  
知病所繇生而直取之乃為善治若不知求本則茫  
如望洋無可問津矣今世不察聖神重本之意治標  
者常七八治本者無二三且動稱急則治標緩則治  
本究其所為緩急顛倒錯認舉手誤人失於不從明  
師講究耳所以凡因病而致逆因逆而致變因寒熱  
而生病因病而生寒熱者但治其所生之本原則後  
生諸病不治自愈所以得陰脈而見陽證者本陰標

欽定四庫全書

醫門法律

陽也得陽脈而見陰證者本陽標陰也若更治其標  
不治其本則死矣為醫而可不知求本哉

知標與本用之不死明知逆順正行無間不知是者不  
足以言診足以亂經故大要曰粗工嘻嘻以為可知言  
熱未已寒病復始同氣異形迷診亂經此之謂也

中道而行無所疑問不有真見安能及此粗工妄謂  
道之易知故見標之陽輒從火治假熱未除真寒復  
起雖陰陽之氣若同而變見之形迥異粗工昧此未



有不迷亂者矣

百病之起多生於本六氣之用則有生於標者有生於中氣者太陽寒水本寒標熱少陰君火本熱標寒其治或從本或從標審寒熱而異施也少陽相火從火化為本太陰濕土從濕化為本其治但從火濕之本不從少陽太陰之標也陽明燥金從燥化燥為本陽明為標厥陰風木從風化風為本厥陰為標其治不從標本而從乎中中者中見之氣也蓋陽明

欽定四庫全書

醫門法律

與太陰為表裏其氣互通於中是以燥金從濕土之中氣為治厥陰與少陽為表裏其氣互通於中是以風木從相火之中氣為治亦以二經標本之氣不合故從中見之氣以定治耳若夫太陽少陰亦互為中見之氣者然其或寒或熱標本甚明可以不求之於中耳至於諸病皆治其本惟中滿及大小二便不利治其標蓋中滿則胃滿胃滿則藥食之氣不能行而藏府皆失所稟故無暇治其本先治其標更為本之



本也二便不通乃危急之候諸病之急無急於此故亦先治之舍此則無有治標者矣至於病氣之標本又自不同病發而有餘必累及他藏他氣先治其本不使得入他藏他氣為善病發而不足必受他藏他氣之累先治其標不使累及本藏本氣為善又如病為本工為標工不量病之淺深病不擇工之臧否亦是標本不得也緣標本之說錯出難明故此述其大畧云

欽定四庫全書

醫門法律

一 申治病不本四時之律

律一條  
發明內經五條

凡治病而逆四時生長化收藏之氣所謂違天者不祥醫之罪也

治不本四時

不本四時者不知四時之氣各有所本而逆其氣也春生本於冬氣之藏夏長本於春氣之生長夏之化本於夏氣之長秋收本於長夏之化冬藏本於秋氣之收如冬氣不藏無以奉春生春氣不生無以奉夏





長不明天時則不知養藏養生之道從何補揀

逆春氣則少陽不生肝氣內變 又夏為寒變

陽氣不能鼓動而生出內鬱於肝則肝氣混揉變而傷矣

肝傷則心火失其所生故當夏令而火有不足寒水侮之變熱為寒也

逆夏氣則太陽不長心氣內洞 又秋為痰癰

陽氣不能條暢而外茂內薄於心燠熱內消故心中

欽定四庫全書

醫門法律

洞然而空也心虛內洞則諸陽之病作矣

心傷則暑氣乘之至秋而金氣收斂暑邪內鬱於是

陰欲入而陽拒之故為寒火欲出而陰束之故為熱

金火相爭故寒熱往來而為痰癰

逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿 又冬為殮泄

肺熱葉焦為脹滿也

肺傷則腎水失其所生故當冬令而為腎虛殮泄殮

泄者水穀不分而寒泄也



逆冬氣則少陰不藏腎氣獨沉 又春為痿厥

少陰主藏少陰之氣不伏藏而至腎氣獨沉則有權

無衡如冷竈無烟而注泄沉寒等病作矣

腎傷則肝木失其所生肝主筋故當春令而筋病為

痿陽貴深藏故冬不能藏則陽虛為厥

此可見春夏生長之令不可以秋冬收藏之氣逆之

秋冬收藏之令不可以春夏生長之氣逆之醫者而

可悖春夏養陽秋冬養陰之旨乎

欽定四庫全書

醫門法律

一 申治病不審地宜之律

律一條  
發明內經六條

凡治病不察五方風氣服食居處各不相同一概施治

藥不中窾醫之過也

治不法天之紀地之理則災害至矣

天時見上地之寒溫燥濕剛柔五方不同人病因之

故內經以異法方宜名篇可見聖神隨五方風氣而

異其法以宜民也

東方之民食魚而嗜鹹魚者使人熱中鹽者勝血故其



民皆黑色疎理其病皆為癰瘍其治宜砭石故砭石者亦從東方來

魚發瘡鹽發渴血弱而熱易為癰瘍

西方之民陵居而多風水土剛強其民不衣而褐薦華食而脂肥故邪不能傷其形體其病生於內其治宜毒藥故毒藥者亦從西方來

水土剛強飲食脂肥膚腠閉封血氣充實外邪不能傷病生於喜怒思憂恐及飲食男女之過甚也

欽定四庫全書

醫門法律

北方其地高陵居風寒冰冽其民樂野處而乳食藏寒生滿病其治宜灸炳故灸炳者亦從北方來

水寒冰冽故生病於藏寒也

南方其地下水土弱霧露之所聚也其民嗜酸而食胘緻理而赤色其病攣痺其治宜微鍼故九鍼者亦從南方來

食胘所食不芬香也酸味收斂故人皆肉理密緻陽盛之處故色赤濕熱內淫故筋攣脈痺也



中央地平以濕民食雜而不勞故其病多痿厥寒熱其  
治宜導引按蹻故導引按蹻者亦從中央出也

東方海南方下西方北方高中央之地平以濕地氣  
異生病殊焉

聖人雜合以治各得其所宜故治所以異而病皆愈者  
得病之情知治之大體也

隨五方用法各得其宜唯聖人能達其性懷耳

春氣西行夏氣北行秋氣東行冬氣南行故春氣始於

欽定四庫全書

醫門法律

下秋氣始於上夏氣始於中冬氣始於標春氣始於左

秋氣始於右冬氣始於後夏氣始於前此四時正化之

常故至高之地冬氣常在至下之地春氣常在必謹察

之

地有高下氣有溫涼高者氣寒下者氣熱故失寒涼者

脹失溫熱者瘡下之則脹已汗之則瘡已此腠理開閉

之常大小之異耳

西北之氣散而收之東南之氣收而溫之所謂同病異



<p>治也故曰氣寒氣涼治以寒涼行水漬之氣溫氣熱治以溫熱強其內守必同其氣可使平也假者反之崇高則陰氣治之汚下則陽氣治之高者其人壽下者其人天</p>	<p>一 申治病不審逆從之律 <small>律一條 發明內經二條</small></p>	<p>凡治病有當逆其勢而正治者有當從其勢而反治者若不懸鑑對照而隨手泛應醫之罪也</p>	<p>不審逆從</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>不審量其病可治與不可治也</p>	<p>逆從倒行</p>	<p>反順為逆也</p>	<p>逆從者以寒治熱以熱治寒是逆其病而治之以寒</p>	<p>治寒以熱治熱是從其病而治之從治即反治也逆</p>	<p>者正治辨之無難從者反治辨之最難蓋寒有真寒</p>	<p>假寒熱有真熱假熱真寒真熱以正治之即愈假寒</p>	<p>假熱以正治之則死矣假寒者外雖寒而內則熱脈</p>
---	--	---	-------------	------------------------	---------------------	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



數而有力或沉而鼓擊或身寒惡衣或便熱秘結或	煩滿引飲或腸垢臭穢此則明是熱極反兼寒化即	陽盛格陰也假熱者外雖熱而內則寒脈微而弱或	數而虛或浮大無根或弦芤斷續身雖熾熱而神則	靜語雖譫妄而聲則微或虛狂起倒而禁之則止或	蚊跡假癰而淺紅細碎或喜冷水而所用不多或舌	胎面赤而衣被不撤或小水多利或大便不結此則明	是寒極反兼熱化即陰盛格陽也假寒者清其內熱	內清則浮陰退舍矣假熱者溫其真陽中溫則虛火	歸元矣是當從治者也	凡用竒偶七方而藥不應則當反佐以入之如以熱	治寒而寒格熱反佐以寒則入矣如以寒治熱而熱	格寒反佐以熱則入矣又如寒藥熱服借熱以行寒	熱藥寒服借寒以行熱皆反佐變通之法因勢利導	故易為力亦小小從治之意也	一 申治病不辨脈證相反之律 <small>律一條 發明內經九條</small>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---



凡治病不辨脈與證之相反憺然治之醫之罪也或不得已明告而勉圖其難則無不可  
氣虛身熱此謂反也

陽氣虛則不當身熱而反熱身熱則脈氣當盛而反虛是病氣與證不符故謂反也反則胡可妄治

穀入多而氣少此謂反也

穀入於胃助其胃氣散布經絡常充然有餘今穀入多而氣少是胃氣不布也

欽定四庫全書

醫門法律

穀不入而氣多此謂反也

胃氣外散脈并之也

脈盛血少此謂反也脈少血多此謂反也

經脈行氣絡脈受血經氣入絡絡受經氣候不相合故皆反常

穀入多而血少者得之有所脫血濕居下也

脫血則血虛血虛則氣盛盛氣內鬱逼迫津液流入下焦故云濕居下也



穀入少而氣多者邪在胃及與肺也

胃氣不足肺氣下流於胃中故邪在胃然肺氣入胃則肺氣不自守氣不自守則邪氣從之故云邪在胃及與肺也

脈小血多者飲中熱也

飲留脾胃則脾氣溢脾氣溢則發熱中

脈大血少者肺有風氣水漿不入

風氣盛滿則水漿不入於脈

欽定四庫全書

醫門法律

形盛脈細少氣不足以息者危形瘦脈大胸中多氣者死

合此一條觀之前四條皆危證然脈細少氣者危脈大多氣者死又與損至之脈同推矣

一 申治病不察四易四難之律 律一條  
發明內經二條

凡治病參合於望色切脈審證三者則難易若視諸掌粗工難易不辨甚且有易無難醫之罪也

凡治病察其形氣色澤脈之盛衰病之新故及治之無





<p>後其時形氣相得謂之可治色澤以浮謂之易已脈 從四時謂之可治脈弱以滑是有胃氣命曰易治</p>	<p>氣盛形盛氣虛形虛是相得也故可治氣色明潤血 氣相營故易已春弦夏鈎秋浮冬沉順從四時故可</p>	<p>治弱而且滑胃氣適中無過不及故易治</p>	<p>形氣相失謂之難治色夭不澤謂之難已脈實以堅謂 之益甚脈逆四時為不可治必察四難而明告之</p>	<p>形與氣兩不相得色夭枯而不明潤脈實堅而無胃 氣逆四時而脈反常此四者工之所難為故必明告 之粗之所易治曾不加察也</p>	<p>一 申治病不察新久之律 <small>律一條 發明內經六條</small></p>	<p>凡治病不辨新病邪實久病正虛緩急先後失序而實 實虛虛醫之罪也</p>	<p>徵其脈小色不奪者新病也</p>	<p>氣乏而神猶強也</p>	<p>徵其脈不奪其色奪者此久病也</p>
---	--	-------------------------	--	--	--	--	--------------------	----------------	----------------------



神雖持而邪則凌正也

徵其脈與五色俱奪者此久病也

神與氣俱衰也

徵其脈與五色俱不奪者新病也

神與氣俱強也

新病可急治久病宜緩調

五藏已敗其色必夭夭必死矣

色者神之旗藏者神之舍神去則藏敗藏敗則色見

欽定四庫全書

醫門法律

夭惡

故病久則傳化上下不并良醫弗為

病之深久者變化相傳上下氣不交通雖醫良法妙

亦何以為之

一 申治病不先歲氣之律 律一條  
發明內經四條

凡治病不明歲氣盛衰人氣虛實而釋邪攻正實實虛

虛醫之罪也

不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以為工矣



不知歲運之盛衰自不知人氣之虛實  
失時反候五治不分邪僻内生工不能禁也

不知氣之至與不至而失其時反其候則五運之治  
盛衰不分其有邪僻内生及於人者雖醫工莫能  
禁之繇其不知時氣也

不知合之四時五行因加相勝釋邪攻正絕人長命不  
知邪正虛實而妄施攻擊奪人真元殺人於冥冥之  
中故為切戒

欽定四庫全書

醫門法律

必先歲氣無伐天和無盛盛無虛虛而遺人夭殃無致  
邪無失正絕人長命

內經諄諄示戒學者可不求師講明蓋歲有六氣分  
主有南面北面之政先知此六氣所在人脈至尺寸  
應之太陰所在其脈沈少陰所在其脈鈎厥陰所在  
其脈弦太陽所在其脈大而長陽明所在其脈短而  
濇少陽所在其脈大而浮如是六脈則謂天和不識  
者呼為病脈攻寒令熱脈不變而熱疾已生制熱令



寒脈如故而寒病又起欲求其適安可得乎天枉之  
來率繇於此不察虛實但用攻擊盛盛虛虛致邪失  
正遺人夭殃絕人長命也

北政之歲少陰在泉則寸口不應厥陰在泉則右不  
應太陰在泉則左不應南政之歲少陰司天則寸口  
不應厥陰司天則右不應太陰司天則左不應諸不  
應者反其診則應矣北政之歲三陰在下則寸不應  
三陰在上則尺不應南政之歲三陰在天則寸不應

欽定四庫全書

醫門法律

三陰在泉則尺不應左右同

一 申用藥不遠寒熱之律 律一條  
發明內經一條

凡治病用寒遠寒用熱遠熱其常也不遠寒熱其變也  
若不知常變一概施治釀患無窮醫之罪也

發表不遠熱攻裏不遠寒不發不攻而犯寒犯熱寒熱  
內賊其病益甚故不遠熱則熱至不遠寒則寒至寒至  
則堅否腹滿痛急下利之病生矣熱至則身熱吐下霍  
亂癰疽瘡瘍脅鬱注下膈癰腫脹嘔斲衄骨節變肉痛



血溢血泄淋闕之病生矣

治病惟發表不遠熱非發表則必遠熱矣惟攻裏不遠寒非攻裏則必遠寒矣不當遠而遠當遠而不遠其害俱不可勝言

一 申治病不知約方之律 律一條  
發明內經二條

凡用方不分君臣佐使頭緒紛雜率意妄施藥與病迥不相當醫之罪也

約方猶約囊也囊滿弗約則輸泄方成弗約則神與弗

欽定四庫全書

醫門法律

居

業醫者當約治病之方而約之以求精也易曰精義入神以致用也不得其精焉能入神有方無約即無神也故曰神與弗居

藏位有高下府氣有遠近病證有表裏用藥有輕重調其多少和其緊慢令藥氣至病所為故勿太過與不及乃為能約

未滿而知約之可為工不可以為天下師



未滿而知約何約之有是以言約者非滿不可故未  
滿而知約必不學無術之下材耳然較諸全不知約  
者失必稍輕嘗見用峻劑重劑之醫屢獲奇中及徵  
其冥報比用平劑輕劑者轉厲豈非功以倖邀不敵  
罪耶噫安得正行無間之哲履險皆平從權皆經也  
哉

一 申治病不知約藥之律 律一條  
發明內經二條

凡用藥太過不及皆非適中而不及尚可加治太過則

欽定四庫全書

醫門法律

病去藥存為害更烈醫之過也

帝曰有毒無毒服有約乎岐伯曰病有久新方有大小  
有毒無毒固宜常制矣大毒治病十去其六嘗毒治病  
十去其七中毒治病十去其八無毒治病十去其九穀  
肉菜食養盡之無使過之傷其正也

下品烈毒之藥治病十去其六即止藥中品藥毒次  
於下品治病十去其七即止藥上品藥毒毒之小者  
病去其八即止藥上下中品悉有無毒平藥病去其



九即當止藥此嘗制也

有毒無毒所治為主適大小為制也

但能破積愈疾解急脫死則為良方非必以先毒為是後毒為非無毒為非有毒為是必量病輕重大小而制其方也

周禮令醫人採毒藥以供醫事以無毒之藥可以養生不可以勝病耳今世醫人通弊擇用幾十種無毒之藥求免過愆病之二三且不能去操養癰之術坐

欽定四庫全書

醫門法律

悞時日遷延斃人者比比而欲己身長享子孫長年其可得乎

一 申治病不疏五過之律 律一條  
釋經文五條

凡診病不問三常不知比類不察神志不遵聖訓故犯無忌醫之過也

凡未診病者必問嘗貴後賤雖不中邪病從内生名曰脫營嘗富後貧名曰失精五氣留連病有所并粗工診之不在藏府不變形軀診之而疑不知病名身體日減



氣虛無精病深無氣洒洒然時驚病深者以其外耗於  
衛內奪於營良工所失不知病情此亦治之一過也

過在不問病情之所始也

凡欲診病者必問飲食居處暴樂暴苦始樂後苦皆傷  
精氣精氣竭絕形體毀沮暴怒傷陰暴喜傷陽厥氣上  
行滿脈去形愚醫治之不知補寫不知病情精華日奪  
邪氣乃并此治之二過也

過在不知病人七情所受各不同也

欽定四庫全書

醫門法律

善為脈者必以比類竒恒從容知之為工而不知道此  
診之不足貴此治之三過也

比類之法醫之所貴如老吏判案律所不載者比例  
斷之纖悉莫逃也竒恒者審其病之竒異平常也從  
容者凡用比類之法分別病能必從容參酌惡粗疎  
簡畧也

診有三常必問貴賤封君傷敗及欲侯王故貴脫勢雖  
不中邪精神內傷身必敗亡始富後貧雖不中邪皮焦





筋屈痿躄為攣醫不能嚴不能動神外示柔弱亂至失常病不能服則醫事不行此治之四過也

此過繇於不能戒嚴病者令之悚然神動蠲除憂患徒外示柔弱委曲從人也

凡診者必知終始有知緒餘切脈問名當合男女離絕菀結憂恐喜怒五藏空虛五氣離守工不能知何術之語

察氣色之終始知病發之餘緒辨男女之順脈與七

欽定四庫全書

醫門法律

情內傷故離間親愛者魂遊絕念所懷者意喪菀積所慮者神勞結固餘怨者志苦憂愁者閉塞而不行恐懼者蕩憚而失守盛怒者迷惑而不治喜樂者憚散而不藏由是八者故五藏空虛血氣離守工不思曉又何言醫

嘗富大傷斬筋絕脈身體復行令澤不息故傷敗結留薄歸陽膿積寒熱粗工治之亟奪陰陽身體解散四肢轉筋死日有期醫不能明不問所發惟言死日亦為粗



工此治之五過也

非分過損身體雖復津液不滋血氣內結留而不去  
薄於陽脈則化為膿久積腹中則外為寒熱也不但  
不學無術者為粗工即使備盡三世經法而診不辨  
三嘗療不慎五過亦為粗畧之醫也

凡此五者受術不通人事不明也

一 申治病不徵四失之律 律一條  
明錄經文

凡治病不問證辨脈而以無師之術籠人此最可賤不

欽定四庫全書

醫門法律

足罪也

夫經脈十二絡脈三百六十五此皆人之所明知工之  
所循用也所以不十全者精神不顯志意不理外內相  
失故時疑殆

精神不顯不能吉凶同患志意不理不能應變無窮  
內外相失不能參合色脈安得不疑而且殆

診不辨陰陽此治之一失也

受師不卒妄作雜術謬言為道更名自功妄用砭石後



醫門法律卷一								欽定四庫全書	醫門法律	此治之四失也	毒不先言此卒持寸口何病能中妄言作名為粗所窮	診病不問其始憂患飲食之失節起居之過度或傷於	治之三失也	宜不別人之勇怯不知比類足以自亂不足以自明此	不適貧富貴賤之居坐之厚薄形之寒溫不適飲食之	遺身殃此治之二失也
--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--------	-----------------------	-----------------------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------



欽定四庫全書

子部  
醫門法律卷二

詳校官入審院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆斯

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣盧遜

謄錄監生臣鄒世俊



欽定四庫全書

醫門法律卷二

南昌喻昌撰

申明仲景律書

附傷寒三陽經禁一條  
附雜證時病藥禁一條

原文允為定律茲特申明十義不更擬律

一 申治風溫不可發汗之律

傷寒有五皆熱病之類也同病異名同脈異經病雖俱傷於風其人素有錮疾則不得同法其人素傷於風因

欽定四庫全書

醫門法律

復傷於熱風熱相薄則發風溫四肢不收頭痛身熱常汗出不解治在少陰厥陰不可發汗汗出譫語獨語內煩躁擾不得卧善驚目亂無精治之復發其汗如此死者醫殺之也

傷寒有五即傷寒中風風溫濕溫疫瘧也寒風溫熱涼各別素有錮疾不得同法即動氣在上下左右不可汗下之類傷風重復傷熱兩邪相搏於內本屬少陰裏證如溫瘧之病而厥陰風木則兼受之熱邪充



斥兩臟尚可用辛溫發散助其□乎悞發其汗死證  
四出不可復救矣復發其汗即申上文不可發汗者  
復發其汗非是死證已出復發其汗也

一 申治濕溫不可發汗之律

傷寒濕溫其人常傷於濕因而中暍濕熱相薄則發濕  
溫病苦兩脛逆冷腹滿又胸頭目痛苦妄言治在足太  
陰不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面  
色變名曰重膈如此者死醫殺之也

欽定四庫全書

醫門法律

濕溫即暑與濕交合之溫病素傷於濕因復傷暑兩  
邪相搏深入太陰以太陰主濕召暑而入其中也兩  
脛逆冷腹滿濕得暑而彰其寒又胸頭目痛苦妄言  
暑得濕而彰其熱此但當分解熱濕之邪而息其焰  
寧可發汗令兩邪混合為一耶發汗則口不能言耳  
不能聞心不知苦但身青面色變顯露於肌肉之外  
耳暍病而至重暍又非虛虛實實之比直為醫之所  
殺矣



二律出脈經王叔和集醫律之文然則醫律古有之矣何以後世無傳耶詳考仲景以前冬月之傷寒尚未備况春月之風溫夏月之濕溫乎是則醫律為仲景之書無疑矣蓋傷寒論全書皆律其書中不及載之證另作律書以緯之傳至晉代傷寒書且得之搜採之餘而律書更可知矣所以叔和雖採二條入脈經究竟不知為何時何人之言也再按律書雖亡而三百九十七法具在其法中之律原可引伸觸類於

欽定四庫全書  
醫門法律

以神而明之如曰此醫吐之過也此醫下之所致也與夫不可汗不可下不可火不可用前藥此為小逆此為大逆此為一逆再逆此為難治此為不治條例森森隨證細心較勘自能立於無過茲將脈法中大戒發明數則俾察脈之時知凜焉

一 申治傷寒病令人亡血之律

病人脈微而濇者此為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱



欲著複衣冬月盛寒欲裸其體陽微則惡寒陰弱則發熱此醫發其汗令陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲著複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脈遲濇故知亡血也

人身之脈陰陽相抱榮衛如環傷寒病起之後脈見陽微陰濇知為醫之所累大汗大下兩傷其榮衛以故惡寒發熱無休止時乃至夏月反毗於陰冬月反

欽定四庫全書

醫門法律

毗於陽各造其偏經年不復其為累也大矣即陽脈之微以久持而稍復而但陰脈遲濇亦為亡血以陰血更易虧難復耳設其人平素脈微且濇醫悞大汗大下死不終日矣此論病時汗下兩傷所以經年不復之脈也

一 申治傷寒病令人發餉之律

寸口脈浮大醫反下之此為大逆浮為無血大即為寒寒氣相搏即為腸鳴醫乃不知而飲水令大汗出水得





寒氣冷必相搏其人即餒

寸口脈浮大病全在表醫反下之則在表之陽邪下陷而胃中之真陽不治遂成結胸等證故為大逆浮主氣故曰無血即浮為在表未入於陰之互辭大即為寒見外感之邪全未外解也中有一證下陷之邪與藏氣相搏而為腸鳴者此必未嘗痞結至極蓋痞結即不復轉氣也醫不知其人邪已內陷當將差就錯內和其氣反飲水令大汗出是下之一損其胃中

欽定四庫全書

醫門法律

之陽飲水再損其胃中之陽腹中之邪隨汗出還返於胃與水氣相搏且夾帶濁氣上干清氣其人即餒餒者胃氣垂絕之象傷寒之危候也然其死與不死尚未可定蓋脈之浮大本非微弱之比而邪之內陷當大逆者止成腸鳴小逆倘發鞫已後陽氣漸回水寒漸散仍可得生觀後條仲景謂寒聚心下當奈何也此則聚而不散無可奈何仁人之望絕矣

一 申治傷寒病致人胃寒之律



寸口脈濡而弱濡即惡寒弱即發熱濡弱相搏藏氣衰  
微胸中苦煩此非結熱而反薄居水漬布冷銚貼之陽  
氣遂微諸府無所依陰脈凝聚結在心下而不肯移胃  
中虛冷水穀不化小便縱通復不能多微則可救聚寒  
不散當奈何也

此見寸口陽脈濡陰脈弱乃藏氣素衰之徵陽濡則  
惡寒陰弱即發熱其人胸中苦煩即為虛煩不當認  
為結熱而以水漬布冷貼重傷其胸中之陽也蓋胸

欽定四庫全書

醫門法律

中之陽為諸府之所依藉陽氣一微陰氣即凝結心  
下如重陰蔽睨胃中水穀無陽以化而水寒下流小  
便必縱通然陽不化氣復不能多履霜堅冰可奈何  
耶亦因平素脈之濡弱知其胸中之陽不能復辟耳  
一 申治傷寒病遇壯盛人發汗過輕之律

寸口脈洪而大數而滑洪大則榮氣長滑數則衛氣實  
榮長則陽盛怫鬱不得出身衛實則堅難大便則乾燥  
三焦閉塞津液不通醫發其汗陽氣不週重復下之胃



燥乾畜大便遂擯小便不利榮衛相搏心煩發熱兩眼  
如火鼻乾面赤舌燥齒黃焦故大渴過經成壞病鍼藥  
所不能制與水灌枯槁陽氣微散身寒溫衣覆汗出表  
裏通然其病即除形脈多不同此愈非法治但醫所當  
慎妄犯傷榮衛

此見榮衛強盛三焦堅實之人雖發其汗未必周到  
必須更汗通其怫鬱若悞下之則熱證百出遂至過  
經而成壞證鍼藥所不能制勢亦危矣與水灌令陽

欽定四庫全書

醫門法律

散汗出因而病愈以其人榮衛素盛故倖全耳然人  
之形脈多有不同設榮衛素弱將奈之何故叮嚀云  
此愈非法治醫當謹持於汗下之先勿使太過不及  
乃為盡善若不辨形脈之強弱而憑臆汗下必犯大  
過不及之戒而傷人之榮衛矣

一 申治傷寒病不審榮衛素虛之律

脈濡而緊濡則陽氣微緊則榮中寒陽微衛中風發熱  
而惡寒榮緊胃氣冷微嘔心內煩醫以為大熱解肌而



發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭卒起而頭  
眩客熱在皮膚悵快不得眠不知胃氣冷緊寒在關元  
技巧無所施汲水灌其身客熱應時罷慄慄而振寒重  
被而覆之汗出而胃顛體惕而又振小便為微難寒氣  
因水發清穀不容間嘔變反腸出顛倒不得安手足為  
微逆身冷而內煩遲欲從後救安可復追還

此見脈之濡而緊者為陽氣微榮中寒陽微衛中風  
外則發熱惡寒榮緊胃中冷內則微嘔心煩醫不知

欽定四庫全書

醫門法律

其外熱內冷以為大熱而從汗解之則表裏俱虛客  
熱淺在皮膚緊寒深在關元猶汲水灌其客熱致寒  
證四出不可復救也

前壞證汗下兩誤鍼藥莫制與之以水而倖痊以其  
榮衛素盛也此一證榮衛素虧雖不經下但只誤汗  
誤與之水即屬不救然則證同脈異不察其脈但驗  
其證徒法不能行矣過愆其可免乎

一 申治傷寒病不審陽盛陰虛之律



脈浮而大浮為氣實大為血虛血虛為無陰孤陽獨下  
陰部小便難胸中虛今反小便利而大汗出法當衛家  
微今反更實津液四射榮竭血盡乾煩不眠血薄肉消  
而成暴液醫復以毒藥攻其胃此為重虛客陽去有期  
必下污泥而死

脈浮而大氣實血虛雖偏之為害亦人所常有也若  
此者陰部當見不足今反小便利大汗出外示有餘  
殊非細故矣設衛氣之實者因得汗利而脈轉微弱

欽定四庫全書

醫門法律

藉是與榮無忤庶可安全若衛分之脈較前更加堅  
實則陽強於外陰必消亡於內所為小便利大汗出  
者乃津液四射之徵勢必榮竭血盡乾煩不眠血薄  
肉消而成暴液下注之證此際安其胃固其液調和  
強陽收拾殘陰岌岌不及况復以毒藥攻其胃增奔  
迫之勢而蹈重虛之戒令客陽亦去嘔血如泥而死  
哉傷寒病陽強於外陰亡於內之證最多醫不知脈  
其操刃可勝數耶



一 申治傷寒病不診足脈強汗動其經血之律  
跌陽脈浮浮則為虛浮虛相搏故令氣餉言胃氣虛竭  
也脈滑則為噦此為醫咎責虛取實守空迫血脈浮鼻  
中燥者必衄也

寸口脈浮宜發其汗謂邪在太陽榮衛間未深入也  
若至陽明即在經之邪以汗為大禁矣設其人胃氣  
充實亦何必禁之故邪入陽明必診跌陽足脈跌陽  
脈浮即是胃氣虛餒不可發汗所以有建中之法建

欽定四庫全書

醫門法律

立中氣然後汗之以汗即胃之津液也津液不充強  
發其汗則邪與虛搏其人必餉若脈見浮而且滑則  
其搏虛者且轉為噦深於餉矣此皆醫者不察足脈  
之咎強責胃氣之虛劫汗以取其實邪致令胃中之  
守空而逼其血外出蓋陰在內為陽之守胃中津液  
為陽其不外泄者賴陰血以守之故強逼其津液為  
汗斯動其所守之血矣其外邪勝而鼻中燥者必衄  
其不衄者亦瘀畜胃中而生他患也此與誤發少陰



汗者同科而減等少陰少血動其血則下厥上竭而  
難治陽明多血但釀患未已耳

一 申治傷寒病不診足脈誤下傷其脾胃之律

跌陽脈遲而緩胃氣如經也跌陽脈浮而數浮則傷胃  
數則動脾此非本病特醫下之所為也榮衛內陷其數  
先微脈反大浮其人大便鞭氣噫而除何以知之本以  
數脈動脾其數先微故知脾氣不治大便鞭氣噫而除  
今脈反浮其數改微邪氣獨留心中則饑邪熱不殺穀  
潮熱發渴數脈當遲緩脈因前後度數如法病者則饑  
數脈不時則生惡瘡也

欽定四庫全書

醫門法律

跌陽足脈以遲緩為經常不當浮數若見浮數知醫  
悞下而傷胃動脾也榮衛環轉之氣以悞下而內陷  
其數脈必先改為微而脾氣不治大便鞭氣噫而除  
此皆邪客於脾所致即鍼經脾病者善噫得後出餘  
氣則快然如衰之謂也邪熱獨留心下雖饑復不殺  
穀抑且潮熱發渴未有愈期必數脈之先微者仍遲



緩如其經常始饑而消穀也若數脈從前不改為微則邪熱未陷於脾但鬱於榮衛主生惡瘡而已

附 申治傷寒不可犯六經之禁

足太陽膀胱經禁下若下之太早必變證百出足陽明胃經禁發汗禁利小便犯之則重損津液脈必代結足少陽膽經禁汗禁下禁利小便汗則犯陽明下則犯太陽利小便則使生發之氣陷入陰中太陽經一禁陽明經二禁少陽經三禁此定禁也至三陰經則

欽定四庫全書

醫門法律

無定禁但非胃實仍禁下耳

附 申治雜證不可犯時禁病禁藥禁

時禁者春夏禁下秋冬禁汗春夏而下秋冬而汗是失天信伐天和也然病有不得已而從權汗下者病去速改若瀆用之是故意違天自取不祥也

病禁者病人陽氣不足陰氣有餘則禁助陰瀉陽病人陰氣不足陽氣有餘則禁助陽瀉陰以及老少不同新久異治之類





藥禁者津液內亡作渴禁用淡滲五苓汗多禁利小便  
便小便多禁發汗咽痛禁發汗利小便大便快利禁  
服梔子大便秘瀯禁用燥藥吐多不得復吐吐而上  
氣壅滯大便不通止可宣散上氣禁利大便脈弦禁  
服平胃而虛虛脈緩禁服建中而實實

治天下有帝王之律治仙神有上天之律至於釋  
門其律尤嚴三藏教典儀律居三之一由五戒而  
五百戒由五百戒直造自性清淨無戒可言而道

欽定四庫全書

醫門法律

成矣醫為人之司命先奉大戒為入門後乃盡破  
微細諸惑始具活人手眼而成其為大醫何可妄  
作聰明草菅人命哉嘗羨釋門犯戒之僧即不得  
與衆僧共住其不退心者自執糞穢雜役三年乃  
懇律僧二十衆佛前保舉始得復為佛子當今世  
而有自訟之醫乎昌望之以勝醫任矣

先哲格言

大凡物理有常有變運氣所主者常也異於所主者皆



變也常則如本氣變則無所不至而各有所占故其  
候有從逆淫鬱勝復太過不及之變其法皆不同若  
厥陰用事多風而草木榮茂此之謂從天氣明潔燥  
而無風此之謂逆太虛埃昏流水不冰此之謂淫大  
風折木雲物混擾此之謂鬱山澤焦枯草木凋落此  
之謂勝大暑燔燎螟蝗為災此之謂復山崩地震埃  
昏時作此之謂大過陰森無時重雲晝昏此之謂不  
及隨其所變疾厲應之皆視當時當處之候雖數里

欽定四庫全書

醫門法律

之間但氣候不同而所應全異豈可膠於一定

歲運有主氣有客氣常者為主外至者為客初之氣厥  
陰以至終之氣太陽者四時之常序也故謂之主氣  
惟客氣本書不載其目故說者多端或以甲子之歲  
天數始於水下一刻乙丑之歲始於二十六刻丙寅  
歲始於五十一刻丁卯歲始於七十六刻者謂之客  
氣此乃四分歷法求大寒之氣何與歲運又有相火  
之下水氣乘之土位之下風氣乘之謂之客氣此亦



主氣也與六節相須不得為客凡所謂客者歲半以  
前天政主之歲半以後地政主之四時常氣為之主  
天地之政為之客逆主之氣為害暴逆客之氣為害  
徐調其主客無使傷沴此治氣之法也

沈存中

少角之運歲木不及侮而乘之者金也金不務德故以  
燥勝風時則有白露早降收氣率行其變為肅殺其  
災為蒼隕名為少角而實與大商之歲同少徵之運  
歲火不及侮而乘之者水也水不務德故以寒勝熱

欽定四庫全書

醫門法律

時則有寒霧凝慘地積堅冰其變為凜冽其災為霜  
雹名為少徵而實與大羽之歲同少宮之運歲土不  
及侮而乘之者木也木不務德故以風勝濕時則有  
大風飄暴草偃沙飛其變為張發其災為散落名為  
少宮而實與大角之歲同少商之運歲金不及侮而  
乘之者火也火不務德故以熱勝燥時則有火延焦  
稿炎赫沸騰其變為銷鑠其災為燔炳名為少商而  
實與大徵之歲同少羽之運歲水不及侮而乘之者



土也土不務德故以濕勝寒時則有泉涌河衍涸澤  
生魚其變為驟注其災為霖潰名為少羽而實與大  
宮之歲同通乎此則知歲在涸流之紀而河決大水  
固可以類而推之也

劉溫舒

天地之間氣有偏勝而無以救之則萬物之所存者幾  
希矣是故風熱燥濕寒五者各司一氣生長化收藏  
五者各司一時以順相乘然後能循環以相生以逆  
相勝然後能循環以相救故曰五氣之運猶權衡也

欽定四庫全書

醫門法律

高者抑之下者視之化者應之勝者復之化者應之  
氣之平也五氣之相得也勝者復之氣之不平也五  
氣之相賊也氣平而相得者所以通其常氣不平而  
相賊者所以觀其變古之明乎此而善攝生者何常  
不消息盈虛以道御神耶

劉溫舒

太陽司天之政歲宜以苦燥之溫之陽明司天之政歲  
宜以苦辛汗之清之散之又宜以鹹少陽司天之政  
歲宜以鹹宜辛宜酸滲之泄之瀆之發之觀氣寒溫



以調其氣太陰司天之政歲宜以苦燥之溫之甚者  
發之泄之不發不泄則濕氣外溢肉潰皮坼而水血  
交流少陰司天之政歲宜鹹以奠之而調其上甚則  
以苦發之以酸收之而安其下甚則以苦泄之厥陰  
司天之政歲宜以辛調之以酸潤之

纂經 吉

歲以陽為首正正也寅引也少陽之氣始於泉下引陽  
升而在天地人之上即天之分五穀草木皆甲拆於  
此時也至立夏少陰之火熾於太虛則草木盛茂垂

欽定四庫全書

醫門法律

枝布葉乃陽之用陰之體此所謂天以陽生陰長經  
言歲半以前天氣主之在乎升浮也至秋而太陰之  
運初自天而下逐陰降而徹地則金振燥令風厲霜  
飛品物咸殞其枝獨在若乎毫毛至冬則少陰之氣  
復伏於泉下水冰地坼萬物周密陰之用陽之體也  
此所謂地以陽殺陰藏經言歲半以後地氣主之在  
乎降沉也

飲食入胃而精氣先輸脾歸肺上行春夏之令以滋



養周身乃清氣為天者也升已而輸膀胱行秋冬之  
令為傳化糟粕轉味而出乃濁陰為地者也若夫順  
四時之氣起居有時以避寒暑飲食有節及不暴  
喜怒以頤神志常欲四時均平而無偏勝則安不然  
傷脾胃真氣下溜或下泄而久不能升是有秋冬而  
無春夏乃生長之用陷於隕殺之氣而百病皆起或  
久升不降亦病焉

王安道

天元紀大論等篇以年歲之支干分管六氣蓋已失先

欽定四庫全書

醫門法律

聖之旨矣年歲之支干天下皆同且通四時不變也  
天氣之溫暑寒涼民病之虛實衰旺東西南北之殊  
方春夏秋冬之異候豈有皆同之理此其妄誕蓋不  
待深論而可知也近世傷寒鈐法則以得病日之干  
支為主其源亦出於此決不可用蓋金木水火土之  
氣各主一時當時則為主氣為司天非其時而有其  
氣則為客氣與時正相反者則謂在泉為其氣伏於  
黃泉之下而不見也治療之法用熱遠熱用寒遠寒



所謂必先歲氣毋伐天和也春時木氣司天則四方  
皆溫夏時火氣司天則四方皆熱夏秋之交土氣司  
天則四方皆濕秋則皆涼冬則皆寒民病往往因之  
此則理之易見者也其有氣與時相反者則所謂客  
氣者也故治療之法亦有假者反之之說觀此則運  
氣之說思過半矣

何栢齋

足相火屬膽配肝主血者也手相火屬三焦配腎之命  
門主精者也肝與命門皆屬風木木中有火則精血

欽定四庫全書

醫門法律

之中有熱氣也然精血體潤水也火與水相守故不  
發至發而為熱則皆精血將枯之所致也譬木枯則  
火易焚耳故相火發者難治今虛勞骨蒸之病皆相  
火發熱之證也小水不能滅大火法當補陰則熱自

退

何栢齋論丹谿  
相火主動等悞

人之臟腑以脾胃為土蓋人之飲食皆入於胃而運以  
脾猶地之土也然脾胃能化物與否實由於水火二  
氣非脾胃所能也火盛則脾胃燥水盛則脾胃濕皆



不能化物乃生諸病水腫之證蓋水盛而火不能化也火衰而不能化水故水之入於脾胃皆滲入血脈骨肉血亦化水肉發腫脹皆自然之理也導其水使水氣少減復補其火使二氣平和斯病去矣丹溪謂脾失運化由肝木侮脾乃欲清心經之火使肺金得令以制肝木則脾土全運化之職水自順道乃不為腫其詞迂而不切

何栢齋

夫陽常有餘陰常不足者在天地則該乎萬物而言在

欽定四庫全書

醫門法律

人身則該乎一體而言非直指氣為陽而血為陰也經曰陽中有陰陰中有陽正所謂獨陽不生獨陰不長是也姑以治法兼證論之曰氣虛者氣中之陰虛也治法用四君子湯以補氣中之陰曰血虛者血中之陰虛也治法用四物湯以補血中之陰曰陽虛者心經之元陽虛也其病多惡寒責其無火治法以補氣藥中加附烏等藥甚者三建湯正陽散之類曰陰虛者腎經之真陰虛也其病多壯熱責其無水治法





以補血藥中加知母黃柏等藥或大補陰丸滋陰大  
補丸之類夫真水衰極之候切不可服烏附等補陽  
之藥恐反助火邪而燦真陰元陽虛甚之軀亦不可  
投芎苓等辛散淡滲之劑恐反開腠理而泄真氣昧  
者謂氣虛即陽虛止可用四君子斷不可用芎辛之  
屬血虛即陰虛止可用四物決不可用參芪之類殊  
不知血脫益氣古聖人之法也血虛者須以參芪補  
之陽生陰長之理也惟真陰虛者將為勞極參芪固

欽定四庫全書

醫門法律

不可用恐其不能抵當而反益其病耳非血虛者之  
所忌也如明醫雜著謂血病治氣則血愈虛耗又曰  
血虛誤服參芪等甘溫之藥則病日增服之過多則  
死不治何其不達理耶虞

天民

西北二方在人為腎水肺金所居之地二藏常恐其不  
足東南二方在人為肝木心火所居之位二藏常恐  
其有餘難經曰東方實西方虛寫南方補北方即此  
之義也夫腎水既實則陰精時上奉於心肺故東方



之木氣不實而西方之金氣不虛此子能令母實使  
金得以平木也是故水日以盛而火日以虧此陰精  
所奉於上而令人壽延也若夫腎水一虛則無以制  
南方之心火故東方實而西方虛其命門與胞絡之  
相火皆挾心火之勢而來侮所不勝之水使水日虧  
而火日盛此陽精所降於下故令人壽折也

虞天民

蔡西山脈經有論三焦一篇後引禮運記曰上焦若竅

中焦若編下焦若瀆然未曾發明其義新安孫景思

欽定四庫全書

醫門法律

氏因推其義而解之曰上焦若竅竅者竅漏之義可  
以通達之物必是胃之上脘經曰上焦在胃之上口  
主納而不出是也中焦若編編者編絡之義如有物  
編包之象胃之外有脂如網包羅在胃之上以其能  
磨化飲食故脈訣云膏凝散半斤者此也是必脾之  
大絡此為中焦經曰主腐熟水穀是也下焦若瀆瀆  
者溝瀆之義可以決瀆可以傳導乃是小腸之下曰  
闌門泌別水穀自此而分清濁之所此為下焦經曰



在膀胱上口主瀉而不藏又曰主出而不納又曰下焦為傳化之府又曰三焦為水穀之道路氣之所終始也蓋水穀之所入自上而中自中而下至於糟粕轉輸傳道而下一無底滯如此尤可表其為有形明矣所謂形者非謂藏府外別生一物不過指其所而為形耳按蔡西山據禮運記而言白虎通性情篇漚亦作編二說安得俱誤恐漚與編殆相似而訛之耳

俞子容

欽定四庫全書

醫門法律

近時醫者多執前人肝常有餘腎常不足之說往往舉手便用平肝之劑按聖濟經云原四時之所化始於木究十二經之所養始於肝女子受娠一月是厥陰肝經養之肝者乃春陽發動之始萬物生長之源故戒怒養陽使先天之氣相生於無窮所以肝主色氣和則體澤氣傷則枯槁故養肝戒忿是攝生之切要也不可泥前說

俞子容

甲乙經曰丈夫以右為命門左為腎女子以左為命門



<p>右為腎無求子曰男子先生右腎女子先生左腎是以命門為子宮左腎為血海張潔古云男女皆左為</p>	<p>腎右為命門男子主藏精者氣海也女子主繫胞者血海也所主者異受病則一也此說當為定論</p>	<p><small>俞子容辨</small> 衡為血海</p>	<p>虛者補之實者瀉之雖三尺童子皆知之矣至於五實五虛豈可與泛泛虛實同藥哉夫一身猶一國也如尋邑百萬圍昆陽此五實證也故蕭王親犯中堅而</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>督戰如河內饑而又經火災此五虛證也故汲黯不避矯詔而發倉此可與達權通變者論不可與貪常嗜瑣者說也夫五實為五藏俱太過五虛為五藏俱不及內經言此二證皆死非謂必死也謂不救則死救之不得其道亦死也其下復言漿粥入胃則虛者活身汗後利則實者活此兩言自是前二證之治法也後人只以之斷驗死生見虛者漿粥不入實者汗利俱閉便委之死地豈不謬哉夫漿粥入胃而不注</p>
---	---	-------------------------------------	--	------------------------	---



泄則胃氣和胃氣和則五虛皆實也是以生也汗以  
泄其表利以泄其裏併泄則上下通上下通則五實  
皆啓矣是以生也

張子和

虛損之微者真火尚存服寒涼藥猶可虛損之甚者真  
火已虧藥以寒涼豈能使之化為精血以補其虛乎  
虛損之證皆下寒上熱蓋所謂水火不交者也其重感  
於寒者則下焦作痛不感寒者則不痛至於上焦燥  
熱則一也上焦方苦煩熱得寒涼之藥則暫快遂以

欽定四庫全書

醫門法律

為藥之功故喜服之不知寒涼之藥不久下注則下  
元愈寒火熱為寒所逼上行則上焦復熱愈甚展轉  
反覆遂至沉痾而不可救是則以寒涼補陰非徒無  
益而且有損士夫蓋陰受其害而不知也治之補以  
寒涼佐以溫熱補三佐二空心涼服所謂熱因寒用  
者也久則精生熱退而病愈矣

何栢齋

經云陰虛生內熱奈何曰有所勞倦形氣衰少穀氣不  
盛上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣薰胸中故內熱



嗟夫此內傷之說之原乎夫人身之陰陽有以表裏  
言者有以上下之分言者有以氣血言者有以身前  
身後言者有以臟腑言者有以升降呼吸之氣言者  
餘如動靜語默起居之類甚多不必悉舉此所謂陰  
虛之陰其所指與數者皆不同蓋勞動之過則陽和  
之氣皆亢極而化為火矣况水穀之氣又少入是故  
陽愈甚而陰愈衰矣此陰虛之陰蓋指身中之陰氣  
與水穀之味耳或以下焦陰陽為言或以腎水真陰

欽定四庫全書

醫門法律

為言皆非也夫有所勞役者過動屬火也形氣衰少  
者壯火食氣也穀氣不盛者勞傷元氣則少食而氣  
衰也上焦不行者清陽不升也下脘不通者濁陰不  
降也夫胃受水穀故清陽升而濁陰降以傳化出入  
滋榮一身也今胃不能納而穀氣衰少則清無升而  
濁無降矣故曰上焦不行下脘不通然非謂絕不行  
不通也但比之平常無病時則謂之不行不通耳上  
不行下不通則鬱矣鬱則少火皆成壯火而胃居上



焦下腕兩者之間故胃氣熱則上炎熏胸中而為內熱也東垣所言正與經旨相合固宜引此段經文於內外傷辨以為之主乃反不引此却謂火乘土位此不能無疑者也又經曰勞者溫之溫者養也東垣以為溫涼之溫謂宜溫藥以補元氣而瀉火邪又改損者益之為損者溫之又以溫能除大熱為內經所云而徧考內經並無此語亦不能無疑者也然溫藥之補元氣瀉火邪者亦惟氣溫而味甘者斯可矣蓋溫

欽定四庫全書

醫門法律

能益氣甘能助脾而緩火故元氣復而火邪息也夫宜用溫藥以為內傷不足之治則可以為勞者溫之之註則不可苟以補之除之抑之舉之散之等語比類而觀焉則其義自著矣

王安道

婦人之於血也經水蓄則為胞胎則蓄者自蓄生者自生及其產育為惡露則去者自去生者自生其醞而為乳則無復下滿而為月矣失血為血家妄逆產乳為婦人常事其去其生則一同也失血家須用下劑



破血蓋施之於妄逆之初亡血虛家不可下蓋戒之於亡失之後

人之登溷辟辟有聲勃勃如蠅沫狀者咸以為寒非寒也由腸胃中濁氣不得宣行也滯下之裏急後重及膀胱不利而癃者下焦之火鬱而不伸也二者頗關衝任督三經常見裏急後重者多連尾□長疆如錐刺狀膀胱癃閉者臍下小腹逼迫而痛是皆下焦火鬱而六府濁氣相與糾鬱於衝任之分故也腸胃陽

欽定四庫全書

醫門法律

明燥金也下焦少陽相火也後重之用木香檳榔行燥金之鬱也癃閉之用知母黃柏散相火之熾也

凡傷寒家服藥後身熱煩燥發渴冒瞽脈兩手忽伏而不見惡寒戰慄此皆陰陽氤氳正邪相爭作汗之徵也姑宜靜以待之不可因而倉皇及至錯誤

厥陰是六經中一經之名厥自是諸證中一症之目也酒之氣暴如人身虛氣逆氣之暴酒得肉食則其氣相纏綿而不暴如人之虛氣逆氣得金石之劑沉墜





則其氣亦纏綿而不暴所以然者在相纏綿也故金石之纏綿在氣不在質惟其氣相得而纏綿故其勢亦不得不與之纏綿也世人但知金石藥墜氣而不知所以墜氣之義也東垣家則用質陰味厚以沉降之蓋氣陽質陰陰陽相遇則自然相得而不升走亦金石纏綿之義歟

凡數一為奇二為偶三為參五為伍如是則有統紀而無錯亂醫書論脈云參伍不調蓋謂參不成參伍不

欽定四庫全書

醫門法律

成伍大小不均疎數不等錯亂而無紀也黃發有陰陽天五之土為火所焚陽黃也地二之火為水所溺陰黃也

劉河間為補瀉脾胃之本者蓋以脾胃中和之氣也燥其濕則為瀉潤其燥則為補

火多水少為陽實陰虛其病為熱水多火少為陰實陽虛其病為寒也

心肺為藏陰也以通行陽氣而居上陰體而陽用也大



腸小腸為府陽也以停陽氣而居下陽體而陰用也  
肥人濕多瘦人火多濕多肌理縱外邪易入火多肌理  
緻外邪難侵濕多中緩少內傷火多中燥喜內傷  
人首尊而足卑天地定位也脾肺相為母子山澤通氣  
也肝膽主怒與動雷風之相薄也心高腎下水火不  
相射也八卦相錯而人亦肖之妙哉易也

鬱者結聚而不得發越當升者不得升當降者不得降  
當變化者不得變化所以傳化失常而六鬱之病見

欽定四庫全書

醫門法律

矣氣鬱者胸脇痛濕鬱者周身疼或關節痛遇陰寒  
則發痰鬱者動則氣喘寸口脈沉滑熱鬱者昏瞶小  
便赤脈沉數血鬱者四肢無力能食食鬱者噯酸腸  
飽不能食左寸脈和平右寸脈緊盛

俱滑伯仁

設有人焉正已奪而邪方盛者將顧其正而補之乎抑  
先其邪而攻之乎見有不的則死生係之此其所以  
宜慎也夫正者本也邪者標也若正氣既虛則邪氣  
雖盛亦不可攻蓋恐邪未去而正先脫呼吸變生則



措手無及故治虛邪者當先顧正氣正氣存則不致於害且補中自有攻意蓋補陰即所以攻熱補陽即所以攻寒世未有正氣復而邪不退者亦未有正氣竭而命不傾者如不得已亦當酌量緩急暫從權宜從少從多寓戰於守斯可矣此治虛之道也若正氣無損者邪氣雖微自不宜補蓋補之則正無與而邪反盛適足以藉寇兵而資盜糧故治實證者當直去其邪邪去則身安但法貴精專便臻速効此治實

欽定四庫全書

醫門法律

之道也要之能勝攻者方是實證實者可攻何慮之有不能勝攻者便是虛證氣去不返可不寒心此邪正之本末有不可不知也惟是假虛之證不多見而假實之證最多也假寒之證不難治而假熱之治多誤也然實者多熱虛者多寒如丹溪曰氣有餘便是火故實能受寒而余續之曰氣不足便是寒故虛能受熱世有不明真假本末而曰知醫者則未敢許也治其王氣者謂病有陰陽氣有衰王不明衰王則治之



反甚如陽盛陰衰者陰虛火王也治之者不知補陰  
以配陽而專用苦寒治火之王豈知苦寒皆沉降沉  
降則亡陰陰愈亡則火愈盛故服寒反熱者陰虛不  
宜降也又如陽衰陰盛者氣弱生寒也治之者不知  
補陽以消陰而專用辛溫治陰之王豈知辛溫能耗  
散耗散則亡陽陽愈亡則寒愈甚故服熱反寒者陽  
虛不宜耗此無他皆以專治王氣故其病反如此

又如夏令本熱而伏陰在內故每多中寒冬令本寒

欽定四庫全書

醫門法律

而伏陽在內故每多內熱設不知此而必欲用寒於  
夏治火之王用熱於冬治寒之王則有中寒隔陽者  
服寒反熱中熱隔陰者服熱反寒矣是皆治王之謂  
而病之所以反也

氣有外氣天地之六氣也有內氣人身之元氣也氣失  
其和則為邪氣氣得其和則為正氣亦為真氣但真  
氣所在其義有三曰上中下也上者所受於天以通  
呼吸者也中者生於水穀以養營衛者也下者氣化



於精藏於命門以為三焦之根本者也故上有氣海  
曰膻中也其治在肺中有水穀氣血之海曰中氣也  
其治在脾胃下有氣海曰丹田也其治在腎人之所  
賴惟此氣耳氣聚則生氣散則死故帝曰氣內為寶  
此誠最重之辭醫家最切之旨也即如本篇始末所  
言及終始等篇皆惓惓以精氣重虛為念先聖惜人  
元氣至意於此可見奈何今之醫家但知見病治病  
初不識人根本凡天下之理亦焉有根本受傷而能

欽定四庫全書

醫門法律

無敗者伐絕生機其誰之咎

諸風掉眩皆屬於肝矣若木勝則四肢強直而為掉風  
動於上而為眩脾土受邪肝之實也若木衰則虛不  
養筋而為掉氣虛於上而為眩金邪乘木肝之虛也  
又諸痛癢瘡瘍皆屬於心若火盛則熾熱為癰心之  
實也陽衰則陰勝為疽心之虛也五藏六府虛實皆  
然故本篇首言盛者寫之虛者補之末言有者求之  
無者求之盛者責之虛者責之蓋既以氣宜言病機



矣又特以盛虛有無四字貫一篇之首尾以盡其義  
此正先聖心傳精妙所在最為喫緊綱領奈何劉完  
素未之詳審略其顛末獨取其中一十九條演為原  
病式皆偏言盛氣實邪且於十九條中凡歸重於火  
者十之七八至於不及虛邪則全不相顧又曰其為  
治者但當寫其過甚之氣以為病本不可反誤治其  
兼化也立言若此虛者何堪故樓氏指其治法之偏  
誠非過也

欽定四庫全書

醫門法律

如太陰雨化施於太陽太陽寒化施於少陰少陰熱化  
施於陽明陽明燥化施於厥陰厥陰風化施於太陰  
凡淫勝在我者我之實也實者真邪也反勝在彼者  
我之虛也虛者假邪也此六氣之虛實即所謂有無  
也然天地運氣雖分五六而陰陽之用水火而已故  
陽勝則陰病陰勝則陽病寫其盛氣責其有也培其  
衰氣責其無也求得所本而直探其蹟則排難解紛  
如拾芥也設不明逆順盈虛之道立言之意而鑿執



不移所謂面東者不見西牆面南者不覩北方察一曲者不可與言化察一時者不可與言大未免實實虛虛遺人害矣

十一難曰經言脈不滿五十動而一止一藏無氣者何藏也然人吸者隨陰入呼者因陽出今吸不能至腎至肝而還故知一藏無氣者腎氣先盡也然則五藏和者氣脈長五藏病者氣脈短觀此一藏無氣必先乎腎如下文所謂二藏三藏四藏五藏者當自遠而

欽定四庫全書

醫門法律

近以次而短則由腎及肝由肝及脾由脾及心由心及肺故凡病將危者必氣促似喘僅呼吸於胸中數寸之間蓋其真陰絕於下孤陽浮於上此氣短之極也醫於此際而尚欲平之散之未有不隨撲而滅者良可哀也夫人之生死由乎氣氣之聚散由乎陰而殘喘得以尚延者賴一綫之氣未絕耳此藏氣之不可不察也

浮沉遲數滑澁即此六者之中而復有大相懸絕之要



則人多不能識也夫浮為表矣而凡陰虛者脈必浮而無力是浮不可以槩言表可升散乎沉為裏矣而凡表邪初感之甚者陰寒束於皮毛陽氣不能外達則脈必先見沉緊是沉不可以槩言裏可攻內乎遲為寒矣而傷寒初退餘熱未清脈多遲滑是遲不可以槩言寒可溫中乎數為熱矣而凡虛損之候陰陽俱虧氣血散亂者脈必急數愈數者愈虛愈虛者愈數是數不可以槩言熱可寒涼乎微細類虛矣而痛

欽定四庫全書

醫門法律

極壅閉者脈多伏匿是伏不可以槩言虛可驟補乎洪弦類實矣而真陰大虧者必關格倍常是弦不可以槩言實可消伐乎夫如是者是於綱領之中而復有大綱領者存焉設不能以四診相參而欲孟浪任意則未有不覆人於反掌間者此脈道之所以難言毫釐不可不辨也

陰陽形氣俱不足者調以甘藥甘之一字聖人用意深矣蓋藥食之入必先脾胃而後五藏得稟其氣胃氣





強則五藏俱盛胃氣弱則五藏俱衰胃屬土而喜甘  
故中氣不足者非甘溫不可土強則金王金王則水  
充此所以土為萬物之母而陰陽俱虛者必調以甘  
藥也雖至真要等論所列五味各有補寫但彼以五  
行生克之理推衍而言然用之者但當微兼五味而  
以甘為主庶足補中如四氣無土氣不可五藏無胃  
氣不可而春但微弦夏但微鈞之義皆是也觀陰陽  
應象大論曰形不足者溫之以氣精不足者補之以

欽定四庫全書

醫門法律

味故氣味之相宜於人者謂之為補則可若用苦劣  
難堪之味而求其能補無是理也氣味攻補之學倘  
不善於調和則動手便錯此醫家第一著要義

滑伯仁曰察脈須識上下來去至止六字不明此六字  
則陰陽虛實不別也上者為陽來者為陽至者為陽  
下者為陰去者為陰止者為陰上者自尺部上於寸  
口陽生於陰也下者自寸口下於尺部陰生於陽也  
來者自骨肉之分而出於皮膚之際氣之升也去者



自皮膚之際而還於骨肉之分氣之降也應曰至息  
曰止也

人迎候陽故一盛在少陽膽與三焦也二盛在太陽膀  
胱小腸也三盛在陽明胃與大腸也四盛已上者以  
陽脈盛極而陰無以通故曰格陽寸口候陰故一盛  
在厥陰肝與心主也二盛在少陰心與腎也三盛在  
太陰脾與肺也四盛已上者以陰脈盛極而陽無以  
交故曰關陰

欽定四庫全書

醫門法律

二陽之病發心脾二陽陽明也胃與大腸之脈也腸胃  
有病心脾受之發心脾猶言延及於心脾也雖然脾  
胃為合胃病而及脾理固宜矣大腸與心本非合也  
今大腸而及心何哉蓋胃為受納之府大腸為傳化  
之府食入於胃清氣歸心飲入於胃輸精於脾者以  
胃之能納大腸之能化耳腸胃既病則不能受不能  
化心脾何所資乎心脾既無所資則無以運化而生  
精血矣故腸胃有病心脾受之則男為少精女為不



月矣心脾當總言男女不當分別至隱曲不月方可  
分說耳 王安道

咳嗽外感六淫鬱而成火必六淫相合內傷五藏相勝  
必五邪相併有此不同而中間又有斂散二法斂者  
謂收斂肺氣也散者謂解散寒邪也宜散而斂則肺  
寒邪一時斂住為害非輕宜斂而散則肺氣弱一時  
發散而走泄正氣害亦非小且如感風咳嗽已經散  
之後其表虛復感寒邪虛邪相乘又為喘嗽若欲散

欽定四庫全書

醫門法律

風則愈重而虛其肺若收斂則愈又滯其邪當先輕  
解漸次斂之肺不致虛邪不致滯喘嗽自止矣

徐叔拱

內經曰一陰一陽結謂之喉痺王太僕註云一陰者手  
少陰君火心主之脈氣也一陽者手少陽相火三焦  
之脈氣也二火皆主脈並絡於喉氣熱則內結結甚  
則腫脹腫脹甚則痺痺甚而不通則死矣蓋手少陰  
少陽君相二火獨盛則熱結正絡故病且速也十二  
經中言噤乾噤痛咽腫頰腫舌本強皆君火為之也



惟喉痺急速相火之所為也夫君火者猶人火也相  
火者猶龍火也人火焚木其勢緩龍火焚木其勢速  
內經之言喉痺則咽與舌在其間耳以其病同是火  
故不分也 治喉痺之火與救火同不容少待內經  
火鬱發之發謂發汗然咽喉中豈能發汗故出血者  
乃發汗之一端也

酸者肝木之味由火盛制金不能平木則肝木自盛故  
為酸也如飲熱則酸矣或言吐酸為寒者誤也是以

欽定四庫全書

醫門法律

肝熱則口酸心熱則口苦脾熱則口甘肺熱則口辛  
腎熱則口鹹或口淡者胃熱也胃屬土土為物之母  
故胃為一身之本淡為五味之本然則吐酸豈為寒  
者歟 凡中酸法宜溫藥散之者亦猶解表之義以  
使腸胃結滯開通怫鬱散而和也若久酸不已則不  
宜溫之宜以寒藥下之後以涼藥調之結散熱去則

氣和也

劉河間  
論吐酸

仲景論少陰病熱極曰溲便遺失狂言目反視者腎先



絕也靈樞經曰腎主二陰然本衰虛而怫熱客其部  
分二陰鬱結則痿痺而神無所用故澁便遺失而不  
能止然則熱證明矣

劉河間  
論淋

衝任督三脈以帶脈束之因餘經上下往來遺熱於帶  
脈之間血積不流火從金化而為白乘少腹冤熱白  
物滿溢隨澁而下綿綿不絕多不痛也或有痛者則  
壅礙因壅而成痛也內經曰少腹冤熱澁出白液冤  
者屈滯也病非本經為他經冤鬱而成此疾也 治

欽定四庫全書

醫門法律

瀉利與治帶下皆不可驟用峻熱之藥燥之燥之則  
內水涸內水涸則必煩渴煩渴則小澁不利小澁不  
利則足腫面浮漸至不治

赤白痢者是邪熱傳於大腸下廣腸出赤白也帶下  
者傳於小腸入脬經下赤白也據此二證皆可同治  
濕法治之以導水禹功丸瀉訖次以淡劑降心火益  
腎水下小澁分水道則自愈矣

子和論  
帶下

木鬱達之達者通暢之也如肝性急怒氣逆脘脇或脹



火時上炎治以苦寒辛散而不愈者則用升發之藥  
加以厥陰報使而從治之又如久風入中為飧泄及  
不因外風之入而清氣在下為飧泄則以輕揚之劑  
舉而散之凡此之類皆達之之法也雖然木鬱固有  
吐之之理今以吐字總該達字則是凡木鬱皆當用  
吐矣其可乎哉東垣謂食塞肺分為金與土旺於上  
而尅木吐去其物以伸木氣正高者因而越之之義  
恐不勞引木鬱之說以汨之也 火鬱發之發者汗

欽定四庫全書

醫門法律

之也升舉之也如腠理外閉邪惡拂鬱則解表取汗  
以散之又如龍火鬱甚於內非苦寒降沉之劑可治  
則用升浮之藥佐以甘溫順其性而從治之使勢窮  
則止如東垣升陽散火湯是也 土鬱奪之奪者攻  
下也劫而衰之也如邪熱入胃用鹹寒之劑以攻去  
之又如中滿腹脹濕熱內甚其人壯氣實者則攻下  
之其或勢甚而不能頓除者則劫奪其勢而使之衰  
又如濕熱為痢有非力輕之劑可治者則或攻或奪



以致其平凡此之類皆奪之之法也 金鬱泄之泄者滲泄而利小便也疏通其壅也如肺金為腎水上源金受火爍其令不行原鬱而滲道閉矣宜肅清金化滋以利之又如肺氣膈滿胸憑仰息非利肺氣之劑不足以疏通之凡此之類皆泄之之法也王註解表二字於理未當 水鬱折之折者禦也伐而挫之也漸殺其勢也如腫脹之病水氣淫溢而滲道以塞夫水之所不勝者土也今土氣衰弱不能制之故反

欽定四庫全書

醫門法律

受其侮治當實其脾土資其運化俾可以制水而不敢犯則滲道達而後愈或病勢既旺非上法所能遽制則用泄水之藥以伐而挫之或去菴陳莖開鬼門潔淨府三治備舉迭用以漸平之王氏所謂抑之制其衝逆正欲折挫其汎濫之勢也夫實土者守也泄水者攻也兼三治者廣略而決勝也雖俱為治水之法然不審病者之虛實久近淺深雜焉而妄施治之其不傾踣者寡矣 邪氣久客正氣必損今邪氣雖



去苟不平調正氣使各安其位復其常猶未足以盡其妙故又曰然調其氣苟調之而其氣猶或過而未服則當益其所不勝以制之如木過者當益金金能制木則木斯服矣所不勝者所畏者也故曰過者折之以其畏也夫制物者物之所欲也制於物者物之所不欲也順其欲則喜逆其欲則惡今逆之以所惡故曰所謂瀉之王氏以鹹瀉腎酸瀉肝之類為說未

盡厥旨

王安道  
論五鬱

欽定四庫全書

醫門法律

三焦取火能腐物之義火之性自下而上三焦者始於原氣由於中脘散於膻中皆相火之自下而上也其曰上焦主納而不出下焦主出而不納其納其出皆係乎中焦之腐熟焦之為義可見矣

厥陰太陽少氣多血太陰少陰少血多氣陽明氣血俱多少陽氣多血少男子婦人均有此氣血也男子多用氣故常氣不足女人多用血故血常不足所以男子病多在氣分婦人病多在血分世俗乃謂男子多





氣女子多血豈不謬哉

邪氣盛則實精氣奪則虛二句為病治之大綱其辭似顯其義甚微最當詳辨而辨之有最難者何也蓋實言邪氣實宜寫也虛言正氣虛宜補也凡邪正相薄而為病則邪實正虛皆可言也故主寫者則曰邪盛則實當寫也主補者則曰精奪則虛當補也各執一句茫無確見藉口文飾孰得言非是以至精之訓反釀莫大之害不知理之所在有必不可移易者奈時

欽定四庫全書

醫門法律

醫不能察耳余請析此為四曰孰緩孰急其有其無也所謂緩急者察虛實之緩急也無虛者急在邪氣去之不速留則生變也多虛者急在正氣培之不早臨期無濟也微虛微實者亦治其實可一掃而除也甚虛甚實者所畏在虛但固守根本以先為已之不可勝則邪無不退也二虛一實者兼其實開其一面也二虛一實者兼其虛防生不測也總之實而誤補固必增邪猶可解救其禍小虛而誤攻真氣忽去莫



可挽回其禍大此虛實之緩急不可不察也所謂有  
無者察邪氣之有無也凡風寒暑濕火燥皆能增邪  
邪之在表在裏在府在藏必有所居求得其本則直  
取之此所謂有有則邪之實也若無六氣之邪而病  
出三陰則皆情慾以傷內勞倦以傷外非邪似邪非  
實似實此所謂無無則病在元氣也不明虛實有無  
之義必至以逆為從以標作本絕人長命損德多矣  
可不懼且慎哉

欽定四庫全書

醫門法律

損分五藏而五藏所藏則無非精與氣耳夫精為陰人  
之水也氣為陽人之火也水火得其正則為精為氣  
水火失其和則為熱為寒此因偏損所以致有偏勝  
故水中不可無火無火則陰勝而寒病生火中不可  
無水無水則陽勝而熱病起但當詳辨陰陽則虛損  
之治無餘義矣如水虧者陰虛也只宜大補真陰切  
不可再伐陽氣火虛者陽虛也只宜大補元陽切不  
可再傷陰氣蓋陽氣不足而復伐其陰陰亦損矣陰



已不足而再傷其陽陽亦亡矣夫治虛治實本自不	同實者陰陽因有餘但去所餘則得其平虛者陰陽	有不足再去所有則兩者俱敗其能生乎故治虛之	要凡陰虛多熱者最嫌辛燥恐助陽邪也尤忌苦寒	恐伐生氣也惟喜純甘壯水之劑補陰以配陽則剛	為柔制虛火自降而陽歸乎陰矣陽虛多寒者最嫌	涼潤恐助陰邪也尤忌辛散恐傷陰氣也只宜甘溫	益火之品補陽以配陰則柔得其主沉寒自斂而陰	從乎陽矣是以氣虛者宜補其上精虛者宜補其下	陽虛者宜補而兼煖陰虛者宜補而兼清此固陰陽	之治辨也其有氣因精而虛者自當補精以化氣精	因氣而虛者自當補氣以生精又如陽失陰而離者	非補陰何以收散亡之氣水失火而敗者非補火何	以甦隨絕之陰此又陰陽相濟之妙用也故善補陽	者必於陰中求陽則陽得陰助而生化無窮善補陰	者必於陽中求陰則陰得陽升而泉源不竭故以精
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

欽定四庫全書

醫門法律



氣分陰陽則陰陽不可離以寒熱分陰陽則陰陽不  
可混此又陰陽邪正之離合也知陰陽邪正之治則  
陰陽和而生道得矣

本神篇曰心怵惕思慮則傷神傷神則恐懼自失邪氣  
藏府病形篇曰憂愁恐懼則傷心口問篇曰悲哀憂  
愁則心動心動則五藏六府皆搖可見心為五藏六  
府之大主而總統魂魄兼該志意故憂動於心則肺  
應思動於心則脾應怒動於心則肝應恐動於心則

欽定四庫全書

醫門法律

腎應此所以五志惟心所使也設能善養此心而居  
處安靜無為懼懼無為欣欣婉然從物而不爭與時  
變化而無我則志意和精神定悔怒不起魂魄不散  
五藏俱寧邪亦安從奈我何哉

人知陰虛惟一而不知陰虛有二如陰中之水虛則病  
在精血陰中之火虛則病在神氣蓋陽衰則氣去故  
神志為之昏亂非火虛乎陰虧則形壞故肢體為之  
廢弛非水虛乎今以神離形壞之證乃不求水火之



源而猶以風治鮮不危矣試以天道言之其象亦然  
凡旱則多燥燥則多風是風木之化從乎燥燥則陰  
虛之候也故凡治類風者專宜培補真陰以救根本  
使陰氣復則風燥自除矣然外感者非曰絕無虛證  
氣虛則虛也內傷者非曰必無實證有滯則實也治  
虛者當察其在陰在陽而直補之治實者但察其因  
痰因氣而暫開之此於內傷外感及虛實攻補之間  
最當察其有無微甚而酌其治也甚至有元氣數虧

欽定四庫全書

醫門法律

猝然仆倒上無痰下失禁瞑目昏沉此厥竭之證尤  
與風邪無涉使非大劑參附或七年之艾破格挽回  
又安望其復真氣於將絕之頃哉倘不能察其表裏  
又不能辨其虛實但以風之為名多用風藥不知風  
藥皆燥燥復傷陰風藥皆散散復傷氣以內傷作外  
感以不足為有餘是促人之死也

五藏失治皆為心痛刺治分經理甚明悉至若舍針用  
藥尤宜察此詳議蓋腎心痛者多由陰邪上衝故善



瘦如從後觸其心胃痛者多由停滯故胸腹脹滿脾  
心痛者多由寒逆中焦故其病甚肝心痛者多由木  
火之鬱病在血分故色蒼蒼如死狀肺心痛者多由  
上焦不清病在氣分故動作則病益甚若知其氣  
則順之在血則行之鬱則開之滯則逐之火多實則  
或散或清之寒多虛則或溫或補之必真心痛者乃  
不可治否則但得其本則必隨手而應其易如探囊  
也

欽定四庫全書

醫門法律

天之六氣惟火有二君者上也相者下也陽在上者即  
君火也陽在下者即相火也上者應離陽在外也故  
君火以明下者應坎陽在內也故相火以位火一也  
而上下幽顯其象不同此其所以有辨也然以凡火  
觀之則其氣質上下亦自有君相明位之辨蓋明者  
光也火之氣也位者形也火之質也如一寸之燈光  
被滿室此氣之為然也盈爐之炭有熱無燄此質之  
為然也夫燄之與炭皆火也然燄明而質暗燄虛而



質實燄動而質靜燄上而質下以此証之則其氣之  
與質固自有上下之分亦豈非君相之辨乎是以君  
火居上為日之明以昭天道故於人也屬心而神明  
出焉相火居下為原泉之溫以生養萬物故於人也  
屬腎而元陽蓄焉所以六氣之序君火在前相火在  
後前者肇物之生後者成物之實而三百六十日中  
前後二火所主者止四五六七月共一百二十日以  
成一歲化育之功此君相二火之為用也

欽定四庫全書

醫門法律

六氣之分屬陰者三濕燥寒是也屬陽者二風熱而已  
使火無君相之化則陰勝於陽而殺甚於生矣此二  
火之所以必不可無也若因惟火有二便謂陽常有  
餘而專意抑之則伐天之和伐生之本莫此為甚此  
等大義學者最當詳察

三陽所在其脈無不應者氣之盈也三陰所在其脈有  
不應者以陽氣有不及氣之虛也然三陰之列又惟  
少陰獨居乎中此又陰中之陰也所以少陰所在為



不應蓋亦應天地之虛耳豈君不主事之謂乎

五行勝復之理不期然而然天地萬物固無往而非五行而亢害承制又安往而不然哉故求之於人則五藏更相平也五志更相勝也五氣更相移也五病更相變也故火極則寒生寒極則濕生濕極則風生風極則燥生燥極則熱生皆其化也第承制之在天地者出乎氣化之自然而在人亦為有之則在挽回運用之得失耳使能知其微得其道則把握在我何害

欽定四庫全書

醫門法律

之有設承制之盛衰不明似是之真假不辨則敗亂可立而待也

故凡以太陽之人而遇流衍之紀以太陰之人而逢赫曦之紀強者有制弱者遇扶氣得其平何病之有或以強陽遇火則炎烈生矣陰寒遇水則冰霜及矣天有天符歲有歲會人得無人和乎

王荊公解痛利二字曰治法云諸痛為實痛隨利減世俗以利為下也假令痛在表者實也痛在裏者實也





痛在血氣者亦實也故在表者汗之則愈在裏者下  
之則愈在血氣者散之行之則愈豈可以利為下乎  
宜作通字訓則可此說甚善已得治實之法矣然痛  
證亦有虛實治法亦有補寫其辨之之法不可不詳  
凡痛而脹閉者多實不脹不閉者多虛痛而拒按者  
為實可按者為虛喜寒者多實愛熱者多虛飽而甚  
者多實飢而甚者多虛脈實氣粗者多實脈虛氣虛  
者多虛新病壯年者多實愈攻愈劇者多虛痛在經

欽定四庫全書

醫門法律

者脈多弦大痛在藏者脈多沈微必兼脈證而察之  
則虛實自有明辨實者可利虛者亦可利乎不當利  
而利之則為害不淺故凡治表虛而痛者陽不足也  
非溫經不可裏虛而痛者陰不足也非養營不可上  
虛而痛者心脾受傷也非補中不可下虛而痛者脫  
泄亡陰也非速救脾胃溫補命門不可夫以溫補而  
治痛者古人非不多也惟近代薛立齋汪石山輩尤  
得之奈何明似丹溪而亦曰諸痛不可補氣局人意



見豈良法哉

崆峒子云脾土上應乎天亦屬濕化所以水穀津液不行即停聚而為痰飲也夫人之病痰火者十之八九老人不宜速降其火虛人不宜盡去其痰攻之太甚則病轉劇而致危殆須以固元氣為本凡病推類而行之亦思過半矣昌按藥以勝病乃致脾胃不能勝藥猶不加察元氣一壞變症多端如脾虛而氣短不能以續變而似喘促尚用降氣定喘之藥如脾虛衛

欽定四庫全書

醫門法律

氣不行變而為浮腫尚用耗氣利水之藥如脾虛鬱滯變而作寒熱尚謂外感用發散之藥虛而益虛直令氣盡身亡全不悔禍復以此法施之他人展轉戕生可勝誅哉

小學有虛實分治之法謂疾病之生也皆因外感內傷生火生濕濕熱生痰四者而已審其少壯新病是濕則燥之是火則瀉之濕而生熱則燥濕而兼清熱火而生痰則瀉火而兼豁痰無餘蘊矣審其衰老久病



又當攻補兼施如氣虛而有濕熱痰火則以四君子湯補氣而兼燥濕清熱豁痰瀉火如血虛而有痰火濕熱則以四物湯補血而兼瀉火豁痰清熱燥濕如此則攻補合宜庶乎可也故曰少壯新病攻邪可審老衰久病補益為先若夫陰虛火動脾胃衰弱真陰者水也脾胃者土也土雖喜燥然太燥則草木枯槁水雖喜潤然太潤則草木濕爛是以補脾滋腎之劑務在燥濕得宜隨證加減焉耳

欽定四庫全書

醫門法律

小學有火濕分治之法謂肥人氣虛生寒寒生濕濕生痰瘦人血虛生熱熱生火火生燥故肥人多寒濕瘦人多熱燥也

治病分初中末三法初治之道法當猛峻緣病得之新暴當以疾利猛峻之藥急去之不使病邪久居身中為害也中治之道法當寬猛相濟為病得之非新非久當以緩疾得中養正去邪相濟而兼治之末治之道法當寬緩廣服平善無毒用其安中養血氣俾邪



自去

治病有和取從折屬五法一治曰和假令小熱之氣當以涼藥和之二治曰取為熱勢稍大當以寒藥取之三治曰從為熱勢既甚當以溫藥從之或寒因熱用或寒以溫用或以汗發之四治曰折謂病熱極甚當以逆制之或以下奪之五治曰屬為求其屬以衰之緣熱深陷在骨髓無法可出鍼藥所不能及故求其屬以衰之

欽定四庫全書

醫門法律

昌按求屬之法內經明謂諸寒之而熱者取之陰熱之而寒者取之陽所謂求其屬也又謂大寒而甚熱之不熱是無火也當助其心大熱而甚寒之不寒是無水也當助其腎又謂取心者不必齊以熱取腎者不必齊以寒但益心之陽寒亦通行強腎之陰熱之猶可妙義精切若此本文插入不通無著之語火衰於戌金衰於辰盲瞽後人今特正之

治病有八要八要不審病不能去非病不去醫無可去



之術也故須辨審八要庶不有誤其一曰虛五虛是也脈細皮寒氣少泄瀉前後飲食不進此為五虛二曰實五實是也脈盛皮熱腹脹前後不通悶瞖此五實也三曰冷臟腑受其積冷是也四曰熱臟腑受其積熱是也五曰邪非臟腑正病也六曰正非外邪所中也七曰內病不在外也八曰外病不在內也審此八要參以脈候病機乃不至於有誤

學士商輅云醫者意也如對敵之將操舟之工貴乎臨

欽定四庫全書

醫門法律

機應變方固難於盡用然非方則古人之心弗傳茫如望洋如捕風必有率意而失之者矣方果可以不用于雖然方固良矣然必熟之素問以求其本熟之本草以究其用熟之診視以察其證熟之治療以通其變始於用方而終至於無俟於方夫然後醫之道成矣此論學醫用方最為精切

栢齋三書云藥之治病各有所主主治者君也輔治者臣也與君相反而相助者佐也引經及引治病之藥



至於病所者使也如治寒病用熱藥則熱藥君也凡  
溫熱之藥皆輔君者也臣也然或熱藥之過甚而有  
害也須少用寒涼藥以監制之使熱藥不至為害此  
則所謂佐也至於五藏六府及病之所在各須有引  
導之藥使藥與病相遇此則所謂使也餘病推此按  
栢齋此論乃用藥之權最為精切舊謂一君二臣三  
佐四使為定法此未可泥藥性論又以衆藥之和厚  
者定為君其次為臣為佐有毒者多為使此說殊謬

欽定四庫全書

醫門法律

設若削堅破積大黃巴豆輩豈得不為君耶

晉時才人欲刊正周易及諸藥方先與祖訥共論訥曰  
辯釋經典縱有異同不足以傷風教至於湯藥小小  
不達便致壽夭所由則後人受弊不少何可輕以裁  
斷祖訥之言可謂仁矣今天下才士勵志醫藥正可  
入理深譚乃效齊人惟知管晏以陶氏六書竄入仲  
景成法後人受弊更當何如

夫醫者非仁愛之士不可託也非聰明達理不可任也



非廉潔淳良不可信也是以古之用醫必選明良其  
德能仁恕博愛其智能宣暢曲解能知天地神祇之  
次能明性命吉凶之數處虛實之分定順逆之節原  
疾病之輕重而量藥劑之多少貫微洞幽不失細少  
如此乃謂良醫豈區區俗學能之哉

初學記

醫以活人為務與吾儒道最切近自唐書列之技藝而  
吾儒不屑為之世之習儒者不過誦一家之成說守  
一定之力以幸病之偶中不復深為探索上求聖賢

欽定四庫全書

醫門法律

之意以明夫陰陽造化之會歸又不能博極羣書採  
擇衆議以資論治之權變甚者至於盡棄古方附會  
臆見展轉以相迷而其為患不少矣是豈聖賢慈惠  
生民之盛意哉昌按春秋時左氏譚醫理甚悉漢儒  
已不習醫太史公作倉公等列傳鮮所發明况其他  
乎其後如華元化傳寢涉妖妄醫脈之斷實儒者先  
斷之也有唐列之方技無足怪矣九靈山房文集所  
論醫者當博極羣書求聖賢之意旨明造化之會歸



其屬望顧不大歟

戴叔明

醫之為道非精不能明其理非博不能至其約是故前人立教必使之先讀儒書明易理素難本草脈經而不少畧者何蓋非四書無以通義理之精微非易無以知陰陽之消長非素問無以識病非本草無以識藥非脈經無從診候而知寒熱虛實之證聖賢示人畧舉其端而已後學必須會羣書之長叅所見而施治之然後為可

醫學集成

欽定四庫全書

醫門法律

正五音者必法師曠之律呂成方員者必法公輪之規矩五音方員特末技耳尚取精於其事者况醫為人之司命不精則殺人今之患者不達此理委命於時醫與自暴自棄甘於溝瀆何異故病有六失失於不審失於不信失於過時失於不擇醫失於不知病失於不知藥又史記云驕恣不倫於理一不治輕身重財二不治衣食不能適三不治陰陽并藏氣不定四不治形羸不能服藥五不治信巫不信醫六不治今





時病家此其通弊矣

本集

世間多有病人親友故舊交游來問疾其人曾不經事  
未讀方書自騁了了詐作明能譚說異端或言是虛  
或道是實或云是風或云是氣紛紛謬說種種不同  
破壞病人心意不知孰是遷延未就時不待人歛然  
至禍此段情態今時尤甚

孫思邈

欽定四庫全書

醫門法律

醫門法律卷二



欽定四庫全書

子部  
醫門法律卷三

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣盧遵

謄錄監生臣鄒世俊



欽定四庫全書

醫門法律卷三

南昌喻昌撰

中塞門

論一首  
律三條

法十三條  
比類法六十九條

風寒暑濕燥火六氣分配手足各六經百病之生莫不繇之軒岐論列要在於此然原始上古經文先師僦季貸所傳每思洪荒初闢結繩紀事書從何來豈光音天化生世界蚤有天醫降下乎抑仰求大自在

欽定四庫全書

醫門法律

天而得之乎然則醫藥者上天之載也窮理盡性至命首推醫學矣去古漸遠無階可升日取內經讀之其端緒或有或無有者可求無者將何求耶君相二火及燥氣未曾深及即寒之一氣賴先聖張仲景推演傷寒中寒為二論不知中寒論何以不入金匱之藏至晉初即無可搜求并其弟子衛沈四逆三部厥經亦亡從未有老醫宿學記載一語晉人之淺於譚醫豈待問哉設使晉代仙醫許旌陽葛稚川之流仰



遯丹臺紫府大自在天之藏得其原論亦未必為當  
世之所好矣昌既尚論傷寒論不揣凡駑竊欲擬議  
仲景傳世之文以窺見不傳之一斑後及內經之風  
熱暑濕并燥火缺畧百病傳訛綿力任重老而不休  
志非不苦但以從不見聞之說定為率由坦道按劍  
而說不祥在所不免然十百中豈無二三知己取其  
大關畧其小失乎見為是者因其是暢發奧旨見為  
非者因其非另豎偉議總不肯安上世至今相沿之

欽定四庫全書

醫門法律

黯汶而必欲耀之光明有仲景表章內經於前有諸  
君子表章內經金匱於後昌於後輩中如雜劇登場  
漫引其端要不謂非箇中人物也且昌數十載寤寐  
誠求纔脫凡身必承提命此番公案尚有待於再來  
云

陰病論

喻昌曰太極動而生陽靜而生陰陽動而不息陰靜而  
有常二氣交而人生二氣分而人死二氣偏而病起二



氣乖而病篤聖神憂之設為醫藥調其偏駁使歸和平而民壽已永觀於生氣通天論中論人身陽氣如天之與日失其所則折壽而不彰是雖不言陰病而陰病之機宛然可識但三皇之世如春陽和司令陰靜不擾所以內經凡言陰病但啓其端弗竟其說厥後國政乖訛陽舒變為陰慘天之陽氣閉塞地之陰氣冒明冒明者以陰濁而冒蔽陽明也百川沸騰山冢崩高岸為谷深谷為陵詩言之矣民病因之橫夭宏多究莫識其所

欽定四庫全書

醫門法律

以橫夭之故漢末張仲景著傷寒論十卷治傳經陽病著卒病論六卷治暴卒陰病生民不幸卒病論當世即已失傳豈非其時賢士大夫莫能深維其義金匱玉函置而弗收其流布民間者悉罹兵火之厄耶仲景已後英賢輩出從未有闡揚其烈者惟寒祇和於中寒一門微有發明誨人以用附子乾薑為急亦可謂仲景之徒矣然自有醫藥以來祇道其常仲景兼言其變咤而按劍勢所必至越千百年祇和草澤一家之言已不似仲



景登高之呼况有丹溪節齋諸縉紳先生多主貴陰賤  
陽立說曰陽道饒陰道乏曰陽常有餘陰常不足曰陰  
氣難成易虧故早衰製為補陰等丸疇重乎陰疇非至  
理第於此道依樣葫蘆未具隻眼然世醫莫不奉以為  
宗即使卒病論傳之至今亦與傷寒論同其悠悠汶汶  
也已嗟乎化日舒長太平有象亂離愁慘殺運繁興救  
時者儻以貴陰賤陽為政教必國非其國治病者倘以  
貴陰賤陽為藥石必治乖其治矣豈通論哉昌尚論仲

欽定四庫全書

醫門法律

景傷寒論於凡陰病見端當以回陽為急者一一表之  
吾門已駸駸知所先矣今欲并度金鍼暢言底裏易云  
通乎晝夜之道而知夫晝為陽羣陰莫不潛伏夜為陰  
羣陰得以現形諸鬼為之夜食一切山精水怪揚氛吐  
燄伎倆無窮比雞鳴則盡隱矣蓋雞鳴夜雖未央而時  
則為天之陽也天之陽開故長夜不至漫漫而將旦也  
陰病之不可方物此見一斑而誰為燃犀之照也哉佛  
說四百四病地水火風各居百一是則四百四病皆為



陰病矣夫水火木金土在天成象在地成形原不獨畸  
於陰然而五形皆附地而起水附於地而水中有火火  
中有風人所以假合成身身所以相因致病率稟四者  
金性堅剛不受和合故四大惟金不與證無生者必修  
西方佛土有繇然也世人但知地氣靜而不擾偶見地  
動便駭為異不知地氣小動則為災眚大動則為劫厄  
劫厄之來天地萬物凡屬有形同歸於壞然地氣有時  
大動而世界得不速壞者則以玄天真武坐鎮北方攝

欽定四庫全書

醫門法律

伏龍蛇不使起陸以故地動而水不動水不動而水中  
之火火中之風自不動也仲景於陰盛亡陽之證必用  
真武湯以救逆者非以此乎至於戊亥混茫亦非天翻  
地覆互相混也天原不混於地迺地氣加天而混之耳  
蓋地水火風四輪同時轟轉雷礮沖射之威千百億道  
震盪於五天之中頃之攪毀太空混為一區而父母所  
生血肉之軀其陰病之慘烈又當何如禪宗有白浪滔  
天劫火洞然大千俱壞等語豈非四大解散之時實有



此象乎究竟地氣之加於天者止加於欲界色界等天不能加於無色界天所以上八景中初利天宮萬聖朝真兜率內院諸天聽法各各身除中陰頂現圓光由此直接非想非非想天而入佛界法界觀大千世界若掌中一果矣更何劫運可加之耶劫運所加之天至子而開陰氣下而高覆始露至丑而陰氣盡返於地而太空始廓兩儀分奠厥位日月星辰麗乎天華嶽河海附乎地五天之氣散佈於列曜九地之氣會通乎山澤以清

欽定四庫全書

醫門法律

以寧曰大曰廣庶類以漸萌生而天界隙中所餘暴悍濁陰動輒綿亘千萬丈排空直墜摧殘所生靡有孑遺天開地闢以後陰慘餘殃尚若此其可畏必至寅而駁劣悉返沖和天光下濟地德上承名木嘉卉纍纍垂實光音天人下食其果不復昇舉因得施生乃至繁衍而成天地人之三界也此義關係人身性命病機安危最宏最鉅儒者且置為不論不議醫者更蔑聞矣昌每見病者陰邪橫發上干清道必顯畏寒腹痛下利上嘔自





汗淋漓肉潤筋惕等證即忙把住關門行真武坐鎮之法不使龍雷升騰霄漢一遵仲景已傳之祕其人獲安倘失此不治頃之濁陰從胸而上入者咽喉腫痺舌脹睛突濁陰從背而上入者頸筋龕大頭項若冰轉盼渾身青紫而死謂非地氣加天之劫厄乎惟是陡進附子乾薑純陽之藥亟驅陰邪下從陰竅而出非與迅掃濁陰之氣還返地界同義乎然必盡驅陽隙之陰不使少留乃得功收再造非與一洗天界餘氛俾返沖和同義

欽定四庫全書

醫門法律

乎會仲景意中之法行之三十年治經百人凡遇藥到莫不生全雖曰一時之權宜即擬為經常之正法可也醫學缺此誠為漏義謹立鄙論以開其端後有作者出其廣大精微之蘊是編或有可採云爾

卒中寒者陽微陰盛最危最急之候經曰陰盛生內寒因厥氣上逆寒氣積於胸中而不泄不泄則溫氣去寒獨留留則血凝血凝則脉不通其脉盛大以濇故中寒內經之言若此今欲會仲景表章內經之意敷陳一二



敢辭饒舌乎

經既言陰盛生內寒矣又言故中寒者豈非內寒先生  
外寒後中之耶經既言血凝脈不通矣又言其脈盛大  
以濇者豈非以外寒中故脈盛大血脈閉故脈濇耶此  
中伏有大疑請先明之一者人身衛外之陽最固太陽  
衛身之背陽明衛身之前少陽衛身之兩側今不繇三  
陽而直中少陰豈是從天而下蓋厥氣上逆積於胸中  
則胃寒胃寒則口食寒物鼻吸寒氣皆得入胃腎者胃

欽定四庫全書

醫門法律

之關也外寒斬關直入少陰腎藏故曰中寒也此內經  
所隱而未言者也一者其脈盛大以濇雖曰中寒尚非  
卒病卒病中寒其脈必微蓋內經統言傷寒中寒之脈  
故曰盛大以濇仲景以傷寒為熱病中寒為寒病分別  
言之傷寒之脈大要以大浮數動滑為陽沉濇弱弦微  
為陰陽病而見陰脈且主死况陰病卒急必無反見陽  
脈之理若只盛大以濇二陽一陰亦何卒急之有哉此  
亦內經所隱而難窺者也



再推仲景以沉瀦弱弦微為陰脉矣其傷寒傳入少陰經則曰脉微細今寒中少陰又必但言脉微不言細矣蓋微者陽之微也細者陰之細也寒邪傳腎其亡陽亡陰尚未可定至中寒則但有亡陽而無亡陰故知其脉必不細也若果見細脉則其陰先已內虧何繇而反盛耶

在傷寒證惟少陰有微脉他經則無其太陽膀胱為少陰之府纔見脉微惡寒仲景蚤從少陰施治而用附子

欽定四庫全書

醫門法律

乾薑矣蓋脉微惡寒正陽微所致詩云彼月而微此日而微今此下民亦孔之哀在天象之陽且不可微然則人身之陽顧可微哉腎中既已陰盛陽微寒自内生復加外寒斬關直中或沒其陽於內滅頂罹殃或逼其陽於外隙駒避舍其人頃刻云亡故仲景以為卒病也人身血肉之軀皆陰也父母構精時一點真陽先身而生藏於兩腎之中而一身之元氣由之以生故謂生氣之原而六淫之外邪毫不敢犯故謂守邪之神暗室一



燈炯然達旦耳目賴之以聰明手足賴之以持行者矣  
昔人傲雪凌寒尋詩訪友猶曰一時之興到至如立功  
異域嚙雪虜庭白首猶得生還幾曾內寒生而外寒中  
耶故以後天培養先天百年自可常享苟為不然陽微  
必至陰盛陰盛愈益陽微一旦外寒卒中而以經常之  
法治之百中能有一活耶卒病之旨其在斯乎

腎中真陽得水以濟之留戀不脫得土以堤之蟄藏不  
露除施泄而外屹然不動而手足之陽為之役使流走

欽定四庫全書

醫門法律

周身固護腠理而捍衛於外而脾中之陽法天之健消  
化飲食傳布津液而運行於內而胸中之陽法日之馭  
離照當空消陰除噎而宣布於上此三者豐亨有象腎  
中真陽安享太寧故有八十而御女生子餘勇可賈者  
矣即或施泄無度陽痿不用尚可遷延歲月惟在外在  
上在中之陽衰微不振陰氣迺始有權或膚冷不溫漸  
至肌鞭不柔衛外之陽不用矣或飲食不化漸至嘔泄  
痞脹脾中之陽不用矣或當膺阻礙漸至窒塞不開胸



中之陽不用矣乃取水土所封之陽出而任事頭面得  
陽而戴赤肌膚得陽而燥脾胃得陽而除中即不中  
寒其能久乎

寒中少陰行其嚴令埋沒微陽肌膚凍裂無汗而喪神  
守急用附子乾薑加蔥白以散寒加猪膽汁引入陰分  
然恐藥力不勝熨蔥灼艾外內協攻迺足破其堅凝少  
緩須臾必無及矣此一難也

若其人真陽素擾腠理素疎陰盛於內必逼其陽亡於

欽定四庫全書

醫門法律

外魄汗淋漓脊項強硬用附子乾薑猪膽汁即不可加  
蔥及熨灼恐助其散令氣隨汗脫而陽無繇內返也宜  
撲止其汗陡進前藥隨加固護腠理不爾恐其陽復越  
此二難也

用附子乾薑以勝陰復陽者取飛騎突入重圍搴旗樹  
幟使既散之陽望幟爭趨頃之復合耳不知此義者加  
增藥味和合成湯反牽制其雄入之勢必至迂緩無功  
此三難也



其次前藥中即須首加當歸肉桂兼理其榮以寒邪中入先傷榮血故也不爾藥偏於衛弗及於榮與病即不相當邪不盡服必非勝算此四難也

其次前藥中即須加入人參甘草調元轉餉收功帷幄不爾薑附之猛直將犯上無等矣此五難也

用前藥二三劑後覺其陽明在躬運動頗輕神情頗悅更加黃芪白朮五味白芍大隊陰陽平補不可歇手蓋重陰見現浪子初歸斯時搖搖靡定怠緩不為善後必

欽定四庫全書

醫門法律

墮前功此六難也

用羣隊之藥以培陰護陽其人即素有熱痰陽出蚤已從陰而變寒至此無形之陰寒雖散而有形之寒痰阻塞竅隧者無繇遽轉為熱薑附固可勿施其牛黃竹瀝一切寒涼斷不可用若因其素有熱痰妄投寒劑則陰復用事陽即躁擾必墮前功此七難也

前用平補後已示銷兵放馬偃武崇文之意茲後總有頑痰留積經絡但宜甘寒助氣開通不宜辛辣助熱壅



塞蓋辛辣始先不得已而用其毒陽既安堵即宜休養  
其陰何得喜功生事徒令病去藥存轉生他患漫無寧  
守此八難也

昌粗陳病槩明告八難良工苦心此道庶幾可明可  
行矣然鹵莽拘執之輩用法必無成功愚昧鮮識之  
人服藥必生疑畏謹合陰病論請正明哲巨眼懇祈  
互相闡發俾卒病之旨人人共明坦然率由詎非生  
民之厚幸乎

欽定四庫全書

醫門法律

丹谿曰中寒者倉卒受寒其病即發而暴蓋中寒之  
人乘其腠理疎豁一身受邪難分經絡無熱可散溫  
補自解此胃之大虛不急治去生甚遠法當溫散理  
中湯甚者加附子其見解超出尋常矣然又曰有卒  
中天地之寒氣口傷生冷之物有外感無內傷用仲  
景法若挾內傷補中益氣湯加發散之藥必先用參  
芪托住正氣可見丹谿宗尚東垣猶在仲景宮牆之  
外未知其中宗廟百官之富美也



戴元禮曰中寒是身受肅殺之氣口食冰水瓜果冷 物病者必脉沉細手足冷息微身倦雖身熱亦不渴 倦言語或遇熱病誤服此藥輕者至重重者至死在 脉數者或飲水者煩燥動搖者皆是熱病寒熱二證 若水火也不可得而同治誤則殺人學者慎之按元 禮國朝名醫中之翹楚也其於中寒畧窺大意未識 奧旨且不曰以熱病法治之則死反曰熱病用此藥 即死殊失主客然二老外更無有言及中寒者昌又	欽定四庫全書
推其登壇建幟之功矣	醫門法律
律三條	
凡治陰寒暴病恣用清涼藥者百無一活如此死者醫 殺之也	
凡治暴寒病胸中茫無真見雖用辛熱或以漸投或行 監制時不待人倏然而逝醫之罪也	
凡醫起一陰病者即可免一劫厄天理人事必至之符 也其不能起人卒病而求幸免劫厄自不可得世有	





藹藹吉人其擇術當何如耶

比類仲景傷寒論陽虛陰盛治法并死證三十一則

太陽經九法 太陰經一法 少陰經七法

少陰死證五法 厥陰經五法 厥陰死證五法

卒病論雖亡傷寒論固存也仲景於傷寒陽微陰

盛惡寒之證尚不俟其彰著早用附子乾薑治之

并灸之矣况於卒病乎况於卒病彰著之極者乎

茲特重加剖繹非但治卒病有據即遇傷寒危證

欽定四庫全書

醫門法律

毫髮莫遁耳

仲景治傷寒傳經熱病邪在太陽之初便有用附子治

陽虛九法

其一因誤用發汗藥致汗漏不止者用桂枝湯加附子

為救法<sup>七</sup> 其證惡風小便難四肢微急難以屈伸

風傷衛之證原惡風加以誤汗則腠理盡開而惡風

愈甚小便難者諸陽主氣陽亡於外膀胱之氣化自

不行也四肢微急難以屈伸者四肢為諸陽之本亡



陽脫液斯骨屬不利也陽虛之人誤發其汗既可用此方以救其陽未汗之先寧不可用此方以解肌得汗乎仲景於桂枝湯中加人參加附子不一而足其旨微矣

其一因誤汗致心悸頭眩身暈動無可奈何者用真武湯為救法<sup>八</sup>其證發汗不解仍發熱心下悸頭眩身暈動振振欲擗地

汗雖出而熱不退則邪未盡而正已大傷况裏虛為

欽定四庫全書

醫門法律

悸上虛為眩經虛為暈身振振搖無往而非亡陽之象所以行真武把關坐鎮之法也

其一為發汗不解反惡寒者用芍藥甘草附子湯為救法<sup>九</sup>其證發汗不解反惡寒者虛故也

未汗而惡寒邪盛而表實已汗而惡寒邪退而表虛陽虛則惡寒宜用附子固矣然既發汗不解可知其熱猶在也熱在而別無他證自是陰虛之熱又當用芍藥以收陰此榮衛兩虛之救法也



其一發汗若下之病仍不解煩躁者用茯苓四逆湯為救法<sup>十</sup>

誤汗則亡陽而表虛誤下則亡陰而裏虛陰陽俱虛邪獨不解故生煩躁用此湯以救之前一證榮衛兩虛此一證表裏兩虛製方之妙又非表裏一言可盡蓋煩為心煩躁為腎躁故用乾薑附子入腎以解躁茯苓人參入心以解煩也

其一誤下而致脉促胸滿復微惡寒者用桂枝湯去芍

欽定四庫全書

醫門法律

藥加附子為救法<sup>一十</sup>

脉促雖表邪未盡然胸但滿而不結則以誤下而損其胸中之陽也加以微惡寒則并腎中之真陽亦損而濁陰用事矣故去芍藥之陰加附子以回陽也其一下之後復發汗脉沉微身無大熱者用乾薑附子湯為救法<sup>二十</sup>其證晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱

此證前一條云下之後復發汗必振寒脉微細所以



然者以內外俱虛故也誤汗亡陽誤下亡陰故云內  
外俱虛然不出方以用附子回陽人參益陰已有成  
法不必贅也此復教人以精微之蘊見亡陽一證較  
亡陰倍多然陽用事於晝者也熱煩燥擾不得眠見  
於晝者若此陰用事於夜者也安靜不嘔不渴見於  
夜者若彼豈附子人參陰陽兩平之可施乎必乾薑  
附子偏於辛熱乃足回其陽以協於偏勝之陰也

其一風濕兩邪搏聚一家用甘草附子湯分解之法

三十

欽定四庫全書

醫門法律

其證骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣  
小便不利惡風不欲去衣或身微腫

風則上先受之濕則下先受之逮至兩相搏聚注經  
絡流關節滲骨體軀殼之間無處不到則無處不痛  
也於中短氣一證乃汗多亡陽陽氣大傷之徵故用  
甘草附子白朮桂枝為劑以復陽而分解外內之邪  
也又寒傷榮而無汗之證用桂枝附子湯即本方去  
朮加薑棗之制也其寒傷榮無汗而大便鞭小便自



利者知其邪不在表則本方去桂枝仍用朮藉其益  
土燥濕之用也三方原三法今併為一見治風濕相  
搏不出以回陽為急務耳

其一心下痞而惡寒汗出用附子瀉心湯復陽瀉痞兼  
而行之之法四十

瀉心湯有五曰甘草曰半夏曰生薑曰黃連曰附子  
以惡寒汗出陽虛之證較陰痞更急故用麻沸湯漬  
去痞之藥而侵入濃煎之附子汁雖曰一舉兩得其

欽定四庫全書

醫門法律

所重從可識矣

其一誤用陽旦湯致逆用四逆湯救逆一法五十

陽旦湯者桂枝湯加黃芩之制也其人陽氣素衰者  
雖當夏月陽外陰內桂枝湯中可加附子不可加黃  
芩所以其人得湯便厥也若重發汗或燒針者誤上  
加誤非四逆湯不能回其陽矣

陽明少陽二經絕無用附子法惟太陽一經獨有不  
得不用之證蓋太陽膀胱為腎之府腎中陽虛陰盛



勢必傳出於府以故纔見脉微惡寒漏汗惡風心悸  
頭眩肉瞤筋惕躁擾等證縱是傳經熱病不得不用  
薑附以消陰復陽也而暴病不繇傳經發熱卒然而  
至尚何等待而不用附子乾薑乎

太陰經一法

傷寒傳太陰經有自利不渴一證乃其人平素濕土之  
藏有寒也故用四逆湯為溫土之法五十

太陰濕土之藏有寒不用理中而用四逆者此亦可

欽定四庫全書

醫門法律

見仲景之精義蓋水土同出一源冬月水煖則土亦  
煖夏月水寒則土亦寒所以土寒即陰內陽外非細  
故也用四逆以溫土抑何神耶

少陰經七法

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者用灸及附子

湯外內協攻之法

六十

口中和而不燥不渴其無裏證可知况背為督脉統  
督諸陽上行之地他處不寒獨覺背間寒者其為陽



虛而陰邪上湊又可知故外灸內溫兩法並施必求  
陰消陽復而後已也不知者謂傷寒纔一二日外證  
且輕何反張皇若此詎識仲景正以一二日即顯陽  
虛陰盛之證蚤從暴病施治所謂見微知著也若待  
至三四日勢必極盛難返不可救藥矣况於三四日  
以後其非暴病明矣又何用張皇也哉

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三  
日無裏證故用微發汗之法七十

欽定四庫全書

醫門法律

得病纔二三日無吐利躁煩嘔渴裏證其當從外解  
無疑然少陰絕無發汗之法汗之必至亡陽惟此一  
證其外發熱無汗其內不吐利躁煩嘔渴乃可溫經  
散寒取其微似之汗此義甚微在太陽經但有桂枝  
加附子之法蓋太陽病無脉微惡寒之證即不當用  
附子及見脉微惡寒吐利躁煩等證亡陽已在頃刻  
又不當用麻黃即此推之凡治暴病而用麻黃者其  
殺人不轉睫矣



少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉者有用附子湯一  
法  
六十

一身骨節俱痛者傷寒太陽經病也若手足寒而脉  
沉則腎中真陽之虛審矣可見身體骨節之痛皆陽  
虛所致而與外感不相涉矣故用附子湯以助陽而  
勝腎寒斯骨屬之痛盡除也若以其痛為外感之痛  
寧不殺人乎

少陰下利脉微者有用白通湯一法  
八十

欽定四庫全書

醫門法律

利不止厥逆無脉乾嘔煩者有白通加猪膽汁一法服  
湯脉暴出者死微續者生  
九十

少陰下利其人腎藏虛寒邪盛也脉微者與白通湯  
驅寒助陽斯利止脉健矣服之利不止轉至無脉嘔  
煩有加此因以熱藥治寒寒甚而格藥不入徒增其  
逆亂之勢也加猪膽汁為鄉導斯藥入而寒不為拒  
陽可回脉可出矣然脉必微續乃生暴出至死甚哉  
虛陽之易出難回也





八  
少陰下利有水氣或咳或嘔者有用真武湯加減一法

陰寒甚而水汎濫由陽虛不能攝水復不能生土以

制水以故腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利或

小便亦利或咳或嘔水性汎濫則無所不之也因其

見證不一故有加減法餘見尚論篇

少陰下利裏寒外熱手足厥逆脉微欲絕有用白通四

逆湯加減一法<sup>二</sup>面色赤者加蔥九莖腹中痛者去蔥加

欽定四庫全書

醫門法律

芍藥二兩嘔者加生薑二兩咽痛者去芍藥加桔梗一

兩利止脉不出者去桔梗加人參二兩

少陰死證五條

少陰病惡寒身踈而利手足逆冷不治

陰盛無陽也

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死

陽回利止則生若利止更加眩冒則其止也乃陰已

先亡故陽無依附浮越於上而神氣散亂時時自冒



也

少陰病四逆惡寒而身踈脉不至不煩而燥者死

脉不至陽已先絕不煩而躁孤陰頃刻自盡矣

少陰病六七日息高者死

息高則真陽上越其下無根綿綿若存之地神機化

滅故主死也

少陰病脉微沉細但欲卧汗出不煩自欲吐至五六日

自利復煩躁不得臥寐者死

欽定四庫全書

醫門法律

傷寒忌見陰脉故仲景謂少陰病脉沉者急溫之今

脉之微沉細具見外證嗜臥汗出不煩陽不為用矣

自欲吐陰邪上干矣更加自利則藏氣必至盡絕矣

况始先不煩今更煩躁始先欲寐今更不得卧寐所

存一綫之陽擾亂若此可復收乎

厥陰經五法

病者手足厥冷言我不結胸少腹滿按之痛者此冷結

在膀胱關元一法



陽邪當結於陽不結胸則陽虛可知陰邪當結於陰  
冷結在膀胱關元則陰盛可知

傷寒脉促手足厥逆者有灸之之法

脉見喘促陽氣內陷急遽不舒之狀也加以手足厥

逆陽微陰盛必罹滅頂之凶故當灸之以通其陽也

大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒用

四逆湯一法

五十

大汗出而邪不除陽則反虛矣內拘急四肢疼下利

欽定四庫全書

醫門法律

厥逆惡寒則陽之虛者已造於亡而陰之盛者尚未

有極故用四逆湯以勝陰復陽也

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者用通脉四逆湯一法

下利裏寒加以外熱是有裏復有表也然在陽虛之

人雖有表證其汗仍出其手足必厥纔用表藥立至

亡陽不用表藥終是外邪不服故於四逆湯中加蔥

為治絲絲必貫為萬世法程

嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治用四逆湯



一法  
五十

嘔與微熱似有表也脉弱則表邪必不盛小便利則裏邪必不盛可見其嘔為陰邪上干之嘔熱為陽氣外散之熱見厥則陽遭陰掩其勢駸危非用四逆湯莫可救藥矣難治二字回互上條多少叮嚀見嘔而微熱與裏寒外熱毫釐千里用四逆湯即不可加蔥以速其陽之飛越學者可不深研乎

厥陰死證四條

欽定四庫全書

醫門法律

傷寒六七日脉微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死  
灸所以通陽也厥不還則陽不回可知矣

傷寒發熱下利厥逆躁不得臥者死

腎主躁躁不得臥腎中陽氣越絕之象也

發熱而厥七日下利者為難治

先熱後厥病邪已為加進其厥復至七日之久所望者陽回厥返耳若更加下利是其虛寒深錮陽固無回馭之機陰亦有立盡之勢故難治也



傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也

發熱而利裏虛而外邪內入也故曰有陰汗出不止表虛而內陽外出也故曰無陽

再按少陰腎中內藏真陽其死證舍真陽外亡別無他故矣乃厥陰之死證亦因厥逆不返下利不止致腎臟真陽久出不返乃成死候然則腎臟之真陽豈非生身立命之原乎觀此而卒病論之旨全現全彰矣

欽定四庫全書

醫門法律

比類金匱水寒五則

仲景卒病論既亡昌於卒暴中寒證歸重少陰腎藏之真陽惟真陽衰微不振外寒始得卒然中之著陰病論暢發其義矣透此一關於以讀仲景之書無往非會心之妙如金匱水氣病證治條下泛而觀之以為論水而已初不解其所指也詳而味之乃知水雖有陰陽之分要皆陰象要皆少陰腎



所專司少陰之真陽蟠盛屹然不露則水皆內附而與腎氣同其收藏無水患之可言也必腎中真陽虧損然後其水得以汎濫於週身而心火受其湮鬱脾土受其漂沒其勢駸成滔天莫返矣故特發金匱奧義數則於左以明治之一斑

金匱五水之分曰風水曰皮水曰正水曰石水曰黃汗其風水皮水黃汗雖關於腎屬在陽分至於正水石水則陰分之水一切治陽水之法所不得施之者矣

欽定四庫全書

醫門法律

正水其脉沉遲外證自喘北方壬癸自病故脉見沉遲腎藏水肺生水子病累母標本俱病故外證自喘內經曰腎者胃之關關門不利故聚水成病上下溢於皮膚跗腫腹大上為喘呼不得臥金匱正水之名蓋本諸此石水其脉自沉外證腹滿不喘此因腎氣并於水而不動故脉沉水畜膀胱之內胞但少腹滿硬氣不上干於肺故不喘內經曰陰陽結斜陰多陽少名曰石水又曰腎肝并沉為石水以肝腎兩藏之



氣皆得貫入胞中故也而巢氏病源又謂石水者引  
兩脇下脹痛或上至胃腕則死其說果何所據耶蓋  
石水既關肝腎二藏然則腎多即下結而難上肝多  
則挾木勢上犯胃界亦勢有必至耳 葉永言少腹  
有瘕即石水之證偶因感發痛楚叫喊醫不察誤以  
柴胡藥動其肝氣且微下之嘔血如污泥而死巢氏  
所指殆此類矣 門人問治葉永言病施何法則愈  
荅曰經言先痛而後病者治其本當先溫其疝瘕用

欽定四庫全書

醫門法律

附子肉桂勝其寒救其陽止其痛後治其感可也醫  
不知此而用小柴胡湯不應見其大便不通用導法  
不應又微下之詎知濁陰上逆必用溫藥陰竅乃通  
設行寒下則重陰沍寒助其橫發敗濁之物傾囊倒  
上貫胃出口所不免矣仲景既有動氣在下不可汗  
下之戒又謂趺陽脉當伏今反緊本自有寒疝瘕腹  
中痛醫反下之下之即胸滿短氣蚤見及此蓋不溫  
其疝瘕反用寒下虛其胸中之陽則陽不布化陰得



上千迺至胸滿短氣敗濁一齊上湧而死也即是推  
之凡有疝瘕腹痛之證重受外寒其當溫經救陽允  
為定法矣本卷後採仲景治寒疝用烏頭煎方可參  
閱

金匱云少陰脉緊而沉緊則為痛沉則為水小便即難  
脈得諸沉當責有水身體腫重水病脉出者死

此論少陰病水之脉出見浮大則主死然風水皮水  
其脉皆浮妊婦病水其脉亦浮不在此例也夫少陰

欽定四庫全書

醫門法律

者至陰也於時主冬沉脉見者水象與經氣皆所當  
然故其脉反出即是少陰經氣不得藏而外絕必主  
死矣究竟所謂脉出主死者非但以其浮也惟沉之  
而無脉然後浮之而主死耳

金匱云寸口脉沉而遲沉則為水遲則為寒寒水相搏  
跌陽脉伏水穀不化脾氣衰則驚澹胃氣衰則身腫少  
陽脉卑少陰脉細男子則小便不利婦人則經水不通  
經為血血不利則為水名曰血分





寸口脉沉為水遲為寒水與寒皆非外入之邪乃由脾胃與衝脉二海合病所致蓋胃海水穀之陽不布則五陽虛竭故生寒衝脉血海之陰不生化則羣陰內結故生水水寒相搏於二海故十二經脉所稟水寒之狀應見於寸口也跌陽脾胃之脉隱伏難於推尋其人必水穀不化脾氣衰則清濁不分於裏而驚澹胃氣衰則陽氣不行於表而身腫兩有必至者衝脉為血之海屬右腎之藏三焦是其府男子以之藏

欽定四庫全書

醫門法律

精女子以之繫胞同一源也然在女則陰血海多主病在男則陽三焦多主病其流各有不同焉且衝脉無可診也男子診其少陽脉卑知為三焦氣不化而小便不利婦人診其少陰脉細知為血海受病而經水不通是則男子之水由於氣不化女子之水由於血不通誠一定之理矣然而男子亦有病血者女子亦有病氣者仲景方中氣病多有兼血藥者血病多有兼氣藥者蓋必達權通變然後可造精微之域耳



金匱舉治水寒次第之法設為問荅問曰病者苦水面	目身體四肢皆腫小便不利脉之不言水反言胸中痛	氣上沖咽狀如灸肉當微咳喘審如師言其脉何類師	曰寸口脉沉而緊沉為水緊為寒沉緊相搏結在關元	始時當微年盛不覺陽衰之後榮衛相干陽損陰盛結	寒微動腎氣上衝咽喉塞噎脚下急痛醫以為留飲而	大下之氣擊不去其病不除重復吐之胃家虛煩咽燥	欲飲水小便不利水穀不化面目手足浮腫又與葶藶	欽定四庫全書	醫門法律	丸下水當時如小差食飲過度腫復如前胸脇苦痛象	若奔豚其水揚溢則浮咳喘逆當先攻擊沖氣令止乃	治咳咳止其喘自差先治新病病當在後	脉沉為水脉緊為寒為痛水寒屬於腎足少陰之脉	自腎上貫肝膈入肺中循喉嚨其支者從肺出絡心	注胸中凡腎氣上逆必衝脈與之並行隨脈所過與	正氣相沖擊遂成以上諸病陽衰之後結寒之邪發	而上沖醫不治其沖氣妄吐下之遂損其腐熟水穀
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



傳化津液之胃於是渴而飲水小便不利至積水四	射沖氣乘虛愈擊尚可漫然治其水乎故必先治沖	氣之本沖氣止腎氣平則諸證自差未差者各隨所	宜補陽瀉陰行水實胃疏通關元之積寒久痺可也	立一法而前後次第了然無忒學者可不知所宗乎	師曰寸口脉遲而濇遲則為寒濇則為血不足跌陽脉	微而遲微則為氣遲則為寒寒氣不足則手足逆冷手	足逆冷則榮衛不利榮衛不利則腹滿脇鳴相逐氣轉	欽定四庫全書	醫門法律	膀胱榮衛俱勞陽氣不通即身冷陰氣不通即骨疼陽	前通則惡寒陰前通即痺不仁陰陽相得其氣乃行大	氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺尿名曰氣分 <small>二十</small>	枝去芍藥加麻辛附子湯 <small>論見本方下</small>	寸口以候榮衛跌陽以候脾胃脾胃虛寒則手足不	得稟水穀氣日以益衰故逆冷也逆冷之氣入積於	中而不瀉則內之溫氣去寒獨留故腹滿也脾之募	在季肋章門寒氣入於募正當少陽經脉之所過少
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



<p>陽之府三焦也既不能行升發之氣於上焦必乃引其在腹與入募之寒相逐入於膀胱留積不去榮衛</p>	<p>愈益不通腹滿胡繇而散耶有時陽雖前通然孤陽獨至衛氣終不充於腠理故惡寒陰雖前通然孤陰</p>	<p>獨至終不溫分肉故痺而不仁必陰陽二氣兩相協和榮衛通行無礙而膻中之宗氣始轉宗氣一轉則</p>	<p>離照當空濁陰之氣自從下焦二陰之竅而散第其散分虛實兩途氣實則從後陰喧吹而出氣虛則從</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>前陰淋漓而出是則寒氣之聚散總關於溫氣之去存故名之曰氣分也此等竿頭進步之言讀其書者明飲上池而不知其味豈非腥穢汨之耶</p>	<p>比類金匱胃寒四則</p>	<p>反胃一證金匱無顯條但於嘔吐篇中發奧義四段其脉其證皆主陽氣衰微立說但隱而不露今特發明彙入中寒門後以見人身陽氣所關之重</p>	<p>又見胸中陽氣與腎中真陽差等不同而治寒病</p>
---	---	---	---	------------------------	---	-----------------	--	----------------------------



之機了然心目矣

問曰病人脉數數為熱當消穀引飲而反吐者何也師  
曰以發其汗令陽微膈氣虛脉乃數數為客熱不能消  
穀胃中虛冷故也脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變  
為胃反寒在於上醫反下之令脉反弦故名曰虛

此條仲景形容脉證之變態最為微妙凡脉陽盛則  
數陰盛則遲其人陽氣既微何得脈反數脉既數何  
得胃反冷此不可不求其故也蓋脉之數由於誤用

欽定四庫全書

醫門法律

辛溫發散而遺其客熱胃之冷由於陽氣不足而生  
其內寒醫不達權通變見其脉數反以寒劑瀉其無  
過致上下之陽俱損其脉遂從陰而變為弦上之陽  
不足日中已前所食亦不消化下之陽不足日暮已  
後陽亦不入於陰而糟粕不輸於大小腸從口入者  
惟有從口出而已故曰胃氣無餘言胃中之陽氣所  
存無幾所以反胃而朝食暮吐也

寸口脉微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足



血不足則胸中冷

此條顯論脉理雖不言證隱緯上條反胃之證不重  
舉耳人身之脉陽法天而健陰法地而翕兩相和合  
不剛不柔不疾不徐沖和純粹何病之有哉今微則  
陽不健運數則陰不靜翕陰陽兩乖其度榮衛不充  
而胸中冷又不啻上條客熱已也夫榮衛之氣出入  
藏府流布經絡本生於穀復消磨其穀是榮衛非穀  
不充穀非榮衛不化胸中既冷胃必不能出納其穀

欽定四庫全書

醫門法律

證成反胃又何疑乎

跌陽脉浮而濇浮則為虛濇則傷脾脾傷則不磨食朝  
食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脉緊而濇其病  
難治

脾氣運動則脉不濇胃氣堅固則脉不浮今脉浮是  
胃氣虛不能腐熟水穀脉濇是脾血傷不能消磨水  
穀所以陽時食入陰時反出陰時食入陽時反出蓋  
兩虛不相參合故莫繇轉輸下入大小腸也河間謂



跌陽脉緊內燥盛而濕氣衰故為難治可見浮脉病  
成必變緊脉也况緊而見瀉其血已亡乎上腕亡血  
膈間乾澀食不得入下腕亡血必并大小腸皆枯食  
不得下故難治也

嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主  
之  
五

嘔則穀氣不資於脉故脉弱弱則陽氣虛不能充於  
內外下焦虛則小便冷自利上焦虛則濁氣升上逼

欽定四庫全書

醫門法律

迫其陽於外外雖假熱內實真寒證成厥逆所出之  
陽頃刻決離而不返矣治之誠難也惟四逆一湯勝  
陰回陽差有可用耳

嘔證而兼厥逆下利乃陰寒之極陽氣衰微可知反  
胃之嘔乃關格之嘔陰陽兩病殊不與下利厥逆相  
雜不知金匱緣何重錄傷寒論中厥陰證一條入在  
反胃一門豈其誤以嘔與反胃為同證耶醫學之不  
明自昔已然可慨也已茲並辨明以見胸中之陽與



腎中之陽大不同也胸中之陽如天之有日其關係榮衛納穀之道最為扼要前三條所云是也蓋胸中下連脾胃其陽氣虛者陰血亦必虛但宜用沖和之劑以平調藏府安養榮衛舍純粹以精之藥不可用也腎中之陽如斷鼈立極其關係命根存亡之機尤為宏鉅後一條所云是也蓋腎中內藏真陽其陽外亡者陰氣必極盛惟從事剛猛之劑以摧鋒陷陣勝陰復陽非單刀直入之法不可行也如是而讀此四

欽定四庫全書

醫門法律

章庶幾用法之權衡因誤編而愈益明矣

中寒色脉六則

中寒之色必見青者以青乃肝之色也故仲景云鼻頭色青腹中痛苦冷者死謂厥陰挾少陰腎水為寒寒極則陽亡陽亡則死耳

唇口青身冷為入藏即死

五藏治內屬陰主藏精宅神血氣併寒邪而入堵塞之藏真之精氣不行神機化滅升降出入之道皆絕





榮絕則唇口青靈樞曰足厥陰氣絕則唇青肝藏血  
氣絕則榮絕可知

脉脫入藏即死入府即愈

脫者去也經脉乃藏府之隧道為寒氣所逼故經氣  
脫去其脉而入於內之藏即死入於內之府即愈也  
經曰血氣并走於上則為大厥暴死

上者膻中三焦之府也又不盡指入藏言矣又如邪  
客五絡狀若尸厥者以通血脉為治此但於頭面絡

欽定四庫全書

醫門法律

脉所過通其血脉則愈又不盡指入府言矣可見脉  
脫入藏入府者脉之徵也血氣走痺於上者證之徵  
也參互考訂然後其死其愈可得詳耳

中寒脉散者

脉脫內入脉散外出內入猶有藏府之分外出則與  
陽俱亡而不返矣

尺脉遲滯沉細寒在下焦

溫經散寒其人可愈



比類金匱胸腹寒痛十七則

寒痛多見於身之前以身之背為陽身之前為陰也而身之前又多見於腹以胸為陰之陽腹為陰之陰也仲景論心胸之痛屬寒證者十之二三論腰腹之痛屬寒證者十之七八亦可煥然明矣茲舉內經金匱之奧相與繹之

經曰真心痛者寒邪傷其君也手足青至節甚則旦發夕死夕發旦死

欽定四庫全書

醫門法律

心為神明之藏重重包裹百骸衛護千邪萬惡莫之敢干必自撤其藩神明不守寒邪乃得傷犯其用勝寒峻猛之劑僭逼在所不免昌嘗思之必大劑甘草人參中少加薑附豆蔻以溫之俾邪去而藥亦不存迺足貴耳若無大力者監之其敢以暴易暴乎  
鍼經云足太陰之脉其支者復從胃別上注心中是動則病舌根脹食則嘔胃腕痛腹脹善噫心中急痛  
此以脾病四逆之邪連及於心其勢分而差緩不若



真心痛之卒死矣即太陰推之足少陰厥陰客邪皆可犯心惟陽虛陰厥斯舟中皆敵國矣

厥心痛乃中寒發厥而心痛寒逆心胞去真心痛一間

耳手足逆而通身冷汗出便溺清利不渴氣微力弱

亦主旦發夕死急以朮附湯溫之

二十一

諸經心痛心與背相引心痛徹背背痛徹心宜亟溫其

經諸府心痛難以俯仰小腹上衝卒不知人嘔吐泄

瀉其勢甚銳宜亟溫其府至藏邪乘心而痛不可救

欽定四庫全書

醫門法律

藥者多宜亟溫其心胞并注邪別脉經絡藏府淺深  
歷然乃可圖功

心痛者脉必伏以心主脉不勝其痛脉自伏也不可因

其脉伏神亂駭為心虛而用地黃白朮補之蓋邪得

溫藥則散加泥藥即不散不可不慎之也溫散之後

可陰陽平補之

金匱論胸痺心痛之脉當取太過不及陽微陰弦以太

過之陰乘不及之陽即胸痺心痛然總因陽虛故陰



得乘之陽本親上陽虛知邪中上焦設陰脉不弦則  
陽雖虛而陰不上干惟陰脉弦故邪氣厥逆而上此  
與濁氣在上則生膜脹同一病源也胸痺有微甚不  
同微者但通其上焦不足之陽甚者必驅其下焦厥  
逆之陰通胸中之陽以薤白酒或括蕒半夏桂枝  
枳實厚朴乾薑白朮人參甘草茯苓杏仁橘皮擇用  
對病三四味即成一方不但苦寒不入即清涼盡屏  
蓋以陽通陽陰分之藥所以不得預也甚者則用附

欽定四庫全書

醫門法律

子烏頭蜀椒大辛熱以驅下焦之陰而復上焦之陽  
發明三方於左臨病之工宜取則焉

金匱又錯出一證云病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似  
噦不噦憤憤然無奈者生薑半夏湯主之此即胸痺  
一門之證故用方亦與胸痺無別必編者之差誤今  
併論於此蓋陽受氣於胸陰乘陽位阻其陽氣布息  
呼吸往來之道若喘若嘔若噦實又不然但覺憤亂  
無可奈何故用半夏生薑之辛溫以燥飲散寒患斯



愈也緣陰氣上逆必與胸中之飲結為一家兩解其  
邪則陽得以布氣得以調而胸際始曠也其用橘皮  
生薑及加竹茹人參皆此例也

發明金匱心痛徹背背痛徹心用烏頭赤石脂丸

二十  
六

心痛徹背背痛徹心乃陰寒之氣厥逆而上干者橫  
格於胸背經脈之間牽連痛楚亂其氣血紊其疆界  
此而用氣分諸藥則轉益其痛勢必危殆仲景用蜀  
椒烏頭一派辛辣以溫散其陰邪然恐胸背既亂之

欽定四庫全書

醫門法律

氣難安而即於溫藥隊中取用乾薑之泥赤石脂之  
澀以填塞厥氣所橫衝之新隧俾胸之氣自行於胸  
背之氣自行於背各不相犯其患迺除此煉石補天  
之精義也今人知有溫氣補氣行氣散氣諸法矣亦  
知有堵塞邪氣攻衝之竇令胸背陰陽二氣並行不  
悖者哉

發明金匱胸痺緩急用薤苳仁附子散

二十  
五

胸中與太空相似天日照臨之所而膈中之宗氣又



賴以苞舉一身之氣者也今胸中之陽痺而不舒其  
經脉所過非緩即急失其常度總因陽氣不運故致  
然也用薏苡仁以舒其經脉用附子以復其胸中之  
陽則宗氣大轉陰濁不留胸際曠若太空所謂化日  
舒長曾何緩急之有哉

發明金匱九痛丸 二十  
七

仲景於胸痺證後附九痛丸治九種心痛以其久著  
之邪不同暴病故藥則加峻而湯改為丸取緩攻不

欽定四庫全書

醫門法律

取急蕩也九種心痛乃久客之劇證即腎水乘心脚  
氣攻心之別名也痛久血瘀陰邪團結溫散藥中加  
生狼牙巴豆吳茱萸驅之使從陰竅而出以其邪據  
胸中結成堅壘非搗其巢邪終不去耳合三方以觀  
仲景用意之微而腎中之真陽有之則生無之則死  
其所重不可識耶

金匱云跌陽脉微弦法當腹滿不滿者必便難兩胫疼  
痛此虛寒從下上也當以溫藥服之



跌陽脾胃之脉而見微弦為厥陰肝木所侵侮其陰  
氣橫聚於腹法當脹滿有加設其不滿陰邪必轉攻  
而上決無輕散之理蓋陰邪既聚不溫必不散陰邪  
不散其陰竅必不通故知其便必難勢必逆攻兩脘  
而致疼痛較腹滿更進一步也虛寒之氣從下而上  
繇腹而脘繞見一斑亟以溫藥服之俾陰氣仍從陰  
竅走散而不至上攻則善矣

仲景所謂此虛寒自下上也當以溫藥服之芑舉陰

欽定四庫全書

醫門法律

病證治了無剩義蓋虛寒從下上正地氣加天之始  
用溫則上者下聚者散直捷痛快一言而終故卒病  
論雖亡其可意會者未嘗不宛在也

金匱云病者腹滿按之不痛為虛

腹滿時減復如故此為寒當與溫藥

中寒其人下利以裏虛也

裏虛下利即當溫補藏氣防其竭絕

病者痿黃躁而不渴胸中寒實而利不止者死



痿黃乃中州土敗之象躁而不渴乃陰盛陽微之象  
胸中寒實乃堅冰凝沍之象加以下利不止此時即  
極力溫之無能濟矣蓋堅在胸而瑕在腹堅處拒藥  
不納勢必轉趨其瑕而奔迫無度徒促其藏氣之絕  
耳孰謂虛寒下利可不乘其胸中陽氣未漓陰寒未  
實蚤為溫之也乎

發明金匱腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐用附子

粳米湯 二十  
九

欽定四庫全書

醫門法律

腹中陰寒奔迫上攻胸脇以及於胃而增嘔逆頃之  
胃氣空虛邪無所隔徹入陽位則殆矣是其除患之  
機所重全在胃氣乘其邪初犯胃尚自能食而用附  
子粳米之法溫飽其胃胃氣溫飽則土厚而邪難上  
越胸脇逆滿之濁陰得溫無敢留戀必還從下竅而  
出曠然無餘此持危扶顛之手眼也

發明金匱腹痛脉弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則  
不欲食邪正相搏即為寒疝寒疝繞腹痛若發則自汗





出手足厥冷其脉沉弦者用大烏頭煎十三

繇內經心疝之名推之凡腹中結痛之處皆可言疝

不獨臍丸間為疝矣然寒疝繞腹痛其脉陽弦陰緊

陽弦故衛氣不行而惡寒陰緊故胃中寒盛不殺穀

邪即胃中之陰邪正即胃中之陽氣也論胃中水穀

之精氣與水穀之悍氣皆正氣也今寒入榮中與衛

相搏則榮即為邪衛即為正矣繞臍腹痛自汗出手

足厥冷陽微陰盛其候危矣故用烏頭之溫合蜜之

欽定四庫全書

醫門法律

甘入胃以建其中而緩其勢俾胃中陽旺榮中之邪

自不能留亦不使虛寒自下上之微旨也

比類金匱虛寒下利六則

內經曰下利發熱者死此論其常也仲景曰下利手足

不逆冷反發熱者不死此論其暴也蓋暴病有陽則

生無陽則死故虛寒下利手足不逆冷反發熱者或

其人藏中真陽未漓或得溫補藥後其陽隨返皆是

美徵此但可收拾其陽協和其陰若慮其發熱反如



常法行清解之藥鮮有不殺人者矣

仲景曰下利手足厥冷無脉者灸之不溫若脉不還反  
微喘者死

手之三陽起於手足之三陽起於足故手足為諸陽  
之本而脉又為氣血之先平人氣動其息血充其形  
出陽入陰互為其根若陰寒極盛則陽氣不布於經  
脉五液不行聚而下利其脉則無其手足則冷去生  
遠矣此時藥不能及姑灸之以艾試其人陽氣之存

欽定四庫全書

醫門法律

否若微陽未絕得艾氣之接引重布經脉手足轉溫  
隨用溫經回陽藥以繼之若無根之陽反從艾火逆  
奔為喘則陽從上脫不復返矣吁嗟萬物觸陽舒之  
煖而生觸陰慘之寒而殺世人戕賊其陽猶或諉為  
不知醫操活人之術乃戕賊夫人之陽以促人之亡  
者豈亦諉之不知耶

仲景又曰下利有微熱而渴脉弱者今自愈

上條昌會仲景意云灸後手足轉溫隨用溫經回陽



藥以繼之今觀此條不藥自愈之證其奧妙愈推愈廣蓋重緯下利脉沉弦者下重脉大者為未止脉微弱數者為欲自止雖發熱不死之文而致其精耳彼脉微弱而數利欲自止但得不死耳病未除也此獨言脉弱乃陰退陽復在表作微熱在裏作微渴表裏之間微有不和不治自愈治之必反不愈矣仲景凡喫緊叮嚀處俱金鍼未度今僭明之蓋外感證在表則發熱在裏則作渴不但微熱不可盡去即作渴亦

欽定四庫全書

醫門法律

有不同如少陰病五六日自利而渴其小便白者則不為裏熱而為腎虛引水自救設以裏熱之渴治之寧不殺人乎昌故會仲景意云不治自愈治之必反不愈謂夫慮周千變之醫世難輕覲耳

仲景又云下利脉數而渴者今自愈設不差必清膿血以有熱故也

此一條病機不但治傷寒病為扼要即治陰病最宜消息蓋下利而本之陽虛陰盛得至脉數而渴是始



焉陰盛今則陽復矣故自愈也設不愈則不但陽復必其陽轉勝夫陰而匱膿血也五運六氣有勝必有復內經謂無贊其復是謂至治可見復則必有過甚之害夫既復矣而更贊之欲何求耶治陰病者其陽已復而重贊之寧不亢而有悔哉

仲景又云下利脉沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微熱所以然者其面戴陽下虛故也

欽定四庫全書

醫門法律

太陽陽明併病面色緣緣正赤者為陽氣拂鬱在表宜解其表此之下利脉沉遲而面見小赤身見微熱乃陰寒格陽於外則身微熱格陽於上則面小赤仲景以為下虛者謂下無其陽而反在外在上故云虛也虛陽至於外越上出危候已彰或其人陽尚有根或服溫藥以勝陰助陽陽得復返而與陰爭差可恃以無恐蓋陽返雖陰不能格然陰尚盛亦未肯降必鬱冒少頃然後陽勝而陰出為汗陰出為汗邪從外



解自不利矣鬱冒汗出儼有龍戰於野其血玄黃  
之象陽入陰出從危轉安其機之可畏尚若此誰謂  
陰邪可聽其盛耶

仲景又云下利後脉絕手足厥冷晬時脉還手足溫者  
生脉不還者死

脉絕不惟無其陽亦無其陰陽氣破散豈得陰氣不  
消亡乎晬時脉還乃脉之伏者復出耳脉豈有一息  
之不續耶仲景用灸法正所以通陽氣而觀其脉之

欽定四庫全書

醫門法律

絕與伏耳故其方即名通脉四逆湯服後利止而脉  
仍不出是藥已大應其非脉絕可知又加人參以補  
其亡血斯脉自出矣成法具在宜究心焉

醫門法律卷三



欽定四庫全書

子部  
醫門法律卷四

詳校官八醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勸

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣盧遵

謄錄監生臣鄒世俊



欽定四庫全書

醫門法律卷四

南昌喻昌撰

中寒門諸方

附薑白通湯 治暴卒中寒厥逆嘔吐瀉利色清氣

冷肌膚凜慄無汗盛陰沒陽之證

附子

炮去皮臍

乾薑

炮各五錢

蔥白

五莖取汁

猪膽

大者半枚

右用水二大盞煎附薑二味至一盞入蔥汁并猪膽

欽定四庫全書

醫門法律

汁和勻溫服再用蔥一大握以帶輕束切去兩頭留

白二寸許以一面熨熱安臍上用熨斗盛炭火熨蔥

白上面取其熱氣從臍入腹甚者連熨二三餅又甚

者再用艾炷灸關元氣海各二三十壯內外協攻務

在一時之內令得陰散陽回身溫不冷次用第三方

二  
附薑湯 治卒暴中寒其人腠理素虛自汗淋漓身

冷手足厥逆或外顯假熱躁煩乃陰盛於內逼其陽

亡於外即前方不用蔥白也



附子炮去皮臍乾薑炮各五錢

右用水二大盞煎至一盞略加猪膽汁一蛤蜊壳侵和温冷服不用葱熨及艾灼

三 附薑歸桂湯 治暴病用附薑湯後第二服隨用此

方繼之因附薑顯主回陽而其所中寒邪先傷榮血故加歸桂驅榮分之寒纔得藥病相當也

附子炮去皮臍乾薑炮當歸炮肉桂各二錢五分

右用水二大盞煎至一盞入蜜一蛤蜊壳温服

四 欽定四庫全書

醫門法律

附薑歸桂參甘湯 治陽氣將回陰寒少殺略有端

緒第三服即用此方

附子炮去皮臍乾薑炮當歸炮肉桂各一錢五分人參

甘草炙各二錢

右用水二大盞煨薑三片大棗二枚自汗不用煨薑煎至一

盞入蜜三蛤蜊壳温服

五 辛温平補湯 治暴中寒證服前三方後其陽已回

身温色活手足不冷吐利漸除第四方即用此平調





藏府榮衛俾不致有藥偏之害

附子

炮去皮臍

乾薑

炮各五分

當歸

錢一

肉桂

分五

人參

甘草

炙

黃芪

炙蜜

白朮

炒土

白芍

酒炒各一錢

五味子

粒十二

右用水二大盞煨薑三片大棗二枚

劈

煎至一盞加

蜜五蛤蜊壳温服

六

甘寒補氣湯

治中寒服藥後諸證盡除但經絡間

微有窒塞辛温藥服之不能通快者第五方用甘平

助氣藥緩緩調之

欽定四庫全書

醫門法律

人參

錢一

麥冬

錢一

黃芪

蜜炙錢二

白芍

酒炒錢一

生地黄

錢二

牡丹皮

分八

淡竹葉

鮮者取汁少許更妙乾者用七分

右用水二大盞煎至一盞加梨汁少許熱服無梨汁

用竹瀝可代

六方次第昌所自訂者也然仲景卒病方論無傳難

以徵信再取傷寒論并金匱治虛寒諸方發明為例

見治熱病雜病之虛寒者用藥且若此而治暴病之

說可深信不疑矣更取諸家方治評定得失大意以



昭法戒傷寒十四方金匱十二方評定通用成方十  
則共得四十二方

<sup>七</sup>桂枝湯加附子方 治傷寒發汗過多汗漏不止惡

風小便難四肢微急亡陽之證

方論俱見  
本集前

桂枝

三錢芍藥

三錢酒炒

甘草

二錢炙

附子

炮去皮  
三錢

煨薑

二錢

大棗

二錢劈

右用水二大盞煎至一盞溫服

按漏汗亡陽之證煨薑辛散酌用一錢可也

欽定四庫全書

醫門法律

<sup>八</sup>真武湯 治太陽誤汗不解悸眩暈振亡陽之證又

治少陰腹痛下利有水氣之證

茯苓

三兩芍藥

三兩生薑

三兩白朮

二兩附子

一枚炮去皮  
臍破八片

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服

若效者加五味子半升細辛乾薑各一兩

細辛乾薑之辛以散水寒五  
味之酸以收肺氣而止欬

若小便利者去茯苓

茯苓淡滲而利竅小便既利  
即防陰津暗竭不當更滲



若下利者去芍藥加乾薑二兩

芍藥收陰而停液非下利之所宜  
乾薑散寒而煥土土煥則水有制

若嘔者去附子加生薑足成半斤

嘔加生薑宜矣乃水寒上逆為嘔正當用附子者  
何以反去之耶蓋真武湯除附子外更無熱藥乃  
為肺胃素有積熱留飲慣嘔而去之又法外之法  
耳觀後通脈四逆湯嘔者但加生薑不去附子豈  
不其明所以暴病之嘔  
即用真武尚不相當也

九  
芍藥甘草附子湯 治傷寒發汗不解反惡寒陽虛

之證

欽定四庫全書

醫門法律

芍藥 三兩 甘草 二兩 附子 一枚炮去皮  
臍破八片

右三味以水五升煮取一升五合溫服半升

十  
茯苓四逆湯 治傷寒汗下屢誤陰陽兩傷煩躁之

證

茯苓 六兩 人參 一兩 甘草 二兩 乾薑 一兩  
炙

附子 一枚生用去  
皮破八片

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日三服

十一  
桂枝去芍藥加附子湯 治傷寒下之後脈促胸滿



微惡寒陽虛之證 又治風濕相搏之證去芍藥加

白朮亦治風濕相搏

桂枝 三兩 去皮 甘草 二兩 炙 附子 一枚 炮 生薑 三兩 切

大棗 十二枚 劈

右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓適寒溫

服一升

二十 乾薑附子湯 治傷寒下之後復發汗晝煩躁夜安

靜脈沉微陽虛之證

欽定四庫全書

醫門法律

乾薑 兩 附子 一枚 去皮 生用

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

三十 甘草附子湯 治風濕相搏煩疼掣痛短氣惡風陽

虛之證

甘草 二兩 炙 附子 二枚 炮 去皮 白朮 二兩 桂枝 四兩 去皮

右四味以水六升煮取三升去滓溫服一升日三服

初服得微汗則解能食汗止復煩者服五合恐一升

多者宜服六七合為妙



<p>四十 附子瀉心湯 治傷寒心下痞惡寒汗出熱邪既盛 真陽復虛之證金匱有大黃附子湯亦同此意見二 十九方</p>	<p>大黃 <small>二兩</small> 黃連 黃芩 <small>各一兩</small> 附子 <small>一枚炮別煮取汁</small></p>	<p>右四味切三味以麻沸湯漬之須臾絞去滓內附子 汁分溫再服</p>	<p>五十 四逆湯 治三陰經證四肢厥冷虛寒下利急溫其 藏之總方</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p> <p>甘草 <small>二兩炙</small> 乾薑 <small>三兩強人可四兩</small> 附子 <small>大者一枚生去皮</small></p>	<p>右三味以水三升煮取一升二合分溫再服</p>	<p>六十 通脈四逆加減湯 治厥陰下利清穀裏寒外熱厥 逆惡寒脈微欲絕之證即用前四逆湯方面色赤者 加蔥九莖 <small>面色赤陽格於上也加蔥通陽氣也故名通脈</small></p>	<p>腹中痛者去蔥加芍藥二兩 <small>腹中痛真陰不足也去蔥惡其順陽也加芍藥</small></p>	<p>嘔者加生薑二兩</p>
---	--	---------------------------------------	---	---	--------------------------	--	--	----------------



咽痛者去芍藥加桔梗一兩咽痛陰氣上結也去芍藥惡其斂氣聚陰也加

利止脉不出者去桔梗加人參二兩利止邪欲罷也脉仍不出陽氣

未復也脉者氣血之先陽氣未復亦兼陰血不充故加人參補其氣血也去桔梗者惡其上斂而不四通

也

七十 白通湯 治少陰病但見下利藏寒陰盛用此以通

其陽勝其陰

蔥白四莖 乾薑一兩 附子一枚生

欽定四庫全書

醫門法律

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

八十 白通加猪膽汁湯 治少陰下利脉微與上白通湯

服之利不止厥逆無脉乾嘔煩者用此加猪膽汁湯

為鄉導服湯脉暴出者死微續者生

蔥白四莖 乾薑一兩 附子一枚生 人尿五合 猪膽汁一合

已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁人尿和

令相得分溫再服若無膽汁用人尿亦可

九十 附子湯 治少陰病一二日口中和背惡寒陽虛之



證灸後用此方又治少陰身體痛手足寒脉沉陽虛之證

附子 二枚去皮 茯苓 二兩 人參 二兩 白朮 四兩 芍藥 三兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

十二 麻黃附子甘草湯 治傷寒少陰經二三日無裏證

用此方溫經微發其汗金匱用治少陰水病少氣脉

沉虛脹者發其汗即已又少陰無裏證而有表證反

發熱者去甘草加細辛名麻黃附子細辛湯二方皆

欽定四庫全書

醫門法律

少陰表法也

已上十四方引證  
仲景傷寒證治

二十 白朮附子湯 金匱治風濕相搏身體煩疼不能轉

側脉浮虛而濇者用桂枝附子湯若大便堅小便自

利者用此方

白朮 二兩 附子 一枚半 甘草 一兩 生薑 一兩

大棗 六枚

右五味以水三升煮取一升去滓分溫三服一服覺



身痺半日許再服三服都盡其人如冒狀勿怪即是  
朮附並走皮中逐水氣未得除故耳

又近効方朮附湯治風虛頭重眩苦極不知食味用

此方煖肌補中益精氣

二十 桂枝去芍藥加麻辛附子湯 治氣分心下堅大如

盤邊如旋杯水飲所作

桂枝 三兩 生薑 三兩 甘草 二兩 炙 大棗 十二枚 麻黃 二兩

細辛 二兩 附子 一枚 炮

欽定四庫全書

醫門法律

右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升

分温三服當汗出如蟲行皮中即愈金匱論水氣病

寸口脉遲而澹至名曰氣分一段奧義前明之矣今

觀此證氣分之水結聚心下堅大如盤內水與外風

相挾漫無解散之期榮衛之氣且無繇通行相得臏

中之大氣更無繇豁然而轉其氣祇從邊旁走動如

旋杯之狀苦且危矣此方桂枝湯去芍藥之酸收而

合麻黃附子細辛湯之温散明是欲使少陰之水寒





及所挾之外風一汗而內外雙解無餘故云當汗出  
 如蟲行皮中則愈其非少陰水寒及不挾外風之證  
 自是胃中蓄積水飲至多上結心下但用枳實白朮  
 二味治其水飲腹中與即當散矣金匱雖未明言究  
 竟氣分之水不越此陰陽二治故不厭其複重繹於  
 此方之下

二十  
 三  
 崔氏八味丸 治脚氣上入少腹不仁 又治虛勞

腰痛少腹拘急小便不利 又治短氣有微飲引從

欽定四庫全書

醫門法律

小便出

乾地黄兩八 山茱萸 薯蕷各四 澤瀉 茯苓

牡丹皮兩各三 桂枝 附子各一

右八味末之煉蜜和丸梧子大酒下十五丸日再服

金匱用崔氏八味丸成方治脚氣上入少腹不仁者

脚氣即陰氣少腹不仁即攻心之漸故用之以驅逐

陰邪也其虛勞腰痛少腹拘急小便不利則因過勞

其腎陰氣逆於少腹阻遏膀胱之氣化小便自不能



通利故用之以收攝腎氣也其短氣有微飲者飲亦	陰類阻其胸中空曠之陽自致短氣故用之引飲下	出以安胸中也乃消渴病飲水一斗小便亦一斗而	亦用之者何耶此不但腎氣不能攝水反從小便恣	出源泉有立竭之勢故急用之以逆折其水不使順	趨也夫腎水下趨之消腎氣不上騰之渴舍此渴從	治哉後人謂八味丸為治消渴之聖藥得其旨矣然	今世以為壯水益火兩腎平補之套藥曾不問其人	欽定四庫全書	醫門法律	小便之利與不利口之渴與不渴一槩施之總於金	匱之義有未悉耳	二十	括萋瞿麥丸 治小便不利有水氣其人渴	括萋根 二兩 茯苓 三兩 薯蕷 三兩 附子 一枚 瞿麥 一兩	右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三丸日三服不知	增至七八丸以小便利腹中溫為知金匱治小便不	利而淋且渴者用之以其胃中有熱腹中有寒故變	八味丸之制為此丸見其人跌陽脉數即胃中有熱
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	------	----------------------	---------	----	-------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



胃熱必消穀引食大便必堅小便必數是其淋而且  
 渴為胃熱中消明矣故用括蕒以清胃熱茯苓瞿麥  
 以利小水然腎中寒水之氣上入於腹則腹中必冷  
 故用附子以勝其寒方下云以小便利腹中溫為知  
 製方之義可繹思也

二十 五 薏苡附子散 金匱治胸痺緩急之證

薏苡仁 二兩 大附子 一枚  
炮

右二味杵為散服方寸匕日三服

欽定四庫全書

醫門法律

二十 六 烏頭赤石脂丸 金匱治心痛徹背背痛徹心

蜀椒 一兩 烏頭 半兩  
炮 附子 半兩 乾薑 半兩  
炮

赤石脂 一兩  
煨 碎

右五味末之蜜丸如桐子大先食服一九日三服不

知稍加服

二十 七 九痛丸 金匱治九種心痛兼治卒中惡腹脹痛口

不能言又治連年積冷流注心胸痛并冷腫上氣落

馬墜車血疾等



<p>附子<small>三兩</small> 炮 生狼牙<small>一兩</small> 炙香 巴豆<small>一兩</small> 去皮 人參 乾薑 吳茱萸<small>各一兩</small></p>	<p>右六味末之煉蜜丸如桐子大酒下強人初服三丸日三服弱者二丸</p>	<p>二十 附子粳米湯 金匱治腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐</p>	<p>附子<small>一枚</small> 炮 半夏<small>半升</small> 甘草<small>一兩</small> 大棗<small>十枚</small> 粳米<small>半升</small></p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>二十 大建中湯 金匱治心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近者</p>	<p>蜀椒<small>二合</small> 去汗 乾薑<small>四兩</small> 人參<small>二兩</small></p>	<p>右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火煎取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日食糜溫覆之</p>	<p>三 大烏頭煎 金匱治心腹痛脉弦緊邪正相搏即為</p>
---	------------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------	--	---	--	-------------------------------



寒疝繞臍痛若發則自汗出手足厥冷者

烏頭

大者五枚熬  
去皮不咬咀

右以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令水氣盡

取二升強人服七合弱人服五合不差明日更服不

可日再服

又方治寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺

諸藥不能治用本方以桂枝湯五合解令少清初服

二合不知即服三合又不知復加至五合其知者如

欽定四庫全書

醫門法律

醉狀得吐者為中病外臺烏頭湯治寒疝腹中絞痛

賊風入攻五臟拘急不得轉側發作有時使人陰縮

手足厥逆即此合桂枝湯方也

一 三十  
大黃附子湯 金匱治脇下偏痛發熱其脉緊弦此

寒也以溫藥下之

大黃 二兩 附子 二枚 細辛 二兩

右三味以水五升煮取二升分溫三服若強人煮取

二升半分溫三服服後如人行四五里進一服



仲景治傷寒熱邪痞聚心下而挾陽虛陰盛之證用	附子瀉心湯之法矣其雜證脇下偏痛發熱為陽其	脉弦緊為陰寒上逆者復立此溫藥下之一法然仲	景諄諄傳心後世領略者鮮金匱又別出一條云其	脉數而緊乃弦狀如弓弦按之不移數脉弦者當下	其寒脉緊而遲者必心下堅脉大而緊者陽中有陰	可下之讀者罔識其指詎知皆以溫藥下之之法耶	其曰當下其寒曰陽中有陰試一提出其金鍼不躍	然乎	三十 赤丸 治寒氣厥逆	三十 茯苓 <small>四兩</small> 烏頭 <small>二兩</small> 半夏 <small>四兩</small> 細辛 <small>一兩</small> 千金 <small>一作人參</small>	右四味末之內真朱為色煉蜜丸如麻子大先食酒	飲下三丸日再服不知稍增之以知為度	已上十二方引	證金匱證治	三十 論建中之法	傷寒有小建中湯一法乃桂枝湯加膠飴共六味治二
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----	-------------	---	----------------------	------------------	--------	-------	----------	-----------------------

欽定四庫全書

醫門法律



三日心悸而煩欲傳不傳之邪以其人中氣餒弱不能  
送邪外出故用膠飴之甘小小建立中氣以祛邪也金  
匱有黃芪建中湯一法於小建中湯內加黃芪治虛勞  
裏急自汗表虛肺虛諸不足證而建其中之衛氣也金  
匱復有大建中湯一法以其人陰氣上逆胸中大寒嘔  
不能食而腹痛至極用蜀椒乾薑人參膠飴大建其中  
之陽以驅逐濁陰也後人推廣其義曰樂令建中湯治  
虛勞發熱以之並建其中之榮血曰十四味建中湯治

欽定四庫全書

醫門法律

臟氣素虛以之兩建其脾中腎中之陰陽仲景為祖後  
人為孫一脉淵源猗歟盛矣建中如天子建中和之極  
揖遜征誅皆建中內當然之事虛羸之體服建中後可  
汗可下誠足恃也至理中則變理之義治中則分治之  
義補中溫中莫非惠先京國之大端矣緣傷寒外邪逼  
處域中法難盡用仲景但於方首以小之一字示其微  
意至金匱治雜證始盡建中之義後人引伸觸類曲暢  
建中之旨學者必於前人之方一一會其大意庶乎心手



之間無入而不自得也

三十  
四 論東垣升陽益胃湯黃芪補胃湯二方彙方諸書採

治惡寒之證其誤最大

惡寒一證大率陽虛所致有微甚之不同微者用桂枝湯加人參黃芪甚者并加附子仲景之法精且備矣後世全不究心但曰外感遵仲景內傷法東垣取東垣升陽益胃黃芪補胃二湯為表虛惡寒之治此不可不辨也蓋表為陽表虛即表之陽虛故惡寒也與升陽益胃

欽定四庫全書

醫門法律

之方迥不相涉升陽益胃者因其人陽氣過鬱於胃土之中胃虛不能升舉其陽本內經火鬱發之之法益其胃以發其火也升陽方中半用人參黃芪白朮甘草益胃半用獨活羌活防風柴胡升陽復以火本宜降雖從其性而升之不得不用澤瀉黃連之降以分殺其勢製方之義若此至黃芪補胃湯則并人參不用而用白芷藁本升麻黃黃蘗大升小降之矣然陽火鬱於胃土之中其時寒必兼時熱其脉必數實其證必燥渴若不辨





而簡其方以治陽虛陰盛有寒無熱脉微不渴之惡寒  
寧不殺人乎

三十  
五 論扶陽助胃湯

此方乃東垣弟子羅謙甫所製治虛寒逆上胃痛之證  
遵內經寒淫於內治以辛熱佐以苦溫之旨用附子乾  
薑之大辛熱者溫中散寒用草豆蔻益智仁辛甘大熱  
者驅逐胃寒同為主治用甘草之甘溫白朮陳皮之苦  
溫溫養脾氣以佐之寒水挾木勢侮土故作急痛用桂

欽定四庫全書

醫門法律

以伐腎邪用芍藥以瀉肝木用吳茱萸以泄胸中厥逆  
之氣三使分猷而出井井有條謙甫師事東垣二十年  
盡得東垣之學觀此方以扶陽助陰胃為名明是中寒  
繇於胃寒一似韓祗和法門較之升陽益胃不啻岐途  
矣要知東垣治火鬱發其火則烟熄謙甫治無火補其  
土則氣溫用方者可不辨之於蚤乎語云見過於師方  
堪傳授見與師齊減師半德謙甫真不愧東垣弟子矣

三十  
六 論附子理中湯



理中湯古方也仲景於傷寒證微示不用之意故太陽  
悞下協熱而利心下痞鞭表裏不解用理中湯加桂枝  
而更其名曰桂枝人參湯及治霍亂證始仍理中之舊  
此見理中非解外之具矣然人身脾胃之地總名中土  
脾之體陰而用則陽胃之體陽而用則陰理中者兼陰  
陽體用而理之升清降濁兩擅其長若脾腎兩臟陽虛  
陰盛本方加附子又以理中之法兼理其下以腎中之  
陽較脾中之陽關係更重也後人更其名曰附子補中

欽定四庫全書

醫門法律

湯換一補字去兼理之義遠矣寶鑑復於本方加白芍  
白茯苓朴草豆蔻陳皮名曰附子溫中湯治中寒腹痛  
自利完穀不化脾胃虛弱不喜飲食懶言困倦嗜卧等  
證反重健運之陽不重蟄藏之陽燼亂成法無足取也  
夫既重溫脾附子可以不用既用附子溫腎即不當襍  
以白芍之酸寒况完穀不化亦豈厚朴陳皮豆蔻所能  
勝哉嗟夫釜底有火乃得腐熟水穀冷竈無烟世寧有  
不炊自熟之水穀耶後人之不逮古昔遠矣今人競宗



補腎不如補脾不知此語出自何典而庸俗方信為實  
有是說豈非俚淺易入耶又三因桂香丸潔古漿水散  
未免太過仲醇脾腎雙補丸未免不及太過則陽亢不  
及則陰凝總不若附子理中之無偏無陂矣

三十  
七 論增損八味丸

古方崔氏八味丸用附桂二味陽藥入地黄等六味陰  
藥之中金匱取治脚氣上入少腹不仁其意頗微蓋地  
氣上加於天則獨用薑附之猛以勝之地氣纔入少腹

欽定四庫全書

醫門法律

適在至陰之界無事張皇所以但用陽藥加於陰藥內  
治之不必偏於陽也至腎水泛溢婦人轉胞小便不利  
則變其名為腎氣丸而藥仍不變蓋收攝腎氣則腎水  
歸源而小便自行亦無取偏陽為矣觀此則治陽虛陰  
盛之卒病其當用純陽無陰更復何疑後人於脚氣入  
腹少腹不仁而見上氣喘急嘔吐自汗不識其證地氣  
已加於天襲用此方不應乃云此證最急以腎乘心水  
尅火死不旋踵用本方加附桂各一倍終是五十步笑



百步不達卒病大關徒以腎乘心水尅火五臟受尅為最急不知五臟互相尅賊危則危矣急未急也厥後朱奉議治脚氣變八味丸為八味湯用附子乾薑芍藥茯苓甘草桂心人參白朮其義頗精於中芍藥甘草人參臨證更加裁酌則益精矣奈何無識之輩復以此湯插入已見去桂心加乾地黃以陰易陽奚啻千里而方書一槩混收詎識其為奉議之罪人乎

三十  
八 論三因治自汗用芪附朮附參附三方

欽定四庫全書

醫門法律

黃芪一兩附子五錢名芪附湯白朮一兩附子五錢名朮附湯人參一兩附子五錢名參附湯三方治自汗之證審其合用何方煎分三服服之其衛外之陽不固而自汗則用芪附其脾中之陽遏鬱而自汗則用朮附其腎中之陽浮游而自汗則用參附凡屬陽虛自汗不能舍三方為治耳然三方之用則大矣芪附可以治虛風朮附可以治寒濕參附可以壯元神三者亦交相為用其所以祇用二物比而成湯不襍他味者用其所當用



功效若神誠足貴也年高而多姬妾者每有所失隨進  
參附湯一小劑即優為而不勞仕宦之家彌老而貌若  
童子得力於此方者頗衆故治自汗一端不足以盡三  
方之長也以黃芪人參為君其長駕遠馭附子固不能  
以自恣朮雖不足以制附然遇陽虛陰盛寒濕沉痾即  
生附在所必用亦何取制伏為耶金匱近効白朮附子  
湯中即本方加甘草一味仲景取之以治痺證豈非以  
節制之師緩圖其成乎急證用其全力即不可制緩證  
用其半力即不可不制至急中之緩緩中之急不制而  
制制而不制妙不容言矣

欽定四庫全書

醫門法律

三十  
九 論寶鑑桂附丸

方用川烏黑附乾薑赤石脂川椒桂六味為丸療風邪  
冷氣入乘心絡臟腑暴感風寒上乘於心令人卒然心  
痛或引背脅乍間乍甚經久不差按此方原倣金匱九  
痛丸之例治久心痛而云暴感風寒入乘於心令人卒  
然心痛則是素無其病卒然而痛矣卒病宜用湯以盪



之豈有用丸且服至一料之理千萬方中獲此一方有  
合往轍又不達製方之蘊學者將何所宗乎况邪在經  
絡則治其經絡邪在府則治其府邪在臟則治其臟此  
方即變為湯但可治臟病不可治府及經絡之病蓋臟  
為陰可勝純陽之藥府為陽必加陰藥一二味以監制  
其僭熱經絡之淺又當加和榮衛并宣導之藥矣因併  
及之

十四論得効華撥丸

欽定四庫全書

醫門法律

虛寒泄瀉宜從溫補固矣然久瀉不同暴病且有下多  
亡陰之戒方中用附子勝寒當兼以參朮如理中之例  
可也乃用乾薑復用良薑用華撥復用胡椒用丁香復  
用豆蔻惟恐不勝其瀉曾不思五臟氣絕於內則下利  
不禁其敢以一派香燥坐耗臟氣耶後人復製萬補丸  
雖附子與人參當歸白朮同用而仍蹈前轍丁沉乳茴  
草蔻肉蔻薑桂華撥既無所不有更加陽起鍾乳赤脂  
石性之悍冀圖瀋止其瀉而不知盡劫其陰徒速人臟



氣之絕耳用方者鑒諸

四十  
一 論本事溫脾湯

學士許叔微製此方用厚朴乾薑甘草桂心附子各二兩  
兩大黃四錢煎六合頓服治錮冷在腸胃間泄瀉腹痛  
宜先取去然後調治不可畏虛以養病也叔微所論深  
合仲景以溫藥下之之法其大黃止用四錢更為有見  
夫錮冷在腸胃而滑泄矣即溫藥中寧敢多用大黃之  
猛重困之乎減而用其五之一乃知叔微之得於仲景

欽定四庫全書

醫門法律

者深也仲景云病人舊微澹者梔子湯不可與服又云  
太陰病脈弱便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人  
胃氣弱易動故也即是觀之腸胃錮冷之滑泄而可恣  
用大黃耶不用則溫藥必不能下而久留之邪非攻不  
去多用則溫藥恐不能制而洞下之勢或至轉增裁酌  
用之真足法矣玉機微義未知此方之淵源不為首肯  
亦何貴於論方哉

四十  
二 論本事椒附散



治項筋痛連背髀不可轉移方用大附子一枚炮去皮  
臍為末每服二錢用川椒二十粒以白麵填滿水一盞  
生薑七片同煎至七分去椒入鹽空心服叔微云予一  
親患此服諸藥無效嘗憶千金髓有腎氣攻背強一證  
處此方與之一服瘥觀此而昌陰病論中所謂地氣從  
背而上入者頃之頸筋粗大頭項若冰非臆說矣夫腎  
藏真陽陽盛則百骸溫暖陽衰則一身沍寒至陽微則  
地氣上逆者其冷若冰勢所必至此但項筋通連背髀  
欽定四庫全書  
醫門法律

殊非暴證且獨用附子為治則暴病必藉附子全力大  
劑服之不待言矣陶潛詩云竒文共欣賞疑義相與析  
安得起宋代之叔微劇談陰病乎

醫門法律卷四





欽定四庫全書

子部  
醫門法律卷五

詳校官太醫院醫官汪景晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣盧遂

謄錄監生臣鄒世俊



欽定四庫全書

醫門法律卷五

南昌喻昌撰

中風門

論一篇 法四十一條 律六條

中風論

喻昌曰中風一證動關生死安危病之大而且重莫有過於此者內經風痺痿厥四證各有顛論獨風論中泛及雜風至論中風惟曰風中五藏六府之俞亦為藏府

欽定四庫全書

醫門法律

之風各入其門戶所中則為偏風不過兩述其名而已後論五藏并胃府之風亦但各述其狀而已賴仲景金匱書表章先聖云夫風之為病當半身不遂或但臂不舉者此為痺脈微而數中風使然又云寸口脈浮而緊緊則為寒浮則為虛寒虛相搏邪在皮膚浮者血虛絡脈空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喁僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即重不勝邪入於府即不識人邪入於藏舌即難言口流涎沫



又云寸口脈遲而緩遲則為寒緩則為虛營緩則為亡  
血衛緩即為中風邪氣中經則身痒而癢疹心氣不足  
邪氣入中則胸滿而短氣以及五藏風脈死證語語金  
鍼大有端緒之可求矣仲景以後英賢輩出方書充棟  
何反漫無取裁坐令中風一證鮮畫一之法治之百不  
一效昌生也晚敢辭不敏逐條引伸內經仲景聖法為  
治例而先立論以括其要焉然世咸知仲景為立方之  
祖至中風證仲景之方首推侯氏黑散為主方後人罔

欽定四庫全書

醫門法律

解其意謹并明之夫八風之邪皆名虛邪人身經絡營  
衛素盛者無從入之入之者因其虛而龍之耳內經謂  
以身之虛而逢天之虛兩虛相感其氣至骨入則傷五  
藏工候禁之不能傷也又謂賊風數至虛邪朝夕內至  
五藏骨髓外傷空竅肌膚靈樞亦謂聖人避邪如避矢  
石是則虛邪之來為害最烈惟良工知禁之聖哲知避  
之矣然風為陽邪人身衛外之陽不固陽邪乘陽尤為  
易入即如偏枯不仁要皆陽氣虛餒不能充灌所致又



如中風卒倒其陽虛更審設非陽虛其人必輕矯便捷  
何得卒倒耶仲景之謂脈微而數微者指陽之微也數  
者指風之熾也所出諸脈諸證字字皆本陽虛為言然  
非仲景之言而內經之言也內經謂天明則日月不明  
邪害空竅可見風性善走空竅陽虛則風居空竅漸入  
府藏此惟離照當空羣邪始得畢散若胸中之陽不治  
風必不出矣扁鵲謂虢太子尸厥之病曰上有絕陽之  
絡下有破陰之紐見五絡之絡於頭者皆謂陽絡而邪

欽定四庫全書

醫門法律

阻絕於下其陽之根於陰陰陽相紐之處而正復破散  
於下故為是病古人立言之精若此仲景以後醫脈斬  
焉中斷後賢之特起者如劉河間則主火為訓是火召  
風入火為本風為標矣李東垣則主氣為訓是氣召風  
入氣為本風為標矣朱丹谿則主痰為訓是痰召風入  
痰為本風為標矣然一人之身每多兼三者而有之曷  
不曰陽虛邪害空竅為本而風從外入者必挾身中素  
有之邪或火或氣或痰而為標耶王安道謂審其為風



則從內經審其為火為氣為痰則從三子徒較量於彼此之間得非無權而執一耶且從三子固各有方論可守從內經果何著落耶中風門中大小續命湯及六經加減法雖曰治風依然後人之法也金匱取古今錄驗續命湯治風痲之身無痛而四肢不收者仲景所重原不在此所重維何則驅風之中兼填空竅為第一義也空竅一實庶風出而不復入其病瘳矣古方中有侯氏黑散深得此意仲景取為主方隨製數方輔其未備後

欽定四庫全書

醫門法律

人目覩其方心炫其指詎知仲景所為心折者原有所本乃遵內經久塞其空是謂良工之語耶觀方下云服六十日止藥積腹中不下矣久塞其空豈不彰明哉後人以無師之智燭亂成法中風之初治其表裏風邪非不外出而重門洞開出而復入乃至莫禦者多矣又謂一氣微汗一旬微利要亦五十步之走耳正如築堤禦水一旬一氣正程功課效之日豈有姑且開堤泄水重加板築之理哉是以後人委曲偏駁不似先聖直切精



粹諸家中風方論直是依樣葫蘆不足觀矣非然也三  
人行必有我師况綜列羣方贊其所長核其所短俾學  
者一簡勘而心地朗然坐進此道用之如鍾離丹熟銅  
鐵皆金其師資於前賢豈不大耶謹論

中風之脈各有所兼兼則益造其偏然必顯呈於脈盖

新風挾舊邪或外感或內傷其脈隨之忽變兼寒

則脈浮緊兼風則脈浮緩兼熱則脈浮數兼痰則脈

浮滑兼氣則脈沉澹兼火則脈盛大兼陽虛則脈微

欽定四庫全書

醫門法律

亦大而空兼陰虛則脈數亦細如絲陰陽兩虛則微  
數或微細虛滑為頭中痛緩遲為營衛衰大抵陽浮  
而數陰濡而弱浮滑沉滑微虛散數皆為中風然虛  
浮遲緩正氣不足尚可補救急大數疾邪不受制必  
死無疑若大數未至急疾猶得不死經言風氣之病  
似七診而非故言不死可見大數為風氣必有之脈  
亦未可定為死脈耳

岐伯謂各入其門戶所中則為偏風仲景謂風之為病



然當半身不遂或但臂不舉者此為痺脈微而數中風使

門戶指入絡入經入府入藏言也經言百病之生必先於皮毛邪中之則腠理開開則邪入客於絡脈留而不去傳入於經留而不去傳入於府廩於腸胃此則風之中人以漸而深其人之門戶未至洞開又不若急虛卒中入藏之驟也仲景會其意故以臂不舉為痺敘於半身不遂之下謂風從上入臂先受之所

欽定四庫全書

醫門法律

入猶淺也世傳大拇一指獨麻者三年內定中風則又其淺者矣然風之中人必從榮衛而入風入榮衛則榮脈改微衛脈改數引脈以見其人必血舍空虛而氣分熱熾風之繇來匪伊朝夕也

內經言偏枯者不一曰汗出偏阻曰陽盛陰不足曰胃脈內外大小不一曰心脈小堅急曰腎水虛靈樞亦叙偏枯於熱病篇中皆不言風皆不言其本於何邪豈非以七情饑飽房室凡能虛其藏氣致榮衛經



脈痺而不通者皆可言邪耶河間主火立說即腎水  
虛陽盛陰不足之一端也東垣主氣立說即七情鬱  
遏之一端也丹溪主痰立說即飲食傷脾之一端也  
一病之中每多兼三者而有之安在舉一以括其他  
乎經云不能問其虛安問其餘偏枯病陽盛陰不足  
固有之而陽氣虛衰痺而不通者尤多可問其餘耶  
中絡者肌膚不仁中經者軀殼重著中府即不識人中  
藏即舌難言口流涎沫然中府必歸胃府中藏必歸心  
藏也

欽定四庫全書

醫門法律

中絡邪正入衛猶在經脈之外故但肌膚不仁中經  
則邪入於榮脈之中內而骨外而肉皆失所養故軀  
殼為之重著然猶在軀殼之間至入府入藏則離軀  
殼而內入邪中深矣府邪必歸於胃者胃為六府之  
總司也廩於腸胃非舉大小二腸並重蓋風性善行  
空竅水穀入胃則胃實腸虛風邪即迸入腸中少頃  
水穀入腸則腸實胃虛風復迸入胃中見胃風必奔





迫於二腸之間也風入胃中胃熱必盛蒸其津液結  
為痰涎壅塞隧道胃之支脈絡心者纔有壅塞即堵  
其神氣出入之竅故不識人也諸感受邪至盛必迸  
入於心而亂其神明神明無主則舌縱難言廉泉開  
而流涎沫也  
偏枯病脈之遲緩見於寸口榮衛之行不逮也外則身  
痒而癢疹內則胸滿而短氣榮脈內外邪氣充斥去府  
不遠矣

欽定四庫全書

醫門法律

脈之行度一晝一夜復朝寸口榮衛氣衰寸口之脈  
遲緩不逮身痒癢疹非但風見於外由榮衛氣弱自  
致津凝血滯也胸滿非獨風見於內由榮衛不行邪  
混胸中阻遏正氣也榮衛氣衰邪之入府入藏孰從  
禁之故以寸口脈辨其息數斯邪入之淺深可得而  
諦之耳

昔人云中府多著四肢用一多字明是卜度之辭乃  
遂執此語以當中府見症何其疎耶夫四末在軀殼



之外非府也若謂脾主四肢脾更屬藏而非府矣大抵風淫末疾但是風淫於內毋論中府中經中藏必四末為之不用其不專屬中府明矣然則四肢何以不舉耶人身榮衛正行於軀殼之中者也風入榮衛即邪氣盛而本氣衰如樹枝得風非搖則折故知四肢不舉者榮衛之氣短縮不行所致也

中藏多滯九竅此亦卜度之辭五藏開竅於眼耳鼻

欽定四庫全書

醫門法律

口舌固矣而前後二陰之竅又屬府不屬藏未可並舉也五藏非一齊俱中但以何竅不利驗何藏受邪差可耳然諸家舍外候別無內諦之法且無畫一方又何疎耶蓋風中入藏關係生死安危辨症既不清用藥自不當故特引內經金匱奧義詳之如左  
風中五藏後世忽略諸家方論無津可問茲會經意以明其治經曰肺中於風多汗惡風時咳晝差暮甚診在脅上其色白此舉其外候也金匱曰肺中風狀口燥而



子診在目下其色青金匱曰肝中風者頭目暈而脇痛	經曰肝中於風多汗惡風善悲色蒼嗑乾善怒時憎女	也	陰之屬不過三日而死者正指此等無根之脈而言	入於陰矣其下無根則孤陰且以漸而亡矣內經死	知加以有浮無沉按之弱如蔥葉則在上之陽不下	氣未絕猶屬可生若脈見浮之而虛其藏真欲散可	失故身運而重胃虛而腫脹等證相因互見也然藏	欽定四庫全書	醫門法律	水穀所容之胃府逮風入肺而亂其魄運用之機盡	喘勢有必至然未入之先已傷及榮衛所主之肌肉	風既中肺則火熱隨之耗其津液搏其呼吸口燥而	表章內經皆自出手眼以述為作學者知之他藏倣此	以徵其浮而藏氣之存否始得渙然無疑矣大凡仲景	則曰肺死藏浮之虛按之弱如蔥葉下無根者死合沉	脈來如物之浮如風吹毛此形其浮散之狀也至金匱	喘身運而重胃虛而腫脹則并詳其內證矣經曰死肺
-----------------------	-----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



行常偃令人嗜甘肝死藏浮之弱按之如索不來或曲如蛇行者死

風木之藏更中於風風性上搖必頭目暈動風耗血液必筋脈縱急其死脈浮之弱按之如按索不來則浮沉之間陰陽已見決離或曲如蛇行仍是上下不動惟在中者儘力奔迫皆藏氣垂絕之象也

經曰心中於風多汗惡風焦絕善怒嚇病甚則言不可快診在口其色赤金匱分為二候其曰心中風者翕翕

欽定四庫全書

醫門法律

發熱不能食心中飢食即嘔吐此外因也其曰心傷者勞倦即頭面赤而下重心中痛而自煩發熱當臍跳其脈弦此內因也心死藏浮之實如麻豆按之益躁疾者死

心藏中風分之為二者其一以外入之風必從他藏逆至心不受邪故也宜隨其藏氣兼去其風其一以七情內傷神明真陰不守而心火炎上頭目發赤藏真既從火上炎陰之在下者無陽以舉之則下重其



衛外之陽不得入通於心則發熱其受盛之府藏氣  
不交鬱而內鼓則當臍跳動死心脈內經形容不一  
仲景總會大意謂心藏垂絕之脈一舉一按短數而  
動浮沉不可息數之狀若此

經曰脾中風狀多汗惡風身體怠惰四肢不欲動色薄  
微黃不嗜食診在鼻上其色黃金匱曰脾中風者翕翕  
發熱形如醉人腹中煩重皮目睜睜而短氣脾死狀浮  
之大堅按之如覆杯潔潔狀如搖者死

欽定四庫全書

醫門法律

風入脾藏為賊邪外掣皮目內亂意識四肢怠惰形  
如醉人有必至也加以胸中短氣脾藏之傷已見一  
斑若脈更來去至止不常浮之益大堅是為獨陽按  
之潔潔狀如搖是為獨陰故其動非活動轉非圓轉  
非藏氣之垂絕而何

經曰腎風之狀多汗惡風面癢然如腫脊痛不能正立  
其色焔隱曲不利診在肌上其色黑金匱闕此腎死藏  
浮之堅按之亂如轉丸益下入尺中者死



面癱然浮腫者腎氣不能蟄封收藏濁氣上干於面也脊痛不能正立者腎間生氣不鼓腰府憊而僂俯與隱曲不利同一源也金匱雖見缺文大要兩腎藏精宅神一身根本多慾致虛風最易入腰曲脊垂舌卷小便不禁皆其候也中腎從來兼此四者本實先撥可知然腎藏真陽腎基未壞真陽可居必無死脈若浮之而堅陽已離於陰位按之亂如轉丸則真陽搏激而出不能留矣若益下入尺中則真陽先去所

欽定四庫全書

醫門法律

餘孤陰亦亂而下趨正所謂陽從上脫陰從下脫也風中入藏最防迸入於心後世悉用腦麝引風入心尤而效之莫有知其非者茲舉金匱二方以明其治

侯氏黑散 一治中風四肢煩重心中惡寒不足者外臺用之以治風癱仲景製方皆匠心獨創乃於中風證首引此散豈非深服其長乎夫立方而但驅風補虛誰不能之至於驅之補之之中行其堵截之法則非思議可到方中取用礬石以固澀諸藥使之留積



不散以漸填其空竅服之日久風自以漸而熄所以  
初服二十日不得不用溫酒調下以開其痺著以後  
則禁諸熟食惟宜冷食如此再四十日則藥積腹中  
不下而空竅填矣空竅填則舊風盡出新風不受矣  
蓋礬性得冷即止得熱即行故囑云熱食即下矣冷  
食自能助藥力抑何用意之微耶

風引湯 二 治大人風引少小驚癇癱瘓日數十發醫

所不療除熱方可見大人中風牽引少小驚癇癱瘓

欽定四庫全書

醫門法律

正火熱生風五藏亢甚歸迸入心之候蓋驚癇之來  
初分五藏後迸入心故同治也巢氏用此治腳氣豈  
非以石性易於下達可勝其濕熱不使攻心乎夫厥  
陰風木與少陽相火同居火發必風生風生必挾木  
勢侮其脾土故脾氣不行聚液成痰流注四末因成  
癱瘓用大黃為君以蕩滌風火熱濕之邪矣隨用乾  
薑之止而不行者以補之用桂枝甘草以緩其勢用  
諸石藥之澹以堵其路而石藥之中又取滑石石膏



清金以伐其木赤白石脂厚土以除其濕龍骨牡蠣
以收斂其精神魂魄之紛馳用寒水石以助腎水之
陰俾不為陽光所劫更用紫石英以補心神之虛恐
主不安則十二官皆危也明此以治入藏之風游刃
有餘矣何後世以為石藥過多舍之不用而用腦麝
以散其真氣花蛇以增其惡毒智耶愚耶吾不解矣
按金匱風引湯當在侯氏黑散之下本文有正氣引
邪啗僻不遂等語故立方即以風引名之侯氏黑散
欽定四庫全書
醫門法律
顛主補虛以熄其風此方兼主清熱火濕以除其風
也集者誤次於寸口脈遲而緩之下則證與方不相
涉矣
風中五藏其來有自藏氣先傷後乃中之火熱氣濕痰
虛六賊勾引深入一旦卒倒無知通身牽引四末不用
但得不死亦成癱瘓何藏先傷調之使平不令迸入於
心乃為要也
五藏各藏一神不可傷之經謂神傷於思慮則肉脫





<p>意傷於憂愁則肢廢魂傷於悲哀則筋攣魄傷於喜樂則皮槁志傷於盛怒則腰膝難以俛仰是風雖未入藏真先已自傷火熱氣濕痰虛迎之內入多汗惡風等證因之外出治之難矣善治者乘風未入審其何藏先傷何邪徹土綢繆最為扼要之法也</p> <p>中風外證錯見不一風火相煽多上高巔風濕相搏多流四末手足麻木但屬氣虛關節腫痺濕痰凝滯</p> <p>偏正頭痛愈風丹 <small>三</small> 目蠕面腫胃風湯 <small>四</small> 風濕薏</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>醫門法律</p> <p>苡仁湯 <small>五</small> 排風湯 <small>六</small> 麻木人參補氣湯 <small>七</small> 腫痺舒筋散 <small>八</small></p>	<p>寒熱似瘧解風為宜風藏痰隧搜風最當</p> <p>解風散 <small>九</small> 搜風丸 <small>十</small></p>	<p>經絡及府治分淺深表裏之邪大禁金石</p> <p>中絡桂枝湯 <small>十一</small> 中經小續命湯加減 <small>十二</small> 表裏兼治</p>	<p>防風通聖散 <small>十三</small> 祛風至寶膏 <small>十四</small> 攻裏三化湯 <small>十五</small> 搜</p>	<p>風丸 <small>十六</small></p>
---	--	--	--	--	-----------------------------



左癱右瘓風入筋骨宣導其邪緩以圖之

舒筋保安散 六十

卒中灌藥宜用辛香開痰行氣調入蘇合

南星湯調蘇合丸 七十 順氣散 八十 勻氣散 九十 稀涎散

十二

四肢不舉有虛有實陽明虛則宗筋失潤不能束骨而利機關陽明實則肉理緻密加以風邪內淫正氣自不週流也

欽定四庫全書

醫門法律

虛用六君子湯 一二十 實用三化湯合承氣湯 二二十

口眼喎斜邪急正緩左急治左右急治右先散其邪次補其正

左急三聖散 三十 右急勻氣散 九十

轉舌正舌方名雖美少陰脈繫舌本三年之艾不言標矣資壽解語猶為近之

轉舌膏 四十 正舌散 五十 資壽解語湯 六十

風初入府肌肉蠕動手足牽強面腫能食胃風宜投



胃風湯 <small>二十</small> 七	風初入藏發熱燥煩先用瀉青兼解表裏次用愈風磨	入四白	瀉青丸 <small>二十</small> 八 愈風湯 <small>二十</small> 九 四白丹 <small>三</small> 十	養血豁痰枳鑿不入先其所急不宜並施	養血大秦芎湯 <small>三十</small> 一 當歸地黃湯 <small>三十</small> 二 天麻丸 <small>三十</small> 三	豁痰滌痰湯 <small>三十</small> 四 青州白丸子 <small>三十</small> 五 熱痰竹瀝荆	瀝湯 <small>三十</small> 六 貝母瓜蒌散 <small>三十</small> 七 陰虛夾痰千金地黃	欽定四庫全書 醫門法律	湯 <small>三十</small> 八	心火內蘊膈中如燔涼膈清心功見一班心血內虧恍	惚不寐服二丹丸可以安睡火盛壯水勿辭迂緩水升	火降枯回燥轉	涼膈散 <small>三十</small> 九 清心散 <small>四十</small> 十 二丹丸 <small>四十</small> 一 壯水地黃湯	<small>四十</small> 二	真陽上脫汗多肢冷氣喘痰鳴此屬不治黑錫三建引	陽回宅水土重封虞淵浴日
----------------------------	-----------------------	-----	---	------------------	---	---	---	----------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------	--	------------------------	-----------------------	-------------



黑錫丹

三四十

三建二香湯

四十四

腎水泛痰真陽未脫治以星附十中九活

星附湯

五四十

外風暴發內風易熾熱澀甘寒避居密室毋見可欲毋  
進肥鮮謹調千日重享天年

世傳中風之人每遇外風一發宜進續命湯以禦之  
殊為不然風勢纔定更用續命湯重引風入自添蛇  
足也惟用甘寒藥頻頻熱服俾內不召風外無從入

欽定四庫全書

醫門法律

之路且甘寒一可息風二可補虛三可久服何樂不  
用耶

律五條

凡風初中經絡不行外散反從內奪引邪深入者醫之  
過也

治中風壹如治傷寒不但邪在三陽引入三陰為犯  
大禁即邪在太陽引入陽明少陽亦為犯禁也故風  
初中絡即不可引之入經中經即不可引之入府中



府即不可引之入藏引邪深入釀患無窮乃至多死  
少生可無戒歟

凡治中風自汗證反利其小便者此醫之過也

毋論風中淺深但見自汗則津液外出小便自少若  
更利之使津液下竭則榮衛之氣轉衰無以制風火  
之勢必增其煩熱而真陰日亡也况陽明經利其小  
便尤為犯禁少陰經利其小便必失洩而殺人矣可  
無戒歟

欽定四庫全書

醫門法律

凡治中風病不明經絡府藏徒執方書妄用下法者必  
至傷人醫之罪也

風中經絡只宜宣之使散誤下則風邪乘虛入府入  
藏釀患無窮若夫中藏之候多有平素積虛藏真不  
守者下之立亡不可不慎惟在胃府一證內實便秘  
者間有可下然不過解其煩熱非大下也所謂一氣  
之微汗一旬之微利亦因可用始用之至於子和以  
下立法機要以中藏者宜下為言則指下為定法胡



可訓耶然中藏有緩急二候中府日久熱勢深極停  
入藏者此屬可下必使風與熱俱去填其空竅則風  
不再生若開其瘀壅必反增風勢何以下為哉其卒  
虛身中急證下藥入口其人即不甦矣可無辨歟後  
世以中府之便秘指為中藏見其誤下不致損人益  
信子和機要之法為可用設遇真中藏證下不中病  
難可復追矣

凡治中風四肢不舉證不辨虛實妄行補瀉者醫之過

欽定四庫全書

醫門法律

也

四肢不舉皆屬脾土膏粱太過積食內壅者為脾土  
瘀實宜瀉以開其壅食少體羸怠惰嗜卧者為脾土  
虛衰宜補以健其運若不辨而實者補之虛者瀉之  
寧不傷人乎

凡治外中於風不辨內挾何邪誤執一家方書冀圖弋  
獲其失必多醫之過也

風邪從外入者必驅之使從外出然挾虛者非補虛



則風不出挾火者非清熱則風不出挾氣者非開鬱  
則風不出挾濕者非導濕則風不出挾痰者非豁痰  
則風不出河間東垣丹溪各舉一端以互明其治後  
學不知變通但宗一家為主治倘一病兼此五者成  
方果安在况不治其所有反治其所無寧不傷人乎

附風痺

法一條

岐伯謂中風大法有四一曰偏枯半身不遂二曰風痺  
於身無痛四肢不收三曰風懿奄忽不知人四曰風痺

欽定四庫全書

醫門法律

諸痺類風狀後世祖其說而無其治金匱有古今錄驗  
三方可類推之

經謂內奪而厥則為風痺仲景見成方中有治外感  
風邪兼治內傷不足者有合經意取其三方以示法  
程一則曰古今錄驗續命湯再則曰千金三黃湯三  
則曰近效白朮附子湯前一方治榮衛素虛而風入  
者中一方治虛熱內熾而風入者後一方治風已入  
藏脾腎兩虛兼諸痺類風狀者學者當會仲景意而



於淺深寒熱之間以三隅反矣

古今錄驗續命湯

四十  
五

千金三黃湯

四十  
六

近效白朮附子湯

四十  
七

附風懿

按風懿曰奄忽不知人即該中風卒倒內金匱不重

舉其證意可知矣

附風痺

法七條

中風四證其一曰風痺以諸痺類風狀故名之也然雖

欽定四庫全書

醫門法律

相類實有不同風則陽先受之痺則陰先受之耳致痺

之因曰風曰寒曰濕互相雜合匪可分屬但以風氣勝

者為行痺性善行故也以寒氣勝者為痛痺寒主收急

故也以濕氣勝者為著痺濕主重滯故也

邪之所中五淺五深不可不察在骨則重而不舉在筋

則屈而不伸在肉則不仁在脈則血凝而不流在皮則

寒此五者在軀殼之間皆不痛也其痛者隨血脈上下

寒凝汁沫排分肉而痛雖另名周痺亦隸於血脈之中





也骨痺不已復感於邪內舍於腎筋痺不已復感於邪  
內舍於肝脈痺不已復感於邪內舍於心肌痺不已復  
感於邪內舍於脾皮痺不已復感於邪內舍於肺此五  
者亦非徑入五藏也五藏各有合病久而不去內舍於  
其合也蓋風寒濕三氣雜合牽制非若風之善行易入  
故但類於中風也

經論諸痺至詳然有大闕且無方治金匱補之一曰血  
痺二曰胸痺三曰腎著四曰三焦痺

欽定四庫全書

醫門法律

金匱論血痺謂尊榮人骨弱肌膚盛重困疲勞汗出卧  
不時動搖加被微風遂得之但以脈自微濇在寸口關  
上小緊宜鍼引陽氣令脈和緊去則愈 血痺陰陽俱  
微寸口關上微尺中小緊外證身體不仁如風痺狀黃  
芪桂枝五物湯主之

四十  
九

經但言在脈則血凝而不流金匱直發其所以不流  
之故言血既痺脈自微濇然或寸或關或尺其脈見  
小緊之處即風入之處也故其鍼藥所施皆引風外



出之法也

金匱論胸痺脈證并方治繹明入二卷胸寒痺痛條下此不贅

金匱腎著之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣裏冷濕久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘薑苓朮湯主之十五

經但言骨痺不已復感於邪內舍於腎仲景知濕邪

欽定四庫全書

醫門法律

不能傷腎藏之真不過舍於所合故以身重腰冷等證為言曰飲食如故曰病屬下焦意可知矣然濕土之邪賊傷寒水恐害兩腎所主生氣之源關係尤大故特舉腎著一證立方以開其痺著

金匱復有總治三痺之法今誤編歷節黃汗之下其曰諸肢節疼痛身體魁癩脚腫如脫頭眩短氣遇濕欲吐桂枝芍藥知母湯主之是也一五十一

短氣中焦胸痺之候也屬連頭眩即為上焦痺矣遇



<p>則陽愈不通其痺轉入諸府而成死症者多矣可無</p>	<p>之法則從無有用之者以攻裏之藥皆屬苦寒用之</p>	<p>入在四物四君等藥之內非顯發表明矣至於攻裏</p>	<p>麻黃白芷者以麻黃能通陽氣白芷能行榮衛然已</p>	<p>血脈致身中之陽不通於陰故致痺也古方多有</p>	<p>痺症非不有風然風入在陰分與寒濕互結擾亂其</p>	<p>也</p>	<p>凡治痺症不明其理以風門諸通套藥施之者醫之罪</p>	<p>也</p>	<p>凡治痺症不明其理以風門諸通套藥施之者醫之罪</p>	<p>也</p>	<p>也</p>	<p>也</p>	<p>也</p>	<p>也</p>
<p>欽定四庫全書</p>														
<p>醫門法律</p>														
<p>律一條</p>														
<p>痺症瑣屑不便立法者俱於用方條下發之宜逐方</p>														
<p>細玩</p>														
<p>不可悞施</p>														
<p>治痺諸方不另立門姑附風門之後實與治風不同</p>														
<p>體魁療筋骨痺也榮衛筋骨三焦俱病又立此法以</p>														
<p>治之合四法以觀精微之蘊仲景真百世之師矣</p>														
<p>濕欲吐中焦痺也脚腫如脫下焦痺也肢節疼痛身</p>														



明辯而深戒歟

風門雜法七條

鶴膝風者即風寒濕之痺於膝者也如膝骨日大上下肌肉日枯細者且未可治其膝先養血氣俾肌肉漸榮後治其膝可也此與治左右半身偏枯之證大同夫既偏枯矣急溉其未枯者然後既枯者得以通氣而復榮倘不知從氣引血從血引氣之法但用麻黃防風等散風之套藥鮮有不全枯而速死者故治鶴膝風而亟攻其痺必并其足痿而不用矣比而論之其治法不益明乎

欽定四庫全書

醫門法律

右方治小兒鶴膝風用六味地黄丸加鹿茸牛膝共八味不治其風其意最善蓋小兒非必為風寒濕所痺多因先天所稟腎氣衰薄陰寒凝聚於腰膝而不解從外可知其內也故以六味丸補腎中之水以鹿茸補腎中之火以牛膝引至骨節而壯其裏擷之筋此治本不治標之良法也舉此為例而推之



破傷風之證最難治人之壯盛者隨其外證用表裏中 三法及驅風之藥此無難也人之素弱及老人小兒 或因跌仆去血過多或因瘡口膿水淋漓未合風邪 乘虛深入血分者宜比治血痺之例四物湯中加去 風藥可也其元氣大虛不勝外風昏迷厥逆證屬危 急者先進獨參湯隨進星附湯 <small>四十</small> 驅治虛風可也 其外科及軍中備急諸方皆為壯盛者而設預備以 俟破傷證隨即灌藥故其功效敏捷非方之有奇特	欽定四庫全書 醫門法律	也倘風入既久必難為功矣欲為大醫備急諸藥不 可不蓄 和榮湯 <small>七十</small> 急風散 <small>七十</small> 獨聖散 <small>七十</small> 四	再論半身不遂口眼喎斜頭目眩運痰火熾盛筋骨時 疼乃原於血虛血熱挾痰挾火經絡肌表之間先已 有其病根後因感冒風寒或過嗜醇酒膏粱而助痰 火或惱怒而逆肝氣遂成此證其在於經絡肌表筋 骨之間尚未入於藏府者並以通榮衛為治如和榮
--	----------------	--	---



湯中有補血活血之功不至於滯有健脾燥濕消痰之能不致於燥又清熱運動疎風開經絡通腠理內固根本外散病邪王道劑也多服可以見功

凡治癘風之法以清榮衛為主其汗宜頻發血宜頻刺皆清榮衛之捷法也生蟲由於肺熱其清肅之令不行故由皮毛漸入腠理胃腸莫不有蟲清其金則蟲不驅自熄試觀金風一動旱魃絕蹤其理明矣然清肺亦必先清榮衛蓋榮衛之氣腐而不清傳入于肺

欽定四庫全書

醫門法律

先害其清肅之令故也苦藥雖能瀉肺殺虫亦能傷胃不可久服胃者榮衛從出之源也久服苦寒榮衛轉衰而腐敗壅鬱不可勝言矣所以苦參丸之類榮衛素弱穀食不充之人不宜服也大楓子油最能殺蟲驅風然復過於辛熱風未除而目先壞者多矣其硫黃酒服之必致腦裂之禍又醉仙散入輕粉和未日進三服取其人昏昏若醉毒涎從齒縫中出癘未差而齒先落矣蓋除癘之藥服之近而少癘必不除



服之久且多癘雖除藥之貽害更大惟易老祛風丸	東坡四神丹二方可以久服取效取為法焉 祛風	丸 <small>七十</small> 四神丹 <small>七十</small>	要知脈風成則為癘然人之榮血正行於十二經脈之	中者也用平善之藥生血清熱為主驅風殺蟲為輔	更行汗之刺之之法無不愈者且非極意懲創之人	不可與治以戒色慾禁口腹二者非烈漢不能也	痛風一名白虎歷節風實即痛痺也經既言以寒氣勝	欽定四庫全書	醫門法律	者為痛痺矣又言凡傷於寒者皆為熱病則用藥自	有一定之權衡觀金匱用附子烏頭必用於表散藥	中合桂枝麻黃等藥同用即發表不遠熱之義至攻	裏必遵內經不遠於寒可知矣諸家方中不達此義	即攻裏槩不遠熱獨千金犀角湯一方深有合於經	意特表之為例 犀角湯 <small>七十</small>	更有內熱因血虛熾盛始先表散藥中蚤已不能用	辛熱者即當取夏月治溫熱病之表法為例諸家復
----------------------	----------------------	---	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------	------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------	----------------------	----------------------



<p>無其方獨本事方中有牛旁子散先得我心亦并表 出 牛旁子散 七十</p>				<p>欽定四庫全書</p>				<p>醫門法律卷五</p>
---	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------

醫門法律





欽定四庫全書

子部  
醫門法律卷六

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勛

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣盧 澂

謄錄監生臣鄒世俊



欽定四庫全書

醫門法律卷六

南昌喻昌撰

中風門諸方

侯氏黑散 治大風四肢煩重心中惡寒不足者外

臺治風癩方論見前法中然以菊花為君亦恐

風邪乘虛迸入心藏故也

菊花 分四十 白朮 分十 細辛 分三 茯苓 分三 牡礪 分三 桔梗 分八

欽定四庫全書

醫門法律

防風 分十 人參 分三 礬石 分三 黃芩 分三 當歸 分三 乾薑 分三 芎

藟 分三 桂枝 分三

右十四味杵為散酒服方寸匕日三服初服二

十日用溫酒調服禁一切實肉大蒜常宜冷食

六十日止即藥積在腹中不下也熱食即下矣

冷食自能助藥力

二 風引湯 除熱癰瘤方論見前法中蓋風者外司厥

陰內屬肝木上隸手經下隸足經中見少陽相



<p>火所以風自內發者由火熱而生也風生必害 中土土主四肢土病則四末不用聚液成痰癰 瘰者以風火挾痰注於四支故也觀金匱此方 可見非退火則風必不熄非填竅則風復生風 火一熾則五神無主故其用藥如此之周到也</p>
<p>大黃 乾薑 龍骨 <small>各四兩</small> 桂枝 <small>三兩</small> 甘草 牡蠣 <small>各二兩</small></p>
<p>滑石 石膏 寒水石 赤石脂 白石脂</p>
<p>紫石英 <small>各六兩</small></p>
<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>
<p>右十二味杵麤節以韋囊盛之取三指撮并花 水三升煮三沸溫服一升治大人風引少小驚 癇瘕癰日數十發醫所不療除熱方 巢氏用</p>
<p>此方治脚氣</p>
<p>愈風丹 治諸風證偏正頭痛</p>
<p>防風通聖散四物湯黃連解毒湯各一料加</p>
<p>羌活 細辛 甘菊花 天麻 獨活 薄荷</p>
<p>何首烏 <small>各一兩</small></p>



<p>右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼茶清下不拘時服</p>	<p>按外風與身中之火熱相合以陽從陽必上攻於頭然風火盛榮血必虧故其藥如是也</p>	<p>四 胃風湯 治虛風證能食手足麻木牙關急搐目內蠕睜胃風面腫</p>	<p>升麻 白芷 <small>各一錢二分</small> 麻黃 葛根 <small>各一錢</small> 當歸 蒼朮 甘草 <small>炙</small> 柴胡 羌活 藁本 黃柏 草薺</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>五 菴荳蔻 蔓荊子 <small>各五分</small> 右水二盞薑三片棗一枚煎一盞去滓服</p>	<p>按風入胃中何以反能食蓋風生其熱即內經痺成為消中之理也方中但去其風不去其熱者以熱必隨風外解不必加治耳</p>	<p>五 薏苡仁湯 治中風手足流注疼痛麻痺不仁難以屈伸</p>	<p>薏苡仁 <small>三錢</small> 當歸 芍藥 <small>各一錢二分</small> 麻黃 <small>五分</small> 官桂 <small>五分</small> 蒼朮</p>
---------------------------------	---	---	---	------------------------	--	--	-------------------------------------	--



<p>木 <small>米泔水浸到</small> 炒一錢五分 甘草 一</p>	<p>右水二盞生薑七片煎八分去渣溫服食前下 自汗減麻黃有熱減官桂</p>	<p>按此為風濕相搏關節不利之證故用藥如是 也</p>	<p>六 排風湯 治風虛冷濕邪氣入藏狂言妄語精神錯 亂及五臟風發等證</p>	<p>防風 白朮 當歸 芍藥 肉桂 杏仁 川</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>芎 白蘚皮 甘草 <small>灸各一錢</small> 麻黃 茯苓 獨活 <small>各三</small></p>	<p>右作二服每服水二盞薑三片煎七分去渣服 按虛風冷濕雖已入臟其治法必先宣之使從 外散故用藥如是也</p>	<p>七 人參補氣湯 治手指麻木</p>	<p>人參 黃芪 <small>各二錢</small> 升麻 柴胡 芍藥 生甘草</p>	<p>炙甘草 五味子 <small>各五分</small></p>
--	--	---------------------------------	--	----------------------------	------------------------	--	---	--------------------------	--	-----------------------------------



<p>右水一盞煎至五分食遠臨睡服渣再煎</p>	<p>按諸陽起於指手指麻木風已見端宜亟補其</p>	<p>氣以禦外入之風故用此為綢繆計也</p>	<p>八 舒筋保安散 治左癱右瘓筋脈拘攣身體不遂脚</p>	<p>腿少力乾濕脚氣及濕滯經絡久不能去宣導</p>	<p>諸氣</p>	<p>木瓜<sup>五</sup>兩 葶藶 五靈脂 牛膝<sup>酒</sup>浸續斷 白僵蠶</p>	<p>炒 松節 白芍藥 烏藥 天麻 威靈仙 黃</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>芪 當歸 防風 虎骨<sup>酒炙各一兩</sup></p>	<p>右用無灰酒一斗浸上藥二十七日緊封扎日</p>	<p>足取藥焙乾搗為細末每服二錢用浸藥酒調</p>	<p>下酒盡用米湯調下</p>	<p>按此治風濕搏結於筋脈之間凝滯不散阻遏</p>	<p>九 正氣不得通行故用藥如是也</p>	<p>解風散 治風成寒熱頭目昏眩肢體疼痛手足麻痺上鬲壅滯</p>
-------------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------	---	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------------



人參 <small>兩</small> 麻黃 <small>兩</small> 川芎 獨活 細辛 甘草 <small>各一兩</small>
右為細末每服五錢水盞半生薑五片薄荷葉少許煎八分不拘時服
按風成為寒熱乃風入胃中而釀榮衛之偏勝
第四方胃風湯正驅胃風使從外解之藥此因
風入既久胃氣致虛故以人參為君臣以麻黃
川芎佐以獨活細辛使以甘草而和其榮衛乃
可收其外解之功也若夫久風成為飡泄則風
已入於裏又當用人參為君桂枝白朮為臣茯苓
甘草為佐使而驅其風於內此表裏之權衡
內經之旨要也本方雖用風成寒熱四字漫無
著落今并及之
十 搜風順氣丸 治風燥便秘因致氣閉不行暫時用
之以疎風潤燥順氣殊不可少本方條下過於
誇大謂久服百病皆除老者還少豈理也哉然
又云孕婦勿服如服藥覺臑府微痛以羊肚肺

欽定四庫全書

醫門法律



羹補之則其藥有偏峻不可久服明矣

車前子 一兩

白栴榔

火麻子

微炒

牛膝

酒浸 郁李

仁 湯炮去皮另研

兔絲子

製

乾山藥

各二兩

枳壳

炒 防風

獨活 各一兩

大黃

五錢半生

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九酒

茶米飲任下空心臨卧各一服去腸風宿滯并

腸風下血

一十桂枝湯 治風從外來入客於絡留而不去此方主

欽定四庫全書

醫門法律

之

桂枝 芍藥

甘草

生薑

各三錢

大棗

二枚

右用水盞半微火煎八分溫服須臾啜熱稀粥

以助藥力溫覆令一時許遍身熱熱微似有汗

者益佳詳見尚論太陽上篇

按此方為中風一證羣方之祖不但風中入絡

即中經中府中藏藥中皆當加入本方以風從

外入者究竟必驅從外出故也後人競用續命





湯為加減此方置之不錄未免得流忘源矣又  
況源流俱失者哉

二十小續命湯 治中風不省人事漸覺半身不遂口眼

歪斜手足戰掉語言蹇澀肢體麻痺精神昏亂

頭目眩暈痰火并多筋脈拘急不能屈伸骨節

煩疼不得轉側諸風服之皆驗脚氣緩弱久服

得瘥久病風人每遇天色陰晦節候變易預宜

服之以防啞啞

欽定四庫全書

醫門法律

防風 桂心 黃芩 杏仁去皮尖炒 芍藥 甘草

川芎 麻黃去節 人參各一錢四分 防已二錢 大附子炮七分

右咬咀作二貼每貼水盞半薑五片棗一枚煎

八分服

精神恍惚加茯神遠志 骨節煩疼有熱者去

附子倍芍藥無熱者倍官桂附子 心煩多驚

加犀角 嘔逆腹脹加半夏倍人參 煩躁大

便澀去附子倍芍藥加竹瀝 葶寒下利去防



已黃芩倍附子加白朮 自汗去麻黃杏仁加	白朮 脚膝弱加牛膝石斛 身痛加秦艽	腰痛加桃仁杜仲 <small>薑汁炒</small> 失音加杏仁	按此方無分經絡不辨虛實寒熱若不細辨加	減難以取效今并錄易老六經加減法為例用	方者師其意焉可矣	易老六經加減法	麻黃續命湯治中風無汗惡寒本方中麻黃杏	仁防風各加一倍	桂枝續命湯治中風有汗惡風本方中桂枝芍	藥杏仁各加一倍二證皆太陽經中風也	白虎續命湯治中風有汗身熱不惡寒本方中	加知母石膏各一錢四分去附子	葛根續命湯治中風身熱有汗不惡風本方中	加葛根桂枝黃芩各一倍二證皆陽明經中風	也
--------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------	----------	---------	--------------------	---------	--------------------	------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	---

欽定四庫全書

醫門法律



<p>附子續命湯治中風無汗身涼本方中加附子 一倍乾薑甘草各一錢此證乃太陰經中風也</p>	<p>桂附續命湯治中風有汗無熱本方中加桂枝 附子甘草各一倍此少陰經中風也</p>	<p>羌活連翹續命湯中風六證混淆繫之於少陽 厥陰或肢節攣痛或麻木不仁本方中加羌活 連翹各一錢半</p>	<p>三十一 防風通聖散 治諸風潮搐手足痲癱小兒急驚風</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>大便結邪熱暴甚肌肉蠕動一切風症</p>	<p>防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 芒硝 連</p>	<p>翹 薄荷 麻黃 山梔子 石膏 桔梗 黃</p>	<p>芩 白朮 荆芥 甘草 滑石 各五分</p>	<p>右水二盞薑三片煎至八分服涎嗽加半夏生</p>	<p>薑製開結加大黃二錢破傷風加羌活全蝎各</p>	<p>五分腰脇痛加芒硝當歸各一錢</p>	<p>按此方乃表裏通治之輕劑用川芎當歸芍藥</p>
--	--	---	-------------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------



<p>白朮以和血益脾所以汗不傷表下不傷裏可                  多服也</p>	<p>四十                  祛風至寶膏 治諸風熱</p>	<p>防風 半二兩                  白朮 半一兩                  芍藥 半二兩                  芒硝 錢五                  石膏 兩一                  滑</p>	<p>石 三兩                  當歸 半二兩                  黃芩 兩一                  甘草 兩二                  大黃 錢五                  連翹 錢五                  川</p>	<p>芎 半二兩                  麻黃 去節 錢五                  天麻 兩一                  荆芥 錢五                  山梔子 錢五                  熟</p>	<p>地黃 兩一                  黃柏 錢五                  桔梗 兩一                  薄荷 錢五                  羌活 兩一                  人參 兩一                  全</p>	<p>蝎 錢五                  細辛 錢五                  黃連 錢五                  獨活 兩一</p>	<p>欽定四庫全書                  醫門法律</p>	<p>右為細末煉蜜丸彈子大每服一丸細嚼茶酒                  任下臨卧服</p>	<p>按此方亦表裏通治即前防風通聖散十七味                  更加熟地黃益血人參益氣黃柏黃連除熱羌</p>	<p>活獨活天麻全蝎細辛去風乃中風門中不可                  移易之顛方又非前通套泛用之方比也</p>	<p>五十                  不換金丹 退風散熱治中風口喎</p>	<p>荆芥穗 僵蠶 天麻 甘草 羌活 川芎</p>
--	---	--	--	---	--	--	---	--	---	---	---	---------------------------



<p>白附子 烏頭 蝎梢 藿香葉 <small>各半</small> 薄荷葉 <small>三兩</small></p>	<p>防風 <small>一兩</small></p> <p>右為末煉蜜丸彈子大每服一丸細嚼茶酒任下塗噎處亦可</p>	<p>按此方祛風之力頗大至清火散熱殊未必然大勢風而挾寒痰氣窒閉者宜之</p>	<p>六三化湯 治中風外有六經之形證先以加減續命湯主之內有便溺之阻隔此方主之</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p> <p>厚朴 大黃 枳實 羌活 <small>各等分</small></p> <p>每服一兩水煎</p>	<p>按此乃攻裏之峻劑非堅實之體不可輕服蓋傷寒證胃熱腸枯不得不用大承氣以開其結</p>	<p>然且先之以小承氣調胃承氣恐誤用不當即傷人也在中風證多有虛氣上逆關隘阻閉之</p>	<p>候斷無用大承氣之理古方取藥積腹中不下以漸填其空竅俾內風自熄奈何今人每開竅</p>
--	---	--	--	--	---	---	---



以出其風究竟竅空而風愈熾長此安窮也哉 十攝生飲調蘇合丸 治一切卒中不論中風中寒中
暑中濕中氣及痰厥飲厥之類初作皆可用此 先以皂角去皮弦細辛生南星半夏為末吹入
鼻中俟其噴嚏即進前藥牙禁者中指點南星 半夏細辛末并烏梅肉頻搽自開
天南星 <small>圓白者濕紙裏煨</small> 南木香 蒼朮 細辛 甘草
生用 石菖蒲 <small>各一錢</small> 半夏 <small>百沸湯炮少頃一錢半</small>
欽定四庫全書 醫門法律 右件剉散分二服水一盞半生薑七厚片煎取其半乘熱調蘇合香丸半丸灌下痰盛者加全蝎二枚炙
按此方治卒中氣閉痰迷不得不用之劑但正氣素虛之人不能當腦麝及細辛摧枯拉朽之勢裁節而用十之二三可也其牛黃清心丸與蘇合丸異治熱阻關竅可用牛黃丸開之寒阻關竅可用蘇合丸開之其口開手撒遺尿等死



症急用人參附子峻補間有得生者若牛黃蘇  
合之藥入口即斃此無異以千鈞鎮一絲也

十  
烏藥順氣散 治風氣攻注四肢骨節疼痛遍身頑

麻及療癱瘓語言蹇澀脚氣步履多艱手足不

遂先宜多服此藥以疎氣逆然後隨證投以風

藥

麻黃去節 陳皮去木 白烏藥二兩 白僵蠶炒去嘴 川芎

白芷 甘草炙 枳殼炒 桔梗各一兩 乾薑炮五錢

欽定四庫全書

醫門法律

右為末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎憎

寒壯熱頭痛身體倦怠加蔥白三寸煎併服出

汗或身體不能屈伸溫酒調服

按中風證多挾中氣不但卒中急證為然凡是

中風證皆有之嚴用和云人之元氣強壯榮衛

和平腠理緻密外邪焉能為害或因七情飲食

勞役致真氣先虛榮衛空疎邪氣乘虛而入故

致此疾若內因七情而得者法當調氣不當治



<p>人參 五分 烏藥 半錢 紫蘇 各三 木瓜 各三</p>	<p>白朮 二錢 天麻 五分 沉香 白芷 青皮 甘草 各三分</p>	<p>此</p>	<p>九<sup>十</sup>勻氣散 治中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜服</p>	<p>已見也</p>	<p>頭痛鼻塞聲重尚為合宜故知論方不可橫以</p>	<p>梗厚朴白芷甘草白朮麻黃更加葛根治感風</p>	<p>藥也和劑合兩方取用乾薑人參川芎陳皮桔</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>吹毛責備詎知白芷香而不燥正和榮衛之善</p>	<p>人反惜其說有未備且謂方中不當雜入白芷</p>	<p>枳桔僵蠶等風藥正先治氣後治風之妙旨後</p>	<p>共八味為劑較前局方烏藥順氣散不用麻黃</p>	<p>草陳皮六君子湯中用其五加烏藥青皮白芷</p>	<p>理甚當其用八味順氣散乃人參白朮茯苓甘</p>	<p>氣治之此良法也宜八味順氣散嚴氏此說於</p>	<p>風外因六淫而得者亦當先調氣後依所感六</p>
--	--	----------	--	------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------





右水二盞薑三片煎八分服風氣腰痛亦宜服之

按勻氣之說甚長身內之氣有通無壅外風自不能久居而易於解散故知勻氣即調氣之旨

非有兩也

二十  
一 稀涎散 治風涎不下喉中作聲狀如牽鋸或中

濕腫滿

半夏

大者十  
四枚

猪牙皂角

一箇  
炙

欽定四庫全書

醫門法律

右咀作一服水二盞煎一盞入生薑自然汁少

許服不能嚥者徐徐灌之

按此以半夏治痰涎牙皂治風比而成方蓋因

其無形之風挾有形之涎膠結不解用此二物

俾涎散而風出也其有涎多難散又非小吐不

可則用明礬合牙皂等分為末白湯調服吐之或

用蘿蔔子合牙皂等分為末煎服半盞吐之其

風多涎少人事不昏則用蝦半斤入醬蔥薑等



料物水煮先喫蝦次喫汁後以鵝翎探引吐之  
活法在心無施不當也

二十 加味六君子湯 治四肢不舉屬於脾土虛衰者

須用如顛治其本不可加入風藥

人參 白朮 茯苓 甘草 陳橘皮 半夏 各一

錢 加竹瀝 半小 麥冬 三錢

右用水二盞薑三片棗二枚煎六分溫服口渴  
去半夏加葳蕤石膏虛甚不熱者加附子

欽定四庫全書

醫門法律

按中風門中從不錄用此方所謂治未而忘其  
本也夫風淫末疾四肢不舉乃風淫於內虛者  
多實者少審其果虛則以六君子加甘寒藥如  
竹瀝麥冬之屬允為治虛風之儀式也

二十 三化湯 見第十六方

按經謂土太過則令人四肢不舉此真膏粱之  
疾非肝腎經虛之比其治瀉令氣弱陽虛土平  
斯愈而用三化湯及調胃承氣湯然土實之證



十不見一非審諦無忒未可嘗試也

二十  
三聖散 治中風手足拘攣口眼喎斜脚氣行步

不正

當歸

酒洗

玄胡索

微炒

肉桂

去粗皮

右為末每服二錢空心溫酒調下

按此方治血虛風入之顛劑也故取以治口眼

喎斜之左急右緩者然血藥中而加地黃白芍

秦艽杜仲牛膝風藥中而加天麻防風羌活白

欽定四庫全書

醫門法律

芷細辛或加獨活以去腎間風加葶藶以除下

焦熱又在隨證酌量矣

勻氣散 見第十九

取其方以治口眼喎斜之右急左緩者然倍用

生熟甘草加苡仁以緩其急加麥冬葳蕤竹瀝

以熄其風得效去白芷蘇葉可常服也

二十

轉舌膏 治中風癱瘓舌蹇不語

用涼膈散加菖蒲遠志各等分蜜丸彈子大硃



<p>砂為衣薄荷湯化下臨卧或食後服 涼膈散 見第三十八方</p>	<p>按此乃治心經蘊熱之方也</p>	<p>三十 五 正舌散 治中風舌木強難轉語不正 蝎梢 <small>去毒二 十七箇</small> 茯苓 <small>一 兩</small></p>	<p>右為細末每服一錢食前溫酒調服又擦牙更 效</p>	<p>按此乃治風涎壅塞之方也</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>二十 六 資壽解語湯 治中風脾緩舌強不語半身不遂 防風 附子 <small>炮</small> 天麻 酸棗仁 <small>各一 錢</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 官 桂 <small>各八 分</small> 羌活 甘草 <small>各五 分</small></p>	<p>右水二盞煎八分入竹瀝二匙薑汁二滴食遠 服</p>	<p>按此方乃治風入脾蔽舌強不語之證至於少 陰脈縈舌本腎虛風入舌不能言喫緊之後古</p>	<p>今從無一方及之昌每用此方去羌防加熟地</p>
--------------------------------------	--------------------	---	---------------------------------	--------------------	------------------------	--	---------------------------------	--	---------------------------



何首烏枸杞子甘菊花胡麻仁天門冬治之獲

効今特識於此方之下聽臨病之工酌用焉

後檢

宣明方有地黄飲子治腎虛氣厥  
厥至舌下先得我心補錄於四十

胃風湯 見第四方 治虛風證能食手足麻木牙

關急搐目內蠕睨胃風面腫

按虛風入胃反能食者乃風入而助其胃之火

熱故比平常食加進也此去癰成為消中不遠

此方但治其風不治其火熱殊不合內經之旨

欽定四庫全書

醫門法律

必於竹瀝麥冬花粉葳蕤石膏生地梨汁甘寒

藥中加入升麻葛根甘草為劑始克有當况風

既入胃內經述其五變曰厥顛曰寒熱曰消中

曰飡泄曰癘風隨人之寒熱或上或下變病若

此其可畏奈何不習不察徒欲檢方而治病耶

有志於醫者自為深造無寄後人籬下可矣

二十  
七

瀉青丸 治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安

卧此是風熱燥煩之故也



當歸 川芎 梔子 羌活 大黃 防風 龍膽草 各等分	右為末蜜丸彈子大每服一九竹葉湯化下	按此方以瀉青為名者乃瀉東方甲乙之義也	風入厥陰風木之藏同氣相求其勢必盛所慮	者虛而眩運熱而燥煩虛也熱也其可以為壯	實而輕瀉之乎審果壯實乃可施此審屬虛熱	必以四物湯全方加人參竹瀝秦艽羌活八味	欽定四庫全書	醫門法律	為劑始合法度也	二十	愈風湯 初覺風動服此不致倒仆此乃治未病	之聖藥也又治中風證內邪已除外邪已盡當	服此藥以行導諸經久服大風悉去縱有微邪	只從此藥加減治之然治病之法不可失於通	塞或一氣之微汗或一旬之通利如此乃常服	之藥也久則清濁自分榮衛自和矣	羌活 甘草 防風 當歸 蔓荊子 川芎
---------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------	------	---------	----	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------



細辛 黃芪 枳壳 人參 麻黃 白芷 甘	菊 薄荷 枸杞子 知母 地骨皮 獨活	秦艽 黃芩 芍藥 蒼朮 生地黄 <small>各四兩</small> 肉桂	一兩	右咀每服一兩水二盞生薑三片空心煎服臨	卧煎滓服空心一服吞下二丹丸謂之重劑臨	卧一服吞下四白丹丸謂之輕劑 假令一氣	之微汗用愈風湯三兩加麻黃一兩作四服加	欽定四庫全書 醫門法律	薑空心服以粥投之得微汗則住如一旬之通	利用愈風湯三兩加大黃一兩亦作四劑如前	臨卧服得利為度此藥嘗服之不可失四時之	輔	春將至大寒後本方加半夏人參柴胡謂迎而	奪少陽之氣也	夏將至穀雨後本方加石膏黃芩知母謂迎而	奪陽明之氣也
---------------------	--------------------	---------------------------------------	----	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--------------------	--------	--------------------	--------



季夏之月本方加防己白朮茯苓謂勝脾之濕也

秋將至大暑後本方加厚朴藿香肉桂謂迎而奪太陰之氣也

冬將至霜降後本方加附子宮桂當歸謂勝少陰之氣也此藥四時加減臨病酌宜誠治風證之聖藥也

欽定四庫全書

醫門法律

按此一方相傳謂是愈風之聖藥後人見其種種敷陳次第有法駭以為竒而深信不疑及用之治病百無一愈蓋似是而非昌不得不為辨之其云初覺風動服此不致倒仆此乃治未病之聖藥也夫覺風勢初動不服端本澄原之藥以固護其榮衛反服風藥而招風取中以漢武之虛耗稱為成周之上理其誰欺乎又云內邪已除外邪已盡當服此以行導諸經久服大風悉去夫既內邪除外邪盡廣服補益以養其正





可也豈有久服此藥之理耶豈舍內邪外邪別 有大風當去耶何其自呈缺漏耶至於一旬通 利以本方一劑加大黃二錢或可若夫一氣微 汗計本藥分七十二劑每劑已用麻黃四分零 而此四劑中各加二錢五分如此重劑豈微汗 之劑耶方中發汗之藥已複用至十二味矣必 更重加麻黃始為微汗者何耶仲景用桂枝湯 解表恐其力輕故啜熱稀粥以繼之用麻黃湯 恐其力重多致亡陽多方回護豈有反投熱粥 之理後人無識奉此為第一靈寶寧知其驕矜 自用欺已欺人也哉		二十 九	四白丹 清肺氣養魄中風多昏冒緣氣不清利 也	白朮 白茯苓 人參 宿砂 香附 甘草	防風 川芎 各五錢 白芷 一兩 白檀香 一錢 知母 二錢 羌	活 薄荷 獨活 各二錢 細辛 二錢 麝香 牛黃 龍
--	--	---------	--------------------------	--------------------	--------------------------------	---------------------------

欽定四庫全書

醫門法律



腦各五分  
俱另研藿香錢甜竹葉

右為細末煉蜜為丸每兩作十丸臨睡嚼一丸  
煎愈風湯送下上清肺氣下強骨髓

按此方頗能清肺養魄方中牛黃可用而腦麝  
在所不取以其耗散真氣治虛風大非所宜然  
本方以四君子湯作主用之不為大害今更定  
牛黃仍用五分龍腦麝香各用二分取其所長  
節其所短庶幾可也其他犯腦麝諸方一概不

欽定四庫全書

醫門法律

錄如牛黃清心丸四君子藥中甘草加至四倍  
其意亦善仿此為例腦麝裁酌用十之二足可  
備清心寧神之用其粵中蠟丸腦麝原少且經  
久蓄品味和合用時仍濃煎甘草湯調服為善  
方不贅

十三  
大秦芫湯 治中風外無六經之形證內無便溺之

阻隔知血弱不能養筋故手足不能運動舌強  
不能言語宜養血而筋自柔



秦艽 石膏 <small>各一錢</small> 甘草 川芎 當歸 芍藥
羌活 獨活 防風 黃芩 白芷 生地黄
熟地黄 白朮 茯苓 <small>各七分</small> 細辛 <small>五分</small> 春夏加知
母一錢
右水二盞煎如遇天陰加薑七片心下痞加枳
實五分
按此方既云養血而筋自柔何得多用風燥之
藥既欲靜以養血何得用風以動之是其方與
欽定四庫全書 醫門法律
言悖矣偶論三化湯愈風湯及大秦艽湯三方
為似是而非及查三方皆出機要方中云是通
真子所撰不知其姓名然則無名下士燭亂後
人見聞非所謂一盲引衆盲耶業醫者當深入
理要自具隻眼可矣
一三十 養血當歸地黄湯
當歸 地黄 川芎 芍藥 藁本 防風 白
芷 <small>各一分</small> 細辛 <small>五分</small>



右水二盞煎一盞通口食前溫服

按此出拔萃方中用血藥風藥各四味半潤半

燥亦不善於立方者矣即謂治本不可忘標四

物湯中加風藥一味足矣因以此藥遍索諸方

適良方中有六合湯一方治風虛眩暈先得我

心用四物各一兩秦艽羌活各半兩雖用風藥

二味其分兩則仍一味也舉此為例方不重贅

三十  
二 天麻丸 治風因熱而生熱盛則動宜以靜勝其

欽定四庫全書

醫門法律

燥是養血也此藥行榮衛壯筋骨

天麻

牛膝

二味用酒同浸  
三日焙乾用

草薺

玄參

各四兩杜

仲

炒去絲  
七兩

附子

炮一兩

羌活

四兩

當歸

十兩

生地黄

一兩

方有獨活四兩去腎間風

右為細末煉蜜丸梧桐子大每服五七十九空

心溫酒或白湯下良久進食服藥半月後覺塞

壅以七宣丸疎之

按此方大意主治腎熱生風其以天麻入牛膝



<p>同製取其下達倍用當歸地黃生其陰血葶藶          玄參清下焦之濕熱附子補下焦之真陽蓋惟          腎中陽虛故風得以久據其地也用羌活之獨          本者即真獨活不必更加也吁嗟多慾之人兩          腎空虛有如烏風洞慘慘黯黯漫無止息環視          風門諸藥有一能勝其病者乎此方雜在羣方          內未易測識特表而出之</p>	<p>三十          滌痰湯 治中風痰迷心竅舌強口不能言</p>	<p>欽定四庫全書          醫門法律</p>	<p>南星 <small>薑 煮</small> 半夏 <small>炮 七次</small> 枳實 <small>一錢</small> 白茯苓 <small>一錢</small> 橘紅 <small>一錢</small></p>	<p>石菖蒲 <small>八分</small> 人參 <small>各七分</small> 竹茹 <small>各七分</small> 甘草 <small>五分</small></p>	<p>右水二盞生薑五片煎八分食前服</p>	<p>按此證最急此藥最緩未免有兩不相當之弊</p>	<p>審其屬熱此方調下牛黃清心丸審其屬虛此</p>	<p>方調下二丹丸庶足以開痰通竅也</p>	<p>三十          青州白丸子 治男子婦人手足癱瘓風痰壅盛          嘔吐涎沫及小兒驚風并治</p>
---	--	---------------------------------	---	---	-----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	---



<p>白附子 <small>二兩</small> 半夏 <small>七兩</small> 水浸南星 <small>二兩</small> 川烏 <small>去皮</small></p>
<p>右羅為末生絹袋盛於井花水內擺出粉未出者以手揉令出查再搗再擺以盡為度用磁盆</p>
<p>日中曝夜露每日一換新水攪而後澄春五夏三秋七冬十日去水曬乾如玉片以糯米粉作</p>
<p>稀糊丸如菘豆大每服二十九丸生薑湯下無時如癱瘓酒下小兒驚風薄荷湯下三五丸</p>
<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>
<p>按此方治風痰之上藥也然藥味雖經製煉溫性猶存熱痰迷竅非所宜施</p>
<p>三十 竹瀝湯 治四肢不收心神恍惚不知人事口不能言</p>
<p>竹瀝 <small>二升</small> 生葛汁 <small>二升</small> 生薑汁 <small>二合</small></p>
<p>右三汁和勻分溫三服</p>
<p>按人身之積痰積熱常招致外風結為一家令人心神恍惚如邪所憑實非邪也消風清熱開</p>



<p>三十 痰其神自安此方可頻服也</p>	<p>三十 貝母瓜蒌散 治肥人中風口眼喎斜手足麻木 左右俱作痰治</p>	<p>貝母 瓜蒌 南星<small>炮</small> 荆芥 防風 羌活 黃</p>	<p>藥 黃芩 黃連 白朮 陳皮 半夏<small>湯炮七次薄</small></p>	<p>荷 甘草<small>炙</small> 威靈仙 天花粉<small>各等分</small></p>	<p>右每服水二盞薑三片煎八分至夜服</p>	<p>按中風證多挾熱痰而肥人復素有熱痰不論</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>左右俱作痰治誠為當矣但肥人多虛風瘦人多實火虛風宜用甘寒一派如竹瀝人參麥冬生地生葛汁生梨汁鮮淡竹葉汁石膏瓜蒌葳蕤胡麻仁等藥此方三黃並用治瘦人實火或可治肥人虛風甚不宜也至泛論治熱痰之藥諸方中又惟此足擅其長存之以備實火生風生痰之選</p>	<p>三十 千金地黃湯 治熱風心煩及脾胃熱壅食不下</p>
---------------------------	--	--	---	---	------------------------	---------------------------	------------------------	---	-----------------------------------



生地黄汁 枸杞子汁 <small>各五升</small> 真酥 生薑汁 <small>各一升</small>	荆瀝 竹瀝 <small>各五升</small> 人參 <small>八兩</small> 白茯苓 <small>六兩</small> 天門冬 <small>八兩</small> 大	黃 梔子 <small>各四兩</small>	右十一味以後五味為細末先煎地黄等汁內末藥調服方寸匙再漸加服以利為度	按此方補虛清熱潤燥滌痰除風開通瘀塞美善具備誠足貴也因養血豁痰難於兩用姑舉此方為例以聽臨症酌量又四肢不舉脾土屬	欽定四庫全書 醫門法律	虛屬實分途異治苟其虛實不甚相懸此方更在所必用法無窮盡人存政舉未易言耳	三十 涼膈散 治心火上盛膈熱有餘目赤頭眩口瘡	唇裂吐衄涎嗽稠粘二便淋閉胃熱發斑小兒驚急潮搐瘡疹黑陷大人諸風癱瘓手足掣搦筋攣疼痛	連翹 梔子仁 薄荷 大黃 芒硝 甘草	黃芩
--	---	-------------------------	-----------------------------------	--	----------------	------------------------------------	---------------------------	--	--------------------	----





右水二盞棗一枚蔥一根煎八分食遠服  
九十  
清心散即涼膈散加黃連

右水盞半加竹葉十片煎八分去渣入蜜少許  
溫服頭痛加川芎防風石膏

按中風證大勢風木合君相二火主病多顯膈

熱之證古方用涼膈散最多不但二方已也如

轉舌膏用涼膈散加菖蒲遠志如活命金丹用

涼膈散加青黛藍根蓋風火之勢上炎胸膈正

欽定四庫全書

醫門法律

燎原之地所以清心寧神轉舌活命涼膈之功

居多不可以宣通腸胃之法輕訾之也

十四  
地黃飲子宣明方 治舌瘖不能言足癢不能用腎

虛弱其氣厥不至舌下

熟地黃 巴戟去心 山茱萸 肉蓯蓉酒浸 石斛

附子炮 五味子 白茯苓 菖蒲 遠志去骨 官桂

麥冬各等分

右為末每服三錢生薑五片棗一枚薄荷七葉



水一盞半煎八分服無時

按腎氣厥不至舌下乃藏真之氣不上榮於舌  
本耳至其濁陰之氣必橫格於喉舌之間吞咯  
維艱昏迷特甚又非如不言之證可以緩調方  
中所用附桂巴菝原為驅逐濁陰而設用方者  
不可執已見而輕去之也

一四  
十

三因白散子 治肝腎中風涎潮壅塞不語嘔吐

痰沫頭目眩暈兼治陰症傷寒六脈沉伏及霍

欽定四庫全書

醫門法律

亂吐瀉小便淋漓不通

大附子

去皮  
臍生

滑石

桂府者  
各五錢

製半夏

七錢  
半

右為末每服二錢水二盞薑七片蜜半匙煎七

分空心冷服

按此方甚超但不明言其所以然且引兼治陰  
症傷寒霍亂吐瀉等證為言轉覺泛而不精矣  
蓋此即上條昌所論濁陰上逆之證緣肝腎之  
氣厥逆而上是以涎潮壅塞舌瘖不語痰沫吐



咯難出頭目重眩故非附子不能驅其濁陰然  
濁陰走下竅者也濁陰既上逆其下竅必不通  
故用滑石之重引濁陰仍順走前陰之竅亦因  
附子雄入之勢而利導之也更慮濁陰遇胸中  
之濕痰兩相留戀再加半夏以開其痰庶涎沫  
與濁陰俱下方中具有如此之妙義而不明言  
以教後人殊可惜也

四十  
二丹丸 治風邪健忘養神定志和血內安心神

欽定四庫全書

醫門法律

外華腠理得睡

丹參 熟地黄 天門冬 去心各兩半 硃砂 人參

菖蒲 遠志 各五錢 茯神 麥門冬 甘草 各一兩

右為細末煉蜜為丸桐子大每服五十九至一  
百丸空心食前服

按中風證心神一虛百骸無主風邪擾亂莫繇  
驅之使出此方安神益虛養血清熱息風服之  
安睡功見一斑矣相傳用愈風湯吞下殊失用



方之意

四十

豨薟丸

治肝腎風氣四肢麻痺骨痛膝弱風濕

諸瘡

右以豨薟草五月五日六月六日採葉九蒸九

曝凡蒸用酒蜜酒晒乾為末蜜丸桐子大空心

酒下百丸

按豨者猪也其畜屬亥乃風木所生之始故取

用其葉以治風凡腎藏生風之證服此其效最

欽定四庫全書

醫門法律

著江寧節度使成訥知益州張詠兩以方藥進

獻至尊訥以弟訢中風伏枕五年一道人傳此

方服之愈詠以掘地得碑製服千服髭鬚烏黑

筋力輕健見都押衙羅守一中風墜馬失音不

語與藥十服其病立瘥又和尚智嚴年七十或

患偏風口眼喎斜時時吐涎與十服亦便得瘥

古今用此獲效者最多然莫知其所以然也其

妙處全在氣味之豨劣與腎中之腥臊同氣相



求故能入腎而助其驅逐陰風之力也因治腎  
風之方百不得一特錄此丸合前天麻丸兩發  
其義也

四十四

黑錫丹 治真元虛憊陽氣不固陰氣逆沖三焦

不和冷氣刺痛飲食無味腰背沉重膀胱久冷

夜多小便女人血海久冷赤白帶下及陰證陰

毒四肢厥冷不省人事急用棗湯吞一百粒即

便回陽此藥大能升降陰陽補虛益元墜痰除

欽定四庫全書

醫門法律

濕破癖

沉香 葫蘆巴 酒浸炒 附子 炮 陽起石 研細水飛 肉

桂 兩半 破故紙 舶茴香 肉豆蔻 麪裹 木香 金

鈴子 蒸去皮核 硫黃 黑錫 去滓秤 各一兩 各二兩

右用黑盞或鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子

地上出火毒研令極細餘藥並細末和勻自朝

至暮以研至黑光色為度酒糊丸如梧子大陰

乾入布袋內擦令光瑩每四十九丸空心鹽薑湯



或棗湯下女人艾葉棗湯下急症用百丸
按此方用黑錫水之精硫黃火之精二味結成
靈砂為君諸香燥純陽之藥為臣用金鈴子苦
寒一味為反佐用沉香引入至陰之分為使凡
遇陰火逆沖真陽暴脫氣喘痰鳴之急症舍此
藥再無他法可施昌每用小囊佩帶隨身恐遇
急症不及取藥且欲以吾身元氣溫養其藥藉
手效靈厥功歷歷可紀即如小兒佈痘與此藥
欽定四庫全書
醫門法律
迴無相涉然每有攻之太過如用蜈蚣穿山甲
桑蠶之類其痘雖勃然而起然頭面遍身腫如
瓜匏瘡形濕爛難乾乃至真陽上越氣喘痰鳴
兒醫撒手駭去昌投此丸領其陽氣下入陰中
旋以大劑地黃湯峻補其陰以留戀夫真陽肌
膚之熱反清腫反消濕爛反乾而成厚靨如此
而全活者不知凡幾因附本方項下以廣用方
者之識



五十四

三建二香湯 治男婦中風六脈俱虛舌強不語痰

涎壅盛精神如癡手足偏廢此等不可攻風只

可補虛

天雄 附子

烏頭

各二錢俱去  
皮臍生用

沉香

木香

各一

錢俱水  
磨汁

右作二服每服水盞半薑十片煎七分食前服

按此方天雄附子烏頭同時並用其生者不加

炮製惟恐縛孟貴之手莫能展其全力耳必因

欽定四庫全書

醫門法律

其人陰邪暴甚埋沒微陽故用此純陽無陰一

門三將領以二香直透重圍驅逐極盛之陰拯

救將絕之陽此等大關雖有其方能用者罕方

下妄云治中風六脈俱虛又云不可攻風只可

補虛全是夢中說夢誤人最大當知此證其脈

必微而欲絕不可以虛之一字漫無著落者言

脈其方更猛悍毒厲不可以補虛二字和平無

偏者言方此方書所為以盲引盲耶



六十四  
星附散 治中風能言口不歪而手足躡曳者

南星 半夏各 茯苓 僵蠶炒 川烏去皮 人參

黑附子 白附子各八分

右水二盞煎八分食遠熱服得汗愈

按此方乃治虛風寒痰之主藥也風虛則熾痰

寒則壅阻遏脾中陽氣不得周行故手足為之

躡曳用此方熱服以助脾中之陽俾虛風寒痰

不相互結乃至得汗則風從外出痰從下出分

欽定四庫全書

醫門法律

解而病愈矣凡用附子藥多取溫冷謂熱因寒

用也此用烏頭附子人參一派溫補絕無發散

之藥向非加以熱服亦胡繇而得汗耶敬服敬

服

七十四  
古今錄驗續命湯 治中風癱身體不能自收口

不能言冒昧不知痛處或拘急不得轉側

麻黃 桂枝 當歸 人參 石膏 乾薑 甘

草各三兩 芎藭 杏仁四十枚





<p>右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗</p>	<p>薄覆脊憑几坐汗出則愈不汗更服無所禁勿</p>	<p>當風并治但伏不得卧咳逆上氣面目浮腫</p>	<p>按此合後三方金匱取用之意已發之於本條</p>	<p>下今細玩此方細詳其證乃知痲即痺之別名</p>	<p>也風入而痺其榮衛即身體不能自收口不能</p>	<p>言冒昧不知痛處或拘急不能轉側也然榮衛</p>	<p>有虛有實虛者自內傷得之實者自外感得之</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>此方則治外感之痺其榮衛者故以得小汗為</p>	<p>貴然已變越婢之制而加芎歸養血人參益氣</p>	<p>矣其內傷而致榮衛之痺者於補氣血藥中略</p>	<p>加散風藥為制更可知矣</p>	<p>八 十 千金三黃湯 治中風手足拘急百節疼痛煩熱</p>	<p>心亂惡寒經日不欲飲食</p>	<p>麻黃<small>分五</small>獨活<small>分四</small>細辛<small>分二</small>黃芪<small>分二</small>黃芩<small>分三</small></p>	<p>右五味以水六升煮取二升分溫三服一服小</p>
---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------	--	-------------------	--	---------------------------



<p>汗二服大汗心熱加大黃二分腹滿加枳實一枚氣逆加人參三分悸加牡蠣三分渴加括萎根三分先有寒加附子一枚 分字當作去聲讀</p>	<p>按此方治風入榮衛肢節之間擾亂既久證顯煩熱惡寒不食邪盛正虛可知其用麻黃為君以麻黃能通陽氣而開痺也故痺非得汗不開然內虛當慮須用參芪以佐之而虛復有寒熱</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>之不同虛熱則用黃芩虛寒則加附子此仲景所以深取之也</p>	<p>九十 近效白朮附子湯 治風虛頭重眩苦極不知食</p>	<p>味暖肌補中益精氣</p>	<p>白朮 二兩 附子 一枚半炮 去皮臍 甘草 一兩 炙</p>	<p>右三味剉每五錢匕薑五片棗一枚水盞半煎七分去滓服</p>	<p>按此方治腎氣空虛之人外風入腎恰似烏洞</p>
--	---	------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	--	--------------------------------	---------------------------



<p>之中陰風慘慘晝夜不息風挾腎中濁陰之氣厥逆上攻其頭間重眩之苦至極難耐兼以胃氣亦虛不知食味故方中全不用風門藥但用附子暖其水葳白朮甘草暖其土葳水土一暖則濁陰之氣盡趨於下而頭苦重眩及不知食味之證除矣試觀冬月井中水暖土中氣暖其陰濁之氣且不能出於地豈更能加於天乎製方之義可謂精矣此所以用之而獲近效耶</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>十五 史國公浸酒方 治諸風五痺左癱右瘓口眼喎斜四肢疼痛七十二般風二十四般氣其效不可盡述</p>	<p>當歸 虎脛骨<small>酥油</small> 川羌活 川葶藶 防風<small>各二</small></p>	<p>兩 秦艽<small>四兩</small> 龍甲<small>一兩</small> 川牛膝<small>酒浸</small> 松節 晚蠶砂<small>各炒</small></p>	<p>二 枸杞子<small>五兩</small> 乾茄根<small>八兩</small> 蒼耳子<small>四兩</small></p>	<p>右十三味用無灰酒一大罈將絹袋盛藥懸於酒內密封固候十四日後開罈取酒取時不可</p>
--	------------------------	--	--	---	---	---



痺證諸方

欽定四庫全書

醫門法律

一五

三痺湯 治血氣凝滯手足拘攣風寒濕三痺

人參 黃芪 當歸 川芎 白芍藥 生地黄

杜仲 薑汁炒 川續斷 防風 桂心 細辛 白

茯苓 秦艽 川牛膝 川獨活 甘草 各等分

右水三盞生薑三片棗一枚煎五分不拘時服

按此用參芪四物一派補藥內加防風秦艽以

勝風濕桂心以勝寒細辛獨活以通腎氣凡治

三氣襲虛而成痺患者宜准諸此

面對罈口恐藥氣沖人面目每飲一盞勿令藥力斷絕飲盡病痊將藥渣晒為末米糊丸梧桐子大每服八十九丸空心溫酒下忌食動風辛熱物此藥可以常服

按治風治痺藥酒方亦不可少此方平中之奇

功效頗著後有增入白花蛇一條者此又以腸

胃漫試其毒吾所不取



五十  
痺在上用桂枝五物湯

黃芪三兩 桂枝三兩 芍藥三兩 生薑六兩 大棗十二枚

右五味以水六升煮取二升溫服七合日三服  
一方有人參

按此乃金匱治血痺之方也血痺而用桂枝湯  
加黃芪以其風邪獨勝風性上行故其痺在上  
也其脈微濇寸口關上小緊緊處乃邪著之驗  
也然又曰寸口關上微尺中小緊外症身體不

欽定四庫全書

醫門法律

仁如風痺狀此方主之又可見風性善行隨其  
或上或下一皆主以此方矣

五十  
痺在臂用十味剉散 原治中風血弱臂痛連及

筋骨舉動難支

附子炮 黃芪 當歸 白芍藥各一錢 川芎 防風

白朮各七分 茯苓 肉桂各五分 熟地黃潤洗焙乾二錢

右水二盞薑三片棗二枚食後臨卧服

按臂痛乃筋脈不舒體盛者可去其筋脈中之



<p>風然既已血痺所受風燥之累不淺故取此方 養血之中加附子之力通其陽氣而用防風反 佐黃芪出其分肉腠理之風也</p>	<p>五十 痺在手足風淫末疾則用烏頭粥 原治風寒濕 麻木不仁</p>	<p>烏頭 <small>生研為末</small> 每用香熟白晚米二合入藥末四錢同米以砂 礮煮作稀粥不可太稠下生薑汁一匙白蜜三</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>匙攪勻空心溫啜之為佳如中濕多更加薏苡 仁末三錢服此粥大治手足不隨及腫痛不能 舉者服此預防之</p>	<p>按四肢為諸陽之本本根之地陽氣先已不用 况周身經絡之末乎故用烏頭合穀味先從榮 衛所生之地注力俾四末之陽以漸而充也用 方者知之</p>	<p>五十 痺在手足濕流關節則用薏苡湯 原治手足流</p>
---	--	---	------------------------	--	--	-----------------------------------



注疼痛麻木不仁難以屈伸

薏苡仁 當歸 芍藥 桂心 麻黃各一錢 甘草

五分 蒼朮米泔浸炒二錢

右水二鍾薑五片煎八分食前服有汗去麻黃  
有熱去桂心

按此方以薏苡仁為君舒筋除濕其力和緩當  
三倍加之至於麻黃雖能通其陽氣然在濕勝  
方中即無汗不可多用減大半可也

欽定四庫全書

醫門法律

五十六 痺在身半以下用通痺散 原治腰以下至足風

寒濕三氣合而成痺兩足至臍冷如冰不能自  
舉或因酒熱立冷水中久成此疾

天麻 獨活 當歸 川芎 白朮 藁本等分

右為細末每服二錢熱酒調下

按此方因風寒濕三氣混合入于陰股其邪已  
過于榮衛故變桂枝五物之制而用此散緩緩  
分出其邪也



七五  
十

痺在遍身走痛無定用控涎丹 原治人忽患胸

背手脚腰胯痛不可忍牽連筋骨坐卧不寧走

痛無定乃痰涎伏在胸膈上下變為此疾或令

人頭重不可舉或神意昏倦多睡或飲食無味

痰唾稠粘口角流涎卧則喉中有聲手脚腫痺

氣脈不通疑似癱瘓但服此藥數服其病如失

甘遂 大戟 白芥子

右等分為末麩丸桐子大食後臨卧薑湯下五

欽定四庫全書

醫門法律

七丸或十九量人服

按風寒濕三痺之邪每藉人胸中之痰為奧援

故治痺方中多兼用治痰之藥昌於中風第四

十一方取用三因白散子之用半夏已見大意

但彼治濁氣上干此治濁痰四注以濁痰不除

則三痺漫無寧宇也凡遇痰積極盛之症此方

亦不可少實非謂子和之法足勝治痺之用也

學者辨諸





五十  
八 又方用

白茯苓 二兩 半夏 四兩 枳壳 一兩 風化硝 三錢

薑汁糊丸梧桐子大每服五十丸薑湯下然治

痺以開通陽氣補養陰血為貴著意治痰必轉

燥其血不可以為此善于彼而瀆用之矣

五十  
九 痺在脈用人參丸

人參 麥門冬 茯神 赤石脂 龍齒 石菖

蒲 遠志 黃芪 各一兩 熟地黃 二兩

欽定四庫全書

醫門法律

右為末煉蜜和搗五百杵為丸梧桐子大每服

三十丸食遠清米飲送下

按心主脈內經脈痺不已復傳於心可見五藏

各有所主各有所傳也此方安心神補心血先

事預防功效更敏加當歸甘草薑棗粳米汁煎

服更效

十六  
痺在胸用括萋薤白半夏湯 治胸痺不得卧心痛

徹背



括萋實

一枚

薤白

三兩

半夏

三兩

白酒

四升

右四味同煮取一升五合分三服温酒半升一日服之

按胸痺之症人所通患仲景於金匱出十方以治之然不明言也盖胸中如太空其陽氣所過如離照當空曠然無外設地氣一上則窒塞有加故知胸痺者陽不主事陰氣在上之候也仲景微則用薤白白酒以通其陽甚則用附子乾

欽定四庫全書

醫門法律

薑以消其陰以胸痺非同他患補天浴日在醫之手眼耳後世總不知胸痺為何病昌特發明於乙集胸寒痺痛條下文學錢尊王胸中不舒者經年不能自名其狀頗以為慮昌投以薤白湯次日云一年之病一劑而頓除抑何神耶昌不過以仲景之心法為法耳何神之有然較諸家之習用白豆蔻廣木香訶子三稜神麩麥芽等藥坐耗其胸中之陽者亦相懸矣



六十  
一 痺在胞用腎瀝湯 原治胞痺小腹急痛小便赤

澀

麥門冬 五加皮 犀角一鎊各 杜仲 桔梗 赤

芍藥 木通各一錢 桑螵蛸一鎊

右水盞半加入羊腎一隻去脂膜切細竹瀝少

許同煎一盞去渣空心頓服日再服 一方有

桑皮無螵蛸

按此方名腎瀝者形容其胞中之氣痺而不化

欽定四庫全書

醫門法律

外腎之溺滴瀝不出之苦也乃因虛熱壅其膀

胱肺氣不能下行所致桑皮桑蛸咸為治肺而

設此方大意聊見一斑不可誤認為其人內腎

素虛而小便淋漓也

六十  
二 痺在腸用吳茱萸散 原治腸痺寒濕內搏腹痛

滿氣急大便殮泄

吳茱萸湯炮 乾薑炮 甘草炙 肉豆蔻煨各 砂仁 神

麩 白朮各一兩 厚朴薑汁炒 陳皮 良薑



<p>右為末每服一錢食前米飲下</p>	<p>按腸痺之證總關於脾胃寒邪濕邪先傷其太</p>	<p>陰之脾風邪先傷其陽明之胃太陰傷故腹滿</p>	<p>陽明傷故飧泄內經謂胃風久蓄為飧泄明非</p>	<p>朝夕之故也脾胃有病三痺互結於腸此宜以</p>	<p>辛辣開之非如胞痺為膀胱之熱當用清涼之</p>	<p>比矣</p>	<p>六十 三 痺在筋用羚羊角散 原治筋痺肢節束痛</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>羚羊角 薄荷 附子 獨活 白芍藥 防風</p>	<p>川芎 各等分</p>	<p>右水盞半薑三片煎五分服</p>	<p>按此方治筋痺之義美則美矣未盡善也以七</p>	<p>味各用等分漫無君臣佐使之法耳蓋筋痺必</p>	<p>以舒筋為主宜倍用羚羊角為君筋痺必因血</p>	<p>不榮養宜以白芍川芎更加當歸為臣然恐羚</p>	<p>角性寒但能舒筋不能開痺必少用附子之辛</p>
---------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------	-----------------------------------	------------------------	----------------------------	---------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------



<p>熱為反佐更少用薄荷獨活防風入風寒濕隊 中而為之使可也用方者必須識此</p>	<p>四 六十 痺在皮用羌活湯 原治皮痺皮中狀如蟲走腹 脇脹滿大腸不利語不出聲</p>	<p>羌活 細辛 附子<small>泡去皮臍</small> 沙參 羚羊角<small>鎊</small> 白朮</p>	<p>五加皮 生地黄 官桂 枳殼<small>炒</small> 麻黃<small>去節</small> 白</p>	<p>蒺藜 杏仁 丹參 葶藶 五味子 石菖蒲</p>	<p>木通 檳榔 郁李仁<small>泡去皮</small> 赤茯苓<small>各等分</small></p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>右水盞半薑五片煎七分不拘時溫服</p>	<p>按皮痺不已傳入於肺則製方當以清肺氣為</p>	<p>主此方雜沓不適於用今取沙參羚羊角麻黃</p>	<p>杏仁白蒺藜丹參五味子石菖蒲八味去羌活</p>	<p>細辛附子白朮五加皮生地黄官桂枳殼葶藶</p>	<p>木通檳榔郁李仁赤茯苓九味而加石膏以清</p>	<p>肺熱甘草以和肺氣更加乾薑少許為反佐以</p>	<p>乾薑得五味子以收肺氣之逆也</p>
--	---	--	--	----------------------------	--	------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------



<p>六十 熱痺用升麻湯 原治熱痺肌肉極熱體上如鼠 走唇口反縮皮毛變紅黑</p>	<p>升麻 <small>三錢</small> 茯神 人參 防風 犀角 <small>鎊</small> 羚羊角 <small>鎊</small></p>	<p>羌活 <small>各一錢</small> 官桂 <small>三分</small></p>	<p>右水二鍾薑三片入竹瀝半酒盞不拘時服</p>	<p>按此方乃劉河間所製後人治熱病遵用河間 誠足法矣方中以升麻為君除陽明肌肉之熱 然熱甚必亂其神識故以人參茯神犀角羚羊</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>角為臣而協理之以官桂三分為反佐以羌防 為使如秋月寒潭碧清可愛鄙意羌防使藥更 少減其半匪故饒舌無非欲為引掖後來之助</p>	<p>耳</p>	<p>六十 冷痺用巴戟天湯 原治冷痺脚膝疼痛行步艱</p>	<p>難</p>	<p>巴戟天 <small>去心一錢</small> 附子 <small>製</small> 五加皮 <small>各七分</small> 川牛膝 <small>酒炒一錢</small> 石</p>	<p>斛 甘草 <small>炙</small> 草薢 白茯苓 防風 防已 <small>各五分</small></p>
--	---	---	--------------------------	---	------------------------	---	----------	-----------------------------------	----------	---	--



右水二盞薑三片煎八分空心服

按冷痺之證其風寒濕三痺之氣皆挾北方寒水之勢直有溫之而不易熱者方中之用巴戟天為君韙矣其附子加皮牛膝石斛茯苓甘草亦大小臣工之意然不用當歸肉桂溫其血分輔君之藥尚有未切葦薤反佐防風防已為使則俱當也

六十 心痺用犀角散 原治心痺神恍惚恐畏悶亂不

欽定四庫全書

醫門法律

得睡志氣不寧語言錯亂

犀角 羚羊角 人參 沙參 防風 天麻

天竺黃 茯神 升麻 獨活 遠志 麥門冬

甘草 龍齒 丹參 牛黃 麝香 龍

腦 各一分

右為末和諸藥重研令極細每服錢半不拘時麥門冬湯調下

按此散每服中腦麝纔得一釐五毫且有人參



甘草和胃固氣庶幾可用然二物不過藉以通

心開竅耳原不必多更減三之一為長也

六十  
八 肝痺用人參散 原治肝痺氣逆胸膈引痛睡卧

多驚筋脈攣急此藥鎮邪

人參 黃芪 杜仲酒炒 酸棗仁微炒 茯神 五味子

細辛 熟地黄 川芎 秦艽 羌活各一兩 丹砂

五錢  
另研

右為極細末入丹砂再研勻每服一錢不拘時

欽定四庫全書

醫門法律

調下日二服

按厥陰肝臟所主者血也所藏者魂也血痺不

行其魂自亂今不通其血而但治其驚此不得

之數也方中用參芪益氣以開血當矣其諸養

血寧神鎮驚之藥多汎而不切昌嘗製一方以

人參為君黃芪肉桂當歸川芎為臣以代赭石

之顛通肝血者佐參芪之不逮少加羌活為使

盖氣者血之天也氣壯則血行然必以肉桂當





<p>歸大溫其血預解其凝泣之勢乃以代赭之重 墜直入厥陰血分者開通其瘀塞而用羌活引 入風痺之所緣厥陰主風風去則寒濕自不存 耳錄出以質高明</p>	<p>六十 脾痺用溫中法麩丸 原治脾痺發咳嘔涎 法麩<small>炒</small> 麥牙<small>炒</small> 白茯苓 陳皮<small>去白</small> 厚朴<small>製</small> 枳實<small>炒</small> 各一兩 人參 附子<small>製</small> 乾薑<small>炮</small> 當歸<small>酒洗</small> 甘草<small>炙</small> 細 辛 桔梗<small>五錢</small> 吳茱萸<small>湯炮</small> 三錢</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p> <p>右為細末煉蜜丸梧桐子大每服七八十九食 前熱水送下</p>	<p>按脾為太陰之臟其痺必寒濕多而風少此方 溫中理氣壯陽驅陰種種有法但既曰發咳嘔 涎半夏似不可少</p>	<p>十七 肺痺用紫蘇湯 原治肺痺心膈窒塞上氣不下 紫蘇子<small>炒</small> 半夏<small>製</small> 陳皮<small>去白</small> 桂心 人參 白</p>	<p>木 各五分 甘草 二分</p>
---	---	--	--	--	--------------------



右水盞半薑五片棗二枚煎七分不拘時溫服	按肺為相傳之官治節行焉管領周身之氣無	微不入是肺痺即為氣痺明矣蘇子雖能降氣	其力甚輕且桂心半夏之燥人參白朮之泥俱	非肺痺所宜其陳皮雖能下氣然必廣東化州	所產口中嚼試其辣氣直入丹田者為貴今肆	中藥無道地下氣亦非陳皮所勝矣夫心火之	明尅肺金者人之所知而脾土之暗傷肺金者	多不及察蓋飲食入胃必由脾而轉輸於肺倘	脾受寒濕必暗隨食氣輸之於肺此濁氣干犯	清氣之一端也肝之濁氣以多怒而逆干於肺	腎之濁氣以多慾而逆干於肺三陰之邪以漸	填塞肺竅其節治不行而痺成矣開肺痺之法	昌頗有寸長見寓意等集中茲不贅	腎痺用牛膝酒 原治腎痺虛冷復感寒濕為痺	七十	牛膝 秦艽 川芎 白茯苓 防已 官桂
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	----	--------------------



<p>獨活 <small>各二兩</small> 五加皮 <small>四兩</small> 丹參 薏苡仁 火麻仁 <small>炒</small></p>	<p>麥冬 石斛 杜仲 <small>炒各一兩</small> 附子 <small>製</small> 地骨皮 乾薑</p>	<p><small>炮各五錢</small></p>	<p>右咬咀生絹袋盛之好酒一斗浸春秋五日夏三日冬十日每服半盞空心食前服日二次</p>	<p>按腎為北方寒水之臟而先天之真火藏於其中故謂生氣之原又謂守邪之神今風寒濕之邪入而痺之去生漸遠矣此方防已麥冬丹參</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>地皮迂緩不切</p>	<p>風門雜方七道</p>	<p><small>七十</small> 和榮湯 <small>論見前</small></p>	<p>白朮 川芎 <small>各一錢半</small> 南星 半夏 芍藥 茯苓</p>	<p>天麻 <small>各一錢</small> 川歸 生地黃 熟地黃 牛膝 酸</p>	<p>棗仁 黃芩 橘紅 <small>各八分</small> 羌活 防風 官桂 <small>各六分</small></p>	<p><small>分</small> 紅花 甘草 <small>炙各四分</small> 黃栢 <small>三分</small></p>	<p>水煎入竹瀝薑汁晨服</p>
--	--	----------------------------	--	---	------------------------	---------------	---------------	---	--	--	--	--	------------------



<p>七十 急風散 治新久諸瘡破傷中風項強背直口噤 不語手足抽搐眼目上視喉中拽鋸及取箭頭 丹砂<small>一兩</small>草烏<small>二兩半生半熟燒</small>烏頭<small>生二錢五分</small> <small>存性末醋淬晒乾與生草烏同</small> 麝香<small>一錢</small> <small>末研 另研</small></p>	<p>七十 右為細末和勻每服五分以酒下血止痛定如 神出箭頭先進一服次以藥敷箭頭上</p>	<p>七十 獨聖散 治破傷風久未愈手背強直牙關緊急 立效</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>七十 蟬蛻 <small>取頭足 淨五錢</small></p>	<p>七十 右為末好酒一盞煎滾服之立甦</p>	<p>七十 祛風丸 <small>易老方</small></p>	<p>七十 黃芪 枳壳 防風 枸杞子 芍藥 甘草</p>	<p>七十 地骨皮 生地黃 熟地黃</p>	<p>七十 各等分蜜丸</p>	<p>七十 四神丹 <small>東坡方</small></p>	<p>七十 羌活 玄參 當歸 生地黃</p>
---	--	--	------------------------	---	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------------------	----------------------------



<p>各等分或煎或丸服</p>	<p>七十 犀角湯 <small>千金方</small> 治熱毒流於四肢歷節疼痛</p>	<p>七十 犀角 <small>三兩</small> 羚羊角 <small>一兩</small> 前胡 黃芩 梔子仁 射干</p>	<p>大黃 升麻 <small>各四兩</small> 新豆豉 <small>一兩</small></p>	<p>右方咬咀每服五錢水二盞煎服</p>	<p>按此方壯火內熱熾盛者宜之腸胃弱者當減</p>	<p>去大黃勿用</p>	<p>七十 牛旁子散 <small>本事方</small></p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>牛旁子 <small>炒</small> 新豆豉 羌活 <small>各三兩</small> 生地黄 <small>二兩半</small></p>	<p>黃芪 <small>一兩半</small></p>	<p>右為細末湯調二錢空心食前日三服</p>	<p>按此方不但不用烏附併不用麻桂凡治血虛</p>	<p>內熱熾盛而欲外解其勢宜倣此推之也</p>	<p>醫門法律卷六</p>
-----------------	--	---	---	----------------------	---------------------------	--------------	---------------------------------------	------------------------	--	------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------



欽定四庫全書

子部  
醫門法律卷七

詳校官太醫院醫官原 姜晟

編修臣 倉聖脈 覆勘

總校官編修臣 王燕緒

校對官編修臣 盧 遂

謄錄監生 臣 鄒世後



欽定四庫全書

醫門法律卷七

南昌喻昌撰

熱濕暑三氣門

法二十五條  
律十一條

論三篇

六氣春主厥陰風木秋主陽明燥金冬主太陽寒水各  
行其政惟春分以後秋分以前少陽相火少陰君火  
太陰濕土三氣合行其事是故天本熱也而益以日  
之暑日本烈也而載以地之濕三氣交動時分時合

欽定四庫全書

醫門法律

其分也以風動於中勝濕解蒸不覺其苦其合也天  
之熱氣下地之濕氣上人在氣交之中受其炎蒸無  
隙可避多有體倦神昏肌膚癢起胸膈瘞出頭面癩  
生者矣甚則消渴癰疽吐瀉瘧痢又無所不病矣其  
不能澹泊滋味屏逐聲色者且以濕熱預傷金水二  
臟為秋冬發病之根故病之繁而且苛者莫如夏月  
為最夫天氣無形之熱與地氣有形之濕交合而大  
生廣生之機益彰然殺機每伏於生機之內所稱移



星易宿龍蛇起陸者即於夏月見之人身亦然內經運  
氣主病凡屬少陰君火即與太陰濕土一類同推不  
分彼此而太陰司天濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛  
以苦燥之以淡泄之治濕之法則然矣下文即出治  
熱之法云濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為  
故而止可見濕淫而至於上甚即為熱淫其人之汗  
必為濕熱所鬱而不能外泄故不更治其濕但令汗  
出如其故常斯熱從汗散其上甚之濕即隨之俱散

欽定四庫全書

醫門法律

耳觀於內經濕熱二氣合推即以得汗互解妙義彰  
彰矣

仲景以瘧病濕病暈病其為太陽經外感之候者合而  
名篇蓋瘧為熱病之最惡者而要皆為濕熱之所釀  
正從三氣交動中會其微旨也然三氣雜病非傷寒  
之比者曷可枚舉但有一端為時令所乘即當推三  
氣主病何有何無孰淺孰深以求確然之治如當風  
冒濕飲醇啖燻精津素虧熱毒內蘊濕邪久著之體





發為瘡瘍癰痢黃瘰腫滿消渴痿厥之病既有濕熱  
多寡之不同又有氣血虛實之各異向非深入軒岐  
仲景堂奧而取途於諸家之狹隘所稱活人手眼果  
安在哉故會三氣交病之義以審脈辨證用方其於  
濕熱之孰多孰少治療之從上從下補救之先陰先  
陽纖悉畢貫矣不遵聖法而欲免過差其可得乎

金匱論瘧病於風木主事之時蚤已申不可汗下之戒  
云夫風病下之則瘧復發汗必拘急見風與熱合而

欽定四庫全書

醫門法律

生病風則內應肝而主筋熱則內應心而主脈妄下  
損陰則筋失養而成瘧妄汗損陽則脈失養而拘急  
矣至濕暍所釀之瘧其不可汗下之意則為少變維  
時陽氣在外既屢以發汗為戒及遇無汗之剛瘧又  
不得不用葛根湯取其微汗至於下法全不示戒且  
云可與大承氣湯其意甚微見身內之陰為外熱所  
耗容有不得不下之證但十中不得一二終非可訓  
之定法畧舉其端聽用者之裁酌耳然亦見風寒之



邪中人不可妄用苦藥濕熱之邪中人不可妄用辛  
溫矣

論金匱治瘧用括萋根桂枝湯方

本文云太陽病其證備身體強凡凡然脈反沈遲此  
為瘧括萋根桂枝湯主之傷寒方中治項背凡凡用  
桂枝加葛根湯矣此因時令不同故方亦少變彼之  
汗出惡風其邪在表而此之太陽證罔不具備其邪  
之亦在於表可知也但以脈之沈遲知其表之邪

欽定四庫全書

醫門法律

為內濕所持而不解即係濕熱二邪交合不當從風  
寒之表法起見故不用葛根之發汗解肌改用括萋  
根味苦入陰擅生津徹熱之長者為君合之桂枝湯  
和榮衛養筋脈而治其瘧乃變表法為和法也

論金匱治瘧用葛根湯方

本文云太陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不  
得語欲作剛瘧葛根湯主之傷寒論太陽篇中項背  
凡凡無汗惡風者用葛根湯此證亦用之者以其邪



在太陽陽明兩經之界兩經之熱并於胸中必延傷肺金清肅之氣故水道不行而小便少津液不布而無汗也陽明之筋脈內結胃口外行胸中過人迎環口熱并陽明斯筋脈牽引口噤不得語也然剛瘧無汗必從汗解況濕邪內鬱必以汗出如故而止故用此湯合解兩經之濕熱與風寒之表法無害其同也  
論金匱治瘧用大承氣湯方

欽定四庫全書

醫門法律

可與大承氣湯仲景之用此方其說甚長乃死裏求生之法也靈樞謂熱而瘧者死腰折癩齒齮也茲所云卧不著席即腰折之變文脚攣急即癩癩之變文且齮齒加以胸滿口噤上中下三焦熱邪充斥死不旋踵矣何以投是湯乎在傷寒證腹滿可下胸滿則不可下又何以投是湯乎須知所謂胸滿不可下者謂其邪尚在表未入於裏故不可下此證入裏之熱極深極重匪可比倫況陽熱至極陰血立至消亡



即小小下之尚不足以勝其陽救其陰故取用大下  
之方以承領其一綫之陰氣陰氣不盡為陽熱所劫  
因而得生者多矣可與二字甚活臨證酌而用之初  
非定法也既有下之重傷其陰之大戒復有下之急  
救其陰之活法學者欲為深造端在斯矣

瘧病論

喻昌曰六淫之邪至於成瘧乃病證之最多最深最惡  
最易惑人者軒岐仲景奧中之奧後世罔解因至肆無

欽定四庫全書

醫門法律

忌憚鑿空妄譚此唱彼和天枉接踵豈操生人之術以  
殺人耶繇辨之不蚤辨耳夫瘧者強也後名為瘧傳者  
之誤也素問謂諸瘧項強皆屬於濕是病機顯主於濕  
矣千金推廣其義謂太陽中風重感寒濕則變瘧見太  
陽中風身必多汗或衣被不更寒濕內襲或重感天時  
之寒地氣之濕因而變瘧是合風寒濕三者以論瘧矣  
金匱以瘧濕暍名篇又合熱暑濕三者言之然所謂柔  
瘧剛瘧未嘗不兼及風寒且亦云發汗過多因致瘧見



夏月人本多汗尤不可過發其汗也古今言瘧之書止此後世王海藏論瘧知宗仲景雖識有未充要亦識大之賢矣傷寒論載瘧病五條尚論篇中已明之茲復詳金匱所增十條其旨已悉然終古大惑不立論以破其疑心有未慊誠以仲景論瘧病所舉者太陽一經耳後之治此病者謂太陽行身之背故頸項強背反張屬在太陽而用金匱桂枝葛根二方茫不應手每歸咎仲景之未備不思外感六淫之邪由太陽而傳六經乃自然

欽定四庫全書

醫門法律

之行度邪不盡傳即不已故三陽三陰皆足致瘧仲景之書通身手眼雖未明言其隱而不發之旨未嘗不躍然心目如太陽之傳陽明項背几几少陽之頸項強是知三陽皆有瘧矣而三陰豈曰無之海藏謂三陽太陰皆病瘧獨不及少陰厥陰云背反張屬太陽低頭視下手足牽引肘膝相構屬陽明一目或左或右斜視一手一足搐搦屬少陽發熱脈沈細腹痛屬太陰以防風當歸湯治太陽陽明發汗過多而致瘧者以柴胡加防風



湯治少陽汗後不解寒熱往來而成瘧者雖不及少陰厥陰然其製附子散桂心白朮湯附子防風散意原有在觀其白朮湯下云上解三陽下安太陰一種苦心無非謂傳入少陰厥陰必成死證耳詎知傳經之邪如風雨之來而晝地以限其不至豈可得乎況足少陰厥陰之瘧不死者亦多靈樞謂足少陰之經筋循脊內俠膂上至頂與足太陽筋合其病在此為主癰癥及瘧在外陽病者不能俛在內陰病者不能仰是則足少陰之藏

欽定四庫全書

醫門法律

與足太陽之府兩相連絡而以不能俛者知為太陽主外不能仰者知為少陰主內其辨精矣素問亦謂太陽者一日而主外則二日陽明三日少陽之主外從可識矣少陰主內則太陰厥陰之主內從可識矣仲景之以頭強脊強不能俛者指為太陽之瘧原以該三陽也而其以身蹇足蹇不能仰者指為少陰之瘧以該三陰實所謂引而不發躍然心目者也素問謂腎病者善脹尻以代踵脊以代頭形容少陰病俛而不能仰之狀更著



海藏謂低頭視下肘膝相構正不能仰之陰病反指為  
陽明之瘧立言殊有未確況仲景謂少陰病下利若利  
自止惡寒而蹇卧手足溫者可治又謂少陰病惡寒而  
蹇時自煩欲去衣被者可治言可用溫以治之也然仲  
景於太陽證獨見背惡寒者無俟其身蹇蚤已從陰急  
溫而預救其不能仰於少陰證而見口燥咽乾及下利  
純青水者無俟項背牽強蚤已從陽急下而預救其不  
能俛蓋藏陰之盛府有先徵府陽之極入藏立槁此皆

欽定四庫全書

醫門法律

神而明之之事後代諸賢非不心維其義究莫能口贊  
一辭亦可見由賢希聖升天之難若不肖者之涉誕則  
墜淵之易矣即如小兒之體脆神怯不耐外感壯熱多  
成瘧病後世妄以驚風立名有四證生八候之鑿說實  
則指瘧病之頭搖手勁者為驚風之抽掣指瘧病之卒  
口噤脚攣急者為驚風之搐搦指瘧病之背反張者為  
驚風之角弓反張幼科翕然宗之病家坦然任之不治  
外淫之邪反投金石腦麝之藥千中千死而不悟也又



如新產婦人血舍空虛外風襲入而成瘧病仲景之所  
明言不肖者不顧悖聖輒稱產後驚風妄投湯藥亦千  
中千死而不悟也昌不惜金針度人其如若輩之不受  
度者轉生讎恨何哉可慨也已

瘧脈論

喻昌曰瘧證之顯者後世且并其名而失之況瘧脈之  
微乎然而可得言也瘧證異於常證瘧脈必異於常脈  
是故體強其脈亦強求其柔軟和緩必不可得況強脈

欽定四庫全書

醫門法律

恒雜於陰脈之內所以沈弦沈緊邪深脈錮難於亟奪  
仲景謂脈陰陽俱緊亡陽也此屬少陰見非太陽之緊  
比也又謂少陰病脈緊至七八日脈暴微手足反溫脈  
緊反去者為欲解可見瘧證之欲解必緊實之脈轉為  
微弱而現劇病之本象乃可漸返平脈不遽解也古今  
言瘧證之及脈者莫如金匱然皆片言居要非深明傷  
寒比類互推之法茫不知其立言之意故因論瘧病而  
并及瘧脈焉其曰太陽病發熱脈沈而細名曰瘧為難





治以發熱為太陽證沈細為少陰脈陽病而得陰脈故  
難治也難治初非不治仲景治發熱脈沈原有麻黃附  
子細辛之法正當此例用之設仍用太陽之桂枝葛根  
二方則立剷孤陽之根真不治矣以少陰所藏者精所  
宅者精神者陰也神者陽也凡見微脈即陽之微見細  
脈即陰之細微則易於亡陽細則易於亡陰此其所以  
難治也故病傳厥陰而少陰之精神未虧即無死證其  
厥逆下利煩燥脈微而死者究竟以厥陰而累少陰之

欽定四庫全書

醫門法律

絕耳此脈中之真消息凡病皆然不但為瘧脈之金鍼  
也其曰太陽病其證備身體強凡凡然脈反沈遲此為  
瘧雖亦陽證陰脈而遲與微細大有不同遲乃太陽榮  
血之陰受病故脈之朝於寸口者其來遲遲是榮血不  
能充養筋脈而成瘧但取益陰生津以和筋脈而不與  
少陰同法矣兩證之夾陰脈其辨如此其引脈經云瘧  
家其脈伏堅直上下而復以按之緊如弦直上下行互  
發其義明伏非伏藏之伏按之可得即所謂沈也堅非



漫無著落即緊如弦不為指撓邪氣堅實也直上下行  
者督脈與足太陽合行於脊裏太陽邪盛督脈亦顯其  
盛緣督脈行身之背壬脈行身之前如天地子午之位  
居南北之中故其脈見則直上直下脈經謂直上下行  
者督脈也見之則大人癩小兒癩者是也惟其夾於沈  
脈之內重按始得所以病癩癩及瘰有非陽病可比若  
舉指即見直上直下則病為陽狂其證登高踰垣勇力  
且倍平昔何至攣縮若是耶瘰證陰脈之似陽其辨又

欽定四庫全書

醫門法律

如此然在傷寒誤發少陰汗者必動其血為下厥上竭  
亡陰而難治而瘰病之誤發其汗者必動其濕濕雖陰  
類乃外受之陰邪非身中陰血之比但所動之陽奔入  
濕中為濕所沒而成滅頂之凶即是亡陽之變證仲景  
曰其脈如蛇不言其證然未發汗之先已見惡寒頭搖  
口噤背張脚攣幾幾陽之欲亡則發汗以後內關筋惕  
舌卷囊縮背曲肩垂項似拔腰似折頸筋粗勁四末逆  
冷皆瘰病之所畢具不待言矣第因發汗而動下焦之



濕又因發汗逼令真陽脫入濕中是則多汗亡陽之外更添亡陽一證所以形容其脈如蛇言脫出之陽本急疾親上輕矯若龍為濕之遲滯所紐則如蛇行之象儘力奔迸究竟不能奮飛也此脈之至變義之至精而從來未解者也更有暴腹脹大者為欲解脈如故反伏弦者瘧之文不敘病之原委突云欲解如禪家半偈令人何處下參耶試一參之妙不容言矣蓋傷寒傳至厥陰有欲解者有過經不解者此之出欲解之證復出不解

欽定四庫全書

醫門法律

之脈殆謂瘧傳厥陰其經已盡解與不解辨其脈證而可知也欲解之證厥陰之邪必傳脾土尅其所勝腹當為之暴脹本內經厥陰在泉民病腹脹之義以論證亦見厥陰不再傳太陽而但轉太陰邪欲解耳解則其脈必見微浮何以知之於傷寒厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈而知之也若脈仍陰象反見沈弦必自病其筋脈而拘急成瘧亦如過經之例未可定其解期矣至於論治六經皆有成法金匱但取太陽二方陽明一



方為例而厥陰之筋脈自病又必少陰之陽虛不能柔  
養筋脈所致所以脈反沈弦此當用溫以救其陽也傷  
寒厥陰亡陽必顯內拘急之證內拘急者即靈樞在內  
者陰病不能仰之奧旨故知少陰主內厥陰之用溫仍  
從少陰溫之也又厥陰下利腹脹滿者仲景亦先溫其  
裏病機雖云諸腹脹大皆屬於熱而暴腹脹大乃是少  
陰陽虛更兼陰盛故其腹之脹大不徐而暴也陰故暴  
陽即不暴故知厥陰亦從少陰之溫法也不溫則不但

欽定四庫全書

醫門法律

無解期且有死期矣昌特推原仲景以誘掖來學未知  
其能弋獲否也謹論

經曰傷於濕者下先受之言地濕之中人先中其履地  
之足然後漸及於上者也曰濕流關節言地濕之中  
人流入四肢百節猶未入於藏府者也曰陰受濕氣  
言地濕之中人已入於太陰脾土未入於陽明胃土  
者也曰濕上甚為熱此則下受之濕襲入三陽胸背  
頭面之間從上焦之陽而變為熱濕者也濕至上焦



而變熱其證夏月為最多蓋夏月地之濕氣上合於天之熱氣日之暑氣結為炎蒸人身應之頭面赤腫瘡癬叢生疫邪竊據其繇來自非一日矣

諸家論濕但云濕流關節止耳至濕上甚為熱之旨從未言及今悉論之濕上甚為熱內經豎一義云汗出如故而止妙不容言蓋濕上甚為熱即所謂地氣上為雲也汗出如故即所謂天氣下為雨也天氣下為雨而地氣之上升者已解散不存矣治病之機豈不

欽定四庫全書

醫門法律

深可會哉

濕上甚為熱其人小便必不利蓋膀胱之氣化先為濕熱所壅而不行是以既上之濕難於下趨經又云治濕不利小便非其治也可見治上甚之濕熱利其小便即為第二義矣然有陽實陽虛二候陽實者小便色赤而痛利其小便則上焦遏鬱之陽氣通其濕熱自從膀胱下注而出矣陽虛者小便色白不時淋漓而多汗一切利小水之藥即不得施若誤施之即犯



虛虛之戒不可不辨也

金匱治上焦之濕本內經濕上甚為熱之義而分輕重  
二證輕者但發熱面赤而喘頭痛鼻塞而煩邪在上  
焦裏無別病者但內藥鼻中搐去濕熱所釀黃水而  
已以鼻竅為腦之門戶故即從鼻中行其宣利之法  
乃最神最捷之法也重者身熱足寒時頭熱面赤目  
赤皆濕上甚為熱之明徵濕熱上甚故頭熱面赤目  
赤濕熱上甚故陽氣上壅不下通於陰而足寒自成

欽定四庫全書

醫門法律

無已謂是濕傷於下風傷於上仲景發明內經奧旨  
成土苴矣豈其不讀內經耶豈風始生熱濕不生熱  
耶在冬月傷寒已為熱病豈夏月傷濕反不為熱病  
耶詳仲景以上甚為熱之重證發入瘧病最重之條  
而不言其治昌欲於此微露一絨然而竿頭之步觀  
者得無望之却走乎內經原有上者下之之法邪從  
下而上必驅之使從下出一定之理也其證輕者裏  
無別病但搐其黃水從清陽之鼻竅而下出則其重



而裏多危證者必驅其黃水從前後二陰之竅而出  
所可意會也金匱於本文之下增若發其汗者二十  
四字垂戒初不以下為戒又可意會也但下法之難  
不推其所以不可汗之故即不得其所以用下之權  
仲景以其頭搖口噤背張幾幾陽之欲亡若更發其  
汗重虛衛外之陽惡寒必轉甚若發汗已其脈如蛇  
真陽脫離頃刻死矣繇是推之濕上甚為熱之重者  
非用下法難以更生而下法必以溫藥下之庶幾濕

欽定四庫全書

醫門法律

去而陽不隨之俱去耳此非無徵之言也仲景即於  
本篇申一義云下之額上汗出微喘小便利者死豈  
非因下而并奪其陽之大戒乎噫嘻此殆與性與天  
道同義矣

論金匱治濕用麻黃白朮湯方

本文云濕家身煩疼可與麻黃湯發其汗為宜慎不  
可以火攻之 此治熱濕兩停表裏兼治之方也身  
煩者熱也身疼者濕也用麻黃取微汗以散表熱用



白朮健脾以行裏濕而麻黃得朮則雖發汗不至多  
汗朮得麻黃并可行表裏之濕下趨水道又兩相維  
持也傷寒失汗而發黃用麻黃連翹赤小豆湯分解  
濕熱亦是此意但傷寒無用朮之法金匱復出此法  
又可見雜證脾濕內淫必以朮為主治矣

合論金匱治濕用桂枝附子湯白朮附子湯甘草附子  
湯三方

凡夏月之濕皆為熱濕非如冬月之濕為寒濕也而

欽定四庫全書

醫門法律

金匱取用附子之方不一而足者何耶宜乎據方推  
證者莫不指熱濕為寒濕矣不思陽氣素虛之人至  
夏月必且益虛虛故陽氣不充於身而陰濕得以據  
之此而以治濕之常藥施之其虛陽必隨濕而俱去  
有死而已故陽虛濕盛舍助陽別無驅濕之法亦不  
得不用之法耳

桂枝附子湯 白朮附子湯

本文云傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉





側不嘔不渴脈浮虛而濇者桂枝附子湯主之若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之

用桂枝附子溫經助陽固護表裏以驅其濕以其不嘔不渴津液未損故用之也若其人大便堅則津液不充矣小便自利則津液下走矣故去桂枝之走津液而加白朮以滋大便之乾也此連下條甘草附子湯俱傷寒論太陰篇中之文也傷寒瘧濕暍篇中不載而金匱瘧濕暍篇中載之可見治

欽定四庫全書

醫門法律

風濕與治熱濕其陽虛者之用本方不當彼此異同矣而傷寒論但云若大便堅小便自利者去桂加白朮湯主之金匱重立其方且於方下云一服覺身痺半日許再服三服都盡其人如蠅狀勿怪即是朮附並走皮中逐水氣未得除故耳成無已註傷寒於此條云以桂枝散表之風附子逐經中之濕總不言及陽虛而昌諄複言之得此一段始為有據其一服覺身痺者藥力雖動其濕而陽氣



尚未充不便運旋也三服都盡陽氣若可行矣遍  
身如攢針之刺其渙而難萃之狀尚若此金匱可  
謂善於形容矣不但此也人身藉有陽氣手持足  
行輕矯無前何至不能自轉側乎此豈可諉咎於  
濕乎即謂濕勝陽氣果安往乎況其證不嘔不渴  
其脈浮虛而濇陽虛確然無疑無已輒以治風濕  
之外邪為訓寧不貽誤後人耶

甘草附子湯

欽定四庫全書

醫門法律

本文云風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則  
痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫  
者甘草附子湯主之

此亦陽虛之證以前條大約相同風傷其衛而陽  
不固於外濕流關節而陽不充於經用此固衛溫  
經散濕也

論金匱防已黃芪湯

本文云風濕脈浮身重汗出惡風防已黃芪湯主之



欽定四庫全書

醫門法律

取差亦從下受者從下出之法也

脾惡濕夏月濕熱相蒸多有發黃之候然與傷寒陽明  
瘵熱發黃微有不同彼屬熱多其色明亮此屬濕多  
其色黯晦

內經云濕勝為著痺金匱獨以屬之腎名曰腎著云腎  
著之病其人身體重腰中冷如坐水中形如水狀反  
不渴小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣裏  
冷濕久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘薑



苓朮湯主之 此證乃濕陰中腎之外廓與腎之中  
藏無預者也地濕之邪著寒藏外廓則陰氣凝聚故  
腰中冷如坐水中實非腎藏之精氣冷也若精氣冷  
則膀胱引之從夾脊逆於中上二焦榮衛上下之病  
不可勝言今邪止著下焦飲食如故不渴小便自利  
且與腸胃之府無預況腎藏乎此不過身勞汗出衣  
裏冷濕久久得之但用甘草乾薑茯苓白朮甘溫從  
陽淡滲行濕足矣又何取煖胃壯陽為哉 甘薑苓

欽定四庫全書

醫門法律

朮湯

內經病機十九條叙熱病獨多謂諸病喘嘔吐酸暴注  
下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓之有聲如鼓癰疽瘍  
疹瘤氣結核吐下霍亂脅鬱腫脹鼻塞衄衄血溢血  
泄淋悶身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄衄蟻血污皆  
屬於熱劉河間逐病分註了明所以後世宗之故原  
病式不可不讀也

雜病惡寒者乃熱甚於內也經云惡寒戰慄者皆屬於



熱又云禁慄如喪神守皆屬於火原病式曰病熱甚而反覺其寒此為病熱實非寒者是也古人遇戰慄之證有以大承氣湯下燥糞而愈者惡寒戰慄明是熱證但有虛實之分耳

雜病發熱者乃陰虛於下也經云陰虛則發熱夫陽在外為陰之衛陰在內為陽之守精神外馳嗜慾無節陰氣耗散陽無所附遂至浮散於肌表之間而惡熱也實非有熱當作陰虛治而用補養之法可也

欽定四庫全書

醫門法律

東垣發熱惡熱大渴不止煩燥肌熱不欲近衣其脈洪大按之無力者或無目痛鼻乾者非白虎湯證也此血虛發躁當以當歸補血湯主之又有火鬱而熱者如不能食而熱自汗氣短者虛也以甘寒之劑瀉熱補氣非如能食而熱口舌乾燥大便難者可用寒下之比

又有脚膝痿弱下尻臀皆冷陰汗臊臭精滑不固脈沈數有力為火鬱於內逼陰向外即陽盛拒陰當用苦



寒藥下之者此水火徵兆之微脈證治例之妙取之  
為法

夏月火乘土位濕熱相合病多煩燥悶亂四肢發熱或  
身體沈重走注疼痛皆濕熱相搏鬱而不伸故致熱  
也

內經叙病機十九條而屬火者五謂諸熱瞽瘵暴瘡冒  
昧躁擾狂越罵詈驚駭肘腫疼酸氣逆衝上禁慄如  
喪神守嘔嘔瘡瘍喉痺耳鳴及聾嘔涌溢食不下目

欽定四庫全書

醫門法律

昧不明暴注暈瘵暴病暴死皆屬於火原病式解之  
甚詳

丹谿曰相火易起五性厥陽之火相扇則妄動矣火起  
於妄變化莫測無時不有煎熬真陰陰虛則病陰絕  
則死君火之氣經以暑與熱言之相火之氣經以火  
言之蓋表其暴悍酷裂有甚於君火者也然則厥陰  
風木之後少陽相火雖分主六十日而相火實隨觸  
而動四時皆然不定主於春夏之間矣但熱暑濕三



氣交合而相火尤為易動則有之也

黃連瀉心火黃芩瀉肺火芍藥瀉脾火柴胡瀉肝火知  
母瀉腎火此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食  
勞倦內傷元氣火不兩立為陽虛之病以甘溫之劑  
除之如黃芪人參甘草之屬若陰微陽強相火熾盛  
以乘陰位日漸煎熬為血虛之病以甘寒之劑降之  
如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱內實為陽強之  
病以鹹冷之劑折之如大黃樸硝之屬若腎水受傷

欽定四庫全書

醫門法律

真陰失守無根之火為陰虛之病以壯水之劑制之  
如生地黃玄參之屬若右腎命門火衰為陽脫之病  
以溫熱之劑濟之如附子乾薑之屬若胃虛過食冷  
物抑遏陽氣於脾土為火鬱之病以升散之劑發之  
如升麻葛根之屬不明諳此求為大病施治何所依  
據耶

內經曰諸濕腫滿皆屬脾土原病式曰諸瘕強直積飲  
痞膈中滿霍亂吐下體重胛腫肉如泥按之不起皆



屬於濕脈經曰脈來滑疾身熱煩喘胸滿口燥發黃者濕熱脈洪而緩陰陽兩虛濕熱自甚脈洪而動濕熱為痛也

內經因於濕首如裹丹谿解之甚明謂濕者土之濁氣首為諸陽之會其位高其氣清其體虛故聰明係焉濁氣薰蒸清道不通沈重不利似乎有物蒙之失而不治濕鬱為熱熱留不去大筋腴短者熱傷血不能養筋故為拘攣小筋弛長者濕傷筋不能束骨故為

欽定四庫全書

醫門法律

痿弱

因於氣為腫王註亦明謂素常氣疾濕熱加之氣濕熱爭故為腫也邪氣漸盛正氣漸微陽氣衰少致邪代正氣不宣通故四維發腫諸陽受氣於四肢也然則今人見膝間關節腫疼全以為風治者豈不悞耶濕病所主內傷外感不同況有寒濕風濕各異而夏月三氣雜合為病不過大同小異多少先後之分耳人只知風寒之威嚴不知暑濕之炎暄感人於冥冥之





中原病式云諸強迫積飲等證皆屬於濕或腫滿體寒而有水氣乘必小便赤少不通或濁是蓄熱入裏極深非病寒也

大抵治法宜理脾清熱利小便為上故治濕不利小便非其治也宜桂苓甘露木香葶藶木通治之守真曰葶藶木香散下神芎丸此藥下水濕消腫脹利小便理脾胃無出乎此也腹脹脚腫甚者舟車丸下之濕熱內深發黃茵陳湯下之或佐以防己黃芪當以脈

欽定四庫全書

醫門法律

證辨之如脈滑數小便赤澹引飲者皆宜下之也

濕溫之證因傷濕而復傷暑也治在太陰不可發汗汗

出必不能言耳聾不知痛所在名曰重暈如此死者

醫殺之也

詳見卷之一

中濕有與中風相似者其脈必沈澹沈細絲脾虛素多

積痰偶觸時令濕熱內搏其痰心胸涎壅口眼喎邪

半身不遂昏不知人其治亦在太陰若作中風治則

脾氣立虧亦殺之也

暑風見本門後



風濕論

喻昌曰風也濕也二氣之無定體而隨時變易者也濕在冬為寒濕在春為風濕在夏為熱濕在秋為燥濕以濕土寄王於四季之末其氣每隨四時之氣而變遷昌言之矣惟風亦然風在冬為齟發之寒風在春為調暢之溫風在夏為南薰之熱風在秋為淒其之涼風內經謂風者百病之長其變無常者是也其中人也風則上先受之濕則下先受之俱從太陽膀胱經而入風傷其衛濕流關節風邪從陽而親上濕邪從陰而親下風邪無形而居外濕邪有形而居內上下內外之間邪相搏擊故顯汗出惡風短氣發熱頭痛骨節煩疼身重微腫等證此固宜從汗解第汗法不與常法相同用麻黃湯必加白朮或加薏苡仁以去其濕用桂枝湯必去芍藥加白朮甚者加附子以溫其經其取汗又貴徐不貴驟驟則風去濕存徐則風濕俱去也其有不可發汗者緣風濕相搏多夾陽虛陽虛即不可汗但可用辛熱氣壯

欽定四庫全書

醫門法律



之藥扶陽以逐濕而已凡見短氣雖為邪阻其正當慮胸中陽虛凡見汗出微喘雖為肺氣感邪當慮真陽欲脫明眼辨之必早也傷寒論中風濕相搏以冬寒而例三時金匱瘧濕暍篇中風濕相搏以夏熱而例三時其曰病者一身盡痛發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致豈非夏月當風取涼過久而閉其汗乎日晡所劇其病在陽明然與瘧病之齧齒熱甚入深陽明可下之證不同此但可汗而不可下也

欽定四庫全書

醫門法律

何以言之內經謂太陰陽明為表裏外合肌肉故陽受風氣陰受濕氣所以風濕客於太陰陽明即為半表半裏而一身之肌肉盡痛即為在表之邪未除故可汗而不可下也況人身之氣晝日行陽二十五度平旦屬少陽日中屬太陽日西屬陽明日晡所劇邪在陽明而太陽少陽之氣猶未盡退故亦可汗不可下也觀金匱一則曰可與麻黃加朮湯發其汗為宜慎不可以火攻之再則曰可與麻黃杏子薏苡甘草湯雖未言及不可下



而其可汗不可下之意此例具見矣若下之則虛其胃  
氣而風邪下陷濕邪上湧其變不可勝言矣其濕流關  
節之痛脈見沈細者則非有外風與之相搏祇名濕痺  
濕痺者濕邪痺其身中之陽氣也利其小便則陽氣通  
行無礙而關節之痺并解矣設小便利已而關節之痺  
不解必其人陽氣為濕所持而不得外泄或但頭間有  
汗而身中無汗反欲得被蓋向火者又當微汗以通其  
陽也因風濕相搏之文錯見不一難於會通故并及之

欽定四庫全書

醫門法律

暍者中暑之稱淮南子陰暍人於樾下其名久矣後世以  
動而得之為中熱靜而得之為中暑然則道途中暍  
之人可謂靜而得之耶動靜二字只可分外感內傷  
動而得之為外感天日之暑熱靜而得之因避天日  
之暑熱而反受陰濕風露瓜果生冷所傷則有之矣  
時令小寒大寒而人受之者為傷寒時令小暑大暑  
而人受之者即為傷暑勞苦之人凌寒觸暑故多病  
寒暑安養之人非有飲食房勞為之招寒引暑則寒



暑無絲入也所以膏梁藜藿東南西北治不同也  
體中多濕之人最易中暑兩相感召故也外暑蒸動內  
濕二氣交通因而中暑所以肥人濕多夏月百計避  
暑反為暑所中者不能避身之濕即不能避天之暑  
也益元散驅濕從小便出夏月服之解暑有自來矣  
然體盛濕多則宜之清癯無濕之人津液為時令所  
耗當用生脈散充其津液若用益元妄利小水竭其  
下泉枯槁立至況暑熱蒸動之濕即肥人多有內夾

欽定四庫全書

醫門法律

虛寒因至霍亂吐瀉冷汗四逆動關性命者徒恃益  
元解暑驅濕反促其臟腑氣絕者比比可不辨而輕  
用之歟不特此也凡見汗多之體即不可利其小便  
蓋胃中只此津液夫既外泄又復下行所謂立匱之  
術也仲景名曰無陽其脈見短促結代則去生遠矣  
中暑卒倒無知名曰暑風大率有虛實兩途實者痰之  
實也平素積痰充滿經絡一旦感召盛暑痰阻其氣  
卒倒流涎此濕暍合病之最劇者也宜先吐其痰後



清其暑猶易為也。虛者陽之虛也。平素陽氣衰微，不振陰寒久已用事，一旦感召盛暑邪，湊其虛，此濕暍病之得自虛寒者也。宜回陽藥中兼清其暑，最難為也。丹溪謂火令流，金鑠石，何陰冷之有？立言未免偏執。十中不無二三之誤也。夫峩峩積雪，終古未消，豈以他山不然，遂謂夏月曠剝皆熱火乎？人身之有積陰，乃至湯火不能溫者，何以異此？內經謂無者求之，虛者責之，可見不但有者實者之當求責矣。管見謂

欽定四庫全書

醫門法律

大黃龍丸有中暍昏死，灌之立甦者，非一徵乎？間亦有中氣者，為七情所傷，氣厥無痰，宜用蘇合香丸灌之。許學士云：此氣暴厥逆而然，氣復即已。雖不藥亦愈。然甦後暑則宜清也。

夏月人身之陽以汗而外泄，人身之陰以熱而內耗。陰陽兩俱不足，仲景於中暍病禁用汗下，溫鍼汗則傷其陽，下則傷其陰。溫鍼則引火熱內攻，故禁之也。而其用藥但取甘寒生津保肺固陽益陰為治，此等關



係最鉅今特挈出靈樞有云陰陽俱不足補陽則  
陰竭瀉陰則陽亡蓋謂陽以陰為宅補陽須不傷其  
陰陰以陽為根瀉陰須不動其陽夫既陰陽俱不足  
則補瀉未可輕言纔有補瀉必造其偏如重陰重陽  
之屬其初不過差之毫厘耳所以過用甘溫恐犯補  
陽之戒過用苦寒恐犯瀉陰之戒但用一甘一寒陰  
陽兩無偏勝之藥清解暑熱而平治之所以為百代  
之宗也

欽定四庫全書

醫門法律

合論金匱治暍用白虎加人參湯瓜蒂湯二方

金匱治暍病止出二方一者白虎加人參湯顛治其  
熱以夏月之熱淫必僭而犯上傷其肺金耗其津液  
用之以救肺金存津液也孫思邈之生脈散李東垣  
之清暑益氣湯亦既祖之矣一者瓜蒂散顛治其濕  
以夏月之濕淫上甚為熱亦先傷其肺金故外漬之  
水得以聚於皮間皮者肺之合也用以搐其胸中之  
水或吐或瀉而出則肺氣得以不壅而皮間之水得



以下趨也何後人但宗仲景五苓散為例如河間之  
通苓散子和之桂苓甘露飲非不得導濕消暑之意  
求其引伸瓜蒂湯之制以治上焦濕熱而清夫肺金  
則絕無一方矣故特舉二方合論其義見無形之熱  
傷其肺金則用白虎加人參湯救之有形之濕傷其  
肺金則用瓜蒂湯救之各有所主也二方傷寒瘧濕  
暍篇中不載金匱瘧濕暍篇中復出之金鍼暗度宜  
識之矣

欽定四庫全書

醫門法律

白虎加人參湯 本文云太陽中熱者暍是也其人

汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯主之本方之

義已見尚論一百一十三方中茲再詳之夏月汗

出惡寒者衛氣虛也身熱而渴者肺金受火尅而

燥渴也內經曰心移熱於肺傳為膈消消亦渴也

心火適王肺金受制證屬太陽然與冬月感寒之

治不同用此湯以救肺金是為第一義矣

瓜蒂湯





本文云太陽中暍身疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致一切瓜蒂湯主之 變散為湯而去赤小豆酸漿水獨用瓜蒂一味煎服搗去胸中之水則皮中之水得以俱出也搗中有宣泄之義汗如其故不復水漬皮間矣此即內經以水灌汗乃至不復汗之證仲景會其意言中暍者兼乎中濕有所祖也然水行皮中何以脈見微弱耶蓋中暍脈本虛弱而濕居皮膚內合於肺阻礙榮衛

欽定四庫全書

醫門法律

之運行其脈更見微弱也暍脈虛弱按之無力濕脈微弱舉之不利濕與暍合之脈則舉按皆不利也搗去其水而榮衛通肺氣行舉指流利即濕去之徵按之有力即暍解之徵一物之徵其功效之神且捷者有如此矣

水行皮中乃夏月偶傷之水或過飲冷水或以冷水灌汗因致水漬皮中遏鬱其外出之陽以故身熱疼重用瓜蒂一物驅逐其水則陽氣行而遏鬱



之病解矣凡形寒飲冷則傷肺乃積漸使然此偶  
傷之水不過傷肺所合之皮毛故一搗即通并無  
藉赤小豆酸漿水之羣力也即是推之久傷取冷  
如風寒雨露從天氣而得之者皆足遏鬱其上焦  
之陽又與地氣之濕從足先受宜利其小便者異  
治矣可無辨歟

夏月卒倒不省人事名曰暑風乃心火暴甚暑熱乘之  
令人噎悶昏不知人然亦有他藏素虛暑得深中者

欽定四庫全書

醫門法律

但不似心藏之篤耳如入肝則眩運頑痺入脾則昏  
睡不覺入肺則喘滿痿躄入腎則消渴雖當補益與  
清解兼行然必審其屬於何藏用藥乃得相當也

傷暑之脈內經曰脈虛身熱得之傷暑甲乙經曰熱傷  
氣而不傷形所以脈虛者是也若難經曰其脈浮大  
而散殊有未然夫浮大而散乃心之本脈非病脈也  
仲景不言但補其偏曰弦細芤遲芤即虛豁也弦細  
遲即熱傷氣之應也其水行皮中之脈則曰微弱見



脈為水濕所持陽氣不行也統而言之曰虛分而言之曰弦細芤遲微弱其不以浮大之脈混入虛脈之中稱為病暑之脈慮何周耶

日中勞役而觸冒其暑者此宜清涼解其暑毒如白虎湯益元散黃連香薷飲三黃石膏湯之類皆可取用也

深居廣廈襲風涼飡生冷遏抑其陽而病暑者一切治暑清涼之方即不得徑情直施如無汗仍須透表以

欽定四庫全書

醫門法律

宣其陽如吐利急須和解以安其中甚者少用溫藥以從治之故冒暑之霍亂吐瀉以治暑為主避暑之霍亂吐瀉以和中溫中為主不可不辨也

元豐朝立和劑局萃集醫家經驗之方於中暑一門獨詳以夏月暑證五方歷試見聞廣耳其取用小半夏茯苓湯不治其暑頗治其濕又以半夏茯苓少加甘草名消暑丸見消暑在消其濕名正言順矣其香薷飲用香薷扁豆厚朴為主方熱盛則去扁豆加黃連



為君治其心火濕盛則去黃連加茯苓甘草治其脾  
濕其縮脾飲則以脾為濕所浸淫而重滯於扁豆葛  
根甘草中佐以烏梅砂仁草果以快脾而去脾所惡  
之濕甚則用大順散來復丹以治暑證之多瀉利者  
又即縮脾之意而推之也其枇杷葉散則以胃為濕  
所竊據而濁穢故用香薷枇杷葉丁香白茅香之辛  
香以安胃而去胃所惡之臭甚則用冷香飲子以治  
暑證之多嘔吐者又即枇杷葉散而推之也醫者於

欽定四庫全書

醫門法律

熱濕虛寒淺深緩急間酌而用之其利溥矣而後來  
諸賢以益虛繼之河間之桂苓甘露飲五苓三石意  
在生津液以益胃之虛子和之桂苓甘露飲用人參  
葛根甘草藿香木香益虛之中又兼去濁或用十味  
香薷飲於局方五味中增人參黃芪白朮陳皮木瓜  
益虛以去濕熱乃至東垣之清暑益氣湯人參黃芪  
湯又補中實衛以去其濕熱肥白內虛之人勿論中  
暑與否所宜頻服者也中暑必顯燥煩熱悶東垣倣



仲景竹葉石膏湯之制方名清燥湯仍以去濕為首  
務夫燥與濕相反者也而清燥亦務除濕非東垣具  
過人之識不及此矣又如益元散之去濕而加辰砂  
則并去其熱五苓散之去濕而加人參則益虛加辰  
砂減桂則去熱白虎湯加人參則益虛加蒼朮則勝  
濕合之局方則大備矣然尚有未備焉昌觀暑風一  
證其卒倒類乎中風而不可從風門索治百一選方  
雖有大黃龍丸初不為暑風立法管見從而贊之曰

欽定四庫全書

醫門法律

有中暈昏死灌之立甦則其方亦可得治暑風之一  
斑矣儻或其人陰血素虧暑毒深入血分進以此丸  
寧不立至危殆乎良方復有地榆散治中暑昏迷不  
省人事而欲死者但用平常涼血之藥清解深入血  
分之暑風良莫良於此矣後有用之屢效而美其名  
為潑火散者知言哉夫中天火運流金燦石而此能  
潑之益見暑風為心火暴甚煎熬陰血舍清心涼血  
之外無可撲滅耳綜羣方而論列之以其詳故益加



詳焉

諸方俱彙  
本門後

律十一條

凡治瘧病不察致病之因率爾施治醫之罪也

因者或外感六淫或因發汗過多或因瘡家誤汗或因風病誤下或因灸後火熾或因陰血素虧或因陽氣素弱各各不同不辨其因從何救藥耶

凡治瘧病不深明傷寒經候脈候妄肩其任者醫之罪也 不知邪在何經則藥與病不相當不知脈有可

欽定四庫全書

醫門法律

據則藥徒用而無濟故瘧病之壞不出亡陰亡陽兩途亡陰者精血津液素虧不能榮養其筋脈此宜急救其陰也亡陽者陽氣素薄不能充養柔和其筋脈此宜急救其陽也陰已虧而復補其陽則陰立盡陽已薄而復補其陰則陽立盡不明傷寒經候脈理則動手輒錯何可自貽冥報耶

凡治小兒瘧病妄稱驚風名色輕用鎮驚之藥者立殺其兒此通國所當共禁者也 小兒不耐傷寒壯熱



易至昏沈即於其前放銃吶喊有所不知妄捏驚風  
輕施鎮墜勾引外邪深入內藏千中千死從未有一  
救者通國不為共禁寧有底止哉

凡治產後瘧病妄稱產後驚風輕用鎮驚之藥者立

殺其婦此庸工所當知警者也 產後血舍空虛外

風易入仲景謂新產亡血虛多汗出喜中風故令病

瘧後賢各從血舍驅風成法可遵非甚不肖者必不

妄用鎮驚之藥不似小兒驚風之名貽害千古在賢

欽定四庫全書

醫門法律

智且不免焉茲約通國共為厲禁革除驚風二字不

許出口入耳凡兒病發熱昏沈務擇傷寒名家循經

救治百不失一於以打破小兒人鬼關人天共快也

凡治濕病禁發其汗而陽鬱者不微汗之轉致傷人醫

之過也 濕家不可發汗以身本多汗易至亡陽故

濕溫之證誤發其汗名曰重暈此為醫之所殺古律

垂戒深矣其久冒風涼恣食生冷乃至以水灌汗過

抑其陽者不微汗之病無從解內經謂當暑汗不出



者秋風成癰亦其一也不當汗者反發其汗當微汗者全不取汗因噎廢食此之謂矣

凡治濕病當利小便而陽虛者一概利之轉至殺人醫之罪也 濕家當利小便此大法也而真陽素虛之人汗出小便滴瀝正泉竭而陽欲出亡之象若以為濕熱恣膽利之真陽無水維附頃刻脫離而死矣此法所不禁中之大禁也

凡治中濕危篤之候即當固護其陽若以風藥勝濕是

欽定四庫全書

醫門法律

為操刃即以溫藥理脾亦為待斃醫之罪也

人身陽盛則輕矯濕盛則重著乃至身重如山百脈痛楚不能轉側此而不用附子回陽勝濕更欲何待在表之濕其有可汗者用附子合桂枝湯以驅之外出在裏之濕其有可下者用附子合細辛大黃以驅之下出在中之濕則用附子合白朮以溫中而燥其脾今之用白朮而雜入羌防枳朴梔橘等藥且無濟於事況用枳榔滑石舟車導水瀘川等法乎





凡治中暑病不辨外感內傷動靜勞逸一槩襲用成方者醫之罪也 傷寒夾陰誤用陽旦湯得之便厥傷暑夾陰誤用香薷飲入喉便暗後賢於香薷飲中加人參黃芪白朮陳皮木瓜兼治內傷誠有見也而不辨證者之貽誤寧止此乎

凡治中暑病不兼治其濕者醫之過也

熱蒸其濕是為暑無濕則但為乾熱而已非暑也故肥人濕多即病暑者多瘦人火多即病熱者多

欽定四庫全書

醫門法律

凡治中暑病遇無汗者必以得汗為正若但清其內不解其外醫之罪也 中暑必至多汗反無汗者非因水濕所持即為風寒所閉此宜先散外邪得汗已方清其內若不先從外解則清之不勝清究成癰痢等患貽累無窮

凡治中暑病無故妄行溫補致令暑邪深入逼血妄行醫之罪也 暑傷氣纒中即慄慄短息有似乎虛故清暑益氣兼而行之不知者妄行溫補致令暑邪深



醫門法律卷七								欽定四庫全書	醫門法律						誤以溫治其害無窮也	入血分而成衄痢即遇隆冬大寒漫無解期故熱邪
--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--	--	--	--	--	-----------	----------------------



欽定四庫全書

子部  
醫門法律卷八

詳校官八醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣盧澂

謄錄監生臣鄒世俊



欽定四庫全書

醫門法律卷八

南昌喻昌撰

傷燥門

論一首  
律五條

法十一條

秋燥論

喻昌曰燥之與濕有霄壤之殊燥者天之氣也濕者地之氣也水流濕火就燥各從其類此勝彼負兩不相謀春月地氣動而濕勝斯草木暢茂秋月天氣肅而燥勝

欽定四庫全書

醫門法律

斯草木黃落故春分以後之濕秋分以後之燥各司其政今指秋月之燥為濕是必指夏月之熱為寒然後可奈何內經病機一十九條獨遺燥氣他凡秋傷於燥皆謂秋傷於濕歷代諸賢隨文作解弗察其訛昌特正之大意謂春傷於風夏傷於暑長夏傷於濕秋傷於燥冬傷於寒覺六氣配四時之旨與五運不相背戾而千古之大疑始一抉也然則秋燥可無論乎夫秋不遽燥也大熱之後繼以涼生涼生而熱解漸至大涼而燥令乃



行焉經謂陽明所至始為燥終為涼者亦誤文也豈有  
新秋月華露湛星潤淵澄天香遍野萬寶垂實歸之燥  
政迨至山空月小水落石出天降繁霜地凝白鹵一往  
堅急勁切之化反謂涼生不謂燥乎或者疑燥從火化  
故先燥而後涼此非理也深乎深乎上古脈要曰春不  
沈夏不弦秋不數冬不濇是謂四塞謂脈之從四時者  
不循序漸進則四塞而不通也所以春夏秋冬孟月之  
脈仍循冬春夏秋季月之常不改其度俟二分二至以

欽定四庫全書

醫門法律

後始轉而從本令之王氣乃為平人順脈也故天道春  
不分不溫夏不至不熱自然之運悠久無疆使在人之  
脈方春即以弦應方夏即以數應躁促所加不三時而  
歲度終矣其能長世乎即是推之秋月之所以忌數脈  
者以其新秋為燥所勝故忌之也若不病之人新秋而  
脈帶微數乃天真之脈何反忌之耶且夫始為燥終為  
涼涼已即當寒矣何至十月而反溫耶涼已反溫失時  
之序天道不幾頓乎不知十月之溫不從涼轉正從燥



生蓋金位之下火氣承之以故初冬常溫其脈之應仍  
從乎金之濇耳由濇而沈其濇也為生水之金其沈也  
即為水中之金矣珠輝玉映傷燥云乎哉然新秋之涼  
方以却暑也而夏月所受暑邪即從涼發經云當暑汗  
不出者秋成風癘舉一癘而凡當風取涼以水灌汗迺  
至不復汗而傷其內者病發皆當如癘之例治之矣其  
內傷生冷成滯下者并可從癘而比例矣以其原來皆  
暑濕之邪外內所主雖不同同從秋風發之耳若夫深

欽定四庫全書

醫門法律

秋燥金主病則大異焉經曰燥勝則乾夫乾之為害非  
遽赤地千里也有乾於外而皮膚皴揭者有乾於內而  
精血枯涸者有乾於津液而榮衛氣衰肉爍而皮著於  
骨者隨其大經小絡所屬上下中外前後各為病所燥  
之所勝亦云燥矣至所傷則更厲燥金所傷本摧肝木  
甚則自戕肺金蓋肺金主氣而治節行焉此惟土生之  
金堅剛不撓故能生殺自由紀綱不紊若病起於秋而  
傷其燥金受火刑化剛為柔方圓且隨型埴欲仍清肅



之舊其可得耶經謂欬不止而出白血者死白血謂色  
淺紅而似肉似肺者非肺金自削何以有此試觀草木  
菁英可掬一乘金氣忽焉改容焦其上首而燥氣先傷  
上焦華蓋豈不明耶詳此則病機之諸氣贖鬱皆屬於  
肺諸痿喘嘔皆屬於上二條明指燥病言矣生氣通天  
論謂秋傷於燥上逆而欬發為痿厥燥病之要一言而  
終與病機二條適相脗合祇以誤傳傷燥為傷濕解者  
競指燥病為濕病遂至經旨不明今一論之而燥病之

欽定四庫全書

醫門法律

機了無餘義矣其左肱脇痛不能轉側噤乾面塵身無  
膏澤足外反熱腰痛驚駭筋攣丈夫癩疝婦人少腹痛  
目昧眚瘡則燥病之本於肝而散見不一者也內經燥淫  
所勝其主治必以苦溫者用火之氣味而制其勝也其  
佐以或酸或辛者臨病制宜宜補則佐酸宜寫則佐辛  
也其下之亦以苦溫者如清甚生寒留而不去則不當  
用寒下宜以苦溫下之即氣有餘亦但以辛寫之不以  
寒也要知金性畏熱燥復畏寒有宜用平寒而佐以苦



甘者必以冷熱和平為方制乃盡善也又六氣凡見下承之氣方制即宜少變如金位之下火氣承之則苦溫之屬宜減恐其以火濟火也即用下亦當變苦溫而從寒下也此內經治燥淫之旨可贊一辭者也至於肺氣臄鬱痿喘嘔欬皆傷燥之劇病又非制勝一法所能理也茲併入燥門細商良治學者精心求之罔不獲矣若但以潤治燥不求病情不適病所猶未免涉於麓踈耳痺論云陰氣者靜則神藏躁則消亡下文但言飲食自

欽定四庫全書

醫門法律

倍腸胃乃傷曾不及於肺也其所以致躁而令陰氣消亡之故引而未發也至靈樞云形寒飲冷則傷肺始知傷肺關於寒冷矣可見肺氣外達皮毛內行水道形寒則外寒從皮毛內入飲冷則水冷從胸中上溢遏抑肺氣不令外揚下達其治節不行周身之氣無所稟仰而肺病矣究竟肺為嬌臟寒冷所傷者十之二三火熱所傷者十之七八寒冷所傷不過裹束其外火熱所傷則更消燼其中所以為害倍烈也然





火熱傷肺以致諸氣臏鬱諸痿喘嘔而成躁病百道  
方中率皆依樣葫蘆如烏藥香附紫蘇半夏茯苓厚  
朴丁沈訶蔻薑桂蓬稜枳榔益智之屬方方取足祇  
因內經脫遺躁證後之無識者競皆以躁治躁恬於  
操刃曾不顧陰氣之消亡耳

雖以東垣之大賢其治躁諸方但養榮血及補肝腎虧  
損二便閉結而已初不論及於肺也是非謂中下二  
焦有躁病而上焦獨無也不過闕經旨傷濕之疑遂

欽定四庫全書

醫門法律

因仍不察耳夫諸氣臏鬱之屬於肺者屬於肺之燥  
非屬於肺之濕也苟肺氣不燥則諸氣稟清肅之令  
而週身四達亦胡致臏鬱耶諸痿喘嘔之屬於上者  
上亦指肺不指心也若統上焦心肺並言則心病不主  
痿喘及嘔也惟肺燥甚則肺策痿而不用肺氣逆  
而喘鳴食難過膈而嘔出三者皆燥證之極者也經  
文原有逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿之文其可稱  
為濕病乎更考東垣治肺消方中引用白苳蔻葶澄



茄及治諸氣方中雜用辛香行氣之藥覺於傷燥一途有未悉耳又如丹溪折衷雜證為後代所宗亦無一方一論及於肺燥但於熱鬱湯下云有陰虛而得之者有胃虛食冷物抑遏陽氣於脾土中而得之者其治法皆見發熱條中此治非陰虛非陽陷亦不發熱而常自蒸蒸不解者夫蒸蒸不解非肺氣為熱所內蒸而不能外達耶方用蓮翹薄荷葉黃芩山梔仁麥門冬甘草鬱金瓜蒌皮穰八味竹葉為引方後復

欽定四庫全書

醫門法律

設為問答云何不用蒼朮香附撫芎曰火就燥燥藥皆能助火故不用也似此一方示不欲以燥助火之意於熱鬱之條其不敢以燥益燥重傷肺金隱然可會何為不立燥病一門暢發其義耶又如繆仲醇治病所用者無非四君四物二冬二母沙參玄參黃芪山藥蘓子橘紅桑葉枇杷葉杏仁棗仁扁豆蓮心瓜蒌五味升葛柴前芩連梔栝滑石石膏菊花枸杞牛膝續斷薏苡木瓜胡麻首烏豆豉霜梅膠飴之屬千方



一律不過選擇於此增入對證一二味自成一家識者稱其不盡用方書所載投之輒効蓋獨開門戶者也又有稱其精於本草擇用五六十種無過之藥屢獲竒驗無以多為者昌謂不然世之患燥病者多仲醇喜用潤劑於治燥似乎獨開門戶然亦聰明偶合未有發明可以治內傷之燥不可以治外感之燥何況風寒暑濕哉節取其長可矣

內經云心移熱於肺傳為鬲消肺燥之繇來者遠矣苟

欽定四庫全書

醫門法律

其人腎水足以上升而交於心則心火下降而交於腎不傳於肺矣心火不傳於肺曾何傷燥之虞哉即腎水或見不足其腸胃津血足以協濟上供肺亦不致過傷也若夫中下之澤盡竭而高源之水猶得措於不傾則必無之事矣所以經文又云二陽結謂之消手陽明大腸熱結而津不潤足陽明胃熱結而血不榮證成消渴舌上赤裂大渴引飲與心移熱於肺傳為鬲消文雖異而義則一也治鬲消者用白虎加人



參湯頴救其肺以施於諸氣贖鬱諸痿喘嘔罔不合  
矣學者可不知引伸觸類以求坐進此道耶

陰陽別論云二陽之病發心脾有不得隱曲男子少精  
女子不月其傳為風消其傳為息賁死不治此亦肺  
燥所繇來而未經揭出者夫燥而令男子精液衰少  
女子津血枯閉亦云極矣然其始但不利於隱曲之  
事耳其既則胃之燥傳入於脾而為風消風消者風  
熱熾而肌肉消削也大腸之燥傳入於肺而為息賁

欽定四庫全書

醫門法律

息賁者息有音而上奔不下也是則胃腸合心脾以  
共成肺金之燥三藏二府陰氣消亡殆盡尚可救療  
乎夫由心之肺已為死陰之屬然脾氣散二陽之精  
上輸於肺猶得少甦涸鮒今以燥之為害令生我者  
盡轉而浚我之生故直斷為死不治也從前憤憤特  
繹明之

病機十九條內云諸瀆枯涸乾勁皴揭皆屬於燥燥金  
雖為秋令雖屬陰經然異於寒濕同於火熱火熱勝



則金衰火熱勝則風熾風能勝濕熱能耗液轉令陽  
實陰虛故風火熱之氣勝於水土而為燥也

肝主於筋風氣自甚燥熱加之則液聚於胸膈不榮於  
筋脈而筋燥故勁強緊急而口噤或癱瘓昏冒僵仆  
也

風熱燥甚怫鬱在表而裏氣平者善伸數欠筋脈拘急  
或時惡寒或筋惕而搐脈浮數而弦若風熱燥并鬱  
甚於裏則必為煩滿必為悶結故燥有表裏氣血之

欽定四庫全書

醫門法律

分也

至於筋緩不收痿痺不仁因其風熱勝濕為燥日久乃  
燥病之甚者也至於諸氣臏鬱諸痿喘嘔皆屬於肺  
金從燥化金且自病而肺氣日見消亡又何論痿痺  
乎

五藏五志之火皆有真液以養之故凝聚不動而真液  
尤賴腎之陰精胃之津液交灌於不竭若腎胃之水  
不繼則五藏之真陰隨耗五志之火翕然內動而下



上中三消之病作矣河間云燥太甚而脾胃乾涸則成消渴亦其一也

燥病必渴而渴之所屬各不同有心肺氣厥而渴有肝痺而渴有脾熱而渴有腎熱而渴有胃與大腸結熱而渴有小腸痺熱而渴有因病瘧而渴有因素食肥甘而渴有因醉飲入房而渴有因遠行勞倦遇大熱而渴有因傷害胃乾而渴有因風而渴五藏部分不同病之所遇各異其為燥熱亡液則一也另詳消渴

欽定四庫全書

醫門法律

門

治燥病者補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸中燥熱之甚濟胃中津液之衰使道路散而不結津液生而不枯氣血利而不瀦則病日已矣

腎惡燥急食辛以潤之故腎主五液津則大便如常若饑飽勞逸損傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪伏於血中耗散真陰津液虧少故大便結燥仲景云小便利大便硬不可攻下以脾約丸潤之戒輕下而



重傷津液也然藏結復有陽結陰結之不同陽結者以辛涼潤之陰結者以辛溫潤之其辨又在微芒之間矣

律五條

凡秋月燥病誤以為濕治者操刃之事也從前未明咎猶可諉今明知故犯傷人必多孽鏡當前悔之無及凡治燥病燥在氣而治血燥在血而治氣燥在表而治裏燥在裏而治表藥不適病醫之過也

欽定四庫全書

醫門法律

凡治雜病有兼帶燥證者誤用燥藥轉成其燥因致危困者醫之罪也

凡治燥病須分肝肺二藏見證肝藏見證治其肺燥可也若肺藏見證反治其肝則坐誤矣醫之罪也肝藏見燥證固當急救肝葉勿令焦損然清其肺金除其燥本尤為先務若肺金自病不及於肝即頗力救肺焦枯且恐立至尚可分功緩圖乎

凡治燥病不深達治燥之旨但用潤劑潤燥雖不重傷



亦誤時日祇名龕工所當戒也

熱濕暑三氣門諸方

瘧病廿方 熱病十五方 溫病十五方 暑病三

十二方

括萋根桂枝湯方

全匱方  
論具本門前

括萋根 二兩 桂枝 三兩 芍藥 三兩 甘草 二兩 生薑 三兩 大棗 十二枚

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微汗汗不出食頃食熱粥發之

欽定四庫全書

醫門法律

按此方原是不欲發汗之意以夏月縱不得汗服藥亦易透出也若服此食頃不得汗當食熱粥發之所以桂枝有汗能止無汗能發也然既以括萋根為君當增之桂枝為臣當減之大約括萋根三錢桂枝一錢五分芍藥二錢甘草一錢五分生薑三片大棗二枚無汗發以熱粥連服三劑可也蓋濕持其汗或兼微受風寒營衛不和設不用此通其營衛則未瘧者成瘧已瘧者難愈矣 凡用古方分兩當倣此裁酌





葛根湯方

金匱方  
論具本門中

葛根

四兩

桂枝

三兩

麻黃

三兩

芍藥

二兩

甘草

二兩

生薑

三兩

棗

十二枚

十二枚

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫

內諸藥煮取三升溫服一升覆取微似汗不須啜粥

餘如桂枝湯方法及禁忌

按此方為夏月傷寒脈緊發熱無汗者而設仲景云

夏月脈洪大者是其本位若其人病苦頭疼發熱無

欽定四庫全書

醫門法律

汗者須發其汗亦此意也然身纔有潤便撤其覆勿

令汗出為節可矣

大承氣湯方

金匱方  
論具本門

大黃

四兩

厚朴

半斤炙  
去皮

枳實

三枚

芒硝

一合

右四味以水一斗先煮二味取五升去滓內大黃煮

取二升去滓內芒硝更上火微一二沸分溫再服得

下止服

按此治瘧病之極重難返死裏求生之法在邪甚而



<p>正未大傷者服此十有九活所以仲景著之為法也</p>	<p>麻黃加獨活防風湯 <small>治剛瘧</small></p>	<p>麻黃 <small>去節</small> 桂枝 <small>各一兩</small> 芍藥 <small>三兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 獨活 防風 <small>各一兩</small></p>	<p>右剉細每服一兩用水二鍾煎至一鍾半溫服指爪</p>	<p>乾燥屬風熱甚者</p>	<p>方見三卷中風門</p>	<p>元戎四物湯 治臟結祕澹者</p>	<p>欽定四庫全書 <small>醫門法律</small></p>	<p>當歸 熟地黃 川芎 白芍藥 大黃 <small>煨</small> 桃仁</p>	<p><small>各等分水煎或丸</small></p>	<p>丹谿大補丸</p>	<p>降陰火補腎水治陰虛燥熱</p>	<p>黃栢 <small>炒褐</small> 知母 <small>酒浸炒</small> 熟地黃 <small>酒蒸</small> 敗龜板 <small>酥炙黃</small></p>	<p>右為末猪脊髓和煉蜜丸如桐子大每七十九空心</p>	<p>淡鹽湯送下</p>	<p>六味地黃丸</p>
-----------------------------	------------------------------------	--	-----------------------------	----------------	----------------	---------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------	--------------	--------------------	--	-----------------------------	--------------	--------------



<p>治下焦燥熱小便澀而數又治腎氣虛久新憔悴          寢汗發熱五臟齊損瘦弱虛煩骨蒸下血自汗盜          汗水泛為痰咽燥口渴眼花耳聾等證功效不能          盡</p>	<p>懷熟地 <small>八兩</small> 山茱萸肉 乾山藥 <small>各四兩</small> 牡丹皮</p>	<p>白茯苓 澤瀉 <small>各三兩</small></p>	<p>右各另為末和地黃膏加煉蜜丸桐子大每服七八</p>	<p>十丸空心食前滾湯下</p>	<p>欽定四庫全書          醫門法律</p>	<p>自製清燥救肺湯 治諸氣膹鬱諸痿喘嘔</p>	<p>桑葉 <small>經霜者得金氣而柔潤不凋取之為君去枝梗三錢</small> 石膏 <small>煑稟清肅之氣極清肺熱二錢</small></p>	<p>五錢甘草 <small>和胃生金一錢</small> 人參 <small>生胃之津養肺之氣七分</small> 胡麻仁 <small>炒研一錢</small> 真阿</p>	<p>膠 <small>八分</small> 麥門冬 <small>去心一分</small> 杏仁 <small>炮去皮尖炒黃七分</small> 枇杷葉 <small>一片刷去毛蜜</small></p>	<p>黃 塗灸</p>	<p>水一碗煎六分頻頻二三次滾熱服痰多加貝母瓜</p>	<p>萸血枯加生地黃熱甚加犀角羚羊角或加牛黃</p>	<p>昌按諸氣膹鬱之屬於肺者屬於肺之燥也而古今</p>
---	--	----------------------------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------	--------------------------	--	---	---	-------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------



治氣鬱之方用辛香行氣絕無一方治肺之燥者諸  
痿喘嘔之屬於上者亦屬於肺之燥也而古今治法  
以痿嘔屬陽明以喘屬肺是則嘔與痿屬之中下而  
惟喘屬之上矣所以千百方中亦無一方及於肺之  
燥也即喘之屬於肺者非表即下非行氣即瀉氣間  
有一二用潤劑者又不得其肯綮總之內經六氣脫  
悞秋傷於燥一氣指長夏之濕為秋之燥後人不敢  
更端其說置此一氣於不理即或明知理燥而用藥

欽定四庫全書

醫門法律

夾雜如弋獲飛蟲茫無定法示人也今擬此方命名  
清燥救肺湯大約以胃氣為主胃土為肺金之母也  
其天門冬雖能保肺然味苦而氣滯恐反傷胃阻痰  
故不用也其知母能滋腎水清肺金亦以苦而不用  
至如苦寒降火正治之藥尤在所忌蓋肺金自至於  
燥所存陰氣不過一綫耳倘更以苦寒下其氣傷其  
胃其人尚有生理乎誠倣此增損以救肺燥變生諸  
症如沃焦救焚不厭其頻庶克有濟耳



燥門諸方

滋燥養榮丸

治皮膚皴揭筋燥爪乾

當歸酒洗 生地黃 熟地黃 白芍藥 秦艽

黃芩各一錢半 防風一錢 甘草五分 水煎服

大補地黃丸 治精血枯涸燥熱

黃栢鹽酒炒 熟地黃酒蒸各四兩 當歸酒洗 山藥 枸杞子

甘州佳 知母鹽酒炒 山茱肉 白芍藥各二兩 生地黃

欽定四庫全書

醫門法律

二兩 肉蓯蓉酒浸 玄參各一兩半

右為細末煉蜜丸如桐子大每服七八十丸空心淡

鹽湯送下

東垣潤腸丸

治脾胃中伏火大便秘澇或乾燥閉塞不通全不

思食乃風結秘皆令閉塞也以潤燥和血疎風自

然通矣

麻子仁 桃仁 羌活 當歸尾 大黃煨各半兩 皂



<p>角仁 秦艽 <small>錢各五</small></p>	<p>右除另研外為細末五上火煉蜜丸如桐子大每服三五丸食前白湯下又有潤燥丸一方本方加郁李仁防風</p>	<p>東垣導滯通幽湯</p>	<p>治大便難幽門不通上沖吸門不開噎塞不便燥祕氣不得下治在幽門以辛潤之</p>	<p>當歸 升麻 桃仁 <small>另研各一錢</small> 生地黃 熟地黃 <small>各五</small></p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p><small>分</small> 紅花 甘草 <small>灸各三分</small></p>	<p>右作一服水煎調栴榔末五分服加大黃名當歸潤燥湯</p>	<p>清涼飲子 <small>一名生液 甘露飲</small></p>	<p>治上焦積熱口舌咽鼻乾燥</p>	<p>黃芩 黃連 <small>錢各二</small> 薄荷 玄參 當歸 芍藥 <small>各一</small></p>	<p><small>錢五</small> 甘草 <small>錢一</small></p>	<p>水二鍾煎八分不拘時服大便秘結加大黃二錢</p>
---------------------------------	--	----------------	---	--	------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------	---	---	----------------------------



大秦苳湯

治血弱陰虛不能養筋筋燥而手足不能運動

按此方乃後人假托仲景之名而立以治風濕相搏  
骨節煩疼無汗而成剛痲者然無引及服法殊不精  
詳當知前葛根湯方內去葛根加獨活防風與此無  
二但引及服法詳明耳

海藏神朮湯

治內傷冷飲外感  
寒邪而無汗者

蒼朮

製

防風

各二兩

甘草

一兩炒

欽定四庫全書

醫門法律

右咬咀加葱白生薑同煎服如太陽證發熱惡寒脈  
浮而緊者加羌活二錢太陽脈浮緊中帶弦數者是  
兼少陽加柴胡二錢太陽脈浮緊帶洪者是兼陽明  
加黃芩二錢婦人加當歸或加木香湯或加藁本湯  
如乳吹煎成調六一散三五錢

按此海藏得意之方也以治春夏外感寒邪內傷生  
冷發熱而無汗者即痲病亦可用之蓋不欲無識者  
輕以麻黃桂枝之熱傷人也夫麻黃桂枝遇濕熱時



令原不敢輕用即有宜用之證十中不過一二而已

昌明仲景不得不表揚海藏之功

海藏白朮湯

治內傷冷物外感風寒有汗者

白朮

三兩

防風

二兩

甘草

一兩

炙

右咬咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分溫服一

日止用一二服待二三日漸漸汗少為解

按二朮最能行濕夏月分有汗無汗用之所以為神

海藏白朮湯加藥法

上解三陽下安太陰

欽定四庫全書

醫門法律

白朮

如欲汗之解用蒼朮

防風

各一兩

右咬咀水煎至七分溫服若發熱引飲者加黃芩甘

草若頭疼惡風者加羌活散羌活一錢五分川芎七

分五釐細辛五分是也若身熱目痛者加石羔湯石

羔二錢半知母八分白芷一錢是也腹中痛者加芍

藥湯芍藥二錢桂枝一錢是也往來寒熱而嘔者加

柴胡散柴胡二錢半夏一錢是也心下痞者加枳實

一錢若有裏證加大黃一錢量虛實加減之邪去止





服

三方總稱神朮所稱上解三陽下安太陰縱未必然而太陰脾惡濕者也夏月預清其濕俾不與熱邪相合其得力不亦多乎

海藏桂枝葛根湯

治傷風項背強及有汗不惡風柔瘧即仲景桂枝湯去麻黃也若無汗之剛瘧又必用麻黃矣可見麻黃桂枝夏月原有不得不用之病蓋邪在太陽

欽定四庫全書

醫門法律

通其營衛則外受之邪有出無入其所全不更大乎但未可執為常法耳學者參之

海藏桂枝加川芎防風湯

治發熱自汗而不惡寒者名曰柔瘧即仲景葛根湯去麻黃葛根加川芎防風也

海藏柴胡加防風湯

治汗後不解乍靜乍躁目直視口噤往來寒熱脈弦此少陽風瘧



<p>柴胡 防風 各一兩 半夏 製六錢 人參 各五錢 黃芩 各五錢 薑 各六錢 甘草 五分 大棗 三枚</p>	<p>每服一兩水三盞煎一盞半去渣溫服</p>	<p>海藏防風當歸湯</p>	<p>治發汗過多發熱頭面搖卒口噤背反張者太陽</p>	<p>兼陽明也宜去風養血</p>	<p>防風 當歸 川芎 地黃 各一兩</p>	<p>每服一兩水三盞煎至二盞溫服</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>按瘧病本太陽經病太陽日久勢必傳遍六經然必兼乎太陽二方治太陽兼少陽太陽兼陽明論證頗詳超越尋常萬萬惜其於三陰之瘧獨詳太陰連出五方似欲推及少陰厥陰而未明言觀其後三方項下云手足厥冷筋脈拘急意可識矣然終是三陰混同立治未有精詳且三陰經既有陰瘧矣又豈無陽瘧耶此等處合尚論篇三陰經細參自為得師可矣 海藏八物白朮散</p>
---	------------------------	----------------	----------------------------	------------------	------------------------	----------------------	------------------------	---



治傷寒陰瘧三日面腫手足厥冷筋脈拘急汗不出恐陰氣內傷

白朮 茯苓 五味子 各半 桂心 三分 麻黃 兩半 良薑 一分 羌活 兩半 附子 三分

每服四錢水一大盞薑五片同煎至五分去渣溫服無時

按此方乃太陽兼三陰之證治也

海藏桂枝加芍藥防風防己湯

欽定四庫全書

醫門法律

治發熱脈沈而細者附太陰也必腹痛

桂枝 一兩半 防風 防己 各一兩 芍藥 二兩 生薑 一兩半 大棗 六枚

每服一兩水三盞煎至一盞半去渣溫服亦宜服小續命湯

按脈沈而細未是太陰確證少陰亦有發熱者服此方及小續命湯恐有不對

海藏附子散



治傷寒陰瘧手足厥冷筋脈拘急汗出不止頭項  
強直頭搖口噤

桂心三錢 附子一兩 白朮一兩 川芎三錢 獨活半兩

每服三錢水一盞棗一枚煎至五分去渣溫服

海藏桂心白朮湯

治傷寒陰瘧手足厥冷筋脈拘急汗出不止

白朮 防風 甘草 桂心 川芎 附子各等分

每服五錢水二鍾生薑五片棗二枚同煎至七分去

欽定四庫全書

醫門法律

查溫服

海藏附子防風散

治傷寒陰瘧閉目合面手足厥逆筋脈拘急汗出

不止

白朮一兩 防風 甘草 茯苓 附子 乾薑各七錢五

分柴胡 五味各一兩 桂心半兩

每服三錢生薑四片同煎去渣溫服

按三方俱用白朮在內原為太陰而設然俱云汗出



<p>不止則陽亡於外津亡於內方中每兼表散何耶況筋脈拘急全賴陽氣以柔和之陰津以灌潤之方中兩不相照殊有未到也</p>	<p>羚羊角散 <small>此四方另選附益</small></p>	<p>治傷寒陽瘧身熱無汗惡寒頭項強直四肢疼痛</p>	<p>煩躁心悸睡卧不得</p>	<p>羚羊角 <small>屑</small> 犀角 <small>屑</small> 防風 茯神 柴胡 麥門冬 人參 葛根 枳壳 甘草 <small>炙各二錢五分</small> 石膏 龍</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>齒 <small>各五錢</small></p> <p>右呶咀每服五錢水一鍾煎至五分去渣溫服不拘時</p>	<p>按此方治陽瘧深得清解之法</p>	<p>麥門冬散</p> <p>治傷寒陽瘧身體壯熱項背強直心膈煩燥發熱惡寒頭面赤色四肢疼痛</p>	<p>麥門冬 地骨皮 麻黃 <small>去節</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 知母 黃</p>
--	------------------------------------	----------------------------	-----------------	---	--------------------	--	---------------------	--	--



<p>芩 赤芍藥 白蘚皮 杏仁<small>麸炒去皮尖</small> 甘草<small>炙</small> 犀角屑<small>各七分半</small></p>	<p>右咬咀每服五錢水一大盞煎至五分去渣溫服不拘時</p>	<p>按此方徑用麻黃不用防柴葛枳其意更深但羚羊石膏似不可少</p>	<p>石膏散</p>	<p>治傷寒陽瘧通身壯熱目眩頭痛</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>石膏<small>二兩</small> 秦艽<small>去土</small> 龍齒<small>各一兩</small> 犀角屑 前胡<small>各半兩</small></p>	<p>右咬咀每服五錢水一大盞入豆豉五十粒葱白七莖同煎至五分去渣入牛黃末一字攪令勻溫服不拘時</p>	<p>按三方俱用龍齒之瀋似有未當餘藥則各極其妙此方用豆豉葱白作引調入牛黃末更妙</p>	<p>牛黃散</p>	<p>治傷寒陽瘧發熱惡寒頭項強直四肢拘急心神</p>
---	-------------------------------	-----------------------------------	------------	----------------------	------------------------	--	---	---	------------	----------------------------



煩躁

牛黃另研麝香另研犀角屑水飛硃砂水飛人參 赤茯苓

防風 芎藭 甘草 麥門冬 桂心 地骨

皮 天麻各二錢半

右為細末研勻每服二錢竹瀝調下不拘時

按發熱惡寒之證邪在經絡此一方直攻神明何耶

即謂邪入心胞用犀羚羊牛黃足矣何并硃砂麝香而

用之毋乃開門延寇乎

欽定四庫全書

醫門法律

海藏愈風湯一名懸卿古拜飲

治一切失血筋脈緊急產後與汗後搐搦

荆芥為細末

先以炒大豆黃卷以酒沃之去黃卷取清汁調前末

三五錢和查服之輕者一服重者二三服即止氣虛

者忌服童便調亦可

按此海藏治風人血分之方與瘧病無涉然而金匱

有垂戒二條云夫風病下之則瘧復發汗必拘急又



云瘡家雖身疼痛不可發汗汗出則瘡設使不發汗 但用此方治之亦何遽成瘡病耶蓋邪風從虛而入 補則補其邪汗則傷其正惟先服此出其風隨即補 之乃為要訣耳	以上 治瘡	人參瀉肺湯	治熱十 五方	治肺經積熱上喘嗽胸膈脹滿痰多大便澀	人參 黃芩 梔子仁 枳殼 <small>炒</small> 薄荷 甘草	連翹 杏仁 <small>去皮尖</small> 桑白皮 大黃 桔梗 <small>各等分</small>	欽定四庫全書 醫門法律	每服七錢水二盞煎八分食後通口服	按人參肺熱反能傷肺此清肺經積熱以人參瀉肺 立名可見瀉其肺熱必不可傷其肺氣也況人參之 溫以一味清涼監之有餘如此大隊寒下之藥不推 之為君其敢用乎	天門冬散	治肺壅腦熱鼻乾大便秘澀	天門冬 <small>去心</small> 桑白皮 升麻 大黃 枳殼 <small>炒</small> 甘草
--	----------	-------	-----------	-------------------	-------------------------------------	---	----------------	-----------------	---	------	-------------	--





水二盞薑三片煎八分食前服	黃芩 車前 滑石 甘草 <small>各等分</small>	赤茯苓 猪苓 葵子 枳實 瞿麥 木通	治膀胱實熱小便不通口苦舌乾咽腫不利	赤茯苓湯	羊角猪膽汁之屬加入一二味為切	按此方雖曰治膽熱尚有未備如柴胡人參青黛羚羊角猪膽汁之屬加入一二味為切	長流水二盞煎八分食後溫服	欽定四庫全書 醫門法律	各八分 黍米 合酸棗仁 <small>微炒研</small>	半夏 麩 黃芩 軍薑 <small>炮</small> 遠志 <small>去心</small> 茯苓 生地黃	治膽熱精神不守熱泄	半夏湯	焦壅熱可取	按此方藥味較前少減然用升麻且升且降以散上	水二盞煎八分食後溫服	各八分 荆芥 <small>一錢</small>
--------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------	------	----------------	------------------------------------	--------------	----------------	-----------------------------------	---	-----------	-----	-------	----------------------	------------	-----------------------------



按此方不清肺熱顛利小便且有降無升上竅不開  
徒開其下是名霸道是為劫法庸醫多蹈此

龍腦雞蘇丸

除煩熱鬱熱肺熱咳嗽吐血鼻衄血崩消渴驚悸

解酒毒膈熱口臭口瘡清心明目

薄荷葉 一兩 生地黄 六錢 麥門冬 四錢 蒲黃 炒 阿膠

炒各 黃芪 一錢 人參 木通 各二錢 甘草 半錢 銀柴胡 用

通浸二日  
取汁入膏

欽定四庫全書

醫門法律

右為末用蜜三兩煉過後下地黄汁等藥熬成膏丸

如梧桐子大每服二十九丸嚼碎湯送下

按此丸兩解氣分血分之熱有益無損宜常製用之

利膈散

治脾肺大熱虛煩上壅咽喉生瘡

雞蘇葉 荊芥穗 防風 桔梗 牛蒡子 炒 人

參 甘草 各一兩

右為末每服二錢不拘時沸湯點服咽痛口瘡甚加



僵蠶一兩

按此方清上焦熱全用辛涼輕清之氣不雜苦寒降下之味其見甚超較涼膈散更勝

地黃煎 治積熱

地黃汁 四升 茯苓 三合 知母 各四兩 葳蕤 四兩 括蔞根

生薑汁 鮮地骨皮 生麥冬汁 白蜜 各二升 石

膏 八兩 竹瀝 三合

右呶咀以水一斗零二升先煮諸藥取汁三升去渣

欽定四庫全書

醫門法律

下竹瀝地黃麥冬汁緩火煎四五沸下蜜薑汁微火煎至出六升初服四合日三服夜一服加至五七合四五月作散服之

按此方生津涼血制火徹熱兼擅其長再加人參乃治虛熱之聖方也

碧雪

治一切積熱咽喉口舌生瘡心中煩躁嚙物妨悶致咽閉壅塞及天行時熱發強昏憤



芒硝 朴硝 硝石 馬牙硝 青黛 石膏

寒水石 水研 甘草 各等分

右將甘草煎湯二升去渣卻入諸藥再煎用柳木棍  
不住手攪令消溶得所卻入青黛和勻傾入砂盆內  
候冷結凝成霜研為細末每用少許含化津嚥不拘  
時候如覺喉壅閉塞不能吞物者即以小竹筒吹藥  
入喉中即愈

欽定四庫全書

醫門法律

亦為簡便

消毒犀角飲

治大人小兒內蘊邪熱痰涎壅盛腮項結核口舌  
生瘡及遍生瘡癩已潰未潰並宜服之

犀角 磨汁 防風 各一錢 鼠粘子 炒二錢 荊芥穗 一錢 甘草 炙錢

半

水二盞煎一盞食後溫服

按此方頗清上焦蘊熱與利膈散畧同彼可多服此



可暫服耳

四物二連湯

治血虛虛勞發熱五心煩熱晝則了明夜則發熱

當歸 生地黃 白芍藥 川芎 黃連 胡

黃連 各八分

水盞半加薑煎

四順清涼引子

治血熱壅實面赤蘊結煩悶

欽定四庫全書

醫門法律

大黃 赤芍藥 當歸 甘草 各一錢

水盞半煎八分食遠通口服

按二方清血分之熱然惟實熱可用虛熱則不宜用

恐傷其胃也

牛黃膏

治熱入血室發狂心熱不認人者

牛黃 一錢 硃砂 鬱金 各二錢 腦子 五分 甘草 牡丹皮

各二錢



右為末煉蜜丸皂角子大新汲水化下

按此方乃清鎮安神之劑熱由心胞襲入神明不得

已而用之也

楊氏秦艽扶羸湯

治肺痿骨蒸成勞或嗽或寒或熱聲啞不出體虛

自汗四肢倦怠

柴胡二錢 人參 鼈甲炙 秦艽 當歸 地骨皮各一

錢半夏 紫苑 甘草一錢

欽定四庫全書

醫門法律

右呶咀水煎服

按此治少陽經久熱成勞氣血兩治之法

局方當歸補血湯

治肌熱躁熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息其脈

洪大而虛重按全無此脈虛血虛也若悞服白虎

湯必死宜此主之

黃芪 當歸

右呶咀水煎



按此足三陰血分之病若以肺氣虛熱白虎湯法施之則脾氣從之下溜轉促其陰之亡耳蓋病深之人服藥中竅未必効一不當而追之不及矣可不辨哉再按人身熱病最多蓋素蘊之熱挾天時之熱而橫發耳是則胃氣清和遇暄熱而不覺其熱者乃為平人迨至積熱既久然後治之已為失算況於藥不對病乎所以肥人之病多因血肉過盛而積飲食之熱瘦人之病因津液素衰而生火炎之熱治肥人之熱

欽定四庫全書

醫門法律

慮虛其陽治瘦人之熱慮虛其陰未可執方妄施矣茲所錄方各宜自為推廣至表裏之熱及升陽滋陰等法各有顯方此不及

再按大腑實熱腹脹不通口舌生瘡有生薑瀉心湯一法大竒用生薑橘皮竹茹黃芩梔子仁白朮各三兩桂心一兩茯苓芒硝各二兩生地黃十兩呔咀入大棗煎每服一兩蓋必陰虛血燥火熱難伏為從治耳因推金匱腎氣丸童子亦可服附桂者不過從治



法虛熱得除可多服哉以上治瘰熱

金匱麻黃白朮湯方論見前 治濕十五方

麻黃三兩 去節 桂枝二兩 甘草一兩 炙 杏仁七十箇 去皮尖 白朮四兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥

煮取二升半去渣溫服八合覆取微似汗

桂枝附子湯方論見前

桂枝四兩 生薑三兩 附子三枚 炮去皮切八片 甘草二兩 大棗十二枚

右五味以水六升煮取二升去渣分溫三服

欽定四庫全書

醫門法律

白朮附子湯方

白朮二兩 附子一枚 半 甘草一兩 炙 生薑一兩 半 大棗六枚

右五味以水三升煮取一升去渣分溫三服一服覺

身痒半日再服三服都盡其人如蝟狀勿怪即是朮

附並走皮中逐水氣未得除故耳

金匱甘草附子湯方

甘草二兩 炙 附子二兩 簡 白朮二兩 桂枝四兩

右四味以水六升煮取三升去渣溫服一升日三服





初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升多者服六七合為妙

金匱麻黃杏子薏苡甘草湯方

病者一身盡痛發熱日晡所劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所致也可與麻黃杏子

薏苡甘草湯

麻黃去節炮四兩 甘草炙一兩 薏苡仁半斤 杏仁七十粒去皮尖炒

右剉麻豆大每服四錢七水盞半煮八分去渣溫服

欽定四庫全書

醫門法律

有微汗避風

金匱防己黃芪湯

防己一兩 甘草半兩炒 白朮七錢半 黃芪一兩二錢半

右剉麻豆大每抄五錢七生薑四片大棗一枚水盞

半煎八分去渣溫服良久再服喘者加麻黃半兩胃

中不和者加芍藥三分氣上沖加桂枝三分下有沈

寒者加細辛三分服後當如蟲行皮中從腰下如水

煖坐被上又以一被繞腰以下溫令微汗差



和劑五積散

治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐或有  
腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風無問內傷生冷外  
感風寒及寒濕客於經絡腰脚痠疼及嬾人經血  
不調或難產並治

白芷 茯苓 半夏 湯洗七次 當歸 川芎 甘草 炒

肉桂 芍藥 各三兩 枳殼 炒 麻黃 去節 陳皮 去白各六兩 桔

梗 十二兩 厚朴 薑炒 乾薑 炮各四兩 蒼朮 米泔浸去皮廿四兩

欽定四庫全書

醫門法律

右咬咀每服四錢水一盞薑三片葱白三根煎七  
分熱服冒寒用煨薑挾氣加茱萸嬾人調經催生  
加艾醋

按此一方能治多病粗工咸樂用之而海藏云麻黃  
桂芍甘草即各半湯也蒼朮甘草陳皮厚朴即平胃  
散也枳殼桔梗陳皮茯苓半夏即枳桔二陳湯也又  
川芎當歸治血兼乾薑厚朴散氣此數藥相合為解  
表溫中泄濕之劑去痰消痞調經之方雖為內寒外



<p>感表裏之分所制實非仲景表裏麻黃桂枝薑附之      的方也主積冷嘔泄時疫項背拘急加葱白豆豉厥      逆加吳茱萸寒熱咳逆加棗嬪人難產加醋始知用      之非一途也惟知活法者其擇之由海藏所云觀之      可見裏急者治先其裏表急者治先其表毋取於兩      頭忙矣</p>	<p>活人敗毒散</p>	<p>羌活 獨活 前胡 柴胡 芎藭 枳殼 白</p>	<p>欽定四庫全書  <small>醫門法律</small></p>	<p>茯苓 桔梗 人參 <small>已上各一兩</small> 甘草 <small>半兩</small></p>	<p>右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎至七分      溫服或沸湯點亦得治傷寒瘟疫風濕風眩拘蹇風      痰頭疼目眩四肢痛增寒壯熱項強睛疼及老人小      兒皆可服或瘴煙之地或瘟疫時行或人多風痰或      處卑濕脚弱此藥不可闕也日二三服以知為度煩      熱口乾加黃芩</p>	<p>昌鄙見三氣門中推此方為第一以其功之著也雷</p>
--	--------------	----------------------------	--	---	---	-----------------------------



公問黃帝曰三陽莫當何謂也帝曰三陽并至如風  
雨如霹靂故人莫能當也然則夏月三氣聚合其為  
病也豈同一氣之易當乎人感三氣而病病而死其  
氣互傳乃至十百千萬則為疫矣倘病者日服此藥  
二三劑所受疫邪不復留於胸中詎不快哉方中所  
用皆辛平更以人參大力者負荷其正驅逐其邪所  
以活人百千萬億奈何庸醫俗子往往減去人參不  
用曾與衆方有別而能活人耶

欽定四庫全書

醫門法律

清熱滲濕方

黃栢

鹽水炒

黃連

茯苓

澤瀉

各一錢

蒼朮

白

朮

各一錢半

甘草

五分

水二鍾煎八分服

如單用滲濕去黃連黃栢加橘皮乾薑

昌閱此一方差合鄙意以夏月所受之濕為熱濕暑  
濕而羣方所主之藥多在寒濕風濕殊不慊耳方後  
云云乃是去寒增熱依樣葫蘆矣

二朮四苓湯



治諸濕腫滿一身盡痛發熱煩悶二便不利	白朮 蒼朮 茯苓 猪苓 澤瀉 黃芩 羌	活 芍藥 梔子仁 甘草 <small>各等分</small>	水三盞薑三片燈心一撮煎服	此方通治表裏濕邪從水道出兼清暑熱之氣所宜	遵也	桂苓甘露飲	治濕熱內甚煩渴瀉利小便澹大便急霍亂吐下	欽定四庫全書 醫門法律	頭痛口乾	方見本門	羌活勝濕湯	治脊痛項強腰如折項如拔上沖頭痛乃足太陽	經氣不行此方主之	羌活 獨活 <small>各一錢</small> 藁本 防風 <small>各一錢半</small> 荆子 川芎	甘草 <small>灸四分</small>	水二盞煎八分食後溫服
-------------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------------	----	-------	---------------------	----------------	------	------	-------	---------------------	----------	--	-----------------------	------------



按濕上甚而熱汗之則易下之則難故當變其常法而為表散此方得之

續隨子丸

治肺經有濕通身虛腫滿悶不快或欬或喘

人參 漢防己 赤茯苓 寒食麵包 檳榔 木

香各半 葶蘆四兩 續隨子一兩 海金沙半兩

右為末棗肉丸梧子大每三十九丸桑白皮湯下

按攻下之方多過於峻此治肺經病以人參為君海

欽定四庫全書

醫門法律

金砂散以白朮為君差可耳

除濕湯

治寒濕所傷身體重著腰脚酸疼大便澹泄小便

或瀉或利

半夏炒 厚朴薑製 蒼朮米泔製 藿香葉 陳皮去白

白茯苓各一兩 甘草炙七錢 白朮生用一兩

右咬咀每服四錢水一盞薑七片棗一枚煎七分食

前溫服



<p>按脾惡濕濕從下入而傷其脾是以身重足軟小便 濇大便反利不溫其脾濕無由去當以此方加清熱 利水藥</p>	<p>白朮酒</p>	<p>治中濕骨節疼痛</p>	<p>白朮一兩酒三盞煎一盞不拘時頻服不能飲酒 以水代之</p>	<p>按此方顛一理脾不分功於利小便蓋以脾能健運 欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>自濕不留而從水道出耳然則胃中津液不充不敢 利其小便者得此非聖藥乎</p>	<p>金匱白虎加人參湯 <small>有論</small> 治暑三十二方</p>	<p>知母 <small>六兩</small> 石膏 <small>一斤</small> 甘草 <small>二兩</small> 粳米 <small>一合</small> 人參 <small>三兩</small></p>	<p>右五味以水一斗煮米熟湯成去渣溫服一升日三 服</p>	<p>金匱瓜蒂湯 <small>有論</small></p>	<p>瓜蒂 <small>二七</small></p>
--	------------	----------------	-------------------------------------	---	---	--	---	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------



右剉以水一升煮取五合去滓頓服  
清暑益氣湯 東垣方

治夏月暑熱蒸人人感之四肢倦怠胸滿氣促肢節疼或氣高而喘身熱而煩心下痞脹小便黃數大便溏泄或痢口渴不思飲食自汗體重

人參 黃芪 升麻 蒼朮 各一錢 白朮 神麩 各五

分 陳皮 炙甘草 黃栢 麥門冬 當歸 乾

葛 五味子 澤瀉 青皮 各三分

欽定四庫全書

醫門法律

右水煎溫服

諸方總論見前

人參益氣湯 東垣

治暑熱傷氣四肢倦怠嗜卧手指麻木

人參 一錢二分 黃芪 二錢 白芍 七分 甘草 一錢 五味子 三十粒 柴

胡 六分 升麻 五分

右水煎服

生脈散





<p>治熱傷元氣肢體倦怠氣短懶言口乾作渴汗出不止或濕熱大行金為火制絕寒水生化之源致肢體痿軟脚鼓眼黑最宜服之</p>	<p>人參 麥門冬 五味子 各等分</p>	<p>右水煎服</p>	<p>竹葉石膏湯 治暑熱煩燥</p>	<p>石膏 兩半 夏 錢二 人參 麥門冬 各三錢 甘草 二錢 竹</p>	<p>葉 二十箇 揉碎</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>右薑三片水煎服</p>	<p>黃芪人參湯 并加減法</p>	<p>黃芪 一錢 自汗過多者加一錢 人參 白朮 各五分 蒼朮 汗一錢</p>	<p>橘皮 白 不去 甘草 當歸身 洗 麥門冬 各二分 黃栢</p>	<p>神麴 炒 各三分 升麻 六分 五味子 九粒</p>	<p>水二盞煎一盞去渣稍熱食遠或空心服之忌酒濕</p>	<p>麵大料物之類及過食冷物如心下痞悶加黃連二</p>	<p>三分胃脘當心痛減大寒藥加草豆蔻仁五分脇下</p>
---	-----------------------	-------------	--------------------	--------------------------------------	-----------------	--------------------	----------------	-------------------	--	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



痛或縮急加柴胡二三分頭痛目中溜火加黃連二  
三分川芎三分頭目不清利上壅上熱加蔓荊子三  
分藁本二分細辛一分川芎三分生地黄二分如氣  
短精神少夢寐間困乏無力加五味子九粒大便瀉  
隔一二日不見致食少食不下血中伏火而不得潤  
也加當歸身生地黄各五分桃仁三粒去皮尖麻子  
仁研泥五分如大便通行所加之藥勿再服如大便  
又不快利勿用別藥少加大黃五分煨如久不利非

欽定四庫全書

醫門法律

血結血閉而不通也是熱則生風其病人必顯風證  
單血藥不可復加只宜常服黃芪人參湯外用羌活  
防風各五錢水四盞煎至一盞去渣空心服之大便  
必大走也一服便止胸中氣滯加青皮倍陳皮去其  
邪氣此病本元氣不足惟當補元氣不當瀉之 氣  
滯太甚或補藥太過或心下有憂滯鬱結之事更加  
木香二三分砂仁二三分白荳蔻二分與正藥同煎  
服 腹痛不惡寒者加芍藥五分黃芩二分卻減五



<p>味子</p>	<p>香薷飲</p>	<p>治一切暑熱腹痛或霍亂吐利煩心等證</p>	<p>香薷<small>一斤</small>厚朴<small>製</small>白扁豆<small>炒各半斤</small></p>	<p>每服五錢水盪半煎八分不拘時溫服</p>	<p>五物香薷飲 驅暑和平</p>	<p>即前方少加茯苓甘草也</p>	<p>黃連香薷飲</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>黃連<small>四兩</small>香薷<small>一斤</small>厚朴<small>半斤</small></p>	<p>每服四錢如前服</p>	<p>十味香薷飲</p>	<p>治伏暑身體倦怠神昏頭重吐利</p>	<p>香薷 人參 陳皮 白朮 茯苓 黃芪 木</p>	<p>瓜 厚朴 扁豆 甘草<small>各五錢</small></p>	<p>咬咀水煎每服一兩</p>	<p>宣明桂苓甘露飲<small>共八味</small></p>
-----------	------------	-------------------------	--	------------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------------	--	----------------	--------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------------



茯苓	澤瀉	白朮	石膏	寒水石	滑
兩	各一	兩	各一	兩	各一
石	猪苓	肉桂			
澄四	兩	錢	各五		
右為末每服三錢溫湯調下					
子和桂苓甘露飲					
治伏暑發渴脈虛水逆滯共十二味					
即前方加人參甘草乾葛各一兩藿香木香各一					
錢減桂只用一錢猪苓不用					
桂苓丸					
欽定四庫全書					
醫門法律					
治冒暑煩渴飲水過多心腹脹滿小便亦少					
肉桂	茯苓				
兩	各一				
右為末蜜丸每兩作十九每細嚼一丸白湯下					
五苓散					
加人參一錢					
名春澤湯					
治暑濕為病發熱頭疼煩躁而渴					
白朮	猪苓	茯苓	澤瀉	肉桂	
各兩	半	二兩	半	一兩	
右為末每服三二錢熱湯調下					
辰砂五苓散					
加辰砂等分減桂三之一					



<p>益元散 即天水散</p>	<p>治傷寒表裏俱熱煩渴口乾小便不通及霍亂吐瀉下利腸澼偏主石淋及嬾人產難催生下乳神効</p>	<p>桂府滑石 <small>膩白者</small> 粉草 <small>一兩</small></p>	<p>右為極細末每服三錢白湯調下新水亦得加薄荷少許名雞蘇散加青黛末少許名碧玉散治療並同但以迴避世俗之輕侮耳加辰砂少許名辰砂益元</p>	<p>散</p> <p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>通苓散</p>	<p>治傷暑潮熱煩渴小便不利</p>	<p>麥門冬 淡竹葉 車前穗 燈心</p>	<p>各等分水煎服</p>	<p>三黃石膏湯</p>	<p>黃連 <small>二錢</small> 黃栢 山梔 玄參 <small>各一錢</small> 黃芩 知母 <small>各一錢</small></p>	<p><small>錢五</small> 石膏 <small>錢三</small> 甘草 <small>分七</small> 水煎服</p>
-----------------	--	---	---	---------------------------------	------------	--------------------	-----------------------	---------------	--------------	--	--



白虎加蒼朮湯	即本方不用人參加蒼朮二兩增水作四服	六和湯	治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉寒熱交作傷寒	陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏	食	香薷 <small>二錢</small> 砂仁 <small>七湯洗</small> 半夏 <small>七次</small> 杏仁 <small>去皮</small> 人參甘草	炙各五分赤茯苓藿香白扁豆 <small>薑汁炒</small> 厚朴 <small>薑製</small> 木瓜	欽定四庫全書	醫門法律	錢各一	水二鍾薑五片紅棗二枚煎一鍾不拘時服	却暑散	赤茯苓甘草 <small>生各四兩</small> 寒食麵生薑 <small>各一斤</small>	右為細末每服二錢不拘時新汲水或白湯調服	消暑丸 治伏暑引飲脾胃不利	半夏 <small>一斤用醋</small> 甘草 <small>生</small> 茯苓 <small>各半</small>	右為末薑汁糊丸每見生水如桐子大每服五十九
--------	-------------------	-----	---------------------	---------------------	---	---	---	--------	------	-----	-------------------	-----	--	---------------------	---------------	---	----------------------



不拘時熱湯送下中暑為患藥下即甦傷暑發熱頭  
疼服之尤妙 夏月常服止渴利小便雖飲水多亦  
不為害應是暑藥皆不及此若停痰飲並用生薑湯  
下入夏之後不可闕此

枇杷葉散

治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

枇杷葉去毛 陳皮去白 丁香 厚朴去皮薑汁 白

茅根 麥門冬 乾木瓜 甘草 香薷一錢

欽定四庫全書

醫門法律

右搗羅為末每服二錢水一盞生薑三片煎七分溫  
服溫湯調服亦得如煩燥用井花水調下小兒三歲  
以下可服半錢更量大小加減

潑火散

即地榆散

治中暑昏迷不省人事欲死者并治傷暑煩躁口

苦舌乾頭痛惡心不思飲食及血痢

地榆 赤芍藥 黃連 青皮去白各

每服三錢漿水調服若血痢水煎服



香薷丸

治大人小兒傷暑伏熱燥渴瞽悶頭目昏眩胸膈煩  
滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍  
亂吐利轉筋

香薷 一兩 蘇葉 各五錢 甘草 炙 檀香 剉 丁香 各二錢半

右為細末煉蜜為丸每兩作三十九丸每服一九細嚼溫湯下  
酒煮黃連丸

治伏暑發熱嘔吐惡心并治膈熱解酒毒厚腸胃

欽定四庫全書

醫門法律

黃連 十二兩 好酒 五斤

右將黃連以酒煮乾研為末滴水丸如梧桐子大空心  
送下三五十九丸

水葫蘆丸 治冒暑毒解煩渴

川百藥 煎三兩 人參 二錢 麥門冬 烏梅肉 白梅肉

乾葛 甘草 各半兩

右為細末麵糊為丸如雞頭實大含化一九夏月出

行可度一日





<p>按孔明五月渡瀘深入不毛分給此丸於軍士故名 水葫蘆孟德遙指前有梅林失於未備耳</p>	<p>縮脾飲 消暑氣除煩渴</p>	<p>縮砂仁 烏梅肉<small>淨</small> 草薹<small>煨去皮</small> 甘草<small>炙各四兩</small> 乾葛</p>	<p>白扁豆<small>去皮炒各二兩</small></p>	<p>每服四錢水一碗煎八分水澄冷服以解煩或欲熱 欲溫任意服代熟水飲之極妙</p>	<p>大順散</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不清濁 相干陰陽氣逆霍亂嘔吐藏府不調</p>	<p>甘草 乾薑 杏仁<small>去皮尖</small> 桂枝<small>去皮</small></p>	<p>右先將甘草用白砂炒次入薑卻下杏仁炒過篩去 沙淨合桂為末每服二三錢湯點服</p>	<p>冷香引子</p>	<p>治傷暑渴霍亂腹痛煩躁脈沈微或伏</p>
--	-------------------	--	---------------------------------	--	------------	------------------------	--	---	--	-------------	------------------------



水盞半薑十片煎八分去渣井水頓冷服  
大黃龍丸

治中暑身熱頭疼狀如脾寒或煩渴嘔吐昏悶不  
食

舶上硫黃 硝石 各一兩 白礬 雄黃 滑石 各半兩

白麵 四兩

右五味研末入麵和勻滴水丸如梧子大每服三十  
丸新井水下管見云有中暍昏死灌之立甦

欽定四庫全書

醫門法律

醫門法律卷八



欽定四庫全書

子部  
醫門法律卷九

詳校官 內閣學士 姜晟

編修 臣 倉聖脈 覆勘

總校官 編修 臣 王燕 緒

校對官 編修 臣 盧 遂

謄錄 監生 臣 鄒 世 俊



欽定四庫全書

醫門法律卷九

南昌喻昌撰

癰證門

論一首  
律三條

癰證論

喻昌曰癰之一病無如內經論之最詳最徹隨其病之所形按法刺之莫不應手而愈蓋九鍼之用通於神明不可有微芒之差忒故內經論癰不得不詳也後世惡

欽定四庫全書

醫門法律

於鍼石不可與言至巧乃以藥劑攻邪存正調營衛之偏和陰陽之逆於是種種聖法不適於用矣如張子和見羸人病癰二年不敢輒投寒涼取刺癰論詳之刺其十指出血立愈此正內經所謂癰之且發也陰陽之且移也必從四末始也堅束其處決去其血則邪往而不  
得并故立愈也以子和之久諳鍼法且檢鍼經致其詳慎鍼其可以瀆用哉舍鍼而求內經用藥之捷法茫然無可下手矣予之所以心折仲景稱為百世之師者每



遇一證必出一法以緯內經之不逮一言當千百言而居其要也夫人四體安然外邪得以入而瘧之每伏藏於半表半裏入而與陰爭則寒出而與陽爭則熱半表半裏者少陽也所以寒熱往來亦少陽所主謂少陽而兼他經之證則有之謂他經而全不涉少陽則不成其為瘧矣所以仲景曰瘧脈多弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者下之差弦遲者可溫之弦緊者可發汗鍼灸也浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之

欽定四庫全書

醫門法律

只此七言而少陽一經汗吐下和溫之法具備其他瘧瘧溫瘧牡瘧瘧母四證要不外少陽求治耳出傷寒論之緒餘以補內經下手之法非聖人而能之乎謹將金匱奧義一一發明於左

少陽乃東方甲木之象故其脈主弦此不但初病之脈乃爾即久瘧正虛脈不鼓指而弦象亦隱然在內所以仲景云瘧脈自弦由首及尾脈之屢遷縱不同而弦之一字實貫徹之也瘧邪之舍於營衛正屬少陽



欽定四庫全書

醫門法律

恢恢乎游又空虛也耶

弦數者風發也以飲食消息止之仲景既云弦數者多熱矣而復申一義云弦數者風發見多熱不已必至於極熱熱極則生風風生則肝木侮土而傳其熱於胃坐耗津液陽愈偏而不返此未可徒求之於藥也須以飲食消息而止其熾熱即梨汁蔗漿生津止渴之屬正內經風淫於內治以甘寒之旨也

陰氣孤絕陽氣獨發則熱而少氣煩冤手足熱而欲嘔



名曰瘧瘧若但熱不寒者即氣內藏於心外舍分肉之間令人消爍肌肉內經謂其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧仲景之重引其文另有妙義蓋從上條弦數者風發也以飲食消息止之抽絲引絮而出其證謂弦數之脈熱盛生風必侮土而傷其津液由少陽而入陽明兩經合邪其熱倍熾倘不能以飲食消息急止其熱則熱之移於胃者必上薰心肺少氣煩冤而心肺

欽定四庫全書

醫門法律

病手心熱欲嘔而胃自病所以繼之曰邪氣內藏於心外舍分肉之間令人消爍肌肉蓋傷寒病三陽合邪其來如風雨如霹靂令人莫當而瘧之在少陽苟不入於陰而但出於陽迨至兩陽合邪亦豈能堪之耶故知消息而止入胃之熱邪真聖法也然仲景之法亦從內經而得內經謂瘧脈緩大虛便宜用藥不宜用鍼又謂虛者不宜用鍼以甘藥調之昌知意中在用甘寒也



溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時嘔白虎加  
桂枝湯主之內經言溫瘧有二但先熱後寒仲景所  
名溫瘧則但熱不寒有似瘧瘧而實不同也瘧瘧兩  
陽合邪上薰心肺肺主氣者少氣煩冤則心主脈者  
陽盛脈促津虧脈代從可推矣溫瘧脈如平人則邪  
未合而津未傷其所以但熱而不寒者則以其人素  
有痺氣榮衛不通故瘧之發於陽不入於陰即入而  
陰亦不受所以骨節煩疼時嘔邪氣扞格之狀有如

欽定四庫全書

醫門法律

此者惟用白虎湯以治陽邪而加桂枝以通營衛斯  
陰陽和血脈通得汗而愈矣在傷寒病衛強營弱衛  
氣不共營氣和諧者用桂枝湯復發其汗立愈此瘧  
邪偏著於陽桂枝湯藥即不可用但用白虎湯大清  
氣分之熱少加桂枝合陰陽而兩和之乃知仲景之  
法絲絲入扣也

其內經所稱先熱後寒之溫瘧一者先傷於風後傷於  
寒風為陽邪寒為陰邪瘧發時先陽後陰故先熱後





寒也此以風寒兩傷營衛之法治之初無難也其一  
為冬感風寒深藏骨髓內舍於腎至春夏時令大熱  
而始發其發也瘧邪從腎出之於外而大熱則其內  
先已如焚水中火發雖非真火亦可畏也俟其瘧勢  
外衰復返於腎而陰精與之相持乃始為寒設不知  
壯水之主以急救其陰十數發而陰精盡矣陰精盡  
則真火自焚灑灑時驚目亂無精頃之死矣所以傷  
寒偏死下虛之人謂邪入少陰無陰精以禦之也而

欽定四庫全書

醫門法律

溫瘧之慘寧有異哉此亦仲景意中之隱昌特比例  
陳情以為來學之助

瘧多寒者名曰牡瘧蜀漆散主之 瘧多寒者寒多於  
熱如三七二八之分非純寒無熱也純寒無熱則為  
陰證而非瘧證矣此條又抽絲引絮即上條兩陽合  
邪上薰心肺證中復指出多寒少熱一證蓋邪之伏  
於心下適在膻中心包之位心為陽中之陽陽邪從  
陽尤為易入邪入則心虛經曰心虛者熱收於內內



收其熱并其邪亦收之不易外出此寒多之一因也  
邪入心胞都城震動周身精液悉力內援重重裹擷  
胞內之邪為外所拒而不易出又寒多之一因也心  
者牡藏故即以寒多熱少之瘧名曰牡瘧用蜀漆散  
和漿水吐其心下結伏之邪則內陷之邪亦隨之俱  
出一舉而蕩逐無餘矣豈不快哉蜀漆常山苗也常  
山善吐何以不用常山而用蜀漆取苗性之輕揚者  
入重陽之界引拔其邪合之龍骨鎮心寧神蠲除伏

欽定四庫全書

醫門法律

氣雲母安藏補虛媚茲君主仲景補天浴日之方每  
多若此至如溫瘧亦用此方更加蜀漆以吐去其心  
下結伏之邪蓋一吐則周身之痺者通而榮衛并可  
藉以無忤則又以吐法為和法者也 其附外臺秘  
要牡蠣湯一方同治牡瘧者又初感病時風寒未清  
傳變為瘧結伏心下故方中用麻黃以散風寒并藉  
之以通陽氣耳可見病之途原不一學者於此一證  
二方比而參之以求生心之變化則幾矣



論金匱柴胡去半夏加枳薑湯方 治瘧病發渴者亦  
治勞瘧

此仲景治少陽病全體大用之一方也仲景謂瘧邪  
盛衰出入必在少陽表裏之間小柴胡湯乃傷寒少  
陽經天然不易之法渴者去半夏加枳薑實亦天然  
不易之法而施之於少陽邪傳陽明傷耗津液之證  
亦為天然不易之法蓋渴雖陽明津竭而所以致陽  
明津竭者全本少陽之邪觀內經刺法渴者取之少

欽定四庫全書

醫門法律

陽非以其木火之勢劫奪胃津而然耶故瘧邪進退  
於少陽即以此方進退而施其巧柴胡黃芩對治木  
火人參甘草扶助胃土枳薑生津潤燥薑棗發越營  
衛若夫勞瘧之病其本火盛榮衛衰津液竭亦不待  
言故并可施此方以治之也

論柴胡桂薑湯 治瘧寒多微有熱或但寒不熱服一  
劑如神

此瘧之寒多熱少或但寒不熱非不似於牡瘧而微



甚則大不同仲景不立論止附一方且云服一劑如	神其邪之輕而且淺從可識矣蓋以衛即表也榮即	裏也胸中之陽氣散行於分肉之間今以邪氣痺之	則外衛之陽反鬱伏於內守之陰而血之痺者愈瘵	結而不散遇衛氣行陽二十五度而病發其邪之入	營者既無外出之勢而榮之素痺者亦不出而與陽	爭所以多寒少熱或但有寒無熱也小柴胡湯本陰	陽兩停之方可隨瘵邪之進退以為進退者如桂枝	欽定四庫全書	醫門法律	乾薑則進而從陽痺著之邪可以開矣更加牡蠣以	奠其堅壘則陰陽豁然貫通而大汗解矣所以服一	劑如神也其加芩連以退而從陰即可類推	病瘵以月一日發當十五日愈設不差當月盡解如其	不差當云何師曰此結為癥瘕名曰瘵母急治之宜鱉	甲煎丸	此見瘵邪不能久據少陽即或少陽經氣衰弱不能	送邪外出而天氣半月一更天氣更則人身之氣亦
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	------	----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-----	----------------------	----------------------



更癘邪自無可容矣不則天人之氣再更其癘邪縱  
盛亦強弩之末不能復振矣設仍不解以為元氣未  
生耶而月已生魄矣元氣何以不生以為邪氣不盡  
耶而月已由滿而空矣邪氣何以不盡此必少陽所  
主之脇肋外邪盤踞其間依山傍險結為窠巢縣官  
當一指可撲之時曾不加意漸至滋蔓難圖興言及  
此不覺涕泗交流乃知仲景急治之法真經世宰物  
之大法也

欽定四庫全書

醫門法律

再按譚醫者當以靈素為經金匱為緯讀靈素而不  
了了者求之金匱矩矱森森但旨深詞約味如嚼蠟  
不若內經之芻豢悅口所以古今注內經者不下百  
家而注金匱者率罕其人即間有之其胸中渾是疑  
團擇顯明之句發揮一二隨竟其說觀者曾何賴焉  
歷代名賢屈指不過數人咸以仲景之學為絕學存  
而不論論而不議其所以卓冠億兆人千百年者各  
從內經分頭證入如癘病一門巢氏病源妄分五藏



後人謂其發明內經深信不疑而不知癰邪不從藏  
發內經所無之理巢氏臆言之耳陳無擇三因之說  
避矣乃謂夏傷於暑秋為痲癰者不可專以此論何  
其甘悖聖言耶至論內因勦襲巢氏心肝脾肺腎五  
癰立言仍是巴人下里之音矣張子和治癰喜用汗  
吐下三法自誇本於長沙詎知仲景所謂汗下者但  
從少陽之和法而進退其間不從傷寒之汗下起見  
也其可吐者或用瓜蒂或用常山苗各有深意亦豈

欽定四庫全書

醫門法律

漫然而吐之耶且子和謂治平之時其民夷靜雖用  
砒石辰砂有毒之藥以熱治熱亦能取效是何言歟  
至東垣丹谿確遵內經夏傷於暑秋必痲癰之論多  
所發明而謂吳楚閩廣之人患癰至多陽氣素盛之  
處其地卑濕長夏之時人多患暍癰霍亂瀉痢傷濕  
熱也此語誠為聰明絕世矣然於內經之旨尚隔一  
層內經運氣暑與濕同推不分彼此曾何分南北乎  
內經本謂夏傷於暑長夏傷於濕秋必痲癰脫落五



字遂謂秋傷於濕冬生咳嗽而傷燥一氣古今絕無  
一人起而颺言此等大綱不正亦何貴於識大之賢  
哉且丹溪所論十二經皆能為病固即刺瘡篇之旨  
易不遵金匱推足少陽一經為主坐令多岐亡羊耶  
方書俱以溫瘧為傷寒壞病與風瘧大同此言出於  
何典至於牡瘧總無其名統括於寒瘧之內悞指寒  
瘧為藏寒之極故無熱有寒用薑桂附子溫之又有  
更其名為牡瘧者云久受寒濕陰盛陽虛不能制陰  
所以寒多不熱悽愴振振亦行溫熱之法直是殺人  
不轉睫矣又謂暑瘧即瘧瘧嘔者用縮脾等藥從無  
有救少陽木火之邪如救焚者適燕而南其指抑何  
生民之不幸耶

律三條

凡治瘧不求邪之所在輒行大汗大下傷人正氣者醫  
之罪也

瘧邪在於半表半裏故有寒有熱若大汗以傷其表

欽定四庫全書

醫門法律



大下以傷其裏是藥反增瘧矣倘瘧邪伏而未盡藥  
過再發更將何法以處之

凡用吐法妄施惡劣之藥并各種丸藥傷人臟腑者醫  
之罪也

吐法止可用清芬之氣透入經絡引出瘧邪如酒浸  
常山不用火煎之類其膽礬信石等丸吞入腹中粘  
著不行攪亂腸胃臟腑究竟無益戒之戒之

凡用截瘧之法不俟瘧勢稍衰輒求速止者醫之罪也

欽定四庫全書

醫門法律

截者堵截也兵精餉足寇至方可堵截若兵微城孤  
不可截也在壯盛之體三四發後瘧勢少減可以截  
之其虛弱之人始終不可截也誤截因致腹脹者每  
多壞事即服藥亦有避忌瘧將來可服藥阻其來將  
退可服藥追其去若瘧勢正盛服藥與之混戰徒自  
苦耳但瘧之來去既遠藥不相及五不當一故服藥  
妙在將來將去之時

白虎加桂枝湯方 全匱方  
有論





溫服一升日二服	右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升	大棗 十二枚	柴胡 八兩 人參 三兩 黃芩 三兩 甘草 三兩 括蕒根 四兩 生薑 二兩	勞瘵	柴胡去半夏加括蕒湯方 <small>金匱方有論</small> 治瘵病發渴者亦治	諸藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服	右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升內	欽定四庫全書 醫門法律	牡蠣 四兩 麻黃 四兩 去節 甘草 二兩 蜀漆 三兩	牡蠣湯 治牡瘵 <small>外臺秘要方金匱有論</small>	漆半分臨發時服一錢匕	右三味杵為散未發前以漿水服半錢匕溫瘵加蜀	蜀漆散方 <small>金匱方有論</small>	右剉每五錢水一盞半煎至八分去滓溫服汗出愈	知母 六兩 甘草 二兩 石膏 一斤 粳米 二合 桂枝 三兩
---------	----------------------	-----------	---	----	---	------------------	----------------------	----------------	--	-------------------------------------	------------	----------------------	------------------------------	----------------------	--



<p>千金方用鱉甲十二片又有海藻三分大戟一分廔</p>	<p>汁內諸藥煎為丸如梧桐子大空心服七九日三服</p>	<p>灰候酒盡一半著鱉甲於中煮令汎瀾如膠漆絞取</p>	<p>右二十三味為末煨竈下灰一斗清酒一斛五斗浸</p>	<p>桃仁<small>二分</small></p>	<p>廔蟲<small>五分</small> 阿膠<small>三分</small> 蜂窠<small>四分</small> 赤硝<small>十二分</small> 蜣螂<small>六分</small></p>	<p>厚朴<small>三分</small> 牡丹<small>五分</small> 瞿麥<small>二分</small> 紫葳<small>三分</small> 半夏<small>一分</small> 人參<small>一分</small></p>	<p>薑<small>三分</small> 大黃<small>三分</small> 芍藥<small>五分</small> 桂枝<small>三分</small> 葶藶<small>一分</small> 石韋<small>三分</small></p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>鱉甲<small>十二分</small> 烏扇<small>三分</small> 黃芩<small>三分</small> 柴胡<small>六分</small> 鼠婦<small>二分</small> 乾</p>	<p>鱉甲煎丸方<small>金匱有論</small></p>	<p>溫服一升日三服初服微煩復服汗出便愈</p>	<p>右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升</p>	<p>甘草<small>二兩</small></p>	<p>柴胡<small>半斤</small> 桂枝<small>三兩</small> 乾薑<small>二兩</small> 黃芩<small>三兩</small> 括蕒根<small>四兩</small> 牡蠣<small>兩</small></p>	<p>柴胡桂薑湯<small>金匱有論</small> 治瘧寒多微有熱或但寒不熱</p>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---	--	---	--------------------	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	--	--



蟲五分無鼠婦赤硝二味以鱉甲煎和諸藥為丸

附選用三方

桂枝黃芩湯

柴胡一兩 黃芩二錢 人參 甘草各四分 半夏四分 石

膏 知母各五錢 桂枝一錢

右為麤末每服五七錢水煎

昌按此方小柴胡湯合白虎加桂枝湯於和法中兼

解表熱遵用仲景聖法可喜可喜

欽定四庫全書

醫門法律

人參柴胡引子事親

人參 柴胡 黃芩 甘草 大黃 當歸 芍

藥各等分

右為麤末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去

渣溫服

昌按此即小柴胡去半夏加大黃當歸芍藥大柴胡

去半夏枳實加人參當歸於和法中畧施攻裏之法

深中肯綮



柴朴湯

柴胡 獨活 前胡 黃芩 蒼朮 厚朴 陳

皮 半夏 麩 白茯苓 藿香 甘草

水二鍾生薑五片煎一鍾發日五更服氣弱加人參

白朮食不尅化加神麩麥芽山楂

昌按此方治瘧因起於暑濕及食滯者宜之

加味香薷飲

香薷 厚朴 扁豆 白朮 白芍藥 陳皮

欽定四庫全書

醫門法律

白茯苓 黃芩 黃連 甘草 猪苓 澤

瀉 木瓜

右生薑煎服口渴實者加天花粉葛根知母虛者加

五味子麥門冬人參

昌按此方暑邪入裏外無表證者宜之

祛癘散

黃芪 人參 白朮 白茯苓 砂仁 草

果 陳皮 五味子 甘草 烏梅



水二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾溫服

昌按此方表裏之邪已透中氣虛弱者可用

附備用九方

二朮柴葛湯 治諸瘧必用之劑

白朮 蒼朮 柴胡 葛根 陳皮 各七分 甘草 五分

若一日一發及午前發者邪在陽分加枯苓茯苓半

夏 各一錢 熱甚頭痛加川芎軟石膏 各一錢 口渴加石膏

知母麥門冬 各一錢 若間日或三日發午後或夜發者

欽定四庫全書

醫門法律

邪在陰分加川芎當歸酒炒芍藥熟地黃酒炒知母

各一錢 酒黃芪酒紅花 各四分 提在陽分可截之 若間

一日連發二日或日夜各發者氣血俱病加人參黃

芪白茯苓 各一錢 以補氣川芎地黃歸芍以補血 若

陽瘧多汗用黃芪人參白朮以斂之無汗用柴胡蒼

朮白朮黃芩葛根以發之 若陰瘧多汗用白芍當

歸熟地黃芪黃柏以斂之無汗用柴胡蒼朮川芎紅

花升麻以發之 胃氣弱飲食少或服截藥傷脾胃



<p>而食少者加人參酒芍藥大麥芽<small>各一錢</small>傷食痞悶或</p>	<p>有食積者加神麩麥芽枳實<small>各一錢</small>黃連<small>五分</small>痰盛加薑</p>	<p>半夏南星枳實<small>炒各一錢</small>黃連黃芩<small>各六分</small>若用截之加檳榔</p>	<p>常山青皮黃芩<small>各一錢</small>烏梅肉<small>三枚</small>日久虛瘧寒熱不多</p>	<p>或無寒而但微熱者邪氣已無只用四君子湯合四</p>	<p>物湯加柴胡黃芩黃芪陳皮以滋補氣血</p>	<p>柴苓湯<small>活人</small>治瘧熱多寒少口燥心煩少睡<small>即小柴胡湯合五苓</small></p>	<p>散<small>小柴胡湯見黃疸門</small>五苓散見三氣門</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>醫門法律</p>	<p>昌按活人柴苓湯治瘧之要藥也然不敢輒入正選姑存備用者則以五苓散利水恐遇木火乘胃大耗津液大渴引水自救之證反利其小水而自犯其律也用方者詳之</p>	<p>半夏散 治瘧瘧發作有時熱多寒少頭痛額角并胸前肌肉瞤動食纔入口即吐出面色帶赤宜服之</p>	<p>半夏<small>泡七次為末薑汁和調作餅曬乾</small>藿香 羌活 芎藭<small>各一分</small></p>
---	---	---	---	-----------------------------	-------------------------	--	--	---------------	-------------	---	---	---



<p>牽牛 兩半</p>	<p>右為細末每服三錢食後白湯調下</p>	<p>露薑飲 治脾胃痰癰發為寒熱</p>	<p>生薑 兩四</p>	<p>右和皮搗汁一碗夜露至曉空心冷服</p>	<p>二十四味斷癰飲 治久癰</p>	<p>常山<small>酒炒</small> 草果 檳榔 知母<small>酒炒</small> 陳皮 青皮 川芎 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥 白芷 人參</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>紫蘇 蒼朮 白朮 半夏 良薑 茯苓</p>	<p>桂 葛根 甘草 杏仁 烏梅<small>各等分</small></p>	<p>右咬咀每服一兩水二盞薑三片棗一枚煎八分發日早服</p>	<p>昌按此方治久癰母癰邪氣散漫表裏俱亂廣其法以求之然仍不離小柴胡湯為主亦可喜也</p>	<p>治癰因勞役憂思而作汗多食少倦甚者補中益氣</p>	<p>湯 方見虛勞門</p>
------------------	-----------------------	----------------------	------------------	------------------------	--------------------	---	------------------------	--------------------------	--	--------------------------------	--	-----------------------------	--------------------



<p>小柴胡湯加常山截瘧神效 <small>方見黃疸門</small></p>	<p>婦人久瘧用小柴胡合四物湯服之 <small>小柴胡湯見黃疸門四物湯</small></p>	<p><small>見婦人門</small></p>	<p>小兒瘧疾有痞塊生地芍藥各一錢陳皮川芎炒黃芩半夏各一錢甘草三分加薑煎調醋炙鱉甲末</p>	<p>效</p>	<p>正傳有二男子皆年四五十各得瘧瘧三年俱發於寅申巳亥日一人晝發發於巳而退於申一人夜發</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>發於亥而退於寅晝發者乃陰中之陽病宜補氣解表與小柴胡倍柴胡人參加白朮川芎葛根陳皮青皮蒼朮夜發者為陰中之陰病宜補血疎肝用小柴胡湯合四物湯加青皮各與十貼加薑棗煎於未發前二時每日一貼服至八貼同日得大汗而愈</p>	<p>丹谿治一人因勞役發嗽得瘧瘧又服發散藥變為發熱舌短語言不正痰吼有聲脈洪實似滑先用獨參湯加竹瀝二蛤殼一服後吐膠痰舌本正後用黃</p>
---	--	----------------------------	--	----------	---	------------------------	---	---





芪人參湯半月愈

一婦病瘧三日一發食少經不行已三月脈無時寒  
議作虛寒治疑悞再診見其梳洗言動如常知果悞  
也經不行非無血為痰所凝脈無非血氣衰乃積痰  
生熱結伏其脈而不見耳當作實熱治與三化丸旬  
日後食進脈出帶微弦謂胃氣既全雖不藥瘧當自  
愈而經行也令淡滋味果應

一婦身材小味厚痲瘧月餘間日發於申酉頭與身

欽定四庫全書

醫門法律

痛寒多喜極熱竦湯脈伏面慘晦作實熱治之以十  
棗湯為末粥丸黍米大服十粒津嚥日三次令淡飯  
半月大汗愈

一婦人痢困哭子變瘧一日五六作汗如雨不止脈  
微數疲甚無邪可治陰虛陽散死在旦夕且服四獸  
等熱劑遂用參朮二兩白芍一兩黃芪半兩炙甘草  
二錢作四大劑服之而愈

痢疾門



痢疾論

喻昌曰痢疾一證難言之矣在靈素謂之腸澼亦曰滯下金匱以嘔吐噦下利列為一門蓋以三者皆足陽明胃手陽明大腸所生之病也至其所論下利則皆傷寒論中厥陰經之本證與二陽明嘔吐噦同列之義殊不相合觀其論中厥與利每每並言始先即云六府氣絕於外者手足寒五藏氣絕於內者下利不禁是則厥而且利為虛寒之極所以反能食者則死反發熱者不死

欽定四庫全書

醫門法律

若痢證則能食者不死發熱者多死何其相反若是耶此必金匱嘔吐噦之下脫失下痢一證乃取傷寒厥陰下利之文補入其中後人屢試不驗投杼而起者多矣夫冬月傷寒之下利與夏秋傷暑濕熱之下痢而可藉口仲景謾言治法哉後人以其無師之智各呈偏見或得於目之所擊手之所試分播廣傳終不可以為法乃遂謂瘧痢無正方也醫事之偷何遂至此昌謹以黃岐仲景之法擬議言之在內經冬月傷寒已稱病熱至夏



秋熱暑濕三氣交蒸互結之熱十倍於冬月矣外感三  
氣之熱而成下痢其必從外而出之以故下痢必從汗  
先解其外後調其內首用辛涼以解其表次用苦寒以  
清其裏一二劑愈矣失於表者外邪但從裏出不死不  
休故雖百日之遠仍用逆流挽舟之法引其邪而出之  
於外則死證可活危證可安治經千人成效歷歷可紀  
詳金匱有云下痢脈反弦發熱身汗者自愈夫久痢之  
脈深入陰分沈瀋微弱矣忽然而轉弦脈渾是少陽生

欽定四庫全書

醫門法律

發之氣非用逆挽之法何以得此久利邪入於陰身必  
不熱間有陰虛之熱則熱而不休今因逆挽之勢逼其  
暫時燥熱頃之邪從表出熱自無矣久痢陽氣下陷皮  
膚乾澀斷然無汗今以逆挽之法衛外之陽領邪氣同  
還於表而身有汗是以腹中安靜而其病自愈也曷豈  
敢用無師之智哉又有驟受暑濕之毒水穀傾囊而出  
一晝夜七八十行大渴引水自救百杯不止此則腸胃  
為熱毒所攻頃刻腐爛比之悞食巴豆鉛粉其烈十倍



更用逆挽之法迂矣遠矣每從內經通用之法大黃黃連甘草一晝夜連進三五十杯俟其下利上渴之勢少緩乃始平調於內更不必挽之於外蓋其邪如決水轉石乘勢出盡無可挽耳更有急開支河一法其邪熱之在裏者奔迫於大腸必鬱結於膀胱膀胱熱結則氣不化而小溲短赤不用順導而用逆挽仍非計也清膀胱之熱令氣化行而分消熱勢則甚捷也仲景謂下利氣者當利其小便夫氣者膀胱之化也反從大腸而

欽定四庫全書

醫門法律

出當利其小便非急開支河之謂乎然而水出高原肺不熱則小溲自行肺與大腸為表裏大腸之熱皆因肺熱所移尤宜用辛涼之藥先清肺之化源矣金匱有下利肺痛者紫參湯主之氣利訶黎勒散主之後人疑二方非仲景之方詎知腸胃有病其所關全在於肺本草謂紫參主心腹中積聚療腸胃中熱通九竅利大小便仲景取之固通因通用之意也訶黎勒有通有塞通以下涎液消宿食破結氣澁以固腸脫仲景取之亦通塞



互用之意也。又可見肺氣不通而痛，則急通其壅大腸之氣，墜而逼迫，則通塞互用而緩調其適矣。嗟乎內經之法，無可下手者，求之金匱，金匱下利之法，無可下手者，求之自心，寤寐之神，轉覺金匱之法，一如指掌，可惜少壯光陰，虛擲今老矣，不能進步矣。特揭鄙言，為後人深入之一助。

再按治瘧之法，當從少陽而進退，其間進而就陽，則從

少陽為表法固矣，乃痢疾之表亦當從於少陽，蓋水穀

欽定四庫全書

醫門法律

之氣由胃入腸，疾趨而下，始焉少陽生發之氣不伸，繼

焉少陽生發之氣轉陷，故泛而求之三陽，不若顛而求

之少陽，俾蒼天清淨之氣，足以升舉水土物產之味，自

然變化精微，輸泄有度，而無下痢奔迫之苦矣。況兩陽

明經所藏之津液，既已下泄，尤不可更發其汗，在傷寒

經禁明有陽明禁汗之條，而金匱復申下利發汗之禁

謂下利清穀不可攻其表，汗出必脹滿，蓋以下利一傷

其津液，發汗再傷其津液，津液去則胃氣空而下出之



濁氣隨汗勢上入胃中遂成脹滿求其下利且不可得  
寧非大戒乎所以當從少陽半表之法緩緩逆挽其下  
陷之清氣俾身中行春夏之令不致於收降耳究竟亦  
是和法全非發汗之意津液未傷者汗出無妨津液既  
傷皮間微微得潤其下陷之氣已舉矣夫豈太陽外感  
風寒可正發汗之比乎又豈太陽陽明合病下利可用  
葛根之比乎噫微矣微矣

治痢用通因通用之法亦有金鍼蓋火濕熱之邪奔迫

欽定四庫全書

醫門法律

而出止宜用苦寒之藥如大小承氣之類方書每雜  
以溫中厚腸胃之藥是欲為火濕熱立幟也其孰辨  
之

內經曰腸澼便血身熱則死寒則生又曰腸澼下白沫  
脈沈則生浮則死腸澼之候身不熱脈不懸絕滑大  
者生懸澹者死以藏期之又曰陰陽虛脫腸澼死泄  
而奪血脈沈微手足逆皆難治

脈經曰腸澼下膿血脈沈小留連者生數大發熱者死



又腸澀筋攣脈細小安靜者生浮大堅者死

噤口痢乃胃中濕熱之毒薰蒸清道而上以致胃口閉塞而成噤口之證亦有悞服瀋熱之藥而邪氣停於胃口者用人參石蓮子等分煎服強呷但得一口下噤虛熱即開更以二味為末頻頻服之

治噤口痢多有用黃連者此正治濕熱之藥苦而且降不能開提況非胃虛所宜昌故不敢取用

有用田螺搗如泥納臍中引火熱下行最妙但鬱熱

欽定四庫全書

醫門法律

宜一開一降未可徒恃一法

有用丁香砂仁之屬以火濟火則殺人之事矣

休息痢者乃乍作乍止或因邪氣未曾滌盡遽止而復作者是也或初愈恣食厚味及妄作勞皆能致之

金匱云下利已瘥至其年月日時復發者以病不盡故也當下之宜大承氣湯 休息痢止而不止正氣既虛邪復不盡未可言下此證止之已久其正已復其積未除故須下之



原病式云白痢既非寒證何故服辛熱之藥亦有愈者  
蓋辛熱之藥能開發腸胃鬱結使氣液宣通流濕潤  
燥氣和而已此特其一端也甚有先曾通洩或因涼  
藥太過脈微沈細四肢厥冷即宜溫補升陽益胃理  
中之屬至云槩不可用熱藥亦非通變之精妙也  
機要云後重則宜下腹痛則宜和身重則除濕脈弦則  
去風膿血稠粘以重劑竭之身冷自汗以熱藥溫之  
風邪內結宜汗之驚澹而痢宜溫之

欽定四庫全書

醫門法律

仲景治下痢可下者悉用承氣湯大黃之寒其性善走  
佐以厚朴之溫善行滯氣緩以甘草之甘飲以湯液  
灌滌腸胃滋潤輕快積行即止

凡先瀉而後痢者逆也復通之而不已者虛也脈微遲  
宜溫補脈弦數為逆主死產後痢亦宜溫補

腹痛因肺金之氣鬱在大腸之間者以苦梗發之後用

### 痢藥

肛門痛熱留於下也初病身熱脈洪大宜清之黃芩芍





藥湯病久身冷自汗宜溫之理中湯

下血者宜涼血活血當歸黃芩桃仁之類風邪下陷者

宜升提之濕熱傷血者宜行濕清熱

下墜異常積中有紫黑血而且痛甚者此為死血用

桃仁滑石行之

血痢久不愈者屬陽虛陰脫用八珍湯加升舉之藥甚

有陣陣自下手足厥冷脈漸微縮此為元氣欲絕急

灸氣海穴用附子理中湯稍遲之則死

欽定四庫全書

醫門法律

凡下痢純血者如塵腐色者如屋漏水者大孔開而不

收如竹筒唇如硃紅者俱死如魚腦髓者身熱脈大

者俱半死半生

久痢血脈沈弱諸藥不效以十全大補湯加薑棗少入

蜜煎服

律三條

凡治痢不分標本先後槩用苦寒者醫之罪也

以腸胃論大腸為標胃為本以經脈論手足陽明為



標少陽相火為本故胃受濕熱水穀從少陽之火化  
變為惡濁而傳入於大腸不治少陽但治陽明無益  
也少陽生發之氣傳入土中因而下陷不先以辛涼  
舉之徑以苦寒奪之痢無止期矣

凡治痢不審病情虛實徒執常法自恃顯門者醫之罪  
也

實者邪氣之實也虛者正氣之虛也七實三虛攻邪  
為先七虛三實扶正為本十分實邪即為壯火食氣

欽定四庫全書

醫門法律

無正可扶急去其邪以留其正十分虛邪即為淹淹  
一息無實可攻急補其正聽邪自去故醫而不知變  
通徒守家傳最為悞事

凡治痢不分所受濕熱多寡輒投合成丸藥悞人者醫  
之罪也

痢由濕熱內蘊不得已用苦寒蕩滌宜煎不宜丸丸  
藥不能蕩滌且多夾帶巴豆輕粉定粉硫黃礪砂甘  
遂芫花大戟牽牛烏梅粟殼之類即使病去藥存為



害且大況病不能去毒烈轉深難以復救可不慎耶

金匱小柴胡去半夏加括蕒實湯

方見癰  
痰門

昌按此方乃少陽經半表半裏之的藥原用半夏之

辛溫半兼乎表今改用括蕒實之涼苦半兼乎裏退

而從陰則可進而從陽不勝其任矣然不必更求他

藥但於柴胡增一倍二倍用之允為進之之法也

活人敗毒散

方見三  
氣門

昌按活人此方全不因病痢而出但昌所為逆挽之

欽定四庫全書

醫門法律

法推重此方蓋藉人參之大力而後能逆挽之耳金

匱治下痢未及小柴胡湯後來方書不用猶曰無所

祖也至活人敗毒散夏秋疫癘諸方莫不收用之矣

而治下痢迥不及之者何哉遍查方書從無有一用

表法者惟楊子建治痢廣引運氣自逞狂能名其方

曰萬全護命湯採用活人之半川芎獨活桔梗防風

甘草而增麻黃官桂蒿本白芷細辛一派辛溫辛熱

之藥且雜牽牛峻下於內百道方中似此無知妄作



一方言表不殺人哉 再閱潔古七方雖為平淡無  
竒而老成全不犯手茲特錄之其他備用諸方亦各  
有取義以俟臨病採擇

大黃湯古潔治瀉痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜

無度

右用大黃一兩剉碎好酒二大醖浸半日許煎至一  
盞半去渣分作二服頓服之痢止勿服如未止再服  
取利為度後服芍藥湯和之痢止再服白朮黃芩湯

欽定四庫全書

醫門法律

盡撤其毒也

芍藥湯古潔行血調氣經曰澁而便膿血知氣行而血

止行血則便自愈調氣則後重除

芍藥一兩當歸一兩黃連一兩黃芩各半兩大黃三錢桂二錢

甘草炒檳榔各二錢木香一錢

如便後臟毒加黃柏半兩

右九味咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去渣溫服

如痢不減漸加大黃食後服



<p>白朮黃芩湯<small>古潔</small>服前藥痢疾雖除更宜調和</p>	<p>白朮<small>一兩</small>黃芩<small>七錢</small>甘草<small>三錢</small></p>	<p>右咬咀作三服水一盞半煎一盞溫服</p>	<p>黃連阿膠丸<small>和劑</small>治冷熱不調下痢赤白裏急後重臍</p>	<p>腹疼痛口燥煩渴小便不利</p>	<p>黃連<small>去鬚三兩</small>阿膠<small>碎炒一兩</small>茯苓<small>去皮二兩</small></p>	<p>右以連苓為細末水熬阿膠膏搜丸如桐子大每服</p>	<p>三十丸空心溫米湯下</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>白頭翁湯<small>金匱</small></p>	<p>白頭翁<small>二兩</small>黃連黃柏秦皮<small>各三兩</small></p>	<p>右四味以水七升煮取二升去渣溫服一升不愈更</p>	<p>服</p>	<p>加減平胃散<small>古潔</small>經云四時皆以胃氣為本久下血則</p>	<p>脾胃虛損血水流於四肢却入於胃而為血痢宜</p>	<p>服此滋養脾胃 白朮厚朴陳皮<small>各一兩</small>木香檳榔<small>各三錢</small>甘草</p>
--	--	------------------------	---	--------------------	--	-----------------------------	------------------	------------------------	------------------------------	---	-----------------------------	----------	---	----------------------------	--



<p>錢七 桃仁 人參 黃連 阿膠<small>炒</small> 茯苓<small>各五錢</small></p>	<p>右咬咀每服五錢薑三片棗一枚水煎溫服無時血多加桃仁熱泄加黃連小便澁加茯苓澤瀉氣不下後重加檳榔木香腹痛加官桂芍藥甘草膿多加阿</p>	<p>膠濕多加白朮脈洪大加大黃</p>	<p>蒼朮地榆湯<small>潔</small> 治脾經受濕下血痢</p>	<p>蒼朮<small>三兩</small> 地榆<small>一兩</small></p>	<p>每一兩水二盞煎一盞溫服</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>槐花散<small>潔</small></p>	<p>青皮 槐花 荆芥穗<small>各等分</small></p>	<p>右為末水煎空心溫服</p>	<p>犀角散 治熱痢下赤黃膿血心腹困悶</p>	<p>犀角屑 黃連<small>去鬚</small> 地榆<small>微炒</small> 黃芪<small>各一兩</small> 當歸<small>半兩</small></p>	<p>木香<small>二錢五分</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一盞煎至六分去渣溫服無</p>	<p>時</p>
--	---	---------------------	---------------------------------------	--	--------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------------	------------------	-------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	----------



黃連丸 <small>一名羚羊角丸</small> 治一切熱痢及休息痢日夜頻併兼	治下血黑如雞肝色	黃連 <small>去鬚二兩半</small> 羚羊角 <small>鎊</small> 黃柏 <small>去粗皮各一兩半</small> 赤茯苓 <small>去皮</small>	右為細末蜜和丸如桐子大每服二十九薑蜜湯下	暑月下痢用之尤驗一方用白茯苓臘茶送下	生地黄湯 治熱痢不止	生地黄 <small>兩半</small> 地榆 <small>七錢半</small> 甘草 <small>二錢半</small>	欽定四庫全書 醫門法律	右咬咀如麻豆大以水二盞煎至一盞去渣分溫二服空心日晚再服	鬱金散 治一切熱毒痢下血不止	川鬱金 槐花 <small>炒各半兩</small> 甘草 <small>炙二錢半</small>	右為細末每服一二錢食前豆豉湯調下	茜根散 治血痢心神煩熱腹中痛不納飲食	茜根 地榆 生乾地黄 當歸 <small>炒</small> 犀角 <small>屑</small> 黃芩	梔子仁 <small>兩半</small> 黃連 <small>二兩去鬚微炒</small>
--	----------	--	----------------------	--------------------	------------	---	----------------	-----------------------------	----------------	---	------------------	--------------------	---	--



<p>右咬咀每服四錢以水一盞入豆豉五十粒薤白七寸煎至六分去渣不拘時溫服</p>	<p>十寶湯 治冷痢如魚腦者三服見效甚捷</p> <p>黃芪<small>兩四</small> 熟地<small>酒浸</small> 白茯苓 人參 當歸<small>酒浸</small> 白朮</p>	<p>半夏 白芍藥 五味子 官桂<small>兩各一</small> 甘草<small>兩半</small></p> <p>右為麤末每服二錢水一盞生薑三片烏梅一箇煎至七分食前溫服</p>	<p>芍藥黃芩湯<small>東垣</small> 治洩痢腹痛或後重身熱久不愈脈</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>醫門法律</p> <p>洪疾者及下痢膿血稠粘</p> <p>黃芩 芍藥<small>兩各一</small> 甘草<small>錢五</small></p>	<p>右咬咀每服一兩水一盞半煎一盞溫服無時如痛加桂少許</p>	<p>香連丸<small>直指</small> 治下痢赤白裏急後重</p> <p>黃連<small>去蘆二十兩用吳茱萸十兩同炒令赤去茱萸不用</small> 木香<small>四兩八錢八分不見火</small></p>	<p>右為細末醋糊丸如桐子大每服三十九空心飯飲</p>	<p>下</p>
---	---	---	--	--	---------------------------------	---	-----------------------------	----------





大承氣湯

方見三  
氣門

小承氣湯

方見三  
氣門

進承氣法治太陰證不能食是也當先補而後瀉乃

進藥法也先剉厚朴

兩半

薑製水一盞煎至半盞服若

二三服未已胃有宿食不消加枳實二錢同煎服二

三服泄又未已如不加食尚有熱毒又加大黃

三錢推

過泄未止者為腸胃久有塵垢滑粘加芒硝

半合

垢去

盡則安矣後重兼無虛證者宜之若力倦氣少脈虛

欽定四庫全書

醫門法律

不能食者不宜此法蓋厚朴枳實大瀉元氣也

退承氣法治陽明證能食是也當先瀉而後補乃退

藥法也先用大承氣

五錢

水一盞依前法煎至七分稍

熱服如瀉未止去芒硝減大黃一半煎二服如熱氣

雖已其人心腹滿又減去大黃但與枳實厚朴湯又

煎二三服如腹脹滿退泄亦自安後服厚朴湯數服

則已

地榆芍藥湯

保命

治泄痢膿血脫肛



<p>蒼朮<small>八兩</small>地榆 卷柏 芍藥<small>各三兩</small></p>	<p>右叻咀每服二兩水煎溫服病退勿服</p>	<p>敗毒散<small>方見三氣門</small> 治壯熱下痢及似痢非痢似血非血</p>	<p>如濁酒</p>	<p>右剉每服五錢水盞半薑三片薄荷五葉煎服熱多</p>	<p>則溫服寒多則熱服傷濕加白朮頭痛加天麻</p>	<p>參苓白朮散<small>和劑</small> 治久瀉及大病後痢後調理消渴者</p>	<p>尤宜</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>醫門法律</p>	<p>人參 乾山藥 蓮肉<small>去心</small> 白扁豆<small>去皮薑汁浸炒各一斤半</small> 白</p>	<p>朮<small>於潛者</small> 桔梗<small>炒令黃色</small> 砂仁 白茯苓<small>去皮</small> 薏苡仁</p>	<p>炙甘草<small>各一斤</small></p>	<p>右為細末每服二錢米湯調下或加薑棗煎服或棗</p>	<p>肉和藥丸如桐子大每服十十九空心米湯送下或</p>	<p>煉蜜丸如彈子大湯化下</p>	<p>倉廩湯 治禁口痢有熱乃毒氣衝心食即吐</p>	<p>人參 茯苓 甘草<small>炙</small> 前胡 川芎 羌活 獨</p>
--	------------------------	---	------------	-----------------------------	---------------------------	--	-----------	---------------	-------------	--	--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	---------------------------	--



煎至一盞去渣食前溫服		右分作二貼水二盞黑豆百粒生薑五片白梅一箇	黃芩 <small>錢四分</small> 甘草 <small>錢二分</small>	葛根 枳殼 半夏 生地 杏仁 <small>去皮</small> 茯苓 <small>各</small>	葛根湯 專治酒痢	再服忌粘滑油膩生菜	各末等分和勻空腹爛煮糯米飲調方寸七服之日	州黃柏 <small>赤色堅薄者</small> 川當歸 <small>五味俱取細末</small>	犀角屑 <small>取黑色文理粗者產後用彌佳</small> 宣州黃連 苦參 <small>多買輕搗</small> 金	犀角丸 但是痢服之無不瘥者	右為細末生薑茶煎湯調下三錢	石蓮肉乾山藥 <small>分等</small>	蘋蓮飲	渣無時熱服	右叟咀每服五錢水一盞半生薑三片煎至七分去	活 桔梗 柴胡 枳殼 陳倉米 <small>分等</small>
------------	--	----------------------	---	--	----------	-----------	----------------------	--	---	---------------	---------------	--------------------------	-----	-------	----------------------	----------------------------------

欽定四庫全書

醫門法律



括萋根湯 治下痢冷熱相衝氣不和順本因下虛

津液耗少口乾咽燥常思飲水毒氣更增煩燥轉

甚宜服此藥救之

括萋根

白茯苓

甘草

灸各半兩

麥門冬

去心二錢五分

右咬咀每服五錢水一盞半棗二枚劈破煎至七分

去渣服不拘時

陳米湯 治吐痢後大渴飲水不止

右用陳倉米二合水淘淨以水二盞煎至一盞去

欽定四庫全書

醫門法律

渣空心溫服晚食前再煎服

治痢後渴

右用粳米二合以水一盞半同煮研絞汁空心頓

服之

澤漆湯 治痢後腫滿氣急喘嗽小便如血

澤漆葉

微炒五兩

桑根白皮

炙

郁李仁

湯浸去皮尖

炒熟各三兩

陳

皮去白朮

炒

杏仁

湯浸去皮尖雙

人參

一兩

半

右咬咀每服五錢水二盞生薑三片煎取八分去渣



<p>溫服候半時辰再服取下黃水數升或小便利為度</p> <p>茯苓湯 治痢後遍身微腫</p> <p>赤茯苓 <small>去黑皮</small> 澤漆葉 <small>微炒</small> 白朮 <small>微炒各一兩</small> 桑根白皮 <small>炙黃</small></p> <p>黃芩 射干 防己 澤瀉 <small>各三兩</small></p> <p>右咬咀每服五錢匕先以水三盞煮大豆一合取二盞去渣內藥煎取一盞分為二服未瘥頻服二料</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>醫門法律</p>	<p>醫門法律卷九</p>
--	---------------------------	---------------



欽定四庫全書

子部  
醫門法律卷十

詳校官太醫院書官臣善晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣盧遂

謄錄監生臣鄒世俊



欽定四庫全書

醫門法律卷十

西昌喻昌撰

痰飲門

論二首  
律三條

法一十四條

痰飲論

喻昌曰痰飲為患十人居其七八金匱論之最詳分別而各立其名後世以其名之多也徒徇其末而忘其本曾不思聖人立法皆從一源而出無多岐也蓋胃為水

欽定四庫全書

醫門法律

穀之海五藏六府之大源飲入於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行以為常人金匱即從水精不四布五經不並行之處以言其患謂人身所貴者水也天一生水乃至充周流灌無處不到一有瘀蓄即如江河迴薄之處穢莖叢積水道日隘橫流旁溢自所不免必順其性因其勢而疏導之由高山而平川由平川而江海庶得免乎泛濫所以仲景分別淺深誨人因名以求其義焉淺者



在於軀壳之內藏府之外其名有四曰痰飲曰懸飲曰  
溢飲曰支飲痰飲者水走腸間瀝瀝有聲懸飲者水流  
脇下咳唾引痛溢飲者水流行於四肢汗不出而身重  
支飲者咳逆倚息短氣其形如腫一由胃而下流於腸  
一由胃而旁流於脇一由胃而外出於四肢一由胃而  
上入於胸膈始先不覺日積月累水之精華轉為混濁  
於是遂成痰飲必先圍聚於呼吸大氣難到之處故由  
腸而脇而四肢至漸漬於胸膈其勢愈逆矣痰飲之患

欽定四庫全書

醫門法律

未有不從胃起者矣其深者由胃上入陽分漸及於心  
肺由胃下入陰分漸及於脾肝腎故水在心心下堅築  
短氣惡水不欲飲緣水攻於外火瑕故水益堅火鬱於  
內氣收故築動短氣火與水為仇故惡而不飲也水在  
肺吐涎沫欲飲水緣肺主氣行營衛布津液水邪入之  
則塞其氣道氣凝則液聚變成涎沫失其清肅故引水  
自救也水在脾少氣身重緣脾惡濕濕勝則氣虛而身  
重也水在肝脇下支滿噎而痛緣肝與膽為表裏經脈





並行於脇火氣衝鼻則嚏弔脇則痛也水在腎心下悸  
緣腎水凌心逼處不安又非支飲鄰國為壑之比矣夫  
五藏藏神之地也積水泛為痰飲包裹其外詩有謂波  
撼岳陽城者情景最肖詎非人身之大患乎然此特隨  
其所在辨名定位以祈治不乖方耳究竟水所蓄聚之  
區皆名留飲留者留而不去也留飲去而不盡者皆名  
伏飲伏者伏而不出也隨其痰飲之或留或伏而用法  
以治之始為精義昌試言之由胃而上胸膈心肺之分

欽定四庫全書

醫門法律

者驅其所留之飲還胃下從腸出或上從嘔出其出皆  
直截痛快而不至於伏匿人咸知之若由胸膈而外出  
肌膚其清者或從汗出其濁者無可出矣必還返於胸  
膈由胸膈還返於胃乃可入腸而下出驅之必有伏匿  
肌膚而不勝驅者若由胸膈而深藏於背背為胸之府  
更無出路尤必還返胸膈始得趨胃趨腸而順下豈但  
驅之不勝驅且有挾背間之狂陽壯火發為癰毒結如  
橘囊者伏飲之艱於下出易於釀禍其誰能辨之誰能



出之邪昌以靜理而譚醫施治鑿鑿有據謹因金匱秘  
典直授金鍼令業醫之子已精而益求其精耳

痰飲脈論

喻昌曰痰飲之脈金匱錯出不一難於會通以鄙見論  
之亦有淺深微甚之不同可預明也脈要精微篇曰肝  
脈奩而散色澤者當病溢飲溢飲者渴暴多飲而易入  
肌皮腸胃之外也此特舉暴飲水溢飲病之最淺者為  
言耳仲景會其意即以飲證分之為四統言其綱曰痰

欽定四庫全書

醫門法律

飲懸飲溢飲支飲大都為由淺入深者商治失此不治  
而至於積水滔天即此四飲自有不可同語者矣其謂  
飲脈不弦但苦喘短氣者見飲脈本弦飲脈不弦則水  
之積也不厚然亦害其陽氣微喘短氣而已其謂支飲  
亦喘而不能臥加短氣其脈平者見支飲上於胸膈喘  
而短氣其脈仍平有而若無纔有停積未至留伏故不  
見於脈也其謂脈浮而細滑者傷飲見浮而細滑非傷  
風傷寒之比亦飲之初鬱氣分而未深也醫者於此時



蚤思昏墊之災亟興已溺之念而行因勢利導之法患  
斯解矣否則證成深錮末流愈分伏根之所愈不可識  
經年檢方問藥漫圖成功其可得乎故凡見脈轉沈弦  
一派即當按法求之其曰脈沈者胸中有留飲短氣而  
渴四肢歷節痛言肺之治節不行宗氣不布故短氣氣  
不布則津亦不化故膈燥而渴脾氣不運水飲流於肢  
節而作痛也似此一證肺脾交病所稱飲入於胃遊溢  
精氣上輸於脾脾氣散精上輸於肺之常者且轉而藉

欽定四庫全書

醫門法律

寇兵齎盜糧矣欲求其安寧可得乎至論弦脈則曰咳  
者其脈弦為有水曰雙弦者寒也皆大下後虛脈偏弦  
者飲也為喘滿曰脈弦數有寒飲冬夏難治曰脈沈而  
弦者懸飲內痛此即沈潛水蓄支飲急弦而廣其說除  
大下後其脈雙弦者有虛寒之別其偏弦者俱為水飲  
也冬夏難治亦因用寒遠寒用熱遠熱之法不若春秋  
為易施耳懸飲內痛謂懸飲結積於內其甚者則痛也  
更有沈緊之脈主心下痞堅面色黧黑之證謂水挾腎



寒雜揉於心肺之分則心下堅而面色黑也有脈伏而為留飲之證積飲把持其脈而不露較瀋脈尤甚矣又曰脈伏便利心下續堅此為留飲欲去故也又曰久咳數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者必苦冒本有支飲在胸中故也凡此皆病深而脈變當一一逆其流而窮其源者夫天樞開發胃和則脈和今為痰飲凝結其中則開闔之機關不利而脈因之轉為沈弦急弦偏弦弦數弦緊或伏而不見非亟去其痰飲亦胡繇脈

欽定四庫全書  
醫門法律

復其常邪淺者淺治深者深治淺深之間者適其中而治留者可攻伏者可導堅者可削再一因循病深無氣灑灑時驚不可救藥矣

痰飲留伏論

喻昌曰痰飲之證留伏二義最為難明前論留飲者留而不去伏飲者即留飲之伏於內者也留飲有去時伏飲終不去留伏之義已見一班而金匱奧義夫豈渺言能盡謹再陳之金匱論留飲者三伏飲者一曰心下有



留欽其人背寒如掌大曰留欽者脇下痛引缺盆曰胸  
中有留欽其人短氣而渴四肢歷節痛言胸中留欽阻  
抑上焦心肺之陽而為陰疇則其深入於背者有冷無  
熱并阻督脈上升之陽而背寒如掌大無非陽火內鬱  
之象也脇下為手足厥陰上下之脈而足少陽之脈則  
由缺盆過季肋故脇下引缺盆而痛為留欽偏阻木火  
不伸之象欽留胸中短氣而渴四肢歷節痛為肺不行  
氣脾不散精之象也合三條而觀之心肺肝脾痰飲皆

欽定四庫全書

醫門法律

可留而累之矣其義不更著邪至伏欽則曰膈上病痰  
滿喘咳吐發則寒熱背痛腰疼目泣自出其人振振身  
劇必有伏欽言胸中乃陽氣所治留欽阻抑其陽則  
不能發動然重陰終難蔽晝有時陽伸陰無可容忽而  
吐發其留欽可以出矣若更伏留不出乃是三陽之氣  
伸而復屈太陽不伸作寒熱腰背痛目泣少陽不伸風  
火之化鬱而并於陽明土中陽明主肌肉遂振振身  
而劇也留欽之伏而不去其為累更大若此然留欽伏



飲仲景不言治法昌自其遏抑四藏三府之陽而求之則所云宜用溫藥和之者豈不切於此證而急以之通其陽乎所云苓桂朮甘湯者雖治支滿目眩豈不切於此證而可做其意乎故必深知比例始可與言往法也後人不明金匱之理妄生五飲六證之說即以海藏之明於五飲湯方下云一留飲在心下二支飲在脇下三痰飲在胃中四溢飲在膈上五懸飲在腸間而統一方以治之何其淺邪

欽定四庫全書

醫門法律

再按痰飲總為一證而因則有二痰因於火有熱無寒飲因於濕有熱有寒即有溫泉無寒火之理也人身熱鬱於內氣血凝滯蒸其津液結而為痰皆火之變現也水得於濕留戀不消積而成飲究竟飲證熱濕釀成者多寒濕釀成者少蓋濕無定體春日風濕夏日熱濕秋曰燥濕冬曰寒濕三時主熱一時主寒熱濕較寒濕三倍也內經濕土太過痰飲為病治以諸熱劑非指痰飲為寒後人不解妄用熱藥藉為口實



詎知凡治六淫之邪先從外解故治濕淫所勝亦不  
遠熱以散其表邪及攻裏自不遠於寒矣況始先即  
不可表而積陰阻遏身中之陽亦必藉溫熱以伸其  
陽陰邪乃得速去若遂指為漫用常行之法豈不愚  
哉

論苓桂朮甘湯

痰飲陰象阻抑其陽用此陽藥化氣以伸其陽此正  
法也茲所主乃在胸脇支滿目眩者何邪靈樞謂心

欽定四庫全書

醫門法律

包之脈是動則病胸脇支滿然則痰飲積於心包其  
病自必若是目眩者痰飲阻其胸中之陽不能布水  
精於上也茯苓治痰飲伐腎邪滲水道桂枝通陽氣  
和營衛開經絡白朮治風眩燥痰水除脹滿甘草得  
茯苓則不資滿而反泄滿本草亦曰甘草能下氣除  
煩滿故用之也

論苓桂朮甘湯腎氣丸二方

金匱云夫短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯



主之腎氣丸亦主之並出二方其妙義愈益彰著首  
卷辨息論中已詳仲景分別呼吸言病之旨矣今短  
氣亦分呼吸各出一方呼氣之短用苓桂朮甘湯以  
通其陽陽化氣則小便能出矣吸氣之短用腎氣丸  
以通其陰腎氣通則小便之關門利矣一言半句莫  
非精蘊其斯以為聖人乎

論大小青龍湯

溢飲之證水飲溢出於表營衛盡為之不利必倣傷

欽定四庫全書

醫門法律

寒病營衛兩傷之法發汗以散其水而營衛通經脈  
行則四肢之水亦散矣究竟大青龍升天而行雲雨  
小青龍鼓浪而奔滄海治飲證必以小青龍為第一  
義也

合論十棗湯甘遂半夏湯二方

傷寒病兩脇痞滿而痛用十棗湯下其痰飲雜病雖  
非傷寒之比而懸飲內痛在脇則同況脈見沈弦非  
亟奪其邪邪必不去脈必不返所以用十棗湯不嫌





其過峻也凡病之在脇而當用下者必倣此為例也  
至甘遂甘草湯之治留飲微妙玄通非深入聖域莫  
能製之內經但曰留者攻之耳仲景於是析義以盡  
其變無形之氣熱結於胃則用調胃承氣攻之熱結  
於腸則用大小承氣攻之有形之飲痞結於胸則用  
陷胸湯攻之痞結於脇則用十棗湯攻之留結於腸  
胃之間則用甘遂半夏湯攻之法曰病者脈伏其人  
欲自利利反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故

欽定四庫全書

醫門法律

也甘遂半夏湯主之脈道為留飲所隔伏而不行其  
證欲下利利反快似乎留飲欲去然雖欲去不能去  
也心下續堅滿可見留飲之末已及於腸留飲之根  
仍著於胃不剗其根飲必不去故立是方甘遂甘草  
大相反者合而用之俾其向留著之根儘力一剗得  
留者去而藥性已不存矣正內經有故無殞之義也  
又加白蜜同煎留戀其藥不致迸入無過之地其用  
半夏芍藥者由木入土中成其堅滿半夏益土芍藥



伐木抑何神邪後世方書并甘草刪去神奇化為朽腐製方立論皆中人以下之事矣竟何益哉

合論木防已湯葶藶大棗瀉肺湯防已椒目葶藶大黃丸三方

三方皆治支飲上入膈中而有淺深次第之分首一方先治其肺中一方顛治其肺後一方兼治肺氣所傳之府蓋支飲上入於膈逼近心肺奧援腎邪本文云其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沈緊得之數

欽定四庫全書

醫門法律

十日醫吐下之不愈木防已湯主之虛者即愈實者三日復發復與不愈者去石膏加茯苓芒硝蓋以支飲上入阻其氣則逆於肺間而為喘滿阻其血則雜揉心下而為痞堅腎氣上應其色黑血凝之色亦黑故黧黑見於面部然且姑緩心腎之治先治其肺肺之氣行則飲不逆而俱解耳木防已味辛溫能散留飲結氣又主肺氣喘滿石膏辛甘微寒主心下逆氣清肺定喘人參甘溫治喘消膈飲補心肺不足桂枝



辛熱通血脈開結氣宣導諸藥在氣分服之即愈若  
飲在血分深連下焦必愈而復發故去石膏氣分之  
藥加芒硝入陰分開痰結消血癖合之茯苓去心下  
堅且伐腎邪也葶藶大棗湯大瀉其肺氣亦以氣停  
故液聚耳防已椒目葶藶大黃丸治腹滿口舌乾燥  
腸間有水氣之證乃肺氣膈鬱於上以致水飲不行  
於下而燥濕之甚用此丸急通水道以救金氣之膈  
鬱不治上而治其下故用丸劑也

欽定四庫全書

醫門法律

合論小半夏湯小半夏加茯苓湯外臺茯苓飲三方

前一方治支飲嘔而不渴者支飲上入膈中而至於  
嘔從高而越其勢最便但嘔家本當渴渴則可徵支  
飲之全去若不渴其飲尚留去之未盡也不必加治  
但用半夏之辛溫生薑之辛散再引其欲出之勢則  
所留之邪自盡矣中一方亦治卒嘔吐者但多心下  
痞膈間有水眩悸故加茯苓以去水伐腎而安心也  
後一方加人參枳實橘皮尤為緊要治積飲既去而



虛氣塞滿其中不能進食此證最多金匱蚤附外臺  
一方啟誘後人非天民之先覺而誰

合論澤瀉湯厚朴大黃湯二方

二方之治支飲俱從下奪而有氣血之分前後之辨  
首一方為支飲之在心下者阻其陽氣之升降心氣  
鬱極火動風生而作冒眩惟是不治其冒眩但利小  
便以泄其支飲則陽自升而風火自息仲景製方每  
多若此後一方治支飲之胸滿者夫支飲而至胸滿

欽定四庫全書

醫門法律

在仲景自用大小陷胸湯治之此方乃承氣之法止  
可施於傷寒無形氣分熱結而乃以治有質之痰飲  
非仲景絲絲畢貫之法矣其為編書者悞入更復何  
疑

論五苓散一方

本文云假令瘦人臍下有悸吐涎沫而癩眩此水也  
五苓散主之此尋常一方耳深維其義譬如以手指  
月當下了然蓋瘦人木火之氣本盛今以水飲之故



下鬱於陰中挾其陰邪鼓動於臍則為悸上入於胃則吐涎沫及其鬱極乃發直上頭目為癩為眩巢氏病源云邪入之陰則癩夫陽鬱於陰其時不為癩眩出歸陽位反為癩眩者夾帶陰氣而上也故不治其癩眩但散其在上夾帶之陰邪則立愈矣散陰邪之法固當從表然不如五苓散之表法為長以五苓散兼利其水耳今世之用五苓散者但知其為分利前後水穀之方不知其為分利表裏陰陽之方方下所

欽定四庫全書

醫門法律

云多飲暖水汗出愈之文總置不錄何其淺耶不但此也即如小青龍一方世但知為發表之輕劑全不知其為利小水而設夫山澤小龍養成頭角乘雷雨而直奔滄海其不能奮髯而昇天豈待問哉所以金匱治支飲五方總不出小青龍一方為加減取其開通水道千里不留行耳

後世治痰飲有四法曰實脾燥濕降火行氣實脾燥濕二陳二朮最為相宜若陰虛則反忌之矣降火之法



痰在膈上大滿大實非吐不除然非定法也使為定法	老人腎虛水汎痰飲上湧崔氏八味丸以攝之	小兒慢脾風痰飲阻塞竅隧星附六君湯以醒之	宜溫其中真陽虛者更補其下清上諸藥不可用也	五若果脾胃虛寒飲食不思陰氣痞塞嘔吐涎沫者	虛寒痰飲少壯十中間見一二老人小兒十中常見四	丸引氣下趨痰飲始豁也	逆直透膜原結壘萬千膜脹重墜不可以仰用桂苓	欽定四庫全書	醫門法律	痰飲亦互結成癖用清痰丸以除之多慾則腎氣上	驚甲散以除之多憂則脾氣內鬱而食亦不化氣食	肝氣上逆而血亦隨之氣血痰飲互結成癖用柴胡	苓厚朴湯則分其濁氣下出而痰飲上出也多怒則	痰飲從下出也濁陰之氣從下入上裹其痰飲用茯	入內裹其痰飲惟用小青龍湯則分其邪從外出而	之藥諸方漫然全無著落謹再明之風寒之邪從外	須分虛實實用苦寒虛用甘寒庶乎可也若夫行氣
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	------------	----------------------	--------	------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



人人能用之矣何必獨推子和哉子和必相其人可吐後乃吐之一吐不徹俟再俟三緩以開之據云湧痰之法自有擒縱卷舒其非浪用可知

謹再論金匱不言之意以明之傷寒論用汗吐下和溫之法矣至痰飲首當言吐者仲景反不言之何邪其以吐發二字為言者因喘滿而痰飲上溢從內而自發也其曰醫吐下之不愈亦非以吐下為咎也其曰嘔家本渴渴者為欲解又屬望於從吐得解也胡

欽定四庫全書

醫門法律

竟不出可吐一語邪仲景意中謂痰飲證內多夾衝氣眩冒等證吐之則殆故不煩辭說直不以吐立法開後世之過端所以為立法之祖也自子和以吐法擅名無識者爭趨捷徑貽悞不可勝道必會仲景意以言吐然後吐罔不當也

今定吐禁一十二條

眩冒昏暈不可吐 氣高氣淺不可吐

積勞未息不可吐 病後新虛不可吐



脈道微弱不可吐 病勢險急不可吐
陽虛多汗不可吐 素慣失血不可吐
風雨晦冥不可吐 冬氣閉藏不可吐
多疑少決不可吐 吐後犯戒不可吐
今定藥禁一十條
陰虛枯燥妄用二陳 陽虛多汗妄用青龍
心虛神怯妄用辛散 肺虛無氣妄用苦瀉
肝虛氣刺妄用龍薈 脾虛浮腫妄用滾痰
欽定四庫全書
醫門法律
胃虛津竭妄用香燥 臟腑易動妄行湧泄
本非堅積妄行峻攻 血氣虛羸妄行鍼灸
律三條
凡熱痰乘風火上入目暗耳鳴多似虛證悞行溫補轉
錮其痰永無出路醫之罪也
凡痰飲隨食並出不開幽門徒溫其胃束手無策遷延
悞人醫之罪也
凡遇腎虛水泛痰湧氣高喘急之證不補其下反清其





上必致氣脫而死醫之罪也

苓桂朮甘湯

茯苓四兩 桂枝三兩 白朮三兩 甘草二兩

右四味以水六升煮取三升分溫三服小便則利

腎氣丸

即八味丸  
方見中寒門

甘遂半夏湯

甘遂大者三枚 半夏十二枚 芍藥五枚 甘草如指大一枚

大一枚

欽定四庫全書

醫門法律

右四味以水二升煮取半升去渣以蜜半升和藥汁

煎取八合頓服之

十棗湯

芫花熬 甘遂 大戟各等分

右三味以水一升五合先煎大棗十枚取九合去渣

內藥末強人服一錢七贏人服半錢平旦溫服之不

下者明日更加半錢得快下後糜粥自養

大青龍湯



再服微利則愈	右五味以水六升煮取二升去渣內芒硝再微煎分	木防已 <small>二兩</small> 桂枝 <small>二兩</small> 人參 <small>四兩</small> 芒硝 <small>三合</small> 茯苓 <small>四兩</small>	木防已加茯苓芒硝湯	右四味以水六升煮取二升分溫再服	木防已 <small>三兩</small> 石膏 <small>十二枚雞子大碎</small> 桂枝 <small>二兩</small> 人參 <small>四兩</small>	木防已湯	煮取三升去渣溫服一升	欽定四庫全書 醫門法律	右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥	辛 <small>三兩</small> 桂枝 <small>三兩</small> 去皮 <small>半</small> 夏 <small>半升</small>	麻黃 <small>三兩</small> 去節 <small>三兩</small> 芍藥 <small>三兩</small> 五味子 <small>半升</small> 乾薑 <small>三兩</small> 甘草 <small>三兩</small> 炙 <small>三兩</small> 細	小青龍湯	煮取三升去渣溫服一升取微似汗汗多溫粉粉之	右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥	麻黃 <small>六兩</small> 去節 <small>六兩</small> 桂枝 <small>二兩</small> 去皮 <small>二兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 炙 <small>二兩</small> 杏仁 <small>四十箇</small> 生薑 <small>切三兩</small> 大棗 <small>十二枚</small> 石膏 <small>如雞子大碎</small>
--------	----------------------	---	-----------	-----------------	---	------	------------	----------------	----------------------	--	--	------	----------------------	----------------------	--



澤瀉湯

澤瀉 五兩  
白朮 一斤

右二味以水二升煮取一升分溫服

厚朴大黃湯

厚朴 尺一  
大黃 六兩  
枳實 四枚

右三味以水五升煮取二升分溫再服

小半夏湯

半夏 一斤  
生薑 半斤

欽定四庫全書

醫門法律

右二味以水七升煮取一升半分溫再服

椒蘆黃丸

防己  
椒目  
葶蘆 蒸  
大黃 各一斤

右四味末之蜜丸如桐子大先食服一九日三服稍

增口中有津液渴者加芒硝半兩

小半夏加茯苓湯

半夏 一斤  
生薑 半斤  
茯苓 三兩  
法四兩

右三味以水七升煮取一升五合分溫再服



<p>五苓散 <small>方見三氣門 已上俱金匱方</small></p>	<p>外臺茯苓飲</p>	<p>茯苓 人參 白朮 <small>各三兩</small> 枳實 <small>二兩</small> 橘皮 <small>二兩半</small> 生薑</p>	<p><small>兩四</small></p>	<p>右六味水六升煮取一升八合分溫三服如人行八</p>	<p>九里進之</p>	<p>星附六君子湯 <small>即六君子加南星附子 方見眩病門</small></p>	<p>崔氏八味丸 <small>方見中寒門</small></p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>附備用方</p>	<p>二賢湯 治一切痰飲</p>	<p>橘紅 <small>用真正廣產者一斤</small> 炙甘草 食鹽 <small>各四兩</small></p>	<p>右水一碗漫火煮焙乾搗為細末白湯點服一方用</p>	<p>橘紅四兩甘草一兩為細末點服治痰極有效</p>	<p>豁痰湯 治一切痰疾此方與滾痰丸相副蓋以小</p>	<p>柴胡湯為主合前胡半南殼蘇陳朴之屬出入加</p>	<p>減素抱痰疾及肺氣壅塞者以柴胡為主餘者並</p>
--	--------------	--	--------------------------	-----------------------------	-------------	--	-----------------------------------	------------------------	-------------	------------------	---	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------



右為細末生薑汁煮麵糊丸如桐子大每服三十九	易成但以朴硝撒在竹盤中少時盛水 置當風處即乾如芒硝刮取用亦可	半夏 <small>二兩</small> 茯苓 <small>一兩</small> 枳殼 <small>去瓢</small> 風化朴硝 <small>二錢五分</small>	發喘四肢浮腫者用此而愈	臂痛乃痰證也但治痰而臂痛自止及婦人產後	氣不下故上行攻臂其脈沈細者是也後人為	腕停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾滯而	痛不能舉手足或左右時復轉移由伏痰在內中	茯苓丸 <small>一名指迷</small> 本治臂痛具指迷方中云有人臂	最効	膈不利者加枳實內外無熱者去黃芩治一切痰氣	水二盞薑五片煎八分不拘時服中風者加獨活胸	活 <small>各五分</small>	紫蘇 陳皮 厚朴 南星 薄荷 枳殼 羌	柴胡 半夏 <small>各二錢</small> 枯芩 人參 <small>脈盛有力者不用</small> 甘草	去柴胡以前胡為主
----------------------	-----------------------------------	---	-------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	----	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--	----------



瓜萋半夏丸 治肺熱痰嗽	下五六十丸	噙嚼一丸清湯送細嚥之或丸如菘豆大淡薑湯送	右為細末煉蜜入薑汁少許和藥杵勻丸如龍眼大	梗 香附 淡鹽水浸炒各半兩 青黛 另研一錢 芒硝 另研二錢 瓜萋仁 另研一兩	天門冬 去心 黃芩 酒炒 海粉 另研 橘紅 去白各一兩 連翹 半兩 桔	塊凝滯喉間肺氣不清或吐咯難出	欽定四庫全書 醫門法律	老痰丸 潤燥開鬱降火消痰治老痰鬱痰結成粘	下	右三味和丸梧桐子大日乾每服七十丸空心溫酒	茅山蒼朮 製一斤 生油麻 半兩水二盞研取漿 大棗 十五枚煮爛取肉	神朮丸 治痰飲	立見功效	兩手戰掉茶盞亦不能舉服此隨愈痰藥方多惟此	薑湯送下 累有人為痰所苦夜間兩臂如人抽擗
-------------	-------	----------------------	----------------------	--	-------------------------------------	----------------	-------------	----------------------	---	----------------------	----------------------------------	---------	------	----------------------	----------------------



瓜蒌仁 另研半夏 製各一兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五十丸

薑湯下

千緡湯 治風痰壅盛喘急日夜不得臥人扶而坐

者一服立愈

半夏 製大者七枚 皂莢 炙去皮弦一寸 甘草 炙一寸

右作一服水一盞薑三片煎七分溫服

御愛紫宸湯 解宿酒嘔噦惡心痰唾不進飲食

欽定四庫全書

醫門法律

木香 五分 砂仁 芍藥 檀香 茯苓 官桂 藿

香 各一錢 陳皮 乾葛 良薑 丁香 甘草 炙各二錢

分二服每服水盞半煎七分不拘時服

四七湯 治七情氣鬱結滯痰涎如破絮或如梅核

咯之不出嚥之不下并治中脘痞滿痰涎壅盛上

氣喘急

半夏 三錢 茯苓 二錢 厚朴 一錢 紫蘇葉 一分

水二盞薑五片棗一枚煎七分服



<p>大川芎丸 消風壅化痰涎利咽膈清頭目治頭痛</p>	<p>旋運心忪煩熱頸項緊急肩背拘倦肢體煩疼皮</p>	<p>膚癢癢腦昏目疼鼻塞聲重面上遊風狀如蟲行</p>	<p>川芎 龍腦 薄荷葉 <small>焙乾各七</small> 桔梗 <small>一百</small> 甘草</p>	<p><small>燻三十</small> 防風 <small>去苗二</small> 細辛 <small>洗五</small></p>	<p>右為細末煉蜜搜和每一兩半分作五十九丸每服一</p>	<p>丸臘茶清細嚼下食後臨臥服</p>	<p>小胃丹</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>芫花 <small>好醋拌勻過一宿於瓦器</small> 甘遂 <small>濕紙裹長流</small></p>	<p><small>曬</small> 大戟 <small>長流水煮一時再用</small> 大黃 <small>濕紙裹煨勿令</small></p>	<p><small>酒潤炒熟焙</small> 黃蘗 <small>炒三</small></p>	<p>右為末以白朮膏丸如蘿蔔子大臨臥津液吞下或</p>	<p>白湯送下取膈上濕痰熱積 以意消息之欲利空</p>	<p>心服 一方加木香檳榔各半兩</p>	<p>小川芎丸 治膈上痰</p>	<p>川芎 <small>二兩細剉</small> 川大黃 <small>二兩蒸</small></p>
-----------------------------	----------------------------	----------------------------	--	--	------------------------------	---------------------	------------	------------------------	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------	--





<p>右件焙乾為末用不蛀皂角五七挺溫水揉汁絹濾 出渣瓦礫中熬成膏和前二味為丸如桐子大每服 五十丸小兒三丸薑湯下</p>	<p>旋覆花散 治心胸痰熱頭目旋痛飲食不下</p>	<p>旋覆花 甘草<small>炙各半兩</small>枳殼<small>去瓢炒</small>石膏<small>細研各二兩</small>赤茯</p>	<p>苓 麥門冬<small>去心</small>柴胡<small>去苗</small>人參<small>各一兩</small>犀角屑 防風 又黃芩<small>去錢半</small></p>	<p>右咬咀每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去 渣食後良久溫服</p> <p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>化涎散 治熱痰利胸膈止煩渴</p>	<p>凝水石<small>煨研一兩</small>鉛白霜<small>研另</small>馬牙硝<small>研另</small>雄黃<small>另研各一錢</small>白</p>	<p>礬<small>研</small>甘草<small>炙各二錢半</small>龍腦<small>許少</small></p> <p>右為細末研勻每服一錢不拘時水調下小兒風熱 痰涎用沙糖水調下半錢此藥大涼不可多服</p>	<p>八珍丸 治膈痰結實滿悶喘逆</p>	<p>丹砂<small>研半兩</small>犀角<small>鎊</small>羚羊角<small>鎊</small>茯神<small>去木</small>牛黃<small>研</small>龍腦</p>
---	---------------------------	--	--	--	----------------------	--	--	----------------------	---



<p>研各二 錢半 牛膽南星 礪砂 研各一兩</p>	<p>右為細末研勻煉蜜和丸如雞豆實大每服一九食後細嚼人參荊芥湯下</p>	<p>驚梨煎丸 治熱痰涼心肺利咽膈解熱毒補元氣</p>	<p>大驚梨 二十枚去皮核用淨布絞取汁薄荷 研生半斤 皂角 不蛀者十挺去</p>	<p>皮子漿水二升接取濃汁白蜜 斤半 生地黄 半斤研取汁同上五味慢火熬膏和下藥</p>	<p>人參 白茯苓 皮去 白蒺藜 刺炒去 肉蓯蓉 酒浸切焙乾 牛</p>	<p>膝 酒浸 半夏 湯泡 木香 各一兩 檳榔 兩 煨二 防風 去 青橘皮</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>去 白桔梗 炒 羌活 白朮 山藥 各七錢半 甘草 炙半兩</p>	<p>右為細末同前膏拌勻杵令得所丸如梧子大每服五十丸加至二十九食後荊芥湯送下日二服</p>	<p>法製半夏 消飲化痰壯脾順氣</p>	<p>用大半夏湯洗泡七遍以濃米泔浸一日夜每半夏一兩用白礬一兩半研細溫水化浸半夏上留</p>	<p>水兩指許頻攪冬月於煖處頓放浸五日夜取出焙乾用鉛白霜一錢溫水化又浸一日夜通七日</p>
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	---	--------------------------------------	---	--------------------	-------------------------------------	---	----------------------	---	---



神芎導水丸

盡取出再用漿水慢火煮勿令滾候漿水極熱取出焙乾以磁器收貯每服一二粒食後細嚼溫薑湯下又一法依前製成半夏每一兩用白礬水少許漬半夏細飛硃砂末淹一宿斂乾焙用依前法亦可用生薑自然汁漬焙用

黃芩一兩黃連

川芎

薄荷各半兩

大黃二兩滑石

黑牽牛頭末各四兩

欽定四庫全書

醫門法律

河間製治一切熱證其功不可盡述設或久病熱鬱無問瘦□老弱并一切證可下者始自十丸以為度常服此藥除腸胃積滯不傷和氣推陳致新得利便快並無藥燥搔擾亦不困倦虛損遂病人心意或熱甚必急須下者使服四五十丸未効再服以意消息常服二三十丸不動臟腑有益無損或婦人血病下惡物加桂半兩病微者常服甚者取利因而結滯開通惡物自下也凡老弱虛人脾胃經虛風熱所鬱色



黑齒槁身瘦萎黃或服甘熱過度或三消等病若熱甚於外則肢體躁擾病於內則神志躁動怫鬱不開變生諸證皆令服之惟臟腑滑泄者或裏寒脈遲者或婦人經病產後血下不止及孕婦等不宜服

咳嗽門 論二首 法十六條 律六條

咳嗽論

喻昌曰咳嗽一證求之內經博而寡要求之金匱惟附五方於痰飲之後亦無顛論不得已問津於後代諸賢

欽定四庫全書

醫門法律

所述珪璧琳瑯非不棼然案頭究竟各鳴已得而鮮會歸昌不以漫然渺然之說傳信後人將何以為言哉蓋嘗反覆內經之文黃帝問於岐伯曰肺之令人咳者何也岐伯對曰五藏六府皆足令人咳非獨肺也此一語推開肺咳似涉太驟設當日先陳肺咳以漸推詳則了無疑義後世有成法可遵矣非然也聖神立言不過隨文演義微啟其端苟必一一一致詳即非片言居要之體所以讀內經貴在自得其要得其要則一言而終不得



其要則流散無窮豈特論咳嗽一證為然哉黃帝訓雷  
公之辭有曰不知比類足以自亂不足以自明固知比  
類之法不但足以蔽內經之義并足以蔽窮無窮極無  
極之義管可窺天蠡可測海內經千萬年脫畧之文一  
知比類直可合符一堂至於竒病當前游刃恢恢不待  
言矣請申之岐伯雖言五藏六府皆足令人咳其所重  
全在於肺觀其下文云皮毛者肺之合也皮毛先受邪  
氣邪氣以從其合也其寒飲食入胃從胃脈上至於肺

欽定四庫全書

醫門法律

則肺寒肺寒則內外合邪因而客之則為肺咳此舉形  
寒飲冷傷肺之一端以明咳始之因耳內外合邪四字  
扼要比類之法重在於此人身有外邪有內邪有外內  
合邪有外邪已去而內邪不解有內邪已除而外邪未  
盡纔一比類了然明白奈何不辨之於蚤聽其釀患日  
深邪夫形寒者外感風寒也飲冷者內傷飲食也風寒  
無形之邪入內與飲食有形之邪相合必留戀不舍治  
之外邪須從外出內邪須從下出然未可表裏並施也



金匱五方總不出小青龍湯一方為加減是內經有其  
論金匱有其方矣而內經金匱之所無者欲從比類得  
之果何從哉進而求之暑濕暑濕之邪皆足令人咳也  
蓋暑濕之外邪內入必與素醞之熱邪相合增其煩咳  
宜從辛涼解散又當變小青龍湯之例為白虎而兼用  
天水五苓之屬矣進而求之於火則有君相之合無內  
外之合而其足以令人致咳者十常八九以心與肺同  
居膈上心火本易於剋制肺金然君火無為而治恒不

欽定四庫全書

醫門法律

自動有時勞其心而致咳息其心咳亦自止尚不為剝  
床之災也惟相火從下而上挾君火之威而刑其肺上  
下合邪為患最烈治之亦可從外內合邪之例比擬其  
或引或折以下其火俾不至於燎原耳於中咳嗽煩冤  
腎氣之逆亦為上下合邪但濁陰之氣上干清陽為鬲  
盲遮蔽任其煩冤不能透出亦惟下驅其濁陰而咳自  
止矣進而求之於燥內外上下初無定屬或因汗吐太  
過而津越於外或因瀉利太久而陰亡於下或營血衰



少不養於筋或精髓耗竭不充於骨乃致肺金日就乾  
燥火入莫禦咳無止息此時亟生其津亟養其血亟補  
其精水猶可為也失此不治轉盼甕乾杯罄毛瘁色弊  
筋急爪枯咳引胸背弔脇疼痛諸氣膈鬱諸痿喘嘔噎  
塞血泄種種危候相因而見更有何法可以沃其焦枯  
也邪經謂咳不止而出白血者死豈非肺受燥火煎熬  
而腐敗其血亦從金化而色白邪至於五藏六府之咳  
內經言之不盡者要亦可比類而會通之耳昌一人知  
欽定四庫全書

醫門法律

見有限由形寒飲冷傷肺一端比類以及暑濕火燥不  
過粗枝大葉啟發聰明之一助至從根本入理深譚是  
必待於後人矣

### 咳嗽續論

昌著咳嗽論比類內經未盡底裏竊不自安再取金匱  
嚼蠟終日不輟始得恍然有會始知金匱以咳嗽敘於  
痰飲之下有深意焉蓋以咳嗽必因之痰飲而五飲之  
中獨膈上支飲最為咳嗽根底外邪入而合之固嗽即



無外邪而支飲漬入肺中自足令人咳嗽不已況支飲  
久蓄膈上其下焦之氣逆衝而上者尤易上下合邪也  
夫以支飲之故而令外邪可內下邪可上不去支飲其  
咳終無寧宇矣去支飲取用十棗湯不嫌其峻豈但受  
病之初即病蓄已久亦不能舍此別求良法其曰咳家  
其脈弦為有水十棗湯主之正謂急弦之脈必以去支  
飲為亟也猶易知也其曰夫有支飲家咳煩胸中痛者  
不卒死至一百日一歲宜十棗湯此則可以死而不死

欽定四庫全書

醫門法律

者仍不外是方去其支飲不幾令人駭且疑乎凡人胸  
膈間孰無支飲其害何以若此之大其去害何必若此  
之力蓋膈上為陽氣所治心肺所居支飲橫據其中動  
肺則咳動心則煩搏擊陽氣則痛逼處其中營衛不行  
神魄無依則卒死耳至一百日一年而不死陽氣未散  
神魂未離可知惟亟去其邪可安其正所以不嫌於峻  
攻也掃除陰濁俾清明在躬較彼姑待其死何得何失  
邪其曰久咳數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛





者必苦冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家夫不治其咳而治其飲仲景意中之隱不覺一言逗出其實大數為火刑金而無制故死其弱且虛為邪正俱衰而易復故可愈也其曰咳逆倚息不得臥小青龍湯主之明外內合邪之證惟有小青龍的對一方耳然而用小青龍湯其中頗有精義須防衝氣自下而上重增濁亂也衝氣重增濁亂其咳不能堪矣傷寒證用大青龍湯無少陰證者可服脈微弱者不可服服之則肉瞶筋惕

欽定四庫全書

醫門法律

而亡陽雜證用小青龍湯亦恐少陰腎氣素虛衝任之火易於逆上衝任火上無咳且增煩咳況久咳不已顧可動其衝氣邪蓋衝任二脈與腎之大絡同起腎下出胞中腎虛不得固守於下則二脈相挾從小腹逆衝而上也於是用桂苓五味甘草湯先治其衝氣衝氣即低而反更咳胸滿者因水在膈間不散其病再變前方去桂加乾薑細辛以治其咳滿咳滿即止第三變而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑為熱藥也服之當遂渴而



渴反止者為支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復  
內半夏以去其水水去嘔止第四變其人形腫者以水  
尚在表也加杏仁主之其證應內麻黃以其人遂痺故  
不內之若逆而內之者必厥所以然者以其人血虛麻  
黃發其陽故也第五變若面熱如醉此為胃熱上衝薰  
其面加大黃以利之嗟夫仲景治咳全不從咳起見去  
其支飲下其衝氣且及下衝氣法中之法游刃空虛全  
牛劃然已解何其神邪向也不解作者之意祇覺無階

欽定四庫全書

醫門法律

可升何期比類而得外邪內入下邪上入之端因復參  
之金匱其精蘊始得洞矚豈非神先告之邪慰矣慰矣  
內經秋傷於濕冬生咳嗽此脫文也訛傳千古今特正  
之曰夏傷於暑長夏傷於濕秋必痰癯秋傷於燥冬  
生咳嗽六氣配四時之理燦然明矣蓋濕者水類也  
燥者火類也濕病必甚於春夏燥病必甚於秋冬痰  
癯明是暑濕合邪然濕更多於暑何反遺而不言至  
於咳嗽全是火燥見病何反以為傷濕耶所以春夏



多濕病者春分以後地氣上升天氣下降二氣交而  
濕蒸於中土膏水溽礎潤木津人身應之濕病見焉  
秋冬多燥病者秋分以後天氣不降地氣不升二氣  
分而燥呈其象草黃木落山巉水枯人身應之燥病  
見焉然則咳嗽之為傷燥豈不明哉

六氣主病風火熱濕燥寒皆能乘肺皆足致咳其濕咳  
即分屬於風火熱燥寒五氣中也風乘肺咳汗出頭  
痛痰涎不利火乘肺咳喘急壅逆涕唾見血熱乘肺

欽定四庫全書

醫門法律

咳喘急面赤潮熱甚者熱盛於中四末反寒熱移於  
下便泄無度燥乘肺咳皮毛乾稿細瘡濕癢痰膠便  
秘寒乘肺咳惡寒無汗鼻塞身疼發熱燥煩至於濕  
痰內動為咳又必因風因火因熱因燥因寒所挾各  
不相同至其乘肺則一也

風寒外束華蓋散參蘇飲加聲音不出風邪人參荊芥  
湯寒邪三拗湯遇冷咳發者橘皮半夏湯

火熱內燔加減瀉白散水煮金花丸加身熱如炙紫苑



膏

傷暑之咳自汗脈虛發渴人參白虎湯清暑益氣湯

傷濕之咳身重脈細痰多五苓散白朮湯加喘滿浮腫

欬氣丸濕熱素蘊於中黃連解毒湯滾痰丸濕熱素

蘊於上連聲逆氣不通者桑白皮散

傷燥之咳痰粘氣逆血腥杏仁蘿蔔子丸清金潤燥天

門冬丸鳳髓湯加面目浮腫蜜酥煎

內傷之咳治各不同火盛壯水金虛崇土鬱甚舒肝氣

欽定四庫全書

醫門法律

逆理肺食積和中房勞補下用熱遠熱用寒遠寒內

已先傷藥不宜峻至於上焦虛寒嘔唾涎沫則用溫

肺湯上中二焦俱虛則用加味理中湯三焦俱虛則

用加味三才湯

傷腎之咳氣逆煩冤牽引腰腹俛仰不利六味地黃湯

加五味子水飲與裏寒合作腹痛下利真武湯於中

有燥咳熱移大腸亦主腹痛下利毫釐千里尤宜辨

之



營衛兩虛之咳營虛發熱衛虛自汗或惡寒寧肺湯 虛勞之咳五味黃芪散麥門冬飲
心火刑肺見血人參芎歸湯
乾咳無痰火熱內壅用四物桔梗湯開提之傷酒熱積 用瓊玉膏滋潤之色慾過度腎水不升用八味丸蒸 動之
上半日咳多火在陽分宜白虎湯下半日咳多火在陰 分宜四物芩連湯
欽定四庫全書
醫門法律
久咳肺損肺痿痰中見血潮熱聲颯人參養肺湯血腥 喘乏鍾乳補肺湯久咳宜收瀋者人參清肺湯加聲 音不出訶子散
膏梁致咳比濕熱內蘊例治之加色慾過度元氣虛損 又不可盡攻其痰辛苦致咳比風寒外束例治之加 外寒裏其內熱須分寒熱多少以消息而施表裏兼 治之法
律六條



凡治咳不分外感內傷虛實新久襲用清涼藥少加疎  
散者因仍苟且貽患實深良醫所不為也

凡治咳遇陰虛火盛乾燥少痰及痰咯艱出者妄用二  
陳湯轉劫其陰而生大患者醫之罪也

凡咳而且利上下交征而不顧其中氣者十無一起  
如此死者醫殺之也

此有肺熱腎寒兩證水火不同無論用涼用溫總以  
回護中氣為主

欽定四庫全書

醫門法律

凡邪盛咳嘔斷不可用劫澀藥咳久邪衰其勢不銳方  
可澀之悞則傷肺必至咳無休止坐以待斃醫之罪  
也

凡屬肺痿肺癰之咳悞作虛勞妄補陰血轉滯其痰因  
致其人不救者醫之罪也

凡咳而漸至氣高汗漬宜不俟喘急痰鳴急補其下若  
仍治標亡本必致氣脫卒亡醫之罪也

金匱治咳五方



小青龍湯 方見痰飲門

桂苓五味甘草湯

茯苓四兩 桂枝四兩 甘草炙三兩 五味子半升

右四味以水八升煮取三升去渣分三溫服

苓甘五味薑辛湯

茯苓四兩 甘草三兩 乾薑三兩 細辛三兩 五味子半升

右五味以水八升煮取三升去渣溫服半升日三服

茯苓五味甘草去桂加薑辛夏湯

欽定四庫全書

醫門法律

茯苓四兩 甘草二兩 細辛二兩 乾薑二兩 五味子半 半夏各半

右六味以水八升煮取三升去渣溫服半升日三服

茯苓甘草五味薑辛湯 本方加大黃名曰茯苓薑味辛夏仁黃湯

茯苓四兩 甘草三兩 五味半升 乾薑三兩 細辛三兩 半夏半升 杏

仁半升 皮去

以水一斗煮取三升去渣溫服半升日三服

華蓋散



<p>麻黃<small>去根</small> 紫蘇子<small>炒</small> 杏仁<small>去皮</small> 桑白皮<small>炒</small> 赤茯苓  <small>皮</small> 橘紅<small>已上各</small> 甘草<small>五錢</small></p>	<p>水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾去渣不拘時服</p>	<p>參蘇飲</p>	<p>人參 蘇葉 乾葛 前胡 陳皮 枳殼 半夏          夏 茯苓<small>各八分</small> 木香 桔梗 甘草<small>各五分</small></p>	<p>水二盞薑五片棗二枚煎一盞熱服</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>人參荊芥湯</p>	<p>陳皮 荊芥穗 人參 半夏 通草 麻黃          桔梗<small>各一錢</small> 杏仁 細辛 甘草<small>各五分</small></p>	<p>水二盞薑三片棗二枚煎服</p>	<p>三拗湯</p>	<p>生甘草 麻黃<small>節不去</small> 杏仁</p>	<p>右咬咀二錢水二盞薑三片煎八分食遠服若增寒惡風取汗解加桔梗荊芥名五拗湯治咽痛</p>
---	------------------------------	------------	--	-----------------------	------------------------	--------------	--	--------------------	------------	------------------------------------	--





<p>橘皮半夏湯</p>	<p>陳皮 <small>兩半</small> 半夏 <small>錢二</small></p>	<p>右為末作二服水盞半薑十片煎七分溫服</p>	<p>加減瀉白散</p>	<p>桑白皮 <small>錢半</small> 地骨皮 陳皮 青皮 桔梗 甘草</p>	<p><small>炙</small> 黃芩 知母 <small>各七分</small></p>	<p>右水二盞煎八分食後溫服</p>	<p>水煮金花丸</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>南星 <small>生各</small> 半夏 <small>一兩</small> 寒水石 <small>一兩</small> 煨天麻 <small>錢五</small> 白麵 <small>兩三</small></p>	<p>雄黃 <small>錢一</small></p>	<p>右為細末滴水為丸小豆大每服五七十丸至百丸</p>	<p>煎沸湯下藥丸煮浮為度滂出淡漿浸另用生薑湯</p>	<p>下</p>	<p>紫苑膏</p>	<p>枇杷葉 <small>去毛</small> 木通 欵冬花 紫苑 杏仁 <small>去皮炒</small> 桑</p>	<p>白皮 <small>炙各</small> 大黃 <small>兩半</small></p>
--------------	--	--------------------------	--------------	--	--	--------------------	--------------	------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------	------------	--	--



右為細末煉蜜丸櫻桃大夜間噙化三五丸	人參白虎湯 <small>方見三氣門</small>	清暑益氣湯 <small>方見三氣門</small>	五苓散 <small>方見三氣門</small>	白朮湯 <small>方見三氣門</small>	欵氣丸	青皮 陳皮 檳榔 木香 杏仁 茯苓 郁	李仁 <small>去皮</small> 川當歸 廣茂 馬兜鈴 <small>炮</small> 葶藶 <small>各三錢</small> 人	欽定四庫全書 醫門法律	參 防已 <small>各四錢</small> 牽牛 <small>頭末二兩半</small>	右為細末薑汁麵糊丸如梧桐子大每服二十九加	至七十九丸食後薑湯送下	黃連解毒湯	黃連 <small>二錢</small> 黃芩 黃柏 梔子 <small>各一錢</small>	水二盞煎一盞溫服	滾痰丸 <small>方見痰飲門</small>	桑白皮散
-------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	-----	---------------------	--	----------------	---	----------------------	-------------	-------	--	----------	--------------------------	------



櫻桃大每服一丸同生薑細嚼下治肺經內外合邪	兩糯米粉并黃蠟一兩成粥更入蜜再熬和勻丸如	桑皮赤茯苓加麥門冬人參肉桂阿膠陳皮甘草各三	十九不拘時生薑湯下日三服 又方去防已前胡	右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如桐子大每服二	黃杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁麩炒黃研如膏已上各七錢半</small>	桔梗 桑白皮 防已 紫苑 赤茯苓 生地	天門冬 <small>去心一兩半焙</small> 百合 前胡 貝母 <small>煨</small> 半夏 <small>湯洗去滑</small>	欽定四庫全書 醫門法律	清金潤燥天門冬丸 治肺藏壅熱咳嗽痰唾稠粘	右為末粥糊丸桐子大每服五十丸白湯下	杏仁 蘿蔔子 <small>炒各一兩</small>	杏仁蘿蔔子丸	右咀每服七錢薑三片棗一枚煎七分食遠服	分 前胡 柴胡 紫蘇 赤茯苓 枳殼 甘草 <small>等各</small>	桑白皮 <small>炒</small> 桔梗 川芎 防風 薄荷 黃芩
----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--	---------------------	--	----------------	----------------------	-------------------	----------------------------	--------	--------------------	---	-------------------------------------



咳嗽語聲不出咽喉妨礙狀如梅核噎塞不通膈氣  
噎食皆可服 又方單用天門冬十兩生地三斤取  
汁為膏麥冬八兩膏子為丸如桐子大每服五十九  
道遙散下道遙散須去甘草加人參治婦人喘嗽手  
足煩熱骨蒸寢汗口乾引飲面目浮腫

鳳髓湯 治咳嗽大能潤肺

牛髓 一斤取蹄骨中者 白蜜 半斤 杏仁 四兩去皮尖研如泥 乾山藥 四兩

炒 胡桃仁 去皮四兩另研

欽定四庫全書

醫門法律

右將髓蜜二味沙鍋內熬沸以絹濾去渣盛磁瓶內  
將杏仁等三味入瓶內以紙密封瓶口重湯煮一日  
夜取出冷定每早晨白湯化一二匙服

蜜酥煎

白沙蜜 一升 牛酥 一升 杏仁 三升去皮尖研如泥

右將杏仁於磁盆中用水研取汁五升淨銅鍋內勿  
令油膩垢先傾三升汁於鍋內刻木記其淺深減記  
又傾汁二升以緩火煎減所記處即入蜜酥二味煎



至記處藥成置淨磁器中每日三次以溫酒調一匙		
或以米飲白湯皆可調服七日唾色變白二七唾稀		
三七嗽止此方非獨治嗽兼補虛損去風燥悅肌膚		
婦人服之尤佳		
溫肺湯		
陳皮	半夏	
肉桂	乾薑	
白芍藥	杏仁	
各一錢		
五味子	細辛	
甘草	各四分	
水盞半煎八分食後服仁齋方有阿膠無芍藥		
欽定四庫全書		
醫門法律		
加味理中湯 治脾肺俱虛咳嗽不已		
人參	白朮	
茯苓	甘草	
陳皮	半夏	
乾	薑	
五味子	細辛	
右咬咀每服三錢薑三片棗一枚煎七分食遠服		
加味三才湯		
天門冬	生地黄	
人參	各等分	
水煎服		
六味地黃湯		



<p>地黄<small>錢二</small> 牡丹皮<small>錢一</small> 白茯苓<small>錢一</small> 山藥<small>錢一</small> 山茱萸<small>錢一</small> 澤瀉<small>分七</small></p>	<p>水煎食前服</p>	<p>寧肺湯</p>	<p>人參 當歸 白朮 熟地 川芎 白芍 五味子 麥門冬 桑皮 白茯苓 甘草<small>炙各七分</small> 阿膠<small>錢炒一</small></p>	<p>右水二盞薑三片紫蘇五葉煎八分食遠服</p> <p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>五味黃芪散</p> <p>麥門冬 熟地黄<small>錢各一</small> 桔梗 黃芪<small>各錢半</small> 五味子 人參 芍藥 甘草<small>各五分</small></p>	<p>右作一服水二盞煎八分食後溫服</p>	<p>麥門冬飲</p> <p>川芎 當歸 白芍 生地 黃柏 知母 麥門冬<small>錢各一</small> 五味子<small>粒十五</small> 桑皮<small>分八</small></p>	<p>水二盞薑一片棗一枚煎八分食後服</p>
---	--------------	------------	--	---	--	-----------------------	--	------------------------



人參芎歸湯

當歸 川芎 白芍藥各二分 人參 半夏 陳皮

赤茯苓 阿膠炒成珠 細辛 北五味 甘草各灸

一分

右咬咀每服五錢薑三片棗一枚煎服

四物桔梗湯

當歸 川芎 芍藥 熟地 桔梗 黃蘗炒各一錢

右水二盞煎八分加竹瀝半盞薑汁一匙和勻服

欽定四庫全書

醫門法律

瓊玉膏

人參十二兩 白茯苓十五兩 琥珀 沈香各半兩 大生地

十斤洗淨銀石器內杵  
細取自然汁盛忌鐵器 白蜜五斤蒸去渣

右本方原無沈香琥珀乃臞仙加入自云奇効異常

今錄其方先以地黃汁同蜜熬沸攪勻用絹濾過將

人參等為細末和蜜汁入磁瓶或銀瓶內用棉紙十

數層加箬封固瓶口入砂礪內或銅鍋內以長流水

煮沒瓶頸用桑柴火煮三晝夜取出換過油單臘紙



<p>扎口懸浸井中半日以出火氣提起仍煮半日以出氣然後收藏每日清晨及午後取一二匙用溫酒一兩調服白湯調亦可忌雞犬見</p>	<p>八味丸 <small>方見中寒門</small></p>	<p>白虎湯 <small>方見三氣門</small></p>	<p>四物芩連湯 <small>即四物湯加黃芩黃連</small></p>	<p>人參養肺湯</p>	<p>人參 阿膠 貝母 杏仁 <small>去皮尖</small> 桔梗 茯苓</p>	<p>欽定四庫全書 <small>醫門法律</small></p>	<p>桑皮 枳實 <small>炒</small> 甘草 <small>各五分</small> 柴胡 <small>一錢</small> 五味子 <small>十二粒</small></p>	<p>右水二盞薑三片棗一枚煎八分食後服</p>	<p>鍾乳補肺湯</p>	<p>鍾乳粉 <small>另研如米</small> 桑皮 <small>各三兩</small> 肉桂 白石英 <small>另研如米</small> 五味子 <small>各二兩</small></p>	<p>子 欵冬花 紫苑茸 麥門冬 人參 <small>各二兩</small></p>	<p>右為粗末次以鍾乳石英同和勻每服四錢水盞半薑五片棗一枚粳米一小撮煎七分去渣食後服</p>	<p>訶子散 治久嗽語聲不出</p>
---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------	---	-----------------------------------	---	-------------------------	--------------	--	--	--	--------------------





訶子肉 炒 通草 各錢半 杏仁 去皮尖炒一錢

水二盞薑三片棗一枚煎八分食後服

真武湯 方見中寒門

關格門 論二首律三條

關格論

喻昌曰關格之證自靈素以及難經仲景脈法皆深言之然無其方也後世以無成方依傍其中玄言奧義總不參研空存其名久矣間有以無師之智臨證處方傳

欽定四庫全書

醫門法律

之於書眼中金屑不適於用可奈之何謹以尚論之懷暢言其理素問謂人迎一盛病在少陽二盛病在太陽三盛病在陽明四盛以上為格陽寸口一盛病在厥陰二盛病在少陰三盛病在太陰四盛已上為關陰人迎與寸口俱盛四倍以上為關格關格之脈羸不能極於天地之精氣則死矣此以三陽之府三陰之藏分診於結喉兩旁人迎之位兩手寸口大淵之位蓋隨人迎寸口經脈之行度而施其刺法也靈樞言刺之從所分人



迎之盛瀉其陽補其所合之陰二瀉一補從所分寸口  
之盛瀉其陰補其所合之陽二瀉一補皆以上氣和乃  
止至於用藥則從兩手寸關尺三部之脈辨其藏府之  
陰陽故靈樞復言邪在府則陽脈不和陽脈不和則氣  
留之氣留之則陽氣盛矣陽氣大盛則陰脈不和陰脈  
不和則血留之血留之則陰氣盛矣陰氣太盛則陽氣  
不能榮也故曰關陽氣太盛則陰氣不能榮也故曰格  
陰陽俱盛不能相榮也故曰關格關格者不能盡期而

欽定四庫全書

醫門法律

死也此則用藥之權衡隨其脈之尺陰寸陽偏盛俱盛  
而定治耳越人宗之發為陰乘陽乘之脈因推其乘之  
之極上魚為溢入尺為覆形容陰陽偏而不返之象精  
矣至仲景復開三大法門謂寸口脈浮而大浮為虛大  
為實在尺為關在寸為格關則不得小便格則吐逆從  
兩手寸口關陰格陽過盛中察其或浮或大定其陽虛  
陽實陰虛陰實以施治療蓋於靈樞陽太盛則陰不能  
榮陰太盛則陽不能榮以及越人陰乘陽乘之法加以



浮大之辨而虛實始得瞭然不爾關則定為陰實格則定為陽實矣抑何從得其微細耶此一法也謂心脈洪大而長是心之本脈也上微頭小者則汗出下微本大者則關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死此則深明關格之源由於五志厥陽之火遏鬱於心胞之內其心脈上微見頭小亦陽虛之驗下微見本大亦陽實之驗頭無汗者可治有汗則心之液外亡自焚而死矣在二陽之病發心脾且不得隱曲男子少精女子不月

欽定四庫全書

醫門法律

傳為風消索澤而不治沉關格之病精氣竭絕形體毀阻離絕菀結憂愁恐怒五藏空虛氣血離守厥陽之火獨行上合心神同處於方寸之内存亡之機間不容髮可不一辨察之乎此二法也謂跌陽脈伏而濇伏則吐逆水穀不化濇則食不得入名曰關格診跌陽足脈或伏或濇辨胃氣所存幾何伏則水穀入而不化胃氣之所存可知矣濇則并其食亦不得入胃氣之所存更可知矣榮衛之行遲水穀之入少中樞不運下關上格豈



待言哉此三法也仲景金針暗度有此三法大槩在顧慮其虛矣因是上下古今搜採羣言而諸大老名賢無一論及此證者惟雲岐子迷其陰陽反背之狀傳其所試九方譬如航海萬里得一聲氣相通之侶欣慰無似遑計其短乎然不欲後人相安其說又不忍緘口無言也其謂陰陽易位病名關格胸膈上陽氣常在則熱為主病身半已下陰氣常在則寒為主病胸中有寒以熱藥治之丹田有熱以寒藥治之若胸中寒熱兼有以主

欽定四庫全書

醫門法律

客之法治之治主當緩治客當急此從傷寒論胸中有寒丹田有熱立說實非關格本證所引內經運氣治主客之法亦屬無據至於靈素難經金匱之文絕不體會所定諸方渾入後人惡劣窠臼觀之殊不慊耳方中小疵雜用二陳五苓枳殼厚朴檳榔木香是也方中大疵雜用片腦麝香附子皂角牽牛大黃朴硝是也夫陰陽不交各造其偏而謂陰反在上陽反在下可乎九死一生之證而以霸術劫奪其陰陽可乎仲景之以趺陽為



診者正欲人調其營衛不偏陰偏陽一味沖和無忤聽胃氣之自為敷布由一九而二八三七四六乃始得協於平也豈一蹴所能幾耶故不問其關於何而開格於何而通一惟求之於中握樞而運以漸透於上下俟其跌陽脈不伏不瀋營氣前通乃加意於營衛氣前通乃加意於衛因其勢而利導之庶不與藥扞格耳若營氣纔通即求之衛衛氣纔通即求之營且為生事喜功況躁不能需亟思一逞乎夫死裏求生之治須得死裏求

欽定四庫全書

醫門法律

生之人嗒然若喪先熄其五志交煽之火治吐逆之格由中而漸透於上治不洩之關由中而漸透於下治格而且關由中而漸透於上下所謂三年之艾不蓄則不免死亡蓄之則免於死亡矣人亦何為而不蓄之耶或者病余不立一方此終身不靈之人也寧無見其方而反惑耶不得已姑立進退黃連湯一方要未可為中人道也

進退黃連湯方論



喻昌曰黃連湯者仲景治傷寒之方也傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之以其胃中得升而獨治於下為下寒腹中痛陽不得降而獨治於上為胸中熱欲嘔吐與此湯以升降陰陽固然矣而濕家下之舌上如胎者丹田有熱胸中有寒亦用此方何耶後人牽強作解不得製方之旨又安能取裁其方耶蓋傷寒分表裏中三治表裏之邪俱盛則從中而和之

欽定四庫全書

醫門法律

故有小柴胡湯之和法於人參甘草半夏生薑大棗助胃之中但加柴胡一味透表黃芩一味透裏尚恐圭角少露有碍於和於是去滓復煎漫無異同飲入胃中聽胃氣之升者帶柴胡出表胃氣之降者帶黃芩入裏一和而表裏之邪盡服其有未盡者加工治之不相扞格矣至於丹田胸中之邪則在於上下而不為表裏即變柴胡湯為黃連湯和其上下以桂枝易柴胡以黃連易黃芩以乾薑代生薑飲入胃中亦聽胃氣之上下敷布



故不問其上熱下寒上寒下熱皆可治之也夫表裏之邪則用柴胡黃芩上下之邪則用桂枝黃連表裏之邪則用生薑之辛以散之上下之邪則用乾薑之辣以開之仲景聖法灼然矣昌欲進退其上下之法操何術以進退之邪前論中求之於中握樞而運以漸透於上下俟其營氣前通衛氣前通而為進退也然而難言之矣格則吐逆進而用此方為宜蓋太陽主開太陽不開則胸間窒塞食不得入入亦復出以桂枝為太陽經藥和

欽定四庫全書

醫門法律

營衛而行陽道故能開之也至於五志厥陽之火上入桂枝又不可用矣用之則以火濟火頭有汗而陽脫矣其關則不得小便退之之法從胃氣以透入陰分桂枝亦在所不取但胃之關門已閉少陰主闔少陰之氣不上胃之關必不開矣昌意中尤謂少陰之脈沈而滯與跌陽之脈伏而濇均足慮也內經常兩言之曰腎氣獨沈曰腎氣不衡夫真氣之在腎中猶權衡也有權有衡則關門時開時闔有權無衡則關門有闔無開矣小溲



亦何從而出耶是則腎氣丸要亦退之之中所有事矣  
腎氣交於胃則關門開交於心則厥陽之火隨之下伏  
有不得不用之時矣進退一方於中次第若此夫豈中  
人所能辨哉

律四條

凡治關格病不知批郤導竅但冀止嘔利溲亟治其標  
伎窮力竭無益反損醫之罪也

凡治關格病不參診人迎跌陽太衝三脈獨持寸口已

欽定四庫全書

醫門法律

屬疎畧若并寸口陰陽之辨懵然醫之罪也

凡治關格病不辨脈之陽虛陽實陰虛陰實而進退其

治盲人適路不辨東西醫之罪也

凡治關格病不崇王道輒操霸術逞己之能促人之死

醫之罪也

雲岐子關格九方錄出備覽臨證製方懲而改之亦

師資之法也

柏子仁湯





人參 半夏 白茯苓 陳皮 柏子仁 甘草

炙麝香 少許 另研

右生薑煎入麝香調勻和服加郁李仁更妙

按此方用六君子湯去白朮之滯中加柏子仁郁李

仁之潤下少加麝香以通關竅非不具一種苦心然

終不識病成之理不知游刃空虛欲以麝香開竅適

足以轉閉其竅耳

人參散

欽定四庫全書

醫門法律

人參 麝香 片腦 各少許

右末甘草湯調服

按此方輒用腦麝耗散真氣繞過胸中大氣宗氣穀

氣交亂生機索然盡矣能愈病乎

既濟丸 治關格脈沈細手足厥冷者

熟附子 童便浸 各一錢 人參 麝香 少許

右末糊丸桐子大麝香為衣每服七丸燈心湯下

按方下云脈沈細手足厥冷全是腎氣不升關門不



<p>開之候參附固在所取但偏主於陽無陰以協之亦何能既濟耶且以麝香為衣走散藥氣無繇下達即使藥下關閉小便暫行其格必愈甚矣</p>
<p>檳榔益氣湯 治關格勞後氣虛不運者</p>
<p>檳榔<small>用多</small> 人參 白朮 當歸 黃芪 陳皮 升</p>
<p>麻 甘草 柴胡 枳殼</p>
<p>生薑煎服</p>
<p>按此方用補中益氣加檳榔枳殼且云檳榔多用意</p>
<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>
<p>謂補中益氣之升檳榔之墜一升一墜關格可通耳不知升則逾格墜則逾關皆必不得之數也</p>
<p>木通二陳湯 治心脾疼後小便不通皆是痰隔於</p>
<p>中焦氣滯於下焦</p>
<p>木通 陳皮<small>去</small> 白茯苓 半夏<small>薑</small> 甘草 枳殼</p>
<p>右生薑煎服服後徐徐探吐更不通服加味小胃丹加味控涎丹</p>
<p>按此復以二陳加木通枳殼亦即補中益氣加檳榔</p>



枳殼之法但關格病屬火者多屬痰者少酷日當空  
得片雲掩之不勝志喜人身火患顧可盡劫其痰乎  
況痰膈不羸亦不關關格病羸不能極於天地之精  
氣明是陰精日削陽光日亢之候乃欲舉痰為治且  
服小胃控涎等屬藥是何言歟

導氣清利湯 治關格吐逆大小便不通

猪苓 澤瀉 白朮 人參 藿香 栝子仁

半夏 陳皮 甘草 木通 梔子 白茯苓

欽定四庫全書

醫門法律

檳榔 枳殼 大黃 厚朴 麝香 黑牽牛

右生薑煎服兼服木香和中丸吐不止灸氣海天樞  
如又不通用蜜導

按此方彙聚通利之藥少佐參朮以為導氣之功無  
往不到矣不知淹淹一息之人有氣可鼓而開其久  
閉之關乎纔入胃中立增吐逆尚謂吐不止灸氣海  
天樞加以火攻可堪之乎大便不通用蜜導小便不  
通用何導之可惱可笑



加味麻仁丸 治關格大小便不通

大黃一兩 芍藥 厚朴 當歸 杏仁 麻仁 檳榔

木香 枳殼 各五錢

右為末蜜丸熟水下

按此方頗力於通大便吾恐大便未通胃氣先損食

愈不納矣不思大便即通利如常其關格固自若也

服此丸一次必增困三倍連服必不救矣

皂角散 治大小便關格不通經三五日者

欽定四庫全書

醫門法律

大皂角 燒存性

右為末米湯調下又以猪脂一兩煮熟以汁及脂俱

食之又服八正散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈心草茶

根

按此等作用只顧通二便之標不深求關格之本詎

知皂角末入胃千鍼攢簇肥人萬不可堪况羸人乎

隨服人脂人膏已不能救其浚削况更加桃仁朴硝

助虐乎



大承氣湯

方見卷

按此乃治傷寒胃實之方用治關格倒行逆施草菅人命莫此為甚

九方不達病成之理漫圖弋獲其以峻藥加入六君子湯補中益氣湯中猶可言也其以峻藥加入二陳湯及八正承氣等方不可言矣至於片腦麝香皂角等藥驟病且不敢輕用况垂斃者乎伎轉出轉窮所以為不學無術徒讀父書之流歟

欽定四庫全書

醫門法律

進退黃連湯方

自擬

方論見前

黃連

薑汁炒

乾薑

炮

人參

人乳拌蒸

桂枝

一錢

半夏

薑製

一錢五分

大棗

二枚

進法用本方七味俱不製水三茶盞煎一半溫服

退法不用桂枝黃連減半或加肉桂五分如上逐味

製熟煎服法同但空朝服崔氏八味丸三錢半饑服

煎劑耳

崔氏八味丸

方見一卷



資液救焚湯 自擬 治五志厥陽之火

生地黄 二錢 取汁 麥門冬 二錢 取汁 人參 一錢五分 乳拌蒸 炙甘草

一錢 真阿膠 一錢 胡麻仁 一錢 炒研 栝子仁 七分 炒 五味子 四分

紫石英 一錢 寒水石 一錢 滑石 一錢 敲碎不為末 生犀汁 研

三 生薑汁 二茶匙

右除四汁及阿膠其八物用名山泉水四茶杯緩火煎至一杯半去渣入四汁及阿膠再上火畧煎至膠烊化斟出調牛黃細末五釐日中分二三次熱服空

欽定四庫全書

醫門法律

朝先服崔氏八味丸三錢

昌不獲已聊擬二方為治關格之榜樣至於病變無方生心之化裁亦當與之無方初非以是印定學人眼目且并向癡人說夢也

醫門法律卷十



欽定四庫全書

子部  
醫門法律卷十一

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣盧 澂

謄錄貢生臣畢所謫



欽定四庫全書

醫門法律卷十一

南昌喻昌撰

消渴門

論二首  
律五條

法四條

消渴論

喻昌曰消渴之患常始於微而成於著始於胃而極於肺腎始如以水沃焦水入猶能消之既而以水投石水去而石自若至於飲一澍一飲一澍二則燥火劫其真

欽定四庫全書

醫門法律

陰操立盡之術而勢成熇熇矣內經有其論無其治金匱有論有治矣而集書者採傷寒論厥陰經消渴之文湊入後人不能決擇斯亦不適於用也蓋傷寒傳經熱邪至厥陰而盡熱勢入深故渴而消水及熱解則不渴且不消矣豈雜證積漸為患之比乎謹從內經擬議言之經謂凡治消瘵什繫偏枯痿厥氣滿發逆肥貴人則膏粱之疾也此中消所由來也肥而不貴食弗給於鮮貴而不肥飡弗過於饗肥而且貴醇酒厚味孰為限量





哉久之食飲釀成內熱津液乾涸求濟於水然水入尚  
能消之也愈消愈渴其膏梁愈無已而中消之病遂成  
矣夫既痺成為消中隨其或上或下火熱熾盛之區以  
次傳入矣上消者胃以其熱上輸於肺而子受母累心  
復以其熱移之於肺而金受火刑金者生水而出高源  
者也飲入胃中遊溢精氣而上則肺通調水道而下今  
火熱入之高源之水為暴虐所逼合外飲之水建瓶而  
下飲一澍二不但不能消外水且並素醞水精竭絕而

欽定四庫全書

醫門法律

盡輸於下較大腑之暴注暴泄尤為甚矣故死不治也  
所謂由心之肺謂之死陰死陰之屬不過三日而死者  
此之謂也故飲一澍二第一危候也至於胃以其熱由  
關門下傳於腎或以石藥耗其真女謁竭其精者陽  
強於外陰不內守而小澍渾濁如膏飲一澍一腎消之  
證成矣經謂石藥之性悍又謂脾風傳之腎名曰疝瘕  
少腹冤熱而痛出白液名曰蠱明指腎消為言醫和有  
云女子陽物也晦淫則生內熱惑蠱之疾此解冤熱及



蠱義甚明王太僕謂消爍肌肉如蠱之燭日漸損削乃  
從消字起見淺矣淺矣夫惑女色以喪志精泄無度以  
至水液渾濁反從火化亦最危候經云君火之下陰精  
承之故陰精有餘足以上承心火則其人壽陰精不足  
心火直下腎中陽精所降其人夭矣故腎者胃之關也  
關門不開則水無輸泄而為腫滿關門不閉則水無底  
止而為消渴消渴屬腎一證金匱原文未脫其曰飲一  
斗溲一斗者腎氣丸主之於以蒸動精水上承君火而

欽定四庫全書

醫門法律

止其下入之陽光此正通天手眼張子和輒敢詆之既  
詆仲景復諛河間謂其神芎丸以黃芩味苦入心牽牛  
大黃驅火氣而下以滑石引入腎經將離入坎真得黃  
庭之祕顛倒其說阿私所好識趣卑陋若此又何足以  
入仲景之門哉何栢齋消渴論中已辨其非昌觀戴人  
吐下諸案中從無有治消渴一案者可見無其事即無  
其理矣篇首論火一段非不有其理也然以承氣治壯  
火之理施之消渴又無其事矣故下消之火水中之火



也下之則愈燔中消之火竭澤之火也下之則愈傷上  
消之火燎原之火也水從天降可滅徒攻腸胃無益反  
損夫地氣上為雲然後天氣下為雨是故雨出地氣地  
氣不上天能雨乎故亟升地氣以慰三農與亟升胃氣  
以溉三焦皆事理之必然者耳不與昔賢一為分辨後  
人亦安能行其所明哉

消渴續論

昌著消渴論聊會內經大意謂始於胃而極於肺腎定

欽定四庫全書

醫門法律

為中上下之三消其他膈消食飢等證要亦中上之消  
耳然未得金匱之實據心恒不慊越二歲忽憶內經云  
有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行胃氣熱熱氣  
薰胸中故內熱恍然悟胸中受病消息惟是胃中水穀  
之氣與胸中天真灌注環周乃得清明在躬若有所勞  
倦傷其大氣宗氣則胸中之氣衰少胃中穀氣因而不  
盛穀氣不盛胸中所傷之氣愈益難復而不能以充行  
於是穀氣留於胃中胃中鬱而為熱熱氣薰入胸中混



合其衰少之氣變為內熱胸胃間不覺易其沖和之舊  
矣求其不消不渴寧可得乎透此一關讀金匱所不了  
了者今始明之其云寸口脈浮而遲浮即為虛遲即為  
勞虛則衛氣不足勞則榮氣竭跌陽脈浮而數浮則為  
氣數則消穀而大堅氣盛則澁數澁數則堅堅數相搏  
即為消渴舉寸口以候胸中之氣舉跌陽以候胃中之  
氣顯然有脈之可循顯然有證之可察然且難解其微  
焉蓋陰在內為陽之守陽在外為陰之固寸口脈浮陰  
不內守故衛外之陽浮即為虛也寸口脈遲陽不外固  
故內守之陰遲即為勞也總因勞傷榮衛致寸口脈虛  
而遲也然榮者水穀之精氣衛者水穀之悍氣虛而且  
遲水穀之氣不上充而內鬱已見膈虛胃熱之一班矣  
更參以跌陽脈之浮數浮則為氣即內經熱氣薰胸中  
之變文數則消穀而大堅昌前論中既如以水投石水  
去而石自若偶合胃中大堅消穀不消水之象可見火  
熱本足消水也水入本足救渴也胃中堅燥全不受水

欽定四庫全書

醫門法律



之浸潤轉從火熱之勢急奔膀胱故洩數洩去其內愈  
燥所以堅數相搏即為消渴直引內經味過於苦久從  
火化脾氣不濡胃氣乃厚之意為消渴之源精矣微矣  
晉唐以後代不乏賢隨其聰敏揣摩內經各自名家卒  
皆不入仲景堂奧其所得於內經者淺耳使深則能隨  
證比類各出脈證方治以昭成法而金匱遺編家傳戶  
誦之矣即如消渴證相沿謂中消者宜下之共守一語  
更無別商豈一下可了其局乎抑陸續徐下之乎夫胃

欽定四庫全書

醫門法律

已大堅不受膏沐輒投承氣堅者不受瑕者受之矣膀胱  
不受大腸受之矣豈不乘其藥勢傳為痢下驚澹中  
滿腫脹之證乎總錄謂末傳能食者必發腦疽背瘡不  
能食者必傳中滿鼓脹皆為不治之證諸家不亟亟  
於始傳中傳反於末傳多方療治如忍冬藍葉薺芎丸  
散及紫蘇葶藶中滿分消湯丸欲何為耶金匱於小洩  
微覺不利蚤用文蛤一味治之方書從不錄用詎知軟  
堅之品非劫陰即傷陰獨此一種平善無過兼可利水



誠足寶乎潔古謂能食而渴者白虎加人參湯不能食而渴者錢氏白朮散加葛根末傳瘡疽者火邪盛也急攻其陽無攻其陰下焦元氣得强者生失强者死末傳中滿者高消中消制之太過速過病所上熱未除中寒復起非藥之罪用藥時失其緩急之制也潔古老人可謂空谷足音矣所云無攻其陰得强者生失强者死皆慮泉竭之微言令人聳然起敬於是追步後塵徐商一語曰三消總為火病豈待末傳瘡疽始為火邪勝耶然

欽定四庫全書

醫門法律

火之在陽在陰分何藏府合何藏府宜升宜降宜折宜伏各各不同從其性而治之使不相扞格乃為良法若不治其火但治其熱火無所歸熱寧有止耶如腎消陰病用六味丸陽病用八味丸此亦一法若謂下消只此一法其去中消宜下之說能以寸哉

內經陰陽別論曰二陽結謂之消二陽者陽明也手陽明大腸主津病消則目黃口乾是津不足也足陽明胃主血病熱則消穀善饑血中伏火乃血不足也結



者津血不足結而不行皆燥之為病也

內經曰心移熱於肺傳為膈消張子和謂膈消猶未及於肺至心移寒於肺乃為肺消如此泥文害意非能讀內經者也豈有心移熱於肺肺傳其熱於膈猶未及肺之理必變經文為心移熱於膈傳為肺消乃不泥乎要識心肺同居膈上肺為嬌藏移寒移熱總之易入但寒邪入而外束熱邪入而外傳均一肺消而治則有分矣

欽定四庫全書

醫門法律

劉河間論三消之疾本濕寒之陰氣極衰燥熱之陽氣太甚六氣中已遺風火二氣矣且以消渴消中消腎分名三消豈中下二消無渴可言耶及引經言有心肺氣厥而渴有肝痺而渴有痺熱而渴有胃與大腸結熱而渴有脾痺而渴有腎熱而渴有小腸痺熱而渴愈推愈泛其不合論消渴但舉渴之一端為燥熱亡液之驗誠不可解玉機微義深取其說發煖藥補腎之誤吾不知煖藥果為何藥也世豈有以煖藥治



消渴之理哉其意蓋在非金匱之主腎氣丸耳夫腎  
氣丸蒸動腎水為治消渴之聖藥後世咸知之而何  
栢齋復辨之昌恐後學偶閱子和宗厚之說反滋疑  
眩故再陳之

痺成為消中胃熱極深胃火極熾以故能食易饑多渴  
諸家咸謂宜用大承氣湯下之矣不知漸積之熱素  
蘊之火無取急下下之亦不去徒損腸胃轉增其困  
耳故不得已而用大黃當久蒸以和其性更不可合

欽定四庫全書

醫門法律

枳實厚朴同用助其疾趨之勢潔古用本方更其名  
曰順利散隱然取順利不取攻劫之意方下云治中  
消熱在胃而能食小便赤黃微利至不欲食為効不  
可多利昌恐微利至不欲食胃氣已不存矣承氣非  
微利之法而可瀆用哉子和更其方為加減三黃丸  
合大黃芩連用之不用枳朴矣方下云治丹石毒及  
熱渴以意則度須大實者方用曾不思消渴證真氣  
為熱火所耗幾見有大實之人耶然則欲除胃中火





熱必如之何而後可昌謂久蒸大黃與甘草合用則  
急緩互調與人參合用則攻補兼施如充國之屯田  
金城坐困先零庶幾可圖三年之艾目前縱有乘機  
鬪捷之著在所不舉如之何欲取効眉睫耶昔賢過  
矣

律五條

凡治初得消渴病不急生津補水降火徹熱用藥無當  
遷延誤人醫之罪也

欽定四庫全書

醫門法律

凡治中消病成不急救金水二藏泉之竭矣不云自中  
醫之罪也

凡治肺消病而以地黃丸治其血分腎消病而以白虎  
湯治其氣分執一不通病不能除醫之罪也

凡消渴病少愈不亟回枯澤稿聽其土燥不生致釀瘡  
疽無救醫之罪也

凡治消渴病用寒涼大過乃至水勝火湮猶不知反漸  
成腫滿不救醫之罪也



消渴門諸方

金匱腎氣丸 本文云男子消渴小便反多以飲一

斗小便一斗腎氣丸主之即崔氏八味丸治脚氣

上入少腹不仁之方也

乾地黄八兩 山茱萸 山藥各四兩 澤瀉 白茯苓

牡丹皮各三兩 肉桂 附子炮各一兩

右八味末之煉蜜為丸梧子大酒下十五丸日再服

按王太僕註內經云火自腎而起謂龍火龍火當

欽定四庫全書

醫門法律

以火逐火則火可滅若以水治火則火愈熾此必然

之理也昌更謂用桂附蒸動腎水開闔胃關為治消

渴喫繁大法胡乃張子和別有肺腸前論中已詳之

矣但至理難明淺見易惑局方變其名為加減八味

丸加五味子一兩半減去附子豈非以五味之津潤

勝於附子之燥熱耶舉世咸樂宗之大惑不解可奈

何哉

金匱文蛤散 本文云渴欲飲水不止者文蛤散主



之

文蛤五兩

右一味杵為散以沸湯五合和服方寸匙

按傷寒論用此治候以水噴人面肌膚粟起之表證  
今消渴裏證亦用之蓋取其功擅軟堅且利水徹熱  
耳前已論悉

再按金匱治消渴止用腎氣丸五苓散文蛤散三方  
而五苓又從傷寒證中採入白虎加人參湯亦然所

欽定四庫全書

醫門法律

以用方者當會通全書而引伸以求其當也

金匱白虎加人參湯 原治太陽中暈汗出惡寒身

熱而渴 去知母之苦加淡竹葉麥門冬之甘名

竹葉石膏湯治虛煩證

知母<sub>六兩</sub>石膏<sub>一斤</sub>碎  
甘草<sub>三兩</sub>粳米<sub>六合</sub>人參<sub>二兩</sub>

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三

服

按此治火熱傷其肺胃清熱救渴之良劑也故消渴



病之在上焦者必取用之東垣以治膈消潔古以治	能食而渴者其不能食而渴者用錢氏白朮散倍加	葛根而東垣復參內經膏粱之病不可服芳草石藥	治之以蘭除其陳氣之義一變其方為蘭香飲子用	石膏知母生熟甘草人參加入蘭香防風白苳蔻仁	連翹桔梗升麻半夏再變其方為生津甘露飲子用	石膏人參生熟甘草知母加黃蘗杏仁山梔華澄茄	白葵白苳蔻白芷連翹薑黃麥門冬蘭香當歸身桔	欽定四庫全書 醫門法律	梗升麻黃連木香柴胡藿香全蝎而為之辭曰此制	之緩也不惟不成中滿亦不傳下消矣三消皆可用	昌實不敢信其然也乃至三因之石子蠶尾湯潔古	之清涼飲子俱從此方增入他藥引入他藏全失急	救肺胃之意此後賢之所以為後賢耶	竹葉黃芪湯 治消渴證氣血虛胃火盛而作渴	淡竹葉 生地黃 各二錢 黃芪 麥門冬 當歸	川芎 黃芩 炒 甘草 芍藥 人參 半夏 石
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	---------------------	-----------------------	-----------------------



<p>膏 煨各 一錢</p>	<p>右水煎服</p>	<p>按前白虎加人參湯專治氣分燥熱此方兼治氣血燥熱後一方專治血分燥熱宜辨證而擇用之</p>	<p>生地黄飲子 治消渴咽乾面赤煩燥</p>	<p>人參 生乾地黄 熟乾地黄 黃芪 天門冬</p>	<p>麥門冬 枳殼<small>炒</small> 石斛 枇杷葉 澤瀉 甘</p>	<p>草<small>炙各等分</small></p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>右剉散每服三錢水一盞煎至六分去滓食遠臨卧</p>	<p>頓服 此方生精補血潤燥止渴佐以澤瀉枳殼疎</p>	<p>導二腑使心火下降則小腑清利肺經潤澤則大腑</p>	<p>流暢宿熱既除其渴自止故取用之</p>	<p>錢氏白朮散 治虛熱而渴</p>	<p>人參 白朮 白茯苓 甘草 藿香 木香<small>各一</small></p>	<p><small>兩</small> 乾葛<small>二兩</small></p>	<p>右為末每服三錢水煎溫服如飲水多多與服之</p>
--------------------	-------------	---	------------------------	----------------------------	---	-----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------	--	---	----------------------------



按仁齋用本方加五味子柴胡各三錢分十劑煎服 治消渴不能食海藏云此四君子加減法亦治濕勝 氣脫泄利太過故虛熱作濕在所必用	宣明黃芪湯 治心移寒於肺為肺消飲少洩多當 補肺平心	黃芪 <sup>三</sup> 五味子 人參 麥門冬 桑白皮 <sup>各二</sup> 兩	枸杞子 熟地黃 <sup>各一</sup> 兩半	右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服	欽定四庫全書 醫門法律	宣明麥門冬飲子 治心移熱於肺傳為膈消胸滿 心煩精神短少	人參 茯神 麥門冬 五味子 生地黃 炙 甘草 知母 葛根 括萎根 <sup>各等</sup> 分	右呶咀每服五錢加竹葉十四片煎七分溫服無時 按宣明二方為內經心移寒移熱兩證各出其治一 種苦心非不可嘉然移寒移熱其勢頗銳而生津養 血其應差緩情非的對易老門冬飲子亦然昌謂心
---	------------------------------	---	-----------------------------	--------------------	----------------	--------------------------------	--	--



<p>之移寒必先束肺之外郭用參芪補肺加散寒之藥可也而用枸杞熟地黃補腎則迂矣用桑白皮瀉肺其如外束之寒何至心之移熱治以鹹寒先入其心如文蛤散之類自無熱可移正直走大梁解圍之上者何不及之所以觀於海者難為水也</p>	<p>易老門冬飲子 治老弱虛人大渴</p>	<p>人參 枸杞子 白茯苓 甘草 <small>各等分</small> 五味子</p>	<p>麥門冬 <small>各半兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>右薑水煎服</p>	<p>按易老方即變宣明麥冬飲子去生地知母葛根加枸杞也方下不言心移熱於肺惟以治老弱虛人大渴而增枸杞之潤去地黃之泥知母之苦葛根之發立方於無過治本之圖不為迂矣</p>	<p>猪肚丸 治強中消渴</p>	<p>黃連 粟米 括蕒根 茯神 <small>各四兩</small> 知母 麥門</p>	<p>冬 <small>各二兩</small></p>
--	-----------------------	---	-------------------------------	------------------------	--------------	--	------------------	--	-----------------------------



<p>右為細末將大猪肚一箇洗淨入末藥於內以麻線縫合口置甑中炊極爛取出藥別研以猪肚為膏再入煉蜜搜和前藥杵勻丸如梧子大每服五十九參湯下又方加人參熟地黄乾葛又方除知母粟米用小麥</p>	<p>爛金丸 治熱中消渴止後補精血益諸虛解勞倦去骨節間熱寧心強志安神定魄固臟腑進飲食</p>	<p>免生瘡瘍</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>大猪肚 一箇 黃連 三兩 生薑 碎 白蜜 各二兩</p>	<p>先將猪肚淨洗控乾復以葱椒醋麵等同藥以水酒入銀石器內煮半日漉出黃連洗去蜜酒令盡剉研為細末再用水調為膏入猪肚內以線縫定仍入銀石器內煮爛研如泥搜和下項藥</p>	<p>人參 五味子 杜仲 薑炒 山藥 石斛 山茱</p>	<p>肉 車前子 新蓮肉 去皮 鱉甲 乾地黄 當</p>	<p>歸 各二兩 磁石 煨 白茯苓 槐角子 炒 川芎 各一兩 黃</p>
---	--	-------------	------------------------	---	--	----------------------------------	----------------------------------	--





芪四兩兔絲子酒淘蒸研五兩沈香半兩麝香別研一錢

右為細末用猪肚膏搜和得所如膏少添熟蜜搗數千杵丸如桐子大每服五十丸食前用温酒或糯米飲送下一方有白朮二兩陽起石一兩

按用麝香陽起石開竅興陽渾是後人孟浪知見其他無過之藥及製肚之法亦有可採故合前方兩存之

潔古化水丹 治手足少陰渴飲水不止或心痛者

欽定四庫全書

醫門法律

本事治飲冷水多

川烏臍大者四枚炮去皮甘草炙一兩牡蠣生三兩蛤粉用厚者炮四兩

右為細末醋浸蒸餅為丸每服十五丸新汲水下心痛者醋湯下立愈飲水一石者一服愈海藏云此藥能化停水

按飲水過多亦有能消其火熱者而火熱既消反不能消水轉成大患者多有之潔古有見於此而用川烏助火合之牡蠣蛤粉鹹寒共成消水之功也又恐



纔過之火熱其根尚伏所以不多用之原有深意但不和盤托出以告人耳
黃連膏 治口舌乾小便數舌上赤脈生津液除乾
燥長肌肉
黃連 <small>一斤碾為末</small> 牛乳汁 白蓮藕汁 生地黄汁 <small>各一斤</small>
右將汁熬膏搓黃連末為丸如小豆大每服二十九少呷湯下日進十服
欽定四庫全書
醫門法律
生地黄膏 治證同前
生地黄 <small>梳大一握</small> 冬蜜 <small>一人</small> 人參 <small>兩半</small> 白茯苓
右先將地黄洗搗爛以新汲水調開同蜜煎至一半入參苓末拌和以磁器密收匙挑服
按二膏一用苦寒合甘寒一純用甘寒相其所宜擇而用之治消渴之權衡大畧可推故兩錄之
天門冬丸 治初得消中食已如饑手足煩熱背膊疼悶小便白濁



服一劑渴止勿服	下藥煮取三升分作三服渴急飲之下焦熱者夜輒	右呔咀用水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗去滓	神知母 葛根 黃苓 磁石 瓜蒌根 甘草	猪腎 大豆 薺萆 石膏 人參 茯苓	猪腎薺萆湯 治消中日夜尿八九升者	起之易為功也	欽定四庫全書 醫門法律	有可議耳減去此物更增三倍用之可以必効蓋初	二十九丸未免悠悠從事矣方中藥品頗佳但赤石脂	按初得中下二消急治其本可也丸藥本緩且只服	送下食前	右為細末煉蜜丸如梧子大每服二十九丸用粟米飲	肉蓯蓉 鹿茸 五味子 赤石脂 澤瀉	天門冬 土瓜根 瓜蒌根 熟地黄 知母
---------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	--------	----------------	----------------------	-----------------------	----------------------	------	-----------------------	-------------------	--------------------



<p>按腎氣虛損之證本陰精不足當歸川芎雖云補陰</p>	<p>分煎至五分去滓空心服晚食前再服</p>	<p>煮腎至一盞去水上浮脂及腎次入藥五錢生薑半</p>	<p>右剉碎每服用羊腎一對切去脂膜先以水一盞半</p>	<p>兩磁石<small>半兩研碎 淘去赤汁</small></p>	<p>麥門冬<small>去心</small>川芎<small>各二兩</small>五味子<small>各二兩</small>炙甘草<small>各半</small>玄參<small>各半</small></p>	<p>桂心 熟地黄 白茯苓 龍骨 當歸<small>各一兩</small></p>	<p>雞脰脰<small>微炙</small>遠志<small>去心</small>人參 桑螵蛸<small>微炒</small>黃芪 澤瀉</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>腎瀝散 治消腎腎氣虛損發渴小便數腰疼痛</p>	<p>涼而事下焦之溫補為合法也</p>	<p>沈香以其病在中下陽氣陰精兩竭故舍上焦之清</p>	<p>本方去石膏知母葛根黃芩加鹿茸地骨皮熟地黄</p>	<p>精溢消渴之後多作癰疽皆由過服丹石所致即以</p>	<p>所必用後有製薺萇丸治強中為病莖長興盛不交</p>	<p>諸清涼入腎且急服之火熱熾盛於上下三焦者在</p>	<p>按此方用白虎等清涼之劑加入猪腎大豆磁石引</p>
-----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	---	---	--	------------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



不能補精且一辛一散非所宜施不若以山茱萸枸杞子代之為長以其引用之法頗佳故取之

白茯苓丸 治腎消因消中之後胃熱入腎消燦腎

脂令腎枯燥遂致此疾兩腿漸細腰脚無力

白茯苓 覆盆子 黃連 瓜蒌根 草薢 人

參 熟地黄 玄參 各一兩 石斛 蛇床子 各七錢半 雞

脛脰 三十具 微炒

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧子大每服三

欽定四庫全書

醫門法律

十九食前煎磁石湯送下

友人朱麟生病消渴後渴少止反加燥急足膝痿弱

命予亟以雜霸之藥投之不能待矣予主是丸加犀

角坐中一醫曰腎病而以犀角黃連治其心毋乃倒

乎予曰腎者胃之關也胃之熱下傳於腎則關門大

開關門大開則心之陽火得以直降於腎經云陽精

所降其人天非細故也今病者心火燦腎燥不能需

予用犀角黃連入腎對治其下降之陽光寧為倒乎



醫敬服友人服之果効再更六味地黄丸加犀角而  
肌澤病起

忍冬丸 治渴病愈須預防發癰疽

忍冬草

根莖花葉  
皆可用之

右用米麴酒於瓶內浸糠火煨一宿取出曬乾入甘  
草少許為末既以所浸酒煮糊為丸如梧桐子大每  
服五十丸至百丸酒飲任下

按此方於四月間採鮮花十數斤揉取其汁煎成膏

欽定四庫全書

醫門法律

子酒湯任用點服養陰退陽調和榮衛血脈凡係火  
熱熾盛之體允為服食仙方

藍葉散 治渴利口乾煩熱背生癰疽赤焮疼痛

藍葉 升麻 玄參 麥門冬 黃芪 葛根

沈香 赤芍藥 犀角屑 甘草 生用各  
一兩 大黃 二  
兩

炒 微

每服四錢水一盞煎至六分去滓不拘時溫服

紫蘇湯 治消渴後遍身浮腫心膈不利



渴一證為然臨病宜加審諦也	按飲醇食燂積成胃熱濕熱生蟲理固有之不獨消	耗其精液 <small>出夷堅志</small>	條類虻蟲而色紅其渴頓止乃知消渴一證有蟲	煎至一碗空心飲之雖困頓不妨自後下蟲三四	苦楝根取新白皮一握切焙入麝香少許水二碗	殺蟲方 治消渴有蟲	每服四錢水一盞半薑五片煎七分不拘時服	欽定四庫全書 <small>醫門法律</small>	木瓜乾 烏梅 <small>槌破不 去仁</small> 麥蘖 <small>炒</small> 甘草 草菓 <small>去皮 各半</small>	液枯燥血泣小便併多肌削嗜冷物寒漿	烏梅木瓜湯 治飲酒多發積為酷熱裏蒸五臟津	每服四錢水一盞半生薑半分煎八分溫服	香 <small>兩 各半</small>	紫蘇莖葉 桑白皮 赤茯苓 <small>各一</small> 郁李仁 <small>去皮 炒二</small>	兩 羚羊角 <small>鎊</small> 檳榔 <small>各七 錢半</small> 桂心 枳殼 <small>炒</small> 獨活 木
--------------	----------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------	--------------------	-------------------------------	--	------------------	----------------------	-------------------	--------------------------	---	---



虛勞門諸方

金匱桂枝龍骨牡蠣湯

論見前小品云虛弱浮熱汗出者除桂加白薇附子各

三分故曰二加龍骨湯

桂枝 芍藥

生薑

各三兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

龍骨

牡蠣

右七味以水七升煮取三升分溫三服

金匱天雄散

有論

天雄

三兩炮

白朮

八兩

桂枝

六兩

龍骨

三兩

欽定四庫全書

醫門法律

右四味杵為散酒服半錢匕日三服不知稍增之

金匱小建中湯

有論

桂枝

三兩去皮

甘草

三兩炙

大棗

十二枚

芍藥

六兩

生薑

二兩

膠

飴

一升

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火

消解溫服一升日三服

嘔家不可用建中湯以甜故也

千金療男女因積冷氣滯或大病後不復常苦四肢沈重骨肉痠疼吸吸少氣行動喘乏胸滿氣急腰背強痛心中虛悸咽乾唇燥而體少色或飲食無味脇肋腹張頭重不舉多卧少起甚者積年輕者百日漸





致瘦弱五臟氣竭則難可復常六脈俱不足虛寒乏  
氣少腹拘急羸瘠百病名曰黃芪建中湯又有人參  
兩二

金匱黃耆建中湯

有論於小建中湯內加黃耆一  
兩半餘依上法氣短胸滿者加

生薑腹滿者去棗加茯苓一兩半及  
療肺虛損不足補氣加半夏三兩

樂令建中湯

治臟腑虛損身體消瘦潮熱自汗將

成癆瘵此藥大能退虛熱生血氣

前胡

細辛

淨

黃耆

蜜塗

人參

桂心

橘皮

白

去

當歸

洗去

土

白芍藥

茯苓

去

皮麥門冬

去

心甘草

灸各

欽定四庫全書

醫門法律

半夏

湯洗七次

切七錢半

每服四錢水一盞薑四片棗一枚煎七分不拘時熱

服

按樂令建中湯治虛勞發熱以此並建其中之營血

蓋營行十二經脈之中為水穀之精氣故建其營血

亦得以建中名之耳

十四味建中湯 治營衛失調氣血不足積勞虛損

形體羸瘠短氣嗜卧欲成癆瘵



<p>當歸 <small>酒浸</small> 白芍藥 白朮 麥門冬 <small>去心</small> 甘草 <small>炙</small> 肉</p>	<p>茯苓 <small>酒浸</small> 人參 川芎 肉桂 附子 <small>炮</small> 黃耆 製</p>	<p>半夏 熟地黄 <small>酒蒸</small> 茯苓 <small>各等分</small></p>	<p>右咬咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚空心溫服 按十四味建中湯治臟氣素虛以之兩建其脾腎之 陰陽蓋虛勞病多本脾腎故引伸建中之法以治之 二方乃後人超出之方也</p>	<p>金匱八味腎氣丸 <small>有論</small> 方見前</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>金匱薯蕷丸 <small>有論</small></p>	<p>薯蕷 <small>三十</small> 當歸 桂枝 乾地黄 麩 豆黃卷</p>	<p>各十 <small>分</small> 甘草 <small>二十</small> 芎藭 麥門冬 芍藥 白朮</p>	<p>杏仁 <small>各六</small> 人參 <small>七</small> 柴胡 桔梗 茯苓 <small>各五</small> 阿</p>	<p>膠 <small>七</small> 乾薑 <small>三</small> 白薇 <small>二</small> 防風 <small>六</small> 大棗 <small>百枚</small> 為膏</p>	<p>右二十一味末之煉蜜和丸如彈子大空腹酒服一</p>	<p>丸一百丸為劑</p>	<p>金匱酸棗仁湯 <small>有論</small></p>
--	---	---	--	--------------------------------------	--------------------	--------------------------------	---	--	--	---	-----------------------------	---------------	---------------------------------



酸棗仁二升 甘草一兩 知母二兩 茯苓二兩 芎藭二兩  
深師有生 薑二兩

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮取三升分溫三服

金匱大黃虜蟲丸 有論

大黃十分 黃芩二兩 甘草三兩 桃仁一升 杏仁一升 芍藥四兩

乾地黄十兩 乾漆一兩 蜜蠱一升 水蛭百枚 蟻螬一升 虜蟲半升

右十二味末之煉蜜和丸小豆大酒飲服五丸日三

欽定四庫全書

醫門法律

服

金匱附千金翼炙甘草湯 有論

甘草四兩 桂枝 生薑各三兩 麥門冬半斤 麻仁半升

參 阿膠各二兩 大棗三十枚 生地黄一斤

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓內

膠消盡溫服一升日三服

金匱附肘後獺肝散 有論

獺肝一具炙乾末之水服方寸匕日三服



<p>十全大補散 治男子婦人諸虛不足五勞七傷不 進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛 夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘嗽中滿脾腎氣 弱五心煩悶並皆治之</p>	<p>肉桂 甘草 芍藥 黃耆 當歸 川芎 人 參 白朮 茯苓 熟地黄 <small>各等分</small></p>	<p>右為麤末每服二大錢水一盞生薑三片棗二枚煎 至七分不拘時溫服</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>按此方合黃耆建中湯四君子湯四物湯三方共得 十味合天地之成數名曰十全大補以治氣血俱衰 陰陽並弱之候誠足貴也但肉桂之辛熱未可為君 審其腎虛腰腹痛少用肉桂若營衛之虛須少用桂 枝調之取為佐使可也</p>	<p>聖愈湯 治一切失血或血虛煩渴燥熱睡臥不寧 或瘡證膿水出多五心煩熱作渴等證</p>	<p>熟地黄 <small>生者自製</small> 生地黄 當歸 <small>酒拌各一錢</small> 人參 黃芪</p>
---	---	--	------------------------	--	---	--



炒  
川芎 各一錢

右水煎服

按失血過多久瘡潰膿水不止雖曰陰虛實未有不兼陽虛者合用人參黃耆允為良法凡陰虛證大率宜倣此矣

黑地黄丸 治陽盛陰衰脾胃不足房室虛損形瘦

無力面多青黃而無常色此補氣益胃之劑也

蒼朮 一斤 油浸熟地黄 一斤 五味子 半斤 乾薑 半兩 秋冬一兩 夏半兩 春七錢

欽定四庫全書

醫門法律

右為細末棗肉丸如梧子大食前米飲或酒服百丸治血虛久痔甚妙經云腎苦燥急食辛以潤之此藥開腠理生津液通氣又五味子酸以收之此雖陽盛而不燥熱乃是五臟虛損於內故可益血收氣此藥類象神品方也

按此方以蒼朮為君地黄為臣五味子為佐乾薑為使治脾腎兩臟之虛而去脾濕除腎燥即兩擅其長超超玄箸視後人之脾腎雙補藥品龐雜者相去豈



不遠耶

還少丹 大補心腎脾胃一切虛損神志俱耗筋力

頓衰腰脚沈重肢體倦怠血氣羸乏小便渾濁

乾山藥 牛膝酒浸 遠志去心 山茱萸去核 白茯苓去皮 五

味子 巴戟酒浸 肉蓯蓉酒浸 石菖蒲 楮實

杜仲去麤皮薑汁酒拌同炒斷絲 舶茴香各一兩 枸杞子 熟地

黃各二兩

此據寶鑑所定考楊氏原方山藥牛膝各一兩半茯苓茱萸楮實杜仲五味巴戟蓯蓉遠志茴香各

欽定四庫全書

醫門法律

一兩菖蒲地黃  
枸杞各半兩

右為細末煉蜜同棗肉為丸如桐子大每服三十九

溫酒或鹽湯下日三服食前五日覺有力十日精神

爽半月氣壯二十日目明一月夜思飲食冬月手足

常暖久服令人身體輕健筋骨壯盛悅澤難老更看

體候加減如熱加山梔仁一兩 心氣不寧加麥門冬一兩

少精神加五味子一兩 陽弱加續斷一兩 常服固齒無瘡

癯婦人服之容顏悅澤煖子宮去一切病



按楊氏製此方緩補心腎脾肺正合內經勞者溫之  
損者溫之之義溫養和平以俟虛羸之自復耳虛勞  
纔見端者宜之若病勢已成此方又迂緩不切矣大  
約中年無病男女服之必効方名還少丹意可知也  
人參養榮湯 治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食  
少作瀉等證若氣血虛而變見諸證勿論其病勿  
論其脈但用此湯其病悉退

白芍藥 一錢五分 人參 陳皮 黃芪 蜜炙 桂心 當歸

欽定四庫全書

醫門法律

白朮 各錢 甘草 各錢 熟地黄 五味子 炒杵 茯苓 各七

分 遠志 去心五分

右薑棗水煎服

按方中諸品為心脾二臟之藥於補肺殊不甚切然  
養榮之法正當補養心脾以榮為水穀之精氣脾得  
以主之及行至上焦則肺衛心榮各分氣血所主固  
知養榮原不及於肺方下所註肺虛誤也昌因養榮  
之義關於虛勞最切故辨之



<p>參朮膏 治中風虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈</p>
<p>人參 白朮 <small>各等分</small></p>
<p>右水煎稠湯化服之</p>
<p>按方下所治非為虛勞設也而治虛勞尤在所必用藥品精貴功效敏速莫踰於此後人增苡仁蓮肉黃芪茯苓神麩澤瀉甘草七味吾不知於補元氣之義何居而鄙吝之人見之未有不欣然從事者矣</p>
<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>
<p>人參散 治邪熱客經絡痰嗽煩熱頭目昏痛盜汗倦怠一切血熱虛勞</p>
<p>黃芩 <small>半兩</small> 人參 白朮 茯苓 赤芍藥 半夏麩</p>
<p>柴胡 甘草 當歸 乾葛 <small>各一兩</small></p>
<p>每服三錢水一盞薑四片棗二枚煎七分不拘時溫服</p>
<p>按此方治邪熱淺在經絡未深入臟腑雖用柴胡乾葛之輕全藉參朮之力以達其邪又恐邪入痰隧用</p>





茯苓半夏兼動其痰合之當歸赤芍黃芩并治其血中之熱且止用三錢為劑蓋方成知約庶幾敢用柴胡乾葛耳此許叔微之方一種深心昌故發之

保真湯 治勞證體虛骨蒸服之清補

當歸 生地黄 熟地黄 黃芪蜜水 人參 白

朮 甘草 白茯苓各五分 天門冬去心 麥門冬去心 白

芍藥 黃檗鹽水炒 知母 五味子 軟柴胡 地

骨皮 陳皮各一錢 蓮心五分

欽定四庫全書

醫門法律

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

按此方一十八味十全大補方中已用其九獨不用

肉桂耳然增益地黄代川芎之上竄尤為合宜餘用

黃檗知母五味子滋益腎水二冬地皮清補其肺柴

胡入肝清熱陳皮助脾行滯全重天冬麥冬黃栢知

母五味地皮柴胡不獲已借十全大補以行之耳其

意中實不欲大補也然亦一法錄之

三才封髓丹 降心火益腎水滋陰養血潤補不燥



天門冬 去心 熟地黄 人參 各半 黃檗 三兩 砂仁 半兩

甘草 七錢半

右六味為末麵糊丸桐子大每服五十九丸用菝葐半兩切作片酒一盞浸一宿次日煎三四沸去滓空心食前送下

按此於三才丸方內加黃檗砂仁甘草以黃檗入腎滋陰以砂仁入脾行滯而以甘草少變天冬黃檗之苦俾合人參建立中氣以伸參兩之權殊非好為增

欽定四庫全書

醫門法律

益成方之比故錄用之

天真丸 治一切亡血過多形稿肢羸食飲不進腸

胃滑泄津液枯竭久服生血養氣暖胃駐顏

精羊肉 七斤去筋膜脂 肉菝葐 十兩 當歸 十二兩 洗去蘆山

藥 濕者去皮十兩 天門冬 去心焙乾一斤

右四味為末安羊肉內裹縛用無灰酒四瓶煮令酒盡再入水二升煮候肉糜爛再入

黃耆末 五兩 人參末 三兩 白朮末 二兩



熟糯米飯焙乾作餅將前後藥末和丸梧子大一日  
二次服三百丸温酒下如難丸用蒸餅五七枚焙乾  
入白中杵千下丸之

按此方可謂長於用補矣人參羊肉同功而菝蓉山  
藥為男子佳珍合之當歸養榮黃耆益衛天冬保肺  
白朮健脾而其法製甚精允為補方之首

麥煎散 治少男室女骨蒸黃瘦口臭肌熱盜汗婦

人風血攻症四肢

欽定四庫全書

醫門法律

赤茯苓 當歸 乾漆 鼈甲醋炙 常山 大黃煨

柴胡 白朮 生地黄 石膏各一兩 甘草半兩

右為末每服三錢小麥五十粒水煎食後臨卧服若  
有虛汗加麻黃根一兩

按此方治肝肺脾胃火盛灼乾營血乃致口臭肌熱  
可驗故用潤血行瘀之法以小麥煎之引入胃中蓋  
胃之血乾熱熾大腸必然枯燥服此固可無疑然更  
加人參助胃真氣庶可多服取効也



人參地骨皮散 治臟中積冷營中熱按之不足舉  
之有餘陰不足而陽有餘也

茯苓<sup>半</sup> 知母 石膏<sup>各一</sup> 地骨皮 人參 柴胡

生地黄<sup>各一兩</sup>

右咬咀每服一兩生薑三片棗一枚水煎細細溫服  
閒服生精補虛地黄丸

按臟中積冷營中熱冷熱各偏為害不一此方但可

治營熱耳於臟冷無預也方後云閒服生精補血地

欽定四庫全書

醫門法律

黃丸豈一方中不當兩涉耶又豈以治營熱為最急  
無暇分功於臟冷耶如法用之俟營熱稍清兼治臟  
冷要亦用藥之小權衡耳

東垣補中益氣湯

黃芪<sup>一錢五分</sup> 人參 甘草<sup>炙各一錢</sup> 白朮 當歸身 柴

胡 升麻 陳皮<sup>各五分</sup>

右咬咀水煎

益胃升陽湯 前方加



為咀每四錢加生薑煎	黃芪 <small>蜜炙</small> 附子 <small>炮等分</small>	嚴氏芪附湯 治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠	冬加乾薑半兩	右為末酒煮羊肉丸如桐子大每五六十丸鹽湯下	骨 <small>一兩酒浸酥炙</small>	黃栢 <small>半斤鹽酒炒</small> 知母 <small>酒浸炒</small> 熟地黃 <small>各三兩</small> 敗龜板 <small>四兩酒浸</small>	白芍 <small>炒</small> 陳皮 <small>炒</small> 牛膝 <small>各二兩</small> 瑣陽 <small>各二兩</small> 當歸 <small>各一兩半</small> 虎	欽定四庫全書 醫門法律	補陰丸	淡鹽湯送下	右為末豬脊髓和煉蜜丸如桐子大每七十丸空心	兩六	黃栢 <small>炒褐色</small> 知母 <small>酒浸炒</small> 熟地黃 <small>酒蒸</small> 敗龜板 <small>酥炙黃末各</small>	丹谿大補丸	右咬咀水煎	炒麵 <small>一錢五分</small> 生黃芩 <small>瀉盛暑之伏庚金肺逆</small>
-----------	--	---------------------	--------	----------------------	-------------------------	--	--	----------------	-----	-------	----------------------	----	--	-------	-------	---



參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣短頭暈

人參 半兩 附子 炮去皮 一兩

為咀分作三服加生薑煎

水腫門諸方

金匱防已黃芪湯

防已 一兩 黃芪 一分 白朮 三分 甘草 半兩

右剉每服五錢匕生薑四片棗一枚水盞半煎取八

欽定四庫全書

醫門法律

分去滓溫服良久再服

金匱越婢湯

麻黃 六兩 石膏 半斤 生薑 三兩 大棗 十五枚 甘草 二兩

右五味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三

升分溫三服 惡風者加附子一枚 風水加朮四

兩 古今錄驗

金匱防已茯苓湯

防已 三兩 黃芪 一兩 桂枝 三兩 茯苓 六兩 甘草 二兩



右五味以水六升煮取二升分溫三服	金匱麻黃附子湯	麻黃 <small>兩三</small> 甘草 <small>兩二</small> 附子 <small>一枚</small>	右三味以水七升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升半溫服八合日三服	金匱杏子湯 <small>未見恐是麻黃杏子甘草石膏湯</small>	蒲灰散 <small>方見消渴門</small>	金匱黃芪芍藥桂枝苦酒湯	欽定四庫全書 醫門法律	黃芪 <small>兩五</small> 芍藥 <small>兩三</small> 桂枝 <small>兩三</small>	右三味以苦酒一升水七升相和煮取三升溫服一升當心煩服至六七日乃解苦心煩不止者以苦酒阻故也 <small>一方用美酒醱代苦酒</small>	金匱桂枝加黃芪湯	桂枝 <small>兩二</small> 芍藥 <small>兩二</small> 生薑 <small>各三兩</small> 甘草 <small>兩二</small> 大棗 <small>十二枚</small> 黃芪	右六味以水一斗煮取三升溫服一升須臾飲熱稀
-----------------	---------	--	-------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------	----------------	--	--	----------	---	----------------------



粥一升餘以助藥力溫覆取微汗若不汗更服

金匱桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

桂枝 生薑 各三兩 甘草 二兩 大棗 十二枚 麻黃 細辛

各二兩 附子 一枚

右七味以水七升煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升

分溫三服當汗出如蟲行皮中即愈

金匱枳朮湯

枳朮 七枚 白朮 二兩

欽定四庫全書

醫門法律

右二味以水五升煮取三升分溫三服腹中臍即當

散也

實脾散 治陰水發腫用此先實脾土

厚朴 去皮 白朮 木瓜 去穢 大腹子 附子 炮 木香

不見火 草薢仁 白茯苓 去皮 乾薑 炮 甘草 炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎七分不

拘時溫服

按治水以實土為先務不但陰水為然方下所云治





<p>落時套耳</p>	<p>藥居多較前方稍勝然不用茯苓仍用檳榔厚朴終</p>	<p>按此方合前方俱主脾腎之治而此方溫煖腎臟之</p>	<p>蘇湯送下</p>	<p>右為細末糊丸如梧桐子大每服五十九丸不拘時紫</p>	<p>瀉<small>一兩</small>肉荳蔻<small>煨</small>檳榔<small>各半</small></p>	<p><small>製</small>獨活<small>白木</small>陳皮<small>去白</small>吳茱萸<small>炒</small>桂心<small>各一兩</small>澤</p>	<p>附子<small>炮二兩</small>南木香<small>煨</small>茴香<small>炒</small>川椒<small>炒出汗</small>厚朴<small>去粗皮</small></p>	<p>復元丹 治脾腎俱虛發為水腫四肢虛浮心腹腎</p>	<p>脹小便不通兩目下腫</p>	<p>用桂而用厚朴檳榔尚有可議耳</p>	<p>減頂之凶矣實土以堤水寧不為第二義乎方中不</p>	<p>能蟄封收藏而泛溢無制耳倘腎氣不溫則真陽有</p>	<p>達耳夫陰水者少陰腎中之真陽衰微北方之水不</p>	<p>然陰水當補陽水當瀉之念橫於胸中故其言有不</p>	<p>陰水發腫用此先實脾土然則其後將用何藥耶儼</p>
-------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------	------------------------------	---	---	--	-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



導滯通幽湯 治脾濕有餘及氣不宣通面目手足

浮腫

木香 白朮 桑白皮 陳皮 各五錢 茯苓 去皮一兩

右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服空心

食前

按脾喜燥惡濕脾濕有餘氣不宣通即是脾中健運之陽不足先加意理脾之陽俟體中稍快用此方退其面目手足浮腫乃為善也

欽定四庫全書

醫門法律

胃苓湯 乃平胃散合五苓散加陳皮也

蒼朮 厚朴 薑汁炒 陳皮 白朮 茯苓 各一錢半 澤瀉

猪苓 各一錢 甘草 六分 官桂 三分

右水加生薑煎服

按此方宣導胃水膀胱水順道而出水患在所必用然亦相其人津液不虧腎水不竭乃可用之恐蹈重虛之律也其遠人無病但覺不服水土允宜此方消風敗毒散 此即人參敗毒散合荆防敗毒散並



用也	人參 獨活 柴胡 桔梗 枳殼 <small>炒</small> 羌活 茯	苓 川芎 前胡 甘草 荆芥 防風 <small>各一錢</small>	水二鍾薑三片煎八分食遠服	按此方治風水皮水凡在表宜從汗解者必用之劑	然仲景之用汗法必兼用黃芪實表恐表虛之人因	身之水乘表藥外湧盡漬皮腠反為大累耳此方用	人參為君固護元氣是以用之無恐即是推之元氣	欽定四庫全書 醫門法律	素虛腠理素疎參芪合用允為當矣	加減金匱腎氣丸 治肺腎虛腰重脚腫小便不利	或肚腹腫脹四肢浮腫或嘔急痰盛已成蠱證其	効如神此證多因脾胃虛弱治失其宜元氣後傷	而變證者非此藥不能救	白茯苓 <small>三兩</small> 附子 <small>五錢</small> 牛膝 官桂 澤瀉 車前子	山茱萸 山藥 牡丹皮 <small>各一兩</small> 熟地黄 <small>四兩</small> <small>搗膏</small>	右為末和地黃煉蜜丸如桐子大每服七八十丸空
----	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------	---	--	----------------------



心白湯下

按本方濟生以附子為君此薛新甫重訂用白茯苓為君合之牛膝車前治腰以下之水其力最大然而腎之關門不開必以附子回陽蒸動腎氣其關始開胃中積水始下以陽主開故也關開即不用茯苓牛膝車前而水亦下關闔則茯苓車前用至無筭抑莫如之何矣用方者將君附子乎抑君茯苓乎

調榮散 治瘀血留滯血化為水四肢浮腫皮肉赤

欽定四庫全書

醫門法律

紋名血分

蓬朮 川芎 當歸 延胡索 白芷 檳榔

陳皮 赤芍藥 桑白皮炒 大腹皮 赤茯苓

葶藶炒 瞿麥各一錢 大黃半錢 細辛 官桂 甘草

炙各五分

右作一服水二鍾薑三片紅棗二枚煎至一鍾食前

服

按瘀血化水赤縷外現其水不去勢必不瘀之血亦



盡化為水矣此方只作一服原不欲多用之意但服後其水不行赤縷不減未可再服且用治血補氣之藥調三五日徐進此藥虛甚者必參附合用得大力者主持其間驅逐之藥始能建功也

烏鯉魚湯 治水氣四肢浮腫

烏鯉魚

尾一

赤小豆

桑白皮

白朮

陳皮

各三錢

葱白

五莖

右用水三碗同煮不可入鹽先喫魚後服藥不拘時

欽定四庫全書

醫門法律

候

按此方用烏魚煖胃行水合之赤豆葱白以開鬼門潔淨府更合之白朮陳皮桑皮清理脾肺一種深心殊可採用

防已散 治皮水腫如褰衣在皮膚中四肢習習然

漢防已

桑白皮

黃芪

桂心

各一兩

赤茯苓

二兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服五錢水一大盞煎至五分去滓不拘時



溫服

按此即仲景金匱防已茯苓湯治皮水之方而加桑白皮也然皮水者鬱其榮衛乎太陰肺氣不宣治法金鬱者泄之桑白皮固可加然不可過泄肺氣桂心固能行水然不如桂枝之發越榮衛大凡變易仲景之方必須深心體會假如榮衛通行水道不利又當以桂心易桂枝矣此活法也

導水茯苓湯 治水腫頭面手足徧身腫如爛瓜之

欽定四庫全書

醫門法律

狀手按而塌陷手起隨手而高突喘滿倚息不能轉側不得着牀而睡飲食不下小便秘瀉溺出如割而絕少雖有而如黑豆汁者服嘔噉氣逆諸藥不効用此即愈亦嘗驗其病重之人煎此藥時要如熬阿刺吉酒相似約水一斗止取藥一盞服後小水必行時即漸添多直至小便變青白色為愈

赤茯苓

麥門冬

去心

澤瀉

白朮

各三兩

桑白皮

紫蘇

檳榔

木瓜

各一兩

大腹皮

陳皮

砂仁



木香 <small>各七錢半</small>	右呶咀每服半兩水二盞燈草二十五根煎至八分空心服 如病重者可用藥五兩再加麥門冬二兩燈草半兩以水一斗於砂鍋內熬至一大碗再下小銚內煎至一大盞五更空心服滓再煎服連進此三服自然利小水一日添如一日
按此方藥味甚平而其煎法則甚奇蓋得仲景百勞水之意而自出手眼者可喜可喜	欽定四庫全書
醫門法律	已上治水病方後附治脹病方九道
人參芎歸湯 <small>直指</small> 治煩燥喘急虛汗厥逆小便赤大便	黑名血脹
人參 辣桂 <small>去粗皮</small> 五靈脂 <small>炒各二錢五分</small> 烏藥 蓬朮 <small>煨</small>	木香 砂仁 炙甘草 <small>各半兩</small> 川芎 當歸 半夏
<small>湯炮各七錢五分</small>	右呶咀每服一兩五錢生薑五片紅棗二枚紫蘇四
葉煎空心服	



按此方治血脹初成者服之必効  
化滯調中湯

白朮一錢五分 人參 白茯苓 陳皮 厚朴薑製 山查

肉 半夏各一錢 神麩炒 麥芽炒各 砂仁七分

水二鍾薑三片煎八分食前服

按此方即參朮健脾湯加神麩麥芽脹甚者加蘿蔔子炒一錢麵食傷尤宜用乃助脾之健運以消其氣分之脹也

欽定四庫全書

醫門法律

人參丸 治經脈不利化為水流走四肢悉皆腫滿名曰血分其候與水相類若作水治之非也宜用此

人參 當歸 大黃濕紙裹飯上蒸 桂心 瞿麥

穗 赤芍藥 白茯苓各半 葶藶炒另研

右為末煉蜜丸如桐子大每服十五丸加至三十丸空心飲湯下

按此方治血分之水少用葶藶為使不至耗氣散氣





殊可取用

見寶鑑見寶鑑丸治寒氣客於下焦血氣閉塞而成瘕聚腹

中堅大久不消者

附子炮去皮 鬼箭羽 紫石英各三錢 澤瀉 肉桂

玄胡索 木香各二錢 檳榔二錢 血竭一錢半 水

蛭一錢炒 京三稜五錢 桃仁三十粒湯浸去皮 大黃

二錢剉用酒同  
三稜浸一宿焙

右十三味除血竭桃仁外同為末入另研二味和勻

欽定四庫全書

醫門法律

用元浸藥酒打糊丸如桐子大每服三十丸淡醋湯

送下食前溫酒亦得

按此方消瘕之力頗大用得其宜亦不為峻

小溫中丸丹溪治脹是脾虛不能運化不可下之

陳皮 半夏湯炮去皮 神麩炒 茯苓各一兩 白朮二兩 香

附子不要 針砂各一兩半 苦參炒 黃連炒各半兩 甘草

三錢

右為末醋水各一盞打糊為丸如桐子大每服七八



<p>十九白朮六錢陳皮一錢生薑一片煎湯吞下虛甚        加人參一錢各用本方去黃連加厚朴半兩忌口病        輕者服此丸六七兩小便長病甚服一斤小便始長        按脾虛作脹最不宜用大黃之藥散其脾氣丹谿此        方亦可取用</p>	<p>禹餘糧丸<small>田三</small>治十腫水氣脚膝腫上氣喘急小便不        利但是水氣悉皆主之<small>許學士及丹谿皆云此方治膨脹之要藥</small></p>	<p>蛇含石<small>大者三兩以新鐵銚盛入炭火中燒蛇黃與釵子一般紅用鉗取蛇黃傾入醋中候</small></p>	<p>欽定四庫全書  <small>醫門法律</small></p>	<p>冷取出禹餘糧石<small>三</small>真針砂<small>五兩</small>先以水淘淨炒  <small>研極細</small>醋二升就銚內煮醋乾為度後用銚并藥入  <small>炭中燒紅鉗出傾藥淨磚地上候冷研細</small></p>	<p>以三物為主其次量人虛實入下項<small>治水多是取轉推此方三物既</small>  <small>非大戟甘遂芫花之比又有下項藥扶持故虛人老人亦可服</small></p>	<p>羌活 木香 茯苓 川芎 牛膝<small>酒浸</small> 桂心 白</p>	<p>豆蔻<small>炮</small> 大茴香<small>炒</small> 蓬朮 附子<small>炮</small> 乾薑<small>炮</small> 青皮</p>	<p>京三稜<small>炮</small> 白蒺藜 當歸<small>酒浸一宿各半</small></p>	<p>右為末入前藥拌勻以湯浸蒸餅揅去水和藥再杵</p>
--	---	---	--	--	---	---	---	--	-----------------------------



極勻丸如桐子大食前溫酒白湯送下三十丸至五	十丸最忌鹽一毫不可入口否則發疾愈甚但試服	藥即於小便內旋去不動臟腑病去日日三服兼以	溫和調補氣血藥助之真神方也	按此方昔人用之屢効以其大能煖水臟也服此丸	更以調補氣血藥助之不為峻也	導氣丸 治諸痞塞關格不通腹脹如鼓大便結秘	小腸腎氣等疾功效尤速	欽定四庫全書 醫門法律	青皮 用水蛭等分同 炒赤去水蛭 莪朮 用蜚蟲等分同 炒赤去蜚蟲 胡椒 茴香	炒去 三稜 乾漆炒 茴香 去乾漆 檳榔 斑貓炒 赤芍 川椒炒 乾薑	硃砂炒 附子 青鹽炒 去硃砂 去青鹽 茱萸 牽牛炒 石菖蒲 桃仁炒 去桃仁	右各等分剉碎與所製藥炒熟去水蛭等不用祇以	青皮等十味為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五	十九加至七十九空心用紫蘇湯送下	按此方各味俱用峻藥同炒取其氣而不取其質消	堅破結亦能斬關而入然病久憊甚用之必不能勝
----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	------------	----------------	---	---	---	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------------



病勢已成元氣可耐蚤用可以建功

溫胃湯 治憂思聚結脾肺氣凝陽不能正大腸與

胃氣不平脹滿上衝欬食不下脈虛而緊瀦

附子炮去皮臍厚朴去皮生用當歸 白芍藥 人參 甘

草炙橘皮各一錢半乾薑一錢一分川椒去閉口炒出汗三分

右作一服水二鍾薑三片煎至一鍾食前服

按此方變附子理中之意而加血分藥兼理其下亦

可取用

欽定四庫全書

醫門法律

強中湯 治食啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂成脹

滿有妨飲食甚則腹痛

人參 青皮去白陳皮去白丁香各二錢白朮一錢半附子

炮去皮臍草萊仁 乾薑炮各一錢厚朴薑製甘草炙各五分

嘔加半夏傷麵加茱萸子

水二鍾薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

按此方即用附子理中湯更加香燥之藥以強其胃

胃氣虛寒者亦可暫用一二劑也



右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三	茵陳蒿 <small>兩六</small> 梔子 <small>枚十四</small> 大黃 <small>兩二</small>	金匱茵陳蒿湯 <small>三方合論見前</small>	四味以水六升煮取二升分溫三服	梔子 <small>枚十四</small> 大黃 <small>兩一</small> 枳實 <small>枚五</small> 豉 <small>升一</small>	金匱梔子大黃湯	頓服	右四味以水六升煮取二升去滓內硝更煮取一升	欽定四庫全書 醫門法律	大黃 黃蘗 硝石 <small>各四兩</small> 梔子 <small>十五枚</small>	金匱大黃硝石湯	金匱小半夏湯 <small>方見消渴門 方論俱見前</small>	金匱小建中湯 <small>方見虛勞門</small>	金匱瓜蒂散 <small>方見三氣門</small>	金匱小柴胡湯 <small>方見嘔吐門</small>	金匱桂枝黃芪湯 <small>方見水腫門</small>	黃痺門諸方
----------------------	--	---------------------------------	----------------	---	---------	----	----------------------	----------------	---	---------	--	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------



升去滓分溫三服小便當利尿如皂角汁狀色正赤  
一宿腹減黃從小便去也

按黃瘧宜下之證頗多如酒瘧腹滿鼻煤脈沈弦者  
宜先下之如病瘧以火劫其汗兩熱合蒸其濕一身  
盡發熱面黃肚熱熱在裏當下之前一方大黃硝石  
湯治瘧病邪熱內結并膀胱俱結之重劑中一方治  
酒熱內結且并肌表俱受熱結之下劑末一方治穀  
瘧瘵熱在裏似表實非表熱之下劑學者比而參之

欽定四庫全書

醫門法律

其用下之權宜始得了然胸中也

金匱茵陳五苓散

潤氣分燥熱

茵陳蒿末十分五苓散

五分方見痰飲

右二味和勻先食飲方寸匙日三服

金匱猪膏髮煎

潤血分燥熱

猪膏半斤亂髮

如雞子大三枚

右二味和膏中煎之髮消藥成分再服

病從小便出

按二方一治氣分之燥一治血分之燥方論見前



<p>硝石礬石散 <small>治女勞瘵</small></p>	<p>硝石 礬石 <small>燒等分</small></p>	<p>麻黃醇酒湯 <small>治黃瘵表實</small></p>	<p>麻黃 <small>三兩</small></p>	<p>右一味以美清酒五升煮取二升半頓服盡冬月用</p>	<p>酒春月用水煮之</p>	<p>茵陳附子乾薑甘草湯 <small>治陰黃一名茵陳四逆湯</small></p>	<p>治發黃脈沈細遲肢體逆冷腰以上自汗</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>茵陳 <small>二兩</small> 乾薑 <small>炮一兩</small> 附子 <small>一枚切</small> 甘草 <small>炙一兩</small></p>	<p>右為粗末分作四貼水煎服</p>	<p>小茵陳湯 治發黃脈沈細遲四肢及遍身冷</p>	<p>茵陳 <small>二兩</small> 附子 <small>一枚切</small> 甘草 <small>炙一兩</small></p>	<p>右為粗末用水二升煮一升溫分三服</p>	<p>茵陳附子湯 治服四逆湯身冷汗不止者</p>	<p>茵陳 <small>一兩</small> 附子 <small>二枚各切</small> 乾薑 <small>炮二兩</small></p>	<p>右為粗末水煎分三服</p>
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	--	-------------------------	------------------------	---	--------------------	---------------------------	---	------------------------	--------------------------	--	------------------



茵陳茱萸湯 治服茵陳附子湯證未退及脈伏者 吳茱萸 <small>一兩</small> 當歸 <small>三分</small> 附子 <small>二枚各切</small> 木通 <small>一兩</small> 乾薑 <small>炮</small>	茵陳 <small>各一兩半</small> 右為粗末分作二服水煎	韓氏茵陳橘皮湯 治身黃脈沈細數身熱而手足寒喘嘔煩燥不渴者	茵陳 <small>兩</small> 橘皮 生薑 <small>各一兩</small> 白朮 <small>一分</small> 半夏 茯苓 <small>各半</small>	欽定四庫全書 醫門法律 右為末水四升煮取二升放溫分作四服	按此係足太陰證少兼足陽明耳 韓氏茵陳茯苓湯	治發黃脈沈細數四肢冷小便濇煩燥而渴 茯苓 桂枝 猪苓 <small>各一兩</small> 滑石 <small>半兩</small> 茵陳 <small>一兩</small>	右為末每服半兩水煎服如脈未出加當歸 麻黃連翹赤小豆湯	治身熱不去瘀熱在裏發黃小便微利
--	--------------------------------------	------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------	-----------------





麻黃 連翹 各一兩 赤小豆 一合

右咬咀作一服水煎

抵當湯 治太陽傷寒頭痛身熱法當汗解反利小

便熱瘀膀胱則身黃脈沈少腹硬小便自利其人

如狂者下焦有血也宜此湯主之

水蛭 各十箇 蜜蟲 各十箇 大黃 一兩 桃仁 十二箇

右剉作一服水煎食前服輕者用桃仁承氣湯

按麻黃連翹赤小豆方乃仲景治傷寒發黃熱瘀在

欽定四庫全書

醫門法律

表之方也此方乃仲景治傷寒發黃熱瘀在裏血畜

下焦之方也採而錄之者見雜證當比類而思治儻

因同脈同證同則用當而通神矣

半夏湯 治酒瘴身黃無熱清言了了腹滿欲嘔心

煩足熱或癥瘕心中懊懷其脈沈弦或緊細

半夏 茯苓 白朮 各三兩 前胡 枳殼 炒 甘草

大戟 炒各三兩 黃芩 茵陳 當歸 各一兩

右咬咀每服四錢水煎入薑三片空心服



按金匱云酒黃瘰者或酒無熱清言了了腹滿欲吐 鼻燥其脈浮者先吐之沈弦者先下之誨人察脈辨 證而用治得其先務其指已明不必出方也後人模 倣為此一方揉入他證他脈真同說夢
藿脾飲 <small>戴氏</small> 治酒瘰
藿香葉 枇杷葉 <small>去毛</small> 桑白皮 陳橘皮 乾葛
白茯苓 雞距子 <small>各等分</small>
右水煎下酒煮黃連丸
欽定四庫全書
醫門法律
梔子大黃湯 治酒瘰心中懊懣或熱痛
山梔 <small>十四枚</small> 大黃 <small>一斤</small> 枳實 <small>五枚</small> 豆豉 <small>一升</small>
右四味以水六升煎取二升分溫三服
白朮湯 <small>三因</small> 治酒瘰因下後變為黑瘰目青面黑心中 如啖蒜齏狀大便黑皮膚不仁脈微而數
白朮 桂心 <small>各一錢</small> 枳實 <small>炒</small> 豆豉 甘葛 杏仁
甘草 <small>炙五分</small> 水一鍾煎至七分食前服
按陳無擇倣金匱酒瘰下之久久為黑瘰全文而製



此方祇從酒熱起見漫不識其來意詎知榮衛之氣	以久下而陷不易升布乃至索然不運於周身而周	身之血亦瘀黯而變黑色是必先復其營衛之氣隨	聽營衛運退其瘀黯然後為可無擇賢者且不深究	厥旨他何望耶	酒煮黃連丸 治酒瘰 <small>見三氣門</small>	加味四君子湯 治色瘰	人參 白朮 白茯苓 白芍藥 黃芪 <small>炙</small> 白扁	欽定四庫全書 醫門法律	豆 <small>炒各三錢</small> 甘草 <small>炙一錢</small>	水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾服無時	腎瘰湯 治腎瘰目黃渾身金色小便赤澁	升麻根 <small>兩半</small> 蒼朮 防風根 獨活根 白朮 柴	胡根 羌活根 葛根 <small>各半錢</small> 白茯苓 猪苓 澤	瀉 甘草根 <small>各三分</small> 黃蘗 <small>二分</small> 人參 神麩 <small>各六分</small>	分作二貼水煎食前稍熱服	按東垣之製此方無非欲解散腎臟之瘀熱傳出膀
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	-------------------------------	------------	--------------------------------------	----------------	---	-------------------	-------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	-------------	----------------------



眊之府俾得表裏分消耳究竟所用表藥之根終是  
體輕無力不能深入更不能透瘀熱堅壘雖有深心  
亦不過無可奈何之方而已醫而不從事仲景能免  
面牆而立乎

小兔絲子丸 治女勞瘵 治腎氣虛損五勞七傷

少腹拘急四肢酸疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳  
鳴心忪氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂  
不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝痿緩小

欽定四庫全書

醫門法律

便滑數房室不舉股內濕癢水道澁痛小便出血  
時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續絕傷補五臟  
去萬病明視聽益顏色輕身延年聰耳明目

石連肉 二兩 白茯苓 蒸一兩 兔絲子 酒浸研 五兩 懷山藥 二兩

小半  
打糊

右為細末用山藥糊搜和為丸如梧子大每服五十  
丸温酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜湯下晚  
食前再服



按後人製方方下必誇大其辭令用者欣然樂從似此一方立於無過之地洋洋盈耳何不可耶

崔氏八味丸 治女勞瘵 方見二卷中寒門

滑石散 治女勞瘵 詳辨其訛宜合前論細閱

滑石 一兩半 白礬 一兩

右為細末每服二錢用大麥粥清食前調服以小便出黃水為度

按此方即金匱硝石礬石散也後人不解用硝石之

欽定四庫全書

醫門法律

意狂瞽輕變其藥並變方名前有頗論論之矣茲再托出金匱製方奧義相與明之蓋少陰主內一身精血悉屬主管血雖化於脾生於心藏於肝苟少陰腎之主內者病則脾莫得而化血心莫得而主血肝莫得而藏血營衛之運行稽遲充身之血液敗結乃至為乾血勞為女勞瘵向非亟去其敗結新血不生將其人亦不生矣原方取用硝石鹹寒壯水之主以驅滌腸胃瘀壅之濕熱推陳致新合之礬石能除固熱



<p>參朮健脾湯 治發黃日久脾胃虛弱飲食少思</p>	<p>非虛也故可用之散邪解熱</p>	<p>按方下諸證俱係邪熱壅盛於胃雖全不食似虛實</p>	<p>水二鍾煎七分食前服</p>	<p>葛根 <small>各四分</small></p>	<p>蒼朮 <small>米泔浸一宿 咀炒</small> 黃連 <small>各五分</small> 山梔 <small>炒</small> 秦艽 防已</p>	<p>茵陳 <small>七分</small> 白茯苓 <small>六分</small> 木猪苓 澤瀉 白朮 陳皮</p>	<p>目俱黃小便不利全不食不得卧</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>茯苓滲濕湯 治黃瘴寒熱嘔吐渴欲飲水身體面</p>	<p>哉</p>	<p>之漢不足責也古今之以小成自狃者獨一無擇乎</p>	<p>疎陋極矣陳無擇從諛其說擬議於二方之間門外</p>	<p>石為滑石但取小便色黃為驗並不問大便之色黑</p>	<p>色黑小便屬陽其色黃可互驗也後之無識者更硝</p>	<p>引入腸胃俾瘀血分從二陰之竅而出大便屬陰其</p>	<p>之在骨髓者並建消瘀除濁之偉績以大麥粥為使</p>
----------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	---	--	----------------------	--------------------	-----------------------------	----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



散搐鼻取下黃水却服此藥	右為極細末食後溫水調下二錢日三服先用瓜蒂	黃連 <small>二兩</small> 大黃 <small>二兩</small> 醋炒黃芩 甘草 <small>各一兩</small>	黃連散 治黃瘧大小便秘瀉壅熱累効	比并錄以備酌用其虛勞證參養榮湯用之	按此一方血虛熱入血分又非前中虛可用補氣之	芫飲子	鍾薑三片煎八分食前服濟生有肉桂小草名秦	欽定四庫全書 醫門法律	地黄 <small>酒蒸</small> 陳皮 <small>各一錢</small> 半夏 <small>麩</small> 炙甘草 <small>各五分</small> 水二	白朮 茯苓 秦艽 當歸 川芎 芍藥 熟	當歸秦艽散 治五瘧口淡咽乾倦怠發熱微寒	較前一方天淵故兩備酌用	服色瘧加炙黃芪白扁豆 <small>各一錢</small>	按此一方為中氣虛弱而設故不治其瘧但補其中	歸 <small>各一錢</small> 炙甘草 <small>七分</small> 水二鍾棗二枚煎八分食前	人參 白朮 <small>各一錢</small> 白茯苓 陳皮 白芍藥 <small>煨</small> 當
-------------	----------------------	--	------------------	-------------------	----------------------	-----	---------------------	----------------	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------------------------	----------------------	--	--



按田野麤蠻之人多有實證可用此藥若膏梁輩縱有實熱此方亦未可用當以為戒

茵陳附子乾薑湯 治陰黃

附子炮去皮三錢 乾薑炮二錢 茵陳錢 草薹煨一錢 菴白

術四分 枳實炒銹 半夏製 澤瀉各五分 白茯苓 橘紅各三分

生薑五片水煎去滓涼服

按此方治服寒涼藥過多變陰黃者

秦芫湯 治陰黃不欲聞人言小便不利

欽定四庫全書

醫門法律

秦芫兩一 旋覆花 赤茯苓 炙甘草各五錢

右呶咀每服四錢匕以牛乳汁一盞煎至六分去滓

不拘時溫服

按此一方治胃中津虛亡陽而發陰黃者其證較前

方所主之證迥別故兩錄之以備酌用然此證其脈

必微弱伏結亡陽者亡津液也

治陰黃汗染衣涕唾黃

用蔓青子搗末平旦以井華水服一匙日再加至兩





匙以知為度每夜小便中浸少許帛子各書記日色  
漸退白則瘥不過五升而愈

按此方退陰黃之不涉虛者平中之奇

一清飲 治瘴證發熱

柴胡三錢 赤茯苓二錢 桑白皮炒 川芎各一錢半 甘草炙一錢

水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾食前服

按此一方治肝血肺氣交熱之證輕劑可退熱也

青龍散 治風氣傳化腹內瘀結而目黃風氣不得

欽定四庫全書

醫門法律

泄為熱中煩渴引飲

地黄 仙靈脾 防風各二錢半 荆芥穗一兩 何首烏去黑

皮米泔浸一宿  
竹刀切二錢半

右為末每日三服食後沸湯調下一錢

按風氣發黃病在營衛之間者方宜倣此

小柴胡加梔子湯 治邪熱留半表半裏而發黃者

仍以和其表裏為法雖雜證不能外也

柴胡半斤 黃芩三兩 人參三兩 甘草三兩 半夏半斤 生薑三兩 大



醫門法律卷十一								欽定四庫全書	醫門法律					溫服一升日三服	右八味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升	棗 <small>十三枚</small> 梔子 <small>三十枚</small>
---------	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	--	--	--	--	---------	----------------------	---



欽定四庫全書

子部  
醫門法律卷十二

詳校官太醫院醫士臣趙正池  
編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒  
校對官編修臣盧 逵  
謄錄貢生臣畢所諧



欽定四庫全書

醫門法律卷十二

南昌喻昌撰

律四條

凡肺痿病多不渴以其不渴漫然不用生津之藥任其肺日枯燥醫之罪也以其不渴恣胆用燥熱之藥勢必熇熇不救罪加等也

凡治肺痿病淹淹不振如魯哀朝雖孔聖不討三家僭

欽定四庫全書

醫門法律

竊但扶天常植人紀嘿維宗社耳故行峻法大驅涎沫圖速效返速斃醫之罪也

凡治肺癰病須與肺痿分頭異治肺癰為實肺痿為虛肺癰為陽實肺痿為陰虛陽實始宜散邪次宜下氣陰虛宜補胃津兼潤肺燥若不分辦而悞治醫殺之也

凡治肺癰病以清肺熱救肺氣俾其肺葉不致焦腐其生乃全故清一分肺熱即存一分肺氣而清熱必須



<p>滌其壅塞分殺其勢於大腸令濁穢膿血日漸下移 為妙若但清解其上不引之下出醫之罪也甚有惡 其下利奔迫而急止之罪加等也</p>
<p>肺癰肺痿門金匱諸方</p>
<p>金匱甘草乾薑湯</p>
<p>甘草<small>四兩</small>乾薑<small>二兩</small></p>
<p>右咬咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再服</p>
<p>金匱射干麻黃湯</p>
<p>射干<small>十三枚</small>麻黃<small>四兩</small>生薑<small>四兩</small>細辛<small>三兩</small>紫苑<small>三兩</small>款</p>
<p>冬花<small>三兩</small>五味子<small>半升</small>大棗<small>七枚</small>半夏<small>大者八枚</small>洗</p>
<p>右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫內諸</p>
<p>藥煮取三升分溫三服</p>
<p>金匱皂莢丸</p>
<p>皂莢<small>八兩</small>刮去皮用醋炙</p>
<p>右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三九日三</p>
<p>夜一服</p>



<p>金匱厚朴麻黃湯</p> <p>厚朴<small>五兩</small> 麻黃<small>四兩</small> 石膏<small>如雞子大</small> 杏仁<small>半升</small> 半夏<small>半升</small> 乾薑<small>二兩</small></p> <p>細辛<small>二兩</small> 小麥<small>一升</small> 五味子<small>半升</small></p> <p>右九味以水一斗二升先煮小麥熟去滓內諸藥煮取三升溫服一升日三服</p>	<p>金匱澤漆湯</p> <p>半夏<small>半升</small> 紫參<small>五兩一作紫苑</small> 澤漆<small>三斤以東流水五斗煮取一斗五升</small> 生薑<small>五兩</small> 白前<small>五兩</small> 甘草<small>五兩</small> 黃芩 人參 桂枝<small>各三兩</small></p> <p>欽定四庫全書 醫門法律</p> <p>右九味咬咀內澤漆汁中煮取五升溫服五合至夜盡</p>	<p>金匱麥門冬湯</p> <p>麥門冬<small>七升</small> 半夏<small>一升</small> 人參<small>三兩</small> 甘草<small>二兩</small> 粳米<small>三合</small> 大棗<small>二十枚</small></p> <p>右六味以水一斗二升煮取六升溫服一升日三夜一服</p>	<p>金匱葶藶大棗瀉肺湯</p>
---	--	--	------------------



葶藶

熬令黃色搗丸如彈子大 大棗 十二枚

右先以水三升煮棗取二升去棗內葶藶煮取一升

頓服

金匱桔梗湯

亦治

桔梗

一兩二兩 甘草

右二味以水三升煮取一升分溫再服則吐膿血也

金匱越婢加半夏湯

麻黃

六兩半斤 石膏

三兩 生薑

十五枚 大棗

二兩 甘草

半斤 半夏

欽定四庫全書

醫門法律

右六味以水六升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取三

升分溫三服

金匱小青龍加石膏湯

麻黃

芍藥

桂枝

細辛

甘草

乾薑

各三兩

五味子

半夏

各半斤

石膏

二兩

右九味以水一斗先煮麻黃去沫內諸藥煮取三升

強人服一升羸者減之日三服小兒服四合

外臺炙甘草湯

治肺痿咳嗽唾多心中溫溫液液者



<p>甘草 <small>灸 四兩</small> 桂枝 生薑 <small>各三兩</small> 麥門冬 <small>半斤</small> 麻仁 <small>半斤</small> 人參 阿膠 <small>各二兩</small> 大棗 <small>三十枚</small> 生地黃 <small>一斤</small></p>	<p>右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠消盡溫取一升日三服</p>	<p>按灸甘草湯仲景傷寒門治邪少虛多脈結代之聖方也一名復脈湯千金翼用之以治虛勞即名為千金翼灸甘草湯外臺用之以治肺痿即名為外臺灸甘草湯蓋以傷寒方中無治虛勞無治肺痿之條而</p>	<p>欽定四庫全書 醫門法律</p>	<p>二書有之耳究竟本方所治亦何止于二病哉昌每用仲景諸方即為生心之化裁亦若是而已矣外臺所取在於益肺氣之虛潤肺金之燥無出是方至於桂枝辛熱似有不宜而不知桂枝能通榮衛致津液榮衛通津液致則肺氣轉輸濁沫以漸而下尤為要藥所以云治心中溫溫液液者</p>	<p>千金甘草湯 甘草</p>
--	---------------------------------------	---	------------------------	---	---------------------





右一味以水三升煮減半分溫三服

按本方用甘草一味乃從長桑君以後相傳之神方也歷代內府御院莫不珍之蓋和其偏緩其急化其毒卓然奉之為先務然後以他藥匡輔其不逮可得收功敏捷耳今之用是方徒見諸家方中競誇神功及服之不過少殺其勢於三四日之間究不收其實效遂以為未必然耳因並傳其次第以為學者用方時重加細繹耳

欽定四庫全書

醫門法律

千金生薑甘草湯 治肺痿咳涎沫不止咽燥而悶

生薑 五兩 人參 三兩 甘草 四兩 大棗 十五枚

右四味以水七升煮取三升分溫三服

按此方即從前甘草一味方中而廣其法以治肺痿胃中津液上竭肺燥已極胸咽之間乾槁無耐之證以生薑之辛潤上行為君合之人參大棗甘草入胃而大生其津液於以回枯澤槁潤咽快膈真神方也  
千金桂枝去芍藥加皂莢湯 治肺痿吐涎沫



桂枝 <small>二兩</small> 生薑 <small>三兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 大棗 <small>十枚</small> 皂莢 <small>二枚</small> 炙黑 <small>去皮</small>	右五味以水七升微微火煮取三升分溫三服	按此方即桂枝湯本方去芍藥加皂莢也芍藥收陰	酸斂非此證所宜故去之皂莢入藥胸中如棘鍼四	射不令涎沫壅遏故加之此大治其榮衛之上著也	榮衛通則肺氣不壅矣	外臺桔梗白散 治欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴	時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰	欽定四庫全書	醫門法律	桔梗 貝母 <small>各三分</small> 巴豆 <small>一分</small> 去皮 <small>蒸研如脂</small>	右三味為散強人飲服半錢匕羸者減之病在膈上	者吐膿血膈下者瀉出若下多不止飲冷水一杯則	定	按咳而胸滿七證乃肺癰之明徵用此方深入其阻	開通其壅遏或上或下因勢利導誠先著也雖有葶	藶大棗瀉肺湯一方但在氣分不能深入故用此方	於其將成膿未成膿之時蚤為置力庶不犯膿成則
---	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-------------------	--------	------	--	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



死之遲悞豈不超乎

千金葦莖湯 治效有微熱煩滿胸中甲錯是為肺

癰

葦莖 二升 薏苡仁 半斤 桃仁 五十枚 瓜瓣 半升

右四味以水一斗先煮葦莖得五升去滓內諸藥煮取二升服一升再服當吐如膿

按此方不用巴豆其力差緩然以桃仁亟行其血不令成膿其意甚善合之葦莖薏苡仁瓜瓣清熱排膿

欽定四庫全書

醫門法律

行濁消痰潤燥開痰收功于必勝亦堂堂正正有制之師也

總按肺為嬌藏肺氣素為形寒飲冷而受傷久久出汗過多而不瘥氣餒不振即為肺痿其風傷皮毛熱傷血脈風熱相搏氣血稽留遂為肺癰肺痿多涎沫乃至便下濁沫肺癰多膿血乃至便下膿積凡胃強能食而下傳者皆不死也夫血熱則肉敗榮衛不行必將為膿是以金匱以通行榮衛為第一義欲治其



子先建其母胃中津液尤貴足以上供而無絕之後  
世諸方錯出不一不明大義今一概不錄只此金匱  
十五方而已用之不盡矣

虛勞門

論二首  
律十條

法三十一條

虛勞論

喻昌曰虛勞之證金匱敘於血痺之下可見勞則必勞  
其精血也營血傷則內熱起五心常熱目中生花見火  
耳內蛙聒蟬鳴口舌糜爛不知正味鼻孔乾燥呼吸不

欽定四庫全書

醫門法律

利乃至飲食不為肌膚怠惰嗜卧骨軟足酸營行日遲  
衛行日疾營血為衛氣所迫不能內守而脫出於外或  
吐或衄或出二陰之竅血出既多火熱迸入逼迫煎熬  
漫無休止營血有立盡而已不死何待耶更有勞之之  
極而血痺不行者血不脫於外而但畜於內畜之日久  
週身日走之隧道悉痺不流惟就乾涸皮鮮滑澤面無  
榮潤於是氣之所過血不為動徒蒸血為熱或日晡或  
子午始必乾熱俟蒸氣散微汗而熱解熱蒸不已瘵病



成焉不死又何待耶亦有始因脫血後遂血痺者血虛  
血少艱於流布發熱致痺尤易易也內經凡言虛病不  
及於勞然於大肉枯槁大骨陷下胸中氣高五臟各見  
危證則固已言之未有勞之之極而真臟脈不見者也  
然枯槁已極即真藏脈不見亦寧有不死者乎秦越人  
始發虛損之論謂虛而感寒則損其陽陽虛則陰盛損  
則自上而下一損損於肺皮聚而毛落二損損於心血  
脈不能榮養臟腑三損損於胃飲食不為肌膚虛而感

欽定四庫全書

醫門法律

熱則損其陰陰虛則陽盛損則自下而上一損損於腎  
骨痿不起於床二損損於肝筋緩不能自收持三損損  
於脾飲食不能消化自上而下者過於胃則不可治自  
下而上者過於脾則不可治蓋飲食多自能生血飲食  
少則血不生血不生則陰不足以配陽勢必五藏齊損  
越人歸重脾胃旨哉言矣至仲景金匱之文昌細會其  
大意謂精生於穀穀入少而不生其血血自不能化精  
內經於精不足者必補之以味味者五穀之味也補以



味而節其勞則精貯漸富大命不傾設以雞口之入為  
牛後之出欲其不成虛勞寧可得乎所以垂訓十則皆  
以無病男子精血兩虛為言而虛勞之候煥若指掌矣  
夫男子平人但知縱慾勞精抑孰知陰精日損飲食無  
味轉勞轉虛轉虛轉勞脈從內變色不外華津液衰而  
口渴小便少甚則目瞑衄血陰精不交自走盜汗淋漓  
身體振搖心膽驚怯者比比然也故血不化精則血痺  
矣血痺則新血不生並素有之血亦瘀積不行血瘀則

欽定四庫全書

醫門法律

營虛營虛則發熱熱久則蒸其所瘀之血化而為蟲遂  
成傳尸瘵證窮凶極厲竭人之神氣養蟲之神氣人死  
則蟲亦死其遊魂之不死者傳親近之一脈附入血隧  
似有如無其後蟲日榮長人日凋悴閱三傳而蟲之為  
靈非符藥所能制矣醫和視晉平公疾曰是近女室晦  
而生內熱惑蠱之疾非鬼非食不可為也惑即下唇有  
瘡蟲食其肛其名為惑之惑蠱字取義三蟲共載一器  
非鬼非食明指蟲之為厲不為尊者諱也以故狐惑之



證聲啞喎勞瘵之證亦聲啞喎是則聲啞者氣管為蟲  
所餌明矣男子前車之覆古今不知幾千億人矣巢氏  
病源不察謂有虛勞有蒸病有注病勞有五勞六極七  
傷蒸有五蒸二十四蒸注有三十六種九十九種另各  
分門異治後人以岐路之多茫然莫知所適且諱其名  
曰痰火而夢夢者遂謂痰火有虛有實乃至克棟諸方  
妄云肺虛用某藥肺實用某藥以及心肝脾腎咸出虛  
實兩治之法是於虛損虛勞中添出實損實勞矣鄙陋

欽定四庫全書

醫門法律

何至是耶仲景於男子平人諄諄致戒無非謂營衛之  
道納穀為寶居常調營衛以安其穀壽命之本積精自  
剛居常節嗜慾以生其精至病之甫成脈纔見端惟恃  
建中復脈為主治夫建中復脈皆稼穡作甘之善藥一  
遵精不足者補之以味之旨也豈有泉之竭矣不云自  
中之理哉後人補腎諸方千蹊萬徑以治虛勞何反十  
無一全豈非依樣葫蘆徒資話柄耶及其血痺不行仲  
景亟驅其舊生其新幾希於瘵瘵將成未成之間誠有



一無二之聖法第牽常者不能用耳試觀童子臟腑脆嫩纔有寒熱積滯易於結癖成疳待其血痺不行氣蒸發熱即不可為女子血乾經閉發熱不止癆瘵之候更多待其勢成縱有良法治之無及倘能服膺仲景幾先之哲喫力於男子童子女子瘵病將成未成之界其活人之功皆是起白骨而予以生全為彼蒼所眷注矣

虛勞脈論

喻昌曰虛勞之脈皆不足之候為精氣內奪與邪氣外

欽定四庫全書

醫門法律

入之實脈常相反也黃帝問何謂重虛岐伯對以脈氣上虛尺虛是謂重虛謂其上下皆虛也氣虛者言無常也謂其脈之無常也尺虛者行步恆然謂其步履之不正也脈虛者不象陰也謂其脈全不似手太陰脈之充盈也皆易明也獨脈之無常從來謂是上焦陽氣虛故其脈無常果爾則下焦陰氣虛脈更無常矣觀下文云如此者滑則生濇則死濇脈且主死而寸脈之無常寧復有生理哉故氣虛者言無常也此一語明謂上氣之





虛由胸中宗氣之虛故其動之應手者無常耳乃知無常之脈指左乳下之動脈為言有常則宗氣不虛無常則宗氣大虛而上焦之氣慳慳不足也後之論脈者失此一段精微但宗越人所述損脈而引伸觸類曰脈來奘者為虛緩者為虛滯為虛芤為中虛弦為中虛脈來細而微者血氣俱虛脈小者血氣俱少脈沈小遲者脫氣虛損之脈似可一言而畢實未足以盡其底裏賴仲景更其名為虛勞虛勞之脈多兼浮大當於前人論脈

欽定四庫全書

醫門法律

合參浮大與否所以謂男子平人脈大為勞極虛亦為勞又謂脈浮者裏虛又謂勞之為病其脈浮大手足煩春夏劇秋冬瘥男子脈浮弱而濇為無子脈得諸芤動微緊男子失精女子夢交脈極虛芤遲為清穀亡血失精脈虛弱細微者善盜汗而總結其義曰脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛虛寒相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精可見浮大弦緊外象有餘其實中藏不足不顯泥遲緩微弱一端以



驗脈而脈之情狀莫逃於指下即病之疑似莫弦於胸  
中仲景之承前啟後豈苟焉而已哉昌不揣愚陋已著  
大氣論於卷首發明胸中大氣宗氣所關之重因辨岐  
伯所指脈氣上虛為宗氣之虛以見重虛之脈乳下宗  
氣在所當診固堂下指陳未必堂上首肯然不可謂門  
外漢也

鍼經云形氣不足病氣不足此陰陽俱不足也不可刺  
之刺之重不足重不足則陰陽俱竭氣血皆虛五臟空

欽定四庫全書

醫門法律

虛筋骨髓枯老者絕滅壯者不復矣

按形者形骸也氣者口鼻呼吸之氣也形骸消瘦視  
壯盛者迥殊氣息喘促或短而不足以息視勞役形體  
氣不急促者迥殊病氣不足懶語困弱是正氣內虧  
視外邪暗助精神反增者迥殊此不可刺宜補之以  
甘藥甘藥正稼穡作甘培補中央以灌輸臟腑百脈  
之良藥此法惟仲景遵之其次則東垣丹溪亦宗之  
但東垣引以證內傷而不及外感丹溪引以證陰虛



而不及陽損此聖域賢關之分量也

秦越人發明虛損一證優入聖域雖無方可考然其論  
治損之法損其肺者益其氣損其心者調其營衛損  
其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其  
腎者益其精即此便是正法眼藏使八十一難俱倣  
此言治何患後人無具耶

原氣虛與虛損不同原氣虛可復虛損難復也至虛損  
病亦有易復難復兩候因病至虛者緩調自復因虛

欽定四庫全書

醫門法律

致損者虛上加虛卒難復也故因病致虛東垣丹溪  
法在所必用若虛上加虛而至於損原氣索然丹溪  
每用人參膏至十餘斤多有得生者其見似出東垣  
之右然則丹溪補陰之論不過救世人偏於補陽之  
弊耳豈遇陽虛之病而不捷於轉環耶

飲食勞倦為內傷元氣真陽下陷內生虛熱東垣發補  
中益氣之論用人參黃芪等甘溫之藥大補其氣而  
提其下陷此用氣藥以補氣之不足也若勞心好色



內傷真陰陰血既傷則陽氣偏盛而變為火矣是謂  
陰虛火旺勞瘵之證故丹溪發陽有餘陰不足之論  
用四物加知母黃栢補其陰而火自降此用血藥以  
補血之不足也益氣補陰一則因陽氣之下陷而補  
其氣以升提之一則因陽火之上升而滋其陰以降  
下之一升一降迥然不同亦醫學之兩大法門不可  
不究悉之也

丹谿論勞瘵主乎陰虛者蓋自子至巳屬陽自午至亥

欽定四庫全書

醫門法律

屬陰陰虛則熱在午後子前寤屬陽寤屬陰陰虛則  
汗從寐時盜出也升屬陽降屬陰陰虛則氣不降氣  
不降則痰涎上逆而連綿不絕也脈浮屬陽沈屬陰  
陰虛則浮之洪大沈之空虛也此皆陰虛之證用四  
物湯加黃栢知母主之然用之多不效何哉蓋陽既  
虛矣火必上炎而當歸川芎皆氣辛味大溫非滋虛  
降火之藥又川芎上竄尤非虛炎短乏者所宜地黃  
泥膈非胃熱食少痰多者所宜黃栢知母苦辛大寒



雖滋陰其實燥而損血雖曰降火其實苦先入心久而增氣反而助火至其敗胃所不待言不若用薏苡仁百合天冬麥冬桑白皮地骨皮牡丹皮枇杷葉五味子酸棗仁之屬佐以生地黄汁藕汁人乳汁童便等如咳嗽則多用桑白皮枇杷葉有痰則增貝母有血則多用薏苡仁百合增阿膠熱盛則多用地骨皮食少則用薏苡仁至七八錢而麥冬常為之主以保肺金而滋生化之源往往應手而效蓋諸藥皆稟燥

欽定四庫全書

醫門法律

降收之氣氣之薄者為陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平寒涼是也以施於陰虛火動之證猶當溽暑伊鬱之時而商飈一動炎歎如失矣與治暑熱用白虎湯同意然彼是外感外感為有餘故用寒沈藏之藥而後能補其偏此是內傷內傷為不足但用燥降收之劑而已得其平矣此用藥之權輿也

虛勞之疾百脈空虛非粘膩之物填之不能實也精血枯涸非滋濕之物濡之不能潤也宜用人參黃芪地



黃二冬枸杞五味之屬各煎膏另用青蒿以童便熬  
膏及生地汁白蓮藕汁乳汁薄荷汁隔湯煉過酌定  
多少并麋角膠霞天膏合和成劑每用一匙湯化服  
之如欲行瘀血加入醋製大黃末玄明粉桃仁泥韭  
汁之屬欲止血加入京墨之屬欲行痰加入竹瀝之  
屬欲降火加入童便之屬

凡虛勞之證大抵心下引脇俱疼蓋滯血不消新血無  
以養之尤宜用膏子加韭汁桃仁泥

欽定四庫全書

醫門法律

呼吸少氣懶言語無力動作目無精光面色眊白皆兼

氣虛用麥冬人參各三錢陳皮桔梗炙甘草各半兩

五味子二十一粒為極細末水浸油餅為丸如雞頭

子大每服一丸細嚼津唾嚥下名補氣丸

氣虛則生脈散不言白朮血虛則三才丸不言四物前言

薏苡仁之屬治肺虛後言參芪地黃膏子之類治腎

虛蓋肝心屬陽肺腎屬陰陰虛則肺腎虛矣故補肺

腎即是補陰非四物黃栢知母之謂也



陳藏器諸虛用藥凡例	虛勞頭痛復熱加枸杞萎蕤	虛而欲吐加人參	虛而不安亦加人參	虛而多夢紛紜加龍骨	虛而多熱加地黃牡蠣地膚子	甘草	虛而冷加當歸川芎乾薑	虛而損加鍾乳	棘刺蓯蓉巴戟天	虛而大熱加黃芩天冬	虛而多忘加茯苓遠志	虛而口乾加麥冬知母	虛而吸吸加胡麻覆盆子栝子仁	虛而多氣兼微咳加五味子大棗	虛而驚悸不安加龍齒沙參紫石英	欽定四庫全書	醫門法律	小草若冷則用紫石英小草若客熱則用沙參龍齒	不冷不熱皆用之	虛而身強腰中不利加磁石杜仲	虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭	虛而勞小便赤加黃芩	虛而客熱加地骨皮黃芪	虛而冷加黃芪	虛而痰復有氣加生薑半夏枳實	虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞胫胫	虛而小腸不利加茯苓澤瀉	虛而損溺白加厚朴	髓竭不足加地黃當歸	肺氣不足加二冬五味子	心氣不足加
-----------	-------------	---------	----------	-----------	--------------	----	------------	--------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---------------	----------------	--------	------	----------------------	---------	---------------	----------------	-----------	------------	--------	---------------	----------------	-------------	----------	-----------	------------	-------



人參茯苓萸蒲 肝氣不足加天麻川芎 脾氣不  
足加白朮白芍益智 腎氣不足加熟地遠志丹皮  
膽氣不足加細辛酸棗仁地榆 神昏不足加硃  
砂預知子茯神

勞瘵兼痰積其證腹脇常熱頭面手足則於寅卯時分  
乍有涼時宜以霞天膏入竹瀝加少薑汁調玄明粉  
行之若頑痰在膈上膠固難治者必以吐法吐之或  
沈香滾痰丸透膈丹之類下之甚則用倒倉法若肝

欽定四庫全書

醫門法律

有積痰瘀血結熱而勞瘵者其大衝脈必與衝陽脈  
不相應宜以補陰藥吞當歸龍薈丸

古方柴胡飲子防風當歸飲子麥煎散皆用大黃蓋能  
折炎上之勢而引之下行莫速乎此然惟大便實者  
乃可若澹泄則雖地黃之屬亦不宜況大黃乎

病勞有一種真藏虛損復受邪熱者如經驗方中治勞  
熱青蒿煎丸用柴胡正合宜耳熱去即須急已若無  
邪熱不死何待又大忌芩連栝驟用純苦寒藥反瀉





其陽但當用瓊玉膏之類大助陽氣使其復還寅卯之位微加瀉陰火之藥是也

有重陰覆其陽火不得伸或洒洒惡寒或志意不樂或脈弦數四肢五心煩熱者火鬱湯柴胡升麻湯病去即已不可過劑

服寒涼藥證雖大減脈反加數者陽鬱也宜升宜補大忌寒涼犯之必死

治法當以脾腎二藏為要腎乃繫元氣者也脾乃養形

欽定四庫全書

醫門法律

體者也經曰形不足者溫之以氣氣謂真氣有少火之溫以生育形體然此火不可使之熱熱則壯壯則反耗真氣也候其火之少壯皆在兩腎間經又曰精不足者補之以味五味入胃各從所喜之藏而歸之以生津液輸納於胃者若五味一有過節反成其藏有餘勝克之禍起矣候其五味之寒熱初在脾胃次在其所歸之藏即當補其不足瀉其有餘謹守精氣調其陰陽夫是故天樞開發而胃和脈生矣



勞疾久而嗽血咽疼無聲此為下傳上若不嗽不疼久而溺濁脫精此為上傳下皆死證也

夫傳尸勞者男子自腎傳心心而肺肺而肝肝而脾女子自心傳肺肺而肝肝而脾脾而腎五臟復傳六腑而死矣雖有諸候其實不離乎心陽腎陰也若明陰陽用藥可以起死回生

蘇遊論曰傳尸之候先從腎起初受之兩脛酸疼腰背拘急行立脚弱飲食減少兩耳颼颼直似風聲夜卧

欽定四庫全書

醫門法律

遺泄陰汗痿弱腎既受訖次傳於心心初受氣夜卧心驚或多恐怖心懸懸氣吸吸欲盡夢見先亡有時盜汗飲食無味口内生瘡心氣煩熱惟欲眠卧朝輕夕重兩頰口唇悉皆紋赤如傳臙脂有時手足五心煩熱心受已次傳於肺肺初受氣咳嗽上氣喘卧益甚鼻口乾燥不聞香臭如或忽聞惟覺朽腐氣有時惡心欲吐肌膚枯燥時或疼痛或似蟲行乾皮細起狀如麩片肺既受已次傳於肝肝初受氣兩目眊眊



面無血色嘗欲顰眉視不能遠目嘗乾澁又時赤痛  
或復睛黃嘗欲合眼及時睡卧不著肝既受已次傳  
於脾脾初受氣兩脇虛脹食不消化又時瀉利水穀  
生蟲有時肚痛腹脹雷鳴唇口焦乾或生瘡腫毛髮  
乾聳無有光潤或時上氣撐肩喘息利赤黑汁見此  
證者乃不治也

紫庭方云傳尸伏尸皆有蟲須用乳香熏病人之手乃  
仰手掌以帛覆其上熏良久手背上出毛長寸許白

欽定四庫全書

醫門法律

而黃者可治紅者稍難青黑者即死若熏之良久無  
毛者即非此證屬尋常虛勞證也又法燒安息香令  
烟出病人吸之嗽不止乃傳尸也不嗽傳尸也

合論金匱桂枝龍骨牡蠣湯天雄散二方

本文云夫失精家少腹強急陰頭寒目眩髮落脈極  
虛芤遲為清穀亡血失精脈得諸芤動微緊男子失  
精女子夢交桂枝龍骨牡蠣湯主之

天雄散 本文無



按前一方向用桂枝湯調其營衛羈遲脈道虛衰加龍 骨牡蠣瀋止其清穀亡血失精一方而兩扼其要誠 足寶也小品又云虛羸浮熱汗出者除桂加白薇附 子各三分故曰二加龍骨湯得此一加減法後之用 是方者更思過半矣可見桂枝雖調營衛所首重倘 其人虛陽浮越於外即當加附子白薇以回陽而助 其收瀋桂枝又在所不取也後一方以上中二焦之 陽虛須用天雄以補其上白朮以固其中用桂枝領 欽定四庫全書 醫門法律	藥行營衛上焦並建回陽之功方下雖未述證其治 法指掌易見然則去桂枝加白薇附子得非倣此以 治中下二焦之陽虛欲脫耶精矣	論金匱小建中湯黃芪建中湯二方 本文云虛勞裏 急悸衄腹中痛夢失精四肢酸疼手足煩熱咽乾口 燥小建中湯主之虛勞裏急諸不足黃芪建中湯主 之	按虛勞病而至於亡血失精消耗精液枯槁四出難
---	---	--	----------------------



為力矣內經於鍼藥所莫制者調以甘藥金匱遵之  
而用小建中湯黃芪建中湯急建其中氣俾飲食增  
而津液旺以至充血生精而復其真陰之不足但用  
稼穡作甘之本味而酸辛鹹苦在所不用蓋舍此別  
無良法也然用法者貴立於無過之地寧但嘔家不  
可用建中之甘即服甘藥微覺氣阻氣滯更當慮甘  
藥大過令人中滿蚤用橘皮砂仁以行之可也不然  
甘藥又不可恃更將何所恃哉後人多用樂令建中

欽定四庫全書

醫門法律

湯十四味建中湯雖無過甘之弊然樂令方中前胡  
細辛為君意在退熱而陰虛之熱則不可退十四味  
方中用附桂茯苓意在復陽而陰虛之陽未必可復  
又在用方者之善為裁酌矣

論八味腎氣丸方 本文云虛勞腰痛少腹拘急小便  
不利者八味腎氣丸主之金匱之用八味腎氣丸屢  
發於前矣消渴之關門大開水病之關門不開用此  
方蒸動腎氣則關門有開有闔如晨門者與陽俱開



與陰俱闔環城內外賴以安堵也其治脚氣上入少  
腹不仁則藉以培真陰真陽根本之地而令濁陰潛  
消不得上干清陽耳今虛勞病桂附本在所不用而  
腰痛少腹拘急小便不利三證皆由腎中真陽內微  
所致其病較陰虛發熱諸證迥乎不同又不可不求  
其有而反責其無矣

論薯蕷丸方 本文云虛勞諸不足風氣百疾薯蕷丸  
主之

欽定四庫全書

醫門法律

按虛勞不足之病最易生風生氣倘風氣不除外證  
日見有餘中藏日見虛耗神頭鬼臉不可方物有速  
斃而已故用此方除去其風氣兼培補其空虛也

論酸棗仁湯方 本文云虛勞虛煩不得眠酸棗仁湯  
主之

按素問云陽氣者煩勞則張精絕滯積於夏使人煎  
厥已詳論卷首答問條矣可見虛勞虛煩為心腎不  
交之病腎水不上交心火心火無制故煩而不得眠



不獨夏月為然矣方用酸棗仁為君而兼知母之滋  
腎為佐茯苓甘草調和其間芎藭入血分而解心火  
之燥煩也

論大黃廔蟲丸方 本文云五臟虛極羸瘦滿不能飲  
食食傷憂傷房室傷饑傷勞傷經絡營衛氣傷內有  
乾血肌膚甲錯兩目黯黑綏中補虛大黃廔蟲丸主  
之

按七傷金匱明為食傷憂傷飲食傷房室傷饑傷勞

欽定四庫全書

醫門法律

傷經絡營衛氣傷及房勞傷但居其一後人不知何  
見謂七傷者陰寒陰痿裏急精速精少陰下濕精滑  
小便苦數臨事不舉似乎顛主腎傷為言豈有五勞  
分主五藏而七傷獨主一藏之理雖人生恣逞傷腎  
者恒多要不可為一定之名也所以虛勞證凡本之  
內傷者有此七者之分故虛勞發熱未不由瘀血  
者而瘀血若無內傷則營衛運行不失其次瘀從何  
起是必飲食起居過時失節營衛凝泣先成內傷然



後隨其氣所阻塞之處血為瘀積瘀積之久牢不可  
拔新生之血不得周灌與日俱積其人尚有生理乎  
仲景施活人手眼以潤劑潤其血之乾以蠕動嗽血  
之物行死血名之曰緩中補虛豈非以行血去瘀為  
安中補虛上著耶然此特世俗所稱乾血勞之良治  
也血結在內手足脈相失者宜之兼入瓊玉膏潤補  
之藥同用猶妙昌細參其證肌膚甲錯面目黯黑及  
羸瘦不能飲食全是營血瘀積胃中而發見於肌膚

欽定四庫全書

醫門法律

面目所以五藏失中土之灌溉而虛極也此與五神  
藏之本病不同故可用其方而導去其胃中之血以  
內穀而通流營衛耳許州陳大夫傳仲景百勞丸方  
云治一切癆瘵積滯不經藥壞證者宜服與世俗所  
稱乾血勞亦何以異大夫其長於謀國者歟方用當  
歸乳香沒藥各一錢蜜蟲十四箇人參二錢大黃四  
錢水蛭十四箇桃仁十四箇浸去皮尖右為細末煉  
蜜為丸桐子大都作一服可百丸五更用百勞水下





取惡物為度服白粥十日百勞水即仲景甘爛水以杓揚百遍者也

論金匱附千金翼炙甘草湯方一名復脈湯治虛勞不足汗出而悶脈結悸行動如常不出百日危急者十日死

按此仲景治傷寒脈代結心動悸邪少虛多之聖方也金匱不載以千金翼常用此方治虛勞則實可徵信是以得名為千金之方也虛勞之體多有表熱夾其

欽定四庫全書

醫門法律

陰虛所以其證汗出而悶表之固非即治其陰虛亦非惟用此方得汗而脈出熱解俾其人快然真聖法也但虛勞之人胃中津液素虛匪傷寒暴病邪少虛多之比桂枝生薑分兩之多服之津液每隨熱勢外越津既外越難以復收多有淋漓沾濡一晝夜者透此一關亟以本方去桂枝生薑二味三倍加入人參隨繼其後庶幾津液復生乃致營衛盛而諸虛盡復豈小補哉



論金匱附肘後癩肝散丸 本文云治冷勞又主鬼疰  
一門相染

按許叔微本事方云葛稚川言鬼疰者是五尸之一  
疰諸鬼邪為害其變動不一大約使人淋漓沈沈默  
默的不知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯  
以至於死傳於傍人乃至滅門覺知是證者急治癩  
肝一具陰乾取末水服方寸匙日三服效未知再服  
此方神良

欽定四庫全書

醫門法律

再按長桑君所授越人禁方各傳其徒一人者至華  
元化斃獄其傳遂泯仲景醫中之聖諸禁方詎不盡  
窺底蘊然而有其理無其事者不足尚也有其事無  
其理者不足尚也即有其理有其事矣而用意罕幾  
先之哲尤不足尚也如癩肝散非不可以殺蟲而未  
可以行血逐瘀所以製緩中補虛大黃廔蟲丸一方  
自出手眼而授陳大夫百勞丸一方加入人參只作  
一服以取頓快蓋於此時而用力可圖十全其五也



迨至束手無策而取用獺肝以去其蟲蟲去其人可  
獨存乎然蟲亦不可不去也金匱之附肘後一方豈  
無意哉

附論李東垣補中益氣湯益胃升陽湯二方

東垣所謂飲食勞倦內傷元氣則胃脘之陽不能升  
舉並心肺之氣陷入於中焦而用補中益氣治之方  
中佐以柴胡升麻二味一從左旋一從右旋旋轉於  
胃之左右升舉其上焦所陷之氣非自腹中而升舉

欽定四庫全書

醫門法律

之也其清氣下入腹中久為殮泄並可多用升柴從  
腹中而升舉之矣若陽氣未必陷下反升舉其陰氣  
干犯陽位為變豈小哉更有陰氣素慣上干清陽而  
胸中之肉隆聳為膜胸間之氣漫散為脹者而悞施  
此法天翻地覆九道皆塞有瀕於死而坐困耳後人  
相傳謂此方能升清降濁有識者亦咸信之醫事尚  
可言哉夫補其中氣以聽中氣之自為升降不用升  
柴可也用之亦可也若以升清之藥責其降濁之能



豈不痴乎

附論朱丹谿大補陰丸四物加黃檗知母湯二方

虛勞之證陰虛者十常八九陽虛十之一二而已丹谿著陰有餘陽不足之論而定二方與東垣補中益氣之法旗鼓相當氣下陷而不能升則用東垣火上升而不能降則用丹谿二老入理深譚各造其極無容議也前論補中益氣能升清陽設誤用之反升濁陰以致其叮嚀矣而丹谿之法用之多不效者可不

欽定四庫全書

醫門法律

深維其故哉昌謂立法者無過而用法者不得法中之奧過端四出蓋於陽常有餘陰常不足二語未常細心推辨耳夫陽之有餘得十之七陰之不足得十之三此所謂真有餘真不足也陽真有餘一切補陰之藥直受之而無恐多用之亦無害是則補陰在所必需矣若陰之不足者十存其三而陽之有餘者十存四五亦名有餘而實則非真有餘也究亦同歸不足而已補陰寒涼之藥尚敢恣用乎不知此義而恣



用之豈但不效其後轉成陰盛陽虛清穀盜汗等患  
 究竟陰基已壞於前即欲更補其氣其如味之不能  
 載何故再致叮嚀俾用昔人法如持衡在手較量於  
 輕重之間可矣

附論嚴用和芪附湯參附湯二方

虛勞之屬陽虛者十中豈無一二嚴氏二方似不可  
 少其方從金匱術附湯生出投之得當通於神明其  
 虛勞失血宜之者尤多以其善治龍雷之陰火耳但

欽定四庫全書

醫門法律

以參芪為君附子為佐雖每服一兩不嫌其多方中  
 止用芪附各半人參五錢附子一兩分三服能無倒  
 乎

水腫門

論三首合論金匱方六條  
律七條附論海藏法一條

水腫論

喻昌曰病機之切於人身者水火而已矣水流濕火就  
 燥水柔弱火猛烈水泛溢於表裏火遊行於三焦拯溺  
 救焚可無具以應之乎經謂二陽結謂之消三陰結謂



之水手足陽明熱結而病消渴火之為害已論之矣而  
三陰者手足太陰脾肺二藏也胃為水穀之海水病莫  
不本之於胃經乃以屬之脾肺者何耶使足太陰脾足  
以轉輸水精於上手太陰肺足以通調水道於下海不  
揚波矣惟脾肺二藏之氣結而不行後乃胃中之水日  
蓄浸灌表裏無所不到也是則脾肺之權可不伸耶然  
其權尤重於腎腎者胃之關也腎司開闔腎氣從陽則  
開陽太盛則闔門大開水直下而為消腎氣從陰則闔

欽定四庫全書

醫門法律

陰太盛則闔門常闔水不通而為腫經又以腎本肺標  
相輸俱受為言然則水病以脾肺腎為三綱矣於中節  
目尤難辨晰金匱分五水之名及五藏表裏主病徹底  
言之後世浸不加察其治水輒宗霸術不能行所無事  
可謂智乎五水者風水皮水正水石水黃汗也風水其  
脈自浮外證骨節疼痛惡風渾是傷風本證從表治之  
宜矣皮水其脈亦浮外證跗腫按之沒指不惡風其腹  
如鼓不渴當發其汗證不同而治同其理安在則以皮



毛者肺之合也肺行營衛水漬皮間營衛之氣臏鬱不行其腹如鼓發汗以散皮毛之邪外氣通則內鬱自解耳正水其脈沈遲外證自喘北方壬癸自病陽不上通關門閉而水日聚上下溢於皮膚跗腫腹大上為喘呼不得卧腎本肺標子母俱病也石水其脈自沈外證腹滿不喘所主在腎不合肺而連肝經謂肝腎並沈為石水以其水積胞中堅滿如石不上大腹適在厥陰所部即少腹疝瘕之類也不知者每治他病誤動其氣上為

欽定四庫全書

醫門法律

嘔逆多主死也巢氏病源謂石水自引兩脇下脹痛或上至胃脘則死雖不及於誤治大抵肝多腎少之證耳黃汗汗如蘗汁其脈沈遲身發熱胸滿四支頭面腫久不愈必致癰膿陰脈陽證腎本胃標其病皆胃之經脈所過後世名之瘴水者是也夫水飲入胃不行鬱而為熱熱則營衛之氣亦熱熱之所過末流之患不可勝言皆從瘴水而浸淫不已耳然水在心之部則鬱心火炳明之化水在肝之部則鬱肝木發生之化水在肺之部



則孤陽竭於外其魄獨居水在脾之部則陰於內而穀  
精不布水在腎之部不但諸陽退伏即從陽之陰亦且  
退伏孤陰獨居於下而隔絕也故胃中之水惟恐其有  
火有火仍屬消渴末傳中滿之不救腎中之水惟恐其  
無火無火則真陽滅沒而生氣內絕其在心之水遏抑  
君火若得脾土健運子必救母即在肝在肺在腎之水  
脾土一旺水有所制猶不敢於橫發第當懷山襄陵之  
日求土不委頹足矣欲土宜稼穡豈不難哉夫水土平

欽定四庫全書

醫門法律

成以神禹為師醫門欲平水土不師仲景而誰師乎

### 水腫脈論

喻昌曰諸病辨脈以浮沈遲數四脈為綱而水病之精  
微要渺莫不從此四字叅出其及於弦緊微瀆伏潛之  
脈者愈推愈廣之節目耳風水脈浮此定法也然有太  
陽脈浮之風水有肝腎並浮之風水有勇而勞汗之風  
水有面胛龐鬱壅害於言之風水治法同一開鬼門而  
標中之本則微有分矣抑且當汗之證渴而下利小便





數皆不可發汗可不辨而犯其戒乎脈沈曰水此定法也而肝腎並沈為石水沈伏相搏名曰水少陰脈緊而沈緊則為痛沈則為水脈得諸沈當責有水身體腫重水病脈出者死沈為水緊為寒沈緊相搏結在關元沈為裏水水之為病其脈沈小屬少陰內經明有潔淨府之法金匱治諸沈脈俱不及之另曰腰以下腫者宜利小便又曰小便自利者愈正恐沈微沈遲腎氣衰少誤用其法耳已上所論浮沈諸脈皆顯明而可解者也至

欽定四庫全書

醫門法律

論遲數之脈謂寸口脈浮而遲浮脈則熱遲脈則潛熱潛相搏名曰沈跌陽脈浮而數浮脈即熱數脈即止數止相搏名曰伏沈伏相搏名曰水沈則絡脈虛伏則小便難虛難相搏水走皮膚即為水矣如是言脈截斷衆流令聰明知見全不得入豈非最上一乘乎寸口者肺脈所過跌陽者胃脈所過二脈合診者表章內經三陰結謂之水當以寸口跌陽定其診也寸口脈浮而遲浮為衛為陽遲為營為陰衛不與營和其陽獨居脈外則



為熱營不從衛匿於脈中則為潛營衛之間熱潛之邪  
相搏而至則肺氣不能布化故自結而沈也脾與胃以  
膜相連而為表裏跌陽脈浮而數胃陽不與脾陰相合  
浮而獨居於表則為熱脾陰不得胃陽以和反為陽氣  
所促而變數數則陰血愈虛而止矣數止相搏名曰伏  
者跌陽之脈本不伏以熱止之故而脈伏也寸口之沈  
跌陽之伏相搏於中則為水豈非三陰結一定之診乎  
然肺合皮毛者也皮膚者絡脈之所過肺沈而氣不為

欽定四庫全書

醫門法律

充營潛而血不為養則絡脈虛脾與胃行津液者也脾  
伏則津液不入膀胱故小便難絡虛便難水之積者乘  
虛而走皮間為腫矣金匱之書觀之不解正精微所在  
未可釋手也寸口脈遲而濇解見二卷水寒中然以寸  
口定肺之診矣而肺者外合皮毛內合大腸者也外合  
皮毛既推皮虛所過絡脈之虛水入為腫矣而內合大  
腸豈無脈法以推之耶金匱又曰寸口脈弦而緊弦則  
衛氣不行緊即惡寒水不沾流走於腸間以浮遲弦緊



為肺脈主水表裏之分也弦為水緊為寒水寒在肺則營衛不溫分肉而惡寒肺之治節不行不能通調水道故水不沾流而但走大腸之合也即肺水者其身腫小便難時時鴨澹之互辭也以跌陽定胃之診矣而胃之或寒或熱亦即於脈之或緊或數而辨之故曰跌陽脈當伏今反緊本自有寒疝瘕腹中痛醫反下之下之即胸滿短氣又曰跌陽脈當伏今反數本自有熱消穀小便數今反不利此欲作水一寒一熱兩出跌陽所主脈

欽定四庫全書

醫門法律

證寒疝瘕即石水之類腹中痛宜溫不宜下下之而傷其胸中之陽則濁陰上攻胸滿短氣也內經腫滿環臍痛名風根不可動動之為水溺澹之病風根為陽動之則乘陰疝瘕為陰動之則乘陽皆精義也熱能消穀小便數本是瘕成消中之病今反小便不利此欲作水亦可見其水必乘熱勢浸淫無所不至與黃汗證大同小異耳金匱水病脈法之要全在求責有無盛虛有者求之無者求之凡屬本證兼證胸中了然無所疑惑矣盛



<p>惡風者防已黃芪湯主之腹痛加芍藥</p>	<p>論金匱防已黃芪湯方 本文云風水脈浮身重汗出</p>	<p>矣</p>	<p>肌膚癆潰者一一致詳始得其精學脈者自為深造可</p>	<p>營衛所主上中下三焦俱病四屬斷絕者有營衛熱附</p>	<p>衛不和於脈之內外者有營衛阻絕於脈之上下者有</p>	<p>理者有營衛因穀氣少並虛其宗氣胸中作痛者有營</p>	<p>上行而不環周於身者有營衛因汗出多而不固於腠</p>	<p>則主死耳又如營衛之虛其辨不一有營衛隨風火熱</p>	<p>乎惟少陰腎水其脈本沈者忽焉沈之烏有而反外出</p>	<p>人自悞乎風水黃汗等證脈之浮大且洪者豈亦主死</p>	<p>推愈廣愈求愈獲如水病脈出者死徒讀其文寧不悞</p>	<p>脈者精微之學也昌欲傳其精微而精微出於平淡愈</p>	<p>有脈可據矣虛者責之為正虛衛虛營虛經虛絡虛水</p>	<p>者責之為風為熱為腫為痛為氣強為發熱燥煩莫不</p>
------------------------	------------------------------	----------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

欽定四庫全書

醫門法律



脈浮表也汗出惡風表之虛也身重水客分肉也防  
已療風腫水腫通腠理黃芪溫分肉補衛虛白朮治  
皮風止汗甘草和藥益土生薑大棗辛甘發散腹痛  
者陰陽氣塞不得升降再加芍藥收陰

論金匱越婢湯方 本文云風水惡風一身悉腫脈浮

不渴續自汗出無大熱越婢湯主之 裏水者一身  
面目黃腫其脈沈小便不利故令病水假如小便自  
利此亡津液故令渴也越婢加朮湯主之前條風水

欽定四庫全書

醫門法律

續自汗出無大熱故用之設不汗出且大熱表法當  
不主此也後條裏水假如小便自利亡津而渴故用  
之不爾裏法當不主此也曰無大熱則有熱可知曰  
裏水乃軀壳之裏非臟腑之裏可知故俱得用越婢  
湯也

越婢湯者示微發表於不發之方也尚論傷寒太陽  
第三篇已詳之矣大率取其通調營衛和緩之性較  
女婢尤過之而命其名也蓋麻黃石膏二物一甘熱



一甘寒合而用之脾偏於陰則和以甘熱胃偏於陽則和以甘寒乃至風熱之陽水寒之陰凡不和於中土者悉得用之何者中土不和則水穀不化其精悍之氣以實榮衛榮衛虛則或寒或熱之氣皆得壅塞其隧道而不通於表裏所以在表之風水用之而在裏之水兼渴而小便自利者咸必用之無非欲其不害中土耳不害中土自足消患於方萌抑何待水土平成乎

欽定四庫全書

醫門法律

論金匱防已茯苓湯方 本文云皮水為病四肢腫水

氣在皮膚中四肢聶聶動者防已茯苓湯主之風水脈浮用防已黃芪湯矣而皮水即彷彿而用之前脈論中謂同一開鬼門而標中之本則微有分此方是也風水下鬱其土氣則用白朮崇土薑棗和中皮水內合於肺金鬱泄之水漬於皮以淡滲之故以茯苓易白朮加桂枝解肌以散水於外不用薑棗和之於中也况四肢聶聶風在營衛觸動經絡桂枝尤不可



少耶

論金匱麻黃附子湯杏子湯二方

本文云水之為病其脈沈小屬少陰浮者為風無水  
虛脹者為氣水發其汗即已脈沈者宜麻黃附子湯  
浮者宜杏子湯

此論少陰正水之病其脈自見沈小殊無外出之意  
若脈見浮者風發於外也無水虛脹者手太陰氣鬱  
不行也風氣之病發其汗則自己耳即脈沈無他證

欽定四庫全書

醫門法律

者當倣傷寒少陰例用麻黃附子甘草湯盪動其水  
以救腎若脈浮者其外證必自喘當倣傷寒太陽例  
用麻黃杏子甘草石膏湯發散其邪以救肺此治金  
水二藏之大法也

論黃芪芍藥桂枝苦酒湯桂枝加黃芪二方

本文云黃汗之為病身體腫發熱汗出而渴狀如風  
水汗沾衣色正黃如蘗汁脈自沈何從得之師曰以  
汗出入水中浴水從汗孔入得之宜黃芪芍藥桂枝酒湯主



之 黃汗之病兩足自冷假令發熱此屬歷節食已  
汗出又身常暮盜汗者此勞氣也若汗出已反發熱  
者久久其身必甲錯發熱不止者必生惡瘡若身重  
汗出已輒輕者久久必身暈暈即胞中痛又從腰以  
上必汗出下無汗腰臑弛痛如有物在皮膚中狀劇  
者不能食身疼重煩燥小便不利此為黃汗桂枝加  
黃芪湯主之

兩證大同小異前一證以汗出而衛氣不固外水入

欽定四庫全書

醫門法律

搏於營鬱而為熱熱盛則腫而發黃熱盛則耗其津  
液而作渴故以黃芪固護其衛以桂枝本方加苦酒  
引入營分散其水寒之邪但衛虛多汗不任發表故  
不用薑棗協助胃氣所恃者黃芪實衛之大力耳後  
一方用桂枝全方啜熱稀粥助其得汗加黃芪固衛  
以其發熱且兼自汗盜汗發熱故用桂枝多汗故加  
黃芪也其發汗已仍發熱邪去不盡勢必從表解之  
汗出輒輕身不重也久久身暈胸中痛又以過汗而





傷其衛外之陽並胸中之陽也腰以上有汗腰以下  
無汗陽通而陰不通上下痞隔更宜黃芪固陽桂枝  
通陰矣黃汗與歷節有分陽火獨壅於上為黃汗陰  
水獨積於下為兩脛冷陽火盛及肌肉則發熱陰水  
寒及筋骨則歷節痛源同而流不同也食已汗出者  
食入於所長之陽與勞氣相搏散出為汗乃至氣門  
不閉津液常泄暮為盜汗也甲錯者皮間枯澹如鱗  
甲錯出也發熱不已熱入肉腠必生惡瘡留結癰膿

欽定四庫全書

醫門法律

也腰臑弛痛如有物在皮中狀即內經痛痺逢寒則  
蟲之類也小便不利津液從汗越也不能食脾胃氣  
虛不能化穀也身體重衛氣不充分肉也煩燥胃熱  
上薰心肺也治黃汗之法盡發於此矣

論金匱桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯枳朮湯

本文云氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作桂  
枝去芍藥加麻黃附子湯主之 又云心下堅大如  
盤邊如旋杯水飲所作枳朮湯主之



心下胃之上也胃中陽氣不布心下乃為水飲之陰  
占據堅大如盤阻其上下出入之坦道祇從邊旁轉  
轉雖總一陽氣之權不伸所致然有陰陽二候陽氣  
虛而陰氣乘之結於心下必用桂枝湯去芍藥之走  
陰而加麻黃附子細辛共散胸中之水寒以少陰主  
內水寒上入即從少陰溫經散寒之法而施治也所  
以方下云當汗出如蟲行皮中即愈可見胃中之陽  
不布即胸中之陽亦虛胸中陽虛並衛外之陽亦不

欽定四庫全書

醫門法律

固故其汗出時如蟲行皮中尚顯陽氣滯濇之象設  
非桂麻細辛協附子之大力心下水寒能散走皮中  
乎水寒散斯重雲見睨而心下之堅大者豁然空矣  
此神治也其有陽邪自結於陽位陰寒未得上入者  
但用枳朮二味開其痰結健其脾胃而陽分之陽邪  
解之自易易耳

論海藏集仲景水氣例

海藏於治水腫一門務為致詳設為水氣問難求責



脈之有力無力藏沈府浮用藥大凡意在發明內經  
仲景其實渾是後人窠臼中無實得也其云高低內  
外輕重表裏隨經補瀉要當詳察肺胃腎三經病即  
瘥也此一語最為扼要然終未到家內經明謂三陰  
結謂之水三陰者太陰也足太陰脾手太陰肺氣結  
不行即成水病而水之源出自腎故少陰腎亦司之  
但當言肺脾腎不當言肺胃腎也何也胃不必言也  
胃本水穀之海五臟六腑之大源脾不能散胃之水

欽定四庫全書

醫門法律

精於肺而病於中肺不能通胃之水道於膀胱而病  
於上腎不能司胃之關門時其輸泄而病於下所以  
胃中積水浸淫無所底止耳海藏舉肺胃腎而遺脾  
於至理不過一間未達原不必議其治例仍以肺沈  
大腸浮心沈小腸浮為言此則相沿之陋也詎知臟  
腑各分浮沈而大小二腸不當從上焦分診耶至於  
所集仲景水氣例則未窺宮牆富美反多門外邪僻  
矣夫仲景論雜證於水氣一門極其精詳惟恐足



太陰脾之健運失職手太陰肺之治節不行足少陰  
腎之關門不開並其府膀胱之氣化不行所用方藥  
皆不蹈重虛之戒立於無過之地海藏集仲景治肺  
癰葶藶大棗瀉肺湯為例是欲以瀉肺之法為瀉水  
之法矣集仲景治傷寒痞連兩脇雜證支飲在脇之  
十棗湯為例是欲以瀉胸脇及膀胱為瀉水之法矣  
何其敢於操刃而藉口仲景耶不但此也抑且假托  
後人治水之峻藥本之仲景謂三花神祐丸即十棗

欽定四庫全書

醫門法律

湯加牽牛大黃輕粉除濕丹即神祐丸加乳香沒藥  
玄青丹又即神祐丸加黃連黃蘗青黛集仲景之方  
以傳會後人罪不容誅矣後人依樣葫蘆更改一味  
二味即成一方不傷脾即瀉肺不瀉肺即瀉膀胱乃  
致積水滔天載胥及溺絕無一人追悔從前用藥之  
咎正以繇來者非一日耳水病門中成方百道求一  
救肺氣之贖鬱而伸其治節之方無有也求一救膀  
胱阻絕而伸其氣化之方無有也節取數方發明備



用臨病自出生心化裁是所望矣

脹病論

喻昌曰脹病與水病非兩病也水氣積而不行必至於極脹脹病亦不外水裹氣結血凝而以治水諸法施之百中無一愈者失於師承無人罔施妄投耳今天下醫脈久斷醫學久荒即欲效司馬子長擔簦負笈遍訪於江淮汶泗而師資果安在乎昌於斯世無地可以著錐然而皇皇斯人不敢自外請一比類為後學商之仲景

欽定四庫全書

醫門法律

謂水病氣分心下堅大如盤邊如旋杯水飲所作然則脹病豈無血分腹中堅大如盤者乎多血少氣豈無左脇堅大如盤者乎多氣少血豈無右脇堅大如盤者乎故不病之人凡有癥瘕積塊痞塊即是脹病之根日積月累腹大如箕腹大如甕是名單腹脹不似水氣散於皮膚面目四肢也仲景所謂石水者正指此也胸中空曠氣食尚可從旁轉腹中大小腸膀胱逼處瘀濁占據水不下趨而泛溢無不至矣內經明脹病之旨而無



其治仲景微示其端而未立法然而比類推之其法不啻詳也仲景於氣分心下堅大如盤者兩出其方一方治陰氣結於心下用桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯一方治陽氣結於心下用枳朮湯夫胸中陽位尚分陰氣陽氣而異其治况腹中至陰之處而可不從陰獨治之乎陰氣包裹陰血陰氣不散陰血且不露可驅其血乎舍雄入九軍單刀取勝之附子更有何藥可散其陰氣破其堅壘乎推之兩脇皆然但分氣血陰結之微甚而水亦必從其類矣此等比類之法最上一乘非中材所幾和盤托出為引伸啟發之助

律七條

凡治水腫病不分風水皮水正水石水黃汗五證及脾肺腎三臟所主恣用驅水惡劣之藥及禹功舟車導水等定方者殺人之事也

凡治水腫病有當發汗散邪者不知兼實其衛致水隨汗越浸淫皮腠不復順趨水道醫之罪也

欽定四庫全書

醫門法律



凡治水腫病遇渴而下利之證誤利其水致津液隨竭  
中土坐困甚者脈代氣促瀕於死亡醫之罪也

凡治水腫病遇少腹素有積塊疝瘕誤行發表攻裏致  
其人濁氣上衝胸胃大嘔大逆痛引陰筋卒死無救  
者醫殺之也

凡治水腫黃汗證乃胃熱釀成痺水誤用熱藥轉增其  
熱貽患癰膿醫之罪也

凡治水腫病不察寸口脈之浮沈遲數弦緊微瀦以及  
欽定四庫全書

醫門法律

跌陽脈之浮數微遲緊伏則無從辨證用藥動罹凶  
禍醫之罪也

凡治脹病而用耗氣散氣瀉肺瀉膀胱諸藥者殺人之  
事也

治病用藥貴得其宜病有氣結而不散者當散其結  
甚有除下蕩滌而其氣之結尚未遽散者漸積使然  
也今脹病乃氣散而不收更散其氣豈欲直裂其腹  
乎收之不能遽收亦漸積使然緩緩圖成可也若求



快意一朝如草頭諸方明明立見殺人若輩全不悔  
禍輾轉以售奸吾不知其何等肺腸千劫不能出地  
獄矣

黃痺門

法十五條 律三條

經言溺黃赤安卧者痺病溺黃赤者熱之徵也安靜嗜  
卧者濕之徵也所以有開鬼門潔淨府之法開鬼門  
者從汗而泄其熱於肌表也潔淨府者從下而泄其  
濕於小便也此特辨名定治之大端而精微要渺惟

欽定四庫全書

醫門法律

金匱有獨昭焉要知外感發黃一證傷寒陽明篇中  
已悉金匱雖舉外感內傷諸黃一一發其底蘊其所  
重尤在內傷茲特詳加表章為後學法程焉

金匱論外感熱鬱於內而發黃之證云寸口脈浮而緩  
浮則為風緩則為痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃  
瘀熱以行其義取傷寒風濕相搏之變證為言見風  
性雖善行纔與濕相合其風即痺而不行但鬱為瘀  
熱而已及鬱之之極風性乃發風發遂挾其瘀熱以





行於四肢而四肢為之苦煩顯其風淫末疾之象挾其瘵熱以行於肌膚而肌膚為之色黃顯其濕淫外漬之象其脈以因風生熱故浮因濕成痺故緩此而行內經開鬼門潔淨府之法俾風挾之熱從肌表出濕蒸之黃從小便出而表裏分消為有據也

金匱重出傷寒陽明病不解後成穀瘵一證云陽明病脈遲者食難用飽飽則發煩頭眩小便必難此欲作穀瘵雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也此因外

欽定四庫全書

醫門法律

感陽明胃中之餘熱未除故食難用飽飽則食復生熱兩熱相合而發煩頭眩小便難腹滿勢所必至在陽明證本當下陽明而至腹滿尤當急下獨此一證下之腹滿必如故非但無益反增困耳以其脈遲而胃氣空虛津液不充其滿不過虛熱內壅非結熱當下之比金匱重出此條原有深意見脈遲胃虛下之既無益而開鬼門潔淨府之法用之無益不待言矣嘗憶一友問仲景云下之腹滿如故何不立一治法



余曰仲景必用和法先和其中後乃下之友曰何以  
知之余曰仲景云脈遲尚未可攻味一尚字其當攻  
之旨躍然金匱又云諸黃腹痛而嘔者用小柴胡湯  
觀此仍是治傷寒邪高痛下故使嘔也小柴胡湯主  
之之法是以知之耳陳無擇治穀瘵用穀芽枳實小  
柴胡湯差識此意但半消半和半下三法並用漫無  
先後較諸仲景之絲絲必貫相去遠矣

金匱又云跌陽脈緊而數數則為熱熱即消穀緊則為

欽定四庫全書

醫門法律

寒食即為滿尺脈浮為傷腎跌陽脈緊為傷脾風寒  
相搏食穀則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便  
不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名曰穀瘵此論  
內傷發黃直是開天闢地未有之奇東垣脾胃論仿  
彿什一後世樂宗金匱奧義置之不講殊可慨也請  
細陳之人身脾胃居於中土脾之土體陰而用則陽  
胃之土體陽而用則陰兩者和同則不剛不柔胃納  
穀食脾行穀氣通調水道灌注百脈相得益彰其用



大矣惟七情饑飽房勞過於內傷致令脾胃之陰陽  
不相協和胃偏於陽無脾陰以和之如造化之有夏  
無冬獨聚其熱而消穀脾偏於陰無胃陽以和之如  
造化之有冬無夏獨聚其寒而腹滿其人跌陽之脈  
繫寒數熱必有明徵診其或繫或數而知脾胃分主  
其病診其繫而且數而知脾胃合受其病法云精矣  
然更有精焉診其兩尺脈浮又知並傷其腎夫腎脈  
本沈也胡以反浮蓋腎藏精者也而精生於穀脾不

欽定四庫全書

醫門法律

運胃中穀氣入腎則精無裨而腎傷故沈脈反浮也  
知尺脈浮為傷腎則知跌陽脈繫即為傷脾然繫乃  
肝脈正仲景所謂繫乃弦狀若弓弦之義脾脈舒緩  
受肝木之尅賊則變繫肝之風氣乘脾聚之寒氣兩  
相搏激食穀即眩是穀入不能長氣於胃陽而反動  
風於脾陰即胃之聚其熱而消穀者亦不過蒸為腐  
敗之濁氣而非精華之清氣矣濁氣繇胃熱而下流入  
膀胱則膀胱受其熱氣化不行小便不通一身盡黃



濁氣由脾寒而下流入腎則腎被其寒而尅賊之餘其腹必滿矣究竟穀瘵由胃熱傷其膀胱者多由脾寒傷其腎者十中二三耳若飲食傷脾加以房勞傷腎其證必腹滿而難治矣仲景於女勞瘵下重申其義曰腹如水狀不治豈不深切著明乎

女勞瘵額上黑謂身黃加以額黑也黑為北方陰晦之色乃加於南方離明之位此必先有胃熱脾寒之濁氣下流入腎益以女勞無度而後成之其由來自非

欽定四庫全書

醫門法律

一日肘後謂因交接入水所致或有所驗然火炎薪燼額色轉黑雖不入水其能免乎故脾中之濁氣下趨入腎水土互顯之色但於黃中見黑滯耳若相火從水中上炎而合於心之君火其勢燎原烟燄之色先透於額乃至微汗亦隨火而出於額心之液且外亡矣手足心熱內傷皆然日暮陽明用事陽明主闔收斂一身之濕熱疾趨而下膀胱因而告急其小便自利大便黑時澹又是膀胱畜血之驗腹如水狀實



非水也正指畜血而言也故不治

酒瘴心中懊懣而熱不能食時欲吐酒為濕熱之最氣  
歸於心肺味歸於脾胃久積之熱不下行而上觸則  
生懊懣痞塞中焦則不能食其濕熱之氣不下行而  
上觸則為嘔嘔則勢轉橫逆遍漬周身也傷寒論謂  
陽明病無汗小便不利心中懊懣者身必發黃是知  
熱甚於內者皆足致此非獨酒矣

金匱治酒瘴用或吐或下之法云酒黃瘴必小便不利

欽定四庫全書

醫門法律

其候心中熱足下熱是其證也又云或酒無熱清言  
了了腹滿欲吐鼻煤其脈浮者先吐之沈弦者先下  
之又云心中熱欲吐者吐之愈又云心中懊懣或熱  
痛梔子大黃湯主之又云下之久久為黑瘴言雖錯  
出義實一貫蓋酒之積熱入膀胱則氣化不行必小  
便不利積於上焦則心中熱積於下焦則足下熱其  
無心中足下熱者則清言了了而神不昏但見腹滿  
欲吐鼻煤三證可知其膈上與腹中陰陽交病須分



先後治之當辨脈之浮沈以定吐下之先後脈浮病在膈上陽分居多先吐上焦而後治其中滿脈沈弦病在腹中陰分居多先下其中滿而後治其上焦若但心中熱欲嘔則病全在上焦吐之即愈何取下為哉其酒熱內結心神昏亂而作懊懷及痛楚者則不可不下但下法乃劫病之法不可久用久久下之必脾肺之陽氣盡傷不能統領其陰血其血有日趨於敗而變黑耳曾謂下法可瀆用乎仲景於一酒瘴臚

欽定四庫全書

醫門法律

列先後次第以盡其治其精而且詳若此

酒瘴之黑與女勞瘴之黑殊不相同女勞瘴之黑為腎氣所發酒瘴之黑乃榮血腐敗之色榮者水穀之精氣為濕熱所瘵而不行其光華之色轉為晦黯心胸嘈雜如噉蒜齏狀其芳甘之味變為酸辣乃至肌膚抓之不仁大便正黑脈見浮弱皆肺金節治之氣不行而血瘵也必復肺中清肅之氣乃可驅榮中瘵濁之血較女勞瘴之難治特一間耳方書但用白朮湯



理脾氣解酒熱以言治抑何庸陋之甚耶

黃瘴由於火土之熱濕若合於手陽明之燥金則熱濕燥三氣相搏成黃其人必渴而飲水有此則去濕熱藥中必加潤燥乃得三焦氣化行津液通渴解而黃退渴不解者燥有未除耳然非死候也何又云瘴而渴者難治則更慮其下泉之竭不獨云在中之津液矣

合論金匱桂枝黃芪湯小柴胡湯麻黃醇酒湯三方

欽定四庫全書

醫門法律

仲景治傷寒方首用麻黃湯為表法今觀金匱治黃瘴之用表主之以桂枝黃芪湯小柴胡湯附之以千金麻黃醇酒湯明示不欲發表之意故其方首云諸病黃家但利小便假令脈浮當以汗解之宜桂枝加黃芪湯可見大法當利小便必脈浮始可言表然瘴證之脈多有榮衛氣虛濕熱乘之而浮故用桂枝黃芪湯和其榮衛用小柴胡湯和其表裏但取和法為表法乃仲景之微旨也而表實發黃當汗之證豈曰無



之再取千金麻黃醇酒湯一方附入必不自出麻黃  
峻表之方背立法之本意又仲景之苦心也讀此而  
治病之機宛然心目矣

桂枝黃芪湯 表虛者必自汗汗雖出而邪不出

故用桂枝黃芪以實表然後可得驅邪之正汗

此義不可不知

小柴胡湯 邪正相擊在下則痛在上則嘔即傷

寒論邪高痛下之旨也故取用和表裏之法和

欽定四庫全書

醫門法律

其上下

千金麻黃醇酒湯 表有水寒入於榮血閉而不

散熱結為黃故賴麻黃顛力開結散邪加醇酒

以行之也

合論金匱大黃硝石湯梔子大黃湯茵陳蒿湯三方

濕熱鬱蒸而發黃其當從下奪亦須做治傷寒之法裏

熱者始可用之重則用大黃硝石湯蕩滌其濕熱如

大承氣湯之例稍輕則用梔子大黃湯清解而兼下





奪如三黃湯之例更輕則用茵陳蒿湯清解為君微  
加大黃為使如梔豉湯中加大黃如博碁子大之例  
是則汗法固不敢輕用下法亦在所慎施以瘴證多  
夾內傷不得回護之耳

大黃硝石湯 熱邪內結而成腹滿與傷寒當急  
攻下之證無異故以大黃硝石二物蕩邪開結  
然小便赤則膀胱之氣化亦熱又藉蘗皮梔子  
寒下之力以清解其熱也

欽定四庫全書

醫門法律

梔子大黃湯 此治酒熱內結昏惑懊懷之劑然  
傷寒證中有云陽明病無汗小便不利心中懊  
懷者身必發黃是則諸凡熱甚於內者皆足致  
此非獨酒也

茵陳蒿湯 此治穀瘴寒熱不能食之方然此由  
脾胃內鬱之熱外達肌膚與外感之寒熱少異  
熱壅於胃故不能食方中但治裏熱不解表邪  
從可識矣



論瓜蒂湯方 瓜蒂湯吐藥也邪在膈上淺而易及用此湯以吐去其黃水正內經因其高而越之之旨也然此亦仲景治傷寒之正方曷為治瘴證但附於後是亦不欲輕用之意矣

合論金匱小建中湯小半夏湯二方

黃瘴病為濕熱之所釀矣然有濕多熱少者有濕少熱多者有濕熱全無者不可不察也仲景慮瘴病多夾內傷故爾慎用汗吐下之法其用小建中湯則因

欽定四庫全書

醫門法律

男子發黃而小便自利是其裏無濕熱惟以入房數擾其陽致虛陽上泛為黃耳故不治其黃但和榮衛以收拾其陽聽其黃之自去即取傷寒邪少虛多心悸而煩合用建中之法以治之此其一端也又有小便本赤黃治之其色微減即當識其蘊熱原少或大便欲自利腹滿上氣喘急即當識其脾濕原盛或兼寒藥過當宜急用小半夏湯溫胃燥濕儻更除其熱則無熱可除胃寒起而呃逆矣此又一端也凡治濕



熱而不顧其人之虛寒者觀此二義能無悚惕耶

小建中湯 即桂枝湯倍芍藥加膠飴也男子數  
擾其陽致虛陽上泛為黃用此湯固護其衛則  
陽不能外越而芍藥之酸收其上泛之陽以下  
歸於陰甘草膠飴培其中土土厚則所收之陽  
不能復出此天然絕妙之方也然必小便自利  
證非濕熱者乃可用之不然寧不犯酒家用桂  
枝嘔家用建中之大禁乎

欽定四庫全書

醫門法律

小半夏湯 小便色小變而欲自利濕雖積而熱  
則微若其脾濕不行而滿脾濕動肺而喘此但  
當除濕不可除熱熱除則胃寒氣逆而噦矣凡  
遇濕多熱少之證俟其熱小除即用此以溫胃  
燥濕其治熱多濕少當反此推之

合論金匱猪膏髮煎茵陳五苓散二方

此治濕熱中重加燥證之方也燥者秋令也夏月火  
炎土燥無俟入秋濕土轉燥之證已多不可不察況



欽定四庫全書

醫門法律

與熱而俱除矣製方之妙夫豈思議之可幾哉

猪膏髮煎 肘後方云女勞瘵身目盡黃發熱惡

瘡少腹滿小便難以大熱大勞交接入水所致

者用此方又云五瘵身體四肢微腫胸滿不得

汗汗出如黃蘗汁由大汗出入水所致者猪脂

一味服其意以身內黃水因受外水遏抑而生

與仲景治血燥之意相遠惟傷寒類要云男子

女人黃瘵食飲不消胃脹熱生黃衣在胃中有



乾屎使然猪脂煎服下乃愈是則明指血燥言  
矣蓋女勞瘵血瘀膀胱非直入血分之藥必不  
能開仲景取用蛭蟲水蛭礬石無非此義然蛭  
蛭過峻不可以治女勞礬石過燥又不可以治  
女勞之燥故更立此方以濟之世之入多寶山  
而空手歸者可勝道哉

茵陳五苓散 濕熱鬱蒸於內必先燥其肺氣以

故小水不行五苓散開腠理致津液通血氣且

欽定四庫全書

醫門法律

有潤燥之功而合茵陳之辛涼清理肺燥肺金  
一潤其氣清肅下行膀胱之壅熱立通小便利  
而黃去矣

論金匱硝石礬石散方

此治女勞瘵之要方也原文云黃家日晡所發熱而  
反惡寒此為女勞得之膀胱急小腹滿身盡黃額上  
黑足下熱因作黑瘵其腹脹如水狀大便必黑時澹  
此女勞之病非水也腹滿者難治硝石礬石散主之



從來不解用硝石之義方書俱改為滑石礬石散方  
下謬云以小便出黃水為度且並改大黃硝石湯為  
為大黃礬石湯醫學之陋一至此乎夫男子血化為  
精精動則一身之血俱動以女勞而傾其精血必繼  
之故因女勞而尿血者其血尚行猶易治也因女勞  
而成瘕者血瘀不行為難治矣甚者血瘀之久大腹  
盡滿而成血蠱尤為極重而難治矣味仲景之文及  
製方之意女勞瘕非亟去其膀胱少腹之瘀血萬無

欽定四庫全書

醫門法律

生路在傷寒熱瘕膀胱之證其人下血乃愈血不下  
者用抵當湯下之亦因其血之暫結可峻攻也此女  
勞瘕畜積之血必匪朝夕峻攻無益但取石藥之悍  
得以疾趨而下達病所硝石鹹寒走血可消逐其熱  
瘕之血故以為君礬石本草謂其能除錮熱在骨髓  
用以清腎及膀胱臟腑之熱並建消瘕除濁之功此  
方之極妙極妙者也以陳無擇之賢模稜兩可其說  
謂無發熱惡寒脈滑者用此湯若發熱惡寒其脈浮



緊則以滑石石膏治之青天白日夢語喃喃況其他  
乎世豈有血畜下焦反見浮滑且緊之脈者乎妄矣  
妄矣

夏月天氣之熱與地氣之濕交蒸人受二氣內鬱不散  
發為黃瘧與龕醬無異必從外感汗下吐之法去其  
濕熱然夏月陽外陰內非如冬月傷寒人氣伏藏難  
動之比仲景慎用三法之意昌明之矣其穀瘧酒瘧  
女勞瘧則人自內傷與外感無涉仲景補內經之闕

欽定四庫全書

醫門法律

曲盡其微昌並明之矣至於陰瘧一證仲景之方論  
已亡千古之下惟羅謙甫茵陳附子乾薑甘草湯一  
方治用寒涼藥過當陽瘧變陰之證有合往轍此外  
無有也今人但云陽瘧色明陰瘧色晦此不過氣血  
之分辨之不清轉足誤人如酒瘧變黑女勞瘧額上  
黑豈以其黑遂謂陰瘧可用附子乾薑乎夫女勞瘧  
者真陽為血所壅閉尚未大損瘀血一行陽氣即通  
矣陰瘧則真陽衰微不振一任濕熱與濁氣敗血團



結不散必復其陽錮結始開倘非離照當空幽隱胡  
由畢達耶學者試於前卷方論中究心焉思過半矣

律三條

黃痺病得之外感者誤用補法是謂實實醫之罪也

黃痺病得之內傷者誤用攻法是謂虛虛醫之罪也

陰痺病誤從陽治襲用苦寒倒行逆施以致極重不返

者醫殺之也

陰痺無熱惡寒小便自利脈遲而微誤開鬼門則肌

欽定四庫全書

醫門法律

膚冷鞭自汗不止誤潔淨府則膀胱不約小便如奔

死期且在旦暮况於吐下之大謬乎即以平善之藥

遷延亦為待斃之術耳在半陰半陽之證其始必先

退陰復陽陰退乃從陽治若以附子黃連合用必且

有害奈何純陰無陽輒用苦寒耶

肺癰肺痿門

論一首  
律四條

法十三條

論曰肺癰肺痿之證誰秉內照曠然洞悉請以一得之

愚僭為敷陳人身之氣稟命於肺肺氣清肅則周身之





氣莫不服從而順行肺氣壅濁則周身之氣易致橫逆而犯上故肺癰者肺氣壅而不通也肺痿者肺氣委而不振也纔見久咳上氣先須防此兩證肺癰由五臟蘊崇之火與胃中停蓄之熱上乘乎肺肺受火熱熏灼即血為之凝血凝即痰為之裹遂成小癰所結之形日長則肺日脹而脅骨日昂迺至咳聲頻併濁痰如膠發熱畏寒日晡尤甚面紅鼻燥胸生甲錯始先即能辨其脈證屬表屬裏極力開提攻下無不愈者奈何醫學無傳

欽定四庫全書

醫門法律

爾我形骸視等隔垣但知見效治效或用牛黃犀角糞以解熱或用膏子油粘糞以潤燥或朝進補陰丸或夜服清胃散千蹊萬徑無往非殺人之算病者亦自以為虛勞尸瘵莫可奈何迨至血化為膿肺葉朽壞傾囊吐出始識其證十死不救嗟無及矣間有癰小氣壯胃強善食其膿不從口出或順趣肛門或旁穿脅肋仍可得生然不過十中二三耳金匱治法最精用力全在未成膿之先今人施於既成膿之後其有濟乎肺痿者其積



漸已非一日其寒熱不止一端總由胃中津液不輸於肺肺失所養轉枯轉燥然後成之蓋肺金之生水精華四布者全藉胃土津液之富上供罔缺但胃中津液暗傷之竇最多醫者粗豪不知愛護或腠理素疎無故而大發其汗或中氣素餒頻吐以倒傾其囊或瘵成消中飲水而渴不解泉竭自中或腸枯便秘強利以求其快漏卮難繼只此上供之津液坐耗岐途於是肺火日熾肺熱日深肺中小管日窒咳聲以漸不揚胸中脂膜日

欽定四庫全書

醫門法律

乾咳痰難於上出行動數武氣即喘鳴沖擊連聲痰始一應金匱治法非不彰明然混在肺癰一門况難解其精意大要緩而圖之生胃津潤肺燥下逆氣開積痰止濁唾補真氣以通肺之小管散火熱以復肺之清肅如半身痿廢及手足痿軟治之得法亦能復起雖云肺病近在胸中呼吸所關可不置力乎肺癰屬在有形之血血結宜驟攻肺痿屬在無形之氣氣傷宜徐理肺癰為實誤以肺痿治之是謂實實肺痿為虛誤以肺癰治之



是為虛虛此辨證用藥之大畧也

金匱論肺癰肺痿之脈云寸口脈數其人咳口中反有濁唾涎沫者為肺痿之病若口中辟辟燥咳即胸中隱隱痛脈反滑數此為肺癰咳唾膿血脈數虛者為肺痿數實者為肺癰

兩手寸口之脈原為手太陰肺脈此云寸口脈數云滑數云數虛數實皆指左右三部統言非如氣口獨主右關之上也其人咳口中反有濁唾涎沫頃之遍

欽定四庫全書

醫門法律

地者為肺痿言欬而口中不乾燥也若咳而口中辟辟燥則是肺已結癰火熱之毒出現於口咳聲上下觸動其癰胸中即隱隱而痛其脈必見滑數有力正邪氣方盛之徵也數虛數實之脈以之分別肺痿肺癰是則肺痿當補肺癰當瀉隱然言表

金匱論肺癰又云寸口脈微而數微則為風數則為熱微則汗出數則畏寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則咳口乾



喘滿燥不渴時唾濁沫時時振寒熱之所過血為之凝  
滯畜結癰膿吐如米粥始萌可救膿成則死

肺癰之脈既云滑數此復云微數者非脈之有不同  
也滑數者已成之脈微數者初起之因也初起以左  
右三部脈微知其衛中於風而自汗左右三部脈數  
知為榮吸其熱而畏寒然風初入衛尚隨呼氣而出  
不能深入所傷者不過在於皮毛皮毛者肺之合也  
風由所合以漸舍肺俞而咳唾振寒茲時從外入者

欽定四庫全書

醫門法律

從外出之易易也若夫熱過於榮即隨吸氣深入不  
出而傷其血脈矣衛中之風得榮中之熱留戀固結  
於肺葉之間乃致血為凝滯以漸結為癰膿是則有  
形之敗濁必從瀉肺之法而下驅之若得其毒隨驅  
下移入胃入腹入腸再一驅即盡去不留矣安在始  
萌不救聽其膿成而致肺葉腐敗耶

金匱於二證用徹土繆綢之法治之於蚤然先從脈辨  
其數虛數實次從口辨其吐沫乾燥然更出一捷要之



法謂咳嗽之初即見上氣喘急者乃外受風寒所致其脈必浮宜從越婢加半夏之法及小青龍加石膏之法亟為表散不爾即是肺癰肺痿之始基故以咳嗽上氣病證同敘於肺癰肺痿之下而另立痰飲咳嗽本門原有深意見咳而至於上氣即是肺中壅塞逼迫難安尚何等待不急散邪下氣以清其肺乎然亦分表裏虛實為治不當誤施轉增其困矣

金匱云上氣面浮腫有息其脈浮大不治又加利尤甚

欽定四庫全書

醫門法律

又云上氣喘而燥者屬肺脹欲作風水發汗則愈

上氣之候至於面目浮腫鼻有息音是其肺氣壅逼上而不下加以其脈浮大氣方外出無法可令內還而下趨故云不治也加利則上下交爭更何以堪之肺脹而發其汗者即內經開鬼門之法一汗而令風邪先泄於肌表水無風戰自順趨而從下出也若夫面目浮腫鼻有息音其痿全在氣逆氣可外泄乎况乎逆上者未已可盡泄乎外不可泄而內又不能返



故云不治良工苦心以漸收攝其氣順從膀胱之化  
尚可得生故知不治二字原活初非以死限之矣  
論金匱甘草乾薑湯 法云肺痿吐涎沫而不咳者其  
人不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下  
故也此為肺中冷必眩多涎唾用甘草乾薑湯以溫  
之若服湯已渴者屬消渴

肺熱則膀胱之氣化亦熱小便必赤澁而不能多若  
肺痿之後但吐涎沫而不咳復不渴反遺尿而小便

欽定四庫全書

醫門法律

數者何其與本病相反耶必其人上虛不能制下以  
故小便無所收攝耳此為肺中冷陰氣上巔侮其陽  
氣故必眩陰寒之氣凝滯津液故多涎唾若始先不  
渴服溫藥即轉渴者明是消渴飲一澉二之證消渴  
又與癰疽同類更當消息之矣

論金匱射干麻黃湯 厚朴麻黃湯 二方

法云欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之

咳而脈浮者厚朴麻黃湯主之



上氣而作水雞聲乃是痰礙其氣氣觸其痰風寒入肺之一驗耳發表下氣潤燥開痰四法萃於一方用以分解其邪不使之合此因證定藥之一法也若咳而其脈亦浮則外邪居多全以外散為主用法即於小青龍湯中去桂枝芍藥甘草加厚朴石膏小麥仍從肺病起見以故桂枝之熱芍藥之收甘草之緩概示不用而加厚朴以下氣石膏以清熱小麥引入胃中助其升發之氣一舉而表解脈和於以置力於本病然後破竹之勢可成耳一經裁酌直若使小青龍載肺病騰空而去神哉快哉

欽定四庫全書

醫門法律

論金匱澤漆湯 法云咳而脈沈者澤漆湯主之

脈浮為在表脈沈為在裏表裏二字與傷寒之表裏大殊表者邪在衛即肺之表也裏者邪在榮即肺之裏也熱過於榮吸而不出其血必結血結則痰氣必為外裏故用澤漆之破血為君加入開痰下氣清熱和榮諸藥俾堅壘一空元氣不損製方之意若此



論金匱皂莢丸 法云咳逆上氣時時唾濁坐不得眠  
皂莢丸主之

火熱之毒結聚於肺表之裏之清之溫之曾不少應  
堅而不可攻者又用此丸豆大三粒朝三服暮一服  
吞適病所如棘針徧刺四面環攻如是多日庶幾無  
堅不入聿成蕩洗之功不可以藥之微賤而少之也  
胸中手不可及即謂為代針丸可矣

論金匱麥門冬湯 法云火逆上氣咽喉不利止逆下

欽定四庫全書

醫門法律

氣者麥門冬湯主之

此胃中津液乾枯虛火上炎之證治本之良法也夫  
用降火之藥而火反升用寒涼之藥而熱轉熾者徒  
知與火熱相爭未思及必不可得之數不惟無益而  
反害之凡肺病有胃氣則生無胃氣則死胃氣者肺  
之母氣也本草有知母之名者謂肺藉其清涼知清  
涼為肺之母也有貝母之名者謂肺藉其豁痰寶豁  
痰為肺之母也然屢施於火逆上氣咽喉不利之證





而屢不應名不稱矣孰知仲景有此妙法於麥冬人參甘草粳米大棗大補中氣大生津液隊中增入半夏之辛溫一味其利咽下氣非半夏之功實善用半夏之功擅古今未有之奇矣

論金匱桔梗湯 法云效而胸滿振寒咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰桔梗湯主之此上提之法也癰結肺中乘其新造未固提而出之所提之敗血或從唾出或從便出而可愈與滋蔓難

欽定四庫全書

醫門法律

圖膿成自潰之死證迥殊膿未成時多服此種亦足以殺其毒勢而堅者漸取壅者漸通也然用藥必須有因此因胸滿振寒不渴病不在裏而在表用此開提其肺氣適為恰當如其勢已入裏又當引之從胃入腸此法殊不中用矣

論金匱葶藶大棗瀉肺湯 法云肺癰不得卧葶藶大棗瀉肺湯主之 附方云肺癰胸滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香鼻酸辛效逆上氣喘鳴迫塞



葶藶大棗瀉肺湯主之三日一服可服至三四劑先服小青龍湯一劑乃進

此治肺癰喫緊之方也肺中生癰不瀉其肺更欲何待然日久癰膿已成瀉之無益日久肺氣已索瀉之轉傷惟血結而膿未成當亟以瀉肺之法奪之亦必其人表證盡入於裏因勢利導乃可為功所附之方項下純是表證何其甘悖仲景而不辭然亦具有高識遠意必因其裏證不能少待不得不用之耳其云

欽定四庫全書

醫門法律

先服小青龍湯一劑乃進情可識矣論其常則當升散開提者且未可下奪論其急則當下奪者徒牽制於其外反昧膿成則死之大戒安得以彼易此哉

論金匱越婢加半夏湯 小青龍加石膏湯 二方

法云欬而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脈浮大者越婢加半夏湯主之又云肺脹欬而上氣煩燥而喘脈浮者心下有水小青龍加石膏主之

前一方麻黃湯中以杏仁易石膏而加薑棗則發散



之力微而且緩後一方中以證兼煩燥宜發其汗麻  
桂藥中加入石膏其力轉猛然監以芍藥五味子乾  
薑其勢下趨水道亦不至過汗也越婢方中有石膏  
無半夏小青龍方中有半夏無石膏觀二方所加之  
意全重石膏半夏二物協力建功石膏清熱藉辛溫  
亦能豁痰半夏豁痰藉辛涼亦能清熱不然石膏可  
無慮半夏在所禁矣前麥門冬方中下氣止逆全藉  
半夏入生津藥中此二方又藉半夏入清熱藥中仲

欽定四庫全書

醫門法律

景加減成方無非生心化裁後學所當神往矣

再論肺痿肺癰之病皆燥病也肺稟清肅之令乃金  
寒水冷之臟火熱熏灼久久失其清肅而變為燥肺  
中生癰其津液全裹其癰不溢於口故口中辟辟然  
乾燥肺熱成痿則津液之上供者悉從燥熱化為涎  
沫濁唾證多不渴較胃中津液盡傷母病累子之痿  
又大不同祇是津液之上輸者變為唾沫肺不霑其  
惠澤耳若夫痿病津液不能滅火反從火化累年積



歲肺葉之間釀成一大火聚以清涼投之扞格不入  
矣然雖扞格固無害也設以燥熱投之以火濟火其  
人有不坐斃者乎半夏燥藥也投入肺中轉增其患  
自不待言但清涼既不能入惟燥與燥相得乃能入  
之故用半夏之燥入清涼生津藥中則不但不燥轉  
足開燥其濁沫隨逆氣下趨久久津液之上輸者不  
結為涎沫而肺得霑其漬潤痿斯起矣人但知半夏  
能燥津液孰知善用之即能驅所燥之津液乎此精  
蘊也

欽定四庫全書

醫門法律

附方 六方係孫奇輩採附金匱者論具本方之下

外臺炙甘草湯治肺痿涎唾多心中溫溫液液者

千金甘草湯

千金生薑甘草湯治肺痿咳涎沫不止咽燥而渴

千金桂枝去芍藥加皂莢湯治肺痿吐涎沫

外臺桔梗白散治欬而胸滿振寒脈數咽喉不渴時

出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰



千金葦莖湯治效有微熱煩滿胸中甲錯為肺癰  
律十條

凡虛勞病畏寒發熱者衛虛則畏寒營虛則發熱耳當  
緩調其營衛俾不相亢戰則寒熱自止若以外感少  
陽經主寒熱用小柴胡湯治之乃至汗多而衛傷於  
外便澹而營傷於內寒熱轉加醫之罪也

凡虛勞病多有發熱者須辨其因之內外脈之陰陽時  
之早晚而定其治若通套退熱之藥與病即不相當  
是謂誅伐無過邪反不服乃至熱久血乾津竭十死  
不救醫之罪也

欽定四庫全書

醫門法律

凡虛勞病多有奪血而無汗者若認為陽實而責其汗  
必動其血是名下厥上竭醫殺之也

凡虛勞病最防脾氣下溜若過用寒涼致其人清穀者  
醫之罪也

凡治骨蒸發熱熱深在裏一切輕揚之藥禁不可用用  
之反引熱勢外出而增其熾灼乾津液肌肉枯槁四



出求其止在內裏時蒸時退且不可得安望除熱止  
病乎醫之罪也

凡治癆瘵發熱乘其初成胃氣尚可勝藥急以峻劑加  
入人參導血開囊退熱行瘀全生保命所關甚大遲  
則其人胃虛氣餒羸瘠不堪即醫良法妙亦何為哉  
此非醫罪繩趨尺步昧於行權隱忍不言欲圖僥倖  
反為罪也

凡治小兒五疳即大人五勞也幼科知用五疳之成方

欽定四庫全書

醫門法律

而不知五勞曲折次第初起者治之可以得效胃虛  
者服之有死而已蓋膽草蘆薈宣胡黃連極苦大寒  
兒不能勝耳大方亦然謂五藏有虛勞實勞恣用苦  
寒罪莫逃也

婦女癆瘵十中二三衝為血海瘀積不行乃至血乾經  
斷骨蒸潮熱夜夢鬼交宜急導其血加人參以行之  
程功旦夕可也若以丸藥緩治王道緩圖坐以待斃  
醫之罪也



嘗富後貧名曰脫營嘗貴後賤名曰失精脫營失精非  
病關格即病虛勞宜以漸治其氣之結血之凝乃至  
流動克滿程功千日可也醫不知此用補用清總不  
合法身輕骨瘦精神其能久居乎此非醫罪遷延貽  
誤薄乎云爾

婦人遭其夫離絕菀結不解亦多成關格虛勞二候此  
與二陽之病發心肺大同月事時下知未甚也亦如  
前法程功百日氣血流行可無患也不月者亦須程  
功千日從事空王消除積恨可也此亦非醫罪但以  
其勢緩而姑任之不蚤令其更求良治遷延圖利心  
孽難除耳

欽定四庫全書

醫門法律

醫門法律卷十二

