本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書 子部

備急千金要方 目錄 卷一

詳校官太醫院吏目臣朱桂
編修臣倉聖脈履勘

總校官中書臣朱　鈐
校對官中書臣胡紹基
校對官庶吉士臣嚴　福
謄錄舉人臣汪師曾
謄錄監生臣蔣錦城

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

千金要方

提要

臣等謹案千金要方九十三卷唐孫思邈撰唐書隱逸傳稱其少時周洛州刺史獨孤信稱為聖童及長隱居太白山隋文帝輔政以國子博士徵不起則思邈生於周朝入隋已長然盧照鄰病梨樹賦序稱癸酉歲於長安見思邈自云開皇辛酉歲生今年九十二則思邈生於隋朝照鄰乃思邈之弟子記其師言必不妄惟以隋書考之開皇紀號凡二十年止于庚申次年辛酉已改元仁壽與史殊不相符又由唐高宗咸亨四年癸酉上推九十二年為開皇二年壬寅實非辛酉干支亦不相應然自癸酉上推九十三年正得開皇元年辛丑蓋照鄰集傳寫訛異

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以辛丑為辛酉以九十三為九十二也史又稱思邈卒于永淳元年年百餘歲自是年上推至開皇辛丑正一百二年數亦相合則生于後周隱居不仕之說為史誤審矣思邈嘗謂人命至重貴于千金一方濟之德踰于此故所著方書以千金名凡診治之訣針灸之法以至導引養生之術無不周悉猶慮有遺缺更撰翼方輔之攷晁陳諸家著録載千金方各三十卷錢曾讀書敏求記所載卷數亦同又謂宋仁宗命高保衡林億等校正刊行後列禁経二卷合二書計之止六十二卷此本增多三十一卷疑後人併為一書而離析其卷帙葉夢得避暑録話稱思邈作千金前方時已百餘歲妙盡古今方書之要獨傷寒未之盡似未盡通仲景之言故不敢深論後三十年 案百餘歲及後三十年之説皆因仍舊誤今姑仍原

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

之本錄作千金翼論傷寒者居半蓋始得之其用志精審不苟如此云云則二書本相因而作亦相濟為用合之亦未害宏旨也太平廣記載思邈曾救昆明池龍得龍宮仙方三十首散入千金方各卷之中蓋小説家附會之談固無足深辨焉乾隆四十八年二月恭校

上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:15
列印頁數：4
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書
備急千金要方目録
卷一
醫學諸論
卷二
婦人方
卷三
婦人方
卷四
婦人方
卷五
婦人方
卷六
婦人方
卷七
婦人方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

卷八
少小嬰孺方
卷九
少小嬰孺方
卷十
少小嬰孺方
卷十一
少小嬰孺方
卷十二
少小嬰孺方
卷十三
少小嬰孺方
卷十四
少小嬰孺方
卷十五
少小嬰孺方
七竅病方

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:16
列印頁數：6
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

卷十六 七竅病方
卷十七 七竅病方
卷十八 七竅病方
卷十九 七竅病方
卷二十 七竅病方
卷二十一 七竅病方
卷二十二 風毒脚氣方
卷二十三 風毒脚氣方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

卷二十四
風毒脚氣方
卷二十五
諸風方
卷二十六
諸風方
卷二十七
諸風方
卷二十八
諸風方
卷二十九
傷寒方
卷三十
傷寒方
卷三十一
傷寒方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

卷三十二 傷寒方
卷三十三 傷寒方
卷三十四 傷寒方
卷三十五 傷寒方
卷三十六 肝臟方
卷三十七 肝臟方
卷三十八 膽腑方
卷三十九 膽腑方

備急千金要方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

卷四十
心臟方
心臟方
卷四十一
心臟方
卷四十二
卷四十三
小腸腑方
卷四十四
小腸腑方
卷四十五
小腸腑方
卷四十六
脾臟方
卷四十七
脾臟方

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:17
列印頁數：10
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

卷四十八 脾臟方
卷四十九 脾臟方
卷五十 脾臟方
卷五十一 脾臟方
卷五十二 脾臟方
卷五十三 胃腑方
卷五十四 胃腑方
卷五十五 肺臟方
卷五十六 肺臟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

卷五十六 肺臟方
卷五十七 大腸腑方
卷五十八 大腸腑方
卷五十九 腎臟方
卷六十 腎臟方
卷六十一 膀胱腑方
卷六十二 膀胱腑方
卷六十三 消渴方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

卷六十四
消渴方
卷六十五
丁腫方
卷六十六
丁腫方
卷六十七
丁腫方
卷六十八
丁腫方
卷六十九
疿漏方
卷七十
疿漏方
卷七十一
疿漏方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

卷七十二 解毒雜治方
卷七十三 解毒雜治方
卷七十四 解毒雜治方
卷七十五 解毒雜治方
卷七十六 備急方
卷七十七 備急方
卷七十八 備急方
卷七十九 備急方
食治

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:19
列印頁數：14
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

卷八十
食治
卷八十一
養性
卷八十二
養性
卷八十三
養性
卷八十四
養性
卷八十五
平脉
卷八十六
平脉
卷八十七
平脉
卷八十八
針灸

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:19
列印頁數：15
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

卷八十八 針灸
卷八十九 針灸
卷九十 針灸
卷九十一 針灸
卷九十二 針灸
卷九十三 針灸

備急千金要方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

備急千金要方序

昔神農偏嘗百藥以辨五苦六辛之味逮伊摯而湯液之劑備黄帝欲創九針以治三陰三陽之疾得岐伯而砭艾之法精雖大聖人有意于拯民之瘼必待賢明博通之臣或為之先或為之後然後聖人之所為得行于永久也醫家之務經是二聖二賢而能事畢矣後之留意于方術者苟知藥而不知灸未足以盡治療之體知灸而不知針未足以極表裏之變如能兼是聖賢之蘊者其名醫之良乎有唐真人孫思邈者乃其人也以上智之材抱康時之志當太宗治平之際思所以佐迺后庇民之事以謂上醫之道真聖人之政而王官之一守也而乃祖述農黄之旨發明岐摯之學經掇扁鵲之難方採倉公之禁仲景黄素元化緑帙葛仙翁之必效胡居士之經驗張苗之藥對叔和之脉法皇甫謐之三部陶隱居之百一自餘郭玉范汪僧垣阮炳上極文字之初下訖有隋之世或經或方無不採摭集諸家之所祕

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

要去衆說之所未至成書一部總三十卷目録一通臟腑之論針艾之法脉證之辨食治之宜始婦人而次嬰孺先脚氣而後中風傷寒癰疽消渴水腫七竅之病五石之毒備急之方養性之術總篇二百三十二門合方論五千三百首莫不十全可驗四種兼包厚德過於千金遺法傳於百代使二聖二賢之美不墜于地而世之人得以階近而至遠上識于三皇之奥者孫真人善述之功也然以俗尚險怪我道純正不述劒腹易心之異世務徑省我書浩博不可道聽塗說而知是以學寡其人寖以紛靡賢不繼世簡編斷缺不知者以異端見黜好之者以闕疑輟功恭惟我朝以好生為德以廣愛為仁迺詔儒臣正是墜學臣等術謝多通職專典校於是請内府之祕書探道藏之別録公私衆本搜訪幾遍得以正其訛謬補其遺佚文之重複者削之事之不倫者緝之編次類聚暮月功至綱領雖有所立文義猶或疑阻是用端本以正末如素問九墟靈樞甲乙太素巢源

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

諸家本草前古脉書金匱玉函肘後備急謝士秦刪繁方劉涓子鬼遺論之類事關所出無不研核尚有所闕而又泝流以討源如五鑒經千金翼崔氏纂要延年祕録正元廣利外臺秘要兵部手集夢得傳信之類凡所派別無不考理互相質正反覆稽參然後遺文疑義煥然悉明書雖是舊用之惟新可以濟舍靈裨明聖好生之治可以傳不朽副主上廣愛之心非徒為太平之文致實可佐皇極之錫福校讎既成繕寫伊始恭以上進

庶備親覽

太子右贊善大夫臣高保衡尚書都官員外郎臣孫奇

尚書司封郎中充祕閣校理臣林億尚書工部侍郎兼侍講臣錢象先等謹上

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

本序

夫清濁剖判上下攸分三才肇基五行俶落萬物淳朴無得而稱燧人氏出觀斗極以定方名始有火化伏羲氏作因之而畫八卦立庖厨滋味既興痾瘵萌起大聖神農氏愍黎元之多疾遂嘗百藥以救療之猶未盡善黄帝受命創制九針與方士岐伯雷公之倫備論經脉旁通問難詳究義理以為經論故後世可得依而暢焉春秋之際良醫和緩六國之時則有扁鵲漢有仲景倉公魏有華佗並皆探賾索隱窮幽洞微用藥不過二三灸炷不逾七八而疾無不愈者晉宋以來雖復名醫間出然治十不能愈五六良由今人嗜慾太甚立心不常嫚放縱逸有闕攝養所致耳余緬尋聖人設教欲使家家自學人人自曉君親有疾不能療之者非忠孝也末俗小人多行詭詐倚傍聖教而為欺紿遂令朝野士庶咸恥醫術之名多教子弟誦短文構小策以求出身之道醫治之術闕而弗論吁可怪也嗟乎深乖聖賢之本

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

意吾幼遭風冷屢造醫門湯藥之資罄盡家産所以青衿之歲高尚茲典白首之年未嘗釋卷至於切脉診候採藥合和服餌節度將息避慎一事長於已者不遠千里伏膺取決至於弱冠頗覺有悟是以親鄰中外有疾厄者多所濟益在身之患斷絶醫門故知方藥本草不可不學吾見諸方部帙浩博忽遇倉卒求檢至難比得方訖疾已不救矣嗚呼痛夭枉之幽厄惜墮學之昏愚乃博採羣經刪裁繁重務在簡易以為備急千金要方一部凡三十卷雖不能究盡病源但使留意於斯者亦思過半矣以為人命至重有貴千金一方濟之德踰于此故以為名也未可傳於士族庶以貽厥私門張仲景曰當今居世之士曾不留神醫藥精究方術上以療君親之疾下以救貧賤之厄中以保身長全以養其生而但競逐榮勢企踵權豪孜孜汲汲惟名利是務崇飾其末而忽棄其本欲華其表而悴其内皮之不存毛將安傅進不能愛人知物退不能愛躬知已卒遇風邪之氣

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

嬰非常之疾患及禍至而後震慄身居死地蒙蒙昧昧
懃若遊魂降志屈節欽望巫祝告窮歸天束手受敗齎
百年之壽命將至貴之重器委付庸醫恣其所措咄嗟
暗悔歎身已斃神明消滅變為異物幽潛重泉徒為一
悲痛夫舉世昏迷莫能覺悟自盲若是夫何榮勢之云
哉此之謂也

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:22
列印頁數：22
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

備急千金要方凡例

千金方舊有例數十條散在諸篇凡用一法皆宜徧知之雖素熟其書者臨事尚慮有所遺失況倉卒遘疾按證為治不能無未達之惑及新加撰次不可無法今撮集舊凡并新校之意為例一篇次於今序之末庶後之施用者無凝滯焉

凡和劑之法有斤兩升合尺寸之數合湯藥者不可不知按吳有複秤單秤隋有大升小升此制雖復紛紜正惟求之太深不知其要耳陶隱居撰本草序録一用累黍之法神農舊秤為定孫思邈從而用之孫氏生於隋末終于唐永淳中蓋見隋志唐令之法矣則今之此書當用三兩為一兩三升為一升之制世之妄者乃謂古今之人大小有異所以古人服藥劑多無稽之言莫此為甚今之用藥定以三兩為今一兩三升為今一升方中雖時復有用尺寸處舊例已有準折斤兩法今則不復重述也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凡古方治疾全用湯法百千之中未有一用散者今世醫工湯散未辨宜其多說異端承疑傳謬按湯法�△咀（為如麻豆各切）散法治篩（為濤篩治擇）卒病賊邪須湯以蕩滌長病痼疾須散以漸漬此古人用湯液煮散之意也後世醫工惟務力省一切為散遂忘湯法傳用既久不知其非一旦用湯妄生疑訝殊不知前世湯藥劑料雖簿而數藥競進每藥數服以古較今豈不今雖大而日飲不過三數服而且方用專一今人治病反多乎又昔人長將藥者多作煮散法蓋取其積日之功故每用一方寸匕為一服多不過三方寸匕然而須以帛裹煮時微微振動是古人之意豈須欲多服藥哉又服丸之法大率如梧子者二十丸多不過三十四十丸及服散者少則刀圭錢五匕多則方寸匕而已豈服湯特多煮散丸散則少乎是知世人既不知湯液煮散之法今從舊例率定以藥二十古兩水一小斗煮取今一升五合去

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

淖塗分三服自餘利湯欲少水而多取數補湯欲多水而少取數各依方下別法

凡古經方用藥所有炙煉節度皆脚注之今方則不然撮合諸家之法而為合和一篇更不于方下各注各注則徒煩而不備集出則詳審而不煩凡合和者於第一卷檢之常用烏頭止言炮製此物大毒難循舊制當依治歷節防已湯云凡用烏頭皆去皮熬令黑乃堪用不然至毒人特宜慎之又桂本畏火所不可近若婦人妊娠又慮動胎當依惡阻篇茯苓丸方云妊娠忌桂故熬後用之又方中用大黄者當依治癰疽地黄丸方云薄切五升米下蒸熟曝乾用之凡諸方用藥多出神農本經但古今不同詳略或異施於達者不假縷陳與衆共之事須詮詔古文從簡則菜萸渾於山吳門冬隱於天麥椒不判于秦蜀荆罔分于牡蔓今則檢從本草各以一二而詳之又近世用藥相承其謬若不辨正為損滋多求真珠者罕知

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

朱砂之為末多以水銀朱充用擇通草者鮮知木通之別號皆以通脫木為名以杜蘅而當細辛用黃耆而得苜蓿白蒺藜蒺藜之偽以刺者為良青木香木香之佳以土者為惡桂心蓋取其枝中之肉狗脊何元無二條檳榔大腹古昔用之無別枳實枳殼後世尚乎金色之毛山梔子梔子本為一物訶梨勒訶子曲生異端蚱蟬以聲而命名用啞者則顯知其謬胡麻以國而為號以烏者正得其真天南星虎掌名異而實同茵蔯蒿茵蔯名同而實異斯實藥家之消息為醫者可不留心又如白朮一物古書惟只言朮近代醫家咸以朮為蒼朮今則加以白字庶乎臨用無惑矣

凡諸方中用藥間復有不出本草舊經者咸名醫垂記或累世傳良或博聞有驗或自用得力故孫氏不得而棄之傳之方來豈小補哉

凡古名賢治病多用生命以濟災急雖曰賤畜貴人至

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:24
列印頁數：26
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

於愛命人畜一也損彼益已物情同患況於人乎夫殺生求生去生更遠今之此方所以不用生命物為藥也其蚩蟲水蛭輩市有先死者可市而用之不在此例又云用雞子者皆取先破者用之完者無力

凡古今病名率多不同緩急尋檢常致疑阻若不判別何以示衆且如世人呼陰毒傷寒最為劇病嘗深摭其由然口稱陰毒之名意指少陰之證病實陰陽之候命一疾而涉三病以此為治豈不遠而殊不知陰毒少陰陰陽自是三候為治全別古有方證其說甚明今而混淆害人最急又如腸風藏毒欬逆慢驚遍稽方論無此名稱深窮其狀腸風乃腸痔下血藏毒欬逆慢驚者陰癇之病若乃痢之蠱毒欬逆者噦逆之名慢驚者陰癇之病若不知古知今何以為人司命加以古之經方言多雅奧以利為滯下以屬為腳氣以淋為癃以實為祕以天行為傷寒以白虎為歷節以膈氣為膏肓以喘嗽為痙以不語為癒以緩縱為痱以怔

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

忪為悸以痰為飲以黃為癉諸如此論可不討論而
況病有數候相類二病同名者哉宜其視傷寒中風
熱病溫疫通曰傷寒膚脹鼓脹腸覃石癖率為水氣
療中風專用乎痰藥指滯下或以為勞疾伏梁不辨
乎風根中風不分乎時疾此今天下醫者之公患也
是以別白而言之
凡方後舊有禁忌法或有或無或詳或略全無類例今
則集諸藥反惡畏忌及諸雜忌為一篇凡服餌者於
第一卷檢之
凡下丸散不云酒水飲者本方如此而別說用酒水飲
則是可通用三物服也
凡諸方論咸出前古諸家及唐代名醫加減為用而各
有效今則遍尋諸家有增損不同者各顯注于方下
庶後人用之左右逢其原也
凡諸卷有一篇治數病者今則各以類次仍於卷首目
下注云某病附焉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凡諸方與篇題各不相符者卒急之際難于尋檢今則改其詮次庶幾歷然易曉

凡諸方有一方數篇重出主治不殊者則去之各有治療者則云方見某卷某篇

凡諸篇類例之體則論居首脉次之大方在前單方次之針灸法處末焉緩急檢尋繁而不雜也

婦人卷中有虛損一篇補益一篇事涉相類詳而察之亦自有條諸凡大方皆在補益諸湯與煎盡屬虛損

又頭面篇中備載風眩之治小腸腑卷重出風眩一門求之類例不當復出蓋前篇雜疏諸家之法廣記而備言之後篇特記徐嗣伯十方欲後人知所適從耳

凡婦人之病比之男子十倍難治所以別立方也若是四時節氣為病虛實冷熱為患者故與丈夫同也其雜病與丈夫同者散在諸卷

凡小兒之病與大人不殊惟用藥有多少為異其驚癇客忤解顱不行等八九篇合為一卷自餘下利等方

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:25
列印頁數：29
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

並散在諸篇中可披而得也

凡針灸孔穴已具明堂篇中其逐篇諸穴多有不與明堂同者及明堂中所無者亦廣記當時所傳得效者耳故不必盡同舊經也

凡諸卷中用字文多假借如乾字作干屎字作矢銳字古之意也

作兌其類非一今則各仍舊文更不普加改定亦從

凡諸方論今各檢見所從來及所流派比欲各加題別

竊為非醫家之急今但按文校定其諸書之名則隱而不出以成一家之美焉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷一

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

論大醫習業第一

凡欲為大醫必須諳素問甲乙黄帝鍼經明堂流注十二經脉三部九候五臟六腑表裏孔穴本草藥對張仲景王叔和阮河南范東陽張苗靳邵等諸部經方又須妙解陰陽禄命諸家相法及灼龜五兆周易六壬並須精熟如此乃得為大醫若不爾者如無目夜遊動至顛殞次須熟讀此方尋思妙理留意鑽研始可與言於醫道者矣又須涉獵羣書何者若不讀五經不知有仁義之道不讀三史不知有古今之事不讀諸子覩事則不能默而識之不讀内經則不知有慈悲喜捨之德不讀莊老不能任真體運則吉凶拘忌觸塗而生至於五行休王七耀天文並須探賾若能具而學之則於醫道無所滯礙而盡善盡美者矣

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:26
列印頁數：31
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

論大醫精誠第二

張湛曰夫經方之難精由來尚矣今病有内同而外異亦有内異而外同故五臟六腑之盈虛血脉榮衛之通塞固非耳目之所察必先診候以審之而寸口關尺有浮沉弦緊之亂俞穴流注有高下淺深之差肌膚筋骨有厚薄剛柔之異唯用心精微者始可與言于兹矣今以至精至微之事求之于至麤至淺之思豈不殆哉若盈而益之虛而損之通而徹之塞而壅之寒而冷之熱而温之是重加其疾而望其生吾見其死矣故醫方卜筮藝能之難精者也既非神授何以得其幽微世有愚者讀方三年便謂天下無病可治及治病三年乃知天下無方可用故學者必須博極醫源精勤不倦不得道聽塗説而言醫道已了深自誤哉凡大醫治病必當安神定志無欲無求先發大慈惻隱之心誓願普救含靈之苦若有疾厄來求救者不得問其貴賤貧富長幼妍媸怨親善友華夷愚智普同一等皆如至親之想亦不

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:26
列印頁數：32
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

得瞻前顧後自慮吉凶護惜身命見彼苦惱若已有之深心悽愴勿避嶮巇晝夜寒暑饑渴疲勞一心赴救無作工夫形迹之心如此可為蒼生大醫反此則是含靈巨賊自古名賢治病多用生命以濟危急雖曰賤畜貴人至于愛命人畜一也損彼益已物情同患況於人乎夫殺生求生去生更遠吾今此方所以不用生命為藥者良由此也其蝘蜓水蛭之屬市有先死者則市而用之不在此例只如雞卵一物以其混沌未分必有大段要急之處不得已隱忍而用之能不用者斯為大哲亦所不及也其有患瘡瘕下痢臭穢不可瞻視人所惡見者但發慚愧悽憐憂恤之意不得起一念蒂芥之心是吾之志也夫大醫之體欲得澄神內視望之儼然寬裕汪汪不皎不昧省病診疾至意深心詳察形候纖毫勿失處判針藥無得參差雖曰病宜速救要須臨事不惑唯當審諦覃思不得於性命之上率爾自逞俊快邀射名譽甚不仁矣又到病家縱綺羅滿目勿左右顧盼絲

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:27
列印頁數：33
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

竹湊耳無得似有所娛珍羞迭薦食如無味醽醁兼陳看有若無所以爾者夫一人向隅滿堂不樂而況病人苦楚不離斯須而醫者安然懽娛傲然自得茲乃人神之所共耻至人之所不為斯蓋醫之本意也夫為醫之法不得多語調笑談謔諠譁道說是非議論人物衒燿聲名訾毀諸醫自矜已德偶然治癒一病則昂頭戴面而有自許之貌謂天下無雙此醫人之膏肓也老君曰人行陽德人自報之人行陰德鬼神報之人行陽惡人自報之人行陰惡鬼神害之尋此二途陰陽報施豈誣也哉所以醫人不得恃己所長專心經略財物但作救苦之心於冥運道中自感多福者耳又不得以彼富貴處以珍貴之藥令彼難求自衒功能諒非忠恕之道志存救濟故亦曲碎論之學者不可恥言之鄙俚也

論治病略例第三

夫天布五行以植萬類人稟五常以為五臟經絡腑輸陰陽會通玄冥幽微變化難極易曰非天下之至賾其

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

孰能與于此觀今之醫不念思求經旨以演其所知各承伎始終循舊省病問疾務在口給相對斯須便處湯藥按寸不及尺握手不及足人迎趺陽三部不參動數發息不滿五十短期未知決診九候曾無髣髴明堂闕庭盡不見察所謂窺管而已夫欲視死別生固亦難矣此皆醫之深戒病者可不謹以察之而自防慮也古來醫人皆相嫉害扁鵲為秦太醫令李□所害即其事也一醫處方不得使別醫和合脫或私加毒藥令人增疾漸以致困如此者非一特須慎之寧可不服其藥以任天真不得使愚醫相嫉賊人性命甚可哀傷夫百病之本有中風傷寒寒熱温癉中惡霍亂大腹水腫腸澼下痢大小便不通賁豚上氣欬逆嘔吐黄疸消渴留飲癖食堅積癥瘕瘿瘻驚邪癲癇鬼疰喉痺齒痛耳聾目盲金瘡踠折癰腫惡瘡痔瘻瘤癭男子五勞七傷虚乏羸瘦女子帶下崩中血閉陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此皆大略宗兆其間變動枝葉各依端緒以取之又有冷熱勞損傷

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

飽房勞驚悸恐懼憂恚怵惕又有產乳落胎墮下瘀血又有貪餌五石以求房中之樂此皆病之根源為患生諸枝葉也不可不知其本末但尚醫說男女長幼之病有半與病源相附會者便可服藥也男子者衆陽所歸常居于燥陽氣遊動强力施泄便成勞損損傷之病亦有月事月事來日得風冷濕熱四時之病相協者皆自以衆矣若比之女人則十倍易治凡女子十四已上則

說之不爾與治誤相觸動更增困也處方者亦應問之凡用藥皆隨土地所宜江南嶺表其地暑濕其人肌膚薄脆腠理開疎用藥輕省關中河北土地剛燥其人皮膚堅硬腠理閉塞用藥重複世有少盛之人不避風濕觸犯禁忌暴竭精液雖得微疾皆不可輕以利藥下之一利大重竭其精液困滯着牀動經年月也凡長宿病宜服利湯不須盡劑候利之足則止病源未除者於後更合耳稍有氣力堪盡劑則不論也病源須服利湯取除者服利湯後宜將丸散時時助之

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:28
列印頁數：36
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凡病服利湯得瘥者此後慎不中服補湯也若得補湯病勢還復成也更重瀉之則其人重受弊也若初瘥氣力未甚平復者但消息之須服藥者當以平藥和之夫常患之人不妨行走氣力未衰欲將補益冷熱隨宜丸散者可先服利湯瀉除胷腹中壅積痰實然後可服補藥也夫極虛勞應服補湯者不過三劑即止若治風病應服治風湯者皆非三五劑可止也自有滯風洞虛即服十數劑乃至百餘日可瘥也故曰實即瀉之虛則補之

夫二儀之内陰陽之中唯人最貴人者稟受天地中和之氣法律禮樂莫不由人人始生先成其精精成而腦髓生頭圓法天足方象地眼目應日月五臟法五星六腑法六律以心為中極大腸長一丈二尺以應十二時小腸長二丈四尺以應二十四氣身有三百六十五絡以應一歲人有九竅以應九州天有寒暑人有虛實天有陰陽人有男女月有大小人有

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

長短所以服食五穀不能將節冷熱醎苦更相攝觸共為攻擊變成疾病凡醫診候固是不易又問而知之別病深淺名曰巧醫仲景曰凡欲和湯合藥針灸之法宜應精思必通十二經脉辨三百六十孔穴榮衛氣行知病所在宜治之法不可不通古者上醫相色色脉與形不得相失黑乘赤者死赤乘青者生中醫聽聲聲合五音火聞水聲煩悶千驚木聞金聲恐畏相刑脾者土也生育萬物迴助四傍善者不見死則歸之太過則四肢不舉不及則九竅不通六識閉塞猶如醉人四季運轉終而復始下醫診脉知病源由流轉移動四時逆順相害相生審之臟腑之微此乃為妙也

論診候第四

夫診候之法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進脉未亂精神未散服藥必活若病已成可得半愈病勢已過命將難全

夫欲理病先察其源候其病機五臟未虛六腑未竭血

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:29
列印頁數：38
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

經脉未盛絡脉調均氣血未亂精取其脉知其逆順非其時不用也深察三部九候而明告之古之善為醫者上醫醫國中醫醫人下醫醫病又曰上醫聽聲中醫察色下醫診脉又曰上醫醫未病之病中醫醫將病之病下醫醫已病之病若不加心用意於事混淆即病者難以救矣何謂三部寸關尺也上部為天肺也中部為人脾也下部為地腎也何謂九候部各有三合為九候上部天兩額動脉主頭角之氣也上部地兩頰動脉主口齒之氣也上部人耳前動脉主耳目之氣也中部天手太陰肺之氣也中部地手陽明胷中之氣也中部人手少陰心之氣也下部天足厥陰肝之氣也下部地足少陰腎之氣也下部人足太陰脾之氣也合為九候夫形盛脉細少氣不足以息者死形瘦脉大胷中多氣者死形氣相得者生參伍不調者病三部九候皆相失者死愚醫不通三部九候及四時之經或用湯藥倒錯針灸失度順方治病更增他疾遂致滅亡哀哉烝民枉死者

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半可謂世無良醫為其解釋經説地水火風和合成人
凡人火氣不調舉身蒸熱風氣不調全身彊直諸毛孔
閉塞水氣不調身體浮腫氣滿喘粗土氣不調四肢不
舉言無音聲火去則身冷風止則氣絶水竭則無血土
散則身裂然愚醫不思脉道反治其病使藏中五行共
相尅切如火熾燃重加其油不可不慎凡四氣合德四
神安和一氣不調百病一生四神動作四百四病同時
俱發又云一百一病不治自愈一百一病須治而愈一
百一病雖治難愈一百一病真死不治

張仲景曰欲療諸病當先以湯蕩滌五臟六腑開通諸
脉治道陰陽破散邪氣潤澤枯朽悦人皮膚益人氣血
水能淨萬物故用湯也若四肢病久風冷發動次當用
散散能逐邪風氣濕痺表裏移走居無常處者散當平
之次當用丸丸藥者能逐風冷破積聚消諸堅癖進飲
食調和榮衛能參合而行之者可謂上工故曰醫者意
也又曰不須汗而彊汗之者出其津液枯竭而死須汗

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

而不與之汗者使諸毛孔閉塞令人悶絶而死又不須下而彊下之者令人開腸洞泄不禁而死須下而不與而彊與灸者令人火邪入腹干錯五臟重加其煩而死須灸而不與灸之者令人冷結重凝久而彌固氣上衝心無地消散病篤而死

黄帝問曰淫邪泮衍奈何岐伯對曰正邪從外襲内而未有定舍及淫於藏不得定處與榮衛俱行而與魂魄飛揚使人卧不得安而喜夢也凡氣淫於腑則有餘於内不足于外問曰有餘不足於内氣淫於臟則有餘於内不足于外問曰有餘不足有形乎對曰陰盛則夢涉大水而恐懼陽盛則夢蹈大火而燔灼陰陽俱盛則夢相殺毀傷上盛則夢飛揚下盛則夢墮墜甚飽則夢與巢源云夢行甚饑則夢取

巢源云夢卧肝氣盛則夢怒肺氣甚則夢恐懼哭泣心氣盛則夢喜笑及恐畏脾氣盛則夢歌樂體重手足不舉腎氣盛則夢腰脊兩解而不屬凡此十一盛者至而瀉之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

立已厥氣客于心則夢見丘山煙火客于肺則夢飛揚見金鐵之器奇物客于肝則夢見山林樹木客于脾則夢見邱陵大澤壞屋風雨客于腎則夢見臨淵没居水中客於膀胱則夢見聚邑街衢客于膽則腸則夢見田野客于小腸則夢見行走而不能前進及池渠窀窓見斬首客于跨則夢見行客于胃則夢見飲食客于大夢見鬬訟自刳客于陰器則夢交接鬬内客于項則中居客于股則夢見禮節拜跪客於胞胵則夢見溲溺便利凡此十五不足者至而補之立已善診候者亦可深思此意乃盡善盡美矣矣

史記曰病有六不治驕恣不論于理一不治也輕身重財二不治也衣食不能適三不治也陰陽并藏氣不定四不治也形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也生候尚存形色未改病未入腠裏針藥及時能將節調理委以良醫病無不愈

論處方第五

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夫療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼疰蠱毒以蠱毒藥癰腫瘡瘤以瘡瘤藥風濕以風濕藥風勞氣冷各隨其所宜雷公云藥有三品病有三階藥有甘苦輕重不同病有新久寒温亦異重熱膩滑鹹酢藥飲食等于熱病為治餘病非對輕熱辛苦淡藥飲食等於風雨為治餘病非對輕冷粗澁甘苦藥草可知臨事制宜當識斯要

於冷病為治餘病非對其大綱略顯其源流自餘覩狀藥對曰夫衆病積聚皆起于虚虚生百病積者五臟之所積聚者六腑之所聚如斯等疾多從舊方不假增損虚而勞者其弊萬端宜應隨病增減古之善為醫者皆自採藥審其體性所主取其時節早晚早則藥勢未成晚則盛勢已歇今之為醫不自採藥且不委節氣早晚只共採取用以為藥又不知冷熱消息分兩多少徒有療病之心永無必愈之效此實浮惑聊復審其冷熱記其增損之主耳虚勞而苦頭痛復熱加枸杞萎蕤虚而

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:31
列印頁數：43
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

吐加人參虛而不安亦加人參虛而多夢紛紜加龍骨虛而多熱加地黃牡礪地膚子甘草虛而冷加當歸芎藭乾薑虛而損加鍾乳棘刺肉蓯蓉巴戟天虛而大熱加黃芩天門冬虛而多忘加茯神遠志虛而驚悸不安加龍齒紫石英沙參小草冷則用紫石英小草若客熱即用沙參龍齒不冷不熱無用之虛而口乾加麥門冬知母虛而吸吸加胡麻覆盆子柏子仁虛而多氣兼微欬加五味子大棗虛而身彊腰中不利加磁石杜仲虛而多冷加桂心吳茱萸附子烏頭虛而小便赤加黃芩虛而客熱加地骨皮白朮黃耆虛而冷用隴西黃耆虛而痰復有氣加生薑半夏枳實虛而小腸利加桑螵蛸龍骨雞胜胵虛而小腸不利加茯苓澤瀉虛而痢白加厚朴諸藥無有一一歷而用之但據體性冷熱的相主對聊叙增損之一隅入處方者宜準此

論用藥第六

上藥一百二十種為君主養命以應天無毒多服久服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經

中藥一百二十種為臣主養性以應人有毒無毒斟酌其宜欲遏病補虛羸者本中經

下藥一百二十五種為佐使主以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經

三品合三百六十五種法三百六十五度每一度應一日以成一歲倍其數合七百三十名也

凡藥有君臣佐使以相宣攝合和者宜用一君二臣三佐五使又可一君三臣九佐使也又有陰陽配合子母兄弟根莖花實草石骨肉有單行者有相須者有相使者有相畏者有相惡者有相反者有相殺者凡此七情合和之時用意審視當用相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可用相畏相殺者不爾勿合用也又有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱温凉四氣及有毒無毒陰乾曝乾採造時月生熟土地所出真偽陳新並各有法其相使相畏七情列之如左處方之日宜深而究之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

玉石上部

玉泉 畏欬冬花 玉屑 惡鹿角 丹沙 惡磁石畏鹹水 曾青 畏菟絲子 石膽 水英為使 雲母 澤瀉及流水惡徐長卿 朴硝 畏麥句薑 鍾乳 畏牡桂菌桂芫花辛夷白薇 蛇牀子菟絲子為使惡玄石牡蒙畏紫石英蕞草 消石 火為使惡苦參苦菜畏女菀 礬石 甘草為使惡牡礪 滑石 石韋為使惡曾青 白石英 惡馬目毒 紫石英 長石為使畏不欲鮫甲黃連扁青附子 赤石脂 惡大黃畏芫花 黃石脂 曾青為使惡細辛畏蜚蠊扁青附子 白石脂 驚糞為使惡松枝畏黃芩 太一餘糧 杜仲石韋為使惡參句薑 赤石脂 惡大黃畏芫花 黃石 公磁石 柴胡為使畏黃石脂惡牡丹蓂草 玄石 惡松脂柏子仁茵桂 理石 滑石為使畏麻黃 水銀 畏磁石 殷孽 惡防已畏木 孔公孽 木蘭為使惡細辛 凝水石 畏地榆解 水銀 畏磁石 殷孽 惡防已畏木 孔公孽 木蘭為使惡細辛 凝水石 畏地榆解

玉石中部

陽起石 桑螵蛸為使畏菟絲子惡澤瀉菌桂雷丸蛇蛻皮 石膏 雞子為使惡蓂草毒 巴豆毒

玉石下部

青琅玕 得水銀良畏雞骨殺錫毒 礬石 得火良畏掌毒公鶩屎細辛畏水 特生礬石 得火良畏水 方解石 惡巴豆 代赭 畏天雄 大鹽 漏蘆為使 青琅玕 得水銀良畏雞骨殺錫毒 礬石 得火良畏掌毒公鶩屎細辛畏水 特生礬石 得火良畏水 方解石 惡巴豆 代赭 畏天雄 大鹽 漏蘆為使 辛夷 畏牡桂菌桂芫花辛夷白薇 蛇牀子菟絲子為使惡玄石牡蒙畏紫石英蕞草 消石 火為使惡苦參苦菜畏女菀 礬石 甘草為使惡牡礪 滑石 石韋為使惡曾青 白石英 惡馬目毒 紫石英 長石為使畏不欲鮫甲黃連扁青附子 赤石脂 惡大黃畏芫花 黃石 公磁石 柴胡為使畏黃石脂惡牡丹蓂草 玄石 惡松脂柏子仁茵桂 理石 滑石為使畏麻黃 水銀 畏磁石 殷孽 惡防已畏木 孔公孽 木蘭為使惡細辛 凝水石 畏地榆解 巴豆毒 陽起石 桑螵蛸為使畏菟絲子惡澤瀉菌桂雷丸蛇蛻皮 石膏 雞子為使惡蓂草毒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

草藥上部

六芝 薯蕷為使得髮良惡 恒山畏扁青菌陳

天門冬 垣衣地黃為使使畏曾青

麥門冬 地黃車前為使惡欵冬苦瓠畏苦參青蘘

朮 防風地榆為使

女萎萎蕤 畏鹹

乾地黃 畏海蛤

菖蒲 秦艽秦皮為使惡地膽麻黃

澤瀉 畏海蛤文蛤

薯蕷 紫芝為使甘遂

遠志 得茯苓毒畏真珠蜚蠊藜蘆薺蛤

菊花 木狗杞根桑根白皮為使

人參 □茯苓為使疏反藜蘆

甘草 朮乾漆苦參為使惡遠志反甘

牛膝 惡炭火龜甲陸英畏白前

細辛 曾青獭根為使惡狼毒山茱萸黃耆

石斛 陸英為使惡凝水石畏滑石消石反藜蘆

菴蕳子 荊子蔥莢仁為使惡細辛乾薑

薪荑子 得荊子細辛良惡乾薑苦

巴戟天 覆盆為使惡菴茼

兔絲子 得酒良薯蕷松脂為使惡菴茼

防風 惡乾薑藜蘆白斂芫花殺附子毒

沙參 畏鹹水反藜蘆

天名精 垣衣

丹參 畏鼠姑

飛廉 得烏頭良惡麻黃

杜若 得辛夷細

黃耆 惡龜甲

黃連 黃芩龍骨理石為使惡菊花芫花玄參白鮮皮畏欵冬勝

地黃為使惡雷丸

茜根 畏鼠姑

決明子 著實為使惡大麻子

黃連 蔥薤為使惡貝母

絡石 杜仲牡丹為使惡蔓菁蒲貝母

龍膽 貫衆為使惡防葵地黃

蛇牀子 惡牡丹及惡貝母

芎藭 白芷為使

續斷 地黃為使惡雷丸

五味子 蔓荊為使惡菱蔓勝烏頭

薇銜 得秦皮良

烏頭解巴豆毒

辛夷反柴胡前胡

子為使惡朝生雷丸丹參

蔾蒿子 烏頭為使

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

草藥中部

當歸 惡蘭茹畏葛蒲海藻牡蠣

藜蘆 菜本 惡茹 惡藺

麻黃 厚朴為使惡辛夷石韋

乾薑 秦椒為使惡黃連黃芩天鼠糞殺半

前胡 半夏為使惡皂莢畏藜蘆

芍藥 雷丸為使惡石斛芒

貝母 厚朴白薇為使惡桃花畏小薊反藜蘆

玄參 惡黃耆乾

葛根 解野葛巴豆百藥毒

黃芩 山茱萸龍骨為使惡蔥實畏丹砂及牡丹

夏莧毒

苦參 玄參為使惡敗醬

杏仁為使惡乾薑大棗山茱萸反藜蘆

梔蓽 枸杞為使惡乾薑牛膝乾漆反烏頭

石韋 滑石杏仁當歸為使使得葛蒲良

瞿麥 蘘草牡丹為使

狗脊 蕨薇為使消畏消石鼈甲

防己 殷孽為使惡細辛畏蕨薇

紫菀 款冬為使惡天雄瞿麥及雷丸遠志畏茵蔯

款冬 紫菀為使惡螺蛸桔梗茯苓草解

蕨 薏苡為使畏葵根大黃及柴胡牡蠣前胡

紫參 畏辛夷

仙靈脾 惡桑螵蛸

白芷 當歸為使惡旋復花

石龍芮 大戟為使畏蛇蛻皮吳茱萸

白鮮皮 惡桑

女菀 畏鹵鹹

澤蘭 防己為使

草藥下部

甘遂 瓜蒂為使惡遠志反甘草

芫花 決明為使畏反甘草

澤漆 小豆為使惡蕃薟

大戟

大黃 黃芩為使

桔梗 節皮為使畏茯苓龍膽龍眼

葶藶 榆皮為使得酒良惡殭蠶石龍芮

地榆 得髮良惡麥門冬

海藻 反甘草

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

木藥上部

茯苓茯神 馬蘭為使惡白斂畏牡蠣桂心及地榆雄黃秦艽龜甲 栢子仁 牡蠣桂心瓜子為使

鉤吻 半夏為使惡黃芩 藜蘆 黃連為使反細辛芍藥五參惡大黃 天雄 遠志為使

烏頭烏喙 蓽茇為使反半夏栝蔞貝母白斂白芨惡藜蘆 貫衆 蓬蔺為使 虎掌

蜀漆為使畏莽草 附子 地膽為使甘草黃耆人參烏韭大豆 蜀漆 栝蔞為使惡貫

衆 恒山 畏玉札 半夏 射干為使惡乾薑乾薑秦艽龜甲反烏頭 狼牙 蕪荑

為使惡秦艽地榆 白斂 代赭為使反烏頭 白芨 紫石英為使惡理石李核仁杏核仁 薤菌

得酒良畏雞子 藺茹 甘草為使惡麥門冬 蘆蓋草 畏鼠婦 夏枯草 土瓜為使

畏雞子 半夏為使 乾漆 畏雞子 蔓荊子 惡烏頭石

惡菊花羊蹄諸石鼈齒 杜仲 惡蛇蛻玄參 乾漆 半夏為使 狼毒 大豆

芎藭為使惡五石脂畏葛及蒲黃黃連石膏黃環 酸棗仁 惡防己 槐子 天雄景天為使

防風為使 牡荊實 惡石膏 五加皮 遠志為使畏蛇蛻玄參 黃蘗 惡漆 辛

蓼實為使惡丹參消石白蘞畏紫石英 秦皮 大戟為使惡吳茱萸 占斯 解狼毒毒 栀子 解蜘

乾薑為使惡桔梗及寒水石消石 山茱萸 蓼實為使惡桔梗防風防己 吳茱萸

木藥中部

厚朴 乾薑為使惡澤瀉

蜘蛛毒 秦椒 惡栝蔞防葵畏雄黃 桑根白皮 續斷桂心麻子為使

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

木藥下部

黃環 蔦尾為使惡茯苓防己

石南 五加皮為使惡

巴豆 芫花為使惡蕤草

蜀椒 杏仁為使畏欬冬

□疏 漏蘆為使

藥華 決明為使

雷丸 荔實厚朴

皂莢 柄子為使惡參門冬葛根為使惡參苦參

獸上部

龍骨 得人參牛黃良畏石膏

龍角 畏乾漆蜀椒理石

牛黃 人參為使惡龍骨地黃及龍膽

白膠 得火良畏大黃

阿膠 得火良畏大黃

蛚蠐畏牛膝

獸中部

獸下部

麋脂 畏大黃惡甘草

犀角 松脂為使惡蓳菌雷丸

羖羊角 菟絲子為使

鹿茸 麻勃為使

鹿角 杜仲為使

蟲魚上部

蜜蠟 惡芜花齊蛤

蜂子 畏黃芩藥牡蠣

牡蠣 貝母為使甘草牛膝遠志蛇牀良惡麻黃

蟲魚中部

伏翼 蒐實雲實為使

蝟皮 得酒良殺桔梗麥門冬

蜥蜴 惡硫黃斑猫蒸蔓

露蜂房 吳茱萸辛夷

桑螵蛸 畏旋復花

海蛤 蜀漆為使畏狗膽甘遂芜花

龜甲 惡沙參蛚蠐

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣
蠡蟲畏皂莢菖蒲
蟒蟲畏為使畏狗膽甘遂芫花
鼈甲惡礬石烏賊魚骨惡白斂白蘞
鼠糞惡白斂白蘞

蟲魚下部

蛇蛻畏礦石及酒
蜣蜋畏羊角石膏
斑猫馬刀為使畏巴豆丹參空青惡膚青
地膽畏牡蠣惡甘草
馬刀得水良

菓上部

大棗殺烏頭毒

菓下部

杏仁得火良惡黃耆黃芩葛根解錫胡粉毒畏苯草
冬葵子黃芩為使

菜上部

葱實解藜蘆毒

菜中部

麻蕡麻子畏牡蠣白蘞惡茯苓

米上部

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:35
列印頁數：51
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

米中部

大豆及黃卷 惡五參龍膽得前胡烏喙杏仁牡蠣良殺烏頭毒 大麥 食蜜殺毒 火毒 為使醬藥

右一百九十七種有相制使其餘皆無故不備錄

或曰古人用藥至少分兩亦輕瘥病極多觀君處方非不煩重分兩亦多而瘥病不及古人者何也答曰古者日月長遠藥在土中自養經久氣味真實百姓少欲稟氣中和感病輕微易為醫療今時日月短促藥力輕虛人多巧詐感病厚重難以為醫病輕用藥須少痾重用藥即多此則醫之一隅何足怪也又古之醫者自解採取陰乾曝乾皆悉如法用藥必依土地所以治十得九今之醫者但知診脉處方不委採藥時節至于出處土地新陳虛實一皆不悉所以治十不得五六者寔由于此夫處方者常須加意重複用藥藥乃有力若學古人徒自悞耳方來學者須詳而熟之

凡紫石英白石英朱砂雄黃硫黃等皆須光明映徹色

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

理鮮淨者為佳不然令人身體乾燥發熱口乾而死

凡草石藥皆須土地堅實氣味濃烈不爾治病不愈

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黄吳茱萸皆欲得陳久者良其餘惟須精新也

論合和第七

問曰凡和合湯藥治諸草石蟲獸用水升數消殺之法則云何答曰凡草有根莖枝葉皮骨花實諸蟲有毛翅皮甲頭足尾骨之屬有須燒鍊炮炙生熟有定一如後法順方者福逆之者殃或須花實依方鍊治極令淨潔然後升合秤兩勿根莖或須皮去肉或去皮須肉或須令參差藥有相生相殺氣力有强有弱君臣相理佐使相持若不廣通諸經則不知有好有惡或醫自以意加減不依方分使諸草石强弱相欺入人腹中不能治病更加鬪爭草石相反使人迷亂力甚刀劒若調和得所雖未能治病猶得安利五臟於病無所增劇例曰諸經方用藥所以熬鍊節度皆脚注之今方則不然於此篇

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

具條之更不煩方下別注也

凡藥治擇熬炮訖然後秤之以充用不得生秤

凡用石藥及玉皆碎如米粒綿裹内湯酒中

凡鍾乳等諸石以玉槌水研三日三夜漂鍊務令極細

凡銀屑以水銀和成泥

凡礬石赤泥團之入火半日乃熟可用仍不得過之不

鍊生入藥使人破心肝

凡朴硝礬石燒令汁盡乃入丸散硼硝朴硝皆絞湯訖

内汁中更上火兩三沸烊盡乃服

凡湯中用丹砂雄黄者熟末如粉臨取内湯中攪令調

和服之

凡湯中用完物皆擘破乾棗梔子之類是也用細核物

亦打碎山茱萸五味子蓽撥核決明子之類是也細花子

物正爾完用之旋復花菊花地膚子葵子之類是也米

麥豆輩亦完用之

凡橘皮吳茱萸椒等入湯不咬咀

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凡諸果實仁皆去尖及雙仁者湯揉撻去皮仍切之用
梔子者去皮用蒲黃者湯成下
凡麥門冬生薑入湯皆切三擣三絞取汁湯成去滓下
之煮五六沸依如升數不可共藥煮之一法薄切用
凡麥門冬皆微潤抽去心
凡麻黃去節先別煮兩三沸掠去沫更益水如本數乃
内餘藥不爾令人煩寸斬之小草瞿麥五分斬之細辛
白前三分斬之膏中細剉也
凡牛膝石斛等入湯酒拍碎用之石斛入丸散者先以
碻槌極打令碎乃入臼不爾擣不熟入酒亦然
凡桂厚朴杜仲秦皮木蘭輩皆削去上虛軟甲錯取裏
有味者秤之茯苓猪苓削除黑皮牡丹巴戟天遠志野
葛等皆槌破去心紫菀洗去土曝乾乃秤之薤白葱白
除青令盡莽草石南茵芋澤蘭剔取葉及嫩莖去大枝
鬼白黃連皆除根毛石韋辛夷拭去毛辛夷又去心蜀
椒去閉口者及目用大棗烏梅皆去核用鬼箭削取羽

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

皮

凡茯苓芍藥補藥須白者瀉藥惟赤者

凡菟絲子煖湯淘汰去沙土乾漉煖酒漬經一宿漉出曝微白擣之不盡者更以酒漬經三五日乃出更曬微乾擣之須臾悉盡極易碎

凡用甘草厚朴枳實石南茵芋藜蘆皂莢之類皆炙之而枳實去穰藜蘆去頭皂莢去皮子

凡用椒實微熬令汗出則有勢力

凡湯丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆熥灰炮令微拆削去黑皮乃秤之惟薑附湯及膏酒中生用亦削去皮乃秤之直理破作七八片

凡半夏熱湯洗去上滑一云十洗四破乃秤之以入湯若膏酒丸散皆熥灰炮之

凡巴豆去皮心膜熬令紫色桃仁杏仁葶藶胡麻諸有脂膏藥皆熬黃黑別擣令如膏指攪視泯泯爾乃以向成散稍稍下白中合研擣令消散乃復都以輕絹篩之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

須盡又内白中依法擣數百杵也湯膏中雖有生用者
並擣破
凡用麥蘗麴末大豆黄卷澤蘭蕪荑皆微炒乾漆炒令
煙斷用烏梅入丸散者熬之用熟艾者先炒細擘合諸
藥擣令細散不可篩者内散中和之
凡用諸毛羽齒牙蹄甲龜鼈鰒鯪鯉等甲皮肉骨角筋鹿
茸等皆炙之蛇蛻皮微炙
凡諸斑猫等諸蟲皆去翅足微熬用桑螵蛸中破炙之
牡蠣熬令黄色殭蠶蜂房微炒之
凡湯中用麝香犀角鹿角羚羊角牛黄須末如粉臨服
内湯中攪令調和服之
凡丸散用膠先炙使通體沸起燥乃可擣有不沸處更
炙之斷下湯直爾用之勿炙諸湯中用阿膠皆絞湯畢
内汁中更上火兩三沸令烊
凡用蜜先火煎掠去沫令色微黄則丸經久不壞掠之
多少隨蜜精粗遂至大稠於丸彌佳

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凡丸中用蠟烊投少蜜中攪調以和藥

凡湯中用飴糖皆湯成下諸湯用酒者皆臨熟下之

凡藥有宜丸者宜散者宜湯者宜酒漬者宜膏煎者亦有一物兼宜者亦有不入湯酒者並隨藥性不得違之其不宜湯酒者列之如左

朱砂 酒熟入 雌黃 雲母 陽起石 酒入

礬石 酒入 硫黃 酒入 鍾乳 酒入 孔公孽 酒入

礬石 酒入 銀屑 白堊 銅鏡鼻

胡粉 鉛丹 鹵鹹 酒入 石灰 酒入

藜灰

右石類一十七種

野葛 狼毒 毒公 鬼臼

莽草 蒴藿 酒入 巴豆 蠷螋 酒入

皂莢 酒入 藿菌 藜蘆 蘭茹

貫衆 酒入 蕪荑 雷丸 狼牙

鳶尾 蔌蒻 酒入 女菀 菜耳

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:37
列印頁數：58
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

紫葳 酒入　薇銜 酒入　飛廉　石南 酒入　棟實　蓄根　羊桃 酒入　瓜蒂　陟釐　槐子 酒入　地膚子　芜蔚子　王不留行　右草木之類四十八種

白芨　牡蒙　占斯　辛夷　虎杖 單入酒漬　虎掌　麻勃　苦瓠　雲實　狼跋子 酒入　青葙子　菟絲子 酒入

蜂子　蜜蠟　白馬莖　狗陰　雀卵　雞子　雄鵲　伏翼　鼠婦　樗雞　螢火　蠐螬 蠐舊作蟨　殭蠶　蜈蚣　蜥蜴　斑猫　斐螾　蝼蛄　馬刀　赭魁　蝦蟇　蝟皮　生鼠　生龜 酒入　蝎牛　諸鳥獸 酒入　蟲魚膏骨髓膽血屎溺

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右蟲獸之類二十九種

古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分為一兩十六兩為一斤此則神農之稱也吴人以三兩為一兩隋人以二兩為一兩今依四分為一兩稱為定方家凡云等分者皆是丸散隨病輕重所須多少無定銖兩三種五種皆悉分兩同等耳凡丸散云若干分兩者是品諸藥宜多宜少之分兩非必止於若干之分兩也假令日服三方寸匕須瘥止是三五兩藥者以大錢上全抄之若云半錢匕者則是一錢抄取一邊爾並用五銖錢也錢五匕者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落為度一撮者四刀圭也十撮為一勺兩勺為一合以藥升分之者謂藥有虚實輕重不得用斤兩則以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分内散藥勿按抑之正爾微動令平調耳今人分藥不復

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:38
列印頁數：60
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用此

凡丸藥有云如細麻大者即胡麻也不必扁扁但令較略大小相稱爾如黍粟者亦然以十六黍為一大豆也如麻子者即今大麻子準三細麻也如胡豆者今青斑豆也以二大麻子準之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子準之如大豆者以二小豆準之如梧桐子十丸為定如彈丸及雞子黃者以十梧桐子準之

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當先去心皮乃秤之以一分準十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩準一枚枳實若干枚者去穰畢以一分準二枚橘皮一分準三枚棗有大小以三枚準一兩云乾薑一累者以半兩為正本草云一兩為正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩為正椒一升三兩為正吳茱萸一升五兩為正菟絲子一升九兩為正菴藺子一升四兩為正蛇牀子一升三兩半為正地膚子一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

升四兩為正此其不同也云某子一升者其子各有虛實輕重不可通以秤準皆取平升為正

凡方云桂一尺者削去皮畢重半兩為正甘草一尺者重二兩為正云某草一束者重三兩為正一把者重二兩為正

凡云蜜一斤者有七合猪膏一斤者一升二合

凡湯酒膏藥舊方皆云㕮咀者謂秤畢擣之如大豆又使吹去細沫此於事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略令如㕮咀者乃得無末而片粒調和也凡云末之者謂擣篩如法也

凡丸散先細切曝燥乃擣之有各擣者有合擣者並隨方所言其潤濕藥如天門冬乾地黃輩皆先切曝乾獨擣令偏碎更出細擘曝乾若值陰雨可微火烘之既燥小停冷乃擣之凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之為正其湯酒中不須如此

凡篩丸藥用重密絹令細於蜜丸即易熟若篩散草藥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用輕疎絹於酒中服即不泥其石藥亦用細絹篩令如丸藥者

凡篩丸散藥畢皆更合于白中以杵擣之數百過視其色理和同為佳

凡煮湯當取井花水極令淨潔升斗分量勿使多少煮之調和候火用心一如鍊法

凡煮湯用微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水一斗煮取四升以此為率皆絞去滓而後酌量

也然則利湯欲生少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁者為病須快利所以少水而多取汁者為病須補益是以多水而少取汁好詳視之不得令水多少湯熟用新布兩人以尺木絞之澄去垽濁分再服三服者第二第三服以紙覆令窓勿令洩氣欲服以銅器於熱湯上煖之勿令器中有水氣

凡漬藥酒皆須切細生絹袋盛之乃入酒密封隨寒暑日數視其濃烈便可漉出不必待至酒盡也滓可曝燥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

微搗更漬飲之亦可散服

凡建中腎瀝諸補湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑新藥貧人當依此用皆應先曝令燥也

凡合膏先以苦酒漬令淹浹不用多汁密覆勿洩云晬時者周時也從今旦至明旦亦有止一宿煮膏當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使匝匝沸乃下之取沸靜良久乃止寧欲小生其中有薤白者以兩頭微熬黃為候有白芷附子者亦令小黃色為度猪肪皆勿令經水臘月者彌佳絞膏亦以新布絞之若是可服之膏膏滓亦堪酒煮飲之可摩之膏膏滓則宜以傅病上此蓋欲兼盡其藥力故也

凡膏中有雄黃朱砂輩皆別擣細研如麪須絞膏畢乃投中以物疾攪至於凝彊勿使沉聚在下勿調也有水銀者于凝膏中研令消散胡粉亦爾

凡擣藥法燒香洒掃淨潔不得雜語喧呼當使童子擣之務令細熟杵數可至千萬杵過多為佳

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凡合腎氣蕎蕷及諸大補五石大麝香丸金牙散大酒煎膏等合時煎時並不令婦人小兒產母喪者痼疾六根不具足人及雞犬六畜等見之大忌切宜慎之其續命湯麻黃等諸小湯不在禁忌之限比來田野下里家因市得藥隨便市上雇人擣合非止諸不如法至于石斛菟絲子等難擣之藥費人功力賃作擣者隱主悉盜棄之又為塵埃穢氣入藥中羅篩粗惡隨風飄揚衆口嘗之衆鼻齅之藥之精氣一切都盡與朽木不殊又復服餌不能盡如法服盡之後反加虛損遂謗醫者處方不效夫如此者非醫之咎自緣發意甚誤宜熟思之

論服餌第八

若用毒藥治病先起如黍粟病去即止不去倍之不去十之取去為度病在胸膈已上者先食而後服藥病在心腹已下者先服藥而後食病在四肢血脉者宜空腹而在旦病在骨髓者宜飽滿而在夜

凡服丸散不云酒水飲者本方如此是可通用也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凡服利湯欲得侵早凡服湯欲得稍熱服之即易消下不吐若冷則吐嘔不下若太熱則破人咽喉務在用意湯必須澄清若濁令人心悶不解中間相去如步行十里久再服若太促數前湯未消後湯來衝必當吐逆仍問病者腹中藥消散乃可進服

凡服湯法大約皆分為三服取三升然後乘病人穀氣彊進一服最須多次一服漸少後一服最須少如此即甚安穩所以病人於後氣力漸微故湯須漸少凡服補湯欲得服三升半晝三夜一中間間食則湯氣溉灌百脉易得藥力凡服湯不得太緩太急也又須左右仰覆卧各一食頃即湯勢偏行腹中又於室中行皆可一百步許一日勿出外即大益

凡服湯三日常忌酒緣湯忌酒故也凡服治風湯第一服厚覆取汗若得汗即須薄覆勿令大汗中間亦須間食不爾令人無力更益虛羸

凡丸藥皆如梧桐子大補者十丸為始從一服漸加不

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

過四十丸過亦損人云一日三度服欲得引日多時不闕藥氣漸漬熏蒸五臟積久為佳不必頓服早盡為善徒藥名藥獲益甚少凡人四十已下有病可服瀉藥不甚須服補藥必若有所損不在此限四十已上則不可服瀉藥須服補藥五十已上四時勿闕補藥如此乃可延年得養生之術耳其方備在第二十七卷中素問曰實即瀉之虛即補之不虛不實以經調之此其大略也凡有臟腑積聚無問少長須瀉則瀉凡有虛損無問少長須補即補以意量度而用之

凡服瘕漏疳蟨等藥皆慎猪雞魚油等味至老損人也

凡諸惡瘡瘥後皆百日慎口味不爾而瘡即發也

凡服酒藥欲得使酒氣相接無得斷絶絶則不得藥力多少皆以知為度不可令至醉及吐則大損人也

凡服藥皆斷生冷酢滑猪犬雞魚油麪蒜及菓實等其

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大補丸散切忌陳臭宿滯之物有空青忌食生血物天門冬忌鯉魚白朮忌桃李及雀肉葫荽大蒜青魚酢等物地黃忌蕪荑甘草忌菘菜海藻細辛忌生菜菟絲子生菜商陸忌犬肉茯苓忌醋物栢子仁忌濕麪巴豆忌蘆筍羹及猪肉鼈甲忌菟葵菜

蘆忌狸肉半夏菖蒲忌飴糖及羊肉恒山桂心忌生蔥忌兔肉牛膝忌牛肉黃連桔梗忌猪肉牡丹忌葫荽藜已

凡服藥忌見死尸及產婦穢汚觸之兼及忿怒憂勞

凡餌湯藥其粥食肉菜皆須大熟熟即易消與藥相宜若生則難消復損藥力仍須少食菜及硬物於藥為佳亦少進鹽醋乃善亦不得苦心用力及房室喜怒是以治病用藥力惟在食治將息得力大半於藥有益所以病者務在將息節慎節慎之至可以長生豈惟愈病而已

凡服瀉湯及諸丸散酒等至食時須食者皆先與一口冷醋飲須臾乃進食為佳

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:42
列印頁數：68
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凡人忽遇風發身心頓惡或不能言有如此者當服大小續命湯及西州續命排風越婢等湯于無風處密室之中日夜四五服勿計劑數多少亦勿慮虛常使頭面手足腹背汗出不絶為佳服湯之時湯消即食粥粥消即服湯亦少與羊肉臛將補若風大重者相續五日五夜服湯不絶即經二日停湯以羹臛自補將息四體若小瘥即當停藥漸漸將息如其不瘥當服湯攻之以瘥為度

凡患風服湯非得大汗其風不去所以諸風方中皆有麻黄至如西州續命即用八兩越婢六兩大小續命或用一兩三兩四兩故知非汗不瘥所以治風非密室不得輒服湯藥徒自誤耳惟更加增未見損減矣

凡人五十已上大虛者服三石更生慎勿用五石也四時常以平旦服一二升煖飲終身勿絶及一時勿食蒜油魚猪牛馬雞鵝鴨等肉即無病矣

論藥藏第九

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

存不忘亡安不忘危大聖之至教求民之瘼恤民之隱賢人之用心所以神農鳩集百藥黃帝纂錄針經皆備預之常道也且人痾瘵多起倉卒不與人期一朝嬰已豈遑知救想諸好事者可貯藥藏用以備不虞所謂起藥數十斤不見養身者有蓄人藥一錙銖以此類之極心雖微所救惟廣見諸世祿之家有善養馬者尚貯馬可愧矣貴畜而賤身誠可羞矣傷人乎不問馬此言安用哉至如人或有公私使命行邁邊隅地既不毛藥物一朝至此何歎惜之晚哉故置藥藏法以防危殆云爾天殁者斯為自致豈是枉橫何者既不能深心以自衛焉出忽逢瘴癘素不資貯無以救療遂拱手待斃以致

石藥灰土藥水藥根藥莖藥葉藥花藥皮藥子藥五穀五果五菜諸獸齒牙骨角蹄甲皮毛尿屎等藥酥髓乳酪醍醐石蜜沙糖飴糖酒醋膠麴蘗豉等等藥

右件藥依時收採以貯藏之蟲豸之藥不收採也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

秤斗升合鐵白木白絹羅紗羅馬尾羅刀砧玉槌
瓷鉢大小銅銚鐺釜銅鐵匙等
右合藥所須極當預備
凡藥皆不欲數數曬曝多見風日氣力即薄歇宜熟知
之諸藥未即用者候天大晴時于烈日中曝令大乾以
新瓦器貯之泥頭密封須用開取即急封之勿令中風
濕之氣雖經年亦如新也其丸散以瓷器貯蜜蠟封之
勿令洩氣則三十年不壞諸杏仁及子等藥瓦器貯之
則鼠不能得之也凡貯藥法皆須去地三四尺則土濕
之氣不中也

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:43
列印頁數：71
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷二

詳校官太醫院吏目臣宋柱
編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐
校對官庶吉士臣嚴　福
謄錄監生臣蔣錦城

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷二

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

婦人方

求子第一 論轉女為男法 灸法

論曰夫婦人之別有方者以其胎妊生產崩傷之異故也是以婦人之病比之男子十倍難療經言婦人者衆陰所集常與濕居十四已上陰氣浮溢百想經心内傷五藏外損姿顏月水去留前後交互瘀血停凝中道斷絶其中傷墮不可具論生熟二臟虛實交錯惡血内漏氣脉損竭或飲食無度損傷非一或瘡瘕未愈便合陰陽或便利於懸厠之上風從下入便成十二痼疾所以婦人別立方也若是四時節氣為病虛實冷熱為患者病與丈夫同則散在諸卷中可得而知也然而女人嗜故與丈夫同也惟懷胎妊而挾病者避其毒藥耳其雜慾多於丈夫感病倍於男子加以慈戀愛憎嫉妒憂恚

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

染著堅牢情不自抑所以為疾根深療之難瘥故養生之家特須教子女學習此三卷婦人方令其精曉即于倉卒之秋何憂畏也夫四德者女子立身之樞機產育者婦人性命之長務若不通明于此則何以免于夭枉者哉故傅母之徒亦不可不學常宜繕寫一本懷挾隨身以防不虞也

論曰人之情性皆願賢已而疾不及人至於學問則隨情逐物墮於事業詎肯專一推求至理莫不虛棄光陰没齒無益夫婚姻養育者人倫之本王化之基聖人設教備論厥旨後生莫能精曉臨事之日惛爾若愚是則徒願賢已而疾不及人之謬也所實不達賢已之趣而妄狥虛聲以終無用今具述求子之法以貽後嗣同志之士或可覽焉

論曰夫欲求子者當先知夫妻本命五行相生及與德合并本命不在子休廢死墓中者則求子必得若其本命五行相尅及與刑殺衝破并在子休廢死墓中者則

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

求子了不可得慎無措意縱或得者於後終亦累人若
其相生并遇福德者仍須依法如方避諸禁忌則所誕
兒子盡善盡美難以具陳禁忌法受胎時日推王相
貴宿日法在二十七卷巾
論曰凡人無子當為夫妻俱有五勞七傷虛羸百病所
致故有絶嗣之患夫治之法男服七子散女服紫石
門冬圓及坐藥盪胞湯無不有子也
七子散治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補不足方

五味子　鍾乳粉　牡荆子　菟絲子
車前子　蘄蓂子　石斛　乾地黄
薯蕷　杜仲　鹿茸　遠志 各八銖
附子　蛇床子　芎藭 各六銖　山茱萸
天雄　人參　茯苓　黄耆
牛膝 各五銖　桂心 十銖　蓯蓉 十一銖　巴戟天 十二銖

右二十四味治下篩酒服方寸匕日二不知增至二
匕以知為度禁如藥法不能酒者蜜和圓服亦得一
方加覆盆子八銖求子法一依後房中篇

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:45
列印頁數：75
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

朴硝盪胞湯治婦人立身已來全不產及斷緒久不產三十年者方

朴硝 牡丹 大黃
桃仁 生用各三銖細辛 當歸 厚朴 桔梗
蚖蟲 水蛭 各十枚 甘草 牛膝 各二 橘皮 各二銖 附子 六銖 人參 赤芍藥 茯苓 桂心

右十八味咬咀以清酒五升水五升合煮取三升分四服日三夜一每服相去三時更服如常覆被取少汗汗不出冬日著火籠之必下積血及冷赤膿如赤小豆汁本為婦人子宮内有此惡物使然或天陰臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱大困不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後仍著導藥 千金翼方不用桔梗

甘草

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:45
列印頁數：76
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治全不產及斷緒服前朴硝湯後著坐導藥方

皂莢 千金翼作苦瓠 山茱萸 千金翼作苦瓠 各一兩 當歸 各一兩

細辛 五味子 乾薑 各二兩 大黃

礬石 戎鹽 蜀椒 各半兩

右十味為末以絹袋盛大如指長三寸盛藥令滿內

婦人陰中坐卧任意勿行走急小便時去之更安新

子若未見病出亦可至十日安之一本別有葶藶砒

者一日一度必下青黃冷汁汁盡即止可幸御即有

霜各半兩此藥為服朴消湯恐去冷惡物出不盡以

導藥下之值天陰冷不疼不須著導藥亦有著鹽為

導藥者然不如此藥其服朴消湯後即安導藥經一

日外服紫石門冬丸

紫石門冬圓治全不產及斷緒方

紫石英 天門冬 各三兩 當歸 芎藭

紫葳 卷栢 桂心 烏頭

乾地黃 牡蒙 千金翼作牡荊 外臺作牡蒙 禹餘糧

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

石斛 辛夷 各二兩 人參 桑寄生
續斷 細辛 厚朴 乾薑
食茱萸 牡丹 牛膝 各三十銖 栢子仁 一兩
薯蕷 烏賊骨 甘草 各一兩半

右二十六味為末蜜和丸如梧桐子大酒服十丸日三漸增至三十丸以腹中熱為度不禁房室夫行不在不可服禁如藥法比來服者不至盡劑即有娠

白薇圓主令婦人有子方

白薇 細辛 秦椒 白斂一云白芷 桂心 牛膝 防風 人參

右八味為末蜜和丸如梧桐子大酒服十丸日三漸增至三十丸以腹中熱為度不禁房室夫行不

秦艽 蕪荑 沙參 芍藥

五味子 白殭蠶 牡丹 蠐螬 各一兩

乾漆 栢子仁 乾薑 卷栢

附子 芎藭 各三十銖 桃仁 紫石英 各一兩半

鍾乳 乾地黃 各三兩 白石英 鼠婦 半兩

水蛭 蚤蟲 各五枚 十 吳茱萸 十八銖

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:46
列印頁數：78
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麻布叩□頭 燒一尺

右三十二味為末蜜和丸如梧桐子大酒服十五丸日再稍加至三十丸當有所去小覺有異即停服

又方治久無子或斷緒上熱下冷百病皆治之方

白薇 乾地黃 車前子 蜀椒 各八十銖 紫石英 藁本 石膏 菴蕳子 卷栢 各十銖三 白龍骨 遠志 麥門冬 茯苓 澤蘭 赤石脂 太乙餘糧 各兩二 當歸 芎藭 蛇牀子 各兩一 白芷 覆盆子 桃仁 人參 各兩一半 桂心 蒲黃 各兩二半 細辛 三兩 橘皮 半兩

右二十八味為末蜜和丸如梧子大酒服十五丸日再漸增以知為度亦可至五十丸慎猪雞生冷酢滑魚蒜驢馬牛肉等覺有娠即停三月正擇食時可食牛肝及心至四月五月不須但不可故殺令子短壽

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:46
列印頁數：79
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

遇得者大良

金城大守白薇圓治月水不利閉塞絶産十八年服此藥二十八日有子方

白薇 細辛 各十銖 人參 各三

杜蘅 古今録驗用牡蠣 半夏 白殭蠶 當歸 紫菀 各八銖 牛膝 沙參 乾薑 秦艽 各半兩 蜀椒 附子 防風 各一兩半

右十七味為末蜜和丸如梧子大先食服三丸不知稍增至四五丸此藥不可長服覺有娠即止用之大論曰古者求子多用慶雲散承澤圓今代人絶不用此雖未試驗其法可重故述之

慶雲散治丈夫陽氣不足不能施化施化無成方

覆盆子 五味子 各一升 菟絲子 二升 天雄 一兩

桑寄生 四兩 天門冬 九兩

石斛 白朮 各三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

紫石英 二兩
右九味治下篩酒服方寸匕先食服日三素不耐冷者去寄生加細辛四兩陽氣不少而無子者去石斛加檳榔十五枚

承澤圓治婦人下焦三十六疾不孕絶產方

藁本 一兩　澤蘭子 五合　梅核仁 辛夷 各一升　葛上亭長 七枚　溲疏 三兩
右六味為末蜜和丸如大豆先食服二丸日三不知稍增若腹中無堅癖積聚者去亭長加通草一兩惡甘草和藥先以苦酒搜散乃納少蜜和為丸

大黄圓治帶下百病無子服藥十日下血二十日下長蟲及青黄汁三十日病除五十日肥白方

乾薑 各一升　大黄 破如米豆熬令黑　蜀椒 二兩　茯苓 如雞子大一枚　柴胡　朴硝
右七味為末蜜和丸如梧桐子大先食服七丸米飲下加至十丸以知為度五日微下

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:47
列印頁數：81
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

吉祥圓治女人積年不孕方

天麻 柳絮 牡丹 茯苓 乾地黃 桂心 各一兩 五味子 桃花 白朮 芎藭 各二兩 覆盆子 一斗 桃仁 一百枚 菟絲子 楮實子 各一升

右十四味為末蜜和丸如豆大每服空心飲苦酒下五丸日中一服晚一服

消石大黃圓治十二瘕癖及婦人帶下絶產無子并服大丸不下水穀但下病耳不至令人虛極方見第十一卷中

寒食藥而腹中有癖者當先服大丸下之乃服寒食藥

秦椒圓治婦人絶產生來未產盪滌腑臟使玉門受子精

秦椒 天雄 各十八銖 玄參 人參 白蘞 鼠婦 白芷 黃耆 桔梗 露蜂房 白殭蠶 桃仁

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蠐螬　白薇
牡蒙　沙參　各一兩
牡丹皮　牛膝
芍藥　桂心
大黃　石斛
卷栢　五味子
防風　甘草
細辛　蕪荑　各一兩
白朮　各十銖三　栢子仁
茯苓　當歸
乾薑　各兩半一　澤蘭
乾地黃　芎藭　各一兩十八銖
乾漆　白石英
紫石英　附子　各二兩
鍾乳　二兩半
水蛭　七枚
亩蟲　一百枚
麻布叩複頭　七尺燒

右四十四味為末蜜丸如梧子大酒服十丸日再稍加至二十丸若有所去如豆汁鼻涕此是病出覺有異即停

灸法

婦人絶子灸然谷五十壯在内踝前直下一寸婦人絶嗣不生胞門閉塞灸關元三十壯報之

婦人妊子不成若墮落腹痛漏見赤灸胞門五十壯在

關元左邊二寸是也右邊二寸名子戶
婦人絶嗣不生灸氣門穴在關元傍三寸各百壯
婦人子藏閉塞不受精疼灸胞門五十壯
婦人絶嗣不生漏赤白灸泉門十壯三報穴在橫骨當
陰上際
論曰陰陽調和二氣相感陽施陰化是以有娠而三陰
所會則多生女但妊娠二月名曰始胎精氣成于胞裏
至于三月名曰始胎血脉不流象形而變未有定儀見
物而化是時男女未分故未滿三月者可服藥方術轉
之令生男也
丹參圓治婦人始覺有娠養胎并轉女為男方

丹參 續斷 芍藥 白膠
白朮 栢子仁 甘草 各二兩 人參
苓蘑 乾薑 各三銖 吳茱萸 橘皮
當歸 各一兩十八銖 白芷
蕪荑 十八銖 犬卵 一具乾 東門上雄雞頭一枚
冠纓 燒灰各一兩 乾地黃 一兩半

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十九味為末蜜和丸如梧子大酒服十丸日再稍加至二十丸

又方取原蠶屎一作矢一枚井花水服之日三

又方取弓弩弦一枚絳囊盛帶婦人左臂一法以繫腰下滿百日去之

又方取雄黃一兩絳囊盛帶之要女者帶雌黃

又以斧一柄於產婦臥牀下置之仍繫刃向下勿令人知如不信者待雞抱卵時依此置於窠下一窠兒子盡為雄也

妊娠惡阻第二 論法一方

論曰何以知婦人妊娠脉平而虛者乳子法也經云陰搏陽別謂之有子此是血氣調和陽施陰化也診其手少陰脉動甚者妊子也少陰心脉也心主血脉又腎名胞門子户尺中腎脉也尺中之脉按之不絶法妊娠也三部脉沉浮正等按之無絶者有娠也妊娠初時寸微小呼吸五至三月而尺數也妊娠四月

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:49
列印頁數：85
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欲知男女者左疾為男右疾為女左右俱疾為產二子又法左手沉實為男右手浮大為女左右手俱沉實猥生二男俱浮大猥生二女尺脉若左偏大為男右偏大為女左右俱大產二子大者如實狀又法左手尺中浮大者男右手尺中沉細者女若來而斷絶者月水不利二女不爾男作女生又法得太陰脉為男得太陽脉為女太陰脉沉太陽脉浮又遣妊娠人面南行還復呼之左迴首者是男右迴首者是女又看上圊時夫從後急呼之左迴首是男右迴首是女又婦人妊娠其夫左乳房有核是男右乳房有核是女

妊娠欲知將産者懷妊離經其脉浮設腹痛引腰脊為今出也但離經者不病也又法欲生其脉離經夜半覺痛日中則生也

論曰凡婦人虚羸血氣不足腎氣又弱或當風飲冷太過心下有淡水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人月水尚來顏色肌膚如常但苦沉重憒悶不欲食飲又不知其患所在脉理順時平和則是欲有妊也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憒憒頭重眼眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲噉鹹酸果實多卧少起世謂惡食其至三四月日已上皆大劇吐逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬于藏藏氣澁則四肢沉重挾風則頭目眩也覺如此候者便宜服不宣通故心煩憒悶氣逆而嘔吐也血脉不通經絡否

半夏茯苓湯數劑後將茯苓丸淡水消除便欲食也既得食力體强氣盛力足養胎母便健矣古今治阻病方有十數首不問虛實冷熱長少殆死者活于此方

氣頭眩體重四肢百節疼煩沉重多卧少起惡寒汗出

半夏茯苓湯治妊娠阻病心中憒悶空煩吐逆惡聞食

疲極黄瘦方

半夏　生薑各三十銖　乾地黄　茯苓各八銖

橘皮　旋復花　細辛　人參

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:49
列印頁數：87
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芍藥　芎藭　桔梗　甘草　各十二銖

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服若病阻積月日不得治及服藥冷熱失候病變客熱煩渴口生瘡者去橘皮細辛加前胡知母各十二銖若變冷下痢者去乾地黃入桂心十二銖若食少胃中虛生熱大便閉塞小便赤少者宜加大黃十八銖去地黃加黃芩六銖餘依方服一劑得下後消息看氣力冷熱增損方調定更服一劑湯便急服茯苓丸令能食便强健也忌生冷醋滑油膩菘菜海藻

茯苓圓治妊娠阻病患心中煩悶頭眩重憎聞飲食氣便嘔逆吐悶顛倒四肢垂弱不自勝持服之即效要先服半夏茯苓湯兩劑後可服此方

茯苓　人參　桂心　黍　乾薑　半夏　橘皮　各一兩　白朮　葛根　甘草　枳實　各二兩

右十味為末蜜和為丸如梧子飲服二十丸漸加至

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:50
列印頁數：88
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三十丸日三 肘後不用乾薑半夏橘皮白朮葛根只五味又云妊娠忌桂故葵

治妊娠惡阻嘔吐不下食方

青竹茹 橘皮 各十 八銖 茯苓 生薑 各一 兩

半夏 三十 銖

作

右五味㕮咀以水六升煮取二升半分三服不瘥頻

橘皮湯治妊娠嘔吐不下食方

橘皮 竹茹 人參 白朮 各十 八銖

作

右六味㕮咀以水七升煮取二升半分三服不瘥重

生薑 一 兩 厚朴 十二 銖

作

論曰舊說凡受胎三月逐物變化稟質未定故妊娠三

養胎第三 論逐月養胎方 禁忌

月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德

大師觀禮樂鍾鼓俎豆軍旅陳設焚燒名香口誦詩書

古今箴誡居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

調心神和情性節嗜慾庶事清淨生子皆良長壽忠孝
仁義聰慧無疾斯蓋文王胎教者也
論曰兒在胎日月未滿陰陽未備腑臟骨節皆未成足
故自初迄于將產飲食居處皆有禁忌
妊娠食羊肝令子多厄食山羊肉令子多病
妊娠食驢馬肉令子延月食騾肉產難
妊娠食雞子及乾鯉魚令子無音聲并缺脣
妊娠食兎肉犬肉令子多瘡
妊娠食雞肉糯米令子多寸白蟲
妊娠食椹并鴨子令子倒出心寒
妊娠食雀肉并豆醬令子滿面多黡黯黑子
妊娠食雀肉飲酒令子心淫情亂不畏羞恥
妊娠食鼈令子短項
妊娠食永漿絶胎
妊娠勿向非常地大小便必半產殺人
徐之才逐月養胎方

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:51
列印頁數：90
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥毋食腥辛是謂才正

妊娠一月足厥陰脉養不可針灸其經足厥陰内屬於肝肝主筋及血一月之時血行否澁不為力事寢必安靜無令恐畏

妊娠一月陰陽新合為胎寒多為痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿胞急卒有所下當預安之宜服

烏雌雞湯方

烏雌雞一隻 治如食法

吳茱萸一升 麥門冬五合 人參 芍藥 茯苓 阿膠各二兩 甘草 白术各三兩 生薑各一兩

右十味㕮咀以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥煎取三升内酒三升并膠烊盡取三升放温每服一升日三

補胎湯若曾傷一月胎者當預服此方

細辛一兩 防風二兩 乾地黄 白术各三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生薑 四兩　吳茱萸 大麥 各五合　烏梅 一升

右八味㕮咀以水七升煮取二升半分三服先食服

寒多者倍細辛茱萸熱多渴者去之加栝蔞根二兩

若有所思去大麥加栢子仁三合一方有人參一兩

妊娠二月名始膏無食辛臊居必靜處男子勿勞百

節皆痛是為胎始結

妊娠二月足少陽脉養不可針灸其經足少陽内屬

于膽主精二月之時兒精成于胞裏當慎護驚動也

中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背强痛卒有所

妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴

下乍寒乍熱宜服

艾葉湯方

艾葉　丹參　當歸　麻黄 各二兩

人參　阿膠 各三兩　甘草 四分　生薑 六兩

大棗 十枚

右九味㕮咀以酒三升水一斗煮減半去滓内膠煎

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:51
列印頁數：92
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取三升分三服一方用烏雌雞一隻宿肥者治如食法割頭取血内三升酒中相和次以水一斗二升先煮取汁去雞内藥煎取三升内血酒并膠煎取三升分温三服

黄連湯若曾傷二月胎者當預服此方

黄連 人參 各一兩 吴茱萸 五合 生薑 三兩 生地黄 五兩 一方用阿膠

右五味㕮咀以酢漿七升煮取三升分四服日三夜一十日一修合若頗覺不安加烏梅一升加烏梅者不用漿直取水耳一方用當歸半兩

妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視璧玉欲子賢良端坐清虚是謂外象而内感者也

妊娠三月手心主脉養不可針灸其經手心主内屬于心無悲哀思慮驚動

妊娠三月為定形有寒大便青有熱小便難不赤即

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃卒驚恐憂愁嗔怒喜頓仆動于經脉腹滿繞臍苦痛或腰背卒有所下

雄雞湯方

雄雞一隻 治如食法

生薑 各一兩

麥門冬 五合

芍藥 四兩

大棗 十二枚擘

甘草 二兩

人參 二兩

茯苓 各二兩

右十一味㕮咀以水一斗三升煮雞減半出雞內藥煮取半內清酒三升并膠煎取三升分三服一日令盡當温卧一方用當歸芎藭各二兩不用黃芩生薑

茯神湯若曾傷三月胎者當預服此方

茯神 丹參 龍骨 各一兩

當歸 甘草 人參 各二兩

赤小豆 二十一枚 大棗 二十一枚

右九味㕮咀以酢漿一斗煮取三升分四服先食服

七日後服一劑腰痛者加桑寄生二兩 深師有薤白二兩麻子一升

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

妊娠四月始受水精以成血脉食宜稻粳羹宜魚雁是謂盛血氣以通耳目而行經絡

妊娠四月手少陽脉養不可針灸其經手少陽内輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲食

妊娠四月有寒心下愠愠欲嘔胷膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項强痛寒熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胷心煩不得安卒有所下

菊花湯方

菊花 一枚 雞子大
麥門冬 一升
大棗 十二枚
人參 一兩半
半夏 四兩 生薑 五兩
甘草 當歸 各二兩
麻黄 各三兩
阿膠 各二兩

右十味㕮咀以水八升煮減半内清酒三升并阿膠日一方用烏雌雞一隻煮水煎藥煎取三升分三服温卧當汗以粉粉之護風寒四五

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:53
列印頁數：95
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

調中湯若曾傷四月胎者當預服此方

白芍藥 生薑 各四兩 厚朴 枳實

生李根白皮

續斷 芎藭 各一兩 甘草 各一兩 白朮 柴胡 各三兩 當歸 一兩半

烏梅 一升

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一八日後復服一劑

妊娠五月始受火精以成其氣卧必晏起沐浴浣衣深其居處厚其衣服朝吸天光以避寒殃其食稻麥其羹牛羊和以菜茹調以五味是謂養氣以定五臟

妊娠五月足太陰脉養不可針灸其經足太陰内輸于脾五月之時兒四肢皆成無大饑無甚飽無食乾燥無自炙熱無太勞倦

妊娠五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶頓欲仆卒有所下

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:53
列印頁數：96
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

阿膠湯主之之方

阿膠 四兩 人參 一兩 生薑 六兩 當歸 芍藥 甘草 吳茱萸 七合 麥門冬 一升 黃芩 各二兩 旋復花 二合

右十味㕮咀以水九升煮藥減半內清酒三升并膠微火煎取三升半分四服日三夜一先食服便愈不瘥再服一方用烏雌雞一隻割取咽血內酒中以水煮雞以煎藥減半內酒并膠煎取三升半分四服

安中湯曾傷五月胎者當預服此方

黃芩 一兩 當歸 芎藭 乾地黃 人參 各二兩 芍藥 各三兩 生薑 六兩 麥門冬 一升 五味子 大麻仁 各五合 大棗 二十五枚

右十二味㕮咀以水七升清酒五升煮取三升半分四服日三夜一七日復服一劑

妊娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜處出遊于野數觀走犬及視走馬食宜鷙鳥猛獸之肉

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:53
列印頁數：97
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

是謂變腠理紉筋以養其力以堅背膂

妊娠六月足陽明脉養不可針灸其經足陽明内屬于胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘麥門冬湯方

美無太飽

妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹内脹滿身體腫驚怖忽有所下腹痛如欲産手足煩疼宜服

麥門冬湯方

麥門冬 一介 人參 甘草 黄芩 各二兩

乾地黄 三兩 阿膠 四兩 生薑 六兩 大棗 十五枚

右八味以水七升煮減半内清酒二升并膠煎取三升分三服中間進糜粥一方用烏雌雞一隻煮水以煎藥

柴胡湯若曾傷六月胎者當預服此方

柴胡 四兩 蒗蓉 一兩 白朮 芍藥 一作紫菀 各二兩 甘草 麥門冬 各二兩 生薑 六兩 乾地黄 五兩 大棗 三十枚

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一
中間進糜粥勿食生冷及堅硬之物七日更服一劑
妊娠七月始受木精以成其骨勞身搖肢無使定止
動作屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒常食稻粳
以密腠理是謂養骨而堅齒
妊娠七月手太陰脉養不可針灸其經手太陰内屬
于肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭
無薄衣無洗浴無寒飲

妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脉
若傷寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背强

葱白湯主之方

葱白	長三四寸十四莖	半夏	麥門冬 各一升
旋復花	二合	人參	一兩
黄芩	一兩	甘草	
當歸	黄耆 各三兩	阿膠	四兩
		生薑	八兩

右十一味㕮咀以水八升煮減半内清酒三升及膠
煎取四升每服一升日三夜一温卧當汗出若不出

者加麻黃一兩煮服如前法若秋後勿强漬汗一方
以黃雌雞一隻割咽取血内酒中煮雞取汁以煎藥
杏仁湯若曾傷七月胎者當預服此方
杏仁　甘草　各二兩　紫菀　一兩　鍾乳
乾薑　各三兩　麥門冬　吳茱萸　一升　粳米　五合
五味子　三合
右九味㕮咀以水八升煮取三升半分四服日三夜
一中間進食七日服一劑一方用白雞一隻煮汁煎

藥
妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極
是謂密腠理而光澤顏色
妊娠八月手陽明脉養不可針灸其經手陽明内屬
于大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無
輒失食無忍大起
妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱胎
動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

或青或黃或使寒慄腰背苦冷而痛目眩眩

芍藥湯主之之方

芍藥 四兩　生薑 四兩

當歸 白术　厚朴 二兩　甘草

人參 各三兩　薤白 一升切

右八味㕮咀以水五升清酒四升合煮取三升分三服日再夜一一方用烏雌雞煮汁以煎藥

葵子湯若曾傷八月胎者當預服此方

葵子 二升　甘草

厚朴 各二兩　白术

柴胡 各三兩　芍藥 四兩　生薑 六兩　大棗 二十枚

右八味㕮咀以水九升煮取三升分三服日三凡十日一劑一方用烏雌雞一隻煮水以煎藥

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備

飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮致才力

妊娠九月足少陰脉養不可針灸其經足少陰内屬于腎腎主續縷九月之時兒脉續縷皆成無處濕冷無著灸衣

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背痛不可轉側短氣

半夏湯方

半夏　麥門冬　吳茱萸　當歸　阿膠 各三兩　乾薑一兩　大棗十二枚

右七味㕮咀以水九升煮取三升去滓內白蜜八合微火上温服四服痢即止一方用烏雌雞一隻煮汁煎藥

猪腎湯若曾傷九月胎者當預服此方

猪腎一具　茯苓　桑寄生　乾薑　乾地黄 各三兩　芎藭　白朮 四兩　附子 中者一枚　大豆三合　麥門冬一升

右十味㕮咀以水一斗煮腎令熟去腎內諸藥煎取三升半分四服日三夜一凡十日更一劑

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣于丹田故使關節人神皆備但俟時而生

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

妊娠一月始胎二月始膏三月始胞四月形體成五月能動六月筋骨立七月毛髮生八月臟腑具九月穀氣入胃十月諸神備日滿即產矣宜服滑胎藥八月即服

丹參膏養胎臨月服令滑而易產方

丹參 半斤 芎藭 當歸 各二兩 蜀椒 五合有熱者以大麻仁五合代

右四味咬咀以清酒溲濕停一宿以成煎猪膏四升微火煎膏色赤如血膏成新布絞去滓每日取如棗許內酒中服之不可逆服至臨月乃可服舊用常驗甘草散令易生母無疾病未生一月日預服過三十日行步動作如故兒生墮地皆不自覺方

甘草 一兩 黄芩 一用茯苓 乾薑 吴茱萸 大麥蘗 各三兩一方用粳米 大豆黄卷 麻子仁 桂心

右八味治下篩酒服方寸匕日三煖水服亦得

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:56
列印頁數：103
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

千金圓主養胎治產難顛倒胞不出服一丸傷毀不下
產餘病汗不出煩滿不止氣逆滿以酒服一丸一名保生丸
甘草 貝母
乾薑 桂心
石斛 石膏 各六銖
右十二味為末蜜和丸如彈子大每服一丸日三用
棗湯下一方用蒲黃一兩
蒸大黃圓治妊娠養胎令易產方
大黃 三十銖蒸 枳實 各八銖 芍藥 十銖
杏仁 各十銖 芎藭 白朮 乾薑 厚朴 各二銖 吳茱萸 一兩
右九味為末蜜丸如梧桐子大空腹酒下二丸日三
不知稍加之
滑胎令易產方
阿膠 八兩 滑石 三兩 車前子 一升
右三味治下篩飲服方寸匕日再至生月乃服藥利

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

九竅不可先服

備急千金要方卷二

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:56
列印頁數：105
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷三

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官庶吉士臣嚴　福

謄録監生臣蔣錦城

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷三

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

婦人方

妊娠諸病第四 方灸法

第一胎動及數墮胎

治妊娠二三月上至八九月胎動不安腹痛已有所見方

欽定四庫全書

艾葉 阿膠

甘草 二兩

阿膠 二兩

芎藭

當歸 青竹茹 各五兩

治妊娠胎動去血腰腹痛方

右五味以水八升煮取三升去滓内膠令消分三服

日三

右四味以水一斗半煮銀二斤取六升去銀内藥煎取二升半内膠令烊分三服不瘥重作一方用甘草

備急千金要方

芎藭 肘後不用 當歸 各三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

二兩

蔥白湯治妊娠胎動不安腹痛方

蔥白 升切 一 阿膠 兩 二 當歸 續斷 芎藭 兩各 三

右五味㕮咀以水一斗先煮銀六七兩取七升去銀內藥煎取二升半下膠令烊分三服不瘥重作

治妊娠胎動晝夜叫呼口噤脣搴及下重痢不息方

艾葉㕮咀以好酒五升煮取四升去滓更煎取一升服口閉者格口灌之藥下即瘥亦治妊娠腰痛及妊娠熱病并妊娠卒下血

旋復花湯治妊娠六七月胎不安常服之方

旋復花 兩 一 半夏 芍藥 生薑 兩各 二 枳實 厚朴 白朮 茯苓 兩各 三

右九味㕮咀以水一斗煮取二升半分五服日三夜二先食服

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:58
列印頁數：108
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治妊娠數墮胎方

取赤小豆為末酒服方寸匕日二亦治妊娠數月月水尚來者

又方妊娠三月灸膝下一寸七壯

第二漏胞方

治妊娠下血如故名曰漏胞胞乾便死方

生地黃半斤㕮咀以清酒三升煮三沸絞去滓服之無時能多服佳 姚大夫加黃雌雞一頭治如食法崔氏取雞血和藥中服

治妊娠血下不止名曰漏胞血盡子死方

乾地黃擣末以三指撮許酒服不過三服瘥

又方生地黃汁一升清酒四合煮三四沸頓服不止頻服

服

又方

乾薑二兩

乾地黃四兩

右二味治下篩以酒服方寸匕日再三服

第三子煩方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

竹瀝湯治妊娠常苦煩悶此是子煩
竹瀝 一升 麥門冬 防風 黄芩 各三兩
茯苓 四兩
右五味以水四升合竹瀝煮取二升分三服不瘥再
又方時時服竹瀝隨多少取瘥止
第四心腹腰痛及脹滿方
治妊娠心痛方
青竹皮一升以酒二升煮三兩沸頓服
又方破生雞子一枚酒和服之
又方
白蜜 三兩 羊脂 八兩 青竹茹 一升
右三味合煎食頃服如棗核大三枚日三
又方燒棗二七枚為末尿服之立愈
又方蜜一升和井底泥泥心下
治妊娠腹中痛方
生地黄三斤擣絞取汁用清酒一升合煎減半頓服

列印日期/時間：02/04/2005 18:39:58
列印頁數：110
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方燒車缸脂内酒中服亦治妊娠欬嗽并産難三日不出

又方取蜜一升頓服良

治妊娠腹中滿痛乂心不得飲食方

黄芩 三兩 芍藥 四兩 白朮 六兩

右三味咬咀以水六升煮取三升分三服半日令藥盡微下水令易生月飲一劑為善也

治妊娠忽苦心腹痛方

燒鹽令赤熱三指撮許酒服之立産

治妊娠傷胎結血心腹痛方

取小兒尿二升頓服之立瘥大良

治妊娠中惡心腹痛方

新生雞子二枚破著杯中以糯米粉和如粥頓服亦治妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不止

又方水三升洗夫靴剔汁温服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治妊娠中盡心腹痛方

燒敗鼓皮酒服方寸匕須臾自呼盡主姓名

治妊娠腰痛方

大豆二升以酒三升煮取二升頓服之亦治常人卒腰痛者

又方

又方麻子三升以水五升煮取汁三升分五服亦治心

鼓二兩

榆白皮三兩

右二味熬濤蜜丸如梧桐子大服二七丸亦治心痛

又方燒牛屎焦末水服方寸匕日三服

又方地黃汁八合酒五合合煎分温服

治妊娠脹滿方

取秤鎚燒之淬酒中服良亦治妊娠卒下血

第五傷寒方

治妊娠傷寒頭痛壯熱肢節煩疼方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

石膏 八兩 大青 一切 黃芩 各三兩 葱白 一切 升

前胡 知母

右七味咬咀以水七升煮取二升半去滓分五服相去如人行七八里久再服

栀子仁 各四兩

治妊娠頭痛壯熱心煩嘔吐不下食方

知母 四兩 生蘆根 一升 青竹茹 三兩 粳米 五合

右四味以水五升煮取二升半稍稍飲之盡更作瘥止

治妊娠傷寒服湯後頭痛壯熱不歇宜用此湯拭其身

麻黃 半斤 竹葉 一切 升 石膏 三升 為末

右三味以水五升煮取一升去滓冷用拭身體又以故布摋頭額胷心燥則易之患瘧者加恒山五兩

治妊娠傷寒方

葱白 十莖 生薑 二兩 切

右二味以水三升煮取一升半頓服取汗

治妊娠中風寒熱腹中絞痛不可鍼灸方

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:00
列印頁數：113
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鯽魚一頭燒作灰擣末酒服方寸匕取汗

治妊娠遭時疾令子不落方

取竈中黃土水和塗臍乾復塗之一方酒和塗方五寸又泔清和塗之並佳

又犬尿泥塗腹勿令乾

治妊娠熱病方

蔥白 五兩
豉 一升

右二味以水六升煮取二升分二服取汗

又方蔥白一把以水三升煮令熟服之取汗食蔥令盡亦主安胎若胎已死者須臾即出

又方車轄脂酒服大良

又方井底泥泥心下三寸立愈

又方青羊屎塗腹上

又方水服伏龍肝一雞子大

治大熱煩悶者方

葛根汁二升分三服如人行五里久進一服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方燒大棗七枚為末酒和服

又方槐實燒灰取方寸匕酒和服

第六癰病方

治妊娠患癰湯方

恒山 二兩 甘草 一兩 黄芩 三兩 烏梅 十四枚

石膏 八兩

右五味㕮咀以酒水各一升半合漬藥一宿煮三四沸去滓初服六合次服四合後服二合凡三服

右四味㕮咀以水六升煮取二升半去滓分三服第一服取未發前一食頃服之第二服取臨欲發服之餘一服用以塗頭額及胷前五心藥滓置頭邊當一日勿近水及進飲食過發後乃進粥食

第七下血方

又方

恒山 竹葉 各三兩 石膏 八兩

粳米 一百粒 崔氏外臺作糯米集驗救急作秫米

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:00
列印頁數：115
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治妊娠忽暴下血數升胎燥不動方

榆白皮 三兩 當歸 生薑 各二兩 乾地黃 四兩

葵子 一升 後不用 一升尅

右五味以水五升煮取二升半分三服不瘥更作服之

馬通湯治妊娠卒驚奔走或從高墮下暴出血數升方

馬通汁 一升 乾地黃 阿膠 各四兩 當歸 艾葉 各三兩

右五味以水五升煮取二升半去滓内馬通汁及膠令烊分三服不瘥重作

膠艾湯

治妊娠二三月上至七八月其人頓仆失跼胎動不下傷損腰腹痛欲死若有所見及胎奔上搶心短氣方

艾葉 三兩 阿膠 芎藭 芍藥 甘草 當歸 各二兩 乾地黃 四兩

右七味㕮咀以水五升好酒三升合煮取三升去滓

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

内膠更上火令盡消分三服日三不瘥更作

治妊娠卒下血方

葵子一升以水五升煮取二升分三服瘥止

又方生地黄切一升以酒五升煮取三升分三服亦治落身後血

又方取葵根莖燒作灰以酒服方寸匕日三

蟹爪湯治妊娠僵仆失據胎動轉上搶心甚者血從口出逆不得息或注上下血一斗五升胎不出子死則寒慄人腹中急如產狀虛乏少氣困頓欲死煩悶反覆服藥母得即安下血亦止其當產者立生方

蟹爪 一升　甘草　桂心 各二尺　阿膠 二兩

右四味㕮咀以東流水一斗煮取三升去滓内膠烊盡能為一服佳不能者食頃再服若口急不能飲者格口灌之藥下便活也與母俱生若胎已死獨母活也若不僵仆平安妊娠無有所見下血服此湯即止或云桂不安胎亦未必爾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治妊娠胎墮下血不止方

丹參十二兩㕮咀以清酒五升煮取三升分三服温

日三

又方地黄汁和代赭為末服方寸匕

又方桑蠹蟲屎燒灰酒服方寸匕

香豉湯治半産下血不盡苦來去煩滿欲死方

香豉一升半以水三升煮三沸漉去滓内成末鹿角

一方寸匕頓服之須臾血自下鹿角燒亦得

第八小便病方 灸法

治妊娠小便不利方

葵子一升 榆白皮一把切

右二味以水五升煮五沸每服一升日三

又方

葵子 茯苓各一兩

右二味為末以水服方寸匕日三小便利則止 仲景云妊娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:01
列印頁數：118
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治妊娠患子淋方

葵子一升以水三升煮取二升分再服

又方葵根一把以水三升煮取二升分再服

治妊娠小便不通利方

蕪菁子七合為末水和服方寸匕日三

治妊娠尿血方

黍穰燒灰酒服方寸匕日三

治婦人無故尿血方

龍骨五兩治下篩酒服方寸匕空腹服日三久者二

十服愈

又方

爪甲　亂髮

右二味並燒末等分酒服方寸匕日三飲服亦得

又方

桂心　鹿角屑　大豆黃卷　各一兩

右三味治下篩酒服方寸匕日三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方取夫爪甲燒作灰酒服之

又方取故船上竹茹曝乾擣末酒服方寸匕日三亦主

遺尿

治婦人遺尿不知出時方

白薇 芍藥 各一兩

右二味治下篩酒服方寸匕日三

又方

礬石 牡蠣 各二兩

右二味治下篩酒服方寸匕亦治丈夫

又方胡薰窠中草燒末酒服半錢匕亦治丈夫

又方燒遺尿人薦草灰服之瘥

又方灸橫骨當陰門七壯

第九下痢方 灸法

治妊娠下痢方

人參 三兩

黃芩 三兩

櫸皮 四兩

酸石榴皮 三兩

粳米 三合

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右五味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

又方白楊皮一斤㕮咀以水一大升煮取二小升分三服

又方燒中衣帶三寸為末服之

治妊娠患膿血赤滯魚腦白滯臍腹絞痛不可忍者方

薤白 一升切 酸石榴皮 黄蘗 各三兩 產寶作黄連 阿膠 二兩 地榆 四兩

又方羊脂如碁子大十枚温酒一升投中頓服之日三

治妊娠注下不止方

作

阿膠 艾葉 酸石榴皮 各二兩

右五味㕮咀以水七升煮取二升半分三服不瘥更

治妊娠及產已寒熱下痢方

右三味以水七升煮取二升去滓内膠令烊分三服

黄連 一升 黄蘗 一斤 梔子 三十枚

右三味㕮咀以水五升漬一宿煮三沸服一升一日

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:03
列印頁數：121
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

一夜令盡嘔者加橘皮一兩生薑二兩亦治丈夫常痢

治婦人欲痢輒先心痛腹脹滿日夜五六十行方

石榴皮 麴 各八兩 黃蘗 一作參蘗 一兩 烏梅

黃連 艾 各一兩 防己 二兩 阿膠

乾薑 各三兩 附子 五兩

右十味為末蜜和丸如梧子大飲服二十丸日三漸加至三十四十丸

治婦人水洩痢方

灸氣海百壯三報

第十水腫方

治妊娠體腫有水氣心腹急滿湯方

茯苓 白朮 各四兩 崔氏無朮 黃芩

杏仁 各三兩 旋復花 二兩

右五味咬咀以水六升煮取二升半分作三服

鯉魚湯治妊娠腹大胎間有水氣方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鯉魚一頭 二斤
白朮 生薑 各五兩
當歸 各三兩
茯苓 四兩
芍藥

右六味㕮咀以水一斗二升先煮魚熟澄清取八升
内藥煎取三升分五服

治妊娠毒腫方

蕪菁根淨洗去皮擣酢和如薄泥勿令有汁猛火煮
根時用子若腫在咽中取汁含咽之

二三沸適性薄腫以帛急裹之日再易寒時温覆非

又方燒□牛屎酢和傅之乾則易亦可服方寸匕日三

治妊娠手脚皆腫攣急方

赤小豆 五升
商陸根 一切

右二味以水三斗煮取一斗稍稍飲之盡更作一方

加澤榛一斤

產難第五 論鍼法 方

論曰產婦雖是穢惡然將痛之時及未產已產並不得
令死喪汚穢家人來視之則生難若已產者則傷兒也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

婦人產乳忌反支月若值此月當在牛皮上若灰上勿令水血污物著物則殺人及浣濯衣水皆以器盛過此忌月乃止

凡生產不依產圖脫有犯觸於後母子皆死若不至死無病子亦易養

即母子俱病庶事皆不稱心若能依圖無所犯觸母即

凡欲產時特忌多人瞻視惟得三二人在傍待總產訖乃可告語諸人也若人衆看視無不難產

凡產婦第一不得忽忽忙怕傍人極須穩審皆不得預緩預急及憂悒憂悒則難產若腹痛眼中火生此兒迴轉未即生也兒出訖一切人及母皆忌問是男是女兒始落地與新汲井水五呷忌與暖湯物勿令母看視穢汚

凡產婦慎食熱藥熱麪食常識此飲食當如人肌溫溫也

凡欲臨產時必先脫尋常所著衣以籠竈頭及竈口令

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

至窓即易産也

凡産難及子死腹中并逆生與胞胎不出諸篇方可通檢用之

治産難或半生或胎不下或子死腹中或著脊及坐草數日不産血氣上搶心母面無顏色氣欲絶者方

醇酒二升　白蜜一升　成煎猪膏一升

右三味合煎取二升分再服不能再服可隨所能服之治産後惡血不除上搶心痛煩急者以地黄汁代醇酒

治難産方

槐枝切二升　榆白皮切二升　大麻仁各一升　瞿麥各三兩　通草三兩　牛膝五兩

右六味㕮咀以水一斗二升煮取三升半分五服

又方吞皂莢子二枚

又方取厠前已用草二七枚燒作屑水調而服之

又方令夫唾婦口中二七過立出

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方鍼兩肩井入一寸寫之須臾即分娩

治產難三日不出方

取鼠頭燒作屑井花水服方寸匕日三

又方車軸脂吞大豆許兩丸

又方燒藥杵令赤內酒中飲之

又方燒大刀鐶以酒一杯沃之頓服即出救死不分娩者

治產難累日氣力乏盡不得生此是宿有病者方

阿膠二兩 赤小豆二升

右二味以水九升煮豆令熟去滓內膠令烊每服五合不覺更服不過三服即出

又方

槐子十枚四 蒲黃一合

右二味合內酒中溫服須臾不生再服之水服亦得

又方

生薑汁 生地黃汁各半升

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:04
列印頁數：126
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味合煎熟頓服之

治產難及日月未足而欲產者方

知母一兩為末蜜丸加兎屎大每服一丸痛不止更

一丸

羚羊角散治產後心悶是血氣上衝心所致

羚羊角一枚燒作灰下篩以東流水服方寸匕若未

瘥須臾再服取悶瘥乃止

又方羖羊角燒作灰以温酒服方寸匕不瘥須臾再進

治產乳運絶方

半夏一兩濤篩丸如大豆内鼻孔中即愈 此是扁鵲法

又方神麴末水服方寸匕亦治產難

又方赤小豆擣為散取東流水服方寸匕不瘥更服

又方含釅醋噀面即愈凡悶即噀之

又方取釅醋和產血如棗許大服之

治心悶方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

產後心悶眼不得開即當頂上取髮如兩指大强以人牽之眼即開

子死腹中第六 方論

論曰凡婦人產難死生之候母面赤舌青者兒死母活母脣口青口兩邊沫出者母子俱死母面青舌赤口中沫出者母死子活

治動胎及產難子死腹中并妊娠兩兒一死一生服之令死者出生者安神驗方

蜥蜴爪一升 甘草二尺 阿膠三兩

右三味以東流水一斗先煮蜥蜴爪甘草得三升去滓次內膠令烊頓服之不能分再服若人困拘口內藥藥入即活煎藥作東向竈用葦薪煮之

真珠湯治胎死腹中方

熟真珠一兩 榆白皮切升

右二味以苦酒三升煮取一升頓服之死胎立出治子死腹中不出方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以牛尿塗母腹上立出

又方取竈下黃土三指撮以酒服之立出土當著兒頭上亦治逆生及橫生不出手足先見者

又方服水銀三兩立出

又方取夫尿二升煮令沸飲之

又方酢二升拗口開灌之

又方吞槐子二七枚亦治逆生

又方三家雞卵各一枚三家鹽各一撮三家水各一升合煮令產婦東向飲之立出

又方瞿麥一斤以水八升煮取二升一服一升不出再服

治胎死腹中乾燥著背方

葵子一升 阿膠五兩

右二味以水五升煮取二升頓服之末出再煮服

治妊娠未足月而胎卒死不出其母欲死方

以苦酒濃煮大豆每服一升死胎立出不能頓服分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

再服一方用醇酒煮大豆亦治積聚成瘕

治妊娠胎死腹中若子生胞衣不出腹中引腰背痛方

甘草一尺 筒桂四寸 香豉二升 雞子一枚 蒲黃二合

右五味以水六升煮取一升頓服之胎胞穢惡盡去大良

治妊娠得病須去胎方

以雞子一枚鹽三指撮和服立下 此與阮河南療難產相同

又方麥蘗一升為末和蜜一升服之立下

又方七月七日神麴三升酢一升煮兩沸宿不食平旦頓服之即下

又方大麥麴五升酒一斗煮三沸去滓分五服令盡當宿勿食其子如糜令母肥盛無疾苦千金不傳

逆生第七 論方

論曰凡產難或兒橫生側生或手足先出可以鍼錐刺兒手足入一二分許兒得痛驚轉即縮自當迴順也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治逆生方

以鹽塗兒足底又可急爪搔之并以鹽摩產婦腹上即愈

又方以鹽和粉塗兒足下即順（子母秘録云以鹽和粉）

又方取梁上塵如彈丸許二枚治末三指撮温酒服之治逆生及横生不出手足先見者方

燒蛇蛻皮為末服一刀圭（亦云三指撮）面向東酒服即順

又方取蟬殼二枚治為末三指撮許温酒服之（崔氏外臺子母秘録作彈丸二枚為末酒服）

手即持丸出神驗

又方取夫陰毛二七莖燒以猪膏和丸如大豆吞之兒即順

又方取蛇蛻皮燒灰猪膏和丸東向服

又方以手中指取釜底墨交畫兒足下即便順生

又方取父名書兒足下即順生

治横生及足先出者方

取梁上塵竈突墨酒服之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方取車缸中脂書兒足下及掌中

治縱橫生不可出者方

菟絲子末酒若米汁服方寸匕即生車前子亦好服

如上法

又方以水苦酒服竈突墨塵

治產時子但趨穀道者方

熬鹽熨之自止

胞胎不出第八 方

牛膝湯治產兒胞衣不出令胞爛方

牛膝 瞿麥 各一兩 當歸 通草 各一兩半

滑石 二兩 一方用桂心二兩 葵子 半升

治產難胞衣不出橫倒者及兒死腹中母氣欲絶方

右六味㕮咀以水九升煮取三升分三服

半夏 二兩 白斂 二兩

右二味治下篩服方寸匕小難一服橫生二服倒生三服兒死四服亦可加代赭瞿麥各二兩為佳

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治胎死腹中若母病欲下之方

取榆白皮細切煮汁三升服之即下難生者亦佳

又方生地黄汁一升苦酒三合令暖服之不能頓服分再服亦得

又方

牛膝 三兩

葵子 一升

右二味以水七升煮取三升分三服

又方

澤蘭葉 三兩

滑石 五合

生麻油 二合

右三味以水一升半煮澤蘭取七合去滓内滑石麻油頓服之立出良

治胞衣不出方

取小麥合小豆煮令濃飲其汁立出亦治横逆生者

又方取瓜瓣二七枚服之立出

又方取水煮弓弩弦飲五合即出亦可燒灰酒和服

又方取宅中所埋柱掘出取坎底當柱下土大如雞子

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

酒和服之良

又方墨三寸為末酒服

又方取蒲黄如棗許以井花水服

又方苦酒服真珠一兩

又方雞子一枚苦酒一合和飲之

又方生男吞小豆七枚生女者十四枚即出

治逆生胎不出方

竈上墨以酒煮一兩沸取汁服

治產後胞不時出方

井底土如雞子中黄以井花水和服立出

又方取井中黄土丸如梧桐子吞之立出又治兒不出

治子死腹中若衣不出欲上搶心方

急取蟻蛭土三升熬令熱囊盛熨心下令胎不得上

又方末竈突中墨三指撮許以水苦酒調服立出當著

兒頭生

搶心良

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方取夫内衣蓋井上立出

又方取炊篩當户前燒服之

下乳第九 方

鍾乳湯治婦人乳無汁方

石鍾乳 一方用滑石 白石脂 各六兩 通草 十二銖

桔梗 半兩切

右五味�mouth以水五升煮三沸三上三下去滓内消石令烊分服

又方

石鍾乳 通草 各等分

右二味為末粥飲服方寸匕日三後可兼養兩兒 通草

橫心者是勿取羊桃根色黃無益 一方二味酒五升漬一宿明旦煮沸去滓服一升日三夏冷服冬温服

又方

石鍾乳 四兩 甘草 二兩一不用 漏蘆 三兩 通草 栝蔞根 五兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:08
列印頁數：135
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服 一云用栝蔞實一枚

又方

石鍾乳 通草 各一兩 漏蘆 半兩 桂心

甘草 栝蔞根 各六銖

右六味治下篩酒服方寸匕日三最驗

又方

石鍾乳 漏蘆 各二兩

右二味治下篩飲服方寸匕即下

漏蘆湯治同前

漏蘆 通草 各二兩 石鍾乳 一兩 黍米 一升

右四味㕮咀米宿漬揩撻取汁三升煮藥三沸去滓

作飲飲之日三

漏蘆散治同前

漏蘆 半兩 石鍾乳 栝蔞根 各一兩 蠐螬 三合

右四味治下篩先食糖水服方寸匕日三

單行石膏湯治同前

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:08
列印頁數：136
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

石膏四兩研以水二升煮三沸稍稍服一日令盡

麥門冬散治同前

麥門冬　通草　理石　石鍾乳

右四味各等分治下篩先食酒服方寸匕日三

又方

麥門冬　通草　理石　石鍾乳

土瓜根　大棗　蠐螬

右七味等分治下篩食畢用酒服方寸匕日三

又方母猪蹄一具粗切以水二斗熟煮得五六升汁飲之不出更作

又方

猪蹄　二枚熟炙搥碎　通草　八兩細切

右二味以清酒一斗浸之稍稍飲盡不出更作　外臺猪蹄

又方

栝蔞根切一升酒四升煮三沸去滓分三服

不炙以水一斗煮取四升入酒四升更煮飲之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

栝蔞根 漏蘆 各三兩
滑石 通草 各二兩
石鍾乳 四兩
白頭翁 一兩

右六味治下篩以酒服方寸匕日三

又方取栝蔞子尚青色大者一枚熟擣以白酒一斗煮取四升去滓溫服一升日三黃色小者用二枚亦好

又方土瓜根治下篩服半錢匕日三乃乳如流水

單行鬼箭湯治同前

鬼箭五兩以水六升煮取四升每服八合日三亦可

燒作灰水服方寸匕日三

甘草散治同前

甘草 一兩 通草 三十銖
石鍾乳 二十兩
屋上散草 二把燒為灰
雲母 二十兩半

右五味治下篩食後溫漏蘆湯服方寸匕日三乳下

又方燒死鼠作屑酒服方寸匕日三立下勿令知

止

又方燒鯉魚頭為末酒服三指撮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)


鯽魚湯下乳汁方

鯽魚 長七寸 豬肪 半斤 漏蘆 石鍾乳 各八兩

右四味切豬肪魚不須洗治清酒一斗二升合煮魚熟藥成絞去滓適寒温分五服其間相去須臾一飲令藥力相及為佳乳即下

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:09
列印頁數：139
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)



欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷五四

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄舉人臣張元功

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷四　唐　孫思邈　撰

婦人方　宋　林億等　校正

虛損第十　論盜汗附方

論曰凡婦人非止臨產須憂至於產後大須將慎危篤之至其在于斯勿以產時無他乃縱心恣意無所不犯時微若秋毫感病廣於嵩岱何則產後之病難治于餘病也婦人產訖五臟虛羸惟得將補不可轉瀉若其有病不須耽藥若行耽藥轉更增虛就中更虛向生路遠所以婦人產後百日以來極須慇懃憂畏勿縱心犯觸及即便行房若有所犯必身反强直猶如角弓反張名曰蓐風則是其犯候也若似角弓命同轉燭凡百女人宜好思之苟或在微不慎戲笑作病一朝困卧控告無所縱多出財寶遍處求醫醫者未必解此縱得醫來大命已去何處追尋學者于此一方大須精熟不得同

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

於常方耳特忌上厠便利宜室中盆上佳

凡產後滿百日乃可合會不爾至死虛羸百病滋長慎之

凡婦人皆患風氣臍下虛冷莫不由此早行房故也

凡產後七日内惡血未盡不可服湯候臍下塊散乃進

羊肉湯有痛甚切者不在此例後三兩日消息可服澤蘭丸比至月滿丸盡為佳不爾虛損不可平復也全極消瘦不可救者服五石澤蘭丸凡在蓐必須服澤蘭丸

補之服法必七日外不得早服也

凡婦人因暑月產乳取涼太多得風冷腹中積聚百病竟起迄至于老百方治不能瘥桃仁煎主之出蓐後服之婦人縱令無病每至秋冬須服一兩劑以至年内常將服之佳

四順理中圓已產訖可服此方

甘草 一兩
人參 白术 乾薑 各一兩

右四味為末蜜和丸如梧子服十丸稍增至二十丸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

新生藏虛此所以養臟氣也

桃仁煎治婦人產後百疾諸氣補益悅澤方

桃仁一千二百枚擣令細熟以上好酒一斗五升研濾三四遍如作麥粥法以極細為佳内長頂瓷瓶中密塞以麵封之内湯中煮一伏時不停火亦勿令火猛使瓶口常出在湯上無令沉没熟訖出温酒服一合日再雖丈夫亦可服之

石斛地黄煎治婦人虛羸短氣胸逆滿悶風氣方

石斛　甘草　桂心 二兩　大黄 八兩　麥門冬 二升　茯苓 一升　紫菀 各四兩　桃仁 半升

生地黄汁　淳酒 各八升

右十味為末於銅器中炭火上熬内鹿角膠一斤耗得一斗次内飴三斤白蜜三升和調更於銅器中釜上煎微耗以生竹攪無令著耗令相得藥成先食酒服如彈子一丸日三不知稍加至二丸

地黄羊脂煎治婦人產後欲令肥白飲食平調方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生地黃汁 一斗 生薑汁 五升 白蜜 各五升 羊脂 二斤

右四味先煎地黃令得五升次内羊脂令煎減半内薑汁復煎令減合蜜著銅器中煎如飴取雞子大一枚投熱酒中服日三

地黃酒治產後百病未產前一月當預釀之產訖蓐中服之方

地黃汁 一升 好麴 好米 各二升

右三味先以地黃汁漬麴令發準家法醞之至熟封七日取清服之常使酒氣相接勿令斷絶慎蒜生冷酢滑猪雞魚一切婦人皆須忌之但夏三月熱不可合春秋冬並得合服地黃并滓内米中炊合用之一石十石一準此一升為率先服羊肉當歸湯三劑乃服之佳

羊肉湯治產後虛羸喘乏自汗出腹中絞痛之方

肥羊肉 三斤去脂 當歸 姚氏用蔥白 桂心 甘草 各二兩

芍藥 三兩子母秘録作豉一升

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生薑 各四兩
乾地黃 五兩

右八味㕮咀以水一斗半先煮肉取七升去肉內餘

藥煮取三升去滓分三服不瘥重作 千金翼有蔥白一斤子母祕録

若胸中微熱加黃芩參門冬各一兩頭痛加石膏一兩中風加防風一兩大便不利加大黃一兩小便難加葵子一兩上氣咳逆加五味子一兩

猪腎湯治產後虛羸喘乏乍寒乍熱病如瘧狀名蓐勞方

猪腎 一具去脂四破若無用羊腎代

香豉 綿裹

白粳米

蔥白 各一兩

右四味以水三斗煮取五升去滓任情服之不瘥更

羊肉黃耆湯治產後虛乏補益方

羊肉 三斤

黃耆 三兩

大棗 三十枚

茯苓

作 廣濟方有人參當歸各二兩為六味

甘草

當歸

桂心

麥門冬

乾地黃

芍藥 各二兩

右十味㕮咀以水二斗煮羊肉取一斗去肉內諸藥

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:12
列印頁數：145
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煎取三升去滓分三服日三

鹿肉湯治產後虛羸勞損補乏方

鹿肉 四斤
乾地黃 甘草 芍藥 黃耆 人參 當歸 大棗 二十枚
麥門冬 茯苓 各三兩
生薑 各二兩
半夏 一升

右十三味㕮咀以水二斗五升煮肉取一斗三升去肉內藥煎取五升去滓分四服日三夜一

羚羊角湯治產後虛乏五勞七傷虛損不足臟腑冷熱不調方

羚羊骨 一具
遠志 黃耆 芍藥 茯苓 一作茯神 厚朴 各三兩
乾薑 防風 當歸 橘皮 甘草 獨活 生薑 各四兩

右十五味㕮咀以水三斗煮羚羊骨取二斗去骨內藥煎取五升去滓分五服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當歸芍藥湯治產後虛損逆害飲食方

當歸 一兩半　芍藥　人參　桂心

生薑　乾地黃　甘草 各一兩　大棗 二十枚

右八味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服日三

杏仁湯治產後虛氣方

杏仁　橘皮　白前　人參 各三兩

麥門冬 二兩　蘇葉　半夏 各一升　桂心 四兩　生薑 十兩

右九味㕮咀以水一斗二升煮取三升半去滓分五服

治婦人產後上氣賁豚氣積勞臟氣不足胸中煩躁關

虛煩第十一　方

薤白湯治產後胷中煩熱逆氣方

薤白　半夏　甘草　人參

知母 各二兩　石膏 四兩　栝蔞根 三兩　麥門冬 半升

右八味㕮咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:13
列印頁數：147
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

日三夜二熱甚即加石膏知母各一兩

竹根湯治產後虛煩方

甘竹根細切一斗五升以水二斗煮取七升去滓内

小麥二升大棗二十枚復煮麥熟三四沸内甘草一

兩麥門冬一升湯成去滓服五合不瘥更服取瘥短

氣亦服之

人參當歸湯治產後煩悶不安方

人參　當歸　麥門冬　乾地黃

桂心各二兩　大棗二十枚　粳米一升　芍藥四兩

淡竹葉三升

右九味㕮咀以水一斗二升先煮竹葉及米取八升

去滓内藥煮取三升去滓分三服若煩悶不安者當

取豉一升以水三斗煮取一升盡服之甚良

甘竹茹湯治產後内虛煩熱短氣方

甘竹茹一升　人參　茯苓　甘草各一兩　黃芩三兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:13
列印頁數：148
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右五味㕮咀以水六升煮取二升去滓分三服日三

知母湯治產後乍寒乍熱通身温壯胸心煩悶方

知母 三兩 芍藥 甘草 各一兩 黄芩 各二兩 桂心

右五味㕮咀以水五升煮取二升半分三服一方不

竹葉湯治產後心中煩悶不解方

生淡竹葉 麥門冬 各一升 甘草 二兩 生薑

用桂心加生地黄

茯苓 各三兩 大棗 十四枚 小麥 三合

右七味㕮咀以水一斗先煮竹葉小麥取八升内諸

藥煮取三升去滓分三服若心中虚悸者加人參二

兩其人食少無穀氣者加粳米五合氣逆者加半夏

淡竹茹湯治產後虚煩頭痛短氣欲絶心中悶亂不解

方

二兩

生淡竹茹 一升 麥門冬 小麥 各五合 甘草 一兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:13
列印頁數：149
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生薑 三兩 產寶 用乾葛

大棗 十四枚 產寶 用石膏三兩

右六味㕮咀以水一斗煮竹茹小麥取八升去滓乃内諸藥煮取二升去滓分二服贏人分作三服若有人參入一兩若無人參内茯苓一兩半亦佳人參茯苓皆治心煩悶及心虛驚悸安定精神有則為良無自依方服一劑不瘥更作若氣逆者加半夏二兩

赤小豆散治產後煩悶不能食虛滿方

赤小豆三七枚燒作末以冷水和頓服之良

蒲黄散治產後煩悶方

蒲黄以東流水和方寸匕服極良

蜀漆湯治產後虛熱往來心胷煩滿骨節疼痛及頭痛壯熱晡時輒甚又如微瘧方

蜀漆葉 桂心 甘草 黄芩 各一兩

黄耆 五兩 知母 芍藥 各二兩 生地黄 一斤

右八味㕮咀以水一斗煮取三升分三服治寒熱不傷人

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:14
列印頁數：150
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芍藥湯治產後虛熱頭痛方

白芍藥　乾地黃　牡蠣各五兩　桂心三兩

右四味㕮咀以水一斗煮取二升半去滓分三服日三此湯不傷損人無毒亦治腹中拘急痛若通身發熱加黃芩二兩

中風第十二方論

論曰凡產後角弓反張及諸風病不得用毒藥惟宜單行一兩味亦不得大發汗特忌轉瀉吐利必死無疑大豆紫湯治產後百病及中風癉瘂或背强口噤或但煩熱苦渴或頭身皆重或身癢劇者嘔逆直視此皆因虛風冷濕及勞傷所為驗方

大豆五升　清酒一斗

右二味以鐵鍱猛火熬豆令極熱焦煙出以酒沃之去滓服一升日夜數服服盡更合小汗則愈一以去風二則消血結如娠傷折胎死在腹中三日服此

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

酒即瘥

獨活紫湯治產後百日中風瘛口噤不開并治血氣痛勞傷補腎方

獨活一斤　大豆五升　舊酒一斗三升

右三味先以酒漬獨活再宿若急須微火煮之令減三升去滓別熬大豆極焦使煙出以獨活酒沃之去豆服一升日三夜二

小獨活湯治如前狀方

獨活八兩　葛根　生薑各六兩　甘草二兩

右四味㕮咀以水九升煮取三升去滓分四服微汗佳

甘草湯治在蓐中風背强不得轉動名曰風瘛方

甘草　乾地黃　麥門冬　麻黃各二兩

葛根半斤　栝蔞根　芎藭　黃芩各三兩　杏仁五十枚

右九味㕮咀以水一斗五升酒五斤合煮葛根取八

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

升去滓内諸藥煮取三升去滓分再服一劑不瘥更合良千金翼崔氏有前胡三兩

獨活湯治產後中風口噤不能言方

獨活生薑各五兩 防風秦艽 桂心白朮 甘草當歸 附子各二兩 葛根三兩 防己一兩

右十一味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服

雞糞酒治產後中風及百病并男子中一切風神效方

雞糞一升熬令黃 烏豆一升熬令聲絶勿焦

右二味以清酒三升半先淋雞糞次淋豆取汁一服一升温服取汗病重者凡四五日服之無不愈

竹葉湯治產後中風發熱面正赤喘氣頭痛之方

淡竹葉一握 葛根三兩 防風二兩 桔梗 桂心各一兩 大附子一枚 甘草 人參 甘草 生薑五兩 大棗十五枚

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:15
列印頁數：153
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十味㕮咀以水一斗煮取二升半去滓分三服日三温覆使汗出若頸項强者用大附子若嘔者加半夏四兩

防風湯治產後中風背急短氣方 千金翼作裏急短氣

防風 獨活 葛根 各五兩 當歸 芍藥 人參 甘草 乾薑 各二兩

右八味㕮咀以水九斗煮取三升去滓分三服日三

鹿肉湯治產後風虛頭痛壯熱言語邪僻方

鹿肉 三斤 芍藥 獨活 秦艽 各三兩 黄芩 黄耆 各三兩 半夏 一升 乾地黄 桂心 芎藭 各二兩 生薑 六兩 甘草 阿膠 各一兩 茯苓 千金翼作茯神 人參 各四兩

右十五味㕮咀以水二斗煮肉得一斗二升去肉内藥煎取三升去滓内膠令烊分四服日三夜一

獨活酒治產後中風方

獨活 一斤 桂心 三兩 秦艽 五兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右三味㕮咀以酒一斗半漬三日飲五合稍加至一升不能多飲隨性服

大豆湯治產後卒中風發病倒悶不知人及娠娠挾風兼治在蓐諸疾方

大豆 五升 令微焦 炒
葛根 獨活 各八兩
防己 六兩

右四味㕮咀以酒一斗二升煮豆取八升去滓内藥煮取四升去滓分六服而日四夜二

五石湯治產後卒中風發疾口噤倒悶吐沫瘈瘲眩冒不知人及濕痺緩弱身體瘀娠娠百病方

紫后英 三兩
鍾乳
赤石脂
石膏
獨活 三兩
葛根 四兩
桂心
防己
當歸
乾薑 各二兩
白术
甘草
栝蔞根
芎藭
白石英
牡蠣
人參
黄芩

右十八味末五石㕮咀諸藥以水一斗四升煮取三升半分五服日三夜二一方有滑石寒水石各二兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

棗二十枚
四石湯治產後卒中風發疾口噤瘈瘲悶滿不知人并
緩急諸風毒痺身體瘇強及挾胎中風婦人百病方
紫石英 白石英 赤石脂 各三兩
獨活 生薑 各六兩
芎藭 甘草 各二兩
五服
右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升半去滓分
小柴胡湯治婦人在蓐得風蓋四肢苦煩熱皆自發露
所為若頭不痛但煩熱與三物黃芩湯頭痛與小柴胡
湯方
柴胡 半斤
生薑 二兩
大棗 十二枚
半夏 半升
黃芩 各三兩
人參 甘草 各二兩
三物黃芩湯方
升日三服
右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去滓每服一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃芩 苦參 各二兩 乾地黃 四兩

右㕮咀以水八升煮取二升去滓適寒温服一升日二多吐下蟲

甘草湯治產後腹中傷絶寒熱恍惚狂言見鬼此病中風内絶藏氣虛所為方

甘草 芍藥 各五兩 羊肉 三斤

通草 三兩 產寶用當歸

右四味㕮咀以水一斗六升煮肉取一斗去肉内藥煮取六升去滓分五服日三夜二

羊肉湯治產後中風久絶不產月水不利乍赤乍白及男子虛勞冷盛方

羊肉 三斤 成籌大蒜 去皮切 香豉 各三升

右三味以水一斗三升煮取五升去滓内酥一升更煮取三升分温三服

葛根湯治產後中風口噤瘛瘲氣息迫急眩冒困頓并產後諸疾方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

葛根 生薑 各六兩
甘草 桂心 茯苓 石膏
人參 白术 芎藭 防風 各二兩
右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服日三

防風酒治產後中風方
防風 獨活 各一斤
茵芋 一兩 石斛 五兩
右六味㕮咀以酒二斗漬三宿初服一合稍加至三四合日三

木防己膏治產後中風方
木防己 半斤
茵芋 五兩
右二味㕮咀以苦酒九升漬一宿猪膏四升煎三上三下膏成炙手摩千遍瘥

治產後中柔風舉體疼痛自汗出者及餘百疾方
獨活 八兩
當歸 四兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:17
列印頁數：158
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味咬咀以酒八升煮取四升去滓分四服日三夜一取微汗 葛氏單用獨活小品加當歸若上氣者加桂心二兩不瘥更作

浴湯治產後中風流腫方

鹽五升熬令赤 雞毛一把燒作灰

右二味以水一石煮鹽作湯內雞毛灰著湯中適冷暖以浴大良又浴婦人陰冷腫痛凡風腫面欲裂破者以紫湯一服瘥神效 紫湯是炒黑豆作者

治產後中風頭面手臂通滿方

大豆三升以水六升煮取一升半去豆澄清更煎取一升內白朮八兩附子三兩獨活三兩生薑八兩添水一斗煎取五升內好酒五升合煎取五升去滓分五服日三夜一間粥頻服三劑

茯神湯治產後忽苦心中衝悸或志意不定恍恍惚惚言語錯謬心虛所致方

茯神四兩 人參 甘草 當歸 桂心各二兩

茯苓各三兩 芍藥 生薑八兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:17
列印頁數：159
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大棗 三十枚

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三夜一良

遠志湯治產後忽苦心中衝悸不定志意不安言語錯誤惚惚憒憒情不自覺方

遠志 麥門冬 人參 甘草 當歸 桂心 各二兩 芍藥 一兩 茯苓 五兩 生薑 六兩 大棗 二十枚

右十味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三

贏者分四服產後得此正是心虛所致無當歸用芍

薤若其人心胷逆氣加半夏三兩

茯苓湯治產後暴苦心悸不定言語錯謬恍恍惚惚心

中憒憒此皆心虛所致方

茯苓 五兩 甘草 芍藥 桂心 當歸 各三兩 生薑 六兩 麥門冬 一斤 大棗 三十枚

右八味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

無當歸可用芎藭若苦心志不定加人參二兩亦可
内遠志二兩若苦煩悶短氣加生竹葉一升先以水
一斗三升煮竹葉取一斗内藥若有微風加獨活三
兩麻黄二兩桂心二兩用水一斗五升若頸項苦急
背膊强者加獨活葛根各三兩麻黄桂心各二兩生
薑八兩用水一斗半
安心湯治產後心衝悸不定恍恍惚惚不自知覺言語
錯誤虚煩短氣志意不定此是心虚所致方
遠志 甘草各二兩 人參 茯神 當歸 芍藥各三兩 麥門冬一升 大棗三十枚
右八味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三
若苦虚煩短氣者加淡竹葉二升水一斗二升煮竹
葉取一斗内藥若胸中少氣者亦甘草為三兩善
甘草圓治產後心虚不足虚悸心神不安吸吸乏氣或
若恍恍惚惚不自知覺者方
甘草 遠志 葛蒲各三兩 人參

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麥門冬　乾薑
桂心　各一兩　大棗　五十枚　茯苓　各二兩　澤瀉

右十味為末蜜丸如大豆酒服二十丸日四五服夜再服不知稍加若無澤瀉以白朮代之若胸中冷增人參圓治產後大虛心悸志意不安不自覺恍惚恐畏夜不得眠虛煩少氣方

乾薑
人參　甘草　茯苓　各三兩　麥門冬　桂心　一兩　大棗　五十枚　菖蒲　澤瀉　薯蕷　乾薑　各二兩

右十味為末以蜜棗膏和丸如梧子未食酒服二十丸日三夜一不知稍增若有遠志內二兩為善若風氣內當歸獨活三兩亦治男子虛損心悸

大遠志圓治產後心虛不足心下驚悸志意不安恍恍惚惚腹中拘急痛夜卧不安胸中吸吸少氣內補傷損益氣安定心神亦治虛損方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

遠志　甘草　乾地黄　桂心
茯苓　麥門冬　人參　當歸
白朮　澤瀉　獨活　葛蒲 各三兩
薯蕷　阿膠 各二兩　乾薑 四兩

乳三兩為善

心腹痛第十三 方

三不知稍增至五十丸若大虛身體冷少津液加鍾
右十五味為末蜜和如大豆未食温酒服二十丸日

蜀椒湯治產後心痛此大寒冷所為方

蜀椒 二合　芍藥　當歸　半夏
甘草　桂心　人參　茯苓 各二兩
蜜 一升　生薑汁 五合

右十味㕮咀以水九升煮椒令沸然後内諸藥煮取
二升半去滓内薑汁及蜜煎取三升一服五合漸加
至六合禁勿冷食

大巖蜜湯治產後心痛方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾地黃 當歸 獨活 甘草 芍藥 桂心 細辛 小草 各二兩 吳茱萸 升一 乾薑 三兩 右十味咬咀以水九升煮取三升内蜜五合重煮分三服日三 胡洽不用獨活桂心小草千金翼不用蜜

乾地黃湯治産後兩膂滿痛兼除百病方

乾地黃 芍藥 各三兩 當歸 蒲黃 各二兩 生薑 五兩 桂心 六兩 甘草 一兩 大棗 二十枚 右八味咬咀以水一斗煮取二升半去滓分服日三

芍藥湯治産後苦腹少痛方

芍藥 六兩 桂心 生薑 各三兩 甘草 二兩 膠飴 八兩 大棗 十二枚 右六味咬咀以水七升煮取四升去滓内膠飴令烊

當歸湯治婦人寒疝虛勞不足若産後腹中絞痛方

當歸 芍藥 各二兩 子母秘録作甘草 生薑 五兩 分三服日三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

羊肉一斤
右四味㕮咀以水八升煮羊肉熟取汁煎藥得三升適寒温服七合日三金匱要畧胡洽不用芍藥名小羊肉湯

桃仁芍藥湯治產後腹中疾痛方

桃仁半升　芍藥　當歸　芎藭　甘草各二兩　乾漆　桂心

右七味㕮咀以水八升煮取三升分三服

羊肉湯治產後及傷寒大虛上氣腹痛兼微風方

乾薑各三兩　甘草　獨活　桂心

人參各二兩　麥門冬七合　生地黃五兩　大棗十二枚

右十一味㕮咀以水二斗煮肉取一斗去肉内藥煮取二升半分四服日三夜一千金翼無乾薑

羊肉當歸湯治產後腹中心下切痛不能食往來寒熱若中風乏氣力方

羊肉三斤　當歸　黃芩附後用黃者　芎藭

肥羊肉二斤無羊肉用麞鹿肉代　茯苓　黃耆

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

防風 附後用 人參 甘草 各二兩 芍藥 三兩 生薑 四兩

右八味㕮咀以水一斗二升先煮肉熟減半内餘藥

取三升去滓分三服日三 胡洽以黄耆代黄芩白朮代芍藥名大羊肉湯子母

祕録以桂心代防風加大棗十七枚良

羊肉杜仲湯治産後腰痛欬喘方

羊肉 四斤 杜仲 紫菀 當歸

欬冬花 人參 厚朴 芎藭

桂心 白朮 各三兩 五味子 細辛

生薑 八兩 大棗 三十枚 附子 蓽薢 甘草 黄耆 各二兩

右十八味㕮咀以水二斗半煮肉取汁一斗五升去

肉内藥煎取三升半去滓分五服日三夜二

羊肉生地黄湯治産後三日腹痛補中益藏强氣力消

血方

甘草

羊肉 三斤 生地黄 切二升 桂心 當歸

芎藭

人參 各二兩 芍藥 三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右八味㕮咀以水二斗煮肉取一斗去肉内藥煎取三升分四服日三夜一

内補當歸建中湯治產後虚羸不足腹中□痛不止吸吸少氣或苦小腹拘急痛引腰背不能飲食產後一月日得服四五劑為善令人力壯方

當歸 四兩　芍藥 五兩　甘草 二兩　生薑 六兩　桂心 三兩　大棗 十八枚

右六味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服一日令盡若大虚内飴糖六兩作湯成内之于火上飴消若無生薑則以乾薑三兩代之若其人去血過多崩傷過多虚竭腹中絞痛方

芎藭 乾地黄 各四兩　芍藥 五兩　桂心 二兩　甘草 三兩　大棗 四十枚

内補芎藭湯治婦人產後虚羸及崩傷過多虚竭腹中

去滓内阿膠若無當歸以芎藭代之

傷内竭不止加地黄六兩阿膠二兩合八種作湯或

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:20
列印頁數：167
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右七味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服
日三不瘥復作至三劑若有寒苦微下加附子三兩
治婦人虛羸少氣傷絶腹中拘急痛崩傷虛竭面目
無色及唾吐血甚良
大補中當歸湯治産後虛損不足腹中拘急或溺血少
腹苦痛或從高墮下犯内及金瘡血多内傷男子亦宜
服之方
當歸 續斷 桂心 芎藭

乾薑 麥門冬 各三兩 芍藥 四兩 吳茱萸 一升
乾地黄 六兩 甘草 白芷 各二兩 大棗 四十枚
右十二味㕮咀以酒一斗漬藥一宿明旦以水一斗
合煮取五升去滓分五服日三夜二有黄者入二兩
益佳
桂心酒治産後瘀痛及卒心腹痛方
桂心三兩以酒三升煮取二升去滓分三服日三
生牛膝酒治産後腹中苦痛方

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:21
列印頁數：168
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生牛膝根五兩以酒五升煮取二升分二服若用乾牛膝根以酒漬之一宿然後可煮

治產後腹中如弦常堅痛無聊賴方

當歸末二方寸匕內蜜一升煎之適寒温頓服

吳茱萸湯治婦人先有寒冷胸滿痛或心腹刺痛或嘔吐食少或腫或寒或下痢氣息綿慞欲絶產後益劇皆主之方

吳茱萸 二兩　防風　桔梗　乾薑

甘草　細辛　當歸 各十二銖　乾地黃 十八銖

右八味㕮咀以水四升煮取一升半去滓分再服

蒲黃湯治產後餘疾胸中少氣腹痛頭疼餘血未盡除腹中脹滿欲死方

蒲黃　生地黃 各五兩　芍藥　桂心 各一兩　硼硝 二兩　桃仁 二十枚　大棗 十五枚

右八味㕮咀以水九升煮取二升半去滓內芒硝分三服日三良驗

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

敗醬湯治產後疹痛引腰腹中如錐刀所刺之方

敗醬 三兩 桂心 芎藭 各一兩半 當歸 一兩

右四味㕮咀以清酒二升水四升微火煮取二升去滓適寒温服七合日三食前服之 千金翼只用敗醬一味

芎藭湯治產後腹痛方

芎藭 甘草 各二兩 蒲黃 女萎 各一兩半

桃仁 黃耆 作黃芩 千金翼各三十鉢 當歸 十八兩 桂心 各一兩 生地黃 一升 前胡 各一兩

芍藥 大黃 各三十鉢

分四服日三夜一

右十二味㕮咀以水一斗酒二升合煮取三升去滓

獨活湯治產後腹痛引腰背拘急痛方

獨活 當歸 桂心 芍藥 生薑 各三兩 甘草 二兩 大棗 二十枚

右七味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服服後相去如人行十里久再進

芍藥黃耆湯治產後心腹痛方

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:21
列印頁數：170
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芍藥 四兩　黃耆　白芷　桂心
生薑　人參　芎藭　當歸
乾地黃　甘草 各二兩　茯苓 三兩　大棗 十枚
右十二味㕮咀以酒水各五升合煮取三升去滓先食服一升日三 千金翼無人參當歸芎藭地黃茯苓為七味
治產後腹脹痛不可忍者方
煮黍粘根為飲一服即愈
治婦人心痛方
布裹鹽如彈丸燒作灰酒服愈
又方燒秤錘投酒中服亦佳
又方炒大豆投酒中服佳

備急千金要方卷四

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:22
列印頁數：171
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷五

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

婦人方

惡露第十四 方

乾地黃湯治產後惡露不盡除諸疾補不足之方

乾地黃三兩 芎藭 桂心 黃耆

當歸各二兩 人參 防風 茯苓

欽定四庫全書 備急千金要方

細辛 芍藥 甘草各一兩

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日

再夜一

桃仁湯治產後往來寒熱惡露不盡方

桃仁五兩 吳茱萸二升 黃耆 當歸

芍藥三兩各 生薑 醍醐百鍊酥 柴胡各八兩

右八味㕮咀以酒一斗水二升合煮取三升去滓適

寒温先食服一升日三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

澤蘭湯治產後惡露不盡腹痛不除小腹急痛痛引腰背少氣力方

澤蘭 當歸 各二兩 生地黃 一兩半 甘草 三兩 生薑 芍藥 一兩 大棗 十枚

右七味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服日三

甘草湯治產乳餘血不盡逆搶心胸手足逆冷脹乾腹脹短氣方

甘草 芍藥 桂心 阿膠 各三兩 大黃 四兩

墮身欲死服亦瘥

右五味㕮咀以東流水一斗煮取三升去滓内阿膠令烊分三服一服入腹中面即有顏色一日一夜盡此三升即下腹中惡血一二升立瘥當養之如新產者

大黃湯治產後惡露不盡方

大黃 當歸 甘草 生薑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

牡丹　芍藥　各三兩　吳茱萸　一升

右七味㕮咀以水一斗煮取四升去滓分四服一日令盡加人參二兩名人參大黃湯

柴胡湯治產後往來寒熱惡露不盡方

柴胡　生薑　各八兩　桃仁　五十枚　當歸　芍藥　各三兩　吳茱萸　二升

黃耆

右七味㕮咀以水一斗三升煮取三升去滓先食服一升日三　千金翼以清酒一斗煮

蒲黃湯治產後餘疾有積盡不去腹大短氣不得飲食上衝胷脅時時煩憒逆滿手足悁疼胃中結熱方

蒲黃　半兩　大黃　芒硝　甘草　黃芩　各一兩　大棗　三十枚

右六味㕮咀以水五升煮取一升清朝服至日中下若不止進冷粥半盞即止若不下與少熱飲自下人羸者半之　千金翼名大黃湯而不用芒硝

銅鏡鼻湯治產後餘疾惡露不除積聚作病血氣結搏

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:23
列印頁數：174
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

心腹疼痛方

銅鏡鼻十八銖燒末 大黃二兩半 芍藥

乾地黃 芎藭 乾漆 芒硝各二兩

亂髮雞子大燒 棗三十枚

右九味㕮咀以水七升煮取二升二合去滓內髮灰

鏡鼻末分三服

小銅鏡鼻湯治如前狀方

銅鏡鼻十銖燒末 大黃 甘草 黃芩

右七味㕮咀以酒六升煮取三升去滓內鏡鼻末分

三服亦治遁尸心腹及三十六尸疾

梔子湯治產後兒生處空流血不盡小腹絞痛方

梔子三十枚以水一斗煮取六升內當歸芍藥各二

兩蜜五合生薑五兩羊脂一兩於梔子汁中煎取二

升分三服日三

生地黃湯治產後三日至七日腹中餘血未盡絞痛强

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

滿氣息不通方

生地黃 五兩 生薑 三兩 大黃 芍藥 茯苓 細辛 各一兩 桂心 當歸 甘草 黃芩 各一兩半 大棗 二十枚

右十一味㕮咀以水八升煮取二升半去滓分三服日三

大黃乾漆湯治新產後有血腹中切痛方

大黃 乾漆 乾地黃 桂心

右五味㕮咀以水三升清酒五升煮取三升去滓温服一升不瘥明旦服一升滿三服病無不瘥方

乾薑 各二兩

麻子酒治產後血不去方

麻子五升擣以酒一斗漬一宿明旦去滓温服一升瘥

先食服不瘥夜服一升不吐下忌房事一月將養如初產法

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

升麻湯治產後惡物不盡或經一月半歲一歲方

升麻三兩以清酒五升煮取二升去滓分再服當吐下惡物勿怪良

治產後惡血不盡腹中絞刺痛不可忍方

大黃 黃芩 桃仁 各三兩 桂心 甘草 當歸 各二兩 芍藥 四兩 生地黃 六兩

右八味㕮咀以水九升煮取二升半去滓食前分三服

治產後漏血不止方

露蜂房 敗船茹

右二味等分作灰取酪若漿服方寸匕日三

又方

大黃 三兩 芒硝 一兩 桃仁 水蛭 蝱蟲 各十枚 甘草 當歸 各二兩 蠐螬 四十枚

右八味㕮咀以水三升酒一升合煮取三升去滓分

三服當下血

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:24
列印頁數：177
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方

桂心 蠐螬 各二兩 栝蔞根 牡丹 各三兩

豉一升

右五味咬咀以水八升煮取三升去滓分三服

治產後血不可止者方

乾葛蒲三兩以清酒五升漬煮取三升分再服即止

治產後惡血不除四體並惡方

續骨木二十兩破如算子大以水一斗煮取三升分

三服相去如人行十里久間食粥或小便數或惡血下即瘥此木得三遍煮

治產後下血不盡煩悶腹痛方

羚羊角 燒成灰 刮取三兩

枳實 一兩細切 熬令黃

芍藥 二兩熬 令黃

右三味治下篩煮水作湯服方寸匕日再夜一稍加至二匕

又方鹿角燒成灰擣篩煮豉汁服方寸匕日三夜再稍

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

加至二匕不能用豉清煮水作湯服之

又方擣生藕取汁飲二升甚驗

又方生地黃汁一升酒三合和溫頓服之

又方赤小豆擣散取東流水和服方寸匕不瘥更服

治產後血瘕痛方

古鐵一斤秤鎚斧頭鐵杵亦得炭火燒令赤内酒五升中稍稍服之神妙

治婦人血瘕心腹積聚乳餘疾絶生小腹堅滿貫臍中

熱腰背痛小便不利大便難不下食有伏蟲臚脹癰疽腫久寒留熱胃管有邪氣方

半夏 一兩 六銖 石膏 藜蘆 牡蒙

薤蓉 各十八銖 桂心

巴豆 六十枚 研如膏

右九味為末蜜丸如小豆服二丸日三及治男子疝病

治婦人血瘕痛方

乾薑 各一兩 烏喙 半兩

乾薑 烏賊魚骨 各一兩
右二味治下篩酒服方寸匕日三
又方末桂心溫酒服方寸匕日三
下痢第十五 方
膠蠟湯治產後三日内下諸雜五色痢方
阿膠 黄蘗 各一兩 蠟 如棊子三箇 當歸 一兩半
黄連 二兩 陳廩米 一升
右六味㕮咀以水八升煮米蟹目沸去米内藥煮取二升去滓内膠蠟令烊分四服一日令盡
桂蜜湯治產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時下血方
桂心 甘草 各二兩 乾薑 二兩 附子 一兩
蜜 一升 當歸 三兩 赤石脂 十兩
右七味㕮咀以水六升煮取三升去滓内蜜煎一兩沸分三服日三
治產後下赤白腹中絞痛湯方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芍藥 乾地黃 各五兩 甘草 阿膠 各二兩

艾葉 當歸 各二兩

右六味㕮咀以水七升煮取二升半去滓内膠令烊分三服

治產後赤白下久不斷身面悉腫方

大豆 微熬 小麥 各一升半

右四味以水九升煮取三升去滓分三服此方神驗亦可以水五升酒一斗煎取四升分四服

治產後痢赤白心腹刺痛方

薤白一兩 當歸二兩 酸石榴皮三兩 地榆根四兩

右五味㕮咀以水六升煮取二升半去滓分三服必効

方加厚朴一兩阿膠人參甘草黃連各一兩半

粳米 五合

當歸湯治產後下痢赤白腹痛方

當歸 龍骨 各三兩 乾薑 白术 各二兩

芎藭 二兩半 甘草 白艾 熟者 附子 各一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右八味㕮咀以水六升煮取二升去滓分三服一日令盡

白頭翁湯治產後下痢兼虛極方

白頭翁　阿膠　秦皮　黃連　甘草 各二兩　黃蘗 三兩

右六味㕮咀以水七升煮取二升半去滓內膠令烊分三服日三

鼈甲湯治產後早起中風冷泄痢及帶下方

鼈甲 如手大　當歸　黃連　乾薑 各二兩　黃蘗 長一尺廣三寸　千金翼加白頭翁一兩

右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服日三

龍骨圓治產後虛冷下血及穀下晝夜無數兼治產後惡露不斷方

龍骨 四兩　乾薑　甘草　桂心 各二兩

右四味為末蜜和暖酒服二十丸如梧子日三一方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用人參地黃各二兩

阿膠圓治產後虛冷洞下心腹絞痛兼泄瀉不止方

阿膠 四兩
人參
甘草 龍骨
桂心
乾地黃
白术
黃連
當歸
附子 各二兩
右十味為末蜜丸如梧子温酒服二十丸日三

澤蘭湯治產後餘疾寒下凍膿裹急胸脇滿痛欬嗽嘔血寒熱小便赤黃大便不利方

澤蘭 石膏 各四十二銖
厚朴 各八十銖
遠志 三十銖
藁本 各五十銖
芎藭 各十二銖
當歸
甘草
乾薑
人參
桔梗 各十二銖
乾地黃
白术
蜀椒
白芷
栢子仁
防風
山茱萸
細辛 各九銖
桑白皮
麻子仁 各半升
右二十一味咬咀以水一斗五升先内桑白皮煮取七升半去之内諸藥煮取三升五合去滓分三服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾地黄湯治産後下痢方

乾地黄 二兩　白頭翁 黄連 各一兩　蜜蠟 一方寸

阿膠 如手掌大一枚

右五味咬咀以水五升煮取二升半去滓内膠蠟令烊分三服日三 千金翼用乾薑一兩

生地黄湯治産後忽著寒熱下痢方

生地黄 五兩　甘草 黄連 桂心 各一兩　大棗 二十枚　赤石脂 二兩　淡竹葉 二升一作竹皮

右七味咬咀以水一斗煮竹葉取七升去滓内藥煮取二升半分三服日三

藍青圓治産後下痢方

藍青 熬　附子 鬼白 蜀椒 各一兩半　厚朴 阿膠 甘草 各二兩　艾葉 當歸 各三兩　黄蘗 龍骨 黄連 各一兩　茯苓 人參 各一兩

右十四味為末蜜和丸如梧子每服二十丸空腹飲

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下一方用赤石脂四兩

赤石脂圓治產後虛冷下痢方

赤石脂 三兩　白朮　黃連

當歸　乾薑　秦皮

附子 各一兩　甘草 各二兩　蜀椒

右九味為末蜜和丸如梧子酒服二十丸日三千金翼作散空腹飲服方寸匕

赤散治產後下痢方

赤石脂　代赭 各三兩　桂心 一兩

右三味治下篩酒服方寸匕日三十日愈

黑散治產後下痢方

麻黃　貫衆　桂心 各一兩　甘草

乾漆 各三兩　細辛 二兩

右六味治下篩酒服五撮日再五日愈麥粥下尤佳

黃散治產後下痢方

黃連 二兩　黃芩　蜚蟲　乾地黃 各一兩

右四味治下篩酒服方寸匕日三十日愈

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:27
列印頁數：185
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

龍骨散治產後痢方

五色龍骨　代赭　赤石脂

黃蘗根皮　蜜炙令焦　各一兩半　黃連　二兩

艾　各二兩

右六味治下篩飲服方寸匕日三

淋渴第十六

栝蔞湯治產後小便數兼渴方

栝蔞根　麥門冬　甘草　黃連　各二兩

人參　生薑　各三兩

大棗　十五枚　桑螵蛸　二十枚

栝蔞根　四兩　人參

乾地黃　各二兩　大棗　二十枚　土瓜根　五兩崔氏用蘆根

麥門冬　各三兩　甘草　崔氏不用

又方治產後渴不止方

右八味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升分六服

雞胵胻湯治產後小便數方

雞胵胻　二具　雞腸　三具洗　乾地黃　當歸　厚朴　人參　各三兩

甘草　各二兩　麻黃　四兩

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生薑 五兩
大棗 二十枚
右十味㕮咀以水一斗煮胇脛及腸大棗取七升去滓內諸藥煎取三升半分三服
治婦人結氣成淋小便引痛上至小腹或時溺血或如豆汁或如膠飴每發欲死食不生肌面目萎黃師所不能治方
具齒 四枚燒作末
葵子 一升
石膏 五兩碎
滑石 二兩末
右四味以水七升煮二物取二升去滓內二末及猪脂一合更煎三沸分三服日三不瘥再合服
石韋湯治產後卒淋氣淋血淋石淋方
石韋 黃芩 通草 各二兩
甘草 二兩
榆皮 五兩
大棗 三十枚
葵子 二升
生薑 各三兩
右九味㕮咀以水八升煮取一升半分三服 集驗無甘草生薑崔氏同產寶不用薑棗
葵根湯治產後淋瀝方
葵根 二兩
車前子
亂髮 燒灰
大黃

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:28
列印頁數：187
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桂心 滑石 兩各一 通草 三兩 生薑 六兩

冬瓜練 七合作汁

右九味㕮咀以水七升煮取二升半分三服 千金翼不用冬瓜練

茅根湯治產後淋方

白茅根 一斤 瞿麥 人參 各二兩 生薑 三兩

鯉魚齒 一百枚

右九味㕮咀以水一斗煮取二升半分三服

茯苓 各四兩 地脈 桃膠 甘草 各一兩

滑石散治產後淋方

滑石 五兩 通草 車前子 葵子 各四兩

右四味治下篩酢漿水服方寸匕稍加至二匕

竹葉湯治產後虛渴少氣力方

竹葉 三升 生薑 半夏 各三兩 大棗 十四枚

小麥 五合 甘草 茯苓 人參 各一兩

麥門冬 五兩

右九味㕮咀以水九升煮竹葉小麥取七升去滓内

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:28
列印頁數：188
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

諸藥更煎取二升半一服五合日三夜一

雜治第十七方 灸法

治婦人勞氣食氣胃滿吐逆其病頭重結痛小便赤黃大下氣方

烏頭 黃芩 大黃 八兩 戎鹽 一兩半 苦參 各十八銖 人參 消石 各一兩 蠐螬 桂心 巴豆 各半兩 半夏 三兩

右十一味為末以蜜青牛膽拌和擣三萬杵丸如梧子宿不食酒服五丸安卧須臾當下下黃者小腹積

也青者疝也白者內風也如水者留飲也青如粥汁膈上邪氣也血如腐肉者傷也赤如血者乳餘疾也

如蟲刺者蟲也既下必渴渴飲粥饑食酥糜三日後當温食食必肥濃三十日平復亦名破積烏頭丸主心腹積聚氣悶脹疝瘕內傷瘀血產乳餘疾及諸不足

竹茹湯治婦人汗血吐血尿血下血方

竹茹 二升 人參 芍藥 桔梗 苓蒲 當歸 甘草 桂心 各一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾地黃 四兩
右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

治婦人自少患風頭疼眼眩方
石南 一方用石韋 細辛 天雄 茵芋 各二兩
薯蕷 防風 貫衆 獨活 蘼蕪 各四兩 乾薑 山茱萸 各三兩
右十一味㕮咀以酒三斗漬五日初飲二合日三服後稍稍加之

眉骨眼眥癢痛有時生瘡喉中乾燥四體痛癢方
栝蔞根 麥門冬 龍膽 各三兩 大黃 二兩 杏仁 二升 土瓜根 八兩
右六味為末蜜丸如梧子大飲服十枚日三後漸加之

治婦人患癖按時如有三五箇而作水聲殊不得寢食常心悶方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

牽牛子三升治下篩飲服方寸匕日一服三十服後可服好硫黃一兩

治婦人忽與鬼交通方

松脂 二兩　雄黃 一兩末

右二味先烊松脂乃内雄黃末以虎爪攪令相得藥成取如雞子中黃夜卧以煮燻籠中燒令病人取自昇其上以被自覆惟出頭勿令過熱及令氣得泄也

厚朴湯治婦人下焦勞冷膀胱腎氣損弱白汁小便俱出

厚朴如手大長四寸以酒五升煮兩沸去滓取桂一尺為末内汁中調和一宿勿食旦頓服之

温經湯治婦人小腹痛方

茯苓 六兩　土瓜根　芍藥 各三兩　薏苡仁 半斤

右四味咬咀以酒三升漬一宿旦加水七升煎取二升分再服

半夏厚朴湯治婦人胸滿心下堅咽中帖帖如有炙肉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鱗吐之不出咽之不下方

半夏 一升 厚朴 三兩 茯苓 四兩 生薑 五兩 蘇葉 二兩

右五味咬咀以水七升煮取四升分四服日三夜一

不瘥頓服一方無蘇葉生薑

治婦人氣方

平旦服烏牛尿日一止

昆布圓治婦人胸中伏氣方

昆布 海藻 芍藥 桂心 白石英 欵冬花 桑白皮 人參 各二兩 柏子仁 茯苓 鍾乳 各二兩半 紫菀 甘草 各一兩 乾薑一兩六銖 吳茱萸 五味子 細辛 各一兩半 杏仁 百枚 橘皮 蘇子 各五合

右二十味為末蜜和丸如梧子酒服二十丸日再加至四十丸

治婦人無故憂恚胸中迫塞氣不下方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芍藥　滑石
山茱萸　前胡　各一兩六銖　大黃
細辛　生薑　各一兩　半夏　十八銖　桂心　半兩　麥門冬
右十二味為末蜜丸如梧子酒服二十丸加至三十丸日三服

治婦人斷產方

蠶子故紙方一尺燒為末酒服之終身不產

又方油煎水銀一日勿息空肚服棗一枚永斷不損人

治勞損產後無子陰中冷溢出子門閉積年不瘥身體寒冷方

防風　一兩半　桔梗　三十銖　人參　一兩　葛蒲
半夏　丹參　厚朴　乾薑
紫菀　杜蘅　各十八銖　秦艽　白斂
牛膝　沙參　各半兩

右十四味為末白蜜和丸如小豆食後服十五丸日三服不知增至二十丸有娠止夫不在勿服之服藥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

後七日方合陰陽

五加酒治產後癖瘦玉門冷方

五加皮 枸杞子 各二 升 蛇牀子 一 升 杜仲 各一 升
乳牀 半 斤 乾地黃 丹參 各二 兩 乾薑 三 兩
天門冬 四 兩

右九味㕮咀以絹袋子盛酒三斗漬三宿一服五合日再稍加至十合佳

治子門閉血聚腹中生肉癥藏寒所致方

硫黃 四 兩 吳茱萸 一 半 兩 菟絲子 一 兩 六銖 蛇牀子 一 兩

右四味為散以水一升煎二方寸匕洗玉門日再洗

治產後勞玉門開而不閉方

大酒服三丸日再若覺腹中痛食後服之

右三味先濤漆為散內汁中攪微火煎為丸如梧子

乾漆 半 斤 生地黃汁 三 升 生牛膝汁 一 斤

治產後陰道開而不閉方

石灰一斗熬令燒草以水二斗投之適寒溫入汁中

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

坐漬之須臾復易坐如常法此方已効千金不傳

黃芩散治婦人陰脫方

黃芩 二兩 蝟皮 各半 當歸 各半 芍藥 一兩

牡蠣 各二兩半 竹皮 狐蔥 一具千金翼用松皮

右七味治下篩飲服方寸匕日三禁舉重房勞冷食

硫黃散治同前

硫黃 烏澤魚骨 各半兩 五味子 三銖

右三味治下篩以粉其上良日再三粉之

當歸散治同前

當歸 黃芩 各二兩 蝟皮 半兩 牡蠣 二兩半

芍藥 一兩六銖

右五味治下篩酒服方寸匕日三服禁舉重良

治產後陰下脫方

蛇床子一升布裹炙熨之亦治產後陰中痛

又方燒人屎為末酒服方寸匕日三

又方燒敝幕頭為灰酒服方寸匕

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方 鼈頭五枚燒末以井花水服方寸匕日三

又方

皂莢 半兩 大黃 細辛 各十銖 蛇床子 三銖

右五味治下篩用薄絹囊盛大如指内陰中日二易即瘥

又方

吳茱萸 蜀椒 各一升 戎鹽 如雞子大

右三味皆熬令變色為末以綿裹如半雞子大内陰中日一易二十日瘥

治婦人陰下脫若脫肛方

羊脂煎訖適冷暖取塗上以鐵精傅脂上多少令調以火灸布令暖熨肛上漸推内之然後末磁石酒服方寸匕日三

治陰下挺出方

蜀椒 廣濟方不用 烏頭 白芝 各半兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右三味治末以方寸匕綿裹内陰中入三寸腹中熱易之日一度明旦乃復著七日愈

當歸湯治産後臟中風冷陰腫痛方

當歸 獨活 各二兩 白芷 地榆 各三兩 敗醬 千金翼不用 礬石 各二兩

右六味以水一斗半煮取五升適冷暖稍稍洗陰日三度

三

又方熟濤桃仁傅之良日三度

炙法月水不利貲豚上下并無子炙四滿三十壯穴在丹田兩邊相去各湯升半丹田在臍下二寸是也

婦人胞落頹炙臍中三百壯 又炙身交五十壯三報在臍下橫文中 又炙背脊當臍五十壯 又炙五泉五十壯三報 又炙龍門二十壯三報在玉泉下女人陰内外之際此穴卑今廢不針炙

婦人胞下垂注陰下脫炙俠玉泉三寸隨年壯三報

婦人陰冷腫痛炙歸來三十壯三報俠玉泉五寸是其


本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

穴

婦人欲斷產灸右踝上一寸二壯即斷

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:32
列印頁數：198
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)



欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷六十七

詳校官太醫院吏目臣宋柱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄舉人臣張元功

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書
備急千金要方卷六
唐 孫思邈 撰
宋 林億等 校正
婦人方
補益第十八 方論
論曰凡婦人欲求美色肥白罕比年至七十與少不殊者勿服紫石英令人色黑當服鍾乳澤蘭丸也
栢子仁圓治婦人五勞七傷羸冷瘦削面無顏色飲食減少貌失光澤及產後斷緒無子能久服令人肥白補益方

栢子仁 黄耆 乾薑 紫石英 各二兩
蜀椒 一兩半 杜仲 當歸 甘草
芎藭 各四十銖 厚朴 桂心 桔梗
赤石脂 蒐蘿 五味子 白朮
細辛 獨活 人參 石斛
白芷 芍藥 各一兩 澤蘭 二兩六銖 藁本

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:33
列印頁數：200
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蕪荑 各十八銖
乾地黃 三方作牛膝 各十銖
鍾乳 二兩
白石英 各二兩
烏頭 一方作牛膝 各十銖
防風 各十銖

右三十味為末蜜和酒服二十丸如梧子不知加至三十丸 千金翼無烏頭有龍骨防葵茯苓秦艽各半兩為三十三味并治產後半身枯悴

大五石澤蘭圓治婦人風虛寒中腹内雷鳴緩急風頭痛寒熱月經不調繞臍惻惻痛或心腹瘕堅逆飲食手足冷多夢身體痺痛榮衛不和虛弱不能動及產後虛損並宜服方

鍾乳 禹餘糧 紫石英 甘草
黃耆 各二兩半 石膏 白石英 蜀椒
乾薑 各二兩 澤蘭 二兩六銖 當歸 桂心
芎藭 厚朴 栢子仁 乾地黃
細辛 茯苓 五味子 龍骨 各一兩半
石斛 遠志 人參 續斷
白朮 防風 烏頭 各三十銖 山茱萸
紫菀 各一兩 白芷 藁本 蕪荑 各十八銖

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服二十丸加至三十丸 千金翼有陽起石二兩

小五石澤蘭圓治婦人勞冷虛損飲食減少面無光色腹中冷痛經候不調吸吸少氣無力補益温中方

鍾乳 紫石英 赤石脂 當歸 龍骨 桂心 各二兩半 陽起石 乾薑 各二兩 澤蘭 二兩六銖 白朮 芍藥 甘草 各四十二銖 石膏 礬石 各一兩半 白石英 蜀椒 山茱萸 各三十銖 厚朴 人參 栝子仁 藁本 各一兩 蕪荑 十八銖

右二十三味為末蜜和丸如梧子大酒服二十丸加至三十丸日三

增損澤蘭圓治產後百病理血氣補虛勞方

澤蘭 甘草 當歸 芎藭 各四十二銖 桂心 附子 乾薑 白朮 白芷 細辛 各一兩 防風 人參

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

牛膝 各三十銖
厚朴 藁本
右二十味為末蜜和丸如梧子空腹酒下十五丸至二十丸
大補益當歸圓治產後虛羸不足胸中少氣腹中拘急疼痛或引腰背痛或所下過多血不止虛竭乏氣晝夜不得眠及崩中面目脫色唇乾口燥亦治男子傷絶或從高墮下内有所傷藏虛吐血及金瘡傷犯皮肉方
當歸 芎藭 續斷 乾薑
阿膠 甘草 各四兩
附子 白芷 各三兩
乾地黄 十兩
栝子仁 乾地黄 各三十銖
石斛 各六銖
蕪荑 各半兩
麥門冬 二兩
白术 吳茱萸
桂心 芍藥
右十三味為末蜜和丸如梧子大酒服二十丸日三夜一不知加至五十丸若有真蒲黄加一升絶妙
白芷圓治產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣面目脫色腹中痛方

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:34
列印頁數：203
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白芷 五兩
當歸 阿膠 各三兩
乾地黃 四兩
續斷 附子 各一兩
乾薑
右七味為末蜜和丸如梧子大酒服二十丸日四五
服無當歸芎藭代入蒲黃一兩妙無續斷犬薊根代
紫石英 栢子仁 各三兩
烏頭 桂心
乾薑 各二兩
甘草 一作杜仲
蜀椒 杜衡
辛夷 各一兩半
細辛 一兩
石斛 遠志 寄生 蒐蘑
當歸 山茱萸 澤瀉 芎藭
心悸酸□恍惚不能起居方
紫石英 栢子仁 各三兩
烏頭 桂心
熱頭痛熱毒風虛百脉沉重下赤白不思飲食而頭眩
紫石英 栢子仁 圓治女子遇冬天時行溫風至春夏病
右十八味為末蜜和丸如梧子酒服二十丸漸加至
三十丸日三服一方用牡蠣一兩
鍾乳澤蘭圓治婦人久虛羸瘦四肢百體煩疼臍下結
冷不能食面目瘀黑憂恚不樂百病方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鍾乳二兩　澤蘭三兩六銖　防風四十二銖　人參
栢子仁　麥門冬　乾地黄　石膏
石斛各一兩半　芎藭　甘草　白芷
牛膝　山茱萸　薯蕷　當歸
藁本各三十銖　細辛　桂心各一兩　蕪荑半兩
艾葉十八銖

右二十一味為末蜜和丸如梧子酒服二十丸加至四十丸日二服

大澤蘭圓治婦人虛損及中風餘病疝瘕陰中冷痛或頭風入腦寒痺筋攣緩急血閉無子面上游風去來目淚出多涕唾忽忽如醉或胃中冷逆胸中嘔不止及泄痢淋瀝或五臟六腑寒熱不調心下痞急邪氣厥逆或漏下赤白陰中腫痛胸脇支滿或身體皮膚中澁如麻疾或月水不通魂魄不定飲食無味并産後内衄無所眩無所見或上氣惡寒洒淅如瘧或喉痺鼻齆風癇癲豆苦癢痰癖結氣或四肢拘攣風行周身骨節疼痛目

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不治服之令人有子方

澤蘭 二兩六銖　藁本 各一兩十八銖　當歸 甘草

紫石英 三兩　芎藭

五味子 各一兩半　桂心

白芷　蒻蓉

薯蕷　茯苓

細辛 各一兩　卷栢

杜仲　牛膝

艾葉 各十八銖　蕪荑

一有枳實 十八銖

麥門冬 一兩半

右三十二味為末蜜和為丸如梧子大酒服二十丸

至四十丸久赤白痢去乾地黄石膏麥門冬栢子仁

加大麥蘗陳麴龍骨阿膠黄連 各一兩半有鍾乳加三兩良

小澤蘭圓治産後虚羸勞冷身體尪瘦方

澤蘭 二兩六銖　當歸

栢子仁　防風

茯苓 各一兩　甘草 各一兩十八銖　芎藭

白芷

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蜀椒 藁本 細辛 白朮
桂心 蕪荑 人參 食茱萸
厚朴 各八銖 十二兩 石膏 二兩
右十八味為末蜜和丸如梧子大酒服二十丸日三
服稍加至四十丸無疾者依此方春秋二時常服一
劑甚良有病虛羸黃瘦者服如前一方無茯苓石膏
有芍藥乾薑 胡洽十五味無柄子仁人參食茱萸除細辛桂心生用外盡熬令變色為末蜜丸如彈子大內暖酒中服之千金翼無茯苓食茱萸有乾薑一兩
紫石英天門冬圓主風冷在子宮有子常墮落或始為婦便患心痛仍成心疾月水都未曾來服之肥充令人有子方
紫石英 天門冬 禹餘粮 各三兩 蕪荑
烏頭 薤蓉 桂心 甘草
五味子 栢子仁 石斛 人參
澤瀉 一作澤蘭 遠志 杜仲 各二兩 蜀椒
卷栢 寄生 石南 雲母

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當歸 一作辛夷 烏賊骨 各一兩

右二十二味為末蜜和為丸梧子大酒服二十丸日二服加至四十丸

三石澤蘭圓治風虛不足通血脉補寒冷方亦名石斛澤蘭丸

鍾乳 白石英 各四兩 紫石英 防風

石斛 石膏 各二兩 甘草 當歸

藁本 茯神 各一兩六銖 澤蘭 二兩六銖 黄耆

桂心 人參

芎藭 各一兩十八銖 白朮

乾薑 獨活

桔梗 細辛

蜀椒 黄芩

秦艽 防葵 各一兩 厚朴

乾地黄 各一兩半 白芷

栝子仁 五味子

蘼蕪 各十八銖

茯苓 蒻蓉

右三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服二十丸加至三十丸日二三服

大平胃澤蘭圓治男子女人五勞七傷諸不足定志意

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

除煩滿手足虛冷羸瘦及月水往來不調不能動等方

澤蘭　細辛　黃耆　鍾乳 各三兩

栢子仁　乾地黃 各二兩半　大黃　前胡

遠志　紫石英 各二兩　芎藭　白朮

蜀椒 各一兩半　白芷　丹參　梔子 一本用枳實

芍藥　桔梗　秦艽　沙參

桂心　厚朴　石斛　苦參

人參　麥門冬　乾薑 各一兩　附子 六兩

吳茱萸　麥蘗 各五合　陳麴 一升　棗 五十枚作膏

右三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服二十丸加至三十丸令人肥健 一本無乾薑有當歸三兩

澤蘭散治產後風虛方

澤蘭 九分　禹餘粮　防風 各十分　石膏　白芷　乾地黃　赤石脂　肉蓯蓉

鹿茸　芎藭 各八分　藁本　蜀椒

白朮　栢子仁 各五分　桂心　甘草

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當歸 乾薑 各七分 厚朴 各四分 人參 三分 蕪荑 細辛

右二十二味治下篩酒服方寸匕日三

月水不通第十九方

桃仁湯治婦人月水不通方

桃仁 朴硝 牡丹皮 射干

土瓜根 黃芩 各三兩 芍藥 大黃

柴胡 各四兩 牛膝 桂心 各二兩 水蛭

蟲蟲 各七十枚

右十三味㕮咀以水九升煮取二升半去滓分三服

乾薑圓治婦人寒熱羸瘦酸消怠惰胸中支滿肩背脊

重痛腹裏堅滿積聚或痛不可忍引腰小腹痛四肢煩

疼手足厥逆寒至肘膝或煩滿手足虛熱意欲投水中

百節盡痛心下常苦懸痛時寒時熱惡心涎唾喜出每

愛鹹酸甜苦之物身體或如雞皮月經不通大小便苦

難食不生肌方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾薑 芍藥 茯苓 消石
杏仁 水蛭 蝱蟲 桃仁
蠐螬 廬蟲 各一兩 柴胡 芍藥
人參 大黃 蜀椒 當歸 各二兩
右十六味為末蜜和丸如梧子空心飲下三丸不知
加至十丸 千金翼以療婦人瘕結脅肋下疾
乾漆湯治月水不通小腹堅痛不得近方
乾漆 蒺藜 芍藥 細辛
甘草 附子 各一兩 當歸 桂心
芒硝 黃芩 各二兩 大黃 三兩 吳茱萸 一升
右十二味咬咀以清酒一斗浸一宿煮取三升去滓
內消烊盡分為三服相去如一炊頃
芒硝湯治月經不通方
芒硝 丹砂 末 當歸 芍藥
土瓜根 水蛭 各二兩 大黃 三兩 桃仁 一升
右八味咬咀以水九升煮取三升去滓內丹砂芒硝

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

分為三服

治月經不通心腹痛絞欲死通血止痛方

當歸 大黃 芍藥 各三兩 吳茱萸

乾地黃 乾薑 芎藭 蝟蟲

梔子十四枚 桃仁一升

水蛭各二兩 細辛 甘草 桂心各一兩

右十四味㕮咀以水一斗五升煮取五升分為五服

一本有牛膝麻子仁各三兩

桃仁湯治月經不通方

桃仁一升 當歸 土瓜根 大黃

水蛭 蝟蟲 芒硝各二兩 牛膝

麻子仁 桂心各三兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升半去滓內消令烊分為三服 肘後無當歸麻子仁用牡丹射干黃芩芍藥柴胡各三兩為十三味千金翼無蝟蟲

前胡牡丹湯治婦人盛實有熱在腹月經瘀閉不通及勞熱熱病後或因月經來得熱不通方

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:37
列印頁數：212
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

前胡 牡丹 玄參 桃仁
黃芩 射干 旋復花 栝蔞根
甘草 二兩各 芍藥 茯苓 大黃
枳實 三兩各

右十三味咬咀以水一斗煮取三升分為三服

乾地黃當歸圓治月水不通或一月再來或隔月不至或多或少或淋瀝不斷或來而腰腹刺痛不可忍四體嘘吸不欲食心腹堅痛有青黃黑色水下或如清水不欲行動舉體沉重惟思眠卧欲食酸物虛乏黃瘦方

乾地黃 三兩 當歸 甘草 一兩半各 牛膝

芍藥 乾薑 澤蘭 人參

牡丹 一兩六銖各 丹參 蜀椒 白芷

黃芩 一兩八銖 桑耳 桂心 二兩各 麋蟲 四十枚 十

芍藥 二兩 桃仁 水蛭 蝱蟲 十枚各七

蒲黃 二合

右二十一味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

十五丸漸加至三十丸以知為度一本無
牡丹圓治婦人女子諸病後月經閉絶不通及從小來
不通并新産後瘀血不消服諸湯利血後餘疢未平宜
服之取平復方

當歸 桂心 各二兩 蝱蟲 各五十枚
芍藥 玄參 桃仁
牡丹 三兩 瞿麥 各一兩
蠐螬 二枚

右十二味為末蜜和丸如梧子大酒下十五丸加至
二十丸血盛者作散服方寸匕腹中當轉如沸血自
化成水去如小便赤少除桂心用地膚子一兩
黄芩牡丹湯治女人從小至大月經未嘗來顏色萎黄
氣力衰少飲食無味方

芍藥 海藻 各一兩 蝱蟲 七十枚
黄芩 牡丹 桃仁 瞿麥
大黄 三兩 枳實 射干
蠐螬 十枚 水蛭 五十枚

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十三味咬咀以水一斗煮取三升分三服服兩劑後灸乳下一寸黑眞際各五十壯

治月經不通方

取葶藶一升為末蜜丸如彈子大綿裹内陰中入三寸每丸一宿易之有汁出止

乾漆圓治月經不通百病不瘥方

乾漆　土瓜根　射干　芍藥　各一兩半

牡丹　牛膝　黄芩　桂心

吳茱萸　大黄　柴胡　各一兩六銖　桃仁

蠐螬　各四十枚　水蛭

蟅蟲　各七十枚　大麻仁　四合　亂髮　雞子大二枚　菴蕳子　二合

鼈甲　各二兩　蠐螬　各四十枚　蝱蟲

大麻子　三升　菴蕳子　三升　桃仁　一升　竈屋炲煤　四兩

土瓜根　射干　各六兩　牛膝　八兩　桂心　四兩

右二十味為末以蜜和為丸每日酒下十五丸梧子大漸加至三十丸日三仍用後浸酒服前丸藥

浸酒方

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:39
列印頁數：215
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右八味咬咀以清酒三斗絹袋盛藥浸五宿以一盞下前丸藥甚良或單服之亦好

當歸圓治女人臍下癥結刺痛如蟲所嚙及如錐刀所刺或赤白帶下十二疾腰背疼痛月水或在月前或在月後方

當歸 葶藶 附子 吳茱萸 大黃 各二兩 黃芩 桂心 乾薑 牡丹 芎藭 各一兩半 細辛 秦椒 蜈蚣 水蛭 各五十枚 柴胡 厚朴 各一兩六銖 牡蒙 一方無 甘草 各一兩

右十八味為末蜜和丸如梧子大空心酒下十五丸

鼈甲圓治女人小腹中積聚大如七八寸盤面上下周流痛不可忍手足苦冷欬噫腥臭兩脇熱如火灸玉門冷如風吹經水不通或在月前或在月後服之三十日便癒有孕此是河内太守魏夫人方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鼈甲 桂心 各一兩半 蜂房 半兩 玄參
蜀椒 細辛 人參 苦參
丹參 沙參 吳茱萸 各十八銖 廬蟲
水蛭 乾薑 牡丹 附子
皂莢 當歸 芍藥 甘草
防葵 各一兩 蠐螬 二十枚 蝨蟲 大黃 各一兩六銖
右二十四味為末蜜和丸如梧子大酒下七丸日三
稍加之以知為度

又方治婦人因產後虛冷堅結積在腹內月經往來不時苦腹脹滿繞臍下痛引腰背手足煩或冷熱心悶不欲食方

鼈甲 一兩半 乾薑 赤石脂 丹參
禹餘粮 當歸 白芷 一方用術
乾地黃 各一兩六銖 代赭 甘草
鹿茸 烏賊骨 殭蠶 各十八銖 桂心
細辛 蜀椒 附子 各一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十七味蜜和丸如梧子大空心酒下五丸加至十

丸

禹餘粮圓治婦人產後積冷堅癖方

禹餘粮　烏賊骨　吳茱萸　桂心

禹餘粮　各二兩半　當歸　白朮　細辛

乾地黃　人參　芍藥　芎藭

前胡　各一兩六銖　乾薑　三兩　各十八銖　礬石　六銖　白薇

紫菀　黃芩　各一兩　蜚蠊　一兩

右十九味為末蜜和丸如梧子空心酒若飲下二十

丸日二不知則加之

牡蒙圓治婦人產後十二癥病帶下無子皆是冷風寒

氣或產後未滿百日胞胳惡血未盡便利於懸圊上及

久坐濕寒入胞裏結在小腹牢痛為之積聚小如雞子

大者如拳按之跳手隱隱然或如蟲嚙或如針刺氣時

搶心兩脇支滿不能食飲食不消化上下通流或守胃

管痛連玉門背膊嘔逆短氣汗出小腹苦寒胞中創傷

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

引陰痛小便自出子門不正令人無子腰胯疼痛四肢
沉重淫躍一身盡腫乍來乍去大便不利小便淋瀝或
月經不通或下如腐肉青黃赤白黑等如豆汁夢想不
祥方 亦名紫蓋丸

牡蠣 厚朴 消石 前胡
乾薑 蘆蟲 牡丹 蜀椒
葶藶 人參 芎藭 吳茱萸
黃芩 桔梗 茯苓 細辛
桂心 各八銖 大黃二兩半 附子一兩六銖 當歸半兩

右二十味為末蜜和更擣萬杵丸如梧子大空心酒
服三丸日三不知則加之至五六丸下青白黃赤物
如魚子者病根出矣

治月經不通結成癥瘕如石腹大骨立宜此破血下癥
方

大黃 消石 各六兩 巴豆 蜀椒 各一兩

代赭 柴胡 各熬令色 水蛭 丹參 熬令紫色

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

土瓜根 兩各三
蟲蟲 茯苓 兩各二
蟲蟲 四百枚 蠐螬 一升
乾漆 芍藥 牛膝 土瓜根
宜服此數有神驗方
大蟲蟲圓治月經不通五七年或腫滿氣逆腹脹癥痛
二丸未知加五丸日再服 千金翼無柴胡水蛭丹參土瓜根
右十四味為末巴豆別研蜜和丸如梧子空心酒服
乾漆 芍藥 牛膝 土瓜根 牡丹 乾地黃 桃仁 黃芩 乾薑 乾地黃 牡丹 吳茱萸 一升
桂心 兩各四 牡蒙 茯苓 海藻 兩各五 水蛭 三百枚 蠐螬 五合 芒硝 一兩 人參 一兩半
桂心酒治月經不通結成癥癖方
丸不知加之日三服 千金翼無芒硝人參
右十九味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒下七

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大黃 三兩
黃芩 乾薑 各二兩
蠐螬 蝟蟲 二百枚
蠐蟲 各七枚
細辛 各一兩
殭蠶 五十枚
乾地黃 六兩
虎杖根 二升
水蛭 各十枚
亂髮灰
大麻仁 三升
竈突墨 三升
鼈甲 各五兩
菴蕳子 二升

右二十四味咬咀以酒四斗分兩甕浸之七日併一甕盛攪令調還分作兩甕初服二合日二加至三四合

虎杖煎治腹内積聚虚脹雷鳴四肢沉重月經不通亦治丈夫病方

取高地虎杖根細剉二斛以水二石五斗煮取一大斗半去滓澄濾令淨取好醇酒五升和煎令如餳每服一合消息為度不知則加之

又方治月經閉不通結瘕腹大如甕短氣欲死方

虎杖根 百斤去頭去土曝乾切
土瓜根
牛膝 各取汁二斗

右三味咬咀以水一斛浸虎杖根一宿明旦煎取二斗内土瓜牛膝汁攪令調勻煎令如餳每以酒服一

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:41
列印頁數：221
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

合日再夜一宿血當下若病去但服

桃仁煎治帶下經閉不通方

桃仁 蝱蟲 各一升 朴硝 五兩 大黃 六兩

右四味為末別治桃仁以醇苦酒四升內銅鍋中炭火煎取二升下大黃桃仁蝱蟲等攪勿住手當欲可丸下朴硝更攪勿住手良久出之可丸乃止取一丸如雞子黃投酒中預一宿勿食服之至晡時下如大豆汁或如雞肝凝血蝦蟇子或如膏此是病下也

治月經不通臍下堅結大如杯升發熱往來下痢羸瘦此為氣癥一作血癥若生肉癥不可為也療之之方

生地黃 三十斤取汁 乾漆 一斤為末

右二味以漆末內地黃汁中微火煎令可丸每服酒下如梧子大三丸不知加之常以食後服

治月經不通甚極閉塞方

牛膝 一斤 麻子 三升蒸 土瓜根 三兩 桃仁 二升

右四味咬咀以好酒一斗五升浸五宿一服五合漸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

加至一升日三能多益佳

治產後風冷留血不去停結月水閉塞方

桃仁 麻子仁 各二升 菴蔺子一升

右三味咬咀以好酒三斗浸五宿每服五合日三稍加至一升

五京圓治婦人腹中積聚九痛七害及腰中冷引小腹害食得冷便下方

乾薑 蜀椒 各三兩 附子一兩 吳茱萸一升

當歸 狼毒 黃芩 牡蠣 各二兩

右八味為末蜜和丸如梧子初服三丸日二加至十丸此出京氏五君故名五京久患冷困當服之

雞鳴紫圓治婦人癥癖積聚方

皂莢一分 藜蘆 甘草 礬石

烏喙 杏仁 乾薑 桂心

巴豆各二分 前胡 人參各四分 代赭五分

阿膠六分 大黃八分

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:42
列印頁數：223
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十四味為末蜜丸如梧子雞鳴時服一丸日益一丸至五丸止仍從一起下白者風也赤者癥瘕也青黃者心腹病

遼東都尉所上圓治臍下堅癖無所不治方

恒山 大黃 巴豆 各一分 天雄 二枚

苦參 白薇 乾薑 人參

細辛 狼牙 龍膽 沙參

玄參 丹參 各三分 芍藥 附子

牛膝 茯苓 各五分 牡蒙 四分

藿蘆 六分一方云二兩三分

右二十味為末蜜丸宿勿食服五丸日三大羸瘦月水不調當二十五日服之下長蟲或下種種病出二十五日服中所苦悉愈肌膚盛五十日萬病除斷緒有子

牡蠣圓治經閉不通不欲飲食方

牡蠣 四兩 大黃 一斤 柴胡 五兩 乾薑 三兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:42
列印頁數：224
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芎藭 各二兩半
芒硝 各五合
桃仁 七十枚
右十三味為末蜜丸如梧子大飲服七丸日三
當歸圓治腰腹痛月水不通利方
土瓜根 各二兩
水蛭 各二兩
丹參 各一兩
乾漆 各一兩
當歸 各四兩
芎藭 各四兩
桃仁 五十枚
人參 一兩
牡蠣 一兩
烏頭 一兩
右十一味為末以白蜜丸如梧子大酒下三丸日三
服
消石湯治血瘕月水留瘀血大不通下病散堅血方
消石 各三兩
蝱蟲 各三兩
大黃 三兩
細辛 一兩
乾薑 一兩
黃芩 各一兩
芍藥 一兩
土瓜根 二兩
丹參 二兩
代赭 二兩
蠐螬 各二兩
大棗 十枚
桃仁 二升
牛膝 一斤
朴硝 四兩
右十六味咬咀以酒五升水九升漬藥一宿明旦煎

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:42
列印頁數：225
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取四升去滓下朴硝消石烊盡分四服相去如炊頃去病後食黃鴨羹勿見風

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:43
列印頁數：226
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷七

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

婦人方

赤白帶下崩中漏下第二十 論灸法方

論曰諸方説三十六疾者十二癥九痛七害五傷三痼不通是也何謂十二癥是所下之初一曰狀如膏二曰如黑血三曰如紫汁四曰如赤肉五曰如膿痂六曰如豆汁七曰如葵羹八曰如凝血九曰如清血血似水十曰如米泔十一曰如月浣乍前乍却十二曰經度不應期也何謂九痛一曰陰中痛傷二曰陰中淋瀝痛三曰小便即痛四曰寒冷痛五曰經來即腹中痛六曰氣滿痛七曰汁出陰中如有蟲嚙痛八曰脇下分痛九曰腰胯痛何謂七害一曰窮孔痛不利二曰中寒熱痛三曰小腹急堅痛四曰藏不仁五曰子門不端引背痛六曰月浣乍多乍少七曰害吐何謂五傷一曰兩脇支滿痛

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:43
列印頁數：227
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

二曰心痛引脇三曰氣結不通四曰邪思洩利五曰前後痼寒何謂三痼一曰羸瘦不生肌膚二曰絶産乳三曰經水閉塞病有異同具治之方

白堊圓治女人三十六疾方 又方見後

白堊 龍骨 當歸 茯苓 白斂 石韋 細辛 附子 人參 烏賊骨 大黄 已上各半兩

芍藥 各十八銖 黄連 黄芩 黄耆 禹餘糧 甘草 牡蠣 白石脂 藁本 甘皮

右二十一味為末蜜和丸如梧子大空腹飲服十丸日再不知加之二十日知一月百病除若十二癥倍

牡蠣禹餘糧烏賊骨白石脂龍骨若九痛倍黄連白斂甘草當歸若七害倍細辛藁本甘皮加椒菜萸各一兩若五傷倍大黄石韋瞿麥若三痼倍人參加赤石脂礬石巴戟天各半兩合藥時隨病增減之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治女人腹中十二疾一曰經水不時二曰經來如清水三曰經水不通四曰不周時五曰生不乳六曰絶無子七曰陰陽減少八曰腹苦痛如刺九曰陰中寒十曰子門相引痛十一曰經來凍如葵汁狀十二曰腰急痛凡此十二病得之時因與夫卧起月經不去或卧濕冷地及以冷水洗浴當時取快而後生百病或瘡瘕痩未瘥便合陰陽及起早作勞衣單席薄寒從下入方

赤石脂 半夏 各一兩 六銖 蜀椒 乾薑 各一兩 吳茱萸 當歸 各一兩 桂心 丹參 各一兩 白斂 防風 各一兩 蘼蕪 半兩

右十一味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒服十丸日三不知稍加以知為度

白石脂圓治婦人三十六疾胞中痛漏下赤白方

白石脂 烏賊骨 禹餘糧 牡蠣 各十八銖 赤石脂 乾地黃 乾薑 龍骨 桂心 石韋 白斂 細辛

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:44
列印頁數：229
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芍藥 黃連
黃芩 蜀椒 附子 當歸
芎藭 甘草 各半 兩 鍾乳 白芷
右二十二味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒下十五丸日再一方有黃蘗半兩
小牛角鰓散治帶下五貲一曰熱病下血二曰寒熱下血三曰經脉未斷為房事則血漏四曰經來舉重傷任脉下血五曰產後臟開經利五貲之病外實内虛方
牛角鰓 一枚燒令赤 當歸 乾薑 各一兩 續斷 各二兩 阿膠 三兩 鹿茸 禹餘糧 各二兩 赤小豆 二升 烏賊骨 龍骨 各一兩 龍骨散治淳下十二病絶產一曰白帶二曰赤帶三曰患痛八曰内强九曰腹寒十曰藏閉十一曰五藏酸痛
右十味治下篩空腹以酒服方寸匕日三 千金翼無鹿茸烏賊骨
經水不利四曰陰胎五曰子藏堅六曰藏癖七曰陰陽

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

十二曰夢與鬼交宜服之 淳下一本作腹下

龍骨 三兩 黄蘗 半夏 竈中黄土

桂心 乾薑 各二兩 石韋 滑石 各一兩

烏賊骨 代赭 各四兩 白殭蠶 五枚

右十一味治下篩酒服方寸匕日三白多者加烏賊骨殭蠶各二兩赤多者加代赭五兩小腹冷加黄蘗桂心各二兩已上各隨病增之

二兩子藏堅加乾薑桂心各二兩已上各隨病增之

服藥三月有子即住藥藥太過多生兩子當審方取

好藥寡婦童女不可妄服

治女人帶下諸病方

大黄 蒸三斗米下 附子 茯苓 牡蒙

牡丹 桔梗 葶藶 各三兩 厚朴

芎藭 人參 當歸 蜣蜋

蜀椒 吳茱萸 柴胡 乾薑

桂心 各半兩 細辛 二兩半

右十八味為末蜜和丸如梧子大每日空心酒服二

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:45
列印頁數：231
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丸不知加之以腹中温温為度 一本有麻子三兩澤蘭半兩而無蜀椒葶藶

治帶下百病無子服藥十四日下血二十日下長蟲及青黄汁出三十日病除五十日肥白方

大黄 破如豆粒熬令黑色 五兩 芎藭 乾薑 各一兩 柴胡 各一斤 朴硝 一斤 蜀椒 各一升 茯苓 如雞子大一枚

右七味為末蜜丸如梧子大先食米飲服七丸不知加至十丸以知為度

治帶下方

枸杞根 一斤 生地黄 五斤

右二味咬咀以酒一斗煮取五升分為三服水煮亦得

治婦人及女子赤白帶下方

禹餘糧 當歸 芎藭 各一兩半 赤石脂 白石脂 阿膠 龍骨 石韋 一兩六銖 烏賊骨 黄蘗 白斂 黄芩 一兩用黄連

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

續斷　桑耳　牡蠣　各一兩

右十五味為末蜜丸如梧子大空心飲下十五丸日

再加至三十丸為度

白馬蹄圓治女人下焦寒冷成帶下赤白浣方

白馬蹄　鼈甲　鯉魚甲　龜甲

蜀椒　各一兩　磁石　甘草　杜仲

葶藶　當歸　續斷　芎藭

禹餘糧　桑耳　附子　各二兩

右十五味為末蜜丸梧子大以酒服十丸加至三十丸日三服

丸日三服　一本無龜甲

白馬駑散治帶下方　下白者取白馬駑下赤者取赤馬駑隨色取之

白馬駑　二兩　龜甲　四兩　鼈甲　十八銖　牡蠣　一兩十八銖

右四味治下篩空心酒下方寸匕日三服加至一匕

治五色帶下方

半

服大豆紫湯日三服　方見別卷

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:46
列印頁數：233
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方燒馬左蹄為末以酒服方寸匕日三服

又方燒狗頭和毛皮骨為末以酒服方寸匕

又方煮甑帶汁服一杯良

又方燒馬蹄底護乾為末以酒服之方寸匕日三

雲母苓蘑散衛公治五崩身瘦欬逆煩滿少氣心下痛與子藏相通小便不利常拘急頭眩頸項急痛手足熱面生瘡腰痛不可俯仰陰中腫如有瘡狀毛中癢時痛氣逆衝急心煩不得卧腹中急痛食不下吞醋噫苦上下腸鳴漏下赤白青黃黑汁大臭如膠汚衣狀皆是內傷所致中寒即下白熱即下赤多飲即下黑多食即下黃多藥即下青或喜或怒心中常恐或憂勞便發動大惡風寒方

雲母　苓蘑　代赭

東門邊木（燒各一兩）　白殭蠶　烏賊骨

白垩　蝟皮（各六銖）　鼈甲（一作龜甲）　桂心

伏龍肝　生鯉魚頭（各十八銖）

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十二味治下篩酒服方寸匕日三夜一 一方有龍骨乾葛

慎火草散治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面黑無顏色皮骨相連月經失度往來無常小腹弦急或苦絞痛上至心兩脇腫脹食不生肌膚令人偏枯氣息乏少腰背痛連脇不能久立每嗜卧困懶 又方見後

慎火草 白石脂 禹餘糧 鼈甲

乾薑 細辛 當歸 芎藭

石斛 芍藥 牡礪 各二兩 黄連

薔薇根皮 乾地黄 各四兩 熟艾 桂心 各一兩

右十六味治下篩空腹酒服方寸匕日三稍加至二匕若寒多者加附子椒熱多者加知母黄芩各一兩白多者加乾薑白石脂赤多者加桂心代赭各二兩禹餘糧圓治崩中赤白不絶困篤方

禹餘糧 五兩 白馬蹄 十兩 龍骨 三兩 鹿茸 二兩

烏賊魚骨 一兩

右五味為末蜜丸梧子大以酒服二十丸日再以知

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

為度

增損禹餘糧圓治女人勞損因成崩中狀如月經來去多不可禁止積日不斷五臟空虛失色黃瘦崩竭暫止少日復發不耐動搖小勞輒劇治法且宜與湯未宜與此丸也發時服湯減退即與此丸若是疾久可以長與此方

禹餘糧 龍骨 人參 桂心

紫石英 烏頭 寄生 杜仲

五味子 遠志 兩各二 澤瀉 當歸

石斛 蔥蓉 乾薑 兩各三 蜀椒

牡蠣 甘草 兩各一

右十八味為末蜜丸梧子大空心酒下十丸漸加至二十丸日三服

治女人白崩及痔病方

槐耳 白斂 艾葉 蒲黃

白芷 兩各二 黃耆 人參 續斷

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當歸　禹餘糧　橘皮　茯苓

乾地黃　蜱皮　各三兩　牛角鰓　四兩

豬後蹄　二十箇　白馬蹄　四兩酒浸一宿熬

右十七味為末蜜丸每日空心酒下二十丸日二加之

治婦人忽暴崩中去血不斷或如驚鴨肝者方

小薊根　六兩　當歸　阿膠　續斷

青竹茹　芎藭　各三兩　生地黃　八兩　釜月下土　絹裹

地榆　各四兩　馬通　一升赤帶用赤馬白帶用白馬

右十味㕮咀以水八升和馬通汁煮取三升分三服不止頻服三四劑未全止續服後丸方

小薊根　丹參　各十三銖　乾地黃　二兩半　芎藭

續斷　甘草　地榆　鹿茸

秦牛角鰓　各三兩剉熬令黑　赤石脂　阿膠　當歸　各一兩半　龜甲　一兩集驗作栢葉　栢子仁

右十四味為末蜜丸梧子大空心以酒服十丸日再

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

後稍加至三十丸

治女人崩中去赤白方

白馬蹄 五兩　蒲黃　鹿茸　禹餘糧

白馬鬐毛　小薊根　白芷　續斷 各四兩

人參　乾地黃　栢子仁　烏賊骨

黃耆　茯苓　當歸 各三兩　艾葉

蕘蓉　伏龍肝 各二兩

右十八味為末蜜丸如梧子大空心飲服二十丸日

再加至四十丸

當歸湯治崩中去血虛羸方

當歸　芎藭　黃芩　芍藥

甘草 各二兩　生竹茹 二升

右六味㕮咀以水一斗煮竹茹取六升去滓内諸藥煎取三升半分二服忌勞動嗔怒禁百日房事

治崩中晝夜十數行衆醫所不能瘥者方

芎藭八兩㕮咀以酒五升煮取三升分三服不飲酒

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:47
列印頁數：238
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

者水煮亦得

治崩中下血出血一斛服之即斷或月經來過多及過期不來者服之亦佳方

吳茱萸 當歸 各三兩 芎藭 人參

芍藥 牡丹 各二兩 桂心 阿膠

生薑 甘草 各二兩 半夏 八兩 麥門冬 一升

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分為三服

治暴崩中去血不止方

牡蠣 兎骨 各二兩 半炙

右二味治下篩酒服方寸匕日三

治女人白崩方

芎藭 桂心 阿膠 赤石脂

小薊根 各二兩 乾地黃 四兩 伏龍肝 如雞子大七枚

右七味㕮咀以酒六升水四升合煮取三升去滓內膠令烊盡分三服日三 千金翼止六味無伏龍肝

伏龍肝湯治崩中去赤白或如豆汁方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

伏龍肝 如彈丸七枚
生薑 五兩
生地黃 四升一方五兩
甘草
艾葉
赤石脂 桂心 各二兩
牛角仁 一枚燒
續斷
乾地黃
桑耳
白朮
赤石脂
礬石
乾薑
附子 龍骨
當歸 各三兩
人參 一兩
蒲黃
防風
禹餘糧 各二兩
肥羊肉 三斤
乾薑
當歸 各三兩
生地黃 二升

重虛極方

大牛角中仁散治積冷崩中去血不止腰背痛四肢沉

右七味咬咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一

右十五味治下篩以温酒未食服方寸匕日三不知稍加

治崩中去血積時不止起死方

右四味咬咀以水二斗煮羊肉取一斗三升下地黃汁及諸藥煮取三升分四服即斷尤宜羸瘦人服之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生地黃湯治崩中漏下日去數升方

生地黃一斤 細辛三兩

右二味咬咀以水一斗煮取六升服七合久服佳

治崩中漏下赤白不止氣虛竭方

龜甲 牡蠣各三兩

右二味治下篩酒服方寸匕日三

又方燒亂髮酒和服方寸匕日三

又方桑耳二兩半 鹿茸十八銖

右二味以醋五升漬炙燥漬盡為度治下篩服方寸匕日三

又方燒鹿角為末酒服方寸匕日三

又方燒桃核為末酒服方寸匕日三

又方地榆 知母

右二味各指大長一尺者咬咀以醋三升東向竈中灰酒服方寸匕

又方桑木中蜴屎燒灰酒服方寸匕

治極濃去滓服之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治崩中下血羸瘦少氣調中補虛止血方

澤蘭 蜀椒 二兩 六銖 藁本 栢子仁

山茱萸 厚朴 各十八銖 乾地黃 牡蠣 各一兩半

代赭 桂心 防風 細辛

乾薑 各一兩 甘草 當歸 芎藭 各一兩十八銖

蕪荑 半兩

右十七味治下篩空心溫酒服方寸匕日三神良一方加白芷龍骨各十八銖人參一兩十八銖為二十

味

治崩中方

白茅根 三斤 小薊根 五斤

右二味咬咀以水五斗煎取四斗稍稍服之 外臺用酒煎

丹參酒治崩中去血及產餘疾方

丹參 艾葉 地黃 忍冬 地榆 各五斤

右五味剉先洗白熟舂以水漬三宿出滓煮取汁以

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黍米一斛炊飯釀酒酒熟窄之初服四合後稍稍添之

牡丹皮湯治崩中血盛併服三劑即瘥方

牡丹皮 乾地黄 斛脉 各二兩 禹餘糧

白芷 伏龍肝 青竹茹 芎藭

艾葉 龍骨 栢葉 厚朴

地榆 各二兩 阿膠 一兩 芍藥 四兩

右十五味㕮咀以水一斗五升煮取五升分五服相去如人行十里久再服

治崩中單方

燒牛角末以酒服方寸匕日三服亦治帶下

又方桑耳燒令黑為末酒服方寸匕日二服亦治帶下

又生薊根一斤半擣取汁温服亦可酒煮服之

又方羊脛一具以酢煮去血服之即止忌猪魚鮓滑物

犯之便死亦治帶下

治白崩方

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:49
列印頁數：243
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

灸小腹橫文當臍孔直下百壯又灸内踝上三寸左右各百壯

論曰治漏血不止或新傷胎及産後餘血不消作堅使胞門不閉淋瀝去血經踰日月不止者未可以諸斷血湯宜且與牡丹丸散等待血堅消便停也堅血消者所去淋瀝便自止亦漸變消少也此後有餘傷毀不復處中去血多金瘡去血多拔牙齒去血多未止心中懸虛此乃可作諸主治耳婦人産乳去血多傷胎去血多崩心悶眩冒頭重目暗耳聾滿舉頭便悶欲倒宜且煮當歸芎藭各三兩以水四升煮取二升去滓分二服即定展轉續次合諸湯治之

白垩圓治女人三十六疾胞中病漏下不絶方 又方見前

邯鄲白垩 禹餘糧 白芷 白石脂
乾薑 龍骨 桂心 瞿麥
大黄 石韋 白斂 細辛
芍藥 甘草 黄連 附子

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當歸　茯苓　鍾乳　蜀椒　黃芩　各兩半　牡蠣　烏賊骨　各八銖　十

右二十三味為末蜜丸梧子大空心酒服五丸日再服不知加至十丸

治女人漏下或瘕或劇常漏不止身體羸瘦飲食減少或赤或白或黃使人無子者方

牡蠣　伏龍肝　赤石脂　白龍骨　桂心　烏賊骨　禹餘糧　各等分

右七味治下篩空心酒服方寸匕日二白多者加牡蠣龍骨烏賊骨赤多者加赤石脂禹餘糧黃多者加伏龍肝桂心隨病加之　張文仲同亦療崩中肘後無白龍骨以粥飲服

治婦人漏下不止散方

鹿茸　阿膠　各三兩　烏賊骨　當歸　各二兩　蒲黃一兩

右五味治下篩空心酒服方寸匕日三夜再服

治女人產後漏下及痔病下血方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

礬石 一兩
附子 一枚
右二味為末蜜丸如梧子大空心酒下二丸日三稍加至五丸數日瘥能百日服之永斷

芎藭湯治帶下漏血不止方
芎藭 乾地黃 黃耆 芍藥 吳茱萸 甘草 各二兩 當歸 乾薑 各三兩
右八味㕮咀以水一斗煮取三升分三服若月經後因有赤白不止者除地黃吳茱萸加杜仲人參各二兩

治漏下去血不止方
取水蛭治下篩酒服一錢許日二惡血消即愈

治漏下神方
取槐子燒末酒服方寸匕日三立瘥

治漏下去黑方
乾漆 麻黃 細辛 桂心 各一兩
甘草 半兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右五味治下篩以指撮著米飲中服之

治漏下去赤方

白术 二兩
白薇 半兩
黄蘗 二兩半

右三味治下篩空心酒服方寸匕日三

治漏下去黄方

黄連 大黄 各六銖
桂心 各半兩
黄芩

右六味治下篩空心酒服方寸匕日三

盧蟲 乾地黄 各六銖

治漏下去青方

大黄 黄芩 各半兩
白薇 桂心

右五味治下篩空心酒服方寸匕日三

治漏下去白方

鹿茸 一兩
白斂 十八銖
狗脊 半兩

右三味治下篩空心米飲服方寸匕日三

治女子漏下積年不斷困篤方

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:51
列印頁數：247
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取鵲重巢柴燒灰作末服方寸匕日三服三十日愈

甚良重巢者去年在巢中產今年又在上作重巢產者是也

馬通湯治漏下血積月不止方

赤馬通汁 一升取新馬屎絞取汁乾者水浸絞取汁 生艾葉 阿膠 各三兩 當歸 各三兩 乾薑 各二兩 好墨 半圓

右六味㕮咀以水八升酒二升煮取三升去滓內馬通汁及膠微火煎取二升分再服相去如人行十里久

馬蹄屑湯治白漏不絕方

白馬蹄 赤石脂 各五兩 禹餘糧 烏賊骨 龍骨 牡蠣 各四兩 當歸 各三兩 甘草 二兩 白殭蠶 一兩 附子 乾地黃

右十一味㕮咀以水二斗煮取九升分六服日三

馬蹄圓治白漏不絕方

白馬蹄 禹餘糧 各四兩 龍骨 三兩 烏賊骨

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白殭蠶 赤石脂 各二兩
右六味為末蜜丸梧子大酒服十丸不知加至三十
丸
慎火草散治漏下方 又方見前
慎火草 十兩 熬黃
當歸 龍骨 半兩
右五味治下篩先食酒服方寸匕日三
蒲黃散治漏下不止方
蒲黃 半升
當歸 各二兩
右三味治下篩酒服五分匕日三不知稍加至方寸匕
灸法
女人胞漏下血不可禁止灸關元兩傍相去三寸
女人陰中痛引心下及小腹絞痛腹中五寒灸關儀百壯穴在膝外邊上一寸宛宛中是
女人漏下赤白及血灸足太陰五十壯穴在内踝上三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寸足太陰經内踝上三寸名三陰交

女人漏下赤白月經不調灸交儀三十壯穴在内踝上五寸

女人漏下赤白灸營池四穴三十壯穴在内踝前後兩邊池中脉上一名陰陽是

女人漏下赤白四肢酸削灸漏陰三十壯穴在内踝下五分微動脚脉上

女人漏下赤白泄注灸陰陽隨年壯三報穴在足拇趾下屈裏表頭白肉際是

月經不調第二十一方 灸法

白垩圓治婦人月經一月再來或隔月不來或多或少淋瀝不斷或來而腰腹痛噓吸不能食心腹痛或青黄黑色或如水舉體沉重方

芍藥	白垩	白石脂
黄連	龍骨	牡蠣
茯苓	細辛	禹餘糧
乾薑	烏賊骨	各一兩半
	當歸	

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桂心　人參　瞿麥　石韋
白芷　白斂　附子　甘草　各一兩
蜀椒　半兩
右二十一味為末蜜丸如梧子大空心酒下二十丸日三至月候來時日四五服為佳

桃仁湯治產後及墮身月水不調或淋瀝不斷斷後復來狀如瀉水四體噓吸不能食腹中堅痛不可行動月水或前或後或經月不來舉體沉重惟欲眠臥多思酸物方

桃仁　五十枚
澤蘭　甘草　芍藥　牛膝　桂心　牡丹皮　當歸　各三兩
芍藥　生薑　各四兩
地黃　八兩
蒲黃　七合
右十四味㕮咀以水二斗煮取六升半分六服

杏仁湯治月經不調或一月再來或兩月三月一來或月前或月後閉塞不通方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杏仁 二兩
桃仁 一兩
大黃 三兩
水蛭 蟲蟲 各十枚 三
甘草 紫菀 各三兩 作紫蔵
代赭 一兩
桃仁 大黃 各五兩
朴硝 牡丹
之方
大黃朴硝湯治經年月水不利胞中有風冷所致宜下
物隨大小便有所下下多者止之少者勿止盡三服
右五味㕮咀以水六升煮取二升分三服一服當有
右十四味㕮咀以水一斗五升煮取五升去滓内消
令烊分五服五更為首相去一炊頃自下後將息忌
見風
菜菔蝱蟲湯治久寒月經不利或多或少方
牡丹 各一兩
生薑 一斤
吳茱萸 三升
蝱蟲 水蛭 蠐蟲
小麥 半夏 各一升

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大棗二十枚　桃仁五十枚　人參　牛膝各三兩

桂心六兩　甘草一兩半　芍藥二兩

右十五味咬咀以酒一斗水二升煮取一斗去滓適寒温一服一升日三不能飲酒人以水代之湯欲成乃内諸蟲不耐藥者飲七合

抵虎湯治月經不利腹中滿時自減并男子膀胱滿急

虎掌千金翼作虎杖　大黄各二兩　桃仁三十枚　水蛭二十枚

方

大黄一兩半　前胡一作柴胡　芒硝熬各五兩　葶藶

方

蜀椒並熬六銖各　生薑

芍藥各十八銖　茯苓十五銖

杏仁九銖熬　桃仁二十枚熬　水蛭半合熬　蝱蟲熬

右十二味為末蜜丸梧子大空腹飲服七丸日三不

七熬圓治月經不利手足煩熱腹滿默默不欲寤心煩

右四味以水三升煮取一升盡服之當下惡血為度

知加一倍千金翼無芍藥又一方有蠐螬牡丹各二兩為十四味

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桃仁散治月經來繞臍痛上衝心胸往來寒熱如瘧症狀方

桃仁 五十枚 桂心 十寸 五 茯苓 一兩 蠐螬 二十枚 牛膝 各二兩 代赭 各二兩 大黃 八兩

右八味治下篩宿勿食温酒服一錢匕日三

治月經往來腹腫腰腹痛方

廬蟲 四枚 蜀椒 一撮 乾薑 各六銖 大黃 各半兩 芎藭 各半兩 女青 桂心

右七味治下篩取一刀圭先食酒服之日三十日微下善養之

治月經不調或月頭或月後或如豆汁腰痛如折兩脚疼胞中風寒下之之方

大黃 朴硝 各四兩 牡丹 三兩 桃仁 一升 茯苓 甘草 人參 陽起石 各二兩 水蛭 蝱蟲 各二兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升去滓内朴硝令烊

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:54
列印頁數：254
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

盡分三服相去如一飯頃

陽起石湯治月水不調或前或後或多或少乍赤乍白

方

陽起石　甘草　續斷　乾薑

人參　桂心　各二兩　附子　一兩　赤石脂　三兩

伏龍肝　五兩　生地黃　一升

右十味以水一斗煮取三升二合分四服日三夜一

治婦人憂恚心下支滿膈中伏熱月經不利血氣上搶

心欲嘔不可多食懈怠不能動方

大黃　芍藥　蜈蚣　各二兩　土瓜根

蜀椒　黃芩　白朮　乾薑

地骨皮　一作炭皮　芎藭　各一兩　桂心　乾漆　各一兩半

右十二味為末蜜丸如梧子每服十丸日三不知加之

牛膝圓治產後月水往來乍多乍少仍復不通時時疼痛小腹裏急下引腰身重方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

牛膝　芍藥　人參　大黃　各三兩
牡丹皮　甘草　當歸　芎藭　各二兩
桂心一兩　蘼蕪　蠐螬　蜚蠊　各十四枚
蝟皮　水蛭　各七十枚

右十四味為末蜜丸如梧子酒服五丸日三不知稍增

又方鹿角末服之良

又方生地黃汁三升煮取二升服之

又方燒月經衣井花水服之

又方燒白狗糞焦作末酒服方寸匕日三

又方取白馬尿服一升良

治月經不斷方

船茹一斤淨洗河水四升半煮取二升分二服

又方服地黃酒良

又方服大豆酒佳

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:54
列印頁數：256
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方燒箕舌灰酒服之

又方灸内踝下白肉際青脉上隨年壯

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:55
列印頁數：257
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷十八至十一

詳校官太醫院吏目臣宋 柱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄舉人臣汪師曾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷八　唐　孫思邈　撰

少小嬰孺方　宋　林億等　校正

序例第一　方

論曰夫生民之道莫不以養小為大若無于小卒不成大故易稱積小以成大詩有厥初生民傳云聲子生隱公此之一義即是從微至著自少及長人情共見不待經史故今斯方先婦人小兒而後丈夫耆老者則是崇本之義也然小兒氣勢微弱醫士欲留心救療立功差難今之學者多不存意良由嬰兒在於襁褓之內乳氣腥臊醫者操行英雄詎肯瞻視靜言思之可為太息者矣小品方云凡人年六歲已上為小十六歲已上為少壯十已上為壯五十已上為老其六歲已下經所不載所以乳下嬰兒有病難治者皆為無所承據也中古有巫妨者立小兒

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:55
列印頁數：259
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

顱顖經以占夭壽判疾病死生世相傳授始有小兒方焉逮于晉宋江左推諸蘇家傳習有驗流于人間齊有徐王者亦有小兒方三卷故今之學者頗得傳授然徐氏位望隆重何暇留心于少小詳其方意不甚深細少有可採未為至祕今博撰諸家及自經用有效者以為此篇凡百居家皆宜達茲養小之術則無橫夭之禍也又曰小兒病與大人不殊惟用藥有多少為異其驚癎客忤解顱不行等八九篇合為此卷下痢等餘方並散在諸篇可披而得之

凡生後六十日瞳子成能咳笑應和人百日任脉成能自反覆一作百五十日百八十日尻骨成能獨坐二百一十日掌骨成能匍匐三百日臏骨成能獨立三百六十日膝骨成能行此其定法若不能依期者必有不平之處

凡兒生三十二日一變六十四日再變變且蒸九十六日三變一百二十八日四變變且蒸一百六十日五變一百九十二日六變變且蒸二百二十四日七變二百

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五十六日八變變且蒸二百八十八日九變三百二十日十變變且蒸積三百二十日小蒸畢後六十四日大蒸蒸後一百二十八日復大蒸蒸後六十四日復大蒸蒸後一百二十八日復大蒸蒸後六十四日復大蒸蒸後一百二十八日復大蒸蒸後六十四日復

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熱甚者達日數不歇審計變蒸之日當其時有熱微驚慎不可治及灸刺但和視之若良久熱不可已少與紫丸微下熱歇便止若於變蒸之中加以時行温病或非變蒸時而得時行者其診皆相似惟耳及尻通熱口上無白泡耳當先服黑散以發其汗汗出温粉粉之熱當歇便就瘥若猶不都除乃與紫丸下之兒變蒸時若有寒加之即寒熱交爭腹腰夭糺啼不止者熨之則愈也

熨法出下篇灸粉絮熨者是

變蒸與温壯傷寒相似若非變蒸身熱耳熱尻亦熱此乃為他病可作餘治審是變蒸不得為餘治也

又一法凡兒生三十二日始變變者身熱也至六十四日再變變且蒸其狀卧端正也至九十六日三變定者候丹孔出而泄至一百二十八日四變變且蒸以能咳笑也至一百六十日五變以成機關也至一百九十二日六變變且蒸五機成也至二百二十四日七變以能匍匐也至二百五十六日八變變且蒸以知欲學語也

列印日期/時間：02/04/2005 18:40:57
列印頁數：262
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

至二百八十八日九變以亭亭然也凡小兒生至二百八十八日九變四蒸也當其變之日慎不可妄治之則加其疾變且蒸者是兒送迎月也蒸者甚熱而脉亂汗出是也近者五日歇遠者八九日歇也當是蒸上不可灸刺妄治之也

紫圓治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒温壯汗後熱不歇及腹中有痰癖哺乳不進乳則吐哯食癇先寒後熱方

赤石脂 代赭 各一兩 巴豆三十枚 杏仁五十枚

右四味為末巴豆杏仁別研為膏相和更擣二千杵當自相得若硬入少蜜同擣之密器中收三十日兒服如麻子一丸與少乳汁令下食頃後與少乳勿令多至日中當小下熱除若未全除明旦更與一丸百日兒服如小豆一丸以此準量增減夏月多熱喜令發疹二三十日輒一服佳紫圓無所不療雖下不虛人

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黑散治小兒變蒸中挾時行温病或非變蒸時而得時行者方

麻黄　杏仁 各半兩　大黄 六銖

右三味先擣麻黄大黄為散別研杏仁如脂乃細細内散又擣令調和内窯器中一月兒服小豆大一枚以乳汁和服抱令得汗出温粉粉之勿使見風百日兒服如棗核以兒大小量之

擇乳母法

凡乳母者其血氣為乳汁也五情善惡悉是血氣所生也其乳兒者皆宜慎于喜怒夫乳母形色所宜其候甚多不可求備但取不胡臭癭癧氣嗽瘕疥癰瘡白禿癜瘡潘脣耳聾鼽鼻瘨瘺無此等疾者便可飲兒也師見其故灸癒便知其先疾之源也

備急千金要方卷八

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷九

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

少小嬰孺方

初生出腹第二 論一

論曰小兒初生先以綿裹指拭兒口中及舌上青泥惡血此為之玉衡一作衡若不急拭啼聲一發即入腹成百病矣兒生落地不作聲者取暖水一器灌之須臾當啼兒生不作聲者此由難產少氣故也可取兒臍帶向身却捋之令氣入腹仍呵之至百度啼聲自發亦可以蔥白徐徐鞭之即啼兒已生即當舉之舉之遲晚則令中寒腹内雷鳴乃先浴之然後斷臍不得以刀子割之須令人隔單衣物咬斷兼以暖氣呵七遍然後纏結所留臍帶令至兒足趺上短則中寒令兒腹中不調常下痢若先斷臍然後浴者則臍中水臍中水則發腹痛其臍斷訖連臍帶中多有蟲宜急剔撥去之不爾入兒腹成

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

疾斷兒臍者當令長六寸長則傷肌短則傷藏不以時斷若捋汁不盡則令暖氣漸微自生寒令男臍風生兒宜用其父故衣裹之生女宜以其母故衣皆勿用新帛為善不可令衣過厚令兒傷皮膚害血脉發雜瘡而黃兒衣綿帛特忌厚熱慎之慎之凡小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若都不見風則令肌膚脆輭便易中傷皆當以故絮衣之勿用新綿也凡天和暖無風之時令母將兒於日中嬉戲數見風日則血凝氣剛肌肉牢密堪耐風寒不致疾病若常藏在幃帳之中重衣溫暖譬猶陰地之草木不見風日輭脆不堪風寒也凡裹臍法椎治白練令柔輭方四寸新綿厚半寸與帛等合之調其緩急急則令兒吐哯兒生二十日乃解視臍若十許日兒怒啼似衣中有刺者此或臍燥還刺其腹當解之易衣更裹裹臍時閉户下帳然火令帳中溫暖換衣亦然仍以溫粉粉之此謂冬時寒也若臍不愈燒絳帛末粉之若過一月臍有汁不

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

愈燒蝦蟆灰粉之日三四度若臍中水及中冷則令兒腹絞痛夭糺啼呼面目青黑此是中水之過當灸粉絮以熨之不時治護臍至腫者當隨輕重重者便灸之乃可至八九十壯輕者臍不大腫但出汁時時啼呼者擣當歸末和胡粉傅之炙絮日熨之至百日愈以啼呼止為候若兒糞青者冷也與臍中水同兒洗浴斷臍竟棚抱畢未可與朱蜜宜與甘草湯以甘草如手中指一節許打碎以水二合煮取一合以綿纏沾取與兒吮之連吮汁計得一蜆殼入腹止兒當快吐吐去心胸中惡汁也如得吐餘藥更不須與若不得吐可消息計如飢渴須臾更與之若前所服及更與並不得吐者但稍稍與之令盡此一合止如得吐出惡汁令兒心神智慧無病也飲一合盡都不吐者是兒不含惡血耳勿復與甘草湯乃可與朱蜜以鎮心神安魂魄也兒新生三日中與朱蜜者不宜多多則令兒脾胃冷腹脹喜陰癇氣急變禁瘞而死新生與朱蜜法以飛鍊朱砂如大豆許以赤

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蜜一蜆殼和之以綿纏筯頭沾取與兒吮之得三沾止一日令盡此一豆許可三日與之則用三豆許也勿過此則傷兒也與朱蜜竟可與牛黃如朱蜜多少也牛黃益肝膽除熱定精神止驚辟惡氣除小兒百病也新生三日後應開腸胃助穀神可研米作厚飲如乳酪厚薄以豆大與兒咽之頻咽三豆許止日三與之滿七日可與哺也兒生十日始哺如棗核二十日倍之五十日如彈丸百日如棗若乳汁少不得從此法當用意小增之若三十日而哺者令兒無疾兒哺早者兒不勝穀氣令生病頭面身體喜生瘡愈而復發令兒厄弱難養三十日後雖哺勿多若不嗜食勿强與之不消復生疾病哺乳不進者腹中皆有痰癖也當以四物紫丸微下之節哺乳數目便自愈小兒微寒熱亦當爾利之要當下之然後乃瘥凡乳兒不欲太飽太飽則嘔吐每候兒吐者乳太飽也以空乳乳之即消日四乳兒若臍未愈乳兒太飽令風中臍也夏不去熱乳令兒嘔逆冬不去寒乳令

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

兒欬痢母新房以乳兒令兒羸瘦交脛不能行母有熱以乳兒令變黃不能食母怒以乳兒令喜驚發氣疝又令上氣癲狂母新吐下以乳兒令虛羸母醉以乳兒令身熱腹滿凡新生小兒一月内常飲猪乳大佳凡乳母乳兒當先極挼散其熱氣勿令汁奔出令兒噎輒奪其乳令得息息已復乳之如是十返五返視兒饑飽節度知一日中幾乳而足以為常又常捉去宿乳兒若卧乳母當以臂枕之令乳與兒頭平乃乳之令兒不噎母欲寐則奪其乳恐填口鼻又不知饑飽也浴兒法凡浴小兒湯極須令冷熱調和冷熱失所令兒驚亦致五藏疾也凡兒冬不可久浴浴久則傷寒夏不可久浴浴久則傷熱數浴背冷則發癇若不浴又令兒毛落新生浴兒者以猪膽一枚取汁投湯中以浴兒終身不患瘡疥勿以雜水浴之兒生三日宜用桃根湯浴桃根李根梅根各二兩枝亦得咬咀之以水三斗煮二十沸去滓浴兒良去不祥令兒終身無瘡疥治小兒驚辟惡氣以金虎

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

湯浴金一斤虎頭骨一枚以水三斗煮為湯浴但須浴即煮用之凡小兒初出腹有驚口者其舌上有白屑如米劇者鼻中亦有之此由兒在胞胎中受穀氣盛故也或妊娠時嗜糯米使之然治之之法以髮纏筯頭沾井花水法小兒初出腹有連舌舌下有膜如石榴子中濃以綿纏筯頭拭之若春夏無粟莢可煮粟木皮如用花水撩拭之三日如此便脫去如不脫可煮粟莢汁令隔連其舌下後喜令兒言語不發不轉也可以爪摘斷之微有血出無害若血出不止可燒髮作灰末傅之血便止也小兒出腹六七日後其血氣收斂成肉則口舌喉頰裏清淨也若喉裏舌上有物如蘆籜盛水狀者若懸癰有脹起者可以綿纏長針留刃處如粟米許大以針刺決之令氣泄去青黃赤血汁也一刺之止消息一日未消者來日又刺之不過三刺自消盡餘小小未消三刺亦止自然得消也有著舌下如此者名重舌有著頰裏及上腭如此者名重腭有著齒斷上者名重斷皆

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:00
列印頁數：270
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

刺去血汁也

小兒生輒死治之法

當候視兒口中懸癰前上腭有胞者以指摘取頭決血脉不斂也恐不育若有如此者皆宜與龍膽湯也出方

令潰去血勿令血入咽入咽殺兒急急愼之

小兒初出腹骨肉未斂肌肉猶是血也血凝乃堅成肌肉則使面目繞鼻口左右悉黄而啼閉目聚口撮面口中乾燥四肢不能伸縮者皆是肉耳其血沮敗不成肌肉則使面目繞鼻口左右悉黄

相兒命短長法

兒初生叫聲連延相屬者壽聲絶而復揚急者不壽

啼聲散不成人

啼聲深不成人

臍中無血者好

臍小者不壽

通身軟弱如無骨者不壽

鮮白長大者壽

自開目者不成人

目視不正數動者大非佳

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

汗血者多厄不壽
汗不流不成人
小便凝如脂膏不成人　頭四破不成人
常搖手足者不成人
早坐早行早齒早語皆惡性非佳人
頭毛不周匝者不成人　髮稀少者强不聽人（一作不聰）
額上有旋毛者早貴妨父母
兒生枕骨不成者能言而死
尻骨不成者能倨而死　掌骨不成者能匍匐而死
踵骨不成者能行而死　臏骨不成者能立而死
身不收者死
魚口者死
股間無生肉者死
顖下破者死
陰不起者死
陰囊下白者死赤者死
卵縫通達黑者壽
論曰兒三歲已上十歲已下視其性氣高下即可知其夭壽大畧兒小時識悟通敏過人者多夭大則項棗顏回之流是也小兒骨法成就威儀迴轉遲舒稍費人精

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

神雕琢者壽其預知人意迴旋敏速者亦夭即楊修孔融之徒是也由此觀之夭壽大畧可知也亦猶梅花早發不覩歲寒甘菊晚成終于年事是知晚成者壽之兆也

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:01
列印頁數：273
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷十

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

少小嬰孺方

驚癎第三 論方 候癎法 灸法

論曰少小所以有癎病及痙病者皆由臟氣不平故也新生即癎者是其五臟不收斂血氣不聚五脉不流骨法不成也多不全育其一月四十日已上至期歲而癎者亦由乳養失理血氣不和風邪所中也病先身熱掣癡驚啼叫喚而後發癎脉浮者為陽癎病在六腑外在肌膚猶易治也病先身冷不驚掣不啼呼而病發時脉沉者為陰癎病在五臟內在骨髓極難治也病發身軟時醒者謂之癎也身強直反張如弓不時醒者謂之痙也諸反張大人脊不容側手小兒容三指者不可復治也凡脉浮之與沉以判其病在陰陽表裏耳其浮沉復有大小滑澁虛實遲駛諸證各依脉形為治神農本草

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:02
列印頁數：274
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

經說小兒驚癎有一百二十種其證候微異於常便是癎候也初出腹血脉不斂五臟未成稍將養失宜即為病也時不成人其經變蒸之後有病餘證並寬惟中風最暴卒也小兒四肢不好驚掣氣息小異欲作癎及變蒸日滿不解者並宜與龍膽湯凡小兒之癎有三種有風癎有驚癎有食癎然風癎驚癎時時有之十兒之中未有一二是風驚者凡是先寒後熱發者皆是食癎也驚病皆按圖灸之風癎當與猪心湯食癎當下乃愈紫丸佳凡小兒所以得風癎者緣衣暖汗出風因入也風癎者初得之時先屈指如數乃發作者此風癎也驚癎者起于驚怖大啼乃發作者此驚癎也驚癎微者急持之勿復更驚之或自止也其先不哺乳吐而變熱後發癎者此食癎早下則瘥四味紫丸逐癖飲最良去病速而不虛人赤丸 本無赤丸方諸醫方並無按此服四味紫丸不得下者當以赤丸赤丸差缺病重者當用之今次後癖結脹滿篇中第一方八味名紫雙丸者用朱砂色當赤用巴豆又用甘遂比紫丸當缺疑此即赤丸也差缺病重者當用之凡小兒不能乳哺當與紫

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丸下之小兒始生生氣尚盛但有微惡則須下之必無所損及其愈病則致深益若不時下則成大疾疾成則難治矣凡下四味紫丸最善雖下不損人足以去疾若四味紫丸不得下者當以赤丸下之赤丸不下當倍之若已下而有餘熱不盡當按方作龍膽湯稍稍服之并摩赤膏 方見篇末本 風癎亦當下之然當以猪心湯下之驚癎但按圖灸之及摩生膏 方見篇末本 不可大下也何者驚癎心氣不定一作足下之內虛益令甚爾驚癎甚者特為難治故養小兒常慎驚勿令聞大聲抱持之間當安徐勿令驚怖又天雷時當塞兒耳并作餘細聲以亂之也凡養小兒皆微驚以長其血脉但不欲大驚大驚乃灸驚脉若五六十日灸者驚復更甚生百日後灸驚脉乃善兒有熱不欲哺乳臥不安又數驚此癎之初也服紫丸便愈不愈復與之兒眠時小驚者一月輒一以紫丸下之減其盛氣令兒不病癎也兒立夏後有病治之慎勿妄灸不欲吐下但以除熱湯浴之除熱散粉之 除熱湯散

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:02
列印頁數：276
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

見下篇傷寒條中除熱赤膏摩之又以膏塗臍中令兒在涼處勿禁水漿常以新水飲之小兒衣甚薄則腹中乳食不消不消則大便皆醋臭此欲為癖之漸也便將紫丸以微消之服法先從少起常令大便稀勿大下也稀後便漸減之不醋臭乃止藥也凡小兒冬月下無所畏夏月下難瘥然有病者不可不下下後腹中當小脹滿故當兒漸大當稍稍增之若減少者此腹中已有小不調也節哺乳數日不可妄下又乳哺小兒當令多少有常劑便微服藥勿復哺之但當與乳甚者十許日微者五六日止哺自當如常若都不肯食哺而但欲乳者此是有癖為疾重要當下之不可不下不下則致寒熱或吐而發癇或更致下痢此皆病重不早下之所為也此即難治矣但先治其輕時兒不耗損而病可速愈凡小兒屎黃而臭者此腹中有伏熱宜微將服龍膽湯若白而醋臭者此挾宿寒不消也當服紫丸微者少與藥令內消甚者少增藥令小下皆復節乳哺數日令胃氣平和若

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:03
列印頁數：277
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不節乳哺則病易復復下之則傷其胃氣令腹脹滿再三下之尚可過則傷矣凡小兒有癖其脉大必發癇此為食癇下之便愈當審候掌中與三指脉不可令起而不時下致於發癇則難療矣若早下之此脉終不起也脉在掌中尚可早療若至指則病增矣凡小兒腹中有疾生則身寒熱寒熱則血脉動動則心不定心不定則易驚驚則癇發速也

候癇法

夫癇小兒之惡病也或有不及求醫而致困者也然氣發于内必先有候常宜審察其精神而採其候也

手白肉魚際脉黑者是癇候魚際脉赤者熱

脉青大者寒脉青細者為平也

鼻口乾燥大小便不利是癇候

眼不明上視喜陽是癇候

耳後完骨上有青絡盛卧不靜是癇候青脉刺之令血出也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

小兒髮逆上啼笑面暗色不變是癇候

鼻口青時小驚是癇候

目閉青時小驚是癇候

身熱頭常汗出是癇候

身熱吐哯而喘是癇候

身熱目時直視是癇候

喜欠目上視是癇候

身熱目視不精是癇候

卧惕惕而驚手足振搖是癇候

卧夢笑手足動搖是癇候

意氣下而妄怒是癇候

咽乳不利是癇候

身熱小便難是癇候

吐痢不止厥痛時起是癇候

弄舌搖頭是癇候

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:04
列印頁數：279
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

已上諸候二十餘條皆癇之初也見其候便爪其陽脉所應灸爪之皆重手令兒驟啼及足絶脉亦依方與湯直視瞳子動腹滿轉鳴下血身熱口噤不得乳反張脊强汗出發熱為卧不悟手足掣瘛喜驚凡八條癇之極者也如有此非復湯爪所能救便當時灸之

論曰若病家始發便來詣師師可診候所解為法作次序治之以其節度首尾取瘥也病家已經雜治無次序不能制病病則變異其本候後師便不知其前證虚實直依其後證作治亦不得瘥也要應精問察之為前師所配依取其前蹤跡以為治乃無逆耳前師處湯本應數劑乃瘥而病家服一兩劑未效便謂不驗已後更問他師師不尋前人為治寒温次序而更為治而不次前師治則弊也或前已下之後須平和療以接之而得瘥也或前人未下之或不去者或前治寒温失度後人應調治之是為治敗病皆須邀射之然後免耳不依次第及不審察必及重弊也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

龍膽湯治嬰兒出腹血脉盛實寒熱温壯四肢驚掣發熱大吐哯者若已能進哺中食實不消壯熱及變蒸不解中客人鬼氣并諸驚癎方悉主之十歲已下小兒皆服之小兒龍膽湯第一此是新出腹嬰兒方若日月長大者以次依此爲例若必知客忤及有魅氣者可加人參六銖一歲兒加半兩餘藥皆准耳

當歸各如龍膽多少也一百日兒加三銖二百日兒加

龍膽　鉤藤皮　柴胡　黄芩

桔梗　芍藥　蜣蜋二枚　大黄一兩

茯苓一作茯神　甘草各六銖

右十味㕮咀以水一升煮取五合為劑也服之如後節度藥有虚實虚藥如足數合水也兒生一日至七日分一合為三服兒生八日至十五日分一合半為三服兒生十六日至二十日分二合為三服兒生二十日至三十日分三合為三服兒生三十日至四十日盡以五合為三服皆得下即止勿再服也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大黃湯治少小風癇積聚腹痛夭矯二十五癇方

大黃　人參　細辛　乾薑　當歸　甘皮　各三銖

右六味咬咀以水一升煮取四合服如棗許日三

白羊鮮湯治小兒風癇胷中有疾

白羊鮮三銖　蜚蟬二枚　大黃四銖　甘草　鉤藤皮　細辛各二銖　牛黃如大豆四枚　蛇蛻皮一寸

右八味咬咀以水二升半煮取一升二合分五服日

三若服已盡而癇不斷者可更加大黃鉤藤各一銖

以水漬藥半日然後煮之

增損續命湯治小兒卒中風惡毒及久風四肢角弓反

張不隨并躃□僻不能行步方

麻黃　甘草　桂心各一兩　芎藭　當歸　獨活各十八銖　杏仁二十枚　石膏各半兩

人參　黃芩

右十二味咬咀以水六升煮麻黃去上沫乃納諸藥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煮取一升二合三歲兒分為四服一日令盡少取汗得汗以粉粉之

石膏湯治小兒中風惡癖不能語口眼了戾四肢不隨方

石膏 一合 麻黃 八銖 甘草 射干 桂心 芍藥 當歸 各四銖 細辛 二銖

右八味㕮咀以水三升半先煮麻黃三沸去上沫内餘藥煮取一升三歲兒分為四服日三

治少小中風狀如欲絶湯方

大黃 牡蠣 龍骨 栝蔞根 甘草 桂心 各二十銖 赤石脂 寒水石 各六銖

右八味㕮咀以水一升内藥重半兩煮再沸絞去滓半歲兒服如雞子大一枚大兒盡服入口中即愈汗出粉之藥無毒可每日二服有熱加大黃不汗加麻黃無寒水石朴消代之

二物石膏湯治少小中風手足拘急方

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:05
列印頁數：283
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

石膏 如雞子大一塊碎 真珠 一兩

右以水二升煮石膏五六沸内真珠熬取一升稍稍分服

桂枝湯治少小中風脉浮發熱自汗出項强鼻鳴乾嘔方

桂心 生薑 大棗 四枚 甘草 芍藥 各一兩

右五味咬咀三物以水三升煮取一升分三服 此方與傷寒篇中方相重

二物驢毛散治少小新生中風方

驢毛一把 取背前交脊上會中拔取如手母指大一把 麝香 二豆大

右以乳汁和銅器中微火煎令焦熱出為末小兒不能飲以乳汁和之葦筒貯瀉著咽中然後飲乳令入腹

茵芋圓治少小有風癇疾至長不除或遇天陰節變便發動食飲堅强亦發百脉攣縮行步不正言語不便者

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:06
列印頁數：284
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

服之永不發方

茵芋葉　鉛丹　秦艽　鉤藤皮

石膏　杜蘅　防葵　各一兩　葛蒲

黃芩　各一兩半　松蘿　半兩　蜣蜋　十枚　甘草　三兩

右十二味為末蜜丸如小豆大三歲已下服五丸三歲已上服七丸五歲已上服十丸十歲已上可至十五丸

鎮心圓治小兒驚癇百病鎮心氣方

銀屑　十銖　二十　水銀　二銖　十　牛黃　六銖　大黃　六分

茯苓　三分　茯神　遠志　防己

白斂　雄黃　人參　芍藥　各二分

紫石英　真珠　防葵　鐵精　各四分

右十六味先以水銀和銀屑如泥別治諸藥和丸二歲兒如麻子二丸隨兒大小增之一方無牛黃一味丹參赤膏治少小心腹熱除熱方

丹參　雷丸　芒硝　戎鹽

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大黃 各一兩

右五味㕮咀以苦酒半升浸四種一宿以成鍊猪肪一斤煎三上三下去滓乃内芒硝膏成以摩心下冬夏可用一方但用丹參雷丸亦佳

五物甘草生摩膏治少小新生肌膚幼弱喜為風邪所中身體壯熱或中大風手足驚掣方

雷丸 二兩半

甘草 防風 各一兩 白朮 桔梗 各二十銖

右㕮咀以不中水猪肪一斤煎為膏以煎藥微火上煎消息視稠濁膏成去滓取如彈丸大一枚炙手以摩兒百過寒者更熱熱者更寒小兒雖無病早起常以膏摩顱上及手足心甚辟寒風

灸法

論曰小兒新生無疾慎不可逆針灸之如逆針灸則忍痛動其五脉因喜成癇河洛關中土地多寒兒喜病痙其生兒三日多逆灸以防之人灸頰以防噤有噤者舌

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下脉急牙車筋急其土地寒皆決舌下去血灸頰以防噤也吳蜀地温無此疾也古方既傳之今人不詳南北之殊便按方而用之是以多害於小兒也所以田舍小兒任其自然皆得無有夭横也小兒驚啼眠中四肢掣動變蒸未解慎不可針灸爪之凡灸癇當先下兒使虚乃承虚灸之未下有實而灸者氣逼前後不通殺人癇發平旦者在足少陽晨朝發者在足厥陰日中發者在足太陽黄昏發者在足太陰人定發者在足陽明夜半發者在足少陰

右癇發時病所在視其發早晚灸其所也

夫癇有五藏之癇六畜之癇或在四肢或在腹内當審其候隨病所在灸之雖少必瘥若失其要則爲害也

肝癇之爲病面青目反視手足搖灸足少陽厥陰各三壯

心癇之爲病面赤心下有熱短氣息微數灸心下第二

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:07
列印頁數：287
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肋端宛宛中此為巨闕也又灸手心主及少陰各三壯
脾癇之為病面黃腹大喜痢灸胃管三壯俠胃管傍灸
二壯足陽明太陰各二壯
肺癇之為病而目白口沫出灸肺輪三壯又灸手陽明
太陰各二壯
腎癇之為病面黑正直視不搖如尸狀灸心下二寸二
分三壯又灸肘中動脉各二壯又灸足太陽少陰各二
壯

膈癇之為病目反四肢不舉灸風府又灸頂上鼻人中
下脣承漿皆隨年壯
腸癇之為病不動搖灸兩承山又灸足心兩手勞宮又
灸兩耳後完骨各隨年壯又灸臍中五十壯

右五藏癇證候

牛癇之為病目正直視腹脹灸鳩尾骨及大推各三壯
壯病在腹中燒馬蹄末服之良
馬癇之為病張口搖頭馬鳴欲反折灸項風府臍中三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

燒牛蹄末服之良

羊癇之為病喜揚目吐舌灸大椎上三壯

猪癇之為病喜吐沫灸脊骨兩傍各一寸七壯

犬癇之為病手屈拳攣灸兩手心一壯灸足太陽一壯

雞癇之為病搖頭反折喜驚自搖灸足諸陽各三壯

灸肋戶一壯

右六畜癇證候

小兒暴癇灸兩乳頭女兒灸乳下二分

治小兒暴癇者身軀正直如死人及腹中雷鳴灸太倉及臍中上下兩傍各一寸凡六處又灸當腹度取背以繩繞頸下至臍中竭轉繩向背順脊下行盡繩頭灸兩傍各一寸五壯

若面白啼聲色不變灸足陽明太陰

若目反上視眸子動當灸顱中取之法橫度口盡兩吻際又橫度鼻下亦盡兩邊折去鼻度半都合口為度從額上髮際上行度之灸度頭一處正在顱上末合骨中

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

隨手動者是此最要處也次灸當額上入髮二分許直望鼻為正次灸其兩邊當目瞳子直上入髮際二分許次灸頂上迴毛中次灸客主人穴在眉後際動脉是次灸兩耳門當耳開口則骨解開動張陷是也次灸兩耳上捲耳取之當捲耳上頭是也一法大人當耳上橫三指小兒各自取其指也次灸兩耳後完骨上青脉亦可以針刺令血出次灸玉枕項後高骨是也次灸兩風池在項後兩轅動肋外髮際陷中是也次灸風府當項中央髮際亦可與風池三處高下相等次灸頭兩角兩角當迴毛兩邊起骨是也

右頭部凡十九處兒生十日可灸三壯三十日可灸五壯五十日可灸七壯病重者具灸之輕者惟灸顖中風池玉枕也艾使熟炷令平正著肉火勢乃至病所也艾若生炷不平正不著肉徒灸多炷故無益也

若腹滿短氣轉鳴灸肺募在兩乳上第二肋間宛宛中懸繩取之當瞳子是次灸膻中次灸鳩尾次灸巨闕次灸上脘次灸中脘次灸下脘次灸建里次灸水分次灸陰交次灸神闕次灸氣海次灸石門次灸關元次灸中極次灸曲骨次灸橫骨次灸大赫次灸氣穴次灸四滿次灸中注次灸肓俞次灸商曲次灸石關次灸陰都次灸腹通谷次灸幽門次灸步廊次灸神封次灸靈墟次灸神藏次灸彧中次灸俞府次灸天突次灸璇璣次灸華蓋次灸紫宮次灸玉堂次灸膺窗次灸乳中次灸乳根次灸不容次灸承滿次灸梁門次灸關門次灸太乙次灸滑肉門次灸天樞次灸外陵次灸大巨次灸水道次灸歸來次灸氣衝次灸髀關次灸伏兔次灸陰市次灸梁丘次灸犢鼻次灸足三里次灸上巨虛次灸條口次灸下巨虛次灸豐隆次灸解谿次灸巨虛上廉次灸巨虛下廉次灸三陰交次灸漏谷次灸地機次灸陰陵泉次灸陽陵泉次灸陽交次灸外丘次灸光明次灸陽輔次灸懸鐘次灸丘墟次灸足臨泣次灸地五會次灸俠溪次灸足竅陰次灸大敦次灸行間次灸太衝次灸中封次灸蠡溝次灸中都次灸膝關次灸曲泉次灸陰包次灸足五里次灸陰廉次灸急脈次灸章門次灸期門次灸大橫次灸腹哀次灸食竇次灸天谿次灸胸鄉次灸周榮次灸大包次灸天池次灸腋下三寸次灸極泉次灸青靈次灸少海次灸靈道次灸通里次灸陰郄次灸神門次灸少府次灸少衝次灸天井次灸清冷淵次灸消濼次灸臑會次灸肩髃次灸巨骨次灸天鼎次灸扶突次灸禾髎次灸肩貞次灸臑俞次灸天宗次灸秉風次灸曲垣次灸肩外俞次灸肩中俞次灸天窗次灸瘂門次灸風府次灸大椎次灸陶道次灸身柱次灸神道次灸靈台次灸至陽次灸筋縮次灸中樞次灸脊中次灸懸樞次灸命門次灸陽關次灸腰俞次灸長強次灸上髎次灸次髎次灸中髎次灸下髎次灸會陽次灸承扶次灸殷門次灸浮郄次灸委陽次灸委中次灸附分次灸魄戶次灸膏肓俞次灸神堂次灸譩譆次灸膈關次灸魂門次灸陽綱次灸意舍次灸胃倉次灸肓門次灸志室次灸胞肓次灸秩邊次灸合陽次灸承筋次灸承山次灸飛揚次灸跗陽次灸崑崙次灸僕參次灸申脉次灸金門次灸京骨次灸束骨次灸足通谷次灸至陰次灸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

灸薜息薜息在兩乳下第一肋間宛中是也次灸巨闕大人去鳩尾下一寸小兒去臍作六分分之去鳩尾下一寸是也并灸兩邊次灸胃管次灸金門金門在轂道前寸半之後當中央是也從陰寸下度之大孔前中分右腹部十二處鳩胃管十日兒可灸三壯一月已上可五壯陰下縫中可三壯或云隨年壯

强反張灸大椎并灸諸藏輸及督脊上當中從大椎窮骨中屈更從大椎度之灸度下頭是督脊也右背部十二處十日兒可灸三壯一月已上可灸五壯若手足掣癡驚者灸尺澤次灸陽明次灸少商次灸勞宮次灸心主次灸合谷次灸三關次灸少陽右手部十六處其要者陽明少商心主尺澤合谷少陽也壯數如上

又灸伏兔次灸三里次灸腓腸次灸鹿溪次灸陽明次灸少陽次灸然谷

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右足部十四處皆要可灸壯數如上

手足陽明謂人四指凡小兒驚癇皆灸之若風病大動手足掣癖者盡灸手足十指端又灸本節後

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:09
列印頁數：292
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

少小嬰孺方

客忤第四 論灸法方呪法

論曰少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一名中人是為客忤也雖是家人或別房異户雖是乳母及父母或從外還衣服經履鬼神麤惡暴氣或牛馬之氣皆為忤也鈌作喘息乳氣未定者皆為客忤其乳母遇醉及房勞喘後乳兒最劇能殺兒也不可不慎凡諸乘馬行得馬汗氣臭未盥洗易衣裝便向兒邊令兒中馬客忤兒卒見馬來及聞馬鳴驚及馬上衣物馬氣皆令小兒中馬客忤慎護之特重一歲兒也凡小兒衣布帛綿中不得有頭髮履中亦爾白衣青帶青衣白帶皆令中忤凡非常人及諸物從外來亦能驚小兒致病欲防之法諸有從外來人及有異物入户當將兒避之勿令

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

見也若不避者燒牛屎令常有煙氣置戶前則善
小兒中客為病者無時不有此病也而秋初一切小兒
皆病者豈是一切小兒悉中客邪夫小兒所以春冬少
病秋夏多病者秋夏小兒陽氣在外血脉嫩弱秋初夏
末晨夕時有暴冷小兒嫩弱其外則易傷暴冷折其陽
陽結則壯熱胃冷則下痢是故夏末秋初小兒多壯熱
而下痢也未必皆是中客及魅也若治少小法夏末秋
初常宜候天氣温凉也有暴寒卒冷者其少小則多患
壯熱而下痢也慎不可先下之皆先殺毒後下之耳玄
中記云天下有女鳥名曰姑獲 肘後子母秘録作鳥獲 一名天帝
女一名隱飛鳥一名夜行遊女又曰鈞星鬼喜以陰雨
夜過飛鳴徘徊人村里喚得來者是也鳥淳雌無雄不
産陰氣毒化生喜落毛羽於人中庭置兒衣中便令兒
作癇病必死即化為其兒也是以小兒生至十歲衣被
不可露也七八月尤忌
凡中客忤之為病類皆吐下青黄白色水穀解離腹痛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大糺面色變易其候似癇但眼不上插耳其脉急數者是也宜與龍胆湯下之加人參當歸各如龍膽秤分等多少也小兒中客急視其口中懸癰左右當有青黑腫脉核如麻豆大或赤或白或青如此便宜用針速刺潰去之亦可爪摘決之并以綿纏釵頭拭去血也少小中客之為病吐下青黄赤白汁腹中痛及反倒偃側喘似癇狀但目不上插少睡耳面變五色其脉弦急若失時不治少久則難治矣欲療之方用豉數合水拌令濕擣熟丸如雞子大以摩兒顖及手足心各五六遍畢以丸摩兒心及臍上下行轉摩之食頃破視其中當有細毛即擲丸道中痛即止

治少小中客忤强項欲死方

取衣中白魚十枚為末以傅母乳頭上令兒飲之入咽立愈一方二枚著兒母手掩兒臍中兒吐下愈亦以摩兒項及脊强處

治少小客忤二物黄土塗頭方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

竈中黃土蚯蚓屎等分擣合水和如雞子黃大塗兒頭上及五心良一方云雞子青和如泥

又方

吞麝香如大豆許立愈

治少小犯客忤發作有時者方

以母月衣覆兒上大良

治小兒卒中忤方

剪取驢前膊胛上旋毛大如彈子以乳汁煎之令毛消藥成著乳頭飲之下喉即愈

又方燒母衣帶三寸并髮合乳汁服之

又方取牛鼻津服之

又方取牛口沫傅乳頭飲之

一物猪蹄散治小兒寒熱及赤氣中人方

猪後脚懸蹄燒末擣篩以飲乳汁一撮立效

治少小卒中客忤不知人者方

取熱馬屎一丸絞取汁飲兒下咽便愈亦治中客忤

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

而□啼面青腹强者

二物燒髮散治少小見人來卒不佳腹中作聲者方

用向來者人顖上髮十莖斷兒衣帶少許合燒灰細

末和乳飲兒即愈

治小兒卒客忤方

銅鏡鼻燒令赤著少許酒中大兒飲之小兒不能飲

者含與之即愈

一物馬通浴湯治少小中忤方

馬通三升燒令煙絕以酒一斗煮三沸去滓浴兒即

愈

一物猪通浴湯治小兒中人忤□啼面青腹强者方

猳猪通二升以熱湯灌之適寒温浴兒

治小兒中馬客忤而吐不止者方

灸手心主間使大都隱白三陰交各三壯可用粉丸

如豉法並用唾唾而呪之呪法如左

呪客忤法

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:11
列印頁數：297
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

呪曰摩家公摩家母摩家子兒苦客忤從我始扁鵲雖良不如善唾良呪訖棄丸道中

又法取一刀橫著竈上解兒衣發其心腹訖取刀持向兒呪之唾輒以刀擬向心腹啡啡曰音非出唾貌煌煌曰出東方背陰向陽葛公葛公不知何公子來不視去不顧過與生人忤梁上塵天之神戶下土鬼所經大刀鐶犀對竈君二七唾客愈兒驚唾啡啡如此二七啡啡每唾以刀擬之呪當三遍乃畢用豉丸如上法五六遍訖取此丸破視其中有毛棄丸道中客忤即愈矣

小兒魅方

論曰凡小兒所以有魅病者是婦人懷娠有惡神導其腹中胎妬嫉他小兒令病也魅者小鬼也妊娠婦人不必悉招魅魅人時有此耳魅之為疾喜微微下痢寒熱或有去來毫毛鬢髮□鬣不悅是其證也宜服龍膽湯凡婦人先有小兒未能行而母更有娠使兒飲此乳亦

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

作魘也令兒黃瘦骨立髮落壯熱是其證也

治魘方

灸伏翼熱嚼哺之

又方燒伏翼末飲服之

白鮮皮湯治少小客魘挾實方

又方以水二升煮菰蓄冬瓜各四兩取浴之

白鮮皮　大黃　甘草　各一兩　芍藥

茯苓　細辛　桂心　各十銖

右七味㕮咀以水二升煮取九合分三服

小兒夜啼

龍角圓治小兒五驚夜啼方　崔氏名五驚丸

龍角　六銖　牡蠣　一作牡丹　川大黃　各九銖　黃芩　半兩

蚱蟬　二枚　牛黃　如小豆五枚

右六味末密丸如麻子薺裹兒服二丸隨兒大小增減

芎藭散治小兒夜啼至明即安寐方

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:12
列印頁數：299
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芎藭　白朮　防已　各半兩
右三味治下篩以乳和與兒服之量多少又以兒母手掩臍中亦以摩兒頭及脊驗二十日兒未能服散者以乳汁和服如麻子一丸兒大能服散者以意斟酌與之
一物前胡圓治少小夜啼方
前胡隨多少擣末以蜜和丸如大豆服一丸日三稍加至五六丸以瘥為度
又方以妊娠時食飲偏有所思者物以此哺兒則愈
又方
伏龍肝　交道中土　各一把
右二味治下篩水和少許飲之
又方取馬骨燒灰傅乳上飲兒啼即止
治小兒夜啼不已醫所不治者方
取狼屎中骨燒灰為末水服如黍米粒大二枚即定
治小兒驚啼方

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:12
列印頁數：300
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取雞屎白熬末以乳服之佳

又方酒服亂髮灰

又方車轄脂如小豆許内口中及臍中

又方臘月縛猪繩燒灰服之

又方燒蝟皮三寸灰著乳頭飲之

千金湯治小兒暴驚啼絶死或有人從外來邪氣所逐

令兒得疾衆醫不治方

蜀椒　左顧牡蠣　各六銖碎

右二味以酢漿水一升煮取五合每服一合

傷寒第五　論灸法方

論曰夫小兒未能冒涉霜雪乃不病傷寒也大人解脫之久傷於寒冷則不論耳然天行非節之氣其亦得之有時行疾疫之年小兒出腹便患斑者也治其時行節度故如大人法但用藥分劑少異藥小冷耳

麥門冬湯治小兒未滿百日傷寒鼻衄身熱嘔逆方

麥門冬　十八銖　石膏　寒水石　甘草　各半兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桂心 銖八
右五味㕮咀以水二升半煮取一升每服一合日三
芍藥四物解肌湯治少小傷寒方
芍藥 黃芩 升麻 葛根 各半兩
右四味以水三升煮取九合去滓分服暮歲已上分三
服
麻黃湯治少小傷寒發熱欬嗽頭面熱者方
麻黃 生薑 黃芩 各一兩 甘草
右八味㕮咀以水四升煮取一升半分二服兒若小
以意減之
治小兒傷寒方
桂心 石膏 芍藥 各半兩 杏仁十枚
葛根汁 淡竹瀝 各六合
右二味相和二三歲兒分三服百日兒斟酌服之不
宜生煮服佳
治小兒時氣方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桃葉三兩擣以水五升煮十沸取汁日五六遍淋之
若復發燒雄鼠屎二枚燒水調服之
五味子湯治小兒傷寒病久不除瘥後復劇瘦瘠骨立方
五味子 十銖 大黃 各六銖 黃連 黃芩 各十銖
麥門冬 前胡 各六銖 芒硝 五銖 石膏 一兩
甘草 當歸 各十二銖
右十味咬咀以水三升煮取一升半服二合得下便止計大小增減之
莽草浴湯治小兒傷寒方
莽草 半斤 牡蠣 四兩 雷丸 三十枚 大黃 一兩
蛇牀子 一升
右五味以水三斗煮取斗半適寒温以浴兒避眼及陰
又方治小兒卒寒熱不佳不能服藥方
莽草 丹參 桂心 各三兩 菖蒲 半斤

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

雷丸 一升 蛇牀子 二兩
右六味以水二斗煮三五沸適寒温以浴兒避眼及陰
陰
雷丸浴湯治小兒忽寒熱方
右六味咬咀以水二斗煮取一斗半浴兒避眼及陰
石膏 各三兩 雷丸 二十枚 大黄 四兩 黄芩 一兩 丹參 二兩 苦參
李葉浴湯治少小身熱方
李葉無多少咬咀以水煮去滓將浴兒良
浴訖以粉粉之勿厚衣一宿復浴
柳枝浴湯治小兒生一月至五月乍寒乍熱方
細切柳枝煮取汁洗兒若渴絞冬瓜汁服之
青木香浴湯治小兒壯熱羸瘠方
右五味咬咀以水二斗煮取一斗稍稍浴兒
青木香 四兩 麻子仁 竹葉 各一升 虎骨 五兩
白芷 三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

十二物寒水石散治少小身體壯熱不能服藥方

寒水石　芒硝　滑石　石膏

赤石脂　青木香　大黄　甘草

黄芩　防風　芎藭　麻黄根

右各等分合治下篩以粉一升藥屑三合相和復以篩篩之以粉兒身日三

李根湯治小兒暴有熱得之二三日者方

李根　桂心　芒硝　各十八銖　麥門冬

甘草　各一兩

右五味㕮咀以水三升煮取一升分五服

升麻湯治小兒傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心腹堅

急大小便不利或口瘡者或因壯熱便四肢攣掣驚仍

成癇疾時發時醒醒後身熱如火者悉主之方

升麻　白薇　麻黄　萎蕤

柴胡　甘草　各半兩　黄芩　一兩　朴消

大黄　釣藤　各六銖

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十味咬咀以水三升先煮麻黃去上沫内諸藥煮取一升兒生三十日至六十日一服二合六十日至百日一服二合半百日至二百日一服三合

大黃湯治小兒肉中久挾宿熱瘡瘡熱進退休作無時方

大黃　甘草　芒硝各半兩　桂心八銖　石膏一兩　大棗五枚

右六味咬咀以水三升煮取一升每服二合

蜀椒湯治小兒潮熱方

蜀椒　甘草　知母　龍骨　牡蠣各半兩　石膏一兩　桂心八銖　大黃　黃芩　甘草　麥門冬　芒硝各半兩　石膏一兩　桂心八銖

右五味咬咀以水四升煮取一升去滓一歲兒少少

治小兒腹大短氣熱有進退食不安穀為不化方

温服半合日再

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:14
列印頁數：306
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右七味㕮咀以水三升煮取一升半分三服期歲已下小兒作五服

竹葉湯治小兒夏月患腹中伏熱温壯來往或患下痢色或白或黄三焦不利方

竹葉 切 小麥 各半合 五 柴胡 麥門冬

人參 甘草 各半兩 茯苓 十八銖 黄芩 一兩六銖

右八味㕮咀以水四升煮竹葉小麥取三升去竹葉小麥下諸藥煮取一升半分三服若小兒夏月忽壯

小麥下諸藥煮取一升半分三服若小兒夏月忽壯熱燒人手洞下黄瀦氣力憒然脉極洪數用此方加大黄二兩再服得下即瘥

又方治五六歲兒温壯腹中急滿息不利或有微腫亦治極羸不下飲食堅痞手足逆冷方

竹葉 切 一升 小麥 半升 甘草 黄芩

栝蔞根 澤瀉 茯苓 知母

白朮 大黄 各一兩 桂心 二銖 生薑 一兩半

人參 麥門冬 半夏 各二兩 當歸 十八銖

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十六味咬咀以水七升煮竹葉小麥取四升去滓内藥煎取一升六合分四服

治小兒連壯熱實滯不去寒熱往來微驚悸方

大黄一兩 黄芩 栝蔞根 甘草各十八銖

滑石二兩 桂心 牡蠣 人參

龍骨 凝水石 白石脂 消石各半兩

右十二味咬咀以水四升煮取一升半每服三合一日一夜令盡雖吐亦與之一本加紫石英半兩

欽定四庫全書

備急千金要方

調中湯治小兒春秋月晨夕中暴冷冷氣折其四肢熱不得泄則壯熱冷氣入胃變下痢或欲赤白滯起數去小腹脹痛極壯熱氣脉洪大或急數者服之熱便歇下亦瘥也但壯熱不吐下者亦主之之方

葛根 黄芩 茯苓 桔梗

芍藥 白朮 藁本 大黄

甘草 鉄各六

右九味咬咀以水二升煮取五合服如後法兒生一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

日至七日取一合分三服生八日至十五日取一合半分三服生十六日至二十日取二合分三服生二十日至三十日取三合分三服生三十日至四十日取五合分三服恐喫五合未得更以意斟酌百日至三百日兒一如前篇龍膽湯加之

生地黃湯治小兒寒熱進退啼呼腹痛方

生地黃 桂心 各二兩

右二味以水三升煮取一升朞歲已下服二合以上

三合一方七味有芍藥寒水石黃芩當歸甘草各半兩

治小兒傷寒發黃方

擣土瓜根汁三合服之

又方擣韭根汁澄清取如大豆許滴兒鼻中即出黃水瘥

又方擣青麥汁服之

又方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

小豆 三七枚
瓜蒂 十四枚
糯米 四十粒

右三味為末吹入鼻中

二物通汗散治少小有熱不汗方

粉 半斤
雷丸 四兩

右擣為細末和下篩以粉兒身

二物茯苓粉散治少小頭汗方

茯苓 牡蠣 各四兩

右治下篩以粉八兩合擣為散有熱輒取粉汗即自止

三物黃連粉散治少小盜汗方

黃連 牡蠣 各十八銖
貝母 各十八銖

右以粉一升合擣下篩取粉兒身佳

犀角飲子此由心臟熱之所感宜服此方

犀角 十八銖
茯神 一兩
麥門冬 一兩半
甘草 半兩

右五味㕮咀以水九合煎取四合分服加龍齒一兩

白术 六銖

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:16
列印頁數：310
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

佳

恒山湯治小兒溫瘧方

恒山 切 一兩 小麥 二合 淡竹葉 切 一升

右三味以水一升半煮取五合一日至七日兒一合為三服十六日至二十日兒二合為三服四十日至六十日兒六合為三服六十日至百日兒一服二合半百日至二百日兒一服三合

兒一服三合

灸身

又方鹿角末臨發時先服一錢匕

又方燒鼈甲灰以酒服一錢匕至發時服三匕并以火灸兩乳下一指三壯

又方燒雞脞胵中黃皮為末和乳與服男雄女雌

備急千金要方卷十一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷十二至十四

詳校官太醫院醫士臣舒仪

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣胡紹基

謄録舉人臣汪師曾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷十二　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

少小嬰孺方

斂噦第六　方

小兒出胎二百許日頭身患小小瘡治護小瘥復發五月中忽小小斂噦微温和治之因變癇一日二十過發四肢縮動背脊□□眺眼反須臾氣絶良久復蘇已與常日一夕中合進一升許發時小踈明日與此竹瀝湯得吐下發便大折其間猶稍稍與竹瀝汁

竹瀝湯方

竹瀝　五合　黄芩　三銖　木防己　羚羊角

白术　各六銖作白鮮　大黄　二兩　茵芋　三銖

麻黄　白薇　桑寄生　菴蘭

甘草　各半兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:17
列印頁數：313
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十二味咬咀以水二升半煮取藥減半内竹瀝煎取一升分服二合相去一食久進一服一方無革蘇

紫菀湯治小兒中冷及傷寒暴嗽或上氣咽喉鳴氣逆或鼻塞清水出方

紫菀 杏仁 甘草 橘皮 青木香 麻黄 桂心 各六銖 大黄一兩 黄芩 當歸

右十味咬咀以水三升煮取九合去滓六十日至百日兒一服二合半一百日至二百日兒一服三合

五味子湯治小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘迫欬嗽晝夜不息食則吐不下方

五味子 當歸 各一兩 半夏 麻黄 乾薑 甘草 各六兩 紫菀 人參 桂心 細辛 欵冬花 各二兩 大黄一兩半 白朮 各六銖

右十二味咬咀以水二升半煮取九合去滓兒六十日至百日一服二合半一百日至二百日一服三合其

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大黃別浸一宿下 黃一方無欬冬花大有大棗三枚

治小兒大人欬逆短氣胸中吸吸呵出涕唾嗽出臭膿方

燒淡竹瀝煮二十沸小兒一服一合日五服大人一升亦日五服不妨食息乳哺

治小兒寒熱欬逆膈中有癖乳若吐不欲食方

乾地黃 四兩 麥門冬 五味子 蜜 各半升

大黃 消石 各一兩

欽定四庫全書

備急千金要方

右六味咬咀以水三升煮取一升去滓内消石蜜煮令沸服二合日三胸中當有宿乳汁一升許出大者

射干湯治小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干 麻黃 紫菀 甘草 生薑 各一兩 半夏 五枚 桂心 五寸 大棗 二十枚

右八味咬咀以水七升煮取一升五合去滓内蜜五合煎一沸分温服二合日三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方

半夏 兩四 紫菀 桂心 生薑 細辛 阿膠 甘草 各二兩 欵冬花 二合 蜜 一合

右九味㕮咀以水一斗煮半夏取六升去滓内諸藥煮取二升五合五歲兒服一升二歲服六合量大小多少加減之服之立効

杏仁圓治大人小兒欬逆上氣方

杏仁三升熟擣如膏蜜一升為三分以一分内杏仁擣令强更内一分擣之如膏又内一分擣熟止先食已含咽之多少自在日三每服不得過半方寸匕則利

又方

半夏 二斤去皮洗六七度完用 河水 白礬 一斤為末 丁香 甘草 草豆蔻 川升麻 縮砂 各四兩粗擣

右七味以好酒一斗與半夏拌和勻同浸春冬三七

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:18
列印頁數：316
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

日夏秋七日密封口日足取出用冷水急洗風吹乾每服一粒嚼破用薑湯下或乾喫候六十日乾方得服（疑非孫思邈方）

八味生薑煎治少小嗽方

生薑七兩　乾薑四兩　桂心二兩　甘草　欵冬花各三兩　紫菀各三兩　杏仁　蜜各一升

右合諸藥為末微火上煎取如飴餹量其大小多少與兒含咽之百日小兒如棗核許日四五服甚有驗

四物欵冬圓治小兒嗽晝瘥夜甚初不得息不能復啼方

欵冬花　紫菀各一兩半　桂心半兩　伏龍肝六銖

右為末蜜和如泥取如棗核大傅乳頭令兒飲之日三傅之漸漸令兒飲之

葛蒲圓治小兒暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆鳴方

葛蒲　烏頭　杏仁　礬石　細辛　皂莢各六銖　欵冬花　乾薑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桂心 紫菀 各十八銖 蜀椒 五銖 吳茱萸 六合

右十二味為末蜜丸如梧子三歲兒飲服五丸加至十丸日三兒小以意減之兒大以意加之暴嗽數服便瘥

桂枝湯治少小十日已上至五十日卒得驚欬吐乳嘔逆暴嗽晝夜不得息方

桂枝 半兩 甘草 二兩 麥門冬 一兩十八銖 紫菀 十八銖

右四味咀以水二升煮取半升以綿著湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過與之節乳哺

麻黃湯治少小卒肩息上氣不得安此惡風入肺方

麻黃 四兩 甘草 一兩 桂心 五寸 五味子 半升

半夏 生薑 各二兩

右六味咀以水五升煮取二升百日兒服一合大小節度服之便愈

癖結脹滿第七 方灸法 雜亂附

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:19
列印頁數：318
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

雙紫圓治小兒身熱頭痛食飲不消腹中脹滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起小兒無異疾惟飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱惟此丸治之不瘥更可重服小兒欲下是其蒸候哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹内不調悉宜用此丸不用他藥數用神驗千金不傳方 臣億等詳序例中凡云服紫丸者即前變蒸篇中四味者是也云服紫丸不下者服赤丸赤丸差缺病重者當用之方中並無赤丸而此用朱砂又力緊於紫丸疑此即赤丸也

巴豆 薤核仁 各十八銖 麥門冬 十銖 甘草 五銖

甘遂 朱砂 各二銖 牡蠣 蠟 各八銖

右八味以湯熟洗巴豆研新布絞去油別擣甘草甘遂牡蠣麥門冬下篩訖研薤核仁令極熟乃内散更擣二千杵藥燥不能相丸更入少蜜足之半歲兒服如荏子一雙一歲二歲兒服如半麻子一雙三四歲者服如麻子二丸五六歲者服如大麻子二丸七歲八歲服如小豆二丸九歲十歲微大於小豆二丸常以雞鳴時服至日出時不下者熱粥飲數合即下丸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

皆雙出也下甚者飲以冷粥即止

治小兒胎中宿熱乳母飲食粗惡辛苦乳汁不起兒乳哺不為肌膚心腹痞滿萎黃瘦瘠四肢癈躄繚戾服之可令充悅方

芍藥 柴胡 各二兩 大黃 人參 各一兩 乾薑 如棗核大以熱水代以甘草 各半兩 鼈甲 茯苓 各一兩半

右八味為末蜜丸如大豆服一丸一歲已上乳服三丸七歲兒服十丸日二

牛黃圓治小兒宿乳不消腹痛驚啼方

牛黃 三銖 附子 二枚 真珠 巴豆 杏仁 各一兩

右五味擣附子真珠為末下篩別擣巴豆杏仁令如泥內藥及牛黃擣一千二百杵藥成若乾入少蜜足之百日兒服如粟米一丸三歲兒服如麻子一丸五六歲兒服如胡豆一丸日二先乳哺了服之膈上下悉當微轉藥完出者病愈散出者更服以藥完出為

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

度

芒硝紫圓治小兒宿食癖氣痰飲往來寒熱不欲食消瘦方

芒硝 大黃 各四兩 半夏 甘遂 各二兩 代赭 一兩 巴豆 二百枚 杏仁 一百二十枚

右七味為末別擣巴豆杏仁治如膏旋内藥末擣三千杵令相和合强者内少蜜百日兒服如胡豆一丸過百日至一歲服二丸隨兒大小以意節度當候兒大便中藥出為愈若不出更服如初

治八歲已上兒熱結痰實不能食自下方

芍藥 梔子 知母 大黃 各二兩 柴胡 二兩六銖 升麻 黃連 黃芩 各二兩半 竹葉 切一升半 桔梗 一兩 細辛 十五銖

右十一味咬咀以水六升煮取一升八合去滓分四服十歲兒為三服一本有枳實杏仁各一兩半而無桔梗黃連

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治十五已下兒熱結多痰食飲減自下方

大黃　柴胡　升麻　芍藥　生薑十八銖　杏仁三兩

黃芩各三兩　枳實一兩十八銖　竹葉切一升半　知母　梔子各二兩半

右十一味㕮咀以水六升半煮取二升十歲至十五者分三服

牛黃雙圓治小兒結實乳食不消心腹痛方

牛黃　太山甘遂各半兩　真珠六銖

杏仁　芍藥　黃芩各一兩　巴豆十八銖

右七味為末蜜丸一歲兒飲服如麻子二丸但隨兒大小加減之

牛黃鼈甲圓治少小癖實壯熱食不消化中惡忤氣方

牛黃　厚朴　芩藥　乾薑各半兩　鼈甲　麥糵　柴胡　大黃　枳實　芎藭各一兩

右十二味為末蜜丸如小豆大日三服以意量之

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:20
列印頁數：322
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芜花圓治小兒心下痞痰癖結聚腹大脹滿身體壯熱不欲哺乳方

芜花 各一兩 黄芩 各二兩半 大黄 雄黄 各二兩半

右四味為末蜜和更擣一千杵三歲兒至一歲已下服如粟米一丸欲服丸内兒喉中令母與乳若長服消病者當以意消息與服之與乳哺相避

真珠圓治小兒痰實結聚宿癖羸露不能飲食方

真珠 半兩 麥門冬 一兩 薤仁 二百枚 巴豆 四十枚

右四味為末蜜丸暮歲兒服二丸如小豆大二百日兒服如麻子二丸漸增以知為度當下病赤黄白黑葵汁下勿絶藥病盡下自止久服使小兒肥白已試驗

鼈甲圓治少小腹中結堅脅下有瘀手足煩熱方

鼈甲 芍藥 大黄 各三十銖 茯苓 各二十四銖 柴胡 乾薑 各二十銖 桂心 六銖 蠐螬 各二十枚 蜚蠊

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右九味為末蜜和服如梧子七丸漸漸加之以知為度

鼈頭圓治小兒痞氣胷下腹中有積聚堅痛方

鼈頭 一枚 甘皮 半兩 蝟蟲 麋蟲 桃仁 各十八銖

大黃十八銖以知為度

治小兒羸瘦惙惙宜常服不妨乳方

右五味為末蜜丸服如小豆二丸日三大便不利加甘草五兩為末蜜丸一歲兒服如小豆十丸日三服盡即更合

桂心橘皮湯治小兒五六日不食氣逆方

桂心 人參 各半兩 成擇薤 五兩 橘皮 三兩 黍米 五合

右五味㕮咀以水七升先煮藥煎取二升次下薤米米熟藥成稍稍服之

地黃圓治少小胃氣不調不嗜食生肌肉方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾地黃 大黃 各一兩六銖 茯苓 十八銖 當歸

柴胡 杏仁 各半兩

右六味為末以蜜丸如麻子大服五丸日三

馬通粟圓治少小脊下有氣内痛喘逆氣息難往來寒熱羸瘦不食方

馬通中粟 十八銖

杏仁 紫菀

細辛 各半兩 五味子 石膏 秦艽 各六銖

半夏 茯苓 各六銖

右九味為末蜜丸服如小豆十丸日三不知加至二十丸

治小兒下痢腹大且堅方

以故衣帶多垢者切一升水三升煮取一升分三服

治少小腹脹滿方

燒父母指甲灰乳頭上飲之

又方

腹上摩衣中白魚亦治陰腫

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:21
列印頁數：325
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方

韭根汁和猪脂煎細細服之

又方

車轂中脂和輪下土如彈丸吞之立愈

又方

米粉鹽等分炒變色腹上摩之

治小兒癖

灸兩乳下一寸各三壯

當歸圓治小兒胎寒□□啼腹中痛舌上黑青涎下方一名黑丸

當歸 狼毒 各九銖 吳茱萸 一作杏仁 各半兩 蜀椒 各十枚 巴豆 十八銖 附子 各十銖 乾薑 細辛 各七合 豉 一合

右九味擣七種下篩秤藥末令足研巴豆如膏稍稍内末擣令相得蜜和桑杯盛蒸五升米飯下出擣一千杵一月兒服如黍米一丸日一夜二不知稍加以

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:22
列印頁數：326
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

知為度亦治水癖

馬齒蘚圓治小兒胎寒□□啼驚癇腹脹不嗜食大便青黃并大人虛冷内冷或有實不可吐下方

馬齒蘚一斤燒半日以棗膏和大人服如梧子二丸日三小兒以意減之以腹内温為度有實實去神妙

治小兒忽患腹痛夭矯汗出名曰胎寒方

半夏圓治小兒暴腹滿欲死方

煮梨葉濃汁七合可三四度飲之

半夏隨多少微火炮之擣末酒和服如粟米粒大五

丸日三立愈

治小兒霍亂吐痢方

人參一兩　厚朴　甘草各半兩　白朮十八銖

右四味㕮咀以水一升二合煮取半升六十日兒服

一合百日兒分三服暮歲分二服中間隔乳服之乳

母忌生冷油膩等一方加乾薑一分或加生薑三分

霍香湯治毒氣吐下腹脹逆害乳哺方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

藿香 一兩
生薑 三兩
青竹茹
甘草 各半兩

右四味㕮咀以水二升煮取八合每服一合日三有

熱加升麻半兩

治孩子霍亂已用立驗方

人參 蘆簪 各半兩
藕豆藤 二兩
倉米 一撮

右四味㕮咀以水二升煮取八合分温服

又方

人參 一兩
木瓜 一枚
倉米 一撮

右三味㕮咀以水煮分服以意量之立効

治小兒霍亂方

研尿滓乳上服之

又方

牛涎灌口中一合

治少小吐痢方

亂髮 半兩 燒灰
鹿角 六銖

右二味為末米汁服一刀圭日三服

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:23
列印頁數：328
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方

熱牛屎含之一作牛膝

又方

燒特猪屎水解取汁少小服之

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:23
列印頁數：329
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷十三　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

少小嬰孺方

漏蘆湯治小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒瘡癤方

癰疽瘰癧癤第八　論灸法方

漏蘆　連翹　肘後用白薇　白斂　芒硝　肘後用芍藥　甘草　各六銖　大黃　一兩　升麻　枳實　麻黃　黃芩　各十銖　九

右十味㕮咀以水一升半煎取五合兒生一日至七日取一合分三服八日至十五日取一合半分三服十六日至二十日取二合分三服二十日至三十日取三合分三服三十日至四十日取五合分三服　肘後

五香連翹湯治小兒風熱毒腫腫色白或有惡核瘰癧

治大人各用二兩大黃三兩以水一斗煮取三升分三服其丹毒須針鏡去血經心録無連翹有知母芍藥犀角各等分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

附骨癰疽節解不舉白丹走竟身中白軫瘜不已方

青木香　薰陸香　雞舌香　沉香

麻黃　黃芩 各六銖　大黃 二兩　麝香 三銖

連翹　海藻　射干　升麻

枳實 各半兩　竹瀝 三合

右十四味㕮咀以水四升煮藥減半內竹瀝煮取一升二合兒生百日至二百日一服三合二百日至暮歲一服五合一方不用麻黃

連翹圓治小兒無故寒熱强健如故而身體頸項結核瘰癧及心腹脇背裏有堅核不痛名為結風氣腫方

連翹　桑白皮　白頭翁　牡丹

防風　黃蘗　桂心　香豉

獨活　秦艽 各一兩　海藻 半兩

右十一味為末蜜丸如小豆三歲兒飲服五丸加至十丸五歲已上者以意加之

治丹毒大赤腫身壯熱百病不折方

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:24
列印頁數：331
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寒水石 銖十六
石膏 銖十三
藍青 十二銖 用乾者
犀角
柴胡
杏仁 各八銖
知母 十銖
甘草 五銖
羚羊角 六銖
芍藥
黃芩 各七銖
梔子 十一銖
竹瀝 一升
生葛汁 四合 澄清
蜜 二兩
右十五味咬咀以水五升并竹瀝煮取三升三合去
滓内杏仁脂葛汁蜜微火煎取二升一二歲兒服二
合大者量加之

麻黃湯治小兒丹腫及風毒風疹方

麻黃 一兩半
獨活
射干
甘草
桂心
青木香
石膏
黃芩 各一兩
右八味咬咀以水四升煮取一升三歲兒分為四服
日再

又方治小兒惡毒丹及風疹方

麻黃
升麻
葛根 各一兩
射干
雞舌香
甘草 各半兩
石膏 半合
右七味咬咀以水三升煮取一升三歲兒分三服日

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:24
列印頁數：332
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三

搐湯治小兒數十種丹方

大黃　甘草　當歸　芎藭

白芷　獨活　黃芩　芍藥

升麻　沉香　青木香　木蘭皮　各一兩

芒硝三兩

右十三味㕮咀以水一斗二升煮取四升去滓內芒硝以綿搵湯中適寒溫搐之乾則易之取瘥止

治小兒溺竈丹初從兩股及臍間起走入陰頭皆赤方

桑根皮切一斗以水二斗煮取一斗以洗浴之

治小兒丹毒方

搐慎火草絞取汁塗之良其丹毒方具在別卷

治小兒赤遊腫若徧身入心腹即能殺人方

搐伏龍肝為末以雞子白和傅乾易之

又方白豆末水和傅之勿令乾

治小兒半身皆紅赤漸漸長引者方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

牛膝　甘草

右二味㕮咀合得五升以水八升煮三沸去滓和伏龍肝末傅之

治小兒身赤腫起者方

熬米粉令黑以唾和傅之

又方

伏龍肝　亂髮灰

右二味為末以膏和傅之

治小兒卒腹皮青黑方

以酒和胡粉傅上若不急治須臾便死又灸臍上下左右去臍半寸并鳩尾骨下一寸凡五處各三壯

五香枳實湯治小兒著風熱瘡瘤堅如麻豆粒瘡癢搔之皮剝汁出或徧身頭面年年常發者方

青木香　九銖　麝香　六銖　雞舌香　薰陸香　升麻　黃芩　白斂　麻黃　各一兩　沉香　防風　秦艽　漏蘆　各半兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:25
列印頁數：334
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

枳實 一兩半
大黃 一兩十八銖
右十四味㕮咀以水五升煮取一升八合兒五六歲者一服六合十歲至十四五者一服四五合七八歲者一服六合十歲至十四五者加大黃半兩足水為一斗煮取二升半分三服
治小兒火灼瘡一身盡有如麻豆或有膿汁乍痛乍癢方
甘草 芍藥 白斂 黃芩 黃連 黃蘗 各半兩 苦參 各三兩
右七味為末以蜜和傅之日二夜一亦可作湯洗之
治小兒瘡初起燻漿似火瘡名曰燻瘡亦名爛瘡方
桃仁熟擣以面脂和傅之亦治偏身赤腫起
又方馬骨燒灰傅之
水銀膏治小兒熱瘡方
水銀 胡粉 松脂 各三兩
右三味以豬脂四升煎松脂水氣盡下二物攪令勻不見水銀以傅之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治小兒上下徧身生瘡方

芍藥 黃連 各三兩 黃芩 各二兩 苦參 八兩

大黃 二兩 蛇床子 一升 黃蘗 五兩 扳葽 一斤

右八味咬咀以水二斗煮取一斗以浸浴兒

苦參湯浴小兒身上下百瘡不瘥方

苦參 八兩 地榆 黃連 王不留行 各五兩

獨活 艾葉 各二兩 竹葉 二升

右七味咬咀以水三斗煮取一斗以浴兒瘡上浴訖

傅黃連散

治三日小兒頭面瘡起身體大熱方

升麻 柴胡 石膏 各六銖 甘草 當歸 各十二銖 大黃 黃芩 各八銖

右七味咬咀以水四升煮取二升分服日三夜一量

治小兒身體頭面悉生瘡方

兒大小用之

榆白皮隨多少曝令燥下篩醋和塗綿以傅瘡上蟲

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:26
列印頁數：336
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

自出亦可以猪脂和塗之

枳實圓治小兒病風瘙癢痛如疥搔之汁出徧身瘡瘺如麻豆粒年年喜發面目虛肥手足乾枯毛髮細黃及肌膚不光澤鼻氣不利此則少時熱盛極體當風風相薄所得也不早治之成大風疾方

枳實 一兩
菊花
蛇床子
防風
麻黃 各半兩
漏蘆
浮萍 各一兩
天雄

蒺藜子
白薇

右十味為末蜜和如大豆許五歲兒飲服十丸加至二十丸日二五歲已上者隨意加之兒大者可為散服

治小兒風瘙□瘡方

蒴藿
防風
秦椒
升麻
芫花 一云蔚
蒺藜
蠶石 各一兩

羊桃
石南
苦參
茵芋
蛇床子
枳實

右十三味㕮咀以漿水三斗煮取一斗去滓内蠶令

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

小沸浴之

又方牛膝末酒服方寸匕漏瘡多年不瘥擣末傅之亦

主骨疽癲疾癘癰絶妙

澤蘭湯主丹及□瘚入腹殺人方

澤蘭　芎藭　附子　茵芋

藁本　莽草　細辛　各十二銖

右七味�mouth以水三升煮取一升半分四服先與此

湯然後作餘治

治小兒手足及身腫方

巴豆五十枚去心皮以水三升煮取一升以綿内湯

中拭病上隨手消并治□瘚

又方以小便温暖漬之良

論曰小兒頭生小瘡浸淫疽癢黄膏出不生痂連年不

瘥者亦名妬頭瘡以赤龍皮湯及天麻湯洗之内服漏

蘆湯不宜傳飛烏膏散及黄連胡粉水銀膏散方具在

別卷

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

藜蘆膏治小兒一切頭瘡久即疽癢不生痂方

藜蘆　黃連　松脂 各二兩　猪脂 半斤　礬石 五兩

右七味為末煎令調和先以赤龍皮天麻湯洗訖傅之 赤龍皮槲木皮是也

治小兒頭瘡經年不瘥方

松脂　苦參　胡粉 各一兩　黃芩　黃連 各一兩半　水銀 各一兩六銖　大黃　礬石 半兩

蛇床子 十八銖

右九味為末以臘月猪脂和研水銀不見傅之

又方取屋塵末和油瓶下滓以皂莢湯洗傅之

又方取大蟲脂傅之亦治白禿

又方髮中生瘡頂白者皆以熊白傅之

治小兒頭瘡方

胡粉 一兩　黃連 二兩

右二味為末洗瘡去痂拭乾傅之即瘥更發如前傅

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:27
列印頁數：339
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

之

又方

胡粉 連翹 各一兩
水銀 半兩

右三味以水煎連翹内胡粉水銀和調傅之

又方

白松脂 胡粉 各二兩
水銀 一兩
猪脂 四兩

右四味合煎去滓内水銀粉調傅之大人患同

苦參湯治小兒頭瘡方

苦參 黄芩 黄連 黄蘗 各一兩
甘草 大黄 芎藭 蒺藜子 各三合

右八味咬咀以水六升煮取三升漬布搦瘡上日數過

治小兒頭上惡毒腫痤瘡諸瘡方

男子屎尖燒灰和臘月猪脂先以酢泔清淨洗拭乾傅之

治小兒禿頭瘡方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取雄雞屎陳醬汁苦酒和以洗瘡了傅之

又方芫花臘月猪脂和如泥洗去痂傅之日一度 千金翼治白禿

治小兒頭禿瘡方

蔓蘼子細末先洗傅之

又方不中水蕪菁葉燒作灰和猪脂傅之

治小兒頭禿瘡無髮苦癢方

野葛 末

猪脂

羊脂 各一兩

右三味合煎令消待冷以傅之不過三上

治少小頭不生髮一物楸葉方

楸葉濤取汁傅頭上立生

治小兒頭不生髮方

燒鯽魚灰末以醬汁和傅之

治小兒癭瘡方

家中石灰傅之厚著之良

又方燒桑根灰傅之并燒烏羊角作灰相和傅之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治小兒疽瘻方

丹砂 大黃 各三十銖 雄黃 蘭茹 漆頭者 雌黃 各二十四銖 礬石 馬齒者 莽草 各十八銖 黃連 三十六銖

右八味咬咀以猪脂一升三合微火煎三上三下膏成去滓下諸色末攪凝傅之

治小兒惡瘡方

熬豉令黃為末傅瘡上不過三傅愈

治小兒疽極月初即生常有黃水出方

治小兒月蝕瘡隨月生死方

皂莢湯洗瘡乃傅之

酢和油煎令如粥及熱傅之二日一易欲重傅則以

以胡粉和酥傅之五日瘥

治月蝕九竅皆有瘡者方

燒蚯蚓屎末和猪膏傅之

又方水和粉傅之

治小兒浸淫瘡方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

竈中黃土　髮灰
右二味各等分為末以猪脂和傅之
治小兒黃爛瘡方
四交道中土
竈下土
右二味各等分為末以傅亦治夜啼
又方燒牛屎傅之亦可滅瘢
又方燒艾灰傅之
治小兒疥方
燒竹葉為灰雞子白和傅之日三亦治疥瘡
又方燒亂髮灰和臘月猪脂傅之
又方以臭酥和胡粉傅之
治小兒頭面瘡疥方
麻子五升為末以水和絞取汁與蜜和傅之若有白
犬膽傅之大佳
治小兒濕癬方
枸杞根擣作末和臘月猪膏傅之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方桃青皮擣末和醋傅之日二
又方煎馬尿以洗
又方揩破以牛鼻上津傅之
又方燒狗屎灰和猪脂塗之
治小兒身上生赤疵方
取馬尿洗日四五度
治小兒身上有赤黑疵方
針父脚中取血貼疵上即消
又方取狗熱屎傅之皮自卷落
治小兒疣目方
以針及小刀子決目四面令血出取患瘡人瘡中汁
黄膿傅之莫近水三日即膿潰根動自脫落

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:29
列印頁數：344
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷十四　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

少小嬰孺方

小兒雜病第九　方灸法

治小兒臍中生瘡方

桑汁傅乳上使兒飲之

又方飲羖羊乳及血

治小兒風臍遂作惡瘡歷年不瘥方

取東壁上土傅之大佳若汁不止燒蒼耳子粉之

又方乾蠐螬蟲末粉之不過三四度瘥

治小兒臍不合方

取車轄脂燒灰日一傅之

又方燒蜂房灰為末傅之

治小兒臍中生瘡方

燒甑帶灰和膏傅之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治小兒臍赤腫方

杏仁 兩半 猪頰車髓 鉢

右二味先研杏仁如脂和髓傅臍中腫上

白石脂散治小兒臍汁不止兼赤腫方

以白石脂細研熬令微暖以粉臍瘡日三四度

治小兒鵝口不能飲乳方

鵝屎汁瀝兒口中

又方黍米汁塗之

又方取小兒父母亂髮淨洗纏桃枝沾取井花水東向朝作之

向日以髮拭口中得口中白乳以置水中七過瀝洗三

治小兒心熱口為生瘡重舌鵝口方

柘根剉五升無根弓材亦佳以水五升煮取二升去滓更煎取五合細細傅之數次良

治口瘡白漫漫方

先以父淨髮拭口次取桑汁塗之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治重舌舌强不能收唾方

鹿角末如大豆許安舌下日三四度亦治小兒不能

乳

又方取蛇蛻燒末以雞毛蘸醇醋點藥掠舌下愈

治小兒重舌方

取田中蜂房燒灰酒和塗喉下愈

又方衣魚塗舌上

又方竈月下黃土末苦酒和塗舌上

又方二家屠肉切令如指大摩舌上兒立能啼

又方赤小豆末醋和塗舌上

又方燒簸箕灰傅舌下

又方黃蘗以竹瀝漬取細細點舌上良

治重舌方

灸行間隨年壯穴在足大趾岐中

又灸兩足外踝上三壯

治小兒舌上瘡方

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:30
列印頁數：347
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蜂房燒灰屋間塵各等分和勻傅之

又方桑白汁塗乳與兒飲之

又方羊蹄骨中生髓和胡粉傅之

治舌腫强滿方

滿口含糖醋良

又方飲羖羊乳即瘥

治小兒口瘡不得吮乳方

大青十八銖 黄連十二銖

右二味㕮咀以水三升煮取一升二合一服一合日再夜一

又方

蜜二升 甘草如指大三寸 臘月猪脂一斤

右三味合煎相得含如棗大稍稍咽之日三

又方礬石如雞子大置醋中塗兒足下二七遍愈

治小兒燕口兩吻生瘡方

燒髮灰和猪脂傅之

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:30
列印頁數：348
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治小兒口下黃肌瘡方

取羖羊髭燒作灰和臘月猪脂傅之角亦可用

治口傍惡瘡方

亂髮灰　胡粟灰　黃連　乾薑

右四味等分為散以粉瘡上不過三遍

治口噤赤者心噤白者肺噤方

雞屎白棗大綿裹以水一合煮二沸分再服

治小兒口噤方

鹿角粉　大豆末

右二味等分和乳塗乳上飲兒

又方

驢乳　猪乳　各二升

右二味合煎得一升五合服如杏仁許三四服瘥

崔氏圓治小兒卒中風口噤不下一物方

崔氏如麻子丸之飲下即愈大良雞屎白亦佳

治小兒口中涎出方

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:31
列印頁數：349
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以白羊屎内口中

又方以東行牛口中沫塗口中及頤上又桑白汁塗之

瘡

治小兒卒毒腫著喉頸肚熱妨乳方

升麻　射干　大黄各一兩

右三味咬咀以水一升五合煮取八合一歲兒分三服以滓薄腫上冷更暖以薄大兒以意加之

升麻湯治小兒喉痛若毒氣盛便咽塞并治大人咽喉不利方

升麻　生薑　射干各二兩　橘皮一兩

右四味咬咀以水六升煮取二升去滓分三服

治小兒喉痺腫方

魚膽二七枚以和竈底土塗之瘡

治小兒喉痺方

桂心　杏仁各半兩

右二味為末以綿裹如棗大含咽汁

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治小兒解顱方

熬蛇蛻皮為末和猪頰車中髓傅頂上日三四度

又方猪牙頰車髓傅顖上瘥

治小兒腦長解顱不合羸瘦色黄至四五歲不能行半夏熨方

半夏 生薑 各一 芎藭 升 各一 細辛 兩 三 桂心 一尺 烏頭 十枚

右六味咬咀以醇苦酒五升漬之晬時煮三沸絞去滓以綿一片浸藥中適寒温以熨顖上冷更温之復熨如前朝暮各三四熨乃止二十日可愈

治小兒解顱用生蟹足傅方

生蟹足 白斂 各半兩

右二味擣末以乳汁和傅顖上立愈

治小兒解顱細辛傅方

細辛 桂心 各半兩 乾薑 十八銖

右三味為末以乳汁和傅顖上乾復傅之兒面赤即

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:31
列印頁數：351
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

愈

治小兒顱開不合方

防風 一兩半 栢子仁 白芨 各一兩

右三味為末以乳和傅顱上日一十日知二十日愈

又方取猪牙車骨煎取髓傅顱上愈

小兒顱陷方

灸臍上下各半寸及鳩尾骨端又足太陰各一壯

治小兒狐疝傷損生癩方

桂心 十銖 白朮 一兩八銖 地膚子 二兩半

右三味為末以蜜和丸白酒服如小豆七丸日三亦治大人

又方

芍藥 茯苓 各十八銖 防葵 一作防風 大黄 各半兩

蜀椒 各六銖

右七味為末蜜和服如大豆一丸日五服可加至三丸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五等圓治小兒陰偏大又卵核堅癩方

黃蘗　香豉　桂心各二兩　牡丹　防風

右五味為末蜜丸如大豆兒三歲飲服五丸加至十

丸兒小以意酌量著乳頭上服之

治小兒卵腫方

取雞翅六莖燒灰服之隨卵左右取翮古今錄驗云治陰大如斗

治小兒氣癩方

土瓜根　芍藥　當歸各一兩

右三味咬咀以水二升煎取一升服五合日二

又方三月上除日取白頭翁根擣碎隨偏處傅之一宿作瘡二十日愈

治氣癩方

灸足厥陰大敦左灸右灸右灸左灸各一壯

治小兒陰瘡方

以人屎灰傅之又狗屎灰傅之又狗骨灰傅之又馬

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

骨末傅之

治小兒岐股間連陰囊生瘡汁出先癢後痛十日五日自瘥或一月或半月復發連年不瘥者方

炙瘡搔去痂帛拭令乾以蜜傅更浚麪作燒餅熟即以餳塗餅上熨之冷即止再度瘥

治小兒陰腫方

狐莖炙擣末酒服之

又方炙大敦七壯

又方炙大敦七壯

又方研桑木白汁塗之

又方濤蕪菁薄上

又方濤垣衣傅之又以衣中白魚傅之

又方猪屎五升水煮沸布裹安腫上

治小兒陰瘡方

取狼牙濃煮汁洗之

又方黃連胡粉等分以香脂油和傅之

治小兒核腫壯熱有實方

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:32
列印頁數：354
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

青木香　甘草　石膏　各十銖
麝香　三銖　大黃　前胡　各一兩　黃芩　半兩

右八味咬咀以水七升煮取一升九合每服三合日四夜二

齲頭圓治小兒積冷久不瘥後餘脫肛不瘥腹中冷肛中疼痛不得入者方

死齲頭　二枚炙令焦　磁石　四兩　桂心　三兩
小蝟皮　一枚炙令焦

右四味為末蜜丸如大豆兒三歲至五歲服五丸至十丸日三兒年大以意加之

小兒脫肛方

灸頂上旋毛中三壯即入又灸尾翠骨三壯又灸臍

治小兒疳濕瘡方

鐵衣著下部中即瘥

中隨年壯

又方灸第十五椎俠脊兩傍七壯未瘥加七壯

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治小兒疳瘡方

以猪脂和胡粉傳之五六度

又方嚼麻子傳之日六七度

又方羊膽二枚和醬汁於下部灌之猪脂亦佳

治濕瘡方

濃煮地榆汁洗浴每日二度

治小兒久痢膿濕蟨方

艾葉五升以水一斗煮取一升半分為三服

濃煮地榆汁洗浴每日二度

治濕瘡方

除熱結腸圓斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中瘡爛坐蟨生蟲方

黃連　蘗皮　苦參　鬼臼　獨活　橘皮　芍藥　阿膠 各半兩

右八味為末以藍汁及蜜丸如小豆曰服五丸至十丸 冬無藍汁可用藍子一合春蜜和丸

治小兒蚘蟲方

削楝木上蒼皮以水煮取汁飲之量大小多少為此

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

有小毒

治小兒羸瘦有蚘蟲方

藿蘆二兩以水一升米二合煮取米熟去滓與服

又方萹蓄三兩水一升煮取四合分服之擣汁服亦佳

又方

桃白皮三兩 東引吳茱萸根白皮四兩

右二味咬咀以酒一升二合漬之一宿漸與服取瘥

又取猪膏服之一云治蛲蟲

右二味各等分為末服一錢匕日三

治寸白蟲方

雷丸 苦參

右二味各等分為末服一錢匕日三

又方桃葉擣絞取汁服之

東行石榴皮一把水一升煮取三合分服

治小兒三蟲方

又方楝實一枚内孔中一云治蛲蟲

又方擣槐子内下部中瘡為度一云治蛲蟲

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治大便竟出血方

鼈頭一枚炙令黃黑為末以飲下五分匕多少量兒大小日三服

又方燒車缸一枚令赤內一升水中分二服

又方燒甑帶末傅乳頭上令兒飲之

治小兒尿血方

燒鵲巢灰井花水服之亦治夜尿牀

又方尿血灸第七椎兩傍各五寸隨年壯

治小兒遺尿方

雚麥	石韋	龍膽	皂莢
桂心 各半兩	雞腸草	人參 各一兩	車前子 一兩六銖

右八味為末蜜丸每食後服如小豆大五丸日三加至六七丸

又方小豆葉擣汁服

又方燒雞腸為末漿水服方寸匕日三一云面北斗服

又方灸臍下一寸半隨年壯　又灸大敦三壯亦治尿

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

血

地膚子湯治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通欲小便則澁痛不出出少如血須臾復出方

地膚子 瞿麥 知母 黄芩 枳實 升麻 葵子 猪苓 各六銖 通草 海藻 橘皮 各三銖 大黄 十八銖

右十二味㕮咀以水三升煮取一升一日至七日兒

服一合為三服八日至十五日兒一合半為三服十

六日至二十日兒二合為三服四十日兒以此為準

五十日已上七歲已下以意加藥益水

治小兒淋方

車前子一升水二升煮取一升分服

又方煮冬葵子汁服之

又方取蜂房亂髮燒灰以水服一錢匕日再

治小兒小便不通方

車前草 切一升 小麥 一升

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:34
列印頁數：359
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味以水二升煮取一升二合去滓煮粥服日三四

又方冬葵子一升以水二升煮取一升分服入滑石末六銖

治小兒癩方

蜥蜴一枚燒末酒服之

治小兒吐血方

燒蛇蛻皮末以乳服之并治重舌

又方取油三分酒一分和之分再服

治小兒鼻塞生息肉方

通草 細辛 各一兩

右二味擣末取藥如豆著綿纏頭內鼻中日二

治小兒鼻塞不通濁涕出方

杏仁 兩半 蜀椒 附子 細辛 各六銖

右四味咬咀以醋五合漬藥一宿明日以猪脂五合煎令附子色黃膏成去滓了更以塗絮導鼻孔中日

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

再兼摩頂

治小兒聹耳方

末石硫黃以粉耳中日一夜一

治小兒耳瘡方

又方燒雞屎白筒中吹入

燒馬骨灰傅之

治小兒齒落久不生方

以牛屎中大豆二七枚小開豆頭以注齒根處數度

即生

又方取雄鼠屎二七枚以一屎拭一齒根處盡此上二

十一日即生雄鼠屎頭尖

治小兒四五歲不語方

末赤小豆酒和傅舌下

又方灸足兩踝各三壯

治小兒數歲不能行方

取葬家未開戶盜食來以哺之日三便起行

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治小兒不能乳方

雀屎四枚為末著乳頭飲兒兒大十枚

蒲黄湯治小兒落床墮地如有瘀血腹中陰陰寒熱不肯乳哺但啼哭叫喚方

蒲黄　麥門冬　大黄　黄芩　各十銖

甘草　八銖　芒硝　七銖　黄連　十二銖

右七味㕮咀以水二升煮取一升去滓内芒硝分三服消息視兒羸瘦半之大小便血即愈忌冷食

治小兒食不知饑飽方

鼠屎二七枚燒為末服之

治小兒食土方

取肉一斤繩繫曳地行數里勿洗火炙與食

治小兒噦方

生薑汁　牛乳　各五合

右二味煎取五合分為二服

又方取牛乳一升煎取五合分五服

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:35
列印頁數：362
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治小兒疰方

竈中灰鹽等分相和熬熨之

治小兒悞吞鍼方

取磁石如棗核大或吞或含其針立出

治小兒悞吞鐵物等方

艾蒿一把剉以水五升煮取一升服之即下

治小兒蠷螋咬遶腹匝即死方

濤蒌藜葉傅之無葉子亦可

又方取鷰窠中土猪脂和傅之乾即易之

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:36
列印頁數：363
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷十六五

群校官太醫院醫士臣舒 仮
編修臣倉聖脈覆勘
總校官中書臣朱 鈐
校對官中書臣胡紹基
謄錄舉人臣汪師曾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷十五　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

七竅病方

目病第一　論呪法　證方　灸法

論曰凡人年四十五已後漸覺眼暗至六十已後還漸目明治之法五十已前可服瀉肝湯五十已後不可瀉肝目中有疾可傅石膽散藥等無病不可輒傅散但補肝而已自有肝中有風熱令人眼昏暗者當灸肝輸及服除風湯圓散數十劑當愈

生食五辛　接熱飲食　熱餐麪食　飲酒不已

房室無節　極目遠視　數看日月　夜視星火

夜讀細書　月下看書　抄寫多年　雕鏤細作

博奕不休　久處煙火　泣淚過多

刺頭出血過多

右十六件並是喪明之本養性之士宜熟慎焉又有

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

馳騁田獵胃涉風霜迎風追獸日夜不息者亦是傷目之媒也恣一時之浮意為百年之痼疾可不慎歟凡人少時不自將慎年至四十即漸眼昏若能依此慎護可得白首無他所以人年四十已去常須瞑目勿顧他視非有要事不宜輒開此一術護慎之極也其讀書博奕等過度患目者名曰肝勞若欲治之非三年閉目不視不可得瘥徒自瀉肝及作諸治終是無効人有風疹必多眼昏先攻其風其瞎自瘥

足太陽陽明手少陽脉動發目病黃帝問曰余嘗上清冷之臺中陛而顧匍匐而前余私異之竊内怪之或獨宴視安心定氣久而不解被髮長跪俛而視復久之又不已卒然自止何氣使然岐伯對曰五臟六腑之精氣皆上注于目而為之睛睛之果者為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為其絡果氣之精為白眼肌肉之精為約束果契筋骨血氣之精而與脉并為系系上屬于腦後出於項中故邪中于項因逢身之虛其入深

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

則隨眼系以入于腦入于腦則轉轉則引目系急急則目眩以轉矣邪中其睛則其睛所中者不相比則睛散睛散則岐故見兩物目者五臟六腑之精也營衛魂魄之所營也神氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法于陰白眼赤脉法于陽故陰陽合揣（靈樞作倶）而精明矣目者心之使也心者神之舍也故神分精亂而不專（靈樞作轉）卒然見非常之處精神魂魄散不相得故曰惑帝曰余疑何其然也余每之東苑未嘗不惑去之則復余惟獨為東苑勞神乎何其異也岐伯曰不然夫心有所喜神有所惡卒然相感則精亂視誤故神惑神移乃復是故間者為迷甚者為惑

目眥外決于面者為兌眥在内近鼻者上為外眥下為内眥目赤色者病在心白色者病在肺青色者病在肝黄色者病在脾黑色者病在腎黄色不可名者病在胸中

診目痛赤脉從上下者太陽病從下上者陽明病從外

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:37
列印頁數：367
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

走内者少陽病

夫鼻洞鼻洞者濁下不止傳為鼽瞢瞑目故得之氣厥足陽明有俠鼻入于面者名曰懸顱屬口對入係目本視有過者取之損有餘益不足反者益甚足太陽有通項入於腦者正屬目本名曰眼系頭目固痛取之在項中兩筋間入腦乃別陰蹻陰陽相交陽入陰出陽交于兌皆陽氣盛則瞑目陰氣絶則眠瞑

神麴圓主明目百歲可讀注書方

神麴 四兩　磁石 二兩　光明砂 一兩

右三味為末鍊蜜為丸如梧子飲服三丸日三不禁常服益眼力衆方不及學者宜知此方神驗不可言當祕之

瓜子散補肝治眼漠漠不明亦名十子散方

冬瓜子　青葙子　芜蔚子　枸杞子
牡荆子　蒺藜子　菟絲子　蕪菁子
決明子　地膚子　栢子仁 各二合　牡桂

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夔蘭根 各二兩
薤仁 一合云二合
車前子 一兩
細辛 半兩云半
右十六味治下篩食後以酒服方寸匕日二神驗

補肝圓治眼暗方

青葙子 桂心 蓴蘼子 杏仁

細辛 芫蔚子 枸杞子 五味子 各一兩

茯苓 黄芩 防風 地膚子

澤瀉 決明子 麥門冬 薤仁 各一兩六銖

車前子 菟絲子 各二合

乾地黄 三兩

兔肝 一具

右二十味為末蜜丸飲下二十丸如梧子日再加至三十丸

又方治眼暗眩眩不明寒則淚出肝痺所損之方

兔肝 二具 栢子仁 乾地黄 茯苓

細辛 蘡仁 枸杞子 各一兩六銖

防風 芎藭 薯蕷 各一兩 車前子 一合

五味子 十八銖 甘草 半兩 菟絲子 一合

右十四味為末蜜丸酒服如梧子二十丸日再服加

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

至四十丸

補肝散治目失明漠漠方

決明子 半升 子未用者淨拭內肝於中炭火上炙之令極乾汁盡末之 蓼子 一合熬令香 青羊肝 一具去上膜薄切之以新瓦瓶

右三味合治下篩以粥飲食後服方寸匕日二稍加至三匕不過兩劑能一歲服之可夜讀細書

又方治三十年失明方

鍾乳粉 雲母粉 各鍊者細辛 茯苓 等分

右六味治下篩以酒服五分匕日三加至一錢匕

遠志 五味子 等分

補肝蕪菁子散常服明目方

蕪菁子三升淨淘以清酒三升煮令熟曝乾治下篩以井花水和服方寸匕稍加至三匕無所忌可少少作服之令人充肥明目洞視水煮酒服亦可 千金翼用水煮三易水

又方胡麻一斗蒸三十遍治下篩每日酒服一升

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:39
列印頁數：370
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方服小黑豆每日空心吞二七粒

又方三月三日採蔓菁花陰乾治下篩空心井花水服方寸匕久服長生明目可以夜讀細書

補肝散治男子五勞七傷明目方

右二味以地黃汁和散曝乾更為末以酒服方寸匕日二

地膚子 一斗 陰乾為末

生地黃 十斤 搗取汁

又方白瓜子七升絹袋盛攪沸湯中三遍曝乾以酢五升浸一宿曝乾治下篩酒服方寸匕日三服之百日可夜寫細書

梔子仁煎治肝實熱目眥赤痛如刺方

秦皮 各一兩 六銖

石膏 一兩 碎如小豆

赤蜜 三合

梔子仁 決明子 薤仁 各一兩

車前葉 二合

細辛 半兩

苦竹葉 二合

右九味㕮咀以井花水三升煮取七合去滓下蜜更煎取四合以綿濾之乾器貯密封勿使草芥落中以

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

藥汁細細仰卧以傳目中

瀉肝湯治眼赤漠漠不見物息肉生方

柴胡 芍藥 大黃 各四兩 決明子 澤瀉 黃芩 各二兩 杏仁 各三兩 升麻 枳實 梔子仁 各二兩 竹葉 五升

右十一味㕮咀水九升煮取二升七合分三服熱多體壯加大黃一兩羸老去大黃加梔子仁五兩

又方治眼風赤暗方

前胡 芍藥 各四兩 生地黃 十兩 芒硝 黃芩 茯苓 白芷 枳實 各三兩 人參 白朮 梔子仁 澤瀉 各二兩 甘草 細辛 各一兩 竹葉 五升

右十五味㕮咀以水一斗二升先煎竹葉取九升去滓下諸藥煮取三升半分三服

洗肝乾藍煎治肝熱不止衝眼眼眥赤赤脉息肉痛閉不開熱勢彭彭不歇及目睛黃方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾藍　車前葉　苦竹葉　各三升　細辛

秦皮　薏仁

決明子　四兩　升麻　二兩　栀子仁　芍藥　各三兩

右十味咬咀以水二斗先煮乾藍車前竹葉取一斗去滓澄清取八升内藥煮取三升分三服須利加芒

硝二兩

大棗煎治目熱眥赤生赤脉侵睛息肉急痛閉不開如芥在眼礙痛方

大棗　七枚去皮核　黄連　二兩碎綿裹　淡竹葉　切五合

右三味以水二升煮竹葉取一升澄清取八合内棗肉黄連煎取四合去滓令淨細細以傅目眥中治目中息肉方

臚脂　石鹽　末

右二味和合令調注目兩眥頭日三夜一瘥

又方五加不聞水聲者根去土取皮擣末一升和上酒二升浸七日外一日兩時服之禁醋二七日偏身生瘡

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

若不出未得藥力以生熟湯浴之取毒瘡出瘥

洗眼湯治熱上出攻目生瞳醫目熱痛汁出之方

秦皮　黄蘗　各十
黄芩　薏仁　各八銖　梔子七枚　大棗五枚

右八味㕮咀以水二升浸煮取六合澄清仰卧洗目

一

治目生醫方

貝子十枚燒灰治下篩取如胡豆著醫上日二正仰

分

治目赤及醫方

烏賊骨　鉛丹　大小等分

右二味合研細和白蜜如泥蒸之半食久冷著眼四

皆

又方白羊髓傅之良

又方熟羊眼睛曝乾治下篩傅目兩角

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方新生孩子胞衣曝乾燒末傅目眥中

又方古錢一枚 鹽匕方寸

右二味合治下篩傅目眥中

治目風淚出浮腫多膿爛眥方

乾薑 決明子 礬石 檗仁

細辛 黃連 戎鹽各六銖 銅青三銖

右八味咬咀以少許水浸一宿明旦以好白蜜八合和之著銅器中綿蓋器上著甑中以三斗麥屑蒸之飯熟藥成絞去滓以新死大雄鯉魚膽二枚和內藥中又以大錢七枚常著藥底兼常著銅器中竹簁綿裹頭以注目眥晝夜三四不避寒暑數著藥乾又以魚膽和好覆藥器頭勿令氣歇善

治熱腫漫睛方

以羊筋漱口熟嚼夜卧開目內之即閉目睡去膜明

治風腫方

日即瘥 千金翼以治眯目不明

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:40
列印頁數：375
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取死猪鼻燒灰治下篩日一向日水服方寸匕

治目熱生膚赤白膜方

取雄雀屎細直者人乳和熟研以傳之當漸消爛

又方以蛔蟲燒為末傅之良

挽之割去即見物以綿當眼上著血斷三日瘥

以雞翎截之近黑睛及當白睛嘬之膜自聚鉤針鉤

蕩風散治目白膚風淚下方 刪繁方名真珠散

乾薑 三銖

光明朱砂 半兩 具齒 五枚炭上熟燒為末 衣中白魚 七枚

一方用生薑自然汁澄粉代乾薑

右四味於新磁鉢内研之厚帛三下為散仰卧令人

取小指爪挑少許傅目中取瘥為度 千金翼名真珠散主目瞖覆瞳晴不見物

治目中生息肉膚瞖稍長欲滿目閉瞳子及生珠管方

具齒 七枚燒為末 真珠 等分

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:41
列印頁數：376
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味合治如粉以注腎肉止日三度甚良亦治目中眯不出

治目生珠管方

滑石一作冷石 手爪甲燒 龍骨 具齒 丹砂各等分

右五味治下篩以新筆點取當珠管上日三度良

治毒病後目赤痛有腎方

以青布掩目上以冷水漬青布數易之

治熱病後生腎方

豉二七枚燒為末內管中以吹目中

治熱病後眼暗失明方

以羊膽傅之旦暮各一

治風眼爛眥方

竹葉 黃連各一兩 栢白皮一兩半

右三味咬咀以水二升煮取五合稍用滴目兩眥日三四度

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:41
列印頁數：377
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治胎赤眼方

取槐木枝如馬鞭大長二尺齊頭油麻一匙置銅鉢中旦使童子以水研之至暝止夜卧時洗目傅眥目三良

治目爛赤方

取三指撮鹽置古文錢上重重火燒赤投少醋中足乳汁煎治目中風冷淚出眥赤癢方

淹錢以綿沾汁注目眥中

右三味咬咀以人乳汁一升浸藥一宿明旦以微火煎取三合綿絞去滓取如黍米許內目眥頭日三

仲方三味等分

黄連十銖 鼈仁半兩 乾薑一兩

治目中風腫痛除熱揉眼方

礬石三兩燒令汁盡以棗膏和如彈丸揉眼上下食頃日三止

洗眼湯治目赤痛方

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:42
列印頁數：378
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甘竹葉 七枚
烏梅 古錢 各三枚
右三味以水二升漬藥半日東向竈煮三沸三上三下得二合臨欲眠注目眥
治目卒腫方
以酢漿水作鹽湯洗之日四五度
治目卒癢痛方
削乾薑令圓滑内眥中有汁拭却復内薑味盡易之
治五臟客熱上衝眼内外受風冷目痛不明方
地膚子 瓜仁子 青葙子 蒺藜子
菥蓂子 藍子 菟絲子
蔓荊子 千金翼作車前子各二合 栢子仁 合半 決明子 五合
細辛 一兩六銖 桂心 一兩八銖 大黃 二兩 螢火 六銖
黃連 一兩半
三 千金翼無柏子仁
右十五味為末蜜丸如梧子每服三十丸食後服日
治目赤痛方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

雄黃 一銖 細辛 黃連 乾薑 各二銖

右四味合治如粉以綿裹釵股唾濡頭注藥末内大

眥頭急閉目目中淚出須臾止勿將手近勿將帛裹

勿洗之

又方雄黃 乾薑 黃連 礬石 各六銖

右四味合治並如前方一方加細辛六銖

治眼赤暗方

古青錢 三枚 青鹽 一兩六銖 杏仁 杏未熟時取仁擣汁一合

右三味合内埳器中封頭勿泄氣百日後出著目四

眥頭日二三避風冷

治眼暗赤冷淚方

薏仁 波斯鹽

右二味等分治下篩以驢生脂和每夜傅目四角以

一粟大窓室中將息一月日瘥忌五辛失明者三十

日傅之

治目痛及淚出不止方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

削附子作蠶屎大內目中卧良

治目不明淚出方

以烏雞膽臨卧傳之

治雀盲方

地膚子 五兩 決明子 一斤

右二味為末以米飲汁和丸食後服二十丸至三十

丸日二盡即更合瘥止

治雀目術

令雀盲人至黃昏時看雀宿處打令驚起雀飛乃呪

曰紫公紫公我還汝盲汝還我明如此日日瞑三過

作之眼即明曾試有驗 肘後云刪繁載支太醫法

真珠散治肝氣虛寒眼青睆睆不見物方

真珠 一兩研 白蜜 二合 鯉魚膽 鯉魚腦 各一枚

右四味和合微火煎兩沸綿裹内目中當汁出藥歇

更為之

治目睆睆無所見方

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:43
列印頁數：381
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

青羊肝一具細切以水一斗内銅器中煮以麴餅覆上上鑽兩孔如人眼正以目向就熏目不過再熏即瘥 千金翼若眼暮無所見不用麴餅

治眼暗方

以銅器盛大酢三四升煎七八日覆器濕地取銅青一合以三月杏白仁一升取汁和銅青傅之不過三四度大良

又方

古錢七枚 銅青 乾薑 石鹽

胡粉 薪葉子各中棗大 烏頭一枚棗大 黄連三銖

細辛五銖 薏仁一百三十枚 酢二合 清酒五合

楸葉一把取汁

右十三味治下篩合煎取三分去一盛瓷器中若燥取人乳和傅目慎風冷

又方每朝含黄蘗一爪甲許使津置掌中拭目訖以水洗之至百日眼明此法乃可終身行之永除眼疾神良

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方

柴胡 六銖 決明子 十八銖

右二味治下篩人乳汁和傅目可夜書見五色

治眼暗方

七月七日生苦瓠中白絞取汁一合以酢一升浸古文錢七枚微火煎減半以米許大内眥中

治眼漠漠無所見方

決明子 合一

欽定四庫全書

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

十月上巳日收槐子内新淨甕中以盆密封口三七日發封洗去皮取子從月一日復一枚二日二枚日別加計十日服五十五枚一月日服一百六十五枚一年服一千九百八十枚小月減六十枚此藥主補腦早服之髮不白好顏色長生益壽先病冷人勿服

之肘後云扁鵲方

又方牛膽中漬槐子陰乾百日食後吞一枚十日身輕三十日白髮再黑至百日通神

治目中眯不出方

以蠶砂一粒吞下即出

治稻麥芒等入目中方

取生蠐螬以新布覆目上將蠐螬從布上摩之芒出著布良

治沙石草木入目中不出方

以雞肝注之

又方以書中白魚和乳汁注目中

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治目中眯法

旦起對門戶跪拜云門戶狹小不足宿客方便瘥

治目為物所傷觸青黑方

煮羊肉令熱熨勿令過熱猪肝亦得

治目痛不得睡方

暮炙新青布熨并蒸大豆袋盛枕之夜常令熱

目中痛不能視上星主之先取譩譆後取天牖風池

目中赤痛從内眥始取之陰蹻

青盲遠視不明承光主之

目瞑遠視瞋瞋目窓主之

目瞤遠視瞋瞋目外眥而急頷胲以主之

目瞋瞋赤痛天柱主之

目眩無所見偏頭痛引目外眥而急頷胲以主之

目遠視不明惡風淚出憎寒頭痛目眩瞢内眥赤痛遠視瞋瞋無見眥癢痛淫膚白翳精明主之

青盲無所見遠視瞋瞋目中淫膚白膜覆瞳子巨窌主之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

目不明淚出目眩瞢瞳子癢遠視瞋瞋昏夜無見目瞤
動與項口參相引喎僻口不能言刺承泣
目痛僻戾不明四白主之
目赤目黃權窮主之
瞋目水溝主之
目痛不明斷交主之
目瞑身汗出承漿主之
青盲目惡風寒上關主之
青盲商陽主之
目瞤瞤偏歷主之
眼痛下廉主之
目中白腎前谷主之
目痛泣出甚者如脫前谷主之
白膜覆珠子無所見解谿主之
灸法餘穴見前
目瞤瞤少氣灸五里右取左左取右

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:45
列印頁數：386
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

眼暗灸大椎下數節第十當脊中安灸二百壯惟多為佳至驗

肝勞邪氣眼赤灸當容百壯兩邊各爾穴在眼小眥近後當耳前三陽三陰之會處以兩手按之有上下橫脉則是與耳門相對是也眼急痛不可遠視灸當瞳子上入髮際一寸隨年壯穴名當陽

風瞖患右目灸右手中指本節頭骨上五壯如小麥大左手亦如之

風瘡赤痛灸人中近鼻柱二壯仰卧灸之

目卒生瞖灸大指節橫文三壯在左灸右在右灸左良

備急千金要方卷十五

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷十六　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

七竅病方

鼻病第二　論灸法方

治鼻塞腦冷清涕出方

通草　辛夷　各半兩　細辛　甘遂　一作甘草　一

桂心　芎藭　附子　各一兩

治鼻塞常有清涕出方

細辛　蜀椒　乾薑　芎藭　吳茱萸　附子　各十八銖　桂心　一兩　皂莢屑　半兩

汁和之更佳

如大麻子稍加微覺小痛濤薑為丸即愈用白狗膽

右七味為末蜜丸綿裹內鼻中密封塞勿令氣洩丸

右九味咬咀以綿裹苦酒漬一宿取猪膏煎以附子

猪膏　一升

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:45
列印頁數：388
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

色黃為度去滓綿裹内鼻孔中并摩鼻上

治涕出不止方

灸鼻兩孔與柱齊七壯

香膏治鼻塞窒方

白芷　芎藭　細辛　茅草　小品并千金翼以作薰草　各十銖　當歸　通草　各十銖　辛夷　各十三銖

右七味�mark咬咀以苦酒漬一宿以不中水猪肪一升煎三上三下以白芷色黃膏成去滓綿沾如棗核大内鼻中日三　小品加桂心十八銖

鼻中日三　小品加桂心十八銖

香膏治鼻不利方

當歸　薰草　古今録驗用木香　通草　細辛　各十銖　芎藭　各十八銖　白芷　各半兩

羊髓　四兩猪脂亦得

右八味㕮咬咀以微火合煎三上三下白芷色黃膏成去滓取如小豆大内鼻中日二先患熱後鼻中生赤爛瘡者以黃芩梔子代當歸細辛

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:46
列印頁數：389
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治鼻室氣息不通方

小薊一把�mouth以水三升煮取一升分二服

又方瓜蒂末少許吹鼻中亦可綿裹塞鼻中

又方

槐葉 升五 蔥白 升一切 一 豉 合一

右三味以水五升煮取三升分温三服

治鼻塞多年不聞香臭清水出不止方

取當道車轢過蒺藜一把濤以水三升煎取熟先仰

卧使人滿口含取一合汁灌鼻中使入不過再度上

噦必出一兩箇息肉似赤蛹一方有黄連等分同煎

治鼻齆方

通草 細辛 附子

右三味各等分為末以蜜和綿裹少許内鼻中

又方

甘遂 通草 細辛 附子 各等分

右四味為末以白雄犬膽和為丸如棗核大綿裹内

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:46
列印頁數：390
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鼻中辛熱涕出四五升瘥亦治息肉

又方炙皂莢為末如小豆大以竹管吹鼻中

又方乾薑末蜜和塞鼻中吹亦佳

又方鐵鏁磨石取末以猪脂和綿裹内之經日肉出瘥

又方以馬新屎汁仰頭含滿口灌鼻中

綿裹塞之

治齆鼻有息肉不聞香臭方

又方伏面臨牀前以新汲冷水淋玉枕上後以瓜蒂末

欽定四庫全書

瓜丁　細辛

右二味各等分為末以綿裹如豆大許塞鼻中須臾即通

通草散治鼻中息肉不通利方

通草 雨半　礬石　真珠 各一兩

右三味為末撚綿如棗核取藥如小豆著綿頭内鼻中日三易之一方有桂心細辛各一兩同前擣末和使之

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:47
列印頁數：391
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治鼽鼻中息肉不得息方

礬石 藜蘆 各六銖 瓜蒂 二七枚 附子 十二銖

右四味各擣篩合和以小竹管吹藥如小豆許于鼻孔中以綿絮塞鼻中日再以愈為度 古今錄驗加葶藶半兩

治鼻中息肉方

炙蝟皮為末綿裹塞之三日

又方細篩釜底墨水服之三五日

治鼻中息肉不聞香臭方

燒礬石末以面脂和綿裹著鼻中數日息肉隨藥消落

又方末瓜丁如小豆許吹入鼻中必消如此三四度良

又方

細辛 釜底墨

右二味為末水和服方寸匕

又方綿裹瓜蒂末塞鼻中

羊肺散治鼻中息肉梁起方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

羊肺一具乾之　白术四兩　蒐蓉　通草

乾薑　芎藭各二兩

右六味為末食後以米飲服五分匕加至方寸匕

又方

通草十二銖　真珠六銖　礬石　細辛各一兩

右四味為末撚綿如棗核沾散如小豆并綿内鼻中日再三

治鼻中息肉方

灸上星二百壯穴在直鼻入髮際一寸

治鼻中生瘡方

燒祀竈飯末以傅鼻中

又方燒故馬絆末傅鼻中

又方偷孝子帽以拭之

又方烏牛耳垢傅之

又方以牛鼻津傅之

又方搗杏仁乳傅之亦燒核壓取油傅之

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:47
列印頁數：393
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方燒牛狗骨灰以臘月猪脂和傅之

治疳蟲蝕鼻生瘡方

燒銅筯頭以酢淬之數過取酢傅之又以人屎灰塗之瘥

治鼻痛方

常以油塗鼻内外酥亦得

治卒食物從鼻中縮入腦中介介痛不出方

牛脂若羊脂如指頭大内鼻中以鼻吸取脂須臾脂消則物逐脂俱出也

論曰鼻頭微白者亡血設令徵赤非時者死病人色白者皆亡血也凡時行劒不宜斷之如一二升已上恐多者可斷即以龍骨末吹之九竅出血者皆用吹之

治大便出血及口鼻皆血出血上心胸氣急此是勞熱所致方

芍藥	生竹茹	各三兩
生地黃	八兩	
蒲黃	一升	
地骨皮	五兩	
黃芩		

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右六味㕮咀以水八升煮取二升七合分温三服

凡吐血衄血溺血皆藏氣虛隔氣傷或起驚悸治之之方

生竹皮 一升 芍藥 黄芩 各二兩 芎藭

當歸 桂心 甘草 各一兩

右七味㕮咀以水一斗煮竹皮減三升下藥煎取二升分三服

治衄血方

升分三服

生地黄 六兩 芎藭 一兩 細辛 六銖

伏龍肝 二枚如雞子大 桂心 白芷

乾薑 芍藥 甘草 吳茱萸 各三兩

右十味㕮咀以水三升酒七升煮取三升分三服

生地黄湯治鼻衄方

生地黄 八兩 黄芩 一兩 阿膠 甘草 各二兩

栢葉 一把

右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓内膠煎取二

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

升半分三服

又方

生地黃三斤切 阿膠二兩 蒲黃六合

右三味以水五升煮取三升分三服

又方地黃汁五合煮取四合空腹服之忌酒炙肉且服粳米飲

又方飲小薊汁良

又方以冷水淨漱口含水以蘆管吹二孔中

又方取亂髮五兩燒作灰以管吹鼻中棗核大不止益方寸匕日三甚者夜二巳困不識人者服亦佳

吹之以血斷止并水服方寸匕日三甚者夜二巳困不

又方取人屎尖燒灰水服并吹少許鼻中止

又方五月五日取人屎燒作灰冷水服五分匕佳

又方以膠帖鼻頭上至頂及髮際三寸止

又方新馬屎汁灌鼻中及飲之良

又方以濕布薄胸上善

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:49
列印頁數：396
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方淳酢和土塗陰囊上乾易之

又方韭根蔥根取汁懸頭著一橐大内鼻中少時更著

兩三度瘥蔥白擣汁亦得

治鼻中出血不止方

地黄者乾 梔子 甘草各等分

右三味治下篩酒服方寸匕日三如鼻疼者加豉一合鼻有風熱者以蔥涕和服如梧子五丸

又方濤楮葉汁飲三升大良

灸方張弓令弦向上病兒仰卧枕弦放四體如常卧法刺時癢癢便灸足大指節横理三毛中十壯劇者百壯

刺不止灸之并治陰卵腫

又灸風府一穴四壯不止又灸

又灸涌泉二穴各百壯

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:49
列印頁數：397
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷十七至十九

詳校官太醫院醫士臣舒仗

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄舉人臣汪師曾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷十七　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

七竅病方

口病第三　論灸法方

論曰凡患口瘡及齒禁油麪酒醬酸酢鹹膩乾棗瘥後仍須慎之若不久慎尋手再發發即難瘥薔薇根角蒿為口瘡之神藥人不知之也

治口中面上息肉轉大方

以刀決潰去膿血即愈

治口中瘡久不瘥入胸中並生瘡三年已上不瘥者方

濃煎薔薇根汁含之又稍稍咽之日三夜一冬用根

夏用莖葉

又方角蒿灰傅之一宿知二宿瘥有汁吐之不得咽也

治口瘡不歇方

牛膝　生襄荷根　各三兩　黃蘗　一兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:50
列印頁數：399
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右三味咬咀以綿裹酒三升漬一宿微火煎一兩沸細細含之

升麻煎治膀胱熱不已口舌生瘡咽腫方

升麻 玄參 薔薇根白皮 射干 各四兩 大青 黄蘗 各三兩 蜜七合

右七味咬咀以水七升煮取一升五合去滓下蜜更煎兩沸細細含咽之

治口數生瘡連年不瘥方

薔薇根 黄芩 當歸 桔梗 欽 大黄 鼠李根皮 芍藥 續斷 黄蘗 各一兩 葛根 各一兩 茯苓 黄芩 甘草 大黄 桂心 半兩 栝蔞根 十八銖 薔薇根 各十三銖 枳實 杏仁 黄連 各一兩

治胃中客熱脣口乾燥生瘡方

右十二味為末以酒服方寸匕日二亦可漿水服之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十味為末食前漿水服方寸匕日二

治口熱生瘡方

升麻三十銖 黃連十八銖又古今錄驗作黃蘗

右二味為末綿裹含咽汁亦可去之

治口瘡方

黃蘗二兩 升麻三兩 生地黃五兩 薔薇根皮四兩

右四味咬咀以水七升煮取三升去滓含之瘥止含極吐却更含

治口中瘡爛痛不得食方

甘草一寸 黃連六銖 杏仁二十枚

右三味為末合和綿裹杏仁大含之勿咽日三夜一

薔薇圓治口中瘡身體有熱氣瘭瘰方

薔薇根 黃芩 鼠李根 當歸 黃蘗 石龍芮翼作黃連 葛根 白斂 芍藥 續斷 黃耆各一兩 栝蔞根二兩

右十二味為末蜜和丸如梧子服十丸日三千金翼有黃連

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

一兩
治口吻瘡方
以楸白皮及濕帖之三四度瘥
又方取經年葵根欲腐者彌佳燒作灰及熱傅之良
又方以新炊飯了甑及熱以脣口向甑脣上熨之二七
下三兩上瘥止
又方
梔子　甘草　各十八銖　細辛　三十銖　桂心　十二銖
欽定四庫全書
芎藭　一兩
右五味為末蜜丸食後服七丸日再服瘥
又方
芎藭　白芷　橘皮　桂心
棗肉　各一兩半
右五味為末蜜和為丸食後服十五丸又含之以瘥
為度此方甚驗
治口肥瘡方
備急千金要方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

焚竈上飯令焦末傅之

治鷰吻瘡方

白楊枯枝鐵上燒取湍及熱傅之

又方以木履尾内煻灰中令熱取拄兩吻各二七遍

治口傍惡瘡方

亂髮灰　故絮灰　黄連末　乾薑末

右四味等分合和為散以粉瘡上不過三遍即愈

治口中瘡咽喉塞不利口燥膏方

猪膏　白蜜　各一斤　黄連　一兩

右三味合煎去滓攪令相得含如半棗大日四五夜

二

治熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏方

當歸　射干　升麻　各一兩　附子　半兩

白蜜　四兩

右五味咬咀以猪脂四兩先煎令成膏下著地勿令大熱内諸藥微火煎令附子色黄藥成絞去滓内蜜

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

復上火一兩沸令相得置器中令凝取如杏仁大含之日四五遍輒咽之

治失欠頰車蹉開張不合方

一人以手指牽其頤以漸推之則復入矣推當疾出其指恐誤嚙傷人指也

治失欠頰車蹉方

消蠟和水傅之善

又方灸背第五椎一日二七壯滿三日未瘥灸氣衝二百壯胸前喉下甲骨中是亦名氣堂

又方又灸足內踝上三寸宛宛中或三寸五分百壯三報此三陰交穴也

治卒口噤不開方

以附子搗末內管中強開口吹口中

甘草圓治口中熱乾方

烏梅肉 各一兩半 棗膏 二兩

甘草 人參 半夏 生薑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右六味為末蜜丸如彈子大旋含咽日三

治口乾方

羊脂若猪脂雞子大擘之内半升酢中漬一宿絞取汁含之

治口乾除熱下氣方

石膏 五合 碎 蜜 二升

右二味以水三升煮石膏取二升内蜜煮取二升去滓含如棗核大咽汁盡更含之

治虚勞口乾方

麥門冬 二兩 末 大棗 三十枚 肉

右二味以水一升和令熟五升米下蒸之任性服棗食之立愈

又方

又方羊脂如雞子大醇酒半升棗七枚擘合漬七日取

酸棗 一升

葛根 甘草 各三兩

酸石榴子 烏梅 各五合

栝蔞實 麥門冬 四兩

覆盆子 三合

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:52
列印頁數：405
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右八味為末以蜜丸含如棗大以潤為度

五香圓治口及身臭令香止煩散氣方

豆蔻 丁香 藿香 零陵香 青木香 白芷 甘松香 當歸 各半兩 檳榔二枚 桂心 各一兩 香附子二兩

右十一味為末蜜和丸常含一丸如大豆許咽汁日三夜一亦可常含咽之五日口香十日遍體香二七日衣被香三七日下風人聞香四七日洗手水落地香五七日把他手亦香慎五辛下氣去臭

含香圓治口氣臭穢宜常服之方

丁香 半兩 甘草 三兩 桂心 各一兩半 芎藭 一兩 細辛

右五味為末蜜和丸如彈子大臨卧時服二丸

又方常以月旦日未出時從東壁取步七步回頭向垣立含水噀壁七遍口即美香

又方桂心 甘草 細辛 橘皮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右四味等分治下篩以酒服一錢匕瘥止

又方

棗肉 八兩

芍藥 白芷 橘皮

桂心 各四兩

右五味為末次內棗肉乾則加蜜和丸如大豆許且服十丸食前食後常含之或吞之七日大香治口中臭方

桂心 古今錄用細辛 各等分

甘草 各等分

又方細辛豆蔻含之甚良

右二味為末臨臥以指撮許酒服二十丸即香

又方蜀椒 桂心 各等分

右二味為末酒服三指撮許

主口香去臭方

甘草 三十銖

白芷 十八銖

芍藥 二十四銖

又方大棗 瓜子仁 松根白皮

右三味治下篩以酒服方寸匕日三服三十日口香

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:53
列印頁數：407
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右三味治下篩以酒服方寸匕日二服一百日衣被
香
又方
瓜子仁　芎藭　藁本　當歸
杜蘅 各六銖　細辛 半兩　防風 二兩
右七味治下篩食後飲服方寸匕日三服五日口香
十日身香二十日肉香三十日衣被香五十日遠聞
香一方加白芷十八銖
又方橘皮 二十銖　桂心 十八銖　木蘭皮 一兩　大棗 二十枚
右四味治下篩酒服方寸匕日三久服身香亦可以
棗肉丸之服二十丸如梧子大稍加至三十丸一方
有芎藭十八銖
又方濃煮細辛汁含之久乃吐之
又方井花水三升漱口吐厠中良
又方香薷一把水一斗煎取三升稍稍含之
又方甜瓜子作末蜜和丸如棗核大每日空心洗漱訖

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

含一丸亦傳齒

又方麥大豆令焦及熱酢沃取汁含之

治七孔臭氣皆令香方

沈香 五兩　藁本 三兩　白瓜瓣 半升　丁香 五合　甘草 當歸　芎藭　麝香 各二兩

右八味為末蜜丸如小豆大食後服五丸日三久服令舉身皆香

治身體臭令香方

甘子皮 白芷 各兩半　瓜子仁 三兩　藁本　當歸　細辛　桂心 各一兩

右七味治下篩酒服方寸匕日三服五日口香三七日身香

又方甘草　松根皮　大棗　甜瓜子 各等分

右四味治下篩食後服方寸匕日三七日知百日大香

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

薰衣香方

零陵香 丁香

雞骨煎香 鬱金香

蘇合香 甘松香

雀頭香 白檀香

藿香 各一兩 麝香 半兩

右十八味為末蜜二升半煮肥棗四十枚令爛熟以手痛搦令爛如粥以生布絞去滓用和香乾濕如捺

右十八味為末蜜二升半煮肥棗四十枚令爛熟以手痛搦令爛如粥以生布絞去滓用和香乾濕如捺

藿香 各一兩 麝香 半兩

青桂皮 青木香

楓香 各三兩 薰陸香

甲香 各二兩 沈水香 五兩

安息香 艾納香

又方

盆水內籠下以殺火氣不爾必有焦氣也

沈香 煎香 各五兩

雀頭香 丁子香

又方

麨擣五百杵成丸蜜封七日乃用之以微火燒之以

麨擣五百杵成丸蜜封七日乃用之以微火燒之以

藿香 各一兩

沈香 煎香 各五兩

雀頭香 丁子香

又方

用

右五味治下篩內麝香末半兩粗羅臨薰衣時蜜和

右五味治下篩內麝香末半兩粗羅臨薰衣時蜜和

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

薰陸香　沈香　檀香　雞婁婆香

煎香　甘松香　零陵香　藿香　各一兩

丁香　十八銖　棗肉　八兩　苜蓿香　二兩

右十一味粗下篩合棗肉再擣量加蜜和用之善

濕香方

沈香　二斤七兩九銖　甘松香　檀香　雀頭香　一作藿香　各三兩九銖

麝香　二兩九銖　薰陸香　三兩六銖　零陵香　丁香　各三兩九銖

雞骨煎香　甲香

右十味為末臨用時以蜜和若預和味歇不中

又方

沈香　三兩　零陵香　煎香　麝香　各一兩半

丁子香　藿香　各半兩　甲香　檀香　各三銖

薰陸香　甘松香　六銖

右十味粗下篩蜜和用薰衣時錊盛埋之久窖佳

百和香通道俗用者方

沈水香　五兩　丁子香　雞骨香　雞婁婆香

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:54
列印頁數：411
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甲香 各三兩 薰陸香 白檀香 熟捷香

炭末 各二兩 零陵香 青桂皮 青木香

甘松香 白漸香 柴也 藿香 各一兩 雀頭香

藕合香 安息香 麝香 燕香 各半兩

右二十味為末酒灑令輭再宿酒氣歇以白蜜和内瓷器中蠟紙封勿令氣洩冬月開取用大佳

裹衣香方

丁子香 一兩 苜蓿香 二兩 甘松香 二兩 茅香 各三兩

零陵香 各四兩 藿香

右六味各擣加澤蘭葉四兩粗下篩用之極美

又方

零陵香 二兩 藿香 甘松香 苜蓿香

煎香 白檀香 沈水香 各一兩

右七味合擣加麝香半兩粗下篩用如前法良

又方

藿香 四兩 丁香 七枚 甘松香 麝香

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

沈香　煎香

右六味粗下篩和為乾香取裹衣大佳

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:55
列印頁數：413
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

七竅病方

舌病第四 方

升麻煎舌主心藏熱即應舌生瘡裂破引脣揭赤服之

洩熱方

蜀升麻 射干 各三兩 栢葉 切一升 大青 二兩

苦竹葉 切 各五兩 地黃汁 各五兩 生玄參汁 三合 赤蜜 八合

生蘆根 薔薇根白皮 各五兩

右十味�mouth以水四升煮取一升去滓下玄參汁令兩沸次下地黃汁兩沸次下蜜煎取一升七合綿惹取汁安舌上含細細咽之

治舌上瘡不得食舌本强頸兩邊痛此是心虛熱所致之方

柴胡 升麻 芍藥 梔子仁

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:55
列印頁數：414
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

通草 各二兩
生薑 石膏 各四兩
黃芩 大青 杏仁 各一兩半

右十味咬咀以水一斗九升煮取三升半分四服日三夜一滓可重煎服之

治舌卒腫滿口溢出如吹猪胞氣息不得通須臾不治殺人方

急以指刮破舌兩邊去汁即愈亦可以鈹刀決兩邊破之以瘡膏傅之

又方刺舌下兩邊大脉血出勿使刺著舌下中央脉血出不止殺人如上治不愈或血出數升則燒鐵篦令赤熨瘡數過以絶血也

又方半夏十二枚洗熟以酢一升煮取八合稍稍含漱之吐出加生薑一兩佳

治舌腫起如猪胞方

釜下墨末以酢厚傅舌上下脫去更傅須臾即消若先決出血汁竟傅之彌佳凡此患人皆不識或錯治

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

益困殺人甚急但看其舌下自有噤蟲形狀或如螻蛄或如臥蠶子細看之有頭尾其頭少白燒鐵釘烙頭上使熱即自消

治舌腫强滿口方

滿口含糖酢少許時熱通即止

治舌腫滿口不得語方

鹽一升 廬蟲三十枚

右二味以水三升煮三沸含之稍稍咽之日三

治舌强不得語方

礬石 桂心

右二味等分為末安舌下立瘥

舌上黑有數孔大如箸出血如湧泉此心藏病治之之方

戎鹽 黄芩一作葵子 黄蘗 大黄各五兩

人參 桂心 甘草各二兩

右七味末蜜丸梧子大以飲服十丸日三亦燒鐵篦

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

烙之

治舌上出血如泉方

燒鐵篦熱爍孔中良

脣病第五 甲煎法 灸法 方

脾脣熱焦方

潤脾膏治脾熱脣焦枯無潤方

生天門冬 切 一升 生麥門冬 菱糵 各 四兩

猪膏 三升 細辛 甘草 芎藭

白朮 各二兩 黄耆 升麻 各三兩

右十一味咬咀諸藥苦酒淹一宿綿裹藥臨煎下生地黄汁與猪膏共煎取膏鳴水氣盡去滓取細細含之

甲煎脣脂治脣裂口臭方

先以麻擣泥泥兩口好氈餅容一斗已上各厚半寸曝令乾

甘松香 五兩 艾納香 苜蓿香 茅香 各一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

藿香 三兩　零陵香 四兩
右六味先以酒一升水五升相和作湯洗香令淨切碎又以酒水各一升浸一宿明旦取一斗五升烏麻油六味內其中微火煎三上三下去滓內上件一口餅中令少許不滿然後取

上色沈香 三斤　雀頭香 三兩　蘇合香 各三兩　白膠香
白檀香 各五兩　丁香 一兩　麝香 各一兩　甲香
右八味先酒水相和作湯洗香令淨各別擣碎不用絕細以蜜二升酒一升和香內上件麪餅中令實滿以綿裹餅口又以竹篦交橫約之勿令香出先掘地埋上件油餅令口與地平以香餅合覆油餅上令兩口相當以麻擣泥泥兩餅口際令牢密可厚半寸許用糠壅餅上厚五寸燒之火欲盡即加糠三日三夜勿令火絕計糠十二石訖停三日令冷出之別鍊蠟八斤煮數沸內紫草十二兩煎數十沸取一莖紫草骨白出之又以綿濾過與前草向爪甲上研看紫

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煎相和令調乃内朱砂粉六兩攪令相得少冷未凝之間傾置竹筒中筒上用紙裹麻纏之待凝冷解開任意用之計此可得五十挺

甲煎口脂治脣白無血色及口臭方

燒香澤法

沈香　甲香　丁香　麝香

檀香　蘇合香　薰陸香　零陵香

白膠香　藿香　甘松香　澤蘭

右十二味各六兩胡麻油五升先煎油令熟乃下白膠香藿香甘松澤蘭少時下火綿濾内甕餅中餘八種香濤作末以蜜和勿過濕内著一小甕餅中令滿以綿幕口竹十字絡之以小餅覆大餅上兩口相合窒泥泥之乃掘地埋油餅令口與地平乃聚乾牛糞燒之（一方用糠火燒之）七日七夜不須急滿十二日火尤佳待冷出之即成其餅並須熟泥勻厚一寸曝乾乃可用

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鍊蠟合甲煎法

蠟　紫草各二兩

右先鍊蠟令消乃内紫草煮少時候看以紫草向指甲上研之紫草心白即出之下蠟勿令凝即傾弱一取之便成好口脂也傅口面日三

治緊脣方

纏白布作大燈炷如指安斧刃上燃炷令刃汗出拭取傅脣上日二三度或故青布亦佳并治瘡脣

又方自死螻蛄灰傅之

又方炙松脂帖上取瘥

又方取蛇皮拭淨燒為灰傅之

又方以火炙蠟帖脣取瘥

又方水服蟦蟟灰良

又方青布灰以酒服之脂和塗亦可

又方炙虎口男左女右

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方灸承漿三壯

治瘭屑方

以乾蠐螬燒末和猪脂臨卧傅之

又方燒鼈甲及頭令煙盡為末傅之日三度

治屑生瘡方

以頭垢傅之日三度

又以胡粉傅之

治屑邊生瘡連年不瘥方

以八月藍葉十斤絞取汁洗不過三日即瘥

治屑舌忽生瘡方

燒雞屎白為末以布裹著病上含之

治屑先核方

猪屎平量一升投水絞取汁温服之

治屑黑腫痛癢不可忍方

取大錢四文於石上以臘月猪脂磨取汁塗之

又方以竹弓彈出惡血取瘥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方燒亂髮及蜂房六畜毛作灰猪脂和傅之亦治瘡
脣
治冬月脣乾拆血出方
擣桃仁以猪脂和傅之
治遠行脣口面皺裂方
熟煎猪脂將行夜常取傅面没行萬里野宿不損

備急千金要方卷十八

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:59
列印頁數：422
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷十九　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

七竅病方

齒病第六　論灸法方

論曰凡齒斷宣露多是疳蟨及月蝕以角蒿灰夜傅斷間使滿勿食油不過二三夜瘥食油及乾棗即發所以患齒者忌油乾棗及桂心每旦以一捻鹽内口中以温水含揩齒及叩齒百遍為之不絶不過五日口齒即牢密凡人齒斷不能食果菜者皆由齒根露也為此鹽湯揩齒叩齒法無不愈也神良凡人好患齒病多由月蝕夜食飲之所致也識者深宜慎之所以日月蝕未平時特忌飲食小兒亦然

治齲齒及蟲痛方

高良薑　各十二銖
白附子
知母
細辛　各六銖
芎藭

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右五味為末以綿裹少許著齒上有汁吐出一日兩度含之亦治口氣

又方切白馬懸蹄如米許以綿裹著痛處孔中不過三度善

治蠹齒蟲齒積年不瘥從少至老方

雀麥草一名杜姥草似牛毛草以苦瓠葉四十枚淨洗露一宿平旦取草屈長二寸廣一寸厚五分以瓠葉裹縛之作五六十裹子取三年醯醋浸之至日中取小口甕子令可口含得者將錢內甕子中取一枚少者得二十枚

治蟲齒方

萇荂子三合如無薤子韭子並得以青錢七文燒令赤取小口甕子令可口含得者將錢內甕子中取一撮許萇荂子安錢上令炮焞聲仍與半合許水淋令

列印日期/時間：02/04/2005 18:41:59
列印頁數：424
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

氣上從鼻出將口含鼻口令氣莫出用熏齒冷復更
作取三合藥盡為劑非止蟲齒得瘥或風齒齲齒齒
中病悉主之口中多津即吐之
又方白楊葉切一升水三升煮取一升含之
又方大醋一升煮枸杞根白皮一升取半升含之蟲立
出
又方取桃仁少許以釵頭穿向燈上燒之煙出經少時
吹滅即内入口安蟲齒上咬之不過五六度一方作胡
桃仁
治疳蟲蝕齒根方
地龍置石上著一撮鹽須臾化為水以麪展取却待
凝厚取以内病上又以皂莢去皮塗上蟲即出
又方純麻子燭燼研以井花水塗之
又方黑羖羊脂葭莩子各等分先燒鐵鋤斧□令赤内
其中煙出以布單覆頭令煙氣入口熏之
治齒齗腫痛及蟲痛方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃芩　甘草
細辛　桂心
蛇床子　當歸
各一兩
右六味咬咀以醋漿水七升煮取三升去滓含之日三夜二

治齒有孔不得食面腫方
莽草　猪椒附根皮
七葉　長四寸者七枚
右二味咬咀以漿水三升煮取一升滿口含倦即吐却日二三度

治齒根腫方
松葉　鹽
一把切　一合
右二味以酒三升煮取一升含之

治齒根動欲脫落方
生地黃綿裹著齒上咋之又咬咀以汁漬齒根日四五度著之并咽汁十日内大佳

治齒根動且痛方
生地黃　獨活
各三兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:00
列印頁數：426
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味咬咀以水一升漬一宿取含之

治齒斷間津液血出不止方

生竹筯二兩醋煮含之

又方細辛 二兩 甘草 一兩

右二味咬咀以醋二升煎取一升日夜旋含之

又方礬石一兩燒水三升煮取一升先拭血乃含之已後不用朽人牙根齒落不用之可也

治齒間血出方

以苦竹葉濃煮與鹽少許寒温得所含之冷即吐

又方温童子小便半升取三合含之其血即止也

治齒出血不止方

刮生竹皮二兩苦酒浸之令其人解衣坐使人含噀其背上三過仍取竹茹濃煮汁勿與鹽適寒温含漱之竟日為度

治酒醉牙齒涌血出方

當歸 二兩 礬石 六銖 桂心 細辛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甘草 各一兩
右五味㕮咀以漿水五升煮取三升含之日五六夜三
又方燒釘令赤注血孔中止
治頭面風口齒疼痛不可忍方
蜀椒 二合　茶草 十葉　雀李根　獨活 各二兩
細辛　芎藭　防風 各一兩
右七味㕮咀以酒二升半煮取五沸去滓含之冷吐更含之勿咽汁
又方雞屎白燒灰以綿裹置齒痛上咬咋之
又方煮枸杞汁含之
又方雞屎白以醋煮漬稍稍含之
又方生地黄一節　蒜一瓣
右二味熟擣綿裹著痛上咬之勿咽汁出吐之日日為之瘥止
又方含驢尿須臾即止

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治風齒疼痛方

灸外踝上高骨前交脉三壯又以線量手中指至掌後橫文折為四分量橫文後當臂中灸二壯愈灸之當隨左右

含漱湯治齒痛方

獨活 當歸 各三兩 芎藭 各二兩 藁茇 各二兩 黄芩 細辛 丁香 一兩

右七味㕮咀以水五升煮取二升半去滓含漱須臾吐出吐更含之 古今錄驗同 有甘草二兩

又方含白馬尿隨左右含之不過三五口

漱湯治齒痛方

腐棘刺二百枚以水二升煮取一升旋旋含之日四五度以瘥止

又方芎藭 細辛 防風 礬石

附子 藜蘆 莽草

右七味各等分作末綿裹如彈丸大酒浸安所患處

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

含之勿咽日三刺皮極佳

又方蚯蚓糞水和作稠泥團以火燒令極赤如粉以臘月猪膏和傅齒斷上日三兩度永瘥

又方取自死蚯蚓乾者擣末著痛處即止

治齒斷痛不可食生果方

生地黄　桂心

右二味合嚼令味相得咽之

又方馬齒一把嚼之即瘥

治牙癰塞口噤不開方


附子　大者一枚　黄連　十八銖　礬石　一兩

右三味為末内管中强開口吹之入喉間細細吹之

備急千金要方卷十九

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:02
列印頁數：430
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)


欽定四庫全書 子部
備急千金要方卷二十 二十一
詳校官太醫院醫士臣 針 恢
編修臣 倉 聖脈 覆勘
總校官中書臣 朱 鈐
校對官中書臣 胡紹基
謄錄舉人臣 汪師曾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

七竅病方

喉病第七　證針灸方法　方見第八卷中

小續命湯加杏仁一兩治卒喉痺不得語

烏翼膏喉嚨者脾胃之候若臟熱喉則腫塞神氣不通服之方

生烏翼　十兩

升麻　三兩

羚羊角　通草

芍藥　各二兩

薔薇根　切一升

生地黃　切五合

猪脂　二斤

艾葉　六銖生者又佳

右九味㕮咀綿裹苦酒一升淹浸一宿内猪脂中微火煎取苦酒盡膏不鳴為度去滓薄綿裹膏似大杏仁内喉中細細吞之

治喉腫痛風毒衝心胸方

豉　一升半

犀角

射干

杏仁

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甘草 各二兩
芍藥 三兩
梔子 七枚
升麻 四兩
羚羊角 一兩半
右九味咬咀以水九升煮取三升去滓内豉煮一沸
分三服
治喉腫胸脇支滿方
灸尺澤百壯
治風毒咽水不得下及瘰癧腫方
升麻
芍藥 各六兩
射干
杏仁
楓香
葛根
麻黄 各三兩
甘草 二兩
右八味咬咀以水八升煮取二升半分三服
又方以水服葸茗子末兩錢匕神良
治喉痺方
荆瀝稍稍咽之效
又方燒牛角末酒服之良
又方臘月猪尾燒末水服之善
又方含雞屎白

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方熬杏仁令黑含或末服之
又方巴豆去皮針線穿咽入牽出
又方馬藺子半升水二升煮取一升半服之
又方煮桃皮汁三升服之
又方燒荆汁服之又水三升煮荆一握取一升分三服
又方刺手小指爪文中出三大豆許血逐左右刺皆須
慎酒麪毒物
治喉痺及毒氣方
桔梗二兩水三升煮取一升頓服之
又方生薑二斤擣取汁蜜五合微火煎相和服一合日
五
又方附子一枚破作大片蜜塗灸令黃含咽汁甘盡更
塗灸如前法
又方剥大蒜塞耳鼻日二易
治喉痺卒不得語方
濃煮桂汁服一升亦可末桂著舌下漸咽之良

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方煮大豆汁含之無豆用豉亦佳
又方以酒五合和人乳汁半升分二服
又方燒炊箪作灰三指撮水服之
又方芥子末水和傅之乾則易
又方商陸苦酒熬令濃熱傅之
又方末桂心如棗核大綿裹著舌下須臾破
以韭一把擣熬傅之冷則易
治喉卒腫不下食方
又方含上好醋口舌有瘡亦佳
治懸癰乘熱暴腫長方
乾薑半夏等分末以少許著舌上
又方鹽末以筋頭張口拄之日五
治懸癰咽中生息肉舌腫方
日出時向日張口使婦人用左裙裾拄其頭上七下
瘥
又方羊蹄草煮汁口含之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方鹽豉和塗之良

又方取四五歲小兒尿合鹽含之

凡喉痺深腫連頓吐氣數者名馬喉痺治之之方

馬銜一具水二升煮取一升分三服

又方穬中蒼耳三七枚燒末水服之

又方馬鞭草根一握勿中風截去兩頭擣取汁服之良

又方燒穀奴灰酒服之立破

母薑酒咽門者肝膽之候若臟熱咽門則塞而氣閉若腑寒咽門則破而聲嘶此證宜服之乃效

母薑汁 二升 酥

桂心 秦椒 各一兩

獨活 各一兩 六銖

防風 一兩半 芎藭

牛髓 油 各一升

右九味為末内薑汁中煎取相淹濡下髓酥油等令調微火三上三下煎平旦温清酒一升下二合膏即細細吞之日三夜一

又方丹參 升麻 雄黄 杏仁

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:04
列印頁數：436
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鬼白　甘草　射干　各一兩　麝香　半兩

右八味為末以蜜丸如梧子飲下一丸加至五丸日

三酒服亦佳咽痛失聲不利用之良

治咽傷語聲不徹方

酒　酥　各一升　乾薑　二兩半　末　通草

桂心　石菖蒲　各二兩

右六味合和服一匕日三

又方酒　酥　各一升　乾薑末　十兩

右三味以酒二合酥一匕薑末二匕相和服日三食

後服亦治肺痛

治啞塞欬嗽方

桂心　六銖　杏仁　十八銖

右二味為末蜜丸如杏仁大含之細細咽汁日夜勿

絶

治咽痛逆氣不能食方

麻子一升熬令黑以酒一升淋取汁空心一服一升

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

漸至二升多汗好覆勿觸風冷此方兼理産婦及丈夫中風如角弓反張口噤不開大驗與紫湯氣力同

治卒咽痛方

懸木枸燒末水服方寸匕日三

又方燒炊箪一枚漿水服方寸匕

治卒風咽腫面腫方

杏仁末和雞子黄更擣傳上乾復易之七八度若腫汁出煮醋和伏龍肝傅乾更易之

治尸咽方

燒履鼻繩為灰暖水服之

又方燒麻子脂服之良

治咽喉不利下氣方

射干　杏仁　人參　附子　桂心　各一兩

右五味末蜜丸如指大含一丸稍稍咽之令藥味相接

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:05
列印頁數：438
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治咽喉中痛癢吐之不出咽之不入似得蠱毒方

含生薑五十日瘥

又方以青布裹麻黃燒以竹筒盛煙熏咽中

耳病第八 方

治腎熱背急攣痛耳膿血出或生肉塞之不聞人聲方

磁石 白术 牡蠣 各五兩 甘草一兩

芍藥四兩

葱白 生地黃汁 各一升

大棗十五枚 生麥門冬六兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服

治腎熱面黑目白腎氣内傷耳鳴吼鬧短氣四肢疼痛腰背相引小便黃赤方

白术五兩 生薑六兩 玄參四兩 澤瀉二兩

茯苓各三兩

生地黃切一升

羊腎一具治如食法

淡竹葉切二升 芍藥

右九味㕮咀以水二升煮羊腎竹葉取一斗去滓澄之下藥煮取三升分三服不已日三更服一劑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治腎熱耳膿血出溜日夜不止方

鯉魚腦一枚　鯉魚腸一具洗細切　鯉魚鮓三斤

烏麻子熬令香一升

右四味先擣麻子碎次下餘藥擣為一家內器中微火熬暖布裹薄耳得兩食頃開之有白蟲出更作藥若兩耳並膿出用此為一劑以薄兩耳若止一耳分藥為兩劑不過三薄便瘥慎風冷

治腎虛寒腰脊苦痛陰陽微弱耳鳴焦枯方

生地黃汁二升　羊腎一具炙　白朮　麥麴各一斤　桂心　地骨皮各八兩　甘草乾薑　杜仲　黃耆各四兩　當歸　五味子各三兩　白蜜　生天門冬汁各三升

右十四味為末內盆中取前三物汁和研微火上暖盆取熱更研日曝乾常研令離盆酒服方寸匕日再

治耳聾鳴汁出皆由腎寒或一二十年不瘥之方

柘根三十斤　菖蒲切五斗取五斗各用水一石去滓澄清

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

故鐵 三十斤燒赤水五斗浸三宿去鐵澄清

右三味合一石五斗用米二石并麴二斗釀如常法酒熟一月封頭開清用磁石喻鐵者三斤擣為末内酒中浸三宿飲之日夜飲常取小醉而眠取聞人語乃止藥

又方服天門冬酒百日瘥方見別卷

又方攀石少許以生菖蒲根汁和點入耳中

治勞聾氣聾風聾虛聾毒聾久聾耳鳴方

山茱萸 乾薑 巴戟天 芍藥

澤瀉 桂心 菟絲子 黃耆

乾地黃 遠志 蛇床子 石斛

當歸 細辛 蒐蘿 牡丹

人參 甘草 附子 茯苓 各二兩

葛蒲 一兩 羊腎 二枚 防風 一兩半

右二十三味為末蜜丸如梧子食後服十五丸日三加至三四十丸止皆緣腎虛耳故作補腎方又作薄

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

利丸竅藥即瘥

治耳聾方

巴豆 杏仁 各七枚 印成鹽 兩顆

生地黄 極粗者長一寸半 頭髮 如雞子大燒灰

右五味治下篩以綿薄裹内耳中一日一夜若小損即去之直以物塞耳耳中黄水及膿出漸漸有效不得更著不著一宿後更内一日一夜還去之依前

又方蕘麻仁 五合 杏仁 葛蒲 磁石

右十二味先擣草石令細別研諸仁如脂内松脂蠟合擣數千杵令可丸乃止以如棗核大綿裹塞耳一日四五度出之轉捻不過之四日易之

又方磁石 四兩 天門冬 地骨皮 生薑 各三兩

山茱萸 土瓜根 牡荆子 茯苓

葛蒲 苪蘞 枳實 白芷

桃仁 石鹽 附子 二分 薰陸香 松脂 各十分 蠟 八分 通草 各三分 巴豆 一分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

橘皮　甘草 各二兩　竹瀝 二升

右十五味㕮咀以水八升煮減半內瀝煮取二升五合分三服五日一劑三者乃著散內耳中如後方

又方磁石 四兩　石葛蒲　白斂　牡丹

山茱萸　牛膝　土瓜根 各二兩

右七味治下篩綿裹塞耳日一易之仍服大三五七

散佳方見別卷

石鹽　亂髮灰

右六味等分為末作丸綿裹塞耳時易之瘥止

又方蠟　松脂　薰陸香　蕳麻

又方巴豆 十四枚　成鍊松脂 半兩

右二味合治丸如黍米大綿裹以簪頭著耳中日一

易藥如硬微火炙之以汁出乃愈大效

又方防風　葛蒲　細辛　附子

芎藭 各六銖　雄鯉魚腦 二枚

右六味㕮咀以魚腦合煎三上三下以膏香為成濾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

去滓冷以一棗核灌耳中以綿塞之 古今録驗用療風聾久耳中鳴者以當歸代防風以白芷代芎藭用

又方竹筒盛鯉魚腦炊飯處蒸之冷烊注于耳中

又方菖蒲附子各等分為末以麻油和以綿裹内耳中 廣濟方以撩耳卒痛欲死者崔氏以苦酒和塞耳

又方燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一易

夜去之旦別著

又方蓽麻一百顆 去皮

大棗十五枚 去皮核

右二味熟擣丸如杏仁大内耳中二十日即瘥

又方芥子擣碎以男兒乳和綿裹内之

又取柴胡苗汁灌耳中再度瘥

又方作一坑可容二升許著炭火其中坑似窖形以塼覆口上塼上作一孔子容小指塼孔上著地黄一升以木盆覆之以泥泥盆下勿洩盆底上鑽一小孔可容筋其孔上著三重布以耳孔當盆上薰久若悶去黄水髮裹鹽塞之不過二三度神效

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:07
列印頁數：444
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方擣豉作餅填耳內以地黃長五六分削一頭令尖內耳中與豉餅底齊餅上著揪葉蓋之剜一孔如筯頭透餅于上灸三壯

又方作泥餅子厚薄如錕鈍皮覆耳上四邊勿令洩氣當耳孔上以草刺泥餅穿作一小孔于上以艾灸之百壯候耳中痛不可忍即止側耳瀉却黃水出盡即瘥當灸時若泥乾數易之

又方酒三升碎牡荊子二升浸七日去滓任性服盡雖三十年久聾亦瘥

又方截箭簳二寸內耳中以麪擁四畔勿令洩氣灸筒上七壯

又方硫黃雄黃各等分為末綿裹內耳中數日聞人語聲

又方以綿裹蛇膏塞耳神良

又方淳酢微火煎附子一宿削令可入耳以綿裹塞耳良

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方礬石　甘草　葛蒲　當歸
細辛　防風　芎藭　白芷
烏賊骨　附子　皂莢各半兩　巴豆十四枚
右十二味薄切三升酢漬一宿以不中水雞膏九合煎三上三下以巴豆黃膏成去滓內雄黃末攪調取棗核大瀝耳中綿塞之日三易

右三味咬咀於銅器中微火煎三沸去滓密貯勿泄

又方桂心十銖　野葛六銖　成煎雞肪五兩

以葦筒盛如棗核大火灸令少熱欹卧傾耳灌之如此十日盯瞪自出大如指長一寸久聾不過三十日

以髮裹膏深塞莫使泄氣五日乃出之千金翼云治二十年耳聾

治耳聾乾盯瞪不可出方

擣自死白頂蚯蚓安蔥葉中用麪封頭蒸令熟並化為水以汁滴入耳中滿即止不過數度即挑易出瘥

後髮裹鹽塞之肘後以療蜒蚰入耳立效

又方取酢三年者灌之最良次用綿塞半日許必有物

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

出

赤膏治耳聾齒痛方

桂心 大黃 白朮 細辛 芎藭 各一兩 乾薑二兩 丹參五兩 蜀椒一升 巴豆十枚 大附子二枚

右十味咬咀以苦酒二升浸一宿内成煎猪肪三斤火上煎三上三下藥成去滓可服可摩耳聾者綿裹内耳中齒冷痛則著齒間諸痛皆摩若中有病以酒和服如棗許大咽喉痛取棗核大吞之

治卒耳聾方

細辛 菖蒲 各六銖 杏仁 麴末 各十銖

右四味和擣為丸乾即著少猪脂取如棗核大綿裹内耳中日一易小瘥二日一易夜去旦塞之

治三十年久聾方

故鐵三十斤以水七斗浸三宿取汁入麴釀米七斗如常造酒法候熟取磁石一斤研末浸酒中三日乃

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:08
列印頁數：447
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

可飲取醉以綿裹磁石内耳中好覆頭卧酒醒去磁石即瘥

治耳聾有膿散方

附子一兩 禹餘粮六銖 伏龍肝 龍骨 釜底墨 烏賊骨各半兩

右六味為末取如皂莢子大綿裹内耳中日一易取瘥不瘥者有蟲加麝香一豆大

治耳聾有膿不瘥有蟲方

酢三合 鯉魚腸一具切

右二味和濤帛裹内耳中兩食頃當悶痛有白蟲著藥去之更入新者蟲盡乃止其藥去蟲還可用

又方先以紙纏去耳中汁次以礬石末粉耳中次以鹽末粉其上食久乃起不過再度永瘥

又方擣桂和鯉魚腦内耳中不過三四度瘥

治耳鳴聾方

當歸 細辛 芎藭 防風

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

附子 白芷 各六銖
右六味為末以鯉魚腦八兩合煎三上三下膏成去
滓取棗核大灌耳中且以綿塞耳孔
治耳鳴水入方
附子 礬石 各六銖 甘草 二十銖 通草
右八味為末以白鵝脂半合稍稍和取如棗核大綿
裹内耳中日三旋旋和用 一本用蔥涕半合
桂心 各十八銖 葛蒲 一兩 獨活 一兩半
治耳鳴如流水聲不治久成聾者方
掘生烏頭乘濕削如棗核大内耳中日一易不過三
日愈亦療癢及卒風聾病
治聤耳出膿汁方
礬石 黄連 烏賊骨 赤石脂
右四味各等分為末以綿裹如棗核大内耳中日三
小品不用赤石脂姚氏加龍骨一兩千金翼同姚氏
治聤耳痛膿血出方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取釜月下灰薄耳中日三次易換每換以篦子去之

再著取瘥止

治瞎耳方

取桃仁熟擣以舊緋絹裹內耳中日三易以瘥為度

治底耳方

取黃礬燒綿裹內耳中不過三二日愈或以葦管吹

治百蟲入耳方

耳中 肘後以療耳卒膿出膿

末蜀椒一撮以酢半升調灌耳中行二十步即出

又方火熨桃葉捲之取塞耳立出

又方取車轄脂傅耳孔蟲自出 肘後以療聤耳膿血

又方以葱涕灌耳中蟲即出亦治耳聾

治蜈蚣入耳方

灸猪肉令香掩耳即出

治蚰蜒入耳方

炒胡麻擣碎以葛袋盛傾耳枕之即出

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方以牛酪灌之滿耳即出出當半消若入腹中空腹食好酪一二升即化為黃水而出不盡更服用之神效

千金翼作牛乳

治耳中有物不可出方

以弓弦從一頭令散傅好膠拄耳中物上停之令相著徐徐引出

備急千金要方卷二十

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十一 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

七竅病方

面藥第九 方

五香散治黑皯皰黵黯黑運赤氣令人白光潤方

黃耆 白茯苓 萎蕤 杜若

大豆黃卷 商陸 各二兩 白芷 當歸

白附子 冬瓜仁 杜蘅 白殭蠶

辛夷仁 香附子 丁子香 蜀水花

旋覆花 防風 木蘭 芎藭

藁本 皁莢 白膠 杏仁

天門冬 土瓜根 白朮 梅肉

酸漿 水萍 各三兩 畢豆 四兩 豬胰 二具 曝乾

右三十二味治下篩取洗面二七日白一年與衆別洗手面令白淨悅澤澡豆方

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:10
列印頁數：452
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白豆麪一升 麪餅三升曝乾濤篩 冬瓜仁四合 豬胵兩具大者細切 白茯苓 白芷 白鮮皮 栝蔞子 白朮 白附子 白斂 菟絲子 土瓜根 羌活 蒌糱 桃仁 杏仁 商陸 芎藭各一兩 右十九味合濤篩入麪豬胵拌勻更濤每日常用以漿水洗甚良

又方

畢豆麪一升 栝蔞實三兩一方不用 豬胵五具細切 土瓜根 白茯苓 蒌糱各五兩 皂莢三挺 右七味濤篩將豬胵拌和更濤令勻每旦洗手面百日

日白淨

又方

白芷 白斂 白朮 桃仁 冬瓜仁 杏仁 蒌糱各等分 皂莢倍其數 右八味為末絹篩洗手面時即用

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方

畢豆麪 三升 大豆黃麪亦得

白芷 青木香

甘松香 零陵香 藿香 各二兩

冬葵子 一本又用冬瓜子

栝蔞仁 四兩

右八味擣篩用如常法

令人面白淨悅澤方

白斂 白朮

白附子 白芷 各二兩

豬脬 三具 水漬去赤汁研

藁本 三兩

右六味為末先以蕪菁子半升又酒水各半升相和煎數沸研如泥合諸藥内酒水中以甕器貯封三日每夜取傅面旦以漿水洗之

令人面潔白悅澤顏色紅潤方

豬脬 五具 蕪菁子 二兩

栝蔞子 五兩

桃仁 三兩

右四味以酒和熟擣傅之慎風日

又方採三株桃花陰乾為末空心飲服方寸匕日三并細腰身

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:11
列印頁數：454
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方酒漬桃花服之好顏色治百病三月三日收

澡豆治手乾燥少潤膩方

大豆黃五升 赤小豆去皮五升 零陵香子 苜蓿各一升

冬瓜仁各六合 茅香五合 丁香一兩 麝香一兩

豬胰五具細切

右九味細濤羅與豬胰相合和曝乾再濤篩取洗手面

又方

大豆末二升絹篩 豬胰五具乾之 蒴藿灰一兩 甘松香 零陵香二兩 白芷各四兩 藁本 白芷各三兩

冬瓜仁 白芷 商陸 芎藭各三兩

面脂主悅澤人面耐老方

神良

右九味為末調和訖與豬胰相和更擣令勻欲用稍取以洗手面八九月合冷處貯之三月已後勿用

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當歸 藁本 靡蕪 土瓜根 去皮
桃仁 兩各一 萎蕤 細辛 防風 兩各一半
木蘭皮 辛夷 甘松香 麝香
白殭蠶 白附子 梔子花 零陵香 半兩
豬脰 三具切水漬六日欲用時以酒投取汁漬藥
右二十一味薄切綿裹以豬脰汁漬一宿平旦以煎豬脂六升微火三上三下白芷色黃膏成去滓入麝收于甕器中取塗面
又方治面上皰黑凡是面上疾皆主之方
丁香 零陵香 梔子花 桃仁
白斂 茯苓 土瓜根 菟絲子
防風 沉香 辛夷 當歸
麝香 藁本 商陸 芎藭 各三兩
萎蕤 一作白菝葜 藿香 一本無 白芷 甘松香
白殭蠶 木蘭皮 各二兩半 蜀水花 青木香 二兩
冬瓜仁 四兩 羊腎脂 鵝脂 各一兩半 羊髓 一升

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生豬脂 升三
右二十九味㕮咀先以美酒五升挼豬軀六具取汁漬藥一宿于豬脂中微火極煎三上三下白芷色黃以綿一大兩生布中絞去滓入麝香末以白朮篦攪至凝乃止任性用之良
面膏去風寒令人面光悅却老去皺方
青木香 白附子 白蠟 白芷
芎藭 零陵香 香附子 各二兩 茯苓 甘松香 各一兩 羊髓 一升半 鍊
右十味㕮咀以酒水各半升浸藥經宿次日煎三上三下候酒水盡膏成去滓取傅面如壯若有黯黵皆落
玉屑面膏治面無光澤皮肉皴黑久用令人潔白光潤方
玉屑 細研 土瓜根 白附子 商陸 芎藭 菱糎 冬瓜仁 桃仁

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白芷　木蘭　辛夷 各一兩　菟絲子
青木香　藁本　當歸　黃耆
白殭蠶　藿香　細辛 各八銖　麝香
防風 各兩半　鷹屎白　蜀水花 一合　豬胞 三具細切
白犬脂　鵝脂　熊脂　豬肪脂 各一升
右二十八味先以水浸豬鵝犬熊脂數易水浸冷血脉盡乃可用吠咀諸藥清酒一斗漬一宿明旦生擘豬鵝等脂安藥中取銅鐺于炭火上微煎至暮時乃熟以綿濾置甕器中仍以練繫白芷片看色黃即膏成其豬胞取浸藥酒挼取汁安鐺中其玉屑蜀水花鷹屎白麝香為末膏成安藥中攪令勻旋取傅面

玉屑面脂方

玉屑　白附子　白茯苓　青木香
蕤核　白木　白殭蠶　蜜陀僧
甘松香　烏頭　商陸　石膏
黃耆　胡粉　芍藥　藁本

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

防風　芒硝　土瓜根　桃仁　桃花　白頭弱　知母　各半兩　豬脂　一升　鵝脂　各一合

右三十三味切以酒水各一升合漬一宿出之用銅器微火煎令水氣盡候白芷色黃去滓停一宿旦以柳枝攪白乃用之

又方令黑者皆白老者皆少方

白檀　各一兩　當歸　芎藭　各二兩　辛夷　零陵香　細辛　羊腎脂　白犬脂

王孫　寒水石　木蘭皮　旋覆花　珊瑚　丁香　土瓜根　蜀水花　白茯苓　芎藭　菟絲子　辛夷仁　冬瓜仁　白頭翁　當歸　藁本　白殭蠶　青木香　蕪菁子　梔子花　細辛　萎蕤　商陸　白芷　防風　黃耆　桃仁　藿香

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

前胡　桂心　半夏　白斂
杏仁　蘼蕪　芒硝　杜蘅
麝香　秦椒　礬石　秦皮
杜若　升麻　蜀椒　黄芩
白薇　各六銖　栝蔞仁　一兩　熊脂　鵝脂
羊髓　牛髓　白狗脂　五合　鷹屎白　一合
清酒　豬肪脂　各一升

右五十四味㕮咀酒漬一宿内脂等合煎三上三下酒氣盡膏成絞去滓下麝香末攪至凝色變乃止薦器密貯勿洩氣

煉脂法

凡合面脂先須知煉脂法以十二月買極肥大豬脂水漬七八日日一易水煎取清脂没水中煉鵝熊脂皆如此法

治外膏主面黑黯方

白芷　白蠟　各二兩　白附子　辛夷

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:13
列印頁數：460
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

防風　烏頭　零陵香　藿香
萎蕤 各兩半　藁本 一兩　商陸　麝香 各六銖
麻油 二合　羊脂 五合　牛脂　鵝脂 各一升
右十六味薄切醋漬浹洽經一宿旦合煎候白芷色黃膏成以皂莢湯洗面傅之日三甚良
又方雞子 三枚　胡粉 細研　丁香 各一兩
右三味先以醋一升漬七日後取雞子白調香粉令勻以漿水洗面傅之
又方白礬　石硫黃　白附子 各六銖
右三味為末以酢一盞漬三日夜淨洗面傅之莫見風日慎三七日可白如雪
白面方
牡蠣 三兩　土瓜根 一兩
右二味為末白蜜和取塗面即白如玉旦以温漿水洗之宜慎風日
豬蹄湯洗手面令光潤方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

豬蹄一具　桑白皮　芎藭　萎蕤　白芷　白茯苓各三兩　商陸一作當歸　白术各二兩

右八味㕮咀以水三斗煎豬蹄及藥取一斗去滓每温一盞洗手面大佳

豬蹄漿急面皮去老皺主光澤方

大豬蹄一具淨治如食法以水二升清漿水一升不渝釜中煮成膠用洗手面又以此藥和澡豆夜塗面旦用漿水洗面皮即急

鹿角散令百歲老人面如少年時主光澤潔白方

鹿角長握一　牛乳三升　芎藭　細辛　白芷　白术　白斂　天門冬　白芷　白术　白斂　白附子　酥各三兩　杏仁五七枚

右十一味㕮咀先以水漬鹿角一百日出之與諸藥內牛乳中緩火煎令汁盡出角以白練袋盛餘藥勿收至夜取牛乳石上磨鹿角取塗面旦以漿洗之無乳小便研亦得

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治面黑不淨洗手面澡豆方

白豆屑 二升　白附子　甘松香　丁子香

白芷　白殭蠶　鷹屎白　白檀香

白朮　木香 一用菜本　芎藭　白鮮皮 各三兩

大棗　杏仁 各三十枚　麝香 二兩　白梅肉 三七枚

麪 三升　冬瓜仁 五合　豬胞 三具　雞子白 七枚

土瓜根 一兩又一本用甜瓜子

右二十一味先以豬胞和麪曝乾然後合諸藥擣末

欽定四庫全書

又以白豆屑二升為散每旦用盥洗十日色白如雪

三十日如凝脂神驗 千金翼無白殭蠶芎藭白附子大棗有桂心三兩

鉛丹散治面黑令人面白如雪方

鉛丹 三十銖　真女菀 六十銖

右二味治下篩酒服一刀圭日三男十日女二十日知知則止黑色皆從大便出面白如雪

白楊皮散治面與手足黑令光澤潔白方

白楊皮 十八銖一方用桔皮　桃花 一兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:14
列印頁數：463
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白瓜子仁 三十銖
右三味治下篩温酒服方寸匕日三欲白加瓜子欲
赤加桃花三十日面白五十日手足俱白

治面黑生黡皰方

右四味研和雞子白夜卧塗面上旦用井花水洗之

治面黡皰令人悗白方

白斂 十二銖 生礬石 救急方無 白石脂 六銖 杏仁 三銖

右四味研成粉和匀用人乳調每夜取傅面明旦温
漿水洗之

去面上齇子黑痣方

馬珂 二兩 白附子 鷹屎白 珊瑚 各一兩

右四味研成粉和匀用人乳調每夜取傅面明旦温
漿水洗之

治黡黯烏齇令面潔白方

栝蔞子 六合 白石脂 五合 雀屎 二合去黑 麝香

塗黡上日夜三四度平旦温漿水洗之

苗汁和之如薄泥先用澡豆洗去面上垢膩次以藥

右四味擣篩別研麝香雀屎白石脂和合取生菟絲

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夜以温漿水洗面以生布揩靡子令赤痛水研白旋檀取濃汁塗靡子上旦覆以暖漿水洗之次以鷹屎白傅其上

洗面去黑黯主悅白方

豬脬 去脂 兩具
豆麪 升 四
冬瓜仁 升 半
皂莢 挺 五

細辛 兩 各一
白朮 兩 各一
防風
白斂

白芷 兩 各二
商陸 兩 三

右十味和土瓜根一兩擣絹羅取大猪蹄一具煮令爛作汁和散為餅曝乾再擣為末羅取盥洗不過一年悅白

桃仁澡豆主悅澤去黑黯方

桃仁 蕪菁子 一 兩
畢豆麪 二 升
白朮 六 合

土瓜根 七 合

右五味合和擣篩以酢漿水洗手面

桃花圓治面黑黯令人潔白光悅方

桃花 二 升
桂心
鳥喙
甘草 各一 兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:15
列印頁數：465
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右四味為末白蜜丸如大豆許每服十丸日二服十日易形一方有白附子甜瓜子杏仁各二兩為七味

治面黑黯内外兼治方

成鍊松脂為末温酒服三合日三服盡三升無不瘥

治面黑方

李子仁為末和雞子白傅一宿即落

又方甘草二兩末 白羊乳二升 羊脛二具水浸去汁小切

右三味相和一宿先以酢漿洗面生布拭 夜傅藥

兩遍明旦以豬蹄湯洗却每夜洗之

又方白附子為末酒和傅之即落

又方桂心 蜜 石鹽各等分

右三味為末相和

又方以上朱砂研細如粉和白蜜塗之旦以酢漿洗却

大驗

又方白附子 香附子 白檀 馬珂

紫檀各一兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:16
列印頁數：466
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右五味為末白蜜和如杏仁大陰乾臨用以水研塗面旦以温水洗却忌風油七日面色如蓮花

又方水和丹砂末服方寸匕男七日女二七日色白如雪

治人面黑黯黑膚色粗陋皮厚狀醜方

羖羊脛骨為末以雞子白和傅之旦以白淨粱米泔洗之三日白如雪

又方白蜜和茯苓粉傅之七日愈

又方杏仁酒浸皮脫擣碎絹袋盛夜取拭面

又方酒浸雞子三枚密封四七日成傅面白如雪

又方杏仁 末為 雞子白

治面多黑黯皮因粗澁令人不老皆主之方

右二味相和夜塗面明旦以米泔洗之

上胡粉 二兩

朱砂 雄黃 各三兩

水銀霜 半兩

黃鷹糞 一升

右五味並細研如粉以面脂和淨洗面夜塗之以手

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

細摩令熱明旦不廢作壯然須五日一洗面一塗不過三遍所有惡物一切皆除數倍少嫩慎風日不傳

神祕

治面黑黯令悅澤光白潤好及手皴方

猪蹄 兩 具治 如食法 白粱米 一升洗 令淨

右二味以水五斗合煮猪蹄爛取清汁三斗用煮後

藥

白茯苓 商陸 各五 兩 萎蕤 三 兩 白芷

藁本 各二 兩

右五味咬咀用前藥汁三斗并研杏仁一升合煮取一斗五升去滓甕瓶盛貯内甘松零陵香末各一兩入膏中攪令勻綿羃之每夜取塗手面

治面黑黯皴皮皺皴散方

白附子 蜜陀僧 牡蠣 茯苓

芎藭 各二 兩

右五味為末和以羖羊乳夜塗面以手摩之旦用漿

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

水洗不過五六度一重皮脫黑瘢矣

治面黑黯方

沉香 牛黃 薰陸香 雌黃 鷹屎 丁香 玉屑 各二銖十 水銀 六銖

右八味為細末蜜和以傅之

白瓜子圓治面黑黯令色白方

白瓜子 二兩 遠志 藁本 杜蘅 雲母粉 車前子 白芷 當歸 各一兩

細辛 栢子仁 栝蔞仁 橘皮 白石脂 鉛丹 各半兩 天門冬 三兩

右十五味為末蜜和丸如梧子大空腹服二十丸日三

治粉滓黑黯方

白斂 十二銖 白石脂 六銖

右二味擣篩以雞子白和夜卧塗面旦用井花水洗白

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:17
列印頁數：469
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

去粉滓黔黯皴皰及茸毛令面悅澤光潤如十四五時
方
黃耆 白朮 白斂 萎蕤
防風 一兩半 白芷 細辛 青木香
土瓜根 商陸 蜀水花 鷹屎白 一兩
白附子 芎藭 杏仁 各二兩
右十五味為末以雞子白和作挺陰乾石上研取漿
水塗面夜用旦以水洗之細絹羅如粉佳
治面粉滓方
熬礬石以清酒和傅之不過三上
又方濤生菟絲苗汁塗不過三上
治年少氣盛面生疱瘡方
胡粉 半兩 水銀 一兩 有真珠 一方
右二味以臘月豬脂和熟研令水銀消向暝以傅面
旦起布拭之慎勿水洗至暝又取傅面不過三上瘥
白膏治面瘡疱疥癰惡瘡方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

附子 十五枚 蜀椒 一升 野葛 一尺五寸

右三味㕮咀以酢漬一宿猪膏一斤煎令附子色黃去滓塗之日三上

治面皰方

治面瘡方

鷰鵊屎一升為末以臘月猪脂和令勻夜傅之

木蘭皮一斤以三年酢漬令没百日曝乾為末温酒服方寸匕日三

治面皰方

淳酒 二升 牛膽 羖羊膽 各一具

右三味合煮三五沸傅之

又方薺苨 肉桂 各二兩

右二味為末以酢漿服方寸匕日一服亦治黡黯及

滅癜去黑痣

又方冬葵子 栢子仁 冬瓜子 茯苓 各等分

右四味為末酒服方寸匕食後服日三治面皰甚者

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:17
列印頁數：471
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方生地黃三斤　枸杞根一十斤

右二味先擣枸杞次擣地黃曝乾合篩空腹酒服方寸匕日三久服顏如童子此祕方也

梔子圓治酒瘡鼻皰方

梔子仁　豉各三升　芎藭各四兩　甘草各四兩　大黃六兩　木蘭皮半兩

右六味為末蜜和丸如梧桐子初服十丸日三稍加至十五丸

治鼻皰方

蔾藜子　梔子仁　豉各一升　木蘭皮半斤一本無

右四味為末以酢漿水和如泥夜傅之日未出時暖水洗却亦主滅癜痕

治面上風毒方

玉屑　蜜陀僧　珊瑚各二兩　白附子三兩

右四味為末以酥和夜傅旦洗之亦滅除癜痕

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治面有熱毒惡瘡方

胡粉 熬 黃蘗 炙 黃連 各等分

右三味為末取傅上瘥止若瘡乾以面脂調塗之日三

治滅瘢痕方

猪脂三斤飼烏雞一隻三日令盡後取白屎內白芷當歸各一兩煎白芷色黃去滓內鷹屎白半兩攪令調傅之日三

又方禹餘糧半夏等分為末以雞子黃和先以新布拭瘢處令赤後用藥傅之勿見風日二十日瘥十年者亦滅

又以人精和鷹屎白傅之日二白蜜亦得無問新舊必除

又方白附子 杜若 細辛 各半兩 辛夷 一兩

鷹屎白 一合

右五味為末治取傅之亦滅瘢痕

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治瘢痕凸出方

鷹屎白 一兩 衣白魚 二七枚

右二味為末蜜和以傅日三五度良

又方鷹屎白 二兩 白殭蠶 一兩半

右二味為末以白蜜和傅上日三慎五辛生菜

又方春夏以大麥麨秋冬以小麥麨好細絹下篩以酥和封上

又方臘月猪脂四升煎大鼠一枚令消盡以生布揩拭瘢處令赤塗之不過四五上

又方以熱瓦熨之

又方以凍凌熨之


治身及面上印文方

針刺字上破以醋調赤土薄之乾又易以黑滅即止

又方以未滿月小兒屎傅上一月即没

備急千金要方卷二十一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)



欽定四庫全書 子部
備急千金要方卷二十二
三

詳校官太醫院醫士臣舒仪
編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈐
校對官中書臣胡紹基
謄錄監生臣卯繹曾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十二　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

風毒脚氣方

論風毒狀第一　十六章

論曰考諸經方往往有脚弱之論而古人少有此疾自永嘉南渡衣纓士人多有遭者嶺表江東有支法存道人等並留意經方偏善斯術晉朝仕望多獲全濟莫不由此二公又宋齊之間有釋門深師師道人述法存等諸家舊方為三十卷其脚弱一方近百餘首魏周之代蓋無此病所以姚公集驗殊不慇懃徐王撰録未以為意特以三方鼎峙風教未一霜露不均寒暑不等是以關西河北不識此疾自聖唐開闢六合無外南極之地襟帶是重爪牙之寄作鎮於彼不習水土往者皆遭近來中國士大夫雖不涉江表亦有居然而患之者良由今代天下風氣混同物類齊等所致之耳然此病發

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:19
列印頁數：476
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

初得先從脚起因即脛腫時人號為脚氣深師云脚弱者即其義也深師述支法存所用永平山敷施連范祖耀黃素等諸脚弱方凡八十餘條皆是精要然學者尋覽頗覺繁重正是方集耳卒欲救急莫測指南今取其所經用灼然有效者以備倉卒餘者不復具述

論何以得之於脚

問曰風毒中人隨處皆得作病何偏著於脚也答曰夫人有五臟心肺二臟經絡所起在手十指肝腎與脾三臟經絡所起在足十趾夫風毒之氣皆起於地地之寒暑風濕皆作蒸氣足常履之所以風毒之中人也必先中脚从而不瘥遍及四肢腹背頭項也微時不覺痼滯乃知經云次傳間傳是也

論得已便令人覺不

凡脚氣病皆由感風毒所致得此病多不令人即覺會因他病一度乃始發動或奄然大悶經三兩日不起方乃覺之諸小庸醫皆不識此疾謾作餘病治之莫不盡

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

斃故此病多不令人識也始起甚微食飲嬉戲氣力如故惟卒起脚屈弱不能動有此為異耳黃帝云緩風濕痺是也

論風毒相貌

夫有脚未覺異而頭項臂膊已有所苦有諸處皆悉未知而心腹五内已有所困又風毒之中人也或見食嘔吐憎聞食臭或有腹痛下痢或大小便秘澁不通或胸中衝悸不欲見光明或精神惛憒或喜迷妄語言錯亂或壯熱頭痛或身體酷冷疼煩或覺轉筋或腫不腫或腫不隨或復百節攣急或小腹不仁腨腿頑痺或時緩縱不隨或復百節攣急或小腹不仁此皆脚氣狀貌也亦云風毒脚氣之候也其候難知當須細意察之不爾必失其機要一朝病成難可以理婦人亦爾又有婦人產後春夏取涼多中此毒深宜慎之其熱悶掣癎驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也又但覺臍下冷痞幅幅然不快兼小便淋瀝不同生平即是脚氣之候頑弱名緩風疼痛為濕痺

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

論得之所由

凡四時之中皆不得久立久坐濕冷之地亦不得因酒醉汗出脫衣靴韈當風取涼皆成脚氣若暑月久坐久立濕地者則熱濕之氣蒸入經絡病發必熱四肢酸疼煩悶若寒月久坐久立濕冷地者則冷濕之氣上入經絡病發則四體酷冷轉筋若當風取涼得之者病發則皮肉頑痺諸處瞤動漸漸向頭凡常之日忽然暴熱人皆不能忍得者當於此時必不得頓取於寒以快意也卒有暴寒復不得受之皆生病也世有勤功力學之士一心注意于事从坐行立于濕地不時動轉冷風來擊入於經絡不覺成病故風毒中人或先中手足十指因汗毛孔開腠理疏通風如急箭或先中足心或先足趺或先中膝已下腨脛表裏者若欲使人不成病者初覺即灸所覺處二三十壯因此即愈不復發也黃帝云當風取涼醉已入房能成此疾

論冷熱不同

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

問曰何故得者有冷有熱答曰足有三陰三陽寒中三陽所患必冷暑中三陰所患必熱故有表裏冷熱冷熱不同熱者治以冷藥冷者療以熱藥以意消息之脾受陽毒即熱頑腎受陰濕即寒癖

論因脚氣續生諸病

雖患脚氣不妨乳石動發皆須服壓石藥療之夫因患脚氣續生諸病者則以諸藥對之或小便不利則以猪苓茯苓及諸利小便藥治之大便極堅者則以五柔麻仁丸等治之遍體腫滿成水病者則取治水方中諸治水之藥治之餘皆倣此更無拘忌

論須療緩急

凡小覺病候有異即須大怖畏決意急治之傷緩氣上入腹或腫或不腫胷脇逆滿氣上肩息急者死不旋踵寬者數日必死不可不急也但看心下急氣喘不停或自汗數出或乍寒乍熱其脉促短而數嘔吐不止者皆死

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

論虛實可服藥不可服藥

凡脚氣之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致虛而殂故脚氣之人皆不得大補亦不可大瀉終不得畏虛故預止湯不服也如此者皆死不治也

論看病問疾人

世間大有病人親朋故舊交遊來問疾其人曾不經一事未讀一方自騁了了詐作明能談説異端或言是虛或道是實或云是風或云是蠱或道是水或云是痰紛紜謬説種種不同破壞病人心意不知孰是遷延未定時不待人歘然致禍各自散走是故大須好人及好名醫識病深淺探賾方書博覽古今是事明解者看病不爾大誤人事竊悲其如此者衆故一一顯析具述病之由狀令來世病者讀之以自防備也但有一狀相應則須依方急治勿取外人言議自貽憂悔但詳方意人死不難莫信他言以自悞也余嘗為人撰門冬煎此方治脚氣大有驗病者須用之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

論脉候法

凡脚氣雖復診候多塗而三部之脉要須不違四時者為吉其逆四時者勿治餘如脉經所說此中不復具載

其人本黑瘦者易治肥大肉厚赤白者難愈黑人耐風濕赤白不耐風瘦人肉硬肥人肉軟肉軟則受疾至深難愈也

論腫不腫

凡人久患脚氣不自知別於後因有他病發動治之得瘥後直患嘔吐而復脚弱余為診之乃告為脚氣病者曰某平生不患脚腫何因名為脚氣不肯服湯餘醫以為石發狐疑之間不過一旬而死故脚氣不得一向以腫為候亦有腫者有不腫者其以小腹頑痺不仁者脚多不腫小腹頑後不過三五日即令人嘔吐者名脚氣入心如此者死在旦夕凡患脚氣到心難治以其腎水剋心火故也

論須慎不慎

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凡脚氣之病極須慎房室羊肉牛肉魚蒜蕺菜菘菜蔓菁瓠子酒麪酥油乳糜猪雞鵝鴨有方用鯉魚頭此等並切禁不得犯之并忌大怒惟得食粳粱粟米醬豉葱韭薤椒薑橘皮又不得食諸生果子酸酢之食犯者皆不可瘥又大宜生牛乳生栗子

論差能治者幾日可瘥

凡脚氣病枉死者衆畧而言之有三種一覺之傷晚二驕狠恣傲三狐疑不決此三種正當枉死之色故世間

誠無良醫雖有良醫而病人有性靈堪受入者更復尠少故雖有騏驥而不遇伯樂雖有尼父而人莫之師其為枉橫亦猶此也今有病者有受入性依法使余治之不過十日可得永瘥矣若無受入性者亦不須為治縱令治之恐無瘥日也非但脚氣諸病皆然良藥善觸目可致不可使人必服法為信者施不為疑者說

論灸法

凡脚氣初得脚弱使速灸之并服竹瀝湯灸訖可服八

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

風散無不瘥者惟急速治之若人但灸而不能服散服散而不灸如此者半瘥半死雖得瘥者或至一二年復更發動覺得便依此法速灸之及服散者治十十愈此病輕者登時雖不即惡治之不當根源不除久久期於殺人不可不精以為意

初灸風市　次灸伏兎　次灸犢鼻　次灸膝兩眼直下舒十指掩著兩髀便點當手中央指頭髀大筋上凡灸八處第一風市穴可令病人起正身平立垂兩臂次灸三里　次灸上廉　次灸下廉　次灸絶骨是灸之百壯多亦任人輕者不可減百壯重者乃至一處五六百壯勿令頓灸三報之佳第二伏兎穴令病人累夫端坐以病人手夫掩横膝上夫下傍與曲膝頭齊上傍側夫際當中央是灸百壯亦可五十壯第三犢鼻穴在膝頭葢骨上際外骨邊平處以手按之得節解則是一云在膝頭下近外三骨箕踵中動脚以手按之得窟解是灸之五十壯可至百壯第四膝眼穴在膝頭骨

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:23
列印頁數：484
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下兩傍陷者宛宛中是第五三里穴在膝頭骨節下一夫附脛骨外是一云在膝頭骨節下三寸人長短大小當以病人手夫度取灸之百壯第六上廉穴在三里下一夫亦附脛骨外是灸之百壯第七下廉穴在上廉下一夫一云附脛骨外是灸之百壯第八絶骨穴在脚外踝上一夫亦云四寸是凡此諸穴灸不必一頓灸盡壯數可日日報灸之三日之中灸令盡壯數為佳凡病一脚則灸一脚病兩脚則灸兩脚凡脚弱病皆多兩脚又一方云如覺脚惡便灸三里及絶骨各一處兩脚惡者合四處灸之多少隨病輕重大要雖輕不可減百壯不瘥速以次灸之多多益佳一說灸絶骨最要人有患此脚弱不即治及入腹腹腫大上氣于是乃須大法灸隨諸輸及諸管關節腹背盡灸之并服八風散徃徃得瘥者諸管輸節解法並在別卷中覺病入腹若病人不堪痛不能盡作大灸但灸胸心腹諸穴及兩脚諸穴亦有得好瘥者凡量一夫之法覆手并舒四指對度四指上

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:23
列印頁數：485
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中節上橫過為一夫有兩種有三指為一夫者此脚弱灸以四指為一夫也亦依支法存舊法梁丘犢鼻三里上廉下廉解谿太衝陽陵泉絶骨崑崙陰陵泉三陰交足太陰伏溜然谷涌泉承山束骨等凡一十八穴舊法多灸百會風府五臟六腑輸募頃來灸者悉覺引氣向上所以不取其法氣不止者可用之其要病已成恐不救者悉須灸之其足十趾去指奇一分兩足凡八穴曹氏名曰八衝極下氣有效其足十趾端名曰氣端日灸三壯並大神要其八衝可日灸七壯氣下即止病者非深相委悉慎勿為人灸之慎之慎之凡灸八衝須小作艾炷

論服湯藥色目

風毒之氣入人體中脉有三品内外證候相似但脉有異耳若脉浮大而緩宜服續命湯兩劑應瘥若風盛宜作越婢湯加白朮四兩若脉浮大緊轉駃宜作竹瀝湯若病人脉微而弱宜服風引湯此人脉多是因虛而得

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

之若大虛短氣力乏可以間作補湯隨病冷熱而用之若未愈更服竹瀝湯若病人脉浮大而緊駃此是三品之中最惡脉也或沉細而駃者此脉正與浮大而緊者同是惡脉浮大者病在外沉細者病在内治亦不異當消息以意耳其形尚可而手脚未容至弱數日之中氣上即便命終如此之脉往往有人得之無一存者急服竹瀝湯日服一劑切要湯勢常令相及勿令半日之中空無湯也此湯竹汁多服之若不極熱輒停在胸心更已服三劑竹瀝湯病及脉勢未折而苦脹滿可以大鑿為人患每服當使極熱若服竹瀝湯得下者必佳也若甲湯下之湯勢盡而不得下可以圓藥助湯令下下後更服竹瀝湯趣令脉勢折氣息料理便停服三十二物八風散佳凡初得病便摩野葛膏日再頑痺脚弱都愈乃止若服竹瀝湯脉勢折如未病時氣力轉勝脚故未能行體力充足然後漸微行步病重者瘥後半年始能扶人行耳既覺脉及體内瘥但當勤服八風散勿以脚

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

未能行輕加餘治餘治未必全得益更生諸惡失此諸
治也猥人邊亦勿行野葛膏有人聞竹瀝湯云恐傷腰
脚者即勿與治宜知此法此皆人無受入性不可與醫
故也不為疑者說此之謂也竹瀝湯有三首輕者服前
方重者以次第服後方此風毒乃相注易病人宜將空
缺服小金牙散以少許塗鼻孔耳門病困人及新亡人
喜易人强健人宜將服之亦以塗耳鼻乃可臨近亡人
及視疾者絳囊帶一方寸匕男左女右臂上此散毒服
宜從少為始金牙散方見別卷病人惟宜飲赤小豆飲
冬服側子金牙酒續命湯治風毒病初得似時行毒病
而脉浮緩終不變駃此不治或數日而死或十日而死
或得便不識人或發黃或發斑或目赤或下部穿爛者
此最急得之即先服續命湯一劑須服葛根湯麻黃湯
下之若故不折更與續命湯兩三劑必瘥此病大急常
令湯勢相接不可使半日闕湯即便殺人續命湯方見
別卷

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十三　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

風毒脚氣方

湯液第二　方　裒脚方附

第一竹瀝湯治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腹脹起如腫按之不陷心中惡不欲食或患冷方

竹瀝　升五　甘草　秦艽　葛根

桂心　乾薑　各一兩　防風　升麻　各一兩半　防己　細辛

黄芩　麻黄

茯苓　三兩　附子　二枚　杏仁　五十枚

右十五味㕮咀以水七升合竹瀝煮取三升分三服

取汗　千金翼方無茯苓杏仁有白朮一兩

第二大竹瀝湯治卒中風口噤不能言四肢緩縱偏痺攣急風經五臟恍惚悲怒無常手足不隨方

竹瀝　一斗四升　獨活　芍藥　防風

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

茵芋　甘草
細辛　黄芩
防己　人參
生薑　茯苓　各三兩
烏頭　一枚
石膏　麻黄　各一兩
芎藭　桂心　各二兩
白朮　葛根

右十九味㕮咀以竹瀝煮取四升分六服先未汗者取汗一狀相當即服

第三竹瀝湯治風毒入人五内短氣心下煩熱手足煩疼四肢不舉皮肉不仁口噤不能語方

竹瀝　一斗九升
防風
茯苓　秦艽　各三兩
當歸　黄芩　千金翼作芍藥
人參　芎藭　千金翼作防己
甘草　升麻　千金翼作通草
細辛　桂心
麻黄　白朮　各二兩
葛根　五兩
生薑　八兩

右十八味㕮咀以竹瀝煮取四升分五服初得病即須摩膏日再瘥定止　千金翼無麻黄蜀椒生薑

麻黄湯治惡風毒氣脚弱無力頑瘁四肢不仁失音不

附子　二枚
蜀椒　一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

能言毒氣衝心有人病者但一病相當即服此第一服
次服第二第三第四方
麻黃一兩 大棗二十枚 茯苓三兩 杏仁三十枚
防風 白朮 當歸 升麻
苓藭 芍藥 黃芩 桂心
麥門冬甘草各二兩
分四服日三夜一覆令小汗粉之莫令見風
右十四味㕮咀以水九升清酒二升合煮取二升半
第二服獨活湯方
獨活四兩 乾地黃三兩 生薑五兩 葛根
桂心 甘草 芍藥 麻黃各二兩
右八味㕮咀以水八升清酒二升合煎取二升半分
四服日三夜一脚弱特忌食菰子蕺菜犯之一世治
不愈
第三服兼補厚朴湯并治諸氣咳嗽逆氣嘔吐方
厚朴 芍藥 桂心 乾地黃

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:26
列印頁數：492
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芍藥 當歸 人參 各二兩 黃耆 甘草 各三兩 吳茱萸 二升 半夏 七兩 生薑 一斤 人參 四兩 獨活 茯苓 甘草 各三兩 升麻 一兩半 桂心 防風 芍藥 當歸 黃耆 乾薑 附子 各二兩 大豆 二升

右十二味咬咀以水二斗煮猪蹄一具取汁一斗二升去上肥内清酒三升合煮取三升分四服相去如人行二十里久更進服

第四服風引獨活湯兼補方

人行二十里久

右十三味咬咀以水九升清酒三升合煮取三升半分四服相去如人行二十里久更進服

防風湯治脚癖并治毒氣上衝心胷嘔逆宿癖積氣疝氣一病相當即服之方

芍藥 當歸 防風 麻黃 芎藭 人參 茯苓 半夏

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甘草 橘皮 各一兩 鼈甲 生薑
桂心 各二兩 杏仁 一兩半 赤小豆 一升 貝子
烏梅 各五兩 大棗 二十枚 吳茱萸 五合 犀角
羚羊角 各半兩 薤白 十四枚

右二十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服一日
令盡一方用水一斗二升間食糜一方半夏三兩隨
時用

獨活湯治脚痺方

獨活 四兩 當歸 防風 茯苓
芍藥 黃耆 葛根 人參
甘草 二兩 各 大豆 二升 附子 一枚 乾薑 三兩

右十二味㕮咀以水一斗清酒二升合煮取三升分
三服

越婢湯治風痺脚弱方

麻黃 六兩 石膏 半升 白朮 四兩 大附子 一枚
生薑 三兩 甘草 二兩 大棗 十五枚

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右七味㕮咀以水七升先煮麻黃再沸掠去沫入諸藥煮取三升分三服覆取汗（胡洽方只五味若惡風者加附子一枚多淡水者加白术四兩）

治脚弱神驗方

防己　蜀椒　細辛　桂心　麻黃　石膏　獨活　防風　黃芩　茵芋　葛根　芎藭　芍藥　甘草（各一兩）　生薑　茯苓（各三兩）　烏頭（二枚）

右十七味㕮咀以竹瀝一斗煮取四升分六服令一日一夜服盡其間可常作赤小豆飲有人脚弱先服常用竹瀝湯四劑未覺增損作此方後覺得力又云脉沉細駃風在内者作此湯也

風引湯治兩脚疼痺腫或不仁拘急不得行方

麻黃　石膏　獨活　茯苓（各二兩）　吳茱萸　附子　秦艽　細辛

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:27
列印頁數：495
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桂心 人參 防風 芎藭

防己 甘草 各一兩 乾薑 一兩半 白朮 三兩

杏仁 六十枚

右十七味㕮咀以水一斗六升煮取三升分三服取汗

大鼈甲湯治脚弱風毒攣痺氣上及傷寒惡風溫毒山水瘴氣熱毒四肢痺弱方

鼈甲 二兩 防風 麻黃 白朮

石膏 知母 升麻 茯苓

橘皮 芎藭 杏仁 人參

半夏 當歸 芍藥 萎蕤

甘草 麥門冬 各一兩 羚羊角 六銖 大黃 一兩半

犀角 青木香 雄黃 各半兩 大棗 十枚

貝齒 烏頭 七枚 生薑 三兩 薤白 十四枚

麝香 三銖 小赤豆 三合 吳茱萸 五合

右三十一味㕮咀以水二斗煮取四升分六服相去

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

十里久得下止一方用大黃半兩畏下可止用六銖

一方用羚羊角半兩毒盛可用十八銖 胡洽有山茱萸半升為三

十二味千金翼無知母升麻橘皮芎藭人參當歸萎蕤

小鼈甲湯治身體虛脹如微腫胷心痞滿有氣壯熱小腹厚重兩脚弱方

鼈甲 黃芩 羚羊角 桂心 烏梅 二十枚 薤白 三十枚

升麻 麻黃 杏仁 各三兩 前胡 四兩

通食即嘔吐方

半夏 一升 大棗 烏梅 二十枚 桂心

風緩湯治脚弱舉體癉不仁熱毒氣入臟胷中滿塞不用若體强壯欲須利者加大黃二兩

鼈甲 升麻 枳實

甘草 吳茱萸 大黃 各一兩 生薑

石膏 各六兩 貝齒 七枚 獨活 麻黃

右十味�mouth以水一斗煮取二升七合分三服此常

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:28
列印頁數：497
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

犀角 各三兩一方用羚羊角

右十七味㕮咀以水一斗四升煮取四升分五服日不分出

三夜二不瘥至三劑必瘥

治脚氣初發從足起至膝脛骨腫疼者方

取蜱麻葉切擣蒸薄裹之日二三易即消蜱麻子似牛蜱蟲故名蜱麻也若冬月無蜱麻取蒴藋根擣碎和酒糟三分根一分合蒸熱及熱封裹腫上如前法日二即消亦治不仁頑痺 此方非湯不當見此然以前後三方俱出蘇長史更一分牛乳合煮乳浮結乃服之

若腫已入腨至小便瀝少者方

取烏特牛尿一升二服日二取消乃止 千金翼云贏瘦人二分尿

若腫已消仍有此候者急服此湯方 蘇長史方神驗

麻黄 射干 人參 茯苓

犀角 防已 前胡 枳實 各二兩 半夏

犀角 羚羊角 青木香 橘皮

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:28
列印頁數：498
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杏仁 升麻 兩各一
吳茱萸 升一
生薑 兩五
獨活 兩三
右十七味㕮咀以水一斗二升煮取四升分五服相去二十里久中間進少粥以助胃氣此湯兩日服一劑取病氣退乃止以意消息之若熱盛喘煩者加石膏六兩生麥門冬一升去吳茱萸若心下堅加鼈甲一兩
夫脚氣之疼先起嶺南稍來江東得之無漸或微覺疼瘴或兩脛腫滿或行起澀弱或上入腹不仁或時冷熱小便秘澀喘息氣衝喉氣急欲死食嘔不下氣上逆者皆其候也若覺此證先與犀角旋復花湯方
犀角 旋復花 兩各二
生薑 兩各三
橘皮
大棗 枚七
茯苓
香豉 升一
紫蘇莖葉 握一
右八味㕮咀以水八升煮取二升七合分三服相去十里久服之以氣下小便利為度 崔氏云小犀角湯如其不下服後大

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:29
列印頁數：499
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

犀角湯

大犀角湯療脚氣毒衝心變成水身體遍腫悶絶欲死方

犀角　旋復花　白朮　桂心　防己　黄芩　生薑　橘皮　茯苓各二兩　香豉一升　大棗十枚　紫蘇莖葉一握　桑白皮　前胡各四兩

右十四味㕮咀以水九升煮取二升七合分三服相去十里久取下氣為度若得氣下小便利脚腫即消

能食若服湯竟不下氣急不定仍服後犀角麻黄湯

崔氏又以白前代白朮無防己黄芩桑白皮名旋復花湯

犀角麻黄湯方

犀角　麻黄　防風　獨活崔氏用茯苓　防己　芎藭　白朮　當歸　生薑　甘草　羚羊角崔氏用附子各二兩　黄芩　石膏四兩　杏仁崔氏用細辛各三兩　桂心各三兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:29
列印頁數：500
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十五味㕮咀以水二斗煮麻黃去沫取汁八升下藥煎取三升分三服相去十里久服訖覆取汗若不瘥五日後更一劑取汗同前

萊菔湯治脚氣入腹困悶欲死腹脹方 蘇長史方

吳萊菔六升 木瓜兩顆切

右二味以水一斗三升煮取三升分三服相去如人行十里久進一服或吐或汗或利或大熱悶即瘥此起死回生方

小風引湯治中風腰脚疼痛弱者方 胡洽名大風引湯

獨活 茯苓 各三兩 人參 防風

當歸 甘草 乾薑 胡洽作桂心 各二兩 石斛 胡洽作黃耆 各二兩 附子一枚 大豆二升

右十味㕮咀以水九升酒三升煮取三升分四服服畢相去如人行十里久 胡洽云南方治脚弱與此別用升麻一兩半夏芍藥各二兩合十三味本只有十味減當歸石斛名小風引湯刪繁一方無石斛以療肉極寒肌肉變古瘓名曰惡風腰病脚弱

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

四物附子湯治風濕相薄骨節煩痛四肢拘急不可屈伸近之則痛自汗出而短氣小便不利惡風不欲去衣或頭面手足時時浮腫方

附子 二枚 桂心 四兩 白朮 三兩 甘草 二兩

右四味㕮咀以水六升煮取三升分三服微汗愈大汗煩者一服五合體腫者加防己四兩悸氣小便不利加茯苓三兩既有附子今加生薑三兩

治脚弱風毒實及嶺南瘴氣而腫乍寒乍熱似瘧狀脚腫氣上心悶咳嗽癱緩頑痺方

麻仁 升 麻黃 射干

葛蒲 芒硝 甘草 大黃 各半兩

豉 三合

右九味㕮咀以水六升煮取二升半內芒硝又煎三沸分三服微利一二行解毒熱有腫滓薄之凡覺氣道人深師增損腎瀝湯治風虛勞損挾毒脚弱疼痺或滿輒服一劑佳

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不隨下焦虛冷胷中微有客熱心虛驚悸不得眠食少失氣味日夜數過心煩迫不得卧小便不利又時復下湘東王至江州王在嶺南病悉如此極困篤余作此湯令服即得力病似此者服無不瘥隨宜增損之方

黄耆　甘草　芍藥　麥門冬　人參　肉蓯蓉　乾地黄　赤石脂　茯神　地骨白皮　當歸　遠志　磁石　枳實　防風　龍骨　各一兩

桂心　芎藭　各二兩　生薑　四兩　五味子　三合　半夏　一升　大棗　三十枚　白羊腎　一具

右二十三味㕮咀以水二斗煮羊腎取汁一斗二升内諸藥煮取四升分為五服不利下者除龍骨赤石脂小便澁以赤茯苓代茯神加白术三兩多熱加黄芩一兩遺溺加桑螵蛸二十枚　胡洽方無黄耆蓯蓉赤石脂地骨皮磁石枳實防風龍骨半夏有黄芩為十五味

石膏湯治脚氣風毒熱氣上衝頭面面赤矜急鼻塞去

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

來無時令人昏憒心胷恍惚或若驚悸身體戰掉手足
緩縱或酸痺頭目眩重眼反鼻辛熱氣出口中或患味
甜諸惡不可名狀者方

石膏 龍膽 升麻 芍藥 各二兩

貝齒 甘草 鼈甲 黄芩 當歸 各二兩

羚羊角 各一兩 橘皮 一升

右十一味咬咀以水八升煮取三升分為三服

半夏湯治脚氣上入腹腹急上衝胷氣急欲絶方

半夏 一升 桂心 八兩 乾薑 五兩 甘草 人參 細辛 附子 各二兩 蜀椒 二合

右八味咬咀以水一斗煮取三升分三服初稍稍進
恐氣衝上格塞不得下小小服通人氣耳

烏頭湯治風冷脚痺疼痛攣弱不可屈伸方

烏頭 細辛 蜀椒 各一兩 甘草 秦艽 附子 各二兩 桂心 芍藥 各二兩 乾薑 茯苓 防風 當歸 各三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

獨活 四兩
大棗 二十枚
右十四味㕮咀以水一斗二升煮取四升分五服若
熱毒多服益佳
詐毒湯治脚弱風熱上入心腹煩悶欲絶方
半夏 生薑 各四兩
黄耆 甘草
當歸 人參 厚朴 獨活
橘皮 各一兩 枳實 麻黄 乾地黄
芍藥 各二兩 桂心 三兩 貝子 七枚 大棗 二十枚
右十六味㕮咀以水一斗二升煮取三升六合分四
服日三夜一
風緩湯治脚弱體瘅不仁毒氣上入藏胷中滿塞不通
食輒吐失味方
獨活 甘草 石膏 各三兩 羚羊角
犀角 各半兩 麻黄 防風 當歸
升麻 橘皮 吳茱萸 桂心
半夏 鼈甲 各二兩 枳實 一兩 生薑 六兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大棗 二十枚 貝齒 七枚 烏頭 二兩一作烏梅七枚

右十九味㕮咀以水一斗四升煮取四升一服一升

若有少虛熱者加乾地黃二兩

紫蘇子湯治脚弱上氣昔宋湘東王在南州患脚氣困篤服此湯大得力方

紫蘇子 半夏 各一升 前胡 厚朴 各一兩 橘皮 三兩 大棗 二十枚 生薑 一斤 桂心 四兩 甘草 當歸 各一兩

右十味㕮咀以水一斗三升煮取三升半分為五服日三夜二

附子湯治濕痺緩風身體疼痛如欲折肉如錐刺刀割方

附子 三枚 芍藥 桂心 甘草 茯苓 人參 各三兩 白朮 四兩

右七味㕮咀以水八升煮取三升分三服

防風湯治肢體虛風微瘡發熱肢節不隨恍惚狂言來

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

去無時不自覺悟南方支法存所用多得力温和不損人為勝於續命越婢風引等湯羅廣州一門南州士人常用亦治脚弱甚良方

防風　麻黄　秦艽　獨活　生薑　半夏各二兩　當歸　遠志　甘草　防己　人參　黄芩　升麻　芍藥各一兩　石膏半兩　麝香六銖

一方用白术一兩

右十六味㕮咀以水一斗三升煮取四升一服一升初服厚覆取微汗亦當兩三行下其間相去如人行十里久更服有熱加大黄二兩先有冷心痛疾者倍用當歸加桂心三兩不用大黄

甘草湯治脚弱舉身洪腫胃反食穀吐逆胷中氣結不安而寒熱下痢不止小便難服此湯即益亦服女麴散利小便腫消服大散摩膏有驗方

甘草　人參各一兩　半夏一升　桂心

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蜀椒 各三兩
小麥 八合
吳茱萸 二升
大棗 二十枚
生薑 八兩

右九味㕮咀以水一斗三升煮小麥取一斗去小麥內諸藥煮取三升分為六服 女麴散見別卷

恒山甘草湯若寒熱日再三發可服此方

恒山 三兩
甘草 一兩半

右二味㕮咀以水四升煮取一升半分三服相去五里久一服

丹參牛膝煮散治脚癉弱氣滿身微腫方

丹參 牛膝 桑白皮 杏仁 升麻 猪苓 各四兩 犀角 黃芩 橘皮 防己 白前 澤瀉 桂心 秦艽 各三兩 李根白皮 生薑 各二兩 大麻仁 一升 右十八味擣麤篩以水一升半內散方寸匕煮取七合輕絹濾去滓頓服日再夏月熱不得服圓散此煮

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:32
列印頁數：508
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

散頃年常用大驗
治腰胳不隨兩脚攣腫方
蜀椒四升以水四斗煮取二斗半甕盛下著火暖之
懸板為橋去湯二寸許以脚蹋板拄脚坐以綿絮密
甕常令甕下火不絶勿使湯冷如此消息不過七日
塞勿令泄氣若疲即出入被以粉摩之一食久更入
得伸展并腫亦消

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:33
列印頁數：509
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷二十四 五

詳校官太醫院醫士臣許伋

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣胡紹基

謄録監生臣卯繹曾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十四 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

風毒脚氣方

諸散第三 方

例曰大法春秋宜服散

八風散治風虛面青黑土色不見日月光脚氣痺弱準

紅面青黑主腎不見日月光主肝宜補腎治肝方

菊花 兩三 石斛 附子 甘草 各一兩六銖 鍾乳 天雄 各一兩半 人參 續斷 黄耆 遠志 細辛 石韋 蒐絲子 牛膝 蛇牀子 防風 杜仲 茯苓 萆薢 山茱萸 各一兩 五味子 烏頭 各半兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蒞蓉 二兩
右三十三味治下篩酒服方寸匕日三不效加至二匕
大八風散治諸緩風濕痺脚弱方
巴戟天 黄耆 桂心 細辛
天雄 蕘蘑 蒞蓉 牡荆子
薯蕷 菊花 萎蕤 山茱萸
秦艽 黄芩 石斛 白朮
石斛 龍膽 人參
礬石 一作礬石 厚朴 附子 各半兩 蜀椒 三十粒
茯苓 牛膝 千金翼作乾薑 烏喙 遠志 各一兩
右三十二味治下篩酒服半寸匕日三未驗稍增令
桔梗 三十粒 芎藭 白斂 芍藥 各六銖
微覺 胡洽無桔梗
内補石斛秦艽散治風虛脚弱手足拘攣疼痺不能行
脚趺腫上膝小腹堅如繩約氣息常如憂恚不能食飲

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

者皆由五勞七傷腎氣不足受風濕故也此方悉主之

石斛　附子　天雄　桂心

獨活　天門冬 各一兩　秦艽　烏頭

人參　乾薑　當歸　防風

細辛　麻黃　前胡　五味子 各十八銖

蜀椒　白芷　白术 各半兩　茯苓　桔梗

杜仲 各三十銖　山茱萸

右二十三味治下篩酒服方寸匕日再服不知稍增至二匕虚人三建皆炮實人亦可生用風氣者本因腎虚既得病後毒氣外滿則灸洩其氣内滿則藥馳之當其救急理必如此至于風消退四體虚弱餘毒未除不可便止宜服此散推陳致新極為良妙此既人情可解無可疑焉

秦艽散治風無久新卒得不知人四肢不仁一身盡痛偏枯不隨不能屈伸洒洒寒熱頭目眩倒或口面喎僻

方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

秦艽　乾薑　桔梗　附子　各一兩
天雄　當歸　天門冬　人參
白朮　蜀椒　各十銖　烏頭　各十八銖　細辛
甘草　白芷　山茱萸　麻黃
前胡　防風　五味　各半兩

右十九味治下篩酒服方寸匕日三若老人少服之

胡洽無天門冬前胡有莽草桂心防己莽藨白斂黃耆為二十三味

單服松脂治一切風及大風腳弱風癉方薰陸法亦同

松脂三十斤以櫟皮袋盛繫頭鐺底布竹木置袋於上以石三五顆壓之下水于鐺中令滿煮之膏浮出得盡以後量更二十沸接置于冷水中易袋洗鍋更煮如此九遍藥成擣篩為散以麤羅下之用酒服一方寸匕日二初和藥以冷酒藥入腹後飲熱酒行藥以知為度如覺熱即減不減令人大小便秘澀若澀宜食蔥羹仍自不通宜服生地黃汁微取泄利除忌大麻子以外無所禁若欲斷米加茯苓與松脂等分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蜜和為圓但食淡麪餬飣日兩度食一食一小椀勿多食也作餬飣法硬和麪熟挼煮五十沸漉出冷水淘更置湯中煮十餘沸然後漉出食之服松脂三十日後即覺有驗兩脚似有水流下是效如恐秘澀和一斤松脂茯苓與棗栗許大酥即不澀服經一百日後脚氣當愈仙經曰服松脂一年增壽一年服二年增壽二年則增壽十年

淮南八公石斛萬病散治風濕疼腰脚不隨方

防風　茯苓　菊花　細辛
蜀椒　乾薑　雲母　蔆蓉
人參　乾地黃　附子　石斛
杜仲　遠志　菟絲子　天雄
蓽蘇　桂心　牛膝　蛇牀子
白朮　薯蕷　巴戟　蒿蒲
續斷　山茱萸　各一兩　五味子　半兩

右二十七味治下篩酒服方寸匕日再

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

萊萸散治冷風脚跛偏枯半身不隨晝夜呻吟醫所不治

吳茱萸　乾薑

白斂　牡荆　千金翼作牡桂

附子　天雄

狗脊　乾漆

薯蕷　秦艽

防風　各半兩

右十一味治下篩先食服方寸匕日三藥入肌膚中

溓溓然三日知一月瘥

酒醴第四　方例

例曰凡合酒皆薄切藥以絹袋盛藥内酒中密封頭春夏四五日秋冬七八日皆以味足為度去滓服酒盡後其滓擣酒服方寸匕日三大法冬宜服酒至立春宜停石斛酒治風虛氣滿脚疼癖攣弱不能行方

石斛　丹參

五加皮　各五兩

側子

山茱萸　牛膝　各四兩

秦艽　杜仲

桂心　乾薑

羌活　芎藭

橘皮　黄耆

白前　蜀椒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

茵芋 當歸 各三兩 薏苡仁 一升 防風 二兩 鍾乳 八兩搗碎別絹袋盛繫大藥袋內

右二十一味咬咀以清酒四斗漬三日初服三合日再稍稍加以知為度

烏麻酒方

烏麻五升微熬擣碎以酒一斗漬一宿隨所能飲之盡更作甚良

鍾乳酒治風虛勞損脚疼冷痺羸瘦攣弱不能行方

鍾乳 八兩 丹參 六兩 天門冬 五兩 牛膝 各三兩 乾薑 各三兩 秦艽 各三兩 芎藭 各四兩 當歸 各四兩 附子 桂心 山茱萸 薏苡仁 各一升 防風 黃耆 石斛 杜仲

右十六味咬咀以清酒三斗漬之三日初服三合日再後稍加之以知為度

枸杞葛蒲酒治緩急風四肢不隨行步不正口急及四體不得屈伸方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

葛蒲 五斤　枸杞根 一伯斤

右二味細剉以水四石煮取一石六斗去滓釀二斛米酒熟稍稍飲之

虎骨酒治骨髓疼痛風經五臟方

虎骨一具炭火炙令黃色槌刮取碎擣研得數日清酒六升浸五宿隨性多少稍飲之易云虎嘯風生龍吟雲起此亦有情與無情相感治風之效故亦無疑

蓼酒治胃管冷不能飲食耳目不聰明四肢有氣冬卧脚冷服此酒十日後目既精明體又充壯方

八月三日取蓼曝燥把之如五升大六十把水六石煮取一石去滓以釀酒如常法隨多少飲之已用訖效甚速

小黃耆酒大治風虛痰癖四肢偏枯兩脚弱手不能上頭或小腹縮痛脇下攣急心下有伏水脇下有積飲夜喜夢悲愁不樂恍惚善忘此由風虛五臟受邪所致或久坐腰痛耳聾卒起眼眩頭重或舉體流腫疼痺飲食惡

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

冷濇濇惡寒胷中痰滿心下寒疝藥皆主之及婦人產後餘疾風虛積冷不除者方

黃耆 附子 蜀椒 防風

牛膝 細辛 桂心 獨活

白朮 芎藭 甘草 各三兩 秦艽

烏頭 集驗用薯蕷三兩 乾薑 山茱萸 各二兩 當歸 二兩半 大黃 葛根

右十八味咬咀少壯人無所熬練虛老人微熬之以絹袋中盛清酒二斗漬之春夏五日秋冬七日可先食服一合不知可至四五合日三服此藥攻痺甚佳亦不令人吐悶小熱宜冷飲食大虛加蒐蘿二兩下利加女菱三兩多忘加石斛菖蒲紫石各二兩心下多水者加茯苓人參各二兩薯蕷三兩酒盡可更以酒二斗重漬滓服之不爾可曝滓擣下酒服方寸匕不知稍增之服一劑得力令人耐寒冷補虛治諸風冷神良

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:37
列印頁數：519
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃耆酒治風虛脚疼瘓弱氣悶不自收攝兼補方

黃耆 烏頭 秦艽 蜀椒 白朮 牛膝 山茱萸 桂心 甘草 各三兩 葛根 當歸 石南 各一兩 天雄 石斛 防風 各二兩 鍾乳 栢子仁 芎藭 獨活 薤蓉 細辛 各二兩半 葛蒲 大黃

右二十五味㕮咀無所熬練清酒三斗漬之先食服一合不知可至五合日三以攻痺為佳大虛加薤蓉下利加女萎多忘加菖蒲各三兩 胡洽有澤瀉三兩 茯苓二兩 人參茵芋半夏括蔞芍藥各一兩 無秦艽芎藭牛膝薤蓉甘草葛根當歸菖蒲鍾乳大黃為二十二味名大黃耆湯

茵芋酒治大風頭眩重目瞀無所見或仆地氣絶半日乃蘇口喎噤不開半身偏死拘急痺痛不能動搖歷節腫痛骨中酸疼手不得上頭足不得屈伸不能躡履行

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欲傾跛皮中動搖搖如有蟲啄軫癢搔之生瘡甚者狂走有此諸病藥皆主之方

茵蕳　烏頭　石南　防風

蜀椒　女萎　附子　細辛

獨活　卷栢　桂心　天雄

秦艽　防已　各一兩　躑躅　二兩

右十五味㕮咀少壯人無所熬練虛老人薄炙之清酒二斗漬之冬七日夏三日春秋五日初服一合不知加至二合寧從少起日再以微痺為度　胡洽無蜀椒獨活卷

栢為十二味

大金牙酒治瘴癘毒氣中人風冷濕痺口喎面戾半身不遂手足拘攣歷節腫痛甚者小腹不仁名曰脚氣無所不治方

金牙　一斤　側子　附子　天雄

人參　蒞蓉　茯苓　當歸

防風　黃耆　薯蕷　細辛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桂心　蓽薢
桔梗　黄芩
莒蕫　地骨皮
厚朴　枳實
丹參 兩各三　獨活 斤半
狗脊 兩各二　磁石 兩十
生石斛 兩八　蒴藋 兩四
生地黄 升切二　麥門冬 升各一
薏苡仁　茵芋
白术　牛膝
遠志　牡荆子
五加皮　杜仲

右三十九味咬咀以酒八斗漬七日温服一合日四

五夜一石藥細研別絹袋盛共藥同漬藥力和善主

治極多凡是風虚四體小覺有風痾者皆須將服之

無所不治也服者一依方修合不得輒信人大言浪

有加減

鍾乳酒治虚損通順血脉極補下氣方

鍾乳　石斛
蒐蓉 兩各五　附子
甘菊 兩各二

右五味咬咀以清酒三斗漬服二合日再稍增至一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

升

秦艽酒治四肢風手臂不收髀脚疼弱或有拘急攣縮

屈指偏枯癈躄痹小不仁頑痺者悉主之方

秦艽　天門冬　五加皮　牛膝

附子　桂心　各三兩　巴戟天　杜仲

石南　細辛　各二兩　獨活　一兩　薏苡仁　一兩

右十二味㕮咀以酒二斗漬之得氣味可服三合漸加至五六合日三夜一

術膏酒治脚弱風虛五勞七傷萬病皆主之方

生白朮淨洗一石五斗　擣取汁三斗煎取半

濕荊二十五束束別三尺圍各長二尺五寸徑頭二寸　燒取瀝三斗煎取半

青竹三十束束別三尺圍各長二尺五寸徑一寸

生地黄根五大斗麤大者　擣取汁三斗煎取半

生五加根　三十六斤石煎之去滓澄清取汁七斗以銅器中淨洗訖對于大釜内以水四

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

盛大釜内水上煎之取汁三斗
五升其煎諸藥法一準五加例

右件白朮等五種藥總計得汁九斗五升好糯米一石五斗上小麥麴八斤曝乾為末以藥汁六斗浸麴五日待麴起第一投淨淘米七斗令得三十遍下米置淨席上以生布拭之勿令不淨然後炊之下饋以餘藥汁浸饋調强弱更蒸之待饋上痂生然後下于席上調强弱冷熱如常釀酒法醞之甕中密蓋頭三日後第二投更淘米四斗一如前法投之三日後即以餘汁澆饋重蒸待上痂生下置席上調冷熱如常釀法和上件藥投之三日外然後嘗甘苦得中訖密封頭二七日乃壓取清酒一服四合日再服細細加

加藥如左

桂心 甘草 白芷 細辛
防風 當歸 麻黄 芎藭 各六兩
附子 五兩 牛膝 九兩 乾薑 五加皮 各一斤

右十二味㕮咀訖第三投以米四斗淨淘如前法還

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:39
列印頁數：524
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以知為度溫酒不得過熱慎生冷酢滑猪鯉魚蒜牛肉等

松葉酒主脚弱十二風痺不能行服更生散數劑及衆治不得力服此一劑便能遠行不過兩劑方

松葉六十斤咬咀以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常法別煮松葉汁以漬米并饋飯泥釀封頭七日發澄飲之取醉得此力者甚衆神妙

治脚氣方

好豉三斗蒸一石米下曝乾如是三上以酒五斗漬七日去滓飲惟醉為佳酒盡更以二斗半漬之飲之如初

側子酒治風濕痺不仁脚弱不能行方

側子	牛膝	丹參	山茱萸
蒴藿根	杜仲	石斛 各四兩	防風
乾薑	蜀椒	細辛	獨活
秦艽	桂心	芎藭	當歸

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:39
列印頁數：525
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白木　茵芋　各三兩　五加皮　五兩　薏苡仁　一升

右二十味咬咀絹袋盛清酒四斗漬六宿初服三合稍加以知為度患目昏頭眩者彌精

膏第五方例

例曰凡作膏常以破除日無令喪孝汚穢産婦下賤人雞犬禽獸見之病在外火灸摩之在内温酒服如棗核許

神明白膏治百病中風惡氣及頭面諸病青盲風目爛皆管醫耳聾鼻塞齲齒齒根挺痛及癰痔瘡癬疥等方

吳茱萸　蜀椒　各一升　附子　三十枚　桂心　當歸　細辛　各二兩　前胡　崔氏作白前　白芷　各一升　吳茱萸　蜀椒　芎藭　白术

右十味咬咀淳苦酒於銅器中淹浸諸藥一宿以成煎猪膏十斤炭火上煎三沸三上三下白芷色黄為候病在腹内温酒服如彈丸一枚日三目痛取如黍米内兩眥中以目向風無風可以扇扇之諸瘡痔齲

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:39
列印頁數：526
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

齒耳鼻百病主之皆以膏傅病在皮膚灸手摩病上

日三 肘後九味無桂心

衛侯青膏治百病久風頭眩鼻塞清涕淚出霍亂吐逆

傷寒咽痛脊背頭項强偏枯拘攣或緩或急或心腹久

寒積聚疼痛欬逆上氣往來寒熱鼠漏瘰癧歷節疼腫

關節盡痛男子七傷臚脹腹滿羸瘦不能飲食婦人生

產餘疾諸病瘕疥惡瘡癰腫陰蝕黃疸發背馬鞍牛領

瘡腫方

當歸 栝蔞根 乾地黃 甘草 桂心 芎藭 半夏 各六合 七 蜀椒 各兩 六 細辛 附子 各兩 四 天雄 藜蘆 烏頭 莽草 黃連 寄生 杏仁 各兩 一 黃野葛 二分 生竹茹 六升 巴豆 二十枚 豬脂 三斗 苦酒 一斗六升 乾薑 人參 續斷 戎鹽 各兩 三 皂莢 各兩半 一 厚朴 桔梗 黃芩 各四 石南

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:40
列印頁數：527
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右三十一味咬咀諸藥以苦酒漬一宿以猪脂微火上煎之三下三上膏成病在内以酒服如半棗在外摩之日三

神明青膏治鼻中干瀧之并摩服方

蜀椒 五合 皂莢 黄芩 石南 黄連 雄黄 桂心 藜蘆 各三銖 烏頭 莽草 白朮 芎藭 大黄 澤瀉 各七銖 人參 續斷 各五銖 半夏 當歸 各十二銖 乾地黄 十一銖 萎蕤 細辛 各十銖 附子 桔梗 各二銖 乾薑 六銖 戎鹽 杏子大一枚

右二十五味咬咀以苦酒一斗漬之羊髓一斤為東南三隅竈内諸藥炊以葦薪作三聚新好土藥沸即下置土聚上三沸三下訖藥成以新布絞去滓病在外火灸摩之在内温酒服如棗核日三後稍益以知為度

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

太傅白膏治百病傷寒咽喉不利頭項强痛腰脊兩脚疼有風痺濕腫難屈伸不能行步若風頭眩鼻塞有附息肉生瘡身體隱軫風搔鼠漏瘰癧諸疽惡瘡馬鞍牛領腫瘡及久寒結堅在心腹痛胷痺煩滿不得眠飲食欬逆上氣往來寒熱婦人產後餘疾耳目鼻口諸疾悉主之亦曰太一神效膏方

蜀椒 一升 升麻 一升 切 附子 三兩 巴豆 十 各三銖 芎藭 杏仁 五合 狸骨 細辛 各一兩半 白芷 半兩 甘草 二兩 白术 六兩

一方用當歸三兩

右十二味咬咀苦酒淹漬一宿以猪脂四斤微火煎之先削附子一枚以繩繫著膏中候色黃膏成去滓傷寒心腹積聚諸風腫疾頸項腰脊强偏枯不仁皆摩之日一癰腫惡瘡鼠瘻瘰癧灸手摩之耳聾取如大豆灌之目痛淚出縹白醫如珠當瞳子視無所見取如粒米傅白上令其人自以手掩之須臾即愈便

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以水洗視如平復且勿當風三十日後乃可行鼻中痛取如大豆内鼻中并以摩之齲齒痛以綿裹如大豆著痛齒上咋之中風面目鼻口喎僻以摩之若晨夜行辟霜霧眉睫落數數以鐵漿洗用膏摩之

曲魚膏治風濕疼痺四肢躽弱偏跛不仁并癰腫惡瘡

方

大黄　黄芩　野葛　牡丹　蜀椒　皂莢　蜚蠊　附子　各一兩　蹲蹋　芫花　巴豆　莽草

弱偏枯百病方

野葛膏治惡風毒腫疼痺不仁瘰癧惡瘡癰疽腫脛脚黄藥成去滓微火炙手摩病上日三微火煎三沸一下別内白芷一片三上三下白芷色右十二味�mis咀以苦酒漬藥一宿以成煎猪膏三斤

烏頭　桔梗　升麻　防風　野葛　犀角　蛇銜　莽草　外臺作菌芋

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:41
列印頁數：530
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蜀椒 乾薑 鼈甲 雄黃

巴豆 各一兩 丹參 三兩 躑躅花 一升

右十五味咬咀以苦酒四升漬之一宿以成煎猪膏五斤微火煎三上三下藥色小黃去滓以摩病上此

方不可施之猥人慎之 胡洽無丹參躑躅有細辛又蘇恭以白芷防已吳茱萸附子當歸代巴豆雄黃蛇銜防風鼈甲

蒼梧道士陳元膏治一切風濕骨肉疼痺方

當歸 細辛 芎藭 各一兩 桂心 五寸

天雄 三枚 生地黃 三斤 白芷 一兩半 丹砂 二兩

乾薑 十兩 烏頭 三兩 松脂 八兩 猪肪 十斤

右十二味咬咀以地黃汁漬藥一宿煎猪肪去滓內丹砂末熟攪用火灸手摩病上

藥煎十五沸去滓內丹砂末熟攪用火灸手摩病上日千遍瘥 胡洽有人參防風各三兩附子三十枚雄黃二兩為十五味肘後千金翼有附子二十二銖雄黃二兩半大豝三升為十五味崔氏與千金翼同

裴公八毒膏治卒中風毒腹中絞刺痛飛尸入臟及魘寐不寤尸厥奄忽不知人宿食不消溫酒服如棗核大

得下止若毒氣甚咽喉閉塞不能嚥者折齒内葱葉口中以膏灌葱葉中令下病腫者向火摩腫上若歲中多温欲省病及行霧露中酒服之内鼻中亦得方

蜀椒 當歸 烏頭 巴豆 各一升 薤白一斤 莽草四兩 雄黄 丹砂 各二兩

右八味咬咀苦酒三升漬一宿用猪脂五斤東向竈葦薪火煎之五上五下候薤白黄色絞去滓研雄黄丹砂如粉内之攪至凝乃正膏成盛不津器中諸蜈蚣蛇蜂等毒者以膏置瘡上病在外悉傅之摩之以破除日合一方用礬石一兩蜈蚣二枚是名八毒膏 肘後不用巴豆莽草名五毒膏

備急千金要方卷二十四

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十五　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

治諸風方

論雜風狀第一

岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痱三曰風懿四曰風痺夫諸急卒病多是風初得輕微人所不悟宜速與續命湯依輸穴灸之夫風者百病之長岐伯所言四者說其最重也偏枯者半身不隨肌肉偏不用而痛言不變智不亂病在分腠之間溫卧取汗益其不足損其有餘乃可復也甲乙經云溫卧取汗則巨取之

風痱者身無痛四肢不收智亂不甚言微可知則可治甚即不能言不可治

風懿者奄忽不知人咽中塞窒窒然（巢源作噫噫然有聲）舌彊不能言病在臟腑先入陰後入陽治之先補于陰後瀉于

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

陽發其汗身轉輾者生汗不出身直者七日死 巢源作眼下及
鼻人中左右白者可治一黑一亦吐沫者不可治
風痺濕痺周痺筋痺脉痺肌痺皮痺骨痺胞痺各有證候形如風狀得脉別也脉微澀其證身體不仁
凡風多從背五臟輸入諸臟受病肺病最急肺主氣息又冒諸臟故也肺中風者其人偃卧而胷滿短氣冒悶汗出者肺風之證也視目下鼻上兩邊下行至口色白者尚可治急灸肺輸百壯服續命湯小兒減之若色黄地或自拈衣尋縫如此數日死若為急風邪所中便迷漠恍惚狂言妄語或少氣憒憒不能復言若不求師即治宿昔而死即覺便灸肺輸及膈輸肝輸數十壯急服續命湯可救也若涎唾出不收者既灸當並與湯也諸陽受風亦恍惚妄語與肺病相似然著緩可經久而死肝中風者其人但踞坐不得低頭繞兩目連額上色微有青者肝風之證也若脣色青面黄尚可治急灸肝輸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

百壯服續命湯若大青黑面一黃一白者此為肝已傷不可復治數日而死

心中風者其人但得偃卧不得傾側悶亂冒絶汗出者心風之證也若脣正赤尚可治急灸心輸百壯服續命湯若脣或青或白或黃或黑者此為心已壞為水面目亭亭時悚動者不可復治五六日死一云旬日死

脾中風者其人但踞坐而腹滿身通黃吐鹹汁出者尚可治急灸脾輸百壯服續命湯若目下青手足青者不可復治

腎中風者其人踞坐而腰痛視脇左右未有黃色如餅染大者尚可治急灸腎輸百壯服續命湯若齒黃赤鬢髮直面土色者不可復治

大腸中風者卧而腸鳴不止灸大腸輸百壯可服續命湯賊風邪氣所中則傷於陽陽外先受之客于皮膚傳入于孫脉孫脉滿則入傳于絡脉絡脉滿則輸于大經中成病歸於六腑則為熱不時卧止為啼哭其脉堅大

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

為實實者外堅充滿不可按之按之則痛也經絡諸脉傍支去者皆為孫脉也

凡風之傷人或為寒中或為熱中或為厲風或為偏枯或為賊風故以春甲乙傷於風者為肝風以夏丙丁傷於風者為脾風以秋庚辛傷于風者為肺風以冬壬癸傷于風者為腎風風中於風者為心風以四季戊己傷于風者為脾風以秋庚辛傷于風者為肺風以冬壬癸傷于風者為腎風風中五臟六腑之輸亦為臟腑之風各入其門户所中則為偏風風氣循風府而上則為腦風風入頭則為目風眼寒飲酒中風則為酒風入房汗出中風則為内風新沐中風則為首風从風入房中風則為腸風外在腠理則為泄風故曰風者百病之長也至其變化乃為他病無常方焉是知風者善行而數變在人肌膚中内不得泄外不得散因人動靜乃變其性有風遇寒則食不下遇熱則肌肉消而寒熱有風遇陽盛則不得汗遇陰盛則汗自出肥人有風肌肉厚則難泄喜為熱中目黄瘦人有風肌肉薄則常外汗身中寒目淚出有風遇于虚腠

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

理開則外出凄凄然如寒狀覺身中有水淋狀時如竹管吹處此是其證也有風遇于實腠理閉則内伏令人熱悶是其證也

新食竟取風為胃風其狀惡風頸多汗膈下塞不通食飲不下脹滿形瘦腹大失衣則憤滿食寒即洞泄新熱食竟入水自漬及浴者令人大腹為水病

因醉取風為漏風其狀惡風多汗少氣口乾喜渴近衣則身如火燒臨食則汗流如雨骨節懈惰不欲自勞

新沐浴竟取風為首風其狀惡風頭痛而汗多頭痛

新房室竟取風為内風其狀惡風汗流沾衣勞風之為病法在肺下使人彊上而目脫唾出如涕惡風而振寒

侯之三日及五日中不精明者是也七八日微有青黃膿涕如彈丸大從口鼻出為善若不出則傷肺

風邪客于肌膚虛癢成風胗瘙瘡風邪入深寒熱相搏則肉枯邪客半身入深真氣去則偏枯邪客關機中即攣筋中亦然邪淫于臟夢臟大形小淫於腑夢臟小形

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大邪隨目系入腦則目轉眩邪中精則散視見兩物風
邪入臟寒氣客於中不能發則瘖痙喉痺舌緩不時服
藥針灸風逐脉流入臟使人卒瘖緩縱噤痙致死風入
陽經則狂入陰經則癲陽邪入陰病則靜陰邪入陽病
則怒

若因熱食汗浴通腠理得開其風自出則覺肉中如針
刺步行運力欲汗亦如此也

凡覺肌肉中如刺皆由腠理閉邪氣閉在肌中因欲出
也宜解肌湯則善

夫目瞤動口脣動偏喎皆風入脉故須急服小續命湯
將八風散摩神明白膏丹參膏依經針灸之

諸痺由風寒濕二氣併客于分肉之間迫切而為沫得
寒則聚聚則排分肉肉裂則痛痛則神歸之神歸之則
熱熱則痛解痛解則厥厥則他痺發發則如是此内不
在臟而外未發于皮膚居分肉之間真氣不能周故為
痺也其風最多者不仁則腫為行痺走無常處其寒多

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

者則為痛痺其濕多者則為著痺冷汗濡但隨血脉上下不能左右去者則為周痺也痺在肌中更發更止左以應左右以應右者為偏痺也

夫痺其陽氣少而陰氣多者故令身寒從中出其陽氣多而陰氣少者則痺且熱也

諸痺風勝者則易愈在皮間亦易愈在筋骨則難瘥也

久痺入深令榮衛澀經絡時疎則不知痛

風痺病不可已者足如履水時如入湯腹中股脛淫濼

煩心頭痛傷脾腎時嘔眩時自汗出傷心目眩傷肝悲恐短氣不樂傷肺不出三年死 一云三日死

太陽中風重感於寒濕則變痙也痙者口噤不開背彊而直如發癇之狀搖頭馬鳴腰反折須臾十發氣息如絶汗出如雨時有脫易得之者新産婦人及金瘡血脉虚竭小兒臍風大人涼濕得痙風者皆死温病熱盛入腎小兒癇熱盛皆痙痙瘖厥癲皆相似故久厥成癲宜審察之其重者患耳中策策痛皆風入腎經中也不治

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

流入腎則喜卒然體瘛直如死皆宜服小續命湯兩三劑也若耳痛腫生汁作癰癰者乃無害也惟風宜防耳針耳前動脉及風府神良

諸風第二 方灸法

小續命湯治卒中風欲死身體緩急口目不正舌强不能語奄奄息息神情悶亂諸風服之皆驗不令人虚方

麻黄 防己 崔氏外臺不用 人參 黄芩

桂心 甘草 芍藥 芎藭

杏仁 各一兩 防風 一兩半 附子 一枚 生薑 五兩

右十二味㕮咀以水一斗二升先煮麻黄三沸去沫内諸藥煮取三升分三服甚良不瘥更合三四劑必佳取汗隨人風輕重虚實也有人脚弱服此方至六七劑得瘥有風瘡家天陰節變輒合服之可以防瘡

一本云恍惚者加茯神遠志如骨節煩疼本有熱者去附子倍芍藥 小品千金翼同深師古今録驗有白术不用杏仁救急無芎藭杏仁止十味延年無防風

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

小續命湯治中風胃昧不知痛處拘急不得轉側四肢緩急遺失便利此與大續命湯同偏宜產後失血并老小人

麻黄 桂心 甘草 各二兩 生薑 五兩 人參 芎藭 白朮 前方有杏仁 各一兩 附子 一兩半 防風 防己 芍藥 黄芩 各一兩 古今録驗無桂心名續命湯胡洽千金翼同

右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服

又方治風麻年歲或歌或哭或大笑言語無所不及方

麻黄 三兩 人參 桂心 白朮 各二兩 芍藥 甘草 防己 黄芩 芎藭 當歸 各一兩

右十味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服曰三覆取汗

大續命湯治肝厲風卒然瘡瘤依古法用大小續命二湯通治五臟偏枯賊風方

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:45
列印頁數：541
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麻黃 八兩 石膏 四兩 桂心 乾薑
芎藭 各二兩 當歸 黃芩 各一兩 杏仁 三十枚
荆瀝 一升

右九味㕮咀以水一斗先煮麻黃兩沸掠去沫下諸藥煮取四升去滓又下荆瀝煮數沸分四服能言未自知

又方治大風經臟奄忽不能言四肢垂曳皮肉痛癢不瘥後服小續命湯舊無荆瀝今增之效如神 千金翼有甘草

獨活 麻黃 各三兩 當歸 葛根 生薑 桂心 芎藭 防風 茯苓 附子 細辛 甘草 各一兩

右十二味㕮咀以水一斗二升煮取四升分五服老小半之若初得病便自大汗者減麻黃不汗者依方上氣者加吳茱萸二兩厚朴一兩乾嘔者倍加附子一兩惋者加橘皮二兩若胸中吸吸少氣者加大棗十二枚心下驚悸者加茯苓一兩若熱者可除生薑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

加葛根初得風未須加減便且作三劑停四五日已後更候視病虛實平論之行湯行針依穴灸之

又方治與前大續命湯同宜產婦及老小等方

麻黃 芍藥 各三兩 乾薑 石膏 人參 當歸 桂心 甘草 各二兩 杏仁 四十枚

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服外臺名續命湯范注同云是張仲景方本欠兩味

西州續命湯治中風瘖一作喑入臟身體不知自收口不能言冒昧不識人拘急背痛不得轉側方

麻黃 六兩 石膏 四兩 桂心 二兩 甘草 芍藥 乾薑 黃芩 當歸 各一兩 杏仁 三十枚

右九味㕮咀以水一斗二升煮麻黃再沸掠去上沫後下諸藥煮取四升初服一升猶能自覺者勿熟眠卧可厚覆小小汗出已漸減衣勿復大覆可熟眠矣

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

前服不汗者後復一升汗後稍稍五合一服安穩乃服勿頓服也汗出則愈勿復服飲食如常無禁忌勿見風并治上氣欬逆若面目大腫但得卧服之大善凡服此湯不下者人口噓其背湯則下過矣病人先患冷汗者不可服此湯若虛羸人但當稍與五合為微取汗者皆無害也胡洽方古今録名大續命湯

服二升傷多且湯濁不清故也但得清澄而稍稍服佳間有輒行此湯與産婦及羸人喜有死者皆為頓得伸屈頭眩不能自舉起止顛倒或卧苦驚如墮地狀大續命散治八風十二痺偏枯不仁手足拘急疼痛不盜汗臨事不起婦人帶下無子風入五臟甚者恐怖見鬼來收攝或與鬼神交通悲愁哭泣忽忽欲走方

麻黄	烏頭	防風	桂心
甘草	蜀椒	杏仁	石膏
人參	芍藥	當歸	薗茹 翼作芎藭
黄芩	茯苓	乾薑 各一兩	

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:47
列印頁數：544
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十五味治下篩以酒服方寸匕日再後加以知為度

續命煮散治風無輕重皆主之方

麻黃 芎藭 獨活 防己 桂心 附子 甘草 杏仁 各三兩 茯苓 升麻 細辛 人參 防風 各二兩 石膏 五兩 白朮 四兩

右十五味粗篩下以五方寸匕内小絹袋子中以水四升和生薑三兩煮取二升半分三服日日勿絶慎風冷大良吾嘗中風言語謇澁四肢瘇曳處此方日服四服十日十夜服之不絶得愈

排風湯治男子婦人風虛濕冷邪氣入臟狂言妄語精神錯亂其肝風發則面青心悶亂吐逆嘔沫脇滿頭眩重耳不聞人聲偏枯筋急曲拳而卧其心風發則面赤翕然而熱悲傷瞋怒張目呼喚其脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亡人相隨其肺

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

風發則面白欬逆唾膿血上氣奄然而極其腎風發則面黑手足不遂腰痛難以俛仰痺冷骨疼諸有此候令人心驚志意不定恍惚多忘服此安心定志聰耳明目通臟腑諸風悉主之

白鮮皮 白朮 芍藥 桂心

芎藭 當歸 杏仁 防風

甘草 各一兩 獨活 麻黄 茯苓 各三兩

生薑 四兩

欽定四庫全書

右十三味㕮咀以水一斗煮取三升每服一升覆取微汗可服三劑

大八風湯治毒風頑癖攣曳手脚不遂身體偏枯或毒弱不仁或風入五臟恍恍惚惚多語喜忘有時恐怖或肢節疼痛頭眩煩悶或腰脊彊直不得俛仰腹滿不食欬嗽或始遇病時卒倒悶絶即不能語便失瘖半身不遂不仁沉重皆由體虛恃少不避風冷所致治之方

當歸 二兩半 五味子 升麻 各一兩半 烏頭

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃芩　芍藥　遠志　獨活
防風　芎藭　麻黃　秦艽
石斛　人參　茯苓　石膏
黃芪　紫菀　各一兩　杏仁　四十枚　甘草
桂心　乾薑　各二兩　大豆　一升千金翼云二合

右二十三味�once以水一斗三升酒二升合煮取四升彊人分四服羸人分六服

八風散治八風十二痺猥退半身不遂歷節疼痛肌肉枯焦皮膚瞤動或筋緩急痛不在一處卒起目眩失心恍惚妄言倒錯身上瘡瘭面上起皰或黃汁出更相染漬或燥或濕顏色乍赤乍白或青或黑角弓反張乍寒乍熱方

麻黃　白朮　各一斤　羌活　二斤　黃芩　一斤五兩
大黃　半斤　梔蘗根　甘草　欒荊
天雄　白芷　防風　芍藥
天門冬　石膏　各十兩　山茱萸　食茱萸

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

躑躅 各升五
乾薑 各二兩
丹參 各六兩
右二十五味治下篩酒服方寸匕初每日一服三十日後日再五十日知百日瘥一年平復長服不已佳
先食服
小八風散治迷惑如醉狂言妄語驚悸恐怖恍惚見鬼
喜怒悲憂煩滿顛倒邑邑短氣不得語語則失忘或心
痛徹背不嗜飲食惡風不得去帷帳時復疼熱惡聞人
聲不知痛癢身悉振搖汗出猥退頭重浮腫爪不知痛
頸項強直口面喎戾四肢不隨不仁偏枯攣掣不得屈
伸悉主之方
天雄 當歸
人參 各五分
附子
乾薑 各三分
麻黃
天門冬 防風
蜀椒
獨活 各四分
烏頭 秦艽
細辛
白朮
山茱萸
五味子
附子 十四枚
細辛
雄黃 各五兩
硃砂

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:48
列印頁數：548
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桔梗　白芷　柴胡　莽草　各二分

右二十味治下篩合相得酒服半方寸匕漸至一匕日三服以身中覺如針刺狀則藥行也

烏頭湯治八風五尸惡氣遊走胷心流出四肢來往不住短氣欲死方

烏頭　芍藥　乾薑　桂心　甘草　各二兩　細辛　乾地黃　當歸　吳茱萸

右九味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

藁耳散治諸風方

當以五月五日午時乾地刈取藁耳葉洗曝燥擣下篩酒若漿服一方寸匕日三作散若吐逆可蜜和為丸服十丸準前計一方寸匕數也風輕易治者日再服若身體有風者皆作粟肌出或如麻豆粒此為風毒出也可以鈹針刺潰去之皆黃汁出盡乃止五月五日多取陰乾之著大甕中稍取用之此草辟惡若欲

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

看病省疾者便服之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一周年服之佳七月七九月九皆可採用

治心風虛熱發即恍惚煩悶半身不仁攣急方

荊瀝 竹瀝 各五升 枸杞根白皮

生麥門冬 各一升 香豉 三合 人參

茯苓 梔子仁 黃芩 芎藭

桂心 細辛 杏仁 防風

白鮮皮 各二兩 生薑 石膏 甘草 各三兩

右十八味㕮咀以水二斗和竹瀝荊瀝煮取三升分四服相去如人行六七里凡五劑間三日服一劑 一用 防己三兩

治虛熱恍惚驚邪恐懼方

荊瀝 三升 竹瀝 二升 香豉 三合 牛黃 十八銖

生麥門冬 各三兩 人參 升麻 鐵精

天門冬 龍齒 茯苓 梔子 各二兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十二味咬咀以水二斗煮取三升去滓下牛黃鐵精更煎五六沸取二升七合分五服溫服相去十里久

地黃煎治熱風心煩悶及脾胃間熱不下食冷所致

生地黃汁 枸杞根汁 二升 生薑汁 酥 各三升

荆瀝 竹瀝 各五升 天門冬 人參 各八兩

茯苓 六兩 大黃 梔子仁 各四兩

右十一味擣篩五物為散先煎地黃等汁成煎次內

散藥攪調每服一匕日再漸加至三匕覺利減之

又方黃芩 乾藍 各三兩 芍藥 鼠尾草 各三兩

梔子仁 生葛 各六兩 羚羊角 五兩 豉 一升 綿裹

右八味咬咀以水七升煮取二升五合分三服

治積熱風方

地骨皮 菱糕 丹參 黃芪

麥門冬 澤瀉 各三兩 清蜜 薑汁 各一合

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右九味以水六升煮取二升去滓内地黄汁更緩火煮減一升内蜜及薑汁又煮一沸藥成温服三合日再

大防風湯治中風發熱無汗肢節煩腹急痛大小便不利方

防風　當歸　麻黄　白朮　甘草各八銖十　黄芩三十銖　乾地黄　山茱萸　茯苓各一兩　附子各一兩

右十味㕮咀以水九升煮取二升半一服七合大小便不利内大黄人參各十八銖大棗三十枚生薑三兩煮取三升分三服深師加天門冬一兩

大戟洗湯治中風發熱方

大戟　苦參各等分

右二味為末以藥半升白酢漿一斗煮三沸適寒温洗從上下寒乃止立瘥小兒三指撮許漿水四升煮洗之

金牙酒療積年八風五痓舉身顫曳不得轉側行步跛

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:50
列印頁數：552
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

躃不能收攝又暴口噤失音言語不正四肢背脊筋急
腫痛流走不常勞冷積聚少氣乍寒乍熱三焦不調脾
胃不磨飲澼結實逆害飲食酢咽嘔吐食不生肌醫所
不能治者方

金牙 碎如米粒用小絹袋盛
地膚子 無子用莖蘇葉亦得用蛇床子
羌活 一斤胡洽用獨活
防風 細辛 乾地黃
蒴藿根 附子
茵芋 各四兩
蜀椒 四合

右十味㕮咀盛以絹袋用酒四斗於瓷罌中漬密閉
頭勿令洩氣春夏三四宿秋冬六七宿酒成去滓日
服一合此酒無毒及可小醉常令酒氣相接不盡一
劑病無不愈又令人肥健酒盡自可加諸藥各三兩
惟蜀椒五兩用酒如前勿加金牙也冷加乾薑四兩
服此酒勝灸刺起三十諸風癨曳神驗 肘後備急用升麻乾薑各四兩人參二兩石斛牛膝各五兩不用蒴藿根為十四味蘇恭不用地黃為十三味一方用蔵蓼四兩黃芪三兩胡洽用續斷四兩為十一味千金翼用茵芋四兩無莽草

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:50
列印頁數：553
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

常山太守馬灌酒除風氣通血脉益精華定六腑聰明耳目悅澤顏色頭白更黑齒落更生服藥二十日力勢倍六十日志氣充盈八十日能夜書百日致神明房中强壯如三十時力能引弩年八十人服之亦當有子病在腰膝藥悉主之方

天雄 二兩 生用　商陸根 蹲蹋 各一兩　烏頭 一枚 大者　附子 五枚　桂心　白斂　茵芋　乾薑 各三兩

右十味㕮咀以絹袋盛酒三斗漬春夏五日秋冬七日去滓初服半合稍加至兩三合攪滓為散酒服方寸匕日三以知為度夏日恐酒酸以油單覆之下井中近水令不酸也 千金翼無商陸桂心為八味

蠻夷酒治久風枯攣三十年著床及諸惡風眉毛墮落方

乾地黃　獨活　丹參　礬石 各一兩　麥門冬　附子　甘遂 各二兩　赤石脂 二兩半

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:51
列印頁數：554
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾薑 蕪荑 各一
蘇子 一升 蔞蒿
薯蕷 白朮
牡荊子 山茱萸
欵冬 各十八銖 白芷
烏喙 烏頭
蜀椒 防風
寒水石 牛膝
當歸 柴胡
桔梗 狗脊 翼作枸杞 各半 天雄 兩 石斛
桂心 各六銖
右四十五味咬咀以酒二斗漬夏三日春秋六日冬
九日一服半合密室中合藥勿令女人六畜見之三日清齋乃合 千金翼無芎藭云加大棗四十枚更佳
又方治八風十二痺偏枯不隨宿食久寒虛冷五勞七傷及婦人產後餘疾月水不調皆主之方
礬石 桂心
白朮 芫花 柏子仁 各一合
人參 狼毒
茯神 翼作茯苓 金牙
杜仲 石南
攀石 防葵
芎藭 牡蠣
麻黃 芎藭
細辛 攀石
人參 狼毒
白芷 狼毒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏　石南　白石脂　龍膽
續斷　芫花　白石英　代赭
蘭茹　石韋　玄參　天雄
防風　山茱萸　桔梗　藜蘆
卷栢　細辛　寒水石　烏頭
躑躅　蜀椒　白芷　秦艽
石膏　二兩半　蜈蚣　一枚　葛蒲　各一兩　礬石　附子　遠志　各二兩

右三十四味咬咀以酒二斗漬四日每服一合日再十日後去滓曝乾擣篩為散酒服方寸匕日再以知為度　胡洽四十二味無桂心細辛烏頭躑躅蜀椒而有芒硝恒山黃芩黃連大黃麻黃地黃前胡甘草菟絲子芍藥紫菀各一兩杏仁一十枚同擣篩絹袋盛用水三斗煮三斤黍米三斗作飯依釀酒法以藥袋置釀中春秋七日冬十日夏三日酒成服半雞子殼日三服曝藥為末酒服方寸匕以身體暖為度

魯王酒治風眩心亂耳聾目暗淚出鼻不聞香臭口爛手不能上頭不能帶衣腰脊不能俯仰脚酸不仁難以

生瘡風齒瘻癰喉下生瘡煩熱厥逆上氣胸脇肩膊痛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

久立八風十二痺五緩六急半身不遂四肢偏枯筋攣不可屈伸賊風咽喉閉塞哽哽不利或如錐刀所刺行人皮膚中無有常處久久不治入人五臟或在心下或在膏肓遊走四肢偏有冷處如風所吹久寒積聚風濕五勞七傷虛損百病悉主之方

茵芓　烏頭　防己　石斛 二十四銖　細辛　牛膝　甘草　栢子仁　通草　桂心　秦艽　茵蔯　附子　矍麥　乾地黃　山茱萸　黃芩 胡洽作黃耆　石南　防風　遠志 各十八銖　王不留行 胡洽作天門冬 千金翼作王蓀　杜仲　澤瀉　薯蕷 各三十銖　天雄　蜀椒 除汗　乾薑　白朮　桔梗　白蘞　芎藭　白芷　厚朴　蜀漆 洗去腥　五味子　皂莢 炙去皮子　大黃 各二十銖

右二十五味咬咀以酒四斗漬十日每服一合加至四五合以知為度 千金翼名此為魯公酒有乾薑胡洽無防己以絹囊盛藥用水二斗法麴二斤同漬三四宿出藥囊炊二斗黍米內汁釀之酒熟飲如雞子大日二服稍稍飲之以知為度

又方治風偏枯半死行勞得風若鬼所擊四肢不遂不

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

能行步不自帶衣孿躄五緩六急婦人帶下産乳中風
五勞七傷
乾薑 蠷蠐 各四兩
桂心 甘草
芎藭 續斷
細辛 附子
秦艽 天雄
石膏 紫菀 各五兩
葛根 通草
防風 栢子仁
巴戟天 石斛
石南 山茱萸
石龍芮 四兩 天門冬 牛膝 各八兩 烏頭 二十枚
蜀椒 半升
欽定四庫全書
備急千金要方
右二十五味咬咀以水五升漬三宿法麴一斤合漬
秫米二斗合釀三宿去滓炊糯米一斗醞三宿藥成先
食服半合日再待米極消盡乃去滓曝乾末服
獨活酒治八風十二痺方
獨活 石南 各四兩 防風 三兩 附子
烏頭 天雄
茵芋 各二兩
右七味咬咀以酒二斗漬七日每服半合日三以知

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

為度

灸法

扁鵲云治卒中惡風心悶煩毒欲死急灸足大趾下橫文隨年壯立愈

若筋急不能行者内踝筋急灸内踝上四十壯外踝筋急灸外踝上三十壯立愈

若眼戴精上插灸目兩眥後二十壯

若不能語灸第三椎上百壯

若不識人灸季肋頭七壯

若眼反口噤腹中切痛灸陰囊下第一横理十四壯灸陰囊下第一横理十四壯灸不自覺知或心腹脹滿

卒死亦良

治久風卒風緩急諸風卒發動不自覺知或心腹脹滿

或半身不隨或口噤不言涎唾自出目閉耳聾或身冷直或煩悶恍惚喜怒無常或脣青口白戴眼角弓反張始覺發動即灸神庭一處七壯穴在當鼻直上髮際是

○次灸曲差二處各七壯穴在神庭兩傍各一寸半是

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

○次灸上關二處各七壯一名客主人穴在耳前起骨上廉陷者中是○次灸下關二處各七壯穴在耳前下廉動脉陷者中是○次灸頰車二穴各七壯穴在曲頰陷者中是○次灸廉泉一處七壯穴在當頤直下骨後陷者中是○次灸凶會一處七壯穴在神庭上二寸是○次灸百會一處七壯穴在當頂上正中央是○次灸天柱二處各七壯穴在項後兩大筋外入髮際本神二處各七壯穴在耳正直上入髮際二分是又作四分

○次灸風門二處各七壯穴在第二椎下兩傍各一寸半是○次灸心輸二處各七壯穴在第五椎下兩傍各一寸半是○次灸肝輸二處各七壯穴在第九椎下兩傍各一寸半是○次灸腎輸二處各七壯穴在第十四椎下兩傍各一寸半是○次灸膀胱俞二處各七壯穴在第十九椎下兩傍各一寸半是○次灸曲池二處各七壯穴在兩肘外曲頭陷者中屈肘取之是○次灸肩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

髑二處各七壯穴在兩肩頭正中兩骨間陷者中是○次灸支溝二處各七壯穴在手腕後臂外三寸兩骨間是○次灸合谷二處各七壯穴在手大指虎口兩骨間陷者中是○次灸間使二處各七壯穴在掌後三寸兩筋間是○次灸陽陵泉二處各七壯穴在膝下外尖骨前陷者中是○次灸陽輔二處各七壯穴在外踝上絶骨端陷者中是○次灸崑崙二處各七壯穴在外踝後跟骨上陷者中是

治風灸上星及百會各二百壯前頂二百四十壯腦戶及風府各三百壯一云治大風灸百會七百壯

治百種風灸腦後項大椎平處兩廂量二寸三分須取病人指寸量兩廂各灸百壯得瘥

治風耳鳴從耳後量八分半裹許有孔灸一切風得瘥狂者亦瘥兩耳門前後各灸一百壯

治卒病惡風欲死不能語及肉瘅不知人灸第五推名曰臟輸百五十壯多至三百壯便愈

心輸穴在第五節一云第七節對心橫三間寸主心風
腹脹滿食不消化吐血酸削四肢羸露不欲飲食鼻衄
目眴睆睆不明肩頭脇下痛小腹急灸二三百壯
大腸輸在十六椎兩邊相去一寸半主風腹中雷鳴腸
澼泄利食不消化小腹絞痛腰脊疼彊或大小便難不
能飲食灸百壯三日一報
掖門在掖下攢毛中一寸名太陽陰一名掖間灸五十
壯主風
絶骨在外踝上三寸灸百壯治風身重心煩足脛疼

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷二十六至八

詳校官太醫院醫士臣舒仗

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄監生臣卯繹曾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十六 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

治諸風方

賊風第三 論灸法方

桂枝酒治肝虛寒卒然瘖啞不聲踞坐不得面目青黑四肢緩弱遺失便利屬風所損方

桂枝 芎藭 獨活 牛膝

薯蕷 甘草 各三兩 附子 二兩 防風

茯苓 天雄 茵芋 杜仲

蘼蕪根 白朮 各四兩 乾薑 五兩 蹲蹲

猪椒葉根皮 各一升 大棗 四十枚

右十八味㕮咀以酒四斗漬七日每服四合日二加

肝風占候其口不能言

至五六合

當灸鼻下人中次灸大椎次灸肝輸第九椎下是五

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:55
列印頁數：564
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

十壯餘處隨年壯眼暗灸之得明二三百壯良

大定心湯治心氣虛悸恍惚悒悒方 見別卷中

乾薑附子湯治心虛寒風半身不遂骨節離解緩弱不收便利無度口面喎邪方

芎藭 三兩

乾薑 附子 各八兩 桂心 麻黃 各四兩

右五味㕮咀以水九升煮取三升分三服三日後服一劑

側子酒治心寒或笑或呻口欹方 見別卷中

芎藭湯治卒中風四肢不仁善笑不息方

芎藭 一兩半 黃芩 石膏 一用鴈 當歸

秦艽 麻黃 桂心 乾薑

甘草 各一兩 杏仁 二十一枚

右十味㕮咀以水九升煮取三升分三服

荊瀝湯治心虛寒陰氣傷寒損心驚掣悸語聲寬急混濁口喎冒昧好自笑屬風傷心方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

荊瀝 三升　母薑 取汁一升　麻黃　白朮

芎藭 兩各四　防風　桂心　升麻

茯苓　遠志　人參　羌活

當歸 兩各三　防己　甘草 兩各二

右十五味㕮咀以水一斗五升煎麻黃兩沸去沫次下諸藥煮取三升去滓下荊瀝薑汁煎取四升分四服日三夜一

白朮酒補心志定氣治心虛寒氣性反常心手不隨語聲冒昧其疾源屬風損心具如前方所說無藭

白朮 切　地骨皮　荊實 斗各五　菊花 斗三

右四味以水三石煮取一石五斗去滓澄清取汁釀米二石用麴如常法酒熟隨能飲之常取半醉勿令至吐

治心風寒方

灸心輸各五十壯第五節兩邊各一寸半是

依源麻黃湯治脾虛寒厲風所傷舉體消瘦語音沉澀

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

如破鼓聲舌强不轉而好咽唾口噤唇黑四肢不舉身重如山便利無度方 見別卷中

半夏湯温中下氣治脾寒語聲憂懼舌本捲縮嗔喜無度悟悶恍惚脹滿方

半夏 大麻仁 熬研為脂 生薑 各一升 芍藥

茯苓 五味子 五兩 桂心 甘草 二兩 白术 四兩 附子 五兩

右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓下大麻仁脂更上火一沸分三服

欽定四庫全書

當歸圓補脾安胃調氣止痛治脾虚寒身重不舉語音沉鼓屬風傷痛便利無度方

當歸 酸棗仁 各八兩 芎藭 乾薑 各六兩 地骨皮 黄耆 各七兩 乾地黄 天雄 各六兩

大棗 二十枚 吳茱萸 五合 甘草 秦椒葉 厚朴 秦艽 各四兩 桂心 防風 附子 白术 各五兩

備急千金要方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十八味為末蜜丸如梧子酒服三十丸加至四十丸日再服

脾風占候聲不出或上下手

治脾風方 脾風者總呼為八風

當灸手十指頭次灸人中次灸大椎次灸兩耳門前脉去耳門上下行一寸是次灸兩大指節上下各七壯

灸脾輸夾脊兩邊各五十壯凡人脾輸無定所隨四季月應病即灸臟輸是脾穴此法甚妙

依源麻黃續命湯治肺虛寒厲風所中噓吸戰掉聲嘶塞而散下氣息短憊四肢癖弱面色青葩遺失便利冷汗出

麻黃 六兩 大棗 五十枚 杏仁 白术 人參 乾薑 石膏 各四兩 桂心 茯苓 各三兩 當歸 芎藭 甘草 各二兩

右十二味㕮咀以水一斗二升煮麻黃去沫次下諸藥煎取三升去滓分三服舊方無白术茯苓今方無

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃芩轉以依經逐病增損

八風防風散治肺寒虛傷語音嘶下拖氣用力戰掉緩

弱羸瘠厲風入肺方

防風　獨活　芎藭　秦椒

乾薑　黃耆　附子　四十　二銖　天雄

麻黃　五味子　山茱萸　石膏　各三十　六銖

秦艽　桂心　薯蕷　細辛

當歸　防已　人參　杜仲　各三　十銖

欽定四庫全書　十二

甘草　十銖　二　貫衆　二枚　甘菊　紫菀　二十

右二十四味治下篩每服方寸匕酒調進至兩匕日

再

温中生薑湯治肺虛寒羸瘦緩弱戰掉噓吸胷滿肺癆

方

生薑　二斤　桂心　橘皮　四兩　甘草　麻黃　三兩

右五味㕮咀以水一斗煮取二升半分三服先煎麻

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃兩沸去沫然後入諸藥合煮

治肺寒方

灸肺輸百壯

腎瀝湯治腎寒虛為厲風所傷語音謇吃不轉偏枯腑
聾塞腰背相引隨病用藥依源增損方

脚偏跛蹇緩弱不能動口喎言音混濁便利仰人耳偏

欽定四庫全書

羊腎一具　黃耆　芎藭　桂心

當歸　人參　防風　甘草

五味子各三兩　玄參　茯苓　芍藥各四兩

磁石五兩　地骨皮二升切　生薑八兩

右十五味咬咀以水一斗五升煮羊腎取七升下諸

藥取三升去滓分三服可服三劑

茵芋酒治耳聾口欹等病方見別卷

乾地黃圓治腎虛呻吟喜恚怒反常心性陽氣弱腰背

彊急髓冷方

乾地黃　山茱萸　天門冬　桂心

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

續斷 各一兩半　栢子仁　杜仲　牛膝

蒐蓉 各四十銖　茯苓　天雄　鍾乳 各二兩

松脂　遠志　乾薑 各三十銖　葛蒲

薯蕷　甘草 各一兩

右十八味末蜜丸梧子大酒服三十丸日二加至四十丸

治腎寒方

灸腎輸百壯

大巖蜜湯治賊風腹中絞痛并飛尸遁注發作無時發即搶心脹滿脇下如錐刀刺并主少陰傷寒方

梔子 十五枚　甘草

羊脂 青羊角亦得　茯苓

乾薑　當歸

右十一味咬咀以水八升煮取三升去滓内脂令烊分三服温服相去如人行十里須若痛甚者加羊脂三兩當歸芍藥人參各一兩心腹脹滿堅急者加大乾薑當歸桂心 各一兩　吳茱萸　芍藥 小品用芍藥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃三兩 胡洽不用梔子羊脂茯苓桂心名巖蜜湯
小巖蜜湯治惡風角弓反張飛尸入腹絞痛悶絶往來有時筋急少陰傷寒口噤不利方
大黃二兩 雄黃 青羊脂各一兩 當歸
乾薑 桂心 甘草細辛各四兩 乾地黃 芍藥 吳茱萸三兩
右十一味咬咀以水二斗煮取六升分六服重者加藥用水三斗煮取九升分十服
排風湯治諸毒風邪氣所中口噤悶絶不識人及身體疼煩面目手足暴腫者方
犀角 貝子 升麻 羚羊角各一兩
右四味治下篩為粗散以水二升半内四方寸匕煮取一升去滓服五合殺藥者以意增之若腫和雞子轉側叫呼發作有時使人陰縮手足厥逆方
烏頭湯治寒疝腹中絞痛賊風入腹攻五臟拘急不得傳上日三度老小可斟酌加減神良亦可多合備用

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

烏頭 十五枚 要用五枚
芍藥 四兩
桂心 六兩
大棗 十枚
甘草 二兩
老薑 一斤

右六味㕮咀以水七升煮五味取三升去滓別擣烏頭去皮四破蜜二升微火煎令減五六合內湯中煮兩小沸去滓服一合日三間食彊者三合以如醉狀為知不知增之

治賊風所中腹內攣急方

麻黃 四兩
甘草 一尺
石膏 雞子大
鬼箭羽 各

右四味㕮咀以東流水二升煮取一升頓服之

論曰夫歷節風著人久不治者令人骨節蹉跌變成癩病不可不知古今以來無問貴賤往往苦之此是風之毒害者也治之雖有湯藥而並不及松膏松節酒若鬻旅家貧不可急辦者宜服諸湯猶勝不治但於痛處灸

三七壯佳

防風湯治身體四肢節解如墮脫腫按之皮陷頭眩短氣溫溫悶亂欲吐者方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

防風　白朮　芎藭　芍藥　半夏　生薑各五兩　杏仁　知母　甘草各三兩　桂心各四兩

古今録驗方無半夏杏仁芎藭用附子二枚為八味

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一

羌活湯治中風身體疼痛四肢緩弱不遂及産後中風方

羌活　桂心　芍藥　葛根　麻黄　乾地黄各三兩　甘草二兩　生薑五兩

右八味㕮咀以清酒三升水五升煮取三升温服五

合日三服

防己湯治風歷節四肢疼痛如槌鍛不可忍者方

防己　茯苓　白朮　桂心　生薑各四兩　甘草三兩　人參三兩　烏頭七枚

右八味㕮咀以苦酒一升水一斗煮取三升半一服

八合日三夜一當覺焦熱癉忽忽然慎勿怪也若不

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:59
列印頁數：574
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

覺復合服以覺乃止凡用烏頭皆去皮熬令黑乃堪用不然至毒人宜慎之（千金翼不用苦酒）

治濕風體痛欲折肉如錐刀所刺方

黃芩二兩　附子（乾薑）　人參　甘草　桂心（各二兩）　白朮（四兩）　茯苓

右八味㕮咀以水八升煮取二升日三服（一方去桂心用乾地）

大棗湯治歷節疼痛方

大棗十五枚　附子一枚　生薑二兩　麻黃五兩　甘草一尺　黃耆四兩

右六味㕮咀以水七升煮取三升每服一升日三服

犀角湯治熱毒流入四肢歷節腫痛方

犀角二兩　羚羊角一兩　梔子仁（各三兩）　豉一升　射干（各四兩）　大黃　升麻（各四兩）　前胡　黃芩

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治歷節諸風百節酸痛不可忍方

松脂三十斤鍊五十遍酒煮十遍不能五十遍二十

遍亦可鍊酥三升溫和松脂三升熟攪令極調勻且

空腹酒服方寸匕日三數數食麪粥為佳慎血腥生

冷物酢果子百日已後瘥

松節酒治歷節風四肢疼痛猶如解落方

右二味澄清合漬乾麴五斤候發以糯米四石五斗

釀之依家醞法四酘勿令傷冷熱第一酘時下後諸

藥

栝子仁 天雄 蜀薤 芎藭 各五兩

秦艽 六兩 人參 茵芋 各四兩 防風 十兩

磁石 十一兩末 獨活 十二兩

右十味㕮咀內飯中炊如常酘法酘足訖封頭四七

日壓取清適性服之勿至醉吐

松節 三十斤 猪椒葉 三十斤細剉各用水四石煮取一石

石膏湯逐風毒方

列印日期/時間：02/04/2005 18:42:59
列印頁數：576
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

石膏 雞子大三枚 雞子 二枚 甘草 一尺 麻黄 三兩 杏仁 四十枚

右五味㕮咀以水三升破雞子内水中烊令相得内藥煮取一升服之覆取汗汗不出燒石熨取汗出為佳

治歷節風方

松膏一升酒三升浸七日每服一合日再數劑愈

又方松葉三十斤酒二石五斗漬三七日服一合日五六度

備急千金要方卷二十六

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:00
列印頁數：577
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十七 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

治諸風方

偏風第四 方針灸法

防風湯治偏風甄權處療安平公方

防風 芎藭 白芷 牛膝 狗脊 蕳蘼 白朮 各一兩 羌活

葛根 附子 外臺作人參 各二兩 杏仁 各三兩 石膏 桂心 各四兩 麻黃 四兩 生薑 五兩 薏苡仁

右十六味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服一劑覺好更進一劑即一度針九劑九針即瘥灸亦得

針風池一穴 肩髃一穴

曲池一穴 支溝一穴

五樞一穴 陽陵泉一穴

巨虛下廉一穴

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:00
列印頁數：578
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凡針七穴即瘥

仁壽宮備身患脚奉勑

針鐶銚一穴

巨虛下廉一穴

凡針四穴即能起行

大理趙卿患風腰脚不隨不能跪起

針上窌一穴

陽陵泉一穴

凡針四穴即能跪起

庫狄欽患偏風不得挽弓

針肩髃一穴即得挽弓甄權所行

治猥退風半身不遂失音不語者方

杏仁去雙仁及皮尖三斗洗入白擣二斗令碎研如

寒食粥法取汁八升煎取四升口嘗看香滑即熟未

及此則為不熟惟熟為妙停極冷然後内好麴一斗

六升煎取八升第一遍酘饘也次一炊復取杏仁三

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:00
列印頁數：579
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

升研取一斗二升汁煎取六升第二酘也次一炊準第二酘取杏仁汁多少為第三酘也若疑米不足別更取二升杏仁研取八升汁煎取四升更斟酌炊米酘之若猶不足更研杏仁二升取八升汁煎取四升更酘之以熟為限一石米杏仁三斗所以節次研杏仁者恐并煎汁酢故也若冬日任意并煎準計三斗杏仁取汁一石六斗煎取八斗四升漬麴以分之酘酒熟封四七日開澄取清然後壓糟糟可乾末和酒服之大驗祕方

又方蕘麻子脂一升酒一斗銅鉢盛著酒中一日煮之令熟服之

又方灸百會次灸本神次灸承漿次灸風府次灸肩髃次灸心輸次灸手五冊次灸手髓孔次灸手少陽次灸足五冊次灸足髓孔次灸足陽明各五百壯

治大風半身不遂方

蠶沙兩石熟蒸分作直袋三枚各受七斗熱盛一袋

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

著患處如冷即取餘袋一依前法數數易換百不禁
瘥止須羊肚釀粳米蔥白薑椒豉等爛煮熱喫日食
一具十日止此方千金不傳
又方蒸鼠壤土袋盛熨之瘥即止
葛根湯治四肢緩弱身體疼痛不遂婦人産後中柔風
及氣滿方
葛根　芍藥　桂心　乾地黄
羌活　各三兩　麻黄　甘草　各二兩　生薑　六兩
三
麻子湯治大風周身四肢攣急風行在皮膚身勞彊服
之不虛人又治精神蒙昧者方
秋麻子　三升淨擇水漬一宿　防風　桂心
竹葉　葱白　各一握　香豉　一合　橘皮　各二兩　麻黄　三兩　生薑　碎綿裹　一兩
右十味㕮咀先以水二斗半煮麻子令極熟漉去滓

右八味以清酒三升水五升煮取三升温服五合日

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取九升別煮麻黃兩沸掠去沫内諸藥汁中煮取三升去滓分三服空腹服當微汗汗出以粉塗身極重者不過三兩劑輕者一兩劑瘥有人患大風賊風刺風加獨活三兩比之小續命湯準當六七劑

仲景三黃湯治中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食方

麻黃 三十銖 黃芩 十八銖 黃耆 細辛 各十二銖 獨活 一兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升分二服一服小汗兩服大汗心中熱加大黃半兩脹滿加枳實六銖氣逆加人參十八銖心悸加牡蠣十八銖渴加栝蔞十八銖先有寒加八角附子一枚此方祕不傳

白斂薏苡湯治風拘攣不可屈伸方

白斂 薏苡仁 芍藥 桂心 酸棗仁 牛膝 乾薑 甘草 各一升 附子 三枚

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:02
列印頁數：582
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右九味㕮咀以淳酒二斗漬一宿微火煎三沸每服一升日三扶杖起行不耐酒服五合（千金翼有車前子）

獨活寄生湯夫腰背痛者皆由腎氣虛弱卧冷濕地當風得之不時速治喜流入脚膝為偏枯冷痺緩弱疼重或腰痛攣脚重痺宜急服此方

獨活 三兩（古今録驗用續斷）　寄生　牛膝　細辛　桂心　防風　人參　甘草　當歸　芎藭　秦艽　茯苓　杜仲　乾地黄　芍藥　各二兩

右十五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服温身勿冷喜虛下利者除乾地黄服湯取蒴藋葉火燎厚安席上及熱眠上冷復燎之冬月取根舂取莖熬卧之佳其餘薄熨不及蒴藋葉為愈也諸處風濕亦用此法新産竟或患腹痛不得轉動及腰脚攣痛不得屈伸痺弱者宜服此湯除風消血（肘後有附子一枚大者無寄生人參甘草當歸）

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

菊花酒治男女風虛寒冷腰背痛食少羸瘦無顏色噓吸少氣去風冷補不足方

菊花 杜仲 各一斤 防風 附子 各四兩 紫石英 各八兩 蒐蘿 各五兩 蕘蘼 桂心 當歸 黃耆 乾薑 各三兩 茯苓 獨活 鍾乳 各二兩

右十五味咬咀以酒七斗漬五日一服二合稍稍加至五合日三 千金翼不用乾薑

杜仲酒治腰脚疼痛不遂風虛方

杜仲 八兩 石南 二兩 羌活 四兩 大附子 五枚

右四味咬咀以酒一斗漬三宿每服二合日再偏宜冷病婦人服之

風癱第五 論灸法方

論曰夫風癱者卒不能語口噤手足不遂而彊直者是也治之以伏龍肝五升為末冷水八升和攪取汁飲之能盡為善 肘後此方治心煩恍惚腹中痛滿絕而復蘇 自此已下九方皆主

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:02
列印頁數：584
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

此風用之次第宜細尋之

論曰凡欲醫此病當知先後次第不得謾投湯藥以失機宜非但殺人因茲遂為痼疾已既得之當進三味竹瀝飲少似有勝于常更進湯也竹瀝飲子患熱風者必先用于此制其熱毒

竹瀝湯治四肢不收心神恍惚不知人不能言方

竹瀝 二升
生薑汁 一升
生薑汁 三合

右三味相和温暖分三服平旦日晡夜各一服服訖

覺四體有異似好次進後湯方

竹瀝 一升
生葛汁 五合
芎藭 防己
附子 人參 芍藥 黄芩
甘草 桂心 各二兩 生薑 四兩 羚羊角 三兩
石膏 六兩 杏仁 四十枚 麻黄 防風 各一兩半

右十六味㕮咀以水七升煮減半內瀝煮取二升五合分三服取汗間五日更服一劑頻與三劑漸覺少損乃進後方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

竹瀝 三升　防風　羚羊角
防己　桂心　升麻
芎藭 各二兩　麻黄 三兩

右八味㕮咀以水四升合竹瀝煮取二升半分三服
兩日服一劑常用加獨活三兩最佳此方神良頻進
三劑若手足冷者加生薑五兩白术二兩若未除更
進後方

竹瀝 一升　甘草 一本作一根 二兩　人參
獨活　升麻 各一兩　防風
芎藭
麻黄

附子 一本作仁四十枚　杏 二兩　白术 各二兩
防己　桂心　黄芩
芍藥 各一兩半　生薑　石膏　羚羊角

右十七味㕮咀以水八升煮減半内瀝煮取二升半
分三服相去如人行十里久更服若有氣者加橘皮
牛膝五加皮各一兩
凡風痺服前湯得瘥訖可常服煮散除餘風方

防風　羚羊角
防己　獨活
芎藭　秦艽

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃耆　芍藥　人參　白朮
茯神　芎藭　遠志　升麻
石斛　牛膝　羚羊角　丹參
甘草　厚朴　天門冬　五加皮
地骨皮　黃芩　翼作芩著莦　桂心　各一兩一云各四兩
乾地黃　橘皮　生薑　麻黃　各三兩
檳榔　翼作甘草　藁本　翼作附子　杜仲　翼作參門冬　薏苡仁　一升　石膏　六兩一云三兩
烏犀角　各二兩翼作山茱萸

右三十三味擣篩為粗散和攪令勻每服以水三升藥三兩煮取一升綿濾去滓頓服之取汗日一服若覺心中熱煩以竹瀝代水煮之

荊瀝湯凡患風人多熱常宜服此方

荊瀝　竹瀝　生薑汁　各五合

右三味相和温暖為一服每日旦服煮散午後進此

平復好瘥乃止

獨活煮散治諸風痱方

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:04
列印頁數：587
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

獨活 八兩　芎藭　芍藥　茯苓
防風　防己　葛根 各六兩　羚羊角
當歸　人參　桂心　麥門冬
石膏 各四兩　磁石 十兩　甘草 三兩　白术 五兩

右十六味各切剉分為二十四分每分入生薑生地黃切一升杏仁二七枚以水二升煮取七合或日晚或夜中或日一服或間服無所忌

五補圓凡風服湯藥多患虛熱翕翕然宜除熱方

防風　人參　蕤蓉　乾地黃
羚羊角　麥門冬　天門冬 各一兩半　芍藥
獨活　乾薑　白术　丹參
食茱萸 一云山茱萸　升麻　黃耆　甘菊花　地骨皮
生薑屑　黃芩 各一兩　附子 十八銖　石膏 三兩
秦艽　芎藭　甘草　茯神
石斛　牛膝　五加皮　薯蕷 各三十銖　桂心　防己

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寒水石 二兩

右三十二味為末白蜜和丸如梧子大生薑蜜湯服二十丸日三稍加至三十丸忌油麪蒜生冷酢滑及猪羊雞魚等肉

論曰古人立方皆準病根冷熱制之今人臨急造次搜尋即用故多不驗所以欲用方者先定其冷熱乃可檢方用無不效湯藥既爾丸散亦然凡此風之發也必由熱盛故有竹瀝葛汁等諸冷藥焉後之學者不能仔細識其方意故有茲論具而述之其人無窓室者不可與療以强人居室不窓尚中風邪況服藥之人乎

治風癖不能語手足不遂方

度病者手小指内岐間至指端為度以置臍上直望心下以丹注度上端畢又作兩度續所注上合其下開其上取其本度横置其開上令三合其狀如到作ㄙ字形男度左手女度右手嫌不分了故上丹注三處同時起火灸之各一百壯愈

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十八　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

治諸風方

風懿第六　論針灸方法

獨活湯治風懿不能言四肢不收手足躭曳方

獨活　四兩　桂心　芍藥　栝蔞根　生葛　各三兩　生薑　六兩　甘草　三兩

論曰脾脉絡胃俠咽連舌本散舌下心之別脉係舌本今心脾二臟受風邪故舌彊不得語也

右七味㕮咀以水五升煮取三升分三服日三

治中風口噤不能言方

防己　桂心　麻黄　各二兩　葛根　三兩　防風　芍藥　各一兩　生薑　四兩　甘草　三兩

右八味㕮咀以水六升煮取二升半分三服瘖瘂不語皆治之

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:05
列印頁數：591
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

石南湯治六十四種風注走入皮膚中如蟲行腰脊彊直五緩六急手足拘攣隱胗搔之則作瘡風尸身癢卒風面目腫起手不出頭口噤不能言方

石南　乾薑　人參各一兩　桂心　芎藭各一兩半　甘草二兩　麻黃　黃芩　細辛　乾地黃十八銖　當歸　食茱萸三十銖

右十二味㕮咀以水六升酒三升煮取三升分三服大汗勿怪

治中風口噤不知人者方

芥子一升　酢三升　豉五升　吳茱萸一升

右二味煮取一升薄頭以布裹之日一度肘後以治卒不得語

右二味以水七升煮取三升漸飲之肘後以治不能語

又方白朮四兩以酒三升煮取一升頓服

又方服荊瀝一升

又方服淡竹瀝一升

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:05
列印頁數：592
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

針灸法

卒中風口噤不得開灸機關（千金翼名頰車）二穴穴在耳下八分小近前灸五壯即得語又灸隨年壯僻者逐僻左右灸之中風失瘖不能言語緩縱不隨先灸天窻五十壯息火仍移灸百會五十壯畢還灸天窻五十壯者始發所以先灸天窻次百會佳一灸五十壯悉洩火勢復灸先灸百會則風氣不得洩内攻五臟喜閉伏仍失音也之視病輕重重者一處三百壯大效凡中風服藥益劇者但是風穴悉皆灸之三壯無不愈也神良決定勿疑惑也不至心者勿浪盡灸

論曰風寒之氣客于中滯而不能發故瘖不能言及喉瘖失聲皆風邪所為也入臟皆能殺人故附之于治風方之末凡尸厥而死脉動如故此陽脉下墜陰脉上爭氣閉故也針百會入三分補之灸熨斗熨兩脇下又竈突墨彈丸大漿水和服之又針足中趾頭去甲如韭葉又刺足大趾甲下内側去甲三分

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:06
列印頁數：593
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桂湯治卒失音方

濃煮桂汁服一升覆取汗亦可末桂著舌下漸漸嚥汁

又方濃煮大豆汁含亦佳無豆用豉

治卒不得語方

酒五合和人乳汁中半分為二服

論曰夫眼瞤動口脣偏喎皆風入脉急與大續命湯附子散摩神明膏丹參膏依穴灸之喉痺舌緩亦然風入臟使人瘖瘂卒死口眼相引牙車急舌不轉喎僻者與伏龍肝散和雞冠血及鼈血塗乾復塗之并灸吻邊橫文赤白際逐左右隨年壯報之至三報三日不瘥更報之

附子散治中風手臂不仁口面喎僻方

附子 桂心 各五兩 細辛 防風 人參 乾薑 各六兩

右六味治下篩酒服方寸匕日三稍增之

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:06
列印頁數：594
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甘草湯治偏風積年不瘥手脚枯細面口喎僻精神不定言語倒錯方

甘草 桂心 芎藭 麻黄 當歸 芍藥 人參 各二兩 附子 各二枚 側子 各二枚 獨活 各三兩 防己 各三兩 生薑 各四兩 石膏 茯神 各四兩 細辛 各一兩 秦艽 防風 各一兩半 菊花 一升 淡竹瀝 四升

右二十一味㕮咀以水一斗先煮麻黄去沫取七升内竹瀝及藥煮取三升分四服服三服訖間一盃粥後更進一服待藥勢自汗慎生冷醋蒜麪乳酪魚等治中風面目相引口偏著耳牙車急舌不得轉方

獨活 三兩 生地黄汁 竹瀝 各一升

右三味合煎取一升頓服之即愈

又方牡蠣 礬石 附子 竈下黄土

右四味各等分為末取三年雄雞冠血和藥傅其上

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

持鏡候纔欲復故便急洗去之不速去便過不復還也千金翼云偏右塗左偏左塗右

又方竹瀝三升防風防已升麻桂心芎藭各二兩麻黄四兩羚羊角三兩

右八味㕮咀以水四升合竹瀝煮取一升半分三服日服一劑常用效

又方青松葉一斤擣令汁出清酒一斗漬二宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗出即止

又方酒煮桂取汁以故布搦病上正則止左喎搦右右喎搦左此秘方不傳余常用大效

治口耳僻方

防風附子葛根各二兩麻黄各三兩獨活生薑各四兩杏仁三十枚

右八味㕮咀以水一斗酒二升煮取三升分四服治卒中風口喎不正方

取空青末如豆大一枚含之即愈

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方炒大豆三升令焦以酒三升淋取汁頓服（肘後以治口噤不開）

又方大皂莢一兩去皮子下篩以三年大酢和左喎塗右右喎塗左乾更塗之

又方以葦筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麪密塞之勿令泄氣一頭内大豆一顆并艾燒令然灸七壯即瘥患右灸左患左灸右千金不傳耳病亦可灸之

又方灸手交脉三壯左灸右灸左其炷如鼠屎形横安之兩頭下火

枳蓟酒主諸藥不能瘥者方

枳實上青刮取末欲至心止得蓟五升微火炒去濕氣以酒一斗漬微火暖令得藥味隨性飲之主口僻眼急大驗治緩風急風並佳（肘後以治身直不得屈伸反覆者枳樹皮亦得）

角弓反張第七 方

治卒半身不遂手足拘急不得屈伸身體冷或智或癡或身强直不語或生或死狂言不可名狀角弓反張或

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欲得食或不用食或大小便不利皆療之方 古今録驗名八風續命湯
人參 桂心 當歸 獨活 黄芩 乾薑 甘草 各十兩 石膏 一兩半 杏仁 四十枚
右九味㕮咀以井花水九升煮取三升分三服日二
覆取汗不汗更合加麻黄五兩合服
倉公當歸湯治賊風口噤角弓反張瘛者方
當歸 防風 各十兩 獨活 一兩半 附子 一枚 細辛 半兩 麻黄 三十銖
右六味㕮咀以酒五升水三升煮取三升服一升口不開者格口内湯一服當蘇二服小汗三服大汗
又方酒一斗膠二斤煮令烊得六升每服一升稍服得愈
又方單服荆瀝良
秦艽散治半身不遂言語錯亂乍喜乍悲角弓反張皮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

膚風癢方

秦艽　獨活　胡洽用烏頭　黃耆　胡洽用　人參

甘菊花　各二兩胡洽用蜀椒　茵芋　十八銖胡洽用蒿草

防風　石斛　胡洽用蘼蕪　山茱萸　胡洽用　桂心　各一兩半

附子　芎藭　胡洽用桔梗　細辛　當歸

五味子　甘草　白朮　乾薑

麻黃　白鮮皮　胡洽用白斂各三十銖　天雄　各一兩胡洽用防己

遠志　各一兩胡洽用

右二十二味治下篩酒服方寸匕日再漸漸加至二匕又云治風無新久并補

吳秦艽散治風注入肢體百脉身腫角弓反張手足酸疼皮膚習習身體盡痛眉毛墮落耳聾驚悸心滿短氣魂志不定陰下濕癢大便有血小便赤黃五勞七傷萬病皆治

秦艽　蜀椒　人參　茯苓

牡蠣　細辛　栝蔞根　麻黃　各十八銖

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:08
列印頁數：599
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾薑 附子 白朮 桔梗
桂心 獨活 當歸 各一兩 黃芩
柴胡 牛膝 天雄 石南
杜仲 莽草 烏頭 各半兩 甘草
芎藭 防風 各一兩半

右二十六味治下篩盛以韋袋食前溫酒一升服方寸匕日三服急行七百步更飲酒一升忌如常法

風痺第八方論

論曰血痺病從何而得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛因疲勞汗出卧不時動搖加被微風遂得之形如風狀脈自微澁澁在寸口關上緊宜針引陽氣令脈和緊去則愈

巢源云其狀如被微風所吹但以脈自微澁澁在寸口關上緊宜針治風濕脈浮身重汗出惡風方

甘草 二兩 黃耆 五兩 漢防己 四兩 生薑
白朮 各三兩 大棗 十二枚

右六味㕮咀以水六升煮取三升分三服服了坐被

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:09
列印頁數：600
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中欲解如蟲行皮中臥取汗

鐵精湯治三陰三陽厥逆寒食胸脇支滿病不能言氣

滿胸中急肩息四肢時寒熱不隨喘悸煩亂吸吸少氣

言輒飛颺虛損方

黃鐵 三十斤以流水八斗揚之三千遍 人參 三兩

炭 五十斤燒鐵令赤投冷水復燒七遍如此澄清取汁二斗煮藥 半夏

麥門冬 各一升 白薇 黃芩 甘草

芍藥 各四兩 石膏 五兩 生薑 二兩 大棗 二十枚

右十味㕮咀內前汁中煮取六升服一升日三服兩

日令盡

黃耆湯治血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證

身體不仁如風狀方

蜀黃耆 人參 要署無 芍藥 桂心 各二兩

生薑 六兩 大棗 十二枚

右六味㕮咀以水六升煮取二升服七合日三服令

盡

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:09
列印頁數：601
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治遊風行走無定腫或如盤大或如甌或著腹背或著臂或著脚悉主之方

海藻 茯苓 防風 獨活 附子 白朮 各三兩 大黃 五兩 當歸 一本作當陸商 鬼箭 二兩 各

右九味㕮咀以酒二斗漬五日初服二合漸加以知為度

白斂散治風痺腫筋急展轉易常處方

白斂 半兩 附子 六銖

右二味治下篩酒服半刀圭日三不知增至一刀圭身中熱行為候十日便覺

治風痺遊走無定處名曰血痺大易方

薑蘗 薯蕷 牛膝 澤瀉 各二兩

地膚子 白朮 各半兩 乾漆 蠐螬

狗脊 車前子 天雄 各十銖 茵芋 六銖

山茱萸 三十銖 乾地黃 二兩半

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:09
列印頁數：602
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十四味為末蜜和丸如梧子大酒下十丸日三後稍加

治諸風痺方

防風 甘草 當歸 各一兩 茯苓 各二兩 生薑 五兩 大棗 三十枚 黄芩 桂心 秦艽 葛根 各二兩 杏仁 五十枚

右十一味咬咀以酒水各四升煮取三升分三服取汗

附子酒治大風冷痰癖脹滿諸痺方

大附子一枚重二兩者亦云二枚酒五升漬春五日每服一合日再以瘥為度

麻子酒治虚勞百病傷寒風濕及婦人帶下月水往來不調手足疼痺著牀服之令人肥健方

麻子一石 法麴一斗

右二味先擣麻子成末以水二石著釜中蒸麻子極熟炊一石米傾出滓隨汁多少如家醞法候熟取清

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

酒隨性飲之

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:10
列印頁數：604
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷二十九至三十一

詳校官太醫院醫士臣舒仡

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄監生臣秦聯登

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷二十九　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

傷寒方

傷寒例第一

論曰易稱天地變化各正性命然則變化之迹無方性命之功難測故有炎涼寒燠風雨晦冥水旱妖災蟲蝗怪異四時八節種種施化不同七十二候日月運行各別終其晷度方得成年是謂歲功畢矣天地尚且如然在人安可無事故人生天地之間命有遭際時有否泰吉凶悔各苦樂安危喜怒愛憎存亡憂畏關心之慮日有千條謀身之道時生萬計乃度一日是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故有天行瘟疫病者即天地變化之一氣也斯蓋造化必然之理不得無之故聖人雖有補天立極之德而不能廢之雖不能廢之而能以道御之其次有賢人善于攝生能知撙節與時推移亦

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:11
列印頁數：606
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

得保全天地有斯瘴癘還以天地所生之物以防備之命曰知方則病無所侵矣然此病也俗人謂之橫病多不解治皆曰日滿自差以此致枉者天下大半凡始覺不佳即須救療迄至于病愈湯食競進折其毒勢自然而差必不可令病氣自在恣意攻人拱手待斃斯為誤矣今小品曰古今相傳稱傷寒為難治之疾時行瘟疫是毒病之氣而論治者不判傷寒與時行瘟疫為異氣耳云博採羣經以為上下兩卷廣設備擬好養者可得詳焉

傷寒是雅士之辭天行瘟疫是田舍間號耳不說病之異同也考之衆經其實殊異矣所宜不同方說宜別是以略說其要經言春氣温和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣凛冽此四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷于寒或觸冒之者乃為傷寒耳其傷于四時之氣皆能為病而以傷寒為毒者以其最為殺厲之氣也中而即病名曰傷寒不即病者其寒毒藏于肌骨中至春變為温病至夏變為暑病暑病熱極重于温也是

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:11
列印頁數：607
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以辛苦之人春夏多溫病熱病者皆由冬時觸冒寒冷之所致非時行之氣也凡時行者是春時應暖而反大寒夏時應熱而反大冷秋時應凉而反大熱冬時應寒而反大温此非其時而有其氣是以一歲之中病無長少多相似者此則時行之氣也傷寒之病逐日深淺以施方治今世人得傷寒或始不早治或治不去病或日數久淹困乃告師師苟依方次第而療則不中病皆宜臨時消息制方乃有效耳

華佗曰夫傷寒始得一日在皮當摩膏火灸之即愈若不解者二日在膚可依法針服解肌散發汗汗出即愈即不解至三日在肌復一發汗即愈若不解者止勿復發汗也至四日在胸宜服藜蘆圓微吐之則愈若病困藜蘆圓不能吐者服小豆瓜蒂散吐之則愈也視病尚未醒醒者復一法針之五日在腹六日入胃入胃乃可下也若熱毒在外未入于胃而先下之者其熱乘虛入胃即爛胃也然熱入胃須要下去之不可留于胃中也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

胃若實熱為病三死一生皆不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出此候五死一生劇者黑斑出者此候十死一生但論人有強弱病有難易得效相倍也得病無火迫之但以猪苓散一方寸匕服之當逼與新汲水一升若二升强飲之令以指刺喉中吐之病隨手愈若不能吐者勿强與水水停則結心下也當更以餘藥吐之皆令相主不爾更致危矣若此病輩不時以猪苓散吐解之者其死殆速耳亦可先以去毒物及法針之尤佳夫飲膈實者此皆難治此則三死一生也病者過日不以時下則熱不得泄亦胃爛斑出春夏無大吐下秋冬無大發汗發汗法冬及始春大寒時宜服神丹圓亦可摩膏火炙若春末及夏月始秋此熱月不宜火炙及重覆宜服六物青散若崔文行度瘴散赤散雪煎亦善若無圓散及煎者但單煮柴胡數兩傷寒時行亦可服以發汗至再三發汗不解當與湯實者轉下之其脉朝夕

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

駃者為澼實者朝平夕駃者非澼也轉下湯為可早與但當少與勿令大下耳少與當數其間也諸虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脉不緊數故知非裏實不可下也如此內外皆不可攻而强攻之必遂損竭多死難全也此虛煩但當與竹葉湯若嘔者與橘皮湯一劑不愈為可重與也此法數用甚有效驗傷寒後虛煩亦宜服此湯

王叔和曰夫陽盛陰虛（外臺作表和裏病）汗之則死下之則愈陽虛陰盛（外臺作裏和表病）下之則死汗之則愈夫如是則神丹安可以誤發甘遂何可以妄攻虛盛之治（外臺作表裏之病）相背千里吉凶之機應若影響然則桂枝下咽陽盛則斃（外臺作表和則斃）承氣入胃陰盛以亡（外臺作裏平以亡）若此陰陽虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺狹不知不識病者殞没自謂其分至令冤魂塞於冥路夭死盈于曠野仁愛鑒此寧不傷楚夫傷寒病者起自風寒入于腠理與精氣分爭榮衛否隔周行不

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

通病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背强重此邪氣在表發汗則愈三日以上氣浮在上部填塞胸心故頭痛胷中滿當吐之則愈五日以上氣沉結在臟故腹脹身重骨節煩疼當下之則愈明當消息病之狀候不可亂投湯藥虛其胃氣也經言脉微不可吐虛細不可下又夏月亦不可下也此醫之大禁也脉有沉浮轉能變化或人得病數日方以告醫雖云初覺視病已積日在身其疹瘵結成非復發汗解肌所除當膞其脉隨時形勢救解求免也不可苟以次第為固失其機要乃致禍矣此傷寒次第病三日以内發汗者謂當風解衣夜卧失覆寒温所中并時有疾疫邪風之氣相染易為邪惡所中也至于人自飲食生冷過多腹臟不消轉動稍難頭痛身温其脉實大者便可吐下之不可發汗也

陳廩丘云或問得病連服湯藥發汗汗不出如之何答曰醫經云連發汗汗不出者死病也吾思之可蒸之如

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蒸中風法熱温之氣於外迎之不得不汗出也後以問張苗苗云曾有人作事疲極汗出卧單簟中冷得病但苦寒倦諸醫與圓散湯四日之内凡八過發汗汗不出苗令燒地布桃葉蒸之即得大汗於被中就粉傅身使極燥乃起便愈後數以此發汗汗皆出也人性自有難汗者非惟病使其然也蒸之則無不汗出也諸病發熱惡寒脉浮洪者便宜發汗温粉粉之勿令遇風當發汗而其人適失血及下大利則不可大汗也數少與桂枝湯使體潤黎黎汗出連日當自解也

論曰凡人有少苦似不如平常即須早道若隱忍不治冀望自差須臾之間以成痼疾小兒女子益以滋甚若時氣不和當自戒謹若小有不和即須治療尋其邪由及在腠理以時早治鮮不愈者患人忍之數日乃説邪氣入臟則難可制止雖和緩亦無能為也癰疽丁腫喉瘁客忤尤其為急此自養生之要也凡作湯藥不可避晨夜時日吉凶覺痛須臾即宜便治不等早晚則易愈

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:14
列印頁數：612
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

矣服藥當如方法若縱意違師不須治之也凡傷寒多從風寒得之始表中風寒入裏則不消矣未有温覆而不當與也所以爾者腹中熱尚少不能消之便更為人當不消也凡得時氣病五六日而渴欲飲水飲不能多作病矣若至七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之與之勿令極意也言能飲一斗者與五升若飲而腹滿小便澁若喘若噦不可與之勿然大汗出者欲自愈也人得病能飲水欲愈也

凡温病可針刺五十九穴又身之穴三百六十有五其三十六穴灸之有害七十九穴刺之為災

論曰夫尋方學之要以救速為貴是以養生之家須預合成熟藥以補倉卒之急今具之于左

辟温第二 方凡温病證

屠蘇酒辟疫氣令人不染温病及傷寒歲旦之方

大黄 十銖 十五銖 自朮 十銖 十八銖 桔梗 蜀椒 各十五銖 桂心 十銖 十八銖 烏頭 六兩 菠薾 十二銖

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:14
列印頁數：613
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右七味㕮咀絳袋盛以十二月晦日中懸沉井中令至泥正月朔旦平曉出藥置酒中煎數沸於東向戶中飲之屠蘇之飲先從小起多少自在一人飲一家無疫一家飲一里無疫飲藥酒得三朝還滓置井中能仍歲飲可世無病當家内外有井皆悉著藥辟温氣也又一方有防風一兩

大乙流金散辟温氣方

雄黄 三兩 雌黄 二兩 礬石 一兩半 鬼箭羽 一兩半

羚羊角 燒 二兩

右五味治下篩三角絳袋盛一兩帶心前并掛門戶上若逢大疫之年以月旦青布裹一刀圭中庭燒之温病人亦燒薰之

雄黄散辟温氣方

雄黄 五兩 朱砂 一作赤木 一兩 蒿蒲 二兩 鬼白 各二兩

右四味治下篩以塗五心額上鼻人中及耳門

預備一物栢枝散天氣不和疾病流行方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取南向社中栢東南枝曝令乾擣末酒服方寸匕神良

粉身散辟温病常用方

芎藭 白芷 藁本 各等分

右三味治下篩内米粉中以粉身

殺鬼燒藥方辟温氣

雄黄 丹砂 雌黄 各一斤

羚羊角 殺羊角亦得

蕪荑 虎骨

猳猪屎 馬懸蹄 各三兩

鬼白 鬼箭羽 野丈人 石長生

白朮 各八兩 蜜蠟 八斤

右十六味末之以蜜蠟和為丸如彈許大朝暮及夜中戶前微火燒之

虎頭殺鬼圓辟温方

虎頭 五兩 朱砂 雄黄 雌黄 各一兩半

鬼白 皂莢 蕪荑 各一兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:15
列印頁數：615
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右七味末之以蜜蠟和為丸如彈子大絳袋盛繫臂
男左女右懸屋四角晦望夜半中庭燒一圓
辟溫殺鬼圓熏百鬼惡氣方
雄黃 雌黃各二兩 殺羊角 虎骨各七兩
龍骨 龜甲 鮫鯉甲 蝟皮各三兩
樗雞十五枚 空青 芎藭 真珠各五兩
東門上雞頭一兩
右十三味末之烊蠟二十兩并手圓如梧子正旦門
戶前燒一圓帶一圓男左女右辟百惡獨宿弔喪問
病各吞一圓小豆大天陰大霧日燒一圓於戶牖前
佳
雄黃圓漢建炎二年太歲在酉疫氣流行死者極衆即
有書生丁季迴從蜀青城山來東過南陽從西市門入
見患疫癘者頗多遂于囊中出藥人各惠之一圓靈藥
霑唇疾無不瘥市中疫鬼數百餘見書生施藥悉皆驚
怖而走乃有鬼王見書生謂有道法兼自施藥感衆鬼

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

等奔走若是遂詣書生欲求受其道法書生曰吾無道法乃囊中之藥呈于鬼王鬼王觀藥驚惶扣頭乞命而走此方藥帶之入山能辟虎狼蛇蟲入水能除水怪蛟蜃

雄黄　雌黄　曾青　鬼白
真珠　丹砂　虎頭骨　桔梗
白朮　女青　芎藭　白芷
鬼督郵　蕪荑　鬼箭羽　藜蘆
菖蒲　皂莢　各一兩

右十八味末之蜜丸如彈子大絹袋盛男左女右帶之卒中惡病及時疫吞如梧子一丸燒一丸彈子戶内

赤散辟温疫氣傷寒熱病方

藜蘆　蹶蹏花　各一兩　牡丹皮　皂莢　各一兩六銖
附子　桂心　真珠　各六兩　細辛
乾薑　各十八銖

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右九味末之内真珠合治之分一方寸匕置絳囊中帶之男左女右着臂自隨覺有病之時便以粟米大内著鼻中又酒服一錢匕覆取汗日三服當取一過汗耳

又方正月旦取東行桑根如指長七寸以丹塗之懸門戶上又令人帶之斷温病不相染著方

汲水瓶一長七寸盛著病人卧席下良

又方以繩度所住户中壁屈繩即斷之治温病不相染方

以桃樹蠹屎末之水服方寸匕

又方术豉等分酒漬服之妙

又方正旦吞麻子赤小豆各二七粒又以二七粒投井中

又方新布袋盛赤豆一升内井中三日出舉家服二七枚

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方松葉末之酒服方寸匕日三服

又方常以七月七日合家吞赤小豆向日吞二七枚

又方常以七月七日男吞大豆七枚女吞小豆二七枚

又方神仙教人立春後有庚子日溫蕪菁葅汁合家大小並服不限多少

斷溫疫轉相染著乃至滅門延及外人無收視者方

赤小豆　鬼箭羽　鬼白　雄黃　各二兩

右四味末之以蜜和服如小豆一丸可與病人同床傳衣

治溫令不相染方

新布袋盛大豆一升內井中一宿出服七枚

治溫疫方

藥子二枚末水服之

又方白蜜和上色朱砂粉一兩以太歲日平旦大小勿食向東方立吞服三七丸如麻子大勿令齒近之并吞赤小豆七枚投井泉中終身勿忘此法

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方凡時行疫癘常以月望日細剉東引桃枝煮湯浴之

治癰氣方

蒜五子并皮碎之 豉心一升

右二味以三歲男兒尿二升煮五六沸去滓服之良

又方青竹茹二升以水四升煮取三升分作三服

治患霧氣者心內煩悶少氣頭痛項急起則眼眩欲倒身微熱戰掉不安時復增寒心中欲吐吐時無物方

新猪屎二升半內好酒一升攪令散以生布絞取汁更以綿濾頓服之取盡即地鋪暖卧覆蓋鋪前著火常汗出若得汗當細細去上衣勿使心寒寒即不差

看汗自乾乃起慎風冷亦治瘧及風勞蟲毒

治肝腑臟溫病陰陽毒頸背雙筋牽先寒後熱腰强急

縮目中生花方

梔子各三兩 柴胡五兩 石膏

桂心一兩 白朮 芒硝 大青

生薑各八兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:17
列印頁數：620
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生地黃　香豉　各一升

右十味㕮咀水九升煮取三升分三服

治肝腑臟温病陰陽毒先寒後熱頸筋攣牽面目赤黃身中直强方

升麻　芒硝　各三兩

車前草　曝切二升

玄參　一兩　細辛　二兩　梔子　黃芩

右九味㕮咀以水一斗半煮竹葉車前取七升去滓下諸藥煎至三升芒硝分三服

治心腑臟温病陰陽毒戰掉不安驚動方

大青　黃芩　梔子　知母

芒硝　各三兩　麻黃　四兩　玄參　六兩　石膏

生葛根　各八兩　生地黃　切一升

右十味㕮咀以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服

治脾腑臟温病陰陽毒頭重頸直皮肉痺結核隱起方

石膏　八兩　竹葉　切五升

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大青　羚羊角　升麻　射干
芒硝 各二兩　梔子 四兩　寒水石 五兩　玄參 八兩
右八味㕮咀以水七升煮取三升分三服
治肺腑臟温病陰陽毒咳嗽連續聲不絶嘔逆方
麻黄　梔子　紫菀　大青
玄參　葛根 各三兩　桂心　甘草 各二兩
右十一味㕮咀以水九升煮取三升分作三服
杏仁　前胡 各四兩　石膏 八兩
右九味㕮咀以水九升煮取二升半下芒硝分三服
治腎腑臟温病身面如刺腰中欲折熱毒内傷方
茵蔯蒿　梔子　芒硝 各三兩　苦參
生葛 各四兩　生地黄　石膏 各八兩　蔥白
豉 各一升
菱黍湯治温風之病脉陰陽俱浮汗出體重其息必喘
其形狀不仁嘿嘿但欲眠下之者則小便難發其汗者
必讝語加燒針者則耳聾難言但吐下之則遺失便利

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:18
列印頁數：622
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

如此疾者宜服之方

萎蕤　白薇　麻黃　獨活　杏仁　芍藥　甘草　青木香　各二兩　石膏三兩

右九味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服取汗

若一寒一熱加朴硝一分及大黃三兩下之如無木香可用麝香一分小品方云萎蕤湯治冬温冬春月中風傷寒則發熱頭腦痛咽喉乾舌強骨肉疼心胸痞滿腰背強亦治風温

夫鬰病與百合狐惑濕風温病鬼魅皆相類宜精察節氣其新故二氣相搏喜成此疾

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:18
列印頁數：623
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷三十　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

傷寒方

傷寒膏第三　方

青膏治傷寒頭痛項强四肢煩疼方

當歸　芎藭　蜀椒　白芷　吳茱萸　附子　烏頭　甘草　各三兩

右八味咀以醇苦酒漬之再宿以猪脂四斤煎令藥色黃絞去滓以温酒服棗核大三枚日三服取汗不知稍增可服可摩如初得傷寒一日苦頭痛背强宜摩之佳

黃膏治傷寒赤色頭痛項强賊風走風方

大黃　附子　細辛　乾薑　蜀椒　桂心　各半兩　巴豆　五十枚

右七味咀以醇苦酒漬一宿以臘月猪脂一斤煎

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

之調適其火三上三下藥成傷寒赤色發熱酒服梧子大一枚又以火摩身數百過兼治賊風絶良風走肌膚遊風所在摩之神效千金不傳此趙泉方也

白膏治傷寒頭痛向火摩身體酒服如杏核一枚温覆取汗摩身當千過藥力乃行并治惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍皆治之先以鹽湯洗瘡以布拭之傅膏癰腫火炙摩千過日再自消者方

天雄　烏頭　莽草　羊躑躅　各三兩

右四味㕮咀以苦酒三升漬一夕作東向竈又作十二聚濕土各一升許大取成煎猪脂三斤著銅器中加竈上炊以葦薪令釋内所漬藥炊令沸下著土聚上沸定復上如是十二過令土盡徧藥成去滓傷寒咽喉痛含如棗核一枚日三摩時令勿近目

度瘴發汗青散治傷寒赤色惡寒發熱頭痛項强體疼

發汗散第四　方

方

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:19
列印頁數：625
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麻黃 三兩半
桔梗 細辛 吳茱萸
防風 白术 各一兩
烏頭 乾薑
蜀椒 桂心 各一兩六銖
右十味治下篩温酒服方寸匕温覆取汗汗出止若不得汗汗少不解復服如法若得汗足如故頭痛發熱此為内實當服駃豉圓若薤氏圓如得便頭重者可以二大豆許内鼻孔中覺燥涕出一日可三四度必愈兼辟時行病

五苓散主時行熱病但狂言煩躁不安精彩言語不與人相主當者方

猪苓 白术 茯苓 各十八銖
桂心 十二銖
澤瀉 三十銖
右五味治下篩水服方寸匕日三多飲水汗出即愈

崔文行解散治時氣不和傷寒發熱者方

桔梗 細辛 各四兩
白术 八兩
烏頭 一斤
右四味治下篩若中傷寒服錢五匕覆取汗解若不

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:19
列印頁數：626
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

覺復小增之以知為度若時氣不和旦服錢五匕辟惡氣欲省病服一服皆酒服

六物青散治傷寒赤色惡寒方

右六味治下篩以温酒服五匕不知稍增之服後食頃不汗出者進温粥一杯以發之温覆汗漿漿可也勿令流離勿出手足也汗出止若汗大出不止者温粉粉之微者不須粉不得汗者當更服之得汗而不解者當服神丹丸方出發汗下篇

青散治春傷寒頭痛發熱方出温病門

粉粉之微者不須粉不得汗者當更服之得汗而不解者當服神丹丸方出發汗下篇

青散治春傷寒頭痛發熱方出温病門

右七味治下篩覺傷寒頭痛發熱以白湯半升和藥方寸匕投湯中熟訖去滓盡服覆取汗汗出温粉粉之良久一服不除宜重服之或當微下利者有大黄

附子 白朮 各一兩
桔梗 烏頭 各三兩
防風 細辛 各一兩
十八銖

細辛 各二兩 麻黄 五兩

苦參 厚朴 各三十銖 石膏 大黄 各一兩 烏頭 五枚

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

故也

詔書發汗白薇散治傷寒三日不解者方

白薇 十二銖
杏仁 各十八銖
貝母 各十八銖
麻黃 一兩八銖

右四味治下篩酒服方寸匕自覆汗出即愈

華佗赤散治傷寒頭痛身熱腰背强引頸及風口噤瘧不絶婦人産後中風寒經氣腹大方

丹砂 十二銖
蜀椒
細辛
黃芩
防已
桂心
蜀漆
乾薑

茯苓 人參 女萎 烏頭 各十八銖 雄黃 二十四銖 吳茱萸 三十銖 沙參 桔梗 各二兩半

右十八味治下篩酒服方寸匕日三耐藥者二匕覆令汗出欲治瘧先發一時所服藥二匕半以意消息之細辛薑桂丹砂雄黃不熬餘皆熬之

赤散治傷寒頭痛項强身熱腰脊痛徃來有時方

乾薑
防風
沙參
細辛

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:20
列印頁數：628
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白朮　人參　蜀椒　茯苓
麻黃　黃芩　代赭　桔梗
吳茱萸　各一兩　附子　二兩
右十四味治下篩先食酒服一錢匕日三
烏頭赤散治天行疫氣病方
烏頭　一兩半　皂莢　兩半　雄黃　細辛
桔梗　大黃　各一兩
右六味治下篩清酒若井花水服一刀圭日二不知
稍增以知為度除時氣疫病若牛馬六畜中水行疫
亦可與方寸匕人始得病一日時服一刀圭取兩大
豆許吹著兩鼻孔中
水解散治時行頭痛壯熱一二日方
桂心　甘草　大黃　各二兩　麻黃　四兩
右四味治下篩患者以生熟湯浴訖以暖水服方寸
匕日三覆取汗或利便差丁強人服二方寸匕　延年秘録
有黃芩芍藥各二兩古今録驗無甘草有芍藥治天行熱病生瘡瘡疼痛及解肌出汗

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:20
列印頁數：629
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治時病表裏大熱欲死方

大黃　寒水石　芒硝　石膏

升麻　麻黃　葛根　紫葛

右八味等分治下篩水服方寸匕日二

發汗湯第五　例方　桂枝證

例曰大法春夏宜發汗凡發汗欲令手足皆周至漐漐解當更重發汗汗出多則亡陽陽虛不可重發汗也凡然一時間許益佳但不可令如水流離霢霂耳若病不服湯藥發汗中病便止不必盡劑也凡云可發汗而無汗者圓散亦可用要以汗出為解然不及湯隨證良驗凡病無故自汗出復發其汗愈衛復和故也

夫脉浮者病在外可發汗宜桂枝湯

夫陽脉浮大而數者亦可發汗為宜桂枝湯

夫病常自汗出者此為榮氣和榮氣和而外不解此為衛氣不和也榮行脉中衛行脉外復發其汗衛和則愈宜桂枝湯

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:21
列印頁數：630
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夫病人臟無他病時時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和故也先其時發汗則愈宜桂枝湯

太陽病發熱汗出者此為榮弱衛强故令汗出欲抶邪風宜桂枝湯

太陽病頭痛發熱汗出惡風寒宜桂枝湯

太陽病下之微喘者表未解也宜桂枝加厚朴杏仁湯

太陽病外證未解者不可下宜桂枝湯

太陽病先發其汗不解而下之其脉浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈今脉浮故在外當須解其表則愈宜桂枝湯

太陽病下之氣上衝者可與桂枝湯不上衝不可與

凡桂枝本為解肌若脉浮緊發熱無汗者勿與之當知此勿誤也

凡酒客勿與桂枝湯若服必嘔

凡服桂枝湯吐者後必吐膿血也

桂枝湯治中風其脉陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

者汗自出漉漉惡風淅淅惡寒嗡嗡發熱鼻鳴乾嘔方

桂枝　芍藥　大棗十二枚　生薑各三兩　甘草二兩

右五味咬咀三物切薑擘棗以水七升煮棗令爛去滓乃内諸藥水少者益之煮令微沸得三升去滓服一升日三小兒以意減之初服少多便得汗出者小潤其間不得汗者小促其間令藥勢相及汗出自護如法特須避風病若重宜夜服若服一劑不解病證不變者當復服之至有不肯汗出服兩三劑乃愈服此藥食頃飲熱粥以助藥力

麻黄湯治傷寒頭及腰痛身體骨節疼發熱惡寒不汗而喘方

麻黄三兩　桂心　甘草各二兩　杏仁七十枚喘不甚用五十枚

右四味咬咀以水九升煮麻黄減二升去沫内諸藥煮取二升半絞去滓服八合覆令汗

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:21
列印頁數：632
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大青龍湯治中風傷寒脉浮緊發熱惡寒身體疼痛汗不出煩躁方

麻黃 六兩　桂心　甘草 各二兩　石膏 如雞子一枚碎　生薑 三兩　杏仁 四十枚　大棗 十二枚

右七味㕮咀以水九升煮麻黃去沫乃内諸藥煮取三升分服一升厚覆當大汗出温粉粉之即止不可再服服之則筋惕肉瞤此為逆也不汗乃再服

陽毒升麻湯治傷寒一二日便成陰毒或服藥吐下之後變成陽毒身重腰背痛煩悶不安狂言或走或見鬼或吐血下痢其脉浮大數面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治至七日不可治宜服方

升麻　甘草 各兩半　當歸　蜀椒 各六銖　雄黃　桂心 各六銖

右六味㕮咀以水五升煮取二升半分三服如人行五里進一服温覆手足毒出則汗汗出則解不解重作服之得吐亦佳 仲景無桂心有鼈甲手大一片肘後與千金同古今録驗有梔子六

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:22
列印頁數：633
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鉢鱉甲如手一片

陰毒甘草湯治傷寒初病一二日便結成陰毒或服藥六七日已止至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脉沉細緊數仲景云此陰毒之候身如被打五六日可治至七日不可治也方

甘草　升麻　各半兩　當歸　蜀椒　各六銖　鼈甲一兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升半分三服如人行五里頃更進一服溫覆發汗毒當從汗出汗出則愈若不汗則不除重作服　仲景方去蜀椒

陰旦湯治傷寒肢節疼痛内寒外熱虛煩方

芍藥　甘草　各二兩　乾薑　黄芩　各三兩　桂心四兩　大棗十五枚

右六味㕮咀以水一斗煮取五升去滓温服一升日三夜再服令小汗

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:22
列印頁數：634
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

陽旦湯治傷寒中風脉浮發熱往來汗出惡風頭項强
鼻鳴乾嘔桂枝湯主之隨病加減如左方
以泉水一斗煮取四升分服一升日三自汗者去桂
枝加附子一枚渴者去桂加栝蔞三兩利者去芍藥
桂加乾薑三累附子一枚炮心下悸者去芍藥加茯
苓四兩虛勞裏急正陽旦主之煎得二升内膠飴半
斤為再服若脉浮緊發熱者不可與之
六物解肌湯治傷寒發熱身體疼痛方

葛根 四兩
茯苓 三兩
麻黄 三兩
牡蠣 三兩
生薑 各二兩
甘草 一兩

右六味咬咀以水八升煮取二升分三服再服後得
汗汗通即止古今録驗無生薑甘草者
解肌湯治傷寒溫病方

葛根 四兩
麻黄 三兩
甘草 二兩
芍藥
大棗 十二枚

右六味咬咀以水一斗煮取三升飲一升日三服三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

四日不解脉浮者宜重服發汗脉沉實者宜以駃豉

丸下之 延年秘録有桂心一兩

治傷寒時氣温疫疼痛壯熱脉盛始得一二日者方

丹砂一兩末之以水一斗煮取一升頓服之覆取汗

治疫氣傷寒三日已前不解者方

好豉 一升綿裹 葱白 一升切 小男兒尿 三升

右三味先熬豉葱令相得則投小便煮取二升分再

服徐徐服之覆令汗神驗

解肌升麻湯治時氣三四日不解方

升麻 芍藥 石膏 麻黄

甘草 各一兩 杏仁 三十枚一作貝 貝齒 三枚一作貝母十八銖

右七味㕮咀以水三升煮取一升盡服温覆發汗便

愈

葛根龍膽湯治傷寒三四日不差身體煩毒而熱方

葛根 八兩 龍膽 各一兩 石膏 各一兩

葛根 龍膽 各半兩 大青 升麻

甘草 桂心

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:23
列印頁數：636
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芍藥　黃芩　麻黃各二兩　生薑三兩

右十二味㕮咀以水一斗煮葛根取八升内餘藥煮取三升分四服日三夜一

治傷寒四五日頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食方

梔子仁　黃連　好豉一升　葱白七莖

黃蘗　大黃各半兩

右六味㕮咀以水八升煮上四物六七沸内後葱白豉煮得三升頓服一升日三服湯訖温覆令汗出粉之得汗便止後服勿復取汗不得汗者復服重發此藥無忌特宜老小神良

七物黃連湯治夏月傷寒四肢煩疼發熱其人喜煩嘔逆支滿劇如禍祟寒熱相搏故令喜煩方

黃連　茯苓　甘草一兩六銖　小麥三合　黃芩各十八銖　芍藥

右各㕮咀以水七升煮取三升冷分三服不能一升者可稍稍服之湯勢安乃卧藥主毒氣服湯之後胸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中熱及咽喉痛皆差其明日復煮一劑如法服之此湯無毒但除熱下氣安病人小兒服者取三分之一以水四升煮得二升稍稍服

三匕湯治傷寒中風得之三日至七八日不解胸脇痛四肢逆乾嘔水漿不下腹中宿食不消重下血一日數十行方

茯苓 如雞子大 各半
芒硝 各一升
乾地黄 各一升
黄芩 各三兩
大黄 各四兩
人參 各三兩
栝蔞根 四兩
麻黄 半兩
薰陸香 一兩
雞舌香 各一兩
沉香 一兩
青木香 一兩
麝香 半兩
麻黄 一兩
防風 一兩
獨活 一兩

寒水石 各半斤

右九味㕮咀令相得以散三方寸匕水一升煮令三沸絞去滓服之日三温覆汗出即愈病劇與六七匕

五香麻黄湯治傷寒忽發腫或著四肢或在胸背虚腫浮如吹狀亦著頭面唇口頸項劇者偏著脚脛外如軸大而不痛不赤著四肢者乃欲不遂悉主之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

秦艽 萎蕤 枳實 各二兩 甘草 各二兩 白薇

右十三味咬咀以水九升煮取三升分三服覆取汗

後外摩防己膏

治傷寒三日外與前藥不差脉勢仍數者陽氣猶在經絡未入臟腑方

桂枝 黄芩 葛根 生薑 各三兩 甘草 各二兩 芍藥 六兩 升麻 石膏 八兩 梔子 二七枚

右九味咬咀以水九升煮取二升七合分三服相去十里久若前兩服訖即得汗後服即停不得汗更進一服得汗即止不得汗者明日去梔子加麻黄二兩足水二升再依方服

雪煎治傷寒方

麻黄 十斤 大黄 一斤十二兩 杏仁 三斗四升

右三味咬咀以雪水五斛四斗漬麻黄于東向竈釜

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中三宿内大黄攪令調炊以桑薪煮得二斛汁去滓復内釜中擣杏仁内汁中復炊之可餘六七斗汁絞去滓置銅器中又以雪水三斗合煎之攪令調得二斗四升藥成可丸冷凝丸如彈丸有病者以三沸白湯五合研一丸入湯中適寒温之立汗出若不愈者復服一丸窓盛藥勿令泄氣

備急千金要方卷三十

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:25
列印頁數：640
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

欽定四庫全書

備急千金要方卷三十一　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

傷寒方

發汗圓第六　方

神丹圓治傷寒赤濇惡寒發熱體疼者方

附子　烏頭　各四兩　人參　茯苓

半夏　各五兩　朱砂　一兩

右六味末之蜜圓以真丹為色先食服如大豆二圓

生薑湯下日三須臾進熱粥二升許重覆汗出止若

不得汗汗少不解復服如前法若得汗足應解而不

解者當服桂枝湯此藥多毒熱者令飲水寒者温飲

解之治瘧先發服二圓　要署用細辛不用人參別有射干棗大一枚名赤圓主寒氣厥逆

麥奴圓治傷寒五六日以上不解熱在胸中口噤不能

言惟欲飲水為壞傷寒醫所不能治為成死人精魂已

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

竭心下纔温以杖發其口開灌藥咽中藥得下則愈麥奴圓一曰黑奴圓二曰水解圓

釜底墨　竈突墨　梁上墨　麥奴

黄芩　大黄　芒硝各一兩　麻黄二兩

右八味末之蜜圓如彈子大以新汲水五合研一圓破漬置水中當藥消盡服之病者渴欲飲水極意不問升數欲止復强飲能多飲為善不欲飲水當强飲之服藥須臾當寒寒竟汗出便解若服藥日移五尺許不汗復服如前法不過再三服佳小麥黑勃名麥奴

宜吐第七　例方證

例曰大法春宜吐凡服吐藥中病便止不必盡劑也病如桂枝證頭不痛項不强而脉寸口浮胸中鞕滿氣上衝喉咽不得息者此以内有久痰宜吐之病胷上諸寒胷中鬱鬱而痛不能食欲得使人按之按之反有涎出不利口十餘行而其人脉遲寸脉微滑者

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:25
列印頁數：642
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

此宜吐之吐之利即止少陰病飲食入口即吐心中愠愠然欲吐復不能吐者宜吐之宿食在上管宜吐之病手足逆冷脉乍結者客氣在胸中心下滿而煩飢不能食者以病在胸中宜吐之

瓜蒂散病如桂枝證頭不痛項不强寸脉微浮胷中痞堅氣上撞咽喉不得息者此為胷有寒也宜吐之

瓜蒂　赤小豆　各一兩

右二味治下篩取一錢匕香豉一合熟湯七合煮作稀粥去滓取汁和散温頓服之不吐者少少加得快吐乃止　張文仲以白湯三合和服

水導散治時氣病煩熱如火狂言妄語欲以　闕

按目録宜吐第七水導散後尚有藜蘆圓今俱缺其次則宜下第八有例有證有大承氣湯今亦缺而甘遂以下六味正大承氣湯藥品也中間脱落一二葉須覓善本補之

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:26
列印頁數：643
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甘遂 半兩
枳實 五枚
芒硝 三合
右六味㕮咀以水一斗先煮厚朴枳實取五升去滓內大黃煎取二升去滓下芒硝更煎一兩沸分再服得快利止

白芷 二兩
大黃 四兩
厚朴 八兩
抵党圓下血方
水蛭 亟蟲 各二十枚
桃仁 二十二枚
大黃 三兩
右四味為末蜜和合分為四丸以水一升煮一丸取七合頓服之晬時當下血不下更服

抵党湯治同前
水蛭 亟蟲 各三十枚
桃仁 二十三枚
大黃 三兩
右四味㕮咀以水五升煮取三升去滓服一升不下更服

承氣湯方
枳實 五枚
芒硝 半升
大黃 四兩
甘草 二兩
右四味㕮咀以水五升煮取二升去滓適寒温分三服

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:26
列印頁數：644
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

如人行五里進一服取下利為度若不得利盡服之

生地黃湯治傷寒有熱虛羸少氣心下滿胃中有宿食大便不利方

生地黃 三斤 大黃 四兩 甘草 一兩 芒硝 二合 大棗 二十枚

右五味合濤令相得蒸五升米下熟絞取汁分再服

大柴胡萎蕤知母湯治傷寒七八日不解默默心煩腹中有乾屎讖語方

柴胡 半斤 萎蕤 知母 大黃 甘草 各二兩 人參 黃芩 各三兩 芍藥 各三兩 生薑 五兩 半夏 半升 大棗 二十枚

右十味㕮咀以水一斗煮取三升去滓服一升日三即下為效 集驗用枳實四枚不用芍藥

治傷寒頭痛壯熱百節疼痛方

柴胡 栀子仁 芍藥 知母 各四兩 升麻 黃芩 大青 杏仁 各三兩

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

石膏 八兩　香豉 一升

右十味㕮咀以水九升煮取二升七合分温三服若熱盛加大黄四兩

駃豉圓治傷寒留飲宿食不消方

豆豉 一升　巴豆 去油三百枚 今用二百枚　杏仁 六十枚

黄芩　黄連　芒硝　甘遂 各三兩　大黄　麻黄 各四兩

右九味為末以蜜和丸如大豆服二丸不得下者增之 崔氏云此黄素方

發汗吐下後第九 脉證方 灸法

發汗吐下後飲水多必喘宜慎也

桂枝湯

凡發汗後飲水者必喘宜慎也

竹葉湯治發汗後表裏虚煩不可攻者但當與此方

竹葉 二把　半夏 半升　麥門冬 一升　人參 甘草 各二兩　生薑 四兩　石膏 一斤

傷寒已解半日許復心煩熱其脉浮數者可更發汗宜

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:27
列印頁數：646
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右七味㕮咀以水一斗煮取六升去滓内粳米半升米熟去之分服一升日三 張文仲不用生薑

桂枝麻黄湯服桂枝湯大汗後脉洪大者與桂枝湯若形如瘧一日再發汗出便解者屬桂枝二麻黄一湯方

桂枝 一兩十七銖 麻黄 一兩十六銖 芍藥 生薑 各一兩六銖 甘草 一兩二銖 杏仁 十六枚 大棗 五枚

右七味㕮咀以水五升煮麻黄再沸去沫内諸藥煮取二升適寒温分再服取微汗而已

小青龍湯治傷寒表未解心下有水氣乾嘔發熱而眩或渴或利或噎或小便不利小腹滿或喘者方

芍藥 細辛 各三兩 五味子 半夏 各半升 桂心 麻黄 甘草 乾薑

右八味㕮咀以水一斗煮麻黄減二升去上沫内諸藥煮取三升分三服相去十里頃復服之若渴者去半夏加栝蔞根三兩若微利去麻黄加芫花如一雞子大熬令赤色若噎加附子一枚若小便不利小腹

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:27
列印頁數：647
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

滿者去麻黃加茯苓四兩若喘去麻黃加杏仁半升
數用神效
四物甘草湯治傷寒發汗出而喘無大熱與此方
甘草二兩 麻黃四兩 石膏半斤 杏仁五十枚
右四味㕮咀以水七升先煮麻黃令減二升內諸藥
煎取三升分三服
梔子湯治發汗若下後煩熱胸中窒氣逆搶心者方
梔子十四枚 香豉四合綿裹
右二味以水四升先煮梔子取二升半次內豉煮取
一升半分二服溫進一服得快吐止後服
厚朴湯治發汗後腹脹滿方
厚朴半兩 人參一兩 甘草二兩 生薑八兩
半夏一升
右五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服
玄武湯治太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸
頭眩身瞤動振振欲擗地方

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:28
列印頁數：648
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

茯苓　芍藥　生薑各三兩　白朮二兩　附子一枚

右五味㕮咀以水八升煮取三升温服七合

葛根黄連湯治太陽病反下之利遂不止脉促者表未解喘而汗出者方

葛根半斤　黄連　黄芩各三兩　甘草二兩

右四味㕮咀以水八升先煮葛根減二升次内諸藥煮取二升去滓分再服

右四味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服

茯苓湯治傷寒發汗吐下後心下逆滿氣上衝胸起即頭眩其脉沈緊發汗則動經身為振振搖者方

茯苓四兩　白朮　桂心各三兩　甘草二兩

右四味㕮咀以水六升煮取三升去滓分三服

凡寸口脉浮關上自沈為結胸（藥治作沈細）

凡傷寒病發于陽而反下之熱入因作結胸

太陷胸圓治結胸病頃亦彊如柔痙狀下之即和方

大黄八兩　芒硝　杏仁　蝱蟲各五合

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:28
列印頁數：649
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右四味擣篩大黃蓼蘆餘二味別研如脂和散取如
彈丸大一枚甘遂末一錢匕白蜜二合水一升煮取
八合溫頓服之病乃自下如不下更服取下為效
傷寒六七日結胸熱實其脈沈緊心下痛按之正堅宜
大陷胸湯
太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上乾而渴
日晡有小潮熱心胸大煩從心下至小腹堅滿痛不可
近宜大陷胸湯方

甘遂 末一錢匕 大黃 切六兩 芒硝 一升

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓次內芒硝
一沸次內甘遂分再服一服得快利止後服
甘草瀉心湯傷寒中風醫反下之其人下痢日數十行
穀不化腹中雷鳴心下痞堅結滿乾嘔心煩不能得安
既見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但
以胃中虛客氣上逆使之然也宜治之方
甘草 四兩 黃芩 乾薑 各三兩 黃連 一兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:29
列印頁數：650
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏 半升 大棗 十二枚

右六味㕮咀以水一斗煮取六升去滓分服一升日三加人參三兩乃是也

生薑瀉心湯治傷寒發汗後胃中不和心下痞堅乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下痢者方

生薑 四兩 甘草 人參 黃芩 各兩 乾薑 黃連 各一兩 半夏 半斤 大棗 十二枚

右八味㕮咀以水一斗煮取六升去滓分服一升日三

三

白虎湯治傷寒吐下後七八日不解結熱在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者方

石膏 一升 知母 六兩 甘草 二兩 粳米 六合

右四味㕮咀以水一斗煮米熟去滓分服一升日三

諸亡血及虛家不可與白虎湯若立夏後至立秋前得用之立秋後不可服春三月尚凜冷亦不可與之與之則嘔利腹痛

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:29
列印頁數：651
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

傷寒無大熱而口乾渴心煩背微惡寒宜服白虎湯
傷寒脉浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯渴欲飲
水無表證宜白虎湯
若渴欲飲水口燥舌乾者亦宜白虎湯
青箱子圓治傷寒後結熱在内煩渴者方
青箱子 五兩 黄芩 梧蘘根 苦參 各一兩
黄蘗 二兩 龍膽 梔子仁 黄連 各三兩
右八味為末蜜丸如梧桐子大先食後服七丸日三
不知稍加 本云錫和為丸
大青湯治傷寒熱病十日已上發汗不解及吐下後諸
藥不除及下利不止斑出皆治之方
大青 四兩 甘草 阿膠 各二兩 豆豉 一升
右四味㕮咀以水八升煮取三升去滓煮三沸去豉
内阿膠令烊頓服一升日三服欲盡復作常使有餘
渴者當飲但除熱止吐下無毒 深師治勞復肘後有赤石脂三兩胡洽集驗同

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治傷寒後不了了朝夕有熱如瘧狀方

知母 二兩　麻黃　甘草　芍藥

黃芩　桂心 各一兩

右六味㕮咀以水七升煮取二升半服五合日三溫覆令微汗若心煩不得眠其人欲飲水當稍稍飲之令胃中和則愈

江南諸師祕仲景要方不傳


灸法初得病或先頭痛身寒熱或濟濟欲守火或腰背强直面目如飲酒狀此傷寒初得一二日但烈火灸心下三處第一處去心下一寸名巨闕第二處去心下二寸名上管第三處去心下三寸名胃管各灸五十壯然或人形大小不同恐寸數有異可繩度隨其長短寸數最佳取繩從心頭骨名鳩尾頭度取臍孔中屈繩取半當繩頭名胃管又中屈半繩更分為二分從胃管向上度一分即是上管又上度取一分即是巨闕大人可灸五十壯小兒可三壯亦隨其年灸之大小以意斟量也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

若病者三四日以上宜先灸胸上二十壯以繩度鼻正上盡髮際中屈繩斷去半便從髮際入髮中灸繩頭名曰天聰又灸兩顳顬又灸兩風池又灸肝輸百壯餘處各二十壯又灸太衝三十壯神驗

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:30
列印頁數：654
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)


欽定四庫全書
子部
備急千金要方卷三十二至四
詳校官太醫院醫士臣行伋
編修臣倉聖脈覆勘
總校官中書臣朱鈐
校對官中書臣胡紹基
謄録監生臣秦聯登

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷三十二　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

傷寒方

傷寒雜病第十　論方　灸法

論曰凡除熱解毒無過苦酢等物故多用苦參青箱艾梔子葶藶苦酒烏梅之屬是其要也夫熱盛非苦酢物不解也熱在身中既不時治治之又不用苦酢等藥此如救火不以水也必不可得脫免也

又曰今諸療多用辛甘薑桂人參之屬此皆貴價難得常有比行求之轉以失時而苦參青箱葶藶艾之屬所在盡有除熱解毒最良勝于向貴價藥也前後數參並用之得病内熱者不必按藥次也便以青箱苦參艾苦酒療之但稍與促其間無不解也

扁鵲曰病在腠理湯熨之所及病在血脉針石之所及病在骨髓無可奈何而凡醫治病或言且待使病成乃

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

頓去之此為妄矣當預約束家中及所部曲具語解此意使有病者知之為要

治温氣病欲死方

苦參一兩以酒二升煮取一升盡飲之當吐則除諸毒病服之覆取汗皆愈 張文仲及肘後云治熱毒氣死破棺千金湯

苦參湯治熱病五六日已上方

苦參 三兩

黄芩 二兩

生地黄 八兩

右三味㕮咀以水八升煎取二升適寒温服一升日再

凝雪湯治時行毒病七八日熱積聚胸中煩亂欲死起死人搦湯方

芫花一升以水三升煮取一升半漬故布薄胷上不過三薄熱即除當温暖四肢護厥逆也

栝蔞湯治傷寒中風五六日已上但胷中煩乾嘔方

栝蔞實 一枚

黄芩 甘草 各三兩

生薑 四兩

大棗 十二枚

柴胡 半斤

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:31
列印頁數：657
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右六味㕮咀以水一斗二升煮取五升絞去滓適寒温服一升日三

蘆根飲子治傷寒後嘔噦反胃及乾嘔不下食方

生蘆根 切 一升 各一
青竹茹 各一
粳米 三合
生薑 三兩

右四味以水七升先煮千里鞋底二隻取五升澄清下藥煮取二升半隨便飲不瘥重作取瘥

治傷寒後嘔噦方

通草 三兩
生蘆根 切 一升
橘皮 一兩
粳米 三合

右四味㕮咀以水五升煮取二升隨便稍飲不瘥更作取瘥止

治傷寒後虛羸少氣嘔吐方

石膏 麥門冬 各半夏 各一升
竹葉 二把

右五味㕮咀以水一斗煮取六升去滓内粳米一升米熟湯成飲一升日三服一方加生薑五兩 此方正是仲景竹葉湯方前卷汗後門中已有此方仍少甘草分兩不別

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治熱毒攻手足赤腫燃熱疼腫痛欲脫方

煮馬屎若羊屎汁漬之日三度

又方濃煮虎杖根適寒温以漬手足令至踝上一尺止

又方稻穰灰汁漬之

又方取好酒煮苦參以漬之

又方猪膏和羊屎塗之亦佳

又方取常思草絞取汁以漬之一名蒼耳

漏蘆連翹湯治時行熱毒變作赤色癰疽丹疹毒熱赤腫赤痛生障醫方

漏蘆　連翹　黄芩　麻黄

白朮　升麻　甘草　各一兩　枳實

大黄　各三兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服相去如人行五里久更服熱盛者可加芒硝二兩

猪膽湯治傷寒五六日斑出方

猪膽　苦酒　各三合　雞子　一枚

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:32
列印頁數：659
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右三味合煎三沸强者盡服之羸者須煎六七沸分為二服汗出即愈

治人及六畜時氣熱病疏豆瘡方

濃煮黍穰汁洗之一莖是稭穰即不瘥瘡若黑者擣蒜封之

又方煮芸薹洗之

治熱病後豌豆瘡方

黄連三兩以水二升煮取八合頓服之

又方真波斯青黛大如棗水服之瘥

又方青木香二兩以水三升煮取一升頓服之愈

又方若赤黑發如疥大（一作疾）火者煎羊脂摩傅之

又方小豆屑雞子白和而傅之

又方以婦人月水帛拭之

又方小兒著取月水汁和水浴之

又方灸兩手腕硯子骨尖上三壯男左女右

木香湯治瘡煩疼者方

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:32
列印頁數：660
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

青木香 二兩　薰陸香　礬石　丁香 各一兩
麝香 半兩

右五味咬咀以水四升煮取一升半再服熱毒盛者加犀角一兩無犀角以升麻代之病輕者去礬石神良此病小便澀有血者内壞瘡皆黑靨不出膿者死不治也

又方苎硝和猪膽塗上勿動痂落無痕仍卧黄土末上

驗

治内發瘡盛方

酢 四合　大猪膽 一具

右二味合煎三沸服一合日五服之良

治豌豆瘡初發覺欲作者方

煮大黄五兩服之愈

治時行病發瘡方

取好蜜徧身摩瘡上亦可以蜜煎升麻摩之并數數食之

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:33
列印頁數：661
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治傷寒鼻衄肺間有餘熱故也熱因血自上不止用此方

牡蠣二兩半 石膏一兩六銖

右二味治下篩酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧子大用治大病瘥後小勞便鼻衄者

治傷寒熱病喉中痛閉塞不通方

生烏扇一斤切 猪脂一斤

右二味合煎藥成去滓取如半雞子大薄綿裹之內喉中稍稍咽之取瘥

又方

升麻 芍藥 羚羊角各三兩 通草四兩

射干二兩 生蘆根一升切

右六味㕮咀以水七升煮取二升半分作二服

治熱病口中苦下氣除熱喉中鳴煎方

石膏半升 蜜一斤

右二味以水三升先煮石膏取二升次內蜜復煎取

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

如餳含如棗核許盡復含之大良

治傷寒熱病後口乾喜唾咽痛方

大棗二十枚　烏梅十枚

右二味合擣蜜和含如杏核大咽其汁甚驗矣

禹餘粮湯傷寒服湯藥而下利不止心下痞堅服瀉心湯竟復以他藥下之利不止醫以理中與之而利益甚理中治中焦此利在下焦治之方

禹餘粮　赤石脂各一斤碎

右二味以水六升煮取二升分三服若不止當利小便

治傷寒後下利膿血方

阿膠一兩　黃蘗二兩　黃連四兩　梔子十四枚

右四味咬咀以水六升煮取二升去滓内阿膠更煎令消分為三服甲乙方無黃蘗有黃芩

治赤白下膿小兒得之三日皆死此有蠱蟲在下部方

麝香　礬石　巴豆　附子

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

真珠　雄黄　各等分

右六味治合取桑條如箭簳長三寸以綿纏頭二寸

唾濡綿展取藥著綿上内穀道中半日復易之日再

神效

麻黄升麻湯治傷寒六七日其人大下後脉沈遲手足

厥逆下部脉不至咽喉不利唾膿血泄痢不止為難治

者方

麻黄　知母　萎蕤亦作菖蒲　黄芩　各三兩

升麻　芍藥　當歸　乾薑

石膏　茯苓　白朮　桂心

甘草　麥門冬　各二兩

右十四味㕮咀以水一斗先煮麻黄減二升去上沫

次内諸藥煮取三升分服一升微取汗愈

治温毒及傷寒内虚外熱攻胃下黄赤汁及爛肉汁赤

滯下伏氣腹痛諸熱毒方

梔子　二七枚　豉　一升

薤白　一握

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右三味以水四升先煮梔子薤白令熟次内豉煮取二升半分三服頻服取瘥

治病後虚腫方

豉五升 醇酒一斗

右二味煮三沸及熱頓服不耐酒者隨性覆取汗

治汗不止方

地黄三斤切以水一斗煮取三升分作三服

又方白术葉作飲飲之

又方白术方寸匕以飲服之

治卒得汗不止方

以温酒服牛羊脂愈

又方服屎亦止

治盜汗及汗無時方

以韭根四十九枚水二升煮一升頓服之為度

又方豉一升以酒二升漬三日服不瘥更合服不過三劑即止

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:34
列印頁數：665
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方死人席緣燒灰煮汁洗身瘥

止汗方

杜仲　牡蠣　各等分

右二味治下篩臨夜卧以水服五錢匕

又方

牡蠣　雷丸　麻黄　根各三兩　乾薑

甘草各一兩　米粉二升

右六味治下篩隨汗處粉之

牡蠣散治卧即盜汗風虚頭痛方

牡蠣　白朮　防風各三兩

右三味治下篩酒服方寸匕日二止汗無出此方一切泄汗服之三日皆愈

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:35
列印頁數：666
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷三十三　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

傷寒方

食忌

勞復第十一　方論

論曰凡熱病新瘥及大病之後食猪肉及羊血肥魚油膩等必當大下利醫所不能治也必至于死若食餅餌粢黍飴哺鱠炙棗栗諸菓物脯脩及堅食難消之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃氣虛冷大利難禁不下之必死下之復危皆難救也熱病及大病之後多坐此死不可不慎也

病新瘥後但得食糜粥寧少食令飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與之也引日轉久可漸食羊肉白糜若早起梳頭洗面非但體勞亦不可多言語用心使意勞羹汁雉兔鹿肉不可食猪狗肉也新瘥後當靜卧慎勿煩凡此皆令人勞復故督郵顧子獻得病已瘥未健詣

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:35
列印頁數：667
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

華敷視脉曰雖瘥尚虛未得復陽氣不足慎勿勞事餘勞尚可女勞則死當吐舌數寸其婦聞其夫瘥從百餘里來省之經宿交接中間三日發熱口噤臨死舌出數寸而死病新瘥未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死有士蓋正者疾愈後六十日已能行射獵以房室即吐涎而死及熱病房室名為陰陽易之病皆難治多死近者有一士大夫小得傷寒瘥已十餘日能乘馬行來自謂平復以房室即小腹急痛手足拘攣而死時病瘥後新起飲酒及韭菜病更發

病瘥後未滿五日食一切肉麵者病更發大困

時病新汗解飲冷水者損心胞令人虛補乃不復

時病新瘥食生菜令顏色終身不平復

時病新瘥食生魚酢下痢必不止

時病新瘥食生臛及羊肉者必膈上作熱蒸

時病新瘥食犬羊等肉者必作骨中蒸熱

時病新瘥食魚肉與瓜生菜令人身熱一本作腫

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

時病新瘥食蒜鱠者病發必致大困

黃龍湯治傷寒瘥後更頭痛壯熱煩悶方 仲景名小柴胡湯方

柴胡半斤 半夏半升 黃芩三兩 人參 甘草各二兩 生薑四兩 大棗十二枚

右七味㕮咀以水一斗煮取五升去滓服五合日三

不嘔而渴者去半夏加栝蔞根四兩

補大病後不足虛勞方 萬病虛勞同用

取七歲已下五歲已上黃牛新生者乳一升以水四

升煎取一升如人體温稍稍飲之不得過多十日服

不絕為佳

治傷寒温病後勞復或食或飲或動作方

梔子仁三七枚 石膏五兩 香豉一升

右四味㕮咀以水七升煮取三升分三服

治病後勞復或因洗手足或梳頭或食等勞復之方

取洗手足汁飲一合取頭中垢如棗核大吞一枚

鼠屎尖頭大者二十枚

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:36
列印頁數：669
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

枳實梔子湯治大病已後勞復者方

枳實 三枚 梔子 十四枚 豉 一升 綿裹

右三味㕮咀以酢漿七升先煎減三升次内枳實梔子煮取二升次内豉煮五六沸去滓分再服覆取汗

如有宿食者内大黄如博棊子五六枚

治病新瘥遇美飲食食過多勞復者方

取所食餘燒為末飲調服二錢匕日以三服

治新瘥早起及食多勞復者方

治重病新瘥早起勞及飲食多致發欲死方

燒鼈甲末飲服方寸匕

治食大飽不消勞復脉實者方

右四味㕮咀以水六升煮取二升分三服微取汗應

豉 一升 鼠屎 二十枚

豉 五合 鼠屎 二十一枚 尖頭者

右二味以水二升煮取一升盡服之温卧令小汗愈

崔氏加梔子七枚尤良肘後有麻子仁内一升加水一升亦可内枳實三枚蔥白一虎口

梔子 七枚 大黄 三兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:36
列印頁數：670
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

小鴨溏者止不溏者復作

治勞復垂死方

暖湯三合洗四五歲女子陰取汁内口中服即愈小

男兒亦得

麥門冬湯治勞復氣欲絶起死人方

麥門冬 一兩 甘草 二兩 京棗 二十枚 竹葉 切一升

右四味㕮咀以水七升煮粳米一升令熟去米内諸藥煎取三升分三服不能服者綿滴湯内口中用之

有效

治食勞方

麪二升煮取汁服之

又方杏仁五十枚以酢二升煎取一升服之取汗

又燒人屎灰水服方寸匕為度

欲令病人不復方

燒頭垢如梧桐子大吞服之

治傷寒瘥後一年心下停水不能食者方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生地黃五斤　白朮一斤　好麵二斤

右三味合擣令相得曝乾下篩酒服方寸匕日三加至二匕

論曰婦人溫病雖瘥未嘗平復血脉未和尚有熱毒而與之交接得病者名為陰陽之病其人身體重熱上衝胷頭重不能舉眼中生眵曚一作瞼來四肢一云膝脛拘急小腹絞痛手足拳皆即死其亦有不即死者病苦小腹裏急熱上衝胷頭重不欲舉百節解離經脉緩弱血氣虛骨髓竭便噓噓吸吸氣力轉少著床不能動搖起止仰人或引歲月方死醫者張苗說有婢得病瘥後數日有六人犯之皆死

治婦人得病易丈夫丈夫得病亦易婦人方

取女人中褌近隱處燒服方寸匕三日小便即利陰頭微腫此為愈矣女人病可取男褌一如此法

治交接勞復陰卵腫縮腹中絞痛便欲死方

取所交接婦人衣裳以覆男子立愈

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

令病人不復方

取女人手足爪二十枚女人中衣帶一尺燒以酒若

米飲汁服之

治男子新病起近房內復者方

取女人月經赤帛燒服方寸匕亦治陰卵腫縮入腹

絞痛欲死

治病後髮亂不可理通頭法

生麻油二升將頭髮解開安銅沙羅中用油淹漬之

細將釵子領髮斯須並自通矣

百合第十二 方論

論曰百合病者謂無經絡百脉一宗悉致病也皆因傷

寒虛勞大病已後不平復變成斯病其狀惡寒而嘔者

病在上焦也二十三日當愈其狀腹滿微喘大便堅三

四日一大便時復小溏者病在中焦也六十三日當愈

其狀小便淋瀝難者病在下焦也三十三日當愈各隨

其證以治之百合之為病令人意欲食復不能食或有

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

美時或有不用聞飲食臭時如有寒其實無寒如有熱其實無熱常默默欲卧復不得眠至朝口苦小便赤澀欲行復不能行諸藥不能治治之即劇吐利如有神靈所為也百合病身形如和其脉微數其候每溺時即頭覺痛者六十日乃愈百合病候之溺時頭不覺痛漸漸然寒者四十日愈百合病候之溺時覺快然但覺頭眩者二十日愈百合病證其人或未病而豫見其候者或已病四五日而出或病一月二十日後見其候者治之常誤也依證治之

論曰百合病見在于陰而攻其陽則陰不得解也復發其汗為逆也見在於陽而攻其陰則陽不能解也復下之其病不愈（要略云見于陰者以陽法救之見于陽者以陰法解之見陽攻陰復發其汗此為逆其病難治見陰攻陽乃復下之此亦為逆其病難治）

百合知母湯治百合病已經發汗之後更發者之方

百合 七枚擘
知母 三兩

右二味以泉水先洗漬百合一宿當沫出水中明旦

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

去水取百合更以泉水二升煮取一升汁置之復取知母切以泉水二升煮取一升汁合和百合汁中復煮取一升半再服不瘥更依法合服

百合滑石代赭湯治百合病已經下之後更發者方

百合七枚擘 滑石三兩 代赭一兩

右三味先以泉水漬百合一宿明旦去水更以泉水二升去滓又以水二升煮餘二味取一升內百合汁如前法復煎取一升半分再服

二升煮百合取一升去滓又以水二升煮餘二味取一升內百合汁如前法復煎取一升半分再服

右三味先以泉水漬百合一宿明旦去水更以泉水一升內百合汁如前法復煎取一升半分再服

百合雞子湯治百合病已經吐之後更發者方

以百合七枚擘浸一宿去汁以泉水二升煮取一升取雞子黃一枚內汁中攪令調分再服

百合地黃湯治百合病始不經發汗吐下其病如初者方

以百合七枚擘浸一宿去汁以泉水二升煮取一升內生地黃汁一升復煎取一升半分再服大便當去惡沫為候也

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:38
列印頁數：675
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治百合病經月不解變成渴者方

百合根一升以水一斗漬一宿以汁先洗病人身洗

身後食白湯餅勿與鹽豉也渴不瘥可用栝蔞根并

牡蠣等分為散飲服方寸匕日三

治百合病變而發熱者方

百合根一兩乾 滑石三兩

右二味治下篩飲服方寸匕日三當微利利者止勿

復服熱即除一本云治百合病小便赤澀臍下堅急

治百合病變腹中滿痛者方

但取百合根隨多少熬令黃色擣篩為散飲服方寸

匕日三滿消痛止

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:39
列印頁數：676
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷三十四 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

傷寒方

傷寒不發汗變成狐惑病第十三 論方

論曰狐惑之病其氣如傷寒默默欲眠目不得閉起卧不安其毒在喉咽為惑病在陰肛者為狐病狐惑之病並惡飲食不欲食聞食臭其面目翕赤翕白翕黑毒食於上者則聲喝也 喝一作咽 毒食下部者則乾咽也此由溫毒氣所為食于上者瀉心湯主之食於下者苦參湯淹洗之食于肛外者熏之并用雄黃三片稍置瓦鉼中炭火燒向肛熏之并服湯也

治狐惑湯

黃連 四兩

薰草 四兩

右二味咬咀白酢漿一斗漬一宿煮取二升分為三服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

赤小豆當歸散其人脉數無熱微煩默默但欲卧汗出初得之三四日眼赤如鴆眼得之七八日其四眥黄黑能食者膿已成也治之之方

以赤小豆三升漬之令生芽足乃復乾之加當歸三兩為末漿水服方寸匕日三即愈

瀉心湯其病形不可攻不可灸因火為邪血散脉中傷脉尚可傷臟則劇井輸益腫黄汁出經合外爛肉腐為癰膿此為火疽醫所傷也夫脉數者不可灸因火為邪即為煩因虚逐實血走脉中火氣雖微内攻有力焦骨傷筋血難復也應在瀉心瀉心湯兼治下痢不止腹中幅堅而嘔吐腸鳴者方 仲景名半夏瀉心 要略名甘草瀉心

半夏 半升 黄芩 人參 乾薑 各三兩 甘草 一兩 黄連 大棗 十二枚

右七味㕮咀以水一斗煮取六升分服一升日三

論曰黄有五種有黄汗黄疸穀疸酒疸女勞疸黄汗者

傷寒發黄第十四 論證方 針灸圖

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

身體四肢微腫胸滿不渴汗出如黃蘗汁良由大汗出卒入水中所致黃疸者一身面目悉黃如橘柚暴得熱以冷水洗之熱因留胃中食生黃瓜熏上所致若成黑疸者多死穀疸者食畢頭眩心忪怫鬱不安面發黃由失饑大食胃氣衝熏所致酒疸者心中懊痛足脛滿小便黃面發赤斑黃黑由大醉當風入水所致女勞疸者身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大勞大熱而交接竟入水所致但依後方治之

黃汗之為病身體洪腫發熱汗出不渴狀如風水汗染衣色正黃如蘗汁其脉自沈從何得之此病以汗出入水中浴水從汗孔入因而得之

黃耆芍藥桂酒湯治黃汗方

黃耆 五兩
芍藥 三兩
桂心 三兩

右三味咬咀以苦酒一升水七升合煎取三升飲一升當心煩也至六七日稍稍自除心煩者苦酒阻故也

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:40
列印頁數：679
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃疸之病疸而渴者其病難治疸而不渴其病可治發於陰部其人必嘔發于陽部其人振寒而微熱

桂枝黃耆湯治諸病黃疸宜利其小便假令脉浮當以汗解方

桂枝 芍藥 生薑 各三兩 甘草二兩 黃耆五兩 大棗十二枚

右六味㕮咀以水八升微火煎取三升去滓温服一升發微汗須臾不汗者飲稀熱粥以助湯若不汗更服湯

麻黃醇酒湯治傷寒熱出表發黃疸方

麻黃三兩以醇酒五升煮取一升半盡服之温覆汗出即愈冬月寒時用清酒春月宜用水

治黃疸方

瓜蒂 秫米 赤小豆 各二七枚

右三味治下篩病重者取如大豆二枚内著鼻孔中痛縮鼻須臾當出黃汗或從口中出汁升餘則愈病

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:40
列印頁數：680
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

輕者如一豆不瘥間日復用又下里間以筒使人極吹鼻中無不死大慎之 刪繁療天行毒熱通貫臟腑沈伏骨髓之間或為黃疸黑疸赤疸白疸穀疸馬等病喘息須臾不絶也

大黃圓治同前

大黃 蓼蘆子 各二兩

右二味為末蜜和丸如梧子大未食服十丸日三病瘥止

又方大黃 二兩 黃連 三兩 黃蘗 黃芩 各一兩

豬衣 五合

右五味為末蜜和丸如梧子大先食服三丸日三不知加至五丸

茵蔯湯治黃疸身體面目盡黃方

茵蔯 黃連 各三兩 黃芩 二兩 大黃 二十七枚 梔子 十四枚 人參 各一兩 甘草

右七味㕮咀以水一斗煮取三升分三服日三亦治酒疸酒癖

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:41
列印頁數：681
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三黃散治同前

大黃　黃連　黃芩　各四兩

右三味治下篩先食服方寸匕日三亦可為丸

五苓散治黃疸利小便方

豬苓　茯苓　澤瀉　白朮　桂心　各三十銖

右五味擣篩為散渴時水服方寸匕極飲水即利小便及汗出愈　此方與第九卷方相重以分兩不同故重出

秦椒散治黃疸飲少溺多方

秦椒　六銖　瓜蒂　半兩

右二味治下篩水服方寸匕日三

小半夏湯治黃疸小便色不異欲自利腹滿而喘者不可除熱熱除必噦方

半夏　生薑　各半斤

右二味咬咀以水七升煮取一升五合分再服有人常積氣結而死其心上暖以此湯少許汁入口遂活

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:41
列印頁數：682
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治黃疸方

取生小麥苗擣絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四日便愈無小麥穅麥亦得用之

治黃疸變成黑疸醫所不能治者方

土瓜根擣汁一小升頓服日一平旦服至食時病從小便出先須量病人力不得多服力衰則起不得

治發黃身面目悉黃如金色小便如濃煮蘗汁衆醫不能療者方

茵蔯 栀子 各四兩 黃芩 大黃 各三兩 龍膽 二兩

柴胡 升麻 各三兩

右七味㕮咀以水八升煮取二升七合分三服若身體羸去大黃加栀子五六兩生地黃一升 延年録無茵蔯有栀子四兩栝蔞三兩芒硝二兩

夫黃發已久變作桃皮色心下有堅嘔逆不下飲食小便極赤色少四肢逆冷脉深沉極微細遲者不宜服此方得下必變嘔也宜與大茵蔯湯除大黃與生地黃五兩服湯盡消息看

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

脉小浮出形小見不甚沈微便可治也脉浮見者黄
當明不復作桃皮色心下自寬也大茵蔯湯次出後十一味者是
苦參散治人無漸忽然振寒發黄皮膚黄黧塵出小便
赤少大便時閉氣力無異食飲不妨已服諸湯散餘熱
不除久黄者宜吐下方

苦參 黄連 瓜蒂 黄蘗

大黄 各一兩 蓼蘆 二兩

右六味治下篩飲服方寸匕當大吐吐者日一服不

吐日再亦得下服五日知可消息不覺退更服之小

折便消息之

治發黄方

茵蔯 黄蘗 梔子 大黄 各三兩

石五味叹咀以水九升煮取三升分三服先服湯後

服丸方

大黄 五兩 茵蔯 梔子 各三兩 黄芩 二兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃蘗 二兩

黃連 各二兩

右六味為末以蜜丸如梧子大白飲服二十丸令微利

麻黃連翹赤小豆湯治傷寒瘀熱在裏身體必發黃方

麻黃 二兩

連翹 二兩

大棗 十二枚

杏仁 三十枚

生梓白皮 切二升

赤小豆 一升

甘草 二兩

生薑 三兩

右八味咬咀以水一斗先煮麻黃去沫次內諸藥煎取三升分三服

煎取三升分三服

茵蔯湯治傷寒七八日內實瘀熱結身黃如橘小便不利腹微脹滿宜下之方

茵蔯 六兩

大黃 三兩

梔子 四十枚

右三味咬咀以水一斗二升先煮茵蔯取五升去滓次內梔子大黃煎取三升分服一升日三小便當利如皂莢沫狀色正赤當腹減黃悉隨小便去也 范注用療穀疸小品方用石膏一斤

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:42
列印頁數：685
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大黃黃蘗湯治發黃腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當下之方

大黃 三兩　黃蘗 芒硝 各四兩　梔子 十五枚

右四味咬咀以水六升煮取二升去滓内芒硝復煎取一升先食頓飲之

茵蔯圓治時行病急黃并瘴癘疫氣及瘧瘧之方

茵蔯 梔子 芒硝 杏仁 各三兩　巴豆 一兩　恒山 鼈甲 各二兩　豉 五兩

大黃 五兩

右九味為末以餳為丸如梧子大飲服三丸以吐利為佳不知加一丸初覺體氣有異急服之即瘥神效

治急黃熱氣骨蒸兩目赤脉方

芒硝 一兩　大黃 半末　生地黃汁 八合

右三味合和一服五合日二以利為度不須二服

治風疽小便或黃或白洒洒寒熱好卧不欲動方

三月生艾 一束擣取銅器中煎如漆密封之

大黃

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連　凝水石　栝蔞根　苦參　葶藶 各六銖

右七味六味為末以艾煎和丸如梧子大先食服五丸日二可至二十丸有熱加苦參渴加栝蔞小便澀加葶藶小便多加凝水石小便白加黃連大便難加大黃

濕疸之為病始得之一身盡疼發熱面色黑黃七八日後壯熱熱在裏有血當下去之如狗肝狀其小腹滿者急下之亦治一身盡疼發熱面色黑黃目黃腹滿小便不利方

礬石　滑石 各五兩

右二味治下篩以大麥粥汁服方寸匕日三先食服之便利如血者已當汗出瘥

煩脾色必黃瘀熱以行跗陽脈緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食則滿也尺脈浮為傷腎跗陽脈緊為傷脾風寒相薄食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下寸口脈浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中風四肢苦

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

流小便不通陰被其寒熱流膀胱身故盡黃名曰穀疸

治勞疸穀疸丸方

苦參 三兩 龍膽 一兩

右二味為末牛膽和為丸如梧子大先食以麥粥飲服五丸日三不知稍加之 刪繁方加梔子仁三七枚以猪膽和為丸

夫酒疸其脉浮者先吐之沈弦者先下之夫人病酒疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐嘔者宜吐之方前苦參散七味者是酒疸必小便不利其候當心中熱足下熱是其證也夫酒疸下之久久為黑疸目青面黑心中如啖蒜韲狀大便正黑皮膚爪之不仁其脉浮弱雖黑微黃故云

枳實大黃湯治傷寒飲酒食少飲多痰結發黃酒疸心中懊憹而不甚熱或乾嘔方

枳實 五枚 大黃 三兩 豆豉 半升 梔子 七枚

右四味㕮咀以水六升煮取二升分三服心中熱疼懊憹皆主之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凝水石散治肉疸飲少小便多如白汁色此病得之從酒方

凝水石 白石脂 栝蔞根 桂心 各三十銖 菟絲子 知母 各十八銖

右六味治下篩麥粥飲服五分匕日三服五日知十日瘥

茯苓圓治心下縱橫堅而小便赤是酒疸者方

茯苓 茵蔯 乾薑 各一兩 白朮 熬 各三十銖 枳實 各十銖 半夏 各十二銖 杏仁 各十八銖 甘遂 六銖 當歸 各二十銖 蜀椒

右十味為末蜜和丸如梧子大空腹服三丸日三稍加以小便利為度 千金翼加黃連一兩大黃十八銖名茵蔯丸治黑疸身體闇黑小便澀

半夏湯治酒癖蔭胷心脹滿骨肉沉重逆害飲食乃至小便赤黃此根本虛勞風冷飲食衝心由脾胃內痰所致方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏 一升 生薑 黄芩 茵蔯
當歸 兩各一 前胡 枳實 甘草
大戟 兩各二 茯苓 白朮 兩各三
右十一味㕮咀以水一斗煮取三升分作三服
牛膽圓治酒疸身黄黧塵出方
牛膽 一枚 芜花 一升 薏花 半升 瓜蒂 三兩
大黄 八兩
右五味四味㕮咀以清酒一斗漬一宿煮減半去滓
内牛膽微火煎令可丸如大豆服一丸日移六七尺
不知復服一丸至八丸腸上吐腸下下或不吐而自
愈
大茵蔯湯治内實熱盛發黄黄如金色脉浮大滑實緊
數者大發黄多是酒客勞熱食少胃中熱或温毒内熱
者故黄如金色方
茵蔯 黄蘗 各一兩半 大黄 白朮 各三兩
黄芩 甘草 茯苓 栝蔞根

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

前胡 枳實 各二兩 梔子 二十枚

右十一味㕮咀以水九升煮取三升分三服得快下

消息三四日更治之

茵蔯圓治氣淋臚脹腹大身體面目悉黃及酒疸短氣不得息方

茵蔯 天門冬 各二兩 梔子 各四兩 大黃 各三兩 桂心 各二兩 通草 石膏 各二兩 半夏 半升

右八味蒸大黃通草天門冬半夏梔子曝令乾合擣

篩蜜丸如大豆服三丸日三忌生魚以豆羹服不得用酒一方去石膏內滑石二兩不知加至十丸

黃家至日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之當膀胱急小腹滿體盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹臚脹而滿如欲作水狀大便必黑時溏泄此女勞疸非水也腹滿者難治

硝石礬石散治女勞疸方

硝石 礬石 各半兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味治下篩大麥粥汁服方寸匕日三重衣覆取汗病隨大小便出小便正黃大便正黑


黃疸之為病日晡所發熱惡寒小腹急身體黃額黑大便溏黑足下熱此為女勞腹滿者難治治之方

滑石　石膏　各等分

右二味治下篩以大麥粥汁服方寸匕日三小便極利則瘥

針灸黃疸法

正面圖第一



寅門穴從鼻頭直入髮際度取通繩分為三斷繩取一分入髮際當繩頭針是穴治馬黃黃疸等病

上齗裏穴正當人中及脣針三鋌治馬黃黃疸等病

上腭穴入口裏邊在上縫赤白脉是針三鋌治馬黃黃疸四時等病

舌下穴俠舌兩邊針治黃疸等病

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

脣裏穴正當承漿裏邊逼齒斷針三鋌治馬黃黃疸寒暑溫疫等病

顳顬穴在眉眼尾中間上下有來去絡脉是針灸之治四時寒暑所苦疸氣溫病等

俠人中穴火針治馬黃黃疸疫通身並黃語音已不轉者

俠承漿穴去承漿兩邊各一寸治馬黃急疫等病

巨闕穴在心下一寸灸七壯治馬黃黃疸急疫等病

上管穴在心下二寸灸七壯治馬黃黃疸等病

男陰縫穴拔陰反向上灸治馬黃黃疸等病若女人玉門是穴男女針灸無在

風府穴在項後入髮際一寸去上骨一寸針之治頭中熱病馬黃黃疸等病

熱府穴在第二節下兩傍相去各一寸五分針灸無在





本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肺輸穴從大椎數第三椎兩傍相去各一寸五分灸主黃疸通治百毒病

心輸穴從肺輸數第二椎兩傍相去各一寸五分

肝輸穴從心輸數第四椎兩傍相去各一寸五分

脾輸穴從肝輸數第二椎兩傍相去各一寸五分

腎輸穴從脾輸數第三椎兩傍相去各一寸五分

脚後跟穴在白肉後際針灸隨便治馬黃黃疸寒暑諸毒等病

側面圖第三 耳中 腦石子頭 頰裏 手太陽 錢孔 太衝

耳中穴在耳門孔上橫梁是針灸之治馬黃黃疸寒暑疫毒等病

頰裏穴從口吻邊入徃對頰裏去口一寸針主治馬黃黃疸寒暑温疫等病頰兩邊同法

手太陽穴手小指端灸隨年壯治黃疸

腦石子頭穴還取病人手自捉臂從腕中太澤 澤當作淵 文向上一夫接白肉際灸七壯治馬黃黃疸等病

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

錢孔穴度乳至臍中屈肋頭骨是灸百壯治黃疸

太衝穴針灸隨便治馬黃黃疸温疫毒等病

備急千金要方卷三十四

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:46
列印頁數：695
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書 子部 備急千金要方卷三十五

詳校官太醫院醫士臣舒 仪
編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈴
校對官中書臣胡紹基
謄錄監生臣秦聯登

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷三十五　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

傷寒方　灸刺法

温癉第十五　論癉法　符

論曰夫癉者皆生於風夏傷於暑秋為瘧癉也問曰癉先傷于寒而後傷于風故先寒而後熱也病以時作名曰温癉其但熱而不寒者陰氣先絶陽氣獨發則少氣煩悶手足熱而欲嘔名曰癉癉問曰夫病温癉與寒癉而皆安舍舍于何藏對曰温癉者得之冬中于風寒氣藏于骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓鑠肌肉消腠理發泄因有所用力邪氣與汗皆出此病邪氣先藏于腎其氣先從內出之于外也如是則陰虛而陽

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:47
列印頁數：697
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

盛盛則病矣衰則氣復反入入則陽虛虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧問曰癉瘧何如對曰癉瘧者肺素有熱氣盛于身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍于皮膚之内分肉之間發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及于陰故但熱而不寒氣内藏于心而外舍于分肉之間令人消鑠脫肉故名曰癉瘧夫瘧之旦發也陰陽之旦移也必從四肢始也陽已傷陰從之故氣未并先其時一食頃用細布索緊束其手足十指令邪氣不得入陰氣不得出過時乃解夫瘧脉自弦也弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦遲者可温之若脉緊數者可發汗針灸之脉浮大者吐之瘧脉弦數者風發也以飲食消息止之瘧歲歲發至三歲或連月發不解者以脇下有痞也治之不得攻其痞但得虛其津液先其時發其汗服湯已先小寒者引衣自覆汗出小便利即愈瘧者病人形瘦皮上必粟起也病瘧一日發當以十五日愈設不瘧當

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

月盡解也令不愈當云何師曰此病結為癥瘕名曰癰母急當治之鼈甲煎圓主之方

成死鼈十二斤治如食法要略作鼈用三兩半夏 人參

大戟各六銖 瞿麥 阿膠 紫葳一作紫菀 牡丹皮 石葦 乾薑 大黃

厚朴 桂心 海藻要略作赤消 蓼蘆 蜣蜋各二十銖 蜂窠 桃仁 芍藥各一兩

柴胡一兩半 烏羽燒一作烏扇 黃芩各十八銖 廬蟲 蚤蟲各三十銖要略作鼠婦

右二十四味為末取鍛竈下灰一斗清酒一斛五斗以酒漬灰取酒著鼈盡爛泯泯如漆絞去滓下諸藥煎為丸如梧子大未食服七丸日三仲景方無大戟海藻

柴胡栝蔞根湯治癰而發渴者方

柴胡 黃耆 人參 甘草 生薑各三兩 大棗二十枚 栝蔞根四兩

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去滓煎取三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

升温服一升日三

牡蠣湯牡瘧者多寒治之方 牡瘧一作壯瘧

牡蠣 麻黄各四兩 甘草二兩

蜀椒 三兩無以恒山代之

右四味先洗蜀椒三過去腥咬咀以水八升煮蜀椒麻黄得六升去沫乃内餘藥煮取二升飲一升即吐出復飲之

蜀椒散多寒者牡瘧也治之方

蜀椒 雲母 龍骨各等分

右三味治下篩先未發一炊頃以酢漿服半錢臨發服一錢温瘧者加蜀椒半分雲母取火燒之三日三夜 雲母不用雲母用雲貴

有癉瘧者陰氣孤絶陽氣獨發而脉微其候必少氣煩滿手足熱欲嘔但熱而不寒邪氣内藏于心外舍于分肉之間令人消鑠脱肉也

有温瘧者其脉平無寒時病六七日但見熱也其候骨

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:49
列印頁數：700
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

節疼煩時嘔朝發暮解暮發朝解名温瘧

白虎加桂湯治之方

石膏一斤 知母六兩 甘草二兩 粳米六合

右四味㕮咀以水一斗二升煮米爛去滓加桂心三兩煎取三升分三服覆令汗先寒發熱汗出者愈

麻黄湯治瘧須發汗方

麻黄 栝蔞根 大黄各四兩 甘草一兩

右四味㕮咀以水七升煮取二升半分三服未發前

食頃一服臨發一服服後皆厚覆取汗

治瘧或間日發者或夜發者方

恒山 竹葉各三兩 秫米一百粒 石膏八兩

右四味㕮咀以水八升銅器中漬藥露置星月下高淨處橫刀其上明日取藥于病人房中以銅器緩火煎取三升分三服清旦一服未發前一食頃一服臨發一服三服訖靜室中卧莫共人語當一日勿洗手面及漱口勿進食取過時不發乃澡洗進食并用藥

汁塗五心胷前頭面藥澤置頭邊曾用神驗救急方用烏梅二七枚

又方先作羊肉臛麵餅飽食之并進少酒隨所能令其欣欣有酒氣入密室裹然炭火厚覆取大汗即瘥

又方燒黑牛尾頭毛作灰酒服方寸匕日三恒山圓治瘧瘧說不可具方

恒山　知母　甘草　大黃各十八銖　麻黃一兩

右五味為末蜜和丸如梧子大未食服五丸日二不知漸增以瘥為度肘後無大黃

又方治瘧經數年不瘥者兩劑瘥一月已來一劑瘥方

恒山三兩為末以雞子白和併手丸如梧子大置銅椀中于湯中煮令熟殺腥氣則止以竹葉飲服二十丸欲吐但吐至發令得三服時早可斷食而晚不可斷食可竹葉汁煮糜少食之

梔子湯治同前

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

梔子 十四枚
秫米 十四粒
車前葉 二七枚 炙乾
恒山 三兩
烏賊骨 升麻 鼈甲
附子 各一兩
恒山 三兩

治老瘧久不斷者方

右四味咬咀以水九升煮取三升分三服未發一服發時一服發後一服以吐利四五行為瘧不止冷飯止之

治瘧無問新久者方

小便 一升半 蜜 三匕

右二味煮三沸頓服每發日平旦時服自至發勿食一宿成一服一合比發可數服或吐下

右五味咬咀絹袋盛以酒六升漬之小令近火轉之

重者漸退不過三服瘥

又方

鼠尾子 車前子 各一虎口

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:50
列印頁數：703
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味咬咀以水五升煮取二升未發前服盡
又方馬鞭草汁五合酒三合分三服
又方擣萇菪根燒為灰和水服一合量人大小强弱用之
又方瓜蒂二七枚擣水漬一宿服之
又方常以七月上寅日採麻花為末酒服方寸匕
又方故鞋底去兩頭燒作灰井花水服之
又方服翹搖汁
又方桃花末服方寸匕

治癆方

蜀漆	手足過發時癆斷若不斷可飲一合許癆	右五味咬咀以酒二升半漬之露一宿明日塗五心	恒山 二兩	鼈甲 方寸炙	烏賊骨 方二寸	附子 炮	甘草 各一兩		
蜀漆圓治勞癆并治積勞寒熱發有時似癆者方									
麥門冬 知母 白薇									

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

地骨皮　升麻　各三十銖　甘草　鼈甲

烏梅肉　菱𧐢　各一兩　恒山　一兩半　石膏　二兩

豉　一合

右十三味為末蜜和丸如梧子大飲服十丸日再服之稍稍加至二三十丸此神驗無不瘥也加光明砂一兩

烏梅圓治寒熱勞瘧久不瘥形體羸瘦痰結胷堂食飲減少或因行遠久經勞役患之積年不瘥服之神效方

烏梅肉　豆豉　各一合　升麻　地骨皮

柴胡　鼈甲　恒山　前胡　各一兩

肉蓯蓉　玄參　百合　蜀椒

桂心　人參　知母　各半兩　桃仁　八十枚

右十六味為末蜜凡空心煎細茶下三十丸日二服

老少孩童量力通用無所忌

治勞瘧積時不斷衆治無效者方

生長大牛膝一握切以水六升煮取一升分再服第

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

一服取未發前食頃第二服取臨發時
大五補湯治時行後變成癉癘方
桂心 三十銖 遠志 桔梗 芎藭 各二兩
茯苓 乾地黃 芍藥 人參
白朮 當歸 黃耆 甘草 各三兩
竹葉 五兩 大棗 二十枚 生枸杞根 生薑 各一斤
半夏 麥門冬 各一升
右十八味㕮咀以水三斗煮竹葉枸杞取二斗次内
諸藥煎取六升分六服一日一夜令盡
鯪鯉湯治乍寒乍熱乍有乍無山瘴癘方
鯪鯉甲 十四枚 鼈甲 烏賊骨 各一兩 恒山 三兩
附子 一枚
右五味㕮咀以酒三升漬一夕發前稍稍啜飲勿絶
吐之兼以塗身斷食過時乃食飲
烏梅圓治肝邪熱為瘧令人顏色蒼蒼氣息喘悶戰掉
狀如死者或久熱勞微動如瘧積年不瘥方

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:51
列印頁數：706
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

烏梅肉 蜀椒 鼈甲 萎蕤 知母 苦參 各一兩 甘草 細辛 各十八銖 香豉一合 右十一味為末蜜丸如梧子大酒服十丸日再飲服亦得

甘草一兩 蜀椒三兩 恒山 鼈甲各四兩 甚欲飲清水反寒多不甚熱者方

治心熱為癰不止或止後熱不歇乍來乍去令人煩心

恒山 甘草半兩 知母 鼈甲各一兩 右四味為末蜜丸如梧子大未發前酒服十丸臨發時一服正發時一服

恒山三兩 甘草半兩 知母 鼈甲各一兩 烏梅十枚 香豉一合 栀子 石膏五兩 淡竹葉切二升 右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服

恒山圓治脾熱為癰或渴或不渴熱氣内傷不泄令人病寒腹中痛腸中鳴汗出方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

恒山湯治肺熱痰聚胷中來去不定轉而為癰其狀令人心寒寒甚則發熱熱間則善驚如有所見者方

恒山 三兩 甘草 半兩 秫米 三百二十粒

右三味咬咀以水七升煮取三升分三服至發時令三服盡

又方治腎熱發為癰令人淒淒然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然身掉不定手足寒方

恒山 三兩 烏梅 三七枚 竹葉 切一升 香豉 八合

蔥白 一握

右五味咬咀以水九升煮取三升分三服至發令盡

藜蘆圓五臟並有癰候六腑則無獨胃腑有之胃腑癰者令人旦病也善饑而不能食食而支滿腹大治之方

藜蘆 恒山 皁莢 牛膝 各一兩

右五味先熬藜蘆皁莢色黃合擣為末蜜丸如小豆大旦服一丸正發時一丸一日勿飽食 肘後無恒山及牛膝

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

刺灸法

肝癆刺足厥陰見血　心癆刺手少陰

脾癆刺足太陰　肺癆刺手太陰陽明

腎癆刺足少陰太陽　胃癆刺足太陰陽明橫脉出血

凡灸癆者必先問其病之所發者先灸之從頭項發者于未發前預灸大椎尖頭漸灸過時止從腰脊發者灸腎輸百壯從手臂發者灸三間

癆灸上星及大椎至發時令滿百壯灸艾炷如黍米粒

俗人不解取穴務大炷也

覺小異即灸百會七壯若後更發又七壯極難愈者不過三灸以足踏地以線圍足一匝中折從犬椎向百會

灸線頭三七壯炷如小豆狀　又灸風池二穴三壯

凡一切癆無問遠近正仰卧以線量兩乳間中屈從乳向下灸度頭隨年壯男左女右

諸癆血脉不見者刺十指間出血血去必已先視身之五臟一切諸癆灸尺澤七壯穴在肘中約上動脉是也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

赤如小豆者盡取之

瘧刺足少陰血出愈

瘧上星主之穴在鼻中央直髮際一寸陷容豆是也

灸七壯先取譩譆後取天牖風池瘧日西而發者臨泣主之穴在髮際五分陷者灸七壯

瘧實則腰背痛虛則熨劒飛揚主之穴在外踝上七寸

灸七壯

瘧多汗腰痛不能俛仰目如脫項如拔崑崙主之穴在足外踝後跟骨上陷中灸三壯

讓瘧法未發前把大雄雞一頭著懷中時時驚動令雞

作大聲立瘥

治瘧符凡用二符

瘧小兒父字石拔母字石鎚某甲著患人姓名患瘧人

竊讀之曰一切天地山水城隍日月五星皆敬竈君今

有一瘧鬼小兒罵竈君作黑面奴若當不信看文書急

急如律令

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:53
列印頁數：710
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

此符必須真書前後各留白紙一行擬著竈君額上
瓦石壓之不得壓字上勿令人近符若得專遣一人
看符大好亦勿令灰土傳符上致使字不分明出見
著符次第如後若明日日出後發須令人夜掃竈君
前及額上令淨至發日旦令患人整衣帽立竈前讀
符使人自讀必須分明讀符勿錯一字每一遍若別
人讀一遍患人跪一拜又以手捉患人一度若患人
自讀自捉衣振云人姓某甲如此是凡三遍讀三拜
了以淨瓦石壓兩角字句上著竈額上勿令壓字上
若瘧日西發具如上法三遍讀符至午時更三遍讀
如上法如夜發日暮更三遍讀並如上法其竈作食
亦得勿使動此符若有兩竈大竈上著符若有露地
竈屋裏竈上著止有露竈依法著之仍須手捉符其
符法如後若有客患會須客經停過三度發三度委
曲著符如上法符亦云客姓名患瘧乞拘録瘧鬼小
兒如左凡治久患者一著符一漸瘥亦可五度著符

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:53
列印頁數：711
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

如始可全癒又須手把符如左

王良符張季伯書之急急如律令

此王良符依法長捲兩手握念佛端坐如須行動檢

校插著胸前字頭向上

右二符各依法一時用不得闕一符萬一不癒但得

一發輕後發日更讀即癒一一仔細依法若字參差

即不癒

診谿毒證第十六

江東江南諸谿源間有蟲名短狐谿毒亦名射工其蟲

無目而利耳能聽在山源谿水中聞人聲便以口中毒

射人故謂射工也其蟲小毒輕者及相逐者射著人影

者皆不即作瘡先病寒熱身不喜冷體彊筋急頭痛目

疼張口欠欬嗽呼吸悶亂朝旦少蘇醒晡夕輒復寒熱

或似傷寒發熱散動亦如中尸便不能語病後如此自

非其土地人不常數行山水中不知其證便謂是傷寒

發熱散動作治乖僻毒盛發瘡復疑是瘭疽乃至吐下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

去血復恐疑蟲毒是以致禍耳今說其狀類以明其證與傷寒別也方見別卷中

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:54
列印頁數：713
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷三十六　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

肝臟方

肝臟脉論第一

論曰夫人禀天地而生故内有五臟六腑精氣骨髓筋脉外有四肢九竅皮毛爪齒咽喉脣舌肛門胞囊以此總而成軀故將息得理則百脉安和役用非宜即為五勞七傷六極之患有方可救雖病無他無法可憑奄然永往所以此之中帙卷卷備述五臟六腑等血脉根源循環流注與九竅應會處所并論五臟六腑等輕重大小長短闊狹受盛多少仍列對治方法丸散酒煎湯膏摩熨及灸針孔穴並窮於此矣其能留心於醫術者可考而行之其冷熱虛實風氣準藥性而用之則内外百病無所逃矣凡五臟在天為五星在地為五嶽約時為五行在人為五臟五臟者精神魂魄意也論陰陽察虛

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:54
列印頁數：714
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

實知病源用補瀉應稟三百六十骨節終會通十二經焉

論曰肝主魂為郎官隨神往來謂之魂魂者肝之藏也目者肝之官肝氣通於目目和則能辨五色矣左目甲乙循環紫宮榮華於爪外主筋内主血肝重四斤四兩左三葉右四葉凡七葉有六童子三玉女守之神名藍藍主藏魂號為魂藏隨節應會故云肝藏血血舍魂在氣為語在液為淚肝氣虛則恐實則怒肝氣虛則夢見園花生草得其時夢伏樹下不敢起肝氣盛則夢怒厥氣客於肝則夢山林樹木

凡人寢臥血歸於肝肝受血而能視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝

凡肝臟象木與膽合為腑其經足厥陰與少陽為表裏其脉弦相於冬王於春春時萬物始生其氣來濡而弱寬而虛故脉為弦濡即不可發汗弱則不可下寬者開者通通者利故名曰寬而虛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

春脉如弦春脉肝也東方木也萬物之所以始生也故其氣來濡弱輕虛而滑端直以長故曰弦反此者病何如而反其氣來實而弦此謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病在内太過則令人善忘（忘一作怒）忽忽眩冒而癲疾不及則令人胸痛引背兩脇胠滿

平竿

肝脉來濡弱招招如揭竿末稍曰平（藥源作綽綽如按琴瑟之絃如揭長竿末梢曰平）

春以胃氣為本肝脉來盈實而滑如循長竿曰肝病肝脉來急而益勁如新張弓弦曰肝死

真肝脉至内外急如循刀刀責責然（藥源作嘖嘖然）如按琴瑟絃（藥源作如新張弓弦）色青白不澤毛折乃死

春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死胃而有毛曰秋病毛甚曰金病

肝藏血血舍魂悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄其精不守（一作狂妄不精不敢正當人）令人陰縮而攣筋兩脇肋骨舉（一作不舉）毛悴色夭死于秋

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

足厥陰氣絶則筋縮引卵與舌厥陰者肝脉也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脉絡於舌本故脉弗營則筋縮急筋縮急則引卵與舌故脣青舌卷卵縮則筋先死庚篤辛死金勝木也

肝死藏浮之弱按之中如索不來或曲如蛇行者死

春肝木王其脉弦細而長曰平反得沈濡而滑者是腎之乘肝母之歸子為虚邪雖病易治反得浮大而洪者是心之乘肝子之乘母為實邪雖病自愈反得微澀而短浮者是肺之乘肝金之尅木為賊邪大逆十死不治反得大而緩者是脾之乘肝土之陵木為微邪雖病即瘥心乘肝必吐利肺乘肝即為癰腫

左手關上陰絶者無肝脉也苦癰遺溺難言脇下有邪氣善吐刺足少陽治陽

左手關上陰實者肝實也苦肉中痛動善轉筋吐刺足厥陰治陰

肝脉來濯濯如倚竿如琴瑟絃再至曰平三至曰離經

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

病四至脫精五至死六至命盡足厥陰脉也

肝脉急甚為惡言（一作妄言）微急為肥氣在脇下如覆杯緩甚為嘔微緩為水瘕痺大甚為内癰善嘔劒微大為肝痺縮欬引小腹小甚為多飲微小為消癉滑甚為頽疝微滑為遺溺濇甚為淡飲微濇為瘈瘲筋攣

喘逆其濡而散色澤者當病溢飲溢飲者渴暴多飲而溢入肌膚腸胃之外也（素問溢入作易入）

肝脉搏堅而長色不青當病墜若搏因血在脇下令人

青脉之至也長而左右彈有積氣在心下支肤名曰肝痺得之寒濕與疝同法腰痛足冷頭痛

扁鵲云肝有病則目奪精虛則寒寒則陰氣壯壯則夢山樹等實則熱熱則陽氣壯壯則夢怒

肝在聲為呼在變動為握在志為怒怒傷肝精氣并於肝則憂肝虛則恐實則怒怒而不已亦生憂矣

色主春病變於色者取之榮

病先發於肝者頭目眩脇痛支滿一日之脾閉塞不通

列印日期/時間：02/04/2005 18:43:56
列印頁數：718
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

身病體重二日之胃而腹脹三日之腎小腹腰脊痛脛痠十日不已死冬日入夏早食病在肝平旦慧下晡甚夜半靜假令肝病西行若食雞肉得之當以秋時發病以庚辛日也家有血腥死女子見之以明要為災不者若感金銀物得之凡肝病之狀必兩脇下痛引小腹令人善怒虛則目眩無所見耳無所聞善恐如人將捕之若欲治之當取其經足厥陰與少陽氣逆則頭目痛耳聾不聰頰腫取血者

肝脉沈之而急浮之亦然若脇痛有氣支滿引小腹痛時小便難苦目眩頭痛腰脊痛足為寒時癰女人月事不來時無時有得之少年有所墮墜此為可治宜服防風竹瀝湯秦艽散春當刺大敦夏刺肝病其色青手足拘急脇下苦滿或時眩冒其脉弦長行間冬刺曲泉皆補之季夏刺太衝秋刺中郄皆瀉之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又當灸其門百壯背第九椎五十壯

邪在肝則兩脇中痛寒中惡血在內脥善癪節時腫取之行間以引脇下補三里以温胃中取血脉以散惡血取耳間青脉以去其癪凡有所墮墜惡血留内若有所大怒氣上而不能下積于左脇下則傷肝

肝中風者頭目瞤兩脇痛行常傴令人嗜甘如阻婦狀

肝中寒者其人洗洗惡寒翕翕發熱面翕然赤熱熱有汗舉中煩熱

肝中寒者其人兩臂不舉舌本又作大舌燥善太息舉中痛不得轉側時盜汗欬食已吐其汁肝主舉中喘怒罵其脉沈舉中又窒欲令人推按之有熱舉窒

肝傷其人脱肉又臥口欲得張時手足青目瞑瞳人痛此爲肝臟傷所致也

肝水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時津液微生小便續通

肝脹者脇下滿而痛引小腹不寧

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肝著其病人常欲蹈其胷上先未苦時但欲飲熱
診得肝積脉弦而細兩脇下痛邪氣走心下足脛寒脇
痛引小腹男子積疝女子瘕淋身無膏澤善轉筋爪甲
枯焦青黑春瘥而秋劇色青也
肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足如龜鼈狀
从从不愈發欬逆瘕而連歲月不已以季夏戊巳日得
之何也肺病傳肝肝當傳脾脾適以季夏王王者不受
邪肝復欲還肺肺不肯受因留結為積故知肥氣以季
夏得之
肝病胷滿脇脹善恚怒吐呼身體有熱而復惡寒四肢
不舉面白身體滑其脉當弦長而急今反短濇其色當
青而反白者此是金之尅木為大逆十死不治
襄公問扁鵲曰吾欲不診脉察其音觀其色知其病生
死可得聞乎答曰乃聖道之大要師所不傳黃帝貴之
過於金玉入門見病觀其色聞其呼吸則知往來出入
吉凶之相角音人者主肝聲也肝聲呼其音琴其志怒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

其經足厥陰厥逆少陽則榮衛不通陰陽交錯陰氣外傷陽氣内擊擊則寒寒則虚虚則卒然喑啞不聲此為厲風入肝續命湯主之（方見別卷中）但踞坐不得低頭面目青黑四肢緩弱遺失利便甚則不可治賒則旬月之内桂枝湯主之（方見別卷中）又呼而哭哭而反吟此為金尅木逆逆則悶悶則恐畏目視不明語聲切急謬說有人此陰擊陽陰氣起而陽氣伏伏則實實則熱熱則喘喘則為邪熱傷肝甚則不可治若脣色雖青向眼不應可治若脣色雖青向眼不應可治若地黄煎主之（方見下虚實篇中）肝病為癆者令人色蒼蒼然太息其狀若死者烏梅丸主之（方見別卷中）若其人本來少於悲恚忽爾嗔怒出言反常乍寬乍急言未竟以手向眼如有所畏若不即病禍必至矣此肝病聲之候也若其人虚則為寒風所傷若實則為熱氣所損陽則瀉之陰則補之青為肝肝合筋青如翠羽者吉肝主目目是肝之餘其人木形相比於上角蒼色小頭長面大肩平背直身小手足有材好勞

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

心少力多憂勞於事耐春夏不耐秋冬秋冬感而生病
足厥陰他他然脇廣合堅脆傾正則肝應之正青色小
理者則肝小小則藏安無脇下之病粗理者則肝大大
則虛虛則寒逼胃迫咽善膈中旦脇下痛廣脇反骸者
則肝高高則實實則肝熱上支賁加脇下急為息賁合
脇危一作兎骸者則肝下下則逼胃脇下空空則易受邪
脇骨堅者則肝堅則臟安難傷脇骨弱者則肝脆脆則
善病消癉易傷脇腹好相者則肝端正端正則和利難
傷脇骨偏舉者則肝偏傾偏傾則脇下偏痛凡人分部
陌起者必有病生膽少陽為肝之部而藏氣通於内外
部亦隨而應之沈濁為内浮清為外若色從外走内者
病從外生部處起若色從内出外者病從内生部處陌
内病前治陰後治陽外病前治陽後治陰陽主外陰主
内凡人死生休否則藏神前變形于外人肝前病目則
為之無色若肝前死目則為之脫精若天中等分墓色
應之必死不治看應增損斟酌賒促賒則不出四百日

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

内促則不延旬月之間肝病少愈而卒死何以知之曰青白色如拇指大黵點見顏頰上此必卒死肝絶八日死何以知之面青目赤但欲伏眠目視而不見人汗出如水不止一日二日死面黑目青者不死青如草滋死吉凶之色在於分部順順而見青白入目必病不出其年若年上不應三年之中禍必應也

春木肝脉色青主足少陽脉也春取絡脉分肉春者木始治肝氣始生肝氣急其風疾經脉常深其氣少不能深入故取絡脉分肉之間其脉根本並在竅陰之間應在窻籠之前窻籠者耳前上下脉以手按之動者是也其筋起於小指次指之上結外踝上循脛外廉結於膝外廉其支者別起於外輔骨上走髀前者結伏兎之上後者結於尻其直者上脇乘季脇上走腋前廉俠於膺乳結於缺盆直者上出掖貫缺盆出太陽之前循耳後上額角交巔上下走頷上結於鼽其支者結於目外眥為外維

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

其脉起於目兌眥上抵頭角下耳後循頸行手少陽之前至肩上却交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至兌眥後其支者別兌眥下大迎合手少陽於頰下加頰車下頸合缺盆以下胷中貫膈絡肝屬膽循脇裏出氣街繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胷過季脇下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絶骨之端下出外踝之前循足跗上出小指次指之端其支者別跗上入大指之間循大指岐内出其端還貫入爪甲出三毛合足厥陰

太陰

為表裏厥陰之本在行間上五寸應在背輸同會于手

其足少陽之別名曰光明去踝半寸是也別走厥陰下絡足跌主肝生病病實則膽熱熱則厥厥則陽病陽脉反逆大於寸口一倍病則胷中有熱心脇頭領痛缺盆腋下腫虚則膽寒寒則癒躄則陰病陰脉反小於寸口病則胷中有寒少氣口苦身體無膏澤外至腑絶骨外

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

踝前及諸節皆痛若陰陽俱靜與其俱動如引繩俱頓者病也此盡是足少陽膽經筋脉支別為病今取足厥陰肝經附于後

足厥陰之脉起於大指聚毛之際上循足趺上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上腘內廉循股陰入毛中環陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入顑顙連目系上出額與督脉會于巔一本云其支者從小腹與太陰少陽結於腰髁下第三第四骨空中其支者從目系下頰裏環脣內其支者復從肝別貫膈上注肺中是動則病腰痛不可以俛仰丈夫顏疝婦人小腹腫甚則嘔乾面塵脫色是主肝所生病者胷滿嘔逆洞泄狐疝遺溺閉癃盛者則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝上五寸別走少陽其別者循經上睾結於莖其病氣逆則睾腫卒疝實則挺長熱虛則暴癢取之所別足厥陰之筋起於大指之上上結內踝之上直上循脛上結內輔之上下循陰股結於

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

陰器結絡諸筋

春三月者主肝膽青筋牽病也其源從少陰而涉足少陽少陽之氣始發少陰之氣始衰陰陽怫鬱於腠理皮毛之病俱生表裏之痈因起從少陽發動反少陰氣則臟腑受癘而生其病相反若腑虛則為陰邪所傷腰背所損濇濇前寒而後熱頸外雙筋牽不得屈伸頸直背強急脚縮不伸脥中欲折目中生花若臟實則為陽毒強眼赤黃若欲轉動合身回側故曰青筋牽病 方見傷寒卷

灸法

肝虛實第二 脉灸法 方

扁鵲曰灸肝肺二輸主治丹毒牽病當依源處治調其陽理其陰臟腑之疾不生矣

肝實熱

左手關上脉陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常兩脇痛息忿忿如怒狀名曰肝實熱也

竹瀝泄熱湯治肝實熱陽氣伏邪熱喘逆悶恐目視物

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

無明狂悸非意而言者方

竹瀝 十升 麻黃 大青 梔子仁

升麻 茯苓 玄參 知母 各三分

生葛 石膏 各八分 生薑 芍藥 各四分

右十二味咬咀以水九升煮取二升半去滓下竹瀝煮兩三沸分三服須利下芒硝三分去芍藥加生地黃五分 刪繁方無石膏生葛生薑芍藥用人參三分

前胡湯治肝實熱目痛胷滿氣急塞瀉肝方

前胡 芒硝 秦皮 梔子仁

決明子 黃芩 升麻 薤仁

細辛 各三兩 苦竹葉 車前葉 各切一升

右十一味咬咀以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服又一方有柴胡三兩共十二味

防風散治肝實熱夢怒虛驚方

防風 茯苓 萎蕤 白朮

橘皮 丹參 各一兩三分 細辛 二兩 甘草

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

射干 各一兩
升麻 黄芩 各一兩半
酸棗仁 三分
大棗 三七枚

右十三味治下篩為粗散以兩方寸匕帛裹以井花水二升煮時時動上裹子煎取一升分服日二

遠志散治肝邪熱出言反常乍寬乍急方

遠志 射干 杏仁 大青 各一兩半
芍藥 一兩三分 桂心 三分 知母 升麻 各五分
茯神 麥門冬 葛根 甘草 各一兩

右十三味治下篩為粗散以水二升五合煮竹葉一升取汁内藥一匕半煎取八合為一服日一以綿裹

散煮之

地黄煎治邪熱傷肝好生悲怒所作不定自驚恐方

生地黄 淡竹葉 生薑 車前草
乾藍 各一升切 赤蜜 一升 丹參 玄參 各四兩
茯苓 二兩 石膏 五兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十味㕮咀以水九升煮取三升去滓停冷下蜜更煎三兩沸分三服

肝膽俱實

左手關上脉陰陽俱實者足厥陰與少陽經俱實也病苦胃脹嘔逆食不消名曰肝膽俱實也

肝虛寒

左手關上脉陰虛者足厥陰經也病苦脇下堅寒熱腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰腹痛名曰肝虛寒也

補肝湯治肝氣不足兩脇下滿筋急不得大息四肢厥冷發搶心腹痛目不明了及婦人心痛乳癰膝熱消渴爪甲枯口面青者方

山茱萸 翼作烏頭 甘草 桂心 各三兩 桃仁 翼作薤仁 各二兩 柏子仁 細辛 茯苓 防風 各二兩 大棗二十四枚

右九味㕮咀以水九升煮取五升去滓分三服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

補肝散治左脇偏痛久宿食不消并目眩眩昏風淚出見物不審而逆風寒偏甚消食破氣止淚方

山茱萸 桂心 薯蕷 天雄

茯苓 人參 各五分 芎藭 白术

獨活 五加皮 大黃 各七分 橘皮 三分

防風 乾薑 丹參 厚朴

細辛 桔梗 各一兩半 甘草 甘菊花 一兩

貫衆 半兩 陳麥麴 大麥蘗 各一升

右二十三味治下篩酒服方寸匕日二若食不消食後服若止痛食前服之

松膏酒補肝治肝虛寒或高風眼淚等雜病方

以松脂十斤細剉以水淹浸一周日煮之細細接取脂當沈下取一斤釀米一石水七斗好麴末二斗如上膏水竭更添之脂盡更水煮如前煙盡去火停冷家常釀酒法仍冷下飯封一百日脂米麴並消酒香滿室細細飲之此酒須一倍加麴

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

枸杞酒治同前

擣碎枸杞子一斗先内絹袋中酒二斗漬訖密封泥

甕勿洩曝乾天陰勿出三七日滿旦溫酒任性飲之

忌酢

防風煎治肝虛寒目眩眩視物不明諦視生花補方

防風 細辛 芎藭 獨活 各三兩

白鮮皮 甘草 各三兩 橘皮二兩 大棗三七枚

蜜合五 甘竹葉切一升

右十味㕮咀以水一斗二升先煮九味取四升去滓

下蜜更煎兩沸分四服日三夜一若五六月以燥器

貯冷水藏之

檳榔湯治肝虛寒脇下痛脹滿氣急目昏濁視物不明

方

檳榔二十四枚 附子七枚 母薑七兩 茯苓

橘皮 桂心各三兩 桔梗 白术各四兩 吳茱萸五兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右九味咬咀以水九升煮取三升去滓温服每服一升若氣喘者加芎藭三兩半夏四兩甘草二兩

治肝虛目不明方

灸肝輸二百壯小兒酌量可灸一二七壯

肝膽俱虛

左手關上脉陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也病苦恍惚尸厥不知人妄見少氣不能言時時自驚名曰肝膽俱虛也

順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣

春氣則足少陽不生而肝氣内變順之則生逆之則死

論曰肝勞病者補心氣以益之心王則感於肝矣人逆

肝勞第三 方論

豬膏酒治肝勞虛寒關格勞澀閉塞不通毛悴色夭方

豬膏 薑汁 各二升

虎骨酒治肝虛寒勞損口苦關節骨疼痛筋攣縮煩悶

右二味以微火煎取三升下酒五合和煎分為三服

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:02
列印頁數：733
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

方

虎骨 一升炙焦碎如雀頭

地骨皮 乾薑

五加皮 白朮

枳實 各五兩

丹參 八兩

芎藭 各四兩


猪椒根

乾地黄 七兩

右十味㕮咀絹袋盛以酒四斗浸四日初服六七合漸加至一升日再

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:02
列印頁數：734
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)



欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷三十七八

詳校官太醫院醫士臣舒侃

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄監生臣秦聯登

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷三十七 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

肝臟方

筋極第四 論灸法方

論曰夫六極者天氣通於肺地氣通於嗌風氣應於肝雷氣動於心穀氣感於脾（素問穀作谷也）雨氣潤於腎六經爲川腸胃爲海九竅爲水注之氣所以竅應於五臟五臟

邪傷則六腑生極故曰五臟六極也

論曰凡筋極者主肝也肝應筋筋與肝合肝有病從筋生又曰以春遇病爲筋痺筋痺不已復感於邪内舍於肝則陽氣入於内陰氣出於外若陰氣外出出則虛虛則筋虛筋虛則善悲色青蒼白見於目下若傷寒則筋不能動十指爪皆痛數好轉筋其源以春甲乙日得之傷風風在筋爲肝虛風也若陽氣内發發則實實則筋實筋實則善怒嗌乾傷熱則欬欬則脇下痛不能轉側

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又脚下滿痛故曰肝實風也然則因其輕而揚之因其重而減之因其衰而彰之審其陰陽以別柔剛陽病治陰陰病治陽善治病者病在皮毛肌膚筋脉而治之次治六腑若在五臟則半死矣扁鵲云筋絶不治九日死何以知之手足爪甲青黑呼罵口不息筋應足厥陰足厥陰氣絶則筋縮引卵與舌筋先死矣

橘皮通氣湯治筋實極則欬欬則兩脇下縮痛痛甚則不可轉動方

橘皮 四兩　白朮 五兩　細辛 一兩　茯苓 三兩　香豉 一升　石膏 五兩　當歸 三兩　桂心 一兩　丹參 三兩　芎藭 杜仲 續斷 地骨皮 二兩　乾地黄 當歸 通草 升麻 麥門冬 禹餘糧 桂心 一兩六銖

右八味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

丹參散治筋實極則兩脚下滿滿而痛不得遠行脚心如割筋斷折痛不可忍者方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麻黃 各一兩 十八銖
牛膝 二兩 六銖
甘草 生薑 切炒取 焦乾
牡蠣 各二兩半

右十七味治下篩爲粗散以絹袋子盛二方寸匕以井花水二升煮數動袋子煮取一升頓服日二

地黃煎治筋實極手足爪甲或青或黃或黑烏黯四肢筋急煩滿方

生地黃汁 三升
生葛汁 生玄參汁 各一升
大黃 升麻 各二兩
麻黃 梔子仁

右十味咬咀以水七升先煮七物取二升去滓次下地黃汁煎一兩沸次下葛汁煎取三升分三服日再

五加酒治筋虛極筋癉好悲思顏色蒼白四肢噓吸脚手拘攣伸動縮急腹中轉痛方

犀角 各三兩
石膏 五兩
芍藥 四兩

五加皮 一斤
薏苡仁 半升
枳刺 二升
大麻仁 三升
猪椒根皮 丹參 八兩
乾薑 五兩
芎藭 五兩
桂心 當歸 甘草 三兩
天雄

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:04
列印頁數：738
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

秦椒　白鮮　通草　各四兩
右十五味㕮咀以絹袋盛清酒四斗漬春夏四日秋冬六七日初服六七合稍稍加以知爲度

人參酒治筋虛極則筋不能轉十指爪皆痛數轉筋或卵縮脅脉疼急腹中絞痛或便欲絶不能飲食方

交接過度或病未平復交接傷氣内筋絶舌捲脣青引

人參　防風　茯苓　細辛　秦椒　黄耆　當歸　牛膝
桔梗　各一兩半　乾地黄　丹參　薯蕷　鍾乳　礬石　各二兩　山茱萸　芎藭　各二兩　白朮　麻黄　各二兩半　大棗三十枚　五加皮一升　生薑切乾炒　烏麻碎各二升
治交接損卵縮筋攣方

右二十二味㕮咀鍾乳別以小袋子盛清酒二斗半浸五宿温服三合日再不知隨意增進一本無烏麻用杜仲一兩半

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

燒婦人月經衣灰服方寸匕

治筋絶方

熬蟹腦足髓内瘡中筋即續

灸法

勞冷氣逆腰髖冷痺脚屈伸難灸陽蹻一百壯在外踝下容爪

腰背不便轉筋急痺筋攣灸第二十一椎隨年壯

轉筋十指筋攣急不得屈伸灸脚外踝骨上七壯

失精筋攣陰縮入腹相引痛灸中封五十壯在内踝前筋裏宛宛中

又云灸下滿各五十壯老人加之小兒隨年壯法

又云此二穴喉腫厥逆五臟所苦鼓脹悉以主之

轉筋脛骨痛不可忍灸屈膝下廉横筋上三壯

腹脹轉筋灸臍上一寸二七壯

堅癥積聚第五 論灸方

論曰病有積有聚何以別之答曰積者陰氣也聚者陽

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

氣也故陰沈而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟之所成故積者陰氣也其始發有常處其痛（一作病也）不離其部上下有所終始左右有所窮已聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止其痛無常處謂之聚也故以是別知積聚也

經絡受病入於腸胃五臟積聚發伏梁息賁肥氣否氣奔豚積聚之始生至其已成奈何曰積之始生得寒乃生厥止乃成積人之善病腸中積者何以候之曰皮薄而不澤肉不堅而淖澤如此則腸胃傷惡惡則邪氣留止積聚乃作腸胃之積寒温不次邪氣稍止至其畜積留止大聚乃起病有身體腰髀股脛皆腫環臍而痛是謂何病曰病名伏梁此風根也不可動動之爲水溺濇之病小腹盛左右上下皆有根者伏梁也裹膿血居腸胃之外不可治治之每切按之致死此下則因陰必下膿血上則迫胃管生（王氷云當作出）膈俠胃管内癰此久病也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

難療居臍上爲逆慎勿動亟奪其氣溢於大腸而著於肓肓之原在臍下故環臍而痛

三台圓治五臟寒熱積聚臚脹腸鳴而噫食不生肌膚甚者嘔逆若傷寒寒癉已愈令不復發食後服五丸飲多者十丸常服令人大小便調和長肌肉方

大黄 熬 前胡 各二兩 硝石 蓼蘆

半夏 各一兩 茯苓 半兩 附子 細辛

杏仁 各一升 厚朴

右十味爲末蜜和擣五千杵丸如梧子大服五丸稍加至十丸以知爲度

五石烏頭圓治男子女人百病虚弱勞冷宿寒久癖及癥瘕積聚或嘔逆不下食并風濕諸病無不治之方

鍾乳 鍊 礬石 紫石英

赤石脂 枳實 甘草 白朮

紫菀 山茱萸 防風 白薇

桔梗 天雄 皂莢 細辛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蒞蓉　人參　附子
藜蘆　各一兩六銖　麥門冬　乾薑　蜀椒
吳茱萸　桂心　各二兩半　烏頭　三兩　厚朴
遠志　茯苓　各一兩半　當歸　二兩　棗膏　五合
乾地黃　一兩十八銖
右三十二味為末蜜和擣五千杵丸如梧子大酒服
十丸日三稍加之
烏頭圓治男子女人寒冷腹内積聚邪氣往來厥逆搶心心痛癖悶吐下不止婦人産後羸瘦方
烏頭　十枚　五　吳茱萸　蜀椒　乾薑
桂心　各二兩半　乾地黃　一兩半　前胡　細辛
人參　芎藭　白薇　各一兩六銖　皂莢
紫菀　白薇　芍藥　各十八銖
右十五味為末蜜丸如梧子大酒下十丸日三稍加之以知為度
治心腹疝瘕脇下及小腹滿堅痛有積寒氣入腹使人

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

腹中冷發甚則上搶心氣滿飲食喜嘔方

大黃 茯苓 各一兩半 桂心 黃芩

吳茱萸 細辛 人參 蜀椒

乾薑 各六銖一兩 男髮灰 半兩 牡丹 甘草

芎藭 蒞蓉 蟅蟲 各八銖十 芍藥

防葵 蚤蟲 厚朴 半夏 各一兩

右二十味爲末蜜丸如梧子大服五丸日再漸加之

恒山圓治脇下邪氣積聚往來寒熱如温瘧方

恒山 蜀漆 白薇 桂心

鮀甲 白朮 附子 鼈甲

蜚蠊 各一兩半 蛴螬 六銖

右十一味爲末蜜丸如梧子大以米泔清服五丸日

三

又方蒸鼠壤土熨之冷即易腹中切痛炒鹽半升令熾

内湯中飲之大吐瘥若手足痛者燒青布内小口器中

熏痛處

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:06
列印頁數：744
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

神明度命圓治久患腹内積聚大小便不通氣上搶心
腹中脹滿逆害飲食方
大黄 芍藥 各二兩
右二味爲末蜜丸如梧子大服四丸日三不知可加
至六七丸以知爲度
治萬病積聚方
七八月收蒺藜子不限多少以水煮過熟取滓曝令
乾濤篩蜜丸如梧子大酒服七丸以知爲度其汁煎
如飴服之
陷胷湯治胷中心下結積飲食不消方
栝蔞實 大黄 黄連 各二兩 甘草一兩
右四味㕮咀以水五升煮取二升五合分三服
太乙神明陷冰圓治諸疾破積聚心下支滿寒熱鬼注
長病欬逆唾噫辟除衆惡殺鬼逐邪氣惡胷中結氣咽
中閉塞有進有退繞臍側側隨上下按之跳手心中慍
慍如有蟲狀毒注相染滅門

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:07
列印頁數：745
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

雄黃 油一日煮 丹砂 礬石 當歸
大黃 各二兩 巴豆 一兩 犀角 鬼臼
射罔 藜蘆 各一兩 眞珠 附子 各一兩半
麝香 牛黃 人參 各半兩 蜈蚣
右二十四味爲末蜜和擣三萬杵丸如小豆大先食
飲服二丸日二不知稍加仍以藥二丸安門戶上令
斑猫 七枚 樗雞 地膽 三枚 桂心 三兩
蜥蜴 各一枚 芫青 五枚 烏頭 八枚 杏仁 四十枚
蜥蜴 各二枚 地膽 五十枚 蜚蠊 十四枚 朴硝
蜚蠊 各三十枚 蜈蚣 各二枚 蜚蠊 十四枚 朴硝
蠍蟲 杏仁 各三十枚 蜥蜴 蜈蚣 各二枚 地膽 五十枚 蜚蠊 十四枚 朴硝
人邪鬼忤亦能遣之方
猘犬所作鴆毒入人五臟服藥以消殺其毒食不消婦
氣鬼忤蠱毒邪氣往來夢寤存亡留飲結積虎狼所嚙
蜥蜴圓治癥堅水腫蜚尸百注遁注尸注骨血相注惡
不敢近傷寒服之無不即瘥 此方與尸疰篇方重
衆惡不敢近家及視病人夜行獨宿服二丸令衆惡

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

巴豆 各一兩 十八銖
欵冬花 犀角
澤漆 桑赤雞 鬼督郵 各十八銖
虎骨 各一兩半 甘草 芍藥
右二十味爲末別治巴豆杏仁如膏内藥末研調下
蜜擣二萬杵丸如麻子先食飲服三丸日一不知加
之不敢吐下者一丸有人風冷注癖堅二十年者得
大五明狼毒圓治堅癖痞在人脅脇或在心腹方

癆 此方與尸疰篇方重

狼毒 乾地黄 各四兩 附子 大黄
蕤蓉 人參 當歸 細辛
蜀椒 五味子 蔺茹 欵冬令煙盡 各一兩
半夏 二兩 乾薑 桂心 各一兩半 芫花
莽草 厚朴 防已
旋覆花 各半兩 杏仁 三十枚 巴豆 二十四枚
右二十一味爲末蜜和丸如梧子大服二丸日二夜
一以知為度

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

小狼毒圓治同前

狼毒 三兩 附子 旋覆花 半夏

蘭茹 白附子 各二兩

右六味爲末蜜和擣五千杵丸如梧子大飲服三丸加至十丸日三 附子蘭茹只有三味 後方無半夏白附

狼毒圓治堅癖方

狼毒 五兩 半夏 杏仁 各三兩 桂心 四兩 附子 蜀椒 細辛 各二兩

右七味爲末別擣杏仁蜜和丸如大豆飲服二丸

甘遂湯治暴堅久痞腹有堅方

甘遂 黃芩 芒硝 桂心 細辛 各一兩 大黃 三兩

右六味㕮咀以水八升煮取二升半分三服

治卒暴癥腹中有物堅如石痛如斫刺晝夜啼呼不治

百日必死

牛膝二斤㕮咀曝令乾以酒一斗浸之密塞器口煎

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取半服半升一服便吐去宿食神效

治卒暴癥方

擣碎商陸根蒸之以新布籍腹以藥鋪著其上以衣物覆其上冷易之數日用之旦夕勿息

又方蒜十斤取五月五日戶上者去皮鼈中黃土如雞子大一枚桂心一尺二寸

右三味合擣以淳苦酒和塗布上以掩病處不過三日消凡蒜亦佳肘後方不用桂方

野葛膏治卒暴癥方

野葛一尺當歸細辛各一兩蜀椒半兩烏頭二兩巴豆一百枚附子雄黃油煮一日

右八味咬咀以大醋浸一宿猪膏二斤煎附子色黃去滓內雄黃粉攪至凝傅布上以掩癥處復以油重布上復著十重紙以熨斗盛火著其上常令熱日三夜二須膏乾為度

消石大圓治十二癥瘕及婦人帶下絶產無子并欲服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寒食散而腹中有癥瘕實者當先服大丸下之後與寒食散大丸不下水穀但下病耳不令人困方

消石 六兩朴硝亦得 大黃 八兩 人參 甘草 各二兩

右四味爲末以三年苦酒三升置銅器中以竹筯拄器中一升作一升凡三升作三刻以置火上先内大黃常攪不息手使微沸盡一刻乃内餘藥又盡一刻餘一刻極微火使可丸如雞子中黃凡合藥當先齋戒一宿勿令小兒女人奴婢等見之欲下病者用二也丸欲令大不欲令細能不分爲善若人羸者可少與强者可二十日五服和調半日乃下若婦人服之下者或如雞肝或如米汁正赤黑或一升或三升下後慎風冷作一杯粥食之然後作羹臛自養如産婦法六月則有子禁生魚猪肉辛菜若寒食散者自如藥法不與此同日一服

土爪圓治諸藏寒氣積聚煩滿熱飲食中盡毒或食生

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:09
列印頁數：750
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

物及水中蟲卵生入腹而成蟲蛇若爲魚鼈留飲宿食
婦人産瘕帶下百病陰陽不通利大小便不節絶傷墮
落寒熱交結脣口焦黑身體消瘦嗜卧少食多魘産乳
胞中餘疾股裏熱少腹中急結痛引陰中方

土瓜根　桔梗　各半
大黄　一斤蒸二斗末下曝乾　升末　杏仁　一升

右四味爲末蜜丸如梧子大空腹飲服三丸日三不
知加之以知爲度

治凡所食不消方

取其餘類燒所末酒服方寸匕便吐去宿食即瘥有
食桃不消作病者以時無桃就樹間得槁桃燒服之
登時吐病出甚良

治卒食不消欲成癥積方

煎艾汁如飴取半升作一服便刺吐去宿食神良古今
録驗方白艾五尺圍一束葱苡根一大把二味同煎

治食魚肉等成癥結在腹内并諸毒氣方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

狗屎五升燒末綿裹以酒一斗浸再宿濾取清分十服日三三日令盡隨所食癥結即出

治雜食瘀實不消心腹堅痛方

以水三升煮白鹽一升令消分三服剌吐去所食并治暴癥

治癥堅心下有物大如杯不得食食則腹滿心腹絞痛方

葶藶子 大黃各二兩 澤漆四兩

右三味別研葶藶為膏其二味擣五百杵入蜜更擣千杵和丸如梧子大服五丸不知加之日三

治小腹堅大如盤胷中滿脹食不消化婦人瘦瘠方

以暖水服髮灰一方寸匕日再并灸肋端

又方飲服上好麴末方寸匕日三又灸三焦輸隨年壯瘥

治伏梁氣方

白馬尿銅器中盛取每旦服一升

治癥瘕方

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:10
列印頁數：752
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

槲樹白皮煎令可丸服之取知病動若下減之

椒熨方治患癥結病及瓜病似瓜形日月形或在臍左右或在臍上下或若鼈在左右肋下或當心如合子大法先針其足以椒熨之

取一新盆子受一斗者底鑽一百二十孔孔上著椒三合上著一重紙紙上著冷灰一升冷灰上著熱灰半升上著剛炭火一斤經一食頃盆底熱徹當病上初安氈一重即安火盆火盆大熱以漸更加一重若火更熱不可忍加至三重暫歇進一口冷飲還上火消二分許即停止經三日勿著及至七日決得頓瘥然後食美食自補若小不瘥作露宿丸服之 方見別卷

治腹中積癥方

葶藶子一升熬以酒五升浸七日每服三合日三

治蛇癥方

白馬尾切長五分以酒服方寸匕大者自出更服二分者一方寸匕中者亦出更服三分者一方寸匕小

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

者復出不可頓作一服殺人馬尾一本作馬毛

大黃湯治蛇癥方

大黃 茯苓 各半兩一本作黃芩 烏賊骨 二枚 皂莢 六枚猪牙者如指大一尺 甘草 如雞子大一枚 芒硝 如

右六味㕮咀以水六升煮三五沸去滓内消適寒温盡服之十日一劑作如上法宿勿食平旦空腹服病根當下也

治鼈癥腹堅硬腫起大如盆眠臥不得方食中得病為鼈癥在心下堅强

取藍一斤濤水三升絞取汁每服一升日二

又方蒴藋根白皮一握研取汁以水和頓服之

又方白馬尿一升雞子三枚取白合煎取二合空腹頓服不移時當吐病出

又方雞屎一升炒令黃取五合以酒一升浸取半擣為末以所浸酒服方寸匕日二服三日中作一劑

治蛟龍病開皇六年三月八日有人食芹得之其人病發似癲癇面色青黃因食寒食錫過多便吐

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

出狀似蛟龍有頭而有尾

服寒食餳三斗大驗

山野人有噛蝨在腹生長為蝨癥病治之方

故敗篦子　故敗梳　各一枚

右二件各破為兩分各取一分燒為末又取一分以水五升煮取一升服上件燒末頓服即出

常欲食米若不得米則胸中清水出為米癥治之方

雞屎一升　白米五合

右二味合炒令米焦擣末以水二升頓服取盡須臾吐出病如研米若無米當出痰自此永憎米不復食之矣

人有思肉不已食訖復思者為肉癥治之方

空腹飲白馬尿三升吐有肉出不出必死

食中有髮不覺因食而入久即胷間如有蟲狀上下去來惟欲飲油一日之中乃至三二升不欲飲食者為髮癥方

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:11
列印頁數：755
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以油一升以香澤煎之大□勞貯之安病人頭邊令口鼻臨油上勿令得飲傅鼻而令有香氣當叫喚取飲不得與之必當疲極大睡其髮癥當從口出令一人專守視之并備石灰一裹見癥出以灰粉手捉癥抽出及盡即是髮也初從腹中出形如不流水中濃菜隨髮長短形亦如之

又方酒三升煮猪脂二升三沸服一升日二白馬尿服之亦佳無白馬尿白牛尿亦得

灸法

癥瘕灸內踝後宛宛中隨年壯又灸氣海百壯

久冷及婦人癥瘕腸鳴泄利繞臍絞痛灸天樞百壯三

報穴在俠臍兩邊各二寸勿針

積聚堅滿灸脾募百壯穴在章門季肋端

心下堅積聚冷脹灸上管百壯三報穴在巨闕下一寸

積聚堅大如盤冷脹灸胃管二百壯三報穴在巨闕下二寸

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:11
列印頁數：756
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷三十八　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

膽腑方

膽腑脉論第一

論曰膽腑者主肝也肝合氣於膽膽者中清之腑也（難經）云膽者清淨之腑甲乙云中清之腑也號將軍決曹吏重三兩三銖長三寸三分在肝短葉間下貯水精汁二合（難經作三合）能怒能精氣（甲乙作神）而不瀉故滿而不能實六腑者傳化物而不藏故實而不能滿所以然者水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛故曰實而不滿滿而不實也

名曰傳化之腑此不能久留輸瀉者也所謂五臟者藏精氣而不瀉也故滿而不能實六腑者傳化物而不藏故實而不能滿也

天氣之所生也其氣象天故瀉而不藏此受五臟濁氣

不瀉名曰奇恒之腑若胃大腸小腸三焦膀胱此五者

胞此六者地氣之所生也皆藏於陰而象於地故藏而

喜能剛能柔目下果大其膽乃橫凡膽腦髓骨脉女子

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:12
列印頁數：758
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

左手關上陽絶者無膽脉也若膝疼口中苦眯目善畏如見鬼多驚少力刺足厥陰治陰在足大趾間或刺三毛中

左手關上陽實者膽實也若腹中不安身軀習習也刺足少陽治陽在足上第二趾本節後一寸是也

膽病者善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之咽中介介然數唾候在足少陽之本末亦見其脉之陷下者灸之其寒熱刺陽陵泉若善嘔有苦長太息心中澹澹善悲恐如人將捕之邪在膽逆在胃膽液則口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰嘔膽刺三里以下胃氣逆刺足少陽血絡以閉膽却調其虛實以去其邪也

膽脹者脇下痛脹口苦太息

肝前受病移於膽肝款不已則嘔膽汁

厥陰客於膽則夢鬬訟 甲乙云夢鬬訟自剣

肝應筋爪厚色黄者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪耎色赤者膽緩爪直色白無約者膽直爪惡

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:13
列印頁數：759
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

色黑多敗者膽結

扁鵲云足厥陰與少陽為表裏表清裏濁其病若實極則傷熱熱則驚動精神而不守臥起不定若虛則傷寒寒則恐畏頭眩不能獨臥發於玄水其根在膽先從頭面起腫至足 方見治水篇中

膽有病則眉為之傾病人眉系傾者七日内必死

足少陽之脉是動則病口苦善太息心脇痛不能反側甚則面微塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨所生病者頭痛角頷痛目兌皆痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀挾癭汗出振寒瘧胸中脇肋髀膝外至脛絶骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用盛者則人迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也 其經脉經筋支別已見肝臟部中

膽虛實第二 脉灸法 方

膽實熱

左手關上脉陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲食不下咽乾頭痛洒洒惡寒脇痛名曰膽實熱也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏湯治膽腑實熱精神不守瀉熱方

半夏 宿薑 各三兩 黃芩 一兩 生地黃 五兩 遠志 茯苓 各二兩 秫米 一斗 酸棗仁 五合

右八味㕮咀以千里長流水五斗煮秫米令蟹目沸揚一千餘徧澄清取九升煮藥取三升半分三服 集驗方治虛煩悶不得眠無地黃遠志有麥門冬桂心各三兩甘草人參各二兩

灸濁浴隨年壯穴在俠膽輸傍行相去五寸

治胸中膽病方

膽虛寒

左手關上脉陽虛者足少陽經也病苦眩厥癈足指不能搖躄不能起僵仆目黃失精眩眩名曰膽虛寒也

温膽湯治大病後虛煩不得眠此膽寒故也宜服此方

半夏 竹茹 枳實 各二兩 橘皮 三兩 生薑 四兩 甘草 三兩

右六味㕮咀以水八升煮取二升分三服

治膽虛方

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:14
列印頁數：761
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

灸三陰交各二十壯穴在内踝上一夫

千里流水湯治虛煩不得眠方

麥門冬 半夏 各三兩 茯苓 四兩 酸棗仁 二升

甘草 桂心 黄芩 遠志

葦薾 人參 生薑 各二兩 秫米 一斗

右十二味㕮咀以千里流水一斛煮米令蟹目沸揚

萬遍澄清取一斗煮藥取二升半分三服

酸棗湯治虛勞煩擾奔氣在胷中不得眠方

酸棗仁 五升 人參 桂心 生薑 各二兩

石膏 四兩 茯苓 知母 各三兩 甘草 一兩半

右八味㕮咀以水一斗先煮酸棗仁取七升去滓下

藥煮取三升分三服日三

治虛勞煩悶不得眠方

大棗 二七枚 蔥白 七莖

右二味以水三升煮取一升去滓頓服

梔子湯治大下後虛勞不得眠劇者顛倒懊憹欲死方

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:14
列印頁數：762
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

仲景云發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子湯主之

大梔子 十四枚 豉 七合

右二味以水四升先煮梔子取二升半内豉更煮三

沸去滓每服一升安者勿更服若上氣嘔逆加橘皮

二兩亦可加生薑二兩

治煩悶不得眠方

枸杞白皮 生地黄 五兩 麥門冬 甘草

前胡 各三兩 茯苓 知母 各四兩 人參 二兩

粟米 豉 各五合

酸棗 榆葉 各等分

治虛勞不得眠方

右十味㕮咀以水八升煮取三升七合分四服

右二味為末蜜丸如梧子每服十五丸日再為度

又方乾薑四兩為末湯和頓服覆取汗病愈

咽門論第三

論曰夫咽門者應五臟六腑往還神氣陰陽通塞之道

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

也喉嚨胞囊舌者並津液調五味之氣本也不可不研乎咽門者肝膽之候也其重十兩廣二寸五分至胃管長一尺六寸主通五臟六腑津液神氣應十二時若臟熱則咽門閉而氣塞若腑寒則咽門破而聲嘶毋薑酒主之 方見別卷 熱則通之寒則補之若寒熱調和病不生矣

髓虛實第四 論方

論曰髓虛者腦痛不安髓實者勇悍凡髓虛實之應主於肝膽若其腑臟有病從髓生熱則應臟寒則應腑

羌活補髓圓治髓虛腦痛不安膽腑中寒方

羌活 芎藭 當歸 各三兩 桂心 二兩 人參 四兩 棗肉 研如脂 羊髓 酥 各一升 牛髓 大麻仁 各二升 熬研如脂

右十味先擣五種乾藥為末下棗膏麻仁又擣相濡為一家下二髓并酥內銅鉢中重湯煎取好為丸如梧子酒服三十丸日二服稍加至四十丸

柴胡發泄湯治髓實勇悍驚熱主熱方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

柴胡　升麻　黄芩　細辛
枳實　梔子仁　芒硝三兩　淡竹葉
生地黄一升　澤瀉四兩
右十味咬咀以水九升煮取三升去滓下硝分三服
風虚雜補酒煎第五方
巴戟天酒治虚羸陽道不舉五勞七傷百病能食下氣
方
巴戟天　牛膝各三斤　枸杞根白皮　麥門冬
地黄　防風各二斤
右六味並生用卒無生者用乾者亦得咬咀以酒一
石四斗浸七日去滓温服常令酒氣相續勿至醉吐
慎生冷猪魚油蒜春七日秋冬二七日夏勿服先患
冷者加乾薑桂心各一斤好忘加遠志一斤大虚勞
加五味子蓯蓉各一斤陰下濕加五加根皮一斤有
石斛加一斤佳每加一斤藥則加酒七升此酒每年
入九月中旬即合入十月上旬即服設服餘藥以此

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

酒下之大妙滓曝乾擣為末以此酒服方寸匕日三

益生常加甘草十兩佳虛勞加黃耆一斤

又方

巴戟天　生牛膝　各三斤

五加皮　枸杞根　白皮各一斗

五加酒治虛勞不足方

右二味㕮咀以水一石五斗煮取汁七斗分取四斗浸麴一斗餘三斗用拌飯下米多少如常釀法熟壓取服之多少任性禁如藥法倍日將息

天門冬大煎治男子五勞七傷八風十二痺傷中六極一氣極則多寒痺腹痛喘息驚恐頭痛二肺極則寒痺腰痛心下堅有積聚小便不利手足不仁三脉極則顏色苦青逆意喜恍惚失氣狀似悲泣之後苦舌强咽喉乾寒熱惡風不可動不嗜食苦眩喜怒妄言四筋極則拘攣小腹堅脹心痛膝寒冷四肢骨節皆痛疼五骨極

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

則肢節厥逆黃疸消渴癰疽妄發重病浮腫如水病狀六肉極則發症如得擊不復言甚者至死復生衆醫所不能治此皆六極七傷所致非獨房室之為也憂恚積思喜怒悲懽復隨風濕結氣欬時嘔吐食已變大小便不利時泄利重下溺血上氣吐下乍寒乍熱臥不安席小便赤黃時時惡夢夢與死人共飲食入冢神室魂飛魄散筋極則傷肝傷肝則腰背相引難可俯仰氣極則傷肺傷肺則小便有血目不明髓極則陰痿不起住而不交骨極則傷腎傷腎則短氣不可久立陰痛惡寒甚者卵縮陰下生瘡濕痺手搔不欲住汁出此皆為腎病甚者多遭風毒四肢頑痺手足浮腫名曰脚弱一名脚氣醫所不治此悉主之方

天門冬　生地黃　各切三斗半搗壓盡取汁　白蜜　三升煉

酥　三升煉　枸杞根　切三斗淨洗以水二石五斗煮取一斗三升澄清　麝香　一具擣碎以水一石煮取五斗澄清

右六味並大斗銅器中微火先煎門冬地黃汁減半

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乃合煎取大斗二斗下後件散藥煎取一斗内銅器重釜煎令隱掌可丸如梧子大平旦空腹酒服二十丸日二加至五十丸慎生冷醋滑猪雞魚蒜油麪等須擇四時王相日修合其合和一如第一卷合和篇説散藥如左

茯苓 桂心 白朮 菱蕤 薯蕷 栢子仁 人參 石斛 五加皮 葛蒲 遠志 澤瀉 牛膝 杜仲 覆盆子 細辛 獨活 枳實 芎藭 大豆黄卷 黄耆 蒐蕘 續斷 狗脊 胡麻仁 菴蘭 白芷 橘皮 茯神 巴戟天 石南 各二兩 阿膠 十兩 甘草 六兩 蜀椒 薏苡仁 一升 蔓荆子 三兩 大棗 一百枚 煮作膏 鹿角膠 五兩

右三十八味治下篩内煎中有牛髓鹿髓各加三升

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大佳小便澁去栢子仁加秦艽二兩乾地黄六兩陰癒失精去萎蕤加五味子二兩頭風去栢子仁加菊花防風各二兩小便利陰氣弱去細辛防風加山茱萸二兩腹中冷去防風加乾薑二兩無他疾依方修合凡此煎九月下旬採藥立冬日合服至五月上旬止若十二月臘日合者經夏至七月下旬止若停留經夏不壞當於舍北陰處入地深六尺填沙置藥中上加沙覆之則經夏不損也女人先患熱者得服患冷者勿服

肉蓯蓉　甘草

填骨萬金煎治内勞少氣寒疝裏急腹中喘逆腰脊痛方

生地黄 三十斤 取汁

阿膠 各一斤

麥門冬 乾地黄 各二斤

乾薑

牛髓 三斤

白蜜 十斤

清酒 四斗

桔梗　五味子　桑根白皮　桂心 各八兩

茯苓　人參

附子 各五兩

石斛 一斤 五兩

麻子仁 三升

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大棗一百五十枚　當歸十兩　乾漆二十兩　蜀椒四兩

右二十三味先以清酒二斗六升內桑根白皮麻子仁棗膠為刻識之又加酒一斗四升煮取至刻絞去滓內蜜髓地黃汁湯上銅器煎內諸藥末半日許令可丸止大甕盛飲吞如彈丸一枚日三若夏月暑熱煮煎轉味可以蜜地黃汁和諸藥成末為丸如梧子服十五丸不知稍加至三十丸

治男子風虛勞損兼時氣方

甘草一斤　石斛　防風　蒞蓉　人參　薯蕷各四兩　五味子　菟絲子　牛膝　桂心　巴戟天　芎藭各三兩並為末　生地骨皮切碎　胡麻以水二斗煮取四升去滓各二升　生麥門冬汁各三升　生地黃汁各一升　丹參二兩　生薑汁

右二十二味先煮地黃地骨皮胡麻汁減半內牛髓

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:17
列印頁數：770
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蜜薑門冬各等汁微火煎餘八升下諸藥散和令調
内銅鉢中湯上煎令可丸如梧子大酒服三十丸日
二加至五十丸
小鹿骨煎 一云麋骨 治一切虚羸皆服之方
鹿骨 一具碎 枸杞根 切二升
右二味各以水一斗別器各煎汁五升去滓澄清乃
合一器共煎取五升日二服盡好將慎皆用大斗
地黄小煎治五勞七傷羸瘦乾削方
乾地黄 末一升 胡麻油 半升 蜜 二升 猪脂 一斤
右四味銅器中煎令可丸如梧子大飲服三丸日三
稍加十丸久久常服大有所益瘦黑者肥充
陸抗膏治虚冷枯瘦身無精光虚損諸不足方
牛髓 羊脂 二升 白蜜 各三升
右五味先煎酥令熟次内蓋汁次内蜜次内羊脂牛
髓後微火煎三上三下令蓋汁水氣盡即膏成攪令

酥 經心錄用猪脂 生蓋汁

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:18
列印頁數：771
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凝止温酒服隨人能否不限多少令人肥健發熱也
經心録云治百病勞損風濕補益神效男女通可服之良
枸杞煎補虚羸久服輕身不老神驗方
九月十日取生濕枸杞子一升清酒六升煮五六沸出取熟研濾取汁令其子極浄曝令乾擣末和前汁微火煎令可丸酒服二方寸匕日二加至三匕亦可丸服三十丸
夏姬杏仁煎方
杏仁三升内湯中去皮尖兩仁熟擣盆中水研取七八升汁以鐵釜置熾火上取羊脂四斤就釜内磨消内杏仁汁温之四五日色如金狀餌如彈子日三服百日肥白易容人不能識也
又方杏仁熬黄去皮尖擣服如梧子日三治枯瘦令人潤澤無所禁忌逆上氣喉中百病心下煩不得咽者得茯苓欵冬紫菀併力大良其藥生熱熟冷喉中如有息肉者亦服之桃仁煎方

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:18
列印頁數：772
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桃仁 為末 蜜 各一斤 酥半斤 胡麻一升末

牛乳 五升 地黃十斤取汁

右六味合煎如餳旋服之

治五勞七傷方

白羊頭蹄 一具淨治更以草火燒令黃赤以淨綿急塞鼻及腦孔

胡椒 蓽撥 乾薑 各一兩 葱白一升

豉 二升

右七味先以水煮頭及蹄半熟即内藥煮令極爛去

藥冷暖任性食之日一具七日凡七具忌生冷酢滑

五辛陳臭等物

治虛勞補方

羊肚 一具切 白朮一升

右二味以水二斗煮取六升每服二升日三為度

又方

豉 一升蒸三遍 薤白一斤切

右二味以水七斗煮取三升分三服小取汗

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:18
列印頁數：773
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

膏煎治虛羸瘦方

不中水猪肪煎取一升内蔥白一握煎令黄出内盆中平旦空腹服訖暖覆臥至晡時食白粥粥不得稀過三日服補藥方如左

羊肝 一具　羊脊旁肉 一條　麴末 半斤　枸杞根 十斤

右四味以水三斗煮枸杞取一斗去滓細切肝等内汁中煮著蔥豉鹽如羹法合煎看如稠糖即好食之七日禁如藥法

補虛方

猪肚 一具　人參 五兩　蜀椒 一兩　乾薑 二兩半

蔥白 七兩　白粱米 半斤千金翼用粳米

右六味咬咀諸藥令相得和米内肚中縫合勿令泄氣取四斗半水緩火爛煮空腹食之大佳兼下少飯

論曰稟邱云吐血有三種有内衄有肺疽有傷胃内衄者出血如鼻衄但不從鼻孔出是近從心肺間津液出

吐血第六　論灸法方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

還流入胃中或如豆羹汁或如切□血凝停胃中因即滿悶便吐或去數斗至一石者是也得之於勞倦飲食過常所為也肺疽者或飲酒之後毒滿悶吐之時血從吐後出或一合半升一升是也傷胃者因飲食大飽之後胃中冷則不能消化不能消化便煩悶强嘔吐使所食之物與氣共上衝蹴因傷裂胃口吐血色鮮正赤腹絞痛白汗出其脉緊而數者為難治也問曰病胷脇支滿妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名為何何以得之對曰病名血枯此得之年少時有所大奪血若醉入房中氣竭而肝傷及傷肝也凡吐血後體中但自悗悗然心中不悶者輒以雀卵大如小豆以五丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中故使月事衰少不來也治以鯢賊骨藺茹二味并合丸自愈假令煩躁心中悶亂紛紛嘔吐顛倒不安醫工又與黃土湯阿膠散並加悶亂卒至不濟如此悶者當急吐之方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

爪蔕 二分
杜蘅 人參 各一分
右三味治下篩服一錢匕或無水漿但得下即可贏人小減之吐去青黃或吐血一二升無苦
黃土湯治吐血方
伏龍肝 雞子大三枚
桂心 乾薑
阿膠 芍藥 各一兩
生地黃 八兩
細辛 半兩
當歸 芎藭
吳茱萸 二升
伏龍肝 半斤
甘草 乾薑 仲景作地黃 白朮
阿膠 黃芩 各三兩
右六味㕮咀以水一斗煮取三升去滓下膠分三服
仲景有附子三兩為七味
生地黃湯治憂恚嘔血煩滿少氣胷中痛方
又方治卒吐血及衄血方
滓內膠煮取三升分三服亦治衄血
右十二味㕮咀以酒七升水三升合煮取三升半去

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生地黃一斤　大棗五十枚　阿膠三兩　甘草三兩各

右四味㕮咀以水一斗煮取四升分四服日三夜一

堅中湯治虛勞内傷寒熱嘔逆吐血方

糖三斤　芍藥半夏生薑

甘草三兩各　桂心二兩　大棗五十枚

右七味㕮咀以水二斗煮取七升分七服日五夜二

千金翼無甘草桂心有生地黃

治噫止唾血方

石膏四兩　厚朴三兩　麻黃生薑

五味子半夏

右八味㕮咀以水一斗煮麻黃去沫澄取七升内藥

杏仁二兩各　小麥一升

煮取二升半分再服

麻黃生薑

治吐血胷中塞痛方

芍藥乾薑桂心

當歸大黃芒硝三兩各　阿膠

甘草二兩　人參二兩各　麻黃一兩　乾地黃四兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蝨蟲　水蛭　各八十枚　大棗　二十枚　桃仁　一百枚

右十六味咬咀以水一斗七升煮取四升分五服日三夜二

治吐血内崩上氣面色如土方

右四味咬咀以水五升煮取一升内馬通汁一升煮取一升頓服（仲景名栢葉湯不用阿膠小品不用栢葉與肘後同）

乾薑　阿膠　各二兩　栢葉　各二兩　艾　一把

治吐血酒客温疫中熱毒乾嘔心煩方

蒲黄　犀角　各二兩　栝蔞根　甘草　各二兩

葛根　桑寄生　各二兩

右六味咬咀以水七升煮取三升分三服

澤蘭湯治傷中裏急胷脇攣痛欲嘔血時寒時熱小便赤黄此皆傷於房勞故也

澤蘭　糖　各一斤　桂心　桑根　白皮　各二兩

人參　各二兩　遠志　二兩　生薑　五兩　麻仁　一升

右八味咬咀以醇酒一斗五升煮取七升去滓内糖

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

食前服一升日三夜一勿勞動

治忽吐血一兩口或是心刎或是内崩方

蠐螬五枚　牛膝　王不留行　麥門冬二兩　蕳蘭　芍藥　乾地黄四兩　阿膠各三兩

右十味咬咀以生地黄汁五升赤馬通汁三升煮取三升分三服不瘥更合數劑取瘥止

又方熟艾三雞子許水五升煮取二升頓服

又方燒亂髮灰水服方寸匕日三服　集驗云治舌上忽出血如簪孔者亦治小便出血者

又方凡吐血服桂心末方寸匕日夜可二十服　肘後云亦療下血良

頓服

生地黄肥者五升擣以酒一升煮沸三上三下去滓

治虚勞吐血方

又方生地黄五斤絞取汁微火煎三沸投白蜜一升又

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煎取三升每服半升日三主胷痛百病久服佳

又方栢葉一斤以水六升煮取三升分三服

又方

生地黃汁 升半 川大黃末 一方寸匕

右二味先温地黃汁一沸次内大黃攪和空腹頓服日三瘥

犀角地黃湯治傷寒及温病應發汗而不汗之内畜血者及鼻衄吐血不盡内餘瘀血大便黑面黃消瘀血方

犀角 一兩 生地黃 八兩 芍藥 三兩 牡丹皮 二兩

右四味㕮咀以水九升煮取三升分三服喜妄如狂者加大黃二兩黃芩三兩其人脉大來遲腹不滿自言滿者為無熱但依方不須有所增加

治五臟熱結吐血衄血方

伏龍肝 一雞子枚大 生竹茹 一升 芍藥 當歸 黃芩 芎藭 甘草 各二兩 生地黃 一斤

右八味㕮咀以水一斗三升先煮竹茹減三升下藥

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:21
列印頁數：780
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取三升分三服 千金翼有桂心
當歸湯治劒血吐血方
當歸 乾薑 各二兩 芍藥 阿膠 各三兩 黃芩 三兩
右五味㕮咀以水六升煮取二升分三服
治上焦熱膈傷吐血劒血或下血連日不止欲死並主之
艾葉 竹茹 各一升 阿膠 如手掌大 乾薑 二兩
右四味㕮咀以水三升煮取一升去滓內馬通汁半升煮取一升頓服一方不用竹茹加乾薑作七兩
又方取新馬屎與少水和絞取汁
治虛勞崩中吐血下血上氣短氣欲絶面黑如漆方
生薑 一斤 黃耆 芍藥 芎藭 甘草 各四兩
右五味㕮咀以酒五升浸一宿明旦更以水五升煮取四升分四服日三夜一下陰中毒如湯沃雪凡夏

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

月不得宿浸藥酒客勞熱發痔下血其穀道熱者去

生薑用生地黃代之凡進三兩劑

竹茹湯治吐血汗血大小便下血方

竹茹 二升 甘草 芎藭 黃芩

當歸 各六分 芍藥 白朮 人參

桂心 各一兩

治九孔出血方

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一

擣荊葉汁酒服二合 荊一本作芥

治吐血蟲毒痔血女子腰腹痛大便後出清血者方

取東向蘘荷根擣絞取汁二升頓服立瘥

赤小豆散諸下血先見血後見便此爲遠血宜服黃土湯 方見前七味仲景方是 先見便後見血此近血宜服赤小豆散方

赤小豆 三升熬令折

當歸 三兩

右二味治下篩每服方寸匕日三

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:22
列印頁數：782
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾地黃圓治血虛勞胷腹煩滿疼痛瘀血往來臟虛不受穀氣逆不得食補中理血方

乾地黃 三兩　當歸　乾薑　麥門冬

甘草 二兩　黃芩 各二兩　厚朴　乾漆

枳實　防風　大黃　細辛

白朮 各一兩　茯苓 五兩　前胡 六分　人參 五分

蝟蟲　蜚蟲 各五十枚

右十八味為末蜜丸如梧子大先食服十丸日三稍加

麥門冬湯治凡下血虛極方

麥門冬　白朮 各四兩　甘草 一兩　牡蠣

芍藥　阿膠 各三兩　大棗 二十枚

右七味�once以水八升煮取二升分再服

胷中瘀血椿滿脇膈痛不能久立膝痿寒三里主之


嘔血肩脇痛口乾心痛與背相引不可欬欬引腎痛不容主之 一作容

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

心膈下嘔血上管主之　唾血振寒嗌乾大淵主之
嘔血太陵及郄門主之　嘔血上氣神門主之　内傷唾血不足外無膏澤刺地五會
灸法
治虛勞吐血灸胃管三百壯亦主勞嘔逆吐血少食多飽多唾百病（多唾一作多睡）
吐血唾血灸鳩堂百壯不可針
吐血酸削灸肝輸百壯
吐血腹痛雷鳴灸天樞百壯
吐血唾血上氣欬逆灸肺輸隨年壯
吐血嘔逆灸手心主五十壯（千金翼云太陵是）
凡口鼻出血不止名腦衄灸上星五十壯入髮際一寸是
大便下血灸第二十椎隨年壯

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:23
列印頁數：784
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)


欽定四庫全書
子部
備急千金要方卷三十九
四十

詳校官太醫院醫士臣舒 伋
編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈐
校對官中書臣胡紹基
謄録監生臣秦聯登

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷三十九 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

膽腑方

萬病丸散第七 論方

論曰聖人之道以慈濟物博求衆藥以戒不虞倉卒之際應手皆得故有萬病方焉余以此方散在羣典乃令學者難用討尋遂鳩撮要妙以為斯品庶使造次可得好事君子安不忘危無事之暇可預和合以備痾瘵也

芫花散治一切風冷痰飲癥癖瘕瘧萬醫所不治者皆治之 一名登仙酒 一名三建散

芫花 桔梗 紫菀 大戟

王不留行 烏頭 附子 天雄

白朮 五加皮 菟花 狼毒

莽草 欒荊 栝蔞根 蹢躅

麻黄 白芷 荆芥 茵芋 各十分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

車前子 石斛
石長生 各七分 蛇床子 蕈薾
狗脊 菟絲子 蒺蔾 各二分 闕
藜蘆 薯蕷 薏苡仁 巴戟天
細辛 當歸 芎藭 乾地黃
食茱萸 杜仲 厚朴 黃耆
山茱萸 乾薑 芍藥 桂心
黃芩 吳茱萸 防已 遠志
蜀椒 獨活 五味子 牡丹
橘皮 通草 柴胡 栢子仁
藁本 葛蒲 茯苓 續斷 各二分
右六十四味 千金翼有麻花半夏赤車使者高良薑紫蔵無白朮食茱萸等七味 並不
治不擇不灸不熬但振去塵土擣以粗羅下之即與
服凡是猪雞五辛生冷酢滑任意食之無所忌惟諸
豆皆殺藥不得食

藥散 三兩 細麴末 二升 糯米 三升 眞酒 五升

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

先以三大斗水煮米作粥須極熟冬月揚去火氣春月稍凉夏月揚絶火氣令極冷秋稍温次下麴末搦使和柔相得重下藥末搦使突突然好熟乃下真酒重搦使散盛不津器中以淨杖攪散經宿即飲直以布蓋不須密封凡服藥平旦空心服之以知爲度微覺發動流入四肢頭面習習然爲定勿更加之如法服之常常内消非理加增必大吐利服散者細下篩服一方寸匕和水酒漿飲無在稍增以知爲度服丸者細下篩蜜丸如梧子每服七丸但此藥或丸或散皆可惟不得作湯若欲得補不令吐瀉但取内消大益勝於五石兼逐諸病功

十二種□癖并風入頭眼暗漠漠及上氣欬嗽喉中如水雞聲不得眠臥飲食不作肌膚五臟滯氣積聚不消壅閉不通心腹脹滿及連胷背鼓氣堅結流入四肢或復叉心膈氣滿時定時發十年二十年不瘥五種下痢疳蟲寸白諸蟲上下冷熱久積痰飲令人多睡消瘦無

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:25
列印頁數：788
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

力蔭入骨髓便成滯患身體氣腫飲食嘔逆腰脚酸疼四肢沈重行立不能久婦人因産冷入子臟臟中不淨或閉塞不通胞中瘀血冷滯出流不盡時時疹痛為患或因此斷産并小兒赤白下痢及胡臭耳聾鼻塞等病此藥以三丸為一劑服藥不過三劑萬病悉除説無窮盡故稱萬病丸以其用牛黄為主故一名牛黄丸以耆婆良醫故名耆婆丸方

牛黄　麝香　犀角　各一分　桑白皮

茯苓　乾薑　桂心　當歸

芎藭　芍藥　甘遂　黄芩

蜀椒　細辛　桔梗　巴豆

前胡　紫菀　蒲黄　葶藶

防風　各一分　蜈蚣　三節　石蜥蜴　人參　一寸

禹餘糧　芫花　芫青　七枚

朱砂　雄黄　黄連　大戟

右三十一味　崔氏無黄芩桑白皮桔梗防風為二十七味　並令精細牛黄

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:25
列印頁數：789
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麝香犀角朱砂雄黃禹餘糧巴豆別研餘者合擣重絹下篩以白蜜和更擣三千杵密封下破除日平旦空腹酒服三丸如梧子大取微下三升惡水為良若卒暴病不拘平旦早晚皆可服但以吐利為度若不吐利更加一丸或至三丸五丸須吐利為度不得限以丸數病强藥五服即定一服一盞治一切冷病積飲疝瘕上同宿食嘔吐四兩和酒一斗癥瘕腸鳴噫冷蔭瘦者四兩和酒一斗强者六兩和酒一斗半痰及久勞上同癲痔塊堅冷噦上氣二十兩和酒五斗奔豚冷氣六兩和酒一斗半噎及冷痢上同卒中惡注忤心腹脹氣急欲死者三服八兩和酒二斗久疰及久勞上同癲痔塊堅冷噦上氣二十兩和酒五斗奔豚冷氣六兩和酒一斗半噎及冷痢上同卒中惡注忤心腹脹氣急欲死者三服定一服一盞大吐出鮮血癰氣上同蠱毒五服定一服一盞温瘧癉瘧並上同可三服一盞永瘥治婦人諸風諸病等並依前件帶下十二兩和酒三斗崩中六兩和酒一斗半月閉不通及冷病不產並上同斷緒不產八兩和酒二斗月水前後不調乍多乍少亦

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:26
列印頁數：790
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

令人絶産四兩和酒一斗産後風冷不産六兩和酒
二斗若重者八兩和酒二斗甚者十六兩和酒三斗
大重者子宮下垂十六兩和酒四斗

論曰遠覽前古莫覩此方有高人李孝隆者自云隋初
受之於定州山僧惠通道人此後用之大有效驗祕而
不傳但得其藥其方不可得而聞始吾得之於靜智道
人將三紀於兹矣時俗名醫未之許也然比行之極有
神驗其用藥殊不倫次將服節度大不近人情至於救
急其驗特異方知神物效靈不拘常制至理關感智不
能知亦猶龍吟雲起虎嘯風生此其不知所以然而然
雖聖人莫之辯也故述之篇末以貽後嗣好學君子詳
之非止救物兼深抑亦庶幾於博見矣

太乙神精丹治客忤霍亂腹痛脹滿尸疰惡風癲狂鬼
語蠱毒妖魅溫瘧但是一切惡毒無所不治方

磁石 各四兩　金牙 二兩半　丹砂　曾青　雌黄　雄黄

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:26
列印頁數：791
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右六味各擣絹下篩惟丹砂雌黃雄黃三味以醯醋浸之曾青用好酒於銅器中漬紙窨封訖日中曝百日經夏急五日亦得無日以火暖之然後各研令如細粉以醯酢拌使乾濕得所內土釜中以六一泥固濟勿令泄氣乾後安鐵環施脚高一尺五寸置釜上用熟火然後用益生炭其過三上熟火已外皆須加各長四寸置釜上待三分二分盡即益如此三度盡以漸放火無問軟硬炭等皆得初放火取熟兩秤炭火漸多及至一伏時其火已欲近釜即便滿就釜下益炭經兩度即罷火盡極冷然後出之其藥精飛化凝著釜上五色者上三色者次一色者下雖無五色但色光明皎潔如雪最佳若飛上不盡更令與火如前以雄雞翼掃取或多或少不定研和棗膏丸如黍粒 一本云丹砂曾青雄黃雌黃各二斤丹砂以大酢甕器中漬曾青美酒漬紙窨封閉日曝一百日雄黃雌黃各油煎九日九夜去油膩訖更擣數千杵皆勿研之別以大酢拌令泥泥然內藥土釜中以雄黃在下次下雌黃次曾青次丹砂以甘土泥塗勿令餘毫毛許乾以削炭火燒之九日九夜去釜五寸九日

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

九夜至釜底九日九夜侵釜腹三寸三九二十七日冷之一日一夜以刀子於釜際利著一匝開之取丹丹成訖細研如粉以棗膏和一切丹不得用蜜皆用棗膏學者宜知此術舊不用磁石金牙今加而用之治偏風大風惡疾癲癇癰癖鬼打等最良服法平旦空腹一丸如黍米為度其癘病積久百方不瘥又加心腹脹滿上氣身面脚等並腫垂死者服一丸吐即不瘥者後日增半丸漸服無有不瘥氣亦定當吐出瘥亦有不吐瘥者若不吐復不瘥者更服一丸半仍青黃白物其因癘兩脇下有癖塊者亦當消除若心腹不脹滿者可與一丸日日加之以知為度不必盡須吐亦可一丸即瘥勿併與服亦可三日一服皆須以意斟酌量得其宜或腹内有水便即下者勿恠若患癘日近精神健亦可斟酌病人藥性併與兩丸作一丸頓服之皆至午後食勿使冷勿使熱豉漿粥任意食之若病癘盜汗虛弱者日服一丸至三日吐即止若患癘不汗氣復不流脚冷者服一丸至三日若不汗氣復脚即暖有潤汗不至三日吐即止若患癘

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:27
列印頁數：793
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

無顏色者服藥後三日即有顏色亦有須吐瘥者亦有服少許而瘥者亦有殺藥强人服三四丸始覺藥行者凡人稟性不同不可一槩與之但作黍米大服之為始漸加以知為度藥力驗壯勿併多服特慎油麵魚肉蒜當清淨服之若有患久不瘥在牀羸瘦并腹脹滿及腫或下痢者多死但與藥救之十人中或瘥三四人也又一説癥癖瘕積聚服一刀圭以飲漿水送下治諸卒死中惡客忤霍亂腹滿體帶五尸症惡風症忤大病相易死亡滅門狂癲鬼語已死氣絶心上微暖者扶起其頭以物校開口不可開琢去兩齒以漿飲送藥藥下即活諸久病者日服一刀圭覆令汗汗出即愈不愈者不過再服亦有不汗而瘥復有不汗不愈者服如上法加半刀圭以瘥為度常以絳囊帶丸刀圭散男左女右小兒繫頭上辟癘毒惡時氣射公小兒患可苦酒和之塗方寸紙上著兒心腹上令藥在上治之亦有已死者冬二日夏一日與此

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:27
列印頁數：794
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

藥服得藥下便活若不得入腹不活若加金牙磁石者服至五服内必令人吐逆下利過此即自定其藥如小豆大為始從此漸小不得更大大風惡癩可二十服偏風癱癖諸惡風癩病等亦可二十服自餘諸惡病者皆止一二服量人輕重强弱不得多與若欲解殺藥但爛煮食肥猪肉服此藥後小應頭痛身熱一二日來大不能得食味後自漸得氣味五日後更能食若貪食食過多者宜節之若服藥下悶亂可煮木防己湯服之即定凡言刀圭者以六粟為一刀圭一刀圭說云三小豆為一刀圭作土釜法

其法取兩箇瓦盆各受二大斗許以甘土塗其内令極乾又一法作一瓦釜作一熱鐵釜各受九升瓦在上鐵在下其狀大小隨藥多少不必依此說（一本云擣好甘土絹篩水和作泥硬軟如坯瓦泥泥一升内細紙封擣可受十斤亦可隨藥多少作之陰乾三十日置日中曝亦三十日日夕翻轉向日乾訖以糠五碩内釜糠中四向土擫擁之令糠徧釜周同上下各厚七寸

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以火從下放五日五夜勿令人近之待冷一日一夜乃取掃拭令淨以黃丹醋和如稀粥掃其中令厚一分乃内藥凡合九丹八石招魂太清神仙諸大丹皆用此釜作之萬成終不落節其古釜六一泥及鐵釜皆除去之勿更用也此釜一具前後數十同用不動久久轉此法師甚祕之余欲令當來天下學士得解之所以委曲具述之也

作六一泥法

赤石脂　牡蠣　滑石　礬石

黃礬　鹵土　蚯蚓屎　各二兩

右取礦酢以足為度若無鹵土以鹽代之先作甘土泥以泥各別裹前黃礬等五種作團裹之勿令泄氣以火燒周三日最好一日亦得出火破團取藥各擣碎絹篩然後與蚯蚓屎鹵土等分以酢和之如稠粥即得好酢可用二分酢一分水和用取前瓦盆以此泥塗之曾青如蚯蚓屎如黃連佳世少此者好崑崙碌亦得瘥病丹砂亦勘粟砂亦得舊不用磁石金牙今加之用治萬種惡風神良凡有患連年積歲不可治者宜須合此一篇皆以王相日天晴明齋戒沐浴如法合之

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:28
列印頁數：796
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

述曰古之仙者以此救俗特為至祕余以大業年中數以合和而苦雄黃曾青難得後於蜀中遇雄黃大賤又於飛烏玄武大獲曾青蜀人不識今須識者隨其大小成一釜以之治病神驗不可論宿癥風氣百日服者皆得痊愈故序而述焉

但作蚯蚓屎者即是如此千金可求遂於蜀縣魏家合凡雄黃皆以油煎九日九夜乃可入丹不爾有毒慎勿生用丹必熱毒不堪服宜慎之

令淳于意方故名

特生礬石　皂莢　雄黃　藜蘆　各等分

此是漢文帝時太倉

知人及臥魘囈腳踵不覺者諸惡毒氣病方

倉公散治卒鬼擊鬼癉鬼刺心腹痛如刺下血便死不

右四味治下篩取如大豆許內管中吹入病人鼻得噦則氣通便活若未噦復更吹之以得噦為度此藥

起死回生

小金牙散治南方瘴癘疫氣腳弱風邪鬼疰方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

金牙 五分　雄黃 一兩　蕳蘼　黃芩
蜀椒　由跋　桂心　莽草
天雄　朱砂　麝香　烏頭 各二分
牛黃 一分　蜈蚣 一枚六寸者　細辛　萎蕤
犀角　乾薑 各三分　黃連 四分
右十九味治下篩合牛黃麝香濤三千杵温酒服錢
五匕日三夜二以知為度絳囊盛帶男左女右一方
寸匕省病問孝不避夜行塗人中晨昏霧露亦塗之
大金牙散治一切蠱毒百症不祥醫所不治方
金牙　鸛骨　石膏 各八分　斑猫 七分
活草子　胡燕矢　白朮　雷丸
龍牙 各六分　銅鏡鼻　梔子仁　乾漆
龜甲　鼈甲　鬼督郵　桃白皮
大黃 各四分　桂心　芍藥　徐長卿
羚羊角　射干　升麻　鳶尾
馬目毒公　蜂房　細辛　乾薑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芒硝　由跋　犀角　甘草
狼毒　蜣蜋　龍膽　狼牙
雄黄　真珠　各三分　芜花　莽草
射罔　烏梅　各一分　蛇蜕皮　一尺　鐵精
桃奴　巴豆　各二七枚　赤小豆　一合　地膽　槀雞　芜青　各七枚
右五十味治下篩服一刀圭稍加至二刀圭帶之辟百邪治九十九種疰一本有麝香無白朮

備急千金要方卷三十九

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:29
列印頁數：799
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷四十　唐　孫思邈　撰

心臟方　宋　林億等　校正

心臟脉論第一

論曰心主神神者五臟專精之本也為帝王監領四方夏王七十二日位在南方離宮火也有生之來謂之精兩精相搏謂之神所以任物謂之心神者心之藏也舌者心之官故心氣通於舌舌和則能審五味矣心在竅為耳夫心者火也腎者水也水火相濟心氣通於舌舌非竅也其通于竅者寄見於耳左耳丙右耳丁循環炎宮上出脣口知味榮華於耳外主血内主五音心重十二兩中有三毛七孔盛精汁三合神名呴呴主藏神號五神居隨節應會故云心藏脉脉舍神在氣為吞在液為汗心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢救火陽物得其時則夢燔灼心氣盛則夢喜笑及恐畏厥氣

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:30
列印頁數：800
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

客於心則夢邱山煙火凡心臟象火與小腸合為腑其經手少陰與太陽為表裏其脉洪相于春王于夏夏時萬物洪盛垂枝布葉皆下垂如曲故名鉤心脉洪大而長洪則衛氣實實則氣無從出大則榮氣萌萌洪相薄可以發汗故名曰長長洪相得即引水漿溉灌經絡津液皮膚大陽洪大皆是母軀幸得戊巳用牢根株陽氣上出汗見于頭五内乾枯胞中空虚醫反下之此為重虚脉浮有表無裏陽無所使不但危身并中其母

夏脉如鉤夏脉心也南方火也萬物之所以盛長也故其氣來盛去衰故曰鉤反此者病何如而反其氣來盛去亦盛此謂太過病在外其來不盛去反盛此謂不及病在内太過則令人身熱而膚痛為浸淫不及則令人煩心上見欬唾下為氣泄

心脉來累累如連珠如循琅玕曰平夏以胃氣為本心脉來喘喘連屬其中微曲曰心病心脉來前曲後居如操帶鉤曰心死

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

真心脉至堅而搏如循薏苡子累累然色赤黑不澤毛折乃死

夏胃微鉤曰平鉤多胃少曰心病但鉤無胃曰死胃而有石曰冬病石甚曰今病

心藏脉脉舍神怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破脉不通則血不流血不流則髮不澤面黑如榛葉者血手少陰氣絶則脉不通少陰者心脉也心者脉之合也胭脫肉毛悴色夭死于冬

先死壬篤癸死水勝火也

心死藏浮之實如豆麻擊手按之益躁疾者死夏心火王其脉浮大而散一作弦日平反得弦細而長者是肝之乘心母之歸子為虚邪雖病易治反得大而緩者是脾之乘心子之乘母為實邪雖病自愈反得沉濡而滑者是腎之乘心水之尅火為賊邪大逆十死不治反得微澀而短者是肺之乘心金之陵火為微邪雖病即瘥腎乘心必癰

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

左手關前寸口陰絶者無心脉也若心下熱痛掌中熱時時善嘔口中傷爛刺手少陽治陽左手關前寸口陰實者心實也若心下有水氣憂恚發之刺手心主治陰心脉來累累如貫珠滑利再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡手少陰脉也

笑微緩為伏梁在心下上下行有時唾血大甚為喉介心脉急甚為癉癖微急為心痛引背食不下緩甚為狂微大為心癉引背善淚出小甚為善噦微小為消癉滑甚為善渴微滑為心疝引臍小腹鳴濇甚為瘖微濇為血溢維厥耳鳴癲疾

心脉搏堅而長當病舌卷不能言其濡而散者當病瘖癉一作渴環自己

癉得之外疾思慮而心虛故邪從之扁鵲曰心有病則赤脉之至也喘而堅詮曰有積氣在中時害於食名心口生瘡腐爛

心在聲為笑在變動為憂在志為喜喜傷心精氣并於

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

心則喜心虛則悲悲則憂實則笑笑則喜

時主夏病者時間時甚知其源取其輸觀其應審其害

病先發于心者心痛一日之肺喘欬三日之肝脇痛支

滿五日之脾閉塞不通身痛體重三日不已死冬夜半

夏日中

病在心日中慧夜半甚平旦靜

假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時發得病

以壬癸日方

凡心病之狀鬱內痛脇支滿兩脇下痛膺背肩甲間痛

兩臂內痛虛則胷腹大脇下與腰背相引而痛取其經

手少陰太陽舌下血者其變病刺郄中血者

心脉沉之小而緊浮之不喘苦心下聚氣而痛食不下

喜咽唾時手足熱煩滿時忘不樂喜太息得之憂思

心病其色赤心痛短氣手掌煩熱或啼笑罵詈悲思愁

慮面赤身熱其脉實大而數此為可治宜服（闕宜服者藥）春

當刺中衝夏刺勞宮季夏刺太陵皆補之秋刺間使冬

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

刺曲澤皆瀉之 皆是手心胞胳經 又當灸巨闕五十壯背第五椎百壯邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不足而調其輸

愁憂思慮則傷心心傷則苦驚喜忘善怒

心中風者翕翕發熱不能起心中飢則飲食食則嘔

心中寒者其人病心如噉蒜韲狀劇者心痛徹背背痛徹心如針刺其脈浮者自吐乃愈也

心傷其人勞倦頭面赤而下重心中痛徹背自煩發熱

當臍跳手其脉弦此為心臟傷所致也

邪哭使魂魄不安者血氣少也血氣少者屬于心心氣虛者其人即畏合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰者即為癲陽氣衰者即為狂五臟者魂魄之宅舍精神之所依託也魂魄飛揚者其五臟空虛也即邪神居之神靈所使鬼而下之脉短而微其藏不足則魂魄不安魂屬于肝魄屬于肺肺主津液即為涕泣出肺氣衰者即泣出肝氣衰者魂則不安肝主善怒其聲

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

呼

心水者其人身體腫重一作而少氣不得卧煩而躁其陰大腫真心痛手足清至節心痛甚者旦發夕死夕發旦死

心腹痛懊憹發作腫聚往來上下行痛有休作心腹中熱善渴涎出者是蚘咬也以手聚而堅持之無令得移以大針刺之久持之蟲不動乃出針腸中有蟲蚘咬皆不可取以小針

心脹者煩心短氣卧不安

凡心脉急名曰心疝小腹當有形其以心為壯藏小腸為之使故小腹當有形

診得心積沉而芤時上下無常處病胷滿悸腹中熱面赤咽乾心煩掌中熱甚則唾血身瘙癢主血厥夏差冬劇色赤也

心之積名曰伏梁起於臍上上至心大如臂久久不愈病煩心心痛以秋庚辛日得之何也腎病傳心心當傳

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肺肺適以秋王王者不受邪心復欲還腎腎不肯受因留結為積故知伏梁以秋得之

心病煩悶少氣大熱熱上傷心嘔欬吐逆狂語汗出如珠身體厥冷其脉當浮今反沉濡而滑其色當赤而反黑者此是水之剋火為大逆十死不治

徵音人者主心聲也心聲笑其音竽其志喜其經手少陰厥逆太陽則榮衛不通陰陽反錯陽氣外擊陰氣内傷傷則寒寒則虛虛則驚擊心悸定心湯主之 方見別卷

語聲前寬後急後聲不續前混後濁口喎冒昧好自笑此為厲風入心荊瀝湯主之 方見別卷

心虛風寒半身不遂骨節離解緩弱不收便利無度口面喎邪薑附湯主之 方見

別卷此病不盈旬日宜急治之又笑而呻呻而反憂此為水剋大陰擊陽陰起而陽伏伏則實實則傷熱熱則狂悶亂冒昧言多謬誤不可採聽此心已傷若其人口脣正赤可療青黃白黑不可療也

心病為瘧者令人心煩甚欲得清水反寒多不甚熱 方見

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:33
列印頁數：807
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

別卷若其人本來心性和雅而忽弊急反於常白朮酒主
別卷方見之或言未竟便住以手剔脚爪此人必死禍雖未
及名曰行尸此心病聲之候也虛則補之實則瀉之不可
治者明以察之
赤為心心合脉赤如雞冠者吉心主舌舌是心之餘其
人火形相比於上徵赤色廣眄兌面小頭好肩背髀腹
小手足形安地疾行搖肩背肉滿有氣輕財少信多慮
見事明了好顧急心不壽暴死耐春夏不耐秋冬秋冬
感而生病主手少陰竅竅然髑骬長短傾正則心應之
正赤色小理者則心小小則邪弗能傷易傷以憂粗理
者則心大大則虛虛則寒寒則憂不能傷易傷於邪無
髑骬者則心高高則實實則熱熱則滿于肺中悶而善
忘難開以言髑骬小短舉者則心下下則藏外易傷于
寒易恐以言髑骬長者則心堅堅則藏安守固髑骬弱
以薄者則心脆脆則善病消癉熱中髑骬直下不舉者
則心端正端正則和利難傷髑骬向一方者則心偏傾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

偏傾則操持不一無守司也下云若髑骨小短薄弱而寒病憂恚内損心暴痛而好唾清涎口臭蟲齒痛侵脣齒若髑骨高起則心高高則實實則熱熱則滿于心悶而善忘恐悸喉燥口痛便秘口重舌鵝口聲嘶方見頭面篇中凡人部分陷起者必有病生小腸太陽為心之部其處陷起即病生矣藏含内外沉濁屬内浮清居外若外病内入小腹滿起内病裏出所部陷沒外入内前治陽後補陰内出外前補陰後瀉陽陽則實熱陰則虚寒在陽主外在陰主内凡人死生休咎則藏神前變形于外人心前病則口為之開張若心前死則枯黑語聲不轉若天中等分墓色應之即死不治看應增損斟酌賒促賒則不出四百日内促則不腠旬月之間心病少愈而卒死何以知之曰赤黑色黯黕顏即若見顏度年上必卒死心絶一日死何以知之兩目回回直視肩息立死凡面赤目白憂恚思慮心氣内索面色反好急求棺槨不過十日死又面黄目赤不死赤如衄血死吉凶之色若在于分部脇胠而見赤黑入口此必死不出其年名曰行尸若年上

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

無應三年之中病必死矣

夏大心脉色赤主手太陽也夏取盛經分腠夏者火始

治心氣始長脉瘦氣弱陽氣留溢熱熏分腠内至于經

故取盛經分腠絶膚而病去者邪居淺也所謂盛經者

陽脉也其脉本在外踝之後應在命門之上三寸命門

者在心上一寸也脉根在少澤少澤在手小指端

其筋起於小指之上結於腕上循臂内廉結肘内兌骨

之後彈之應小指之上入結腋下其支者後走腋後廉

上繞肩甲循頸出足太陽之筋前結于耳後完骨其支

者入耳中直出耳上下結于頷上屬目外眥

其脉起于小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂

骨下廉出肘内側兩骨之間上循臑外後廉出肩解繞

肩甲交肩上入缺盆向腋絡心循咽下膈抵胃屬小腸

其支者從缺盆循頸上頰至目兌眥却入耳中其支者

别頰上頗抵鼻至目内眥斜絡于顴合手少陰為表裏

少陰本在兌骨之端應在背後同會于手太陰

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

其手太陽之別名曰支正上腕五寸内注少陰其別者上走肘絡肩髃主心生病病實則小腸熱熱則節弛弛則陽病陽脉大反逆于寸口再倍病則嗌痛頷腫耳聾目黄卧不能言悶則急坐虚則小腸寒寒則生胕胕則陰病陰脉反小于寸口過於一倍病則短氣百節痛筋急頸痛不能轉顧（此盡是手太陽小腸經筋脉支別為病今取心主胞絡少陰心經附于後）手心主之别名曰内關去腕五寸（甲乙作二寸）出于兩筋間循經以上繫於心包絡心系氣實則心痛虚則為煩心取之兩筋間

手心主之脉起于胷中出屬心包下膈歷絡三焦其支者循胷出脇下腋三寸上抵腋下循臑内行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者别掌中循小指次指出其端也動則病手心熱肘臂攣急腋腫甚則胸脇支滿心中澹澹大動面赤目黄善笑不休是主脉所生病者煩心心痛掌中熱為此諸病盛則瀉之虚則補之熱則疾之寒則留之陷下則

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:35
列印頁數：811
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

灸之不盛不虛以經取之盛者則寸口大一倍于人迎虛者則寸口反小于人迎

手少陰之別名曰通理在腕後一寸別而上行循經入咽中系舌本屬目系其實則大腸虛則不能言取之掌後一寸別走太陽

手少陰之脉起于心中出屬心系上腸絡小腸其支者從心系上挾咽系目系（系曰系一作循胸而出腋）其直者復從心系却上肺出腋下下循臑内後廉行太陰心主之後下肘内廉循臂内後廉抵掌後兌骨之端入掌後内廉循小指之内出其端是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主心所生病者目黄脇滿痛臑臂内後廉痛厥掌中熱痛為此諸病盛則瀉之虛則補之盛者則寸口大再倍于人迎虛者則寸口反小於人迎

手少陰之脉獨無輸何也曰少陰者心脉也心者五臟六腑之大主也為帝王精神之所舍其藏堅固邪不能容容之則傷心心傷則神去神去則身死矣故諸邪在

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

於心者皆在心之包絡包絡者心主之脉也故少陰無輸也少陰無輸心不病乎曰其外經腑病臟不病故獨取其經于掌後兌骨之端也

夏三月主心小腸赤脉攢病也其源從少陰太陽之氣相搏而停則榮衛不通皮肉痛起太陽動發少陰淫邪之氣因而作則臟腑隨時受夏疫病也其病相若腑虛則為陰邪氣所傷身戰脉掉捉所不禁臟實則為陽毒所侵肉熱口開舌破咽塞聲嘶故曰赤脉攢病 方見傷寒卷中

扁鵲云炎腎肝心三輸主治丹瘅一作癉毒病當依源為治表治陰陽調和臟腑疾不生矣

心虛實第二 脉炎法 方

心實熱

左手寸口人迎以前脉陰實者手少陰經也病苦閉大便不利腹滿四肢重身熱名曰心實熱也

石膏湯治心熱實或欲吐吐而不出煩悶喘急頭痛方

石膏 一斤 淡竹葉 香豉 各一升 小麥 三升

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

地骨皮 五兩 茯苓 三兩 梔子仁 三枚 三七

右七味㕮咀先以水一斗五升煮小麥竹葉取八升

澄清次下諸藥煮取二升去滓分三服 外臺名瀉肺湯

瀉心湯治老小下利水穀不消腸中雷鳴心下痞滿乾

嘔不安方

人參 黃芩 甘草 各一兩 乾薑一兩半

黃連 二兩 半夏 三兩 大棗十二枚

右七味㕮咀以水八升煮取二升半分三服并治霍

亂若寒加附子一枚渴加栝蔞根二兩嘔加橘皮一

兩痛加當歸一兩客熱以生薑代乾薑

心小腸俱實

左手寸口人迎以前脉陰陽俱實者手少陰與巨陽經

俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得卧以胃

氣不轉水穀實也名曰心小腸俱實

竹瀝湯治心實熱驚夢喜笑恐畏悸懼不安方

淡竹瀝 生地黃汁 各一升 石膏 八兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芍藥　白朮　人參　梔子仁　各二兩
赤石脂　紫菀　知母　茯神　各二兩
右十一味㕮咀以水九升煮十味取二升七合去滓下竹瀝更煎取三升若須利入芒硝二兩去芍藥分三服

茯神散治心實熱口乾煩渴眠卧不安方
茯神　麥門冬　各三十六銖　通草　各三十銖　升麻　各三十銖　紫菀　桂心　各十八銖　知母　一兩
右十味治下篩為粗散以帛裹方寸匕井花水二升半煮取九合時動裹子為一服日再

瀉心湯治心氣不足吐血衄血方
大黃　二兩　黃連　黃芩　各一兩
右三味㕮咀以水三升煮取一升頓服亦治霍亂

安心散治心熱滿煩悶驚恐方
白芍藥　遠志　宿薑　二兩　茯苓

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

赤石脂　麥門冬　知母　紫菀
石膏 各四十銖　人參 二十四銖　桂心　麻黃
黃芩 各三十銖　菱蕤 三十六銖　甘草 十二銖
右十五味治下篩為粗散先以水五升淡竹葉一升煮取三升去滓煮散一方寸匕半以絹裹煮時動之煎取八合為一服日再

治不能食胷中滿膈上逆氣悶熱方

灸心輸二七壯小兒減之

心虛寒

左手寸口人迎以前脉陰虛者手少陰經也病苦悸恐不樂心腹痛難以言心如寒恍惚名曰心虛寒也

茯苓補心湯治心氣不足善悲愁恚怒衄血面黃煩悶五心熱或獨語不覺咽喉痛舌本强冷涎出一作汗出善忘恐徒不定婦人崩中面色赤方

人參 各一兩　茯苓 四兩　甘草 各二兩　麥門冬 三兩　大棗 二十枚　桂心　紫石英　赤小豆 二十四枚

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:37
列印頁數：816
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右八味咬咀以水七升煮取二升分三服

半夏補心湯治心虛寒心中脹滿悲憂或夢山丘平澤者方

半夏 六兩　宿薑 五兩　茯苓 桂心　枳實　橘皮 各三兩　白术 四兩　防風　遠志 各二兩

右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服

牛髓圓通治百病虛瘠羸乏等方

牛髓　羊髓　棗膏　白蜜　酥 各一升　麥門冬　芎藭　桂心　當歸　茯苓 一云茯神　甘草　羌活 各三十銖　乾地黃　乾薑 三十六銖　五味子　人參　防風 各一兩　細辛 十八銖　白术 四十二銖

右十九味切擣十四味再篩別研棗膏和散次與諸髓蜜和攪令相得內銅鉢中於釜沸湯中煎之取堪為丸如梧子大酒服三十丸稍加至四十丸日再服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

心小腸俱虛

左手寸口人迎以前脉陰陽俱虛者手少陰與巨陽經俱也病苦洞泄若寒少氣四肢厥腸澼名曰心小腸俱虛

大補心湯治虛損不足心氣弱悸或時妄語四肢損變氣力顏色不榮方

黃芩 附子 各一兩 甘草 茯苓 麥門冬 乾地黃 桂心 阿膠 各三兩

半夏 遠志 石膏 各四兩 生薑 六兩

粘糖 一斤 大棗 二十枚

右十四味取十三味㕮咀以水一斗五升煮取五升湯成下糖分四服

補心圓治臟虛善恐怖如魘狀及女人產後餘疾月經不調方

當歸 防風 芎藭 附子 芍藥 甘草 蜀椒 乾薑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

細辛　桂心　半夏　厚朴

大黃　猪苓 各一兩　茯苓 一方用茯神　遠志 各二兩

右十六味為末蜜丸如梧子酒服五丸日三不知加至十丸冷極加熱藥

論曰心勞病者補脾氣以益之脾王則感於心矣人逆夏氣則手太陽不長而心氣內洞順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣

心勞第三 方論

大黃瀉熱湯治心勞熱口為生瘡大便苦難閉澀不通心滿痛小腸熱方

大黃　澤瀉　黃芩　芒硝

甘草 一兩　大棗 二十枚

梔子仁 三兩　桂心

通草 二兩　石膏 八兩

右十味㕮咀用水九升先以水一升別漬大黃一宿餘八升水煮諸藥取二升五合去滓下大黃煮兩沸去滓下芒硝令烊分三服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

備急千金要方卷四十

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷四十一

詳校官太醫院醫士臣舒 倪

編修臣倉聖脈 覆勘

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣范 鏊

謄錄監生臣張若湘

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷四十一 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

心臟方

脉極第四 論灸法方

論曰凡脉極者主心也心應脉脉與心合心有病從脉起又曰以夏遇病為脉癉脉癉不已復感於邪内舍於心則飲食不為肌膚效脫血色白不澤其脉空虛口脣不澤飲食不為肌膚若脉氣虛則寒寒則效效則心痛傷心使人好怒口為色赤甚則言語不快血脫色乾燥損脉為心風心風之狀多汗惡風若脉氣實則熱熱則見赤色凡脉氣衰血焦髮墮以夏丙丁日得之於傷風喉中介介如哽甚則咽腫喉癉故曰心風虛實候也若陽經脉病治陰胳陰胳脉病治陽經定其血氣各守其鄉脉實宜瀉氣虛宜補善治病者定其虛實治之取瘥病在皮毛肌膚筋脉則全治之若至六腑五臟則半死

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

矣

扁鵲云脉絶不治三日死何以知之脉氣空虛則顏焦髮落脉應手少陰手少陰氣絶則脉不通血先死矣

生地黄煎治脉熱極則血氣脱色白乾燥不澤飲食不為肌膚消熱止極强胃氣方

生地黄汁　生麥門冬　赤蜜　各一升　薯心　一升一作鼓

遠志二升　甘草二兩　人參　茯苓

乾地黄　芍藥

白术　各三兩　石膏六兩

生萎蕤四兩

右十三味十一味㕮咀以水一斗二升煮取二升七合去滓下地黄汁及蜜更煎三升五合分四服

灸法

胷中痛引腰背心下嘔逆面無滋潤灸上門隨年壯穴

在俠巨闕兩邊相去各半寸一云一寸顏色焦枯勞氣失精

肩臂痛不得上頭灸肩髃百壯穴在肩外頭近後以手按之有解宛宛中

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:40
列印頁數：823
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

脉虚實第五 論針灸方法

論曰凡脉虚者好驚跳不定脉實者洪滿凡脉虚實之應主於心小腸若其腑臟有病從熱生則應臟寒則應腑也

防風圓補虚調中治脉虚驚跳不定乍來乍去主小腸腑寒方

防風 桂心 通草 茯神 遠志 麥門冬 甘草 人參 白石英 各三兩

右九味為末白蜜和丸如梧子大酒服三十丸日再加至四十丸

升麻湯治脉實洪滿主心熱病方

升麻 子芩 澤瀉 梔子仁 淡竹葉 芒硝 各三兩 生地黄 切一升

右七味㕮咀以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:40
列印頁數：824
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麻黃湯調心洩熱治心脉厥大寸口小腸熱齒齲噬痛

方

麻黃 生薑各四兩 細辛 子芩

茯苓 芍藥各三兩 白朮二兩 桂心一兩

生地黃切一升

右九味�mouth咀以水九升煮取三升去滓分三服須利加芒硝三兩甚善

針灸法

心腹痛第六 論灸法 方蒸熨法

心悶痛上氣牽引小腸灸巨闕二七壯

脉不出針不容穴在幽門兩傍各一寸五分是也

論曰寒氣卒客於五臟六腑則發卒心痛胷痺感於寒微者為欬甚者為痛為泄厥心痛與背相引善瘈如物從後觸其心身傴僂者腎心痛也厥心痛腹脹滿心痛甚者胃心痛也厥心痛如以針錐刺其心心痛甚脾心痛也厥心痛如死灰狀終日不得太息者肝心

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

痛也厥心痛卧若徒居心間痛動作痛益甚色不變者肺心痛也真心痛手足青至節心痛甚旦發夕死夕發旦死蚘心痛心腹中痛發作腫聚往來上下行痛有休止腹中熱善涎出是蚘咬也以手按而堅持之勿令得移以大針刺之復以持之蟲不動乃出心下針不可刺中有成聚不可取於輸腸中有蟲蚘咬皆不可取以小針治寒熱氣卒客於五臟六腑中則發心痛方

大黄　芍藥　柴胡　各四兩　升麻　各四兩　朱砂　各三兩　黄芩　桔梗　各三兩　鬼箭羽　各三兩　鬼臼　桂心　朴硝　各二兩

右十一味咬咀以水九升煮取二升七合分三服先分朱砂作三分每服内一分攪止宜服後方

赤芍藥　六兩　桔梗　杏仁　各五兩

右三味咬咀以水六升煮取三升分三服

九痛圓治九種心痛并療冷衝上氣落馬墮車血疾等

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

方 一蟲心痛二注心痛三風心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九去來心痛此之謂

九痛

附子 乾薑 各二兩 吳茱萸 人參

巴豆 各一兩 生狼毒 四兩

右六味為末蜜和丸如梧子大空腹服一丸卒中惡腹脹痛口不能言者二丸日一服連年積冷流注心胸者亦服之好好將息神驗

治九種心痛方

欽定四庫全書

取當太歲上新生槐枝一握去兩頭咬咀以水三升煮取一升頓服

桂心三物湯治心中痞諸逆懸痛方

桂心 生薑 各二兩 膠飴 半斤

右三味取二味咬咀以水六升煮取三升去滓内飴分三服 仲景用枳實五枚不用膠飴肘後用枳實五枚白朮二兩為五味

烏頭圓治心痛徹背背痛徹心方

烏頭 六銖 附子 半兩 蜀椒 半兩 乾薑

備急千金要方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

赤石脂 各一兩
右五味為末蜜丸如麻子大先食服三丸日三不知稍增之 范汪不用附子服如梧子三丸崔氏用桂心半兩為六味

治心痛方
桃白皮煮汁空腹以意服之 崔氏用療疰心痛

治暴心痛或如中惡口中涎出不可禁止回回欲吐方
右一味咬咀以水一石煮取二斗去滓下苦酒二斗苦參 十斤

右一味咬咀以水一石煮取二斗去滓下苦酒二斗苦參 三兩

治卒中惡心痛方
血結陰癖頻用有效大良

痛如骭骨骶等痛凡是腹中之疾悉主之又治宿冷

腹吐不吐下利更酒漬苦參二斤浸久彌佳非止暴

之如梧子大每服以酒一升進三四十丸日一當倒

更煎取五升大且黃末熬和汁中煎令可丸併手丸

右一味咬咀以好酢一升半煮取八合强者頓服老

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

小分二服

又方桂心 一兩

右一味咬咀以水四升煮取一升半分作三服

治蟲心痛方

鶴蝨為末蜜和丸如梧子大服四十丸蜜湯下日一服可加至五十丸慎酒肉

又方鶴蝨一兩為末以温酢一盞和空腹服之蟲當吐出之

又方服漆一合方見養性服餌篇中凡蟲心痛皆用漆主之

五辛湯治心腹冷痛方

細辛 蜀椒 桂心 乾薑 吳茱萸 芍藥 防風 苦參 甘草 乾地黄 當歸 各一兩 梔子 烏梅 大棗 各二七枚

右十四味咬咀以水九升煮取三升分四服

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:42
列印頁數：829
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

犀角圓治心腹久痛積年不定不過一時間還發甚則數日不能食又便出乾血窮天下方不能瘥甄立言處此方數日即愈

犀角 麝香 雄黃 桔梗 莽草 鬼臼 桂心 芫花 各半兩 甘遂 一半兩 光明砂 附子 各六銖 巴豆 二十枚 赤足蜈蚣 二枚 貝齒 五枚

右十四味為末蜜丸如梧子飲服一丸日二漸加至三丸以微利為度 古今集驗無雄黃

高良薑湯治卒心腹絞痛如刺兩脇支滿煩悶不可忍方

高良薑 五兩 厚朴 二兩 當歸 桂心 各三兩

右四味㕮咀以水八升煮取一升八合分三服日二服

若一服痛止便停不須更服強者為二服劣者分三服

當歸湯治心腹絞痛諸虛冷氣滿痛方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當歸 芍藥
桂心 甘草
乾薑 四兩 蜀椒 一兩
右十味咬咀以水一斗煮取三升二合分四服贏劣人分六服 小品方云大冷加附子一枚良
又方治虛冷腹痛不下飲食食復不消膨脹者方
當歸 茯苓 各五分
高良薑 乾薑 各六分
昆布 肉蓯蓉 各四分
烏頭 一兩 大棗 四十枚
法製 大麥蘗 各一升
右十八味咬咀以水一斗五升煮取四升二合分為
五服下利加赤石脂龍骨各三分渴加麥門冬一升
又方治寒冷腹中痛方 小品名吳茱萸湯
當歸 二兩 桂心 甘草 人參 各一兩
生薑 五兩 半夏 小麥 各一升 吳茱萸 二升
厚朴 半夏 各二兩
黃耆 人參 各三兩
紫菀 各四分
桂心
橘皮 各三分
甘草 二兩
桃仁 一百枚
地骨皮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右八味㕮咀以水一斗五升煮取三升分三服日三

亦治產後虛冷

又方治冷氣脇下往來衝胸膈痛引脇背悶者方

當歸 桂心 人參 甘草 吳茱萸 芍藥 大黃 各二兩 茯苓 枳實 各一兩 乾薑 三兩

右十味㕮咀以水八升煮取二升半分三服日三治尸疰亦佳 外臺仲景方無茯苓枳實方

當歸 甘草 橘皮 各二兩 附子 一兩 乾薑 四兩

右五味㕮咀以水八升煮取二升分三服日三

又方治久寒宿疾胸腹中痛短氣時滯下利方

當歸 桂心 各三兩 乾薑 四兩 附子 一兩 范汪無附

右四味㕮咀以水八升煮取二升分三服日三 子用甘草二兩云虛冷激痛甚者加黃耆芍藥各二兩

又方治久寒疾胸腹中痛時下利方

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:43
列印頁數：832
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

温中當歸湯治心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止多熱喜涎出是蚘蟲咬也服二三劑後若不效有異宜改方增損之

當歸 人參 乾薑 茯苓 各二兩
厚朴 木香 桂心 桔梗 各二兩
芍藥 甘草 各二兩

右十味咬咀以水八升煮取三升分温五服日三不耐木香者以犀角一兩代之

羊肉當歸湯治腹冷絞痛方

羊肉 半斤 當歸 四分 乾薑 橘皮 各三分
黄耆 芍藥 芎藭 桂心 各一分
獨活 防風 各三分 吴茱萸 人參 各一分
甘草 乾地黄 茯苓 各一分 生薑 六分

右十七味咬咀以水一斗半先煮肉取一斗二升出肉次内諸藥煮取三升分三服日三覆取温煖

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:44
列印頁數：833
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

温脾湯治腹痛臍下絞結繞臍不止方

甘草 附子 人參 芒硝 各二兩

當歸 乾薑 各三兩 大黃 五兩

右七味咬咀以水七升煮取三升分服日三

生薑湯治胷腹中卒痛方

生薑一斤取汁 食蜜八兩 醍醐四兩

右三味微火上耗令相得適寒温服三合日三

熨蒸法凡心腹冷痛者

熬鹽一斗熨熬鹽沙燒磚石蒸熨取其裹温煖止蒸

土亦大佳

針灸法

凡邪在心則病心痛善悲時眩仆視有餘不足而調其

輸

腎心痛先取京骨崑崙發針不已取然谷

胃心痛取大都太白

脾心痛取然谷太谿

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肝心痛取行間太衝
肺心痛取魚際太淵
心痛引腰脊欲嘔刺足少陰
心痛引背不得息刺足少陰不已取手少陰
心痛腹脹濇濇然大便不利取足太陰
心痛小腹滿上下無常處溲便難刺足厥陰
心痛短氣不足以息刺手太陰
心痛不可按煩心巨闕主之
心痛有三蟲多涎不得反側上管主之
心痛身寒難以俯仰心痞衝胃死不知人中管主之
心痛如針錐刺然谷及太谿主之
心腹中卒痛石門主之
心痞暴痛取足太陰
心懊憹微痛煩逆灸心輸百壯
心痛如錐刀刺氣結灸膈輸七壯
心痛冷氣上灸龍頷百壯在鳩尾頭上行一寸半不可

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

刺之

心痛惡氣上脇急痛灸通谷五十壯在乳下二寸

心痛暴絞急絶欲死灸神府百壯在鳩尾正心有忌

心痛暴惡風灸巨闕百壯

心痛堅煩氣結灸太倉百壯

心痛灸臂腕橫文三七壯又灸兩虎口白肉際七壯

論曰胷痺之病令人心中堅滿痞急痛肌中苦痺絞急

胷痺第七 論灸法方

如刺不得俯仰其胸前皮皆痛手不得犯胸中愊愊而

滿短氣欬唾引痛咽塞不利習習如癢喉中乾燥時欲

嘔吐煩悶白汗出或徹引背痛不治之數日殺人

論曰夫脉當取太過與不及陽微陰弦即胸痺而痛所

以然者責甚極虛故也今陽虛知在上焦所以胸痺心

痛者以其人脉陰弦故也平人無寒熱短氣不足以息

者實也

枳實薤白桂枝湯治胸痺心中痞氣結在胸胸滿脇下

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:45
列印頁數：836
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

逆搶心方

枳實 四枚 薤白 一斤 桂枝 一兩 厚朴 三兩

右五味咬咀以水七升煮取二升半分再服 仲景方厚朴用

栝蔞實 一枚

右五味咬咀以水七升煮取二升半分再服 仲景方厚朴用

栝蔞湯治胸痺病喘息欬唾胸背痛短氣寸脉沈而遲 四兩薤白半斤水五升煮取二升半服之

關上小緊數方

栝蔞實 一枚 半夏 半升 薤白 一斤 枳實 二兩

生薑 四兩

右五味咬咀以白戚漿一斗煮取四升服一升日三 仲景肘後不用生薑枳實半夏

治胷痺侯胷中愊愊如滿噎塞習習如癢喉中澁燥唾 仲景肘後不用生薑枳實半夏

沫宜此方

橘皮 一斤 生薑 半斤 枳實 五枚

右三味咬咀以水五升煮取二升去滓分再服

治中湯胷痺方

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:45
列印頁數：837
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

茯苓湯治胸中氣塞短氣方

茯苓 三兩 甘草 一兩 杏仁 三十枚

右三味㕮咀以水一斗三升煮取六升去滓為六服日三未瘥再合服

通氣湯治胷滿短氣噎塞方

半夏 八兩 生薑 六兩 橘皮 三兩 吳茱萸 四十枚

右四味㕮咀以水八升煮取三升分三服一方用桂二兩無橘皮

細辛散治胷痺達背短氣方

細辛 甘草 各二兩 枳實 生薑

栝蔞實 乾地黃 各三兩 白朮 桂心

茯苓 各五兩

右九味治下篩酒服方寸匕日三

蜀椒散治胷痺達背方

蜀椒 食茱萸 各一兩 桂心 桔梗 各三兩

烏頭 半兩 豉 六錄

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右六味治下篩食後酒服方寸匕日三

前胡湯治胷中逆氣心痛徹背少氣不食方

前胡 甘草 半夏 芍藥 各二兩 生薑 三兩 大棗 三十枚 人參 桂心 各一兩 竹葉 一升

右十一味㕮咀以水九升煮取三升分為四服

又方

前胡 人參 生薑 半夏 大棗 三十枚 生薑 三兩 麥門冬 甘草 芍藥 茯苓 各三兩 桂心 黄芩 當歸 各一兩

右十三味㕮咀以水一斗四升煮取三升去滓分三

大棗 三十枚 錫 各三兩 桂心 當歸 各一兩

麥門冬 甘草 芍藥 茯苓

愛背散治胸背疼痛而悶方

服

蜀椒 桂心 各五兩 烏頭 細辛 附子 羌活 芎藭 一兩六銖

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:46
列印頁數：839
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右七味治下篩帛裹微火炙令煖以熨背上取瘥乃止慎生冷如常法

下氣湯治胸腹背閉滿上氣喘息方

杏仁四七枚 大腹檳榔二七枚

右二味㕮咀以童子小便三升煎取一升半分再服

曾患氣發輒合服之

檳榔湯主破胸背惡氣音聲塞閉方

檳榔極大者四枚小者八枚

右一味二品㕮咀以小兒尿二升半煮減一升去滓分三服頻與五劑永定

灸法

胸癆引背時寒間使主之


胸癆心痛天井主之

胸癆心痛不得息痛無常處臨泣主之

胸癆心痛灸亶中百壯穴在鳩尾上一寸忌針

胸脇滿心痛灸期門隨年壯穴在第二肋端乳直下一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)



列印日期/時間：02/04/2005 18:44:47
列印頁數：841
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷四十二　唐　孫思邈　撰

心臟方　宋　林億等　校正

頭面風第八　方一拔白髮

芎藭酒治腦風頭重頸頭强眼瞤瞤淚出善欠目欲眠

睡憎風劇者耳鳴滿眉眼疼悶吐逆眩倒不自禁諸風

乘虛經五臟六腑皆為癲狂諸邪病悉主之方

芎藭　辛夷　天雄　人參

天門冬　栢子仁　磁石　石膏

茵芋　山茱萸　白頭翁　桂心

秦艽　各三兩　松蘿　羚羊角　細辛

薯蕷　菖蒲　甘草　各二兩

雲母　一兩燒令赤末為粉　防風　四兩

右二十一味㕮咀以酒二斗漬七日初服二合漸加至五合日三有女人少時患風眩發則倒地為婦積

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

年無兒服此酒并將紫石門冬丸服之眩癖生兒平

復（紫石門冬丸方出婦人方中）

治頭眩屋轉眼不得開方（翼名人參湯）

人參 當歸 防風 黄耆

麥門冬（各二兩） 芍藥（各二兩） 獨活 白术

桂心（各三兩）

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

防風湯治風眩嘔逆水漿不下食輒嘔起即眩倒發有時手足厥冷方

防風 防己 附子 乾薑

甘草（各一兩） 蜀椒 桂心（各二兩）

右七味㕮咀以水四升煮取二升分三服日三（古今録驗）

又方治頭風眩欲倒眼旋屋轉腦痛方

茯神 麻黄（用白术一兩） 防風 枳實 杏仁 芎藭（各三兩） 前胡 生薑

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:48
列印頁數：843
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏 各四兩 細辛 二兩 竹瀝 三升

右十一味咬咀以水六升合竹瀝煎取二升七合分三服頻服三兩劑佳

茵芋湯治風虛眩眼暗方

茵芋 一分 人參 甘草 蒜蓉

黃耆 茯苓 秦艽 厚朴

烏喙 各二兩 防風 六兩 山茱萸 松實 各三兩

右十二味咬咀以水一斗煮取二升半分五服强者一日夜盡羸劣分五服二日盡

鴟頭酒治風頭眩轉面上遊風方

飛鴟頭 五枚 茯神 一方無 防風 芎藭

薯蕷 各四兩 葛根 桂心 細辛

人參 天雄 乾薑 枳實

貫衆 蜀椒 各三兩 獨活 二兩 山茱萸 一升

麥門冬 一作天門冬 石南 一作石竇 各五兩

右十八味咬咀絹囊盛清酒四斗漬六宿初服二合

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

日再服稍加以知為度

大三五七散治頭風眩口喎目斜耳聾方

天雄 細辛 各三兩 山茱萸 乾薑 各五兩

薯蕷 防風 各七兩

亦治面骨痛疼

右六味治下篩清酒服五分匕日再不知稍加千金翼云

小三五七散治頭風目眩耳聾方

天雄 三兩 薯蕷 七兩 山茱萸 五兩

右三味治下篩以清酒服五分匕日再不知稍增以

茯神湯治風眩倒屋轉吐逆惡聞人聲方

茯神 獨活 各四兩 黃耆 遠志

防風 各五兩 生薑 三兩 甘草 人參

當歸 牡蠣 白朮 蒺藜

附子 各二兩

右十三味咬咀以勞水一斗二升煮取三升服五合

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

一日夜盡

防風散治頭面風在眉間得熱如蟲行或頭眩目中淚出方

防風 五兩 桂心 細辛 朱砂 乾薑 人參 烏頭 附子 各二兩 茯苓 當歸 各一兩

右十二味治下篩酒服方寸匕日三

又方治風頭眩惡風吐冷水心悶方

防風 二兩 澤瀉 一作澤蘭 天雄 翼作人參 細辛 附子 薯蕷 茯苓 各一兩 白朮 二兩半 桂心 一兩半 乾薑 半兩

右十味治下篩酒服方寸匕常令酒氣相接則脫巾

帽解髮梳頭百過復投一升酒便洗手足須臾自熱

解髮以粉粉之快然便熟眠愈亦可洗頭面汁出 翼云

如服寒食散法

治風眩翻倒無定方

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:49
列印頁數：846
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

獨活 六兩　石膏 蒴藿 各四兩　枳實 三兩　用松實 一方

右四味咬咀以清酒八升煮取四升頓服之以藥滓熨頭覆眠取汗覺冷又内鐺中炒令熱熨之

治患頭眩暈經久得瘥後四體漸羸食無味好食黃土方

麴 二斤　白朮 三斤

右二味為末酒和併手丸如梧桐子曝乾飲服三十

丸日三斷食土為效

治頭中五十種病方

巴戟　菊花　芎藭　乾薑　烏頭　山茱萸　附子　細辛　栝蔞根　防風　石南　白术　桔梗　秦艽　蜀椒　乾地黃　人參　薯蕷　天雄　羌活 各等分　澤瀉　甘草

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:49
列印頁數：847
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二十二味治下篩以酒服方寸匕日三

摩頭散治同前

蘭茹 半夏 桂心 七分 莽草 四分 蜀椒 各六分 烏頭 八分 附子 一兩 細辛 各一兩

右八味治下篩以大酢和摩頭記日數三日頭膚痛四五日後一著藥如前十日以酢漿洗頭復摩藥即愈若生息肉并喉咽中息肉大如棗欲塞以藥摩之即愈耳鼻齒有疾並用之良

入頂散治頭面脹滿腦癢偏枯發作有時狀似刀刺失聲陰陰然疼面目變青方

山茱萸 芎藭 防風 獨活 各一兩半 細辛 莽草 白朮 薯蕷 牛膝 石南 甘草 各一兩 烏頭 通草 葛蒲 附子 麻黃 天雄 蜀椒 桔梗 各一兩六銖

右十九味治下篩酒服方寸匕日三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杏仁膏治上氣頭面風頭痛胸中氣滿賁肫氣上下往來心下煩熱產婦金瘡百病方

杏仁 一升去皮尖雙仁者不在用

右一味擣研以水一斗濾取汁令盡以銅器熘火上從旦煮至日入當熟如脂膏下之空腹酒服一方寸匕日三不飲酒者以飲服之愼猪魚蒜酢

大豆酒治頭風方

大豆 三升炒令無聲

著酒中密泥頭七日温服之

治中風頭痛發熱耳頰急方

右一味先以一斗二升瓶盛清酒九升乘豆熱即傾

麻黄 葛根 石膏 桂心 各三兩

附子 芍藥 甘草 秦艽 防風 各二兩 生薑 五兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服覆取汗

薯蕷散治頭目有風牽引目睛疼痛偏視不明方

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:50
列印頁數：849
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

薯蕷 三兩 細辛 一兩半 秦艽 天雄 各二兩

獨活 桂心 山茱萸 各二兩半

右七味治下篩酒服方寸匕日三

治頭中痛身熱風熱方

竹瀝 三升 升麻 各三兩 生薑 杏仁 各三兩

芍藥 柴胡 各闕兩 石膏 生葛根 各八兩

右八味㕮咀以水六升合竹瀝煮取二升七合分三服

菊花散治頭面遊風方

菊花 一兩 細辛 附子 桂心

乾薑 巴戟 人參 石南

天雄 茯苓 秦艽 防己 各二兩

防風 白朮 山茱萸 薯蕷 各三兩

蜀椒 五合

右十七味治下篩酒服方寸匕日三

治頭面上風方

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:50
列印頁數：850
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

松脂　石鹽　杏仁　蜜蠟各一兩
薰陸香二兩　苣麻仁三兩
右六味熟擣作餅淨剃百會上髮貼膏膏上安紙三日一易若癢刺藥上不久風定
頭風散方
附子一枚中形者　鹽如附子大
右二味治下篩沐頭竟以方寸匕摩頂上日三
治頭風方
欽定四庫全書
備急千金要方
服荆瀝不限多少取瘥止
又方濤蒴藿根一升酒二升漬服汗出止
又方蔓荆子一升為末絹袋盛以酒一斗浸七宿温服
三合日三
又方臘月烏雞屎一升炒令黄為末絹袋盛以酒三升浸温服任性常令醺酣
又方七月七日麻勃三斗麻子一石末相和蒸之沸湯一石五斗三遍淋之煮取一石漬神麴二十斤令發釀

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黍米兩石五斗熟封三七日服清一升百日身中澀皮
八風胸膈五臟骨髓伏風百病悉去
治卒中惡風頭痛方
擣生烏頭以大酢和塗故布上薄痛處須臾痛止日
夜五六薄逐痛處薄之擣烏頭須去皮
又方鹽一升為末以麻油二升煎一宿令消盡塗頭石
鹽尤良
又方芥子為末酢和傅頭一周時

沐頭湯治肺勞熱不問冬夏老少頭生白屑搔癢不堪
然肺為五臟之蓋其勞損傷肺氣衝頭頂致使頭癢多
生白屑搔之隨手起人多患此皆從肺來世呼為頭風
也方

大麻子	秦椒 各三升	皂莢屑 五合後無	肘

右三味熬研內泔中一宿漬去滓木匕攪百遍取勞
乃用沐頭髮際更別作皂莢湯濯之然後傅膏
又方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

菊花　獨活
細辛　蜀椒　茵芋　防風
莽草　桂心　皂莢　杜蘅
右十味各等分可作湯沐及熨之
又方
茵芋　各一兩
猪椒根　三兩
麻黄根　防風　各二兩
細辛
右五味�mouth咬咀以水三斗煮取一斗去滓温以沐頭
又方蜀椒二升以水煮取汁沐髮良
又方蔔蘆子煮湯以沐不過三四度愈
又方以桑灰汁沐頭去白屑神良
治頭項强不得顧視方
蒸好大豆一斗令變色内囊中枕之
又方常以九月九日取菊花作枕袋枕卧良
又方八月後取荆芥鋪床又作枕枕頭立春日去之
又方穿地作小坑燒令赤以水沃之令小冷内生桃葉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

滿其上布席就卧令項當藥上以衣著項兩邊令氣蒸病上汗出良久愈若病大者作地坑亦大

犀角湯治風毒熱頭面腫方

犀角 生薑 各二兩

防風 各一兩 石膏 六兩 黄芩 青木香

升麻 各三兩 防已 一兩半 竹葉 二握 苦參 栝蔞根

右十一味㕮咀以水七升煮取二升分三服相去十里久内消不利

防風散治頭面偏身風腫方

防風 二兩 白芷 一兩 白朮 三兩

右三味治下篩酒服方寸匕日三

治卒中風頭面腫方

擣杏仁如膏以雞子黄合擣令相得傅帛上厚裹之自乾不過八九傅瘥

令白髮還黑方

烏麻九蒸九曝為末以棗膏丸之久服之

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:52
列印頁數：854
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方

旋復花 一升　秦椒 一升　桂心 一尺　隴西白芷 一升

右四味治下篩以井花水服方寸匕日三服三十日

白髮還黑禁房室

又方

石灰酒治頭髮落不止方

石灰三升細篩水拌令濕極熟蒸之炒令至焦以木札投中火即著為候停冷取三升絹袋貯之以酒三斗漬三宿初服半合日三四夜二稍加至一合神驗

又方

桑根白皮切三升以水五升淹漬煮五六沸去滓洗沐髮數數為之自不復落

又方

麻子 三升碎　白桐葉 切一把

右二味以米泔汁二斗煮五六沸去滓以洗沐則髮不落而長甚有驗

治鬢髮墮落令生長方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生栢葉 切一升
猪膏 三升
附子 四枚

右三味為末以膏和為三十丸用布裹一丸内泔汁中煎沐髮長不落其藥密收貯勿令洩氣

又方

麻葉 桑葉

右二味以泔煮去滓沐髮七遍長六尺

又方羊糞灰淋汁洗之日三一洗不過十洗大生

又方

附子 蔓荆子 栢子仁 各三分

右三味以烏雞膏和擣三千杵貯新瓷器中封百日出以馬鬉膏和以傅頭訖巾裹之勿令見風日三傅即生 肘後不用栢子仁以酒漬澤沐

摩膏治頭中二十種病頭眩髮禿落面中風者方

蜀椒 二兩 莽草 各二兩 桂心 各一兩半 薤茹 各一兩半 半夏 乾薑 各一兩

右八味咬咀以生猪肪二十兩合擣令肪消盡藥成

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

先沐頭令淨然後以藥摩顖上日一即愈如非十二
月合則用生烏麻油和塗頭皮沐頭令淨乃用之一
頓生髮如昔 必效方無蜀椒 莽草半兩 夏乾薑
生髮膏治頭中風癢白屑方
蔓荆子 附子 細辛 續斷 零陵香 皂莢 澤蘭 防風 藿香 杏仁 石南 各三兩 莽草 一兩 松膏 各二升 熊脂 三升
右十八味㕮咀以清酒醋三升漬藥一宿明旦以馬
髎膏等微火煎三上三下以白芷色黄膏成用以澤
髮
又方
烏喙 三兩 莽草 石南 細辛 續斷 皂莢 澤蘭 白术 辛夷 防風 白芷 各二兩 竹葉

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:53
列印頁數：857
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

松葉　柏葉　各半升　猪脂　四升

右十五味㕮咀以清酢三升漬一宿明旦微火以脂煎三上三下白芷色黄膏成去滓濾取於沐髮後塗之一方用生油三大升　千金翼無石南用杏仁不用白芷灰汁洗頭去白屑柿良

又方

甘松香　丁香　白芷　澤蘭

杏仁　牡荆子　辛夷仁　芎藭

桑白皮　桑寄生　大麻　苜蓿

防風　莽草　各一兩　零陵香　吴藿香

細辛　蜀椒　各二兩　竹葉　松葉

栢葉　各一升半　胡麻油　臘猪膏　各一升　烏雞肪

雁肪　各一合

右二十五味㕮咀以酢漬一宿内油膏中微火煎三上三下白芷色黄膏成去滓塗頭上日二夜一髮生

又方治髮鬢禿落方

莽草　一兩　防風　升麻　白芷

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:54
列印頁數：858
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

薺苨 各二兩
馬鬣膏 五合
當歸 各一兩
茱萸 三升
白芷
防風
又方治眉落髮落生髮方
冷復上火三五沸止絞去滓傅頭當滓用之
右十一味其六味咀與諸膏合煎諸藥沸則下停
九月二十五日 一作十五日
十月十日
右並以日正午拔之當日不飲酒食肉五辛經一拔
十一月十日
十二月十日
又方取除日自拔白以鼈脂塗之又猪狗膽塗之又狗
黑者更不變
乳亦塗之
又用白蜜傅髮孔即不復生也

蜣蜋 四枚
驢鬣膏 一作雄雞膏 各半升
猪膏 各一升
豹膏 一作狗膏
熊膏
大黄 一兩半
蔓荆子 一升
細辛
黄芩
芎藭

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:54
列印頁數：859
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治染鬚髮方

胡粉 三兩 石灰 熬令黃 六兩 絹篩

右二味如粉以榆皮作湯和之如粉先以皂莢湯洗髮令極淨不得令有膩氣好曝乾夜卧以藥塗髮上令勻訖取桑葉相綴著頭巾上偏以裹髮一夜至旦取醋漿熱煖三遍淨洗髮又以醋泔熱煖洗髮又取生胡麻苗擣取汁三升和水煮一二沸淨濾以濯髮訖又用油湯濯之百日黑如漆

又方以鹽湯洗沐後以生麻油和蒲葦灰傅之一作治白禿

又方黑椹水漬之塗髮令黑

又方生麻油漬烏梅常用傅頭乃良

治髮黃方

臘月猪脂和羊屎灰蒲灰等分封頭三日一為之

又方大豆五升酢漿水二斗煮取五升沐之

治鬢髮黃赤方

燒梧桐灰用乳汁和塗傅鬢髮并皮肉鬢髮即黑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治風頭毛髮落不生方

鐵上生衣研以臘月猪脂和塗之日三亦治眉毛落生眉毛方

鐵生衣　墻上青衣

右二味等分為末以水和塗之即生

又方七月烏麻花陰乾為末以生烏麻油漬之二日一塗

治眉毛鬢髮火燒瘡瘕毛不生方

蒲灰以正月狗腦和傅即生

治髮落不生令長方

麻子一升熬黑壓取油以傅頭長髮妙

又方用雁肪傅之

又方多取烏麻花瓷器盛窖蓋深埋之百日出用塗髮令髮易長而黑

治禿頭方

蕪青子為末以酢和傅之日三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方東行棗根長三尺以中央安甑中心蒸之以器盛兩頭汁用塗頭髮即生（肘後作桑根良）

又方麻子三升熬焦為末以猪脂和塗之髮生為度

拔白髮良日

正月四日　二月八日　三月十二日

四月十六日　五月二十日　六月二十四日

七月二十八日　八月十九日

剪爪甲搔令毛孔少血出以蜜塗之即生黑毛

黑熟椹二升內甕中日中曝三七日化為水洗瘡上

治禿無髮者方

松瀝煎治頭瘡及白禿方

三七日髮生神效

松瀝（七合）　丹砂　雄黃　水銀（研各二兩）

黃連（三兩）　礬石（一兩一云峭粉）

右六味治下篩內瀝中攪研令調以塗之先以泔清洗髮及瘡令無痂然後傅藥二日一傅三傅後當更

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

作膿膿訖更洗凡經三度膿出訖以甘草湯洗去藥毒前後洗十數度即瘥

治白禿髮落生白痂終年不瘥方

五味子 蛇床子 遠志 各三分 兎絲子 五分 蒻蓉 松脂 各二分 雄黃 白蜜 各一分 雞屎白 半分 雌黃 一分

右十味治下篩以猪膏一升二合先内雄黃次内雌黃及松脂又次内諸藥煎之膏黃次内雞白屎次内蜜及松脂又次内諸藥煎之膏成先以桑灰洗頭燥傅之

王不留行湯治白禿及頭白久瘡去蟲止痛之方

王不留行 東引茱萸根皮 桃東南枝 各五兩 苦竹葉 蒺藜子 各三升 大麻仁 一升 蛇牀子 牡荆子

右八味㕮咀以水二斗半煮取一斗洗瘡日再并療癰疽妬乳月蝕瘡爛

松脂膏治白禿及癰疽百瘡方

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:56
列印頁數：863
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

松脂 六兩　礬石　雄黄

附子　大黄　杜蘅 一作牡荆　雄黄

真珠　苦參　石南　秦艽

右十二味咬咀以酢漬一宿猪膏一斤半煎之以附子色黄去滓乃内礬石雄黄水銀更著火三沸安濕地待凝以傅上日三

治白禿方

羊肉濕脯炙令香及熱速搭上不過三四度癢勿搔又新破猪肚去糞及熱速搭上癢慎勿搔當縛兩手之牛肉亦得

日中卧半日去之

又皂莢湯淨洗乾拭然後以陳久油滓塗之日三

又方煮桃皮汁飲之并洗

又方麴豆豉兩種治下篩醋和薄上 麴一作麹

又方大黑豆炒令焦為末和臘月猪脂熱暖時以匙抄封上偏即裹著勿見風

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方桃花為末和猪脂封上必效方以桑椹末同和傳之良

治赤禿方

桑灰汁洗頭令淨擣桑椹封之日中曝頭睡

又方馬蹄灰為末以臘月猪脂和傅之

又方燒牛角灰和猪脂傅之

又方擣黑椹取三升服日三

令髮不生方

蜂灰鼈脂相和新拔毛即塗毛孔上永不生也

治鬼舐頭方

燒猫兒屎以臘月猪脂和傅上

又方猫兒毛燒灰以膏和傅之

又方塼末和蒜擣傅日一度

增損當歸湯治心腹蘊蘊然痛方

當歸 升麻 各三兩 芍藥 黄芩

朴硝 桔梗 柴胡 各四兩

右七味㕮咀以水八升煮取二升半分三服

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:57
列印頁數：865
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷四十三

詳校官太醫院醫士臣舒 倣

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣范 鏊

謄錄監生臣張若湘

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷四十三　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

小腸腑方

小腸腑脉論第一

論曰小腸腑者主心也舌是其候也心合於小腸小腸者受盛之腑也號監倉吏重二斤十四兩長二丈四尺廣二寸四分（難經甲乙云長三丈二尺大二寸半經八分分之少半也）後附脊左回疊積其注於回腸者外傅臍上回運環反十六曲常留水穀二斗四升其一斗二升是水一斗二升是穀應主二十四氣也（難經云十六曲盛穀二斗四升水六升三合合之大半甲乙云受三斗三合合之大半）

脣厚人中長以候小腸小腸病者小腹痛腰脊控睾而痛時窘之復耳前熱若寒甚獨肩上熱及手小指次指之間熱若脉滑者（脉經作陷甲乙亦同）此其候也

小腹控睾引腰脊上衝心邪在小腸者連睾系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃動肝肺散於肓

列印日期/時間：02/04/2005 18:44:58
列印頁數：868
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

結於臍故取之肓原以散之刺太陰以與之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之

左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急熱痺小腹中有疝瘕王月即冷上搶心刺手心主治陰心主在掌後橫文中入一分

左手關前寸口陽絶者無小腸脉也苦臍痺小腹中有內熱小便赤黃刺手太陽治陽手太陽在手小指外側本節陷中

小腸有宿食常暮發熱明日復止

小腸有寒其心下重便膿血有熱必痔

心前受病移於小腸心煞不已則氣與煞俱出

小腸脹者小腹膜脹引腹痛

小腸有宿食常暮發熱明日復止

小腸有寒其心下重便膿血有熱必痔

厥氣客於小腸夢聚邑街衢

心應皮皮厚者脉厚脉厚者小腸厚皮薄者脉薄脉薄者小腸薄皮緩者脉緩脉緩者小腸大而長皮薄而脉沖小者小腸小而短諸陽經脉皆多紆屈者小腸結

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

扁鵲云手少陰與太陽為表裏所以表清裏濁清實濁虛故食下腸實而胃虛故腑實而不滿實則傷熱熱則口張口為之生瘡虛則傷寒寒則便泄膿血或發裏水其根在小腸先從腹起方見治水篇中

小腸絶不治六日死何以知之髮直如乾麻不得屈伸白汗不止

手太陽之脉是動則嗌痛頷腫不可以顧肩似拔臑似折是主液所生病者耳聾目黄頰頷腫頸肩臑肘臂外後廉痛

小腸虛實第二

小腸實熱

左手寸口人迎以前脉陽實者手太陽經也病苦身熱來去汗不出心中煩滿身重口中生瘡名曰小腸實熱

柴胡澤瀉湯治小腸熱脹口瘡方

柴胡　澤瀉　橘皮一用桔梗　黄芩

也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

旋復花　枳實　升麻　芒硝　各三兩
生地黃　切一升
右九味咬咀以水一斗煮取三升去滓下芒硝分三服
大黃圓治小腸熱結滿不通方
大黃　芍藥　芎藭　各二兩　大戟　朴硝　各三兩　杏仁　五十枚　巴豆　七枚
右七味為末蜜和丸如梧子大飲服大人七凡小兒二三丸日二熱去日一服
灸法
小腸熱滿灸陰都隨年壯穴俠中管兩邊相去一寸是也
小腸泄痢膿血灸魂舍一百壯小兒減之穴在俠臍兩邊相去各一寸　冀云相去一寸又灸小腸輸七壯
小腸虛寒
左手寸口人迎以前脉陽虛者手太陽經也病苦顱際

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

偏頭痛耳頰痛名曰小腸虛寒也

治小腸虛寒痛下赤白腸滑腸中懊憹補之方

乾薑 三兩　當歸 黃蘗 地榆 各四兩

黃連 阿膠 各二兩　石榴皮 三枚

右七味㕮咀以水七升煮取二升五合去滓下膠煮

取膠烊盡分三服

舌論第三

論曰凡舌者心主小腸之候也舌重十兩長七寸廣二寸半善用機衡能調五味也凡有所啖若多食鹹則舌脉凝而變色多食苦則舌皮槁而外毛焦枯多食辛則舌筋急而爪枯乾多食酸則舌肉肥而脣揭多食甘則舌根痛而外髮落又曰心欲苦肺欲辛肝欲酸脾欲甘腎欲鹹此五味內合五臟之氣也若臟熱則舌生瘡引脣揭赤若腑寒則舌本縮口噤脣青寒宜補之熱宜瀉之不寒不熱依臟腑調之舌縮口噤脣青升麻煎主之方見別卷

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

風眩第四 叙論 方 灸禁法

前卷既有頭面風方風眩不當分出思邈蓋以此是徐嗣伯方不可以餘方相雜故此特立風眩方條專出徐氏方焉

徐嗣伯曰余少承家業頗習經方名醫要治備聞之矣自謂風眩多途諸家未能必驗至於此術鄙意偏所究也少來用之百無遺策今年將衰暮恐奄忽不追故顯明證論以貽於後云爾

夫風眩之病起於心氣不定胷上蓄實故有高風面熱之所為也痰熱相感而動風風心相亂則悶瞀故謂之風眩大人曰癲小兒則為癎其實則一此方療治萬無不愈但恐證候不審或至差違大都忌食十二屬肉而貪豚為患發多氣急氣急則死不可救故此一湯是輕重之宜勿因此便謂非患所治風眩湯散丸煎凡有十方凡人初發宜急與續命湯也困急時但度灸穴便火針針之無不瘥者初得針竟便灸最良灸法次列於後

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

余業之以來三十餘年所救活者數十百人無不瘥矣後人能曉此方幸勿參以餘術焉

續命湯治風眩發則煩悶無知口沫出四體角弓目反上口噤不得言方

竹瀝 一升二合 生地黃汁 一升 龍齒 四兩 生薑 各四兩 防風 麻黃 各四兩 防已 三兩 附子 三分 石膏 七兩 桂心 二兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服有氣加附子作一兩紫蘇子五合橘皮半兩已服續命湯口開四肢尚未好定而心中尚不除者紫石湯主之方見後紫石煮散是也

貴豚湯治氣奔急欲絶方

吳茱萸 一升 石膏 人參 半夏 芎藭 各三分 桂心 芍藥 生薑 各四分 生葛根 茯苓 各十分 當歸 四兩 李根皮 一斤

右十二味咬咀以水七升清酒八升煮取三升分三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

服

防已地黃湯治言語狂錯眼目霍霍或言見鬼精神昏亂方

防已 甘草 各三兩 桂心 防風 各二兩

生地黃 五斤 別切 勿合藥 漬疾小輕用二斤

右五味㕮咀以水一升漬一宿絞汁著一面取滓著竹簀上以地黃著藥滓上於五斗米下蒸之以銅器盛取汁飯熟以向前藥汁合絞取之分再服

欽定四庫全書

備急千金要方

薯蕷湯治心中驚悸而四肢緩頭面熱心胸痰滿頭目眩胃如欲搖動方

薯蕷 麥門冬 人參 各四兩 生地黃 生薑 各三分 茯苓 半夏 五分 前胡 芍藥 各八分 枳實 遠志 各六分 茯神 竹葉 各二分 秫米 三合

右十六味㕮咀取江水高舉手揚三百九十下量取三斗煮米減一斗內半夏復減九升去滓下藥煮取

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:01
列印頁數：875
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

四升分四服無江水處以千里東流水代之校手令上頭也秦中無江水涇渭水可用諸葛灌劒由尚取之

防風湯服前湯後四體尚不涼冷頭目眩轉者服之此湯大勝宜長將服但藥中小小消息隨冷煖耳仍不除瘥者依此方

防風 石膏 人參 赤石脂 白石脂 生薑 龍骨 寒水石 茯苓各三分 桂心二分 紫石一分

右十一味㕮咀以水八升煮取三升分三服凡用井花水者取清淨也今用江水無泥又無砂穢源泉遠涉順勢歸海不逆上流用以治頭必歸於下故也

薯蕷煎方

薯蕷二十分 甘草十四分 澤瀉 人參 防風各三分 麥門冬三分 山茱萸 桔梗 黃芩各四分 當歸 白斂 桂心

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:01
列印頁數：876
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芍藥　紫菀
大豆黃卷　乾地黃
白朮　芎藭
乾薑
蜀椒　各二分已上二十味並用溥篩
生地黃　十八斤搗絞取汁煎令餘半
麝鹿雜髓　鹿角膠　各八兩
大棗　八十枚　麻子仁　研　各三升　蜜
右二十七味以清酒二斗四升煮桑白皮麻子棗得一斗去滓次下地黃汁膠髓蜜煎減半內前諸末併
桑根皮　五升忌冏上白蘚屋垣牆下溝瀆邊者皆不中用也

煎令可丸如雞子黃大飲服一枚日三稍加至三丸
薯蕷圓治頭目眩胃心中煩鬱驚悸狂癲方
薯蕷　二十分
甘草　三十分
鹿角膠　大豆黃卷
桂心　各七分
乾地黃　神麴　當歸
人參　各十分
麥門冬　防風　黃芩
芍藥　各六分
白朮　柴胡　桔梗
茯苓　杏仁
芎藭　各五分
白斂
乾薑　各三分
大棗　一百枚取膏

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二十二味為末合白蜜棗膏丸如彈丸先食服一丸日三

天雄散治頭目眩暈屋轉旋倒方

天雄 防風 芎藭 人參 獨活 桂心 白朮 遠志 山茱萸 各六分 葛根 各三分 莽草 四分 薯蕷 茯神

右十三味治下篩先食以菊花酒服方寸匕日二漸加至三匕以知為度 菊花酒法九月九日取鄧州甘菊花曝乾作末以米饘中蒸作酒

人參圓治心中時恍惚不定方

上黨人參 鬼白 鐵精 牛黃 丹砂 雄黃 大黃 葛蒲 防風 各一兩 蜥蜴 赤足蜈蚣

右十一味為末蜜丸如梧子大用前菊花酒服七丸日三夜一稍加之合藥勿用青紙忌見婦人青衣人

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

喪孝不具足人及濁穢六畜雞犬鼠等

灸法

其法以繩橫度口至兩邊既得口度之寸數便以其繩一頭更度鼻盡其兩邊兩孔間得鼻度之寸數中屈之取半合於口之全度中屈之先覓頭上迴髮當迴髮灸之以度度四邊左右前後當繩端而灸前以面為正並依年壯多少一年凡三灸皆須瘡瘢又灸壯數如前若連灸火氣引上其數處迴髮者則灸其近當鼻也若迴髮近額者亦宜灸若指面為瘢則闕其面處然病重者亦不得計此也

食禁

虎兎龍蛇牛馬猪羊雞犬猴鼠

右十二相屬肉物皆不得食及以為藥牛黃龍骨齒用不可廢

備急千金要方卷四十三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷四十四　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

小腸腑方

風癲第五　論針灸法方

論曰黃帝問曰人生而病癲疾者安所得之岐伯對曰此得之在腹中時其母數有所大驚也氣上而不下精氣并居故令子發為癲疾病在諸陽脉且寒且熱諸分且寒且熱名曰狂刺之虛脉視分盡熱病已而止病癲初發歲一發不治月一發不治四五日一發名曰癲疾刺諸分其脉尤寒者以針補之病已止癲疾始生先不樂頭重直視舉目赤其作極已而煩心候之於顏取手太陽陽明太陰血變而已癲疾始發而反強因而脊痛候之足太陽陽明太陰手太陽血變而已癲疾始作而引口啼呼（甲乙作喘悸）者候之手陽明太陽右強者攻其左左強者攻其右血變而止治癲疾者常與之居察其所

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:03
列印頁數：880
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當取之處病至視之有過者即寫之置其血於瓠壺之中至其發時血獨動矣不動灸竅骨二十壯竅骨者尾骶也

骨癲疾者頷齒諸輸分肉皆滿而骨倨強直汗出煩悶嘔多涎沫氣下泄不療

筋癲疾者身拳攣急脉大刺項大經之本杼嘔多涎沫氣下泄不療

脉癲疾者暴仆四肢之脉皆脹而從滿脉盡刺之出血

不滿俠項灸太陽又灸帶脉於腰相去三寸諸分肉本輸嘔多涎沫氣下泄不療

治癲者病發而狂面皮厚敦敦者死不療

凡癲發則卧地吐涎沫無知若强掠起如狂及遺糞者難療

癲疾脉搏大滑久自已脉沉小急實死不療小牢急亦不可治脉虚可療實則死矣厥成為癲疾五臟不平六腑閉塞之所生也厥成為癲故附厥於此條也陰衰發

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熱厥陽衰發寒厥

論曰黃帝問曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則為寒厥陰氣衰於下則為熱厥問曰熱厥必起於足下而足下者何也對曰陽氣起於足三趾之表集於足下而聚於足心故陽勝則足下熱也問曰寒厥必起於五趾而上於膝者何也對曰陰氣起於五趾之裏集於膝而聚於膝上故陰氣勝則從五趾至膝上寒其寒也不從外皆從內也厥或令人腹滿或令人暴不知人或至半日遠至一日乃知人者何也陰氣盛於上則下虛下虛則腹滿腹滿則下氣重上而邪氣逆逆則陽氣亂亂則不知人巨陽之厥腫首頭重足不能行發為眴仆陽明之厥癲疾欲走呼腹滿不得臥面赤而熱妄見而妄言少陽之厥暴聾頰腫而熱脇痛脾不可運太陰之厥腹滿膜脹後不利不欲食食則嘔不得臥少陰之厥舌乾溺赤腹滿心痛厥陰之厥小腹腫痛腹脹涇溲不利好臥屈膝陰縮腫腑內 一作外

熱盛則瀉之虛則補之不盛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不虛以經取之上寒下熱先刺其項太陽从留之已則火熨項與肩甲令熱下冷乃止所謂推而上之者也上熱下寒視其虛脉而陷下於經絡者取之氣下而止所謂引而下之者也刺熱厥者留針反為寒刺寒厥者留針反為熱刺熱厥者二陰一陽刺寒厥者二陽一陰所謂二陰者二刺陰也所謂二陽者二刺陽也

論曰温病熱入腎中亦為瘂小兒病癇熱盛亦為瘂凡風瘡暴尸厥及鬼魘不寤皆相似宜精察之故經言从厥則成癲是以知似也

論曰癲病有五一曰陽癲發時如死人遺溺有頃乃解二曰陰癲坐初生小時臍瘡未愈數洗浴因此得之三曰風癲發時眼目相引牽縱反急强羊鳴食頃方解由執作汗出當風因以房室過度醉飲飽滿行事令心氣逼迫短氣脉悸得之四曰濕癲眉頭痛身重坐熱沐髮濕結腦汗未止得之五曰馬癲發時反目口噤手足相引身皆熱坐小時膏氣腦熱不和得之

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治五癲方

銅青　雄黃　空青　東門上雞頭　水銀各一兩　茯苓　猪苓　人參　白芷　白薇　白薇　石長生各二兩　卷栢　烏扇各半兩　硫黃一兩半

右十五味為末以青牛膽和著銅器中於甑中五斗大豆上蒸之藥成丸如麻子先食服三十丸日再夜一

虎睛圓治濕癲掣瘛口眼張大口出白沫或作聲或死不知人方　千金翼名大鎮心丸主諸癎所不療者

虎睛一具酒浸一宿而炙之　鬼箭羽　露蜂房二分　獨活　遠志　細辛　貫衆　麝香　白斂一作白薇　升麻　白蘞皮三兩　牛黃　防風　秦艽　防葵　龍齒　黃芩　雄黃　山茱萸　乾地黃一方乾薑　防己　茯苓　鐵精

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:05
列印頁數：884
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鬼臼 人參 大黃 銀屑 各四分

茯神 石膏 天雄 各五分 寒水石 六分

蛇蛻皮 一尺

右三十二味為末蜜和丸如梧子大酒服十五丸日

再稍加至二十五丸神方

凡癲發之候其狀多端口邊白沫動無常者治之方

秦艽 人參 防葵 一作防風 茯神 一作牡丹 各二兩

甘草 二兩 鉛丹 一兩 貫衆 一枚

右七味㕮咀以水九升煮取三升半分三服

雄雌圓治風癲失性顛倒欲死五癲驚癎方

雄黃 雌黃 真珠 各一兩 鉛 二兩熬令成屑

丹砂 二分 水銀 八分

右六味為末以蜜擣三萬杵丸如胡豆大先食服二

丸日二稍加以知為度 古今録驗云療五癲牛癲則牛鳴馬癲則馬鳴狗癲則狗引盈氣起寒厥不識人氣爭言方吐沫从而得蘇者嗥羊癲則羊鳴雞癲則雞鳴病五癲狂病者腑臟相

續命風引湯治中風癲眩不知人狂言舌腫出方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麻黃 芎藭 石膏 人參
防風 各兩三 桂心 甘草 獨活 各兩二
防己 附子 當歸 各兩一 杏仁 三十枚
陳薑 五兩一本無陳字

右十三味咬咀以酒三升水一斗合煎取四升分四服日三夜一

紫石散治大人風引小兒驚癇瘈瘲日數十發醫所不療者方

紫石英 滑石 白石脂 凝水石
赤石脂 石膏 各兩六 甘草 桂心
牡蠣 各兩五 大黃 龍骨 乾薑 各兩四

右十二味治下篩為粗散盛以韋囊懸於高涼處欲用取三指撮以新汲井水三升煮取一升二合大人頓服未百日兒服一合未能者綿沾著口中熱多者日四五服以意消息 深師方只龍骨乾薑牡蠣滑石白石脂五味

治百二十種風癲癇驚狂發即吐沫不識人者四月五

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

月宜服之方

紫石英　芍藥　龍骨　一本用黃芩　青石脂

白鮮皮　麻黃　當歸　甘草

栝蔞根　桂心　人參　各二兩　牡蠣　三兩

大黃　五兩

右十三味治下篩為粗散分作七裹每以大棗十枚水三升煮取二升半去滓頓服相去滓下一裹大棗十中煎取一升去滓頓服相去七日一服服訖即瘥

治癲癎厥時發作方

防葵　代赭　人參　鉛丹

白殭蠶　生猪齒　鉤藤　茯神

雷丸　虎骨　遠志　桂心

防風　各六分　卷栢　莨宕子　光明砂

牛黃　二分　白斂　四分　蚱蟬　十四枚　蛇蛻皮

升麻　附子　牡丹　龍齒　各一分

白馬眼睛　各一具

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:06
列印頁數：887
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二十五味治下篩酒服方寸匕日二亦可為丸良驗

芎藭湯治風癲引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴方

芎藭 藁本 蔺茹 各五兩

右三味�rm咀内酒一斗煮取三升頓服之羸者分再服取大汗

治風癲方 經心録名鴟頭丸

葶藶子 鉛丹 虎掌 烏頭

栝蔞根 各三分 甘遂 天雄 蜀椒 大戟 各二分 白朮 一分 鐵精 蔺茹 各一兩

鴟頭 枚

右十三味為末蜜丸如梧子湯酒下二丸日三服

又方

地黄 三十斤 天門冬 十斤

右二味擣取汁作煎服之瘥

又方萇菪子三升擣篩酒一斗漬半日絞去滓湯中煎

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:06
列印頁數：888
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

令可丸先食服如小豆二丸加至如梧子二丸以知為度額上手中從文理中赤起是知也無此候更服病日發者三日愈間日發者十日愈五日發者二十日愈半歲發者一月愈

治癲癎痢癡方

鉛丹一斤　飛鴟頭二枚

右二味為末蜜丸先食服三丸日三劇者夜一稍加之

結滯氣冷熱諸風癲癎惡疾耳聾頭風四肢拘攣猥退歷節萬病久服延年輕身齒落更生髮白更黑方

天門冬酒通治五臟六腑大風洞泄虛弱五勞七傷癥

天門冬與百部相似天門冬味甘兩頭方百部細長而味苦令人利擣絞取汁二斗清麴二升麴發以糯米二斗準家醞法造酒春夏極冷下飯秋冬溫如人肌酘之酒熟取清服一盞常令酒氣相接勿至醉吐慎生冷酢滑雞猪魚蒜特慎鯉魚亦忌油膩此是一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

斗汁法餘一石二石亦準此以為大率服藥十日覺身體癮疹大癢二十日更大癢三十日乃漸止此皆是風氣出去故也四十日即覺身心朗然大快似有所得五十日更覺大快當風坐卧覺風不着人身中諸風悉盡用米法先淨淘米曝炕令乾臨欲用時更別取天門冬汁漬米乾漉炊之餘汁拌飯甚宜密封取天門冬汁法淨洗天門冬去心皮乾漉去水切去壓取汁三四遍令滓乾如草乃止此酒初熟味酸仍作臭泔腥氣但依式服之从停則香美餘酒皆不及也封四七日佳凡八月九月即少少合至十月多合擬到來年五月三十日以來相續服之春三月亦得合入四月不得合服酒時若得散服得力更倍速散方天門冬去心皮曝乾擣作末以上件酒服方寸匕日三加至三匕久服長生凡酒亦得服方如左灸法

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:07
列印頁數：890
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大人癲小兒驚癇灸背第二椎及下窮骨兩處以繩度中折繩端一處是脊骨上也凡三處畢復斷繩作三折令各等而參合如厶字以一角注中央灸下二角俠脊兩邊便灸之凡五處也故畫圖注以丹注所灸五處各百壯削竹皮為度勝繩也

是穴 又灸陰莖頭三壯 又灸足大趾上聚毛中七壯 卒癲灸陰莖上宛宛中三壯得小便通即瘥 千金翼云當尿孔上 又灸囊下縫二七壯 又灸兩乳頭三壯 又灸督脉三十壯三報穴在直鼻中上入髮際 又灸耳上髮際各五十壯 漸灸三百壯炷惟小作 又灸天窻百會各

論曰黃帝問曰有病怒狂者此病安生岐伯對曰生於陽曰陽何以使人狂曰陽氣因暴折如難決故善怒病名曰陽厥問曰何以知之對曰陽明常動太陽少陽不動而動大疾此其候也曰治之奈何曰衰其食即已夫食入于陰長氣於陽故奪之食即已使之服以生鐵落為後飯夫生鐵落者下氣疾

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:08
列印頁數：891
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

論曰凡發狂則欲走或自高賢稱神聖皆須備諸火灸乃得永瘥耳若或悲泣呻吟者此為邪非狂自依邪方治之邪入于陽則為狂邪入于陰則為血痺邪入于陽傳即為癲癎邪入于陰傳則為痛瘡陽入于陰病靜陰入于陽病怒

鼈甲湯治邪氣夢寐寤時涕泣不欲聞人聲體中酸削乍寒乍熱腰脊强痛腹中拘急不欲飲食或因疾病之後勞動疲極或觸犯忌諱衆諸不節婦人産生之後月經不利時下青赤白肌體不生肉虛羸度小便不利或頭身發熱旋復解散或一度交接彌日因極皆主之方

鼈甲 七枚
甘草 二兩 各
白薇 一作白芷 一兩 各
貝母 二兩 各
知母 四兩 各
石膏 六兩
防風 三兩
凝水石 二兩 各
麻黄 二兩 各
芍藥 二兩 各
白术 二兩半 各
桂心 二兩 各
茯苓 二兩 各

右十四味咬咀以水二斗煮取四升温服一升日三夜一九物牛黄圓治男子沾鬼魅欲死所見驚怖欲走時有

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:08
列印頁數：892
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

休止皆邪氣所為不能自絶方

牛黄 土精 一分 云火精

荆實 人精 各五分

曾青 蒼龍精

玉屑 白虎精

空青 天精

雄黄 地精

玄參 玄武精

龍骨 水精

赤石脂 朱雀精

右九味名曰九精上通九天下通九地各一兩治下篩蜜和丸如小豆先食服一丸日三稍加以知為度

千金翼云凡邪病當服五邪湯九精丸瘥

十黄散治五臟六腑血氣少亡魂失魄五臟覺不安忽忽喜悲心中善恐怖如有鬼物此皆發于大驚及當風從高墮下落水所致悉主之方

雄黄 人參 各五分

黄芩

大黄

黄連

黄昏

蒲黄

麻黄 各一分

黄蘗

黄耆

細辛

桂心 各三分

黄環

澤瀉

山茱萸 各二分

右十五味治下篩未食温酒服方寸匕日三不知加至二匕羸劣者更加人參五分合十分一方有生黄

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:09
列印頁數：893
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

二分 崔氏有蜀椒五分乾薑四分

別離散治男女風邪男夢見女女夢見男悲愁憂恚怒喜無常或半年數月一發動方

桂心 茵芋 天雄 葛蒲

細辛 茜根 附子 乾薑各一兩

白朮 桑上寄生各三兩

右十味治下篩酒服方寸匕日三凡修合勿令婦人雞犬及病者家人知見令邪氣不去禁之為驗

四物鳶頭散治鬼魅方

東海鳶頭即由跋根 黃牙石一名金牙 莨菪子

防葵各一分

右四味治下篩酒服方寸匕欲令病人見鬼加防葵莨菪並一分欲令知鬼主者復增一分立有驗防葵莨菪並令人迷惑恍惚如狂不可多服

五邪湯治邪氣啼泣或歌或哭方

禹餘糧 防風 桂心 芍藥

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:09
列印頁數：894
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

遠志　獨活
人參　甘草
防己　白朮
蛇蛻皮 各一兩
右十七味咬咀以水二斗煮取四升分四服亦可如
煮散法服之

茯神湯治五邪氣入人體中見鬼妄語有所見聞心悸
跳動恍惚不定方

茯神　人參
赤小豆 四十枚
右五味咬咀以水一斗煮取二升半分三服

人參湯治風邪鬼氣往來發作有時或無時節方

人參　防風
桔蔞根 翼作枯梗
澤瀉　遠志
附子　黃芩
牡蠣　五味子
山茱萸　前胡

茯神　人參
菖蒲　茯 各三兩
牡蠣　秦艽 各二兩
雄黃 深師作黃丹
茯神　菖蒲
烏頭　乾薑
狗脊　遠志
獨活 各五分
秦艽

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

細辛 石膏
芎藭 蜀椒
牛膝 甘草
石南 桑根白皮
桂心 麻黃
竹皮 白朮
橘皮 各十八銖 千金翼作澤蘭 各十 茯苓 各十二銖 大棗 十六枚
鬼箭
右三十二味㕮咀以水六升酒六升合煮取四升分
五服日三夜二
虎睛湯治狂邪發無常被髮大叫喚欲殺人不避水火方
虎睛 露蜂房 鴟頭 各一具 楓上寄生 五分
石長生 十分 茯苓
桂心
獨活 甘草
人參 天雄 各一兩
防風 各三兩
右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升分四服日
三夜一
又方
防葵 人參
貫衆 各五兩 防風
桂心 各三兩
右五味㕮咀以水一斗煮取三升分四服稍服亦可

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方苦參五升蜜和丸如酸棗大單服十丸

治卒發狂方

令患人著地仰卧以冷水終日淋其面良

治百邪鬼魅方

服頭垢小豆大

治魅方

以水服鹿角末方寸匕日三

治狐狸諸色精魅作種種惡怪令人恐怖狂癲風邪方

右二味破雄黃如碁子大鐺中以盆合頭作竈微火煎九日九夜不得少時火絶亦不得火冷須火熱微微不絶神驗

治風邪方

商陸根三十斤去皮細切以水八斗東向竈煎減半去滓更煎令可丸如梧子大服一丸合時勿令人見良耆方及大豆紫湯皆可服汗出佳 良耆方出此篇前紫湯見別卷

雄黃六斤 油一斗二升

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方燒蝦蟇末水服方寸匕日三
又方燒人屎灰酒服愼生冷酢滑猪雞魚蒜等
又方以水服伏龍肝方寸匕日三

治諸橫邪癲狂針灸圖訣

論曰凡諸百邪之病源起多塗其有種種形相示表癲邪之端而見其病或有默默而不聲或復多言而謾說或歌或哭或吟或笑或眠坐溝渠噉食糞穢或裸形露體或晝夜遊走或嗔罵無度或是蜚蠱精靈手亂目急如斯種類癲狂之人今針灸與方藥並主治之

凡占風之家亦以風為鬼斷

扁鵲曰百邪所病者針有十三穴也凡針之體先從鬼宮起次針鬼信便至鬼壘又至鬼心未必須併針止五六穴即可知矣若是邪盡之精便自言說論其由來住驗有實立得精靈未必須盡其命求去與之男從左起針女從右起針若數處不言便偏穴針也依訣而行針灸等處並備主之仍須依掌訣捻目治之萬不失一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃帝掌訣別是術家秘要縛鬼禁劫五嶽四瀆山精鬼魅並悉禁之有目在人兩手中十指節間第一針人中名鬼宮從左邊下針右邊出第二針手大指爪甲下名鬼信入肉三分第三針足大指爪甲下名鬼壘入肉二分第四針掌後橫文名鬼心入半寸即大淵穴也第五針外踝下白肉際足太陽名鬼路火針七鋌鋌三下即申脈穴也第六針大椎上入髮際一寸名鬼枕火針七鋌鋌三下第七針耳前髮際宛宛中耳重下五分名鬼牀火針七鋌鋌三下即上星穴也第十一針陰文上三寸兩筋間名鬼路即勞宮穴也第十針直鼻上入髮際一寸名鬼堂火針七鋌鋌三下即曲池穴也第十三針舌頭一寸當舌中下縫刺貫出舌上名鬼封仍以一板橫口吻安針頭令舌不得動已前若是手足皆相對針兩穴若是孤穴即単針之文外頭接白肉際名鬼臣火針七鋌鋌三下即此下縫灸三壯女人即玉門頭名鬼藏第十二針尺澤橫

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

邪鬼妄語灸懸命十四壯穴在口脣裏中央絃絃者是也一名鬼禄又用剛刀決斷絃絃者乃佳

邪病卧瞑瞑不自知風府主之一名鬼穴

邪病大喚罵走灸十指端去爪一分一名鬼城

邪病大喚罵走遠三里主之一名鬼邪

邪病鬼癲四肢重顩上主之一名鬼門

邪病四肢重痛諸雜候尺澤主之尺中動脉一名鬼受

邪病語不止及諸雜候人中主之一名鬼客屬

凡人中惡先押鼻下是也

倉公法狂癲不識人癲病眩亂灸百會九壯狂走掣

癡灸玉枕上三寸一法頂後一寸灸百壯狂走癲疾

灸頂後二寸十二壯狂邪鬼語灸天窻九壯狂走

灸大幽百壯狂言恍惚灸天樞百壯狂走癲癎灸

季肋端三十壯狂癎哭泣灸手逆注三十壯穴在左

右手腕後六寸狂走驚癎灸河口五十壯穴在腕後

陷中動脉是此與陽明同也狂癲風癎吐舌灸胃管百壯不

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

針　狂邪發無常被髮大喚欲殺人不避水火及狂言妄語灸間使三十壯穴在腕後五寸臂上兩骨間亦灸驚恐歌哭狂走喜怒悲泣灸臣覺一作臣攪隨年壯穴在背上甲內側反手所不及者骨芒穴上捻之痛者是也　狂邪鬼語灸伏兎百壯前作天窻九窻悲泣鬼語灸天府五十壯悲泣邪語鬼忙歌哭灸慈門五十壯　狂邪驚癇病狂癲風驚厥逆心煩灸巨陽五十壯　狂癲鬼語灸灸承命三十壯穴在內踝後上行三寸動脉上亦灸驚狂走也

足太陽四十壯　狂走驚恍惚灸足陽明三十壯　狂癲癇易疾灸足少陽隨年壯　狂走癲厥如死人灸足大趾三毛中九壯翼云灸大敦　狂走易罵灸八會隨年壯穴在陽明下五分　狂癲驚走風恍惚嗔喜罵笑歌哭鬼語悉灸腦戶風池手陽明太陽太陰足陽明陽蹻少陽太陰陰蹻足跟皆隨年壯　驚怖心忪少力灸大橫五十壯　狂風罵詈撾斫人名為熱陽風灸口兩吻邊燕口處赤白際各一壯　又灸陰囊縫三十壯令人立以

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

筆正注當下已卧核卵上灸之勿令近前中卵核恐害陽氣也　狂走刺人或欲自死罵詈不息稱神鬼語灸口吻頭赤白際一壯　又灸兩肘内屈中五壯　又灸背胛中間三壯報灸之倉公法神效　鬼魅灸入髮一寸百壯　又灸間使手心各五十壯　狐魅合手大指縛指灸合間三七壯當狐鳴即瘥　卒狂言鬼語以甑帶急合縛兩手大指便灸左右脇下對屈肋頭兩處火俱起各七壯須臾鬼自道姓名乞去徐徐問之乃解其手

卒中邪魅恍惚振噤灸鼻下人中及兩手足大指爪甲本令艾丸半在爪上半在肉上各七壯不止十四壯灶如雀屎大　風邪灸間使隨年壯　又灸承漿七壯又灸心輸七壯　又灸三里七壯　卒狂鬼語針其足大拇趾爪甲下入少許即止

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:12
列印頁數：902
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷四十 五至七

詳校官太醫院醫士臣程 泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈐

校對官庶吉士臣嚴 福

謄錄監生臣陳振興

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷四十五　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

小腸腑方

風虛驚悸第六　方

遠志湯補心治心氣虛驚悸喜忘不進食方

遠志　乾薑　白朮　桂心　各二兩　黃耆　紫石英　各三兩　防風　當歸　人參　茯苓　各二兩　茯神　羌活　各二兩　麥門冬　半夏　各四兩　甘草　芎藭　大棗十二枚　五味子二合

右十八味㕮咀以水一斗三升煮取三升半分五服日三夜二

又方治中風心氣不足驚悸言語謬誤恍惚憒憒心煩悶耳鳴方

遠志　黃耆　茯苓　甘草

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:13
列印頁數：904
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芍藥 當歸 桂心 無一方 麥門冬 人參 兩各二 獨活 兩四 生薑 兩五 附子 兩一 茯神 兩四 麥門冬 兩四 人參 遠志 甘草 紫石 五味子 兩二 半夏 防風 黄耆 兩各三

當歸 兩各三 細辛 乾薑 兩各六 酸棗 一升 龍骨 桂心 獨活 兩各二 人參 遠志 防風 兩各三

右十二味咬咀以水九升煮取三升分三服

又方治風虛滿頸項强心氣不定不能食方

茯神湯治風經五臟大虛驚悸安神定志方

茯神

人贏服五合日三夜一

右十二味咬咀以水一斗二升煮取四升每服八合

右十四味咬咀以水一斗三升煮酸棗取一斗去棗

內餘藥煎取三升半一服七合日三夜二

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

補心湯治心氣不足其病苦驚悸汗出心中煩悶短氣
喜怒悲憂悉不自知常苦咽喉痛口脣黑嘔吐血舌本
强不通水漿方
紫石英 茯苓 人參 遠志
麥門冬 一升 赤小豆 三合 大棗 三十枚 當歸 茯神 深師作桂 甘草 紫菀 各三兩
右十一味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服
又方治心氣不足多汗心煩喜獨語多夢不自覺咽喉
痛時吐血舌本强水漿不通方
紫石英 研 茯苓 人參 桂心 各二兩 麥門冬 三兩 紫菀 甘草 各一兩 赤小豆 二十四枚 大棗 七枚
右九味㕮咀以水八升煮取二升半分三服春夏服
佳
又方治奄奄忽忽朝瘥暮劇驚悸心中憧憧胸滿不下
食陰陽氣衰脾胃不磨不欲聞人聲定志下氣方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人參 茯苓
枳實 當歸
半夏 桂心 兩各五
茯神 兩二 大棗 枚二十
遠志 甘草
龍齒 桔梗 兩各三
黃耆 兩四 生薑 兩六
遠志 甘草
蒲黃 一方用 菖蒲 人參 茯苓 兩各四
右十四味㕮咀以水一斗二升先煮粳米五合令熟去滓次内藥煮取四升一服八合日三夜二
又方治心氣不足心痛驚悸恐方
右四味㕮咀以水一斗煮取三升半分三服
又方治心氣不足腹背相引痛不能俛仰方 或作傷心湯
遠志 乾地黃 兩各三
麥門冬 石膏 兩各四 半夏 附子
茯神 黃芩
桂心 生薑 兩各二 甘草 阿膠
糖 兩各一 大棗 枚三十
右十四味㕮咀以水一斗煮取三升去滓内糖及膠更煎取二升二合分三服 此方與前卷心虛實篇大補心湯相

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

重分兩別

小定心湯治虛羸心氣驚弱多魘方

茯苓 四兩

桂心 三兩

甘草 芍藥

人參 各二兩

大棗 十五枚

乾薑 遠志

右八味㕮咀以水八升煮取三升分四服日三夜一

大定心湯治心氣虛悸恍惚多忘或夢寤驚魘志少不足

人參 茯苓

茯神 遠志

赤石脂 龍骨

乾薑 當歸

甘草 白朮

芍藥 桂心

紫菀 防風 各二兩

大棗 二十枚

右十五味㕮咀以水一斗二升煮取三升半分五服日三夜一

治驚勞失志方

麥門冬 牡蠣 遠志 各二兩

龍骨 防風

茯神 五兩

甘草 桂心 各二兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大棗二十枚

右九味㕮咀以水八升煮取二升分二服相去如人行十里久進一服

荊瀝湯治心虛驚悸不定羸瘦病方

行五里久再進

荊瀝二升　茯神　白鮮皮各三兩　人參二兩

右五味三味㕮咀以荊瀝銀汁中煮取一升四合分三服相去如人行十里久進一服

白銀十兩以水一斗煮取三升

又方荊瀝二升緩水煎取一升六合分温每服四合日三夜一

鎮心湯治風虛勞冷心氣不足喜忘恐怖神志不定方

防風　當歸　大黄

麥門冬各五分此味又亦云五兩　澤瀉　大豆卷

白斂各四分此味一云三兩　葛蒲　人參

桔梗　桂心　遠志　薯蕷

石膏各三分　紫菀　乾薑

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:15
列印頁數：909
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

茯苓 各二分一云各三分
粳米 五合
秦艽 六分
右二十四味㕮咀以水一斗二升先煮粳米令熟去子大酒服十九加至二十九
澤内藥煮取四升分服八合日三夜一 千金翼不用粳米蜜丸梧
大鎮心散治心虚驚悸夢寤恐畏方
紫石英
茯苓
防風
人參
白术
甘草 各十分
附子 各二兩
茯神 各二兩
甘草
澤瀉 各八分
黄耆
秦艽
白斂 各六分
麥門冬
白薇
當歸 各五分
桔梗
大豆卷
栢子仁
桂心
遠志
大黄 各四分
石膏 各四分
蜀椒
芍藥
乾薑
細辛 各三分
右二十四味治下篩酒服二方寸匕日三一方無紫石英茯苓澤瀉乾薑有大棗四分蜜丸如梧子酒下十
石茯苓澤瀉乾薑有大棗四分蜜丸如梧子酒下十
五丸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方治風虛心氣驚弱恍惚失常忽嗔恚悲志意不樂方

紫石英　白石英　龍齒　人參　細辛　天雄　附子　遠志　白术　桂心　防風 各二兩　乾地黃 一本無　朱砂　乾薑　茯苓

右十五味治下篩酒服兩方寸匕日三

小鎮心散治心氣不足虛悸恐畏悲思恍惚心神不定

惕惕然驚者方

人參　遠志　乾地黃　赤小豆　桂心　黃耆　細辛　乾薑　葛蒲 各二兩　茯苓 四兩

右十四味治下篩酒服二方寸匕日三

鎮心圓治男子婦人虛損夢寤驚悸或失精神婦人赤白注漏或月水不利風邪鬼注寒熱往來腹中積聚憂恚結氣諸病方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

紫石英　茯苓
遠志　麥門冬　菖蒲　蒐蘩
細辛　卷栢　大黃　當歸
防風　人參　大豆卷　乾薑各五分
烏頭　桂心　澤瀉　秦艽
丹參各六分　石膏　芍藥　栢子仁各三分
薯蕷各十分　白斂　鐵精　銀屑
前胡　牛黃各二分　乾地黃十二分　白朮
半夏各八分　蘆蟲十二枚　大棗五十枚

右三十五味為末蜜棗和擣五千杵丸如梧子大酒服五丸日三加至二十丸一本無大豆卷大棗

大鎮心圓所治與前方大同凡是心病悉皆主之方

乾地黃六分　牛黃五分一用牛膝　羌活　桂心
麥門冬　秦艽　芍藥　人參
遠志　紫石英　丹砂　阿膠
甘草　大黃　銀屑　白斂

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:17
列印頁數：912
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當歸 乾薑 防風 各八分 杏仁 蜀椒 各三分 澤瀉 大豆卷 薯蕷 茯神 前胡 鐵精 栢子仁 各五分 大棗 四十枚 桑螵蛸 十一枚

右三十二味為末白蜜棗和丸酒服七丸日三加至二十丸

小鎮心圓治心氣少弱驚虛振悸胸中逆氣魘夢參錯謬忘恍惚方

紫石英 朱砂 茯神 銀屑 雄黃 葛蒲 人參 桔梗 乾薑 遠志 甘草 當歸 桂心 各二分 防風 細辛 鐵精 防己 各一兩

右十七味為末蜜丸如大豆狀飲服十丸日三加至二十丸一方用茯苓二分為十八味

定志小圓治心氣不定五臟不足甚者憂愁悲傷不樂

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

忽忽喜忘朝差暮劇暮差朝發狂眩者方

菖蒲 遠志 各二兩 茯苓 人參 各三兩

右四味為末蜜丸如梧子大飲服七丸日三加茯神

為茯神丸散服之亦佳

紫石酒治久風虛冷心氣不足或時候怖方

紫石英一斤 鍾乳 防風 遠志

甘草 各三兩 桂心 各四兩 麻黃 茯苓 白朮

右九味㕮咀以酒三斗春月漬五日每服四合日三

亦可至醉常令有酒氣

好忘第七方

枕中方

龜甲 龍骨 遠志 菖蒲

右四味等分治下篩酒服方寸匕日三常服令人大

聰 千金方云食後水服

治多忘令人不忘方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

葛蒲二分 茯苓
遠志七分 茯神 人參各五分

右五味治下篩酒服方寸匕日三夜一五日後知神良

又方

蕤蓉 續斷各一分 遠志 菖蒲

右五味治下篩酒服方寸匕日三至老不忘

開心散治好忘方

茯苓各三分

右五味治下篩飲服方寸匕日三

遠志 人參各一分 葛蒲一兩 茯苓二兩

葛蒲益智圓治喜忘恍惚破積聚止痛安神定志聰明耳目方

葛蒲 遠志 人參 桔梗

牛膝各五分 附子五分 茯苓七分 桂心三分

右八味為末蜜丸如梧子一服七丸加至二十丸日二夜一禁如藥法

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

養命開心益智方

乾地黃 人參 茯苓 各二兩 蓯蓉

蒐絲子 遠志 各三兩 蛇牀子 二分

右七味治下篩服方寸匕日二忌兎肉餘無忌

八味散方

天門冬 六分 桂心 茯苓 各一兩 乾地黃 四分

五味子 菖蒲 遠志 石葦 各三分

右八味治下篩後食或酒或水服方寸匕三十日力倍

六十日氣力强志意足

治健忘方

天門冬 遠志 茯苓 乾地黃

治好忘久服聰明益智方

龍骨 虎骨 遠志 各等分

三加至三十丸常服勿絶

右四味各等分為末蜜丸如梧子大酒服二十丸日

右三味治下篩食後服方寸匕日二

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:18
列印頁數：916
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方七月七日取菖蒲酒服三方寸匕飲不至醉

又方常以甲子日取石上菖蒲一寸九節者陰乾百日治合下篩服方寸匕日三耳目聰明不忘 出衢州石橋寺南山

又方七月七日麻勃一升人參二兩為末蒸令氣徧臨夜卧服一刀圭盡知四方之事

又方戊子日取東邊桃枝二七枚縛著卧牀中枕之不忘

又方常以五月五日取東向桃枝日未出時作三寸木人著衣帶中令人不忘

又方丁酉日自往市買遠志裹著衣中角頭還末服之不復忘

治人心昏塞多忘喜誤方

七月七日取蜘蛛網著衣領中勿令人知不忘

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:19
列印頁數：917
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷四十六　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

脾臟方

脾臟脉論第一

論曰脾主意脾臟者意之舍意者存憶之志也為諫議大夫並四臟之所受心有所憶謂之意意之所存謂之志因志而存變謂之思因思而遠慕謂之慮因慮而處物謂之智意者脾之臟也口脣者脾之官脾氣通於口口和則能別五穀味矣故云口為戊舌脣為已循環中官上出頤頰次候於脣下迴脾中榮華於舌外主肉內主味脾重二斤三兩扁廣三寸長五寸有散膏半斤主裹血温五臟神名俾俾主臟營（一作意）秩禄號為意臟隨節應會故曰脾臟營營含意在氣為噫在液為涎脾氣虛則四肢不用五臟不安實則腹脹涇溲不利脾氣虛則夢食飲不足得其時則夢築垣蓋屋脾氣盛則夢歌

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:19
列印頁數：918
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

樂體重手足不舉厥氣客於脾則夢邱陵大澤壞屋風雨凡脾臟象土與胃合為腑其經足太陰與陽明為表裏其脉緩相於夏王於季夏脾者土也敦而福敦者厚也萬物衆色不同故名曰得福者廣萬物懸根住莖其葉在巔蜎蜚蠕動蚑蠉喘息皆蒙土恩德則為緩恩則為遲故令太陰緩而遲尺寸不同酸鹹苦辛大妙而生五行其時而以各行皆不群行盡可常服土寒則温土熱則凉土有一子名之曰金懷挾抱之不離其身金乃畏火恐熱來薰遂棄其母逃於水中水為金子而臟火神閉門塞户内外不通此謂冬時土失其子其氣衰微水為洋溢浸漬其地走擊皮膚面目浮腫歸於四肢愚醫見水直往下之虚脾空胃水遂居之肺為喘浮肝反畏肺故下沈沒下有荆棘恐傷其身避在一邊以為水流心衰則伏肝微則沈故令脉伏而沈上醫遠（一作來）占息則微汗出正流肝著其根心氣因起陽行四肢肺氣因轉孔穴利其溲便遂通水道甘液下流停其陰陽喘

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

亭亭喘息則安腎為安聲其味為鹹倚坐毋敗污臭如腥土得其子即成為山金得其母名曰邱矣

四時之序逆順之變異也然脾脉獨何主脾脉者土也孤藏以灌四旁者也其善者不可得見惡者可見惡者何如其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之喙者此謂不及病在中太過則令人四肢沈重不舉不及則令人九竅壅塞不通名曰重强

脾脉來而和柔相離如雞踐地曰平長夏以胃為本脾

脉來實而盈數如雞舉足曰脾病脾脉來堅銳如雞之喙如鳥之距如屋之漏如水之流曰脾死

真脾脉至弱而乍疎乍散一作數色黃青不澤毛折乃死

長夏胃微濡弱曰平弱多胃少曰脾病但代無胃曰死

濡弱有石曰冬病石甚曰今病

脾臟營營舍意愁憂不解則傷意意傷則悶亂四肢不舉毛悴色夭死于春

足太陰氣絶則脉不營其口脣口脣者肌肉之本也脉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

弗營則肌肉濡肌肉濡則人中滿人中滿則脣反脣反者肉先死甲篤乙死木勝土也

脾死臟浮之入緩一作堅按之中如覆杯絜絜狀如搖者大而緩曰平反得浮大而洪者是心之乘脾母之死六月季夏建未也坤未之間土之位脾王之時其脈歸子爲虛邪雖病易治反得微濇而短者是肺之乘脾子之乘母爲實邪雖病自愈反得弦而長者是肝之乘脾木之尅土爲賊邪大逆十死不治反得沈濡而滑者是腎之乘脾水之陵土爲微邪雖病即瘥

右手關上陰絶者無脾脈也若少氣下利腹滿身重四肢不欲動善歐刺足陽明治陽

右手關上陰實者脾實也若腸中伏伏如堅狀大便難刺足太陰治陰

脾脈長長而弱來疎去概一作數再至曰平三至曰離經病四至脫精五至死六至命盡足太陰脈也

脾脈急甚爲癡癎微急爲膈中滿食飲入而還出後沃

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

沫緩甚為癡厥微緩為風癡四肢不用心慧然若無疾
大甚為擊仆微大為脾疝氣裹大膿血在腸胃之外小
甚為寒熱微小為消癉滑甚為癰癉微滑為蟲毒蚘腸
鳴熱濡甚為腸癰微濡為內潰多下膿血
脾脉搏堅而長其色黃當病少氣其耎而散色不澤者
當病足骭腫若水狀
黃脉之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣名曰厥疝
女子同法得之疾使四肢汗出當風
扁鵲曰脾有病則色癡黃實則舌本强直虛則多癖善
吞注利其實若陽氣壯則夢飲食之類
脾在聲為歌在變動為噫在志為思思傷脾精氣并於
脾則饑音在長夏病變於音者取之經恐懼而不解則
傷精精傷則骨痠癡厥精時自下則病精是故五臟主
藏精者也不可傷傷則守失而陰虛虛則無氣無氣則
死
病先發於脾閉塞不通身痛體重一日之胃而腹脹二

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

日之腎少腹腰脊痛脛痠三日之膀胱背膂筋痛小便閉十日不已死冬人定夏晏食

病在脾日昳慧平旦甚日中持下晡靜（素問作日出甚王氷云日中持）

假令脾病東行若食雉兎肉及諸木果實得之不（癈者繆也）

者當以春時發得病以甲乙日也

凡脾病之狀必身重善饑足痿不收（素問作善肌肉痿足不收甲乙作苦）

取其經足太陰陽明少陰血者

脾脉沈之而濡浮之而虛苦腹脹煩滿胃中有熱不嗜（饑饑肉痿足不收）行善痿脚下痛虛則腹滿腸鳴飧泄食不化

食食而不化大便難四肢苦痺時不仁得之房内月使

不來來而頻併

脾病其色黃飲食不消腹苦脹滿體重節痛大便不利

其脉微緩而長此為可治宜服平胃丸瀉脾丸茱萸丸

附子湯春當刺隱白冬刺陰陵泉皆瀉之夏刺大都季

夏刺公孫秋刺商邱皆補之又當灸章門五十壯背第

十一椎百壯

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:21
列印頁數：923
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

邪在脾胃肌肉痛陽氣有餘陰氣不足則熱中善飢陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹痛陰陽俱有餘若俱不足則有寒有熱皆調其三里

有所擊仆若醉飽入房汗出當風則傷脾脾傷則中氣陰陽離別陽不從陰故以三分候死生

脾中風者翕翕發熱形如醉人腹中煩重皮肉瞤瞤而短氣也脾中寒

脾水者其人腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難脾脹者善噦四肢急一作實體重不能衣一作收

跌陽脉浮而澁浮則胃氣强澁則小便數浮澁相搏大便則堅其脾為約脾約者其人大便堅小便利而反不渴

脾氣弱病利下白腸垢大便堅不能更衣汗出不止名曰脾氣弱或五液注下青黄赤白黑

寸口脉弦而滑弦則為痛滑則為實痛即為急實即為踊痛踊相搏即胸脇搶急

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

跌陽脉浮而澁浮即胃氣微澁即脾氣衰微衰相搏即呼吸不得此為脾家失度

寸口脉雙緊即為入其氣不出無表有裏心下痞堅

跌陽脉微而濇微即無胃氣澁即傷脾寒在於膈而反下之寒積不消胃微脾傷穀氣不行食已自噫寒在胷膈上虛下實穀氣不通為閉塞之病

寸口脉緩而遲緩則為陽其氣長遲則為陰榮氣促一云不足榮衛俱和剛柔相得三焦相承其氣必强

跌陽脉滑而緊滑即胃氣實緊即脾氣傷得食而不消者此脾不治也能食而腹不滿此為胃氣有餘腹滿而不能食心下如飢此為胃氣不行心氣虛也得食而滿者此為脾家不治病人鼻下平者胃病也微赤者病發癰微黑者有熱青者有寒白者不治脣黑者胃先病微燥而渴者可治不渴者不可治臍反出者此為脾先落凡人病脉已解而反暮微煩者人見病者差安而强與一云先終

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈
診得脾積脉浮大而長飢則減飽則見脹起與穀爭減
心下累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢重足
脛腫厥不能臥是主肌肉損色黄也
脾之積名曰痞氣在胃管覆大如盤久久不愈病四肢
不收黄癉食飲不為肌膚以冬壬癸日得之肝病傳脾
脾當傳腎腎適以冬王王者不受邪脾復欲還肝肝不
肯受因留結為積故知痞氣以冬得之

脾病其色黄體青失溲直視脣反張爪甲青飲食吐逆
體重節痛四肢不舉其脉當浮大而緩今反弦急其色
當黄而反青者此是木之尅土為大逆十死不治
宫音人者主脾聲也脾聲歌其音皷其志愁其經足太
陰厥逆陽明則榮衛不通陰陽翻作陽氣内擊陰氣外
傷傷則寒寒則虚虚則舉體消瘦語音沈澀如破皷之
聲舌强不轉而好咽唾口噤脣黑四肢不舉身重如山
便利無度甚者不可治依源麻黄湯主之 方在別卷中 又言

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

聲憂懼舌本卷縮此是木尅土陽擊陰陰氣伏陽氣起
起則實實則熱熱則悶亂體重不能轉側語聲拖聲氣
深不轉而心急此為邪熱傷脾甚則不可治若脣雖瘓
黃語言若轉可治
脾病為癚者令人寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出恒
山丸主之 方在別卷中 若其人本來少於瞋怒而忽反常瞋
喜無度正言而鼻笑不答於人此脾病聲之候也不盈
旬月禍必至矣陰陽之疾經絡之源究尋其病取其所
理然後行治萬無遺一也
黃為脾脾合肉黃如鮑腹者吉脾主口脣脣是脾之餘
其人土形相比於上宮黃色大頭圓面美肩背大腹好
股脛小手足多肉上下相稱行安地舉足心平好利人
不喜權勢喜附人耐秋冬不耐春夏春夏感而生病主
足太陰敦敦然脾應月月有虧盈脾小大隨人脣大小
上脣厚下脣薄無脣斷脣缺破此人脾不正揭聳脣者
則脾高高則實實則熱熱則季脇痛滿脣垂而大不堅

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

者則脾下下則虛虛則危危則寒寒則身重不能行步脣堅者則脾堅堅則臟安安則不病脣上下好者則脾端正端正則脾胃和利人無病脣偏舉者則脾偏痛好脹凡人分部中陷起者必有病生胃陽明為脾之部而蔵氣通於內外部亦隨而應之沈濁為內浮清為外若表病外入所部則起起則前瀉陽後補陰若裏病內出所部則陷陷則前治陰後治陽陽則實熱陰則虛寒寒主外熱主內凡人死生休否則蔵神前變形于外人脾前病脣則焦枯無潤若脾前死脣則乾青白漸縮急齒噤不開若天中等分墓色應之必死不治看色厚薄決判賒促賒則不盈四百日內促則旬朔之間脾病少愈而卒死何以知之曰青黑如拇指黵點見顏頰上此必卒死脾絶十二日死何以知之口冷足腫腹熱臚脹泄利不覺其出時一日五日死面青目黃者五日死病人著牀心痛氣短脾竭內傷百日復愈欲起徬徨因坐於地其亡倚牀能治此者可謂神良又面黃目赤不死黃如枳

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:24
列印頁數：928
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

實死吉凶之色在於分部霍霍而見黑黃入脣必病不出其年 其穴在鼽上當兩眼是其分部位也若年上不應三年之內禍必應也

季夏土脾脉色黃主足太陰脉也其脉本在中封前上四寸之中應在背輸與舌本中封在內踝前一寸大筋白在足大指端內側是也

裏宛宛中脉本從中封上四寸是也其脉根于隱白隱白在足大指之端內側上結於內踝其直者上結其筋起於足大指之端內側上結於內踝其直者上結於膝內輔骨上循陰股結於髀聚於陰器上腹結於臍循腹裏結於脇散於胷中其內者著于脊

其脉起於足大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前廉上腨內循脛骨後交出厥陰之前上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中合足陽明為表裏陽明之本

在厲兌足趺上大指間上三寸骨解中也同會于手太陰

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

其足太陰之別名曰公孫去本節後一寸別走陽明其別者入絡腸胃主脾生病實則胃熱熱則腹中切痛痛則陽病陽脉反大於寸口三倍病則舌强筋轉卵縮牽陰股引髀痛腹脹身重食飲不下煩心心下急注脾脾病虛則胃寒寒則腹中鼓脹脹則陰病陰脉反小於寸口一倍病則泄水不能臥而煩强立股膝内痛苦筋折紐之紐之者脉時緩緩動也發動甚者死不治

四季之月各餘十八日此為四季之餘日主脾胃黄肉隨病也一作内陽病其源從太陰陽明相格節氣相移三焦寒濕不調四時關格而起則臟腑傷痏隨時受癘陽氣外泄陰氣内伏其病相反若腑虛則陰邪所加頭重頸直皮肉强癖若臟實則陽疫所傷蘊而結核起於喉頸之側布毒熱於皮膚分肉之中上散入髮際下貫顳顬隱隱而熱不相斷離故曰黄肉隨病也

扁鵲曰灸肝脾二輸主治丹毒四時隨病當依源補瀉虛實之痏皮肉隨熱則須鎌破薄貼方呪促治疾無逃

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:25
列印頁數：930
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

矣

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷四十七 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

脾臟方

脾虛實第二 方論 脉 灸法

脾實熱

右手關上脉陰實者足太陰經也病苦足寒脛熱腹脹滿煩擾不得臥名曰脾實熱也

欽定四庫全書

備急千金要方

瀉熱湯治舌本强直或夢歌樂而體重不能行方

前胡 茯苓 龍膽 細辛

芒硝 各二兩 杏仁 四兩 玄參 大青 各二兩

苦竹葉 一升 切

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服食後服

治脾熱面黄目赤季脇痛滿方

半夏 母薑 各八兩 枳實 梔子

茯苓 芒硝 各三兩 細辛 五兩 白朮

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:26
列印頁數：932
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杏仁 各四兩 生地黃 淡竹葉 各一升切

右十一味㕮咀以水九升煮取三升去滓下芒硝分三服

治脾橫方

若赤黑發如瓜大煎羊脂摩之

又方末赤小豆和雞子白傅之

四肢寒熱腰疼不得俛仰身黃腹滿食嘔舌根直灸第十一椎上及左右各一寸五分三處各七壯

脾胃俱實

右手關上脉陰陽俱實者足太陰與陽明經俱實也病苦脾脹腹堅搶脇下痛胃氣不轉大便難時反泄利腹中痛上衝肺肝動五臟立喘鳴多驚身熱汗不出喉痺精少名曰脾胃俱實也

瀉熱方

大黃 麻黃 黃芩 各四兩 杏仁 赤茯苓 甘草 橘皮 芒硝

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:26
列印頁數：933
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

澤瀉 各三兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升絞去滓内大黄煮兩沸去滓下芒硝分三服

大黄瀉熱湯治脾脉厥逆大腹中熱切痛舌强腹脹身重食不下心注脾急痛方

大黄 細切水一升半別漬一宿 二兩

甘草 各三兩

澤瀉

芒硝 各二兩

細辛

茯苓

黄芩

橘皮 二兩

治脾熱脇痛熱滿不歇目赤不止口脣乾裂方

淡竹葉 切五升

石膏 一斤碎

生地黄 汁

赤蜜 各一升

右八味㕮咀以水七升煮取三升三合去滓下大黄更煎兩沸去滓下芒硝分三服

右四味先以水一斗二升煮竹葉取七升去滓澄清煮石膏取一升五合去滓下地黄汁兩沸次下蜜煎取三升細細服之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治脾熱偏一邊痛胷滿脇偏脹方

茯苓 橘皮 澤瀉 各三兩 芍藥

白朮 各四兩 人參 桂心 各二兩 石膏 八兩

半夏 六兩 生薑 切一升 桑根白皮 一升

右十一味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服若須利下加芒硝二兩佳

脾虛冷

右手關上脉陰虛者足太陰經也病苦泄注腹滿氣逆

霍亂嘔吐黃癉心煩不得臥腸鳴名曰脾虛冷也

治虛脹脇痛肩急有時發作悉補之方

五加根皮 丹參 橘皮 各一斤 地骨皮

乾薑 白朮 各八兩 猪椒根皮 二斤 乾地黃

芎藭 附子 各五兩 桂心 桔梗 各四兩

大棗 五十枚 甘草 三兩

右十四味㕮咀以酒四斗漬五七日服七八合加至一升日再服

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:27
列印頁數：935
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

檳榔散治脾寒飲食不消勞倦氣脹噫滿憂恚不樂方

檳榔 八枚皮子並用 人參 厚朴 麥蘗 茯苓 陳麴 皮一兩半

右八味治下篩食後酒服二方寸匕日再一方用橘

温脾圓治从病虚羸脾氣弱食不消喜噫方

黄蘗 大麥蘗 吳茱萸 桂心 乾薑 細辛 附子 當歸 大黄 麴 黄連 各一兩

右十一味為末蜜丸如梧子每服十五丸空腹酒服日三

麻豆散主脾氣弱不下食餌此以當食方

大豆黄二升 大麻子三升 熬令香

右二味治下篩飲和服一合日四五任情多少

脾胃俱虚

右手關上脉陰陽俱虚者足太陰與陽明經俱虚也病

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

苦胃中如空狀少氣不足以息四逆寒泄注不已名曰脾胃俱虛也

治腹脹善噫食則欲嘔泄澼溏下口乾四肢重好怒不欲聞人聲忘誤喉痺補之方

黃連 一兩　禹餘糧 二兩　白术 二兩　乾薑 各三兩

大麻子 五兩　桑白皮 八兩　大棗 二十枚

右七味咬咀以水一斗二升煮取三升分四服

治脾胃俱虛苦飢寒痛方

人參 當歸 桔梗 芎藭 各二兩　橘皮 吳茱萸 各二兩　白术 五兩　麥蘗 一升

桔梗 芎藭 各二兩　厚朴 三兩　桂心 甘草 茯苓

右十二味咬咀以水一斗二升煮取三升分三服

白术散治脾胃俱虛冷方

白术 厚朴 人參 吳茱萸

茯苓 麥蘗 麴 芎藭 各三兩

右八味篩酒服方寸匕食後服日三一方加大腹橘

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:28
列印頁數：937
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

皮

平胃圓凡身重不得食食無味心下虛滿時時欲下喜臥者皆針胃管太倉服建中湯及服此方 建中湯方見別卷

杏仁 五十枚
丹參 三兩
玄參 各二兩
苓蘑
桂心 各一兩
苦參
葶藶

右七味為末蜜丸如梧子酒服五丸日三以知為度

又方治丈夫小兒食實不消胃氣不調或温壯熱結大小便不利者有病冷者服露宿丸熱藥後當進此丸調胃方

大黄 二兩
小草
甘草
芍藥

芎藭
葶藶 各一兩
杏仁 五十枚

右七味為末蜜丸飲服如梧子五丸日三一歲小兒二丸漸加之 千金翼有葛蒲當歸乾薑茯苓麥門冬細辛為十三味無杏仁

論曰凡病宿食在上管當吐之脉數而滑者實也有宿食不消下之愈胃中有澼食冷物即痛不能食有熱物即欲食大腹有宿食寒慄發熱如瘧狀宿食在小腹者

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當暮發熱明旦復止寸脉緊即頭痛風寒或腹中宿食不化寸口脉緊者如轉索左右無常脾胃中有宿食不消寸口脉浮而大按之反澀尺中微而澀故知宿食大麴蘗丸主消穀斷下温和又寒冷者長服不患霍亂方

大麥蘗 麴 各一升 附子 乾薑

當歸 人參 各三兩 赤石脂 一兩 桔梗

女萎 各二兩 吳茱萸 皂莢 各五兩 蜀椒 二兩半 烏梅 五十枚

右十三味為末蜜酢中半漬梅一宿蒸三斗米下去核擣如泥和藥蜜和擣三千杵服十丸日三下甚者加龍骨阿膠艾各三兩

消食斷下圓寒冷者常服之方

麴 大麥蘗 各一升 吳茱萸 四兩

右三味為末蜜和服十五丸如梧子大日三

乾薑散治不能食心意冥然忘食方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾薑　法麴　蜀椒　豉　大麥蘗　各一升

右五味合治下篩日後服三方寸匕日三以能食為度

消食圓治數年不能食方

小麥蘗　麴　各一升　乾薑　烏梅　各四兩

右四味為末蜜和服十五丸日再加至四十丸寒在胷中及反胃飜心者皆瘥

麴蘗散主消穀能食除腸中水氣臚脹方

法麴　麥蘗　杏仁　各五兩

右三味治下篩食後酒服一合日三

脾勞第三論　方

論曰凡脾勞病者補肺氣以益之肺旺則感於脾是以聖人春夏養陽氣秋冬養陰氣以順其根本矣肝心為陽脾肺腎為陰逆其根則伐其本陰陽四時者萬物之終始也

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:29
列印頁數：940
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏湯治脾勞實四肢不用五臟乖反脹滿肩息氣急不安承氣泄實熱方

半夏 宿薑 各八兩 茯苓 白朮 各三兩 杏仁 三十枚 大棗 二十枚 竹葉 一切升 橘皮 各四兩 芍藥 各四兩

右九味㕮咀以水一斗煮取三升分四服

消食膏酒治脾虛寒勞損氣脹噫滿食不下通噫方

猪膏 三升 宿薑 汁五升 吳茱萸 一升 白朮 一斤

右四味擣茱萸白朮等二味細細下篩為散內薑汁膏中煎取六升温清酒一升進方寸匕日再

論曰凡肉極者主脾也脾應肉肉與脾合若脾病則肉變色又曰至陰遇病為肌痺肌痺不已復感於邪內舍於脾體癢淫淫如鼠走其人身上津液脫腠理開汗大泄鼻端色黄是其相也凡風氣蘊於皮膚肉色則敗以季夏戊巳日傷於風為脾風脾風之狀多汗陰動傷寒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寒則虛虛則體重怠惰四肢不欲舉不嗜飲食食則欬欬則右脇下痛陰陰引肩背不可以動轉名曰厲風裹虛外實若陽動傷熱熱則實實則人身上如鼠走脣口壞皮膚色變身體津液脫腠理開汗大泄名曰惡風而虛則補之能治其病者風始入肉皮毛肌膚筋脉之間即須決之若入六腑五臟則半死矣須決其綱紀知其終始陰陽動靜肉之虛實實則瀉之扁鵲曰肉絶不治五日死何以知之皮膚不通外不得泄凡肉應足太陰太陰氣絶則脉不營其肌肉脣反者氣盡則肉先死使良妙藥終不治也

治肉熱極肌瘅淫淫如鼠走身上津液脫腠理開汗大泄為瘅風風氣蘊於皮膚肉色敗鼻見黄色麻黄止汗通肉

解風瘅湯方

白朮 各三兩	麻黄	防己 一作防風	枳實
生薑	附子 各四兩	甘草	細辛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桂心 各二兩
石膏 八兩
右十味㕮咀以水九升煮麻黃去沫下諸藥煮取三升分三服
續命湯治肉極虛熱肌瘁淫淫如鼠走身上津液開泄或瘁不仁四肢急痛方
麻黃 生薑 各三兩
當歸 石膏 各二兩
芎藭 桂心 各一兩
甘草 黃芩 各一兩
防風 芍藥 各一兩
杏仁 四十枚
右十一味㕮咀以水九升先煮麻黃除沫下諸藥煮取三升去滓分四服日再
越婢湯治肉極熱則身體津液脫腠理開汗大泄厲風氣下焦脚弱 方見別卷
石南散治肉熱極則體上如鼠走或如風瘁脣口壞皮膚色變主諸風大病方
石南 三十銖
藷蕷 芍藥 一本作甘草 天雄 桃花 一作桃仁 甘菊花 各一兩
黃耆 十八銖

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

山茱萸 一兩十八銖
升麻 萎蕤 各一兩半
真珠 十八銖
石膏 二兩
右十二味治下篩酒下方寸匕日再食後服
大黃耆酒治肉極虛寒為癉風陰動傷寒體重怠惰四肢不欲舉關節疼痛不嗜飲食虛極所致方
黃耆 桂心 巴戟天 石斛
澤瀉 茯苓 栢子仁 乾薑
蜀椒 各三兩 防風 獨活 人參 各二兩
天雄 芍藥 附子 烏頭
茵芋 栝蔞根 山茱萸 半夏
細辛 白朮 黃芩 各一兩
右二十三味咬咀絹袋貯以清酒三斗漬之秋冬七日春夏三日初服三合漸漸加微癉為度日再
治肉極虛寒卒中風口噤不能言四肢緩縱偏攣急痛注五臟恍惚喜怒無常手脚不隨方
獨活 茵芋 黃芩 各三兩 甘草

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

防風　芍藥　麻黄
葛根各二兩　人參一兩　烏頭三枚
右十一味咬咀以水一斗竹瀝四升合煮取四升分
四服日三夜一

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:31
列印頁數：945
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書 子部

備急千金要方卷四十八至五十

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官庶吉士臣嚴福

謄錄監生臣陳振興

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷四十八　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

脾臟方

肉虛實第五　方論

論曰夫肉虛者坐不安席身危變動肉實者坐安不動喘氣肉虛實之應主於脾若其腑臟有病從肉生熱則應臟寒則應腑

五加酒治肉虛坐不安席好動主脾病寒氣所傷方

五加皮　枸杞皮　各二升　乾地黃　丹參　各八兩　石膏　一方作石床　一斤　各一　杜仲　各四兩　乾薑　四兩　附子　三兩

右八味㕮咀以清酒二斗漬三宿一服七合日再

半夏湯治肉實坐安席不能動作喘氣主脾病熱氣所加關格除喘方

橘皮　各四兩　半夏　宿薑　各八兩　麻黃　一兩　杏仁　五兩　石膏　七兩　細辛　二兩　射干　二兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右八味咬咀以水九升煮取三升分三服須利下加芒硝三兩

閉澀第六 論灸法方

論曰有人因時疾瘥後得閉塞不通遂致天命大不可輕之所以備述雖非死病凡人不明藥餌者拱手待斃深可痛哉單複諸方以虞倉卒耳凡大便不通皆用滑膩之物及冷水並通也凡候面黃者即知大便難

麻子仁圓趺陽脉浮而澀浮則胃氣强澀則小便數浮澀相搏大便則堅其脾為約脾約者其人大便堅小便利而不渴也

麻子仁 二升 枳實 芍藥 各八兩 杏仁 一升

大黃 厚朴 各一斤

右六味為末蜜丸如梧子飲服五丸日三漸加至十

丸 肘後外臺無杏仁

治關格大便不通方

芒硝 烏梅 桑白皮 各五兩 芍藥

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:33
列印頁數：948
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杏仁 各四兩 麻仁 三兩 大黃 八兩

右七味㕮咀以水七升煮取三升分三服一本無烏

梅加枳實乾地黃各二兩

治大便閉塞不通神方

猪羊膽無在以筒灌三合許令深入即出矣出不盡

須臾更灌一方加冬葵子汁和之亦妙又椒豉湯五

升和猪膏三合灌之佳臨時易可得即用之又煎蜜

成煎如人指大深内穀道佳又無灰濃酒半升鹽三

錢匕鍊成如上法

三黃湯治下焦熱結不得大便方

大黃 三兩 黃芩 二兩 梔子 二十枚 甘草 一兩

右四味㕮咀以水五升煮取一升八合分三服若大

閉加芒硝二兩

五柔圓治閉澀及虛損不足飲食不生肌膚三焦不調

和榮衛利腑臟補三焦方

大黃 一升蒸三斗米下 前胡 二兩 半夏

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蒞蓉　芍藥
蓼蘆　細辛　各一兩
右九味為末蜜和合擣萬杵為丸梧子大食後服十之緩中不如意便服之又有黃芩一兩
五丸後稍增之日再（崔氏云令人喜飯消穀益氣有憂者加松實半兩菴茼半兩服）
大五柔圓主臟氣不調大便難通和榮衛利九竅消穀益氣方
大黃　芍藥　枳實　蒞蓉
蓼蘆　甘草　黃芩　牛膝　各二兩
桃仁　一百枚　杏仁　四十枚
右十味為末蜜和丸如梧子一服三丸日三加至二十丸酒下
濡臟湯主大便不通六七日腹中有燥屎寒熱煩迫短氣汗出脹滿方
生葛根　豬膏　各二升　大黃　一兩
右三味�mis咀以水七升煮取五升去滓内膏煎取三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

升澄清强人頓服贏人再服亦治大小便不通

治大便不通方

大戟一斤　大豆五升　商陸　牛膝各三斤

右四味㕮咀以水五升煮取二升以大豆五升煮熟冷灌下部中一食頃即通

又方蜜和胡薰屎内大孔中即通

又方水四升蜜一升合煮取二升以大豆五升煎令汁盡至豆乾初服三枚以通為度

又方蜜和胡薰屎内大孔中即通

又方鹽半合蜜三合合煎如錫出之著冷水中丸如檳榔形如指許大深内下部中一食頃即通

又方以醬清漬烏梅灌下部中立通

單用豉清醬清羊酪土瓜根汁灌之立通

治大便難方

又方桑根白皮　榆根白皮各一把

右二味㕮咀以水三升煮取一升半分三服

又方桃皮三升水五升煮取一升頓服

又方水一升煮羊蹄根一把取半升頓服

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:34
列印頁數：951
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方常煮麻子取汁飲

又方常服蜜煎五合

又方猪脂和陳葵子末為丸如梧子每服十丸通即止

又方水服桃花方寸匕無桃花白皮亦得

又方常服車前子及葉並良

又方濤葵根汁生服

又方好膠三寸 葱白一把

右二味以水四升煮取一升半頓服之即下

又方葵子 牛酥各一升猪脂用亦得

右二味以水四升煮葵子取一升内酥煮一沸待冷

又方葵子汁和乳汁等分服之立出

分作二服

又方醬清三升 麻油二升 葱白三寸

右三味合煮令黑去滓待冷頓服之一方不用醬清

芒硝圓治脹滿不通方

芒硝 芍藥各一兩半 杏仁 大黄各二兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃芩 一兩 六銖

右五味為末蜜丸如梧子飲服十五丸加至二十丸

取通利為度日三

又方

通草 朴硝 各四兩

瞿麥 各三兩 車前子 五合 一方六兩一方二升

右六味㕮咀以水八升煮取二升半分三服一方用絹袋盛煮頓服二升

又方獨頭蒜燒熟去皮綿裹内下部中氣立通又削薑

一鹽導之及乾薑鹽杏仁搗丸導之並佳

治脹滿閉不下方

吳茱萸 一升 乾薑 大黃 當歸

桂心 芍藥 甘草 芎藭 各二兩

人參 細辛 各一兩 桃白皮 一把 真珠 半兩

雄黃 十八銖

右十三味㕮咀以水一斗煮取三升去滓内雄黃真

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

珠末酒一升微火煮三沸服一升得下即止

走馬湯主一切卒中惡心痛腹脹大便不通 方見心腹痛篇

巴豆圓主寒癖宿食久飲飽不消大閉不通

巴豆仁一升清酒五升煮三日三夕碎大熟合酒微火煎令可丸如胡豆欲取吐下者服二丸

練中圓主宿食不消大便難方 肘後名承氣丸

大黃八兩 蓼蘆 杏仁 芒硝各四兩

右四味為末蜜丸如梧子大食後服七丸日三後稍加

灸法

大便難灸第七椎兩傍各一寸七壯 又灸承筋二穴各三壯在腨中央陷內

大便不通灸俠玉泉相去各二寸名曰腸遺隨年壯 一云二十半 又灸大敦四壯在足大指聚毛中

大便閉塞氣結心堅滿灸石門百壯

後閉不通灸足大都隨年壯

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:35
列印頁數：954
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治老人小兒大便失禁灸兩脚大指去甲一寸三壯
又灸大指奇間各三壯
治大小便不通方
葵子 末 一升 青竹葉 一把
右二味以水二升煮五沸頓服
又方葵子 一升 榆皮 切 一升
右二味以水五升煮取二升分三服
又方葵子一升以水三升煮取一升去滓内猪脂一升
又方猪脂一斤以水二升煮三沸飲汗立通
治大小便不利方
葵子 二升 消石 二兩
右二味以水五升煮取二升分二服
治小兒大小便不通方
擣白花胡葵子末煮汁服之

空心分二服
又方甑帶煮取汁和蒲黄方寸匕日三服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方末雞屎白服一錢匕

灸法

大小便不利欲作腹痛灸榮衛四穴百壯穴在背脊四面各一寸

腹熱閉時大小便難腰痛連胷灸圍岡百壯穴在小腸輸下二寸横三間甘灸之

大小便不通灸臍下一寸三壯　又灸横文百壯

大小便不利灸八窌 音邊 百壯穴在腰目下三寸俠脊相去可三寸合臍傍一寸五壯

去四寸兩邊各四穴計八穴故名八窌

小兒大小便不通灸口兩吻各一壯

小便不利大便數注灸屈骨端五十壯

小便不利大便注泄灸天樞百壯穴在俠臍相去三寸

皚皚之舍不可針大法在臍傍一寸合臍相去可三寸也

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:36
列印頁數：956
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不瘥其温脾湯建脾丸方出下冷病篇久下得之焉能不愈大凡痢有四種謂冷熱疳蟲冷則白熱則赤疳則赤白相雜無復節度多睡眼澁蟲則純痢瘀血熱則多益黄連去其乾薑冷則加以熱藥疳則以藥吹灌下部蟲毒則以蟲法治之藥既主對相當痢者復自勉勵服餌焉有不愈者也

凡服止痢藥初服皆劇愚人不解即止其藥不服此特不可但使藥與病源的相主對雖劇但服不過再三服漸漸自知惟非其主對者本勿服也

凡痢病通忌生冷酢滑猪雞魚油乳酪酥乾脯醬粉鹹所食諸食皆須大熟爛為佳亦不得傷飽此將息之大經也若將息失所聖人不救也

下利脉滑而數有宿食當下之

下利脉遲而滑者實也利為未止急下之

下利脉反滑當有所去下乃愈

下利不欲食者有宿食當下之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下利而腹痛滿為寒實當下之
下利腹中堅者當下之
下利而讝語者腹内有燥屎宜下之
下利三部皆平（一作浮）按其心下堅者急下之
下利已瘥至其年月日時復發者此為下不盡更下之
愈風寒下者不可下下之後心下堅痛脉遲（一作浮）此為
寒但當温之脉沈緊下之亦然脉大浮弦下之當已下
利脉浮大此為虚以强下之故也設脉浮革者因爾腸
鳴當温之
下利脉遲緊為痛未欲止當温之得冷者滿而便腸垢
下利身軀疼痛急救裏諸温之屬可與理中四逆附子
湯熱藥輩
下利大孔痛者當温暖之
下利腹脹滿身體疼痛者先温其裏乃攻其表
下利清穀不可攻其表汗出必脹滿
下利氣者當利其小便

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下利脉反浮數尺中自濇其人必清膿血
下利脉數而渴者令自愈設不瘥必清膿血有熱故也
下利脉沈弦者下重其脉大者為未止脉微弱數者為
欲自止雖發熱不死
下利脉沈而遲其人面少赤身有微熱
戴陽下虚故也
下利清穀必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者面
下利有微熱而渴脉弱者令自愈
下利脉素有微熱汗出令自愈設脉緊為未解
下利脉反弦發熱身汗者自愈
下利脉大浮弦下當已
下利舌黄燥而不渴胷中實下不止者死
下利後脉絶手足厥冷晝夜時脉還手足温者生不還不
温者死
下利手足厥冷無脉者灸之不温若脉不還反微喘者
死少陰負趺陽者為順

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凡六腑氣絶於外者手足寒上氣脚縮五臟氣絶於内者下不自禁下甚者手足不仁也細尋取之萬不失一

下病體略例如此耳

素問曰春傷於風夏為膿血凡下多滯下也夏傷於風秋必洞泄秋多下水也患是冷也夫積冷積熱及水穀實而下者以大黄湯下之强人勿過兩劑皆消息五六日更進一劑其補澀湯不效者三兩日可進一劑

陟釐圓治百病下痢及傷寒身熱頭痛目赤四肢煩疼不解協熱下痢或醫已吐下之腹内虚煩欲得冷飲飲便不利氣滿嘔逆下痢不能消腹中急痛溫食則吐乍熱乍冷狀如温瘧或小

漢中木防己 六兩

三歲醇苦酒 升五

上好豉 三升

水中陟釐 五兩

紫石英 三兩

厚朴 一兩

隴西當歸 四兩

黄連 二兩

右八味皆取真新者以苦酒二升漬防己極令潤出之留苦酒置以利刀切防己厚令一分使厚薄悉等

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以板瓦覆著炭火上以厚紙藉瓦上布成切防己著紙上訖從頭依次反周而復始令色槁燥復漬向餘苦酒中更出著瓦上熬之如此盡苦酒止勿令火猛徐徐熬令極燥各擣下篩畢都合擣千杵以餘三升苦酒漬豉一宿明旦以瓦盆盛之以一盆覆之蒸五升土下須土氣通流熟出之於盆中研豉以新布絞取濃汁如棗膏法以和藥擣三千杵頓為丸皆如水中雞頭子大分著數囊中懸令陰乾取燥及更盛著服之初服寧少食當餔食水飧欲服藥若食飲消腹平旦以井花水服一劑晝服一劑暮服一劑皆以水亟以蠟蜜封其際勿令見風塵此藥以三丸為一劑

中調和者日可一服若已瘥者二三日可一服消息以意若病重藥力未行者但益服之日可四五劑或時下不止者當復更增令腹中有藥力飲食消是其效也新服藥未安調當水飧助藥力心中了然然後可作羹臛但當冷食之耳若有時不喜冷食者正是

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

藥力盡耳復益服藥至一宿許則復欲進冷也若欲不復藥者但稍温食藥力自盡矣服藥不必强多飲水也自隨體調耳久下虚服之如法禁熱食生魚猪肉蒜生菜酒緣酒發藥力令病者煩熱也又禁辛物及諸肥膩難消物皆勿食也若有風病加防風一兩人虚羸可加石斛一兩若宿有下利腸胃損弱者可加太一餘糧二兩半取石中黄軟香者若婦人産後疾加石硫黄二兩小便黄赤不利加蒲黄一兩依方消息之無不得效也胡洽云舊有五石赤石脂白石英鍾乳礬石并禹餘糧各四兩

常以二月合之

烏梅一斤 升 黄連一斤 色者

下痢熱諸治不瘥方

右二味為末蜜和服如梧子二十丸日三夜二神妙

治積久二三十年常下痢神方

赤松皮去上蒼皮切一斗為散麪粥和一升服之日三服瘥不過服一斗永瘥三十年痢服之百日瘥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

苦參橘皮圓治熱毒痢方

苦參　橘皮　獨活　阿膠

藍青　黃連　鬼白一作鬼箭羽　黃蘗

甘草

右九味等分為末以蜜烊膠和併手丸之如梧子候乾飲服十丸日三後稍加卒下注痢者大良

治諸熱毒下黃汁赤如爛血滯如魚腦腹痛壯熱方

黃蘗　黃芩　升麻

欽定四庫全書

石榴皮各六分　艾葉三分

備急千金要方

當歸　牡蠣　犀角　甘草各一兩

黃連二兩

右十二味咬咀以水六升煮取三升分三服

龍骨圓治下血痢腹痛方

龍骨　龍膽　羚羊角　當歸

附子　乾薑　黃連各三十銖　赤石脂

礬石各一兩半　犀角　甘草　熟艾各十八銖

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十二味為末蜜和丸如小豆先食服十五丸日三
加至二十丸
又方
牛角鰓　當歸　龍骨　乾薑
熟艾 各三兩　附子　黃蘗　赤石脂
芎藭　阿膠　厚朴　甘草
橘皮　石榴皮 二兩　芍藥 各二兩　大棗二十枚
黃連 五合　升麻 一兩半　蜀椒一兩
治血痢方
蒲黃 三合　乾地黃　桑耳　甘草
橘皮
角鰓末阿膠消以綿絞去滓分七服日四夜三 千金翼無
右十九味咬咀以水一斗三升煮取四升去滓内牛
黃連 一兩　赤石脂 五分
阿膠　艾葉　生薑 各二兩　禹餘糧
芒硝　茯苓　人參　栢葉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十四味咬咀以水一斗煮取四升分五服温神效
治下雜血方
乾薑 犀角 地榆 各二兩 蜜二合
右四味咬咀以水五升煮取一升半去滓下蜜煎取
五合分三服此治熱毒蠱妙
治熱毒下黑血五内絞切痛日夜百行氣絶欲死方
黄連一升 龍骨 乾薑 當歸 赤石脂 各三兩 附子一兩 白朮 各二兩 阿膠
右八味咬咀以水一斗煮取五升分五服余以貞觀
三年七月十二日忽得此熱毒痢至十五日命將欲
絶處此方藥入口即定
治下血日夜七八十行方
黄連 黄蘗 各半兩 槀
右二味咬咀淳酢三升煮取一升半分再服
白頭翁湯治赤滯下血連月不瘥方
白頭翁 厚朴 阿膠 黄連

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

秦皮　附子　黄蘗　茯苓
芍藥各二兩　乾薑　當歸　赤石脂
甘草各三兩　龍骨各三兩　大棗三十枚　粳米一升

右十六味咬咀以水一斗二升先煮米令熟出米内藥煮取三升分四服

治下赤連年方

地榆　鼠尾草各一升

右二味咬咀以水二升煮取一升分二服如不止取

又方

秦皮如無用槲皮代之　鼠尾草　薔薇根

屋塵水漬去滓一升分二服古今録驗方云服屋塵汁一小盃

右三味等分咬咀以水淹煎去滓銅器重釜煎成丸如梧子大服五六丸日三稍增瘥止亦可濃汁服半升

治大熱毒純血痢不可瘥者方

黄連六兩咬咀以水七升煮取二升半夜露著星月

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下旦起空腹頓服之臥將息即止不瘥加黃芩二兩更作服之仍不瘥者以疳痢法治之

治熱痢水穀方

黃連 阿膠 各二兩 黃蘗一兩 烏梅四十枚 梔子三十枚

右五味㕮咀以水五升煮取二升半分三服亦治蠱神良

治下痢絞痛腸滑不可瘥方

乾薑 各三兩 黃連六兩 阿膠 鼠尾草 當歸

右五味㕮咀若大冷白多以清酒一斗煮取三升分三服若熱及不痛者去乾薑當歸以水煮之

茯苓湯治困下空竭欲死滯下膿血日數十行羸篤垂死老少並宜服方

人參 乾薑 茯苓 黃蘗 黃連 龍骨 黃芩 桂心

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芍藥 當歸 梔子仁 甘草 各半兩
赤石脂 一兩 大棗 十二枚
右十四味㕮咀以水五升煮取二升分再服不瘥滿三劑此方主風虛冷痢最佳
治冷熱不調或水或膿或五色血者方
酢石榴五枚合殼子擣絞取二升汁服五合瘥止
溫脾湯治下久赤白連年不止及霍亂脾胃冷實不消

方

附子 一枚大者 大黃 四兩 人參 甘草 乾薑 各二兩
右五味㕮咀以水八升煮取二升半分三服臨熟下大黃與後溫脾湯小異須大轉瀉者當用此方神效
黃連湯治赤白痢方
黃連 黃蘗 乾薑 石榴皮 阿膠 各三兩 當歸 二兩 甘草 一兩
右七味㕮咀以水七升煮取三升分三服

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:42
列印頁數：969
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

女萎圓治熱病時氣下赤白痢遂成蠶方 亦名雲實丸
女萎 藜蘆 各三分
黃連 雲實 各二分
烏頭 代赭 各一分
桂心 各四分
右七味為末蜜丸如梧子大服二丸大下痢宿勿食
清旦以冷水服之勿飲食至日中過後乃飲食若得
藥力明旦更服如前亦可長服虛羸晝夜百行膿血
聖湯治下赤白痢大孔蟲生悉皆瘥方
鼠尾草 二兩
豉 一升
桅子仁 生薑 各六兩
桃皮 一握
右五味咬咀以水七升煮取二升半分三服一本單
用桃皮以酒煮服之
治赤白滯下方
清酒 五合
成煎豬膏 三合
右二味緩火煎十沸適寒溫頓服之取瘥止
又方酒四升煮錢四十文取二升分三服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方亂髮雞子大燒末水服不過三服

灸法

泄痢食不消不作肌膚灸脾輸隨年壯

泄注五痢便膿血重下腹痛灸小腸輸百壯

泄痢久下失氣勞冷灸下腰百壯三報穴在八魁正中央脊骨上灸數多尤佳三宗骨是忌針

泄痢不禁小腹絞痛灸丹田百壯三報穴在臍下二寸

泄痢不嗜食雖食不消灸長谷五十壯三報穴在俠臍相去五寸一名循際

泄痢赤白漏灸足太陰五十壯三報

久泄痢百治不瘥灸足陽明下一寸高骨上陷中去大指歧三寸隨年壯

又屈竹量正當兩胯脊上點訖下量一寸點兩傍各一寸復下量一寸當脊上合三處一灸三十壯灸百壯以上下切痢皆斷亦治濕癘冷脊上當胯點處不灸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又灸臍中稍稍二三百壯
又灸關元三百壯十日灸并治冷痢腹痛在臍下三寸
赤白下灸窮骨以灸數多為佳

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:43
列印頁數：972
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷五十　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

脾臟方

冷痢第八　論方

論曰舊治痢於貴勝用建脾丸多效今治積久冷痢先以温脾湯下訖後以建脾丸補之未有不效者貧家難以克辦亦無可將息也

温脾湯治積久冷熱赤白痢者方

大黄　桂心　各三兩　附子　乾薑

人參　各二兩

右五味㕮咀以水七升煮取二升半分三服與前温脾湯小異

建脾圓治虛勞羸瘦身體重脾胃冷飲食不消雷鳴腹脹泄痢不止方

鍾乳粉　三兩　赤石脂　好薤　大麥蘗

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:43
列印頁數：973
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當歸　黃連　人參　細辛
龍骨　乾薑　茯苓　石斛
桂心　各二兩　附子　一兩　蜀椒　六兩
右十五味為末白蜜丸如梧子酒服十丸日三加至三十丸弱者飲服此方通治男女（葉驗無細辛龍骨）
增損建脾圓治丈夫虛勞五臟六腑傷敗受冷初作滯下久則變五色赤黑如爛腸極臭穢者方
鍾乳粉　赤石脂　三兩　礬石　一用礬石　乾薑
右二十味為末蜜丸酒服二十丸日三加至四十丸
駐車圓治大冷洞痢腸滑下赤白如魚腦日夜無節度腹痛不可堪忍者方
薤蓉　桂心　石斛　五味子
澤瀉　遠志　寄生　栢子
人參　白頭翁　天雄　當歸
石榴皮　牡蠣　龍骨　甘草　各二兩
此二方止痢神驗

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:43
列印頁數：974
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連 六兩 乾薑 一兩 當歸 阿膠 各三兩

右四味為末以大酢八合烊膠和之併手丸如大豆許候乾大人飲服三十丸小兒百日以還三丸暮年者五丸餘以意加減日三服

大桃花湯治冷白滯痢腹痛方

赤石脂 乾薑 當歸 龍骨 各一兩 牡蠣 各三兩 附子 二兩 白朮 一升 甘草 一兩 人參 半兩 芍藥 各一兩

右十味㕮咀以水一斗二升煮朮取九升内諸藥煮取三升分三服膿者加厚朴二兩嘔者加橘皮三兩

又方

龍骨 六兩 厚朴 當歸 赤石脂 五兩

右四味㕮咀以水七升煮取二升半分三服熱加白

桃花圓治下冷臍下攪痛方

乾薑 赤石脂 各十兩

頭翁二兩半牡蠣三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味蜜丸如豌豆服十丸日三服加至二十丸

倉米湯治小腹冷氣積聚結成冷痢日夜三四十行方

倉粳米 半斤淨淘乾漉 薤白 一握去青切細 羊脂 一升熬

香豉 三升以水一斗煎取五升澄清

右四味先以羊脂煎薤白令黃并米內豉汁中煎取四升旦空腹溫服一升如行十里久更進一升得快利止若利不止更服如前利後進粳米豉粥若復作更服一劑永瘥

附子湯治暴下積日不住及久痢方

附子 一枚 石榴皮 一具 阿膠 二兩 龍骨

甘草 芍藥 乾薑 黃連 各一兩

黃芩 半兩 粳米 三合

右十味㕮咀以水八升煮取三升分三服

治卒下痢湯方

黃連 五兩 生薑 一斤

右二味㕮咀以水五升煮取一升頓服未止更合服

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:44
列印頁數：976
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

必效

治久冷痢下純白者由積臥冷處經久病發遂令脾胃俱冷日夜五六十行大小腹痛不可忍凡白痢屬冷赤痢屬熱方

好麴末五升微熬令香温清醇酒令熱和麴末一升空腹頓服之日三服若至食時禱蒜一升令至熟下薑椒末調和如常食之法惟須稠勿加鹽以水和麴二升作□餅極爛煮之乾漉熱内蒜薑白中相和一頓食之少與餘食至飢時仍準前食麴末酒比至瘥來少食餘食以此法治不過兩日無有不瘥

治久冷或痢不痢間但腰腹患苦冷方

上等新蜀椒三升用醋宿漬之以麴三升和椒一升緊拌煮作粥空腹頓服之加蔥豉鹽任性調和不瘥更作以瘥為限不過三升椒即愈此方不但治冷大治諸虛損冷極有所益久當自知耳

馬藺子圓治積冷痢下白膿方

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:45
列印頁數：977
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

馬藭子 熬一斤 附子 二兩 乾薑 甘草 各二兩半
神麴 麥蘗 阿膠 各五兩 黃連 三兩
蜀椒 五合
右九味為末蜜丸如梧子服二十丸日二以知為度
或作散酒調服方寸匕亦佳
厚朴湯治三十年久痢不止方
厚朴 乾薑 阿膠 各二兩 黃連 五兩
艾葉 石榴皮 各三兩
右六味㕮咀以水七升煮取二升分再服
四續圓治三十年注痢骨立瘦黃腸滑不瘥方 一名蠟丸
雲實 五合熬香 龍骨 三兩 附子 二兩 女萎 各二兩
白朮 二兩半
右五味為末以蠟煎烊用丸藥如梧子大服五丸日
三不過五六服瘥
椒艾圓治三十年下痢所食之物皆不消化或青或黃
四肢沈重起即眩倒骨肉消盡兩足逆冷腹中熱苦筋

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

轉起止須扶陰冷無子方

蜀椒 三百粒

烏梅 二百枚

熟艾 一升

乾薑 三兩

赤石脂 二兩

右五味椒薑艾下篩梅著一斗米下蒸令飯熟去核杵蜜和丸如梧子服十丸日三

內薑椒末合擣三千杵蜜和丸如梧子服十丸日三

下痢圓治數十年痢下氣消穀令人能食夏月長將服

服不瘥加至二十丸加黃連一升

之不霍亂方

大麥蘗 法麴 各一升

烏梅 二升半

附子

乾薑 黃連

黃蘗 桂心 各三兩

桂心 各二兩

吳茱萸 四兩

蜀椒 一兩

黃連

大麥蘗 好麴 各一升

附子 當歸

麴蘗圓治數十年下痢不止消穀下氣補虛贏方

二十丸三食三服亦可至四十丸

右十味為末蜜和丸如梧子食後服十丸日三加至

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:46
列印頁數：979
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

烏梅肉 乾薑 各四兩

右十味為末蜜丸如梧子食後服二十丸日三

烏梅圓治久痢諸藥不瘥數十年者消穀下氣補虛方

烏梅肉 黃連 乾薑

吳茱萸 各四兩 桂心 二兩 當歸 三兩 蜀椒 一兩半

右七味為末蜜丸如梧子食後服十丸日三

又方治冷痢久下方

烏梅 三百枚 乾薑 黃連 各十兩 當歸

蜀椒 各四兩 細辛 附子 桂心

人參 黃蘗 各六兩 乾薑 各一兩 當歸 三兩 龍骨 八分 赤石脂 厚朴 三兩 阿膠 三分

右十味為末以苦酒漬烏梅一宿去核蒸五升米下用麥蘗方

別擣如泥盤中攪令相得蜜和擣二千杵丸如梧子

食前服十丸日三服稍增至二十丸

七味散治痢下久不瘥神驗方

烏梅肉 各二分 甘草 一分 黃連 八分 龍骨

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右治下篩漿水服二方寸匕日二小兒一錢匕

猪肝圓治下痢腸滑飲食及服藥俱完出者方

猪肝 一具 熬乾 黄連 烏梅肉 阿膠 各二兩 胡粉 七巷子

右五味為末蜜丸如梧子酒服二十丸日三亦可散服方寸匕

羊脂煎大治諸久痢不瘥方

羊脂 一巷子 白蠟 兩碁子 黄連 末一升 酢 七合煎取稠

右七味合内銅器中湯上煎之攪可丸飲服如梧子大三十丸日三碁子大小如方寸匕

又方

羊脂 阿膠 各二兩 蠟 二兩 黍米 二升

右四味合煮作粥一服令盡即瘥

治大下後腹中空竭胷中虚滿不下食方

芍藥 甘草 半夏 各一兩 厚朴

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當歸 桂心 各三兩 生薑 五兩

右七味㕮咀以水八升煮取三升分三服服三劑最佳

治下痢心胷滿不快腹中雷鳴或嘔吐方

黃連 五兩 橘皮 生薑 半夏 各三兩 甘草 二兩 龍骨 人參 一兩 大棗 十五枚

右八味㕮咀以水一斗先煮一大沸乃内藥煮取三升分四服并妊娠良斷痢湯治心胷下伏水方

半夏 一升 生薑 五兩 茯苓 甘草 龍骨 各二兩 附子 一兩 人參 黃連 各三兩 大棗 十二枚

右九味㕮咀以水八升煮取三升分三服

香藷湯治下後煩氣暴上方

生藷 一把冬用藷子三兩 香豉 五升

右二味以水五升煮取二升頓服之

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:47
列印頁數：982
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

瀉心湯治卒下大痢熱脣乾口燥嘔逆引飲方

人參 甘草 黃芩 栝蔞根

橘皮 各一兩 黃連 二兩 半夏 三兩 乾薑 一兩半

右八味咬咀以水六升煮取二升分三服 胡洽云治老小利水

穀不化腹中雷鳴心下痞滿乾嘔不安無橘皮栝蔞若寒加附子一枚渴加栝蔞一兩嘔加橘皮一兩痛加當歸一兩仲景用大棗十二枚

成冷下結脉沈細小數方

治夏月暴冷忽壯熱泄痢引飲熱湯下斷變通身浮腫

澤瀉 一兩半 吳茱萸 茯苓 白朮

當歸 桔梗 犀角 青木香

海藻 芍藥 大黃 各二兩

右十一味咬咀以水九升煮取三升分三服下後消息五六日許可與女麴散

女麴散治痢後虛腫水腫者服此藥小便利得止腫亦消

女麴 一升 乾薑 細辛 椒目

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:47
列印頁數：983
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

附子　桂心　各一兩

右六味治下篩酒服方寸匕不知加至二三匕日三

產後虛滿者大良

治卒暴冷下下部疼悶方

燒甎令熱大酢沃之三重布覆坐上即瘥

備急千金要方卷五十

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:48
列印頁數：984
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書 子部

備急千金要方卷五十三 一至

詳校官太醫院醫士臣程 泰

編修臣倉聖脈 覆勘

總校官中書臣朱 鈐

校對官庶吉士臣嚴 福

謄錄監生臣陳振興

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷五十一 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

脾臟方

瘕濕痢第九 方論

論曰凡瘕濕之病皆由暑月多食肥濃油膩取冷眠睡之所得也禮云君子盛暑之月薄滋味無食肥濃煮餅此時以不利人也養生者宜深戒之不爾多患瘕濕痢不覺其治用五月五日蝦蟇角蒿救月木寒食汁淀但得一事單用之燒作灰和蠟月猪脂傳之逐手便瘥極須慎口味耳

凡所患處或著口齗咽喉下部瘕與月蝕並不痛令人耳

凡瘕在慎鹽醬酢酥油麋等一切皆忌惟白飯豉苜蓿苦苣蕪菁不在禁限

凡吹藥入下部沒中指許深即止

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:49
列印頁數：986
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治疳濕下黑醫不能治垂死者方

髑髏灰　熏黃　朱砂　青黛

石鹽　丁香　麝香　礬石

梔子　莨菪子　鐵衣　乾薑

故靴底灰　乾蝦蟇 五月五日 細辛　土瓜根

芥子　蜀椒　葶藶　各等分 菖蒲

右二十味治下篩以竹筒吹杏仁大著大孔中所有患疳瘡上悉傅之其丁香麝香別研濤著藥中合之

一方有寒食泔淀救月木楸葉為二十三味若病大者用灌方如左

麝香　丁香　甘草　犀角 各三分

右四味治下篩合和以鹽三合蜀椒三合豉二合以水二升煮取一升去滓内四味散合和分作二分灌大孔旦一灌酉一灌之凡久下一月不瘥成疳候孔必寬者是以此主之

八物茜根湯凡下血者是蠱也以此主之 方見蠱篇中

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治疳濕久下痢赤白百療不瘥者方

兎頭骨　蛇頭　蒴藋子　故緋（並灰）

葶藶子　狸骨（一作狐骨）　蜣蜋

百草（五月五日收者）　倒掛草　青黛　晚蠶蛾

青礬　丁香　牀中枇木　蠍蟲屎

麝香　苦參　黄蘗　乾薑

角蒿　朱砂　印成鹽　救月木

桂心　鐵衣　芒硝　蝦蟇

黄礬　茬子（各等分）

右二十九味治下篩以筒子内下部吹著日一二度妙

治疳濕不能食身重心熱脚冷百節疼痛方

黄芩　芍藥　苦參　甘草

當歸　蜀椒　甘松（一作泔淀）　青黛

熏黄（各二兩）　豉　東引桃根　蔥白（各一握）

鹽（一合）　麝香（半分）　猪膽（二枚）

右十五味咬咀以水一斗八升煮取四升分為二分一度灌一分湯如人體然後著麝香猪膽一枚即灌灌了作蔥豉粥食之後日更將一分如前灌之七日忌生冷毒物等但是油膩醬乳醋三十日忌之大佳

治疳蝕人諸處但是赤血痢久不瘥立著即瘥祕方

乾蝦蟇 五月五日收者 一枚作灰末 人屎灰 一作髮灰 麝香 一分 金銀土堝 各五兩 銀末 小豆許

右五味治下篩傅瘡上即瘥三七日忌如前痢者吹

下部

治疳痢不止方

苦參 甘草 薰黄 各二兩 豉 一升半 蔥白 五莖 蜀椒 三十粒

右六味以苦參等三物各擣下篩以水五升煮蔥白豉椒取三升以三指撮苦參末等各一撮内汁中冷暖如人體先飲少許豉汁食一口飯乃側臥徐徐灌之訖多時臥不出為佳大急乃出之於淨地當有疳

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

濕蟲如白馬尾狀頭黑是其效也其重者肛大難瘥當取桃枝綿裹頭用前件汁適寒温烙之須近脊一上三十度烙之乃瘥神驗

又方崔氏云晉代之地多三疳蝕人五臟通見脊骨下膿血手足煩疼四肢無力夜臥煩燥不安而失血色肩髀疼面及手足有浮氣或下血乃死治之之方

雄黄 青葙 各二兩 苦參 三兩 礬石 雌黄 鐵衣 藜蘆 各一兩 麝香 二分別研

右八味治下篩以竹管内大孔中酸棗許吹内下部中日一不過三度小兒以大豆許此方極救死

又方

大麻子 胡麻 各一升半

右二物並熬令黄以三升瓦瓶泥表上厚一寸待泥乾内大麻等令滿以四五枚葦管插口中密泥之掘地作竈倒立竈口底著瓦器承之密填竈孔中地平聚炭瓶四面著墼墼之日沒放火燒至明旦開取適

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寒溫灌疳濕者下部中一合尋覺咽中有藥氣者為佳亦不得過多多則傷人隔日一灌重者再三灌之從旦灌至日夕極覺體中乏力勿怪也非但治疳濕凡百異同瘡疥癬並洗塗之

論曰凡日月蝕時忌食飲腹中生蠶蟲及房室生子不具足必患月蝕瘡亦不得與兒乳日月生後乃不忌令人口臭齒斷宣露常有血出舌上生瘡者皆由犯此所致耳日月蝕時須救不救出行逢暴雨其救月杖須收取治蠶之神藥預備患此者施之救療

硫黃　藺茹　斑猫各等分

右三味治下篩傅瘡上乾者以猪脂和傅之日三夜一

又方

地榆根　薔薇根　吳茱萸根

右三味各三兩治下篩以鹽湯洗瘡傅之日三

小兒痢第十方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

温中湯治小兒夏月積冷洗浴過度及乳母亦將冷洗浴以冷乳飲兒兒壯熱忽值暴雨涼加之兒下如水胃虚弱則面青肉冷眼陷乾嘔者宜先與此調其胃氣下即止方

乾薑 厚朴 各一分 當歸 桂心

甘草 各三分 人參 茯苓 白朮

桔梗 各二分

右九味㕮咀以水二升煮取九合六十日至百日兒一服二合半餘皆隨兒大小

温中大黄湯治小兒暴冷水穀下或乳冷下青結不消或冷實吐下乾嘔煩悶及冷滯赤白下者良若已服諸利湯去實胃中虚冷下如水乾嘔眼陷煩擾不宜利者可除大黄若中乳乳母洗浴水氣未消飲兒遂為霍亂者但用大黄小兒諸霍亂宜利者便用大黄不須利宜温和者除之方

大黄 六分 桂心 厚朴 甘草

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:51
列印頁數：992
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾薑 各一分　人參　茯苓　白朮
當歸 各二分　桔梗 三分
右十味以水二升半煮取八合凡兒三十日至六十日一服二合半二百日至一百日一服二合半二百日已來一服三合

黃蘗湯治小兒夏月傷暴寒寒折大熱熱入胃下赤白滯如魚腦壯熱頭痛身熱手足煩此太陽之氣外傷寒使熱氣便入胃服此方良若誤以利藥下之或以温脾湯下之則熱劇以利藥下之便數去赤汁如爛肉者或下之不瘥宜以澀熱藥斷之下既不止倍增壯熱者服之即效或是温病熱盛復遇暴寒折之熱入腹中下血如魚腦者服之良方

黃蘗　黃連　升麻
白頭翁 一作白斂 當歸　牡蠣　石榴皮
黃芩　寄生　甘草 各二分　犀角
艾葉 各一分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十二味咬咀以水三升煮取一升二合百日兒至二百日一服三合二百餘日至眷歲一服三合半治中結腸圓斷冷滯下赤白青色如魚腦脫肛出積日腹痛經時不斷者方

赤石脂 五分 吳茱萸 三分 乾薑 附子

當歸 厚朴 白朮 木蘭皮

白頭翁 黃連 石榴皮 黃蘗 各二分

右十二味為末蜜丸如大豆二歲兒服五丸三歲已上二十丸日三服不知稍加至十丸

欽定四庫全書

上服十丸十歲已上二十丸暴下者服少許便瘥積下者盡一劑更合

梔子圓治少小熱痢不止方

梔子 七枚 大棗 四枚炙黑 黃蘗 三分 黃連 五分

礬石 四分

藜蘆圓治少小泄清痢方

右五味為末蜜丸如小豆大服五丸日三夜二服不

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:52
列印頁數：994
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

藜蘆 二分　黄連 三分　附子 一分

右三味為末蜜丸如麻子大以粥飲服二丸立驗

四物粱米湯治少小泄注方

粱米　稻米　黍米 各三升　蠟如彈丸大

右四味以水五升東向竈煮粱米三沸去滓復以汁煮黍米三沸去滓以蠟内汁中和之蠟消取以飲之數試有驗

煮稻米三沸去滓復以汁煮黍米三沸去滓以蠟内

龍骨湯治少小壯熱渴引飲下痢方

龍骨　甘草　大黄　赤石脂

栝蔞根　石膏　寒水石　桂心 各二兩

右八味治下篩以酒水各五合煮取二合二沸去滓

量兒大小服之

大黄湯治少小下痢若熱不食傷飽不乳方

大黄　甘草　麥門冬 各一兩

右三味咬咀以水二升煮取一升二三歲兒分三四服

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:52
列印頁數：995
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生金牛黃湯治小兒積下不止因發癇方

生金 三銖一方用六銖無生金用熟金亦得法應作屑今方盡成器者 牛黃 三銖

麻黃 二分 黃連 乾薑 人參

甘草 各一分 細辛 半分

右八味㕮咀以水一升六合煮取八合去滓臨服研牛黃以煮湯中嫌兒熱者用生薑代乾薑今世乏生金但用成器金亦善二三兩皆得用之

澤榛茱萸湯治小兒夏月暴寒寒入胃則暴下如水四肢被寒所折則壯熱經日不除經月許日變通身虛滿腹痛其脉微細服此湯一劑得數漸漸安神方

澤榛 青木香 各二分 海藻 吳茱萸

當歸 各三分 大黃 茯苓 白朮 桔梗 芍藥

右十味㕮咀以水四升煮取一升半二百日至一歲兒一服二合半一歲已上至二歲一服四合

枳實散治少小久痢淋瀝水穀不調形羸不堪大湯藥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

者宜此方

枳實二兩治下篩三歲已上飲服方寸匕若兒小以意斟酌日三服

治少小洞注下痢方

蒺藜子二升擣汁溫服以瘥為度

又方取木瓜汁飲之

又方酸石榴燒灰末服半錢匕日三

又方炒倉米末飲服

又方狗頭骨燒灰水和服之

又方

羊骨灰　鹿骨灰

右二味並水和服之隨得一事即用之

又方炒豉令焦水淋汁服之神驗冷則酒淋服

又方五月五日百草末吹下部

治小兒赤白滯下方

薤白一把　豉一升

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:54
列印頁數：997
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味以水三升煮取二升分三服

又方

栢葉　麻子末　各一升

右二味以水五升煮取三沸百日兒每服三合

又方搗石榴汁服之

又方牛角鰓灰水和服三方寸匕佳

又方燒蜂房灰水和服之

又方

鈔定四庫全書

備急千金要方

亂髮灰　鹿角灰

右二味等分三歲兒以水和服三錢匕日三

治小兒赤白痢方

白蘘荷根汁

生地黃汁　各五合

右二味微火上煎一沸服之

單方治同前服生黃汁一合

又方五月五日蝦蟇灰飲服半錢匕

治小兒熱痢方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煮木瓜葉飲之

治小兒冷痢方

藜菜擣汁量大小與之一方作芥菜

又方擣蒜敷兩足下

治小兒暴痢方

小鯽魚一頭燒末服之亦治大人

又方燒鯉魚骨末服之一方作龍骨

又方赤小豆末酒和塗足下日三度油和亦得

治小兒蠱毒痢方

藍青汁一升二合分為四服

治小兒渴痢方

擣冬瓜汁飲之

備急千金要方卷五十一

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷五十二　唐　孫思邈　撰

胃腑方

宋　林億等　校正

胃腑脉論第一

論曰胃腑者主脾也口脣者是其候也脾合氣於胃胃者水穀之腑也號倉庫守內齒吏重二斤十四兩迂曲屈伸長一尺六寸大一尺五寸徑五寸受水穀三斗五升其中當留穀二斗水一斗五升廣胲大頸張胸五穀乃容而滿上焦泄氣出其精微慄悍滑疾下焦下瀆泄諸小腸此腸胃所受水穀之數也平人則不然胃滿則腸虛腸滿則胃虛更滿更虛氣得上下五臟安定血脉和利精神乃居故神者水穀精氣也五臟不足調於胃故腸胃之中當留穀二斗四升水一斗一升故人一日再至後甲乙作圊後二升半一日中五升七日五七三斗五升而留水穀盡故平人不飲不食七日而死者水穀精

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:55
列印頁數：1000
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

氣津液皆盡故七日而死矣

右手關上陽絶者無胃脉也若吞酸頭痛胃中有冷刺足太陰治陰在足大指本節後一寸

右手關上陽實者胃實也若腸中伏伏一作幅幅不思食得食不能消刺足陽明治陽在足上動脉脉浮而乳浮則為陽乳則為陰浮乳相搏胃氣生熟其陽則絶

跌陽脉浮大者此胃家微虚煩圍必日再行動作頭痛重熱氣朝者屬胃

胃脉搏堅而長其色赤當病折髀其耎而散者當病食癉髀痛病先發於胃脹滿五日之腎少腹腰脊痛脛痠三日之膀胱背膂筋痛小便閉五日上之心脾心痛閉塞不通身痛體重靈樞云上之心三日不已死冬夜半後夏日昳胃病者腹脹胃管當心而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下下取三里

飲食不下膈塞不通邪在胃管在上管則抑而刺之在下管則散而去之

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:55
列印頁數：1001
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

胃脹者腹滿胃管痛鼻焦臭妨於食大便難
胃癰令人旦病也善饑而不能食食而支滿腹大刺足
陽明太陰橫脉出血
移於胃脾斂不已嘔吐長蟲
厥氣客於胃則夢飲食
診得胃脉病形何如肉胃脉實則脹虛則洩脾應肉肉
肉胭堅大者胃厚肉胭磨者胃薄肉胭小而磨者胃不
胃中有癖食冷物者痛不能食食熱則能食脾前受病
堅肉胭不稱其身者胃下胃下者脘約肉胭不堅者胃
緩肉胭無小果累標緊者胃急肉胭多小果累者胃結
胃結者胃上脘約不利
扁鵲云足太陰與陽明為表裏脾胃若病實則傷熱熱
則引水漿常渴虛則傷寒寒則苦饑常痛發於風水其
根在胃先從四肢起腹滿大通身腫方在治水篇中
胃絶不治五日死何以知之舌腫溺血大便赤泄
足陽明之脉起於鼻交頗中旁約太陽之脉下循鼻外

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:55
列印頁數：1002
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

入上齒中還出俠口環脣下交承漿却循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至額顱其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下俠臍入氣街中其支者起胃下口循腹裏下至氣街中而合以下髀關抵伏兎下膝入脛中下循胻外廉下足跗入中指內間其支者下膝三寸而別以下入中指外間其支者跗上入大指間出其端也動則病悽悽振寒善伸數欠顏黑病至証人與火聞木音則惕然而驚心動欲獨閉戶牖而處甚則欲上高而歌棄衣而走賁嚮腹脹是為骭厥是主血所生病者狂癲溫淫汗出鼽衄口喝脣緊頸腫喉痺大腹水腫膝臏腫痛循膺乳街股伏兎骭外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前皆熱其有餘於胃則消穀善饑溺色黃氣不足則身以前皆寒慄胃中寒則脹滿盛者則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:56
列印頁數：1003
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

胃實熱

右手關上脈陽實者足陽明經也病苦頭痛（脈經作腹中堅痛而熱也）汗不出如溫瘧脣口乾善噦乳癰缺盆腋下腫痛名曰胃實熱也

瀉胃熱湯方

梔子仁 射干 升麻 茯苓（各三兩） 芍藥（四兩） 白朮（五兩） 生地黃汁 赤蜜（各一升）

右八味㕮咀以水七升煮取一升半去滓下地黃汁煮兩沸次下蜜煮取三升分三服老小以意加減

胃中熱病

灸三里三十壯穴在膝下三寸

胃虛冷

右手關上脈陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得臥惡風寒灑灑目急腹痛虛鳴（外臺作耳虛鳴）時寒時熱脣口乾面目浮腫名曰胃虛冷也

補胃湯治少氣口苦身體無澤方

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:56
列印頁數：1004
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

栢子仁　防風　細辛　桂心
橘皮　各二兩　芎藭　吳茱萸　人參　各三兩
甘草　一兩
右九味㕮咀以水一斗煮取三升分為三服
人參散補胃虛寒身枯絶諸骨節皆痛方
人參　甘草　細辛　各六分　麥門冬
吳茱萸　二分　蜀椒　三分　桂心　當歸　各七分　乾薑　二兩　遠志　一兩
右十味治下篩食後温酒服方寸匕

喉嚨論第三

論曰喉嚨者脾胃之候也重十二兩長一尺二寸廣二寸其層圍十二重應十二時主通利水穀之道往來神氣若臟熱喉則腫塞氣不通烏翣膏止之　方在第六卷中　若腑寒喉則耿耿如物常欲窒癢瘁涎唾熱則開之寒則通之不熱不寒依臟調之　方在第六卷中

反胃第四　脉法　灸法　方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寸緊尺澀其人胸滿不能食而吐吐止者為下之故不能食設言未止者此為胃反故尺為之微澀跌陽脉浮而澀浮即為虛澀即傷脾脾傷即不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名胃反跌陽脉緊而澀其病難治

治胃虛反食下喉便吐方

人參 澤瀉 甘草 桂心 各二兩
橘皮 乾薑 各三兩 茯苓 四兩 大黃 六兩
青竹茹 五兩

右九味㕮咀以水八升煮取三升一服七合日三夜一已利者去大黃

治反胃而渴方

茯苓 澤瀉 半夏 各四兩 桂心 甘草 各三兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升分三服一方入生薑四兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治胃反吐逆不消食吐不止方

人參 澤瀉 桂心 各二兩 茯苓四兩 橘皮 甘草 黃耆 各三兩 大黃一兩半 生薑八兩 半夏一升 麥門冬三升

右十一味㕮咀以水一斗二升煮取三升二合一服八合日三夜一羸人六合已利去大黃

治胃反朝食暮吐食訖腹中刺痛此由久冷方

橘皮三兩 甘草 厚朴 茯苓

桂心 細辛 前胡 各八兩 生薑五兩 人參 杏仁 竹皮 各二兩

檳榔十枚

右十二味㕮咀以水一斗三升煮取三升分三服一

方有甘皮二兩

又方

橘皮三兩 白朮 人參 各二兩

蜀椒一百二十粒 桂心一兩 薤白一握

右六味㕮咀以水二升漬一宿內羊肚中縫合以三

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:58
列印頁數：1007
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

升水煮水盡出之決破去滓分三服

治反胃大驗方

前胡 生薑 各四兩

阿膠 一兩

大麻仁 五合

橘皮 三兩

桂心 三寸

甘草 五寸

大棗 十枚

吳茱萸 四合

右九味㕮咀以水三升酒二升煮取一升七合分二服

華佗治胃反胃反為病朝食暮吐心下堅如杯升徃來寒熱吐逆不下食此為關上寒澼所作將成肺癆治之方

真珠 雄黃 各三兩

丹砂 五兩

朴硝 五兩

乾薑 十累

右五味為末蜜丸如梧子先食服三丸若小煩者飲水即解然無所忌神良無比一方用桂心一兩

治胃反食即吐方

擣粟米作麪水和作丸楮子大七枚爛煮内醋中細

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

細呑之得下便已麪亦得用之
大半夏湯治胃反不受食食已即嘔吐方
半夏 升三 白蜜 升三 白术 各一 人參 二兩 生薑 三兩
右五味咬咀以水五升和蜜揚之二三百下煮取一升半分三服
治胃反食即吐出上氣方
蘆根 各二兩 細切 茆根
右二味以水四升煮取二升頓服之得下良
又方飲白馬尿即止
又方燒先死雞胜胵灰酒服男雄女雌
又方淘小芥子曝乾為末酒服方寸匕日三
又方灸兩乳下各一寸以瘥為度又灸臍上一寸二十壯又灸內踝下三指稍邪向前有穴三壯 外臺秘要三指作一指也
治酢咽方
麴末 一斤 地黃 三斤

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味合擣日乾以酒服三方寸匕日三

治噫酢咽方

吳茱萸 半斤 生薑 三兩 人參 二兩 大棗 十二枚

右四味㕮咀以水六升煮取二升先食服一升日再

治中散食後吐酸水方

乾薑 食茱萸 各二兩

右二味治下篩酒服方寸匕日二胃冷服之立驗

嘔吐噦逆第五 脈論 灸法

夫吐家脉來形狀如新臥起陽緊陰數其人食已即吐陽浮而數亦為吐寸口脉緊而芤緊即為寒芤即為虛寒虛相搏脉為陰結而遲其人即噎關上數其人則吐跌陽脉微而澀微即下利澀即吐逆穀不得入跌陽脉浮者胃氣虛寒氣在上憂氣在下二氣並爭但出不入其人即嘔而不得食恐怖如死寬緩即瘧嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥難治

論曰凡服湯嘔逆不入腹者先以甘草三兩水三升煮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取二升服之得吐但服之不吐益佳消息定然後服餘湯即流利便不吐也凡嘔者多食生薑此是嘔家聖藥

半夏湯治逆氣心中煩悶氣滿嘔吐氣上方 一名小茯苓湯

半夏一升 生薑一斤 茯苓 桂心各五兩

右四味㕮咀以水八升煮取二升半分三服若少氣

加甘草二兩

前胡湯治寒熱嘔逆少氣心下堅聚彭亨滿不得食寒

熱痟渴補不足方

前胡 生薑各三兩 甘草 朴硝湯下

大黃別浸二兩 芍藥 茯苓 麥門冬

當歸 半夏 滑石 石膏

栝蔞根 黃芩 附子 人參各一兩

治嘔吐四肢痺冷上氣腹熱三焦不調方

右十六味㕮咀以水一斗二升煮取六升分四服

前胡 芎藭 甘草 當歸

石膏 人參 桂心 橘皮各二兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:45:59
列印頁數：1011
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芍藥 三兩
半夏 四兩
生薑 五兩
大棗 三十枚
右十二味㕮咀以水一斗二升下黃芩三兩合煮取三升分三服一方不用黃芩
小麥湯治嘔吐不止方
小麥 一升
人參 厚朴 各四兩
甘草 一兩
生薑汁 三合
茯苓 三兩
青竹茹 二兩半
右七味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服
豬苓散治嘔而膈上寒方
豬苓 茯苓 各三兩
白术 三兩
右三味治下篩以飲服方寸匕日三渴者多飲水
犀角人參飲子治嘔逆胃氣虛邪風熱不下食方
犀角 人參 各二兩
薤白 五兩
粟米 一合
右四味㕮咀以水四升半煮取一升七合下米煮令米熟分四服相去七里久進一服
治春夏時行傷寒寒傷於胃胃冷變嘔方
橘皮 桂心 葛根 各二兩
白茅根 一升

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右四味㕮咀以水六升煮取三升分三服數進服盡更合有熱去桂

小半夏加茯苓湯治諸嘔噦心下堅痞膈間有水痰眩悸者 方見第十八卷中

治嘔噦方

人參一兩 胡麻仁八合 橘皮一分 枇杷葉八兩

右四味㕮咀以水一斗煮枇杷葉取五升下藥煮取三升內麻仁稍飲之

又方蘆根切三升以水一斗煮取四升分作四服

治氣厥嘔噦不得息方

豉一升 半夏八兩 生薑二兩 人參一兩

右七味㕮咀以水九升煮取三升分三服

又方

大棗十枚 附子一枚 橘皮二兩 豉一升

生薑一兩 甘草各一兩

前胡 桂心 甘草各一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右六味㕮咀以水九升煎取二升分三服日三

治卒嘔噦厥逆方

飲新汲冷水三升佳

橘皮湯治乾嘔噦若手足厥冷者方

橘皮 四兩 生薑 半斤

右二味㕮咀以水七升煮取三升分三服不止更合服之

治傷寒後噦乾嘔不下食方

生蘆根 一升 切 青竹茹 一升 粳米 三合 生薑 二兩

右四味㕮咀以水五升煮取二升分三服不止服三

又方

通草 橘皮 各二兩 生蘆根 一升 切 粳米 三合

右四味㕮咀以水四升煮取一升半分三服

治乾嘔吐逆涎沫出者方

半夏 乾薑 各等分

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:01
列印頁數：1014
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味咬咀以漿水一升半煮取七合頓服之日三

治病人乾嘔方

取羊乳汁飲一杯

治乾嘔方

酒浸馬屎一宿取汁服之

又方灸心主尺澤亦佳

又方灸乳下一寸三十壯

又方乾嘔不止粥食湯藥皆吐不停灸手間使三十壯

若四厥脉沉絶不至者灸之便通此起死人法

治噦方

煮豉三升飲汁佳

又方空腹飲薑汁一升

又方濃煎蘆根汁飲之

又方灸承漿七壯炷如麥大

又方灸臍下四指七壯

治惡心方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

苦瓠穰并子一升碎以酒水三升煮取一升頓服須臾吐并下如蝦蟆衣三升

又方服小便一百日佳

又方麻子一升熬令香熟擣取酒三升熟研濾取一升飲盡日二服盡一石瘥一切病自能飲食不能酒任性多少

治食已吐其食方

大黄四兩　甘草二兩

右二味㕮咀以水三升煮取一升半分再服

治食飲輒吐方

頓服生熟湯三升即止

灸法 餘散見前

吐逆嘔不得食灸心輸百壯

吐嘔逆不得下食今日食明日吐者灸膈輸百壯

吐變不得下食灸胸堂百壯

吐逆不得食灸巨闕五十壯

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:01
列印頁數：1016
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

吐逆食不住灸胃管百壯三報

吐逆飲食却出灸脾募百壯三報 章門穴也

吐嘔宿汁吞酸灸神光 一名膽募 百壯三報 甲乙經云日月膽募也在期門

下五分

吐逆霍亂吐血灸手心主五十壯

噫噦腸中氣閉塞灸腋下聚毛下附脇宛宛中五十壯

噦噫嘔逆灸石關百壯

欽定四庫全書

備急千金要方卷五十二

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:02
列印頁數：1017
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷五十三 唐 孫思邈撰

宋 林億等 校正

胃腑方

噎塞第六 論方

五噎圓治胸中久寒嘔逆逆氣食飲不下結氣不消方

古今録驗云五噎者氣噎憂噎勞噎食噎思噎氣噎者心悸上下不通噫噦不徹胸脇苦痛憂噎者天陰苦厥逆心下悸動手足逆冷勞噎者苦氣腦脇下支滿膜中填塞令手足逆冷不能自溫食噎者食無多少惟胸中苦塞常痛不得喘息思噎者心悸動喜忘目視眩眩此皆憂恚嗔怒寒氣上入胸脇所致也

乾薑 蜀椒 食茱萸 桂心

人參 各五分 細辛 白朮 茯苓

附子 各四分 橘皮 六分

右十味為末蜜和丸如梧子大以酒服三丸日三不知加至十丸

止稍加至十丸

又方治五種之氣皆令人噎方

人參 半夏 桂心 防風 一作葵防

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

小草　附子　細辛　甘草　各二兩

紫菀　乾薑　食茱萸　芍藥　各二兩

烏頭　各六分　枳實　一兩

右十四味為末蜜丸如梧子大以酒服五丸日三不止加至十五丸烏頭與半夏相反但去一味合之

竹皮湯治噎聲不出方

竹皮　一用竹葉　細辛　各二兩　甘草　生薑

通草　人參　茯苓　麻黃　各一兩

五味子　桂心　各一兩

右十味咬咀以水一斗煮竹皮減二升去竹皮下藥煮取三升分三服

乾薑湯治飲食輒噎方　集驗名半夏湯

乾薑　石膏　各四兩　栝蔞根　集驗桔梗　人參　各一兩

桂心　各二兩　半夏　各一升　小麥　各一升　吳茱萸　二升

甘草　一兩　赤小豆　三十粒

右十味咬咀以酒五升水一斗煮棗二十枚去滓合

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煮取三升分三服

通氣湯治胸滿氣噎方

半夏 八兩 生薑 六兩 桂心 三兩 大棗 三十枚

右四味咬咀以水八升煮取三升分五服日三夜二

羚羊角湯治氣噎不通不得食方

羚羊角 通草 吳茱萸 乾薑 各三兩 橘皮 各二兩 厚朴 烏頭 五枚

右七味咬咀以水九升煮取三升分三服日三

又方

杏仁 桂心 各三兩

右二味為末蜜丸如棗大稍稍咽之臨食先含彌佳

治卒噎方

滿口著蜜食之即下

又方捻取飯盆邊零飯一粒食之即下

又方刮舂杵頭細糠含之即下神驗

治諸噎方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

常食乾粳米飯即不噎

又方末火炭蜜丸如彈子大含少少咽即下

又方老牛涎棗核大水中飲之終身不復噎

論曰凡療病者皆以其類至如治哽之法豈宜以鸕鷀主骨哽狸虎治魚哽耶至於竹篾薤白嚼筋綿蜜等事乃可通為諸哽用耳

治諸哽方

取鹿筋漬之令濡合而索之大如彈丸以線繫之持筋端吞之入喉推至哽處徐徐引之哽著筋出

又方作竹篾刮令滑淨綿裹內咽中令至哽處可進退引之哽即隨出

又方用綿二兩以蜜煎使熱的的爾從外薄哽所在處灼瓠以熨綿上若故未出復煮一段綿以代前用者并以皂莢屑少少吹鼻中使得噦哽出 肘後方云治哽百日不出者

又方煮薤白令半熟小嚼之以線繫薤中央捉線吞薤下喉至哽處牽引哽即出矣

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:04
列印頁數：1021
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治哽咽方

以虎骨末若狸骨服方寸匕

又方瞿麥末服方寸匕

治魚骨哽方

鸕鷀屎服方寸匕

又方口稱鸕鷀鸕鷀則下

又方服沙糖水

又方服橘皮湯

又方燒魚網灰服方寸匕 必效方云取魚網覆頭立下

治骨鯁在喉衆治不出方

取粘糖丸如雞子黃大吞之不去更吞漸大作丸可至十丸止

又方燒虎狼屎服之

又方吞猪膏如雞子不瘥更吞瘥止

治食中吞髮咽不去繞喉方

取亂髮燒灰酒服一錢匕

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治吞錢方

艾蒿五兩以水五升煮取一升頓服之即下

又方服蜜二升即出

又方末火炭酒服方寸匕水服亦得

治吞金銀鐶及釵方

白糖二斤一頓漸漸食之多食益佳

又方吞水銀一兩再服之

悞吞環及指彊方

悞吞釵方

燒鴈毛二七枚末服之鵝羽亦得

曝韮令萎蒸熟勿切食一束即出或生麥葉筋縷如

韮法皆可用但力意多食自消

悞吞銅鐵而哽者方

燒銅弩牙令赤內酒中飲之立愈

悞吞針釘及箭鏃等方

但多食脂肥肉令飽自裹出

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:04
列印頁數：1023
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治悞吞針方

取懸針磁石末飲服方寸匕即下 古今録驗云今吞針在喉中而服磁石末入腹若舍磁石口中或吸針而出耳也

脹滿第七 論灸法方

論曰病者腹滿按之不痛者為虛按之痛者為實也夫腹中滿不減減不驚人此當下之舌黄未下者下之黄乾燥腹間有水是飲跗陽脉微弦法當腹滿不滿者必自去腹滿時減復如故此為寒當得温藥腹滿口中苦下部閉塞大便難兩胠下疼痛此虛寒氣從下向上當以温藥服之取瘥腹滿轉痛來趣小腹為欲自下利也 一云腹中痛若轉氣下趣小腹為欲自利

温胃湯治胃氣不平時脹欬不能食方

附子 當歸 厚朴 人參
橘皮 芍藥 甘草 各一兩
蜀椒 三合 乾薑 五分

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大半夏湯治胃中虛冷腹滿塞下氣方

半夏 一升 大棗 二十枚 甘草 附子

當歸 人參 厚朴 茯苓

枳實 各二兩 桂心 五兩 生薑 八兩 蜀椒 二百粒

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分三服

附子粳米湯治腹中塞氣脹滿腸鳴切痛胸脇逆滿嘔吐方

附子 一枚 半夏 粳米 各半升 甘草 一兩

大棗 十枚

欽定四庫全書

右五味咬咀以水八升煮米熟去滓每服一升日三服

厚朴七物湯治腹滿氣脹方 仲景云治腹滿發熱數十日脉浮數飲食如故者

厚朴 半斤 甘草 大黃 各三兩 大棗 十枚

枳實 五枚 桂心 二兩 生薑 五兩

右咬咀以水一斗煮取五升去滓内大黃煮取四升

服八合日三嘔逆者加半夏五合利者去大黃寒多

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:05
列印頁數：1025
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

者加生薑至半斤

厚朴三物湯治腹滿發熱數十日脉浮而數飲食如故方

厚朴 半斤 大黃 四兩 陳枳實 大者五枚

右㕮咀以水一斗二升煮取五升内大黃煎取三升去滓服一升腹中轉動者勿服不動者更服 一方加芒硝二兩

吳茱萸湯治久寒胸脇逆滿不能食方

吳茱萸 半夏 各一升 小麥 各一升 甘草 人參 桂心 各一兩 大棗 二十枚 生薑 八兩

右八味㕮咀以酒五升水三升煮取三分分三服

大桂湯治虛羸胸膈滿方

桂心 生薑 各一斤 半夏 一升 黃耆 四兩

右四味㕮咀以水一斗半煮取五升分五服日三夜二

治男子卒勞内傷汗出中風腹脹大饑食不下心痛小

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:06
列印頁數：1026
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

便赤黃時白大便不利方

大黃　蓼蘆　寒水石　苦參

黃連　梔蘗根　各等分

右六味為末蜜丸以豉汁和飲服如梧子大二丸日三加至十丸

灸法

臚脹脇腹滿灸膈輸百壯三報

胸滿心腹積聚痞痛灸肝輸百壯三報

腹中氣脹引脊痛食飲多身羸瘦名曰食晦先取脾輸

脹滿水腫灸脾輸隨年壯三報

後取季脇

臟腑積聚脹滿羸瘦不能飲食灸三焦輸隨年壯

脹滿雷鳴灸大腸輸百壯三報

脹滿氣聚寒冷灸胃管百壯三報穴在鳩尾下三寸

腹脹滿繞臍結痛堅不能食灸中守百壯穴在臍上一寸一名水分

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:06
列印頁數：1027
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

脹滿瘕聚滯下疼冷灸氣海十壯穴在臍下一寸忌不可針

脹滿氣如水腫狀小腹堅如石灸膀胱募百壯穴在中極臍下四寸

脹滿腎冷瘕聚洩利灸太樞百壯穴在臍傍相對橫去臍兩傍各二寸

論灸法方

癇冷積熱第八

論曰凡人中寒者喜欠其人清涕出發熱色和者善噦凡胷病者未脉望之口燥清涕出善噦欠此人中寒其人下利以裹虛故也欲噦不能此人腹中痛凡寒脉沉弦脉雙弦者寒也弦脉狀如張弓弦按之不移脉數弦者當下其寒脉雙弦而遲者心下堅脉大而緊者陽中有陰可下之右手寸口脉弦者即脇下拘急而痛其人濇濇惡寒師曰遲者為寒濇為無血寸口脉微尺中緊而澀緊即為寒微即為虛濇即為血不足故知發汗而復下之大露宿丸主寒冷百病方見第十七卷中

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

匈奴露宿圓治寒冷積聚方

礬石 桂心 附子 乾薑 各二兩

右四味為末蜜丸如梧子大每服十丸日三後稍加之

露宿圓治遇冷氣心下結緊嘔逆寒食不消并主傷寒晨夜觸寒冷惡氣方

附子 烏頭 桂心 礬石 各四兩

右四味為末蜜丸如胡豆大以酒服三丸日三加至

十丸藥耐寒冷忌熱食近火宜冷食飲

治痼冷風眩寒中手足冷胃口寒臍下冷百病五勞七傷第一令人能食二強盛三益氣四有子神驗方

大豆 三升半 生地黃 十五斤取汁 烏頭 一百五十枚

右三味以除日叹咀烏頭以酒一斗半和地黃汁浸烏頭至破日絞去滓内豆藥汁中至除日出曝之有汁更浸曝之至汁盡藥成初服從二豆起可至二十

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

豆酒服之有病空腹服無病食後服四時合並得二
月三月為上時藥令人能食益氣强盛有子髮白反
黑齒落重生先病熱人不可服

治心腹痼冷百治不瘥方

麴末 三升 白朮 五兩 乾薑 桂心 各三兩
蜀椒 吳茱萸 各二兩

右六味治下篩以米飲服方寸匕日二不過五劑諸
冷頓愈無忌空腹服之

治積年冷病方

蜀椒 二兩 香豉 一升

右二味擣椒為末和豉更擣三千杵丸如彈丸大食
前酒服日再

治諸冷極醫所不治方

馬藺子九升淨治去土空腹服一合日三飲及酒下
之服訖須臾以食壓之取瘥乃止

赤圓治寒氣厥逆方

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:07
列印頁數：1030
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

茯苓　桂心　各四兩　細辛一兩　烏頭

附子　各二兩　射罔一兩如大棗

右六味為末内真珠為色蜜丸如麻子空腹酒服一方用半夏四兩不用桂

丸日再夜一不止加至二丸以止為度

半夏湯治胸滿有氣心腹中冷方

半夏一升　桂心四兩　生薑八兩

右三味咀以水七升煮取二升一服七合日三服

生薑湯温中下氣方

生薑一斤　甘草三兩　桂心四兩

右三味咀以水六升煮取一升半一服五合日三服

甘草湯治虚羸惙惙氣欲絶方

甘草　五味子　各二兩　生薑一升　吳茱萸一升

右五味咀以水四升煮茱萸令小沸去滓内藥煮

人參一兩

取一升六合分二服服數劑佳

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

萊菔消石湯治从寒不欲飲食數十年澼飲方

吳茱萸 八合　消石 一升　生薑 一斤

右三味以水一斗水解令得二斗煮藥取四升服二升病即下去勿更服也初下如泔後如汚泥若如沫狀者更可服之養如乳婦法

大建中湯治心脇中大寒大痛嘔不能飲食飲食下咽起出見有頭足上下而痛其頭不可觸近方

自知偏從一面下流有聲決決然若腹中寒氣上衝皮

蜀椒 二合　乾薑 四兩　人參 二兩　粉糖 一升

右四味咬咀以水四升煮取二升去滓内糖微火煮令得一升半分三服服湯如炊三升米从可飲粥二升許更服當一日食糜温覆之

大黄附子湯治脇下偏痛發熱其脉緊弦此寒也當以温藥下之方

大黄 三兩　附子 三枚　細辛 二兩

右三味咬咀以水五升煮取二升分再服

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:09
列印頁數：1032
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

論曰寸口脉弦而緊弦即衛氣不行衛氣不行即惡寒緊則不欲飲食弦緊相搏即為寒疝跗陽脉浮而遲浮即為風虚遲即為寒疝凡瘦人繞臍痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必衝不衝者心下則痞

大烏頭湯主寒疝繞臍苦痛發即白汗出手足厥寒其脉沉弦者方 仲景名二物烏頭煎

烏頭十五枚熬黑不切以水三升煮取一升去滓内白蜜二斤煎令水氣盡得二升强人服七合羸人五合不止更進三合復不止加至五合其止者如醉狀得吐者為中病也桂枝湯方見傷寒卷中 外臺方云以水二升半煮桂取一升以桂汁和蜜煎合煎之一升許服又云范注方秋乾烏頭 實中者去除去角 五枚 白蜜 一斤

烏頭桂枝湯治大寒疝腹中痛逆冷手足不仁若一身盡痛灸刺諸藥不能治方

合一服未效明日更服每日止一服不可再也

右二味以蜜煎烏頭減半去滓以桂枝湯五合解之令得一升許初服二合不止更進三合復不止加至五合其止者如醉狀得吐者為中病也桂枝湯方見

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:09
列印頁數：1033
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

云以桂枝湯和前烏頭煎服

論曰凡人患大熱皆須候脉若大大熱者不得一準方用藥皆準病用藥大熱不可那者當兩倍三倍大大熱者乃至十倍用之乃可制之爾有人苦熱不已皆由服石所致種種服餌不能制止惟朴消煎可以定之武德中有貴高人師市奴謂之金石凌非也此方直用二消寒水石石膏可也即不勞金有金者貴高人所加也

朴硝煎方

金 各二兩

朴硝 一升

芒硝 八兩

寒水石 四兩

石膏

右五味先内二硝於八升湯中攪令消以紙窓封一宿澄取清内銅器中别擣寒水石石膏碎如豆粒以絹袋盛之内汁中以微火煎候其上有漠起以筋投中著筋如淩雪凝白急下瀉著盆中待凝取出烈日曝乾積熱困悶不已者以方寸匕白蜜一合和冷水五合攪和令消頓服之日三熱定即止

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五石湯治胃間熱熱病後不除煩悶口中乾渴方

寒水石 消石 赤石脂 龍骨

栝蔞根 牡蠣 甘草 黄芩 各五分

知母 桂心 石膏 各三分 大黄 二分

右十二味咬咀以水七升煮取三升分四服日三夜一諸本只有四石

竹葉湯治五心熱手足煩疼口乾唇燥胸中熱方

竹葉 小麥 各一升 知母 石膏 各二兩

右十二味咬咀以水一斗二升煮竹葉小麥取八升去滓内藥煮取三升分三服老小分五服

半夏湯治胸中客熱心中煩滿氣上大小便難方

半夏 一升 生薑 八兩 前胡 四兩 茯苓 各二兩 甘草 一兩 黄芩 各三兩 人參 各二兩 杏仁 枳實 各三兩

茯苓 黄芩 生薑 五兩 栝蔞根 甘草 半夏 各一兩 麥門冬 各二兩 人參 一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十味咬咀以水九升煮取三升分三服胸中大熱者沉冷服之大小便澀加大黃二兩一方用梔子仁二兩為十一味

承氣湯治氣結胸中熱在胃管飲食嘔逆渴方

前胡 枳實 桂心 大黃

寒水石 知母 甘草各一兩 消石

栝蔞根 石膏各二兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服

治熱氣手足心煩熱如火方

竹葉二升 枳實三兩 青箱子 白前各一兩

吳茱萸 黃芩各二分 栝蔞根

麥門冬各二兩 生薑六兩 前胡一作芍藥 半夏各五兩

右十一味咬咀以水八升煮取二升分三服

地黃煎治熱方

地黃汁四升 茯神三合 知母 萎蕤各四兩

栝蔞根五兩 竹瀝三合 用竹葉生薑汁 生地骨皮各二升 白蜜二升 石膏八兩

生麥門冬汁

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:10
列印頁數：1036
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十一味咬咀以水一斗二升先煮諸藥取汁三升去滓下竹瀝地黄麥門冬汁微火煎四五沸下蜜薑汁微火煎取六升初服四合日三夜一加至六七合四月五月作散服之

治積熱方

枳實 黄芩 大黄 黄連 芒硝 各二兩

右五味為末蜜丸如梧子大空心酒服三十丸加至

四十丸日一服

治膈上熱方

苦參十兩 玄參五兩 麥門冬三兩 車前子二兩

右四味為末蜜丸如梧子大一服十五丸日二服

細圓治客熱結塞不流利方

大黄 葶藶 各三兩 香豉三合 杏仁 各五分 巴豆

右五味為末蜜丸如梧子大每日飲服二丸以利為

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

度

治骨蒸熱羸瘦煩悶短氣喘息鼻張日西即發方

龍膽　黄連　梔子十枚　苦參　芍藥　青葙子各二兩

右十味為末蜜丸如梧子大飲服二丸日二以止為度一方無苦參已下止五味張文仲為散飲服方寸匕

治骨蒸方

栝蔞根四分　芒硝二分　大黄　黄芩

天靈蓋如梳大炙令黄碎以水五升煮取二升分三服起死人神方

又方水服芒硝一方寸匕日二服神良

又方取人屎灰以酒服方寸匕日二服

治五臟熱及身體熱脉弦急者方

灸第十四椎與臍相當五十壯老少增損之若虚寒至百壯橫三間寸灸之

備急千金要方卷五十三

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:11
列印頁數：1038
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷五十四

詳校官太醫院醫士臣程 泰

編修臣倉聖脉覆勘

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄監生臣張若湘

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷五十四 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

肺臟方

肺臟脉論第一

論曰肺主魄魄藏者任物之精也爲上將軍使在上行所以肺爲五臟之華蓋並精出入謂之魄魄者肺之藏也鼻者肺之官肺氣通於鼻鼻和則能知香臭矣循環紫宮上出於頰候於鼻下迴肺中榮華於髮外主氣内主胸與乳相當左乳庚右乳辛肺重三斤三兩六葉兩耳凡八葉有十四童子七女子守之神名鴻鴻主藏魄號爲魄藏隨節應會故云肺藏氣氣舍魄在氣爲欬在液爲涕肺氣虛則鼻息利少氣實則喘喝胸憑仰息肺氣虛則夢見白物見人斬血藉藉得其時則夢見兵戰氣盛則夢恐懼哭泣厥氣客於肺則夢飛揚見金鐵之器及奇物

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:12
列印頁數：1040
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凡肺藏象金與大腸合為腑其經手太陰與陽明為表裏其脉浮相於季夏王於秋秋時萬物之所終宿葉落柯萋萋枝條杌然獨在其脉為微浮衛氣遲榮氣數數則在上遲則在下故名曰毛陽當陷而不陷陰當昇而不昇為邪所中（二氣感激故為風寒所中）陽中邪則捲陰中邪則緊捲則惡寒緊則為慄寒慄相搏故名曰癉弱則發熱浮度數行有漏刻遲在上傷毛采數在下傷下焦中焦有乃來出旦中旦發暮中暮發藏有遠近脉有遲疾周有萬物之所以收成也故其氣來輕虛而浮來急去散故曰浮反此者病何如而反其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂不及病在中太過則令人氣逆而背痛愠愠然不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音

惡則見有善則匿陽氣下陷陰氣則溫陽反在下陰反在巔故名曰長而且留秋脉如浮秋脉肺也西方金也

肺脉來厭厭聶聶如落榆莢曰肺平秋以胃氣為本肺

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

脉來不上不下如循雞羽曰肺病（巢源無不字）
肺脉來如物之浮如風吹毛曰肺死
真肺脉至大而虚如以毛羽中人膚色白赤不澤毛折
乃死
有弦曰春病弦甚曰今病
秋胃微毛曰平毛多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而
肺藏氣氣舍魄喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不
存人皮革焦毛悴色夭死于夏
手太陰氣絶則皮毛焦太陰者行氣温皮毛者也氣弗
營則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節
傷者則爪（一作皮）枯毛折毛折者則氣先死丙篤丁死火
勝金也
肺死藏浮之虚按之弱如蔥葉下無根者死秋金肺王
其脉微澀而短曰平反得大而緩者是脾之乘肺母之
歸子為虚邪雖病易治反得沉濡而滑者是腎之乘肺
子之乘母為實邪雖病自愈反得浮大而洪者是心之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乘肺火之尅金為賊邪大逆十死不治反得弦細而長者是肝之乘肺木之陵金為微邪雖病即瘥肝乘肺必右手關前寸口陰絶者無肺脉也若短氣欬逆喉中塞作虛噫逆刺手陽明治陽右手關前寸口陰實者肺實也若少氣胸中滿膨膨與肩相引刺手太陰治陰肺脉來泛泛輕如微風吹鳥背上毛再至曰平三至曰惟經病四至脫精五至死六至命盡手太陰脉也

肺脉急甚為癲疾微急為肺寒熱怠惰欬唾血引腰背胸若鼻息肉不通緩甚為多汗微緩為痿漏風（一作偏風）頭已下汗出不可止大甚為脛腫微大為肺癰引胸背起腰內小甚為殽泄微小為消癉滑甚為息賁上氣微滑為上下出血濇甚為嘔血微濇為鼠瘻在頸肢腋之間下不勝其上其能喜酸肺脉搏堅而長當病唾血其濡而散者當病漏（一作灌）汗

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

至今不復發散

白脉之至也喘而浮上虛下實驚有積氣在胸中喘而虛名曰肺癉寒熱得之醉而使内也

黄帝問曰經脉十二而手太陰之脉獨動不休何也手太陰本在寸口中

岐伯對曰足陽明胃脉也胃者五臟六腑之海胃脉在足趺上

之其行之也以息往來故人一呼脉再動一吸脉亦再

大趾間上行三寸骨解中是也其精氣上清注於肺肺氣從太陰而行

動呼吸不已脉動不止

黄帝問曰氣口何以獨為五臟主岐伯曰胃者水穀之海六腑胃居其大五味入於口藏於胃以養五臟氣氣口者太陰是也臟腑之氣味皆出於胃變見於氣口氣口屬腑藏主即呼寸口者也

扁鵲曰肺有病則鼻口張實熱則喘逆胸憑仰息其陽氣壯則夢恐懼等虛寒則欬息下利少氣其陰氣壯則夢涉水等肺在聲為哭在變動為欬在志為憂憂傷肺

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

精氣并於肺則悲也

味主秋結滿而血者病在胸及以飲食不節得病者取之合故命曰味主合

病先發於肺喘欬三日之肝脇痛支滿一日之脾閉塞不通身痛體重五日之胃腹脹十日不已死冬日入夏日出病在肺下晡慧日中甚夜半靜

假令肺病南行若食馬肉及麪肉得之不者當以夏時發得病以丙丁日也宜赤藥

凡肺病之狀必喘欬逆氣肩息背痛汗出尻陰股膝攣髀腨胻足皆痛虛則少氣不能報息耳聾嗌乾取其經手太陰足太陽之外厥陰内少陰血者

肺脉沉之而數浮之而喘苦洗洗寒熱腹滿腸中熱小便赤肩背痛從腰已上汗出得之房内汗出當風

肺病其色白身體但寒無熱時時欬其脉微遲為可治宜服五味子大補肺湯瀉肺散春當刺少商夏刺魚際皆瀉之季夏刺大淵秋刺經渠冬刺尺澤皆補之又當

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

灸臍中百壯背第三椎二十五壯

邪在肺則皮膚痛發寒壯上氣氣喘汗出欬動肩背取之膺中外輸背第三椎之傍以手痛按之快然乃刺之取之缺盆中以越之

形寒寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行肺傷其人勞倦則欬唾血其肺細緊浮數皆吐血此為躁擾嗔怒得之肺傷氣擁所致也

肺中風者口燥而喘身運而重冒而腫脹

肺中寒者其人吐濁涕

肺水者其人身體腫而小便難時時而大便鴨溏

肺脹者虛而滿喘欬目如脫狀其脉浮大

趺陽脉浮緩少陽脉微緊微為血虛緊為微寒此為胤乳診得肺積脉浮而毛按之辟易脇下時時痛逆背相引痛少氣善忘目瞑結癰皮膚寒秋愈夏劇主皮中時痛如蟲緣之狀甚者如針刺之狀時癢色白也

肺之積名曰息賁在右脇下覆大如杯久久不愈病灑

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:15
列印頁數：1046
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

灑寒熱氣逆喘欬發肺癰以春甲乙日得之何也心病傳肺肺當傳肝肝適以春王王者不受邪肺復欲還心心不肯受因留結為積故知息賁以春得之

肺病身當有熱欬嗽短氣唾出膿血其脉當短濇今反浮大其色當白而反赤者此是火之尅金為大逆十死不治商音人者主肺聲也肺聲哭其音磬其志樂其經手太陰厥逆陽明則榮衛不通陰陽反祚陽氣內擊陰氣外傷傷則寒寒則虛虛則厲風所中噓吸戰掉語聲嘶塞而散下氣息短憊四肢僻弱面色青葩遺失便利甚則不可治依源麻黃續命湯主之方見第八卷中

又言音喘急短氣好唾此為火尅金陽擊陰陰氣沉陽氣昇昇則實實則熱熱則狂狂則閉眼悸言非常所說口赤而張飲無時度此熱傷肺肺化為血不治若面赤而鼻不欬可治也

肺病為癆者令人心寒甚則熱熱間善驚如有所見者恒山湯主之方見第十卷中

若其人本來語聲雄烈忽爾不

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

亮拖氣用力方得出言而反於常人呼共語直視不應雖曰未病勢當不久此則肺病聲之候也察觀疾病表裏相應依源審治乃不失也

白為肺肺合皮白如豕膏者吉肺主鼻鼻是肺之餘其

人金形相比於上商白色小頭方面小肩背小腹小手足發動身輕精廉急心靜悍性喜為吏耐秋冬不耐春夏春夏感而生病主手太陰廉廉然肩膺厚薄正竦則肺應之正白色小理者則肺小小則少飲不病喘喝粗理者則肺大大則虛虛則寒喘鳴多飲善病胸喉痺逆氣巨肩反膺陷喉者則肺高高則實實則熱上氣肩息欬逆合腋張脇者則肺下下則逼責迫肝善脇下痛鼻塞或窒而涕生息肉好肩背厚者則肺堅堅則不病欬上氣肩背薄者則肺脆脆則易傷於熱喘息鼻衄肩膺好者則肺端正端正則和利難傷膺偏欹者則肺偏傾偏傾則病胸偏痛鼻亦偏疾凡人分部陷起者必有病生大腸陽明為肺之部而藏氣通於內外部亦隨而應

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

之沉濁為內浮清為外若外病內入則所部起內病裏出則所部陷外入前治陽後治陰內出前治陽後治陰內凡人死生休否則藏神前變實瀉虛補陽主外陰主內凡人死休否則藏神前變形于外人肺前病鼻則為之孔開焦枯若肺前死鼻則為之梁折孔閉青黑色若天中等分墓色應之必死不治看色深淺斟酌賒促遠不出一年促不延時月肺疾少愈而卒死何以知之曰赤色黑如拇指黵點見顏頰上此必卒死肺絶三日死何以知之口張但氣出而不還面白目青是謂亂經飲酒當風風入肺經膽氣妄泄目則為青雖有天救不可復生面黃目白如枯骨死吉凶之色在於分部順順而見赤白入鼻必病不出其年若年間不應三年之中禍必應也

秋金肺脉色白主手太陰脉也秋取經輸秋者金始治肺將收殺金將勝火陽氣在合陰氣初勝濕氣及體陰氣未盛未能深入故取輸以瀉陰邪取合以虛陽邪陽氣始衰故取於合其脉本在寸口之中掌後兩筋間二

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:16
列印頁數：1049
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寸中應在腋下動脉其脉根於太倉太倉在臍上三寸一分是也其筋起於手大指之上循指上行結於魚後行寸口外側上循臂結肘中上臑内廉入腋下上出缺盆結肩髃前上結缺盆下結胸裏散貫賁下抵季脇

其脉起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋下下循臑内行少陰心主之前下肘中後循臂内上骨下廉入寸口上魚循魚際出大指之端其支者從腕後直次指内廉出其端合手陽明為表裏陽明之本在肘骨中同會于手太陰

太陰之别名列缺起於腕下分間並太陰之經直入掌中散入於魚際别走手陽明主肺生病病實則大腸熱則手兌掌起起則陽病陽脉反逆大於寸口三倍病則欬上氣喘渴煩心胸滿臑臂内前廉痛掌中熱氣盛有餘則肩背痛風汗出中風虚則大腸寒寒則欠欬小便遺數數則陰病陰脉反小於寸口一倍病則肩背寒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

痛少氣不足以息季脇空痛尿色變卒遺失無度

秋三月者主肺大腸白氣狂病也其源從太陽擊手太陰太陰受淫邪之氣則經絡壅滯毛皮緊腎發泄邪生則臟腑傷温隨秋受癘其病相反若腑虚則為陰邪所傷乍寒乍熱損肺傷氣暴嗽嘔逆若臟實則為陽毒所損體熱生斑氣喘引飲故曰白氣狂病也

其陽理其陰則臟腑之病不生矣

扁鵲云炙心肺二輸主治丹毒白狂病當依源為療調

肺虚實第二 脉 灸 法 方

肺實熱

右手寸口氣口以前脉陰實者手太陰經也病苦肺脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀名曰肺實熱也

治肺實熱胸憑仰息泄氣除熱方

石膏 八兩 白前 杏仁 各三兩 橘皮 白术 各五兩 赤蜜 七合 枸杞根皮 切二升

右七味㕮咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮三沸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

分三服

治肺熱言音喘息短氣好唾膿血方

生地黃汁二升 麻黃八兩 杏仁五兩 石膏八兩 芒硝各三兩 赤蜜一升

升麻羚羊角各三兩

淡竹茹雞子大一枚

右九味㕮咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮兩沸分三服

治肺熱悶不止胸中喘急驚悸客熱來去欲死不堪服藥泄胸中喘氣方

桃皮芫花各一升

手巾内汁中薄胸温四肢不盈數日即歇

橘皮湯治肺熱氣上欬息奔喘方

橘皮麻黃各三兩 乾薑 細辛 紫菀 蘭各二兩

宿薑柴胡

杏仁各四兩

石膏八兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:18
列印頁數：1052
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右七味㕮咀以水九升煮麻黄兩沸去沫下諸藥煮取三升去滓分三服不瘥與兩劑

治肺熱喘息鼻衄血方

羚羊角　玄參　射干　雞蘇　芍藥　升麻　柏皮 各三兩　淡竹茹 雞子一枚　生地黄 切一升　梔子仁 四兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升分三服須利者下芒硝三兩更煮三沸

右六味㕮咀以水七升先煮麻黄去沫下諸藥煮取三升去滓分三服

治肺熱飲酒當風風入肺膽氣妄泄目青氣喘方

麻黄 四兩　甘草　五味子 各三兩　杏仁 五十枚　母薑 五兩　淡竹葉 切一升

瀉肺散治酒客勞倦或出當風喜怒氣舍於肺面目黄腫起即頭眩欬逆上氣時忽忽欲絶心下弦急不能飲食或吐膿血胸痛引背支滿欲嘔方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五味子 百部 各二兩半 茯苓 附子
蒐蓉 當歸 石斛 遠志
續斷 各一兩 細辛 甘草 各七分 防風
蜀椒 紫菀 桂心 款冬花
乾薑 各一兩半 桃仁 六十枚 杏仁 三十枚

右十九味治下篩以酒服方寸匕日三後稍加至二匕

灸法

肺脹氣搶脇下熱痛灸陰都隨年壯穴在俠胃管兩邊相去一寸胃管在心下三寸

肺脹脇滿嘔吐上氣等病灸大椎并兩乳上第三肋間各止七壯

肺與大腸俱實

右手寸口氣口以前脉陰陽俱實者手太陰與陽明經俱實也病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂捲脣吻不收名曰肺與大腸俱實也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治肺與大腸俱實令人氣憑滿煮散方

茯苓 麻黃 各六分 黃耆 大青

桂心 各三分 細辛 杏仁 各五分 石膏 二兩

丹參 半兩 五味子 甘草 貝母

橘皮 芎藭 各一兩 枳實 三枚

右十五味治下篩為粗散帛裹一方寸匕半井花水一升五合煮取七合為一服日再

肺虛冷

右手寸口氣口以前脉陰虛者手太陰經也病苦少氣不足以息嗌乾不津液名曰肺虛冷也

治肺虛冷聲嘶傷語言用力戰掉緩弱虛瘠風入肺方

防風 獨活 各四十二銖 乾薑 黃耆 各二銖 五味子 山茱萸 各三十六銖 桂心 薯蕷 細辛 防己 各三十銖

芎藭 秦椒 麻黃 天雄 甘草 秦艽 杜仲 人參 甘菊花

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

紫菀 各二十四銖 貫衆二枚 附子七分

右二十二味治下篩以酒服方寸匕日二 一方有石髓六分當歸五分

酥蜜膏酒治肺虛寒癆風所傷語氣嘶塞聲息喘憊欬唾止氣嗽通聲方

酥 崖蜜 飴糖 生薑汁

生百部汁 棗肉 杏仁各一升研 甘皮五具末

右八味合和微火煎常攪二上三下約一炊久取薑汁等各減半止温酒一升服方寸匕細細咽之日二

夜一

又方

豬脬三具 大棗百枚

右二味以酒五升漬之秋冬七日春夏五日出布絞去滓七日服盡二七日忌鹽羊脬亦得治欬嗽胸脇支滿多喘上氣尤良 肘後方治久欬上氣二十年諸治不瘥者

治肺寒損傷氣嗽及涕唾鼻塞方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

棗肉 二升 作脂
白糖 白蜜 各一升
杏仁 一升 熬研為脂酥
生百部汁 各一升
生薑汁
補肺湯治肺氣不足逆滿上氣咽中悶塞短氣寒從背起口中如含霜雪言語失聲甚者吐血方
五味子 三兩
乾薑 桂心
欵冬花 各二兩
右七味合和微火煎常攪約一炊久下之細細温清酒服二合日二
麥門冬 一升 大棗 一百枚
粳米 二合
桑根白皮 一斤
右八味㕮咀以水一斗先煮桑白皮五沸下藥煮取三升分三服
又方
黄耆 五兩
甘草 鍾乳 人參 各二兩
乾地黄 桂心 茯苓 白石英
桑白皮 厚朴 乾薑 紫菀

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

橘皮 當歸
麥門冬 各三兩 大棗 二十枚
右十八味咬咀以水一斗四升煮取四升分五服日
三夜二
又方治肺氣不足欬逆上氣牽繩而坐吐沫唾血不能
飲食方
人參 甘草
藕子 一升 桑白皮 五兩 半夏 六兩 紫菀
五味子 杏仁 各二兩
欬冬花 射干 各一兩 麻黃 乾薑
桂心 各三兩 細辛 一兩半
右十四味咬咀以水一斗二升煮取三升半分五服
日三夜二
又方治肺氣不足欬逆短氣寒從背起口中如含霜雪
語無音聲而渴舌本乾燥方
五味子 藕子 各一升 白石英 鍾乳 各三兩
欬冬花 竹葉
橘皮 桂心

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桑白皮　茯苓
麥門冬　四兩　紫菀　二兩　各　粳米　二合
生薑　五兩　杏仁　五十枚　大棗　十枚
右十六味咬咀以水一斗三升先煮桑白皮粳米大棗米熟去滓内諸藥煮取五升分六服日三

又方治肺氣不足心腹支滿欬嗽喘逆上氣唾膿血胸心煩耳中聞風雨聲面色白方

欵冬花　桂心　二兩　各　桑白皮　一斤　生薑
五味子　鍾乳　三兩　各　粳米　五合　大棗　十枚
麥門冬　四兩
右九味咬咀以水一斗二升先煮粳米棗令熟去之内藥煎取二升分三服温服之一方用白石英二兩

麻子湯治肺氣不足欵嗽膿血氣短不得臥方

麻子　一升
桑白皮　錫　各　一斤
人參　各二兩　紫菀　各一兩　桂心　生薑　三兩
廣濟用紫菀人參各二兩名紫菀湯

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾地黃 四兩

右九味㕮咀以酒一斗五升水一斗五升合煮取四升去滓煎治肺氣不足咽喉苦乾方

升分五服

錫煎治肺氣不足咽喉苦乾方

作錫任多少取乾棗一升去核熟擣水五升和使相得絞去滓澄去上清取濁者內飴中攪火上煎勿令堅令連連服如雞子大漸漸吞之日三夜二

治肺風氣痿絶四肢滿脹喘逆胸滿方

灸肺輸各二壯肺輸對乳引繩度之在第三椎下兩傍相去各一寸五分

肺與大腸俱虛

右手寸口氣口以前脉陰陽俱虛者手太陰與陽明經俱虛也病苦耳鳴嘈嘈時妄見光明情中不樂或如恐怖名曰肺與大腸俱虛也

小建中湯治肺與大腸俱不足虛寒乏氣小腹拘急腰痛羸瘠百病方

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:21
列印頁數：1060
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大棗 十二枚 生薑 桂心 各三兩 甘草 二兩 芍藥 六兩

右五味㕮咀以水八升煮取三升去滓内糖八兩煮

三沸分三服 肘後用黃耆人參各二兩名黃耆建中湯

肺勞第三 論灸法方

論曰凡肺勞病者補腎氣以益之腎王則感於肺矣人逆秋氣則手太陰不收肺氣焦滿順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣

麻黃引氣湯治肺勞氣喘鼻張面目苦腫方

麻黃 杏仁 生薑 半夏 各五分 紫蘇 四分 白前 細辛 桂心 各三分 橘皮 二分 石膏 八兩 竹葉 一切 升

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服

半夏湯治肺勞虛寒心腹冷氣逆遊氣胸脇氣滿從胸達背痛憂氣往來嘔逆飲食即吐虛乏不足方

半夏 一升 生薑 一斤 桂心 四兩 甘草

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

厚朴 各二兩　人參　橘皮　麥門冬 各三兩

右八味㕮咀以水一斗煮取四升分四服腹痛加當歸二兩

厚朴湯治肺勞風虛冷痰澼水氣晝夜不得臥頭不得近枕上氣胸滿喘息氣絶此痰水盛溢方

厚朴　麻黄　桂心　黄芩　石膏　大戟　橘皮 各二兩　枳實

甘草　秦艽　細辛 一兩　半夏 一升　生薑 一兩　大棗 十五枚　杏仁　茯苓 各三兩

右十六味㕮咀以水一斗三升煮取四升分五服

治喉痺氣逆欬嗽口中涎唾方

灸肺輸七壯亦可隨年壯至百壯

備急千金要方卷五十四

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷五十五　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

肺臟方

氣極第四　論灸法方

論曰凡氣極者主肺也肺應氣氣與肺合又曰以秋遇病為皮痺皮痺不已復感於邪内舍於肺則寒濕之氣客於六腑也若肺有病則先發氣氣上衝胸常欲自恚以秋庚辛日傷風邪之氣為肺風肺風之狀多汗若陰傷則寒寒則虛虛則氣逆欬欬則短氣暮則甚陰氣至溫氣生故甚陰畏陽氣晝日則瘥若陽傷則熱熱則實實則氣喘息上胸臆甚則唾血然陽病治陰陰病治陽陽是其表是以陰陽表裏衰王之源故知以陽調陰以陰調陽陽氣實則決陰氣虛則引善治病者初入皮毛肌膚筋脉則治之若至六腑五臟半死矣扁鵲曰氣絶不治喘奔一作而冷汗出二日死氣應手太

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:22
列印頁數：1063
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

陰太陰氣絶則皮毛焦氣先死矣

鍾乳散治氣極虛寒陰畏陽氣晝瘥暮甚氣短息寒亦治百病令人力强能飲食去風冷方

鍾乳 研別 乾薑 桔梗 茯苓 人參 各六銖 白朮 一兩 防風 栝蔞根 牡蠣 各二兩半 細辛 桂心 附子

右十二味治下篩酒服方寸匕日三漸加至二匕五十以上可數服得力乃止 千金翼云有冷加椒有熱加黄芩各三兩

黄耆湯治氣極虛寒皮毛焦津液不通虛勞百病氣力損乏方

黄耆 四兩 人參 白朮 桂心 各二兩 生薑 八兩 大棗 十枚 附子 三十銖一方不用

右七味㕮咀以水八升煮取三升去滓分四服

大露宿圓治氣極虛寒皮癖不已内舍於肺寒氣入客於六腑腹脹虛滿寒冷積聚百病方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

礬石 附後作礬石 乾薑 桂心 皂莢

桔梗 附子 各三兩

右六味為末蜜丸梧子大酒服十丸日三漸加之慎飲食方

硫黃圓治氣極虛寒澼飲胸中痰滿心腹痛氣急不下熱及近火等

硫黃 礬石 乾薑 附子

烏頭 桂心 細辛 白术

桔梗 茯苓 各二兩

右十味為末蜜丸如梧子酒服十丸日三漸加之以止為度 附後無白术桔梗茯苓用吳茱萸蜀椒人參皂莢當歸十二種為丸用治人大冷夏月溫飲食不鮮衣者

大前胡湯治氣極傷熱喘息衝胸常欲自恚心腹滿痛内外有熱煩嘔不安方

生薑 五兩 前胡 八兩 黃芩 三兩 半夏 麻黃 芍藥 各四兩 枳實 四枚 大棗 十二枚

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右八味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服温
竹葉湯治氣極傷熱氣喘甚則唾血氣短乏不欲食口
燥咽乾方
竹葉 二升 麥門冬 小麥
生地黄 各一升 生薑 甘草 一兩 大棗 十枚
石膏 各六兩 麻黄 三兩
右九味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服
灸法
論灸法方
積氣第五
論曰七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣凡七
種氣積聚堅大如杯若栝在心下腹中疾痛不能飲食
時來時去每發欲死如有禍祟此皆七氣所生寒氣即
嘔逆惡心熱氣即説物不竟而迫怒氣即上氣不可忍
七壯
文腹中雷鳴相逐食不化逆氣灸上管下一寸名太倉
嘔吐上氣灸尺澤不三則七壯尺澤者在腕後肘中横

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熱痛上搶心短氣欲死不得息恚氣即積聚在心下不得飲食喜氣即不可疾行不能久立憂氣即不可劇作暮臥不安愁氣即喜忘不識人語置物四方還取不得去處若聞急即四肢腑腫手足筋攣捉不能舉如得病此是七氣所生男子卒得飲食不時所致婦人即產後中風諸疾也

七氣圓方

烏頭 大黃 各七分 紫菀 半夏

前胡 細辛 丹參 茯苓

芎藭 桃仁 胡洽作杏仁 葛蒲 一作芍藥 石膏

吳茱萸 桂心 各三分 桔梗 人參

甘草 防葵 各一兩 乾薑 蜀椒 各半兩

右二十味為末蜜丸如梧子大酒服三丸日三加至十丸一方去半夏加甘遂三分 胡洽無丹參甘草

七氣圓主七氣七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣此之為病皆生積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:24
列印頁數：1067
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

食時去時來發則欲死凡寒氣狀吐逆心滿熱氣狀恍惚眩冒失精怒氣狀不可當熱痛上盪心短氣欲絶不得息恚氣狀積聚心滿不得食飲喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不可苦作臥不安席愁氣狀平故如怒喜忘四肢腑腫不得舉止亦治産後中風餘疾方

大黄 二兩半 人參 半夏 吳茱萸

柴胡 乾薑 細辛 桔梗

葛蒲 各二分 茯苓 芎藭 甘草

蜀椒 一用桂心 石膏 桃仁 各三分

右十五味為末蜜丸如梧子大每服酒下三丸日三服漸加至十丸 千金翼十味無茯苓芎藭甘草石膏桃仁

七氣湯治寒氣熱氣憂氣勞氣愁氣氣或飲食為膈氣或勞氣内傷五臟不調氣衰少力方

乾薑 黄芩 厚朴 深師作桂心 半夏

甘草 乾地黄 芍藥

栝蔞根 各二兩深師作橘皮 蜀椒 三兩深師作桔梗 枳實 五枚

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:25
列印頁數：1068
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人參 一兩 吳茱萸 五合

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服日三

又方治虛冷上氣勞氣等方

半夏 一升 人參 生薑 桂心 甘草 各一兩

右五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服日三

五膈圓治憂膈氣膈食膈飲膈勞膈五病同三服以憂

恚思慮飲食得之若冷食及生菜便發其病若心滿不

得氣息引背痛如刺之狀食即心下堅大如粉絮大痛

欲吐吐即瘥飲食不得下甚者及手足冷上氣欬逆喘

息短氣方

麥門冬 甘草 各五兩 蜀椒 遠志 各三兩 桂心 細辛 各三兩 附子 一兩半 人參 四兩

乾薑 二兩

右九味為末蜜和丸微使淳先食含如彈丸一枚細

細咽之喉中胸中當熱藥力稍盡復含一丸日三夜

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:25
列印頁數：1069
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

二服藥七日愈 延年方云若不能含者可分一大丸作七小圓盡服之夏月含益麥門冬甘草人參胡洽云亦可梧子大十丸酒服之經心録以吳茱萸代桂心酒服如梧子五丸空腹服之治寒冷則心痛咽中有物吐之不出咽之不入食飲少者

治結氣冷癥積在脇下及脚氣上入小腹腹中脹滿百病方

大蒜去心皮三升擣令極熟以水三升和令調絞取汁更擣餘滓令熟更以水三升和令調絞取汁更擣餘滓令熟更以水三升和令調絞取汁合得九升所得滓可桃顆大棄却以微火煎取三升下牛乳三升合煎取三升旦起空腹一頓温服令盡至申時食三日服一劑三十日服十劑止

大蒜煎治疝瘕積聚冷癖痰飲心腹脹滿上氣欬嗽刺風風癲偏風半身不隨腰疼膝冷氣息否塞百病方

蒜 六斤四兩去皮切水四斗煮取一斗去滓
酥 一升內蒜汁中
牛乳 二升
葷菱 胡椒 乾薑 各三兩
石蜜
阿魏 戎鹽 各二兩
石葛蒲 木香 各一兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:25
列印頁數：1070
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾蒲桃 四兩
右十二味為末合内蒜汁中以銅器微火煎取一斗
空腹酒下一兩五日已上稍加至三兩二十日覺四
體安和更加至六兩此治一切冷氣甚良
桔梗破氣圓治氣上下否塞不能息方
桔梗 橘皮 乾薑 厚朴
枳實 細辛 苓蘑 各三分
白术 各六分 胡椒 蜀椒 烏頭 各七分 吳茱萸
蓽茇 十分 人參 桂心 附子
茯苓 前胡 防葵 芎藭 各五分
甘草 大黄 檳榔 當歸 各八分
右二十四味為末蜜丸如梧子大每服酒下十丸日
三有熱者空腹服之
檳榔湯治氣實若積聚不得食息方
檳榔 三枚七 附子 一枚一 半夏 一升 細辛 一兩
生薑 八兩 大黄 紫菀 柴胡 各三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

橘皮 甘草 二兩 紫蘇子 冬用 茯苓 各二兩

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升分三服相去如人行十里久若有癥結堅實如石加鼈甲二兩防葵二兩氣上加桑白皮切二升枳實厚朴各二兩消息治積年患氣發作有時心腹絞痛忽然氣絶腹中堅實醫所不治復謂是蠱方

檳榔 大者四枚 附子 一枚 半夏 一升 柴胡 三兩

右四味㕮咀以水七升煮取三升分四服日三夜一服

生薑 八兩 橘皮 甘草 桂心 各二兩

當歸 枳實 各二兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服五日一劑半夏湯治逆氣心腹滿氣上胸脇痛寒冷心腹痛嘔逆及吐不下食憂氣結聚方

半夏 一升 生薑 桂心 各五兩 橘皮 四兩

右四味㕮咀以水七升煮取三升分四服日三夜一服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人强者作三服亦治霍亂後吐逆腹痛

又方治逆氣心中煩滿氣悶不理氣上方見第十六卷

嘔吐篇四味者是

貝母湯治上氣咽喉窒塞短氣不得臥腰背痛胸滿不得食面色萎黃方

貝母 一兩 生薑 五兩 桂心 麻黃

石膏 甘草 各二兩 杏仁 三十枚 半夏 五合

右八味㕮咀以水一斗煮取三升分為三服日三

欽定四庫全書

麻黃湯治上氣脉浮欬逆喉中水雞聲喘息不通呼吸欲死方

麻黃 八兩 甘草 四兩 大棗 三十枚

射干 如博棊子二枚

右四味㕮咀以井花水一斗煮麻黃三沸去沫内藥

煮取四升分四服日三夜一

奔氣湯治大氣上奔胸膈中諸病發時迫滿短氣不得

臥劇者便悁欲死腹中冷濕氣腸鳴相逐成結氣方

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:27
列印頁數：1073
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生薑一斤 半夏 人參 甘草各三兩 桂心五兩 吳茱萸各一升

右六味㕮咀以水一斗煮取三升分四服

枳實湯下氣治胸中滿悶方

枳實三枚 附子二枚 大棗十四枚 半夏五兩 厚朴各二兩 人參 甘草 白朮 乾薑

右九味㕮咀以水七升煮取二升半每服八合日三

下氣治氣滿腹脹方

半夏一升 生薑一斤 人參一兩半 橘皮三兩

右四味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服日三

一方無人參止三味

治氣兩脇滿急風冷方

杏仁 茯苓 防葵各八分 橘皮 桂心 防風 澤瀉各五分 白朮 射干 芍藥 蘇子

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:27
列印頁數：1074
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桔梗　枳實　各六分

右十四味為末蜜丸梧子大酒服十丸日二加至三十丸

治氣滿閉塞不能食喘息方

訶梨勒十枚為末蜜丸如梧子食後服三丸不忌得利即止

治上氣欬逆方

蘇子　一升　五味子　五合　麻黃　細辛　桔梗　各五兩一方作桔梗

右五味咬咀以水七升煮取三升分三服

治熱發氣上衝不得息欲死不得臥方

橘皮　生薑　紫蘇　人參　桂心　當歸　各二兩　生薑　五兩　半夏　三兩　紫苑　人參　黃芩　甘草　各二兩

右十二味咬咀以水一斗煮取三升分作三服

治氣上不得臥神祕方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桂心 兩半
白鮮皮
白石英
麥門冬
枳實

白鮮皮 貝母
天門冬 兩各二半
車前子 兩二
人參
茯神
檳榔仁
前胡

橘皮 白薇
杏仁 兩各一半
郁李仁 兩三

桃仁 分五

日二加至三十丸

右十七味為末蜜和丸如梧子大以竹葉飲服十丸

竹葉飲法

竹葉 紫蕤子 升各一
紫菀
白前 兩各二

百部 甘草
生薑 兩各三

右七味咬咀以水八升煮取三升温下前丸藥盡更

合

人參湯安食下氣理胸脇并治客熱方

人參 麥門冬
乾薑
當歸

茯苓 甘草
五味子
黄耆

芍藥 枳實 兩各二
桂心 兩三
半夏 升一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大棗十五枚

右十三味㕮咀以水九升煮取三升去滓每服九合

從旦至晡令盡皆熱服慎勿冷

海藻橘皮圓下氣治風虛支滿膀胱虛冷氣上衝肺息奔令咽喉氣悶徃來方

海藻 橘皮 白前 各三分 杏仁

茯苓 芍藥 桂心 各五分 藕子五合

桑肉 桑根白皮 昆布 各二兩 吳茱萸

人參 白朮 葶藶 各一兩

右十五味為末蜜丸如梧子大飲服十丸日二加至十五丸以利小便為度

治氣上方

硇砂 細辛 牛膝 各等分

右三味末氣發酒服方寸匕後三日忌酒餘禁如藥法

治上氣方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

上酥一升　獨頭蒜五顆

右二味先以酥煎蒜黃出之用生薑汁一合共煎令熟空腹溫服一方寸匕

治上氣嘔吐方

芥子二升為末蜜丸寅時以井花水服如梧子七丸日二亦可作散空腹服之及有酒浸服并治臍下絞痛

治勞氣方

小芥子三升擣末絹袋盛酒三斗浸之密封七日去滓溫服半升漸至一升半得方更合忌如藥法

治上氣三十年不瘥方

大棗　杏仁各一百二百粒　豉一百十粒　蜀椒二百粒

右四味先擣杏仁豉令熟後內棗椒更擣為丸如棗

核大含稍稍咽之日三夜一

治積年上氣不瘥垂死者方

萇菪子　熬令色變　熟羊肝　薄切曝乾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味各擣等分以七月七日神酢拌令相著夜不食空腹服二方寸匕須拾針兩食間以冷漿白粥二匕止之隔日一服永瘥四十日内得煮飯汁作蕪菁羹食之已外一切禁斷

下氣方

生薑 五兩
小麥 一升

右二味以水七升煮取一升頓服

又方大棗 二七枚
紫蘇莖葉 切一升

右二味以酒三升煮取一升半分再服水煮亦得一方加橘皮半兩 肘後方無桑用橘皮

治氣方

桃皮二斤去黃者㕮咀以水五升煮取三升每服一升瘥止

升瘥止

又方酒服驢脂二合日二瘥止

又方黃牛乳二升煎取一升和生乳一升空腹服之日二

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:30
列印頁數：1079
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方驢乳初服三合三日後日別五合後至七合七日後至一升忌葵菜猪魚油等

又方尿空腹服百日即止治一切病

又方烏牛尿空腹服日再至三升止

補氣虛逆方

大棗 三升 去脉 甘皮 十具 乾薑 二兩 乾地黃 八兩

右四味治下篩酒四升漬棗三宿漉出棗取酒為炊汁將棗内甑中微火蒸令棗膏入釜中酒裹煎酒令餘二升許候甑中棗只留皮核在乃止火貯器中將前散及熱下攪令調大署與糖相似以酒服二合日再此方非止補氣亦通治一切短氣并形體羸瘦甚良

大補氣方

乾地黃 五兩 甘草 秦椒 各一兩 乾薑

昆布 地骨皮 各四兩 白朮 桂心

人參 厚朴 海藻 各三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

羊腎 一具去膏四枚 羊肚 一具治如食法去膏臀

右十三味治下篩内羊肚中合腎縫塞肚口蒸極熟為度及熱水白合擣取肚腎與藥為一家曝乾更擣為散酒服方寸匕日二

白石英散明目利小便治氣及補五勞七傷無所不治方

煉成白石英十兩 白石英無多少以鎚子礎上細碾向明選去麤翳色暗黑黃赤者惟取白淨者為佳擣絹下之麤器中研令極細熟以生絹袋於銅器中水飛之如作粉法如此三度研訖澄之漸漸去水水盡至石英曝得乾看中有粗惡不淨者去之取中央好者在下有粗惡者亦去之更研堪用者使熟白絹袋子盛著麤椀中以麤椀蓋之於三斗米下蒸之飯熟訖出取懸之使乾更於麤器中研之為成

澤瀉 茯苓 橘皮 各一兩 菟絲子 三兩 石斛 蔥蓉 各六分

右七味治下篩總於麤器中研令相得重篩酒服方寸匕日二不得過之猪魚鵝鴨蒜冷酢滑補傷散治肺傷善泄欬善驚恐不能動筋不可遠行膝不可久立汗出鼻乾少氣喜悲心下急痛痛引胸中臥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不安席忽忽喜夢寒熱小便赤黃目不遠視唾血方

天門冬一升 防風 澤瀉 人參

阿膠兩各一半 栝蔞根 前胡 芍藥

石膏 乾薑 大豆卷兩各二 紫菀

白斂兩各一 桂心 白朮兩各四 乾地黃

甘草 薯蕷 當歸兩各二半

右十九味治下篩食上酒服方寸匕日三

白石英圓補養肺氣方

白石英一作白石脂 陽起石 磁石

菟絲子 蔾蓉 乾地黃兩各二半 石斛

栝蔞根 白朮 五味子兩各二 防風

巴戟天分各五 桂心 人參兩各一 蛇床子兩半

右十五味為末蜜丸如梧子酒下十五丸加至三十

丸日二服

理氣圓治氣不足方

杏仁 桂心兩各一 乾薑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

益智子 各二兩

右四味為末蜜丸如梧子未食服三丸以止為度

治冷氣氣短方

蜀椒五兩絹袋盛酒一斗浸二七日服之任意多少

治讀誦勞極疲乏困頓方

酥 油 糖 酒 白蜜 各二升

右五味合於銅器中微火煎二十沸下之為準七日

七夜服令盡宜慎生冷

又方人參 甘草 茯苓 當歸 各二兩 地骨皮 芎藭 芍藥 乾地黃 各三兩 大棗二十枚

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服一方用桂

治卒短氣方

搗韭汁服一升立瘥 肘後方治卒上氣鳴息便欲絶

心三兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:31
列印頁數：1083
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治乏氣方

生薑　枸杞葉　各二兩

右二味咬咀以水三升煮取一升頓服

治少年房多短氣方

豉七合　梔子二七枚

右二味以水二升煮豉取一升半去豉内梔子煮取八合服半升不瘥更服

灸法

凡上氣冷發腹中雷鳴轉叫嘔逆不食灸太衝不限壯數從痛至不痛從不痛至痛止

上氣厥逆灸胸堂百壯穴在兩乳間

胸膈中氣灸闕輸隨年壯扁鵲云第四椎下兩傍各一寸半名闕輸

心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食不消腸鳴泄利灸太倉百壯太倉穴一名胃募在心下四寸乃胃管下一寸

結氣囊裹針藥所不及灸肓募隨年壯肓募二穴從乳頭即度至臍中屈去半從乳下行度頭是穴

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:32
列印頁數：1084
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下氣灸肺輸百壯又灸太衝五十壯

凡臍下絞痛流入陰中發作無時此冷氣灸關元百壯

穴在臍下三寸

短氣不得語灸天井百壯穴在肘後兩筋間　又灸大椎隨年壯　又灸肺輸百壯　又灸肝輸百壯　又灸尺澤百壯　又灸小指第四指間交脉上七壯　又灸手十指頭合十壯　少年房多短氣灸鳩尾頭五十壯　又鹽灸臍孔中二七壯

乏氣灸第五椎下隨年壯

論曰凡卒厥逆上氣氣攻兩脇心下痛滿奄奄欲絶此為奔豚氣即急作湯以浸兩手足數數易之

奔豚灸氣海百壯穴在臍下一寸半　又灸關元百壯

穴在臍下三寸　奔豚灸期門百壯穴直兩乳下第二脇端傍一寸五分

奔豚腹腫灸章門百壯章門一名長平二穴在大橫外直臍季脇端　奔豚搶心不得息灸中極五十壯中極

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

一名玉泉在臍下四寸

奔豚上下腹中與腰相引痛灸中府百壯穴在乳上三

肋間　奔豚上下灸四滿二七壯穴俠丹田兩傍相去

三寸即心下八寸臍下橫文是也

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:33
列印頁數：1086
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷五十六

詳校官太醫院醫士臣程 泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄監生臣張若湘

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷五十六　唐　孫思邈　撰

肺臟方

宋　林億等　校正

肺癆第六　方論

論曰寸口脉數其人病欬口中反有濁唾涎沫出何也師曰此為肺癆之病何從得之師曰病熱在上焦因欬為肺癆或從汗出或從嘔吐或從痟渴小便利數或從便難數被駃藥下重亡津液故得肺癆又寸口脉不出而反發太陽脉早索陰脉不澀三焦踟躕入而不出陰脉不澀身體反冷其內反煩多唾脣燥小便反難此為肺癆傷於津液便如爛爪下如豚腦但坐發汗故也其病欲欬不得欬欬出乾沫久久小便不利其脉平弱肺癆吐涎沫而不欬者其人不渴必遺溺小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩師曰肺癆欲唾咽燥欲飲者自愈自張口者短氣也

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:34
列印頁數：1088
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甘草乾薑湯濕臟治肺痿多涎唾小便數肺中冷必眩不渴不欬病若渴者屬上虛下不能制溲服此湯已小溫覆之方

甘草 四兩 乾薑 二兩 棗驗肘後有大棗十二枚

右二味㕮咀以水三升煮取一升半去滓分二服

甘草湯治肺痿涎唾多出血心中溫溫液液方 千金翼名溫液湯

甘草二兩㕮咀以水三升煮取一升半去滓分三服

生薑甘草湯治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴方

生薑 五兩 甘草 四兩 人參 三兩 大棗 十二枚

右四味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服

桂枝皂莢湯治肺痿吐涎沫不止方 去芍藥加皂莢

桂枝 生薑 各三兩 甘草 二兩 皂莢 一兩

右五味㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服

大棗十五枚

麻黃湯治肺脹欬而上氣咽燥而喘脉浮者心下有水

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

方

麻黃 芍藥 生薑（仲景用乾薑） 細辛 桂心（各三兩） 半夏 五味子（各半升） 石膏（四兩） 加石膏湯用甘草三兩為九味 肺癰第七（方論） 右八味咬咀以水一斗煮取三升分三服（仲景名此為小青龍）

論曰病欬唾膿血其脉數實者屬肺癰虛者屬肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿若口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛脉反滑數此為肺癰也問曰病者欬逆師脉之何以知為肺癰當有膿血吐之則死後竟吐膿死其脉何類何以別之師曰寸口脉微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脉風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿已成則難治寸口脉數趺陽脉緊寒熱相搏故振寒

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:34
列印頁數：1090
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

而欬跌陽脉浮緩胃氣如經此為肺癰師曰振寒發熱寸口脉滑而數其人飲食起居如故此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之不應愈也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令膿在胸中者為肺癰其脉數欬唾有膿血設膿未成其脉自緊數緊去但數膿為已成也

桔梗湯治欬胸中滿而振寒脉數咽乾而不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥是為肺癰者方

桔梗 三兩 古今錄驗用二兩 一兩 甘草 二兩

膿血也 一方有欬冬花一兩半

葶藶 三兩為末 大棗 二十枚

瀉肺湯治肺癰喘不得臥方

右二味先以水三升煮棗取二升去棗内藥一棗大

右二味咬咀以水三升煮取一升去滓分二服必吐

癰胸脇脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭欬

煎取七合頓服令盡三日服一劑可至三四劑治肺

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

逆上氣喘鳴迫塞未進此方宜先服小青龍湯却服
前藥其青龍湯方在十八卷
黃昏湯治欬有微熱煩滿胸心甲錯是為肺癰者方
黃昏手掌大一片是合昏皮也咬咀以水三升煮取
一升分二服
又方
薏苡仁　瓜瓣　半升　桃仁　五十枚
葶藶　切二升　水二斗　煮取五升去滓
右四味咬咀內葶汁中煮取二升服一升當有所見
吐膿血
飛尸鬼疰第八　論一方　灸法
論曰凡諸心腹痛服衆方熱藥入腹寂然不動但益氣
息急者此尸疰病也宜先服甘草汁一升消息少時服
瞿麥湯盡一劑得下便覺稍寬并暴癥堅結宿食及女
人血堅痛發作無定者神良
五疰湯治卒中賊風遁尸鬼邪心腹刺痛大脹急方

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:36
列印頁數：1092
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大黃 甘草各三兩 烏頭十枚 生薑 當歸各二兩 芍藥各二兩 蜜各一斤 桂心四兩

右八味咬咀別漬大黃以水九升煮取三升烏頭別內蜜中煎令得一升拌湯中去滓分服三合如人行三十里久更進一服日三不止加至四合

蜈蚣湯治惡症邪氣往來心痛徹背或走入皮膚移動不定苦熱四肢煩疼羸乏短氣方

蜈蚣一枚 牛黃一分 大黃二兩 丹砂

人參各三分 細辛 桂心 乾薑各一兩 附子四枚 香分三服

右十三味咬咀以水一斗煮取三升去滓下牛黃麝

鬼臼 當歸 黃芩 麝香各半兩

治卒中惡賊風寒冷入腹便絞痛或飛尸遁尸發作無時搶心胸滿脇痛如刀刺口噤者方

甘草 乾薑 茯苓 乾地黃

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

羊脂　當歸　細辛各一兩　芍藥
吳茱萸　桂心各二兩　栀子仁十五枚
右十一味咬咀以水八升煮取三升去滓内脂烊盡
分三服欲利者加大黄三兩
治卒中惡風角弓反或飛尸遁尸心腹絞痛者方
甘草各一兩　吳茱萸　桂心　乾薑
芍藥各二兩　栀子仁十四枚　芎藭　當歸
乾地黄　茯苓
三兩
羊脂三兩當歸人參芍藥各一兩心腹堅急加大黄
右十味咬咀以水八升煮取三升分三服痛甚者加
桃皮湯治中惡氣心腹痛胸脇脹滿短氣方
桃白皮一握東引者　真珠　附子各一兩
栀子仁十四枚　當歸三兩　吳茱萸　豉各五合
桂心二兩
右八味咬咀以水五升煮取二升去滓内真珠末分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

作二服一方無當歸以下四味

桃奴湯治中惡諸尸蠱疰心腹卒絞痛方

桃奴　當歸　芎藭　甘草 各三兩　人參　乾薑 各二兩　丹砂　麝香　桂心 各一兩　鬼箭羽　茯苓　犀角

右十二味㕮咀以水九升煮取二升半去滓分二服未食服大便不通腹滿者加大黃三兩芒硝二兩 胡洽有雄黃一兩無丹砂芎藭

治卒中風寒冷溫氣入腹虛脹急滿搶心胸脇乂痛氣息不通脉弦緊汗不出及得傷寒方

吳茱萸　當歸　麻黃　獨活　茯苓 各二兩　桂心　甘草　桔梗　青木香　石膏　大黃　犀角 各三兩

右十二味㕮咀以水九升煮取三升分三服日三

治風冷氣入腹忽絞痛緊急如吹大小便閉小腹有氣結如斗大脹滿起其脉弦老者沉遲方

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:37
列印頁數：1095
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

瞿麥 當歸
桔梗 防己
芎藭 各二兩 桂心
一用犀角二兩

右十一味㕮咀以水九升煮取三升分三服

猪苓 鬼箭羽
海藻 吳茱萸
大黃 各三兩

治諸雜症相連續死亦治三十年衆症方

桃根白皮一斤㕮咀以水二斗煮取一斗去滓分八服須令二日服盡 崔氏用桃根白皮治症在心腹痛不可忍者

九

又方搗桃仁二七枚研酒服

又方小芥子末雞子白和傅

尸症鬼症者即五尸之中尸症又挾諸鬼邪為害者也

其變動乃有三十六種至九十九種大畧令人寒熱淋瀝沉沉默默不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後復症易傍人乃至滅門覺如此候者宜急療之方

獺肝一具陰乾治下篩水服一方寸匕日三如一具

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:37
列印頁數：1096
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不瘥更作

小附著散治飛尸賊風發時急痛不在一處針則移發

一日半日乃瘥須臾復發者方

細辛 甘草 一作莽草 各一 桂心 三分

附子 烏頭 乾薑 各一兩 雄黃

真珠 各半兩

右九味治下篩酒服方寸匕不知稍增以知為度 胡洽有蜀椒四分不用桂心附子

大附著散治五尸疰忤與前狀同者方

黃芩 由跋 椒目 細辛

雄黃 乾薑 黃連 各一兩 金牙

屑角 麝香 牛黃 各一分 天雄

桂心 各半兩 真珠 三分 蜈蚣 一枚

右十五味治下篩酒服一錢匕日三以知為度

大金牙散治一切疰病 方見別卷中

金牙散治鬼疰風邪鬼語尸疰或在腰脊胸脇流無常

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

處不喜見人志意不定面脫色目赤鼻張唇乾甲黃者

方

金牙　雄黃　鐵精　野葛

露蜂房　芎藭　大黃　甘草

曾青　蛇蜕皮　真珠　丹砂

藺茹　乾漆　各一分　石長生　狸骨　一作鷄骨　一

桔梗　鬼臼　鬼箭羽　鬼督郵

椒目　烏頭　狼毒　蕪荑

黎蘆　雷丸　鼈甲

滑石　各二作消石分　毒公　各三分　胡燕屎　牛黃　各三分

人參　狼牙　各四分　寒水石　桂心

石膏　五分　蜈蚣　各一枚　蜥蜴　附子　各一枚

蜣蜋　亭長　各七枚　元青　徐長卿

斑猫　四枚各十枚　貝母　二枚

右四十五味治下篩先食以酒服一刀圭日再不知漸加之蟲隨大小便出　崔氏名蜀金牙散

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白术散治風入臟腑悶絶常自躁痛或風症入身冷症鬼症飛尸惡氣腫起或左或右或前或後或内或外針灸流移無有常處驚悸腹脹氣滿心頭痛或恍惚悲懼不能飲食或進或退陰下濕癢或大便有血小便赤黄房中勞極方

白术 十四枚 附子 秦艽 人參 牡蠣 蜀椒 細辛 黄芩 芎藭 牛膝 各三分 乾薑 桂心 防風 各五分 茯苓 桔梗 當歸 獨活 柴胡 各四分 烏頭 甘草 天雄 杜仲 各二分 麻黄 石南 莽草 栝蔞根

右二十六味治下篩平旦酒服五分匕訖如人行七里久勢欲解更飲酒五合為佳

太乙備急散治卒中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼癖及中蠱症吐血下血及心腹卒痛腹滿傷寒熱毒病六七日

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:39
列印頁數：1099
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

方

雄黃 桂心

蜀椒 各一兩 藜蘆 芫花 各二兩

附子 五分 巴豆 各一分 野葛 三分

右九味巴豆別治如脂餘合治下篩以巴豆合和更擣合和調置銅器中密貯之勿泄有急疾水服錢五匕可加至半錢匕老小半之病在頭當鼻衄在膈上吐在膈下利在四肢當汗出此之所為如湯沃雪手下皆愈方宜祕之非賢不傳

龍牙散治百症邪鬼飛尸萬病方

龍牙 茯苓 各二兩半 雄黃 棗膏

芍藥 各五分 乾地黃 石斛

胡燕屎 各三分 鬼箭羽 烏頭 羌活

杏仁 防風 桃奴 鬼臼

露蜂房 曾青 真珠 桂心

鸛骨 各一兩 人參 大黃 各一兩半 白朮 二兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蕪子 四合
芎藭
狸陰 二具
右三十三味治下篩酒服一刀圭以知為度當有蟲
從大便出

銅鏡鼻
甘草
鬼督郵
遠志
橘皮
鼈甲 各半兩

蜈蚣 一枚

治鬼疰蠱疰毒氣變化無常者方

犀角
麝香
蜈蚣
鮫魚皮
丁香
丹砂
雄黃
鹿角

貝子 一枚

龍骨
蘘荷根
蜀椒
乾薑 各一分

右十三味治下篩酒服方寸匕加至二匕日三

備急散治卒中惡風氣忤迷絶不知人 方見別卷三味備急丸是

治暴心痛面無顏色欲死者方

以布裹鹽如彈丸大燒令赤置酒中消服之利即愈

治蠱疰方

燒猫兒屎灰水服之 用雄猫兒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黑奴散治卒得惡症腹脹方

釜下墨一合　鹽二合

右二味合治以水一升半煮取八合一服令盡須臾吐下即瘥

治哭症方

梳齒間刮取垢水服之

又方

亂髮一兩　臘月豬脂一合

右二味取豬脂煎髮令消烊服之蟲死矣

又方

熬大豆帛裹熨之

治一切病食症方　凡食上得病名為食症

取釜下土雞子大為末酢泔清一升和服之行五十步吐即瘥

又方還取本食種數多少相似各少許和合布裹燒灰

如杏仁大水服之

鸛骨圓治遁尸飛尸積聚胷痛連背走無常處或在臟

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:40
列印頁數：1102
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

或腫在腹或奄奄然而痛者方

蠐螬三寸 丹砂一作丹參 牡蠣一作牡丹 雄黃

莽草各四分 藜蘆 桂心 野葛各二分

斑猫芫青各十四枚 巴豆四十枚 蜈蚣一枚

右十二味為末蜜丸如小豆每服二丸日三以知為度

蜥蜴圓治癥堅水腫飛尸遁尸寒尸喪尸尸疰骨血相注惡氣鬼忤蛄毒邪氣往來夢寤存亡流飲結積虎狼

婦人邪氣鬼忤亦能遣之之方 方與積聚篇重

所齧痢犬所咋鴆毒入人五臟服藥以殺其毒毒即消

蜥蜴 蜈蚣各二枚 蟲蟲 杏仁各三十枚

地膽五十枚 蠐螬四十枚 朴硝 巴豆各七分

澤漆 鬼督郵 桑赤雞 桃奴

犀角各二分 乾薑四分 虎骨六分 甘草一兩

芍藥 甘遂各五分 欵冬花三分 蜣蜋十四枚

右二十味別治巴豆杏仁如膏内諸藥末研調下蜜

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

擣二萬杵丸如麻子大食前服三丸日一不下加之不取吐下者一丸旦服有人風冷痃癖堅二十年得愈

桔梗圓治毒痓鬼痓食痓冷痓痰飲宿食不消酒癖諸病

桔梗 藜蘆 皂莢 巴豆 附子 各二兩

右五味為末蜜和擣萬杵丸如梧子宿不食平旦飲服二丸仰臥服勿眠至食時膈上吐膈下下去惡物如科斗蝦蟇子或長一二尺下後當大虛口乾可作雞羹飲五合太極飲食粥一升三四日病未盡更服忌如藥法

十痓圓治十種痓氣痓勞痓鬼痓冷痓生人痓死人痓尸痓食痓水痓土痓等方

雄黃 巴豆 各二兩 人參 甘草 麥門冬 細辛 一作藁木 桔梗 附子

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

皂莢 蜀椒 各一兩

右十味末蜜丸如梧子大空腹服五丸日再稍加以知為度

太乙神明陷氷圓治諸病破積聚心下支滿寒熱鬼疰長病欬逆唾噫辟除衆惡鬼逐邪氣鬼擊客忤中惡胸中結氣咽中閉塞有進有退繞臍絞痛惻惻隨上下按之挑手心中愠愠如有蟲狀毒疰相染甚至滅門者方

雄黃 桂心 丹砂 礬石 各一兩 一作礬石

藜蘆 大黃 各二兩 元青 五枚 真珠

附子 各一兩半 麝香 人參 犀角

蜥蜴 各一枚 烏頭 八枚 杏仁 三十枚 斑猫

鬼臼 射罔 牛黃 各一兩 蜈蚣

樗雞 地膽 各七枚 當歸 三兩 巴豆 一分

右二十四味為末蜜和擣三萬杵丸如小豆先食服二丸日再不止稍增以藥二丸著門上令衆邪不近傷寒服之無不愈若至病家及視病人夜行獨宿服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

二丸衆邪不能近也 黃當歸只十二味與積聚篇重 胡洽無元青桂心真珠麝香人參犀角烏頭射岡蜥蜴楞雞牛

江南度世圓治萬病癥結積聚伏尸長病寒熱症氣流

行皮中久病著牀肌肉消盡四肢煩熱嘔逆不食傷寒

時氣惡症汗出口噤不開心痛方

蜀椒 三兩 人參 細辛 甘草 各二兩

茯苓 真珠 大黃 乾薑

丹砂 野葛 桂心 雄黃

麝香 鬼白 各六分 附子 紫菀 各六分 巴豆 六十枚 蜈蚣 二枚

右二十味為末蜜丸如小豆飲服二丸加至四丸日

二加獺肝一具尤良

大度世圓治萬病與前狀同者方

牛黃 大黃 雄黃 細辛

附子 真珠 甘草 人參

射岡 丹砂 鬼白 莽草 各一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蜀椒 麝香
桂心 紫菀 各二兩
蜥蜴 蜈蚣 各一枚
樗雞 三十枚 巴豆仁 八十枚
右二十六味為末蜜丸如小豆飲服二丸日二先食服之

治疰病相染易及霍亂中惡小兒客忤長病方

獺肝 一具 蜈蚣 一枚 麝香 一分 雄黃
莽草 丹砂 鬼白 犀角
巴豆 大黃 牛黃 各一兩
右十一味末蜜丸如麻子空腹服二丸至三丸以止為度

雷氏千金圓治行諸氣宿食不消飲食中惡心腹痛如刺及癚方

消石 三分 大黃 五分 桂心 乾薑 各二兩
巴豆仁 六十枚

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右五味為末擣三千杵蜜丸如大豆服二丸神驗無比已死者拆齒灌之

治卒得尸疰毒痛往來方

和丸

杏仁 亂髮灰 各等分

右二味研如脂丸如梧子每服酒下三丸日三 姚氏猪膏

治遁尸尸疰心腹刺痛不可忍者方

桂心 乾薑 各一兩 巴豆仁 二兩

右三味治下篩以上酢和如泥傅病上乾即易之

治遁尸尸疰心腹及身有痛處不得近者方

取艾小掇令碎著痛上厚一寸餘熱湯和灰令强熱置艾上冷即易不過二三度瘥

治遁尸飛尸又治暴風毒腫流入四肢頭面方

白芥子一升蒸熟擣以黃丹二兩攪和分作兩分用疎布袋盛更蒸使熱以薄痛上當更迭蒸袋常使熱薄之如此三五度即定

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治人皮膚中痛名曰癥痃症方

醋和燕窠土傅之

治走症方

燒車釭令熱暫入水以濕布裹熨病上

治三十年氣症方

豉心 升半 生椒 一合

右二味以水二升煮取半升適寒温用竹筒縮取汁令病者側臥手擘大孔射灌之少時當出惡物此法垂死悉治得瘥百千不可具説

灸法

凡五尸者飛尸遁尸風尸沉尸尸症也今皆取一方兼治之其狀腹痛脹急不得氣息上衝心胸傍攻兩脇或纍塊踊起或攣引腰背治之法灸乳後三寸男左女右可二七壯不止者多其壯數取愈止 又灸兩手大拇指頭各七壯 又灸心下三寸十壯 又灸乳下一寸隨病左右多其壯數 又以細繩量患人兩乳頭内

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:43
列印頁數：1109
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

即裁斷中屈之又從乳頭向外量使當肋罅於繩頭灸三壯或七壯男左女右卒症忤攻心胷灸第七椎隨年壯　又灸心下一寸三壯　又灸手肘文隨年壯一切病食症灸手小指頭隨年壯男左女右五毒症不能飲食百病灸心下三寸胃管十壯

水症口中涌水經云肺來乘腎食後吐水灸肺輸　又灸三陰交　又灸期門穴在乳下二肋間瀉肺補腎也各隨年壯一切症無新久先仰臥灸兩乳邊邪下三寸第三肋間隨年壯可至三百壯又治諸氣神良一名症市

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:43
列印頁數：1110
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷五十七 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

大腸腑方

大腸腑脉論第一

論曰大腸腑者主肺也鼻柱中央是其候也肺合氣於大腸大腸者為行道傳寫之腑也號監倉掾重二斤十二時定血脉和利精神千金明堂外臺貯水穀一斗二升主十二時定血脉和利精神千金明堂外臺二兩長一丈二尺廣六寸當臍右回疊積還反十二曲之少半十六曲盛穀一斗水七升半同難經云長二丈一尺大四寸徑一寸鼻遂以長以候

大腸

右手關前寸口陽絶者無大腸脉也若少氣心下有水氣立秋節即殺刺手太陰治陰在魚際間

右手關前寸口陽實者大腸實也若腸中切痛如針刀所刺無休息時刺手陽明治陽在手腕中瀉之

大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感于寒則泄當

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:44
列印頁數：1111
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉

腸中雷鳴氣上衝胷脇不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛上廉二里

大腸脹者腸鳴而痛寒則泄食不化

大腸有寒鶩溏有熱便腸垢

大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀

肺前受病移於大腸肺欬不已欬則遺失便利厥氣客於大腸則夢田野

肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裏大者

大腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結

扁鵲云手太陰與陽明為表裏大腸若病實則傷熱熱則脹滿不通口為生瘡食下入腸腸實而胃虛食下胃實而腸虛所以實而不滿乍實乍虛乍來乍去虛則傷寒寒則腸中雷鳴泄青白之利而發於氣水根在大腸 方見治水篇中

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大腸絶不治何以知之泄利無度利絶則死

手陽明之脉起於大指次指之端外側循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉上入肘外廉循臑外前廉上肩出髑骨之前廉上出柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸其肢者從缺盆直而上頸貫頰入下齒縫中還出俠口交人中左之右右之左上俠鼻孔是動則病齒痛頤腫是主津所生病者目黃口乾鼽衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣盛有餘則當脉所過者熱腫虛則寒慄不復盛者則人迎大三倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

大腸虛實第二　脉灸法　方

大腸實熱

右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也病苦腸滿善喘欬面赤身熱喉咽中如核狀名曰大腸實熱也

生薑泄腸湯治大腸實熱腹脹不通口為生瘡者方

生薑　橘皮　青竹茹　黃芩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

梔子仁 白朮 各三兩 桂心 一兩 茯苓 芒硝 各二兩 生地黃 十兩 大棗 十四枚

右十一味以水七升煮取三升去滓下芒硝分二服

治腸中臚脹不消方

灸大腸輸四十九壯

上廉主之

大腸有熱腸鳴腹滿俠臍痛食不化喘不能久立巨虛

大腸虛冷

右手寸口氣口以前脉陽虛者手陽明經也病苦胷中喘腸鳴虛渴脣乾目急善驚泄白名曰大腸虛冷也

黃連補湯治大腸虛冷痢下青白腸中雷鳴相逐方

黃連 四兩 茯苓 芍藥 各三兩

酸石榴皮 五片 伏龍肝 雞子大一枚 地榆 五兩

右六味以水七升煮取二升半去滓下伏龍肝末分

三服

治腸中雷鳴相逐痢下方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

灸承滿五十壯穴在俠巨闕相去五寸巨闕在心下一寸灸之者俠巨闕兩邊各二寸半

治腸中常鳴時上衝心方

灸臍中

食飲不下腹中雷鳴大便不節小便赤黃陽綱主之

腹脹腸鳴氣上衝胷不能从立腹中痛濯濯冬日重感於寒則泄當臍而痛腸胃間遊氣切痛食不化不嗜食身腫俠臍急夭樞主之腸鳴而痛温留主之

肛門論第三

論曰肛門者主大行道肺大腸候也號為通事令史重十二兩長一尺二寸廣二寸三分應十二時若臟傷熱則肛門閉塞大行不通或腫縮入生瘡若腑傷寒則肛門開大行洞寫肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之虛實和平依經調理方見別卷中

皮虛實第四 論方

論曰夫五臟六腑者内應骨髓外合皮毛膚肉若病從

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:46
列印頁數：1115
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

外生則皮毛膚肉關格強急若病從内發則骨髓痺疼然陰陽表裏外皮内髓其病源不可不詳之也皮虛者寒皮實者熱凡皮虛實之應主于肺大腸其病發於皮毛熱則應臟寒則應腑

蒴藋蒸湯治皮虛主大腸病寒氣關格方

蒴藋根葉 切 三升
桃葉皮枝 劉 三升
葛蒲葉 切 二升
細糠 一斗
秫米 五升

右五味以水一石五斗煮取米熟為度大盆器貯之

欽定四庫全書

於盆上作小竹牀子罩盆人身坐牀中四面周迴將席蔟障風身上以衣被蓋覆若氣急時開孔對中泄氣取通身接汗可得兩食久許如此三日蒸還温藥足汁用之若盆裏不過熱盆下安炭火非但治寒但是皮膚一切勞冷悉皆治之

梔子煎治皮實主肺病熱氣方

梔子仁 枳實 各二兩 柴胡 芒硝

大青 杏仁 生地黄

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:46
列印頁數：1116
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

淡竹葉一切各升 生玄參二兩五 石膏八兩

右十味以水九升煮取三升去滓下芒硝分為三服

欬嗽第五 論方 證炙法

論曰經云五臟六腑皆令欬肺居外而近上合於皮毛皮毛喜受邪故肺獨易為欬也邪客於肺則寒熱上氣喘汗出欬動肩背喉鳴甚則唾血肺欬經久不已傳入大腸其狀欬則遺糞腎欬者其狀引腰背痛甚則欬涎腎欬經久不已傳入膀胱其狀欬則遺尿肝欬者其狀左脇痛甚者不得轉側肝欬經久不已傳入膽其狀欬則清苦汁出心欬者其狀引心痛喉中介介如梗甚者喉痺咽腫心欬經久不已傳入小腸其狀欬則失氣脾欬者其狀左脇痛陰陰引肩背甚者不得動動則欬劇經久不已傳入胃其狀欬而嘔嘔甚則長蟲出久欬不已三焦受之三焦欬之狀欬而腸滿不能飲食此皆衆於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也右順時有風寒冷人觸冒觧脫傷皮毛間入腑臟為欬上氣如此

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:46
列印頁數：1117
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

也有非時忽然暴寒傷皮膚中與肺合則欬嗽上氣或胷脇乂痛欬唾有血者是其熱得非時之寒暴薄之不得漸散伏結深喜肺癰也因欬服温藥欬尤劇及壯熱吐膿血汗出惡寒是也天有非時寒者急看四時方也問曰欬病有十何謂也師曰有風欬有寒欬有肢欬有肝欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有厥陰欬之風欬飲冷食寒因之而欬謂之寒欬心下堅滿欬則肢痛其脉反遲謂之肢欬欬則引脇下痛謂之肝欬欬而唾血引手少陰謂之心欬欬而涎出續續不止引小腹謂之脾欬欬引頸項而唾涎沫謂之肺欬欬則耳無所聞引腰并臍中謂之腎欬欬而引頭痛口苦謂之膽欬欬而引舌本謂之厥陰欬風欬者不下之寒欬肢欬肝欬刺足太衝心欬刺手神門脾欬刺足太白肺欬刺手太泉腎欬刺足太谿膽欬刺足陽陵泉厥陰欬刺手太陵

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夫久欬為痰欬而時發熱脈在九一作卒弦者非虛也此為胷中寒實所致也當吐之

夫欬家其脈弦欲行吐藥當相人强弱而無熱乃可吐

耳欬家其人脈弦為有水可與十棗湯下之方見下不能久極飲過度所致也其脈沉者不可發汗久欬數歲其脈弱者可治實大數者死其脈虛者必善胃其人本有支飲在胷中故也治屬飲家上氣汗出而欬屬飲家欬而小便利若失溺不可發汗汗出即厥逆冷

夫病吐血喘欬上氣其脈數有熱不得臥者死寒家欬而上氣其脈數者死謂其人形損故也脈大而散散者為氣實而血虛名曰有表無裏上氣面腫肩息其脈浮大不治加痢尤甚上氣躁而喘者屬肺脹欲作風水發汗愈

小青龍湯治欬逆倚息不得臥方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麻黃　芍藥　細辛　桂心　乾薑　甘草各三兩　五味子　半夏各半升

右八味㕮咀以水一斗先煮麻黃減二升去上沫乃内諸藥煮取三升去滓分三服弱者服半升若渴去半夏加栝蔞根三兩若微痢去麻黃加薤花如雞子大若食飲噎者去麻黃加附子一枚若小便不利小腹滿者去麻黃加茯苓四兩若喘者去麻黃加杏仁半升

青龍湯下已多唾口燥寸脉沉尺脉微手足厥逆氣從小腹上衝胷咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者與茯苓桂心甘草五味子湯治其氣衝方

茯苓四兩　桂心　甘草各二兩　五味子半升

右四味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服温服衝氣即低而反更劇胷滿者用茯苓甘草五味子去桂心加乾薑細辛以治其劇滿方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

茯苓 四兩　甘草 乾薑 細辛 各三兩　五味子 半升

三

右五味咬咀以水八升煮取三升去滓温服半升日三

欬滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑為熱藥也服之當遂渴而渴反止者為支飲也支飲法當冒冒者必嘔嘔者復内半夏以去其水方

半夏 五味子 各半升　茯苓 四兩　細辛 乾薑 甘草 各二兩

右六味咬咀以水八升煮取三升去滓温服半升日三

水去嘔止其人形腫者應内麻黄以其人遂癖故不内麻黄内杏仁方

杏仁 五味子 半夏 各半升　茯苓 四兩　細辛 乾薑 甘草 各三兩

右七味咬咀以水一斗煮取三升去滓温服半升日

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三若逆而内麻黄者其人必厥所以然者以其人血虚麻黄發其陽故也

若面熱如醉此為胃熱上衝熏其面加大黄利之方

大黄 乾薑 細辛 甘草 各三兩 茯苓 四兩 五味子 半夏 各半升 杏仁 各一升

右八味㕮咀以水一斗煮取三升去滓温服半升日三

欬而上氣肺脹其脉浮心下有水氣脇下痛引缺盆設

若有實者必躁其人常倚伏小青龍加石膏湯主之

方

石膏 乾薑 桂心 細辛 各二兩 芍藥 甘草 各三兩 麻黄 四兩 半夏 半升 五味子 一升

右九味㕮咀以水一斗先煮麻黄減二升下藥煮取二升半强者服一升羸者減之小兒四合 仲景用治上氣煩躁而喘脉浮者心下有水外臺同 肺脹欬而

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

澤瀉湯治上氣其脉沉者方

澤瀉 三斤 細切 以東流水五斗 煮取一斗五升 去滓澄清 半夏 半升

生薑 紫菀 一作紫參 白前 各五兩 黄芩 甘草 桂心 人參 各三兩

右九味内澤瀉汁中煮取五升每服五合日三夜一

麥門冬湯下氣止逆治大逆上氣咽喉不利方

甘草 各二兩 大棗 二十枚 麥門冬汁 三升 半夏 一升 粳米 三合 人參

右六味以水一斗二升煮取六升去滓每服半升日三夜一

射干麻黄湯治欬而上氣喉中如水雞聲者方

射干 細辛 欵冬花 紫菀 各三兩 麻黄 生薑 各四兩 大棗 七枚 半夏

五味子 各半升

右九味咬咀以東流水一斗二升先煮麻黄去上沫内藥煮取三升去滓分三服日三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

厚朴麻黄湯治欬而大逆上氣胷滿喉中不利如水雞聲其脉浮者方

厚朴 五兩 麻黄 四兩 石膏 細辛 乾薑 各二兩 小麥 一升 杏仁 半升 五味子 各半升

右九味㕮咀以水一斗二升煮小麥熟去麥内藥煮取三升去滓分三服日三

麻黄石膏湯治上氣胸滿者方

麻黄 四兩 石膏 一枚雞子大 厚朴 五兩 小麥 一升 杏仁 半升

右五味以水一斗先煮小麥熟去之下藥煮取三升去滓分三服 深師用治久逆上氣喉中如水雞鳴名極湯欬者加五味子半夏各半升 乾薑三累

皂莢圓治欬逆上氣時時唾濁但坐不得臥方

皂莢八兩為末蜜丸如梧子大以棗膏和湯服三丸日三夜一 必效方以酥炙皂莢

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

十棗湯夫有支飲家欬煩胷中痛者不卒死至一百日一歲可與此方

大棗十枚 大戟 甘遂 芫花各等分

右大戟甘遂芫花擣為末以水一升五合煮棗取八合去滓内藥末強者一錢匕羸者半錢頓服之平旦服而不下者平旦更加藥半錢下後自然補養

欬而引脇下痛者亦十棗湯主之 方見前

溫脾湯治食飽而欬者方

甘草四兩 大棗二十枚

右二味㕮咀以水五升煮取二升分三服溫服之若咽中痛而聲鳴者加乾薑一兩

百部根湯治嗽不得臥兩眼突出方

百部根生薑各一斤 細辛甘草各三兩

貝母五味子白术各二兩 桂心四兩

麻黃六兩

右九味㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

古今録驗用杏仁四兩紫菀三兩

海藻湯治欬而下利胷中痞而短氣心中時悸四肢不欲動手足煩不欲食肩背痛時惡寒方

海藻四兩　五味子半夏各半升　生薑一兩　細辛二兩　茯苓六兩　杏仁五十枚

右七味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服日三

一方無五味子生薑

白前湯治水欬逆上氣身體浮腫短氣脹滿晝夜倚壁

不得臥咽中作水雞鳴方

白前　紫菀　半夏　大戟各二兩

右四味㕮咀以水一斗浸一宿明旦煮取三升分三服

治九種氣嗽欲死百病方

乾薑　半夏　細辛　紫菀

吳茱萸　蕘花一作芫花　茯苓　甘草

甘遂　防葵　人參　烏頭

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:51
列印頁數：1126
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大黃 杏仁 各一分 蔓蘼二分 巴豆
厚朴 白薇 各三分 五味子 遠志
前胡 葛蒲 枳實 蜀椒
皂莢 當歸 大戟 桂心 各半分

右二十八味為末蜜丸如梧子大先食服二丸日三

服以知為度不知增之

麻黃散治上氣嗽方

麻黃 半斤 杏仁 百枚 甘草 三兩 桂心 一兩

右四味治下篩別研杏仁如脂内藥末和合臨氣上

時服一方寸匕食久氣未下更服一方寸匕可至三

匕氣發便服即止一方去桂心甘草

太醫令王叔和所撰御服蜀椒圓治上氣欬嗽甚良方

蜀椒 五分 烏頭 杏仁 蒿蒲
礬石 一云礬石 皂莢 各一分 細辛 款冬花
紫菀 乾薑 各三分 吳茱萸 麻黃 各四分

右十二味為末蜜丸如梧子大暮臥吞二丸治二十

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

年久嗽不過二十丸

通氣圓治久上氣欬嗽咽中腥臭虛氣攪心痛眼疼耳

中嘈嘈風邪毒疰時氣食不生肌胷中膈塞嘔逆多唾

惡心心下堅滿飲多食少惡疰淋痛病方

飴糖 三升 蜀椒 二升 大附子 五枚 乾薑 七分 烏頭 十分 天門冬 十分

杏仁 一升 蜈蚣 五節 人參 四分 桂心 六分

右十味為末別治杏仁如脂稍稍内藥末濤千杵烊

糖乃内藥末中令調和含如半棗一枚日六七夜三

四服以胸中温如度若夢與鬼交通及飲食者全用

蜈蚣食不消加杏仁五合小腹急腰痛加天門冬杜

仲有風加烏頭三枚附子一枚立夏後勿加也有留

飲加葶藶一兩

治欬嗽上氣方

蜀椒 桂心 海藻 乾薑 細辛 各四分 海蛤 各四分 昆布 各六分 麥門冬 十分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右八味為末蜜丸梧子大飲服十丸加至二十丸日三服有人風虛中冷胷中滿上氣喉中如吹管聲吸吸氣上欲欬服此方得瘥

治欬嗽胷脇支滿多唾上氣方

礬石一作礬石一方不用 烏頭一分細辛 黄環各二分 款冬花 紫菀 杏仁各三分 葛蒲各一分 吳茱萸四分 乾薑五分 蜀椒五合

右十一味為末蜜丸梧子大每服一丸著牙上咽汁日五六服劇者常含不止

又方薑汁一升半 砂糖五合

右二味煎薑汁減半内糖更煎服之

又方白糖五分 皂莢末一方寸匕

右二味先微暖糖令消内皂莢末合和相得丸如小豆先食服二丸

又方酒一升半浸肥皂莢兩挺經宿煮取半升分三服七日忌如藥法若吐多以酢飯三四口止之

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:52
列印頁數：1129
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方巴豆炮去皮勿傷破肉白飲吞下初日二枚二日三枚

又方服芥子七丸以油酒下之

射干煎治欬嗽上氣方

生射干 欵冬花 各二兩 紫菀 細辛

桑白皮 附子 甘草 各二分 白蜜

竹瀝 生薑汁 各一升一云乾薑五兩 飴糖 五兩

右十一味以射干先内白蜜并竹瀝中煎五六沸去之叹咀六物以水一升合浸一宿煎七上七下去滓乃合飴薑一汁煎如餹服如酸棗一丸日三劇者夜二不止加之以止為度

杏仁煎治冷嗽上氣鼻中不利方

杏仁 五合 五味子 欵冬花 各三合 紫菀 乾薑 各二兩 桂心 三兩 甘草 四兩 麻黄 一升

右八味以水一斗煮麻黄取四升治諸藥為末又内膠飴半斤白蜜一斤合内汁中攪令相得煎如飴先

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:52
列印頁數：1130
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

食服如半棗許日三服不知加之以知為度

又方治忽暴嗽失聲語不出方

杏仁 薑汁 砂糖 蜜 各一升

五味子 紫菀 各三兩 通草 貝母 各四兩

桑根白皮 五兩

右九味�mouth咀以水九升煮取三升去滓内杏仁脂薑汁蜜糖和攪微火煎取四升初服三合日再夜一後稍加

欽定四庫全書

通聲膏方

五味子 欵冬花 通草 各三兩 人參

細辛 青竹皮 桂心 葛蒲 各二兩

杏仁 薑汁 各一升 白蜜 二升 棗膏 三升 酥 五升

右十三味㕮咀以水五升微火煎三上三下去滓内薑汁棗膏酥蜜煎令調和酒服棗大一丸

備急千金要方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杏仁 四十枚
紫蘇子 一升
橘皮 一兩
柴胡 四兩

右四味㕮咀以水一斗煮取三升分三服常作飲服

蘇子煎治上氣欬嗽方

蘇子 生薑汁 地黃汁 白蜜 各二升

杏仁 二升

右五味擣蘇子以地黃汁薑汁蜜汁澆之以絹絞取汁更擣以汁澆又絞令味盡去滓熬杏仁令黃黑治如脂又以向汁澆之絹絞往來六七度令味盡去滓内蜜合和置銅器中於湯上煎之令如飴每服方寸匕日三夜一崔氏無地黃汁

又方乾薑末 三兩
膠飴 一斤

右二味和令調蒸五升米下冷以棗大含稍稍咽之

芫花煎治新久嗽方

芫花 乾薑 各二兩
白蜜 二升

日五夜二

右三味為末内蜜中令相和微火煎令如糜每服如

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:53
列印頁數：1132
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

棗核大一枚日三夜一以知為度欲利者多服（深師以治冷飲嗽又治三十年久嗽者以水五升煮芜花取三升去滓内蔓加蜜合煎如糜服之）

欬冬煎治同前

欬冬花　乾薑末　紫菀（各三兩）　芜花（一兩熬令赤）　五味子（二兩）

右五味㕮咀先以水一斗煮三味取三升半去滓内火煎令如糖每服半棗許日三

芜花乾薑末加蜜三升合投湯中令調於銅器中微治三十年欬嗽或飲或欬寒氣嗽雖不同悉主之方

細辛　欬冬花　防風　紫菀（各三兩）　藜蘆（二兩）　蜀椒（五合）

右六味㕮咀取藜蘆先著銅器中次紫菀次細辛次欬冬花次椒以大棗百枚間著諸藥間以水一斗二升微火煮令汁盡出棗曝令燥雞鳴時服半棗不知升半温温為度若强人欲嗽吐者方明旦服一枚以齊中温温為度若强人欲嗽吐者方小增服之便吐膿囊裹結吐後勿冷飲食欬愈止藥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

藥勢靜乃食不爾令人吐不已

治三十年久嗽方

百部根二十斤擣取汁煎如飴服一方寸匕日三服

外臺和飴一斤煎成煎以温粥飲調下深師方以白蜜二升更煎五六沸服三合

又方紫菀二兩 欵冬花三兩

右二味治下篩先食飲服一方寸匕日三服七日瘥

又方白蜜一斤 生薑二斤取汁

右二味先秤銅銚知斤兩訖内蜜復秤知數次内薑汁以微火煎令薑汁盡惟有蜜斤兩在止旦服如棗大含一丸日三服禁一切雜食

治久嗽不瘥方

兔屎四十九枚 碉砂二分 胡桐律一分

右三味為末蜜和丸如梧子大每服三丸以粥飲下日三吐冷物盡即瘥

治積年欵嗽喉中呀聲一發不得坐臥方

紫菀 貝母 半夏 桑根白皮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五味子　射干　百部　各五分　欬冬花

皂莢　乾薑　橘皮　鬼督郵

細辛　各四分　白石英　杏仁　各八分　蜈蚣　二枚

右十六味為末蜜和丸如梧子大飲服十丸日再稍加至二十丸（崔氏無半夏射干乾薑橘皮鬼督郵細辛白石英用麻黃二兩芫根白皮一兩半以煮棗湯送下）

欬冬圓治三十年上氣欬嗽唾膿血喘息不得臥方

欬冬花　乾薑　吳茱萸

蜀椒　桂心

葛蒲　各五分　人參　細辛

薤花　紫菀　甘草　桔梗

防風　芫花　茯苓　皂莢　各三分

右十六味為末蜜丸如梧子大酒服三丸日三服

又方

欬冬花　紫菀　細辛　石斛

防風　芎藭　人參　當歸

藁本　甘草　蜀椒　白朮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏 天雄 葛蒲 鍾乳
桂心 麻黄 各三兩 獨活 二兩 烏頭
芫花 附子 各一兩 桃仁 二十枚 大棗 二十五枚
右二十四味為末蜜丸如梧子大酒服二十丸日二
服不止加之酒漬服亦得

又方

欵冬花 乾薑 桂心 紫菀 各三分
細辛 二分 杏仁 皂莢 礬石 一作攀石 一
右十二味為末蜜丸如梧子大酒服五丸日三夜一
二十年嗽不過五十日愈患欵嗽喉鳴上氣服一劑

菖蒲 烏頭 各一分 蜀椒 五合 吳茱萸 六合

永瘥

治肺傷欵唾膿血腸澼背氣不能食惡風目暗眩眴足
脛寒冷方

紫菀 各二兩 大棗 二十枚 乾地黄 切半升
白膠 生薑 各五兩 桂心 人參

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桑白皮 升切二
苧蘿
大麥 升三
大麻仁
飴糖 升各一

右十二味咬咀以水一斗五升煮麥取一斗去麥下藥煮取三升分五服

五味子湯治唾中有膿血牽胷脇痛方

五味子 桔梗
紫菀 甘草

續斷 兩各二
竹茹 兩三
赤小豆 升一
桑根白皮

地黃 兩各五

右九味咬咀以水九升煮取二升七合分為三服

竹皮湯治欬逆下血不息方

生竹皮 兩三
紫菀 兩二
飴糖 斤一

右四味咬咀以水六升煮取三升去滓分三服

百部圓治諸嗽不得氣息唾膿血方

百部根 兩三
升麻 兩半
桂心
五味子
乾薑 兩各一
甘草
紫菀

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:55
列印頁數：1137
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右七味為末蜜和丸如梧子大每服三丸日三以止為度

治上氣欬嗽喘息喉中有物唾血方

生薑汁 杏仁 各二升 猪膏 二合 糖 蜜 各一升

右五味先以猪膏煎杏仁色黃出之以紙拭令淨擣如膏合薑汁糖蜜等合煎令可丸每服如杏核一枚日夜六七服漸漸增加

治一切肺病欬嗽膿血及唾血不止方

好酥三十斤三遍鍊停取凝當出醍醐服一合日三服瘥止一切藥皆不出此神方

又方三鍊酥如雞子黃適寒温灌鼻中日再夜一

鍾乳七星散治寒冷欬嗽上氣胸滿唾膿血方 又名吸散

鍾乳 礬石 欬冬花 桂心 各等分

右四味治下篩作如大豆七聚七星形以小筒吸取酒送下先食服日三不止加之數試大驗又云臨并

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

吸服之

又方鍾乳　細辛　欵冬花　天雄　紫菀　石膏　各等分　多

七星散治三十年欵嗽方

欵冬花　紫菀　桑根白皮　代赭　細辛　伏龍肝　各一兩

右六味治下篩作七星聚聚如藕豆者以竹筒口當藥上一一吸咽之令藥入腹中先食日三丸服四日得食粥七日嗽愈乃止若大豆匕聚不知小益之勿太

右六味治下篩取如大豆匕聚如前法吸之日二只日復作七星聚以一臠肉炙令熟以展轉藥聚上令藥悉徧肉上仰臥咀嚼之細細咽汁令藥力欵欵割然毒氣入咽中藥力盡總咽却取瘥止未瘥復作如初羊牛鹿肉皆可猪肉不可用

治嗽熏法

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:56
列印頁數：1139
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以熟艾薄薄布紙上紙廣四寸後以硫黃末薄布艾上務令調均以荻一枚如紙長捲之作十枚先以火燒纏下去荻煙從孔出口吸煙咽之取吐止明旦復熏之如前日一二止自然可瘥得食白粥餘皆忌恐是熏黃如硫黃見火必焰矣

又方熏黃一兩研令細以蠟紙并上熏黃令與蠟相入調勻捲之如前法熏之亦如上法日一二止以吐為度七日將息後以羊肉羹補之

又方爛青布廣四寸布上布艾艾上布青礬末礬上布少鹽又布少豉末急捲之燒令著內燥罐中以紙蒙頭更作一小孔口吸取煙細細咽之以吐為度若心胷悶時畧歇煙盡止日一二度用三捲不盡瘥三七日慎油膩

論曰凡上氣多有服吐藥得瘥亦有針灸得除者宜深體悟之

灸法

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:57
列印頁數：1140
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

嗽灸兩乳下黑白際各百壯即瘥　又以蒲當乳頭周匝圍身令前後正平當脊骨解中灸十壯　又以繩橫量口中折繩從脊灸繩兩頭邊各八十壯三報三日畢兩邊者是口合度　灸從大椎數下行第五節下第六節上穴在中間此即神道穴隨年壯并主上氣　灸手屈臂中有橫文外骨捻頭得痛處十四壯良

上氣欬嗽短氣氣滿食不下灸肺募五十壯　上氣欬逆短氣風勞百病灸肩井二百壯　上氣短氣欬逆胷背痛灸風門熱府百壯　上氣欬逆胷滿短氣牽背痛灸巨闕期門各五十壯　上氣欬逆短氣胷滿多唾唾惡冷痰灸肺輸五十壯　上氣胷滿短氣欬逆灸雲門五十壯　上氣欬逆胷痺背痛灸胷堂百壯不針　上氣氣閉欬逆咽冷聲破喉猜猜灸天瞿五十壯一名天突　逆氣虛勞寒損憂恚筋骨攣痛心中欬逆泄注腹滿喉痺頸項強腸痔逆氣痔血陰急鼻衄骨痛大小便澀鼻

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中乾煩滿狂走易氣凡二十二病皆灸絶骨五十壯穴在内踝上三寸宛宛中

備急千金要方卷五十七

列印日期/時間：02/04/2005 18:46:58
列印頁數：1142
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書 子部

備急千金要方卷五十八 九

詳校官太醫院醫士臣程 兼
編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈐
校對官中書臣胡紹基
謄錄舉人臣張元功

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷五十八 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

大腸腑方

痰飲第六 論灸法方

論曰夫飲有四何謂師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲問曰四飲之證何以為異師曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲飲水過多水行歸於四肢當汗出而汗不出身體疼重謂之溢飲其人欬逆倚息短氣不得臥其人如腫謂之支飲

凡心下有水者築築而悸短氣而恐其人眩而癲先寒即為虛先熱即為實故水在於心其人心下堅築築短氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲水水在於脾其人少氣身體盡重水在於肝脇下支滿嚏而痛水在於腎心下悸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脉雙弦者寒也皆大下後喜虛耳脉偏弦者飲也肺飲不弦但喜喘短氣支飲亦喘而不能眠加短氣其脉平也留飲形不發作無熱脉微煩滿不能食脉沉滑者留飲病病有留飲者脇下痛引缺盆嗽轉甚其人欬而不得臥引項上痛欬者如小兒掣癎狀夫胷中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛其脉沉者有留飲也心下有留飲其人背寒冷大如手病人肩息上引此皆有溢飲在胷中久者缺盆滿馬刀腫有劇時此為氣飲所致也膈上之病滿喘欬吐發則寒熱背痛惡寒目泣自出其人振振身瞤劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉移在一臂其脉沉細此非風也必有飲在上焦其脉虛者為微勞榮衛氣不周故也冬自瘧一本作久瘧

小半夏湯病心腹虛冷遊痰氣上胷脇滿不下食嘔逆病痰飲者當用温藥和之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

者方

半夏 一升 生薑 一斤 橘皮 四兩

右三味㕮咀以水一斗煮取三升分三服若心中急及心痛内桂心四兩若腹滿痛内當歸三兩羸弱及老人尤宜服之用人參二兩（仲景無橘皮人參）

又方半夏 一升 生薑 一斤 桂心 三兩 甘草 一兩

右四味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

甘草湯治心下痰飲胷脇支滿目眩方

甘草 二兩 桂心 白术 各三兩 茯苓 四兩

右四味㕮咀以水六升宿漬煮取三升去滓服一升日三小便當利

十棗湯治病懸飲者若下後不可與也凡上氣汗出而欬者此為飲也（方見欬嗽篇中）

小青龍湯病溢飲者當發其汗（方見欬嗽篇中）范汪用大青龍湯木防己湯膈間有支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈者用此方

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

木防己 三兩 桂心 二兩 人參 四兩 石膏 雞子大十二枚

右四味㕮咀以水六升煮取二升分二服虛者即愈實者三日復發發則復與若不愈去石膏加茯苓四兩芒硝三合以水六升煮取二升去滓下硝令烊分二服微下利即愈一方不加茯苓

厚朴大黃湯夫酒客欬者必致吐血此坐久飲過度所致也其脉虛者必胃其胷中本有支飲支飲胷滿主之

厚朴 一尺 大黃 六兩 枳實 四兩

之方

右三味㕮咀以水五升煮取二升分為二服溫服之

葶藶大棗瀉肺湯治支飲不得息方 見肺癰篇中

小半夏加茯苓湯嘔家不渴渴者為欲解本渴今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之又有先渴却嘔者此為水停心下小半夏湯主之治卒嘔吐心下痞膈間有水目眩悸方

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:00
列印頁數：1147
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏一升　茯苓三兩　生薑半斤

右三味㕮咀以水七升煮取一升五合去滓分再服

温服之胡洽不用茯苓用桂心四兩

五苓散假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而癲眩水也此方見前第九卷中

方主之

椒目圓腹滿口乾燥此腸間有水氣此方主之

椒目　木防己　大黄各二兩　葶藶二兩

右四味為末蜜丸如梧子大先食飲服二丸日三後

飲定四庫全書

備急千金要方

稍增口中有津液止渴者加芒硝半兩

甘遂半夏湯病者脉伏其人欲自利利者反快雖利心下續堅滿此為留飲欲去故此方主之

甘遂大者三枚如指大一枚水一升煮取半升　半夏十二枚水一升煮取半升　芍藥三枚

甘草一尺大水一升煮取半升

右四味以蜜半升內二藥汁合得一升半煎取八合

大茯苓湯主胷中結痰飲澼結臍下弦滿嘔逆不得食頓服之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

亦主風水方

茯苓 白朮 各三兩 當歸 橘皮 附子 各二兩 生薑 四兩 半夏 四兩 桂心 各四兩 細辛 一兩 人參 一兩

右九味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服服三劑良

茯苓湯治胷膈痰滿方

茯苓 四兩 半夏 一升 生薑 一斤 桂心 八兩

右四味㕮咀以水八升煮取二升半分四服冷極者加大附子四兩若氣滿者加檳榔三七枚 此方與前卷嘔吐篇方相重分兩加減法不同

大半夏湯治痰冷澼飲胷膈中不理方

半夏 一升 白朮 三兩 生薑 八兩 茯苓 人參 桂心 甘草 附子 各二兩

右八味㕮咀以水八升煮取三升分三服

半夏湯治痰飲澼氣吞酸方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏 吳茱萸 各三兩 生薑 六兩 附子 一枚

右四味以水五升煮取二升半分三服老小各半日三

乾棗湯治腫及支滿癖飲方

大棗十枚 大戟 甘草 甘遂 各一兩 芫花 蕘花 各半兩

右八味咬咀以水五升煮取一升六合分四服空心服以快下為度

當歸湯治留飲宿食不消腹中積聚轉下方

當歸 人參 桂心 黃芩 甘草 芍藥 芒硝 各二兩 大黃 四兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服

治痰飲飲食不消乾嘔方

人參 旋復花 橘皮 細辛 各一兩 生薑 澤瀉 各三兩

澤瀉 白朮 杏仁 枳實 各二兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:01
列印頁數：1150
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

茯苓　柴胡　生薑　半夏　芍藥各三兩

右十三味咬咀以水九升煮取二升七合分三服日三

治胷中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐水方

檳榔十二枚　生薑八兩　茯苓五兩　橘皮三兩　杏仁四兩　白朮各四兩

右七味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服

半夏一兩　生薑五兩　甘草一兩　大棗二十枚　吳茱萸三兩　人參各二兩　桂心四兩

應背痛方

吳茱萸湯治胷中積冷心嘈煩滿汪汪不下飲食心胷

右七味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服日三

治胷膈心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或水鳴多唾

口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此皆胃氣弱受冷

故也其脉喜沉弦細遲悉主之方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏 生薑 各五兩 芍藥 三兩 茯苓 四兩

旋復花 細辛 橘皮 桂心

人參 甘草 桔梗 各二兩

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升分三服病先有

時喜水下者用白朮三兩去旋復花若欲得利者加

大黃二兩須微調者用乾地黃

治冷熱久澼實不能飲食心下虛滿如水狀方

前胡 生薑 茯苓 半夏 各四兩

甘草 枳實 白朮 各三兩 桂心 二兩

右八味㕮咀以水八升煮取三升分三服

前胡湯治胷中久寒澼實膈塞胷痛氣不通利三焦冷

熱不調飲食減少無味或寒熱身重臥不欲起方

前胡 人參 當歸 甘草

半夏 各三兩 大黃 防風 麥門冬 各一兩

吳茱萸 黃芩 各一兩 生薑 四兩 杏仁 四十枚

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升去滓分三服 深師

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:02
列印頁數：1152
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

方云若脇下滿加大棗十二枚此利水亦生

旋復花湯治胷膈痰結唾如膠不下食者方

旋復花 細辛 前胡 甘草 茯苓 各二兩 生薑 八兩 桂心 四兩 半夏 一升

烏頭 五枚

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

薑椒湯治胷中積聚痰飲飲食減少胃氣不足欬逆嘔吐方

右九味㕮咀以水九升煮取二升半去滓内薑汁煮

甘草 一兩各 橘皮 桔梗 茯苓 二兩各 半夏 三兩

薑汁 七合 蜀椒 三合 桂心 附子

右九味㕮咀以水九升煮取二升半去滓内薑汁煮取二升分三服服三劑佳若欲服大散諸五石丸必

先服此湯及進黃耆丸佳一方不用甘草

薑附湯治痰冷澼氣胷滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化

方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生薑 八兩
附子 四兩生用四破
右二味㕮咀以水八升煮取二升分四服亦主卒風
撩膈散治心上結痰飲實寒冷心悶方
丁香 二十八枚
赤小豆 二七枚
人參 甘草 各一分
右四味治下篩酒服方寸匕日二亦治諸黃
斷膈湯治胷中痰癖方
恒山 三兩
甘草 松蘿 各一兩
瓜蒂 二十一枚
右四味咀以水酒各一升半煮取一升半分三服
後服漸減之得快吐後須服半夏湯 半夏湯方見前篇
松蘿湯治胷中痰積熱皆除方
松蘿 二兩
烏梅 栀子 各十四枚
甘草 一兩
恒山 三兩
右五味㕮咀以酒三升浸一宿平旦以水三升煮取一升半去滓頓服之亦可分二服一服得快吐即止
杜蘅湯主吐百病方
杜蘅 松蘿 各三兩
瓜丁 三七枚

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:03
列印頁數：1154
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右三味咬咀以酒一升二合漬二宿去滓分二服若一服即吐者止未吐者更服相去如行十里久令藥力盡服一升稀糜即定老小用之亦佳

蜜煎主寒熱方

蜜 五合 恒山 甘草 各二兩

右三味取二味咬咀以水一斗煮取二升去滓内蜜五合温服七合吐即止不吐更服七合勿與冷水一方

用甘草半兩

又方蜜 二合 醋 八合

右二味調和平旦頓服須臾猥猥然欲吐擿之若意中不盡明旦更服無不大嘔安穩

治卒頭痛如破非中冷又非中風其痛是胷膈中痰厥氣上衝所致名為厥頭痛吐之即瘥方

單煮茗作飲二三升許適冷暖飲二升須臾擿即吐吐畢又飲如此數過劇者須吐膽乃止不損人而渴則瘥

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:04
列印頁數：1155
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蔥白湯治冷熱膈腹發時頭痛悶亂欲吐不得者方

蔥白 二七莖 桃葉 一把一作枇杷葉 真珠

恒山 烏頭 甘草 各半兩

右六味㕮咀以水酒各四升和煮取三升去滓内珠

每服一升吐即止

大五飲圓主五種飲一曰留飲停水在心下二曰澼飲

水澼在兩脇下三曰痰飲水在胃中四曰溢飲飲水溢在

膈上五臟間五曰流飲水在腸間動搖有聲夫五飲者

由飲酒後及傷寒飲冷水過多所致方

葳蕤	遠志	苦參	藜蘆					
烏賊骨	白朮	甘遂	大黄					
石膏	栝蔞根	桔梗	半夏					
紫菀	前胡	五味子	芒硝					
桂心	芫花	當歸	人參					
貝母	茯苓	芍藥	大戟					
葶藶	黄芩 各一兩	甘草	恒山					

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

薯蕷 厚朴 細辛 附子 各二分
巴豆 三十枚
右三十三味為末蜜和丸如梧子大飲服三丸日三稍稍加之以知為度

旋復花圖治停痰澼飲結在兩脇腹脹滿羸瘦不能食
旋復花 桂心 枳實 人參 各五兩
聲腹内熱口乾好飲水漿卒起頭眩欲倒脇下痛方
食不消化喜唾乾嘔大小便或澀或利腹中動搖作水
甘遂 三分 吳茱萸 細辛 大黃
黃芩 蓼蘆 厚朴 芫花
橘皮 各四分 乾薑 芍藥 白朮 各六分
茯苓 狼毒 烏頭 礬石 各八分
右二十味為末蜜丸如梧子大酒服五丸日二後加以知為度 延年方無白朮狼毒烏頭礬石細辛黃芩厚朴吳茱萸芫花橘皮甘遂有皂莢附子各二分蜀椒防葵杏仁各三兩乾地黃四分
中軍候黑圓治澼飲停結滿悶目暗方 黑又作里

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芫花 三兩 巴豆 八分 杏仁 五分 桂心 各四分

右五味為末蜜丸如胡豆每日服三丸稍增得快下止

順流紫圓治心腹積聚兩脇脹滿留飲痰澼大小便不利小腹切痛膈上塞方

桂心 四分 巴豆 七枚 石膏 五分 代赭 烏賊骨 半夏 各三分

右六味為末蜜丸如胡豆平旦服一丸加至二丸 胡洽

有藜蘆莖當歸各三分范注方無石膏半夏有當歸一分茯苓三分莖二分藜蘆五分

治停痰澼飲結在兩脇腹滿羸瘦不能飲食食不消喜唾乾嘔大小便或澀或利方

旋復花 大黃 附子 茯苓 椒目 桂心 芫花 狼毒 乾薑 芍藥 枳實 細辛 各八分

右十二味為末蜜丸如梧子飲下三丸日三服後漸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

增治風氣膈上痰飲方

不開口苦瓠湯煮三五沸以物裹熨心膈上

治結積留飲澼囊胷滿飲食不消方

灸通谷五十壯

九蟲第七 方論

論曰人腹中有尸蟲此物與人俱生而為人大害尸蟲之形狀似大馬尾或如薄筋依脾而居乃有頭尾皆長三寸又有九蟲一曰伏蟲長四分二曰蚘蟲長一尺三曰白蟲長一寸四曰肉蟲狀如爛杏五曰肺蟲狀如蠶六曰胃蟲狀如蝦蟇七曰弱蟲狀如瓜瓣八曰赤蟲狀如生肉九曰蝡蟲至細微形如菜蟲狀伏蟲則羣蟲之主也蚘蟲貫心則殺人白蟲相生子孫轉多其母轉大長至四五丈亦能殺人肉蟲令人煩滿肺蟲令人欬嗽胃蟲令人嘔吐胃逆喜噦弱蟲又名膈蟲令人多唾赤蟲令人腸鳴蝡蟲居胴腸之間多則為痔劇則為癩因

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人瘡瘕即生諸癰疽癬瘻瘍疥齲蟲無所不為人亦不必盡有有亦不必盡多或偏有或偏無類婦人常多其蟲凶惡人之極患也常以白筵草沐浴佳根葉皆可用既是香草且是尸蟲所畏也

論曰凡欲服補藥及治諸病皆須去諸蟲并痰飲宿澼醒醒除盡方可服補藥不爾必不得藥力

治肝勞生長蟲在肝為病恐畏不安眼中方

雞子 五枚 去黃
粳米粉 半斤
蠟
吳茱萸東行根皮 各三兩
乾漆 四兩

右五味濤茱萸皮為末和藥銅器中煎可丸如小豆大宿勿食平旦飲服一百丸小兒五十丸蟲當爛出

集驗方無茱萸根名雞子丸

治心勞熱傷心有長蟲名曰蟲長一尺貫心為病方

雷丸
橘皮
狼牙 六分
貫衆 二枚
吳茱萸根皮 七分
桃仁 一作桃皮 石蠶 各五分
殭蠶 三七枚
蕪荑
青葙

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:06
列印頁數：1160
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾漆 各四分
亂髮 如雞子大燒
右十二味為末蜜丸如梧子空腹苦酒下七丸加至二七丸日二服一方無石蠶
治脾勞熱有白蟲在脾中為病令人好嘔下蟲方
大麻子 八升 東引吳茱萸根 大者一尺 橘皮 二兩
右三味咬咀以水煎臨時量服凡合禁聲勿語道作藥蟲當聞便不下切忌之
治肺勞熱生蟲在肺為病方
狼牙 三兩 東行桑根白皮 切一升
東行吳茱萸根白皮 五合
右三味咬咀以酒七升煮取一升平旦頓服之
治腎勞熱四肢腫急蟯蟲狀如菜蟲在腎中為病方
蕪荑 胡粉 槐皮 各一兩 乾漆 二兩
貫衆 三枚 杏仁 四十枚 吳茱萸 五十枚
右七味治下篩平旦井花水服方寸匕加至一匕半瘥止

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治蟯蟲方

以好鹽末二兩苦酒半升合銅器中煮數沸宿不食空心頓服之

又方真珠二兩 亂髮如雞子大燒末 肘後方用治三蟲右二味治下篩以苦酒調旦起頓服之

蘼蕪圓治少小有蚘蟲結在腹中數發腹痛微下白汁吐悶寒熱飲食不生肌皮肉瘦黃四肢不相勝舉方

蘼蕪 貫衆 雷丸 山茱萸 甘菊花 各四分 天門冬 狼牙 各八分 薤蘆

右八味為末蜜丸如大豆三歲飲服五丸五歲以上以意加之漸至十丸加薤蘆六分名薤蘆丸治老小及婦人等萬病腹内冷熱不通急滿痛胷膈堅滿手足煩熱上氣不得飲食身體氣腫腰脚不遂腹内狀如水雞鳴婦人月經不調無所不治

治蚘蟲方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

藿蘆末以飲服方寸匕不覺加之 備急以治蟯蟲
治熱患有蚘蟲懊憹方
藿蘆 十分 乾漆 各二分 萹竹 各二分
右三味治下篩米飲和合服之日三
治蚘蟲在胃中漸漸羸人方
醇酒 好漆 外臺作好鹽 白蜜 各一升
右三味内銅器中微火煎令可丸如桃核一枚温酒
中宿勿食旦服之蟲必下未下更服 外臺治蟯蟲
治蚘蟲攻心腹痛方
剉薏苡根二斤以水七升煮取三升先食服之蟲即
寸一日易之 集驗方用治長蟲
又方取楝實淳苦酒中浸再宿用綿裹内穀道中入三
死出
又方鶴蝨苦酒空腹服方寸匕佳
又方七月七日採蒺藜子陰乾燒灰先食服方寸匕日
三即瘥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治寸白蟲方

吳茱萸細根一把熟搗

大麻子三升熬搗末

右二味以水三升和搦取汁平旦頓服至巳時與好食令飽須臾蟲出不瘥明旦更合服之不瘥三日服附後治三蟲以酒漬取汁服

右三味治下篩以苦酒二合和一宿次早空腹服之

又方蕪荑六分 狼牙四分 白斂二分

又方胡麻一升 胡粉一兩

右二味為末明旦空腹以猪肉臛汁嗽盡即瘥

又方櫰子四十九枚去皮以月上旬平旦空腹服七枚七日服盡蟲消成水永瘥

又方取吳茱萸北陰根乾去土切一升以酒一升浸一宿平旦分二服凡茱萸皆用細根東引北陰者良若如指以上大不在用

又方研大麻取汁五升分五服亦治小兒蚘蟲

又方用石榴根如茱萸法亦可水煮

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:07
列印頁數：1164
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方以好油麻二升煎令熟内蔥白三寸蔥白黑便熟冷頓服之

又方熬錫令十分燥作末以藥方寸匕内羊肉臛中服之

又方桑根白皮切三升以水七升煮取二升宿勿食平旦空腹頓服 肘後云卒大行中見是腹中已多蟲故也宜速理之

又方檳榔二七枚治下篩以水二升半先煮其皮取一升半去滓内末頻服暖臥蟲出或不盡更合服取瘥止

欽定四庫全書

宿勿食旦服之

論曰凡得傷寒及天行熱病腹中有熱又人食少腸胃空虛三蟲行作求食蝕人五臟及下部若齒斷無色舌上盡白甚者脣裏有瘡四肢沉重忽忽喜眠當數看其上脣内有瘡唾血脣内如粟瘡者心内懊憹痛悶此蟲在上蝕其五臟下脣内生瘡者其人喜眠此蟲在下蝕其下部人不能知可服此蝕蟲藥不爾蟲蟲殺人又曰凡患濕蟲者多是熱病後或头下不止或有客熱結在

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

腹中或易水土温涼氣著多生此病亦有乾蠶不甚泄痢而下部瘡癢不問乾濕久則殺人凡濕得冷而苦痢單煮黄連及艾葉苦參之屬皆可用之若病人齒斷無色舌上白者或喜眠煩憒不知痛癢處或下痢急治下部不曉此者但攻其上不以下部為意下部生蟲蟲蝕其肛肛爛見五臟便死燒艾於竹筒熏之

治傷寒蠶病方

取生雞子小頭叩出白入漆一合熟和攪令極調當欽定四庫全書沫出更内著殼中仰吞之食頃或半日乃吐下蟲劇者再服蟲盡熱除病愈

治濕蠶方

黄連	生薑	各十兩
艾葉	八兩	
苦參	四兩	

右四味㕮咀以水一斗煮取三升分三服久者服三劑

懊憹散治濕蠶瘡爛殺蟲除蠶方

篇竹	半兩
藶蘆	

雷丸

青葙

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

女青 桃仁 各三兩

右六味治下篩粥飲服方寸匕日三加至二匕亦酒服

青箱散治熱病有蠱下部生瘡方

青箱子 一兩 橘皮 甘草 一分 狼牙 三分 篇竹 各二兩 藿蘆 四兩

右六味治下篩米飲和每服一合日三不止稍加之

小品無甘草

蠆蜜湯治濕蠱方

生蠆汁 五合 白蜜 三合 黄連 三兩

右三味以水二升別煮黄連取一升去滓内蠆蜜更煎取一升二合五歲兒平旦空腹服四合日二

治蠱蟲蝕下部瘡穀道中生瘡方

阿膠 當歸 青箱子 各二兩 艾葉 一把

右四味咬咀以水八升煮取二升半去滓分三服

杏仁湯治蠱方

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:09
列印頁數：1167
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杏仁 五十枚 苦酒 二升 鹽 一合

右三味和煮取五合頓服之小兒以意量服

桃皮湯治蟯蟲蛔蟲及痔蠶蟲食下部生瘡方

桃皮 艾葉 各一兩 槐子 三兩 大棗 三十枚

右四味㕮咀以水三升煮取半升頓服之良

猪膽苦酒湯治熱病有蠶上下攻移殺人方

猪膽一具苦酒半升和之火煎令沸三上三下藥成放温空腹飲三滿口蟲死便愈

治温病下部有瘡蟲蝕人五臟方

雄黄 皂莢 各一分 麝香 朱砂 各二分

右四味為末蜜和濤萬杵初得病酒服如梧子大一丸日二若下部有瘡取如梧子大末内下部日二

治下部生瘡方

濃煮桃皮煎如糖取内下部口中有瘡含之

治濕蠶方

取生薑刮去皮斷理切之極熟研取汁一升半又以

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:09
列印頁數：1168
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

水一升半合和相得平旦空腹服仍削生薑二枚如
薤大以楸葉苦桃葉數重裹訖於爐死火中燒令極
熱内下部中食頃若濕盛者三旦作頻服無有不瘥
又方
青黛 二兩 黄連 黄蘗 丁香 各一兩
麝香 二分
右五味治下篩以小棗大内下部中日一度重者棗
大和車脂二三合灌下部中日二服
右五味為末綿裹如棗核大内下部亦可棗汁服方
寸匕日三
治病蠶蟲方
燒馬蹄灰作末以猪脂和傳綿繩上内下部中日四
五度
雄黄兌散治時氣病蠶下部生瘡方
雄黄 半兩 桃仁 一兩 青葙子 黄連
苦參 各三兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:10
列印頁數：1169
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治大孔蟲癢方

蒸大棗取膏以水銀和捻長三寸綿裹訖宿内大孔中明旦蟲皆出水銀損腸宜慎之

治蟲蝕下部方

胡粉　雄黄

右二味各等分為末著穀道中亦治小兒

治傷寒熱病多睡變成濕蠶四肢煩疼不得食方

羊桃十斤切濤令熟暖湯三斗淹浸之日正午時入中坐一炊久不過三度瘥

治熱病蛄毒令人喜寐不知痛處面赤如醉下利膿血者也劇因殺人見人肝肺服藥不瘥可熏之方

當數視其人下部大小之孔穥穥然（一云搜搜然）赤則蠶瘡

以泥作小甕令受一升竹筒一枚如指大者一頭横穿入甕腹中一頭内人穀道中淺入可取熟艾如雞子大著甕中然之於甕口吹煙令入人腹艾盡乃止大人可益艾小兒減之羸者不得多多亦害人日再

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熏不過三作蟲則死下斷亦可末燒雄黃如此熏之

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:10
列印頁數：1171
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

腎臟方

腎臟脉論第一

論曰腎主精腎者生來精靈之本也為後宮内官則為女主所以天之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而生者也故生來謂之精精者腎之藏耳者腎之官也腎氣通於耳耳和則能聞五音矣腎在竅為耳然則腎氣上通於耳下通於陰也左腎壬右腎癸循環玄宮上出耳門候聞四遠下迴玉海俠脊左右與臍相當經於上焦榮於中焦衛於下焦外主骨内主膀胱腎重一斤一兩有兩枚神名澤澤主藏精號為精藏隨節應會故云腎藏精精舍志在氣為欠在液為唾腎氣虛則厥逆實則脹滿四肢正黑虛則使人夢見舟船溺人得其時夢伏水中若有畏怖腎氣盛則夢腰脊兩解不相屬

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

厥氣客於腎則夢臨淵沒居水中
凡腎藏象水與膀胱合為腑其經足少陰與太陽為表
裏其脉沉相於秋王於冬冬時萬物之所藏百蟲伏蟄
陽氣下陷陰氣上昇陽氣中出陰氣冽而為霜遂不上
昇化為霜雪猛獸伏蟄蜾蠃蟲匿藏其脉為沉沉為陰在
裏不可發汗發之者傷脾脾土弱即水氣妄行如
氣在藏慎不可下下之者傷脾脾土弱即水氣妄行如
魚出水蛾入湯重客在裏慎不可熏熏之逆客其息則
喘無持客熱令口爛瘡陰脉且解血散不通正陽遂厥
陰不往從客熱狂入內為結胷脾氣遂弱清溲痢通
冬脉如營冬脉者腎也北方水也萬物之所以合藏也
故其氣來沉以搏故曰營反此者病何如而反其氣來
如彈石者此謂太過病在外其去如數者此謂不及病
在中太過則令人解㑊脊脉痛而少氣不欲言不及則
令人心懸如病饑肫中清脊中痛小腹滿小便變赤黃
腎脉來喘喘累累如勾按之而堅曰平冬以胃氣為本

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

腎脉來如引葛按之益堅曰腎病腎脉來發如奪索辟
辟如彈石曰腎死
真腎脉至搏而絶如以指彈石辟辟然色黄黑不澤毛
折乃死
冬胃微石曰平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石而
有勾曰夏病勾甚曰金病凡人以水穀為本故人絶水
穀則死脉無胃氣亦死所謂無胃氣者但得真藏脉不
得胃氣也所謂脉不得胃氣者肝不弦腎不石也
腎藏精精舍志盛怒不止則傷志志傷則善忘前言腰
脊痛不可以俛仰屈伸毛悴色夭死於季夏
足少陰氣絶則骨枯少陰者冬脉也伏行而濡滑骨髓
者也故骨不濡則肉不能著骨也骨肉不相親即肉濡
而却肉濡而却故齒長而垢髮無澤髮無澤者骨先死
戊篤已死土勝水也
腎死藏浮之堅按之亂如轉丸益下入尺中者死
冬腎水王其脉沉濡而滑曰平反得微澀而短者是肺

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

之乘腎母之歸子為虛邪雖病易治反得弦細而長者是肝之乘腎子之乘母為實邪雖病自愈反得大而緩者是脾之乘腎土之尅水為賊邪大逆十死不治反得浮大而洪者是心之乘腎火之陵水為微邪雖病即瘥左手關後尺中陰絶者無腎脉也若足下熱兩髀裏急精氣竭少勞倦所致刺足太陽治陽

左手關後尺中陰實者腎實也若恍惚健忘目視眩眩耳聾悵悵善鳴刺足少陰治陰

右手關後尺中陰絶者無腎脉也若足逆冷上搶胷痛夢入水見鬼善魘寐黑色物來掩人上刺足太陽治陽

右手關後尺中陰實者腎實也若骨疼腰脊痛内寒熱刺足少陰治陰

腎脉沉細而緊再至曰平三至曰離經病四至脱精五至死六至命盡足少陰脉也

腎脉急甚為骨痿癲疾微急為奔豚沉厥足不收不得前後緩甚為洞下洞下者食不化入咽還

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

出大甚為陰痿微大為石水起臍下以至小腹腫垂垂然上至胃管死不治小甚為洞泄微小為消癉滑甚為癭癩癲微滑為骨痿坐不能起目無所見視見黑花濇甚為大癰微濇為不月水沉痔

腎脉搏堅而長其色黃而赤當病折腰其耎而散者當病少血黑脉之至也上堅而大有積氣在小腹與陰名曰腎痺得之沐浴清水而臥

扁鵲曰腎有病則耳聾腎在竅為耳然則腎氣上通於耳五臟不和則九竅不通陰陽俱盛不得相營故曰關格關格者不得盡期而死也

腎在聲為呻在變動為慄在志為恐恐傷腎精氣并於腎則恐

藏主冬病在藏者取之井

病先發於腎小腹腰脊痛脛痠一日之膀胱背膂筋痛小便閉二日上之心心痛三日之小腸脹四日不已死冬大晨夏晏晡

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

病在腎夜半慧日乘四季甚下晡靜
假令腎病中央若食牛肉及諸土中物得之不者當以
長夏時發得病以戊巳日也
凡腎病之狀必腹大脛腫痛喘欬身重寢汗出憎風寒
即胷中痛大腹小腹痛清厥意不樂取其經足少陰太
陽血者腎脉沉之而大堅浮之而大緊若手足骨腫厥
而陰不興腰脊痛小腹腫心下有水氣時脹閉時泄得
之浴水中身未乾而合房内及勞倦發之

腎病其色黑其氣虛弱吸吸少氣兩耳苦聾腰痛時時
失精飲食減少膝以下清其脉沉滑而遲此為可治宜
服内補散建中湯腎氣丸地黄煎春當刺涌泉秋刺伏
留冬刺陰谷皆補之夏刺然谷季夏刺太谿皆瀉之又
當灸京門五十壯背第十四椎百壯
邪在腎則骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰痛大
便難肩背頸項强痛時眩取之涌泉崑崙視有血者盡
取之有所用力舉重若入房過度汗出如浴水則傷腎

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

腎中風　腎中寒

腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻頭一云面反瘁

汗其足逆寒大便反堅一作痺

腎著之病其人身體重腰中冷如氷狀一作如水洗狀一作如坐水中

腎脹者腹滿引背央央然腰髀一作痺痛

形如水狀反不渴小便自利食飲如故是其證也病屬下焦

從身勞汗出衣裏冷濕故久久得之

腎著之為病從腰以下冷腰重如帶五千錢診得腎積

脈沉而急若脊與腰相引痛饑則見飽則減小腹裏急

口乾咽腫傷爛目瞋瞋骨中寒主髓厥善忘色黑腎之

積名曰奔豚發於小腹上至心下如豚奔走之狀上下

無時久久不愈病喘逆骨痿少氣以夏丙丁日得之何

也脾病傳腎腎當傳心心適以夏王王者不受邪腎復

欲還脾脾不肯受因流結為積故知奔豚以夏得之腎

病手足逆冷面赤目黃小便不禁骨節煩疼小腹結痛

氣衝於心其脈當沉細而滑今反浮大其色當黑而反

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃此是土之尅水為大逆十死不治

羽音人者主腎聲也腎聲呻其音瑟其志恐其經足少

昇昇則寒寒則虛虛則厲風所傷語言謇吃不轉偏枯

陰厥逆太陽則榮衛不通陰陽飜祚陽氣内伏陰氣外

體從鼻而分半邊至脚緩弱不遂口亦欹語聲混濁便

利仰人耳偏聾塞腰背相引甚則不可治腎瀝湯主之

脚偏跛蹇若在左則左腎傷在右則右腎傷其偏枯風

方見別卷中 又呻而好恚恚而善忘恍惚有所思此為土尅

水陽擊陰陰氣伏而陽氣起起則熱熱則實實則怒怒

則忘耳聽無聞四肢滿急小便赤黃語音口動而不出

笑而看人此為邪熱傷腎甚則不可治若面黑黃耳不

應亦可治

腎病為瘧者令人悽悽然腰脊痛宛轉大便難目眴眴

然身掉不定手足寒恒山湯主之 方見別卷中

不吃忽然謇吃而好嗔恚反於常性此腎已傷雖未發

覺已是其候見人未言而前開口笑還閉口不聲舉手

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

柵腹一作把眼此腎病聲之候也虛實表裏浮沉清濁宜以察之逐以治之黑為腎合骨黑如烏羽者吉腎主耳耳是腎之餘其人水形相比於上羽黑色大頭曲面廣頤小肩大腹小手足發行搖身下尻長背延延也不敬畏善欺紿人戮死耐秋冬不耐春夏春夏感而生病主足少陰汙汙然耳大小高下厚薄偏圓則腎應之正黑色小理者則腎小小即安難傷粗理者則腎大大則虛虛則腎寒耳聾或鳴汗出腰痛不得俛仰易傷以邪耳高者則腎高高則實實則腎熱背急綴痛耳膿血出或生肉塞耳耳後陷者則腎下下則腰尻痛不可以俛仰為狐疝耳堅者則腎堅堅則腎不受病不病腰痛耳薄者則腎脆脆則傷熱熱則耳吼鬧善病消癉耳好前居牙車者則腎端正端正則和利難傷耳偏高者則腎偏欹偏欹則善腰尻偏痛凡人分部骨陷者必死不免俠膀胱并太陽為腎之部骨當其處陷也而藏氣通於內外部亦隨而應之沉濁為內浮清為外若色從外走內

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

者病從外生部處起若色從内出外者病從内生部處陷内病前治陰後治陽外病前治陽後治陰陽主外陰主内凡人生死休否則藏神前變形於外人腎前病耳分墓色應之必死不治看應增損斟酌賒促賒不出四則為之焦枯若腎前死耳則為之黯黑焦癖若天中等百日内促則旬日之間腎病少愈而卒死何以知之曰黃黑色黵點如拇指應耳此必卒死腎絶四日死何以知之齒為暴黑面為正黑目中黃腰中欲折自汗出如流面黑目青一作白腎氣内傷病因留積八日當亡是死變也面黃目黑不死黑如灺死吉凶之色天中等分左右發色不正此是陰陽官位相法若不遭官事而應死也其人面目帶黃黑連耳左右年四十以上百日死若偏在一邊最凶必死兩邊有年上無三年之内禍必至矣

冬水腎脉色黑主足少陰脉也少陰何以主腎曰腎者主陰陰水也皆生於腎此脉名曰太衝凡五十七穴冬

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取其井滎冬者水始治腎方閉陽氣衰少陰氣堅盛太陽氣伏沉陽脉乃去故取井以下陰氣逆取滎以通 素問

作實陽氣其脉本在內踝下二寸應舌下兩脉其脉根于涌泉 涌泉在脚心下大拇指筋是

其筋起於小指之下入足心並太陰之筋而邪走內踝之下結於踵與太陽之筋合而上結於內輔下並太陰之筋而上循陰股結於陰器循脊內俠膂上至項結於枕骨與太陽之筋合

欽定四庫全書

其脉起於小指之下斜趣足心出然骨之下循內踝之後別入跟中以上腨內出膕中內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝鬲入肺中循喉嚨俠舌本其支者從肺出絡心注胸中合足太陽為表裏太陽本在跟以上五寸中同會于手太陰

備急千金要方

其足少陰之別名曰太鍾當踝後繞跟別走太陽其別者並經上走於心包下貫腰脊主腎生病病實則膀胱熱熱則閉癃癃則陽病陽脉反逆大於寸口再倍其病

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

則口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃癉腸澼脊股内後廉痛痿厥嗜臥足下熱而痛灸則强食而生災緩帶被髮大杖重履而步虛則膀胱寒寒則腰痛痛欬唾則有血喉鳴而喘坐而欲起目眩眩無所見心懸懸厥

冬三月者主腎膀胱黑骨温病也其源從太陽少陰相若病饑狀氣不足則善恐心惕惕若人將捕之是為骨病生矣其病相反若腑虚則為陰毒所傷裏熱外寒意欲守火而引飲或腰中痛欲折若臟實則為陽温所損胷脇切痛類如刀刺不得動轉熱彭彭若服冷藥過差而便洞瀉故曰黑骨温病也

搏蘊積三焦上下壅塞陰毒内行臟腑受客邪之氣則扁鵲曰灸肝脾腎三輸主治丹金毒黑温之病當依源為理調臟理腑清濁之病不生也

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:16
列印頁數：1183
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

腎實熱

左手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦舌燥
咽腫心煩嗌乾胷脇時痛喘欬汗出小腹脹滿腰背強
急體重骨熱小便赤黃好怒好忘足下熱痛四肢黑耳
聾名曰腎實熱也脉經云腎實熱者病苦膀胱脹閉小腹與腰脊相引痛也
右手尺中神門以後脉陰實者足少陰經也病苦癉身
熱心痛脊脇相引痛足逆熱煩名曰腎實熱也

瀉腎湯治腎實熱小便脹滿四肢正黑耳聾夢腰脊離
解及伏水等氣急方

芒硝 茯苓 各八兩碎 黃芩 各三兩 生地黃汁 各五兩 葛蒲 各五兩 磁石 一升用水如雀頭大 黃 一切器中宿漬 玄參 細辛 各四兩 甘草 二兩

右十味㕮咀以水九升煮七味取二升半去滓下大
黃內藥汁中更煮減二三合去大黃內地黃汁微煎
一兩沸下芒硝分為三服

治腎熱好怒好忘耳聽無聞四肢滿急腰背轉動彊直

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

方

柴胡 茯神 外臺作茯苓 黃芩 澤瀉

升麻 杏仁 大青 芒硝 各三兩

淡竹葉 地黃 各一升 磁石 四兩 羚羊角 一兩

右十二味㕮咀以水一斗煮取三升去滓下芒硝分三服

治腎熱小便黃赤不出出如梔子汁或如黃蘗汁每欲小便莖頭即痛方

榆白皮 切 冬葵子 各一升 車前子 切二升 滑石 八兩碎 瞿麥 各三兩 石韋 四兩

子芩 通草

右八味㕮咀以水二斗先煮車前草取一斗去滓澄清取九升下諸藥煮取三升五合去滓分四服

腎膀胱俱實

左手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽經俱實也病苦脊强反折戴眼氣上搶心脊痛不能自反側名曰腎與膀胱俱實也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右手尺中神門以後脉陰陽俱實者足少陰與太陽經俱實也病苦癲疾頭重與目相引痛厥欲走反眼大風多汗名曰腎膀胱俱實也

腎虛寒

左手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦心中悶下重足腫不可以按地名曰腎虛寒也

右手尺中神門以後脉陰虛者足少陰經也病苦足脛小弱惡寒脉代絶時不至足寒上重下輕行不可按地治腎氣虛寒陰痿腰脊痛身重緩弱言音混濁陽氣頓絶方

小腹脹滿上搶胷痛引脇下名曰腎虛寒也

蓯蓉	白朮	巴戟天	麥門冬	杜仲 各八兩	車前子	乾薑 各五兩
茯苓	甘草	牛膝	五味子			
生乾地黄 五斤						

右十二味治下篩食後酒服方寸匕日三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治腎風虛寒方

灸腎輸百壯對臍兩邊向後俠脊相去各一寸五分

腎膀胱俱虛

左手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦小便利心痛背寒時時小腹滿名曰腎膀胱俱虛也

右手尺中神門以後脉陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦心痛若下重不自收纂反出時時苦洞泄寒中泄腎心俱痛名曰腎膀胱俱虛也

腎勞第三 方論

論曰凡腎勞病者補肝氣以益之肝王則感於腎矣人逆冬氣則足少陰不藏腎氣沉濁順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣

梔子湯治腎勞實熱小腹脹滿小便黃赤末有餘瀝數而少莖中痛陰囊生瘡方

梔子仁　芍藥　通草　石韋各三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

石膏 五兩 滑石 八兩 榆白皮 淡竹葉 切各一升 子芩 四兩 生 薑 五兩 右十味咬咀以水一斗煮取三升去滓分三服

麻黃根粉治腎勞熱陰囊生瘡方

麻黃根 石硫黃 各三兩 米粉 五合 右三味治下篩安絮如常用粉法搭瘡上粉濕更搭之

治腎勞熱妄怒腰脊不可俛仰屈伸煮散方

丹參 牛膝 葛根 杜仲 乾地黃 甘草 各二兩半 茯苓 遠志 子芩 各一兩十八銖 五加皮 石膏 各三兩 淡竹葉 大鴨子 羚羊角 生薑 橘皮 各二兩

右十六味治下篩為粗散以水三升煮兩方寸匕帛裹之時用動取八合為一服日二服

治虛勞陰陽失度傷筋損脉噓吸短氣漏溢泄下小便

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

赤黃陰下濕癢腰脊如折顏色隨落方 隨一作墮

蓐蘚 槀肉 生地黃 桂心

杜仲 麥門冬 各一斤

右六味㕮咀以酒一斗五升漬三宿出曝乾復漬如此候酒盡取乾治下篩食後酒服方寸匕日三

治腎勞虛冷乾枯憂恚内傷从坐濕地則損腎方

桂心 獨活 茯苓 各四兩 秦艽 牛膝 芎藭 防風

乾薑一作乾薑 麥門冬 各三兩 地骨皮 各三兩 石斛 六兩 五加皮 十兩 各五兩

薏苡仁一兩 大麻子二升

右十七味㕮咀以酒四斗漬七日每服七合日二服

論曰凡精極者通治五藏六腑之病候也若五藏六腑衰則形體皆極眼視無明齒焦而髮落身體重則腎水生耳聾行步不正凡陽邪害五藏陰邪損六腑陽實

精極第四 論灸法方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

則從陰引陽陰虛則從陽引陰若陽病者主高高則實實則熱眼視不明齒焦髮脫腹中滿滿則歷節痛痛則宜瀉於內若陰病者主下下則虛虛則寒身體重則腎水生耳聾行步不正邪氣入內行於五臟則欬欬則多涕唾面腫氣逆邪氣逆於六腑淫虛厥於五臟故曰精極也所以形不足溫之以氣精不足補之以味善治精者先治肌膚筋脉次治六腑若邪至五臟已半死矣

扁鵲曰五陰氣俱絶不可治絶則目系轉轉則目精奪為志先死遠至一日半日非醫所及矣宜須精研以表治裏以左治右以右治左以我治彼疾皆瘥矣

竹葉黃芩湯治精極實熱眼視無明齒焦髮落形衰體痛通身虛熱方

竹葉 切二升
黃芩 茯苓 各三兩
麥門冬 大黃 各二兩
生地黃 切一升
生薑 六兩
甘草 芍藥 四兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:19
列印頁數：1190
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治精極五臟六腑俱損傷虛熱遍身煩疼骨中痛痛煩悶方

生地黃汁 二升 麥門冬汁 赤蜜 各一升 竹瀝 一合

石膏 八兩 人參 芎藭 桂心

甘草 黃芩 麻黃 各三兩 當歸 四兩

右十二味㕮咀以水七升先煮八味取二升去滓下地黃等汁煮取四升分四服日三夜一

治五勞六極虛羸心驚厥弱多魘忘湯方

茯苓 四兩 甘草 芍藥 桂心

乾薑 各三兩 大棗 五枚 遠志 人參 各二兩

右八味㕮咀以水八升煮取三升分三服

治虛勞少精方

鹿角為末白蜜和丸如梧子大每服七丸日三服十

又方漿水煮蒺藜子令熟取汁洗陰二十日大效

日大效

棘刺圓治虛勞諸氣不足夢泄失精方

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:20
列印頁數：1191
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

棘刺　乾薑　菟絲子　各二兩　天門冬

烏頭　小草　防葵　薯蕷

菴蘭　細辛　石龍芮　枸杞子

巴戟天　萎蕤　石斛　厚朴

牛膝　各一兩　桂心

右十八味為末蜜丸如梧子大酒服五丸日二服深師

方以蜜雞雞子白各半和丸若患風痿痺氣體不便熱煩滿少氣痟渴加萎蕤天門冬菟絲子身黃汗小便赤黃不利加石龍芮枸杞子關節腰背痛加菴蘭牛膝寒中氣脹時泄數唾吐嘔加厚朴乾薑桂心陰囊下濕精少小便餘瀝加石斛以意增之古今録驗以乾地黃代乾薑以麥門冬代天門冬以杜仲代薯蕷用治男子百病小便過多失精

治夢中泄精尿後餘瀝及尿精方

人參　麥門冬　赤石脂　遠志

續斷　鹿茸　各一兩半　栢子仁　丹參

菟絲子　各六銖　茯苓　龍齒　磁石

蓯蓉　各二兩　乾地黃　三兩

右十四味為末蜜丸如梧子大酒服二十丸日再稍

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

加至三十丸

治虛損小便白濁夢洩方

菟絲子 車前子 韭子 各一升 礬石

當歸 附子 各二兩 芎藭 各三兩 桂心 一兩

右八味為末蜜丸如梧子大酒服五丸日三

又方

大棗 五十枚 韭子 五合 黃耆 人參

甘草 乾薑 當歸 龍骨

半夏 芍藥 各二兩 菜

右十味為末蜜丸如梧子大酒服五丸日三服

韭子圓治房室過度精洩自出不禁腰背不得屈伸食不生肌兩脚苦弱方

韭子 一升 甘草 桂心 紫石英

禹餘糧 遠志 山茱萸 當歸

天雄 紫菀 薯蕷 細辛

茯苓 殭蠶 葛蒲 人參

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杜仲 白朮 乾薑 芎藭
附子 石斛 天門冬 各一兩半 菴蕳
黄耆 菟絲子 乾地黄
蛇床子 各二兩 大棗 五十枚 牛髓 乾漆 各四兩
右三十一味為末牛髓合白蜜棗膏合搗三千杵空腹服如梧子大十五丸日再可加至二十丸

韭子散治小便失精及夢洩精方

韭子 麥門冬 各一升 菟絲子
車前子 各二合 芎藭 二兩 白龍骨 三兩
右六味治下篩酒服方寸匕日三不止稍增甚者夜一服 肘後用澤瀉一兩半

棗仁湯治大虛勞夢洩精莖核微弱血氣枯竭或醉飽傷於房室驚惕忪悸小腹裏急方

棗核仁 二合 澤瀉 人參 芍藥
桂心 各一兩 黄耆 甘草 茯苓
白龍骨 牡蠣 各二兩 生薑 二斤 半夏 一斤

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十二味咬咀以水九升煮取四升一服七合日三
若不能食小腹急加桂心六兩
治夢洩失精方
韭子一升治下篩酒服方寸匕日再服立效
治虛勞尿精方
韭子一升 稻米二升
右以水一斗七升煮如粥取汁六升為三服精溢同此
又方
石榴皮 外臺作柘白皮 桑白皮 切各五合
右二味以酒五升煮取三升分三服
又方乾膠三兩為末以酒二升和分三服温服瘥止一
方用鹿角膠
又方新韭子二升十月霜後採者用好酒八合漬一宿
明旦日色好童子向南擣一萬杵平旦温酒五合服方
寸匕日再

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:22
列印頁數：1195
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

禁精湯治失精羸瘦瘧削少氣目視不明惡聞人聲方

韭子 二升 粳米 一升

右二味於銅器中合熬米黃黑及熱以好酒一斗投之絞取汁七升每服一升日三盡二劑

羊骨湯治失精多睡目瞋瞋方

羊骨 一具 飴糖 半斤 生地黃 三斤 白术 各三斤

大棗 二十枚 桑白皮 厚朴 阿膠 各一兩

麥門冬 人參 芍藥 生薑

甘草 各三兩 茯苓 四兩

桂心 八兩

右十五味㕮咀以水五斗煮羊骨去骨取汁三斗煮藥取八升湯成下膠飴令烊平旦服一升後旦服一

升

灸法

虛勞尿精灸第七椎兩傍各三十壯 又灸第十椎兩傍各三十壯 又灸第十九椎兩傍各二十壯 又灸陽陵泉陰陵泉各隨年壯

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:22
列印頁數：1196
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夢洩精灸三陰交二七壯夢斷神良 内踝上大脉並四指足
丈夫夢失精及男子小便濁難灸腎輸百壯
男子陰中疼痛溺血精出灸裂缺三十壯
失精五臟虛竭灸屈骨端五十壯陰上橫骨中央宛曲
如卻月中央是也此名橫骨
男子虛勞男精陰縮灸臍下三寸
男子虛勞失精陰上縮莖中痛灸大赫三十壯穴在屈骨端三寸
男子虛勞失精陰縮灸中封五十壯
男子腰脊冷疼溺多白濁灸脾募百壯
男子失精膝脛疼痛冷灸曲泉百壯穴在膝內屈文頭

骨極第五 論灸法方

論曰骨極者主腎也腎應骨骨與腎合又曰以冬遇病為骨痺骨痺不已復感於邪內舍於腎耳鳴見黑色是其候也若腎病則骨極牙齒苦痛手足痺疼不能从立屈伸不利身痺腦髓痠以冬壬癸日中邪傷風為腎風風歷骨故曰骨極若氣陰陰則虛虛則寒寒則面腫垢

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黑腰脊痛不能久立屈伸不利其氣衰則髮墮齒槁腰背相引而痛痛甚則欬唾甚若氣陽陽則實實則熱熱則面色炲隱曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足痠痛耳鳴色黑是骨極之至也須精別陰陽審其清濁知其分部視其喘息善治病者始於皮膚筋脉即須治之若入臟腑則半死矣

扁鵲曰骨絶不治痛而切痛伸縮不得十日死骨應足少陰少陰氣絶則骨枯髮無澤骨先死矣

三黄湯治骨極主腎熱病則膀胱不通大小便閉塞顏色枯黑耳鳴虚熱方

大黄 切別漬 各三兩
水一升
黄芩 兩
芒硝 二兩
栀子 十四枚
甘草 一兩

右五味㕮咀以水四升先煮黄芩栀子甘草取一升五合去滓下大黄又煮兩沸下芒硝分三服

灸法

腰背不便筋攣癉縮虚熱閉塞灸第二十一椎兩邊相

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

去各一寸五分隨年壯
小便不利小腹脹滿虛乏灸小腸輸隨年壯

骨虛實第六 論灸法 方

論曰骨虛者痠疼不安好倦骨實者苦煩熱凡骨虛實之應主於腎膀胱若其臟腑有病從骨生熱則應臟寒則應腑

虎骨酒治骨虛酸疼不安好倦主膀胱虛寒方

虎骨一具通炙取黃焦汁盡碎如雀頭大釀米三石

麴四斗水三石如常釀酒法所以加水麴者其骨消

麴而飲水所以加之也酒熟封頭五十日開飲之

治骨實苦酸疼煩熱煎方

葛根汁 生地黃汁 赤蜜 各一升

麥門冬汁 五合

治骨髓中疼方

虎骨 四兩 芍藥 一斤 生乾地黃 五斤

右四味相和攪調微火上煎三四沸分三服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右三味㕮咀以清酒一斗漬三宿曝乾復入酒中如此取酒盡為度擣篩酒服方寸匕日三

治骨髓冷疼痛方

取地黃汁一石酒二斗相攪重煎温服日三補髓

又灸上廉七十壯三里下三寸是穴

治虚勞冷骨節疼痛無力方

右二味兩度蒸曝乾為散食後以酒一升進二方寸匕日再服亦治虚熱

又方天門冬為散酒服方寸匕日三一百日取瘥

論曰凡腰痛有五一曰少陰少陰腎也十月萬物陽氣皆衰是以腰痛二曰風癖風寒著腰是以腰痛三曰腎虚役用傷腎是以腰痛四曰腎腰墜墮傷腰是以腰痛五曰取寒眠地為地氣所傷是以腰痛痛不止引牽腰脊皆痛

二斤 鼓

八斤 地黃

腰痛第七 論針方灸法 導引法

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:24
列印頁數：1200
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杜仲酒治腎脉逆小於寸口膀胱虛寒腰痛胷中動通
四時用之方
杜仲 乾薑 各四兩一云乾地黃 萆薢
羌活 天雄 蜀椒 桂心
芎藭 防風 秦艽 烏頭
細辛 各兩三 五加皮 石斛 各兩五 栝蔞根
地骨皮 續斷 桔梗 甘草 各兩一
右十九味㕮咀以酒四斗漬四宿初服五合加至七
八合日再通治五種腰痛
又方
桑寄生 牡丹皮 鹿茸 桂心
右四味各等分治下篩酒服方寸匕日三
又方單用鹿茸與角亦愈
治腎虛腰痛方
萆薢 桂心 白术 各三分 牡丹皮 二分
右四味治下篩酒服方寸匕日三亦可作湯服之甚

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:24
列印頁數：1201
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

良

又方

附子 二分 桂心 牡丹皮 各半 兩

右三味治下篩酒服一刀圭日再甚驗

腎著湯腎著之為病其人身體重腰冷如水洗狀不渴

小便自利食飲如故是其證也從作勞汗出衣裏冷濕

久久得之腰以下冷痛腹重如帶五千錢者方 古今録驗名甘草湯

甘草 二兩 乾薑 三兩 茯苓 白朮 各四兩

右四味㕮咀以水五升煮取三升分三服腰中即温

腎著散方

杜仲 桂心 各三兩 甘草 澤瀉

牛膝 乾薑 各二兩 白朮 茯苓 各四兩

右八味治下篩為粗散一服三方寸匕酒一升煮五

治腰疼不得立方

六沸去滓頓服日再

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甘遂　桂心（一作附子）　杜仲　人參　各二兩

右四味治下篩以方寸匕内羊腎中炙令熟服之

治腰痛方

蓴蘚　杜仲　各一斤　枸杞根　各一斤

右三味㕮咀好酒三斗漬之内甕中密封頭於銅器中煮一日服之無節度取醉

杜仲圓補之之方

杜仲一兩　石斛二分　乾薑　乾地黃各三分

右四味為末蜜丸如梧子大酒服二十丸日再

丹參圓治腰痛并冷痺方

丹參　杜仲　牛膝　續斷　各三兩

桂心　乾薑　各二兩

右六味為末蜜丸如梧子每服二十丸日再夜一禁如藥法

獨活寄生湯腰背痛者皆是腎氣虛弱臥冷濕當風得

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:25
列印頁數：1203
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

之不時速治喜流入脚膝或為偏枯冷痺緩弱疼重若有腰痛攣脚重痺急宜服之 方見別卷中

治腰脊苦痛不遂方

大豆三斗熬一斗煮一斗蒸一斗蒸一斗酒六斗甕一口蒸令極熱豆亦熱內甕中封閉口秋冬二七日於甕口作孔出取服五合日夜二三服

又方地黄花為末酒服方寸匕日三

又方鹿角去上皮取白者熬令黄為末酒服方寸匕日亦不中服大神良

三特禁生魚餘不禁新者良陳者不佳服角心中黄處

又方羊腎為末酒服二方寸匕日三

又方三月三日收桃花取一斗一升井花水三斗麴六升米六升炊之一時釀熟去糟每服一升日三服若作食飲用河水禁如藥法神良

治丈夫腰脚冷不隨不能行方

上醇酒三斗水三斗合著甕中温漬脚至膝三日止

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:26
列印頁數：1204
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

冷則甕下常著灰火勿使冷手足煩者小便三升盆中溫漬手足

腰腎痛導引法

正東坐收手抱心一人於前據躡其兩膝一人後捧其頭徐牽令傴臥頭到地三起三臥止便瘥

針灸法

腰腎痛宜針決膝腰句畫中青赤路脉出血便瘥

腰痛不得俛仰者令患人正立以竹柱地度至臍斷竹乃以度度背脊灸竹上頭處隨年壯灸訖藏竹勿令人得知腰痛灸脚跟上橫文中白肉際十壯良　又灸足巨陽七壯巨陽在外踝下　又灸腰目窌七壯在尻上約左右是　又灸八窌及外踝上骨約中

腰卒痛灸窮骨上一寸七壯左右一寸各灸七壯

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:26
列印頁數：1205
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書 子部

備急千金要方卷六十

翰林院侍讀臣孫士毅 校理
太醫院院使臣王大純 覆勘
太醫院院使臣張登 覆勘
太醫院院使臣吳謙 等 編修
太醫院院使臣倉聖脈 覆勘

總校官中書臣宋 鈴
校對官中書臣胡紹基
謄錄舉人臣張元功

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷六十　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

腎臟方

補腎第八　論灸法　方

論曰補方通治五勞六極七傷虛損五勞五臟病六極六腑病七傷表裏受病五勞者一曰志勞二曰思勞三曰憂勞四曰心勞五曰疲勞六極者一曰氣極二曰血極三曰筋極四曰骨極五曰髓極六曰精極七傷者一曰肝傷善夢二曰心傷善忘三曰脾傷善飲四曰肺傷善癈五曰腎傷善唾六曰骨傷善饑七曰脉傷善嗽凡遠思強慮傷人憂悲哀傷人喜樂過度傷人忿怒不解傷人汲汲所願傷人感感所患傷人寒暄失節傷人故曰五勞六極七傷也論傷甚衆且言其略此方悉主之

建中湯治五勞七傷小腹急痛膀胱虛滿手足逆冷食

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:27
列印頁數：1207
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

飲苦吐酸痰嘔逆泄下少氣目眩耳聾口焦小便自利

方

膠飴 半斤
黃耆 乾薑 當歸 各三兩
人參 半夏 橘皮 芍藥
甘草 各二兩
附子 一兩
大棗 十五枚

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升半湯成下膠飴烊沸分四服 深師有桂心六兩生薑一斤無橘皮乾薑

又方治虛損少氣腹脹內急拘引小腹至冷不得屈伸乾夢中泄精或時吐逆恍惚面色枯瘁又復微腫百節疼酸方

黃耆 龍骨 各三兩
芍藥 四兩
生薑 五兩
桂心 當歸 茯苓 各二兩
麥門冬 甘草
附子 厚朴 各一兩
人參 各二兩
大棗 三十枚
飴糖 八兩
生地黃 一斤

不能飲食寒熱頭疼手足逆冷大小便難或復下痢口

右十五味㕮咀以水一斗二升煮取四升去滓內飴

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:28
列印頁數：1208
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

糖每服八合日三夜一劾者加生薑一倍

又方治五勞七傷虛羸不足面目黧黑手足疼痛久立腰疼起則目眩腹中懸急而有絶傷外引四肢方

生薑 芍藥 乾地黄 甘草
芎藭 各五兩 大棗三十枚

右六味㕮咀以水六升漬一宿明旦復以水五升合煮取三升分三服藥入四肢百脉似醉狀是效無生薑酒漬乾薑二兩一宿用之常行此方神妙

大建中湯治虛勞寒澼飲在脇下決決有聲飲已如從一邊下決決然也有頭並衝皮起引兩乳内痛裏急善夢失精氣短目瞤瞤惚惚多忘方

人參 三兩 飴糖 八兩
蜀椒 二合 半夏 一升 生薑 一斤 甘草 二兩

右六味㕮咀以水一斗煮取三升去滓内糖温服七合裹急拘引加芍藥桂心各三兩手足厥腰背冷加附子一枚勞者加黄耆一兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:28
列印頁數：1209
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方治五勞七傷小腹急臍下彭亨兩脇脹滿腰脊相引鼻口乾燥目暗眩眩憒憒不樂胷中氣急逆不下食飲漿中策策痛小便黃赤尿有餘瀝夢與鬼神交通去精驚恐虛乏方

飴糖 半斤　黃耆 遠志 當歸 千金翼無　澤瀉 各三兩　芍藥 人參 龍骨　甘草 各二兩　生薑 八兩　大棗 二十枚

右十一味㕮咀以水一斗煮取二升半湯成內糖令烊一服八合消息又一服深師無飴糖遠志澤瀉龍骨有桂心六兩半夏一升

附子一枚

小建中湯凡男女因積勞虛損或大病後不復常苦四體沉滯骨肉疼酸吸吸少氣行動喘憒或小腹拘急腰背強痛心中虛悸咽乾唇燥面體少色或飲食無味陰陽廢弱悲憂慘慼多臥少起久者積年輕者百日漸至瘦削五臟氣竭則難可復振治之之方

甘草 二兩　桂心 生薑 各三兩　芍藥 六兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:29
列印頁數：1210
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

膠飴 一升 大棗 十枚 二

右六味㕮咀以水九升煮取三升去滓内膠飴每服一升日三間三日復作一劑後可與諸丸散 仲景云嘔家不可服肘後云加黄耆人參各二兩為佳若患痰滿及溏洩可除膠飴胡洽方有半夏八兩黄耆三兩古今録驗名芍藥湯

前胡建中湯治大勞虚劣寒熱嘔逆下焦虚熱小便赤痛客熱上熏頭目及骨肉疼痛口乾方

前胡 三兩 黄耆 芍藥 當歸

右十一味㕮咀以水一斗二升煮取四升去滓内糖

白糖 六兩 人參 半夏 各六分 茯苓 桂心 各二兩 甘草 一兩 生薑 八兩

分四服

黄耆建中湯治虚勞裏急諸不足方

黄耆 生薑 桂心 各三兩 甘草 二兩

芍藥 六兩 大棗 十枚 二

右七味㕮咀以水一斗煮取三升去滓内飴令消温

飴糖 一升

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

服一升日三間日可作嘔者倍加生薑腹滿者去棗

加茯苓四兩佳 仲景驗古今録驗並同深師治虚勞腹滿食少小便多者無飴糖有人參二兩半夏一升又治大虚不足小腹裏急勞寒拘引臍氣上衝胸短氣語言謬誤不能食吸吸氣乏悶亂必效方治虚勞下焦虚冷不甚渴小便數者有人參當歸各二兩若失精加龍骨白斂各一兩古今録驗治虚勞裏急小腹急痛氣引胸脇痛或心痛短氣者以乾薑加當歸四兩生薑加當歸四兩

黄耆湯治虚勞不足四肢煩疼不欲食食即脹汗出方

黄耆 麥門冬 芍藥 桂心 各三兩 甘草 當歸 五味子 細辛

人參 各二兩 大棗二十枚 前胡六兩 茯苓四兩 生薑 半夏 各八兩

右十四味咬咀以水一斗四升煮取三升每服八合日二服 深師方治虚乏四肢沉重或口乾吸吸少氣小便利諸不足者無麥門冬五味子細辛前胡有桑螵蛸二十枚治丈夫虚勞風冷少損或大病後未平復而早牽勞腰背強直脚中疼弱補諸不足者無五味子細辛有遠志橘皮各二兩蜀椒一兩烏頭三枚小品方治虚勞少氣小便過多者無五味子細辛人參前胡茯苓半夏有黄芩一兩地黄二兩以水九升煮取三升治虚勞胸中客氣塞冷癖痞宿食不消吐噫脇間水氣或流飲腸鳴食不生肌肉頭病上重下輕目眩眩忽忽去來躁熱臥不得安小腹急

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

小便赤餘瀝臨亭不起陰下濕或小便白濁傷多者無麥門冬五味子細辛當歸前胡茯苓半夏有厚朴二兩胡洽方治五臟内傷者無麥門冬五味子當歸細辛前胡茯苓名大黃煮湯延年秘録方主補虛損強腎氣者無麥門冬五味子細辛前胡有防風芎藭各三兩

樂令黃耆湯治虛勞少氣胷心淡冷時驚惕心中悸動手脚逆冷體常自汗五臟六腑虛損腸鳴風濕榮衛不調百病補諸不足又治風裏急方

黃耆　人參　橘皮　當歸　桂心　細辛　前胡　芍藥　甘草　麥門冬　茯苓　各二兩　生薑　五兩　半夏　二兩半　大棗　二十枚

右十四味㕮咀以水二斗煮取四升每服五合日三夜一　深師方無橘皮細辛前胡甘草麥門冬有烏頭三兩蜀椒二兩遠志二兩胡洽崔氏有蜀椒一兩烏頭五枚崔氏名樂令大黃耆湯

腎瀝湯治虛勞損羸乏欬逆短氣四肢煩疼腰背相引痛耳鳴面黧黯骨間熱小便赤黃心悸目眩諸虛乏方

羊腎　一具　桂心　一兩　人參　澤瀉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五味子　甘草　防風　芎藭
地骨皮　黄耆　當歸各二兩　茯苓
玄參　芍藥　生薑各四兩　磁石五兩
右十六味咬咀以水一斗五升先煮腎取一斗去腎入藥煎取三升分三服可常服之廣濟方治虚勞百病者無人參甘草芍藥當歸芎藭生薑玄參有從蓉三兩牛膝五加皮各二兩胡洽治大虚傷損夢寤驚悸上氣肩息腎中風濕小腹裏急引腰脊四肢常苦寒冷大小便澀利或赤或白足微腫或昏僻善忘者無澤瀉防風黄耆玄參磁石地骨皮有黄芩遠志各一兩參門冬乾地黄各一兩乾地黄三兩麥門冬四兩大棗二十枚治五勞六極遠志各三兩大棗二十枚崔氏治腎藏虚勞所傷補八風十二痺補諸不足者無澤瀉甘草五味子防風芍藥生薑玄參地骨皮有附子牡丹皮各一兩乾地黄三兩大棗二十枚名羊腎湯近效方除風下氣强腰脚明耳目除疲飲理榮衛永不染時疾諸風者無當歸芍藥磁石有獨活牛膝各一兩半參門冬二兩丹參五兩為煮散都分二十四貼每貼入生薑一分杏仁十四枚水三升煮取一升又方羖羊腎一具切去脂以水一斗煮取一斗三升大棗二十枚桑白皮六兩　五味子　黄耆　蒐蓉

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:31
列印頁數：1214
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

防風　巴戟天　秦艽　澤瀉
人參　桂心　薯蕷　丹參
遠志　茯苓　細辛　牛膝各三兩
石斛　生薑各五兩　杜仲　磁石各八兩

右二十二味咬咀内腎汁中煮取三升分三服相去
增損腎瀝湯治大虛不足小便數噓吸焦燋引飲膀胱
如人行五里再服
滿急每年三伏中常服此三劑於方中商量用之

羊腎一具　麥門冬　地骨皮　人參
石斛　澤瀉　栝蔞根　乾地黃
遠志　生薑　甘草　當歸
桂心　茯苓　五味子
桑白皮一作桑寄生各二兩　大棗三十枚

右十七味咬咀以水一斗五升先煮腎取一斗二升
去腎内藥煮取三升去滓分三服　小品方無石斛栝蔞根地骨皮桑白
皮茯苓有芎藭黃連龍骨各二兩螵蛸二十枚又治
腎氣不足痛渴引飲小便過多腰背疼痛者無石斛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

栝蔞根 地骨皮 桑白皮 甘草 有芎藭二兩 黄芩 芍藥 各一兩 桑螵蛸二十枚 雞肫胵 黄皮一兩 崔氏治藏損虚勞李子豫增損者無石斛栝蔞根地骨皮桑白皮有黄耆黄芩芍藥防風各二兩

治左脇氣衝膈上滿頭上有風如蟲行手足頑痺鼻塞脚轉筋不能伸縮兩目時腫痛方

猪腎 一具 防風 芎藭 橘皮

石斛 各一兩 生薑

通草 半夏 各一兩

丹參 茯苓

澤瀉 桂心

乾地黄 三兩

右十三味㕮咀以水一斗半煮腎減三升去腎下藥煮取二升七合去滓分三服

五補湯治五臟内虚竭短氣欬逆傷損鬱悒不足下氣通津液方

五味子 桂心 甘草 人參 各一兩

麥門冬 小麥 各一升 生薑 八兩千金翼無 粳米 三合

薤白 枸杞根白皮 各一斤

右十味㕮咀以水一斗二升煮取三升每服一升日

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:31
列印頁數：1216
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三口燥者先煮竹葉一把水減一升去葉内諸藥煮之

凝唾湯治虚損短氣咽喉凝唾不出如膠塞喉方 一名茯苓湯

麥門冬 五兩 人參 二兩 前胡 三兩 甘草

乾地黄 桂心 芍藥 各一兩 大棗 三十枚

茯苓 二兩

右九味㕮咀以水九升煮取三升分温三服

補湯方

車前子 三兩 防風 桂心 各三兩 巴戟天

丹參 乾地黄 鹿茸 枸杞皮

五加皮 各五兩

右九味㕮咀以水八升煮取三升去滓分三服

人參湯治男子五勞七傷胷中逆滿害食乏氣嘔逆兩脅下脹小腹急痛宛轉欲死調中平臟理絶傷方

人參 當歸 芍藥 甘草

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:32
列印頁數：1217
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生薑　麥門冬　白糖　桂心　各二兩
前胡　茯苓　五味子　蜀椒
橘皮　各一兩　枳實　三兩　大棗　十五枚
右十五味㕮咀取東流水一斗半漬藥半日用三年
陳蘆稍煎取四升內糖復上火煎令十數沸年二十
以上六十以下一服一升二十以下六十以上一服
七八合雖年盛而久羸者亦服七八合日三夜一不
爾藥力不接則不能救病要用勞水陳蘆不則水强
火盛猛即藥力不出也貞觀初有人以患羸瘦殆死
余處此方一劑則瘥如湯沃雪所以録記之餘方皆
内補散治男子五勞六絶其心傷者令人善驚妄怒無
常其脾傷者令人腹滿喜噫食竟欲臥面目瘦黄其肺
傷者令人少精腰背痛四肢厥逆其肝傷者令人少血
面黑其腎傷者有積聚小腹腰背滿痺欬唾小便難六
絶之為病皆起於大勞脉虚外受風邪内受寒熱令人

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:33
列印頁數：1218
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

手足疼痛膝以下冷腹中雷鳴時時泄痢或閉或利面目腫心下憒憒不欲語憎聞人聲方

乾地黄　菟絲子　山茱萸　地麥　各五分

遠志　巴戟天　各半兩　麥門冬　五味子

甘草　人參　蒞蓉　石斛

桂心　茯苓　附子　各一兩半

禁

右十五味治下篩酒服方寸匕日三加至三七無所

石斛散治大風四肢不收不能自反覆兩肩疼痛身重脛急筋腫不能行時寒時熱足腨如刀刺痛身不能自任此皆得之飲酒中大風露臥濕地寒從下入腰以下冷不足無氣子精虛衆脉寒陰下濕莖消令人不樂恍惚時悲此方除風輕身益氣明目强陰令人有子補不足方

石斛　十分

牛膝　二分

附子　杜仲　各四分

栢子仁　石龍芮　芍藥　松脂

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

雲母粉　山茱萸　澤瀉　蕈蘚
菟絲子　防風　細辛　桂心　各三分
右十六味治下篩酒服方寸匕日再陰不起倍菟絲子杜仲腹中痛倍芍藥膝中痛倍牛膝背痛倍蕈蘚腰中風倍防風少氣倍栢子仁屬不能行倍澤瀉隨病所在倍三分亦可為丸以棗膏丸如梧子酒服七丸

腎瀝散治虛勞百病方

菟絲子　丹參　蒐蓉　附子　各五分
右二十味治下篩合鍾乳粉和攪更篩令勻平旦清酒服方寸匕稍加至二匕日再

又方治男子五勞七傷八風十二痺無有冬夏悲憂憔

羚羊腎　一具　陰乾　茯苓　一兩半　五味子　甘草
乾地黃　二兩　人參　鍾乳粉　石斛
山茱萸　防風　乾薑　細辛　各一兩
巴戟天　桂心　石龍芮　牛膝

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

悴凡是病皆須服之方

羊腎 一具 陰乾 厚朴 五味子 女萎

細辛 牡荆子 芍藥 巴戟天

石斛 白斂 石龍芮 茯苓

山茱萸 乾漆 礬石 龍膽

桂心 芎藭 蒞蓉 蜀椒

白朮 菊花 續斷 遠志

人參 黄耆 澤瀉 蕳蘼

黄芩 各一兩 乾薑 附子 防風

蒿蒲 牛膝 各一兩半 桔梗 二兩半 薯蕷

秦艽 各二兩

右三十七味治下篩酒服方寸匕日三忌房室

又方

蒿蒲 山茱萸 各二兩 茯苓 薯蕷

石龍芮 續斷 桔梗 乾薑

蜀椒 芍藥 巴戟天 人參

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:34
列印頁數：1221
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

龍膽　女萎
細辛　蕳蘼
黃耆　芎藭
天雄　桂心　各一兩半
礬石　一作石　五味子　二兩
牛膝　各一兩　遠志　二兩半
防風有烏頭天雄各一兩半餘並同

右三十六味治下篩酒服方寸匕日三　此方比前方無澤瀉黃芩

薯蕷散補丈夫一切病不能具述方

薯蕷　荊實　枸杞子　一方用　續斷　一方用　遠志　一方用
茯苓　一方用　神　牛膝　菟絲子　巴戟天
杜仲　各一兩　蓯蓉　二兩　五味子
山茱萸　一方用　防風　蛇牀子　二分

右十二味治下篩酒服方寸匕日二夜一惟禁醋蒜

自外無忌服後五夜知覺十夜力生十五夜力壯如

盛年二十夜力倍若多忘加遠志茯苓體澀加栝子

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

仁服三兩劑益肌肉亦可為丸每服三十丸日二夜
一以頭面身體暖為度其藥和平不熱調五臟从服
健力不可當婦人服之面生五色
補五勞方
五月五日採五加莖七月七日採葉九月九日取根
治五勞六極七傷虛損方
治下篩服方寸匕日三長服去風勞妙
蓯蓉　白龍骨　陽起石　續斷
天雄各分七　牡蠣　五味子　蛇牀子
乾地黃　桑寄生　天門冬
白石英各二兩　地膚子　車前子　韭子
菟絲子各五合　地骨皮八分
右十七味治下篩酒服方寸匕日三服
鍾乳散治五勞七傷虛羸無氣力傷極方
鍾乳六兩無問粗細以白淨無赤黃黑為上鍋鐺中可盛三二斗并取粟粗糠二合許內鐺中煮五六沸乃內乳煮水欲減又添如故一晬時出以暖水淨淘之曝乾玉碓研不作聲止重密絹水

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下澄取用
鹿角白者 一兩
石斛 鐵精 人參 磁石 桂心 殭蠶各一兩 蛇牀子三兩 白馬莖別搗 硫黄別研
右十一味為末以棗膏和擣三千杵酒服三十丸如
梧子日再慎房室及生冷酢滑雞猪魚陳敗
寒食鍾乳散治傷損乏少氣力虚勞百病令人丁彊飲
食去風冷 方見氣極篇中
地黄散主益氣調中補絶令人嗜食除熱方
生地黄三十斤細切曝乾取生者三十斤擣汁漬之
令相得出曝乾復如是九反曝擣末食後酒服方寸
匕勿令絶
三石散治風勞毒冷百治不瘥補虚方
鍾乳 紫石英 白石英 白术 桔梗 防風各五分 蜀椒 乾薑 附子 牡蠣 桂心 杜仲 栝蔞根 人參 細辛 茯苓各十分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十六味治下篩酒服方寸匕日三行十數步至五十步以上服此大佳少年勿用自餘補方通用老少皆宜冬月服之（千金翼名更生散赤石脂不用紫石英蜀椒杜仲茯苓為十三味）

石韋圓黃帝問五勞七傷於高陽負高陽負曰一曰陰衰二曰精清三曰精少四曰精消五曰囊下濕六曰腰一作胷脊苦痛七曰膝厥痛冷不欲行骨熱遠視淚出口乾腹中鳴時有熱小便淋瀝莖中痛或精自出有病如此所謂七傷一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰疲勞此謂五勞黃帝曰何以治之高陽負曰石韋

丸主之

石韋　細辛　礬石　遠志

蛇牀子　肉蓯蓉　桔梗　天雄

茯苓　澤瀉　葛蒲　杜仲

牛膝　山茱萸　栢子仁　續斷

薯蕷（各二兩）　防風　赤石脂（各三兩）

右十九味為末取棗膏如蜜和丸如梧子酒服三十

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丸日三七日愈二十日百病除長服良 崔氏無磨石
梗薯蕷栝蔞根二 茯苓澤瀉桔
兩半云白水煑方

五補圓治腎氣虛損五勞七傷腰脚酸疼肢節苦痛目
暗眩眩心中喜忘恍惚不定夜臥多夢覺則口乾食不
得味心常不樂多有恚怒房室不舉心腹脹滿四體疼
痺口吐酸水小腹冷氣尿有餘瀝大便不利悉主之久
服延年不老四時勿絶一年萬病 闕 愈之方

杜仲 巴戟天 人參 五加皮
遠志 石斛 薯蕷 狗脊 各四分
五味子 天雄 牛膝 防風
乾地黄 蒐蕘 各十二分 鹿茸 十五分
茯苓 各五分 覆盆子 石龍芮 各八分 菟絲子
蛇牀子 石南 白朮 各三分 萆薢
右二十四味為末蜜丸如梧子酒服十丸日三有風
加天雄苓蘘當歸黄耆五加皮石南茯神獨活栢子
仁白朮各三分有氣加厚朴枳實橘皮各三分冷加

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾薑桂心吳茱萸附子細辛蜀椒各三分泄精加韭子白龍骨牡蠣鹿茸各三分泄痢加赤石脂龍骨黃連烏梅肉各三分春依方服夏加地黃五分黃芩三分麥門冬四分冷則去此加乾薑桂心蜀椒各三分若不熱不寒亦不須增損直爾服之三劑以上即覺廢事悉佳慎酢蒜鱠陳臭大冷醉吐自外百無所慎無比薯蕷圓治諸虛勞百損方

稍加至三十丸不得增常以此為度

薯蕷	二兩	蒞蓉	四兩
杜仲	各三兩	五味子	六兩
牛膝		菟絲子	
澤瀉		茯神	一作茯苓
赤石脂	各一兩	巴戟天	
山茱萸			
乾地黃			

右十二味為末蜜丸如梧子食前酒服二十丸加至三十丸日再無所忌惟禁醋蒜陳臭等物服七日後令人健四體潤澤脣口赤手足暖而有光彩消食身體安和音聲清朗是其驗也十日後長肌肉其藥通

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中入腦鼻必酸疼勿悋若求大肥加燉煌石膏二兩
失性健忘加遠志一兩體少潤澤加栢子仁一兩古今
錄驗有白馬莖二兩共十六味治丈夫五勞七傷頭
痛目眩手足逆冷或煩熱有時或冷痺骨疼腰髖不
隨食雖多不生肌肉或少食而脹滿體澀無光澤陽
氣衰絶陰氣不行此藥能補十一經脉起陰陽通内
制外安魂定魄開三焦破積聚厚腸胃消五臟邪氣
除心内伏熱强筋練骨輕身明目除風去冷無所不
治補益處廣常須服餌為佳七十
老人服之尚有非常力況少者乎
大薯蕷圓治男子女人虚損傷絶頭目眩骨節煩痛飲
食微少羸瘦百病方

| | | |

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

服五丸日三漸增至十丸 張仲景無附子黃芩石膏
十分苓蓟防風各六分茯苓五分乾漆五味子大黃有神鍮
如彈丸每服一丸以一百丸為劑

腎氣圓治虛勞腎氣不足腰痛陰寒小便數囊冷濕尿
有餘瀝精自出陰癢不起忽忽悲喜方

乾地黃 八分 遠志 防風 乾薑
牛膝 麥門冬 萎蕤 薯蕷
石斛 細辛 地骨皮 甘草
附子 桂心 茯苓 山茱萸 四分
蓯蓉 鍾乳粉 十分 羖羊腎 一具

右十九味為末蜜丸如梧子酒服十五丸日三稍加
至三十丸 古今録驗無遠志防風乾薑牛膝地骨萎蕤甘草鍾乳有狗脊一兩黃耆四兩人參
三兩澤瀉乾薑各二兩大棗一百枚

又方治男子婦人勞損虛羸傷寒冷乏少無所不治方

石斛 二兩 紫菀 牛膝 白朮 各五分
麻仁 一分 人參 當歸 茯苓
苓蓟 大豆卷 黃芩 甘草 各六分

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:37
列印頁數：1229
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杏仁 蜀椒 乾地黃 防風 桂心 各四分 羊腎一具 一方有蔻蓉六分 右十八味為末蜜丸如梧子酒服十丸日再漸增之 又此方勝胡公腎氣丸及五石丸 乾地黃 茯苓 玄參 各五兩 澤瀉 桂心 芍藥 各四兩 附子三兩 薯蕷 山茱萸 右九味為末蜜丸如梧子酒服二十丸加至三十丸 以知為度 千金翼有牡丹皮四兩為十味 又方治腎氣不足羸瘦日劇吸吸少氣體重耳聾眼暗 百病方 桂心四兩 乾地黃一斤 澤瀉 薯蕷 茯苓各八兩 牡丹皮六兩 半夏一兩 右七味為末蜜丸如梧子大酒服十丸日三 八味腎氣圓治虛勞不足大渴欲飲水腰痛小腹拘急

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

小便不利方

乾地黃八兩　山茱萸　薯蕷各四兩　澤瀉

牡丹皮　茯苓各三兩　桂心　附子各二兩

右八味為末蜜丸如梧子大酒下十五丸日三加至二十五丸（仲景云常服去附子加五味子姚公云加五味子三兩蔹蓉四兩張文仲云五味子蔹蓉各四兩肘後方云地黃四兩澤瀉附子各一兩餘各二兩）

黃耆圓治五勞七傷諸虛不足腎氣虛損目視眩眩耳無所聞方

黃耆　乾薑　當歸　羌活一作白术　芎藭　甘草　茯苓　細辛

桂心　烏頭　附子　防風

人參　芍藥　石斛　乾地黃

蔹蓉各二兩　棗膏五合　羊腎一具

右十九味為末以棗膏與蜜為丸如梧子大酒服十五丸日二加至三十丸一方無芎藭乾薑當歸羌活

止十四味（古今録驗無羊腎有羌活鍾乳紫石英石硫黃赤石脂白石脂礬石各二分名五石）

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃耆丸

又方療虛勞方

黃耆 鹿茸 茯苓 烏頭 乾薑 各三分 乾地黃 當歸 桂心 栝子仁 白朮 各五分 白皮 菟絲子 五味子 芎藭 各四分 枸杞 大棗二十枚

右十五味為末蜜丸如梧子平旦酒服十丸夜十丸以知為度禁如藥法

神化圓治五勞七傷氣不足陰下濕癢或生瘡小便數有餘瀝陰頭冷疼失精自出小腹急繞臍痛膝重不能久立目視漠漠見風淚出脛酸精氣衰微臥不欲起手足厥冷調中利食方

蓯蓉 牛膝 薯蕷 各六分 續斷 山茱萸 大黃 各五分 遠志 澤瀉 天雄 栝子仁 菟絲子 人參 防風 石斛 栝蔞根 杜仲

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:39
列印頁數：1232
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連　白朮
當歸　各一兩　桂心　甘草　礬石
蛇牀子　赤石脂　蕘蘼　茯苓
細辛　菖蒲　石南　乾薑
芎藭　各三分
右三十一味為末蜜丸如梧子酒服五丸日三加至二十丸
三仁九子圓治五勞七傷補益方
酸棗仁　栢子仁　薏苡仁　菟絲子

菊花子　枸杞子　蛇牀子　五味子
菴蕳子　地膚子　烏麻子　牡荊子
乾地黃　薯蕷　桂心　各二兩　蒻蓉　三兩
右十六味為末蜜丸如梧子酒服二十丸日二夜一
塡骨圓治五勞七傷補五臟除萬病方
石斛　人參　當歸　牡蒙
石長生　石韋　白朮　遠志
蒻蓉　巴戟天　紫菀　茯苓

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾薑　天雄　蛇牀子　牛膝
牡蠣　附子　牡丹　梔子仁
甘草　薯蕷　阿膠　乾地黄
五味子　各二兩　蜀椒　三兩
右二十六味為末白蜜和丸如梧子大酒服三丸日
三
通明圓治五勞七傷六極彊力行事舉重重病後骨髓
未滿房室所食不消胃氣不平方
麥門冬　三斤　乾地黄　石韋　各一斤　紫菀
五味子　肉蓯蓉　甘草　阿膠
杜仲　遠志　茯苓　天雄　各半斤
右十二味為末蜜丸如梧子食上若酒服十丸日再
補虛益精大通圓治五勞七傷百病方
加至二十丸
乾地黄　八兩　乾薑　當歸　石斛
肉蓯蓉　天門冬　白术　甘草

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芍藥 人參 各兩六 大黃 黃芩 各兩五 茯苓 杏仁 各兩三 右十九味為末白蜜棗膏丸如彈子空腹服一丸日三服十日效

赤石脂圓治五勞七傷每事不如意男子諸疾方

赤石脂 山茱萸 七分 防風 遠志 栝蔞根 牛膝 杜仲 薯蕷 各四分 右十味為末蜜棗膏和丸如梧子大空腹服五丸日三服十日知久服不老加菟絲子四分佳

鹿角圓補益方

鹿角 白馬莖 石斛 薯蕷 乾地黃 人參 菟絲子 防風 蛇牀子 各五分 山茱萸 杜仲 赤石脂 石韋 三分 肉蓯蓉 二分 蛇牀子 六分 菖蒲 續斷 天雄 栢子仁 各五分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

澤瀉　乾薑　各四分
五味子　牛膝　石龍芮　遠志　各三分
蔞蓉　七分　巴戟天　各六分　天雄　二分
一方無乾薑五味子
右二十一味為末蜜丸如梧子酒服三十丸日二忌
蔞蓉圓補虛益氣治五臟虛勞損傷陰痺陰下濕癢或
生瘡莖中痛小便餘瀝四肢噓吸陽氣絶陽脉傷方
米醋
右二十一味為末蜜丸如梧子酒服三十丸日二忌
一方無乾薑五味子
蔞蓉　七分
巴戟天　四分
菟絲子　六分　天雄　八分
蔞蓉　薯蕷　各五分　蛇牀子　遠志　各四分
五味子　七分　山茱萸　七分
右九味為末蜜丸如梧子酒服二十丸日二加至二
十五丸
乾地黃圓治五勞七傷六極臟腑虛弱飲食不下顏色
黧黯八風所傷補虛益氣進食資顏色長陽方
乾地黃　茯苓　天雄　各七分　蛇牀子　六分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桂心　麥門冬　各五分　遠志　菖蒲
杜仲　甘草　各十分　五味子　四分　阿膠
棗肉　各八分
右十三味為末蜜丸如梧子酒下二十丸日再加至三十丸常服彌佳
治虛勞不起囊下癢汗出小便淋瀝莖中數痛尿時赤黃甚者失精劇苦溺血目視眩眩見風淚出莖中冷精氣衰兩膝腫不能久立起則目眩補虛方
蛇牀子　細辛　天雄　大黃　各四兩　澤瀉　蔦蘭　防風　遠志　各六分　牛膝　三分　桔蔞根　山茱萸　桂心　薤蓉　石韋　各五分　曰朮　各五分　菟絲子　杜仲　茯苓　栢子仁

右二十二味為末蜜丸如梧子酒服十五丸日再漸加至五十丸十五日身體輕三十日聰明五十日康

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:41
列印頁數：1237
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

健復壯

覆盆子圓治五勞七傷羸瘦補益令人充健方

覆盆子 菟絲子 各十二分 蓯蓉 鹿茸

巴戟天 白龍骨 茯苓 天雄

白石英 五味子 續斷 薯蕷 各十分

乾地黃 八分 蛇牀子 五分 遠志 乾薑 各六分

右十六味為末蜜丸如梧子酒服十五丸日再細細加至三十丸慎生冷陳臭 張文仲方無龍骨鹿茸天雄續斷石英有石斛白朮桂心枸杞子人參栢子仁澤瀉各六分牛膝四分山茱萸五分赤石脂甘草各八分細辛四分

治五勞七傷虛羸無力傷極方

菟絲子 五味子 各二兩 蛇牀子 一兩

右三味為末蜜丸如梧子每服十丸日三服禁如常法

補益方

乾漆 栢子仁 山茱萸 酸棗仁 各四分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右四味為末蜜丸如梧子每服二七丸加至二十丸日二

曲囊圓治風冷補虛弱亦主百病方

乾地黃 薯蕷 牡蠣 天雄

蛇牀子 遠志 杜仲 鹿茸

桂心 五味子 鹿藥草 石斛

車前子 菟絲子 肉蓯蓉 雄雞肝

未連蠶蛾 各等分

右十七味欲和任意擣末蜜丸如小豆大酒服三丸加至七丸日三夜一禁如常法須令常有藥氣大益人服藥十日以後少少得强

崔平世治五勞七傷方

鍾乳粉 菟蘼 各一分 巴戟天 二分

乾薑 三分一作乾地黃 菟絲子 蓯蓉 各二分

右六味為末蜜丸如梧子酒服七丸日三服訖行百步酒服三合更行三百步會中熱定即食乾飯牛羊

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

兎肉任為羹去肥膩餘不忌

明目益精長志倍力久服長生耐老方

遠志 茯苓 細辛 菟絲子

木蘭 續斷 人參 蒿蒲

龍骨 當歸 苓蓟 茯神 各五分

右十二味為末蜜丸如梧子服七丸至十丸日二夜

一滿三年益智

磁石酒療丈夫虛勞冷骨中疼痛陽氣不足陰下疿作一

欽定四庫全書

痛熱方

磁石 石斛 澤瀉 防風 各五兩

杜仲 桂心 各四兩 天雄 桑寄生

天門冬 黄耆 各三兩 石南 二兩 狗脊 八兩

右十二味㕮咀以酒四斗浸漬服三合漸加至五合

日再服亦可單漬磁石服之

石英煎治男子女人五勞七傷消枯羸瘦風虛痼冷少

氣力無顏色不能動作口苦咽燥眠中不安惡夢驚懼

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:42
列印頁數：1240
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

百病方

白石英 碎如米以取三升以竹篦攪勿住手去滓澄清 紫石英 各一斤 製同上 白石英 碎如米以取三升以醇酒九升銅器中微火煎 紫石英 各一斤 製同上

酥 桃仁 升各三 乾地黄 一斤 白蜜 三斤

遠志 茯苓 山茱萸 人參

麥門冬 桂心 乾薑 五味子

白朮 蒐蘆 甘草 天雄

白芷 細辛 芎藭 黄耆

防風 薯蕷 各二兩 附子 五兩 栢子仁

右二十四味治下篩内煎中如不足加酒取足為限

煎令可丸丸如梧子大酒服二十丸日三稍加至四十丸為度無藥者可單服煎令人肥白充實

麋角圓丸

取當年新角連腦頂者為上看角根有斫痕處亦堪用退角根下平者是不堪諸麋角丸方凡有一百一十方此特出衆方之外容成子羔服而羽化夫造此

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

藥取角五具或四具三具兩具一具為一劑先去尖
一大寸即各長七八寸取勢截斷量把鎊得即於長
流水中以竹器盛懸浸可十宿如無長流水處即於
淨盆中滿著水浸每夜易換即將出削去皴皮以利
鎊鎊取白處至心即止以清粟米泔浸兩宿初經一
宿其酒及器物隨藥多少其藥及酒俱入淨釜中
皮及鎊不勻者即以無灰美酒於大白甕器中浸經
宿即乾握去舊水置新絹上曝乾淨擇去惡物粗骨
初武火煮一食久後卽又著火微煎如蟹目沸以柳
木篦長四尺濶三指徐攪不得住手困則易人時時
更添美酒以成煎為度煎之皆須平旦下手不得經
兩宿仍看屑消似希膠即以牛乳五大升酥一斤以
次漸下後藥

蒐絲子	酒浸兩宿待乾別搗	
麋角	一條炙令黃為散與諸藥同制之	櫬榔 通草
秦艽		
人參		甘草
肉蓯蓉	各一兩	

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右擣為散如不要補即不須此藥共煎又可一食時候藥似稠粥即止火少時歇熱氣即投諸藥散相和攪令相得仍待少時漸稠粘堪作丸即以新器盛貯以衆手一時丸就如梧子大若不能衆手丸就旋暖漸丸亦得如粘手著少酥塗手其服餌之法空腹取三果漿以下之如無三果漿酒下亦得初服三十丸日加一丸至五十丸為度日二服初服一百日内忌房室服經一月腹内諸疾自相驅逐有微利勿怪漸後多泄氣能食聰耳明目補心神安臟腑填骨髓理腰脚能久立髮白更黑貌老還少患氣者加枳實青木香准前各一大兩若先曾服丹石等藥即以三黄丸食上壓令宣泄如飲酒食頃口乾鼻中氣粗眼澀即以蜜漿飲之即止如不止加三黄丸使微利諸凡如此一度發動已後方始調暢服至二百日面皺自展光澤一年齒落更生強記身輕若風日行數百里二年常令人肥飽少食七十以上却成後生三年腸

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

作筋髓預見未明四年常飽不食自見仙人三十已下服之不輟顏一定而不變其藥修合時須淨室中不得令雞犬女人孝子等見婦人服之亦佳

治五臟虛勞小腹弦急脹熱方

灸腎輸五十壯老小損之若虛冷可至百壯橫三間寸灸之

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:44
列印頁數：1244
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷六十二

翼祐宣太醫院恩授臣 秦天錫
編修臣倉聖脈覆勘
總校官中書臣朱 鈐
校對官中書臣胡紹基
謄錄舉人臣張元功
謄錄監生臣劉耀馥

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷六十一　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

膀胱腑方

膀胱腑脉論第一

論曰膀胱者主腎也耳中是其候也腎合氣於膀胱膀胱者津液之腑也號水曹掾名玉海重九兩二銖左回疊積上下縱廣九寸受津液九升九合兩邊等應二十四氣鼻空在外膀胱漏泄黃帝曰夫五臟各一名一形腎乃獨兩何也岐伯曰膀胱為腑有二處腎亦二形應腑有二處臟名一腑名二故五臟六腑也一說腎有左右而膀胱無二今用當以左腎合膀胱右腎合三焦左手關後尺中陽絕者無膀胱脉也病苦逆冷婦人月使不調王月則閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經治陰在足內踝下動脉是也

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:45
列印頁數：1246
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右手關後尺中陽絶者無子戸脉也病苦足逆寒絶産帶下無子陰中寒刺足少陰經治陰

左手關後尺中陽實者膀胱實也病苦逆冷脊下邪氣相引痛刺足太陽經治陽在足小趾外側本節後陷中

右手關後尺中陽實者膀胱實也病苦小腹滿引腰痛刺足太陽經治陽

病先發於膀胱者背膂筋痛小便閉五日之腎小腹腰脊痛脛痠一日之脾閉塞不通身痛體重二日不已死冬雞鳴夏下晡一云日夕

肩上熱若脉陷及足小趾外側及脛踝後皆熱若脉陷取委中

膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之則欲小便而不得膀胱脹者小腹滿而氣癃

腎前受病傳於膀胱膀胱腎俞竭不已竭則遺溺厥氣客於膀胱膀則夢遊行腎應骨窓理厚皮者三焦膀胱厚粗理薄皮者三焦膀

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

胱薄腠理疎者三焦膀胱緩急皮而無毫毛者三焦膀胱急毫毛美而粗者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱結也

扁鵲云六腑有病徹面形腎膀胱與足少陰太陽為表裏膀胱總通於五臟所以五臟有疾即應膀胱膀胱有疾即應胞囊傷熱則小便不通膀胱急尿苦黃赤傷寒則小便數清白或發石水根在膀胱四肢小其腹獨大也方見治水篇中骨絶不治齒黃落十日死足太陽之脉起於目内眥上額交巔上其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩膊内俠脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中下會於後陰下貫臀入腘中其支者從膊内左右別下貫胂一作髖過髀樞循髀外後廉下合腘中以下貫腨内出外踝之後循京骨至小指外側是也動則病衝頭痛目似脱項似拔脊痛腰似折髀不可以曲一作囘腘如結腨如列是為踝厥是主筋所生病者痔瘧狂癲疾頭腦項痛目黃淚出鼽衄項背

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

腰尻臑踹脚皆痛小指不用盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

膀胱虛實第二 脉灸法 方

膀胱實熱

左手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦逆滿腰中痛不可俛仰勞也名曰膀胱實熱也

右手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦胞轉不得小便頭眩痛煩滿脊背强名曰膀胱實熱也

治膀胱實熱方

石膏 八兩 梔子仁 一作瓜子仁 十四枚 茯苓 各三兩 生地黃 各一升切 知母 各三兩 蜜 五合 淡竹葉 各三兩 蜜 七合 升麻 大青 各三兩 射干 各三兩

右七味㕮咀以水七升煮取二升去滓下蜜煮二沸分三服須利加芒硝三兩

治膀胱實熱病不已舌乾咽腫方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生玄參　黃蘗　薔薇根白皮　各四兩
右七味以水七升煮取一升去滓下蜜煮二沸細細含之
膀胱虛冷
筋急腹中痛引腰背不可屈伸轉筋惡風偏枯腰痛外踝後痛名曰膀胱虛冷也
左手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦脚中
右手尺中神門以後脉陽虛者足太陽經也病苦肌肉振動脚中筋急耳聾忽忽不聞惡風颼颼作聲名曰膀胱虛也
治膀胱虛冷饑不欲飲食面黑如炭腰脊疼痛方
磁石　六兩　黃耆　杜仲　各四兩　白朮
右七味㕮咀以水九升煮取三升分三服
治膀胱虛冷煞唾則有血喉鳴喘息方
羊腎　一具　人參　玄參　黃耆　白石英　各五兩　茯苓　各三兩　五味子

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:47
列印頁數：1250
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桂心　芎藭　甘草各三兩　茯苓四兩　地骨皮　生薑各五兩　白术六兩

右十一味咬咀以水一斗二升先煮羊腎減三升去腎下藥煮取三升去滓分為三服

龍骨圓治膀胱虛冷坐起欲倒目眩眩氣不足骨痿方

龍骨　栢子仁　乾地黄　甘草　防風各五分　黄耆　禹餘糧　白石英　桂心　茯苓各七分　五味子　羌活　人參　附子各六分　山茱萸　玄參　芎藭各四分　磁石　杜仲　乾薑各八分

右二十味為末蜜丸如梧子大空腹酒服三十丸日二加至四十丸

治膀胱虛寒小便數漏精稠厚如米白泔方

赤石脂　白石脂各五分　乾地黄三分　蒐蘿六分　赤雄雞腸　雞肫胵各兩具　桑螵蛸　牡蠣　龍骨　黄連各四分

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:48
列印頁數：1251
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十味治下篩內雞腸及胇胵中縫塞蒸令熟曝乾合擣為散以酒和服方寸匕日三

治膀胱方

灸之如腎虛法

胞囊論第三 論灸法 方

論曰胞囊者腎膀胱候也貯津液并尿若臟中熱病者胞瀝小便數而多白若至夜則尿偏甚者夜則內陰氣生故熱則瀉之胞瀝小便不通尿黃赤若腑中寒病者胞滑小便數而寒則補之不寒不熱依經調理則病不生矣

凡尿不在胞中為胞屈僻津液不通以蔥葉除尖頭內陰莖孔中深三寸微用口吹之胞脹津液大通即愈

榆皮通滑泄熱煎治腎熱應胞囊瀝熱小便黃赤苦不通方

榆白皮 赤蜜 葵子 各一升 滑石 通草 各三兩 車前子 五升

右六味㕮咀以水三斗煮取七升去滓下蜜更煎取

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:48
列印頁數：1252
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三升分三服婦人難產亦同此方

滑石湯治膀胱急熱小便黃赤方

滑石 八兩 子芩 三兩 車前子 冬葵子 一升 榆白皮 四兩

右五味㕮咀以水七升煮取三升分三服

治虛勞尿白濁方

右取榆白皮切二斤水二斗煮取五升分五服

又方濤乾羊骨為末服方寸匕日二

又方灸脾輸一百壯 又灸三焦輸百壯 又灸腎輸百壯 又灸章門百壯在季肋端

凡飽食後或忍小便或走馬或忍小便大走及入房皆致胞轉膀胱急滿不通治之之方

右用亂髮急纏如兩拳大燒為末醋四合和二方寸匕服之訖即炒熟黑豆葉蹲坐上

治胞轉方

石韋 一兩 葵子 通草 甘草 各二兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鬼箭 三兩
滑石 四兩
榆白皮 一升
右七味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

治丈夫婦人胞轉不得小便八九日者方
葵子 一升
滑石
寒水石 各一斤
右三味㕮咀以水一斗煮取五升分三服

治胞轉小便不得方
蔥白 四莖七
阿膠 一兩
琥珀 三兩
車前子 一升
右四味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

又方阿膠三兩水二升煮取七合頓服
又方豉五合以水三升煮數沸頓服之
又方麻子煮取汁頓服之
又方連勃關燒灰水服之
又方筆頭燒灰水服之
又方燒死蜣蜋二枚末水服之
又方内白魚子莖孔中
又方酒和猪脂雞子大頓服之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治腰痛小便不利苦胞轉方

灸玉泉七壯穴在關元下一寸大人從心下度取八寸是玉泉穴小兒酐酌以取之　又灸第十五椎五十壯　又灸臍下一寸　又灸臍下四寸各隨年壯

三焦脉論第四

論曰夫三焦者一名三關也上焦名三管反射中焦名還神道周身貫體可聞不可見和利精氣決通水道息霍亂下焦名走哺合而為一有名無形主五臟六腑往經脉之氣道也其三焦相形厚薄大小並同膀胱之形孤腑而榮出中焦衛出上焦榮者絡脉之氣道也衛者水道出屬膀胱胱合者雖合而不同上中下三焦同號為氣腸胃之間不可不知也三焦名中清之腑別號玉海云

三焦病者腹脹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則為水留則為脹候在足太陽之外大絡在太陽少陽之間亦見于脉取委陽

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

小腹腫痛不得小便邪在三焦約取太陽大絡視其結脉與厥陰小絡結而血者腫上及胃管取三里

三焦脹者氣滿於皮膚殼殼而不堅疼（一云殼殼而堅）

从效不已傳之三焦效而腹滿不欲飲食也手少陽之脉起於小指次指之端上出兩指之間循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑外上肩而交出足少陽之後入缺盆交膻中散絡心胞下隔徧屬三焦其支者從膻中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上角以屈下額至頰其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目兌皆是也動則病耳聾煇煇焞焞嗌腫喉痺是主氣所生病者汗出目兌皆痛頰腫耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用為此諸病盛則瀉之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反小於寸口也

三焦虛實第五

論曰夫上焦如霧（霧者霏霏起上也）論灸法方其氣起於胃上管（難經甲乙巢源）

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

作口上 並咽以上貫膈布胷中走腋循足太陰之外而行還注於手陽明上至舌下注足陽明常與榮衛俱行於陽二十五度行於陰二十五度為一周日夜五十周身周而復始大會於手太陰也主手少陽心肺之病内而不出人有熱則飲食下胃其氣未定汗則出或出於面或出於背身中皆熱不循衛氣之道而出者何也此外傷於風内開腠理毛蒸理泄衛氣走之固不得循其道此氣慄悍滑疾見開而出故不得從其道名曰漏氣其出若實則上絶於心若虛則引氣於肺也

飲食先吐而後下也寒則精神不守泄下便痢語聲不病則肘攣痛食先吐而後下其氣不續膈間厥悶所以澤瀉湯通脉泄熱治上焦飲食下胃胃氣未定汗出面背身中皆熱名曰漏氣方

地骨皮	五兩	
石膏	八兩	
澤瀉	半夏	
桂心	甘草	各一兩
茯苓		
竹葉	五合	
薯心	一升	
柴胡		
生薑	各三兩	
人參	各二兩	

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:50
列印頁數：1257
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十二味㕮咀以水二斗煮取六升分五服 一云水一斗煮取三升分三服

麥門冬理中湯治上焦熱腹滿不欲飲食或食先吐而後下肘攣痛方

麥門冬 生蘆根 竹茹 麋米 各一升

蓴心 五合 甘草 各三兩 茯苓 各二兩 橘皮 各二兩

人參 菱蕤 各三兩 生薑 四兩 白朮 五兩

右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服

治胸中膈氣聚痛好吐方

右灸厥陰輸穴在第四椎兩邊各相去一寸五分隨年壯

黃耆理中湯治上焦虛寒短氣不續語聲不出方

黃耆 桂心 各二兩 五味子 桔梗

乾薑 茯苓 甘草 芍藥 各三兩

丹參 杏仁 各四兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升分為三服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連圓治上焦冷下痢腹内不安食好注下方

黃連 烏梅肉 各八兩 桂心 二兩 乾薑 附子 阿膠 各四兩 黃蘗 各三兩 櫸皮 芎藭

右九味為末蜜丸如梧子大飲下二十丸加至三十丸

厚朴湯治上焦閉塞乾嘔嘔而不出熱少冷多好吐白沫清涎吞酸方

厚朴 茯苓 芎藭 白术 附子 人參 桔梗 各四兩 玄參 各三兩 橘皮 各三兩 生薑 八兩 吳茱萸 八合

右十一味㕮咀以水二斗煮取五升分為五服

論曰中焦如漚（漚中如漚也）在胃（胃源作胃口）上焦之後此受氣者主化水穀之味祕糟粕蒸津液化為精微上注於肺脉乃化而為血奉以生身莫貴於此故獨得行於經隧名曰榮氣（難經作中焦者在胃口甲乙巢）其氣起於胃中管

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

別號曰豐隆在外踝上去踝八寸別走太陰絡諸經之脉上下絡太倉主腐熟五穀不吐不下實則生熱熱則亂主脾胃之病夫血與氣異名同類焉而脫血者無汗此是神氣是神故血與氣異形而同類衛氣是精血氣奪汗者無血此是精氣故人有兩死（删繁作一死）而無兩生猶精神之氣隔絶也若虚則補於胃實則瀉於脾調其閉塞不通上下隔絶虚則生寒寒則腹痛洞泄便痢霍中和其源萬不遺一也

大黄瀉熱湯開關格通隔絶治中焦實熱閉塞上下不通隔絶關格不吐不下腹脹膨膨喘急方

蜀大黄（切以水一升浸）一兩　黄芩　澤瀉　升麻　芒硝各三兩　羚羊角　梔子各四兩　生玄參八兩　地黄汁一升

右九味㕮咀以水七升煮取二升三合下大黄更煮兩沸去滓下硝分三服

藍青圓治中焦熱水穀下痢方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

藍青汁 三升
黃連 八兩
黃蘗 四兩
烏梅肉
地膚子
地榆
右八味為末以藍青汁和微火煎丸如杏仁大飲服
三丸日二七月七日合大良當併手丸之

黃連煎治中焦寒洞泄下痢或因霍亂後瀉黃白無度
腹中虛痛方

黃連 酸石榴皮 地榆 阿膠 各四兩
黃蘗 當歸 厚朴 乾薑 各二兩
右八味咬咀以水九升煮取三升去滓下阿膠更煎

治四肢不可舉動多汗洞痢方

取烑分三服

右灸大橫隨年壯穴在俠臍兩邊各二寸五分

論曰下焦如瀆 瀆者如溝水決洩也 其氣起下胃管別回腸注於膀胱而滲入焉故水穀者常并居於胃中成糟粕而俱下於大腸主足太陽灌滲津液合膀胱主出不主入別於清濁主肝腎之病候也若實則大小便不通利氣逆

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不續嘔吐不禁故曰走哺若虛則大小便不止津液氣絶人飲酒入胃穀未熟而小便獨先下者何蓋酒者熟穀之液也其氣悍以滑故後穀入而先穀出也所以熱則瀉於肝寒則補於腎也

柴胡通塞湯治下焦熱大小便不通方

柴胡 羚羊角 黄芩 橘皮 澤瀉 各三兩 香豉一升別盛 生地黄一升 芒硝二兩 梔子四兩 石膏六兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升去滓内芒硝分三服

赤石脂湯治下焦熱或下痢膿血煩悶恍惚方

赤石脂八兩 烏梅二十枚 梔子十四枚 糜米一升 白术 升麻 各三兩 乾薑二兩

右七味㕮咀以水一斗煮米取熟去米下藥煮取二升分為三服

止嘔人參湯治下焦熱氣逆不續嘔吐不禁名曰走哺

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:52
列印頁數：1262
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

方

人參 菱蕤 黄芩 知母 茯苓 各三兩 生蘆根 梔子仁 白术 橘皮 各四兩 石膏 八兩

右十味㕮咀以水九升煮取三升去滓分三服

香豉湯治下焦熱毒痢魚腦雜痢赤血臍下小腹絞痛不可忍欲痢不出方

香豉 薤白 各一升 黄連 黄蘗

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服

地榆 各四兩

白术 茜根 各三兩 梔子 黄芩

右九味㕮咀以水九升煮取三升分三服

治膀胱三焦津液下大小腸中寒熱赤白泄痢及腰脊痛小便不利婦人帶下方

右灸小腸輸五十壯

黄蘗止洩湯治下焦虚冷大小便洞泄不止方

黄蘗 人參 地榆 阿膠 各三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連 五兩
右八味㕮咀以水一斗煮取三升去滓下膠消分三服

茯苓 一升 櫸皮 四兩各 艾葉
人參續氣湯治下焦虛寒津液不止短氣欲絶方

人參 橘皮 茯苓 烏梅
麥門冬 黃耆 乾薑 芍藥 三兩各
吳茱萸 三合 桂心 二兩 白朮 厚朴 四兩各
右十二味㕮咀以水一斗二升煮取三升分三服

茯苓圓治下焦虛寒損腹中瘀血令人喜忘不欲聞人語胷中噎塞而短氣方

茯苓 乾地黃 當歸 甘草
乾薑 人參 黃耆 芍藥 五分各
桂心 四分 厚朴 三分 杏仁 五十枚
右十一味為末蜜丸如梧子初服二十丸加至三十丸為度日二清白飲下

伏龍肝湯治下焦虛寒損或先見血後便轉此為近血

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

或利不利方

伏龍肝 五合

乾地黃 五兩一方 用黃蘗

阿膠

牛膝 一作牛蒡根 三兩各

甘草

乾薑

黃芩

地榆 三兩各

髮灰 二合

右九味㕮咀以水九升煮取三升去滓下膠煮消下髮灰分為三服

治下焦虛寒損或先便轉後見血此為遠血或利或不利好因勞冷即發宜續斷止血方

續斷

當歸

桂心

蒲黃

阿膠 一兩各

甘草 二兩

乾薑

乾地黃 四兩各

右八味㕮咀以水九升煮取三升半去滓下膠取烊

下蒲黃分三服

當歸湯治三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從三焦起或熱損發或因酒發宜此方

當歸

乾薑

小薊

阿膠

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

羚羊角　乾地黃　栢枝皮　各三兩　芍藥　白朮　各四兩　蒲黃　五合　青竹茹　半升　伏龍肝　髮灰　一雞子大　黃芩　甘草　各二兩

右十五味㕮咀以水一斗二升煮取三升半去滓下膠取烊次下髮灰及蒲黃分為三服

灸法

五臟六腑心腹滿腰背疼飲食吐逆寒熱往來小便不利羸瘦少氣灸三焦輸隨年壯

腹疾腰痛膀胱疝寒澼飲注下灸下極輸隨年壯

三焦寒熱灸小腸輸隨年壯

三焦膀胱腎中熱氣灸水道隨年壯穴在俠屈骨相去五寸　屈骨在臍下五寸屈骨端水道俠兩邊各二寸半

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:54
列印頁數：1266
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷六十二 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

膀胱腑方

霍亂第六 論方 證炙法

論曰原霍亂之為病也皆因飲食非鬬鬼神夫飽食肫膾復飡乳酪海陸百品無所不噉眠臥冷席多飲寒漿胃中諸食結而不消陰陽二氣擁而反戾陽氣欲升陰氣欲降陰陽乖隔變成吐痢頭痛如破百節如解遍體諸筋皆為回轉論證雖小卒病之中最為可畏雖臨深履危不足以諭之養生者宜達其旨趣庶可免於夭横矣

凡霍亂務在温和將息若冷即遍體轉筋凡此病定一日不食為佳仍須三日少少喫粥三日已後可恣意食息七日勿雜食為佳所以養脾氣也

大凡霍亂皆中食膾酪及飽食雜物過度不能自裁夜

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

臥失覆不善將息所致以此隕命者衆人生稟命以五臟為主夫五臟者即是五行内為五行外為五味五行五味更宜扶抑所以春夏秋冬逆調理之食啖不可過度凡飲食於五臟相剋者為病相生者無他經曰春不食辛夏無食鹹季夏無食酸秋無食苦冬無食甘此不必全不食但慎其太甚耳諺曰百病從口生蓋不虛也四時昏食不得太飽皆能生病從夏至秋分忌食肥濃然熱月人自好冷食更與肥濃兼食果菜無節極遂逐冷眠臥冷水洗浴五味更相剋賊雖欲無病不可得也所以病苦人自作之非關運也書曰非天夭人中自絶命此之謂也

凡諸霍亂忌與米飲胃中得米即吐不止但與厚朴葛根飲若冬瓜葉飲但沾清咽喉而不可多與若服湯時隨服吐者候吐定乃止診脉絶不通以桂合葛根為飲吐下心煩肉熱汗不出不轉筋脉急數者可犀角合葛根為飲吐下不止發熱心煩欲飲水可少飲米粉汁為

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

佳若不止可與葛根薺苨飲服之

問曰病有霍亂者何師曰嘔吐而利此為霍亂

問曰病者發熱頭痛身體疼惡寒而復吐利當屬何病師曰當為霍亂霍亂吐利止而復發熱也傷寒其脉微澁本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必利本反下利者不可治也霍亂吐多者必轉筋不渴即腑上築霍亂而腑上築者為腎氣動當先治其築治中湯主之去术加桂心去术者以术虚故也加桂者恐作霍亂而渴霍亂而腹中痛嘔而吐利嘔而利欲得水者貪狑也霍亂而腑上築吐多者若下多者霍亂而驚悸皆用治中湯主之

治中湯治霍亂吐下脹滿食不消化心腹痛方

人參　乾薑　白术　甘草　各三兩

右四味㕮咀以水八升煮取三升分三服不瘥頻服

三劑遠行防霍亂依前作丸如梧子大服三十丸如

作散服方寸匕酒服亦得若轉筋者加石膏三兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:56
列印頁數：1269
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

云若臍上築者腎氣動也去朮加桂心四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者復用朮悸者加茯苓二兩

渴欲得水者加朮合前胡四兩半腹中痛者加人參合前胡四兩半腹滿者去朮加附子一枚服湯後一食頃服熱粥一升微自溫勿發揭衣被也

以此湯小和之方見傷寒篇中

桂枝湯治吐利止而身體痛不休者當消息和解其外

四順湯治霍亂轉筋肉冷汗出嘔噦者方

右四味㕮咀以水六升煮取二升分三服范注云利甚加龍骨

附子一兩人參乾薑甘草各三兩

四逆湯治多寒手足厥冷脉絶方

右九味㕮咀以水六升酒六升合煮取五升分五服

舊方用棗三十枚今以霍亂病法多痞故除之如退棗入葛根二兩佳霍亂四逆加半夏一合附子小者

二兩

吳茱萸二升生薑八兩當歸芍藥細辛各三兩桂心三兩大棗二十五枚通草甘草各二兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:56
列印頁數：1270
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

一枚惡寒乃與大附子

又方治吐下而汗出小便復利或下利清穀裏寒外熱脉微欲絶或發熱惡寒四肢拘急手足厥方

甘草 二兩 乾薑 一兩半 附子 一枚

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合温分再服彊者可與大附子一枚乾薑至三兩 廣濟方若吐後吸吸少氣及下而腹滿者加人參一兩

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合温分再服彊通脉四逆湯治吐利已斷汗出而厥四肢拘急不解脉微欲絶方

大附子 一枚 甘草 一兩半 乾薑 三兩彊者四兩

右三味㕮咀以水三升煮取一升二合分二服脉出即愈若面色赤者加蔥白九莖腹中痛者去蔥加芍藥二兩嘔逆加生薑三兩咽痛去芍藥加桔梗一兩利止脉不出者去桔梗加人參二兩皆與方相應乃服之 仲景用通脉四逆加猪膽汁湯

竹葉湯治霍亂吐利已服理中四順等湯熱不解者方

列印日期/時間：02/04/2005 18:47:57
列印頁數：1271
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

竹葉 一握　小麥 一升
人參　附子　生薑 十兩　甘草
當歸　桂心 各二兩　芍藥 各一兩　橘皮
右十一味㕮咀以水一斗半先煮竹葉小麥取八升
去滓下藥煮取三升分三服上氣者加吳茱萸半升
即瘥理中四順湯皆大熱若有熱宜竹葉湯 古今録驗無芍
藥

甘草瀉心湯治婦人霍亂嘔逆吐涎沫醫反下之心下
即痞當先治其涎沫可服小青龍湯涎沫止次治其痞
可與此方

甘草 四兩　乾薑　黄芩 各三兩　黄連 一兩
半夏 半升　大棗 十二枚
右六味㕮咀以水一斗煮取六升分六服

小青龍湯治婦人霍亂嘔吐方 見第十八卷中
附子粳米湯治霍亂四逆吐少嘔多者方

中附子 一枚　粳米 五合　半夏 半升　大棗 十枚

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾薑仲景方無 各一兩
甘草 各一兩

右六味㕮咀以水八升煮藥取米熟去滓分三服

理中散治年老羸劣冷氣惡心飲食不化心腹虛滿拘急短氣霍亂嘔逆四肢厥冷心煩氣悶流汗扶老方

麥門冬 乾薑 各六兩
人參 白术

右七味治下篩以白湯三合服方寸匕常服將蜜丸如梧子大酒服二十丸

甘草 各五兩
附子
茯苓 各三兩

人參湯治毒冷霍亂吐利煩嘔轉筋肉冷汗出手足指皆腫喘息垂死絶語音不出百方不效脉不通者服此湯取瘥乃止隨吐續服勿止并灸之方

人參 附子 厚朴 茯苓

治霍亂盡毒宿食不消積冷心腹煩滿鬼氣方

乾薑 桂心 各二兩
甘草 橘皮 當歸 葛根

右十味㕮咀以水七升煮取二升半分為三服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右用極鹹鹽湯三升熱飲一升刺口令吐宿食使盡不吐更服吐訖復飲三吐乃住靜止此法大勝諸治俗人以為田舍淺近法鄙而不用守死而已凡有此病即須先用之

治霍亂方

藕豆　香薷　各一升

右二味以水六升煮取二升分服單用亦得

治霍亂洞下不止者方

右用艾一把水三升煮取一升頓服之良

又方香菜一把水四升煮取一升頓服之青木香亦佳

治霍亂吐下腹痛方

右以桃葉煎汁服一升立止冬用皮

治霍亂引飲輒乾嘔方

右用生薑五兩㕮咀以水五升煮取二升半分二服

高良薑大佳

杜仲圓治霍亂久將遠行預備方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杜仲 藿香 白术 橘皮
吳茱萸 乾薑 人參 厚朴
木香 雞舌香 瞿麥 桂心
薤荷 女萎 茴香
右十五味等分為末蜜丸如梧子酒下二十丸
治霍亂永不發丸方
虎掌 薇銜 各二兩 枳實 附子
人參 檳榔 乾薑 各三兩 厚朴 六兩
皂莢 三寸 白术 五兩
右十味為末蜜丸如梧子大每服酒下二十丸日三
武德中有德行尼名淨明患此已久或一月一發或
一月再發發即至死時在朝大醫蔣許甘巢之徒亦
不能識余以霍亂治之處此方得愈故疏而記之
凡先服石人因霍亂吐下服諸熱藥吐下得止因即變
虛心煩手足熱口燥欲得水嘔逆迷悶脉急數者及時
行熱病後毒未盡因霍亂吐下仍發熱心胷欲裂者以

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

此解之方

薺苨 人參 厚朴 知母
栝蔞根 茯苓 犀角 藍子
枳實 桔梗 橘皮 葛根
黄芩 甘草 各二兩

右十四味㕮咀以水一斗煮取三升分為三服

治中熱霍亂暴利心煩脉數欲得冷水者方

右以新汲井水頓服一升立愈先患胃口冷者勿服

治霍亂醫所不治祕方

右用童女月經衣合血燒末酒服方寸匕百方不瘥者用之

治霍亂轉筋方

右用蓼一把去兩頭以水二升煮取一升頓服之 一方作梨葉

又方燒舊木梳灰為末酒服一枚小者永瘥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方車轂中脂塗足心下瘧

治霍亂轉筋入腹無奈何者方

作極鹹鹽湯於槽中暖漬之

又方以酢煮青布摺之冷即易

治轉筋不止者方

男子則以手挽其陰牽之女子則挽其乳近左右邊

灸法

論曰凡霍亂灸之或雖未能立瘥終無死憂不可逆灸

或但先腹痛或先下後吐當隨病狀灸之

若先心痛及先吐者灸巨闕七壯在心下一寸不效更

灸如前數

若先腹痛者灸太倉三七壯穴在心厭下四寸臍上一

寸不止更灸如前數

若吐下不禁兩手陰陽脉俱疾數者灸心蔽骨下三寸

又灸臍下三寸各六七十壯

若乾嘔者灸間使各七壯在手腕後三寸兩筋間不瘥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

更灸如前數

若嘔噦者灸心主各七壯在掌腕上約中吐不止更灸

如前數

若手足逆冷灸三陰交各七壯在足内踝直上三寸廉骨際未瘥更灸如前數

若先下利者灸穀門二七壯在臍傍二寸男左女右一名大腸募不瘥更灸如前數

若下不止者灸大都七壯在足大趾本節後内側白肉際

若泄利所傷煩欲死者灸慈宮二七壯在横骨兩邊各二寸半 横骨在臍下横門骨是

轉筋在兩臂及胷中者灸手掌白肉際七壯又灸亶中

中府巨闕胃管尺澤并治筋拘頭及足皆愈

走哺轉筋灸踵踝白肉際各三七壯又灸小腹下横骨

轉筋四厥灸兩乳根黑白際各一壯

中央隨年壯

轉筋灸湧泉六七壯在足心下當拇指大筋上又灸足

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大趾下約中一壯
轉筋不止灸足踵聚筋上白肉際七壯立愈
轉筋入腹痛欲死四人持手足灸臍上一寸十四壯自
不動勿復持之又灸股裏大筋去陰一寸
霍亂轉筋令病人合面正臥伸兩手著身以繩橫量兩
肘尖頭依繩下俠脊骨兩邊相去各一寸半灸一百壯
霍亂已死有暖氣者灸承筋七壯 取繩量圍足從趾至跟匝總取等折一半
無不瘥 肘後云此華佗法

以度令一頭至跟踏地處引繩上至度頭即是穴起死人又以鹽内臍中灸二七壯

雜補第七 方論

論曰彭祖云使人丁壯不老房室不勞損氣力顏色不衰者莫過麋角其法刮為末十兩用生附子一枚合之酒服方寸匕日三大良亦可熬令微黃單服之亦令人不老然遲緩不及附子者又以雀卵和為丸彌佳服之二十日大效

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

琥珀散治虛勞百病除陰痿精清力不足大小便不利
如淋狀腦門受寒氣結在關元强行陰陽精少餘瀝腰
脊痛四肢重咽乾口燥食無常味乏氣力遠視眩眩驚
悸不安五臟虛勞上氣滿悶方

琥珀 研 蕪菁子 胡麻子
車前子 蛇床子 菟絲子
枸杞子 菴蕳子 麥門冬 各一升
橘皮 肉蓯蓉 松脂
牡蠣 各四兩 松子 柏子
荏子 各三升 桂心 石韋
石斛 滑石 茯苓
芎藭 人參 杜蘅
續斷 遠志 當歸
牛膝 牡丹 各三兩 通草 十四分

右三十味各治下篩合擣二千杵盛以韋囊先食服方寸匕日三夜一用牛羊乳汁煎令熟長服令人彊

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:01
列印頁數：1280
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

性輕體益氣消穀能食耐寒暑百病除雖御十女不勞損令精實如膏服後七十日可得行房久服老而更少髮白反黑齒落重生

蓯蓉散主輕身益氣彊骨補髓不足能使陰氣强盛方

肉蓯蓉　五味子　遠志　甘草　各一斤

生地黃　三十斤取汁　慎火草　切　楮子　各二升

乾漆

右八味以地黃汁浸一宿出曝乾復漬令汁盡為散

空腹酒服方寸匕日三服三十日力倍常雖御十女無損

禿雞散有房室人常服勿絕方

蛇床子　菟絲子　遠志　防風　五味子　巴戟　杜仲　蓯蓉　各二兩

右八味治下篩酒服方寸匕日二無室勿服

天雄散治五勞七傷陰痿不起衰損者方

天雄　五味子　遠志　各一兩　蓯蓉　十分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蛇床子　菟絲子　各六兩
右六味治下篩酒服方寸匕日三常服勿止
治陰下濕癢生瘡失精陰痿方
牡蒙　菟絲子　栢子仁　蛇床子
蓯蓉　各二兩
右五味治下篩酒服方寸匕日三以知為度
蓯蓉　鍾乳　遠志　蛇床子
治陰痿精薄而冷方
續斷　薯蕷　鹿茸　各三兩
右七味治下篩酒下方寸匕日二欲多房室倍蛇床
欲堅倍遠志欲大倍鹿茸欲多精倍鍾乳
治五勞七傷庶事衰惡方
巴戟天　蛇牀子　天雄　薯蕷　各三分
雄蠶蛾　十枚　五味子　石斛　蓯蓉　各五分
菟絲子　牛膝　遠志　各二分
右十一味治下篩以酒服方寸匕日三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

石硫黃散極益房勞嗽虛損方

石硫黃 白石英 鹿茸 遠志

蛇牀子 五味子 天雄 殭蠶

白馬莖 菟絲子 女萎 各等分

右十一味治下篩酒服方寸匕日三無房勿服

又方蘿摩 六兩 五味子 酸棗仁 栢子仁

乾地黃 枸杞根皮 各三兩

右六味治下篩酒服方寸匕日三

又方車前子莖葉根治下篩服方寸匕彊陰益精

常餌補方

枸杞子 一斤 天雄 三兩 蒐蘿 石斛

乾薑 各八兩 菟絲子 遠志 續斷 各五兩

乾地黃 十兩

右九味治下篩酒服方寸匕日二食無所忌服藥十日候莖頭紫色乃可行房

治男子陰氣衰腰背痛苦寒莖消少精小便餘瀝出失

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

精囊下濕癢虛乏服此令人充實肌膚肥悅方

巴戟天　菟絲子　杜仲　桑螵蛸

石斛

右五味等分治下篩酒服方寸匕日一常服佳

又方薯蕷　巴戟天　山茱萸　丹參

人參 各五分　蛇牀子　五味子 各四分　天雄

細辛 各三分　桂心 二分　乾地黃 十分

右十一味治下篩酒服方寸匕日二夜一

又方五味子　蛇牀子 各二兩　續斷　牛膝 各三兩

車前子　蒻蓉 各四兩

右六味治下篩酒服方寸匕日二

杜仲散益氣補虛治男子羸瘦短氣五臟痿損腰痛不能房室方

杜仲　蛇牀子　五味子　乾地黃 六分

蒻蓉　遠志 各八分　木防己 五分　巴戟天 七分

菟絲子 十分

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:02
列印頁數：1284
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右九味治下篩食前酒服方寸匕日二長服不絶佳

蒐蓉散補虛益陽治陽氣不足陰囊濕癢尿有餘瀝漏

洩虛損云為不起方 又方見前

蒐蓉 續斷 各八分 蛇牀子 九分 五味子

天雄 蓍蕷 各七分 遠志 六分 乾地黄

巴戟天 各五分

右九味治下篩酒服方寸匕日三凡病皆由醉飽後

或疲極之餘而合陰陽致成此病也

白馬莖圓治空房獨怒見敵不興口乾汗出失精囊下

濕癢尿有餘瀝卵偏大引疼膝冷脛痠目中眩眩小腹

急腰脊强男子百病方

白馬莖 石韋 天雄 遠志

赤石脂 蛇牀子 菖蒲 蓍蕷

杜仲 栝蔞根 肉蒐蓉 石斛

續斷 牛膝 山茱萸 栢子仁

細辛 防風 各八分

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:03
列印頁數：1285
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十八味為末白蜜丸如梧子大酒服四丸日再服漸加至二十丸七日知一月日百病愈

治陰痿方

雄雞肝 一具　鯉魚膽 一枚

右二味陰乾百日為末雀卵和丸如小豆大每服一丸日三

又方菟絲子 一升　雄雞肝 三具陰乾百日

右二味為末雀卵和丸如小豆大每服一丸日三

又方乾漆　白朮　甘草　菟絲子

右十二味為末蜜和丸如梧桐子酒服二十丸日三

又方用蜂房灰夜臥傅之

又方用原蠶蛾未連者一升陰乾去頭足毛羽為末白蜜丸如梧子大每用一丸夜臥鹽湯下

又方磁石五斤研清酒三斗漬二七日每服二合日三夜一

薤蓉　牛膝　巴戟天　五味子　桂心 各三兩　石南　石龍芮 各一兩　乾地黃 四兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:03
列印頁數：1286
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方常服天門冬亦佳

又方五味子一斤新好者治下篩酒服方寸匕日三稍加至三匕無所慎忌食猪魚大蒜大醋盡一劑即得力百日已上可見功効服藥常令相續不絶四時勿廢功能自知

又方菟絲子　五味子　蛇牀子　各等分

右三味為末蜜丸如梧子飲服三丸日三

又方蛇牀子　菟絲子　杜仲　各五分　蓯蓉　八分

右五味為末蜜丸如梧子每服酒下十四丸日二夜一

又方蛇牀子　末三兩　菟絲子　汁二合

右二味相和用

又方蛇牀子　蓯蓉　遠志　各三分　附子　一分

右四味為末以唾和丸如梧子大每用一丸

又方蛇牀子　三分　天雄　遠志　各二分　桂心　一分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

無食子一枚

右五味為末用

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:04
列印頁數：1288
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷六十三

詳校官太醫院恩粮臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄監生臣劉耀馥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

論曰凡積久飲酒未有不成消渴然則大寒凝海而酒不凍明其酒性酷熱物無以加脯炙鹽鹹此味酒客躭嗜不離其口三觴之後制不由己飲噉無度咀嚼鮓醬不擇酸鹹積年長夜酣興不解遂使三膲猛熱五臟乾燥木石猶且焦栝在人何能不渴治之愈否屬在病者若能如方節慎旬月可瘳不自愛惜死不旋踵方書醫藥實多有效其如不慎者何其所慎者有三一飲酒二房室三鹹食及麪能慎此者雖不服藥而自可無他不知此者縱有金丹亦不可救深思慎之又曰消渴之人愈與未愈常須思慮有大癰何者消渴之人必於大骨節間發癰疽而卒所以戒之在大癰也當預備癰藥以

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:05
列印頁數：1290
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

防之有人病渴利始發於春經一夏服栝蔞豉汁得其力渴漸瘥然小便猶數甚晝夜二十餘行常至三四升極瘥不減二升也轉久便止漸食肥膩日就羸瘦咽喉脣口焦燥吸吸少氣不得多語心煩熱兩脚酸食乃兼倍於常而不為氣力者當知此病皆由虛熱所致治法可長服栝蔞汁以除熱牛乳杏酪善於補此法最有益治消渴除腸胃熱實方

麥門冬 茯苓 黃連 石膏

升麻 四分 枳實 五分 生薑 屑 龍膽 黃芩 各六分 人參 各八分 菱雞 各八分

枸杞子 外臺用地骨皮 栝蔞根 各十分 茹根 切一升 粟米 三合

右十三味為末蜜丸如梧子大以茹根粟米汁服十丸日二若渴則與此飲至足大麻亦得飲方如左

右二味以水六升煮取米熟用下前藥

又方栝蔞根 生薑 各五兩

生麥門冬汁

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蘆根 二升 切 三

右五味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

茯神湯洩熱止渴治胃腑實熱引飲常渴方

茯神 二兩 作茯苓 外臺

栝蔞根

菱蕤 知母 各四兩

生麥門冬 各五兩

小麥 二升

大棗 二十枚

淡竹葉 切 三升

生地黃 六兩

右九味㕮咀以水三斗煮小麥竹葉取九升去滓下

藥煮取四升分四服服食不問早晚但渴即進非但

止治胃渴通治渴患熱者

猪肚圓治消渴方

猪肚 一具 如食法治

黃連

茯神 各四兩

知母 三兩

右七味為末內猪肚中縫塞安甑中極爛蒸乘熱及

藥木臼中擣可丸若硬與蜜和丸如梧子大飲服三

十丸日二加至五十丸隨渴即服之

梁米 各五兩

栝蔞根

麥門冬 二兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:06
列印頁數：1292
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方栝蔞根　麥門冬　鉛丹　各八分　茯神一作茯苓　甘草各六分

右五味治下篩以漿水服方寸匕日三外臺無茯神

又方黃耆　茯神　栝蔞根　甘草

麥門冬各三兩　乾地黃五兩

右六味�bu咀以水八升煮取二升半去滓分三服日進一劑服十劑佳

浮萍圓治消渴方

乾浮萍　栝蔞根各等分

右二味為末以人乳汁和丸如梧子空腹飲服二十丸日三三年病者三日愈治虛熱大佳

治消渴日飲水一石者方

鉛丹二兩　附子一兩　葛根

右四味為末蜜丸如梧子飲服十丸日三渴則服之春夏減附子

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連圓治渴方

黃連一斤張文仲云十斤　生地黃一斤

右二味絞地黃取汁浸黃連出曝燥復內汁中令汁盡乾擣末蜜丸如梧子服二十丸日三食前後無拘亦可為散以酒服方寸匕

栝蔞粉治大渴祕方

右深掘大栝蔞根厚削皮至白處止寸切水浸一日一夜易水經五日取出爛擣碎研之以絹袋濾如出粉法乾之水服方寸匕日三四亦可作粉粥乳酪中食之不限多少取瘥止

又方栝蔞粉和雞子曝乾更擣為末水服方寸匕日三丸服亦得

又方水和栝蔞散服方寸匕亦可蜜丸如梧子大服三十丸

又方取七家井索近桶口結燒作灰井華水服之不過三服必瘥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方濃煮竹根汁飲之癒止

又方漬豉汁任性多少飲之

又方以青粱米煮取汁飲之以癒止

論曰夫内消之為病當由熱中所致小便多於所飲令人虚極短氣夫内消者食物皆消作小便也而又不渴正觀十年梓州刺史李文博先服白石英既久忽房道强盛經月餘漸患渴經數日小便大利日夜百行以來百方治之漸以增劇四體羸憊不能起止精神恍惚口舌焦乾而卒此病雖稀甚可畏也利時脉沉細微弱服枸杞湯即效但不能長愈服鉛丹散亦即減其間將服除熱宣補丸

枸杞湯治渴而利者方

枸杞枝葉一斤 黄連 栝蔞根 甘草 石膏各三兩

右五味㕮咀以水一斗煮取三升分五服日三夜二劇者多合渴即飲之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鉛丹散治消渴止小便數兼消中方

鉛丹　胡粉　各二分　甘草　栝蔞根　各十分　白石脂　附後作貝母　澤瀉　石膏　赤石脂　各五分

右八味治下篩酒服方寸匕日三壯人一匕半一年病者一日愈二年病者二日愈渴甚者夜二服腹痛者減之丸服亦佳每服十丸傷多令人腹痛張文仲云腹中痛者宜漿水汁下之備急方云不宜酒者用麥汁下之古今録驗方云服此藥了經三兩日宜爛煮羊用

肚空腹服之或作羹亦得宜常淡食之候小便數鹹苦即宜服蒻蓉丸兼煮散將息蒻蓉丸及煮散方見

茯神圓方　集驗名宣補丸治腎消渴小便數者

茯神　黄耆　人參　麥門冬　甘草　黄連　知母　栝蔞根　各三兩　菟絲子　三合　蒻蓉　四兩　石膏　乾地黄　各六兩

右十二味為末以牛膽三合和蜜丸如梧子以茆根

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

湯服三十丸日二服漸加至五十丸

酸棗圓治口乾燥内消方

酸棗一升五合 石榴子乾五合 覆盆子

酸棗三各兩 栝蔞根一兩 茯苓各三兩半 麥門冬四兩 石蜜四兩半 桂心一兩六銖 烏梅十枚

度盡復取含無忌

治消中日夜尿七八升者方

右十味為末蜜丸口含化不限晝夜以口中津液為

右用鹿角灸令焦末以酒服五分匕日三漸加至方寸匕

又方葵根如五升盆大兩束外臺云五大斤以水五斗煮取三

斗宿不食平旦一服三升

又方漚麻汁服一升佳

論曰强中之病者莖長興盛不交精液自出也消渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服猪腎薺苨湯制腎中石熱也又宜服白鴨通湯方見下解石毒篇

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:08
列印頁數：1297
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

猪腎薺苨湯方

猪腎 一具　大豆 一升　薺苨 三兩各　人參 一本作茯苓　茯神 一兩　磁石 綿裹　知母　石膏 三兩各　括蔞根 二兩各　黄芩　甘草

右十二味㕮咀以水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗去滓下藥煮取三升分三服渴及飲之下膽熱者夜輒合一劑病勢漸歇即止

增損腎瀝湯治腎氣不足消渴小便多腰痛方

羊腎 一具　遠志　人參　澤瀉　桂心　當歸　茯苓　龍骨　乾地黄　黄芩　甘草　芎藭 各二兩　五味子 五合　生薑 六兩　大棗 二十枚　麥門冬 一升

右十六味以水一斗五升先取羊腎取一斗二升次下諸藥散取三升分三服

治下膽虚熱注脾胃從脾注肺好渴利方

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:09
列印頁數：1298
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

竹葉 升切三
甘草 兩三
麥門冬 兩各四
茯苓 兩各四
栝蔞根 大棗 枚三十
生薑 兩各五
地骨白皮 升各一
小麥
右九味咬咀先以水三斗煮小麥取一斗去滓澄清
取八升去上沫取七升煮藥取三升分三服
治渴利虛熱引飲不止消熱止渴方
竹葉 升切二
地骨白皮
生地黃 一升切各
栝蔞根
石膏 兩各八
茯神 一作茯苓
菱蕤
知母
生薑 兩各四
生麥門冬 一升半
大棗 枚三十
右十一味咬咀以水一斗二升煮取四升分四服
地黃圓治面黃手足黃咽中乾燥短氣脉如連珠除熱止渴利補養方
生地黃汁 升各二
生栝蔞根汁
牛羊脂 升三
白蜜 升四
黃連 一斤為末
右五味合煎令可丸如梧子大飲服五丸日二加至二十丸若苦冷而渴渴瘥即宜別服溫藥

欽定四庫全書
備急千金要方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治渴小便數方

貝母 六分一本作知母
鉛丹 一分
茯苓 栝蔞根 各四分
雞肫胵中黃皮 拾四枚

右五味治下篩飲服方寸匕日三瘥後常服尤佳長服不絕則去鉛丹以蜜丸之用麥飲下

治渴利方

右用生栝蔞根三十斤切以水一石煮取一斗半去滓以牛脂五合煎取水盡以温酒先食服如雞子大日三

治渴小便利復非淋者方

右用榆白皮二斤切以水一斗煮取五升每服三合日三

又方小豆藿一把擣取汁頓服三升

又方取薔薇根水煎服之佳 肘後以治睡中遺尿

又方三年重鵲巢燒末以飲服之 肘後以治睡中遺尿

又方桃膠如彈丸大含之咽津

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方蠟如雞子大以酢一升煮二沸適寒温頓服之

論曰凡人生放恣者衆盛壯之時不自慎惜快情縱慾能房多服石散真氣既盡石氣孤立惟有虚耗唇口乾焦精液自洩或小便赤黄大便乾實或渴而且利日夜一石或渴而不利或不渴而利所食之物皆化作小便此皆由房室不節之所致也凡平人夏月喜渴者由心王也心王便汗汗則腎中虚燥故渴而小便少也冬月不汗故小便多而數也此為平人之證也名為消渴但小便利而不飲水者腎實也經云腎實則消消者不渴而利是也所以服石之人於小便利者石性歸腎腎得石則實實則能消水漿故利利多則不得潤養五臟臟衰則生諸病張仲景云熱結中焦則為堅熱結下焦則為溺血亦令人淋閉不通明知不必悉患小便利信矣内有熱者則止渴除熱則止渴兼虚者須除熱補虚則瘥矣

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治不渴而小便大利遂至於死者方

右用牡蠣五兩以患人尿三升煎取二升分再服神驗

治小便不禁多日便一二斗或如血色方

麥門冬 乾地黃 各八兩 乾薑 四兩 蒺藜子 各二兩 桂心 各二兩 甘草 一兩

續斷

右七味㕮咀以水一斗煮取二升五合分三服古今錄驗云治腎消脚瘦細小便數

九房散治小便多或不禁方

菟絲子 黃連 各三兩 蒲黃 三兩 消石 一兩

肉蓯蓉 二兩

右五味治下篩并雞肫胵中黃皮三兩同為散飲服方寸匕日三如人行十里久更服千金翼有五味子三兩每服空腹服之

又方鹿茸 三寸 桂心 一尺 附子 大者三枚 澤瀉 三兩 蠷螋 各一升 韭子

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:10
列印頁數：1302
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右六味治下篩以漿服五分匕日三加至一匕

黃耆湯治消中虛勞少氣小便數方

黃耆 芍藥 生薑 桂心 當歸 甘草 各二兩 大棗三十枚 黃芩 乾地黃 麥門冬 各一兩

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服日三

棘刺圓治男子百病小便過多失精方

棘刺芮 石龍芮 巴戟天 各二兩 厚朴 麥門冬 菟絲子 蓁蘼 外臺作草鞋 萎蕤 柏子仁 乾地黃 小草 細辛 杜仲 牛膝 蒩蓉 石斛 桂心 防葵 各一兩 烏頭 半兩

右十九味為末蜜和更擣五六千杵丸如梧子大飲下十丸日三加至三十丸以知為度

治尿數而多者方

右用羊肺一具作羹内少羊肉和鹽豉如食任性食

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:11
列印頁數：1303
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不過三具

治消渴陰脉絶胃反而吐食者方

茯苓 八兩　澤瀉 四兩　白朮　生薑
桂心 各三兩　甘草 一兩

右六味咀以水一斗煮取麥三升取汁三升去麥
下藥煮取二升半每服八合日再

又方取屋上瓦三十年者碎如雀腦三升東流水二石
煮取二斗内藥如左方

生白朮　乾地黄　生薑 各八兩　橘皮
人參　甘草　黄耆　遠志 各三兩
桂心　當歸　芍藥 各二兩　大棗 三十枚

右十味咀内瓦汁中煮取三升分四服 或單飲瓦汁亦佳

治熱病後虚熱渴四肢煩疼方

葛根 一斤　人參　甘草 各一兩　竹葉 一把

右四味咀以水一斗五升煮取五升渴即飲之日
三夜二

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

骨填煎治虛勞渴無不效方

茯苓 菟絲子 當歸 山茱萸 牛膝 五味子 附子 巴戟天 石膏 麥門冬 三兩 石韋 人參 蒻蓉 外臺作遠志 桂心 各四兩 大豆卷 一升 天門冬 五兩

右十六味為末次取生地黃栝蔞根各十斤擣絞取牛髓一斤微火煎令如糜食如雞子黃大日三亦可汁於微火上煎減半便作數分内藥并下白蜜三斤

飲服之

茯神散治虛熱四肢羸乏渴熱不止消渴補虛方

茯神 蒻蓉 各四兩 菱蕤 各四兩 生石斛 栝蔞根 丹參 各五兩 甘草 五味子 知母 當歸 人參 各三兩 麥蘗 三升外臺作小麥

右十三味治下篩以絹袋盛三方寸匕水三升煮取一升日二服一煮為一服

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:12
列印頁數：1305
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

枸杞湯治虛勞口中苦渴骨節煩熱或寒者方

枸杞根白皮 切 五升

麥門冬 三升

小麥 二升

右三味以水二斗煮麥熟藥成去滓每服一升日再

巴郡太守奏三黃圓治男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者方

春三月黃芩 四兩

大黃 三兩

黃連 四兩

夏三月黃芩 六兩

大黃 一兩

黃連 七兩

秋三月黃芩 六兩

大黃 二兩

黃連 三兩

冬三月黃芩 三兩

大黃 五兩

黃連 二兩

右三味隨時加減和擣以蜜為丸如大豆飲服五丸日三不知稍加至七丸取下而已服一月病愈久服走逐奔馬常試有驗 一本云夏三月不服

治熱渴頭痛壯熱及婦人血氣上衝悶不堪者方

右用茅根切三升三擣取汁令盡渴即飲之

治嶺南山瘴風熱毒氣入腎中變寒熱脚弱虛滿而渴

方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連 不限多少 生栝蔞根 汁 生地黃 汁 羊乳 汁
右四味以三汁和黃連末為丸空腹飲服三十丸如
梧子大漸加至四十丸日三重病五日瘥小病三日
瘥無羊乳牛乳人乳亦得若藥苦難服即煮小麥粥
飲服之主虛熱 張文仲云黃連丸名羊乳丸
阿膠湯治虛熱小便利而多服石散人虛熱當風取冷
患脚氣喜發動兼消渴腎脉細弱方
阿膠 二挺 麻子 一升 附子 一枚 乾薑 二兩
遠志 四兩

右五味咬咀以水七升煮取二升半去滓内膠令烊
分三服說云小便利多白日夜數十行至一石五日
頻服良

灸法

論曰凡消渴病經百日以上者不得灸刺灸刺則於瘡
上漏膿水不歇遂致癰疽羸瘦而死亦忌有所誤傷但
作針許大瘡所飲之水皆於瘡中變成膿水而出若水

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

出不止者必死慎之慎之初得患者可如方灸刺之

消渴咽喉乾灸胃管下輸三穴各百壯穴在背第八椎下橫三寸間寸灸之一云灸會堂五十壯又灸足太陽五十壯

消渴口乾不可忍者灸小腸輸百壯橫三間寸灸之

消渴口乾煩悶灸足厥陰百壯又灸陽池五十壯

消渴欬逆灸手厥陰隨年壯

消渴小便數灸兩手小指頭及足兩小趾頭并灸項椎佳又灸當脊梁中央解間一處與腰目上兩處凡三處

又灸背上脾輸下四寸當俠脊梁灸兩處凡諸灸皆當隨年壯又灸腎輸二處又灸腰目在腎輸下三寸亦俠脊骨兩傍各一寸半是左右以指按取闕元一處又兩傍各二寸二處又陰市二處在膝上當伏兔上行三寸臨膝取之或三二列灸相去一寸名曰腎系者黃帝經云伏兔下一寸曲泉陰谷陰陵泉復留此諸穴斷小便最佳不損陽氣亦云止遺溺也太谿中封然谷太白大都趺陽行間大敦隱白涌泉凡此諸穴各一百壯腹背兩脚凡四

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

十七處其腎輸腰目關元水道此可灸三十壯五日一報各得一百五十壯佳涌泉一處可灸十壯大敦隱白行間此處可灸三壯餘者悉七壯皆五日一報滿三灸可止也若發灸諸陰不愈宜灸諸陽諸陽在脚表并灸肺輸募按流注孔穴壯數如灸陰家法

小便數而少且難用力輒失精者令其人舒兩手合掌併兩大指令齊急逼之令兩爪甲相近以一炷灸兩爪甲本肉際肉際方後自然有角令炷當角中小侵入爪上此兩指共用一炷也亦灸脚大趾與手同法各三炷而已經三日又灸之

備急千金要方卷六十三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷六十四　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

消渴方

淋閉第二　論方　證灸法

論曰熱結中膲則為堅下膲則為溺血令人淋閉不通此多是虛損人服大散下膲客熱所為亦有自然下膲熱者但自少可善候之

凡氣淋之為病溺難澀常有餘瀝石淋之為病茎中痛溺不得卒出膏淋之為病尿似膏自出勞淋之為病茎中痛倦即發痛引氣衝下熱淋之為病熱即發甚則尿血治之皆與氣淋同

凡人候鼻頭色黃法小便難也

地膚子湯治下膲結熱小便赤黃不利數起出少茎痛或血出溫病後餘熱及霍亂後當風取熱過度飲酒房勞及行步胃熱以飲逐熱熱結下膲及散石熱動關格

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

小腹堅脹如斗諸有此淋悉治之立驗方

地膚子 三兩

瞿麥 枳實 一作松實

葵子 海藻

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服大小便皆

知母 黄芩 猪苓 通草

閉者加大黄三兩女人房勞腎中有熱小便難不利

小腹滿痛脉沈細者加猪腎一具 崔氏云若加腎可用水一斗半先煮腎取一斗汁然後内藥煎之小品方不用枳實

治百種淋寒淋熱淋勞淋小便澀胞中滿腹急痛方

通草 石韋 王不留行 各二兩

瞿麥 白朮 芍藥 各三兩

右九味㕮咀以水一斗煎取三升分三服 古今錄驗有當歸二兩治下篩以麥粥清服方寸匕日三

石韋 甘草 冬葵子 滑石

又方滑石 石韋 栝蔞根 各二兩

右三味治下篩大麥飲服方寸匕日三

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:15
列印頁數：1311
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治諸種淋方

葵根 八兩 莂根 石首魚頭石 各三兩

甘草 一兩 通草 二兩 貝子 五合 天麻根 五兩

右七味㕮咀以水一斗二升煮取五升分五服日三夜二亦主石淋

又方榆皮 一斤 車前子 冬瓜子 各一升 鯉魚齒 桃膠 通草 地脉 各二兩 瞿麥 四兩

右八味㕮咀以水一斗煮取三升分三服日三

又方細白沙三升熬令極熱以酒三升淋取汁服一合

治淋痛方

滑石 四兩 貝子 七枚燒碎 茯苓 白术

通草 芍藥 各二兩

右六味治下篩酒服方寸匕日二服十日瘥

又方葵子 五合 茯苓 白术 當歸 各二兩

右四味㕮咀以水七升煮取二升分三服日三

又方取猪脂酒服三合日三小兒服一合臘月者

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治小便不利莖中疼痛小腹急痛方

通草 各三兩 茯苓 各三兩 葶藶 二兩

右三味治下篩以水服方寸匕日三

又方蒲黃 各等分 滑石 各等分

右二味治下篩酒服方寸匕日三

治小便不利膀胱脹水氣流腫方

水上浮萍曝乾為末服方寸匕日三

治小便不通方

滑石 三兩 葵子 榆白皮 各一兩

右三味治下篩煮麻子汁一升半取一升以散二方寸匕和分三服即通

又方水四升洗甑帶取汁煮葵子取二升半分三服

又方胡燕屎豉各一合和擣丸如梧子服三丸日三

又方髮去垢燒末葵子各一升以飲服方寸匕日三

又方石首魚頭石為末水服方寸匕日三

又方石槽塞灰土井華水服之日三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方鯉魚齒燒灰末酒服方寸匕日三

又方車前子末方寸匕日三服百日止

治卒不得小便方

吞雞子白取瘧蔔氏云吞黃一

又方車前草一把桑白皮半兩

右二味㕮咀以水三升煎取一升頓服之

治婦人卒不得小便方

杏仁二七枚熬末服之立下

又方紫苑末井華水服三指撮立通血出者四五度服之治黃疸後小便淋瀝方

猪腎一具切茯苓一斤瞿麥六兩

車前根二斗切黃芩三兩椒目三合綿裹澤瀉

地膚子各四兩

治氣淋方

猪腎煮取一斗三升去腎下藥煮取三升分三服

右八味㕮咀以水二斗煮車前取一斗六升去滓下

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:16
列印頁數：1314
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

水三升煮船底苔如鴨子大取二升頓服

又方水三升煮豉一升一沸去滓内鹽一合頓服亦可

單煮豉汁服之

又方水一斗煮比輪錢三百文取三升温服之

又方搗葵子末湯服方寸匕

又方空腹單茹蜀葵一滿口

又方熬鹽熱熨小腹冷復易亦治小便血 肘後方治小便不通

灸法

灸臍中著鹽灸三壯 葛氏云治小便不通

灸闕元五十壯又灸俠玉泉相去一寸半三十壯

治石淋方

右用車前子二升絹袋盛水九升煮取三升先經宿不得食平旦空腹頓服之石即出 備急方云治熱淋

又方取浮石使滿一手許治下篩以水三升酢一升煮取二升澄清服一升不過三服石出 亦治噦淳酒煮之

又方桃膠棗許大夏以冷水三合冬以湯三合和服日

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三當下石子如豆卵石盡止亦治小便出血

灸法

石淋臍下三十六腫病不得小便灸關元三十壯　又灸氣門三十壯　又灸水泉三十壯足大敦是也

治膏淋方

右擣葎草汁二升酢二合和空腹頓服之當尿如小豆汁也又濃煮汁飲亦治淋瀝蘇澄用療尿血

治五勞七傷八風十二痺勞結為血淋熱結為肉淋小便不通莖中及小腹痛不可忍者方

滑石　桂心　冬葵子　王不留行　通草　車前子各二分　甘遂一分　石韋四分

右八味治下篩以麻子飲五合和服方寸匕日三

沙石出一方加榆白皮三分

灸法

勞淋灸足太陰百壯在內踝上三寸三報之

治熱淋方

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:17
列印頁數：1316
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大棗二七枚　葵根切一升冬用子夏用苗

右二味以水三升煮取一升二合分二服熱加黃芩一兩出難加滑石二兩末血者加茜根三兩痛者加芍藥二兩加藥亦加水也

又方白茆根切四斤以水一斗五升煮取五升服一升日三夜二

又方常煮冬葵根作飲服之

治血淋小便磭痛方

雞蘇二兩　通草　滑石各五兩　竹葉一把

生地黃半斤　小薊根一兩

右六味㕮咀以水九升煎取三升去滓分三服温服

石韋散治血淋方

石韋　當歸　蒲黃　芍藥

右四味各等分治下篩酒服方寸匕日三

又方以水五升煮生大麻根十枚取二升頓服亦治小便出血

又方以水四升煮大豆葉一把取二升頓服

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:17
列印頁數：1317
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方以水三升煮葵子一升取汁日三服亦治虛勞尿血

灸法

血淋灸丹田隨年壯又灸伏留五十壯一云隨年壯

五淋不得小便灸懸泉十四壯穴在內踝前一寸斜行小脉上是中封之別名

五淋灸大敦三十壯

卒淋灸外踝尖七壯

淋病九部諸疾灸足太陽五十壯

淋病不得小便陰止痛灸足太衝五十壯

腹中滿小便數起灸玉泉下一寸名尿胞一名屈骨端

灸二七壯小兒以意減之

治遺尿小便澀方

牡蠣 鹿茸 各四兩 桑耳 三兩錄驗無 阿膠 三兩

右四味咬咀以水七升煮取二升分二服日三

又方防己 葵子 防風 各二兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右三味㕮咀以水五升煮取二升半分三服散服亦佳

治小便失禁方

以水三升煮雞腸取一升分三服

治失禁出不自覺方

右用豆醬汁和竈突墨如豆大内尿孔中范注云治胞轉亦治小兒

治尿牀方

取羊肚系盛水令滿線縛兩頭熟煮即開取中水頓服立瘥

又方取雞肫胵一具并腸燒末酒服男雌女雄

又方取羊胞盛水滿中炭火燒之盡肉空腹食不過四五度瘥

又以新炊熱飯一盞瀉尿牀處拌與食之勿令知良

灸法

遺尿失禁出不自知灸陰陵泉隨年壯

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

遺溺灸遺道俠玉泉五寸又灸陽陵泉又灸足陽明各
隨年壯
小便失禁灸大敦七壯又灸行間七壯
尿牀垂兩手兩髀上盡指頭上有陷處灸七壯又灸臍
下橫文七壯

治房勞傷中尿血方
牡蠣　桂心　黃芩

尿血第三　方

治小便血方
生地黃八兩　栢葉一把　黃芩　阿膠各二兩

右四味咬咀以水八升煮取三升去滓下膠分三服
右四味治下篩以飲服方寸匕稍加至二匕日三服
車前子各等分

乾地黃　酸棗小品作敗醬　芎藭　葵子
又方菟絲子　蒲黃　白芷　荊實
一方加甘草二兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:19
列印頁數：1320
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

當歸　茯苓各等分

右十味為末蜜丸如梧子飲服五丸日三稍加至十

丸

又方戎鹽六分　甘草　蒲黃　鹿魚膠各二兩　礬石三兩　大棗十枚

右七味咬咀以水九升煮取二升分三服

又方胡麻三升擣細末以東流水二升漬一宿平旦絞去滓煮兩沸頓服

又方龍骨為細末温水服方寸匕日五六服　張文仲云酒服

又方酒三升煮蜀當歸四兩取一升頓服

又方擣荆葉取汁酒服二合

又方煮車前根葉子多飲佳

又方酒服亂髮灰　蘇澄用水服

又方酒服葵莖灰方寸匕日三

又方刮滑石末水和傅繞小腹及陰際佳　葛氏云治小便不通

又方鼓二升酒四升煮取一升頓服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

水腫第四 方論 灸證 法

論曰大凡水病難治瘥後特須慎於口味又復病水人多嗜食不廉所以此病難愈也代有醫者隨逐時情意在財物不本性命病人欲食肉於貴勝之處勸令食羊頭蹄肉如此者未見有一愈者又此病百脉之中氣水俱實治者皆欲令瀉之使虛羊頭蹄極補那得瘳愈所以治水藥多用葶藶子等諸藥本草云葶藶久服令人大虛故水病非久虛不得絶其根本又有蠱脹但腹滿不腫水脹脹而四肢面目俱腫大有醫者不善診候治蠱以水藥治水以蠱藥或但見脹滿皆以水藥如此者仲景所云愚醫殺之今録忌如左 其治蠱方具在雜方篇見第七十四卷中

喪孝　産乳　音樂　房室

諠戲　一切魚　一切肉　一切生冷

酢滑　蒜　粘食米豆油膩

右以前並禁不得食不及不得用心其不禁者並具本方之下其房室等猶三年慎之永不復發不爾者

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

雖瘥復發復發不可更治也古方有十水丸歷驗多利大便而不利小便所以不能述録也

黄帝問岐伯曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕何以别之岐伯曰水之始起也目果上微腫（靈樞太素作微癰）如新臥起之狀頸脉動時欬陰股間寒足脛腫腹仍大其水已成也以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也膚脹何以候之膚脹者寒氣客於皮膚之間殼殼然而堅（太素外臺作不堅）腹大身盡腫皮厚按其腹陷（太素脣作而）不起腹色不變此其候也鼓脹如何鼓脹者腹脹身腫大大與膚脹等其色蒼黄腹脉起此其候也腸覃如何腸覃者寒氣客於腸外與胃（太素作太衛）氣相薄正氣不得榮因有所繫瘕而内著惡氣乃起息肉乃生始也如雞卵稍以益大及其成也若懷子之狀久者離歲月按之即堅推之則移月事時下此其候也石瘕如何石瘕者生於胞中寒氣客於子門子宫閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉衄以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:20
列印頁數：1323
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

導而下之曰膚脹鼓脹可刺耶曰先瀉其腹之血絡後調其經刺去其血脉師曰病有風水有皮水有正水有石水有黄汗風水其脉自浮外證骨節疼痛其人惡風皮水其脉亦浮外證浮腫按之没指不惡風其腹如鼓要畧巢酒作如故不滿不渴當發其汗正水其脉沈遲外證自喘石水其脉自沈外證腹滿脉經作痛不喘黄汗其脉沈遲身體發熱胷滿四肢頭面並腫久不愈必致癰膿心水者其人身體重一作軆而少氣不得卧煩而燥其人陰大腫肝水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時津液微生小便續通脾水者其人腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難也肺水者其人身體腫而小便難時時鴨溏腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗足為逆冷其面反瘦師曰治水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗即愈問曰有病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫何故師云此法當病水若小便自利及汗出者自當愈一作滿月當愈凡水病之初先

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

兩目上腫起如老蠶色俠頸脉動股裏冷脛中滿按之没指腹内轉側有聲此其候也不即治之須臾身體稍腫腹中盡脹按之隨手起水為已成猶可治也此病皆從虛損所致

大病或下利後婦人産後飲水不即消三膲決漏小便不利仍相結漸漸生聚遂流諸經絡故也

水有十腫不可治者有五第一脣黑傷肝第二缺盆平傷心第三臍出傷脾第四背平傷肺第五足下平滿傷腎此五傷必不可治

凡水病忌腹上出水出水者一月死大忌之

中軍候黑圓治膽玄水先從頭面至脚腫頭眩痛身虛熱名曰玄水體腫大小便澀宜此方 方見第五十八卷中

治小腸水小腹滿暴腫口苦乾燥方

右用巴豆三十枚和皮咬咀水五升煮取三升綿内汁中拭腫上隨手可減日五六拭莫近目及陰 集驗治身暴腫如吹

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治大腸水乍虛乍實上下來去方

赤小豆 五升 桑白皮 切二升 鯉魚 四斤 白术 八兩

右四味咬咀以水三斗煮魚取爛勿用鹽去魚盡食并取汁四升許細細飲下

又方羊肉 一斤 當陸 切一升

右二味以水二斗先煮當陸令爛去滓後内羊肉及

蔥豉酢一如臛法 肘後云治卒腫滿身面浮大

治膀胱石水四肢瘦腹腫方

桑白皮 穀白皮 各四兩 澤漆葉 各三升 大豆 五升

右七味咬咀以水一斗五升煮取六升去滓内好酒三升更煮取五升日二夜一餘者次日更服 集驗方無澤漆

防己 射干 各四兩 白术 各四兩

防己 射干 只四味

又方桑白皮 六兩 射干 各四兩 澤瀉 三兩 黄芩 茯苓 防己 二兩 大豆 三升

澤漆 切一升

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:22
列印頁數：1326
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右九味㕮咀以水五斗煮大豆取三斗去豆澄清取一斗下藥煮取三升空腹分三服

治胃水四肢腫腹滿方

猪腎一具　茯苓四兩　防己四兩　橘皮四兩　玄參四兩　黄芩四兩　杏仁一作漆各二兩　澤瀉一升　白术三兩　大豆三升

右十二味㕮咀以水一斗八升煮猪腎大豆澤瀉桑白皮取一斗澄清去滓内餘藥煮取三升分三服若有人患氣急積久不瘥遂成水腫如此者衆諸皮中浮水攻面目身體從腰以上腫皆以此湯發汗悉愈方

桑白皮二兩各　猪苓二兩　甘草二兩　麻黄四兩　茯苓四兩　杏仁八分各　橘皮四兩　防己四兩

欽定四庫全書　備急千金要方

效加五味子三兩凡服三劑間五日一劑常用有效

治面腫小便澀心腹脹滿方

右二味㕮咀以水五升煮麻黄再沸去沫内甘草取三升分三服取汗愈慎風冷等

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:22
列印頁數：1327
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

葶藶 各五分
蘇子 三合
右六味為末蜜丸如小豆服十丸以桑白皮湯送下
日二加至三十丸
治面目手足有微腫常不能好者方
以楮葉切二升以水四升煮取三升去滓内米煮作
粥食如常食勿絶冬則預取葉乾之準法作粥周年
永瘥慎生冷一切食物
治大腹水腫氣息不通命在旦夕者方
牛黄 二分
椒目 三分
昆布 海藻 各十分
牽牛子 桂心 各八分
葶藶子 六分
右七味為末別擣葶藶如膏合和丸如梧子飲服十
丸日二稍加小便利為度大良正觀九年漢陽王患
水醫所不治余處此方日夜尿一二斗五六日即瘥
有人患水腫腹大其堅如石四肢細小勞苦足脛腫小
飲食便氣急此終身疾服利下藥不瘥者宜服此藥將
瘥後有他犯因爾殂矣計此即是神方 崔氏云蜜和為九蜜湯服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以微除風濕利小便消水穀歲久服之乃可得力瘥後可常服

鬼箭羽 丹參 白术 獨活 各五兩

秦艽 猪苓 各三兩 知母 海藻 各二兩

茯苓 桂心 各二兩

右十味㕮咀以酒三斗浸五日服五合日三任性量力漸加之

治水腫利小便酒客虛熱當風飲冷水腹腫陰腫滿方

當陸 四兩 甘遂 一兩 芒硝 芫花 各二兩 吳茱萸

右五味為末蜜丸如梧子大飲服三丸日三一方有大豆散治久水腹肚大如鼓者方

大黃蕘花各二兩無茱萸加麝香猪苓各一兩

烏豆一斗熬令香勿令大熟去皮為細末篩下餳粥皆得服之初服一合稍加之若初服多後即嫌臭服盡更作取瘥止不得食肥膩渴則飲羹汁慎酒肉猪

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

雞魚生冷酢滑房室得食漿粥牛羊兎鹿肉此據大
饑渴時食之可忍亦勿食也此病難治雖諸大藥丸
散湯膏當時暫瘥過後復發惟此散瘥後不發終身
服之終身不發矣其所禁食物常須少噉莫隨意鹹
物諸雜食等

又方蕈蘑末　蒼耳子灰　各二十匕

右二味水調和服之日二

又方椒目水沈者取熬擣如膏酒服方寸匕

治水氣腫鼓脹小便不利方

葸茗子　一升　羚羊肺　一具青羊亦佳

右二味先洗羊肺湯微湆之薄切曝乾作末以三年
大酢漬葸茗子一晬時出熬令變色熟擣如泥和肺
末蜜合擣三千杵為丸如梧子大食後一食久以麥
門冬飲服四丸日三以喉中乾口粘浪語為候數日
小便大利佳山連療韋司業得瘥司業姪雲表所送

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:24
列印頁數：1330
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

云數用神驗

麥門冬飲方

麥門冬二十五枚 米二十五粒

右二味以水一升和煮米熟去滓以下前件丸藥逐服作用之

徐王煮散治水腫利小便方

牛角鰓 防己 羌活 人參

丹參 牛膝 升麻 防風

秦艽 生薑屑 穀皮 紫菀

杏仁 附子 石斛 各三兩 桑白皮 六兩

橘皮 二兩 白朮 澤瀉 茯苓

郁李仁 豬苓 黃連 各一兩

右二十三味治下篩為粗散以水一升五合煮三寸匕取一升頓服日再不能者但一服二三月以前可服主利多而小便澀者用之大驗

褚澄漢防己散治水腫上氣方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

漢防己 澤漆葉 石韋 澤瀉 各五兩

桑根白皮 白朮 丹參 赤茯苓

橘皮 通草 各三兩 生薑 十兩 郁李仁 五合

右十二味治下篩為粗散以水一升半煮三方寸匕取小便利為度

茯苓圓治水腫甄權為安康公處者方

茯苓 白朮 椒目 各四分 木防己

葶藶 澤瀉 各五分 甘遂 十二分 赤小豆

前胡 芫花 桂心 各二分 芒硝 七分別研

右十二味為末蜜和丸如梧子蜜湯下五丸日一稍加以知為度

治水腫利小便方

大黃 白朮 一作葶藶 木防己 各等分

右三味為末蜜丸如梧子飲下十丸利小便為度不知加之

又方牽牛子末水服方寸匕日一以小便利為度

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方葶藶 四兩 生用 桂心 一兩
右二味為末蜜丸如梧子大飲下七丸日二以知為度
又方郁李仁 末 麵 各一升
右二味和作餅子七枚燒熟空腹熱食四枚不知加一枚以至七枚
又方水銀 三兩 煮三日三夜 葶藶子 椒目 各一升
衣魚 二七枚 水萍 瓜蒂 滑石 各二兩
芒硝 五兩
右八味擣葶藶令細下水銀更擣令不見水銀止別擣椒目令細擣瓜蒂水萍下篩合和餘藥以蜜和更擣三萬杵成丸初服一丸如梧子次服二丸次服三丸次服四丸次服五丸次服六丸至七日還從一丸起始服藥當至六丸還從一丸起始服藥當咽喉上有癰子腫起頰車腫滿齒斷皆腫唾碎血出勿怪也不經三五日即消所苦皆瘥以上服藥若下

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:25
列印頁數：1333
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

多停藥以止利藥至五下止病未瘥更服病瘥止此
治諸體肉肥厚按之不陷甚者臂粗著衣袖不受及
十種大水醫不治者悉主之神驗 深師集驗陶氏古今録驗無衣魚水
萍爪蒂 滑石
澤榛湯治水氣通身浮腫四肢無力或從消渴或從黃
疸支飲内虚不足榮衛不通氣不消化實皮膚中喘息
不安腹中響脹滿眼目不得視方
澤榛根 十兩 鯉魚 五斤 生薑 八兩 赤小豆 二升
茯苓 三兩 人參 甘草 麥門冬 各二兩
右八味咬咀以水一斗七升先煮魚及豆減七升去
之内藥煮取四升半一服三合日三人弱服三合再
服氣下喘止可至四合晬時小便利腫氣減或小瀉
下若小便大利還從一合始大利便止若無鯉魚鯛
魚亦可用若水甚不得臥臥不得轉側加澤榛一斤
渴加栝蔞根二兩欬嗽加紫菀二兩細辛一兩欬冬
花一合桂心三兩增魚汁二升 胡洽無小豆麥門冬有澤瀉五合杏仁一

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:25
列印頁數：1334
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

兩古今録驗無小豆治水在五藏令人欬逆喘上氣腹大而響兩脚腫目下有臥蠶狀微渴不得安臥氣奔短氣有頃乃復小便難少而數肺病胷滿隱痛宜利小便水氣迫肺翕翕寒熱

猪苓散治虚滿通月腫利三膲通水道方

猪苓 葶藶 五味子 防風 澤瀉 桂心 狼毒 椒目 白朮 乾薑 大戟 甘草 各二兩 蒜蓉 二兩半 人參 玄參 赤小豆 二合 女麴 三合

右十七味治下篩酒服方寸匕日三夜一老小一錢匕以小便利為度

治水氣通身洪腫百藥治不瘥待死者方

大麻子 皆取新肥者佳 赤小豆 不得一粒雜各一石

右二味皆以新精者淨揀擇以水淘洗曝乾蒸麻子使熟更曝令乾貯淨器中欲服取五升麻子熬令黃香只宜緩火勿令焦極細作末以水五升搦取汁令盡淨窓器盛貯明旦欲服今夜以小豆一升淨淘浸

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:26
列印頁數：1335
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

至旦乾漉去水以新水煮豆末及好熟即漉出令乾
内麻子汁中煮令大爛熟為佳空腹恣食日三服當
小心悶少時即止五日後小便數或赤而唾粘口乾
不足怪之服訖常以小便利為佳
又方煎人尿令可丸服如小豆大日三
又方大棗肉七枚苦瓠膜如棗核大擣丸一服三丸如
行十五里久又服三丸水出更服一丸即止
又方擣生葶藶子酢和服以小便數為度
又方燒薑石令赤内黑牛尿中令熱服一升日一
又方單服牛尿大良凡病水服無不瘥服法先從少起
得下為度
又方灸足第二趾上一寸隨年壯又灸兩手大指縫頭
七壯
麻黄煎治風水通身腫欲裂利小便方
麻黄 茯苓 澤瀉 各四兩 防風 澤榛 白朮 各五兩 杏仁 大戟

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:26
列印頁數：1336
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

清酒 各一升
黄耆 猪苓 各三兩
大豆 二升 煮取一升 水七升
獨活 八兩

右十三味㕮咀以豆汁酒及水一斗合煮取六升分六七服一日一夜令盡當小便極利為度

大豆散治風水通身大腫眼合不得開短氣欲絶方

大豆 杏仁 清酒 各一升 麻黄 木防己 防風 猪苓 各四兩 澤瀉 黄耆 烏頭 各三兩 生薑 七兩 半夏 六兩 茯苓 白朮 各五兩 甘遂 甘草 各二兩

右十六味㕮咀以水一斗四升煮豆取一斗去豆内藥及酒合煮取七升分七服日四夜三得小便快利為度腫消停藥不必盡劑若不利小便者加生大戟一升蔾蘆二兩無不快利萬不失一 深師方無猪苓澤瀉烏頭半夏

治風水腫方

甘遂

大豆 三升 茯苓 白朮 各五兩 防風

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

橘皮 半夏 生薑 各五兩 鼈甲
當歸 防巳 麻黃 猪苓 各三兩
大戟一兩 葵子一升
桑白皮五升以水二斗煮取一斗去滓内前藥
麻子湯治遍身流腫方
麻子五升 赤小豆三升 當陸一斤 防風三兩
附子一兩
每服相去如人行十里久
右十五味㕮咀内前汁中煮取五升每服八合日三
右五味㕮咀先擣麻子令熟以水三斗煮麻子取一斗三升去滓内藥及豆煮取四升去滓食豆飲汁
大豆煎治男子女人新久腫得暴惡風入腹婦人新産上圍風入臟腹中如鞭者噓吸短氣欬嗽方
右用大豆一斗淨擇以水五斗煮取一斗五升澄清内釜中以一斗半美酒内中更煎取九升宿勿食平旦服三升温覆取汗兩食頃當下去風氣腫退慎風

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

冷十日平復除日合服佳苦急不可待逐急合服腫不盡退加之腫瘥更服三升若十分瘥勿服病中亦可任性飲之使酒氣相接（附後云腫瘥後渴慎勿多飲）

又方楮皮枝葉一大束切煮取汁隨多少釀酒但飲醉為佳不過三四日腫少退瘥後可常服之一方用猪椒皮枝葉

又方鯉魚長一尺五寸以尿淹漬一宿平旦以木篦從口貫至尾微火炙令微熟去皮宿勿食空腹頓服之不能者分再服勿與鹽

摩膏治表凡腫病須百方内外攻之不可一槩方

生當陸（一斤煎可得二斗）一斤　猪膏一斤

右二味和煎令黃去滓以摩腫亦可服少許并塗以紙覆上燥輒傅之不過三日瘥

麝香散治婦人短氣虛羸遍身浮腫皮膚急人所稀見方

麝香（三銖）　雄黃（六銖）　芫花　甘遂（各二分）

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:28
列印頁數：1339
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右四味治下篩酒服錢五匕老小以意增減亦可為
丸如小豆大强者服七丸 小品無雄黃深師以蜜丸
如大豆服二丸日三治三
焦決滿水在胷外名曰水病腹濁大在腹表用
大麝香丸華池方肘後有人參二分為丸服
治虛勞浮腫方
右灸太衝百壯又灸腎輸

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:28
列印頁數：1340
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷六十五

詳校官太醫院院使臣袁天錫
編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐
校對官中書臣胡紹基
謄錄監生臣劉文耀

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷六十五　唐　孫思邈　撰

丁腫方

宋　林億等　校正

丁腫第一　論方　證灸法

論曰夫稟形之類須存攝養將息失度百病萌生故四時代謝陰陽遞興此二炁更相擊怒當是時也必有暴氣夫暴氣者每月之中必有卒然大風大霧大寒大熱若不時避人忽遇之此皆入人四體頓折皮膚流注經脉遂使腠理壅隔榮衛結滯陰陽之氣不得宣泄變成癰疽丁毒惡瘡諸腫至於丁腫若不預識令人死不逮辰若著訖乃欲求方其人已入木矣所以養生之士須早識此方凡是瘡瘍無所逃矣

凡療丁腫皆刺中心至痛又刺四邊十餘下令血出去血傳藥藥氣得入針孔中佳若不達瘡內療不得方

又其腫好著口中頰邊舌上見赤黑如珠子磣痛應心

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:29
列印頁數：1342
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

是也是秋冬寒毒久結皮中變作此疾不即療之日夜根長流入諸脉數道如箭入身捉人不得動搖若不慎口味房室死不旋踵經五六日不瘥眼中見火光神悟口乾心煩即死也

一曰麻子丁其狀肉上起頭大如黍米色稍黑四邊微赤多癢忌食麻子及衣布并入麻田中行

二曰石丁其狀皮肉相連色烏黑如黑豆甚硬刺之不入肉内隱隱微疼忌瓦礫塼石之屬

三曰雄丁其狀皰頭黑靨四畔仰瘡皰漿起有水出色黄大如錢孔形高忌房事

四曰雌丁其狀瘡頭稍黄向裏靨亦似灸瘡四畔皰漿起心凹色赤大如錢孔忌房事

五曰火丁其狀如湯火燒灼瘡頭黑靨四邊有皰漿起如赤粟米忌火炙爍

六曰爛丁其狀色稍黑有白瘢瘡中潰潰則有膿水流出瘡形大小如匙面忌沸熱食爛帛物

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

七曰三十六丁其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起大赤色今日生一明日二後日三乃至十若滿三十六藥所不能治如未滿三十六者可治俗名黑皰忌嗔怒畜積愁恨

八曰蛇眼丁其狀瘡頭黑皮上浮生形如小豆狀似蛇眼大體硬忌惡眼看并嫉妬人見之及毒藥

九曰鹽膚丁其狀大如匙面四畔皆赤有黑粟粒起忌食鹹物

十曰水洗丁其狀大如錢形或如錢孔大瘡頭白裏黑黧汁出中硬忌飲漿水水洗渡河

十一曰刀鎌丁其狀瘡闊狹如薤葉大長一寸左側肉黑如燒爍忌刺及刀鎌切割鐵刃所傷可以藥治

十二曰浮漚丁其狀瘡體曲圓少許不合長而狹如薤葉大内黄外黑黑處刺不痛内黄處刺之則痛

十三曰牛拘丁其狀肉皰起搯不破

右十三種瘡初起必先癢後痛先寒後熱熱定則寒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

多四肢沉重頭痛心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難治其麻子丁一種始末惟癢所録忌者不得犯觸犯觸者即難療其浮漚丁牛拘丁兩種無所禁忌縱不療亦不能殺人其狀寒熱與諸丁同皆以此方療之萬不失一欲知犯觸之狀但脊强瘡痛極甚不可忍者是也

治十三種丁方

右用枸杞其藥有四名春名天精夏名枸杞秋名却老冬名地骨春三月上建日採葉夏三月上建日採根凡四時枝秋三月上建日採子冬三月上建日採根等四味並曝乾若得五月五日午時合和大良如不得依法採者但得一種亦得初逢建日取枝葉子根等四味並曝乾若得五月五

用緋繒一片以裹藥取匝為限亂髮雞子大牛黄梧子大反鈎棘針二十七枚末赤小豆七粒末先於緋上薄布亂髮以牛黄末等布上曝即捲緋繒作圍以髮作繩十字縛之熨斗中急火熬令沸沸定後自乾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

即刮取擣作末絹篩以一方寸匕取枸杞四味合擣絹篩取二匕和合前一匕共為三匕令相得入分為一分早朝空腹酒服一分日二

齊州榮姥方凡是丁腫皆用治之

牡蠣九兩爛者 鍾乳 白石英一兩 桔梗一兩半 枸杞根皮各二兩 白薑石一斤軟黃者

右六味各擣絹篩合和令調先取伏龍肝九升為末以清酒一斗二升攪令渾澄清取二升和藥捻作餅子大六分厚二分其濁滓仍置盆中布餅子於籠上以一幅紙藉盆上以泥酒氣蒸之仍數攪令氣散發經半日藥餅子乾乃內瓦堝中每一重紙一重藥遍布勿令相著以泥密封三七日乾以紙袋貯置乾處舉之用法以針刺瘡中心深至瘡根并刺四畔令血出以刀刮取藥如大豆許內瘡上若病重困日夜三四度輕者一二度著重者二日根爛始出輕者半日一日爛出當看瘡浮起是根出之候若根出已爛者

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:31
列印頁數：1346
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

勿停藥仍著之藥甚安穩令生肌易其病在口咽及
胷腹中者必外有腫異相也寒熱不快疑是此病即
以飲或清水和藥如二杏仁許服之日夜三四服自
然消爛或以物剔吐根出即瘥若根不出亦瘥當看
精神自覺醒悟合藥以五月五日為上時七月七日
次之九月九日臘月臘日皆可若急須藥他日亦得
孝子不具足人產婦六畜雞犬等見之凡有此病忌
要之不及良日也脩合須清淨燒香不得觸穢毋令
房室猪牛雞魚生韭蔥蒜芸薹胡荽葵酒醋麪等若
犯諸忌而發動者取枸杞根湯和藥服並如後方其
二方本是一家智者評論以後方最是真本

趙嬈方

薑石 二十兩 崔氏作十兩
五兩 牡蠣 三兩 茯苓 三兩
枸杞根皮 四兩

右四味各擣篩合和先取新枸杞根合皮切六升水
一斗半煎取五升去滓内狗屎 崔氏云屎 二升攪令調澄

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:32
列印頁數：1347
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取清和前藥熟擣捻作餅子陰乾病者以兩刃針當頭直刺瘡痛徹拔針出刮取藥末著急内瘡孔中勿令歇氣并偏封瘡頭上即脹起針挑根即出重者半日已上或已消爛挑根不出亦自瘥勿憂其病在内者外當有腫相應並皆惡寒發熱疑有瘡者以水半盞刮取藥如桐子大五枚和服之日夜三服即自消若不出根亦自消爛在外者亦日夜三度傳藥根出也若須根出服藥經一日以雞羽剔吐即隨吐根出後常傳勿住即生肉易瘥若犯諸忌而發動者取枸杞根合皮骨切三升以水五升煎取二升去滓研藥末一錢匕和枸杞汁一盞服之日二三服并單飲枸杞汁彌佳又以枸杞汁攪白狗屎取汁服之更良合訖即用不待乾所言白狗屎是狗食骨其屎色如石灰故直言狗白屎也如預造取五月五日七月七日九月九日臘月臘日者尤良神驗或有人忽喉中痛乍寒乍熱者即是其病當急以此藥療之無故而痛

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:32
列印頁數：1348
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

惡寒發熱者亦是此病但依前服之立瘥前後二方同是一法其用一同亦主癰疽甚效

治丁腫病忌見麻勃見之即死者方

胡麻　燭燼　針沙　各等分

右三味為末以醋和傅之

又方石灰三分　馬齒菜二分

右二味擣以雞子白和傅之

又方針刺四邊及中心塗雄黃末立愈神驗一云塗黃土

又方鼠新垤土以小兒尿和傅之

又方鐵衣末以人乳汁和傅之立可

又方小豆花為末傅之瘥

又方以人屎尖傅之立瘥

又方以四神丹一枚當頭上安經宿根即出矣

治一切丁腫方

右用蒼耳根莖苗子但取一色燒為灰醋泔淀和如泥塗上乾即易不過十度根即拔神良余以正觀四

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

年忽口角上生丁腫造甘子振家母為帖藥經十日不瘥余以此藥塗之得愈已後常作此藥以救人無有不瘥者故特論之以傳後嗣丁腫方殆有千首皆不及此雖齊州榮姥方亦不能勝此物造次易得也又方取鐵漿每飲一斗立瘥

更佳

又方蒺藜子一升燒灰釅醋和封上經宿便瘥或針破頭封上

又方麪和臘月猪脂封上瘥

又方皂莢子取仁作末傅之五日内瘥

玉山韓光方韓光治丁腫人也正觀初衢州徐使君訪得此方

右用艾蒿一擔燒作灰於竹筒中淋取汁以一二合和右灰如麪漿以針刺瘡中至痛即點之點三遍其根自拔亦大神驗正觀中用治三十餘人得瘥故録之

魚臍丁瘡似新火針瘡四邊赤中央黑可針刺之若不

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大痛即殺人治之方

右以臘月魚頭灰和髮灰等分以雞溏屎和傅上此外臺不用髮灰以雞子清和塗

瘡見之甚可即能殺二

又方以寒食餳傅之良硬者燒灰塗帖即瘥

治魚臍瘡頭白似腫痛不可忍者方

先以針刺瘡四畔作孔禱白苣取汁滴著瘡孔內

又方傅水獺屎大良

治赤根丁方

右熬白粉令黑蜜和傅之良

又方以新瓮鼠壤水和塗之熱則易

又方馬牙齒禱末臘月猪脂和傅之根即拔燒灰用亦可

犯丁瘡方

蕪菁根　鐵生衣　各等分

右二味和擣以大針刺作孔復削蕪菁根如針大以前鐵生衣塗上刺孔中又塗所擣者封上仍以方寸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

匕緋帛塗帖之有膿出即易須臾拔根出立瘥忌油膩生冷醋滑五辛陳臭粘食

又方刺瘡頭及四畔令汁極出擣生粟黄停上以麪圍之勿令黄出從旦至午即根拔矣

又方以麪圍瘡如前法以針亂刺瘡銅器煑醋令沸瀉著麪圍中令容一盞冷則易之三度根即出

又方取蛇蛻皮如雞子大以水四升煮三四沸去滓頓服立瘥

又方燒蛇蛻皮灰以雞子清和塗瘥

又方取蒼耳苗擣取汁一二升飲之滓傅上立瘥

又方灸掌後橫文後五指男左女右七壯即瘥已用得效丁腫灸法雖多然此一法甚驗出於意表也

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:34
列印頁數：1352
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷六十六 唐 孫思邈 撰

癰疽第二 脈禁法 論灸法 方

丁腫方 宋 林億等 校正

諸浮數脈當發熱而反洗洗惡寒若有痛處當結為癰

脈數身無熱即内有癰

脈微而遲必發熱脈弱而數此為振寒當發癰腫

脈浮而數身體無熱其形默默胃中微燥不知痛處其

人當發癰腫

脈滑而數滑則為實數則為熱滑即為榮數即為衛榮

衛相逢即結為癰熱之所過即為癰膿身體有痛處時

時苦有瘡

問曰寸口脈微而澀法當亡血若汗出設不汗者當云

何答曰若身有瘡被刀器所傷亡血故也

跌陽脈滑而數法當下重少陰脈滑而數婦人陰中生瘡

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:34
列印頁數：1353
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

論曰夫癰疽初發至微人皆不以為急此實奇患惟宜速治稍遲緩乃即病成以此致禍者不一但發背外皮薄為癰外皮厚為疽宜急治之

凡癰疽始發或似小瘡或復大痛或復小痛或發如米粒大白膿子此皆微候宜善察之見有小異即須大驚忙急須攻治及斷口味速服諸湯下去熱毒若無醫藥處即灸當頭百壯其大重者灸四面及中央二三百壯數灸不必多也復薄以冷藥種種救療必速瘥也

凡用藥帖法皆當瘡頭處其藥開孔令洩熱氣亦當頭以火針針入四分即瘥

凡癰疽瘤石癰結筋瘰癧皆不可就針角針角者少有不及禍也

凡癰無問大小已覺即取膠如手掌大暖水浸令軟納口上以綿裹之膠消更易新者常令口開一孔如錢孔大帖腫上令相當納然稱大小當頭上開一孔如錢孔大帖腫上令相當須臾乾急若未有膿者即定不長已作膿者當自出若以鋒針當孔上刺至膿大好至瘥乃洗去膠

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凡腫根廣一寸已下名癰一寸已上名小癰如豆粒大者名皰子皆始作急服五香連翹湯下之數劑取瘥乃止

凡癰高而光大者不大熱其肉正平無尖而紫者不須攻之但以竹葉黃耆湯申其氣耳肉正平為無膿也癰卒痛以八味黃耆散傳之大癰七日小癰五日其自有堅强者寧生破發乳若熱手不可得近者先内服王不留行散外摩發背膏若背生破無苦在乳宜令極熟候手按之隨手即起者瘡熟也須針之針法要得著膿以意消息胷背不過一寸斟量不得膿即與食肉膏散著允頭内癰口中如體氣熱歇即服木占斯散五日後癰欲著痂者即服排膿内塞散

凡癰破之後便綿惙欲死内寒外熱 文淵 腫自有似癰而非者當以手按腫上無所連乃是風毒耳勿針之宜服升麻湯外摩膏破癰口當令上留三分近下一分針之務令極熱熱便不痛破後敗壞不差者作猪蹄湯洗之

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:35
列印頁數：1355
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

日二度夏用二日冬用六七日用湯半劑亦可夫癰壞後有惡肉者宜猪蹄湯洗去穢次傅食肉膏散惡肉盡後傅生肉膏散及摩四邊令好肉速生當斷絶房室忌風冷勿自勞煩待筋脉平復乃可任意耳緣新肉易傷傷則裹潰潰則重發發即難救慎之慎之白痂最忌

凡諸暴腫一一不同無問近遠皆服五香連翹湯刺去血小豆末傅之其間數數以針刺去血若失療已潰爛者猶服五香湯及漏蘆湯下之隨熱多少依方用之外

以升麻湯榻洗熨之 方見丹毒篇 摩升麻膏 方見丹毒篇 若生息肉者以白薗茹散傅之青黑肉去盡即停止好肉生傅

升麻膏如肌不生傅一物黄耆散若傅白薗茹青黑惡肉不盡者可以榛頭薗茹散半錢和白薗茹散三錢稍稍傅之其散各取當色單擣下篩直爾成散用之 此數法集驗用治緩疽

或身中忽有痛處如遭打撲之狀名曰氣痛痛不可忍遊走不住發作有時痛則小熱痛定則寒此皆由久時

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:36
列印頁數：1356
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

受温氣至春暴寒風來折之不成温病乃作氣痛宜先服五香連翹湯摩丹參膏又以白酒煎楊柳皮及暖熨之有赤氣點點者即刺出血也其五香連翹湯及小竹瀝湯可服數劑勿以一劑未瘥便住藥以謂無效即禍至矣中間將白薇散佳又有氣腫痛其狀如癰腫無頭白針寫之次與蒺藜散傅之

虛腫色不變但皮急痛不得手近亦須服此五香湯次

胷中痛短氣者當入閤室中以手指捺左眼視若見光者胷中有結癰若不見光者是瘭疽内發出也

經云氣宿於經絡中血氣俱澁不行擁結為癰疽也不言熱之所作其後成癰又陽氣湊集寒化為熱熱盛則肉腐為膿也由人體有熱被寒冷搏之而脉凝結不行熱氣擁結成癰疽方有灸法亦有温治法以其中冷未成熱之時其用冷藥帖薄之治熱已成以消熱令不成膿也赤色腫有尖頭者藜蘆膏傅之一云醋和蚌蛤灰塗乾則易之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

余平生數病癰疽得效者皆即記之考其病源多是藥氣所作或有上世服石遂令子孫多有此疾食中尤不宜食麪及酒蒜及慎溫牀厚被能慎之者可得終身無他此皆躬自驗之故特論之也

五香連翹湯治一切惡核瘰癧癰疽惡腫患背方

青木香　沈香　丁香　薰陸香

麝香　射干　升麻　獨活

寄生　連翹　通草　各二兩　大黃　三兩

右十二味咬咀以水九升煮取四升內竹瀝二升更煮取三升分三服取快利　肘後方有紫蔕甘草無通草治惡肉惡脉惡核風結腫氣痛要籍喻義有黃耆甘草芒硝各六分千金翼云未瘡中間常服佳與小兒篇方相重小有異處

黃耆竹葉湯治癰疽發背方

黃耆　甘草　黃芩　芍藥

麥門冬　各三兩　當歸　人參　石膏

芎藭　半夏　各二兩　生薑　五兩　生地黃　八兩

大棗　三十枝　淡竹葉　一握

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:37
列印頁數：1358
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十四味咬咀以水一斗二升先煮竹葉取一斗去滓内藥煮取三升分四服相去如行二十里久日三夜一

八味黄耆散方

黄耆　芎藭　大黄　黄連　芍藥　莽草　黄芩　梔子仁　各等分

右八味治下篩雞子白和如泥塗故帛上隨腫大小傅之乾則易若已開口封瘡上須開頭令歇氣

王不留行散治癰腫不能潰困苦無聊賴方

王不留行子三合千金翼作一升　龍骨　當歸　各二兩　野葛皮半分　乾薑　桂心　各一兩　栝蔞根六分

右七味治下篩食後温酒服方寸匕日三以四肢習習為度不知稍加之令人安穩不覺膿自潰即著瘡痂平復神良此浩仲堪方隋濟閣黎所名為神散癰腫即消千金翼云治癰疽及諸雜腫已潰皆服之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

内補散治癰疽發背婦人乳癰諸癤未潰者便消不消者令速潰疾愈方

木占斯　人參　乾薑一云乾地黃　桂心　細辛　厚朴　敗醬　防風　栝蔞根　桔梗　甘草各一兩

右十一味治下篩酒服方寸匕藥入咽覺流入瘡中若癰疽灸之不能發壞者可服之未壞者去敗醬已發膿者内敗醬服藥日七八服夜二三服以多為善若病在下當膿血出此為腸癰也諸病在裏惟服此藥即覺其力痛者即不痛長服治諸瘡及疽痔瘡已潰便早愈醫人不知用此藥發背無有治者若始覺背上有不好處而渴者即勤服之若藥力行覺渴止便消散若雖已壞但日夜服之勿住藥腫自消散不覺去時欲長服者當去敗醬婦人乳癰宜速服之一方無桂心一名木占斯散主癰腫堅結若已壞者速愈未壞者使不成癰便消 張文仲無桂心劉涓子云此是華陀方

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:38
列印頁數：1360
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

排膿内塞散治大瘡熱退膿血不止瘡中肉虚疼痛方
防風 茯苓 白芷 桔梗
遠志 甘草 人參 芎藭
當歸 黄耆 各一兩 厚朴 二兩 桂心 二分
附子 二枚 赤小豆 五合酒浸熬之
右十四味治下篩酒服方寸匕日三夜一
猪蹄湯治癰疽發背方
猪蹄 一具治如食法 黄耆 黄連 芍藥 各三兩
黄芩 二兩 薔薇根 狼牙根 各八兩
右七味㕮咀以水三斗煮猪蹄令熟澄清取二斗下諸藥煮取一斗去滓洗瘡一食頃以帛拭乾帖生肉膏日一如痛加當歸甘草各二兩
又方治癰疽發十指或起膀胱及發背後生惡肉者方
猪蹄 一具治如食法 當歸 大黄 芎藭
芍藥 黄芩 獨活 莽草 各一兩
右八味㕮咀以水三斗煮猪蹄取八升去之内諸藥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煮取四升去滓漬瘡兩食頃洗之拭令乾傅麝香膏

麝香膏治癰疽及發背諸惡瘡去惡肉方

麝香　蔺茹一作真珠　雄黃　礬石各一兩

右四味治下篩以猪膏調如泥塗之惡肉盡止却傅

生肉膏

食惡肉膏方

大黃　芎藭　莽草　真珠

雌黃　附子生用各一兩　白斂　礬石

黃芩　蔺茹各二兩　雄黃半兩

右十一味咬咀以猪脂一升半煎五六沸去滓內蔺

茹礬石末攪調傅之瘡中惡肉盡乃止

治癰腫惡肉不盡者方

蒴藿灰一作藿灰　石灰肘後作白炭灰

右二味各淋取汁合煎如膏膏成傅之食惡肉亦去

黑子此藥過十日不中用

又方生地黃汁煎如膠作餅子帖之日四五度

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:39
列印頁數：1362
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

食惡肉散方

硫黃　丹砂　麝香　榛頭薊菇

馬齒礬　雄黃　雌黃　白礬　各二分

右八味治下篩以粉之吮食惡肉　千金翼薄帖篇無白礬雌黃有藜蘆無

云亦膏和傅之又處療癰疽篇無丹砂廣濟方療癰腫膿潰瘡中有紫肉破不消以此散充或內蝕之

又方蘭菇　礬石　雄黃　硫黃　各二分

右四味治下篩內瘡中惡肉盡即止不得過好肉也

生肉膏治癰疽發背壞後生肉方

生地黃一斤　辛夷二兩　大黃　黃耆　芍藥　黃芩　續斷　各一兩　蘼白五兩

右十二味咬咀以臘月猪脂四升煎取白芷黃下之去滓傳之立瘥

又方甘草　當歸　白芷　蔆蓉

蜀椒　細辛　各二兩　烏喙六分生用　蛇銜一兩

蘼白二十莖　乾地黃三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十味㕮咀以醋半升漬一宿次日猪膏三斤煎令沸三上三下膏成塗之立瘥

蛇銜生肉膏治癜疽金瘡敗壞者方

蛇銜 當歸 各六分 乾地黄 三兩 黄連 黄耆 黄芩 大黄 續斷 蜀椒 芍藥 白芷 附子 甘草 莽草 白芷 附子 甘草 細辛 各一兩 薤白 一把 這黄耆續斷白芨芎藭白芷甘草

右十八味㕮咀酢漬再宿臘月猪脂七升煎三上三下酢盡下之去滓取傅日二夜一 崔氏有大戟獨活各一兩無地黄黄

五香湯治熱毒氣卒腫痛結作核或似癰癤而非使人頭痛寒熱氣急者數日不除殺人

青木香 藿香 薰陸香 沉香 丁香 各一兩

右五味㕮咀以水五升煮取二升分三服不瘥更服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

并以滓停腫上 千金翼以麝香代藿香

漏蘆湯下之方

漏蘆 白芨

白薇 枳實

甘草 各二兩 大黃 三兩

右十味㕮咀以水一斗煮取三升分三服快下之無

藥處單用大黃亦得 肘後云治癰疽丹毒瘡惡肉有遠魅治時行熱毒變作赤色癰疽丹毒腫及眼赤痛生瘴翳若熱盛者可加芒硝二兩經心録無千金翼無白薇劉涓子無芍藥

漏蘆 白芨

黃芩 麻黃

升麻 芍藥

薇有知母犀角芒硝各二兩此方與小兒篇方相重分兩服法異

丹參膏方

丹參 蒴藿 莽草 蜀椒

牛膝 菊花 烏頭 防己 各一兩

蹲躅 各二兩 秦艽 獨活 白芨

日五六度 肘後用防風不用防己治惡肉惡瘡癰風結諸腫云此膏亦可服

煎取猪脂四升煎令醋氣歇慢火煎去滓用傅患處

右十二味㕮咀以醋二升浸一宿夏半日如急要便

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:40
列印頁數：1365
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

小竹瀝湯治氣痛方

淡竹瀝二升　射干　杏仁　獨活

枳實　白朮　防己　防風

秦艽　芍藥　甘草　茵芋

茯苓　黃芩　麻黃各二兩

右十五味㕮咀以水九升煮取半下瀝煮取三升分四服

白薇散方

白薇　防風　射干　白朮各六分

麻黃　秦艽各五分　當歸　防己

烏頭　青木香　天門冬　枳實

獨活　菱蕤　山茱萸各四分　柴胡

白芷各三分　莽草　蜀椒各二分

右十九味治下篩以漿水服方寸匕日三加至二匕

蒺藜散治氣腫痛方

右用蒺藜子一升熬令黃為末以麻油和如泥炒令

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

焦黑以停故熟布上如腫大小勿開孔帖之無蒺藜用小豆末和雞子如前乾易之妙

藜蘆膏治赤色腫有尖頭者方

藜蘆 二分　黃連 二分　礬石 各八分　雄黃 各二兩　松脂 各二兩　黃芩 各二兩

右六味為末猪脂二升二合煎令烊調和以傅上瘡癬頭瘡極效又治淺瘡經年抓搔癢處成孔者

瞿麥散治癰排膿止痛利小便方

瞿麥 一兩　芍藥　桂心　赤小豆 酒浸熬　白斂 各二兩　麥門冬　芎藭　黃耆　當歸

右九味治下篩先食酒下方寸匕日三 千金翼用細辛薏苡仁白芷不用桂心麥門冬白斂治諸癰潰及未潰瘡中疼痛膿血不絶不可忍者

薏苡仁散治癰腫令自潰長肉方

薏苡仁　桂心　白斂　當歸　蒐蓉　乾薑 各二兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右六味治下篩先食温酒服方寸匕日三夜二

黄耆茯苓湯治癰疽潰後膿太多虚熱方

黄耆 麥門冬 各三兩 生薑 四兩 五味子 四合

芎藭 茯苓 各二兩 桂心 各二兩 大棗 二十枚

右八味㕮咀以水一斗半煮取四升分六服 千金翼有遠志

内消散治凡是癰疽皆宜服之方

當歸 人參 甘草 赤小豆 酳一升浸熬 各二兩

右八味㕮咀以水一斗半煮取四升分六服 千金翼有遠志

升麻 四兩

白斂 薏苡仁 黄耆 各三兩 防風 一兩

瞿麥 當歸 猪苓 黄芩 各二兩

右十二味治下篩以酒服方寸匕日三夜二長服取

猶皮散治癰疽膿血内漏諸漏壞敗男發背女乳房及

五痔方

癆

猶皮 蜂房 各一具 地榆 附子

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桂心 當歸 蜀椒 藁本 各四分 續斷 各五分 乾薑 各四分 厚朴 六分 右十一味治下篩空腹以酒服方寸匕日三取瘥加斑猫七枚益良 凡患腫皆因宿熱所致須服冷藥瘥後有患冷利不止者方 人參 龍骨 赤石脂 甘草 乾薑 各二兩 附子 一枚 右六味咬咀以水八升煮取二升半分三服每服八合 合 梔子湯治表裏俱熱三焦不實身體生瘡及發癮癗大小便不利方 梔子仁 二七枚 芒硝 二兩 黄芩 甘草 知母 各三兩 大黄 四兩 右六味咬咀以水五升煮減半下大黄取一升八合去滓内芒硝分三服

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:42
列印頁數：1369
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五利湯治年四十已還强壯常大患熱發癰疽無定處大小便不通方 劉涓子大黄湯 名

芒硝一兩 升麻 梔子仁五兩 黄芩各二兩 大黄三兩

右五味咬咀以水五升煮取二升四合去滓下芒硝悦耐勞苦方

乾地黄圓凡壯熱人能長服之終身不患癰疽令人肥分四服快利即止

乾地黄五兩 芍藥 甘草 桂心

黄耆 黄芩 遠志各二兩 石斛

當歸 大黄各三兩 巴戟天 栝蔞根

人參各一兩 天門冬 蒐蓉各四兩

右十五味為末蜜丸如梧子酒服十丸曰三加至二十丸

又方治虚熱消瘡癰方

乾地黄四兩 大黄六分 芍藥 王不留行

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

茯苓　甘草
人參　遠志　麥門冬
右十二味為末蜜和丸如梧子大酒服十丸日三加
至二十丸久服令人肥健一方有枳實三兩（外臺無甘草遠志麥門冬人參升麻黃芩）
又方治虛勞客熱數發癰腫瘡癤經年不除方
乾地黃四兩　黃耆　黃連　澤瀉
黃芩　大黃
細辛各三兩　甘草
桂心　芍藥
茯苓　乾漆各二兩
人參一兩　天門冬五兩
右十四味為末蜜丸如梧子大酒服十丸日三夜一
加至二十丸久服延年終身不發癰疽凡方中用大
黃薄切五升米下蒸熟曝乾用之熱多倍大黃（要籍喻義無澤瀉）
地黃煎補虛除熱散乳石去癰癤痔疾悉宜服之方
生地黃隨多少三擣三壓取汁令盡銅器中湯上煮

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:43
列印頁數：1371
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

勿蓋覆令泄氣得減半出之布絞去粗碎結濁滓穢再煎令如餳丸如彈丸許酒服日三勿加之百日癰疽永不發

枸杞煎治虛勞輕身益氣令人有力一切癰疽永不發方

枸杞三十斤剉葉生至未落可用莖葉落至未生可用根以水一石煮取五斗去滓淀將滓更入釜與水依前煮取五斗并前為一斛澄清去淀釜中煎取二斗許更入小銅鍋子煎令連連如餳止或器盛重湯煮更好每日早朝服一合半日再初服一合漸加治風濕體痛不能飲食兼癰疽後補虛羸方

薔薇根　枳杞根　各一百斤　食蜜　生地黃　各十斤

右四味㕮咀先以水煮二根令味濃取二斛去淀次內地黃煮令爛絞去滓微火煎令如粥次內蜜耗令相得每食後服如彈丸許

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

搦腫方

大黃　黃芩　白斂　芒硝　各三分

右四味咬咀以水六升煮取三升故帛四重蘸汁中以搦腫處乾即易之無度數晝夜為之

又方治癰疽始作腫赤燉熱長甚速方

青木香　犀角　大黃　梔子仁

紫檀香　升麻　黃芩　羚羊角

黃連　甘草　芒硝　射干

黃蘗　白斂　各二分　地黃汁　五合　麝香　一分研入

右十六味咬咀以水五升煮取二升小冷故帛兩重蘸湯中搦腫處乾即易之日夜數百度

又方治頸項及胷背有大腫赤發即封之令不成膿方

朴消　五兩　香豉　生地黃汁　各半斤

右三味合擣煮令地黃爛熟傳腫處厚二分日三四易至瘥止此兼治一切腫

又方治癰腫痛煩悶方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右用生楸葉十重帖之以帛裹令緩急得所日二易止痛兼消腫蝕膿甚良勝於他物如冬月先收乾者臨用以鹽潤之亦可薄削楸皮用之

又方治大人小兒癰腫方

右用生猪腦傳紙上帖之乾則易日三四度

又方芥子為末湯和傳紙上帖之（千金翼以猪膽和塗之）

又方白薑石末蒜和擣傳上

又方涛馬鞭草傳上即頭出

又方灸兩足大拇趾奇中立瘥仍隨病左右

治癰始覺腫令消方

大黄　通草　葶藶　莽草

右四味各等分為末以水和傳上乾則易之

又方以葭茗末三指撮水和服之日三神良

治癰方

右用芜花為末膠和如粥傳之

治癰疽發腹背陰匿處通身有數十癰者方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右取乾牛糞燒灰治下篩以雞子白調塗之乾復易

若已結膿使聚長者方

右用栝蔞根為末苦酒和傅上燥復易赤小豆亦佳

治癰有膿令潰方

右用雞羽三七枚燒末服之即潰

又方人乳和麪傅上比曉膿血盡出不用近手

又方箔經繩燒末臘月猪脂和傅下畔即潰不須針灸

治癰腫發背初作及經十日已上腫赤燉熱毒氣盛日夜疼痛百藥不效方

鳅雞子一枚 新出狗屎如雞子大

右二味攪調和微火熬令稀稠得所捻作餅子於腫頭堅處帖之以紙帖上以帛抹之時時看視覺餅子熱即易勿令轉動及歇氣經一宿定如多日患者三日帖之一日一易至瘥止此方穢惡不可施之貴勝然其愈疾一切諸方皆不可及自外諸方還復備員設儀注而已學者當曉此方以備諸急爾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

烏麻膏治諸漏惡瘡一十三般丁腫五色遊腫癰癤毒熱狐刺蛇毒狂犬蟲狼六畜所傷不可識者二十年漏金瘡中風皆以此膏帖之惡膿盡即瘥止痛生肌一帖不換藥惟一日一度拭去膏上膿再帖至瘥止

生烏麻油一斤 黃丹四兩 四分皆大 蠟四兩 大斤

右三味以臘日前一日從午內油銅器中微火煎至午時出惟男子合之毋令小兒女人六畜等見明旦看油減一分下黃丹消盡下蠟令沫消藥成至

治諸腫帖方

紫葛十分 大黃五分 青木香一分 玄參

白斂 黃芩 黃連 榆白皮

升麻 由跋各三分 赤小豆一合

松脂膏治癰腫方

松脂一斤半 豬脂一合半 黃芩 黃耆

易無地黃汁以米醋和之

右十一味治下篩以生地黃汁和如泥傅腫上乾則

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連 當歸
芎藭 蠟 各一兩
大黃 芍藥
右十味其八味咬咀合二脂微火煎三上三下綿及
布絞去滓火炙傳紙上隨腫大小帖之日三易即瘥
又方松脂一斤 猪脂半斤 大黃一兩 白蠟四兩
細辛 防風 黃芩 芎藭
白斂 當歸 芍藥 莽草
黃蘗 白芷 黃連 各半兩
右十五味咬咀先煎二脂白蠟令烊次内諸藥三上
三下以綿及布絞著水中為餅取少許火炙之傳油
紙上帖瘡處 千金翼有黃耆一兩
治癰疽痔漏惡瘡婦人妬乳漆瘡方
野葛 芍藥 薤白 當歸
通草 各二分 附子一分
右六味咬咀醋浸半日先煎猪脂八合令煙出内亂
髮二分令消盡下之待冷又内松脂八分蠟二分更

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

著火上和次内諸藥煎令沸三上三下去滓以故帛
傅藥帖腫上乾即易如春月去附子其髮須盡洗去
垢不爾令人瘡痛
青龍五生膏治癰疽痔漏惡瘡膿血出皆以此方導之
生梧桐白皮　生桑白皮　生青竹茹
生栢白皮　生龍膽　各五兩　蜂房　猬皮
蛇蛻皮　雄黃　雌黃　各二兩　蜀椒
附子　芎藭　各五分
右十三味咬咀以三年苦酒二斗浸一宿於炭火上
炙乾擣下細篩以猪脂二升半微火煎攪令相得如
飴著末水中新白甕器中盛稍稍隨病深淺傅之并
以清酒服如棗核大日一
滅癜膏治諸色癰腫惡瘡瘥後有癜痕方
安息香　一作女萎　礬石　狼毒　羊躑躅
烏頭　附子　野葛　白芷
烏賊骨　皂莢　天雄　芍藥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芎藭　赤石脂　大黃　當歸
莽草　石膏　乾地黃　地榆
白朮　續斷　鬼白　蜀椒
巴豆　細辛 各一兩

右二十六味擣末用成煎猪脂四斤和以此為準煎三上三下以好鹽一大匙下之膏成須服者與服須布揩令傷傅之鼻中息肉者取如大豆內鼻中如瘀摩者與摩摩之忌近眼服之忌妊娠人若滅瘢者以血者酒服如棗核大痔漏者以綿裹如梅子大內下部中風者摩患上取瘥崩中者此處疑有脫簡亦內其滅瘢取少許和鷹屎白傅之取臘日合神效千金翼有礬石一兩治膿潰後瘡不合方

右燒鼠皮一枚為末傅瘡孔中

又方熟嚼大豆以傅之

又方炒烏麻令黑熟擣以傅之

又方牛屎傅之乾即易

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方燒破蒲席灰臘月猪脂和内孔中

治癰久不瘥方

右用馬齒菜擣汁煎以停之

治癰癤潰後膿不斷及為諸物刺傷瘡不瘥方

右一味取筋一片碰碎頭少濕内硫黄中以刺瘡孔

瘡瘥為度

治癰肉中如眼諸藥所不效者方

右取附子削令如棊子安腫上以唾帖以火炙之令

附子欲焦復唾濕以火炙之如是三度令附子熱氣

徹内即瘥此法極妙也

練石散治癰有堅如石核者復大色不變或作石癰方

右三味以醋五升先燒石灰赤内醋中不限數醋減

半止總擣末以餘醋和如泥厚傅之乾則易取消止

盡更合諸漏及瘰癧其藥悉皆用之仍火針針頭破

麞麗理黄石一斤 鹿角八兩燒 白斂三兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:47
列印頁數：1380
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

停藥又單磨鹿角半夏末和停之不如前方佳也
治石癰堅如石不作膿者方
右用生商陸根熟擣停之乾即易取軟為度又治濕漏諸癰癬
又方蜀桑根白皮陰乾擣末烊膠以酒和藥停腫根即拔
又方葭茗子為末醋和以傅瘡頭根即拔
又方蛇蛻皮帖之經宿便瘥
又方櫟子一枚以醋於青石上磨之以塗腫上乾更塗不過十度即愈
又方梁上塵　葵根莖灰　各等分
右二味醋和傅之即瘥
又方當上灸百壯石子當碎出如不出益壯乃佳凡發腫至堅有根者名曰石癰
禁腫法
凡春初雷始發聲時急以兩手指雷聲聲止乃止後

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

七日勿洗手此後有一切腫及蠍螫惡注腫瘡摩之隨手即消

書腫方

夭乙甲一不成
不生未乙一
壬癸死

右以丹書閉氣書腫上立瘥

治惡毒腫或著陰卵或著一邊疼痛攣急引入小腹不可忍者一宿殺人方

右取茴香草濤汁飲一升日三四服滓傅腫上冬月闕生者根亦可用此是外國神方於永嘉年末用之起死回生神驗

治風勞毒腫疼痛攣急或牽引小腹及腰髀痛方

右用桃仁一升研如常法以酒三升攪和頓服之厚衣被蓋令汗不過三劑瘥

治脚腫向上至腹即殺人者方

右用赤小豆一斗以水三斗煮令爛出豆以汁浸脚至膝每日一度瘥止若已入腹不須浸但煮豆食之忌鹽菜米麪等渴飲汁瘥乃止

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麻子小豆湯治毒腫無定處或赤色惡寒或心腹刺痛煩悶者此是毒氣深重所致方

麻子　赤小豆 各五升　生商陸 二升　附子 二兩　射干 二兩　升麻 四兩

右六味㕮咀以水四斗先煮四味取二斗半去滓次研麻子碎和汁煮一沸濾去滓取汁爛煮豆其汁每服五合日二夜一當利小便為度腫退即瘥并食豆治一切腫毒疼痛不可忍者方

右取葶藶子熟擣傅之即瘥治諸瘡著白痂復發方

大蒜　鼠屎　書墨

右三味各等分為末傅之日三凡癬無頭者吞葵子一枚不得多服治癬子方

又方生椒末　釜下土

右二味各等分醋和塗之 千金翼有蘜末為三味

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方狗頭骨　芸薹子
右二味各等分為末醋和傅之
又方燒葛蔓灰封上自消牛糞灰封之亦佳
又方鼠粘根葉帖之
又方水和雀屎僚之

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:49
列印頁數：1384
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷六十七

謹校官太醫院臣袁天錫
編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐
校對官中書臣胡紹基
謄錄監生臣劉文耀

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷六十七　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

丁腫方

發背第三　方論

論曰凡發背皆因服食五石寒食更生散所致亦有單服鍾乳而發者又有生平不服而自發者此是上代有服之者其候多卒於背兩胛間起初如粟米大或痛或癢仍作赤色人皆初不以為事日漸長大不過十日遂至於死其臨困之時已濶三寸高一寸瘡有數十孔以手按之諸孔中皆膿出尋時失音所以養生者小覺背上癢痛有異即火急取淨土水和如泥捻作餅子厚二分濶一寸半以粗艾大作炷灸泥餅上帖著瘡上灸之一炷一易餅子若粟米大時可灸七餅子即瘥如榆莢大灸七七餅炷即瘥如錢大可日夜灸之不限炷數仍服五香連翹湯及鐵漿諸藥攻之乃愈又法諸發背未

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:50
列印頁數：1386
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

作大膿可以冷水射之浸石令冷熨之日夜莫住瘥乃止此病忌麪酒五辛等亦有當兩肩上發者

凡服石人皆須勞役四體無令自安如其不爾者多有發動亦不得逐便恣意取暖稱己適情必須遺欲以取寒凍雖當時不寧於後在身多有所益終無發動之慮耳

凡腫起背胛間頭白如黍粟四邊相連腫赤黑令人悶亂即名發背也禁房室酒肉蒜麪若不灸治即入内殺人若灸當瘡上七八百壯有人不識多作雜腫治者皆死

治發背及癰腫已潰未潰方

右用香豉三升少與水和熟擣成强泥依腫作餅子厚三分已上有孔勿覆孔上布豉餅以艾列其上灸之使温温而熱勿令破肉如熱痛即急易之患當滅快得安穩一日二度灸之如先有瘡孔孔中得汁出即瘥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治癰疽發背已潰未潰及諸毒腫方

栝蔞根　榆白皮　胡燕窠　鼠坌土

右四味各等分為末以女人月經衣水洗取汁和如泥封腫上乾即易潰者四面封之已覺即封從一日至五日令癒

治發背背上初欲結腫方

大黃　升麻　黃芩　甘草　各三兩

梔子　三七枚

右五味㕮咀以水九升煮取三升分三服取快利便止不利更進

內補散治癰疽發背已潰排膿生肉方

當歸　桂心　各二兩　人參　芎藭　厚朴　防風　甘草　白芷　各一兩　桔梗

右九味治下篩酒服方寸匕日三夜二未瘥更服勿絕　外臺無防風甘草白芷

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:51
列印頁數：1388
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方治癰疽發背方

蜀椒 乾薑 黃芩 人參 各二分

桂心 一分 小豆 一合半 白斂 甘草 附子 防風 各一兩 芎藭 二兩

右十一味治下篩酒服方寸匕日三夜二

李根皮散治癰疽發背及小小瘭癰方

李根皮 一升 栝蔞根 半夏 各五兩 通草 白斂 桔梗 厚朴 黃芩 桂心 芍藥 各四兩 芎藭 六兩 當歸 各二兩 葛根 三兩 附子 各一兩 甘草 各二兩

右十五味治下篩酒服方寸匕日三瘡大困者夜再服之曾有人患骨從瘡中出兼有三十餘癰癤服此散瘥

大內塞排膿散治發背癰腫經年瘥後復發此因大風或結氣在內經脉閉塞至夏月已來出攻於背久不治積聚作膿血為瘡內漏方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

山茱萸 五味子 茯苓 乾薑 各六兩
甘草 石斛 人參 桂心
芍藥 各五分 巴戟天 麥門冬 乾地黃
蔥蓉 遠志 各八分 當歸 石韋
芎藭 各四分 附子 二分 地膽 菟絲子 各三分
分
右二十味治下篩酒服方寸匕日三夜一稍加之長服終身不患癰癤

治發背方
右用亂髮灰酒服方寸匕亦治瘰疬
又方猪脂傅上日四五度亦治發乳 救急方云取猪羊脂切作片冷水浸帖上暖易之五六十片癤若初帖少許即寒寒定好眠甚妙
又方三年醋滓微火煎令稠和牛脂傅上
又方猪狗牙燒灰醋和傅上日三四易
又方燒古蚌灰雞子白和傅之日三易
又方飲鐵漿二升取利

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:51
列印頁數：1390
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方蛇頭灰醋和傅之日三易

又方燒鹿角灰醋和傅之日四五易

丹毒第四 方論

論曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗之色大者如手掌甚者徧身有癢有腫無定色有白丹者肉中腫起而起大者如連錢小者如麻豆粒狀肉上粟粟如雞冠癢而復痛微虛腫如吹狀隱軫起也有雞冠丹者赤色肌理也一名菜萸丹有水丹者由徧體熱起遇水濕搏之結丹晃晃黃赤色如有水在皮中喜著股及陰處此雖小疾不治令人至死治之皆用

升麻膏方

升麻 白薇 肘後作白斂 漏蘆 連翹 各二兩 芒硝 黃芩 各二兩 蛇噬 枳實 各三兩 蘋藶 四兩 梔子 四十枚

右十味微擣碎以水三升浸半日以猪膏五升煎令水氣盡去滓膏成傅上諸丹皆用之及熱瘡腫上日

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三 經心錄無枳實以治諸毒腫

升麻湯治丹毒方

升麻 漏蘆 芒硝 各二兩 黄芩 三兩 蒴藋 五兩 栀子 二十枚

右六味㕮咀以水一斗浸良久煮取七升冷以故帛染汁搦諸丹毒上常令濕搦後須服飲子并漏蘆湯方並見前癰腫條中服之立瘥 小品用治丹毒諸毒腫

單方

水苔 生蛇銜 生地黄 生菘菜 蒴藋葉 慎火草 五葉藤 豆葉 浮萍

已上取一味單擣塗之

大黄 栀子 黄芩 芒硝

已上取一味下水和用

已上取一味單用一味立瘥

又方凡天下極冷無過藻菜最冷但有患熱毒腫并丹

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

等取渠中藻菜細切熟搗傅之厚三分乾即易

治諸丹神驗方

右以芸薹菜熟搗厚封之隨手即消如餘熱氣未愈
但三日内封之使醒醒好瘥止縱乾亦封之勿歇以
絶本余以正觀七年三月八日於内江縣飲多至夜
睡中覺四體骨肉疼痛比至曉頭痛目眩額左角上
如彈丸大腫痛不得手近至午時至於右角至夜諸
處皆到其眼遂閉合不得開幾至殞斃縣令周公以
種種藥治不瘥經七日余自處此方其驗如神故疏
之以傳來世云耳

治五色油丹方 俗名油腫若犯者多致死不可輕之

右縛母猪枕頭卧甚良

又方牛屎塗之乾即易

治赤流腫丹毒方

右取榆根白皮為末雞子白和傅之 千金翼又用雞子白和蒲蓂衣傅

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方擣大麻子水和傅之

又方以煎羊脂摩之得青羊脂最良 集驗方云治人面目身體卒赤黑丹起如疥狀不治日劇徧身即殺人

治小兒丹毒方

右擣馬齒莧一握取汁飲之以滓傅其上

又方擣赤小豆五合水和取汁飲一合良以滓塗五心

又方濃煮大豆汁塗之良瘥後亦無癜痕

又方臘月猪脂和釜下土傅之乾即易

又方濃煮大豆汁塗之良瘥後亦無癜痕

治小兒五色丹方

右用猪槽下爛泥傅之乾則易 集驗方治卒赤黑丹

又方擣蒴藿葉傅之

又方服黃龍湯二合并傅患上佳

治小兒白丹方

右用燒猪屎灰雞子白和傅之良

治小兒赤丹方

右擣芸薹葉汁服三合滓傅上良 千金翼云芸薹末以雞子白和塗之

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:53
列印頁數：1394
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治小兒赤丹斑駁者方

右以唾和胡粉從外向内傳之

又方鍛鐵屎以猪脂和傳之

又方屋塵以臘月猪脂和傳之

治小兒火丹赤如朱走皮中方

右以醋和豉研傳之

又方鯉魚血傳之良

又方濤荏子傳之良

又方猪屎水和絞取汁服少許良

治小兒天火毒肉中有赤如丹色大者如手甚者徧身或痛或癢或腫方

右用赤小豆二升為末雞子白和如薄泥傳之乾則易便瘥一切丹並用此方皆瘥

又方生麻油塗之

治小兒骨火丹其瘡見骨方

右擣大小蒜厚封之著足踝者是

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治小兒殃火丹毒著兩脅及腋下者方

右用伏龍肝為末油和傅之乾則易若入腹及陰以慎火草取汁服之

治小兒尿竈丹初從兩股起及臍間走入陰頭皆赤色者方

右切桑白皮二升以水二升煮取汁浴之良

又方燒李根為灰以田中流水和傅之良

治小兒朱田火丹病一日一夜即成瘡先從背起漸至徧身如棗大正赤色者方

右用濃煮棘根汁洗之已成瘡者赤小豆末傅之未成瘡者雞子白和小豆末以傅凡方中用雞子者皆取先破者用之完者無力

治小兒天竈火丹痛從髀間起小兒未滿百日犯行路竈君若熱流下令陰頭赤腫血出方

右用伏龍肝擣末雞子白和傅之日三良

又方鯽魚肉 劉五 合 赤小豆末 三 合

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味和擣少水和傅之良

治小兒野火丹病徧身皆赤者方

右用油塗之

治小兒菜萸丹病初從背起徧身如細縷一宿成瘡者方

右用赤小豆為末以粉之如未成瘡者雞子白和以傅之

治小兒癜竈火丹初從足趺起正赤色者方

右以棗根煮汁沐浴五六度

隱軫第五 論灸法方

論曰素問云風邪客於肌中則肌虛真氣發散又被寒搏皮膚外發腠理開毫毛淫氣妄行之則為癢也所以有風軫搔癢皆由於此又有赤軫者忽起如蚊蚋啄煩癢極者重沓壟起搔之逐手起又有白軫者亦如此赤軫熱時即發冷即止白軫天陰冷即發白軫宜煮礬石汁拭之或煮蒴藿和少酒以浴之良 姚氏以治赤軫或煮石南

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:55
列印頁數：1397
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

汁拭之良或水煮雞屎汁或煮枳實汁拭之良餘一切如治丹方法俗呼為風屎亦名風尸

石南湯治六十四種風淫液走人皮中如蟲行腰脊强直五緩六急手足拘攣隱軫搔之作瘡風尸身癢卒面目腫起手不得上頭口噤不能言方此方但是隱軫宜服之瘡方見前風

治風瘙隱軫心迷悶亂方

天雄　牛膝　桂心　知母　各四分

栝蔞根　白朮　各五分　防風　六分　人參　二分

乾薑　細辛　各三分

右十味治下篩酒服半錢匕加至一匕為度

又方巴豆二兩以酒七升煮取三升故帛染汁拭之大人小兒以意加減

又方礬石二兩為末酒三升漬令消帛染拭病上

又方吳茱萸一升酒五升煮取一升半帛染拭病上治搔癢皮中風虛方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

枳實 三升 松葉 一升切 獨活 蒞蓉
黃耆 秦艽 兩各四 丹參 蒴藋 兩各五
右八味㕮咀以酒二斗浸六宿每服二合日二稍加之
治風瘙隱軫方
白朮 三兩 戎鹽 礬石 兩各半 黃連
黃芩 細辛 芎藭 茵芋 兩各一
右八味㕮咀以水一斗煮取三升洗之日三良
又方馬藺子 蒴藋 礬石 芜蔚子
蕤蔡子 茵芋 羊桃 萹竹 兩各三
右八味㕮咀以漿水二斗煮取一斗二升内礬石洗之日三
又方蒴藋 防風 羊桃 石南
茵芋 芜花 蕤蔡 礬石 兩各一
右八味㕮咀以漿水一斗煮取五升去滓内礬石令小沸温浴之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方蛇牀子 二升 防風 二兩 生蒺藜 二兩
右三味㕮咀以水一斗煮取五升拭病上日三五遍
又方酪和鹽熟煮摩之隨手即消良
又方石灰淋取汁洗之良
又方白芷根葉煮汁洗之
又方大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞日三
又方牛膝為末酒下方寸匕日三并治骨疽癩病
又方芥子末漿服方寸匕日三
又方白朮末酒服方寸匕日三
治隱軫癢痛方
大黄 升麻 黄蘗 當歸
防風 芍藥 黄芩 青木香
甘草 各二兩 楓香 五兩 芒硝 一兩 地黄汁 一升
右十二味㕮咀以水一斗煮取三升半去滓下芒硝
令消帛染搦病上一炊久日四五度
治舉體癢痛如蟲囓癢而搔之皮便脱落作瘡方

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:56
列印頁數：1400
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蒺藜子 三升　蛇牀子 二升　芫蔚子 各二升　防風 五兩
大戟 一斤　大黃 二兩　礬石 三兩
右七味㕮咀酒四升水七升煮取四升去滓内礬石以帛染拭之
又灸曲池二穴小兒隨年壯發即灸之神良
治風瘡腫瘡癢在頭面搦洗方
大黃　芒硝 各四分　莽草 二分一作甘草三兩
黃連 六分　黃芩 八分　蒺藜子 五合
右六味㕮咀以水七升煮取三升去滓下硝以帛染
搦洗日一度勿近目
治身體赤隱軫而癢搔之隨手腫起方
莽草 二分　當歸　芍藥　芫花　蜀椒
附子　蠷螋 各四分　猪膏 二升半
右取十味㕮咀以酒漬一宿猪膏煎之候附子色黃
膏成去滓以停病上日三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

青羊脂膏治風熱赤軫搔之逐手作瘡方

青羊脂 兩四 甘草

白芷 白芨

黃耆 升麻 各四分

右十二味咬咀先以水八升煮石膏竹葉取四升去

治隱軫百瘡不瘥者方

右用景天一斤一名慎火草細擣取汁傳上熱灸手

淬浸諸藥以不中水猪脂二升合煎膏成傳病上良

芍藥 各三兩

黃芩 防風

竹葉 切 石膏 各一升

寒水石

摩之再三度瘥

又方芒硝八兩水一斗煮取四升適寒温綿染拭之

又方黃連 切 芒硝 各五兩

右二味以水六升煮取半去滓洗之日四五度

治暴氣在表攻皮上隱軫作瘡方

右煮槐枝葉洗之

治小兒患隱軫入腹體腫强而舌乾方

右用蕪菁子為末酒服方寸匕日三

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:57
列印頁數：1402
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方鹽沙二升水二升煮去滓洗之良

又方車前子為末粉之良

又方鹽湯洗了以蓼子挼停之

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:57
列印頁數：1403
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷六十八　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

丁腫方

癭疽第六　方論

論曰癭疽者肉中忽生黠子如豆粒小者如黍粟極者如梅李或赤或黑或青或白其狀不定有根不浮腫痛傷之應心根深至肌經久便四面悉腫皰黯熟紫黑色能爛壞筋骨若毒散逐脉入臟殺人南人名為搦著毒厚肉處即割去之亦燒鐵烙之令焦如炭或灸百壯或飲葵根汁或飲藍青汁若犀角汁及升麻汁竹瀝黃龍湯等諸單方治專去其熱取瘥其病喜著十指故與代指相似人不識之呼作代指不急治之亦逐脉上入臟殺人南方人得之皆斬去其指初指頭先作黯皰後始腫赤黑黯瘡痛入心是也代指者先腫□熱痛色不黯緣爪甲邊結膿劇者爪皆

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:58
列印頁數：1404
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

脫落此謂之代指病也但得一物冷藥汁搦漬之佳若熱盛服漏蘆湯及搦漬之傳升麻膏亦可針去血不妨洗漬塗膏也

復有惡肉病者身上忽有肉如赤豆粒突出便長推出如牛馬乳上如雞冠狀不治自長出不止亦不痛癢此由春冬時受惡風入肌脉中變成此疾治之宜服漏蘆湯外燒鐵烙之日日為之令焦盡即以升麻膏傳上積日乃瘥

又有赤脉病者身上忽有赤脉絡起隴聳如死蚯蚓之狀視之如有水在脉中長短皆逐脉所處此由春冬受惡風入絡脉中其血肉瘀所作也宜五香連翹湯及竹瀝等治之刺去其血仍傳丹參膏亦用白雞屎塗之良

惡核病者肉中忽有核累累如梅李核小者如豆粒皮肉瘡痛壯熱□索惡寒是也與諸瘡根瘰癧結筋相似其瘡根瘰癧因瘡而生是緩無毒惡核病卒然而起有毒若不治入腹煩悶殺人皆由冬月受温風至春夏有

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

暴寒相搏氣結成此毒也但服五香湯主之又以小豆末傅之亦煮湯漬時時洗之消後以丹參膏傅之令餘核盡消凡惡核初似被射公毒無常定處多惻惻然痛或時不痛人不痛者便不憂不憂則救遲救遲即殺人是以宜早防之尤忌魚雞猪牛馬驢等肉其疾初如粟米或似麻子在肉裏而堅似皰長甚速初得多惡寒須臾即短氣取吳茱萸五合作末水一升和之絞取汁頓服以滓傅上須臾服此汁令毒散止即不入腹也入腹則致禍矣切慎之

凡瘺病喜發四肢其狀赤脉起如編繩急痛壯熱其發於脚喜從腨起至踝亦如編繩故云瘺病也發於腎喜著腋之下皆由久勞熱氣盛為濕涼所折氣結筋中成此病也若不即治其久潰膿亦令人筋攣縮也若不消潰其熱氣不散多作□病漏蘆湯主之瀉後鋒針數針去惡血氣針瀉其根核上傅小豆末取消為度又用治丹法治之亦用治癰三味甘草散傅之若潰傅膏散如

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:59
列印頁數：1406
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

癰法

惡核瘺病瘭疽等多起嶺表中土尠有南方人所食雜類繁多感病亦復不一仕人往彼深須預防防之無法必遭其毒惟須五香湯小豆散吳茱萸皆其要藥

凡附骨疽者以其無破作外臺故附骨成膿故名附骨疽喜急著者先覺痛不得動搖按之應骨痛經日便覺皮肉漸急洪腫如肥狀是也小兒纔手近便六腑呼即是肢節有痛候也大人緩著者先覺肌烘烘然經日便覺痛痺不隨小兒四肢不能動搖亦如不隨狀看肢節解中若有崩烘烘處不知是附骨疽令偏身成腫不至潰體皆有青黯大人亦有不別呼為賊風風腫不知是疽也凡人身體患熱當風取涼風入骨解中風熱相摶便成附骨疽其候嗜眠沈重忽忽耳鳴又秋夏露卧為冷所折風熱伏結而作此疾急者熱多風少緩者風多熱少小兒未知取風冷何故而有此疾由其血盛肌嫩為風

列印日期/時間：02/04/2005 18:48:59
列印頁數：1407
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

折之即使凝結故也凡初得附骨疽即須急服漏蘆湯下之傳小豆散得消可服五香連翹湯方見癰疽條中凡賊風其人體卒無熱中暴風冷即骨解深痛不廢轉動按之應骨痛久即結痛或結瘰癧其附骨疽久即腫而結膿以此為異宜若治附骨作賊風則增益病深膿疾也療之效皆在善始耳此非天下至精其孰能與多若治賊風作附骨即加風冷遂成瘰癧偏枯攣曲之於此若候附骨與賊風為異者附骨之始未腫但痛而已其賊風但痛不熱附骨則其上壯熱四體乍寒乍熱小便赤大便澀而無汗若得下却熱并開發腠理便得消也縱不消盡亦得浮淺近外凡賊風但夜痛骨不可按抑不得回轉痛處不壯熱亦不乍寒乍熱多覺身體索索然冷欲得熱熨痛處即小寬時復有汗出此為賊風證也宜針灸熨煿諸服治風藥即愈方見風條中又有風熱毒相搏為腫其狀先腫上生瘰漿如火灼處名曰風熱毒治之一如丹法

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又有洪燭瘡身上忽生瘭漿如沸湯灑劇者偏頭面亦有胷脇腰腹腫緩通體如火湯灼瘭起者是也治之法急服漏蘆湯下之外以升麻膏傅之其間傅升麻膏若無效一依傅丹方

凡熱瘡起便生白膿黃爛瘡起即淺但出黃汁名肥瘡浸淫瘡者淺搔之旣延長不止搔癢者初如疥搔之轉生汁相連著是也

瘑瘡者初作亦如肥瘡喜著手足常相對生隨月生死痛癢坼裂春夏秋冬隨瘥劇者是也

有久癰餘瘡敗為深疽者在脇脛間喜生瘡中水惡露寒凍不瘥經年成骨疽亦名腊瘡深爛青黑四邊堅彊中央膿血汁出百藥不瘥汁漬好肉處皆虛腫亦有碎骨出者可溫赤龍皮湯漬 方見七十卷腸癰篇 夏月日日洗冬月四日一洗青肉多可傅白薗茹散食去惡肉可三日傅之止後長傅家猪屎散得瘥止取猪屎燒灰作末如粉致瘡中令滿白汁出吮去隨更傅之瘥止若更青肉復

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

著白蘭茹散如前法家猪屎散取平復凡骨疽百療不瘥者可瘡上以次灸之三日三夜便瘥如瘡不瘥瘥而復發骨從孔中出者名為骨疽取先死烏雌雞一隻去肉取骨熬焦如炭取三家牛梧木刮取屑三家甑箄各一兩皆燒成炭合導瘡中碎骨當出數片瘥

治瘻疽祕方

射干	甘草	乾地黃	黃芩 各二兩
枳實	升麻	麝香 二分	前胡 三分
犀角 六分	大黃 十分		

右十味咬咀以水九升煮取三升下大黃一沸去滓內麝分三服瘥止不限劑數此方世所不傳神良無比

外臺無黃芩云翼深師加黃芩麻黃白薇枳實升麻松葉

治瘻疽諸疽十指頭煩赤癢痛方 千金翼名猪蹄湯

當歸	藜蘆	白芷	大黃
黃連	甘草	芎藭	黃芩
細辛	藁本	莽草 各一兩	

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十一味咬咀以水二斗先煮猪蹄一具取一斗煮藥取五升浸瘡即瘥

治瘭疽浸淫多汁日漸大方

黄連 二兩 胡粉 甘草 各二分 蘭茹 各二分

右四味治下篩以粉瘡上日三四度

治瘭疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁出瘥後復發方

黄耆 六分 升麻 四分 欵冬花 二分 附子

苦參 無范注 赤小豆 各一分

右六味治下篩酒服方寸匕稍加日三服

又方虎屎白者以馬屎和曝乾燒為灰粉之良

又方青木香 滑石 龍骨 各三兩 胡粉 一兩

米粉 一升

右五味為末稍以粉病上日三

又方竈屋塵 竈突墨 釜下土 各一升

右三味合研令勻以水一斗煮三沸取汁洗日三四

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

度

治瘭疽著手足肩背忽發累累如赤豆剥之汁出者方

鯽魚 長三寸者 亂髮 如雞子大 猪脂 一升

右三味煎為膏傳之

又方熬蕪菁子擣碎帛裹展轉停上良

又以麻子熬作末摩上良

又方酒和麪傳之

又以猪膽傳之良

又方剥去瘡痂温醋泔清洗之以胡燕窠和百日男兒屎如膏傳之

又方亂髮灰服方寸匕日三亦治發背

又方煮芸薹菜取汁一升服之并食乾熟芸薹數頓少與鹽醬冬月研子水和服之

又方枸杞根并葵根葉煮汁煎令如糖隨意服之

又方臘月糖晝夜連浸數日乃愈

治疽潰後方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以鹽湯洗拭了燒皂莢灰粉上良

又方以牛耳中垢傅之良

又方梁上塵和車虹中脂傅之

又方以生麻油滓綿裹布瘡上蟲出

又方以沸湯灌瘡中三四遍湯一作錫

治疽似癰而小有異膿如小豆汁今日去明日滿者方

右用芸薹熟擣濕布袋盛之埋熱灰中更互熨之不過再三度安瘥冬用乾者

治疽卒著五指筋急不得屈伸者方

又方皂莢煎湯洗瘡拭乾以蘗皮為末傅之勿令作痂

右炙蹉骨中央數十壯或至百壯

治風疽方凡腳腦及曲腋中瘡搔則黃汁出是也灸法見後

右以青竹筒一枚徑一寸半長三尺當中著大豆一升以糠馬屎二物燒為火當竹筒中燒之以器承兩頭取汁先以泔清和鹽熱洗瘡了即塗豆汁不過三度極效

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:02
列印頁數：1413
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方嚼胡麻停以綿裹之日易神良

治石疽狀如痤癰而皮厚方

右擣穀子停之亦治金瘡

治久癰瘡敗壞成骨疽方

右用末龍骨粉瘡四面厚二分以膏著瘡中日二易

蟲出如髮盡愈膏方如左

大蝦蟆一枚自死者　亂髮一塊雞子大　猪脂一斤

右三味取一味内脂中煎略消盡下待冷更内鹽一

合攪和充前用

治瘡久不瘥瘥而復發骨從孔中出名為骨疽方

以猪膽和楸葉擣封之

又方擣白楊葉末傅之

又方擣蕪菁子傅之帛裹日一易

又方穿地作坑口小裹大深三尺取乾雞屎二升以艾

及荆葉擣碎和雞屎令可燃火坑中燒之令煙出内疽

於坑中熏之以衣擁坑口勿洩氣半日當有蟲出甚效

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治附骨疽方

櫸皮燒末飲服方寸匕

又方新剥鼠皮如錢孔大貼腫上即膿出已潰者取猪

脊上脂貼之

又方灸間使後一寸隨年壯立瘥

治久疽方

右用鯽魚破腹勿損内白鹽於腹中以針縫之於銅

器中火上煎令乾作末傳疽瘡中無膿者以猪脂和

傅上小疼痛無怪也十日瘥

苦瓠散治浸淫瘡方 瘡表裏相當名浸淫瘡

苦瓠一兩 蜂房 蛇蛻各半兩 大豆半合 梁上塵一合

右五味治下篩以粉為粥和傳紙上貼之日三 古今録無大豆

又方以煎餅乘熱搦之亦治細癬

又方猪牙車骨年久者槌破燒令脂出熱塗之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方取苦楝皮若枝燒作灰傅上乾者猪脂和塗之并治小兒禿瘡及諸惡瘡

治瘑瘡方

右用醋一升温令沸以生薤一把内中封瘡上瘥為度

又方炒臘月糖傅之

又方濤桃葉和鯉魚鮓糕封之亦可以鮓傅上

又方燒故履系為末傅之

又方燒松根取脂塗之

治燥瘑方

右用醋和灰塗之

又方熱牛屎塗之

治濕瘑方

右燒乾蝦蟆猪脂和傅之

治瘑病百療不瘥方

棟實一升　桃皮　苦參　地榆根各五

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:03
列印頁數：1416
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

兩

右四味㕮咀以水一斗煮取五升稍温洗之日一度

治久瘡疥濕瘡浸淫日廣癢不可堪搔之黄汁出瘥後復發方

右用羊蹄根淨去土細切熟熬以醋和熟擣淨洗瘡

傅上一時間以冷水洗之日一度又陰乾作末癢時

搔則汁出以粉之又以生蔥根揩之 千金翼無蔥字

治一切瘡瘡 凡脚腦及曲腁中癢搔則黄汁出是名風疽

右灸足大趾奇間二七壯又灸大趾頭亦佳

治諸瘡因風致腫方

右燒白芋灰温湯和厚三分傅瘡上乾即易五六度

瘙

又方櫟根皮三十斤剉以水三斛煮令熱下鹽一把令的的然熱以浸瘡當出膿血日日為之瘥止

治惡露瘡方

以擣薤菜傅瘡口以大艾炷灸藥上令熱入内即瘥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治惡瘡方

礬石　松脂　亂髮　蠟　各二分

猪膏 兩四

右五味煎髮候消內礬石次內松脂次內蠟去滓先刮洗瘡令淨然後用藥塗之日再三不痛久瘡時愈

新瘡遲愈瘍瘡頭禿皆即愈生髮勝飛黃膏

又方燒萹竹灰和楮白汁塗之

又方羊屎麻根燒煙斷膏和封上有汁者乾傳之

又方麪一升作餅大小以覆瘡灸上令熱汁出盡瘥

治惡瘡似火爛洗湯

右用白馬屎曝乾以河水和煮十沸絞取汁洗之

治惡瘡其大如錢名曰馬疥方

右以水漬自死蛇一頭令爛去骨以汁塗之隨手瘥

治惡瘡十年不瘥似癩者方

右用蛇蛻皮一枚燒為末下篩猪脂和傳之醋和亦得

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方苦瓠一枚咬咀煮取汁洗之日三度又煎以塗癬甚良當先以泔淨洗乃塗三日瘥

又方燒猳猪屎傅之

又方鹽湯洗擣地黄葉貼之

又方燒蓖茭子為末傅之

又方燒鯽魚灰和醬清傅之

烏膏治惡瘡方

雄黄 雌黄 芎藭 升麻

烏頭 防己 竹灰 黄連

黄蘗 水銀 各二兩 胡粉 一分 蠟 三兩

杏仁 三十枚 巴豆 二十枚 松脂 亂髮 各一雞子大

右十六味咬咀以猪膏三升急煎令髮消去滓停小冷入真珠三錢匕攪令相得以傅之凡用膏先淨洗瘡拭乾乃傅上傅訖以赤石脂黄連散粉之 千金翼無竹灰水銀蠟

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:05
列印頁數：1419
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治種種諸瘡不愈者方

水銀 一兩　黄連 二兩　京墨 三分

右三味治下篩以不中水猪膏和傅上不過再三度瘥神良若欲多作任人水銀大須熟研其藥惟不治金瘡

治反花瘡并治積年諸瘡方

右取牛蒡根熟擣和臘月猪脂封上瘥止并治久不瘥諸腫惡瘡漏瘡等皆瘥

又方取馬齒菜擣封上瘥止

又方取蜘蛛膜貼上數易之瘥止

治身瘡及頭瘡不止方

右取菖蒲為末傅上日三夜二

治瘡久不瘥方

蕪荑　藜蘆 各一兩　薑黄　青礬

雄黄 各一分　苦參　沙參 各三分　附子 一枚

右八味治下篩先以藍汁洗瘡去痂乾拭傅上小兒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

一炊久剥去之大人半日纔剥再停不過三四度愈

治諸瘡久不瘥并治六畜方

右用棗膏三升水三斗煮取一斗半數洗取愈

治代指方

右用甘草二兩咬咀水五升煮取一升半漬之若無用苦硝代

又方以唾和白礜砂先搜麪作椀子盛唾次著礜砂如唾許以爪甲著中一日瘥

又方以唾和白礜砂先搜麪作椀子盛唾次著礜砂如之令熱可忍泥乾即易不過數度瘥

又方以毛雜黃土作泥泥指上厚五分許内糖灰中煨

又方剌指熱飯中二七遍

又方以麻沸湯漬之即愈

又方單煮地榆湯漬之半日

又方取萎黃蔥葉煮沸漬之

又方以蜀椒四合水一升煮三沸漬之

又方先剌去膿血炙魚鮓皮令溫以纏裹周匝痛止便愈

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:06
列印頁數：1421
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治指痛欲脱方

右用猪脂和鹽煮令消熱内指中一食久住 千金翼和乾薑

治手足指掣痛不可忍方

右用醬清和蜜温塗之良

又方灸指端七壯立瘥

治手足指逆臚方 此緣厠上捺頭所致

右還坐厠上以指到捋二七下即瘥

又方青珠一分 乾薑二分

右二味擣以粉瘡上日三

治手足皴裂逆臚代指方

右酒搦猪胞洗之慎風冷

治冬月胃涉凍凌面目手足皴瘃及始熱痛欲瘃者方

右取麥窠煮令濃熱洗之

治凍指瘃欲墮方

右用馬屎三升以水煮令沸漬半日愈

治手足皴劈破裂血出疼痛方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右用猪脂著熱酒中洗之

治手足皴痛方

右用煮茄子根洗之

又方芎藭三分 蜀椒二分 白芷 防風 鹽各一兩

右五味㕮咀以水四升煎取濃塗之或猪脂煎更良

治尸脚方凡人脚無冬夏常拆裂者是

右用雞屎一升水二升煮數沸停水冷漬半日瘥止

亦用馬屎忌踏酒吐及婦人穢血

又方烊膠膠乾故帛貼方

治割甲侵肉不瘥方

右以砺砂礬石為末裹之以瘥為候

又方擣鬼針草苗汁鼠黏草根和臘月猪脂傳之

備急千金要方卷六十八

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書 子部

備急千金要方卷六十九至七十一

謹校官太醫院恩賜冠帶臣 袁天錫
編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱 鈐
校對官中書臣胡紹基
謄錄監生臣劉文耀

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

痔漏方

九漏第一 瘰癧附方 論灸法

論曰夫九漏之爲病皆寒熱瘰癧在於頸腋者何氣使生此皆鼠瘻寒熱之毒氣也堤留於脉而不去者也鼠瘻之本皆根在於臟其末上出於頸腋之下其浮於脉中而未著於肌肉而外爲膿血者易去去之奈何曰請從其末引其本可使衰去而絶其寒熱審按其道以予之徐從末以去之其小如麥者一刺之三刺已決其死生奈何曰反其目視其中有赤脉從上下貫瞳子見一脉一歲死見一脉半一歲半死見二脉二歲死見二脉半二歲半死見三脉三歲死赤脉不下貫瞳子可治也凡項邊腋下先作瘰癧者欲作漏也宜禁五辛酒麪及諸熱食凡漏有似石癰累累然作癧子有核在兩頸及

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:07
列印頁數：1425
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

腋下不痛不熱治者皆練石散傅其外内服五香連翹湯下之已潰者治如癰法諸漏結核未破者火針針使著核結中無不瘥者何謂九漏一曰狼漏二曰鼠漏三曰螻蛄漏四曰蠱漏五曰蚍蜉漏六曰蠐螬漏七曰浮沮漏八曰瘵瘻漏九曰轉脉漏

空青商陸散治狼漏始發於頸腫無頭有根起於缺盆之上連延耳根腫大此得之憂恚氣上不得下其根在肝一作肺空青主之商陸為之佐方

脫肉此得之食有鼠毒不去其根在胃狸骨主闕

狸骨知母散治鼠漏始發於頸無頭尾如鼷鼠闕熱

右十六味治下篩酒下方寸匕日三服十五日

當歸 茴香 礬石各一分 蜀椒三十粒

商陸 斑猫 乾薑 地膽

獨活 黄芩 鼈甲 婦人葦草

空青 蝟腦各二分 蝟肝一具乾 芎藭半分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

狸骨　知母　桂心　鯪鯉
山龜殼　甘草　雄黃　乾薑　各等分
右八味治下篩飲服方寸匕日三仍以蜜和内瘡中
無不瘥先灸作瘡後以藥傳之已作瘡不用灸
地黃膏治鼠漏瘡瘥復發及不愈出膿血不止方
右以不中水猪脂呅咀生地黃内脂中令脂與地黃
以地黃膏傳上日一易
足相淹和煎六七沸其瘡先用桑灰汁洗去惡汁次
治鼠漏方
右用蛇虺所吞鼠燒末服方匕日再不過三服此大
驗但難遇耳并傳瘡中佳
又方死鼠一枚中形者亂髮如鷄子大一枚
右二味以臘月猪脂煎之令消盡膏成分作二分一
分稍稍塗瘡一分稍稍酒服之瘥鼠子當從瘡中出
良
荏子桔梗圓治螻蛄漏始發於頸項狀如腫此得之食

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:08
列印頁數：1427
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

瓜蔞實毒不去其根在大腸荏子主之桔梗為之佐方

荏子 龍骨 各半兩 附子 一枚 蜀椒 百粒

桂心 桔梗 各一分 乾薑 礬石 各一兩

獨活 芎藭 各一兩

右十味為末以棗二十枚合擣醋漿和丸如 彈

漿下五丸加至十丸

雄黃黃芩散治蜂漏始發於頸瘰癧三四處俱相連以

潰此得之飲流水中有風毒不去其根在脾雄黃主之

黃芩為之佐方

雄黃 黃芩 各一兩 蜂房 一具 茴香

吳茱萸 乾薑 各半兩 蜀椒 二百粒 鼈甲

右八味治下篩傅瘡口上日一度十日止

礬石防風散治蚘蜉漏始發於頸初得如傷寒此得之

食中有蚘蜉毒不去其根在腎礬石主之防風為之佐

方

礬石 防風 知母 雌黃

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桃白皮　乾地黃　獨活　青黛
斑猫　白芷　松脂一作栢脂　芍藥
海藻　當歸各一分　白朮　蝟皮各四分
蜀椒百粒

右十七味治下篩飲服一錢匕日三

礬石白朮散治蠐螬漏蛄發於頸下無頭尾如棗核塊累移在皮中使人寒熱心滿此得之因喜怒哭泣其根在心礬石主之白朮為之佐方

地膽各一分　乾烏賊三七枚豆許

細辛一兩　蝟皮　斑猫　枸杞

礬石　白朮　空青　當歸

右十味治下篩以醋漿服方寸匕日三病在上側輪臥此得之因思慮憂懣其根在膽地膽主之甘草為之佐方

地膽甘草散治浮沮漏蛄發於頸如兩指使人寒熱欲臥在下高枕臥使藥流下

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:09
列印頁數：1429
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

地膽　雄黃　乾薑　續斷

石決明　菴蕳根　龍膽　各三分　細辛　二分

大黃　半分　甘草　一分

右十味治下篩傳瘡日四五度　古今錄驗無雄黃有硫黃

雌黃芍藥圓治瘧癘漏始發於頸有根初苦痛令人寒熱此得之因新沐濕結髮汗流於頸所致其根在腎雌黃主之芍藥為之佐方

雌黃　芍藥　茯苓　續斷

乾地黃　空青　礬石　乾薑

桔梗　蜀椒　恒山　虎腎

狸肉　烏腦　斑猫　礬石　各一分

附子　一兩

右十七味為末蜜丸如大豆酒服十丸日二

斑猫白芷圓治轉脉漏始發於頸濯濯脉轉苦驚　身振寒熱此得之因驚臥失枕其根在小腸　集驗作心

斑猫　闕

之白芷為之佐方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

斑猫 白芷
升麻 鍾乳
地膽 續斷
人參 當歸
麥門冬 各一兩
右十七味為末蜜丸如大豆酒服十丸日三勿食菜
慎房室百日 外臺無大黄桂心麥門冬白术鍾乳
治九漏方
空青 商陸
桔梗 防風
黄芩 白芷
雌黄 白术
斑猫 雄黄 各等分
右十八味為末蜜丸如大豆以酢服三丸三十日知四十日愈六十日平復百日内慎房室 一方為散醋服一刀圭日二老小半
空青 綠青 大黄 各二分
升麻 鍾乳 甘草 防風
地膽 續斷 麝香 礬石 各一分
人參 當歸 桂心 各二兩 白术
桂心 白术 礬石 地膽
防風 茬子 礬石
商陸 知母 狸骨
芍藥 甘草

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:10
列印頁數：1431
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方蝟皮 半枚 鯪鯉甲 □雞 各四枚 蜥蜴 蜈蚣 各一枚 蜀椒 一撮 附子 當歸 蜂房 地榆 桂心 通草 乾漆 牡丹 蔥莢仁 蕤蔡子 漏蘆 一作蘆蘆 龍膽 一作龍骨 土瓜 各三分 斑猫 四分 蛇蛻皮 蔺茹 細辛 各二分 鶴骨 六分 蛇牀子 苦參 大黄 雄黄 右二十八味治下篩酒服五分匕以知為度日二服

又方斑猫 七十枚 蝟皮 真珠 雄黄 各一分 右四味治下篩酒服半錢匕日三

又方末成鍊松脂填瘡孔令滿日三四度七日瘥有神驗

又方斑猫 二七枚 雄黄 桂心 犀角 各一雨 右四味治下篩酒服一錢匕日再服病從小便出

又方馬齒莧 陰乾臘月燭燼 各等分 右二味為末以臘月猪脂和其瘡先以暖泔清洗淨

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:11
列印頁數：1432
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

拭乾然後以藥傅之日三

又方乾牛屎　乾人屎各等分

右二味擣先用綿冪瘡上綿上著屎蟲聞屎香即出

若癢即舉綿去之更別取屎及綿著其上如前蟲盡

乃止

又方苦瓠四枚大如盞者各穿一孔如指大置湯中煮十數沸取一竹筒長一尺一頭内瓠孔中一頭注瘡孔上冷則易之徧止

治一切漏方

斑猫四十枚　豉四十九粒　元青二十枚　地膽各十枚　蜈蚣一升半　生大豆黄各隶大核

犀角　牛黄

右八味為末蜜丸如梧子大飲服二丸須臾多作酸漿粥冷飲之病從小便出尿盆中相視如有蟲形狀又似膠汁此病出也間日一服飲粥如常小弱者隔三四日候無蟲出瘡漸癒特忌油膩一切器物皆須灰洗乃作食　崔氏云治九漏初服藥少夜食明旦服二丸至七日甚虚悶可煮食蔓菁菜羹

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

自餘脂膩醋口味果子之類並不得食人强隔日一服人弱兩三日一服瘥後仍作二十日將息便不須服

又方煮鹽花以麪擁病上內鹽花麪匡中厚二寸其下以桑葉三重藉鹽候冷熱得所可忍冷則無益熱則以肉一日一度候瘭癰根株勢消則止若已作瘡者擣穅穀為末粉之

又方槲北陰白皮三十斤剉碎以水一石煮取一斗去滓煎如糖又取都廁上雌雄鼠屎各十四枚燒令汁盡為末內煎中又溫酒一升投煎中合攪之羸人服五合當有蟲出

又方霜下瓠花曝乾為末傅之

又方搗土瓜根傅之燥則易不限時節

又方死蛇去皮肉取骨為末合和封瘡上大痛以杏仁膏摩之止

又方死蛇和臘月猪脂合燒灰為末內孔中

又方燒死蜣螂為末醋和塗又死蛇灰醋和傅之

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:11
列印頁數：1434
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方故布裹鹽如彈丸大燒令赤為末酒服

又方服白馬屎汁一升

又方水研杏仁服之

又方猪脂一升酒五合煎沸頓服之

又方鹽麪和燒灰傅之

又方正月雄狐屎陰乾擣末水和服

治漏作瘡孔方

右用露蜂房爲末臘月猪脂和傅孔上

治漏發心胷以下者方

松脂　武都雄黄　各三兩

右二味和為塊刀子刮爲散飲服一方寸匕日二不瘥更合

治漏方

鍛落鐵屑　狗頰車連齒骨　炙

鹿皮　合毛燒爲灰各等分

虎糞

右四味治下篩以猪膏和内瘡中須臾即易日五六

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:12
列印頁數：1435
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

度

治一切冷瘻方

右用燒人所吐蛔蟲為灰先用甘草湯洗去瘡惡然後著灰無不瘥者慎口味

治鼠瘻腫核痛未成膿者方

右以栢葉傳腫上熬鹽著葉上熨之令熱氣下即消

治風漏及鼠漏方

赤小豆　白斂　黄耆　牡蠣　各等分

右四味治下篩酒服方寸匕日三

治螻蛄瘻方

右先以泔清煮槲葉取汁洗瘡拭乾次以槲葉灰内

治蜂瘻方論

初生狀如桃而癢搔之則引大如雞子如覆手者熬鹽熨之三宿四日不瘥至百日成瘻其狀大如四五寸石廣三寸中生蜂作孔乃有數百以石硫黄隨多

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:12
列印頁數：1436
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

少燃燒令汁出著瘡孔中須臾間見蜂數十蜂盡乃瘥

治蜂癭方

以人屎蛇蛻灰臘月猪膏和傅之

又方鵸頭灰停之

又方取蜂窠燒灰臘月猪膏和傅孔中

右用蝟皮肝心燒灰為末酒服一錢匕

治蟻漏孔容針亦有三四孔者方

又方死蛇腹中鼠取臘月猪脂煎候焦去滓傅之

又方取大黿鮓燒耕垄土令赤以苦酒浸垄土時合壁土故熱以黿鮓著壁土上展轉令熱傅瘡上

又方鯪鯉甲二七枚燒末以猪膏和傅瘡上

又方半夏一枚擣末以鴨脂和傅瘡上

治瘭癧癭橫閡作頭狀若杏仁形亦作瘭癧方

右用雄雞屎燒灰臘月猪脂和封之

治蜣蜋癭方

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:13
列印頁數：1437
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右用牛屎燒灰臘月猪脂和停之

又方蜣蜋丸 即蜣蜋所食屎也 為末傅之

又方乾牛屎為末停之癢即撥却更厚封瘥乃止

又方熱牛屎塗之數易應有蜣蜋出

治蚯蚓瘻方

雞屎 蚯蚓屎

右二味為末用社猪下頷髓和傅之

治蠍瘻五六孔皆相通者方

右擣茅根汁著孔中

治蝦蟆瘻方

右用五月五日蛇頭及野猪脂同水衣封之佳

治蛇瘻方

右用蛇蜕皮燒灰臘月猪脂和封之

治蛙瘻方

右用蛇腹中蛙燒灰封之

治顛當瘻方

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:13
列印頁數：1438
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以擣土瓜根傅至瘥慎口味

治雀瘦方

右取母猪屎燒灰臘月猪膏和傅上當有蟲出如雀形

治膿瘦方

右用桃花末以猪脂和封之佳

治石瘦兩頭出者其狀堅實令人寒熱方

右以大鈹針破之次用鼠粘葉二分為末和雞子白一枚封之

又方擣槐子和井花水封之

灸漏法

蔚蘼子 二合 一升 豉

右二味和擣令極熟作餅子如大錢厚二分許取一枚當瘡孔上作大艾炷如小指大灸餅上三炷一易三餅九炷隔三日復一灸之 外臺灸瘭瘥古今錄驗云不可灸頭瘡蔚蘼氣入腦殺人

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:14
列印頁數：1439
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方擣生商陸根捻作餅子如錢大厚三分安漏上以艾灸餅乾易之灸三四升艾瘡 外臺灸瘰癧

又方七月七日日未出時取麻花五月五日取艾等分合擣作炷用灸瘡上百壯 外臺灸瘰癧

漏灸鳩尾骨下宛宛中七十壯 諸漏灸瘻周四畔九漏灸肩井二百壯

寒熱胷滿頸痛四肢不舉腋下腫上氣胷中有音喉中鳴天池主之

瘧 諸惡漏中冷息肉灸足內踝止各三壯二年六壯

寒熱頸腫後谿主之

寒熱酸痛四肢不舉腋下腫馬刀瘻喉痺髀膝脛骨搖酸痺不仁陽輔主之

寒熱脛腋下腫申脉主之

胷中滿腋下腫馬刀瘻善自囓舌頰天牖中腫寒熱胸脇腰膝外廉痛臨泣主之

寒熱頸腫丘墟主之

腋下腫馬刀肩腫吻傷太衝主之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寒熱頸瘰癧大迎主之

五白膏治鼠漏及瘰癧方

白馬屎　白牛屎　白猪屎　白羊屎
白雞屎　各一升　漏蘆二斤

右六味各於石上燒作灰研絹篩之以猪膏一升三合煎亂髮一兩半令極沸盡消乃内諸末微火上煎若無痂猶須湯洗日再若著膏當以帛裹上勿令中五六沸藥成去瘡痂以鹽湯洗新帛拭乾然後傅膏

曾青散治寒熱瘰癧及鼠瘻方

曾青　茬子　礬石一作礬石　附子各半兩　風冷神驗

曾青　茬子　礬石一作礬石　附子各半兩

栝蔞根　露蜂房　當歸　防風

芎藭　黄耆　黄芩　狸骨

甘草各二兩　細辛　乾薑各一兩　斑猫

元青各五枚

右十七味治下篩以酒服一方寸匕日再

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:15
列印頁數：1441
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治寒熱瘰癧方

土瓜根 連翹 龍膽 黄連

栝蔞根 苦參 芍藥 恒山 各一兩

右八味治下篩酒服五分匕日三 千金翼外臺有狸骨一枚又千方翼一方有當歸無栝蔞恒山

薔薇圓治身體有熱氣瘰癧及常有細瘡并口中生瘡方

薔薇根 三兩 黄耆 黄芩 鼠李根皮 栝蔞根 芍藥 苦參 石龍芮 防風 一作防已 白斂 龍膽 各一兩 梔子仁 四兩

右十二味為末蜜丸如梧子大飲服十五丸日再 千金翼有黄藥一兩

治瘰癧方

右用白殭蠶治下篩水服五分匕日三服十日瘥

又方狸頭一枚灸擣篩飲服方寸匕日二

又方故鞋内氈替燒末五匕和酒一升平旦向日服之

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:15
列印頁數：1442
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

强行須臾吐鼠出三朝服 外臺不同

又方狸頭蹄骨等炙黃擣篩為散飲服一錢匕日二

又方猫兩眼陰乾燒灰井花水服方寸匕日再

又方乾猫舌為末傅瘡上

又方狼屎灰傅之

又方狐頭狸頭灰傅之

又方五月五日取一切種種雜草煮取汁洗之

又方猫腦 莽草

右二味各等分為末著孔中

灸瘭癘法

一切瘭癘在項上及髑處但有肉結凝似作癭及癰癤者以獨頭蒜截兩頭留心大作艾炷稱蒜大小帖癘子上灸之勿令上破肉但取熱而已七壯一易蒜日日灸之取消止一切瘭癘灸兩胯裏患癘處宛宛中日一壯七日止神驗 又灸五里人迎各三十壯又灸耳後髮際直脉七壯 又灸患人背兩邊腋

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下後文上隨年壯

欽定四庫全書

備急千金要方

備急千金要方卷六十九

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

痔漏方

腸癰第二 論灸法 方

論曰卒得腸癰而不曉其病候愚醫治之錯則殺人腸癰之為病小腹重而强抑之則痛小便數似淋時時汗出復惡寒其身皮皆甲錯腹皮急如腫狀其脉數者小有膿也 巢源云數者已有膿也 其脉遲緊者未有膿也甚者腹脹大轉側聞水聲或遶臍生瘡或膿從臍中出或大便出膿血

問曰官羽林婦病醫脉之何以知婦人腸中有膿為下之即愈師曰寸口脉滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑上升榮衛相干血為濁敗小腹痞堅小便或澀或復汗出或復惡寒膿為已成設脉遲緊即為瘀血血下則愈

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:16
列印頁數：1445
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大黃牡丹湯治腸癰方

大黃 四兩
牡丹 三兩
芒硝 二兩
瓜子 一升

桃仁 五十枚

右五味咬咀以水五升煮取一升頓服當下膿血 刪繁

腸癰湯方

牡丹 甘草

敗醬 生薑

方用苦硝半合瓜子五合劉涓子用消石三合云腸癰之病小腹瘡堅或偏在膀胱左右其色或白堅大如掌熱小便欲調時白汗出其脉遲堅者未成膿可下之當有血脉數膿成不復可下肘後名瓜子湯

茯苓 各二兩

薏苡仁
麥門冬 各三兩

丹參 芍藥 各四兩

生地黃 五兩

右十一味咬咀以水一斗煮取三升分三服日三

又方薏苡仁 一升
桃仁 各三兩
牡丹皮 二升
瓜瓣仁

右四味咬咀以水六升煮取二升分再服 姚氏不用桃仁用杏

仁崔氏有芒硝二兩云腹中疥痛煩毒不安或脹滿不下飲食小便澁此病多是腸癰人多不識婦人產後虛熱者多成此病縱非癰疽但是便服此湯無他損也

又方雄雞頂上毛并屎燒作末空心酒服之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方截取檐頭尖少許燒灰水和服當作孔出膿血取愈凡腸癰其狀兩耳輪文理甲錯初患腹中苦痛或繞臍有瘡如粟皮熱便膿血出似赤白下不治必死方

馬蹄灰以雞子白和塗即拔氣不過再

又方死人塚上土作泥塗之

治内癰未作頭者方

右用伏雞屎服之即瘥

又方瓜子三升擣末以水三升煮取一升五合分三服

又方馬牙灰雞子和塗之乾則易

灸腸癰法

屈兩肘正灸肘頭銳骨各百壯則下膿血卽瘥

論曰産後宜勤濟乳不宜令汗蓄積蓄積不去便結不復出惡汗於内引熱温壯結堅牽掣痛大渴引飲乳急痛手不得近成妬乳非癰也急灸兩手魚際各二十七壯斷癰脉也不復惡手近乳汁亦自出便可手助迮捋之則乳汁大出皆如膿狀内服連翹湯外以小豆薄塗

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

之便瘥

婦人女子乳頭生小淺熱瘡癢搔之黃汁出浸淫為長百種治不瘥者動經年月名為妬乳婦人飲兒者乳皆欲斷世謂苟抄乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之傳二物飛烏膏及飛烏散佳若始作者可傳黃芩漏蘆散及黃連胡粉散並佳

赤龍皮湯方

右用槲皮切三升以水一斗煮取五升夏冷用之冬温用之分以洗乳亦洗諸深敗爛久瘡洗竟傳膏散

天麻湯方

右用天麻草切三升以水一斗半煮取一斗隨寒熱分洗乳以殺癢也此草葉如麻冬生夏著花赤如鼠尾花也亦以洗浸淫黃爛熱瘡癢疽濕陰蝕小兒頭

飛烏膏方

癗洗竟傳膏散

傾粉 是燒朱砂作水銀上黑烟也一作細粉 各三兩

礬石

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:18
列印頁數：1448
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味為末以甲煎和如脂以傅乳瘡日三傅作散者不須和汁自著者可用散及諸熱瘡黃爛瘡浸淫汁癢丈夫陰蝕癢濕瘡小兒頭瘡月蝕口邊肥瘡瘑瘡等並皆主之

黃連胡粉散

黃連 二兩　胡粉 十分　水銀 一兩

右三味黃連為末相和奠皮裹熟挼之自能和合縱不得成一家亦得水銀細散入粉中也以傅乳瘡諸濕瘡黃爛肥瘡等若乾著甲煎為膏

治妬乳乳生瘡方

蜂房　猪甲中土　車轍中土　各等分

右三味為末苦酒和傅之

鹿角散治婦人乳生瘡頭汁出疼痛欲死不可忍者方

鹿角 三分　甘草 一分

右二味治下篩和以雞子黃於銅器中置温處炙上傅之日再即愈神驗不傅

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治妬乳方

右以葵莖灰擣篩飲服方寸匕日三即愈 集驗方直擣為散不為灰

又方燒自死蛇為灰和以猪膏塗之大良

灸法

右以蒲黄度口以度從乳上行灸度頭二七壯

論曰産後不自飲兒并失兒無兒飲乳乳蓄喜結癰不飲兒令乳上腫者以雞子白和小豆散傅乳房令消結

也若飲兒不泄者數捻去之亦可令大孩子含水使口中令為嗍取滯乳汁吐去之不含水漱去熱喜令乳頭作瘡乳孔塞也

凡女人多患乳癰年四十以下治之多瘥年五十已上慎勿治治之多死不治自得終天年

連翹湯治妬乳乳癰方

連翹 芒硝 各二兩 芍藥 射干 升麻 防己 杏仁 黄芩

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:19
列印頁數：1450
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大黃 柴胡 甘草 各三兩

右十一味㕮咀以水九升煮取二升五合分三服

治乳癰方

麥門冬 一升 黃芩 芍藥 茯苓 各二兩

桑寄生 人參 黃耆 防風 各三兩

甘草 各三兩 粘糖 八兩 大棗 五枚

右十一味㕮咀以水一斗煮取三升去滓内糖一沸分四服

又方先服前件湯五日後服此丸即愈方

天門冬 五兩 澤蘭 五分 大黃 十分 升麻 六分 各二分

羌活 桑寄生 防風 人參 通草

黃耆 乾地黃 白芷

黃芩 枳實 五味子 茯神

天雄 芎藭 當歸 各一兩

右十九味爲末蜜丸酒服二十丸日二加至四十丸

治乳癰始作方 廣濟方云治乳癰大堅硬赤紫色衣不得近痛不可忍者

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:19
列印頁數：1451
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大黃　棟實　芍藥　馬蹄　各等分

右四味治下篩飲服方寸匕取汗出瘥　廣濟方云酒服方寸匕覆取汗當睡著覺後腫處散不痛經宿乃消

排膿散治乳癰除惡肉方

蒺藜　鐵精　桂心　細辛　一作防風　芍藥　人參　當歸　各三分　甘草　五分

乾薑　芎藭

右十二味治下篩酒服方寸匕日三夜一服藥十日

膿血出多勿怪

又方生地黃　三升　芒硝　三合　豉　一升

右三味合濤傳上熱即易之取瘥止一切癰腫皆用一方單用之　地黃傳之

治妬乳乳癰腫方

右取研米槌二枚灸令熱以絮及故帛摩乳上以槌更互熨之瘥止已用立效

治乳癰堅方

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:20
列印頁數：1452
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右以水罐中盛醋泔清燒石令熱内中沸止更燒如前少熱内乳漬之及冷更燒石内漬不過三度燒石愈

又方黄芩 白斂 芍藥 各等分

右三味為末以漿水飲服半錢匕日三若左乳汁結者即捋去右乳汁若右乳汁結者可捋去左乳汁小品云治妬乳

治乳癰方

又方大黄 莽草 各二分 伏龍肝 十二分 生薑 二分

右三味擣為末以黍米粥清和傅乳四邊痛止即愈無黍米粟米粳米亦得

又方鹿角治下篩以猪脂上清汁服方寸匕不過再服亦可以醋漿水服

右四味擣為末以酢和塗乳痛即止有效

又方取蔥白擣僇之并絞汁一升頓服即愈

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:20
列印頁數：1453
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治乳癰二三百日衆療不瘥但堅紫色青柳根熨方

右以柳根削取上皮擣令熟熬令温盛著練囊中熨乳上乾則易之一宿即愈

蒺藜圓治婦人乳腫痛除熱方

蒺藜子 大黄 各一兩 敗醬 一分 桂心

人參 蕙苡仁 附子 黄連

芍藥 通草 各二分

黄耆 雞骨 當歸 枳實

右十四味為末蜜丸如梧子大未食飲服三丸不知益至五丸日三無所忌一方無大黄敗醬黄連通草

為散酒服方寸匕

備急千金要方卷七十

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:20
列印頁數：1454
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

痔漏方

五痔第三 論灸法 方

論曰夫五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脉痔四曰腸痔五曰血痔牡痔者肛邊如鼠乳時時潰膿血出牝痔者肛邊有瘡癢痛腸痔者肛邊核痛發寒熱血痔者大便清血隨大便汚衣又五痔有氣痔寒温勞温即發蛇蜕皮主之牡痔生肉如兒乳在孔中頗出見外妨於更衣鼈甲主之牝痔 集驗作酒痔 從孔中起外腫五六日自潰出膿血猶皮主之腸痔更衣挺出久乃縮毋猪左足懸蹄甲主之脉痔更衣出清血蜂房主之五藥皆下篩等分隨其病倍其主藥爲三分旦以井花水服半方寸匕病甚者旦暮服之亦可四五服禁寒冷食猪肉生魚菜房室惟得食乾白肉病瘥之後百

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:21
列印頁數：1455
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

日乃通房內又用藥導下部有瘡內藥瘡中無瘡內孔中又用野葛燒末刀圭內藥中服藥五日知二十日若三十日愈痔痛通忌蕈菜

治五痔衆醫所不能愈者方

秦艽 各一兩 厚朴 紫參

亂髮 紫菀 各一兩 雷丸 藁本 各二兩

石南 廬蟲 各一兩 貫衆 三兩 蝕蟲 半升

猪後懸蹄 十四枚

右十三味合擣下篩以羊髓脂煎和丸如梧子大空腹飲下十五丸日二若劇者夜一服四日肛邊癢止八日膿血盡鼠乳悉瘥滿六十日終身不復發久服益善忌魚猪肉等

槐子圓治燥濕痔痔有雄雌皆主之方

槐子 乾漆 秦艽

吳茱萸根白皮 各四兩 白芷 桂心

黃芩 黃耆 白斂 牡蠣

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

龍骨　雷丸
蒺藜　附子　兩各二
丁香　木香

右十六味為末蜜丸如梧子大飲服二十丸日三　千金

翼無白飲深師無黃耆云治苦暴有乾燥腫滴者有崩血無數者有鼠乳附核者有腸中煩癢者二五年皆殺人主忌飲酒及作勞犯之即發

小槐實圓治五十年者方

槐子　三斤　白糖　二斤　礬石　硫黃　各一斤
大黃　乾漆　龍骨　各十兩

右七味四味擣篩其二種石及糖並細切內銅器中一石米下蒸之以綿絞取汁和藥末併手丸如梧子大陰乾酒服二十丸日三稍增至三十丸

槐子酒治同前

槐子　二斗　槐東南枝　細剉一石
槐東南根　細剉三石

右三味內大釜中以十六斛水煮取五斛澄取清更煎取一石六斗炊兩斛黍米上麴二十斤釀之攪令調

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:22
列印頁數：1457
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

封泥七日酒熟取清飲適性常令小小醉合時更煮
滓取汁淘米及洗器不得用水須知此事忌生水故
也
又方塗熊膽取瘥止神良一切方皆不及此
又方七月七日多採槐子熟擣取汁内銅器中重綿窓
蓋著宅中高門上曝二十日已上煎成如鼠屎大内穀
道中日三亦主癭及百種瘡
又方取生槐白皮十兩熟擣丸如彈丸綿裹内下部中
此病宜常食萹竹葉及煮羹粥大佳也
又方取鯉魚腸三具以火灸令香綿裹内穀道中一食
久蟲當出食魚腸數數易之盡三具瘥一方灸腸令香
坐上蟲出經用有效
又方虎頭　犀角
右二味為末和不中水猪脂大如雞子塗瘡上取瘥
治五痔及脫肛方
槐白皮　二兩　猪脂　半斤　榛子　桃仁　各十枚

巴豆 七枚
白芷 各兩半
右十味咬咀煎三上三下去滓以綿沾膏塞孔中日四五過蟲死瘡止癢痛大佳

治五痔方

猬皮 方三指大切
熏香 棗大末
右三味穿地作孔調和取便熏之口中熏黃烟氣出為佳火氣消盡即停停三日將息更熏之凡三度永瘥勿犯風冷羹臛將補慎猪雞等

猬皮圓治痔方 亦治漏
猬皮 一具
右十味為末蜜丸如梧子大服十五丸日再加至四

又方用桃根煮洗之

又方取槐根煮洗之

槐子 三兩
乾薑
猬皮 一具
槐子 三兩
乾地黃 五兩
附子
續斷
黃耆 各二兩
礬石
當歸
連翹

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

十丸 集驗方無礬石地黃

又方治崩中及痔方

猬皮 人參 茯苓 白芷

禹餘糧 乾地黃 槐耳 續斷 各三兩

蒲黃 黃耆 當歸 艾葉

橘皮 白斂 甘草 各二兩

白馬蹄 酒漫一宿熬令黃 牛角鰓 各四兩

鰻鱺魚頭 二十枚 猪懸蹄甲 二十一枚 熬

右十九味為末蜜丸如梧子大酒服二十丸日再稍加

治痔方

右取槐耳赤雞一斤 即是槐樓 為末飲服方寸匕日三

又以蒲黃水服方寸匕日三良妙 外臺云治腸痔每大便常有血者

又方取桑耳作羹空腹飽食之三日食佳

治痔下血及新產漏下方

附子 好礬石 各一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味為末白蜜丸如梧子大酒服二丸日三稍加不過數日便斷百日服之終身不發 崔氏方有乾薑一兩

治外痔方 亦治惡瘡瘺瘡

真珠 雄黃 各一兩 雌黃 各一兩 竹茹 三兩

猪膏 一斤

右五味為末內猪膏中和調又切亂髮半雞子大和東向煎三上三下髮焦出其痔先用鹽湯洗拭乾後傳之

治痔下部出膿血有蟲傍生孔竅方

右以槐白皮一檐剉內釜中煮令味極出置大盆中適寒溫坐其中如浴狀蟲悉出冷又易之不過二三度瘥

治穀道瘡痛繞緣腫起裹許欲生肉突出方

大豆 三升以水七升急火煮取四升 槐白皮 三升 甘草 三兩

右三味以豆汁煮取二升浸故帛薄之冷則易日三五度

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

槐皮膏治穀道癢痛痔瘡方

槐皮 棟實 各五兩外臺作塵豉 白芷 各二兩 甘草 刪繁用蜂房 三兩 當歸 三兩 桃仁 六十枚 赤小豆 二合

右七味咬咀以成煎猪膏一斤微火煎白芷色黄膏成取摩瘡上日再并導下部 刪繁方無當歸治腎勞虚或酒醉當風所損腎藏病所為肛門腫生瘡因酒勞傷發瀉清血肛門疼痛蜂房膏

治穀道痛方

右用菟絲子熬黄黑和雞子黄以傅之日二度

又方取杏仁熬令黄擣所脂以傅之

治大便孔卒痛如鳥啄方

右以大小豆各一斗和濤内兩袋中蒸令極熱更互坐之瘥

灸法

从冷五痔便血灸脊中百壯

五痔便血失屎灸回氣百壯穴在脊窮骨上

痔癬第四 論灸法 方

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:24
列印頁數：1462
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

論曰凡瘡疥小秦艽散中加烏蛇肉二兩主之黃耆酒

中加烏蛇脯一尺亦大效 千金翼云黃耆酒中加烏蛇脯一尺烏頭附子菌芋石南

凡諸疥癬皆用水銀猪脂研令極細塗之

治凡有瘡疥腰胯手足皆生疵疥者方

栝蔞根 四兩 黃連 芍藥 薔薇根

雀李根皮 黃蘗 各三兩 苦參 黃耆

黃芩 石龍芮 各二兩 大黃 當歸

續斷 各一兩

皆須服之

治寒熱瘡及風疥諸雜瘡方

千年韭根 好礬石 雄黃 藜蘆

瓜蒂 胡粉 各一分 水銀 三分

右七味以柳木研水銀使盡用猪脂一升煮藜蘆韭

日三加至三十丸瘥乃止乾疥白癬勿服 千金翼云所是癬疽

右十三味為末蜜丸如梧子大以薔薇飲服二十丸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

根爪蒂三沸去滓内諸藥和調令相得即成以傅之

神良 救急方用治癬瘡

藺茹膏治一切惡瘡疥癬瘍漏瘺方

藺茹 狼牙 青葙 地榆

藜蘆 當歸 萹蓄 羊蹄根 各二兩

蛇牀子 白斂 各六分 漏蘆 二分

右十一味擣以苦酒漬一宿明旦以成煎猪膏四升煎之三上三下膏成絞去滓内後藥如左

雄黄 雌黄 硫黄 礬石

胡粉 松脂 各二兩 水銀 三兩

右七味細研看水銀散盡即傾前件膏中以十隻筯攪數百遍止用磁器密貯舉勿令泄氣煎膏法必微火急即不中用傅藥不可近目及陰先研雄黄等令細候膏小冷即和攪傅之

治疥疽諸瘡方

水銀 胡粉 各六分 黄連 黄蘗 各八分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

薑黃十分　礬石　附子　苦參
蛇牀子各三分
右九味水銀胡粉別研如泥餘爲末以成煎猪膏合和研令調以傅之千金翼無薑黃
治乆瘠癬方
丹砂　雄黃　劉涓子無　亂髮洗淨
松脂　白蜜各一兩　藺茹三兩　猪脂二升
巴豆十四枚
右九味先煎髮消盡內松脂蜜三上三下去滓內諸末中更一沸止以傅之千金翼用蠟不用蜜
又方水銀　礬石一作礬石　黃連一作雄黃　蛇牀子各一兩
右四味爲末以猪脂七合和攪不見水銀爲熟傅之
一方加藜蘆一兩又云藺茹
治諸瘡瘠乆癬乆不瘥者方
水銀一斤　臘月猪脂五斤

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味以鐵器中墨竈用馬通火七日七夜勿住火出之停冷取膏去水銀不妨別用以膏傅一切瘡無不應手立瘥 千金翼又用水銀粉和猪脂塗之

又方特牛尿 羊蹄根 各五升

右二味以牛尿漬羊蹄根一宿日曝乾復内尿中取盡止作末傅諸瘡 千金翼云和猪脂用更精

又方拔取生烏頭十枚切煮汁洗之瘥

論曰凡諸瘡癬初生時或始痛癢即以種種單方救之或噤鹽塗之又以穀汁傅之又以蒜墨和傅之 千金翼蒜作酥

又以薑黄傅之又以鯉魚鮓糝傅之又以牛李子汁傅之若以此救不瘥乃以前諸大方治之

治細癬方

蛇牀子 白鹽 一作白堊 羊蹄根 各一升 赤葛根 苦參 葛蒲 各半斤 黄連 各三兩 莽草

炊一石米頃爲佳澄清後當微温用之滿三日止右八味咬咀以水七升煮取三升適寒温以洗身如

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方羊蹄根於磨石上以苦酒磨之以停瘡欲停先刮瘡以火炙乾後停四五遍 千金翼云療羊蹄根著磁器中以白蜜和臨用先刮瘡令傷次以蜜和者停之如炊一石米久拭去更以三年大蒜和塗之苦刮瘡處不傷即不瘥

又方羊蹄根五升以桑柴灰汁煮四五沸以洗凡方中用羊蹄根皆以日未出採之佳

又方葛蒲末五斤以酒五升漬釜中蒸之使味出先絶酒一日每服一升或半升

又用乾荆子燒中央器承兩頭取汁塗之先刮上令傷次用荆子汁

治癬方

右取煎餅熱搦不限多少日一遍良亦治浸淫瘡

又方淨洗瘡取醬瓣雀屎和傳之瘥止 千金翼云取鼠屎和塗之

又方水銀蕪荑和酥傳之

又方日中午擣桃葉汁傳之

又方擣刺薊汁傳服之

又方燒蛇蛻一具酒服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方服地黃汁佳

又方擣羊蹄根和乳塗之

又方服驢尿良

又方醋煎艾塗之

又方擣萇菪根蜜和傅之千金翼無根字

治濕癬肥瘡方

右用大麻湔傅之五日瘥

治癬久不瘥者方

右取自死蛇燒作灰猪脂和塗即瘥

灸癬法

日中時灸病處影上三姓灸之咒曰癬中蟲毛戎戎若

欲治待日中

八月八日日出時令病人正當東向戶長跪平舉兩手

持尸兩邊取肩頭小垂際骨解宛宛中灸之兩火俱下

各三壯若七壯十日愈

治小兒癬方

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:27
列印頁數：1468
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右以蛇牀實擣末和猪脂以傅之

治瘙癢方

右以水銀和胡粉傅之

治身體瘙癢白如癬狀者方

右四味以苦酒一升合擣令熟以拭身體日三

治癮易方

右以三年醋磨烏賊骨先以布摩肉令赤次傅之

楮子 三枚 猪胞 一具 礬石 一兩 鹽 一升

又方醋磨硫黄塗取上 集驗又磨附子硫黄待使熟將卧以布拭病上乃以藥傅之

又方取塗中先死蜣蜋擣爛塗之當揩令熱封上一宿

癮

又方白斂 熏陸香

右二味揩上作末水服癮

又方硫黄 雌黄 槲皮 燒 蛇蜕 一具

右四味各等分擣篩以清漆合和薄塗白處欲塗時先以巴豆半截拭白處皮微破然後傅之不過三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

度

又方硫黃 水銀 礬石 竈墨 各等分

右四味擣篩內坩子中以蔥葉中涕和研臨臥傅病上

九江散治白癜風及二百六十種大風方

當歸 七分 石南 六分 附子 蹲鴟 各四兩 乾薑 防風 秦艽 菊花 雄黃 麝香 各八分 知母 十一分 蜀椒 連翹 鬼箭羽 石長生 各十分 石斛 天雄 烏頭 獨活 各十二分 防己 莽草 各十分 水蛭 百枚 蜈蚣 三枚 蟲蟲 地膽 各十枚 丹砂 斑猫 各四兩 王不留行 人參 各三兩 黃芩 各三兩 乾薑 四兩

右三十味諸蟲皆去足翅熬炙令熟爲散以酒服方寸匕日再其病入髮令髮白服之百日愈髮還黑又方天雄 白斂

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

附子一兩　商陸　躑躅各一升

右七味治下篩酒服五分匕日三

治白癜方

礬石　硫黄

右二味各等分為末酢和停之

又方平旦以手掉取韭頭露塗之極效

又方以酒服生胡麻油一合日三稍稍加至五合慎生冷猪雞魚蒜等百日服五斗瘥

又方取羅摩草煮汁拭之亦揩令傷擿白汁塗之

又方石灰松脂酒主之方見卷末

又方以蛇蛻皮燸摩數百過棄置草中

又方樹空中水洗桂爲末唾和塗之日三

又方以水銀數數拭之令熱即消瘡乃止

又方灸左右手中指節去延外宛中三壯未瘥報之

治凡身諸處白駁漸漸長似癬但無瘡方

右取鰻鱺魚脂塗之先揩病上使痛然後塗之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治皮中紫赤疵痣去黶黰方

乾漆 雌黃 各三兩 雄黃 五兩

巴豆 十五枚 炭皮 二斤

右六味治下篩以雞子白和塗故帛貼病上日二易

治赤疵方

右用墨大蒜鮓血合塗之

治贅疵痣方

雄黃 硫黃 真珠 礬石

巴豆 藭茹 藜蘆 各一兩

右七味治下篩以真漆合和如泥以塗黠病上須成瘡及去面黚皮中紫不耐漆人不得用以雞子白和之

去疣目方

以七月七日用大豆一合拭疣目上三遍病疣人自種豆於南屋東頭第二雷中豆生四葉以湯沃殺即瘥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方松栢脂合和塗之一宿失矣

又方石硫黃揩六七遍

又方杏仁燒令黑研膏塗上

又方以猪脂癢處揩之令少許血出即瘥神驗不可加

又方每月十五日月正中時望月以禿條箒掃三七遍

瘥

又方苦酒漬石灰六七日滴取汁點疣上小作疣即落

又方取牛口中涎數塗自落

又方著艾炷疣目上灸之三壯即除

惡疾大風第五 方論

論曰惡疾大風有多種不同初得雖偏體無異而眉鬚已落有偏體已壞而眉鬚儼然有諸處不異好人而四肢腹背有頑處重者手足十指已有墮落有患大寒而重衣不暖有尋常患熱不能暫涼有身體枯槁者有津汁常不止者有身體乾癢徹骨搔之白皮如麩手下作瘡者外臺作卒不作瘡有瘡瘕荼毒重疊而生晝夜苦痛不已者

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

有直置頑鈍不知痛癢者其色亦有多種有青黃赤白黑光明枯暗此候雖種種狀貌不同而難療易療皆在前人不由醫者何則此病一著無問賢愚皆難與語何則口順心違不受醫教直希望藥力不能求已故難療易療屬在前人不關醫藥予嘗手療六百餘人瘥者十分有一莫不一一親自撫養所以深細諳委之姑與共語覺難與語不受入即不須與療終有觸損病既不瘥乃勞而無功也又神仙傳有數十人皆因惡疾而致仙道何者皆由割棄塵累懷顓陽之風所以非止瘥病乃因禍而取福也故余所覩病者其中頗有士大夫乃至有異種名人及遇斯患皆愛戀妻孥繫著心髓不能割捨直望藥力未肯近求諸身若能絶其嗜慾斷其所好非但愈疾因茲亦可自致神仙余嘗問諸病人皆云自作不仁之行久久並為極猥之業於中仍欲更作云為雖有悔言而無悔心但能自新受師教命飡進藥餌何有不除余以正觀年中將一病士入山教服松脂欲至

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

百日鬚眉皆生由此觀之惟須求之於已不可一仰醫藥者也然有人數年患身體頑痺羞見妻子不告之令知其後病成狀貌分明乃云犯藥卒患此皆自誤然斯疾雖大療之於微亦可即瘥此一疾得遠者不過十年皆死近者五六歲而亡然病者自謂百年不死深可悲悼一遇斯疾即須斷鹽常進松脂一切公私物務釋然皆棄猶如脫屣凡百口味特須斷除漸漸斷穀不交俗事絶乎慶弔幽隱巖谷周年乃瘥瘥後終身慎房事犯之還發茲疾有吉凶二義得之脩善即吉若還同俗類必是凶矣今畧述其由致以示後之學者可覽而思焉

蔺豆治惡疾方

右用細粒烏豆擇取摩之皮不落者取三月四月天雄烏頭苗及根淨去土勿洗擣絞取汁漬豆一宿漉出曝乾如此七反始堪服初服三枚漸加至六七枚日一服禁房室猪魚雞蒜畢身毛髮即生犯藥不瘥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

岐伯神聖散治萬病癰疽癲疥癬風瘘骨肉疽敗百節
痛眉毛髮落身體搖搖躍躍痛癢目痛皆爛耳聾齒齲
痔瘻
天雄　附子　各三兩
細辛　烏頭　各一兩
蜀椒　防風　各二兩
獨活　各三兩
右十三味治下篩酒服方寸匕日三勿增之
狼毒散治惡疾方
狼毒　秦艽　各等分
右二味治下篩酒服方寸匕日三服五十日愈
又方煉松脂投冷水中二十遍蜜丸服二丸遇饑即服
之日三鼻柱斷離者二百日服之瘥斷鹽及雜食房室
又天門冬酒服百日愈
石灰酒主生毛髮眉鬚去大風方
石灰　一石伴水和濕蒸令氣足
松脂成煉　十斤為末

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:31
列印頁數：1476
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

上糜 一斗二升 黍米 一石

右四味先於大鍋内炒石灰以木札著灰中火出為度以枸杞根剉五斗水一石五升煮取九斗去滓以淋石灰三遍澄清以石灰汁和漬糜用汁多少一如釀酒法訖封四七日開服常令酒氣相及為度百無所忌不得觸風其米泔及飯糟一事已上不得使人畜犬鼠食之皆令深埋却此酒九月作二月止恐熱隔上熱者服後進三五口冷飯壓之婦人不能飲食黃瘦積年及蓐風不過一石即瘥其松脂末初酘釀酒攤飯時均散著飯上待飯冷乃投之此酒飯宜冷不爾即醋宜知之

治大風眉鬚落赤白癩病八風十二痺筋急肢節緩弱飛尸遁注水腫癰疽疥癬惡瘡脚攣手折眼闇洞洩痰飲宿癖寒冷方

糜 二十五斤 商陸根 二十五斤 馬耳 切

右二味合於甕中水一斛漬之炊黍米一石釀如家

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

法使麴米相淹三醆畢密封三七日開視麴浮酒熟
澄清溫服三升輕者二升藥發吐下為佳宜食弱煮
飯牛羊鹿肉羹禁生冷醋滑及猪犬鷄魚等
治風身體如蟲行方
右用鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗浴三四遍并療一切風
又方以淳灰汁洗面不過一月
又方以大豆漬飯漿水旦旦温洗面洗頭髮不淨加少
麪勿以水濯之不過十度
又方成煉雄黄松脂各等分蜜和丸如梧桐子大飲下
十丸日三服百日愈慎酒肉鹽豉等
備急千金要方卷七十一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷七十四

詳校官太醫院院使臣秦天錫
編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐
校對官中書　臣胡紹基
謄錄監生臣劉文耀

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷七十二　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

解毒雜治方

解食毒第一　方論

論曰凡人跋涉山川不諳水土人畜飲啖誤中於毒素不知方多遭其斃豈非枉橫耶然而大聖久設其法以救活之正爲貪生嗜樂忽而不學一朝逢遇便自甘心竟不識其所以今述神農黃帝解毒方法好事者可少留意焉

治諸食中毒方

飲黃龍湯及犀角汁無不治也飲馬尿亦良

治飲食中毒煩懣方

苦參三兩㕮咀以酒二升半煮取一升頓服取吐愈

治食百物中毒方

掘厠傍地深一尺以水滿坑中取厠籌七枚燒令煙

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以投坑中乃取水汁飲四五升即愈急者不可得但掘地著水即取飲之

又方服生韭汁數升

又方含貝子一枚須臾吐食物瘥

治食六畜肉中毒方

各取六畜乾屎爲末水服佳若是自死六畜肉毒水服黃蘗末方寸匕須臾服與佳

又方燒小豆一升爲末服三方寸匕神良

又方水服竈底黃土方寸匕

治食生肉中毒方

掘地深三尺取下土三升以水五升煮土五六沸取上浮清者飲一升立愈

治食牛肉中毒方

狼牙燒灰水服方寸匕良 一作猪牙

又方温湯服猪脂良

又方水煮甘草汁飲之

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:33
列印頁數：1481
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治食牛馬肉中毒方

飲人乳汁良

治食馬肉血洞下欲死方

豉二百粒 杏仁二十枚

右二味咬咀蒸五升米下飯熟擣之再服令盡

又方蘆根汁飲以欲即解

治生食馬肝毒殺人方

牡鼠屎二七枚兩頭尖者是以水研飲之不瘥更作

治食野菜馬肝肉諸脯肉毒方

取頭垢如棗核大吞之起死人

又方燒狗屎灰水和絞取汁飲之立愈

又方燒猪骨爲末水服方寸匕

治食百獸肝中毒方

頓服猪脂一斤佳亦治陳肉毒

治食狗肉不消心中堅或腹脹口乾大渴心急發熱狂言妄語或洞下方

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:34
列印頁數：1482
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杏仁一升合皮研以沸湯三升和絞取汁分三服狗肉完片皆出即靜良驗

治食猪肉中毒方

燒猪屎為末服方寸匕犬屎亦佳

治漏脯毒方 張文仲云茅室諸水迷脯為漏脯

禱韭汁服之良大豆汁亦得

治鬱肉濕脯毒方 張文仲云肉閉在窖器中經宿者為濕脯

燒狗屎為末水服方寸匕凡生肉熟肉皆不用深藏密蓋不泄氣皆殺人又肉汁在器中密蓋氣不泄者亦殺人

治脯在黍米中毒方

麴一兩鹽兩撮以水一升煮服之良

治牛射罔脯毒及餅臛中毒方

取貝子為末水服如豆佳不瘥又服

人以雉肉作餅臛因食皆吐下治之方

犀角為末服方寸匕得靜甚佳

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治食鵝鴨肉成病胷滿面赤不下食者方

服秫米泔良

治食魚中毒方

煮橘皮停極冷飲之立驗 肘後方云治食魚中毒面腫煩亂者

治食魚中毒面腫煩亂及食鱸魚中毒欲死者方

劉蘆根舂取汁多飲良并治蟹毒亦可取蘆葦茸汁飲之愈

治食魚膾及生肉在胷膈中不化吐之不出便成癥瘕方

厚朴三兩 大黃二兩

右二味咬咀以酒二升煮取一升盡服立消人強者

大黃用酒三升煮取二升再服之

治食魚膾不消方

大黃三兩切 朴硝二兩

右二味以酒二升煮取一升頓服之 仲景方有橘皮一兩肘後方云治食猪肉遇冷不消必成瘕下之方亦無橘皮

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:35
列印頁數：1484
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方舂馬鞭草飲汁一升即消生薑亦良附後方云亦宜服諸吐藥

又方鮎魚皮燒灰水服無完皮壞刀裝取之一名鮫魚皮古今録驗云治食鮆鯧魚傷毒

又方魚皮燒灰水服方寸匕

又方魚鱗燒灰水服方寸匕食諸鮑魚中毒亦用之

治食蟹中毒方

冬瓜汁服二升冬瓜亦可食

治食諸菜中毒方

右三味治下篩水服方寸匕小兒尿乳汁共服二升

甘草 貝齒 胡粉 各等分

治食山中樹菌中毒方

亦好

人屎汁服一升良

解百藥毒第二 論解毒方

論曰甘草解百藥此實如湯沃雪有同神妙有人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定中藜蘆毒蔥湯下咽便愈中

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

野葛毒土漿飲訖即止如此之事其驗如反掌要使人皆知之然人皆不肯學誠可歎息方稱大豆汁解百藥毒余每試之大驗絶不及甘草又能加之為甘豆湯其驗尤奇有人服玉壺丸治嘔不能已百藥與之不止藍汁入口即定如此之事皆須知之此則成規更不須試練也解毒方中條例極多若不指出一二學者不可卒知餘方例爾

石藥毒用白鴨屎

人參汁雄黄毒用防己

鐵粉毒用磁石

礬石毒用大豆汁白鷰膏

防葵毒用葵根汁

桔梗毒用白粥

甘遂毒用大豆汁

大戟毒用菖蒲汁

躑躅毒用梔子汁

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:35
列印頁數：1486
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

雞子毒用淳醋
馬刀毒用清水
野芋毒用土漿人糞汁
杏仁毒用藍子汁
百藥毒用甘草薺苨大小豆汁藍葉根實汁
金銀毒用水銀服數兩即出雞子汁及屎白燒猪脂和
水淋雞屎汁煮蔥白汁鴨血及屎汁
芜花毒用防己防風甘草桂汁
野葛毒用雞子清葛根汁甘草汁鴨頭熱血猪膏雞屎
人屎
藜蘆毒用雄黄湯煮蔥汁
烏頭天雄附子毒用大豆汁遠志防風棗肉飴糖
射罔毒用藍汁大小豆汁竹瀝大麻子汁藕芰汁六畜
莨菪毒用薺苨甘草犀角蟹汁升麻
半夏毒用生薑汁及煮乾薑汁
血貝齒屑蚯蚓屎

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

狼毒毒用杏仁藍汁白飲鹽汁木占斯

巴豆毒用煮黄連汁大豆汁葛蒲汁生藿汁肘後云小豆藿煮

寒水石汁

蜀椒毒用葵子汁蒜桂汁豉汁人尿冷水土漿雞毛燒

吸煙及調水服

斑猫元青毒用猪膏大豆汁戎鹽藍汁鹽湯煮猪膏巴

豆服藥過劑悶亂者用水和胡粉水和葛粉地漿蘘荷

汁杭米瀋豉汁乾薑黄連飴糖飲藍汁吞雞子黄

解諸菌毒

掘地作坑以水沃中攪令濁澄清飲之名地漿

解一切毒藥發不問草石始覺惡即服此方

豉 三升 生麥門冬 各八兩 蔥白

右三味㕮咀以水七升煮取二升半分三服

雞腸草散解諸毒方

雞腸草 三分 薺苨 升麻 各四分 芍藥

當歸 甘草 各二分 釜土 一分 藍子 一合

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右八味治下篩水服方寸匕多飲水爲佳若為蜂蛇等毒蟲所螫以針刺螫上血出著藥如小豆許於瘡中令濕瘥為射罔箭所中削竹如釵股長一尺五寸以綿纏繞水沾令濕取藥内瘡中隨瘡深淺令至底止有好血出即休若服藥有毒水服方寸匕毒解痛止愈

解毒藥散方

薺苨 一分 藍 并花二分

解毒藥散方

右二味七月七日取藍陰乾擣篩水和服方寸匕日三

又方中毒者取秦燕毛二枚燒灰服

解一切毒方

毋猪屎水和服之又水三升三合和米粉飲之

解鴆毒及一切毒藥不止煩懣方

甘草 蜜 各四分 梁米粉 一升

右三味以水五升煮甘草取二升去滓歇大熱内粉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

湯中攪令勻調内白蜜更煎令熟如薄粥適寒温飲
一升
治食菉菪悶亂如卒中風或似熱盛狂病服藥即劇方
飲甘草汁藍青汁即愈
治野葛毒以死口噤者方
取青竹去兩節拄兩脇臍上内冷水注之暖即易須
臾口開開即服藥立活惟須數易水
治鈎吻毒困欲死面青口噤逆冷身癉方 肘後方云鈎吻菜莫食芥
齏苪八兩�mouth咀以水六升煮取三升冷如人體服五
合日三夜二凡煮齏苪惟令濃佳
又方煮桂汁飲之
又方嚼蔥涕佳 蔥涕治諸毒
治腹中有鐵方
白折炭刮取末井花水服三錢不過再服

相似而所生之傍無他草又莖有毛誤食之殺人

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷七十三　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

解毒雜治方

解五石毒第三　論　方　證

論曰人不服石以庶事不佳惡瘡疥癬温疫癘疾年年常患寢食不安興居中惡非止已事不康生子難育所以石在身中萬事休泰要不可服五石也人年三十已上可服石藥若素肥充亦勿妄服四十已上必須服之五十已上三年可服一劑六十已上二年可服一劑七十已上一年可服一劑

又曰人年五十已上精華消歇服石猶得其力六十已上轉惡服石難得力所以常須服石令人手足温煖骨髓充實能消生冷舉措輕便復耐寒暑不著諸病是以大須服之凡石皆熟鍊用之凡石之發當必惡寒頭痛心悶發作有時狀如温瘧但有此兆無過取冷水淋之

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:38
列印頁數：1491
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

得寒乃止一切冷食惟酒須温其諸解法備如後說其發背疽腫方見別卷

又曰凡服石人甚不得雜食口味雖百品具陳終不用重食其肉諸雜既重必有相賊聚積不消遂動諸石如當服五六兩乳自是以來深深體悉至於將悉節度頗識其性養生之士宜留意詳焉然其乳石必須土地清法持心將攝得所石藥為益善不可加余年三十八九白光潤羅紋烏翮一切皆成白可入服其非土地者慎勿服之多皆殺人甚於鴆毒紫石白石極須外内映徹光淨皎然非此亦不可服寒石五石更生散方舊說此藥方上古名賢無此漢末有何侯者行用自皇甫士安已降有進餌者無不發背解體而取顛覆余自有識性已來親見朝野仕人遭者不一所以寧食野葛不服五石明其大大猛毒不可不慎也有識者遇此方即須焚之勿久留也今但録主對以防先服者其方以從煙滅不復須存為含生害也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蔥白豉湯鍾乳對朮又對栝蔞其治主肺上通頭胷朮動鍾乳胷塞短氣鍾乳動朮頭痛目疼又鍾乳雖不對海蛤海蛤能動鍾乳鍾乳動則目疼短氣有時朮動鍾乳直頭痛胷塞然鍾乳與朮為患不過此也雖所患不同其治一也發動之始要有所由始覺體中有異與上患相應宜速服此方

蔥白 半斤
豉 二升
菜菔 一升
甘草 三兩
人參 外臺用吳

右四味�once咀先以水一斗五升煮蔥白作湯澄取八升內藥煮取三升分三服纔服便使人按摩搖動口中嚼物然後仰臥覆以煖衣汗出去衣服湯熱歇即便冷淘飯燥脯而已若服此不解復服

甘草湯方

甘草 三兩
桂心 二兩
豉 二升
蔥白 半斤

右四味合服如上法若服此已解肺家猶有客熱餘氣復服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桂心湯方

桂心 麥門冬 各三兩 人參 甘草 各二兩 豉二升 薤白半斤

右六味合服如前法 此方與肘後散發身體生瘡麥門冬湯方用重分兩小異

杜仲湯硫黃對防風又對細辛其治主脾腎通主腰脚

防風動硫黃煩熱脚疼腰痛或嗔忿無常或下利不禁

防風細辛能動硫黃而硫黃不能動彼始覺發便服此

方

杜仲 三兩 枳實 李核仁 各二兩 香豉 一升

甘草 二兩 梔子仁 十四枚

右六味合服如上法若不解復服

大麥奴湯方

大麥奴 四兩 甘草 人參 芒硝 麥門冬 各二兩 半斤

桂心 各二兩 麥門冬 半斤

右六味合服如上法若服此已解脾腎猶有餘熱氣

或冷復服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人參湯方

人參 乾薑 甘草 當歸 各一兩 附子 一枚

右五味合服如上法

生麥門冬湯白石英對附子其治主胃通主脾腎附子動白石英煩熱腹脹白石英動附子嘔逆不得食或口噤不開或言語難手脚疼痛始覺發宜服此方

生麥門冬 四兩 甘草 麻黃 各二兩 豉 二升

右四味合服如上法不解更服

大黃湯方 若煩加細辛五兩

大黃 三兩 豉 二升 梔子仁 二十枚 甘草 二兩

右凡五味合服如上法頻服得下便止不下服盡若熱勢未除視瞻高而患渴復服

栝蔞根湯方

栝蔞根 大麥奴 四兩 甘草 二兩 豉 二升

蔥白 半升

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:40
列印頁數：1495
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右五味合服如上法稍稍一兩合服之隱約得一升許便可食少糜動口若已解胃中有餘熱復服

芒硝湯方

芒硝 桂心 各二兩 通草 甘草 各三兩

白术 一兩 大棗 二十枚 李核仁 二十一枚

右七味合服如上法若腹脹去芒硝用人參二兩

人參湯紫石英對人參其治主心肝通主腰脚人參動紫石英 外臺云細辛人參動紫石英心急而痛或驚悸不得眠臥恍惚欲忘誤失性發狂昏昏欲眠或憒憒喜嗔或瘧或劇乍寒乍熱或耳聾目暗又防風雖不動紫石英紫石英猶動防風 藥源外臺云防風雖不對紫石英而能動紫石英為藥中亦有人參緣防風動人參轉相發動令人亦心痛煩熱 頭項強始覺服此方 外臺麻黄湯服

人參 白术 各三兩 甘草 外臺無 桂心 各二兩

細辛 一兩 豉 三升

右六味合服如上法若嗔盛加大黄黄芩梔子各三兩若忘誤狂發猶未除更服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生麥門冬湯方 外臺此方治嚏石發

生麥門冬 各半 斤

薤白 各一 斤

甘草 三 兩

人參 一 兩

豉 二 升

右五味合服如上法温牀煖覆牀下著火口中嚼物使身稍汗一日便解若心有餘熱更服

人參湯方

人參 防風

生薑 各一 兩

白朮 各 兩

甘草 各三 兩

桂心 二 兩

右六味合服如上法

大麥麨方赤石脂對桔梗其治主心通主胷背桔梗動石脂心痛寒噤手脚逆冷心中煩悶赤石脂動桔梗頭痛目赤身體壯熱始覺發宜温清酒飲之隨能否須酒勢行則解亦可服此方

大麥麨令汗出燥止勿令大焦舂去皮細擣絹篩以冷水和服之 千金翼云炒去皮淨淘蒸令熱曝乾麨令香乃為末

蔥白豉湯舉石無所偏對其治主胃發則令人心急口

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:40
列印頁數：1497
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

嚥骨節疼強或節節生瘡始覺發即服此方 外臺云服麥門冬湯

蔥白半斤 豉二升 甘草二兩

右三味以水六升煮取二升半分三服若散發身體生麥門冬湯方

生麥門冬五兩 甘草三兩 桂心二兩 蔥白半斤

人參一兩半 豉二升

右六味服如解鍾乳湯法

術對鍾乳術發則頭痛目疼或舉身壯熱解如鍾乳法

附子對白石英亦對赤石脂附子發則嘔逆手脚疼體

強骨節痛或項強面目滿腫發則飲酒服勢自愈若不

愈與白石英同解

人參對紫石英人參發則煩熱頭項強與紫石英同解

大黃黃芩湯桔梗對赤石脂又對茯苓又對牡蠣桔梗

發則頭痛目赤身體壯熱解與赤石脂同茯苓發則壯

熱煩悶宜服此方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大黃　黃芩　梔子仁各三兩　豉一升　薤白一升切

右五味㕮咀以水六升煮取二升半分三服

牡蠣發則四肢壯熱心腹煩悶極渴解與赤石脂同

乾薑無所偏對

栝蔞根湯海蛤對栝蔞海蛤先發則手足煩熱栝蔞先發則噤寒清涕出宜服此方

栝蔞根　甘草各二兩　梔子仁十四枚　大黃一兩

右四味合服如解鍾乳法

白石英發先腹脹後發熱

石硫黃發通身熱兼腰膝痛

礬石發遍身發熱兼口噤

牡蠣發頭痛而煩滿熱

茯苓發直頭痛

桔梗發頭面熱

海蛤發心中發熱已上蛤外宜除海浴

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:41
列印頁數：1499
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

紫石英發乍寒乍熱

赤石脂發心噤身熱頭目赤已上二味宜酒

石硫黃礬石桔梗牡蠣茯苓此五物發宜浴白石英亦可小浴其餘皆不宜浴礬石發宜用生熟湯茯苓發熱多攻頭即以冷水洗身漬之

浴法初熱先用煖水後用冷水浴時慎不可洗頭垂沐可以二三升灌之丸藥宜浴便得解即佳不瘥可餘治之

欽定四庫全書

赤石脂紫石英發宜飲酒得酒即解凡藥發或有宜冷或有宜飲酒不可一槩也

又一法云寒食散發動者云草藥氣力易盡石性沉滯獨主胃中故令數發欲服之時以絹袋盛散一匕著四合酒中塞其口一宿後飲盡之其酒用多少將御節度自如舊法此則藥石之勢俱用石不住胃中何由而發事甚驗也

梔子豉湯治食宿飯陳臭肉及羹宿菜發者方

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:42
列印頁數：1500
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

梔子 三七枚 香豉 三升 甘草 三兩

右三味㕮咀以水八升煮取三升分三服亦可加人

蔥白豉湯治因失食發及飲酒過醉發者方

參蔥白

蔥白 一斤 豉 二升 乾薑 五兩 甘草 二兩

右四味㕮咀以水七升煮取三升分三服不解宜服

理中湯方

人參 甘草 白术 各三兩 乾薑 二兩

右四味㕮咀以水六升煮取三升半分三服

人參湯治因瞋怒太過發者方

人參 枳實 甘草 各九分 白术 乾薑 各六分 栝蔞根 各六分

乾薑 栝蔞根 甘草 各九分 白术

人參 甘草 白术 各三兩 乾薑 二兩

右六味㕮咀以水九升煮取三升分三服若短氣者

稍稍數飲 千金翼云主散發氣逆心腹絞痛不得氣息命在轉燭者

情色過多發宜服黃耆湯 方本闕

將冷太過發則多壯熱以冷水洗浴然後用生熟湯五

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:42
列印頁數：1501
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

六石灌之已食少煖食飲少熱酒行步自勞
將熱太過發則多心悶時時食少冷食若夏月大熱時
散發動多起於渴飲多所致水和少麨服之不瘥復作
以瘥為度
冷熱熨法若大小便閉塞不通或淋瀝溺血陰中疼痛
此是熱氣所致用此法即愈
其法前以冷物熨小腹已次以熱物熨之又以冷物
熨之若小便數此亦是取冷所為煖將理自愈
治藥發下利者方
乾服豉即斷能多益佳
檳榔湯凡服散之後忽身體浮腫多是取冷過所致治
之方
檳榔三十枚擣碎以水八升煮取二升分再服千金翼云
子擣作末下篩叹咀其皮以湯七升煮取二升去滓内子味為再服
治凡散發瘡腫方
蔓菁子 熬 杏仁 黄連 胡粉 各一兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:43
列印頁數：1502
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

水銀 二兩
右五味別擣蔓菁子杏仁如膏以猪脂合研令水銀滅以塗上日三夜一
治散發赤腫者方
生地黃 五兩　大黃 一兩　生商陸 三兩　杏仁 四十枚
右四味切醋漬一宿猪猪膏一升煎商陸令黑去滓摩腫上日三夜一
治散發生細瘡者方
黃連　芒硝 各五兩
右二味咬咀以水八升煮黃連取四升去滓内芒硝令烊漬布取帖瘡上數數易換多少皆著之
治散發瘡痛不可忍方
冷石三兩下篩為末粉瘡上日五六度即燥須臾痛
治服散忽發痛方
乾薑五兩咬咀以水五升煮取三升去滓内蜜一合
亦定

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

和攪頓服不瘥重作

鴨通湯解散除熱方

白鴨通 五升 沸湯二斗半淋之澄清取汁二斗 豉 三升

梔子仁 二十枚 麻黃 八兩 冷石 二兩 甘草 五兩

石膏 三兩

右七味五味㕮咀以鴨通汁煮取六升去滓内豉三沸分服五合若覺體冷小便快潤其間若熱猶盛小便赤促服之不限五合宜小勞當漸進食不可令食

沸分服五合若覺體冷小便快潤其間若熱猶盛小便赤促服之不限五合宜小勞當漸進食不可令食

右七味五味㕮咀以鴨通汁煮取六升去滓内豉三

梔子仁 十四枚 豉 一升 白鴨通 五合

黃蘗 各三兩 芍藥 六兩 黃芩 四兩 竹葉 切一升

升麻 大黃 黃連 甘草

解散治盛熱實大小便赤方

少但勿便多耳

右十一味㕮咀以水三斗先煮鴨通竹葉取一斗二升去滓澄清取一斗次内藥煮取三升分三服若上氣者加杏仁五合腹滿加石膏三兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:44
列印頁數：1504
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下散法治藥發熱困方 千金翼云凡散數發熱無賴下去之又云諸丹及金石等同用之
黍米三升作糜以成煎猪脂一斤和令調宿不食旦
空腹食之令飽晚當下藥神良不盡熱發更合服之
又方肥猪肉 五斤 蔥白 各半斤 薤
右三味合煮治如食法宿不食旦服之令盡不盡明
日更服
又方治發動數數患熱困壓藥下之之方
猪腎脂一具不令中水以火炙承取汁適寒温一服
三服每日夜五六合多至五六升二日稍隨大便下
又方作肥猪肉臛一升調如常法平旦空腹頓服令盡
少時腹中雷鳴鳴定藥下隨下以器盛取用水洵得石
不盡更作如前服之

備急千金要方卷七十三

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:44
列印頁數：1505
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷七十四　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

解毒雜治方

蠱毒第四　方論

論曰蠱毒千品種種不同或下鮮血或好臥闇室不欲光明或心性反常乍嗔乍喜或四肢沉重百節酸疼如此種種狀貌說不可盡亦有得之三年乃死急者一月或百日即死其死時皆有九孔中或於脇下肉中出去所以出門常須帶雄黃麝香神丹諸大辟惡藥則百蠱貓虎狐狸老物精魅永不敢著人養生之家大須慮此俗亦有灸法初中蠱於心下捺便大炷灸一百壯并主貓鬼亦灸得愈又當足小指尖上灸三壯當有物出酒上得者有酒出飯上得者有飯出肉菜上得者有肉菜出即愈神驗皆於灸瘡上出

凡中蠱毒令人心腹絞切痛如有物嚙或吐下血皆如

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

爛肉若不即治蝕人五臟盡乃死矣欲驗之法當令病人唾水沉者是蠱不沉者非蠱也

凡人患積年時復大便黑如漆或堅或薄或微赤者皆是蠱也

凡人忽患下血以斷下方治更增劇者此是中蠱也

凡卒患血痢或赤或黑無有多少此皆是蠱毒粗醫以斷痢藥處之此大非也

世有拙醫見患蠱脹者偏身腫滿四肢如故小便不甚澀以水病治之延日服水藥經五十餘日望得瘥愈日復增加奄至隕歿如此者不一學者當細尋方意消息用之萬不失一醫方千卷不盡其理所以不可一一備述云耳

凡人中蠱有人行蠱毒以病人者若服藥知蠱主姓名當使呼喚將去若欲知蠱主姓名者以敗鼓皮燒作末以飲服方寸匕須臾自呼蠱主姓名可語令去則愈又有以蛇涎合作蠱藥著飲食中使人得瘦病此一種積

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:45
列印頁數：1507
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

年乃死療之各自有藥江南山間人有此不可不信之
太上五蠱圓治百蠱吐血傷中心腹結氣堅塞咽喉語
聲不出短氣欲死飲食不下吐逆上氣去來無常狀如
鬼祟身體浮腫心悶煩疼寒戰夢與鬼交狐狸作魅卒
得心痛上乂胷脇痛如刀刺經年累歲著牀不起悉主
之方

雄黃　椒目　巴豆　莽草
芫花　真珠外臺用　木香　鬼白　礬石
藜蘆　各四分　附子　五分　獺肝　一分　蜈蚣　二枚
斑貓　三十枚

右十三味為末蜜和更擣二千杵丸如小豆先食飲
服一丸餘密封勿泄藥氣十丸為一劑如不中病後
日增一丸以下利為度當下蠱種種狀貌不可具述
下後七日將息服一劑三十年百病盡除忌五辛
太乙追命圓治百病若中惡氣心腹脹滿不得喘息心
痛積聚臚脹疝瘕宿食不消吐逆嘔噦寒熱癘癰蠱毒

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:46
列印頁數：1508
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

婦人産後餘疾方

蜈蚣一枚　丹砂　附子　雄黄

礬石一作礬石一分　藜蘆　鬼白各一分　巴豆二分

右八味為末蜜丸如麻子一服二丸日一服傷寒一二日服一丸當汗出綿裹兩丸塞兩耳中下痢服一丸一丸塞下部蠱毒服二丸在外膏和摩病上在膈上吐腦下利有瘡一丸塗之毒自出産後餘疾服一丸耳聾綿裹塞耳

治人得藥雜蠱方

斑貓六枚　桂心　藜蘆各如指大

釜月下土如彈丸大

右四味治下篩水服一錢匕下蠱蛇蝦蟆蜣蜋毒俱出

萬病圓治蠱注四肢浮腫肌膚消索咳逆腹大如水狀死後轉易家人一名蠱脹方小品名雄黄丸一名萬病丸

雄黄　巴豆　莽草　鬼白各四兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蜈蚣 三枚

右五味為末蜜和擣三千杵丸如小豆窓封勿泄氣宿勿食平旦空腹一丸一炊久不知更加一丸當先下清水次下盡長數寸及下蛇又下鰕雞子或白如膏下後作蔥豉粥補之百種煖將息

治中蠱毒腹内堅如石面目青黄小便淋瀝病變無常處方 肘後古今録驗方俱云用鉄精烏雞肝和丸如梧子以酒服三丸日再甚者不過十日千金用後方

疑千金誤

羖羊皮 方五寸

芍藥

黄連

牡丹 各一兩

蘘荷 四兩半

梔子仁 七枚

右七味咬咀以水九升煮取三升分三服 葛氏崔氏同無芍藥牡丹梔子用苦參升麻當歸

犀角圓治蠱毒百病腹暴痛飛屍惡氣腫方

犀角屑

桂心末

羚羊角屑 各四錢匕

天雄

莽草

真珠 雄黄 各一兩

貝子 五枚燒

蜈蚣 五節

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

巴豆 五十枚 麝香 二分 射罔 如雞子黃大一枚

右十三味為末合擣蜜丸如小豆服一丸日二含烟不知少增之卒得腹滿斃屍服如大豆許二丸若惡氣腫以苦酒和塗上縫袋子盛藥繫左臂辟不祥鬼疰蠱毒可以備急

治蠱毒方

茜根 蘘荷根 各三兩

右二味咬咀以水四升煮取二升頓服 肘後方云治中蠱吐血或

又方蝟皮灰 亂髮灰 各一方寸匕 生麻子汁 桃根皮 各五升 槲樹北陰白 兩

右五味先煮槲皮桃根取濃汁一升和麻子汁髮灰等令勻患人宿少食旦服一大升須臾著盆水以雞翎擿吐水中如牛涎犢胎及諸蟲並出

又方槲樹北陰白皮一大握長五寸水三升煮取一升空

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:47
列印頁數：1511
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

腹服即吐蟲出亦治中蠱下血

又方蝟皮灰水服方寸匕亦出蟲

又方大戟　斑猫一分　五月五日桃白皮必效方云　以東引者火烘之各四分

右三味治下篩旦空腹以水一雞子許服八捻用二指相著如開頓服之若指頭相離取藥太多恐能損人肘後方云服棗核大不瘥十日更一服必效方云服半方寸匕其毒即出不出更一服李饒州云若以酒中得則以酒服以食中得以飲服之

治蛇蠱方蛇毒入菜果中食之令人得病名曰蛇蠱

大豆末以酒漬絞取汁服半升

治諸熱毒或蠱毒鼻中及口中出血醫所不治者方

取人屎尖七枚燒作火色置水中研之頓服即愈亦解百毒時氣熱病之毒服極神驗

治蠱吐下血方

欽定四庫全書

備急千金要方

檪皮廣五寸長一尺　五寸如足大指〇小品方用薔薇根

蘆荻根五寸

右二味㕮咀以水二升煮取一升頓服極下蠱

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治中蠱下血日數十行者方

巴豆 二七枚 元青 藜蘆 附子

礬石 各二分

右五味為末別治巴豆合篩和相得以綿裹藥如大豆許內下部中日三瘥

又方苦瓠一枚以水二升煮取一升稍稍服之當下蠱及吐蝦蟆蝌斗之狀一月後乃盡 范江方云苦瓠毒當隨時量用之肘後方云用苦酒二升煮

治下血狀如雞肝腹中攪痛難忍者方

茜根 升麻 犀角 各三兩 桔梗 黃蘗 黃芩 各二兩 白蘘荷 地榆 各四兩

右八味㕮咀以水九升煮取二升半分三服此蠱利血用之

又方桔梗 犀角 各等分

右二味為末酒服方寸匕日三不能自服絞口與之藥下心中當煩須臾自靜有頃下服至七日止可食

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:48
列印頁數：1513
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

猪脾臟自補養治盡下血如雞肝日夜不解欲死者皆可用

治腸蠱先下赤後下黃白沫連年不瘥者方

牛膝一兩搥散切以淳清酒一升漬一宿平旦空腹服之再服便愈

北地太守酒治萬病蠱毒風氣寒熱方

烏頭 甘草 桂心 藜蘆 各四兩 芎藭 黃芩 附子 白斂 各六兩 麥門冬 各六兩 桔梗 半夏 栝子仁 前胡

右十三味七月麴十斤秫米一斛如醞酒法吠咀藥以青布袋盛沉著酒底泥頭秋七日夏五日冬十日空腹服一合日三以知為度藥有毒故以青布盛之服勿中止二十日大有病出其狀如漆五十日病悉愈婦人年五十被病連年腹中積聚冷熱不調時時切痛遶

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

臍絞急上氣胷滿二十餘年服藥二七日所下三四升即愈又有女人病偏枯終産服二十日吐黑物大如刀帶長三尺許即愈其年生子又有女人小得癲病服十八日出血二升半愈有人被杖崩血内瘀臥七年服藥三十五日鼻中出血三升耳中出黄水五升便愈古方云熹平二年北地太守臣光上然此偏著九年服藥十三日出黑血二三升愈有人耳聾十主蠱毒有人中蠱毒者服無不愈極難瘥者不過二七日所有效莫不備出曾有一女人年四十餘偏枯羸瘦不能起長臥牀枕耳聾一無所聞兩手不收已經三年余爲合之遂得平復如舊有人中蠱毒而先患風服茵芋酒傷多吐出蠱數十枚遂愈何況此酒而不下蠱也嘉其功效有異常方故具述焉

方論

胡臭漏腋第五

論曰有天生胡臭有為人所染臭者天生臭者難治為人所染臭者臍石散勿止并服五香

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丸乃可得瘥勿言一度停藥即瘥正一停藥時暫得一瘥耳五香丸見前第六卷中凡胡臭人通忌食芸薹五辛治之終身不瘥

石灰散治胡臭方

石灰 一升 楓香 一作沉香 薰陸香 丁香 青木香 各二兩 礬石 四兩 陽起石 橘皮 各三兩

右八味治下篩以綿作篆子粗如指長四寸展取藥使著篆上以絹袋盛著腋下先以布揩令痛然後挾之

又方三年苦酢和石灰傅之

治胡臭方

辛夷 芎藭 細辛 杜蘅 藁本 各二兩

右五味咬咀以淳苦酒漬一宿煎取汁傅之欲傅取臨臥時以瘥為度

又方青木香 附子 白灰 各二兩 礬石 半兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右四味為散著粉中常粉之肘後無礬石

又方赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布裹熨腋下冷復易

又方槲葉切三升以水五升煮取一升用洗腋下即以白苦瓠燒令煙出熏之數數作用

又方辛夷　細辛　青木香　芎藭　各四分

右四味治下篩熏竟粉之

又方馬齒菜一束擣碎以蜜和作團以絹袋盛之以泥紙裹厚半寸曝乾以火燒熟破取更以少許蜜和使熱勿令冷先以生布揩之夾藥腋下藥痛久忍之不能然後以手中勒兩臂

又方牛脂　胡粉　各等分

右二味煎令可丸塗腋下一宿即愈不過三劑肘後方云合椒以塗

六物散治漏腋腋下及足心手掌陰下股裏常如汗濕

又方伏龍肝作泥傅之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

臭者方

乾枸杞根　乾薔薇根 肘後作 商陸根　胡粉　滑石 各一兩　甘草 各半兩

右件藥治下篩以苦酒少少和塗當微汗出易衣復更塗上不過三著便愈或一歲復發發復塗之

又方水銀　胡粉 外臺作粉霜　石灰 三升　銀屑 一升一作銅屑

右二味以面脂研和塗之良驗

又方正旦以尿洗腋下神妙

又方黃礬石燒令汁盡治為末絹袋盛粉之即瘥

脫肛第六 方灸法

肛門主肺肺熱應肛門熱則閉塞大行不通腫縮生瘡

兌通方

白蜜三升煎令燥冷水中調可得為丸長六七寸內

肛門中到身向上頭向下少時取烊斯須即通洞泄

猪肝散肛門主大腸寒應肛門寒則洞瀉肛門滯出

猪肝 一斤 炙令燥 黄連 阿膠 芎藭 各二兩

艾葉 一兩 烏梅肉 五兩

右六味治下篩温清酒一升服方寸匕半日再若不能酒與清白米飲亦得

壁土散治肛門滯出方

故屋東壁土 一升 碎 皁莢 三挺各長一尺二寸

右二味先擣土為散挹粉肛頭出處次取皁莢炙煖更遞熨取入則止

又方炙故麻履底按令入頻按令入永瘥

癭瘤第七 證炙法 方

原本遺失此一條多有脫誤須覓善本訂之

治五癭方

海藻 龍膽 昆布 礬石 一作礬石 松蘿 各三分 海蛤 通草 麥麴 四分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏 二分

右九味治下篩酒服方寸匕日三禁食魚猪肉五辛

又方小麥麵 一斗 海藻 一斤 特生礬石 十兩

生菜諸難消之物十日知二十日愈

右三味以三年米醋漬小麥麵曝乾各擣為散合和

服一方寸匕日四五服藥含極乃咽之禁薑五辛猪

魚生菜大吹大讀誦大叫語等

欽定四庫全書

又方昆布 松蘿 海藻 各三兩 桂心

右九味治下篩酒服方寸匕日再不得作重用力

又方昆布二兩洗切如指大醋漬含咽汁盡愈

海蛤 通草 各三兩 白斂 二兩

右七味治下篩酒服方寸匕日三

又方海藻 海蛤 各三兩 昆布 半夏

土瓜根 松蘿 各一兩 通草 白斂

龍膽 各二兩

又方海藻 一斤小品三兩 小麥麴 一升

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:51
列印頁數：1520
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右二味以三年醋一升浸麵末曝乾徃返醋盡合擣爲散酒服方寸匕日三服忌努力（崔氏云療三十年癭瘤）

五癭圓方

葛蒲二兩　海蛤　白斂　續斷　海藻　松蘿　桂心　蜀椒　到掛草　半夏各一兩　神麴三兩　羊靡百枚

右十二味治下篩以牛羊髓脂爲丸如梧子大日服三丸

欽定四庫全書

備急千金要方

又方取鹿靡以佳酒浸令没灸乾内酒中更灸令香含咽汁味盡更易盡十具愈

灸法

癭上氣灸天府五十壯（千金翼云又灸鬲堂百壯）

癭上氣短氣灸肺輸百壯

癭上氣胷滿灸雲門五十壯

癭勞氣灸衝陽隨年壯

癭氣面腫灸通天五十壯

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

癭灸天曜三百壯橫三間寸灸之

又灸中封隨年壯在兩足趺上曲尺宛宛中

諸癭灸肩髃左右相當宛宛處男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯或再三取瘥止

又灸風池百壯俠項兩邊

又灸兩耳後髮際一百壯

又灸頭衝一作頭頭衝在伸兩手直向前令臂著頭對鼻所注處灸之各隨年壯千金翼云一名臂腨

凡肉瘤勿治治則殺人慎之肘後方云不得針灸

陷腫散治二三十年癭瘤及骨瘤脂瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤或息肉大如杯杅升斗十年不瘥致有漏潰令人骨消肉盡或堅或輭或潰令人驚悸寤寐不安身體瘦縮愈而復發方

烏賊骨 各一分 石硫黃 各一分 白石英 紫石英

鍾乳 各二分 丹參 三分 琥珀 附子

胡薰屎 大黃 乾薑 各四分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十一味治下篩以韋囊盛勿泄氣若瘡濕即傅若瘡乾猪脂和傅日三四以乾為度若汁不盡者至五劑十劑止藥令人不痛若不消加芒硝二兩佳

治癭瘤方

昆布　桂心　逆流水柳鬚　各一兩

海藻　乾薑　各二兩　羊靨　七枚陰乾

又方礬石　芎藭　各二　當歸　大黄

右六味爲末蜜丸如小彈子大含一丸咽津

黄連　黄芩　吳茱萸　一分　白斂　芍藥　各二分

右九味治下篩雞子黄和塗故細布上隨瘤大小厚薄帖之乾則易著藥熟當作膿脂細細從孔中出頭探膿血盡著生肉膏若膿不盡復起如故

生肉膏治癰瘤潰漏及金瘡百瘡方

芎藭　各一兩　當歸　附子　甘草　白芷　薤白　二兩　生地黄　三兩

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:53
列印頁數：1523
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右七味咬咀以猪脂三升半煎白芷黃去滓稍以傅之日三

又方以狗屎雞子傅之去膿水如前方說傅生肉膏

取瘥 方見前二十二卷

陰癩第八 論灸法

論曰癩有四腫有腸癩卵脹氣癩水癩腸癩卵脹難瘥氣癩水癩針灸易治

治癩圓方

桃仁 蜘咪各五十枚 桂心 蒺藜子 地膚子 澤瀉 防風 五味子 橘皮 茯苓 防葵 芍藥各二兩 牡丹皮 細辛 海藻各一兩 狐陰一具

右十六味為末蜜和丸如梧子服十丸稍加至三十丸方角處一丸令頓上兩爪角各令半丸上爪指佳七壯愈

陰癩灸足大趾下理中十壯隨腫邊灸之 肘後方云灸足大趾第二

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:53
列印頁數：1524
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

節下橫文正中央五壯
姚氏云足大趾本三壯

男兒癩先將兒至碓頭祝之曰坐汝令兒某甲陰囊癩故灸汝三七二十一枚灸訖便牽小兒令雀頭下向著木上隨年壯

囊縫當陰頭灸縫上七壯即消已驗艾炷猶簪頭許

大凡男癩當騎碓軸以莖伸置軸上齊陰莖頭前灸軸

論曰有人自少至長陰下常有乾癬者宜依癬方主之有五勞七傷而得陰下癢濕搔之黃汁出者宜用補丸

散主之仍須傳藥治之亦有患妬精瘡者以妬精方治之夫妬精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門內並似甘瘡作白齊食之大痛甘即不痛也

蒺藜子湯凡虛熱石熱當路門冷濕傷肌熱聚在裏變成熱及水病腫滿腹大氣急大小便不利腫如皮紙盛水晃晃如老蠶色陰莖堅腫為瘡水出此皆腎熱虛損强取風陰濕傷脾胃故也治之法內宜依方服諸利小便藥外以此湯洗四肢竟以蔥白膏傅之別以猪蹄湯

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

洗蓼上蒺藜子湯方

蒺藜子　蔥心青皮　赤小豆　各一升　蘋藶　五升

菘菜子　三升　巴豆　一枚合皮殼

右六味咬咀以水二升煮取八升以淋洗腫處

猪蹄湯治服石發熱因勞損熱盛當風露卧蓼腫方

猪蹄　一隻　蒺藜子　一升碎　葶藶子　五合　蘋藶　三升

黄蘗　五兩　地榆　闕

右六味咬咀以水一斗五升煮取六升去滓適令煖便洗瘡日再或只煮黄蘗汁洗亦佳

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:54
列印頁數：1526
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書 子部

備急千金要方卷七十五至

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄監生臣李維瀛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷七十五　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

備急方

卒死第一　方灸法

治卒死無脉無他形候陰陽俱竭故也治之方

牽牛臨鼻上二百息牛舐必瘥牛不肯舐著鹽汁塗面上牛即肯舐

又方牛馬屎絞取汁飲之無新者水和乾者亦得（肘後方云乾者以人溺解之此扁鵲法）

又方炙熨斗熨兩脇下（急方云又治屍厥）

針灸法

針間使各百餘息又灸鼻下人中一名鬼客廳（肘後方云又治屍厥）

治魘死不自覺者方

愼燈火勿令人手動牽牛臨其上即覺若卒不能語

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:55
列印頁數：1528
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取東門上雞頭爲末以酒服之

治卒魘死方

擣韭汁灌鼻孔中劇者灌兩耳 張仲景云灌口中

治鬼魘不悟方

伏龍肝爲末吹鼻中

又方皁莢爲末如大豆許吹鼻中噦則氣通起死回生

集驗方云治中惡

辟魘方

雄黃如棗大繫左腋下令人終身不魘 張文仲云男左女右

又方灸兩足大趾叢毛中各二七壯 肘後方云華陀法又救卒死中惡

治中惡方

蔥心黃刺鼻孔中血出愈 肘後方云入十八寸無苦使目中血出佳崔氏云男左女右

又方大豆二七粒爲末雞子黃并酒相和頓服

又方使人尿其面上可愈 肘後方云此扁鵲法

又方灸胃管五十壯愈 肘後方云入十八寸無苦使目中血出佳崔氏云男左女右

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治中惡并蟲毒方

冷水和伏龍肝如雞子大服之必吐

又方温二升猪肪頓服之

又方車軸脂如雞子大酒服

治卒忤方 此病即今人所謂中惡者與卒死鬼擊亦相類為治皆參取而用之

鹽八合以水三升煮取一升半分二服得吐即愈 備急方云治卒死鬼擊

若小便不通筆頭七枚燒作灰末水和服之 方云治

即通

又方犢子屎半盞酒三升煮服之亦治霍亂 肘後方云治卒死鬼擊大牛亦可用

又方書墨爲末水服一錢匕

又方臘月野狐腸燒末以水服方寸匕死鼠灰亦佳

灸法 治卒忤死

灸手十指爪下各三壯餘治同上方 備急方云治卒死而張目反折者

又灸人中三壯又灸肩井百壯又灸間使七壯又灸巨闕百壯

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

還魂湯治卒感忤鬼擊飛屍諸奄忽氣絶無復覺或已死咬口口噤不開去齒下湯湯入口不下者分病人髮左右足踏肩引之藥下復增取盡一升須臾立蘇方

麻黄 三兩 桂心 二兩 甘草 一兩 杏仁 七十粒 附後方云張仲景方 云桂不用

右四味㕮咀以水八升煮取三升分三服

治卒死鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絶方

雄黄粉酒服一刀圭日三血化為水

治鬼擊病方 鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀胷脇腹内絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻口血出或下血一名鬼排

雞屎白 如棗大 青花麻 一把

右二味以酒七升煮取三升熱服須臾發汗若不汗熨斗盛火灸兩脇下使熱汗出愈

又方艾如雞子大三枚以水五升煮取二升頓服

又方吹酢少許鼻中

灸法

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:56
列印頁數：1531
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

灸人中一壯立愈不瘥更灸

又灸臍上一寸七壯及兩踵白肉際取瘥又灸臍下一寸三壯

治五絶方 夫五絶者一曰自縊二曰牆壁壓迮三曰溺水四曰魘寐五曰產乳絶

取半夏一兩細下篩吹一大豆許內鼻中即活心下温者一日亦可治

治自縊死方

凡救自縊死者極須按定其心勿截繩手抱起徐徐解之心下尚温者以氈氀覆口鼻兩人吹其兩耳

又方强臥以物塞兩耳竹筒內口中使兩人痛吹之塞口傍無令氣得出半日死人即噫噫即勿吹也

又方擣皁莢細辛屑如胡豆大吹兩鼻中

又方刺雞冠血出滴著口中即活男雌女雄

又方雞屎白如棗大酒半盞和灌口及鼻中佳

又方皁莢爲末以蔥葉吹入兩鼻中逆出更吹

又方梁上塵如大豆許各內一小竹筒中四人各捉一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

筒同時吹兩耳兩鼻即活

又方尿鼻口眼耳中并捉頭髮一撮如筆管大掣之立活

又方雞血塗喉下

又方藍青汁灌之

又方灸四肢大節陷大指本文名曰地袖各七壯

又方令暍人仰臥以熱土壅心上少冷即易氣通止

取道上熱塵土以壅心上少冷即易氣通止

治熱暍方

又方可飲熱湯亦可內少乾薑橘皮飲之稍稍咽勿頓使飽但以熱土及壅臍上佳

又方濃煮蓼取汁三升飲之即愈不瘥更灌

又方張死人口令通以煖湯徐徐灌口中小舉死人頭令湯入腹須臾即蘇

又方使人噓其心令煖易人爲之

又方抱狗子若雞心上熨之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方屋上南畔瓦熱熨心冷易之
又方灌地漿一盞即愈
又方地黃汁一盞服之
又方水半升和麵一大抄服之
治落水死方
以竈中灰布地令厚五寸以甑側著灰上令死者伏於甑上使頭小垂下炒鹽二方寸匕內竹管中吹下孔中即當吐水水下因去甑下死者著灰中壅身使出鼻口即活
又方掘地作坑熟數斛灰內坑中下死人覆灰濕徹即易勿令大熱溥人灰冷更易半日即活
又方取大甑傾之死人伏其上令死人口臨甑口然葦火二七把燒甑中當死人心下令煙出小入死人鼻口中鼻口中水出盡則活火盡復益之常以手候死人身及甑勿令甚熱當令火氣能使死人心下足得煖卒無甑者於岸側削地如甑空下如竈燒令煖以死人著上

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:58
列印頁數：1534
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

亦可用車轂爲之勿令隱其腹令死人低頭水得出并炒灰數斛令煖以粉身濕更易温者

又方但埋死人煖灰中頭足俱没惟開七孔

又方倒懸死人以好酒灌鼻中又灌下部又酢灌鼻亦得

又方綿裹皁莢内下部中須臾出

又方裹石灰内下部中水出盡則活

又方倒懸解去衣去臍中垢極吹兩耳起乃止

又方熬沙覆死人面上下有沙但出鼻口耳沙冷濕即易

又方竈中灰二石埋死人從頭至足出七孔即活

又方屈兩脚著生人兩肩上死人背向生人背即負持走行吐出水便活

又方解死人衣炙臍中凡落水經一宿猶可活

治冬月落水凍四肢直口噤尚有微氣者方

以大器中熬灰使煖盛以囊薄其心上冷即易心煖

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:59
列印頁數：1535
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

氣通目得轉口乃開可温尿粥稍稍吞之即活若不
先温其心便持火炙身冷氣與火争即死
治凍爛瘡方
猪後懸蹄以夜半時燒研細篩以猪脂和傅亦治小兒
治入水手足腫痛方
濤生胡麻薄之
治酒醉中酒恐爛五臟方
以湯著槽中漬之冷復易夏亦用湯
又方凡醉不得安臥不動必須使人摇轉不住特忌當
又方擣茆根汁飲三升
風席地及水洗飲水交接
治飲酒頭痛方
竹茹五兩以水八升煮取五升去滓令冷内破雞子
五枚攪匀更煮二沸飲二升使盡瘥
治飲酒腹滿不消方
煮鹽湯以竹筒灌大孔中

列印日期/時間：02/04/2005 18:49:59
列印頁數：1536
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治飲酒中毒方

煮大豆三沸飲汁三升

又方酒漬乾椹汁服之

治酒病方

蔥白 豉 各一升

右二味以水四升煮取二升頓服

治飲酒房勞虛受熱積日不食四月中熱飲酒不已酒入百脉心氣虛令人錯謬失常方

芍藥 人參 白薇 栝蔞根 枳實 知母 各二兩 甘草一兩 生地黃八兩 酸棗仁 升半 茯神 三兩外臺作茯苓

右十味咬咀以水一斗煮取三升分三服

治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡方

大麻仁 升一 黃芩 二兩肘後用黃蘗

右二味爲末蜜和丸含之 千金翼用黃蘗二兩

治酒醉不醒方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

飲葛根汁一斗二升取醒止肘後方云治大醉連日煩毒不堪

飲酒令人不醉方

栢子仁　麻子仁　各二兩

右二味治下篩爲一服進酒三倍

又方葛花　小豆花　各等分

右二味合爲末服三方寸匕飲時仍進葛根汁芹汁及枇杷葉飲並能倍酒

又方九月九日菊花爲末臨飲服方寸匕

又方五月五日取井中倒生草枝陰乾爲末酒服之

又方小豆花葉陰乾百日爲末服之

飲酒令無酒氣方

乾蔓菁根二七枚三遍蒸爲末取兩錢許酒後水服

治惡酒健嗔方

空井中倒生草燒灰飲之勿令知

又方取其人牀上塵和酒飲之

斷酒方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

柳花　臘月鼠頭灰
右二味等分爲末黃昏時酒服一杯
又方酒七升著瓶中熟朱砂半兩著酒中急塞瓶口安著猪圈中任猪搖動經七日取酒盡飲
又方正月一日酒五升淋碓頭擣一下取飲之
言與病狂人飲也勿令知之後不喜飲酒也
又方故氈中枭耳子七枚燒作灰黃昏時煖一杯酒呪之永不飲酒
又方白猪乳汁一升飲之永不飲酒
又方刮馬汗和酒與飲終身不飲
又方虎屎中骨燒末和酒與飲
又方鸕鷀屎燒灰水服方寸匕永斷
又方取毛鷹一過吐毛水煮去毛頓服
又方故紡車絃燒灰和酒與服
又方驢駒衣燒灰酒飲方寸匕
又方自死蠐螬乾擣末和酒與飲永世聞酒名即嘔神驗

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方酒客吐中肉七枚陰乾燒末服之
又方酒漬汗靴替一宿平旦空腹與飲即吐不喜見酒
又方白狗乳汁酒服之
又方臘月馬腦和酒服之

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:01
列印頁數：1540
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷七十六 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

備急方

蛇蟲等毒第二 論方 灸法

治因熱逐涼睡熟有蛇入口中挽不出方

以刀破蛇尾內生椒三兩枚裹著須臾即出 肘後方云艾灸

蛇尾即出若無火以刀周帀割蛇尾截令皮斷乃將皮倒脫即出

治蛇入人口并七孔中者方

割母猪尾頭滴血著口中即出

又方以患人手中指等截三歲大猪尾以器盛血傍蛇

瀉血口中拔出之

治卒爲蛇繞不解方

以熱湯淋之無湯令人尿之

治蛇蠍螫方

服小蒜汁滓薄上 肘後方云治蝮蛇螫

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:01
列印頁數：1541
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方熟擣葵取汁服之

治蛇嚙方

人尿厚塗帛裹即消

治蛇毒方

消蠟注瘡上不瘥更消注之

又方以母猪耳中垢傅之 肘後方云牛耳中垢亦可用

治蝮蛇毒方

令婦人騎度三過又令坐上

又方以射罔塗腫上血出即愈

又方生麻楮葉合擣以水絞去滓漬之

又方末薑薄之乾復易

又方令婦人尿瘡上

治諸蛇毒方

雄黄 乾薑 各等分

右二味爲末和射罔著竹筒中帶行有急用之

又方雞屎二七枚燒作灰投酒中服之

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:02
列印頁數：1542
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方以麵圍上令童男尿著中燒鐵令赤投中冷復燒著二三度瘥

又方雄黃爲末傅上日一易

又方鹽四兩水一斗煮十沸沸定以湯浸冷易之

又方搗紫菀取汁飲一升以滓封瘡上以少水灌之

又方梳中垢如指大長一寸尿和傅之

又方取合口椒胡荽苗等分擣傅之無不瘥

又方男子陰間毛二七枚含之有汁即咽却祕方也

又方口嚼大豆葉塗之良

又方猪脂和鹿角灰塗之

又灸梳汗出熨之

入山草辟衆蛇方

乾薑　麝香　雄黃　各等分

右三味擣爲粗散以小絳袋盛帶之男左女右蛇毒

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:02
列印頁數：1543
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

塗瘡 集驗方云如無麝香以射罔和代之救急方云以蜜和為膏傳瘡處良

又方常燒羖羊角使煙出蛇則去矣

治蛇螫人瘡已愈餘毒在肉中淫淫痛癢方

大蒜 小蒜 各一升

右二味合擣以熱湯淋以汁灌瘡大良

治蛇骨刺人毒痛方

鐵精如大豆許內管中吹內瘡中良

又方燒死鼠爲末傅之

治衆蛇螫方

灸上三七壯無艾以火頭稱瘡孔大小藝之

治虎咬瘡方

濃煮葛根汁洗十數遍及擣爲散以葛根汁服方寸匕日五甚者夜二

又方青布急卷爲繩止一物燒一頭燃內竹筒中注瘡口熏之妙

又方煮鐵令濃洗瘡

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:03
列印頁數：1544
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方嚼栗子塗之良

辟虎法

凡入山燒水牛羖羊角虎狼蛇皆走

論曰凡見一切毒螫之物必不得起惡心向之亦不得殺之若輒殺之於後必遭螫毒治亦難瘥愼之愼之

治蠍毒方

凡蠍有雌雄雄者痛止在一處雌者痛牽諸處若是雄者用井底泥塗之温則易雌者用當瓦屋溝下泥砂和水塗上立愈

治蠍螫方

傅之若值無雨可用新汲水從屋上淋下取泥又方取齒中殘飯傅之又猪脂封之又射罔封之又碉水浸故布揄之小煖則易水微煖則易之著餘處者冷若著手足以冷水漬之又方生烏頭爲末唾和傅之

治蜂螫毒方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取瓦子摩其上唾二七遍置瓦子故處

治蜂螫方

猪脂　蜜　各五合　蠟二兩

右三味和煎如膏候冷以塗之

又方燒蜂房爲末膏和塗之　附後方云先煮蜂房洗之又燒塗之

又方燒牛屎灰苦酒和塗之

又方酥脂塗之立愈

又方齒垢塗之

又方淳酢沃地取泥塗之

又方嚼鹽塗之

又以人尿新者洗之

又方尿泥塗之

又方反手捻地上土傅之

論曰凡蠷螋蟲尿人影著處便令人病瘡其狀身中忽有處瘡痛如芒刺亦如刺蟲所螫後起細瘡瘺作聚如菜萸子狀四邊赤中央有白膿如黍粟亦令人皮肉急

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:04
列印頁數：1546
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

舉身惡寒壯熱劇者連起竟腰脇胸治之法初得之摩
犀角塗上止其毒治如火丹法余以武德中六月得此
疾經五六日覺心悶不佳以他法治不愈又有人教畫
地作蠷螋形以刀子細細畫盡取蠷螋腹中土就中以
唾和成泥塗之再塗即愈方知天下萬物相感莫曉其
由矣

治蠷螋尿方

羖羊髭燒灰臘月猪脂和封之

又方擣豉封之

又方酢和胡粉塗之

治蠷螋尿瘡方

燒鹿角爲末以苦酒和傅瘡上已有汁者燒道傍敝
蒲席傅之

又方槐白皮半斤切以苦酒二升漬半日刮去瘡處以
洗日五六遍仍以赤小豆爲末以苦酒和傅之燥復易
小兒以水和

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方嚼大麥以停之三日

又方燕窠中土以猪脂和傅

又方熟嚼梨葉以水和塗燥復易之

又方爛擣馬鞭草以傅上燥則易之

又取吳茱萸東行根下土酢和塗之

治三種射工蟲毒方

論曰江南有射工毒蟲一名短狐一名蜮其蟲形如甲蟲狀如大飛生外臺云正黑有一長角在口前如弩檐臨其角端曲

如上弩以氣爲矢因水勢以射人人或聞其在水中鉥鉥作聲要須得水没其口便射人此蟲畏鵝鵝能食之

其初始證先惡寒噤瘳寒熱筋急仍似傷寒亦如中

屍便不能語朝旦小蘇晡夕輒劇寒熱悶亂是其證始

得三四日當即治之稍遲者七日皆死初未有瘡

但惡寒噤瘳及成瘡似蠼螋尿亦似瘭疽瘡射工中瘡

有三種其一種瘡正黑如黛子皮周邊悉赤或衣犯之

如有芒刺痛其一種作瘡久久穿或晡間寒熱其一種

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

如火灼燻起似此者最急數日殺人 備急方云有四種其一種突起如癰
治射工中人寒熱或發瘡偏在一處有異於常者方
取鬼白葉一把清苦酒中熟擣絞取汁服一升日三
又方取生吳菜萸莖葉一握斷去前後取握中熟擣以
水二升煮取七合頓服
又方取葫切帖瘡炙七壯
又方取蜈蚣大者一枚火炙治爲末苦酒和以傅瘡上
又方取赤莧菜熟擣絞取汁每服一升日四五服
又方白雞屎取白頭者三枚湯和塗中毒處
又方升麻 三兩 犀角 烏扇根 各二兩
右三味㕮咀以水四升煮取一升半去滓分再服相
去如一炊頃盡更作
治射工中人已有瘡者方
取芥子爛擣苦酒和厚塗瘡上半日痛便止
又方取狼牙葉冬取根擣令熟薄所中處又飲四五合汁
治射工中人三種瘡方

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:05
列印頁數：1549
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

升麻 二兩
烏扇根 三兩
右二味㕮咀以水三升煮取一升適寒温盡服滓薄
上
五香散治江南毒氣惡核射工中人暴腫生瘡方
甲香 犀角 薰陸香 烏翣 黄連 青木香
甘草 牡蠣 各四分 甘遂 各三分 吳茱萸 黄蘗 各六分
右十六味治下篩中射工毒及諸毒皆水服方寸匕
日三升以水和少許洗之仍以雞子白和塗腫上乾
則易
野葛膏治射工惡核卒中惡毒方
野葛 一升 巴豆 烏頭 蜀椒 各五合
茵芋 躑躅 附子 丹砂 各一兩
雄黄 大黄 各七兩
右十味治下篩以不中水猪膏三斤煎三上三下去

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:05
列印頁數：1550
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

滓内丹砂雄黄末攪至凝以棗核大摩痛上勿近眼

凡合名膏皆無令産婦女人小兒雞犬六畜見之惟

宜清淨

治沙虱毒方

斑猫二枚一枚熬爲末服一大枚燒令煙絶爲末著

瘡中

又方大蒜十枚止一物合皮安熱灰中炮令熱去皮刀

斷蒜頭取熱拄所著毒處

又方麝香　大蒜

右二味合擣以羊脂和著小筒中帶欲用取傅瘡上

又方雄黄　朱砂　恒山　各等分

右三味取五月五日日中時令童子合之取傅瘡上

治石蛭方　山水中陰濕草木上石蛭著人則穿齧人肌膚行人肉中浸淫墳起如蟲行道之狀

凡行山路草木中常以臘月猪膏和鹽塗脚脛及足

趾間趺上及著鞋靸幏蛭不得著人也已著者炙斷其

道即愈

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治水毒方

論曰凡山水有毒蟲人涉水中人似射工而無物其診法初得之惡寒微似頭痛目匡疼心中煩懊四肢振煞腰背百節皆强兩膝痛或翕翕而熱但欲睡旦醒暮劇手足逆冷至肘膝二三日腹中生蟲食人下部肚中有蟲上食人五臟熱盛毒煩下利不禁八九日雖良醫不能治矣覺得之急早視其下部若有瘡正赤如截肉者不過二十日也欲知是中水與非者當作五六升湯以陽毒最急若瘡如鯉魚齒者爲陰毒猶小緩要皆殺人小蒜五升㕮咀投湯中消息勿令大熱去滓以浴之是水毒身體當發赤斑無異者非也當以他病治之

治人忽中水毒手足指冷或至肘膝者方

吳茱萸一升　生薑切一升半　犀角　升麻　橘皮各二兩　烏梅十四枚

右六味㕮咀以水七升煮取二升分二服

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:07
列印頁數：1552
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方浮萍草曝乾爲末酒服方寸匕

又方取梅若桃葉檮絞取汁三升許或乾以少水絞取汁飲之小兒不能飲以汁停乳頭飲之

又方擣蒼耳汁服一升又以綿裹杖沾汁導下部日三

癃

外臺肘後作梨葉

又方濤藍一把以水解以塗浴面目身體令遍

又方濤蓼一把以酒和絞取汁一升飲之不過三服瘥

又方擣蛇莓根爲末水飲之并導下部生者用汁凡夏月行常多齎此藥屑入水以方寸匕投水上流無所畏

又辟射工凡洗浴以少許投水盆中即無毒

治猫鬼野道病歌哭不自由方

五月五日自死赤蛇燒作灰以井花水服方寸匕日一

一針灸方見別卷中

又方臘月死猫兒頭燒灰水服一錢匕日二

治猫鬼眼見猫狸及耳雜有所聞方

相思子　蕳麻子　巴豆各一枚　朱砂末蠟各四銖

右五味合擣爲丸先取麻子許大含之即以灰圍患人前頭著一斗灰火吐藥火中沸即畫火上作十字其猫鬼並皆死矣

治蜘蛛咬毒方

人尿傳又油淀傳又炮薑貼之又猢孫屎傳之

又方烏麻油和胡粉如泥塗乾則易之

治馬囓人及蹯人作瘡毒腫熱痛方

馬鞭梢二寸長　鼠屎二七枚

右二味合燒爲末以猪膏和塗之立愈外臺方云治久不愈者肘後方云用馬鞭皮燒末猪膏和塗遂成瘡爛經

治馬囓人陰卵脫出方

推内入以桑皮細作線縫之破烏雞取肝細剉以封之且忍勿小便即愈

治犬馬囓及馬骨刺傷人及馬血入舊瘡中方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取灰汁熱漬瘡常令汁器有火數易汁勿令爛人肉三數日漬之有腫者炙石熨之日二消止

治馬血入瘡中方

服人糞如雞子大復以糞傅瘡上

又方取婦人月水停之神良

治剥死馬馬骨傷人毒攻欲死方

又方取婦人月水停之大良 外臺方云取其屎燒灰服方寸匕

便取馬腸中屎塗之大良

治馬汗馬毛入人瘡中腫痛欲死方

以水漬瘡數易水便愈愈又以石灰傅之

又方飲醇酒取醉即愈

又方燒雞毛作末以酒服方寸匕

又方以沸湯令所浸洗之取瘥

論曰凡春末夏初犬多發狂必誡小弱持杖以預防之防而不免者莫出於灸百日之中一日不闕者方得免難若初見瘡瘥痛定即言平復者此最可畏大禍即至死在旦夕凡狂犬咬人著訖即令人狂精神已別何以

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

得知但看灸時一度火下即覺心中醒然惺惺了了方知咬已即狂是以深須知此此病至重世皆輕之不以爲意坐是死者常年有之吾初學醫未以爲業有人遭此將以見問吾了不知報答以是經吾手而死者不一自此銳意學之一解已来治者皆愈方知世無良醫枉死者半此言非虚故將来學者非止此法餘一方皆須沈思留心作意慇懃學之乃得通曉莫以初解一兩種法即謂知訖極自誤也聊因方末申此一二言不盡意耳

又曰凡猘犬咬人七日輒應一發三七日不發則脫也要過百日乃得免耳每到七日輒當禱韭汁飲一二升又當終身禁食犬肉蠶蛹食此則發死不可救矣瘡未愈之間禁食生魚及諸肥膩冷食但於飯下蒸魚及於肥器中食便發不宜飲酒能過一年乃佳 集驗方云若重發者生食

蟾蜍鱠絶良亦可燒灸食之必令其人知初得韜毒便爲之則於後不發也

治猘犬毒方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

頭髮　猬皮　各等分

右二味燒灰水和飲一杯口噤者折齒内藥

又方擣地榆絞取汁塗瘡無生者可取乾者以水煮汁飲之亦可爲末服方寸匕日三兼傅上過百日止

又方擣韭絞取汁飲一升日三瘡愈止亦治愈後復發者

又方刮虎牙若骨服方寸匕　小品方云刮狼牙或虎骨末服已發狂如猘犬者服即愈

犬子

又方燒虎骨傅瘡及熨又微熬杏仁擣研取汁服之良

又取燈盞殘油灌瘡口此皆禁酒猪肉魚生菜

又方用韭根故梳二枚以水二升煮取一升頓服

又方桃東南枝白皮一握水二升煮取一升分二服　吐出

又方取猘犬腦傅上後不復發

又方蝦蟇灰粥飲服之

又方服葭萌子七枚日一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方梅子末酒服之

又方以豆醬清塗之日三四

治狂犬嚙人方

蛇脯一枚炙去頭擣末服五分七日三

又方擣葭菪根和鹽停日三

又方青布浸汁服三升

又方飲驢尿一二升

治凡犬嚙人方

熬杏仁五合令黑碎研成膏傅之

又方取竈中熱灰以粉瘡中帛裹繫之

又方燒自死蛇一枚令焦爲末內瘡孔中

又方鼠屎爲末以臘月猪膏和傅之 外臺方云用鼠一枚猪膏煎傅之

又方飲生薑汁一升 小品方云治狂犬咬 外臺方云亦治已瘥後復發者

韭汁亦佳

又方水洗瘡任血出勿止之水洗不住取血自止以綿裹之瘥

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:10
列印頁數：1558
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方以沸湯和灰熨瘡上
又方燒犬尾爲末傅瘡日三
又方以頭垢少少内瘡中
又方火炙蠟以灌瘡中
又方以熱牛屎塗之佳
又方以苦酒和灰塗瘡中
治小兒狗嚙方
月一日以水一升灌之勿令狗主打狗若月盡日三
升水灌之
灸法
凡猘犬所嚙未盡其惡血毒者灸上一百壯已後當日
灸一壯若不血出刺出其血百日灸乃止禁飲酒及猪
犬肉
治猪嚙方
松脂鍊作餅上貼之
又方屋霤中泥塗

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:10
列印頁數：1559
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷七十七 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

備急方

諸般傷損第三 方論

論曰凡被打損血悶搶心氣絶不能言可擘開口尿中安著以手袖掩其口鼻眼上一食頃活眼開與熱小便令下咽即醒又墮車落馬及車碾木打已死者以死人二升

治被打擊頭眼青腫方

炙肥猪肉令熱擪上（肘後方云治血聚皮膚間不消散者）

又方牆上朽骨唾於石上研磨塗之乾即易

又方炙猪肝貼之

又方新殺羊肉乘熱封之

又方大豆黄爲末水和塗之

治被打傷破腹中有瘀血方

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蒲黃一升　當歸　桂心各二兩

右三味治下篩以酒服方寸匕日三夜一

又方劉寄奴　延胡索　碎骨補各一兩

右三味咬咀以水二升煎取七合復内酒及小便各一合熱温頓服

又方蠐螬　蛀蟲　水蛭各三十枚　桃仁五十枚　桂心二兩　大黃五兩

右六味咬咀以酒水各五升煮取三升分五服

又方生地黃汁三升酒一升半煮取二升七合分三服

肘後方從高墮下瘀血脹心面青短氣欲死者

又方萇茗子爲末傳瘡上

白馬蹄散治被打腹中瘀血并治婦人瘀血化血爲水

方

白馬蹄燒令煙盡擣篩酒服方寸匕日三夜一

治被歐擊損傷聚血腹滿煩悶方

豉一升以水三升煮三沸分再服不瘥重作更取麻

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:11
列印頁數：1562
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

子煮如豉法不瘥更煮豉上法

治有瘀血者其人喜忘不欲聞人聲胷中氣塞短氣方

甘草一兩 茯苓二兩 杏仁五十枚

右三味㕮咀以水二升煮取九合分二服

治從高墮下傷拆疾痛煩燥啼叫不得臥方

取鼠尿燒末以猪膏和塗痛上即急裹之肘後方云裹骨破碎

治從高墮下及爲木石所迮或因落馬凡傷損血瘀凝

積氣絶欲死無不治之方

取淨土五升蒸令溜分半以故布數重裹之以熨病上勿令大熱恐破肉冷則易之取痛止卽已凡有損傷皆以此法治之神效已死不能言者亦活三十年者亦瘥

治墮車馬間馬鞍及諸物隱體肉斷方

以酢和麪塗之

當歸散治落馬墮車諸傷腕折臂脚痛不止方

當歸 桂心 蜀椒 附子各二分

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:12
列印頁數：1563
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

澤蘭 一分　芎藭 六分　甘草 五分

右七味並熬令香治下篩酒服方寸匕日三凡是傷損皆服之十日愈小兒亦同 救急方云治墜馬落車被打傷腕折臂叫喚痛聲不絶服此散呼吸之間不復大痛十三日筋骨相連

黃耆散治腕折方

黃耆 芍藥 各二兩　當歸 乾地黃 各三兩　附子 續斷 桂心 乾薑 各一兩　通草 各二兩　大黃 一兩　蜀椒 一合　烏頭 半兩

右十二味治下篩先食酒服五分匕日三 千金翼無大黃

治折骨斷筋方

乾地黃 當歸 羌活 苦參 各二分

右四味治下篩酒服方寸匕日三

治腕折骨損痛不可忍者方

以大麻根及葉擣取汁飲一升無生麻煮乾麻汁服亦主墜墮撾打瘀血心腹滿短氣

治被傷筋絶方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

取蟹頭中腦及足中髓熬之内瘡中筋即續生

治腕折四肢骨碎及筋傷蹉跌方

生地黄不限多少熟擣用薄所損傷處肘後方云小品方爛擣熬之以裹傷處以竹片夾裹令徧縛令急勿令轉動一日可十易三日瘥若血聚在折處以刀子破去血

以水二升漬豉三升取汁服之

治四肢骨碎筋傷蹉跌方

鹿角散治同前

右酒服方寸匕日三肘後方治從高墮下若爲重物所頓迮得瘀血者

欽定四庫全書

又方筋骨傷初破時以熱馬尿傅之無瘢

又方大豆二升水五升煮取二升以淳酒六七升合和豆汁服之一日盡如湯沃雪肘後方云治墮迮瘀血無大豆用小豆佳

又方羊腦一兩髮灰兩胡粉胡桃脂各半

右四味擣和調如膏傅上生布裹

治頭破腦出中風口噤方

大豆一斗熬去腥勿使太熱擣爲末熟蒸氣偏合甑

備急千金要方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下盆中以酒一斗淋之温服一升覆取汗停杏仁膏
瘡上
紫湯治被傷風入四體角弓反張口噤不能言或産婦
墮胎凡得此者大重不過五劑方見第八卷中
治丈夫從高墮下傷五臟微者唾血甚者吐血及金瘡
傷經崩中皆主之方
阿膠 艾葉 乾薑各二兩 芍藥三兩
右四味㕮咀以水八升煮取三升去滓内膠令消分
二服羸人分三服兼治女人産後崩傷下血過多虚
喘腹中絞痛下血不止者服之悉愈
大膠艾湯治男子傷絶或從高墮下傷五臟微者唾血
及金瘡傷經者方
阿膠 艾葉 甘草 當歸 芎藭各二兩 乾薑一兩 芍藥 乾地黄各三兩
右八味㕮咀以水八升煮取三升去滓内膠令烊分

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:13
列印頁數：1566
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

再服羸人分三服此湯治婦人產後崩傷下血過多虛喘欲死腹中激痛下血不止者神良

竹皮湯治爲兵杖所加木石所迮血在胷背及脇中痛不得氣息方

青竹 刮取茹 亂髮 各如雞子大二枚

右二味於炭火上炙令焦燥合擣下篩以酒一升煮三沸上一服盡之三服愈

治墮馬落車及樹間崩血腹滿短氣方

大豆五升以水一斗煮取二升去豆一服令盡劇者不過三作

治墮落車馬間心腹積血嗊吐無數方

乾藕根爲末以酒服方寸匕日三如無取新藕汁服

桃仁湯治從高墮下落大木車馬間胷腹中有血不得氣息方

甘草 各一枚 蒲黃 一兩半 桃仁 十四枚 大棗 二十枚 大黃 消石

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右六味咬咀以水三升煮取一升絞去滓適寒温盡服之當下下不止漬麻汁一杯飲之即止

又方治腹中瘀血痛在腹中不出滿痛短氣大小便不通

桃仁 蠐蟲 各三十枚 荆芥 半分 大黄 各三兩 桂心 甘草 各二兩

芎藭 各三兩 當歸

蒲黄 五兩

右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服

欽定四庫全書

又方治噎落瘀血方

桃仁 五十枚 水蛭 蚖蟲 各二十枚 甘草 二兩

桂心 當歸 各二兩 芒硝 三兩 大黄 四兩

右八味咬咀以水八升煮取三升絞去滓適寒温服

一升曰三服 深師方無芒硝

又方桃仁 五十枚 蚖蟲 蠐蟲 各三十枚 水蛭 三十枚

大黄 五兩 桂心 二兩

右六味咬咀以酒水各五升合煎得三升適寒温飲

備急千金要方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

一升日三服

又方治腕折瘀血方

桃仁 四十枚 亂髮 一握 大黃 如指節大一枚

右三味以布方廣四寸以繞亂髮燒之咬咀大黃桃仁以酒三升煮取一升盡服血盡出 尉後云仲景方用大黃三兩緋帛子如手大灰亂髮如雞子大灰久用吹單布方一尺灰桃仁四十九枚敗蒲席一握長三寸切甘草一枚如指大以童子小便童多少煎湯成內酒一大盞次下大黃分溫爲三服別剉敗蒲席半領煎湯以浴衣被重覆服藥須通利數行痛楚立瘥利及浴水赤勿怪即瘀血也

又方桃仁 六十枚 大黃 六兩 桂心 二兩

右三味咬咀以酒六升煮取三升分三服當下血瘥

蒲黃散治從高墮下有瘀血方

蒲黃 八兩 附子 一兩

右二味爲末酒服方寸匕日三不知增之以意消息

又方治腕折瘀血方

蒲黃 一升 當歸 二兩

右二味治下篩先食酒服方寸匕日三

又方蚤蟲 二十枚 牡丹 一兩

右二味治下篩酒服方寸匕血化爲水 備急方云治久宿血在諸骨節及外不去者二味等分

又方取菴蕳草汁飲之子亦可服

又方凡被打及産後惡血及一切血皆煮續骨木汁三升飲之

治從高墮下崩中方

當歸 大黄 各二分

右二味治下篩酒服方寸匕曰三

治杖瘡方

石灰 七斤 新猪血 一升

右二味和爲丸熟燒之破更丸燒三遍止爲末傅上

又方釜月下土爲細末以油和塗訖臥羊皮上

又服小便良

治竹木刺在皮中不出方

羊尿燥者燒作灰和猪脂塗刺上若不出重塗乃言

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不覺刺出時一云用乾羊屎末
又方薔薇灰水服方寸匕日三服十日刺出
又方酸棗核燒末服之
又方鑿柄燒灰酒服二寸匕
又方頭垢塗之即出
治刺在肉中不出方
煮山瞿麥汁飲之日三瘥止
又方用牛膝根莖生者併擣以薄之即出瘡已合猶出
也

又方白茅根燒末以膏和塗之亦治瘡因風致腫者
又方鹿角燒末以水和塗之立出久者不過一夕
又方嚼白梅以塗之 肘後方用烏梅
又方嚼豉塗之
又方温小便漬之
治久刺不出方
服王不留行即出兼取根爲末貼之

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:15
列印頁數：1571
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治惡刺方

苦瓠開口内小兒尿煮兩三沸浸病上

又方葭菅根火煮浸之冷復易神方也

又方李葉棗葉擣絞取汁點上即效

又方濃煮大豆汁漬取瘥

治惡刺并狐尿刺方

以烏父驢尿漬之

又方温白馬尿漬之

治因瘡腫痛劇者數日死或中風寒或中水或中狐尿刺主之方

燒黍穰若牛馬屎若生桑條取得多煙之物燒熏汁出愈

又方燒蠟内瘡中新瘡亦善

又方以鳧公英草摘取根莖白汁塗之惟多塗爲佳瘥止

余以貞觀五年七月十五日夜左手中指背觸著庭樹至曉遂患痛不可忍經十日病日深瘡日高大色如熟小豆色嘗聞長者之論有此治方試復爲之手下即愈痛亦即除瘡亦即瘥不過十日尋常平復此大神

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

效故疏之蜀人名耳癩關中名苟乳乳奴苟切　菜

治瘡中水腫方

白灰　胡粉　炭　各等分

右三味脂和塗瘡孔上水出則痛止

治手足卒中刺中水毒方

濤韭及藍青置上以火炙熱徹即愈

治瘡因風致腫方

櫟木根皮一斤濃煮內鹽一把漬之

治破傷風腫方

厚塗杏仁膏然麻燭遥炙之

治因瘡腫痛者皆中水及中風寒所作腫入腹則殺人方

温桑灰汁漬冷復温之當令熱神祕

治刺傷中風水方

服黑牛熱尿一服二升三服即止

又方蠟一兩熱炙熨薄裹上令水出愈

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:16
列印頁數：1573
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方魚目燒灰傅之

又方熱煮韭搦之

又方刮箭羽下漆塗之

治瘡犯露腫方 凡八月九月中刺手足犯惡露腫殺人不可輕

生桑枝三枚内瘡灰中推引令極熱斫斷正以枝頭拄瘡口上熱盡即易之盡三枚則瘡自爛仍取薤白

擣綿裹著熱灰中使極熱去綿取薤白薄瘡上以布帛急裹之若有腫者便作用薤白最佳

治漆瘡方

生柳葉三斤細切以水一斗五升煮取七升適寒温洗之日三 肘後方云老柳皮尤妙

又方以磨石下滓泥塗之取瘥止大驗

又方濃煮鼠查葉以洗漆上亦可擣葉取汁塗之

又方爛擣七姑草封之 救急方云七姑草和苎硝塗之

又方貫衆為末以塗上乾以油和之即愈

又方蓮葉燥者一斤以水一斗煮取五升洗瘡上日再

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:17
列印頁數：1574
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方羊乳汁塗之

又方芒硝五兩湯浸以洗之

又方取猪膏塗之


又方礬石著湯中令消洗之

又方宜噉猪肉嚼穞穀塗之

備急千金要方卷七十七

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:17
列印頁數：1575
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)


欽定四庫全書 子部
備急千金要方卷七十八至八十
詳校官太醫院醫官臣姜晟
編修臣倉聖脈覆勘
總校官中書臣朱 鈐
校對官中書臣胡紹基
謄錄監生臣李維瀛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

燒白糖灰粉之即燥立瘥

治火燒瘡方

死鼠頭一枚以臘月猪膏煎令消盡以傅乾即傅之瘥不作瘢神效亦治小兒火瘡

治火瘡敗壞方

柏白皮切以臘月猪膏合淹相得煮四五沸色變去滓傅瘡上 肘後方云柳白皮

又方栢白皮 蛇銜 生地黃 梔子仁

黄芩 苦竹葉 各一分

右六味㕮咀以羊髓半升煎三上三下去滓塗上瘥止

治火爛瘡膏方

竹葉 甘草 各二兩 柏白皮 四兩

右三味㕮咀以猪脂一斤半煎三上三下去滓冷以傅之 集驗方用生地黃四兩

又方榆白皮嚼熟塗之

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:19
列印頁數：1578
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治一切湯火所傷方

初著即以女人精汁塗之瘥

治湯沃人肉爛壞方

杏仁 二兩 附子 二兩 甘草 一兩 羊脂 五兩

右五味㕮咀以不中水猪膏五兩煎塗之

灸及湯火所損晝夜啼呼止痛滅瘢方

羊脂 松脂 各二分 猪膏 蠟 各一

右四味取松脂破銚中切脂嚼蠟著松明上少傾銚令滓漬皆消以杯承汁傳之 松明是肥松木節也

治灸瘡方

甘草 當歸 各一兩 胡麻 外臺用胡粉 羊脂 各六分

右四味㕮咀以猪膏五合煎去滓傳之

又方蠟 三兩 松脂 五兩

右二味合煎塗紙貼之日三

又方取車軸脂塗上

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方凡灸瘡不瘥日別灸上六七壯自瘥

又方石灰一兩擣為細末絹篩猪脂和令相得微火上煎數沸以煖湯先洗瘡訖以布裹灰熨瘡上三過便以藥貼瘡上灸之又擣薤傅之

治灸瘡痛腫急方

擣竈下黃土以水和煮令熱漬之

治灸瘡中風冷腫痛方

但向火灸之瘡得熱則瘡快至痛止日六七灸愈

薤白膏治灸瘡生肉止痛方

薤白 當歸 各二兩 白芷 一兩 羊髓 一斤

右四味㕮咀合煎以白芷色黃藥成去滓取傅之日三

又方治灸瘡膿壞不瘥方

薤白 一握 胡粉 一升 石灰 各一兩 臘月猪脂

右四味先煎薤白令黃去之綿裹石灰煎數沸去之

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:20
列印頁數：1580
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

次入胡粉内膏中令調塗故布貼上日三

又方白蜜一兩　烏賊骨二枚一方作一兩

右二味相和塗之

治針炙瘡血出不止方

燒人屎灰以傅之

又方死蜣蜋爲末以猪脂和塗之

論曰治金瘡者無大小冬夏及始初傷血出便以石灰厚傅裹之既止痛又速愈無石灰灰亦可用若瘡甚深未宜速合者内少骨石令瘡不時合也凡金瘡出血其人必渴當忍之噉燥食并肥膩之物以止渴愼勿鹹食若多飲粥及漿犯即血動溢出殺人又忌愼怒大言笑思想陰陽行動作勞多食酸鹹飲酒熱羹臛輩瘡瘥後猶爾出百日半年乃可復常也

治金瘡大散方

五月五日平旦使四人出四方各於五里内採一方草木莖葉每種各半把勿令漏脱一事日正午時細

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:20
列印頁數：1581
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

切碓擣并石灰極爛熟一石草斷一斗石灰先鑿大實中桑樹令可受藥取藥内孔中實築令堅仍以桑樹皮蔽之以麻擣石灰極密泥之令不泄氣又以桑皮纏之使牢至九月九日午時取出陰乾百日藥成擣之日曝令乾更擣絹篩貯却凡一切金瘡傷折出血登時以藥封裹治使牢勿令動轉不過十日即瘥血出然後傅之此藥大驗平時無事宜多合以備倉卒金瘡之要無出於此雖突厥質汗黃末未能及之

肘後方云用百草心五月五日作七月七日出

又方燒乾梅爲炭擣末傅之一宿即瘥亦治打傷

又方磁石擣末傅之止痛斷血

又方取桑白汁塗桑白皮裹之或石灰封之妙

又方麻葉三斤以水三升熟煮取二升半爲一服

又方飲麻子汁数升

小品方云治毒箭所傷

又方蚯蚓屎以水服方寸匕日三

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:20
列印頁數：1582
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方杏仁石灰爲細末以猪脂和封之 亦主犬馬金瘡止痛太良

治金瘡血出不止方

煮桑根十沸服一升即止

又方擣車前汁傅之血即絶連根取用亦效

又方柳絮封之

又方以蜘蛛幕貼之血即止

又方以人精塗之

又方飲人尿五升愈

内補散治金瘡出血多虚竭方

薤蓉 古今録驗作桑白皮

乾薑 二兩

黄芩

白芨

甘草 芍藥 各四兩

當歸 芎藭 桂心 蜀椒 三兩

吳茱萸 人參 厚朴 黄耆 各一兩

又方當歸 三兩 乾薑 三分 芍藥 辛夷 各五分 甘草 二分

右十四味治下篩以酒服方寸匕日三

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:21
列印頁數：1583
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右五味治下篩酒服方寸匕日三夜一

治金瘡內漏血不出方

牡丹皮爲散水服三指撮立尿出血

治金瘡內漏方

還自取瘡中血著杯中水和服之愈

又方蒲黃二兩 七月七日麻勃一兩

右二味酒服一錢匕日三夜二

二物湯治金瘡腹中瘀血方

大麻子三升 大蔥白二七枚

右使數人各擣令熟著九升水煮取一升半頓服若血出不盡腹中有膿血更合服當吐膿血

內塞散治金瘡方

黃耆 當歸 芎藭 白芷

乾薑 黃芩 芍藥 續斷 各二兩

附子半兩 細辛一兩 鹿茸三兩

右十一味治下篩先食酒服五分匕日三稍增至方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寸匕

治金瘡煩滿方

赤小豆一升以苦酒漬之熬令燥復漬滿三日令色黑服方寸匕日三

治金瘡苦痛方

楊木白皮熬令燥爲末服方寸匕日三又以傅瘡愈

治金瘡若刺瘡痛不可忍百治不瘥者方

蔥一把以水三升煮數沸取漬洗止痛良

治金瘡煩痛大便不利方

大黃　黃芩　闕

右二味爲末蜜和丸如梧桐子大先食服十丸日三

治金瘡不止令唾止痛呪法

呪曰某甲今日不良爲某所傷上告天皇下告地王

清血莫出濁血莫揚良藥百裹不如熟唾日二七痛

唾之即止

又法我按先師本法男師在左女師在右上白東王公

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下白西王母北斗七星黃姑織女請制水之法清旦明
呪不痕不膿不疼不痛羅肺得肺羅肺羅肝得肝羅肉得肉
不任軀姥儂夫自来小兒為日不吉不良某甲為刀斧
槊箭熊虎湯火所傷三唾三呵平復如故急急如律令
此法不復須度受但存念稽急畝誦之非止治百毒所
傷亦治癰疽隨所患轉後語呼之良驗一切瘡毒並皆
用之
續斷散治金瘡中筋骨方

續斷 五兩　細辛　蛇銜　地榆
乾地黃 四兩　當歸　芎藭　芍藥
蓯蓉 各三兩　人參　甘草　附子 各二兩
乾薑　蜀椒　桂心 各一兩半

治金瘡腸出方
磁石　滑石　鐵精 各三兩
右三味爲末粉腸上後用磁石末飲服方寸匕日五
右十五味治下篩酒服一方寸匕日三

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:22
列印頁數：1586
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夜二腸即入

又方取人屎乾爲末以粉腸即入

治被傷腸出不斷者方 肘後方云治腸出欲燥而草土著腸者

作大麥粥取汁洗腸推内之常研米粥飲之二十日稍稍作强糜百日後乃可瘥

地黄膏治金瘡火瘡灸瘡不能瘥者方

生地黄 切一升搗絞取汁三合 薰陸香 松脂 羊腎脂 五合煎 烏麻油 二升 蠟 各二兩

石鹽 一兩研如粉

右八味先下蠟微火令消次内羊脂令消次下油次下松脂令消次下杏仁次下薰陸次下地黄汁次下石鹽以微火煎令地黄汁水氣盡以綿濾停凝一切諸瘡初傷皆用傅之日三夜二愼生冷猪雞魚肉此膏治瘡法先食惡肉不著痂先從内瘥乃至平復無痂不畏風不膿大大要妙

治金瘡血出不止方

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:23
列印頁數：1587
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蒲黃 一斤　當歸 二兩

右二味治下篩酒服方寸匕日二

又方取蔥葉炙取汁塗瘡上即止若爲婦人所驚者取婦人中衣火炙令熱以熨瘡上

又方取豉三升熱湯漬食頃絞去滓内蒲黃三合頓服及作紫湯服之 紫湯方在產婦篇中

治金瘡箭在肉中不出方

白斂　半夏 各等分

右二味治下篩酒服方寸匕日三瘡淺十日出瘡深二十日出終不住肉中

治箭鏃及諸刀刃在咽喉胷膈諸隱處不出者方

取女人月經布燒灰屑酒服之

治卒中箭不出或肉中有聚血方

牡丹皮 一分　白鹽 二分肘後作白斂

右二味治下篩以酒服方寸匕日三服出

又方取栝蔞汁塗箭瘡上即出

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方酒服瞿麥方寸匕日三瘥

治毒箭所中方

擣藍汁一升飲之并以薄瘡上若無藍取青布漬絞汁服之并淋瘡中鏃不出擣死鼠肝塗之

又方多飲葛根汁并治一切金瘡

又方煎地黃汁作丸服之百日箭出

又方雄黃為末傳之當沸汁出愈

又方濤葛根汁飲之又葛白屑熬黃傳瘡止血

又方貝齒末服一錢匕

又方内鹽臍中炙之

治中射網箭方

藍子 五合 升麻 八兩 王不留行 甘草 各等分

右四味治下篩冷水服二方寸匕日三夜二又以水和塗瘡乾易之

治針折入肉中方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

刮象牙爲末水和聚著折針上即出

又方以鼠腦塗之

又方磁石吸鐵者著上即出

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:24
列印頁數：1590
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷七十九　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

食治

序論第一

仲景曰人體平和惟須好將養勿妄服藥藥勢偏有所助令人藏氣不平易受外患夫含氣之類未有不資食以存生而不知食之有成敗百姓日用而不知水火至近而難識余慨其如此聊因筆墨之暇撰五味損益食治篇以啓童稚庶勤而行之有如影響耳

河東衛汎記曰扁鵲云人之所依者形也亂於和氣者病也理於煩毒者藥也濟命扶危者醫也安身之本必資於食救疾之速必憑於藥不知食宜者不足以存生也不明藥忌者不能以除病也此之二事有靈之所要也若忽而不學誠可悲夫是故食能排邪而安臟腑悅神爽志以資血氣若能用食平痾釋情遣疾者可謂良

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:25
列印頁數：1591
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

工長年餌老之奇法極養生之術也夫爲醫者當須先洞曉病源知其所犯以食治之食療不愈然後命藥藥性剛烈猶若御兵兵之猛暴豈容妄發發用乖宜損傷處衆藥之投疾殃濫亦然高平王熙稱食不欲雜雜則或有所犯有所犯者或有所傷或當時雖無災苦積久爲人作患又食噉鮭肴務令簡少魚肉果實取益人者而食之凡常飲食每令節儉若貪味多餐臨盤大飽食訖覺腹中彭亨短氣或致暴疾仍爲霍亂又夏至以後果理極相妨夫在身所以多疾者皆因春夏取冷大過迄至秋分必須愼肥膩餅臛酥油之屬此物與酒漿瓜善乳酪酥等常食之令人有筋力膽幹肌體潤澤卒多飲食不節故也又魚膾諸腥冷之物多損於人斷之益食之亦令臚脹泄利漸漸自己

食酸令人瘚不知何以然少俞曰酸入胃也其氣濇以收也上走兩焦兩焦之氣濇不能出入不出即流於胃黃帝曰五味入於口也各有所走各有所病酸走筋多

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中胃中和温即下注膀胱膀胱走胞胞薄以耎得酸則縮卷約而不通水道不利故癃也陰者積精一作筋之所終聚也故酸入胃走於筋也

鹹走血多食鹹令人渴何也答曰鹹入胃也其氣走中膲注於諸脉脉者血之所走也與鹹相得即血凝凝則胃中汁泣汁泣則胃中乾渴甲乙云凝則胃中汁注之注之則胃中竭渴則咽路焦焦故舌乾喜渴血脉者中膲之道也故鹹入胃走於血皇甫士安云腎合三焦之脉雖屬肝心而爲中焦之道故鹹入而走血也

辛走氣多食辛令人愠心何也答曰辛入胃也其氣走於上膲上膲者受使諸氣而榮諸陽者也薑韭之氣熏至榮衛榮衛不時受之却溜於心下故愠愠痛也辛味與氣俱行故辛入胃而走氣與氣俱出故氣盛也

苦走骨多食苦令人變嘔何也答曰苦入胃也其氣燥而涌泄五穀之氣皆不勝苦苦入下管下管者三膲之道皆閉則不通不通故氣變嘔也齒者骨之所終也故苦入胃而走骨入而復出齒必黧踈皇甫士安云水火相濟故骨氣通於

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

心

甘走肉多食甘令人惡心何也答曰甘入胃也其氣弱劣不能上進於上膲而與穀俱留於胃中甘入則柔緩柔緩則蚘動蚘動則令人惡心其氣外通於肉故甘走肉則肉多粟起而胝皇甫士安云其氣外通於皮故曰甘入走皮矣皮者肉之蓋皮雖屬肺與肉連體故甘潤肌肉并於皮也

黃帝問曰穀之五味所主可得聞乎伯高對曰夫食風者則有靈而輕舉食氣者則和靜而延壽食穀者則有智而勞神食草者則愚癡而多力食肉者則勇猛而多嗔是以肝木青色宜酸心火赤色宜苦脾土黃色宜甘肺金白色宜辛腎水黑色宜鹹內爲五臟外主五行色配五方

五臟所合法肝合筋其榮爪心合脉其榮色脾合肉其榮脣肺合皮其榮毛腎合骨其榮髮

五臟不可食忌法多食酸則皮槁而毛夭多食苦則筋急而爪枯多食甘則骨痛而髮落多食辛則肉胝而脣

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寒多食鹹則脉凝泣而色變

五臟所宜食法肝病宜食麻犬肉李韭心病宜食麥羊肉杏薤脾病宜食稗米牛肉棗葵肺病宜食黄黍雞肉桃蔥腎病宜食大豆黄卷豕肉栗藿 素問云肝色青宜食甘秔米牛肉棗葵皆甘心色赤宜食酸小豆犬肉李韭皆酸肺色白宜食苦麥羊肉杏薤皆苦脾色黄宜食鹹大豆豕肉栗藿皆鹹腎色黑宜食辛黄黍雞肉桃蔥皆辛

五味動病法酸走筋筋病勿食酸苦走骨骨病勿食苦甘走肉肉病勿食甘辛走氣氣病勿食辛鹹走血血病勿食鹹

五味所配法

米飯甘 素問云秔米甘

麻酸 素問云小豆酸

大豆鹹

麥苦 棗甘

李酸 栗鹹

杏苦 桃辛

黄黍辛 葵甘

韭酸 藿鹹

薤苦 葱辛

牛甘 犬酸

豕鹹 羊苦

雞辛

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:26
列印頁數：1595
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五臟病五味對治法肝苦急急食甘以緩之肝欲散急食辛以散之用酸瀉之禁當風心苦緩急食酸以收之心欲耎急食鹹以耎之用甘瀉之禁温食厚衣脾苦濕急食苦以燥之脾欲緩急食甘以緩之用苦瀉之禁温食飽食濕地濡衣肺苦氣上逆息者急食苦以泄之肺欲收急食酸以收之用辛瀉之禁無寒飲食寒衣腎苦燥急食辛以潤之開腠理潤致津液通氣也腎欲堅急食苦以結之用鹹瀉之無犯焠煞無熱衣温食是以毒藥攻邪五穀爲養五菜爲充精以食氣氣養精以榮色形以食味味養形以生力此之謂也神藏有五五二十五種形藏有四方四時四季四肢共爲五九四十五以此輔神可長生久視也精順五氣以爲靈也若食氣相惡則傷精也形受味以成也若食味不調則損形也是以聖人先用食禁以存性後制藥以防命也故形不足者温之以氣精不足者補之以味氣味温補以存形精岐伯云陽爲氣陰爲味味歸形

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

形歸氣氣歸精精歸化精食氣形食味化生精氣生形
味傷形氣傷精精化爲氣氣傷於味陰味出下竅陽氣
出上竅味厚者爲陰味薄者爲陰之陽氣厚者爲陽氣
薄者爲陽之陰味厚則泄薄則通流氣薄則發泄厚則
閉塞壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣氣食少火壯
火散氣少火生氣味辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰陰
勝則陽病陽勝則陰病陰陽調和則平安春七十二日
省酸增甘以養脾氣夏七十二日省苦增辛以養肺氣
秋七十二日省辛增酸以養肝氣冬七十二日省鹹增
苦以養心氣季月各十八日省甘增鹹以養腎氣

治寸白

檳榔味辛温滑無毒消穀逐水除痰癖殺三蟲去伏尸

葡萄味甘辛平無毒主筋骨濕痺益氣倍力强志令人
肥健耐饑忍風寒久食輕身不老延年治腸間水調中

豆蔻味辛温滑無毒温中主心腹痛止吐嘔去口氣臭

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

可作酒常飲益人逐水利小便

覆盆子味甘辛平無毒益氣輕身令髮不白

大棗味甘辛熱滑無毒主心腹邪氣安中養脾氣助十二經平胃氣通九竅補少氣津液身中不足大驚四肢重可和百藥補中益氣强志除煩悶心下懸治腸澼久服輕身長年不饑神仙

生棗味甘辛多食令人熱渴氣脹若寒熱羸瘦者彌不可食傷人

藕實味苦甘寒無毒食之令人心歡止渴去熱補中養神益氣力除百病久服輕身耐老不飢延年一名水芝

生根寒止熱渴破留血

雞頭實味甘平無毒主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣强志意耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙

芰實味甘辛平無毒安中補五臟不饑輕身一名菱黃

帝云七月勿食生菱芰作蟯蟲

栗子味鹹温無毒益氣厚腸胃補腎氣令人耐饑生食

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

之甚治腰脚不遂

櫻桃味甘平濇調中益氣可多食令人好顏色美志一性

橘柚味辛温無毒主胷中瘕熱逆氣利水穀下氣止嘔咳除膀胱留熱停水破五淋利小便治脾不能消穀却輕身長年一名橘皮陳久者良

胷中吐逆霍亂止瀉利去寸白久服去口臭下氣通神津符子味苦平滑多食令人口爽不知五味

梅實味酸平濇無毒下氣除熱煩滿安心止肢體痛偏枯不仁死肌去青黑誌惡疾止下利好唾口乾利筋脉多食壞人齒

柿味甘寒濇無毒通和五氣主腸澼不足及火瘡金瘡止痛

木瓜實味酸鹹温濇無毒主濕痺氣霍亂大吐下後脚轉筋不止其生樹皮無毒亦可煮用

橿實味甘平濇無毒主五痔去三蟲殺蠱毒鬼疰惡毒甘蔗味甘平濇無毒下氣和中補脾氣利大腸止渴去

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煩解酒毒

奚棗味苦冷濇無毒多食動宿病益冷氣發咳嗽

芋味辛平滑有毒寬腸胃充肌膚滑中一名土芝不可

多食動宿冷又烏芋味苦甘微寒滑無毒主消渴癉熱

益氣一名藉姑一名水萍三月採

杏核仁味甘苦温冷而利有毒主咳逆上氣腸中雷鳴

喉癉下氣產乳金瘡寒心奔肫驚癇心下煩熱風氣去

来時行頭痛解肌消心下急殺狗毒五月採之其一核

兩仁者害人宜去之杏實尚生味極酸其中核猶未鞭

者採之曝乾以食甚止渴去冷熱毒扁鵲云杏仁不可

久服令人目面眉髮落動一切宿病

桃核仁味苦甘辛平無毒破瘀血血閉瘕邪氣殺小蟲

治咳逆上氣消心下鞕除卒暴擊血破癥瘕通月水止

心痛七月採凡一切棗核中有兩仁者並害人不在用

其實味酸無毒多食令人有熱黄帝云飽食桃入水浴

成淋病

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:29
列印頁數：1600
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

李核仁味苦平無毒主僵仆躄瘀血骨痛實味苦酸微温澹無毒除固熱調中宜心不可多食令人虚黄帝云李子不可和白蜜食蝕人五内

梨味甘微酸寒澹有毒除客熱氣止心煩不可多食令人寒中金瘡産婦勿食令人萎困寒中

林檎味酸苦平澹無毒止渴好唾不可多食令人百脉弱

柰子味酸苦寒澹無毒耐饑益心氣不可多食令人臚脹久病人食之其病尤甚

安石榴味甘酸澹無毒止咽燥渴不可多食損人肺

枇杷葉味苦平無毒主嘔不止下氣正爾削取生樹皮嚼之少少咽汁亦可煮汁冷服大佳

胡桃味甘冷滑無毒不可多食動痰飲令人惡心吐水

菜蔬第三 五十九條

吐食

枸杞葉味苦平澹無毒補虚羸益精髓諺云去家千里勿食蘿摩枸杞此則言强陽道資陰氣速疾也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蘿摩味甘平無毒一名苦丸其葉厚大作藤生摘之有白汁出人家所種亦可生噉亦可蒸煮食之補益與枸杞葉同

瓜子味甘平寒無毒令人光澤好顏色益氣不饑久服輕身耐老人除胷滿心不樂久食寒中可作面脂一名水芝一名白瓜子即冬瓜仁也八月採白冬瓜味甘微寒無毒除小腹水脹利小便止消渴

凡瓜味甘寒滑無毒去渴多食令陰下癢濕生瘡發黃疸黃帝云丸月勿食被霜瓜向冬發寒熱及温病初食時即令人欲吐也食竟心内作停水不能自消或爲反胃凡瓜入水沈者食之得冷病終身不瘥

越瓜味甘平無毒不可久食損腸胃

胡瓜味甘寒有毒不可多食動寒熱多瘧病積癖血熱

早青瓜味甘寒無毒食之去熱煩不可久食令人多忘

冬葵子味甘寒無毒主五臟六腑寒熱羸瘦破五淋利小便婦人乳難血閉久服堅骨長肌肉輕身延年十二

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

月採葉甘寒滑無毒宜脾久食利胃氣其心傷人百藥忌食心心有毒黃帝云霜葵陳者生食之動五種流飲飲盛則吐水凡葵菜和鯉魚鮓食之害人四季之月土王時勿食生葵菜令人飲食不化發宿病

莧菜實味甘寒澹無毒主青盲白翳明目除邪氣利大小便去寒熱殺蚘蟲久服益氣力不饑輕身一名馬莧一名莫實即馬齒莧菜也治反花瘡

小莧菜味甘大寒滑無毒可久食益氣力除熱不可共鼈肉食成鼈瘕菜亦成鼈瘕

邪蒿味辛温澹無毒主胷膈中臭惡氣利腸胃

苦菜味苦大寒滑無毒主五臟邪氣厭穀胃癉腸澼大渴熱中暴疾惡瘡久食安心益氣聰察少臥輕身耐老耐饑寒一名茶草一名選一名遊冬冬不死四月上旬採

薺菜味甘温澹無毒利肝氣和中殺諸毒其子主明目目痛淚出其根主目澹痛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蕪菁及蘆服菜味苦冷澹無毒利五臟輕身益氣宜久食蕪菁子明目丸蒸曝療黃疸利小便久服神仙根主消風熱毒腫不可多食令人氣脹

隨變

菘菜味甘温澹無毒久食通利腸胃除胷中煩解消渴本是蔓菁也種之江南即化爲菘亦如枳橘所生土地

芥菜味辛温無毒歸鼻除腎邪大破咳逆下氣利九竅明目聰耳安中久食温中又云寒中其子味辛辛亦歸鼻有毒主喉痺去一切風毒腫黃帝云芥菜不可共兔肉食成惡邪病

苜蓿味苦平澹無毒安中利人四體可久食

荏子味辛温無毒主咳逆下氣温中補髓其葉主調中去臭氣九月採陰乾用之油亦可作油衣

蓼實味辛温無毒明目温中解肌耐風寒下水氣面目浮腫却癰疽其葉辛歸舌治大小腸邪氣利中益志黃帝云蓼食過多有毒發心痛和生魚食之令人脫氣陰

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

核疼痛求死婦人月事来不用食蓼及蒜喜爲血淋帶下二月勿食蓼傷人腎扁鵲云蓼久食令人寒熱損骨髓殺丈夫陰氣少精

蔥實味辛温無毒宜肺辛歸頭明目補中不足其莖白平滑可作湯主傷寒寒熱骨肉碎痛能出汗治中風面目浮腫喉痺不通安胎殺桂其青葉温辛歸目除肝中邪氣安中利五臟益目精發黄疸殺百藥毒其根鬚平主傷寒頭痛蔥中涕及生蔥汁平滑止尿血解藜蘆及桂毒黄帝云食生蔥即噉蜜變作下利食燒蔥并噉蜜擁氣而死正月不得食生蔥令人面上起遊風

格蔥味辛微温無毒除癖氣惡毒久食益膽氣强志其子主洩精

薤味苦辛温滑無毒宜心辛歸骨主金瘡瘡敗能生肌肉輕身不饑耐老菜芝也除寒熱去水氣温中散結氣利產婦病人諸瘡中風寒水腫生擣傳之□骨在咽不下者食之則去黄帝云薤不可共牛肉作羹食之成瘕

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

疾韭亦然十月十一月十二月勿食生薤令人多涕唾

韭味辛酸温濇無毒辛歸心宜肝可久食安五臟除胃

中熱不利病人其心腹有痼冷者食之必加劇其子主

夢泄精尿色白根煮汁以養髮黄帝云霜韭凍不可生

食動宿飲飲盛必吐水五月勿食韭損人滋味令人乏

氣力二月三月宜食韭大益人心

白蘘荷味辛微温濇無毒主中蠱及瘧病擣汁服三合

日二生根主諸瘡

恭菜味甘苦大寒無毒主時行壯熱解風熱惡毒

紫蘇味辛微温無毒下氣除寒中其子尤善

雞蘇味辛微温濇無毒主吐血下氣一名水蘇也

羅勒味苦辛温平濇無毒消停水散毒氣不可久食濇

榮衛諸氣

蕪荑味辛平熱滑無毒主五内邪氣散皮膚骨節中淫

淫温行毒去三蟲能化宿食不消逐寸白散腹中温温

喘息一名無姑一名□蘑盛器物中甚辟水蛭其氣甚

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

臭此即山榆子作之凡榆葉味甘平滑無毒主小兒癇
小便不利傷暑熱困悶煮汁冷服生榆白皮味甘冷無
毒利小便破石淋花主小兒頭瘡
葫荽子味酸平無毒消穀能復食味葉不可久食令人
多忘華佗云葫荽菜患胡臭人患口氣臭鼠齒人食之
加劇腹内患邪氣者彌不得食之發宿病金瘡尤忌
海藻鹹寒滑無毒主癭瘤結氣散頸下鞭核痛者腸内
上下雷鳴下十二水腫利小便起男子陰氣
昆布味鹹寒滑無毒下十二水腫癭瘤結氣癭瘡破積
聚
茼蒿味辛平無毒安心養氣脾胃消痰飲
白蒿味苦辛平無毒養五臟補中益氣長毛髮久食不
死白兔食之仙
吳葵一名蜀葵味甘微寒滑無毒花定心氣葉除客熱
利腸胃不可久食鈍人志性若食之被狗齧者瘡永不
瘥

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:33
列印頁數：1607
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

霍味鹹寒濇無毒宜腎主大小便數去煩熱

香菜味辛微温主霍亂腹痛吐下散水腫煩心去熱

甜瓠味甘平滑無毒主消渴惡瘡鼻口中肉爛痛其葉

味甘平主耐饑扁鵲云患脚氣虛脹者不得食之患永

不除

薄味甘寒滑無毒主消渴熱癉多食動痔病

落葵味酸寒無毒滑中散熱實悦澤人面一名天葵一

名蘩露

蘩蔞味酸平無毒主積年惡瘡痔不愈者五月五日日

中採之即名滋草一名雞腸草乾之燒作焦灰用扁鵲

云丈夫患惡瘡陰頭及莖作瘡膿爛疼痛不可堪忍久

不瘥者以灰一分蚯蚓新出屎泥二分以少水和研緩

如煎餅麵以泥瘡上乾則易之禁酒麵五辛并熱食等

黄帝云蘩蔞合鮓食之發消渴病令人多忘別有一

種近水渠中温濕處冬生其狀類葫荽亦名雞腸菜可

以療痔病一名天葫荽

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:34
列印頁數：1608
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

戟味辛微温有小毒主蠷螻尿瘡多食令人氣喘不利人脚多食脚痛

葫味辛温有毒辛歸五臟散癰疽治蠱瘡除風邪殺盡毒氣獨子者最良黄帝云生葫合青魚鮓食之令人腹内生瘡腸中腫又成疝瘕多食生葫行房傷肝氣令人面無色四月八月勿食葫傷人神損膽氣令人喘悸脇肋氣急口味多爽

小蒜味辛温無毒辛歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃氣温中除邪癖毒氣五月五日採曝乾葉主心煩痛解諸毒小兒丹癜不可久食損人心力黄帝云食小蒜嗽生魚令人奪氣陰核瘡求死三月勿食小蒜傷人志性

茗葉味苦鹹酸冷無毒可久食令人有力悦志微動氣

蕃荷菜味苦辛温無毒可久食却腎氣令人口氣香潔

黄帝云不可共韭食令人身重

主辟邪毒除勞弊形瘦疲倦者不可久食動消渴病

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蒼耳子味苦甘温葉味苦辛微寒濡有小毒主風頭寒痛風濕痺四肢拘急攣痛去惡肉死肌膝痛溪毒久服益氣耳目聰明强志輕身一名胡菜一名地葵一名菭一名常思蜀人名羊負来秦名蒼耳魏人名隻刺黄帝云戴甲蒼耳不可共猪肉食害人食甜粥復以蒼耳甲下之成走注又患兩脇立秋後忌食之

食菜萸味辛苦大温無毒九月採停陳久者良其子閉口者有毒不在用止痛下氣除咳逆去五臟中寒冷温中諸冷實不消其生白皮主中惡腹痛止齒疼其根細者去三蟲寸白黄帝云六月七月勿食菜萸傷神氣令人起伏氣咽喉不通徹賊風中人口僻不能語者取菜萸一升去黑子及合口者好豉三升二物以清酒和煮四五沸取汁冷服半升日三得小汗瘥蠆螫人嚼菜萸封上止

蜀椒味辛大熱有毒主邪氣温中下氣留飲宿食能使痛者癢癢者痛久食令人乏氣失明主咳逆逐皮膚中

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寒冷去死肌濕痺痛心下冷氣除五臟六腑寒百骨節中積冷溫癉大風汗自出者止下利散風邪合口者人其中黑子有小毒下水仲景云婺用之黃帝云十月勿食椒損人心傷血脉乾薑味辛熱無毒主胷中滿欬逆土氣溫中止漏血出汗逐風濕痺腸澼下利寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良

生薑味辛微溫無毒辛歸五臟主傷寒頭痛去痰下氣通汗除鼻中塞咳逆上氣止嘔吐去胷膈上臭氣通神明黃帝云八月九月勿食薑傷人神損壽胡居士云薑殺腹中長蟲久服令人少志少智傷心性

董棻味苦平無毒久服除人心煩急動痰冷身重多懈惰芸薹味辛寒無毒主腰脚痺若舊患腰脚痛者不可食必加劇又治油腫丹毒益胡臭解禁呪之輩出五明經其子主夢中泄精與鬼交者胡居士云世人呼爲寒菜甚辣胡臭人食之病加劇隴西氐羌中多種食之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

竹筍味甘微寒無毒主消渴利水道益氣力可久食患冷人食之心痛

野苣味苦平無毒久服輕身少睡黃帝云不可共蜜食之作痔又白苣味苦平無毒益筋力黃帝云不可共酪食必作蟲

茴香菜味苦辛微寒濇無毒主霍亂辟熱除口氣臭肉和水煮下少許即無臭氣故曰茴香醬臭末中亦香其子主蛇咬瘡久不瘥者濤傳之又治九種瘻

蕈菜味苦寒無毒主小兒火丹諸毒腫去暴熱

藍菜味甘平無毒久食大益腎填髓腦利五臟調六腑

胡居士云河東隴西羌胡多種食之漢地尠有其葉長大厚煮食甘美經冬不死春亦有莢其花黃生角結子

子甚治人多睡

蓪竹葉味苦平濇無毒主浸淫瘡瘙疽痔殺三蟲女人陰蝕扁鵲云煮汁與小兒冷服治蛔蟲

斬菜味苦酸冷濇無毒益筋力去伏熱治五種黃病生

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

擣絞汁冷服一升日二黄帝云五月五日勿食一切菜發百病凡一切菜熟煮熱食時病瘥後食一切肉并蒜食竟行房病發必死時病瘥後未健食生青菜者手足必青腫時病瘥未健食青菜竟行房病更發必死十月勿食被霜菜令人面上無光澤目濇痛又瘧發心痛腰疼或致心瘧發時手足十指爪皆青困癈

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:36
列印頁數：1613
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷八十 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

食治

穀米第四 二十六條

薏苡仁味甘温無毒主筋拘攣不可屈伸久風濕痺下氣久服輕身益力其生根下三蟲名醫云薏苡仁除筋骨中邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食一名□一名感米蜀人多種食之

胡麻味甘平無毒主傷中虚羸補五内益氣力長肌肉填髓腦堅筋骨療金瘡止痛及傷寒温瘧大吐下後虚熱困乏久服輕身不老聰明耳目耐寒暑延年作油微寒主利大腸産婦胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮去頭面遊風一名巨勝一名狗虱一名方莖一名鴻藏葉名青蘘主傷暑熱花主生禿髮七月採最上標頭者陰乾用之

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:37
列印頁數：1614
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白麻子味甘平無毒宜肝補中益氣肥健不老治中風汗出逐水利小便破積血風毒腫復血脉産後乳餘疾能長髮可爲沐藥久服神仙

粉味甘微温無毒補虚冷益氣力止腸鳴咽痛除唾血却卒噦

大豆黄卷味甘平無毒主久風濕痺筋攣膝痛除五臟胃氣結積益氣止毒去黑誌面黡潤澤毛皮宜腎生大豆味甘平冷無毒生濤淳酢和塗之治一切毒腫并止痛煮汁冷服之殺鬼毒逐水脹除胃中熱却風痺傷中淋露下瘀血散五臟結積内寒殺烏頭三建解百藥毒不可久服令人身重其麪屑味甘温平無毒主胃中熱去身腫除痺消穀止腹脹九月採黄帝云服大豆屑忌食猪肉炒豆不得與一歲已上十歲已下小兒食竟噉猪肉必擁氣死

赤小豆味甘鹹平冷無毒下水腫排膿血一名赤豆不可久服令人枯燥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

青小豆味甘鹹温平濇無毒主寒熱熱中消渴止泄利
利小便除吐逆卒澼下腹脹滿一名麻累一名胡豆黄
帝云青小豆合鯉魚鮓食之令人肝黄五年成乾痟病
大豆豉味苦甘寒濇無毒主傷寒頭痛寒熱辟癘氣惡
毒煩躁滿悶虚勞喘吸兩脚疼冷殺六畜胎子諸毒
止
菉豆味甘微温無毒和中下氣其葉平主霍亂吐下不
喬麥味酸微寒無毒食之難消動大熱風其葉生食動
刺風令人身癢黄帝云作麪和猪羊肉熱食之不過八
九頓作熱風令人眉鬚落又還生仍希少涇邠已北多
患 此疾
大麥味鹹微寒滑無毒宜心主消渴除熱久食令人多
力健行作蘗温消食和中熬末令赤黑擣作麨止泄利
和清酢漿服之日三夜一
小麥味甘微寒無毒養肝氣去客熱止煩渴咽燥利小
便止漏血唾血令女人孕必得易作麴六月作者温無

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:37
列印頁數：1616
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

毒主小兒癇食不消下五痔蟲平胃氣消穀止利作麪
溫無毒不能消熱止煩不可多食長宿癖加客氣難治
青粱米味甘微寒無毒主胃癉熱中除消渴止泄利利
小便益氣力補中輕身長年
黃粱米味甘平無毒益氣和中止泄利人呼爲竹根米
又却當風臥濕寒中者
白粱米味甘微寒無毒除熱益氣
粟米味鹹微寒無毒養腎氣去骨癉熱中益氣也
陳粟米味苦寒無毒主胃中熱消渴利小便
丹□米味苦微温無毒主欬逆上氣霍亂止泄利除熱
去煩渴又白黍米味甘辛温無毒宜肺補中益氣不可
久食多熱令人煩黃帝云五種黍米合葵食之令人成
痼疾又以脯腊著五種黍米中藏儲食之云令人閉氣
陳廩米味鹹酸微寒無毒除煩熱下氣調胃止泄利黃
帝云久藏脯腊安米中滿三月人不知食之害人
蘗米味苦微温無毒主寒中下氣除熱

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

秫米味甘微寒無毒主寒熱利大腸治榛瘡

酒味苦甘辛大熱有毒行藥勢殺百邪惡氣黃帝云暴下後飲酒者膈上變爲伏熱食生菜飲酒莫炙腹令人腸結扁鵲云久飲酒者腐腸爛胃漬髓蒸筋傷神損壽醉當風臥以扇自扇成惡風醉以冷水洗浴成疼痺大訖即莫飲酒終身不乾嘔飽食訖多飲水及酒成痞澼醉汗出當以粉粉身令其自乾發成風痺常日未没食穀米味甘平無毒益氣安中補虛和胃宜脾

粳米味辛苦平無毒主心煩斷下利平胃氣長肌肉温中一云生者冷燔者熱

糯米味苦温無毒温中令人能食多熱大便鞕

酢味酸温澹無毒消癰腫散水氣殺邪毒血運扁鵲云多食酢損人骨能理諸藥消毒熱

鹽味鹹温無毒殺鬼蠱邪注毒氣下部蠶瘡傷寒寒熱能吐胷中痰澼止心腹卒痛堅肌骨不可多食傷肺喜咳令人色膚黑損筋力扁鵲云鹽能除一切大風疾痛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

者炒熨之黃帝云食甜粥竟食鹽即吐或成霍亂

人乳汁味甘平無毒補五臟令人肥白悅澤馬乳汁味辛温無毒止渴牛乳汁味甘微寒無毒補虛羸止渴入生薑蔥白止小兒吐乳補勞羊乳汁味甘微温無毒補寒冷虛乏少血色令人熱中驢乳味酸寒一云大寒無毒主大熱黃疸止渴母猪乳汁平無毒主小兒驚癎以飲之神妙

馬牛羊酪味甘酸微寒無毒補肺臟利大腸黃帝云食甜酪竟即食大酢者變作血瘕及尿血華佗云馬牛羊酪蚰蜒入耳者灌之即出也

沙牛及白羊酥味甘微寒無毒除胷中客氣利大小腸治口瘡牝牛酥味甘平無毒去諸風濕痺除熱利大便醍醐味甘平無毒補虛去諸風痺百練乃佳甚去月蝕瘡添髓補中填骨久服增年

去宿食

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:39
列印頁數：1619
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熊肉味甘微寒微温無毒主風痺不仁筋急五緩若腹中有積聚寒熱羸瘦者食熊肉病永不除其脂味甘微寒治法與肉同又去頭瘍白禿面黯黯食欲嘔吐久服强志不饑輕身長年黄帝云一切諸肉煮不熟生不斂者食之成瘕熊及猪二種脂不可作燈其煙氣入人目失明不能遠視

羖羊角味酸苦温微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒泄心畏驚悸除百節中結氣及風傷蠱毒吐血婦人産後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身勿令中濕有毒髓味甘温無毒主男子女人傷中陰陽氣不足却風熱止毒利血脉益經氣以酒和服之亦可久服不損人

青羊膽汁冷無毒主諸瘡能生人身脉治青盲明目肺平補肺治嗽止渴多小便傷中止虚補不足去風邪肝補肝明目心主憂恚膈中逆氣腎補腎氣虚弱益精髓頭骨主小兒驚癇煮以浴之蹄肉平主丈夫五勞七傷

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肉味若甘大熱無毒主煖中止痛字乳餘疾及頭腦中大風汗自出虛勞寒冷能補中益氣力安心止驚利產婦不利時患人頭肉平主風眩瘦疾小兒驚癇丈夫五勞七傷其骨熱主虛勞寒中羸瘦其宿有熱者不可食生脂止下利脫肛去風毒婦人產後腹中絞痛肚主胃反治虛羸小便數止虛汗黃帝云羊肉共酢食之傷人心亦不可共生魚酪和食之害人凡一切羊蹄甲中有珠子白者名羊懸筋食之令人癲白羊黑頭食其腦作腸癰羊肚共飯飲常食久久成反胃作噎病甜粥共肚食之令人多唾喜吐清水羊腦猪腦男子食之損精氣少子若欲食者爛研如粉和醋食之然終不若不食為佳青羊肝和小豆食之令人目少明一切羊肝生共椒食之破人五臟傷心最損小兒彌忌水中柳木及白楊木不得銅器中煮殺羊肉食之丈夫損陽女子絶陰暴下後不可食羊肉髓及骨汁成煩熱難解還動利凡六畜五臟著草自動搖及得鹹酢不變色又墮地不汗又

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:40
列印頁數：1621
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

與犬犬不食者皆有毒殺人六月勿食羊肉傷人神氣
沙牛髓味甘温無毒安五臟平胃氣通十二經脉理三
膲約温骨髓補中續絶傷益氣力止泄利去消渴皆以
清酒和煖服之肝明目膽可丸百藥味苦大寒無毒除
心腹熱渴止下利去口焦燥益目精心主虚忘腎主濕
痺補腎氣益精齒主小兒牛癇肉味甘平無毒主消渴
止唾涎出安中益氣力養脾胃氣不可常食發宿病自
死者不任食喉嚨主小兒嗽也
黄犍沙牛黑牯牛尿味苦辛微温平無毒主水腫腹脚
俱滿者利小便黄帝云烏牛自死北首者食其肉害人
一切牛盛熱時卒死者總不堪食食之作腸癰患甲蹄
牛食其蹄中拒筋令人作肉刺獨肝牛肉食之殺人牛
食蛇者獨肝患瘀牛馬肉食之令人身體癢牛肉共猪
肉食之必作寸白蟲直爾黍米白酒生牛肉共食亦作
寸白蟲大忌人下利者食自死牛肉必加劇一切牛馬
乳汁及酪共生魚食之成魚瘕六畜脾人一生莫食十

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

二月勿食牛肉傷人神氣
馬心主喜忘肺主寒熱莖癒肉味辛苦平冷無毒主傷中除熱下氣長筋强腰脊壯健强志利意輕身不饑黃帝云白馬自死食其肉害人白馬玄頭食其腦令人癲白馬鞍下烏色徹肉裹者食之傷人五臟下利者食馬肉必加劇白馬青蹄肉不可食一切馬汗氣及毛不可入食中害人諸食馬肉心煩悶者飲以美酒則解白酒則劇五月勿食馬肉傷人神氣

野馬陰莖味酸鹹温無毒主男子陰癒縮少精肉辛平無毒主人馬癇筋脉不能自收周痺肌不仁病死者不任用

驢肉味酸平無毒主風狂愁憂不樂能安心氣病死者不任用其頭燒却毛煮取汁以浸麴釀酒甚治大風動摇不伏者皮膠亦治大風

狗陰莖味酸平無毒主傷中丈夫陰癒不起腦主頭風癖下部蠹瘡瘡中息肉肉味酸鹹温無毒宜腎安五臟

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

補絶傷勞損久病大虚者服之輕身益氣力黄帝云白犬合海鮀食之必得惡病白犬自死不出舌者食之害人犬春月多狂若鼻赤起而燥者此欲狂其肉不任食九月勿食犬肉傷人神氣

狗卵味甘温無毒除陰莖中痛驚癇鬼氣盡毒除寒熱貴豚五癆邪氣攣縮一名狗顛陰乾勿令敗狗肉味辛平有小毒不可久食令人徧體筋肉碎痛乏氣大猪後脚懸蹄甲無毒主五痔伏熱在腹中腸癰内蝕取酒浸半日炙焦用之四蹄小寒無毒主傷撻諸敗瘡母猪蹄寒無毒煮汁服之下乳汁甚解石藥毒大猪頭肉平無毒補虚乏氣力去驚癇鬼毒寒熱五癆腦主風眩心平無毒主驚邪憂恚虚悸氣逆婦人産後中風聚血氣驚恐腎平無毒除冷利理腎氣通膀胱肝味苦平無毒主明目猪肺微寒無毒主凍瘡痛癢肚微寒無毒補中益氣止渴斷暴利虚弱腸微寒無毒主消渴小便數補下膲虚竭其肉間脂肪平無毒主煎諸膏藥破冷結散宿

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

血解斑猫元青毒猪洞腸平無毒主洞腸挺出血多者
猳猪肉味苦酸冷無毒主狂病多日不愈凡猪肉味苦
微寒宜腎有小毒補腎氣虛竭不可久食令人少子精
發宿病弱筋骨閉血脉虛人肌有金瘡者食之瘡尤甚
猪血平澀無毒主卒下血不止美酒清者和炒服之又
主中風絶傷頭中風眩及諸淋露貴肫暴氣黄帝云凡
猪肝肺共魚鱠食之作癰疽猪肝共鯉魚腸魚子食之
傷人神狍腦損男子陽道臨房不能行事八月勿食猪
肺及粘和食之至冬發疽十月勿食猪肉損人 神氣
鹿頭肉平主消渴多夢妄見者生血治癰腫莖筋主勞
損蹄肉平主脚膝骨中疼痛不能踐地骨主内虛續絶
傷補骨可作酒髓味甘温主丈夫婦人傷中脉絶筋急
痛咳逆以酒和服腎平主補腎氣肉味苦温無毒補中
强五臟益氣力肉生者主中風口僻不正細細剉碎以
薄僻上華佗云和生椒擣薄之使一人專看正則急去
之不爾復牽向不僻處角鎊取屑一升白蜜五升漬之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

微火熬令小變色曝乾更擣篩服方寸匕日三令人輕身益氣力强骨髓補絶傷黃帝云鹿膽白者食其肉害人白鹿肉不可和蒲白作羹食發惡瘡五月勿食鹿肉傷人神氣胡居士云鹿性驚烈多別良草恒食九物餘者不嘗群處必依山岡産婦下澤饗神用其肉者以其性烈清淨故也凡餌藥之人不可食鹿肉服藥必不得力所以然者以鹿常食解毒之草是故能制毒散諸藥故也九草者葛葉花鹿蔥鹿藥白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼耳薺苨

麋骨微温無毒主虚損泄精肉味甘温無毒補益五臟髓益氣力悦澤人而麋無膽所以怯弱多驚恐黃帝云五月勿食麋肉傷人神氣

麋脂味辛温無毒主癰腫惡瘡死肌寒熱風寒濕痺四肢拘緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近男子陰令人心痛生麋肉共雉肉食之作痼疾

令癒一名宮脂十月取黃帝云生麋肉共蝦汁合食之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

虎肉味酸無毒主惡心欲嘔益氣力止多唾不可熱食
壞人齒虎頭骨治風邪眼睛主驚癇也
豹肉味酸温無毒宜腎安五臟補絶傷輕身益氣冬食
利人
狸肉温無毒補中輕身益氣亦治諸注黄帝云正月勿
食虎豹狸肉傷人神損壽
兔肝主目闇肉味辛平濇無毒補中益氣止渴兔無脾
所以能走蓋以屬二月建卯木位也木剋土故無脾焉
馬無脾亦能走也黄帝云兔肉和獺肝食之三日必成
遁尸共白雞肝心食之令人面失色一年成癉黄共薑
食變成霍亂共白雞肉食之令人血氣不行二月勿食
兔肉傷人神氣
生鼠微温無毒主蹉折續筋補骨擣薄之三日一易
獺肝味甘有小毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽皆燒作
灰酒和服之獺肉味甘温無毒主時病疫氣牛馬時行
病皆煮取汁停冷服之六畜灌之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

狐陰莖味甘平有小毒主女子絶産陰中瘕小兒陰癩
卵腫肉并五臟及腸肚味苦微寒有毒主蠱毒寒熱五
臟痼令小兒驚癇大人狂病見鬼黄帝云麝肉共鵲肉
食之作癥瘕野猪青蹄不可食及獸赤足者不可食野
獸自死北首伏地不可食獸有歧尾不可食家獸自死
頭眩丈夫陰痿甲子日勿食一切獸肉大吉鳥飛投人
共鱠汁食之作疽瘡十一月勿食經夏臭脯成水病作
不肯去者口中必有物看口中無者拔一毛放之大吉
一切禽獸自死無傷處不可食三月三日勿食鳥獸五
臟及一切果菜五辛等物大吉
丹雄雞肉味甘微温無毒主女人崩中漏下赤白沃補
虚温中能愈久傷乏瘡不瘥者通神殺惡毒黄雌雞肉
味酸鹹平無毒主傷中消渴小便數而不禁腸澼泄利
補益五臟絶傷五勞益氣力雞子黄微寒主除熱火灼
爛瘡痤可作虎魄神物卵白汁微寒主目熱赤痛除心
下伏熱止煩滿咳逆小兒泄利婦人産難胞衣不出生

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

吞之白雄雞肉味酸微温無毒下氣去狂邪安五臟傷中消渴烏雄雞肉味甘温無毒補中止心痛黑雌雞肉味甘平無毒除風寒濕痺五緩六急安胎黄帝云一切雞肉合魚肉汁食之成心瘕雞具五色者食其肉必狂字雞及野鳥死不伸足爪此種食之害人雞子白共蒜食之令人短氣雞子共鼈肉蒸食之害人雞肉獺肉共食作遁尸注藥所不能治食雞子嗽生蔥變成短氣雞肉犬肝腎共食害人生蔥共雞犬肉食令人穀道終身流血烏雞肉合鯉魚肉食生癰疽雞兔犬肉和食必泄利野雞肉共家雞子食之成遁尸尸鬼纏身四肢百節疼痛小兒五歲已下飲乳未斷者勿食雞肉二月勿食雞子令人常惡心丙午日食雞雉肉丈夫燒死目盲女人血死妄見四月勿食暴雞肉作内疽在胸腋下出漏孔丈夫少陽婦人絶孕虚勞乏氣八月勿食雞肉傷人神氣

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

雉肉酸微寒無毒補中益氣止泄利久食令人瘦喘主
蟻瘻黃帝云八月建酉日食雉肉令人短氣八月勿食
雉肉損人神氣
白鵝脂主耳卒聾消以灌耳毛主射工水毒肉味辛平
利五臟
鷺肪味甘平無毒主風虛寒熱肉補虛乏除客熱利臟
腑及水道黃帝云六月勿食鷺肉傷人神氣
鴛鴦肉味苦微温無毒主瘻瘡清酒浸之炙令熱以薄
上亦炙服之又治夢思慕者
鴈肪味甘平無毒主風攣拘急偏枯血氣不通利肉味
甘平無毒久服長髮鬢髮眉益氣不饑輕身耐暑黃帝
云六月勿食鴈肉傷人神氣
越鷰屎味辛平有毒主殺蠱毒鬼注逐不祥邪氣破五
癰利小便熬香用之治口瘡肉不可食入水爲蛟龍所
殺黃帝云十一月勿食鼠肉鷰肉損人神氣
石蜜味甘平微寒無毒主心腹邪氣驚癇瘈安五臟治

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

諸不足益氣補中止腹痛解諸藥毒除衆病和百藥養脾氣消心煩食飲不下止腸澼去肌中疼痛治口瘡聰明耳目久服强志輕身不饑耐老延年神仙一名石飴白如膏者良是今諸山崖處蜜也青赤蜜味酸噉食之令人心煩其蜂黑色似蜜黄帝云七月勿食生蜜令人絶傷除金瘡益氣力不饑耐老白蠟主久泄澼瘧後重見血者補絶傷利小兒久服輕身不饑生於蜜房或木石上惡芫花百合此即今所用蠟也

蝮蛇肉平有毒釀酒去癩疾諸九瘻心腹痛下結氣除蠆毒其腹中吞鼠平有小毒主鼠瘻

原蠶雄蛾味鹹温有小毒主益精氣强男子陽道交接不倦甚治泄精不用相連者

鯚魚味甘無毒主百病

鰻鱺魚味甘大温有毒主五痔瘻殺諸蟲

鮭魚味甘大温黑者無毒主補中養血治瘰癧五月

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五日取頭骨平無毒燒服止久利

鱓魚 鱓徒河切 平無毒主少氣吸吸足不能立地黃帝云四月勿食蛇肉鱓魚損神害氣

烏賊魚骨味鹹微温無毒主女子漏下赤白經汁並閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子驚氣入腹腹痛環臍丈夫陰中痛而腫令人有子肉味酸平無毒益氣强志

鯉魚肉味甘平無毒主咳逆上氣癰黃止渴黃帝云食桂竟食鯉魚肉害人腹中宿癥病者食鯉魚肉害人

鯽魚肉味甘平無毒主咳逆上氣癰黃止渴黃帝云食又去腸癰黃帝云魚白目不可食之魚有角食之發心

鯽魚味甘平無毒主一切瘡燒作灰和醬汁傳之日二驚害人魚無腸膽食之三年丈夫陰痿不起婦人絶孕

魚身有黑點不可食魚目赤作鱠食成瘕病作鮓食之害人一切魚共菜食之作蛔蟲蟯蟲一切魚尾食之不益人多有勾骨著人咽害人魚有角白背不可食凡魚

赤鱗不可食魚無腮不可食魚無全腮食之發癰疽鯆魚不益人其尾有毒治齒痛鯸鰊魚有毒不可食之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

二月庚寅日勿食魚大惡五月五日勿以鯉魚子共猪肝食必不消化成惡病下利者食一切魚必加劇致困難治穢飯鮓肉臭魚不可合食之害人三月勿食蛟龍肉及一切魚肉令人飲食不化發宿病傷人神氣失氣恍惚

鼈肉味甘平無毒主傷中益氣補不足療脚氣黃帝云五月五日以鼈子共鮑魚子食之作癥黃鼈腹下成王字不可食鼈肉兔肉和芥子醬食之損人鼈三足食之害人鼈肉共莧蕨菜食之作鼈瘕害人

蟹殼味酸寒有毒主胸中邪熱宿結痛喝僻面腫散榛燒之致鼠其黃解結散血愈榛瘡養筋益氣黃帝云蟹目相向足斑者食之害人十二月勿食蟹損人神氣又云龜鼈肉共猪肉食之害人秋果菜共龜肉食之令人短氣飲酒食龜肉并菰白菜令人生寒熱六甲日勿食龜鼈害人心神螺蚌共菜食之令人心痛三日一發蝦鱠共猪肉食之令人常惡心多唾損精色蝦無鬚腹

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下通烏色者食之害人大忌勿輕十一月十二月勿食
蝦蚌著甲之物

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:46
列印頁數：1634
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷八十一至三

詳校官太醫院醫正姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣胡紹基

謄録監生臣李維瀛

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷八十一　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

養性

養性序第一

扁鵲云黃帝說晝夜漏下水百刻凡一刻人百三十五息十刻一千三百五十息百刻一萬三千五百息人之居世數息之間信哉嗚呼昔人嘆逝何可不爲善以自補邪吾常思一日一夜有十二時十日十夜百二十時百日百夜一千二百時千日千夜一萬二千時萬日萬夜一十二萬時此爲三十年若長壽者九十年只得三十六萬時百年之内斯須之間數時之活朝菌蟪蛄不足爲喻焉可不自攝養而馳騁六情孜孜汲汲追名逐利千詐萬巧以求虛譽沒齒而無厭故養性者知其如此於名於利若存若亡於非名非利亦若存若亡所以沒身不殆也余慨時俗之多僻皆放逸以殞亡聊因暇

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:47
列印頁數：1636
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

日粗述養性篇用奬人倫之道好事君子與我同志焉夫養性者欲所習以成性性自爲善不習無不利也性既自善内外百病自然不生禍亂災害亦無由作此養性之大經也善養性者則治未病之病是其義也故養性者不但餌藥餐霞其在兼於百行百行周備雖絶藥餌足以遐年德行不充縱服玉液金丹未能延壽故老子曰善攝生者陸行不遇虎兕此則道德之指也豈假服餌而祈遐年哉聖人所以制藥餌者以救過行之人也故危者抱病歷年而不修一行纏痾沒齒終無悔心此其所以岐和長逝彭跗永歸良有以也嵇康曰養生有五難名利不去爲一難喜怒不除爲二難聲色不去爲三難滋味不絶爲四難神慮精散爲五難五者必存雖心希難老口誦至言咀嚼英華呼吸太陽不能不迴其操不夭其年也五者無於胸中則信順日躋道德日全不祈善而有福不求壽而自延此養生之大旨也然或有服膺仁義無甚泰之累者抑亦其亞歟

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃帝問於岐伯曰余聞上古之人春秋皆度百歲而動作不衰今時之人年至半百而動作皆衰者時代異邪將人失之也岐伯曰上古之人其知道者法則陰陽和於術數飲食有常節起居有常度不妄作勞故能形與神俱而盡終其天年度百歲乃去今時之人則不然以酒為漿以妄為常醉以入房以欲竭其精以耗散其真不知持滿不時御神務快其心逆於生樂起居無節故半百而衰也夫上古聖人之教也下皆為之虛邪賊風避之有時恬澹虛無眞氣從之精神守内病安從來是以其志閑而少欲其心安而不懼其形勞而不倦氣從以順各從其欲皆得所願故甘其食美其服（素問作美其食任其服）樂其俗高下不相慕故其民曰朴是以嗜欲不能勞其目淫邪不能惑其心愚智賢不肖不懼於物合於道數故皆能度百歲而動作不衰者其德全不危也是以人之壽夭在於撙節若消息得所則長生不死恣其情慾則命同朝露也岐伯曰人年四十而陰氣自半也起

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

居衰矣年五十體重耳目不聰明也年六十陰痿氣力大衰九竅不利下虛上實涕泣俱出故曰知之則强不知則老同出名異智者察同愚者察異愚者不足智者有餘有餘則耳目聰明身體輕强年老復壯壯者益理是以聖人為無為之事樂恬澹之味能縱欲快志得虛無之守故壽命無窮與天地俱生萬物以榮夜臥早起廣步於庭被髮緩形以使志生生而勿殺與而勿奪賞而勿罰此春氣之應養生之道也逆之則傷肝夏為寒為變則奉長者少

夏三月此謂蕃秀天地氣交萬物華實夜臥早起毋厭於日使志無怒使華英成秀使氣得泄若所愛在外此夏氣之應養長之道也逆之則傷心秋為瘧瘧則奉收者少冬至重病

秋三月此謂容平天氣以急地氣以明早臥早起與雞俱興使志安寧以緩秋刑收斂神氣使秋氣平毋外其

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:49
列印頁數：1639
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

志使肺氣清此秋氣之應養收之道也逆之則傷肺冬為餐泄則奉藏者少

冬三月此謂閉藏水冰地坼無擾乎陽早臥晚起必待日光使志若伏若匿若有私意若已有得去寒就温毋泄皮膚使氣亟奪此冬氣之應養藏之道也逆之則傷腎春為痿厥則奉生者少

天有四時五行以生長收藏以寒暑燥濕風人有五臟化為五氣以生喜怒悲憂恐故喜怒傷氣寒暑傷形暴怒傷陰暴喜傷陽故喜怒不節寒暑失度生乃不固人能依時攝養故得免其夭枉也

仲長統曰王侯之宮美女兼千卿士之家侍妾數百晝則以醇酒淋其骨髓夜則房室輸其血氣耳聽淫聲目樂邪色醼内不出遊外不返王公得之於上豪傑馳之於下及至生産不時字育太早或童孺而擅氣或疾病而搆精精氣薄惡血脉不充既出胞藏養護無法又蒸之以綿纊爍之以五味胎傷孩病而脆未及堅剛復縱

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:49
列印頁數：1640
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

情欲重重相生病病相孕國無良醫醫無審術姦佐其間過謬常有會有一疾莫能自免當今少百歲之人者豈非所習不純正也抱朴子曰或問所謂傷之者豈色欲之間乎答曰亦何獨斯哉然長生之要其在房中上士知之可以延年除病其次不以自伐若年當少壯而知還陰丹以補腦采七益於長俗一作谷者不服藥物不失一二百歲也但不得仙耳不得其術者古人方之於凌杯以盛湯羽苞之蓄火又且才所不逮而强思之傷也力所不勝而强舉之傷也深憂重恚傷也悲哀憔悴傷也喜怒過度傷也汲汲所欲傷也戚戚所患傷也从談言笑傷也寢息失時傷也挽弓引弩傷也沈醉嘔吐傷也飽食即臥傷也跳走喘乏傷也懽呼哭泣傷也陰陽不交傷也積傷至盡盡則早亡盡則非道也是以養性之士唾不至遠行不疾步耳不極聽目不極視坐不从處立不至疲臥不至懻先寒而衣先熱而解不欲極饑而食食不可過飽不欲極渴而飲飲不欲過多飽食

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

過多則結積聚渴飲過多則成痰澼不欲甚勞不欲甚佚不欲流汗不欲多唾不欲奔走車馬不欲極目遠望不欲多啖生冷不欲飲酒當風不欲數數沐浴不欲廣志遠願不得規造異巧冬不欲極温夏不欲窮涼不欲露臥星月不欲眠中用扇大寒大熱大風大霧皆不欲則傷肝鹹多則傷心甘多則傷腎此五味尅五臟五行自然之理也凡言傷者亦不即覺也謂久即損壽耳是胃之五味不欲偏多故酸多則傷脾苦多則傷肺辛多以善攝生者臥起有四時之早晚興居有至和之常制調利筋骨有偃仰之方祛疾閑邪有吐納之術流行榮衛有補瀉之法節宣勞佚有與奪之要忍怒以全陰抑喜以養陽然後先服草木以救虧缺後服金丹以定無窮養性之理盡於此矣夫欲快意任懷自謂達識知命不泥異端極性肆力不勞持久者聞此言也雖風之過耳電之經目不足喻也雖身枯於留連之中氣絶於綺紈之際而甘心焉亦安可告之以養性之事哉匪惟不

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

納乃謂妖訛也而望彼信之所謂以明鑒給朦瞽以絲竹娛聾夫者也

魏武與皇甫隆令曰聞卿年出百歲而體力不衰耳目聰明顏色和悅此盛事也所服食施行導引可得聞乎隆上疏對曰臣聞天地之性惟人為貴人之所貴莫貴於生唐荒無始劫運無窮人生其間忽如電過每一思此罔然心熱生不再來逝不可追何不抑情養性以自保惜今四海垂定太平之際又當須展才布德當由萬年萬年無窮當由修道道甚易知但莫能行臣嘗聞道人蒯京已年一百七十八而甚丁壯言人當朝朝服食玉泉琢齒使人丁壯有顏色去三蟲而堅齒玉泉者口中唾也朝旦未起早漱津令滿口乃吞之琢齒二七遍如此者乃名曰練精

嵇康云穰歲多病饑年少疾信哉不虛是以關中土地俗好儉膏厨膳餚羞不過葅醬而已其人少病而壽江南嶺表其處饒足海陸鮭餚無所不備土俗多疾而人

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

早夭北方仕子遊宦至彼遇其豐贍以為福祐所臻是
以尊卑長幼恣口食噉夜長醉飽四體熱悶赤露眠臥
宿食不消未逾期月大小皆病或患霍亂脚氣脹滿或
寒熱瘧痢惡核丁腫或癰疽瘡痔漏或偏風猥退不知醫
療以至於死凡如此者比肩皆是惟云不習水土都不
知病之所由靜言思之可為太息者也學者先須識此
以自誡愼

抱朴子曰一人之身一國之象也胷腹之位猶宮室也
四肢之列猶郊境也骨節之分猶百官也神猶君也血
猶臣也氣猶民也知治身則能治國也夫愛其民所以
安其國惜其氣所以全其身民散則國亡氣竭則身死
死者不可生也亡者不可存也是以至人消未起之患
治未病之疾醫之於無事之前不追於既逝之後夫人
難養而易危也氣難清而易濁也故能審威德所以保
社稷割嗜欲所以固血氣然後眞一存焉三一守焉百
病却焉年壽延焉

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:52
列印頁數：1644
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

道林養性第二

眞人曰雖常服餌而不知養性之術亦難以長生也養性之道常欲小勞但莫大疲及强所不能堪耳且流水不腐户樞不蠹以其運動故也養性之道莫久行久立久坐久臥久視久聽蓋以久視傷血久臥傷氣久立傷骨久坐傷肉久行傷筋也仍莫强食莫强酒莫强舉重勿汲汲於所欲勿悁悁懷忿恨皆損壽命若能不犯者則得長生也故善攝生者常少思少念少慾少事少語少笑少愁少樂少喜少怒少好少惡行此十二少者養性之都契也多思則神殆多念則志散多慾則志昏多事則形勞多語則氣乏多笑則臟傷多愁則心懾多樂則意溢多喜則忘錯昏亂多怒則百脉不定多好則專迷不理多惡則憔悴無懽此十二多不除則榮衛失度血氣妄行喪生之本也惟無多無少者幾於道矣是知勿外緣者眞人初學道之法也若能如此者可居瘟疫

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:52
列印頁數：1645
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

之中無憂疑矣既屏外緣會須守五神肝心脾肺腎從四正言行坐立言最不得浮思妄念心想欲事惡邪大起故孔子曰思無邪也常當習黃帝内視法存想思念令見五臟如懸磬五色了了分明勿輟也仍於每旦初起面向午展兩手於膝上心眼觀氣上入頂下達涌泉旦旦如此名曰迎氣常以鼻引氣口吐氣小微吐之不得開口復欲得出氣少入氣多每欲食送氣入腹每欲食氣為主人也凡心有所愛不用深愛心有所憎不用深憎並皆損性傷神亦不用深讚亦不用深毀常須運心於物平等如覺偏頗尋改正之居貧勿謂常貧居富莫謂常富居貧富之中常須守道勿以貧富易志改性識達道理似不能言有大功德勿自矜伐美藥勿離手善言勿離口亂想勿經心常以深心至誠恭敬於物慎勿詐善以悅於人終身為善為人所嫌勿得起恨事君盡禮人以為諂當以道自平其心道之所在其德不孤勿言行善不得善報以自怨仇居處勿令心有不足若有不足則

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

自抑之勿令得起人知止足天遺其禄所至之處勿得多求多求則心自疲而志苦若夫人之所以多病當由不能養性平康之日謂言常然縱情恣慾心所欲得則便為之不拘禁忌欺罔幽明無所不作自言適性不知過後一一皆為病本及兩手摸空白汗流出口唱皇天時内省身心則自知見行之中皆畏諸痾將知四百四無所逮及皆以生平粗心不能自察一至於此但能少病身手自造本非由天及一朝病發和緩不救方更誹謗醫藥無效神仙無靈故有智之人愛惜性命者當自思念深生恥愧誠勒身心常修善事也至於居處不得綺靡華麗令人貪婪無厭乃患害之源但令雅素淨潔無風雨暑濕為佳衣服器械勿用珍玉金寶增長過失使人煩惱根深厨膳勿使脯肉豐盈常令儉約為佳然後行作鵝王步語作含鍾聲眠作獅子臥（右脚脇著地坐脚也）每日自詠歌云美食須熟嚼生食不粗吞問我居止處大宅總林村胎息守五臟氣至骨成仙又歌曰日食三箇

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

毒不嚼而自消錦繡為五臟身著糞掃袍修心既平又須愼言語凡言語讀誦常想聲在氣海中臍下也每日初入後勿言語讀誦寧待平旦也旦起欲專言善事不欲先計校錢財又食上不得平旦也旦起欲專言善事不欲不用寢臥多言笑寢不得語言者言五臟如鐘磬不懸則不可發聲行不得語若欲語須住脚乃語行語則令人失氣冬至日止可語不可言自言曰言答人曰語言有人來問不可不答自不可發言也仍勿觸冷開口大語為佳言語既愼仍節飲食是以善養性者先饑而食先渴而飲食欲數而少不欲頓而多則難消也常欲令如飽中饑饑中飽耳蓋飽則傷肺饑則傷氣鹹則傷筋酸則傷骨故每學淡食食當熟嚼使米脂入腹勿使酒脂入腸人之當食須去煩惱暴數為煩惱侵觸為惱如食五味必不得暴嗔多令人神驚夜夢飛揚每食不用重肉喜生百病常須少食肉多食飯及少葅菜并勿食生菜生米小豆陳臭物勿飲濁酒食麪使塞氣孔勿食生肉傷胃一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

切肉惟須煮爛停冷食之食畢當漱口數過令人牙齒不敗口香熱食訖以冷酢漿漱口者令人口氣常臭作鑞齒病又諸熱食鹹物後不得飲冷酢漿水喜失聲成尸咽凡熱食汗出勿當風發瘂頭痛令人目澀多睡每食訖以手摩面及腹令津液通流食畢當行步躊躇計大益人令人能飲食無百病然後有所修為為快也飽使中數里來行畢使人以粉摩腹上數百遍則食易消食即臥乃生百病不消成積聚飽食仰臥成氣瘕作頭風觸寒來者寒未解食熱食成刺風人不得夜食又云夜勿過醉飽食勿精思為勞苦事有損餘虛損人常須日在巳時食訖則不須飲酒終身無乾嘔勿食父母本身所屬肉令人命不長勿食自己本命所屬肉令人魂魄飛揚勿食一切腦大損人茅屋漏水墮諸脯肉上食之成瘕約暴肉作脯不肯乾者凡乾字舊本並作干害人祭神肉無故自動食之害人飲食上蜂行住食之必有毒害人腹內有宿病勿食陵鯉魚肉害人濕食及酒漿臨上看

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

視不見人物影者勿食之成卒注若已食腹脹者急以藥下之每十日一食葵葵滑所以通五臟擁氣又是菜之主不用合心食之又飲酒不欲使多多則速吐之為佳勿令至醉即終身百病不除从飲酒者腐爛腸胃漬髓蒸筋傷神損壽醉不可以當風向陽令人發狂又不可當風臥不可令人扇凉皆即得病也醉不可露臥及臥黍穰中發癩瘡醉不可强食或發癰疽或發瘡或生瘡醉飽不可以走車馬及跳躑醉不可以接房醉飽交接小者面黑咳嗽大者傷絶臟脉損命凡人饑欲坐小便若飽則立小便愼之無病又忍尿不便膝冷成痺忍大便不出成氣痔小便勿努令兩足及膝冷大便不用呼氣及强努令人腰疼目澀宜任之佳凡遇山水鴈中出泉者不可从居常食作癭病又深陰地冷水不可飲必作痰癚飲食以調時愼脱著凡人旦起著衣反者便著之吉衣光者當户三振之曰殃去吉濕衣及汗衣皆不可从著令人發瘡及風瘙大汗能易衣佳不易者急

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

洗之不爾令人小便不利凡大汗勿偏脫衣喜得偏風半身不遂春天不可薄衣令人傷寒霍亂食不消頭痛脫著既時須調寢處凡人臥春夏向東秋冬向西頭勿北臥及墻北亦勿安牀凡欲眠勿歌詠不祥起上牀坐先脫左足臥勿當舍脊下臥訖勿留燈燃令魂魄及六神不安多愁怨人頭邊勿安火爐日以引火氣頭重目赤睛及鼻乾夜臥當耳勿有孔吹人即耳聾夏不用露面臥令人面皮厚喜成癬或作面風冬夜勿覆頭得長壽凡人眠勿以脚懸踏高處以成腎水及損房足冷人每見十步直墻勿順墻臥風利吹人發癲及體重人汗勿跂牀懸脚以成血痺兩足重腰疼又不得晝眠令人失氣臥勿大語損人氣力暮臥常習閉口口開即失氣且邪惡從口入以而成消渴及失血色屈膝側臥益人氣力勝正偃臥按孔子不尸臥故曰睡不厭跼覺不厭舒凡人野睡則有鬼痛魔邪凡眠先臥心後臥眼人臥一夜當作五度反覆常逐更轉凡人夜魘勿然燈喚之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

定死無疑閻喚之吉亦不得近前急喚夜夢惡不須說旦以水面東方噀之呪曰惡夢著草木好夢成寶王即無咎矣又夢之善惡並勿說為吉衣食寢處皆適能順時氣者始盡養生之道故善攝生者無犯日月之忌晦無失歲時之和須知一日之忌暮無飽食一月之忌暮無大醉一歲之忌暮無遠行終身之忌暮無然燭行房暮嘗護氣也凡氣冬至起於涌泉十一月至膝十二月至股正月至腰名三陽成二月至膊三月至項四月至頂純陽用事陰亦倣此故四月十月不得入房避陰陽純用事之月也每冬至日於北壁下厚鋪草而臥云受元氣每八月一日已後即微火煖足勿令下冷無生意常欲使氣在下不欲泄於上春凍未泮衣欲下厚上薄養陽收陰繼世長生養陰收陽禍則滅門故云冬時天地氣閉血氣伏藏人不可作勞出汗發泄陽氣有損於人也又云冬日凍腦春秋腦足俱凍此聖人之常法也春欲晏臥早起夏及秋欲侵夜乃臥早起冬欲早臥而晏

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:56
列印頁數：1652
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

起皆益人雖云早起莫在鷄鳴前雖言晏起莫在日出後凡冬月忽有大熱之時夏月忽有大凉之時皆勿受之人有患天行時氣者皆由犯此也即須調氣息使寒熱平和即免患也每當臘日勿歌舞犯者必凶常於正月寅日燒白髮吉凡寅日剪手甲午日剪足甲又燒白髮吉

居處法第三

凡人居止之室必須周密勿令有細隙致有風氣得入小覺有風勿强忍从坐必須急急避之从居不覺使人中風古來忽得偏風四肢不隨或如角弓反張或失音不語者皆由忽此耳身既中風諸病總集邪氣得便遭此致卒者十中有九是以大須周密無得輕之愼焉愼焉所居之室勿塞井及水瀆令人聾盲凡在家及外行卒逢大飄風暴雨震電昏暗大霧此皆是諸龍鬼神行動經過所致宜入室閉户燒香静坐安心以避之待過後乃出不爾損人或當時雖未苦於後

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不佳矣又陰霧中亦不可遠行

凡家中有經像行來先拜之然後拜尊長每行至則峻坐焉

凡居家不欲數沐浴若沐浴必須密室不得大熱亦不得大冷皆生百病冬浴不必汗出霢霂沐浴後不得觸風冷新沐髮訖勿當風勿濕縈髻勿濕頭臥使人頭風眩悶髮禿面黑齒痛耳聾頭生白屑饑忌浴飽忌沐沐訖須進少許食飲乃出夜沐髮不食即臥令人心虛饒汗多夢又夫妻不用同日沐浴常以晦日浴朔日沐吉凡炊湯經宿用洗體成癬洗面無光洗脚即疼痛作甑畦瘡熱泔洗頭冷水濯之作頭風飲水沐頭亦作頭風時行病新汗解勿冷水洗浴損心包不能復

凡居家常戒約内外長幼有不快即須早道勿使隱忍以為無若過時不知便為重病遂成不救小有不好即按摩捺捺令百節通利泄其邪氣凡人無問有事無事常須日別蹋脊背四肢一度頭項若令熟蹋即風氣時

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

行不能侵人此大要妙不可具論

凡人居家及遠行隨身常有熟艾一升備急丸辟鬼丸

生肌藥甘濕藥丁腫藥水銀大黃芒硝甘草乾薑桂心

蜀椒不能更蓄餘藥此等常不可闕少及一兩卷百一

備急藥方並帶辟毒蛇蜂蝎等藥隨身也

凡人自覺十日已上康健即須灸三數穴以洩風氣每

日必須調氣補瀉按摩導引為佳勿以康健便為常然

常須安不忘危預防諸病也灸法當須避人神人神禁忌法在中天行時氣也

第二十九卷中 凡畜手力細累春秋皆須與轉瀉藥一度則不

備急千金要方卷八十一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷八十二　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

養性

按摩法第四

天竺國按摩此是婆羅門法

兩手相捉紐捩如洗手法　兩手淺相叉翻覆向胷

兩手相捉共按膝左右同　以手如挽五石力弓左右

同

兩手相重按膝徐徐捩身左右同

作拳向前築左右同　作拳却頓此是開胷左右

同　以手反搥背上左右同

如拓石法左右同

兩手據地縮身曲脊向上三舉

兩手抱頭宛轉膝上此是抽脅

大坐斜身偏欹如排山左右同

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:58
列印頁數：1656
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大坐伸兩脚即以一脚向前虚掣左右同

兩手拒地廻顧此是虎視法左右同

立地反拗身三舉

兩手急相义以脚踏手中左右同

起立以脚前後虚踏左右同

大坐伸兩脚用當相手勾所伸脚著膝中以手按之左右同

右同

右十八勢但是老人日別能依此三遍者一月後百病除行及奔馬補益延年能食眼明輕健不復疲乏

老子按摩法

兩手搽脞左右捩身二七遍

兩手捻脞左右紐肩二七遍

兩手抱頭左右紐腰二七遍

左右挑頭二七遍

兩手托頭三舉之

一手抱頭一手托膝三折左右同

一手托頭一手托膝從下向上三遍左右同

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

兩手攀頭下向三頓足　兩手相捉頭上過左右三遍　兩手相乂托心前推却挽三遍　兩手相乂著心三遍　曲腕築肋挽肘左右亦三遍　舒手挽項左右三遍　左右挽前後扳各三遍　反手著膝手挽肘覆手著膝上左右亦三遍　手摸肩從上至下使遍左右同　兩手空拳築三遍　兩手相乂反覆攪各七遍　外振手三遍內振三遍覆手振亦三遍　摩紐指三遍　兩手反搖三遍　兩手反乂上下紐肘無數單用十呼　兩手上聳三遍　兩手下頓三遍　兩手相乂頭上過左右申肋十遍　兩手拳反背上掘脊上下亦三遍（掘揩之也）　兩手反捉上下直脊三遍　覆掌搦腕內外振三遍

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

覆掌前聳三遍
覆掌兩手相义交横三遍
覆掌横直即聳三遍
若有手患冷從上打至下得熱便休
舒左脚右手承之左手捺脚聳上至下直脚三遍右手捺脚亦爾
左捩足右捩足各三遍
前後捩足三遍
直脚三遍
紐膝三遍
内外振脚三遍
若有脚患冷者打熱便休
紐膝以意多少頓脚三遍
虎據左右紐肩三遍
左右排山負山扳木各三遍
舒手直前頓申手三遍
舒兩手兩膝亦各三遍
舒脚直反頓申手三遍
推天托地左右三遍
却直脚三遍
捩内脊外脊各三遍

調氣法第五

彭祖曰道不在煩但能不思衣食不思聲色不思勝負不思榮辱心無煩形勿極而兼之

列印日期/時間：02/04/2005 18:50:59
列印頁數：1659
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以導引行氣不已亦可得長年千歲不死凡人不可無思當以漸遣除之彭祖曰和神導炁養道當得密室閉户安牀煖席枕高二寸半正身偃臥瞑目閉氣於胸膈中以鴻毛著鼻上而不動經三百息耳無所聞目無所見心無所思如此則寒暑不能侵蜂蠆不能毒壽三百六十歲此隣於眞人也每旦夕 旦夕者足陰陽轉換之時凡旦五更初煖氣至頻頻眼閉是上生氣至氣至凜凜然時乃至牀坐睡倒是下生氣至名曰陽消而陰息旦五更初煖氣至名曰陽息而陰消暮日入後冷氣至暮日入後冷氣至凜凜然時乃至牀坐睡倒是下生氣至名曰陽消地日月山川河海人畜草木一切萬物體中代謝往來無時休息進退如晝夜之更迭如海水之潮汐是天地消息之道也面向午展兩手於脚膝上徐徐按捺肢節口吐濁氣鼻引清氣 凡吐者去故氣亦名死氣納者取新氣亦名生氣故老子經云玄牝之門天地之根綿綿若存時之不勤言口鼻天地之間可以出納陰陽死生之氣也良久徐徐乃以手左托右托上托下托前托後托瞋目張口叩齒摩眼按頭抌耳挽髮放腰咳嗽發揚振動也雙作隻作反手為之然後掣足仰振數八十九十而止仰下徐徐定心作禪觀之法閉目存思想見空中太和元氣如紫雲成蓋五色分明下入毛際漸漸入

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

頂如雨初晴雲入山透皮入肉至骨至腦漸漸下入腹中四肢五臟皆受其潤如水滲入地若徹則覺腹中有聲汩汩然意專思存不得外緣斯須即覺元氣達於氣海須臾則自達於涌泉則覺身體振動兩脚蹉曲亦令人食美氣力強健百病皆去五年十歲長存不忘得滿千萬通則去仙不遠矣人身虛無但有遊氣氣息得理通五通則身體悅懌面色光輝鬢毛潤澤耳目精明令牀坐有聲拉拉然則名一通一通二通乃至日別得三即百病不生若消息失宜即諸痾競起善攝養者須知調氣方焉調氣方療萬病大患百日生眉鬚自餘者不足言也

凡調氣之法夜半後日中前氣生得調日中後夜半前氣死不得調調氣之時則仰臥牀鋪厚輭枕高下共身平舒手展脚兩手握大拇指節去身四五寸兩脚相去四五寸數數叩齒飲玉漿引氣從鼻入腹足則停上有力更取以住氣悶從口細細吐出盡遠從鼻細細引入

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:01
列印頁數：1661
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

出氣一准前法閉口以心中數數令耳不聞恐有誤亂兼以手下籌能至千則去仙不遠矣若天陰霧惡風猛寒勿取氣也但閉之

若患寒熱及卒患癰疽不問日中疾患未發前一食間即調如其不得好瘥明日依式更調之

若患心冷病氣即呼出若熱病氣即吹出若肺病即噓出若肝病即呵出若脾病即唏出若腎病即咽出夜半後八十一鷄鳴七十二平旦六十二日出五十四辰時四十五巳時三十六欲作此法先左右導引三百六十遍病有四種一冷痺二氣疾三邪風四熱毒若有患者安心調氣此法無有不瘥也

凡百病不離五臟五臟各有八十一種疾冷熱風氣計成四百四病事須識其相類善以知之

心臟病者體冷熱相法心色赤患者夢中見人著赤衣持赤刀杖火來怖人療法用呼吹二氣呼療冷吹治熱

肺臟病者胷背滿脹四肢煩悶相法肺色白患者喜夢

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

見美女美男詐親附人共相抱持或作父母兄弟妻子
療法用噓氣出
肝臟病者憂愁不樂悲思喜頭眼疼痛相法肝色青夢
見人著青衣捉青刀杖或獅子虎狼來恐怖人療法用
呵氣出
脾臟病者體上遊風習習偏身痛煩悶相法脾色黃通
土色夢或作小兒擊歷人邪猶人或如旋風圍圞轉治
法用唏氣出
腎臟病者體冷陰衰面目惡瘥相法腎色黑夢見黑衣
及獸物捉刀杖相怖用呬氣出
冷病者用大呼三十遍細呼十遍呼法鼻中引氣入口
中吐氣出當令聲相逐呼字而吐之熱病者用大吹五
十遍細吹十遍吹如吹吹物之吹當使字氣聲似字肺病
者用大噓三十遍細噓十遍肝病者用大呵三十遍細
呵十遍脾病者用大唏三十遍細唏十遍腎病者用大
呬四五十遍細呬三十遍此十二種調氣法若有病依此

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:02
列印頁數：1663
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

法恭敬用心無有不瘥皆須左右導引三百六十遍然後乃為之

服食法第六 方論

論曰凡人春服小續命湯五劑及諸補散各一劑夏大熱則服腎瀝湯三劑秋服黃耆等丸一兩劑冬服藥酒兩三劑立春日則止此法終身常爾則百病不生矣俗人見淺但知鉤吻之殺人不信黃精之益壽但識五穀之療饑不知百藥之濟命但解施瀉以生育不能閉固以頤養故有服餌方焉郤惜曰夫欲服食當尋性理所宜審冷煖之適不可見彼得力我便服之初御藥皆先草木次石是為將藥之大較也所謂精粗相代階粗以至精者也夫人從少至長體習五穀卒不可一朝頓遺之凡服藥物為益遲微則無充饑之驗然積年不已方能骨髓填實五穀居然而自斷今人多望朝夕之效求目下之應腑臟未充便以絕粒穀氣始除藥未有用又將御女形神與俗無別以此致奬胡不怪哉服餌大體

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

皆有次第不知其術者非止交有所損卒亦不得其力故服餌大法必先去三蟲三蟲既去次服草藥好得藥力次服木藥好得力訖次服石藥依此次第乃得遂其藥性庶事安穩可以延齡矣

去三蟲圓方

生地黃汁三斗東向竈葦火煎三沸內清漆二升以荊匕攪之日移一尺內眞丹三兩復移一尺內瓜子末三升復移一尺內大黃末三兩微火勿令焦候可丸丸如梧子大先食服一丸日三濁血下鼻中三十日諸蟲皆下五十日百病愈面色有光澤

又方

漆 二升
蕪菁子 三升末
大黃 六兩末
酒 一升半

右四味以微火合煎令可丸如梧子大先食服三丸十日濁血下出鼻中三十日蟲皆爛下五十日身光澤一年行及奔馬消息四體安穩乃可服草藥其餘

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:02
列印頁數：1665
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

法在三蟲篇中備述第十方見四卷中

服天門冬方

天門冬曝乾擣下篩食後服方寸匕日三可至十服

小兒服尤良與松以若蜜丸服之益善惟多彌佳

又方擣取汁微火煎取五斗下白蜜一斗胡麻炒末二升合煎攪勿息手可丸即止火下大豆黃末和為餅徑三寸厚半寸一服一枚日三百日已上得益此方最上妙包衆方一法釀酒服始傷多無苦多即吐去病也

病也 前道人年近二百而少常告皇甫隆云但取天門冬去心皮切乾之酒服方寸匕日三令人不老補中益氣愈百病也天門冬生奉高山谷在東嶽名淫羊食在中嶽名天門冬在西嶽名管松在南嶽名百部在北嶽名無不愈在原陸山阜名顛棘雖然處處有之異名其實一也在北陰地者佳取細切烈日乾之久服令人長生氣力百倍治虛勞絶傷年老衰損羸瘦偏枯不隨風濕不仁冷痺心腹積聚

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:03
列印頁數：1666
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

惡瘡癰疽腫癩疾重者周身膿壞鼻柱敗爛服之皮脫蟲出顏色肥白此無所不治亦治陰痿耳聾目暗从服白髮黑齒落生延年益命入水不濡服二百日後恬泰疾損拘急者緩羸劣者强三百日身輕三年走及奔馬又三年心腹痼疾皆去

服地黃方

生地黃五十斤熟擣絞取汁澄去滓微火上煎減過半内白蜜五升棗脂一升攪令相得可丸乃止每服如雞子一枚日三令人肥白

又方地黃十斤細切以醇酒二斗漬三宿出曝乾反復内漬取酒盡止與甘草巴戟天厚朴乾漆覆盆子各一斤擣下篩食後酒服方寸匕日三加至二匕使人老者還少强力無病延年

作熟乾地黃法

採地黃去其鬚葉及細根擣絞取汁以漬肥者著甑中土若米無在已蓋上蒸之一時出曝燥更内汁中

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又蒸汁盡止便乾之亦可直切蒸之半日數以酒灑之使周匝至夕出曝乾可擣蜜丸服之

種地黃法

先擇好地黃赤色虛軟者深耕之臘月逆耕凍地彌好擇肥大好地黃根切長四五分至一二寸許一斛可種一畝二三月種之作畦畔相去一尺生後隨鋤壅數耘之至九月十月視其葉小衰乃掘取一畝得二十許斛擇取大根水淨洗其細根乃剪頭尾輩亦洗取之日曝令極燥小腘乃以竹刀切長寸餘許白茅露甑下蒸之密蓋上亦可囊盛土填之從旦至暮當黑不盡黑者明日又擇取蒸之先時已擣其細碎者取汁銅器煎之如薄飴遂以地黃内汁中周帀出曝乾又内汁盡止率百斤生者令得一二十斤取初八月九月中掘者其根勿令大老强蒸則不消盡有筋脉初以地黃内甑中時先用銅器承其下以好酒淋地黃上令帀汁後下入器中取以併和煎汁佳

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃精膏方

黃精一石去鬚毛洗令淨潔打碎蒸令好熟壓得汁復煎去上遊水得一斗內乾薑末三兩桂心末一兩微火煎看色鬱鬱然欲黃便去火待冷盛不津器中酒五合和服二合當未食前日二服舊皮脫顏色變光花色有異鬢髮更改欲長服者不須和酒內生大豆黃絶穀食之不饑渴長生不老

服烏麻法

取黑皮眞檀色者烏麻隨多少水拌令潤勿過濕蒸令氣徧即出曝乾如此九蒸九濤去上皮未食前和水若酒服二方寸匕日三漸漸不饑絶穀久服百病不生常服延年不老

餌栢實方

栢子仁二升擣令細醇酒四升漬攪如泥下白蜜二升棗膏三升擣令可丸入乾地黃末白朮末各一升攪和丸如梧子每服三十丸日二服二十日萬病皆

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

愈

餌松子方

七月七日採松子過時即落不可得治服方寸匕日三四一云一服三合百日身輕二百日行五百里絶穀服昇仙渴飲水亦可和脂服之若丸如梧桐子大服十丸

服松脂方

百鍊松脂下篩以蜜和内筒中勿令中風日服如博棊子一枚博棊長二寸方一寸日三漸漸月別服一斤不饑延年亦可淳酒和白蜜如餳日服一二兩至半斤凡取松脂老松皮自有聚脂者最第一其根下有傷折處不見日月者得之名曰陰脂彌良惟衡山東行五百里有大松皆三四十圍乃多脂又法五月刻大松陽面使向下二十四株株可得半升亦煮其老節根處有脂得用仙經云常以三月入衡山之陰取不見日月松脂鍊而餌之即不召而自來服之百日耐寒暑

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:05
列印頁數：1670
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

二百日五臟補益服之五年即見西王母仙經又云諸石所生三百六十五山其可食者滿谷陰懷中松脂耳其谷正從衡山嶺直東四百八十里當橫捷正在橫嶺東北行過其南入谷五十里窮穴有石城白鶴其東方有大石四十餘丈狀如白松松下二丈有小穴東入山有丹砂可食其南方陰中有大松大三十餘圍有三十餘株不見日月皆可取服之

採松脂法

以日入時破其陰以取其膏破其陽以取其脂脂膏等分食之可以通神靈鑒其陰陽為孔令方五寸深五寸還以皮掩其孔無令風入風入則不可服以春夏時取之取訖封塞勿泄以泥塗之東北行丹砂穴有陰泉水可飲此弘農車君以元封元年入此山食松脂十六年復下居長安東市在上谷牛頭谷時往來至秦嶺上年常如三十者

鍊松脂法

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

松脂七斤以桑灰汁一石煮脂三沸接置冷水中凝復煮之凡十遍脂白矣可服今谷在衡州東南攸縣界此松脂與天下松脂不同

餌茯苓方

茯苓十斤去皮酒漬密封下十五日出之取服如博棊日三亦可屑服方寸匕凡餌茯苓皆湯煮四五沸或以水漬六七日

茯苓酥方

茯苓 五斤灰汁煮十遍漿水煮十遍清水煮十遍

松脂 五斤煮如茯苓法每次煮四十遍

白蜜 三斤煎令沫盡蠟

生天門冬 五斤去心皮曝乾作末

牛酥 各三斤練三十遍

右六味各擣篩以銅器重湯上先內酥次蠟次蜜消訖內藥急攪勿住手務令大均內甕器中密封勿令泄氣先一日不食欲不食先須喫好美食令極飽然後絶食即服二兩二十日後服四兩又二十日後八兩細丸之以咽中下為度第二度以四兩為初二十

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

日後八兩又二十日二兩第三度服以八兩為初二十日二兩二十日四兩合一百八十日藥成自後服三丸將補不服亦得恒以酥蜜消息之美酒服一升為佳合藥須取四時王相日特忌刑殺厭及四激休廢等日大凶此彭祖法

茯苓膏方 千金翼名 凝靈膏

茯苓 淨去皮 松脂 二十四斤

栢子仁 各十二斤 松子仁

右四味皆依法鍊之松栢仁不鍊擣篩白蜜二斗四升內銅器中湯上微火煎一日一夕次第下藥攪令相得微火煎七日七夜上丸如小棗每服七丸日三欲絶穀頓服取飽即得輕身明目不老 北方後一本有茯苓酥杏仁酥地黄酥三方然諸本並無又千金翼中已有今更不添録

服枸杞根方 主養性遲齡

枸杞根切一石水一石二斗煮取六斗澄清煎取三升以小麥一斗乾淨擇內汁中漬一宿曝二徃反令汁盡曝乾擣末酒服方寸匕日二一年之中以二月

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

八月各合一劑終身不老

枸杞酒方

枸杞根一百二十斤切以東流水四石煮一日一夜取清汁一石清麴一如家醞法熟取清貯不津器中出處開之其酒赤如金色旦空腹服半升十日萬病堅覆上三七日沐浴整衣冠再拜平曉向甲寅地日商陸末二升以絹袋貯內酒底緊塞口埋入地三尺內乾地黃末二斤半桂心乾薑澤瀉蜀椒末各一升五服愈 千金翼又云若欲服石者取河中青白石如棗杏大者二升以水三升煮一沸以此酒半合置中須臾即熟可食

餌雲母水方 療萬病

皆愈三十日瘢痕滅惡疾人以水一升和酒半升分上白雲母二十斤薄擘以露水八斗作湯分半洮洗雲母如此再過又取二斗作湯內芒硝十斤以雲母木器中漬之二十日出絹袋盛懸屋上勿使見風日令燥以水漬鹿皮為囊揉挺之從旦至日中乃以細

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:07
列印頁數：1674
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

絹下篩滓復揉挺令得好粉五斗餘者棄之取粉一斗内崖蜜二斤攪令如粥内生竹筒中薄削之漆固口埋北垣南崖下入地六尺覆土春夏四十日秋冬三十日出之當如澤為成若洞洞不消者更埋三十日出之先取水一合内藥一合攪和盡服之日三水寒温盡自在服十日小便當變黄此先療勞氣風疹也二十日腹中寒澼消三十日齲齒除更新生四十日不畏風寒五十日諸病皆愈顏色日少長生神仙

錬鍾乳粉法

鍾乳一斤不問厚薄但取白淨光色好者即任用非此者不堪用先泥鐵鐺可受四五斗者為竈貯水令滿去口三寸内乳著金銀甕甕中任有用之乃下鐺中令水沒甕上一寸餘即得當令如此勿使出水也微火燒日夜不絶水欲竭即添成煖水每一周時輒易水洗鐺并洮乳七日七夜出之淨洮乾内甕鉢中

吾自驗之所以述録

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

玉椎縛格少著水研之一日一夜急著水攪令大濁澄取濁汁其乳粗者自然著底作末者即自作濁水出即經宿澄取其粗著底者准前法研之凡五日五夜皆細逐水作粉好用澄鍊取曝乾即更於銀鉢中研之一日候入肉水洗不落者佳

方

上黨人參　石斛　乾薑　各三分

鍾乳散治虛羸不足六十已上人瘦弱不能食者百病

鍾乳粉　成錬者三兩

右四味擣下篩三味與乳合和相得均分作九貼平旦空腹温淳酒服一貼日午後服一貼黄昏後服一貼日後准此服之凡服此藥法皆三日一劑三日內止用一升半飯一升肉肉及飯惟爛不得服蔥豉貼三日後准此服之凡服此藥法皆三日一劑三日內止用一升半飯一升肉肉及飯惟爛不得服蔥豉

問曰何故三日少食勿得飽也答曰三夜乳在腹中熏補臟腑若此飽食即推藥出腹所以不得飽食也何故不得生食由食生故即損傷藥力藥力既損脂

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肪亦傷所以不得食生食也何故不得食蔥豉蔥豉殺藥故不得食也三日服藥既盡三日内須作羹食補之任意所便仍不用蔥豉及鞭食也三日補訖還須准式服藥如前盡此一斤乳訖其氣力當自知耳不能具述一得此法其後服十斤二十斤任意方便可知也

西嶽眞人靈飛散方

雲母粉一斤 茯苓八兩 鍾乳粉 栢子仁 人參千金翼作白朮續斷 桂心各七兩 菊花十五兩 乾地黃十二兩

右九味為末生天門冬十九斤取汁漬藥内銅器中蒸一石二斗黍米下米熟曝乾為末先食飲服方寸匕日一三日力倍五日血脉充盛七日身輕十日面色悅澤十五日行及奔馬三十日夜視有光七十日白髮盡落故齒皆去更取二十一匕白蜜和擣二百杵丸如桐子大作八十一枚曝乾丸皆映徹如水精

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:08
列印頁數：1677
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

珠欲令髮齒復生者吞七枚日三服即出髮未白齒不落者但服盡三百年乃白如前法服已白者餌藥至七百年乃落入山日吞七丸絶穀不饑余得此方已來將踰三紀頃面色美而悅之疑而未敢措手積年詢訪屢有好名人曾餌得力遂服之一如方說但能業之不已功不徒棄耳

備急千金要方卷八十二

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷八十三　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

養性

黃帝雜忌法第七

旦起勿開目洗面令人目澀失明饒淚清旦常言善事勿惡言聞惡事即向所來方三唾之吉又勿嗔怒勿叱咤咄呼勿嗟歎勿唱奈何名曰請禍勿立膝坐而交臂膝上勿令髮覆面皆不祥勿舉足向火勿對竈罵詈凡行立坐勿背日吉勿面北坐亦思不祥起凡欲行來常存魁綱在頭上所向皆吉若欲征戰存斗柄在前以指敵吉勿面北冠帶凶勿向西北唾犯魁綱神凶勿效唾唾不用遠成肺病令人手足重及背痛效嗽亦勿向西北大小便勿殺龜蛇勿怒目視日月喜令人失明行及乘馬不用迴顧則神去人不用鬼行踏粟凡過神廟愼勿輒入入必恭敬不得舉目恣意顧瞻當如對嚴君焉

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:10
列印頁數：1679
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乃享其福耳不爾速獲其禍亦不得返首顧視神廟勿見龍蛇勿興心驚怪亦勿注意瞻視忽見鬼怪變異之物即強抑之勿怪呪曰見怪不怪其怪自壞又路行及衆中見殊妙美女愼勿熟視而愛之此當魑魅之物使人深愛無問空山曠野稠人廣衆之中皆亦如之凡山水有沙風處勿在中浴害人欲渡者隨驢馬後急渡不傷人有水弩處射人影即死欲渡水者以物打水其弩即散急渡不傷凡諸山有孔穴入採寶者惟三月九月餘月山閉氣交犯死凡人空腹不用見尸臭氣入鼻舌上白起口常臭欲見尸者皆須飲酒見之能辟毒凶行觸熱塗中逢河勿洗面生烏黓

房中補益第八

論曰人年四十已下多有放恣四十已上即頓覺氣力一時衰退衰退既至衆病蜂起从而不治遂至不救所以彭祖曰以人療人眞得其眞故年至四十須諳房中之術夫房中術者其道甚近而人莫能行其法一夕御

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

十人閉固為謹此房中之術畢矣兼之藥餌四時勿絶則氣力百倍而智慧日新然此方之作也非欲務於淫佚苟求快意務存節欲以廣養生也非苟欲强身力行女色以縱情意在補益以遣疾也此房中之微旨也是以人年四十已下即服房中之藥者皆所以速禍慎之慎之故年未滿四十者不足與論房中之事慈心未止兼餌補藥倍力耗喪不過半年精髓枯竭惟向死近少年極須慎之人年四十已上常固精養炁不耗可以不老又餌雲母足以愈疾延年人年四十已上勿服瀉藥常餌補藥大佳昔黄帝御女一千二百而登仙而俗人以一女伐命知與不知豈不遠矣其知道者御女苦不多耳凡婦人不必須有顏色妍麗但得少年未經生乳多肌肉益也若足財力選取細髮目精黑白分明體柔骨輭肌膚細滑言語聲音和調四肢骨節皆欲足肉而骨不大其體及腋皆不欲有毫有毫當輭細不可極於相者但蓬頭蠅面槌項結喉雄聲大口高鼻麥齒目精

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

渾濁口頷有毫骨節高大髮黃少肉隱毫多而且強又生逆毫此相不可皆賊命損壽也凡御女之道不欲令氣未感動陽氣微弱即以交合必須先徐徐調和使神和意感良久乃可令得陰氣陰氣推之須臾自強所謂弱而内迎堅急出之進退欲令疎遲情動而止不可高自投擲顛倒五臟傷絶精脉生致日病但數交而慎密者諸病皆愈年壽日益去仙不遠矣不必九一三五之數也能百接而不施瀉者長生矣若御女多者可採氣之道但深接勿動使良久氣上面熱以口相當引取女氣而吞之可疎疎進退意動便止緩息眠目偃臥道引身體更強可復御他女也數數易之則得益多人常御一女陰氣轉弱為益亦少陽道法火陰家法水水能制火陰亦消陽久用不止陰氣逾陽陽則轉損所得不補所失但能御十二女而不復施瀉者令人不老有美色若御九十三女而自固者年萬歲矣凡精少則病精盡則死不可不思不可不慎之也昔正觀初有一野

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

老年七十餘詣余云數日來陽氣益盛自思氣血已衰何有此盛未知垂老有此為善惡耶余答之曰是大不祥子獨不聞膏火乎夫膏火之將竭也必先暗而後明明止則滅今足下年邁桑榆从當閉精息欲茲忽春情猛發豈非反常耶竊為足下憂之子其勉歟後四旬發病而死此其不慎之效也如斯之輩非一且疏一人以不可縱心竭意以自賊也若一度制得則一度火滅一度增油若不能制縱情施瀉即是膏火將滅更去其油可不深自防所患人少年時不知道知道亦不能信行之至老乃知道便以晚矣病難養也晚而自保猶得延年益壽若年少壯而能行道者神仙速矣或曰年未六十當閉精守一為可爾否曰不然男不可無女女不可無男無女則意動意動則神勞神勞則損壽若念眞正無可思者則大佳長生也然而萬無一有強抑鬱閉之難持易失使人漏精尿濁以致鬼交之病損一而當百

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

也其服食藥物見別卷中

御女之法交會者當避丙丁日及弦望晦朔大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地晦冥日月薄蝕虹蜺地動若御女者則損人神不吉損男百倍令女得病有子必顛癡頑愚瘖瘂聾聵攣跛盲眇多病短壽不孝不仁側塚墓尸柩之傍皆所不可夫交合如法則有神德大智善人降託胎中仍令性行調順所作和合家道日隆又避日月星辰火光之下神廟佛寺之中井竈圊厠之祥瑞競集若不如法則有薄福愚癡惡人來託胎中仍令父母性行凶險所作不成家道日否殃咎屢至雖生成長家國滅亡夫禍福之應有如影響此乃必然之理可不再思之

黃帝雜禁忌法曰人有所怒血氣未定因以交合令人發癰疽又不可忍小便交合使人淋莖中痛面失血色及遠行疲乏來入房為五勞虛損少子且婦人月事未絕而與交合令人成病得白駮也水銀不可近陰令人

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:12
列印頁數：1684
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

消縮鹿猪二脂不可近陰令陰痿也

備急千金要方卷八十三

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:13
列印頁數：1685
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷八十四至六

謹校官翰林院侍讀官臣姜晟
編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐
校對官中書臣胡紹基
謄錄監生臣李維瀛
謄錄監生臣劉耀馥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷八十四 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

平脉

平脉大法第一 論

論曰夫脉者醫之大業也既不深究其道何以為醫者哉是以古之哲醫寤寐俯仰不與常人同域造次必於醫顛沛必於醫故能感於鬼神通於天地可以濟衆可以依憑若與常人混其波瀾則庶事隳壞使夫物類將何仰焉由是言之學者必當屏棄俗情凝心於此則和鵲之功因茲可得而致也

經曰診脉之法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛絡脉調均氣血未亂故乃可診有過之脉脉經云過此非也均脉動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六腑彊弱形之盛衰可以此參互訣生死之分也

又曰平脉者皆於平旦勿食勿語消息體氣設有所作

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

亦如食頃師亦如之既定先診寸口初重指切骨定畢便漸舉指令指不厚不薄與皮毛相得如三菽之重於輕重之間隨人彊弱肥瘦以意消息進退舉按之宜稱其浮沉諸類應於四時五行與人五臟相應不爾者以凡人稟形氣有中適有躁靜各各不同氣脉潮動亦各隨其性韻故一呼而脉再至一吸而脉再至呼吸定息之間復一至合為五至此為平和中適者也春秋日夜正等無餘分時也其餘日則其呼而脉至多吸而脉至少或吸而脉至多呼而脉至少此則不同如冬夏日夜長短之異也凡氣脉呼吸法晝夜變通倣四時然於呼吸定息應五至之限無有虧僻猶晷刻與四時有長短而歲功日數無遺也若人有羸有壯其呼吸雖相壓遏而晝夜息度隨其漏刻是謂呼吸象晝夜變通倣四時夫診脉當以意先自消息壓取病人呼吸以自同而後察其脉數計於定息之限五至者為平人若有盈縮尋

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:14
列印頁數：1688
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

狀論病源之所宜也

問曰何謂三部脉答曰寸關尺也凡人脩短不同其形各異有尺寸分三關之法從肘腕中橫文至掌魚際後文却而十分之而入取九分是為尺從魚際後文却還九分是為寸十分之而入取九分之中則度取十分之一則是寸寸十分之而入取九分之中則寸口也此處其骨自高故云陰得尺內一寸陽得寸內九分從寸口入却行六分為關分從關分又入六分為尺分

尺分

又曰從魚際至高骨却行一寸其中名曰寸口從寸口至尺名曰尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關為界如天地人為三界寸主射上焦頭及皮毛竟手上部關主射中焦腹及腰中部尺主射下焦小腹至足下部此為三部法象三才天地人頭腹足為三元也夫十二經皆有動脉獨取寸口以決五臟六腑死生吉凶之候者何謂也然寸口者脉之大會手太陰之動脉也人一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寸人一日一夜凡一萬三千五百息脉行五十度周於
其身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五
度為一周 晬時也 故五十度而復會於手太陰太陰者寸
口也即五臟六腑之所終始故法取於寸口人有三百
六十脉法三百六十日也

診五臟脉輕重法第二

初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺部 金秋三月庚辛之氣
如六菽之重與血脉相得者心部 火夏三月丙丁之氣
如九菽之重與肌肉相得者脾部 土王四季季夏六月戊巳之氣
如十二菽之重與筋平者肝部 木春三月甲乙之氣
按之至骨舉之來疾者腎部 水冬三月壬癸之氣
心肺俱浮何以別之然浮而大散者心也 相火浮散 浮而短
濇者肺也 法金悭濇
腎肝俱沉何以別之然牢而長者肝也 如弁生苗吐穎
按之耎舉指來實者腎也 濡弱如水舉重勝船
脾者中州故其脉在中是陰陽之脉也 千金翼云遲緩而長者脾也

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

指下形狀第三

浮脉舉之有餘按之不足（浮於指下）沉脉舉之不足按之有餘乃（重按之得）濇脉細而遲往來難且散或一止復來（一曰浮而短一曰短而止或如散）滑脉往來前却流利展轉替替然與數相似（一曰浮中如有九一曰漉漉如欲脫）洪脉極大在指下（一曰浮而大）細脉小大於微常有但細耳微脉極細而輭或欲絶若有若無弦狀（一曰如張弓弦按之不移又曰浮緊弓弦為弦也）緊脉數如切繩狀（一曰如轉索之一曰小也一曰手下快一曰薄一曰按之如欲盡也）弦脉舉之無有按之如張弓

無常遲脉呼吸三至去來極遲（一曰遲之不足按之盡牢一曰按之盡牢遲之無有）緩脉去來亦遲小駛散脉去來促急（一曰一息云土至一曰數者進之名）於遲（一曰浮大而輭陰與陽同著）弱脉極輭而沉細按之欲絶指下一曰按之乃得舉之即無）動脉見於關上無頭尾大如豆厥厥動摇伏脉極重指著骨乃得（一曰關上沈不出名曰伏一曰手下裁動一曰按之不足舉之）無有（無有舉之有餘一）乾脉浮大而輭按之中央空兩邊實（一曰指下無兩傍有）輭脉極輭而浮細（一曰按之無有舉之有餘一曰細小如）輭千金翼輭作濡）虛脉遲大而輭按之不足隱指豁豁然空實脉大而長微彊按之隱

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:16
列印頁數：1691
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

指幅幅然一曰沈浮皆得促脉來去數時一止結脉往來緩時一止復來脉結者生代脉來數中止不能自還因而復動脉代者死散脉大而散散者氣實血虛有表無裏革脉有似沈伏實大而長微弦千金翼以革為牢弦與緊相類輭與弱相類浮與芤相類又曰浮與洪相類微與濇相類沈與伏與數相類

五臟脉所屬第四

相類緩與遲相類又曰輭與遲相類革與實相類翼作牢與實相類滑

心部在左手關前寸口亦名人迎肝部在左手關上腎部在左手關後尺中

肺部在右手關前寸口亦名氣口脾部在右手關上腎部在右手關後尺中脉法讚云

肝心出左脾肺出右腎與命門俱出尺部

魂魄穀神皆見寸口左主司官右主司府

左大順男右大順女關前一分人命之主

左為人迎右為氣口神門決斷兩在關後

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:16
列印頁數：1692
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人無二脉　病死不愈　諸經損減　各隨其部
三陰三陽（一云按察陰陽）　誰先誰後
陰病治官（官藏内也）　陽病治府（府外也）
奇邪所舍　如何捕取　審而知之　針入病愈
脉有三部　陰陽相乘　榮衛氣血　而行人躬
呼吸出入　上下於中　因息遊布　津液流通
隨時動作　傚象形容　春弦秋浮　冬沈夏洪
察色觀脉　大小不同　一時之間　變無經常
尺寸參差　或短或長　上下乖錯　或存或亡
病輒改易　進退低昂　心迷意惑　動失紀綱
願為縷陳　令得分明（師曰）　子之所問　道之根源
脉有三部　尺寸及關　榮衛流行　不失衡銓
腎沈心洪　肺浮肝弦　此自常經　不失銖分
出入昇降　漏刻周旋　水下二刻　脉一周身
旋復寸口　虛實見焉　變化相乘　陰陽相干
風則浮虛　寒則緊弦　沈潛水畜　支飲急弦

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

動弦為痛　數洪熱煩　設有不應　知變所緣
三部不同　病各異端　太過可怪　不及亦然
邪不空見　終必有奸　審察表裏　三焦別分
知邪所舍　消息診看　料度腑臟　獨見若神
分別病形狀第五
脉數則在腑遲在臟脉長而弦病在肝（脉經作脉出於肝）脉小血少病在心（扁鵲云脉大而洪出於心脉下堅上虛病在脾胃脉滑（一作澁）而微浮病在肺脉大而堅病在腎（扁鵲云小而緊）脉滑者多血少氣脉澁者少血多氣脉大者血氣俱多又云脉來細而微者血氣俱虛沈細滑疾者熱遲緊為寒（脉經云洪數滑疾為熱澁遲沈細為寒）脉盛滑緊者病在外熱脉小實而緊者病在内大而堅者血氣俱實脉小者血氣俱少又云脉來細而冷脉小弱而澁謂之从病脉滑浮而疾者謂之新病脉浮滑其人外熱風走刺有飲難治脉沈而緊上焦有熱下寒得冷即便下脉沈而細下焦有寒小便數時苦絞痛下利重脉浮緊且滑直者外熱内冷不得大小便脉

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:17
列印頁數：1694
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

洪大緊急病速進在外苦頭發熱癰腫脉細小緊急病
速進在中寒為疝瘕積聚腹中刺痛脉沈重而直前絶
者病血在腸間脉沈重而中散者因寒食成癥脉直前
而中散絶者病消渴一云病淫瘧脉沈重前不至寸口徘徊
絶者病在肌肉遁尸脉左轉而沈重者氣微陽在胷中
脉右轉出不至寸口者内有肉癥脉累累如貫珠不前
至有風寒在大腸伏留不去脉累累如止不至寸口輸
者結熱在小腸膜中伏留不去脉直前左右彈者病在
血脉中胚血也脉後而左右彈者病在筋骨中也脉前
大後小即頭痛目眩脉前小後大即胷滿短氣上部有
脉下部無脉其人當吐不吐者死上部無脉下部有脉
雖困無所苦夫脉者血之府也長則氣治短則氣病數
則煩心大則病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰
細太素作滑則氣少濇則心痛渾渾革革至如涌泉病進而
危弊弊綽綽其去如弦絶者死短而急者病在上長而
緩者病在下沈而弦急者病在内浮而洪大者病在外

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

脉實者病在内脉虚者病在外在上為表在下為裏浮為在表沈為在裏滑為實為下（又為氣裏）數為虚為熱浮為風為虚動為痛為驚沈為水為實（又為鬼疰）弱為虚為悸遲則為寒澁則少血緩則為虚洪則為氣（一作熱）緊則為寒弦數為癉癉脉自弦弦數多熱弦遲多寒微則為虚代散則死弦為痛癖（一作浮為風疰）偏弦為飲雙弦則脇下拘急而痛其人澁澁惡寒脉大寒熱在中伏者霍亂安臥脉盛謂之脫血凡亡汗肺中寒飲冷水欬嗽下利胃中虚冷此等其脉並緊浮而大者風浮大者中風頭重鼻塞浮而緩皮膚不仁風寒入肌肉滑而浮散者攤緩風滑為鬼疰澁而緊癖病浮洪大長者風眩癲疾大堅疾者癩病弦而鉤脊下如刀刺狀如蜚尸至困不死緊而急者遁尸洪大者傷寒熱病浮洪大者傷寒秋吉春成病浮而滑者宿食浮滑而疾者食不消脾不磨短疾而滑酒病浮而細滑傷飲遲而澁中寒有癥結駃而緊積聚有擊痛弦急疝瘕小腹痛又為癖病（一作疽病）遲而滑者

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:18
列印頁數：1696
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

脹盛而緊曰脹弦小者寒澼沈而弦者懸飲内痛弦數有寒飲冬夏難治緊而滑者吐逆小弱而濇胃反遲而緩者有寒微而緊者有寒沈而遲腹藏有冷病微弱者有寒少氣實緊胃中有寒苦不能食時時利者難治（一作時時嘔）滑數心下結熱盛滑疾胃中有熱緩而滑曰熱有短氣浮短者其人肺傷諸氣微少不過一年死法當中沈而急病傷暑暴發虛熱浮而絶者氣辟大而滑中嗽也沈而數中水冬不治自愈短而數心痛心煩弦而緊膂痛臟傷有瘀血（一作有寒血）沈而滑為下重亦為有膂痛脉來細而滑按之能虛因急持直者僵仆從高墮下病在内微浮秋吉冬成病微數雖甚不成病不可勞浮滑疾緊者以合百病从易愈陽邪來見浮洪陰邪來見沈細水穀來見堅實脉來乍大乍小乍長乍短者為崇脉來洪大嫋嫋者崇脉來沈沈澤澤四肢不仁而重土崇脉與肌肉相得从持之至者可下之弦小緊者可下之緊而數寒熱俱發必下乃愈弦遲者宜温藥緊數者

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:19
列印頁數：1697
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

可發其汗

三關主對法第六

諸浮諸弦諸沈諸緊諸澀諸滑若在寸口膈以上病（頭部）若在關上胃以下病（腹部）若在尺中腎以下病（腰脚部）平寸口脈主對法寸口脈滑而遲不沈不浮不長不短為無病左右同法寸口太過與不及寸口之脈中手短者曰頭痛中手長者曰足脛痛中手促上擊者曰肩背痛寸口脈沈而堅者曰病在中寸口脈浮而盛者曰病在外寸口脈沈而弱者曰寒熱及疝瘕小腹痛（熱一作氣又作中）寸口脈沈而緊苦心下有寒時痛有積邪寸口脈沈而滑者胷中有水氣面目腫有微熱為風水寸口脈沈大而滑沈即為血實滑即為氣實血氣相搏入臟即死入腑即愈寸口脈沈胷中短氣寸口脈沈而喘者寒熱寸口脈浮而滑頭中痛寸口脈浮大按之反澀尺中亦微而澀故知有滯氣宿食寸口脈弦而緊弦即衛氣不行衛氣不行即惡寒水流走腸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

間寸口脉緊或浮膈上有寒肺下有水氣脉緊上寸口者中風風頭痛亦如之（翼云亦為傷寒頭痛）脉弦上寸口者宿食降者頭痛寸口脉弦大婦人半生漏下男子亡血失精寸口脉微而弱微即惡寒弱則發熱當發不發骨節疼煩當煩不煩與極汗出寸口脉微而弱氣血俱虛男子吐血婦人下血嘔汗出寸口脉動而弱動即為驚弱即為悸寸口脉緩而遲緩即為虛遲即為寒虛寒相搏則欲温食食冷即咽痛寸口脉遲而緩遲則為寒緩即為氣寒氣相搏則絞而痛寸口脉遲而澁遲即為寒澁為少血脉來過寸入魚際者遺尿脉出魚際逆氣喘息寸口脉但實者心勞寸口脉漐漐如羹上肥陽氣微連連如蜘蛛絲陰氣衰兩手前部陽絶者苦心下寒毒喙中熱寸口脉偏絶則臂偏不遂其人兩手俱絶者不可治寸口脉來暫大暫小者陰絡也苦陰風痺應時自發身洗洗也寸口脉來暫小暫大者陽絡也苦皮膚病汗出惡寒下部不仁寸口脉浮中風發熱頭痛宜服桂枝湯

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:20
列印頁數：1699
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

葛根湯針風地風府向火灸身摩治風膏覆令汗出寸口脉緊苦頭痛是傷寒宜服麻黄湯發汗針眉衝顳顬摩傷寒膏寸口脉微苦寒為衄宜服五味子湯麻黄茱萸膏令汗出寸口脉數即為吐以有熱在胃管熏胷中宜服藥吐之及針胃管服除熱湯若傷寒七八日至十日熱在中煩滿渴者宜服知母湯寸口脉洪大胷脇滿門寸口脉緩皮膚不仁風寒在肌肉宜服防風湯以藥宜服生薑湯白薇丸亦可紫菀湯下之針上管期門章薄熨之佳灸諸治風穴寸口脉滑陽實胷中壅滿吐逆宜服前胡湯針太陽巨闕瀉之寸口脉弦心下愊愊微頭痛心下有水氣宜服甘遂丸針期門瀉之寸口脉弱陽氣虛弱自汗出宜服茯苓湯内補散將適飲食消息勿極勞針胃管補之寸口脉澀是胃氣不足宜服乾地黄湯自養調和飲食針胃管（一作三里）補之寸口脉芤吐血微芤者衄血空虛去血故也宜服竹皮湯黄土湯炙膻中寸口脉伏胷中逆氣噎塞是諸氣上衝胷中宜服前

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

胡湯大三建丸針巨闕瀉寸口脉沈脅中引脊痛脅中有水氣宜服澤漆湯針巨闕瀉之寸口脉輭弱自汗出是虛損病宜服乾地黃湯薯蕷丸内補散牡蠣散并粉針大衝補之寸口脉遲上焦有寒心痛咽酸吐酸水宜服附子湯生薑湯茱萸丸調和飲食以暖之寸口脉實即熱即宜服竹葉湯葛根湯寒即茱萸丸生薑湯寸口脉細發熱嘔吐宜服黃芩龍膽湯吐不止宜服橘皮桔梗湯炙中府平關脉主對法關上脉浮而大風在胃中張口肩息心下澹澹食欲嘔關上脉微浮積熱在胃中嘔吐蚘蟲心健忘關上脉滑而大小不均必吐逆是為病方欲來不出一二日復欲發動其人欲多飲飲即注利如利止者生不止者死關上脉緊而滑者蚘動關上脉弦而長（翼作大）有痛如刀刺之狀在臍左右上下（脉經云有積在臍左右上下）關上脉澀而堅大而實按之不減有力為中焦實有伏結在脾肺氣塞實熱在胃中關上脉襜襜大而

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:20
列印頁數：1701
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

尺寸細者其人必心腹冷積癥瘕痠結聚欲熱飲食關上脉時來時去乍大乍小乍疎乍數者胃中寒熱羸劣不欲飲食如瘧狀關上脉浮腹滿不欲食浮為虛滿宜服平胃丸茯苓湯生薑前胡湯針胃管先瀉後補之關上脉緊心下苦滿痛脉緊為實宜服茱萸當歸湯又加大黄二兩佳（脉經云又大黄湯兩治之佳）針巨闕下管瀉之關上脉微胃中冷心下拘急宜服附子湯生薑湯附子丸針巨闕補之關上脉數胃中有客熱宜服知母湯（一作丸）除熱湯針巨闕上管瀉之關上脉緩不欲食此脾胃氣不足宜服平胃丸補脾湯又針章門補之關上脉滑胃中有熱滑為熱實氣滿故不欲食食即吐逆宜服朴硝麻黄湯平胃丸（一作宜服紫菀湯人參大平胃散）針胃管瀉之關上脉弦胃中有冷心下厥逆脉弦胃氣虛宜服茱萸湯温調飲食針胃管補之關上脉弱胃氣虛胃中有客熱脉弱為虛熱作病且說云有熱不可大攻之熱去即寒起正宜服竹葉湯針胃管補之關上脉細虛腹滿宜服生薑湯茱萸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蜀椒湯白薇丸針灸三管關上脉澀血氣逆冷脉澀為血虛宜服乾地黄湯四補散針足大衝上補之關上脉乾大便去血宜服生地黄并生竹皮湯灸膈輸若重下去血針關元甚者服龍骨丸（關元一作巨闕）關上脉伏有水氣洪胃中熱必煩滿宜服平胃丸針胃管先瀉後補之關上脉沈心下有冷氣苦滿吞酸宜服白薇丸茯苓丸附子湯針胃管補之（關上脉輭苦虛冷脾氣弱重下病宜服桂枝丸茱萸湯針胃管補之關上脉實胃中痛宜服赤石脂湯女萎丸針關元補之關上脉遲胃中寒宜盛熱即腹滿嚮嚮宜服紫菀丸瀉脾丸針灸胃管瀉之梔子湯茱萸烏頭丸針胃管補之關上脉勞脾胃氣塞無陽氣上熱衝頭面尺脉弱寸彊胃絡脉傷尺脉偏滑平尺脉主對法尺脉浮者客陽在下焦尺脉弱下焦冷疾面赤如醉外熱則疾尺脉細微溏泄下冷利（素問云尺寒脉細微溏泄下冷利）細謂之後泄尺脉虛小者足脛寒痿痺脚疼尺脉澀下血不

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

利多汗 素問云尺澁脉滑謂之多汗 尺脉沈而滑者寸白蟲尺脉細而急者筋攣痺不能行尺脉大者熱在脬中小便赤痛尺脉粗常熱者謂之熱中腰胯疼小便赤熱尺脉按之不絶婦人血閉與關相應和滑者男子氣血實婦人即為妊娠尺脉來而斷絶者男子小腹有滯氣婦人月水不利尺脉俱輭弱内慍熱手足逆冷汗出尺脉俱沈關上無有者苦心下喘尺脉俱沈關上若有苦寒心下痛陰中冷脚痺尺脉俱微少心力不欲言血氣不足其人脚弱短氣尺脉俱數手足頭面有熱俱遲有寒手足頭面有冷風尺脉浮下熱風小便難宜服瞿麥湯滑石散針横骨關元瀉之尺脉緊臍下痛宜服當歸湯灸天樞針關元補之尺脉微厥逆小腹中拘急有寒氣宜服小建中湯針氣海尺脉數惡寒臍下熱痛小便赤黄宜服雞子湯白魚散針横骨瀉之尺脉緩脚弱下腫 一無此四字 小便難有餘瀝宜服滑石湯瞿麥散針横骨瀉之尺脉滑血氣實經脉不利宜服朴硝煎大黄湯下去經血針

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:22
列印頁數：1704
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

關元瀉之尺脉弦小腹疼小腹及脚中拘急宜服建中湯當歸湯針氣海瀉之尺脉弱氣少發熱骨煩宜服前胡湯乾地黄茯苓湯針關元補之尺脉澁足脛逆冷小便赤宜服附子四逆湯針足大衝補之尺脉孔下焦虚小便去血宜服竹皮生地黄湯灸丹田關元尺脉伏小腹痛癥疝水穀不化宜服大平胃丸桔梗丸針關元補之尺脉沈腰背痛宜服腎氣丸針京門補之尺脉輭脚不收風痺一無此五字小便難宜服瞿麥湯白魚散針關元瀉之尺脉牢腹滿陰中急宜服葶藶子茱萸丸針丹田關元中極尺脉遲下焦有寒宜服桂枝丸針氣海關元瀉之尺脉實小腹痛小便不禁宜服當歸湯加大黄一兩利大便針關元補之

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:23
列印頁數：1705
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷八十五　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

平脉

五臟積聚第七

人病有積有聚有穀氣（穀一作繫）夫積者藏病終不移也聚者腑病發作有時展轉痛移為可治也穀氣者脇下牽痛按之則愈愈復發為穀氣夫病已愈不得復發令病復發即為穀氣也諸積大法脉來而細輭附骨者為積也寸口結積在胷中微出寸口積在喉中關上結積在臍傍微下關者積在小腹尺中結積在氣衝上關上積在心下脉出在左積在左脉出在右積在右脉兩出積在中央各以其部處之寸口沈而橫者脇下及腹中有橫積痛其脉弦腹中急痛腰背痛相引腹中有寒疝瘕脉弦緊而細微者癥也夫寒痺癥瘕積聚之脉狀皆弦緊若在心下即寸弦緊在胃管即關弦緊在臍下即尺

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

弦緊一曰關脉長弦有積在臍左右上下

又脉癥法左手脉横癥在左右手脉横癥在右脉頭大在上頭小在下

又一法横脉見左積在右見右積在左偏得洪實而滑大右手脉小上病在左脇下病在左足右手脉大左手脉小上病在右脇下病在右足脉弦而伏者腹中有癥治見一脉相應為易治諸不相應為不合治也左手脉亦為積弦緊亦為積為寒痺為疝痛内有積不見脉難不可轉也必死不治脉來沈而細時直者身有癰腫若腹中有伏梁脉來沈而虚者泄注也脉來小沈實者胃中有積聚不可下食即吐

陰陽表裏虚實第八

弦為小陽緩為陽明洪為太陽三陽也微為少陰遲為厥陰沈為太陰三陰也

脉有一陰一陽一陰二陽一陰三陽有一陽一陰一陽二陰一陽三陰如此言之寸口有六脉俱動耶然經言

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:23
列印頁數：1707
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

如此者非有六脉俱動也謂浮沈長短滑濇也凡脉浮滑長者陽也沈濇短者陰也所以言一陰一陽者謂脉來沈而滑也一陰二陽者謂脉來沈滑而長也一陰三陽者謂脉來浮滑而長時一沈也所以言一陽一陰者謂脉來浮而濇也一陽二陰者謂脉來長而沈濇也一言病之逆順也

脉有陽盛陰虛陰盛陽虛何謂也然浮之損小沈之實大故曰陰盛陽虛沈之損小浮之實大故曰陽盛陰虛是謂陰陽虛實之意也

凡脉浮大數動長滑陽也沈濇弱弦短微陰也陽病見陰脉者逆也主死陰病見陽脉者順也主生關前為陽關後為陰陽數即吐陰微即下陽弦則頭痛陰弦即腹痛以依陰陽察病也又尺脉為陰陰脉常沈而遲寸關為陽陽脉但浮而速有表無裏邪之所止得鬼病何謂表裏寸尺為表關為裏兩頭有脉關中絶不至也尺脉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

上不至關為陰絶寸脉下不至關為陽絶陰絶而陽微死不治呼為表屬腑吸為裏屬臟陽微不能呼陰微不能吸呼吸不足胷中短氣

弱反在關濡反在巔微在其上濇反在下微即陽氣不足活熱汗出濇即無血厥而且寒諸腑脉為陽主熱諸臟脉為陰主寒陽微則汗陰浮自下（脉經作陰微）陽數口生瘡陰數加微必惡寒而煩擾不得眠陽乾吐血（脉經作陽數則）吐血陰乾下血（脉經作陰濇即下血）無陽即厥無陰即嘔

寸口脉浮大而疾者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹中熱寸口浮沈細者名曰陽中之陰病苦悲傷不樂惡聞人聲少氣時汗出陰氣不通（不通一作併）臂不能舉

尺脉沈細者名曰陰中之陰病苦兩脛酸疼不能久立陰氣衰小便餘瀝陰下濕癢

尺脉滑而浮大者名曰陰中之陽病苦小腹痛滿不能溺溺即陰中痛大便亦然

（巢源作臂偏不舉）

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

尺脉牢而長關中無有此為陰干陽其人苦兩脛重小腹引腰痛

寸口壯大尺中無有此為陽干陰其人苦腰背痛陰中傷足脛寒

人有三虛三實者何謂也然有脉之虛實有病之虛實有診之虛實脉之虛實者脉來濡者為虛牢者為實也病之虛實者出者為虛入者為實言者為虛不言者為實緩者為虛急者為實也診之虛實者癢者為虛痛者為實外痛内快為外實内虛内痛外快為内實外虛故曰虛實也

問曰何謂虛實答曰邪氣盛則實精氣奪則虛何謂重實所謂重實者大熱病氣滿是謂重實也

脉盛皮熱腹脹前後不通一脅為五實

脉細皮寒氣少泄痢注前後飲食不入為五虛也

何時得病第九

何以知人露臥得病陽中有陰也何以知人夏月得病

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

諸陽入陰也何以知人春得病無肝脉也無心脉夏得病無肺脉秋得病無腎脉冬得病無脾脉四季之月得病

扁鵲華佗察聲色要訣第十

病人五臟已奪神明不守聲嘶者死病人循衣縫譫言者不可治病人陰陽俱絶掣衣撮空妄言者死病人妄語錯亂及不能語者不治熱病者可治病人陰陽俱絶失音不能言者三日半死病人兩目皆有黄色起者其病方愈病人面黄目青者不死青如草滋死病人面黄目白者不死白如枯骨死病人面黄目黑者不死黑如炲死病人面目俱赤者不死赤如衄血死病人面黄目白者不死白如等者不死病人面黑目青者不死病人面青目白者死病人面赤目青者六日死病人面黄目青者九日必死是謂亂經飲酒當風邪入胃經膽氣妄洩目則為青雖有天救不可復生病人面赤目白者十日死憂恚思慮心氣内索面色反好急求棺槨病人面白目黑者死此

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

謂榮華已去血脉空索病人面黑目白者八日死腎氣内傷病因留積病人面青目黄者五日死病人著牀心痛短氣脾竭内傷百病復愈能起傍徨因坐於地其立倚牀能治此者可謂神良病人面無精光若土色不受飲食者四日死病人目無精光及牙齒黑色者不治病人耳目鼻口有黑色起入于口者必死病人耳目及顴頰赤者死在五日中病人黑色出於額上髮際下直鼻脊兩顴上者亦死在五日中病人及健人黑色若白色起入目及鼻口者死在三日中病人及健人面忽如馬肝色望之如青近之如黑者死病人面黑目直視惡風者死病人面黑脣青者死病人面青脣黑者死病人面黑兩脇下滿不能自轉反者死病人目回回直視肩息者一日死病人陰結陽絶目精脱恍惚者死病人陰陽絶竭目眶陷者死病人眉系傾者七日死病人口如魚口不能復閉而氣出多不返者死病人口張者三日死病人脣青人中反者三日死病人脣反人中滿者死病

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人脣口忽乾者不治病人脣腫齒焦者死病人齒忽變黑者十三日死病人舌卷卵縮者必死病人汗出不流舌卷黑者死病人髮直者十五日死病人髮如乾麻善怒者死病人髮與眉衝起者死病人爪甲青者死病人爪甲白者不治病人手足爪甲下肉黑者八日死病人榮衛竭絶面浮腫者死病人卒腫其面蒼黑者死病人手掌腫無文者死病人臍腫反出者死病人陰囊莖俱腫者死病人脉絶口張足腫者五日死病人足趺腫嘔吐頭重者死病人足趺上腫兩膝大如斗者十日死病人臥遺屎不覺者死病人尸臭者不可治肝病皮白肺之日庚辛死心病目黑腎之日壬癸死脾病脣青肝之日甲乙死肺病頰赤目腫心之日丙丁死腎病面腫脣黃脾之日戊己死青欲如蒼璧之澤不欲如藍赤欲如帛裹朱不欲如頰白欲如鵝羽不欲如鹽黑欲如重漆不欲如炭黃欲如羅裹雄黃不欲如黃土

診五臟六腑氣絶證候第十一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

病人肝絶八日死何以知之面青但欲伏眠目視而不見人汗一作泣出如水不止一曰二日死病人膽絶七日死何以知之眉為之傾病人筋絶九日死何以知之手足爪甲青呼罵不休一曰八日死病人心絶一日死何以知之肩息回視立死一曰目亭亭二日死病人腸一云小腸絶六日死何以知之髮直如乾麻不得屈伸自汗不止病人脾絶十二日死何以知之口冷足腫腹熱臚脹泄利不覺出無時度一曰五日死病人胃絶五日死何以知之脊痛腰中重不可反覆一曰腓腸平九日死病人肉絶六日死何以知之耳乾舌皆腫溺血大便赤泄一曰足腫九日死病人肺絶三日死何以知之口張但氣出而不還一曰鼻口虛張短氣病人大腸絶不治何以知之泄利無度利絶則死病人腎絶四日死何以知之齒為暴枯面為正黑目中黃色腰中欲折白汗出如流水一曰人中平七日死病人骨絶齒黃落十日死諸浮脉無根者皆死已上五臟六腑為根也

診四時相反脉第十二

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

春三月木旺肝脉治當先至心脉次之肺脉次之腎脉次之此為王相順脉也到六月土王脾脉當先至而反不至反得腎脉此為腎反脾也七十日死何謂腎反脾脾期五月六月忌丙丁脾反肝三十日死何謂脾反肝夏火王心脉當先至肺脉次之而反得腎脉是謂腎反脉當先至而反不至脾脉先至是謂脾反肝期正月二月忌甲乙腎反肝三歲死何謂腎反肝春肝脉當先至而反不至腎脉先至是謂腎反肝期七月八月忌庚辛腎反心二歲死何謂腎反心夏心脉當先至而反不至腎脉先至是謂腎反心期六月忌戊己此中不論肺金之氣踈略未諭指南又推五行亦頗顛倒待求別録上凡療病察其形貌神氣色澤脉之盛衰病之新故乃可治之形氣相得色澤以浮脉從四時此為易治形氣相失色夭不澤脉實堅甚脉逆四時此為難治逆四時者春得肺脉夏得腎脉秋得心脉冬得脾脉其至皆懸絶瀝者曰逆春夏沈瀝秋冬浮大病熱脉靜泄

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

痢脉大脫血脉實病在中脉堅實病在外脉不實名逆
四時皆難療也凡四時脉皆以胃氣為本雖有四時王
相之脉無胃氣者難瘥也何謂胃脉來弱以滑者是也
命曰易治

診脉動止投數疎數死期年月第十三

脉一動一止二日死一經云一日死脉二動一止三日
死脉三動一止四日死或五日死脉四動一止六日死
脉五動一止七日死或五日死脉六動一止八日死脉
七動一止九日死脉八動一止十日死脉九動一止九
日死又云十一日死一經云十三日死若立春死脉十
動一止立夏死脉十一動一止立夏死脉十二動一止
立秋死脉十三動一止立秋死脉十四動十五動一止
立冬死脉十五動一止立冬死脉十六動一止一歲死
經云立夏死脉二十動一止一歲死若立秋死脉二十
一動一止二歲死脉二十五動一止二歲死一經云一
歲死又云立冬死脉三十動一止二歲死若三歲死脉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三十五動一止三歲死脉四十動一止四歲死脉五十動一止五歲死不滿五十動一止五歲死五行氣畢陰陽數同榮衛出入經脉通流晝夜百刻五德相生脉來五十投而不止者五臟皆受氣即無病也脉來四十投而一止者一臟無氣却後四歲春草生而死脉來三十投而一止者二臟無氣却後三歲麥熟而死脉來二十投而一止者三臟無氣却後二歲桑椹赤而死脉來十投而一止者四臟無氣歲中死得節不動出清明死遠不出穀雨死矣脉來五動而一止者五臟無氣却後五日而死脉一來而久住者宿病在心主中治脉二來而久住者病在肝枝中治脉三來而久住者病在脾下中治脉四來而久住者病在腎間中治脉五來而久住者病在肺枝中治五脉病虛羸人得此者死所以然者藥不得而治針不得而及盛人可治氣全故也

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:29
列印頁數：1717
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷八十六 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

平脉

扁鵲診諸反逆死脉要訣第十四

扁鵲曰夫相死脉之氣如群鳥之聚一馬之馭系水交在榮衛伺候交射不可知也

馳之狀如懸石之落出筋之上藏筋之下堅關之裏不

脉病人不病脉來如屋漏雀啄者死屋漏者其來既絶而止時時復起而不相連屬也雀啄者脉來甚數而疾絶止復頻來也又經言得病七八日脉如屋漏雀啄者死脉彈人手如黍米也脉來如彈石去如解索者死彈石者辟辟急也解索者動而隨散亂無復次序也脉困病人脉如蝦之游如魚之翔者死蝦游者苒苒而起尋復遲沒不知所在久乃復起起輒遲而沒去速者是也魚翔者似魚不行而但拌尾動頭身搖而久住者是也脉如懸薄卷索者死脉如轉豆者死脉如偃刀者死脉涌涌不去者死脉忽去忽來暫止復來者死脉中侈者死脉分絶者死上下分數也脉有表無

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:29
列印頁數：1718
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

裹者死經名曰結去即死何謂結脉在指下如麻子動
搖屬腎名曰結去死近也
脉五來不復增減者死經名曰代何謂代脉五來一止
也脉七來是人一息半時不復增減亦名曰代正死不
疑經言病或有死或有不治自愈或有連年月而不已
其死生存亡可切脉而知之耶然可具知也設病者若
閉目不欲見人者脉當得肝脉弦急而長而反得肺脉
浮短而濇者死病若開目而渴心下牢者脉當得緊實
而數反得沈滑而微者死病若吐血復鼽衄者脉當得
沈細而反得浮大牢者死病若譫言妄語身常有熱脉
當洪大而反得手足四逆脉反沈細微者死病若大腹
而泄脉當微細而澀反得緊大而滑者死此之謂也經
言形脉與病相反者死奈何然病若頭痛目痛脉反短
濇者死病若腹痛脉反浮大而長者死病若腹滿而喘
脉反滑利而沈者死病若四肢厥逆脉反浮大而短者
死病若耳聾脉反浮大而濇者死 千金翼云脉大者生沈遲細者難治病

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

若目眩眩脉反大而緩者死左有病而右痛右有病而左痛下有病而上痛上有病而下痛此為逆逆者死不可治脉來沈之絶濡浮之不止推手者半月死（一作半日）脉來微細而絶者人病當死人病脉不病者生脉病人不病而脉來往大者死人身大而脉來往小者死人身短而澁而脉來往滑者死人身滑而脉來往澁者死人身小病者死人病尸厥呼之不應脉絶者死脉當大反小者死肥人脉細小如絲欲絶者死羸人得躁脉者死人身脉來往長者死人身長而脉來往短者死尺脉上應寸口大遲者半日死（脉經云尺脉不應寸時如馳半日死）

診五臟六腑十二經脉皆有相反有一反逆即為死候也

診百病死生要訣第十五

凡診脉當視其人大小長短及性氣緩急脉之遲速大小長短皆如其人形性者吉反之者凶

診傷寒熱盛脉浮大者生沈小者死傷寒已得汗脉沈小者生浮大者死

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

濕病三四日以下不得汗脉大疾者生脉細小難得者死不治

温病時行大熱其脉細小者死脉經時行作攘攘

温病下利腹中痛甚者死不治温病汗不出出不至足者死厥逆汗出脉堅彊急者生虚緩者死

熱病二三日身體熱腹滿頭痛食飲如故脉直而疾者八日死四五日頭痛腹痛而吐脉來細彊十二日死八九日頭不疼身不痛目不赤色不變而反利脉來牒牒按之不彈手時大心下堅十七日死

熱病七八日脉不輸一作喘不散一作數者當瘖瘖後三日若汗不出者死

熱病七八日其脉微細小便不利加暴口燥脉代舌焦枯黑者死

熱病未得汗脉盛躁疾得汗者生不得汗者難瘥熱病已得汗脉靜安者生脉躁者難治熱病脉躁盛而不得汗者此陽之極也十死不治熱病已得汗脉常躁盛陰

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

氣之極也亦死（太素作陽極）熱病已得汗常大熱不去者亦死（大一作專）熱病已得汗熱未去脉微躁者慎不得刺治也熱病發熱甚者其脉陰陽皆竭慎勿刺不汗出必下利診人被風不仁癈躄其脉虚者生（巢源云虚數者生）堅急疾者死診癲病虚則可治實則死癲疾脉實堅者生脉沈細小者死癲疾脉搏大滑者久久自已其脉沈小急實不可治小堅急亦不可療診頭痛目痛久視無所見者死（久視一作卒視）診人心腹積聚其脉堅彊急者生虚弱者死又實彊者生沈者死其脉大腹大脹四肢逆冷其人脉形長者死腹脹滿便血脉大時絶極下血脉小疾者死心腹痛痛不得息脉細小遲者生堅大疾者死腸澼便血身熱則死寒則生腸澼下白沫脉沈則生浮則死腸澼下膿血脉懸絶則死滑大則生腸澼之屬身熱脉不懸絶滑大者生懸濇者死以藏期之腸澼下膿血脉沈小流連者生數疾且大有熱者死腸澼筋攣其脉小細安靜者生浮大緊者死洞洩食不化下膿血脉微小者生

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

緊急者死洩注脉緩時小結者生浮大數者死蠹蝕陰
痒其脉虛小者生緊急者死欬嗽脉沈緊者死浮直者
生浮輭者生小沈伏匿者死欬嗽羸瘦脉形堅大者死
欬脫形發熱脉小堅急者死肌瘦下脫形熱不去者死
欬而嘔腹脹且洩其脉弦急欲絶者死吐血衄血脉滑
小弱者生實大者死汗出若衄其脉小滑者生大躁者
死唾血脉緊彊者死滑者生吐血而欬上氣其脉數有
熱不得臥者死傷寒家欬而上氣其脉數散者死謂其
人形損故也上氣脉數者死謂其形損故也上氣喘息
低昂其脉滑手足温者生脉澁四肢寒者死上氣面浮
腫肩息其脉大不可治加利必死一作又甚上氣注液其脉
虛寧寧伏匿者生堅彊者死寒氣上攻脉實而順滑者
生實而逆澁則死太素云寒氣暴上脉滿實何如曰實而滑則生實而逆則死其形盡滿何如曰舉垂盡滿者脉急大堅尺滿而不應如是者順則生逆則死何謂順則生逆則死曰所謂順者手足温也所謂逆者手足寒也消渴其脉數大者生細小浮短者死痟癉脉
實大病久可治脉懸小堅急病久不可治消渴脉沈小

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:32
列印頁數：1723
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

者生實堅大者死水病脉洪大者可治微細者不可治
水病脹閉其脉浮大輭者生沈細虛小者死水病腹大
如鼓脉實者生虛者死卒中惡吐血數升脉沈數細者
死浮大疾快者生卒中惡腹大四肢滿脉大而緩者生
緊而浮者死緊細而微者亦生病瘡腰脊彊急瘈瘲者
皆不可治寒熱瘈瘲其脉代絶者死金瘡血出大多其
脉虛細者生數實大者死金瘡出血脉沈小者生浮大
者死斫瘡出血一二石脉來大二十日死斫刺俱有病
多少血出不自止斷者脉止脉來大者七日死從高頓
仆内有血腹脹滿其脉堅彊者生小弱者死人為百藥
所中傷脉微細者死洪大而速者生（脉經遠作遲）人病甚而
脉不調者難瘥人病甚而脉洪易瘥人陰陽俱結者見
其上齒如熟小豆其脉躁者死（結一作竭）人内外俱虛身體
冷而汗出微嘔而煩擾手足厥逆體不得安靜者死脉
實滿手足寒頭熱春秋生冬夏死老人脉微陽羸陰彊
者生脉炎大加息者死陰弱陽彊脉至而代奇月而死

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

尺脉濇而堅為血實氣虛也其發病腹痛逆滿氣上行此為婦人胞中絶傷有惡血久成結瘕得病以冬時黍稼赤而死

尺脉細而微者血氣俱不足細而來有力者是穀氣不足病秋時得之足病得節輒動棗葉生而死此病秋時得之

左手寸口脉偏動乍大乍小不齊從寸口至關至尺三部之位處處動搖各異不同其人病仲夏得之此脉桃花落而死 花一葉作

右手寸口脉偏沈伏乍小乍大朝來浮大暮夜沈伏浮大即太過上出魚際沈伏即下不至關中往來無常時時復來者榆葉枯落而死 葉一莢作

右手尺部脉三十動一止有頃更還二十動一止乍動乍疎不與息數相應其人雖食穀猶不愈藝草生而死

左手尺部脉四十動而一止止而復來來逆如循直木如循張弓弦緪緪然如兩人共引一索至立春而死 脉經作至立冬死

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:32
列印頁數：1725
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

診三部脉虚實決死生第十六

凡三部脉大都欲等只如小人細人婦人脉小輭小兒四五歲者脉呼吸八至細數吉（千金翼云人大而脉細人細而脉大人樂而脉實人苦而脉虚性急而脉緩性緩而脉躁人壯而脉細人羸而脉大此皆為逆逆則難治反此為順順則易治）凡婦人脉常欲濡弱於丈夫小兒四五歲者脉自訣疾呼吸八至也三部脉或至或不至冷氣在胃中故令脉不通三部脉虚其人長病得之死虚而濇長病亦死虚而滑亦死虚而緩亦死虚而弦急癲病亦死三部脉實而長長病得之死實而滑長病得之生卒病得之死實而緩亦生實而緊亦生實而緊急癲病可治三部脉彊非稱其人病便死三部脉羸非其人得之死三部脉粗長病得之死卒病得之生三部脉細而輭長病得之生細而數亦生微而緊亦生三部脉微而伏長病得之死三部脉輭長病得之不治自愈治之死卒病得之生三部脉浮而結長病得之死浮而滑長病亦死三部脉浮而數長病風得之生卒病得之死三部脉乾長病得之生三部脉弦

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

而數長病得之生卒病得之死三部脉革長病得之生卒病得之死三部脉堅而數如銀釵股蠱毒病必死數而轉蠱毒病得之生三部脉澉澉如羹上肥長病得之死卒病得之生三部脉連連如蜘蛛絲長病得之死卒病得之生三部脉如霹靂長病得之死三部脉如角弓長病得之死三部脉累累如貫珠長病得之死三部脉如水淹然流長病不治自愈治之反死三部脉如屋漏長病十四日死脉經云十日死三部脉如雀啄長病七日死三部脉急切腹間病又婉轉腹痛針上下瘥半死部脉如釜中湯沸朝得暮死夜半得日中死日中得夜半死

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:34
列印頁數：1727
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷八十七至九十

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣胡紹基

謄録監生臣劉耀馥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷八十七　唐　孫思邈　撰

針灸　　宋　林億等　校正

明堂三人圖第一　仰人十四門　伏人十門　側人六門

夫病源所起本於臟腑臟腑之脉竝出手足循環腹背無所不至往來出沒難以測量將欲指取其穴非圖莫可預備之要非灸不精故經曰湯藥攻其内針灸攻其外則病無所逃矣方知針灸之功過半於湯藥矣然去聖久遠學徒蒙昧孔穴出入莫測經源濟弱扶危臨事多惑余慨其不逮聊暇隙鳩集今古名醫明堂以述針灸經一篇用補私闕庶依圖知穴按經識分則孔穴親疎居然可見矣舊明堂圖年代久遠傳寫錯誤不足指南今一依甄權等新撰為定云耳若依明堂正經人是七尺六寸四分之身今半之為圖人身長三尺八寸二分其孔穴相去亦皆半之以五分為寸其尺用夏家

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:35
列印頁數：1729
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

古尺司馬六尺為步即江淮吳越所用八寸小尺是也

其十二經脉五色作之奇經八脉以綠色為之三人孔

穴共六百五十穴圖之於後亦覩之便令了耳仰人二

百八十二穴背人一百九十四穴側人一百七十四穴

穴名共三百四十九單穴四十八名雙穴三百一名

仰人頭面三十六穴穴遠近法第一

頭部中行上星在顱上直鼻中央入髮際一寸陷容豆

顖會在上星後一寸陷者中

前頂在顖會後一寸半骨陷中

百會在前頂後一寸半頂中心

頭第二行五處在頭上去上星傍一寸半

承光在五處後一寸不灸一本言一寸半

通天在承光後一寸半

頭第三行臨泣在目上眥直上入髮際五分陷者中

目窻在臨泣後一寸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

正營在目窻後一寸
正面部中行神庭在髮際直鼻不刺
素窌在鼻柱端
水溝在鼻柱下人中
兌端在脣上端
斷交在脣内齒上斷縫
承漿在頤前下腎之下
廉泉在頷下結喉上舌本
面部第二行曲差俠神庭傍一寸半在髮際
攢竹在眉頭陷端
精明在目内眥外
巨窌俠鼻傍八分直瞳子
迎香在和窌上一寸鼻孔傍
禾窌直鼻孔下俠水溝傍五分
面部第三行陽白在眉上一寸直瞳子
承泣在目下七分直瞳子不灸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

四白在目下一寸

地倉俠口傍四分

大迎在曲頷前一寸二分骨陷中動脉

面部第四行本神俠曲差傍一寸半在髮際（一云直耳上入髮際）

四分

絲竹空在眉後陷中不灸

瞳子窌在目外去眥五分（一名太陽）

一名前關

面部第五行頭維在額角髮際本神旁一寸半不灸

顴窌在面鼽骨下下廉陷中

備急千金要方

上關在耳前上廉起骨開口取之（一名客主人）

下關在客主人下耳前動脉下空下廉合口有空張口則閉

頰車在耳下曲頰端陷者中

胷部中央直下七穴遠近法第二

天突在頸結喉下五寸宛宛中

旋機在天突下一寸陷中仰頭取之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

華蓋在旋機下一寸陷中仰而取之
紫宮在華蓋下一寸六分陷中仰而取之
玉堂在紫宮下一寸六分陷中
膻中在玉堂下一寸六分橫直兩乳間
中庭在膻中下一寸六分陷中
俞府在巨骨下去旋機傍各二寸陷者中仰而取之

胷背在第二行六穴遠近法第三

或中在俞府下一寸六分陷中仰臥取之
神藏在或中下一寸六分陷中仰而取之
靈墟在神藏下一寸六分陷中仰臥取之墟或作墻
神封在靈墟下一寸六分
步郎在神封下一寸六分陷中仰而取之
氣戶在巨骨下俠俞府兩傍各二寸陷中仰而取之
庫房在氣戶下一寸六分陷中仰而取之
屋翳在庫房下一寸六分陷中仰而取之

胷部第三行六穴遠近法第四

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:37
列印頁數：1733
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

膺窗在屋翳下一寸六分乳中禁不灸刺

乳根在乳下一寸六分陷中仰而取之

胷部第四行六穴遠近法第五

雲門在巨骨下俠氣戶兩傍各二寸陷中動脉應手舉臂取之

中府在雲門下一寸方云一寸六分乳上三肋間動脉應手陷中仰而取之

周榮在中府下一寸六分陷中仰而取之

胷卿在周榮下一寸六分陷中仰而取之

天谿在胷卿下一寸六分陷中仰而取之

食竇在天谿下一寸六分舉臂取之

腹中第一行十四穴遠近法第六

鳩尾在臆前蔽骨下五分不灸刺

巨闕在鳩尾下一寸

上管在巨闕下一寸去蔽骨三寸

中管在上管下一寸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

建里在中管下一寸

下管在建里下一寸

水分在下管下一寸臍上一寸

臍中禁不刺即神闕穴

陰交在臍下一寸

氣海在臍下一寸半

石門在臍下二寸女子不灸

關元在臍下三寸

中極在臍下四寸

曲骨在橫骨之上中極下一寸毛際陷中

會陰穴

腹第二行十一穴遠近法第七

幽門在巨闕傍半寸陷中 心藏卷云俠巨闕兩邊相去各一寸

通谷在幽門下一寸

陰都在通谷下一寸

石關在陰都下一寸 一名右關

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:37
列印頁數：1735
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

商曲在石關下一寸（一名高曲）

肓輸在商曲下一寸直臍傍各五分

中注在肓輸下五分

四滿在中注下一寸（肺藏卷云俠丹田）

氣穴在四滿下一寸（婦人方上卷云在關元左邊二寸是右二寸名子戶）

大赫在氣穴下一寸（腎藏卷云名屈骨在陰上橫骨中央貌曲如卻月中央是屈骨端三寸）

橫骨在大赫下一寸（腎藏卷云在橫骨中央大赫下一寸）

腹第三行十二穴遠近法第八

不容在幽門傍各一寸五分去任脉二寸直四肋端相去四寸

承滿在不容下一寸

梁門在承滿下一寸

關門在梁門下一寸太一上

太一在關門下一寸

滑肉門在太一下一寸

天樞一名長谿去肓輸一寸半直臍傍二寸（脾藏卷云名長谷俠

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:38
列印頁數：1736
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

臍相去五寸一名循際

外陵在天樞下半寸大巨上

大巨在臍下一寸兩傍各二寸長谿下二寸

水道在大巨下三寸

歸來在氷道下二寸外臺作三寸

氣衝在歸來下一寸鼠鼷上一寸素問刺熱論註云在腹臍下橫骨兩端鼠鼷上一寸

腹第四行七穴遠近法第九

期門在第二肋端不容傍各一寸半上直兩乳

日月在期門下五分

腹哀在日月下一寸半

大橫在腹哀下二寸直臍傍甲乙云三寸

腹結在大橫下一寸三分

府舍在腹結下三寸

衝門上去大橫五寸在府舍下橫骨兩端約中

手太陰肺經十穴第十

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

少商在手大指端內側去爪甲角如韭葉

魚際在手大指本節後內側散脈中

大泉在手掌後陷者中 此即大淵也避唐祖名當時改正今存此名不改正恐後人將為實是一穴也

經渠在寸口陷者中不灸

列缺在腕上一寸半手太陰絡別走陽明

孔最在腕上七寸手太陰郄也

尺澤在肘中約上動脈

俠白在天府下去肘五寸動脈

天府在腋下三寸不灸

臑會在臂前廉去肩頭三寸 甲乙此穴在肩部外臺大腸銅人經屬三焦

手厥陰心主經八穴第十一

中衝在手中指端在爪甲如韭葉陷者中

勞宮在掌中央動脈

大陵在掌後兩骨間

內關在掌後去腕二寸 外臺作五寸

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:39
列印頁數：1738
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

手心主胳別走大陽

間使在掌後三寸兩筋間

郄門在掌後去腕五寸 外臺云去內關五寸 手厥陰郄也

曲澤在肘内廉下陷者中屈肘得之

天泉在腋下二寸舉腋取之

手少陰心經八穴第十二

少衝在手小指内廉之端去爪甲如韭葉

少府在手小指大節後陷者中直勞宮 大節又作本節

神門在掌後兌骨端陷者中

陰郄在掌後動脉中去腕半寸手少陰郄也

通理在腕後一寸手少陰胳別走太陽

靈道在掌後一寸半

少海在肘内廉節後陷中

極泉在腋下筋間動脉入骨

足太陰脾經十一穴第十三

隱白在足大趾端内側去爪甲如韭葉

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:39
列印頁數：1739
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大都在足大趾内本節後陷中 肝藏卷云在足大趾本節内側白肉際
太白在足大趾内側核骨下陷中
公孫在足大趾本節後一寸足太陰胳別走陽明
商丘在足内踝下微前陷中
漏谷在内踝上六寸骨下陷中太陰胳 銅人經云亦名太陰胳
三陰交在内踝上八寸骨下陷中
地機一名脾舍在膝下五寸足太陰郄也
陰陵泉在膝下内側輔骨下陷者中伸足得之
血海在膝膕上内廉白肉際二寸半 一作三寸
箕門在魚腹上筋間動應手陰市内
厲兌在足大趾次趾外端去爪甲角如韭葉
内庭在足大趾次趾外間
陷谷在足大趾次趾外間本節後去内庭二寸
衝陽在足跗上五寸骨間去陷谷三寸 一云二寸
解谿在衝陽後一寸半

足陽明胃經十五穴第十四

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

豐隆在外踝上八寸足陽明脉別走大陰

下廉一名下巨虛在上廉下三寸

條口在下廉上一寸

巨虛上廉在三里下三寸

三里在膝下三寸脛骨外

犢鼻在膝臏下骭上陝解大筋中

陰市一名陰鼎在膝上三寸伏兔下 第二十卷云在膝上當伏兔下行二寸臨膝取之

伏兔在膝上六寸不灸

髀關在膝上伏兔後交分中

梁丘在膝上二寸兩筋間 或云三寸足陽明郤也

伏人明堂圖 十門一百五穴 內十六穴單八十九穴雙

伏人頭上第一行五穴遠近法第一

後頂在百會後一寸半

強間在後頂後一寸半

腦戶在枕骨上強間後一寸半不灸

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:40
列印頁數：1741
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

風府在項後入髮際一寸大筋内宛宛中不灸

瘖門在項後髮際宛宛中不灸

頭上第二行三穴遠近法第二

玉枕在胳却後七分半俠腦戶傍一寸三分起肉枕骨

胳却在通天後一寸半

上入髮際三寸

天柱俠項後髮際大筋外廉陷者中

頭上第三行三穴遠近法第三

風池在顳顬後髮際陷中

承靈在正營後一寸半

腦空在承靈後一寸半俠玉枕傍枕骨下陷中一名顳

顬

伏人耳後六穴遠近法第四

顱息在耳後青脉間

瘛脉在耳本鷄足青脉不灸

完骨在耳後入髮際四分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

竅陰在完骨上枕骨下
浮白在耳後入髮際一寸
翳風在耳後陷中按之引耳中
脊中第一行十一穴遠近法第五
大椎在第一椎上陷中
陶道在大椎下節間
身柱在第三椎下節間
神道在第五椎下節間
靈臺在第六椎
至陽在第七椎下節間
筋縮在第九椎下節間
脊中在第十一椎下節間不灸
懸樞在第十三椎下節間
命門在第十四椎下節間
陽關穴在第十六椎
腰輸在第二十一椎下節間

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

長彊在脊骶端

脊中第二行二十一穴遠近法第六

大杼在項後第一椎下兩傍各一寸半陷中

風門一名熱府在第二椎下兩傍各一寸半

肺輸在第三椎下兩傍各一寸半 肺藏卷云對乳引繩度之

心輸在第五椎下兩傍各一寸半

膈輸在第七椎下兩傍各一寸半

肝輸在第九椎下兩傍各一寸半 第八卷云第九椎節脊中

膽輸在第十椎下兩傍各一寸半

脾輸在第十一椎下兩傍各一寸半 第八卷云脾輸無定所隨四季月應病即灸藏輸是脾穴

胃輸在第十二椎下兩傍各一寸半

三膲輸在第十三椎下兩傍各一寸半

腎輸在第十四椎下兩傍各一寸半

大腸輸在第十六椎下兩傍各一寸半

小腸輸在第十八椎下兩傍各一寸半

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

膀胱輸在第十九椎下兩傍各一寸半
中膂輸在第二十椎下兩傍各一寸半
白環輸在第二十一椎下兩傍各一寸半
上窌在第一空腰髁下一寸俠脊兩傍
次窌在第二空俠脊陷中
中窌在第三空俠脊陷中
下窌在第四空俠脊陷中
會陽在陰尾骨兩傍

脊中第三行十三穴遠近法第七

附分在第二椎下附項內廉兩傍各三寸
魄戶在第三椎下兩傍各三寸
膏肓在第四椎
神堂在第五椎下兩傍各三寸
譩譆在肩膊內廉俠第六椎下兩傍各三寸
膈關在第七椎下兩傍各三寸
魂門在第九椎下兩傍各三寸 外臺云十椎下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

手少陽三膲經十七穴第八

陽綱在第十椎下兩傍各三寸外臺云十一椎
意舍在第十一椎下兩傍各三寸外臺云九椎下
胃倉在第十二椎下兩傍各三寸
肓門在第十三椎下兩傍各三寸
志室在第十四椎下兩傍各三寸
胞肓在第十九椎下兩傍各三寸
秩邊在第二十一椎下兩傍各三寸
闕衝在手小指次指之端去爪甲角如韭葉
掖門在小指次指間陷者中
中渚在小指次指本節後間陷中
陽池在手表腕上陷者中
外關在腕後二寸陷中手少陽脉別走心主
支溝在腕後三寸兩骨間陷中
會宗在腕後三寸空中手少陽郄也
三陽絡在臂上大交脉支溝上一寸不刺

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:42
列印頁數：1746
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

四瀆在肘前五寸外廉陷中

天井在肘後外大骨後一寸兩筋間陷者中屈肘得之

清泠泉在肘上三寸伸肘舉臂取之 泉亦是淵字

消濼在肩下臂外開腋斜肘分下行

天宗在秉風後大骨下陷中 外臺屬小腸經

臑俞俠肩窻後大骨下胛上廉陷下

肩外俞在肩胛上廉去脊三寸陷者中

肩中俞在肩胛内廉去脊二寸陷者中

曲垣在肩中央曲胛陷者中按之應手痛

手太陽小腸經九穴第九

少澤在手小指端外側去爪甲一分陷中

前谷在手小指外側本節前陷中

後谿在手小指外側本節後陷中

腕骨在手外側腕前起骨下陷中

陽谷在手外側腕中兌骨之下陷中

養老在手踝骨上一空在後一寸陷者中手太陽郄也

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:43
列印頁數：1747
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

支正在腕後五寸手太陽胳別走少陰

小海在肘内大骨外去肘端五分

肩貞在肩曲胛下兩骨解間肩髃後陷者中 外臺在三朕經

足太陽膀胱經十七穴第十

至陰在足小趾外側去爪甲角如韭葉

通谷在足小趾外側本節前陷中

束骨在足小趾外側本節後陷中

京骨在足外節大骨下赤白肉際陷中

申脉陽蹻所生在外踝下陷中容爪甲

金門在足外踝下陷中一名關梁足太陽郄也

僕參一名安耶在足跟骨下陷中

崑崙在足外踝外跟骨上陷中

承山一名魚腹一名傷山一名肉柱在兌踹腸下分肉

飛揚一名厥陽在外踝上七寸足太陽胳別走少陽

承筋一名踹腸一名直腸在腘後從脚跟上七寸腨中

間陷者中

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夾陷中不刺

合陽在膝約中央下三寸

委中在腘中央約又中動脉

委陽在足太陽之後出於腘中外廉兩筋間

扶承下六寸

浮郄在委陽上一寸展足得之

殷門在肉郄下六寸

扶承一名肉郄一名陰關一名皮部在尻臀下股陰下文中 一云尻臀下陷文中

側人明堂圖 六門八十七穴雙

側人耳頸二十穴遠近法第一

頷厭在曲周顱顖上廉

懸顱在曲周顱顖中

懸釐在曲周顱顖下廉

天衝在耳上如前三寸

率谷在耳上入髮際一寸半

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

曲鬢在耳上髮際曲隅陷中

角孫在耳郭中間開口有空

和窌在耳前允髮下動脉

耳門在耳前起肉當耳缺

聽會在耳前陷中張口得之

聽宮在耳中珠子大如赤小豆

天容在耳下曲頰後

天牖在頸筋缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上一

寸

缺盆在肩上横骨陷中

扶突在氣舍後一寸半

天窻在曲頰下扶突後動應手陷中

天鼎在頸缺盆直扶突曲頰下一寸人迎後

人迎在頸大脉應手俠結喉傍以候五藏氣不灸

水突在頸大筋前直人迎下氣舍上 一本云水突在曲頰下一寸近後

氣舍在頸直人迎俠天突陷中

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:44
列印頁數：1750
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

側脅十穴遠近法第二

章門一名長平在大橫文外直臍季肋端

京門在監骨腰中季肋本俠脊

帶脉在季肋下一寸八分

維道在章門下五寸三分

五樞在帶脉下三寸一云在水道下一寸半

居髎在長平下八寸三分監骨上

泉腋在腋下三寸宛宛中舉臂得之 中風卷云腋門在腋下攢毛中一名泉腋即淵腋是也

大包在泉腋下三寸

輒筋在腋下三寸復前行一寸著脇

天池在乳後一寸腋下著肋直腋掾肋間

側人手陽明大腸經二十穴遠近法第三

商陽在手大指次指内側去爪甲角如韭葉

二間在手大指次指本節前内側陷者中

三間在手大指次指本節後内側陷者中

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

合谷在手大指次指岐骨間

陽谿在腕中上側兩筋間陷中

偏歷在腕後三寸手陽明胳別走太陰

温留在腕後小七五寸大七六寸一作小上大上手陽明郄也

下廉在輔骨下去上廉一寸

上廉在三里下一寸

三里在曲池下二寸按之肉起兌肉之端

曲池在肘後轉屈肘曲骨之中

肘窌在肘大骨外廉陷中

五里在肘上行馬裏大脉中不刺

臂臑在肘上七寸捆肉端

肩窌在肩端臑上斜舉臂取之

秉風俠天窌外肩上髃後舉臂有空

肩井在肩上陷解中缺盆上大骨前

天窌在肩缺盆中上毖骨之際陷者中

肩髃在肩端兩骨間按脉極篇云在肩外頭近後以手按之有解宛宛中外臺名扁骨

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:45
列印頁數：1752
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

巨骨在肩端上行兩乂骨間陷中

足少陽膽經十五穴遠近法第四

竅陰在足小趾次趾之端去爪甲如韭葉

俠谿在足小趾次趾岐間本節前

地五會在足小趾次趾本節後不灸

丘墟在足外踝如前陷者中去臨泣三寸

臨泣在足小趾本節後間陷者中去俠谿一寸半

付陽在外踝上三寸太陽前少陽後筋骨間

懸鍾一名絶骨在外踝上三寸動者中足三陽脉

陽輔在外踝上輔骨前絶骨端如前三分許去丘墟七寸

光明在足外踝上五寸足少陽郄陰

外丘在外踝上七寸足少陽郄也少陽所生

陽交一名別陽一名足窮陽維郄在外踝上七寸邪屬

三陽分肉間本云踝上三寸

陽陵泉在膝下一寸外廉陷中

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

關陽在陽陵泉上三寸犢皮外一本云關陵
中瀆在髀骨外膝上五寸分肉間
鐶跳在髀樞中

足厥陰肝經十一穴第五

大敦在足大趾端去爪甲如韭葉及三毛中
行間在足大趾間動應手陷中
大衝在足大趾本節後二寸或一寸半陷中
中封在足内踝前一寸仰足取之伸足乃得
蠡溝在足内踝上五寸足厥陰胳別走少陽
中都在内踝上七寸脛骨中與少陰相值一名中都
膝關在犢鼻下三寸陷者中足厥陰郄也甲乙銅人經云二寸甲乙又以中都為厥陰郄
曲泉在膝輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝乃得
陰包在膝上四寸股内廉兩筋間
五里在陰廉下二寸
陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

足少陰腎經十一穴第六

涌泉一名地衝在足心陷中屈足捲趾宛宛中（肝藏卷云在脚）

然谷一名龍泉在足內踝前起大骨下陷者中（婦人方上卷云）

（心大趾下大筋）

（在內踝前直下一寸）

大鍾在足跟後衝中足少陰胳別走太陽

大谿在足內踝後跟骨上動脉陷者中

水泉在大谿下一寸內踝下足少陰郄也

照海陰蹻脉所生在足內踝下

伏留一名昌陽一名伏白在足內踝上二寸陷中

交信在內踝上二寸少陰前太陰後廉筋骨間

築賓在內踝上踹分中

陰谷在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝而得之

會陰一名屏翳在小便前小便後兩陰間

已上三人圖共三百四十九穴

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:47
列印頁數：1755
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

手三陰三陽穴流注法第二上

凡孔穴

所出為井　所流為滎　所注為輸　所過為源

所行為經　所入為合

灸刺大法

春取滎　夏取輸　季夏取經　秋取合

冬取井

肺出少商為井手太陰脉也流於魚際為滎注於大泉為輸過於列缺為源行於經渠為經入於尺澤為合

心出於中衝為井心包絡脉也流於勞宮為滎注於大陵為輸過於間使為經入於曲澤為合

海為輸過於內關為源行於間使為經入於曲澤為合

心出於少衝為井手少陰脉也流於少府為滎注於神門為輸過於通里為源行於靈道為經入於少海為合

大腸出於商陽為井手陽明脉也流於二間為滎注於三間為輸過於合谷為源行於陽谿為經入於曲池為合

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:47
列印頁數：1756
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三膲出於關衝為井手少陽脉也流於腋門為滎注於中渚為輸過於池陽為源行於支溝為經入於天井為合

小腸出於少澤為井手太陽脉也流於前谷為滎注於後谿為輸過於腕骨為源行於陽谷為經入於小海為合

足三陰三陽穴流注法第二下

胃出於厲兌為井足陽明脉也流於内庭為滎注於陷谷為輸過於衝陽為源行於解谿為經入於三里為合

膽出於竅陰為井足少陽脉也流於俠谿為滎注於臨泣為輸過於丘墟為源行於陽輔為經入於陽陵泉為合

膀胱出於至陰為井足太陽脉也流於通谷為滎注於束骨為輸過於京骨為源行於崑崙為經入於委中為合

脾出於隱白為井足太陰脉也流於大都為滎注於太

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白為輸過於公孫為源行於商丘為經入於陰陵泉為合

肝出於大敦為井足厥陰脉也流於行間為滎注於太衝為輸過於中封為源行於中郄為經入於曲泉為合

腎出於涌泉為井足少陰脉也流於然谷為滎注於太谿為輸過於水泉為源行於伏留為經入於陰谷為合

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:48
列印頁數：1758
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷八十八　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

針灸

針灸禁忌第三

針禁忌法

大寒無刺　素問云天寒無刺天温無疑

月生無瀉　月滿無補

新内無刺　已刺無内

月郭空無治

大怒無刺　已刺無怒　大勞無刺　已刺無勞

大醉無刺　已刺無醉　大飽無刺　已刺無飽

大饑無刺　已刺無饑　大渴無刺　已刺無渴

乘車來者臥以休息如食頃乃刺之

步行來者坐以休息如行十里頃乃刺之

大驚大恐必定其氣乃刺之

刺中心一日死其動為噫

刺中肺三日死其動為欬

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

刺中肝五日死其動為語

刺中脾十五日死其動為吞

刺中腎三日死其動為噦　刺中五藏死日變動出素問刺禁篇又診要經終篇云中心者環死中脾者五日死中肝者五日死中腎者七日死中肺者五日死又四時刺逆從篇云中心一日死其動為噫中肝五日死其動為語中肺三日死其動為欬中腎六日死其動為噦欠中脾十日死其動為吞王冰注云此三論皆岐伯言有不同者傳之誤也

刺中膽一日半死其動吐嘔

刺中膈為傷中不過一歲必死

刺跌上中大脉血出不止死

刺陰股中大脉血出不止死

刺面中流脉不幸為盲

刺客主人内陷中脉為内漏

刺頭中腦户入腦立死　刺膝臏出液為跛

刺舌下中脉大過血出不止為瘖

刺臂太陰脉出血多立死

刺足下布胳中脉血不出

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:49
列印頁數：1760
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

刺足少陰脉重虛出血為舌難以言

刺郄中大脉令人仆脫色

刺膺中陷中肺為喘逆仰息

刺氣衝中脉血不出為腫鼠鼷

刺肘中内陷氣歸之為不屈伸

刺陰股下三寸内陷令人遺溺

刺乳上中乳房為腫根蝕

刺脊間中髓為僵

刺腋下脅間内陷令人欬

刺缺盆中内陷氣洩令人喘欬逆

刺小腹中膀胱溺出令人小腹滿

刺手魚腹内陷為腫　刺腨腸内陷為腫

刺目匡上陷骨中脉為漏為盲

刺關節中液出不得屈伸

神庭禁不可刺　上關刺不可深

缺盆刺不可深　顱息刺不可多出血

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:49
列印頁數：1761
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

臍中禁不可刺　左角刺不可久留

雲門刺不可深　經云雲門刺不可深今則都忌不刺學者宜詳悉之

五里禁不可刺

伏兔禁不可刺　按甲乙足陽明經伏兔刺入五分則不當禁

三陽絡禁不可刺

乳中禁不可刺　伏留刺無多見血

承筋禁不可刺　然谷刺無多見血

炙禁忌法

乳中禁不可刺　鳩尾禁不可刺

承筋禁不可刺

伏兔禁不可刺

三陽絡禁不可刺

五里禁不可刺

雲門刺不可深

左角刺不可久留

臍中禁不可刺

頭維禁不可灸　承光禁不可灸

腦戶禁不可灸　風府禁不可灸

瘖門禁不可灸　陰市禁不可灸

下關耳中有干適低無灸　陽關禁不可灸

耳門耳中有膿及適低無灸

人迎禁不可灸

絲竹空灸之不幸使人目小及盲

承泣禁不可灸　脊中禁不可灸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乳中禁不可灸　瘈脉禁不可灸
石門女子禁不可灸　白環輸禁不可灸
氣衝灸之不幸不得息　泉腋灸之不幸生膿蝕經渠禁不可灸
天府禁不可灸
伏兔禁不可灸　地五會禁不可灸
鳩尾禁不可灸
五臟六腑變化傍通訣第四
凡五臟六腑變化無窮散則諸經其事隱沒難得具知矣
五臟
今纂集相附以為傍通令學者少留意推尋造次可見

五臟經

腎 一 水
心 二 火
肝 三 木
肺 四 金
脾 五 土

六腑

膀胱 小腸 膽　大腸 胃 三焦

足少陰 手少陰 足厥陰 手太陰 足太陰

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:50
列印頁數：1763
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

六腑經
足太陽　手太陽　足少陽　手陽明　足陽明
手少陽
五臟脉
五臟斤兩
沈濡　洪盛　弦長　浮短　緩大
一斤二兩　又云一斤一兩
十二兩　三毛七孔
四斤四兩　左三葉右四葉
三斤三兩　六葉兩耳
五臟斤兩
六腑斤兩
二斤三兩
九兩二銖　二斤十四兩　三兩三銖
二斤十二兩　二斤十四兩
六腑丈尺
縱廣七寸　又云九寸
長二丈四尺　廣二寸四分
三寸三分
大一尺五寸
一大二尺　廣六寸

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:50
列印頁數：1764
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

六腑所受

九升二合 又云九升九合 二斗四升

一合 難經作三合 一斗二升

三斗五升

五臟官

後宮列女 帝王

大尚書 又為將軍 上將軍 又為郎官 諫議大夫

六腑官

水曹掾 監倉吏 將軍決曹吏

監倉掾 内廚吏

五臟輸

十四椎 五椎 九椎 三椎 十一椎

六腑輸

十九椎 十八椎 十椎 十六椎 十二椎

十三椎

五臟募

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:51
列印頁數：1765
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

京門 巨闕 期門 中府 章門

六腑募

中極 關元 日月 天樞 中管 石門

五臟脉出

涌泉 中衝 大敦 少商 隱白 此心包絡經心經出少衝

注 大谿 大陵 神門 大衝 大泉 大白

流 甲乙作留 然谷 勞宮 少府 心經流 行間 魚際 大都

過 水泉 內關 通里 心經過 中封 列缺 公孫

行 伏留 間使 靈道 心經行 中郄 經渠 商丘

入 陰谷 曲澤 少海 心經入 曲泉 尺澤

陰陵泉

六腑脉出

至陰 少澤 竅陰 商陽 厲兌

關衝 關衝 此三膲經出

流 通谷 前谷 俠谿 二間 內庭

腋門

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:51
列印頁數：1766
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

注 束骨 後谿 臨泣 三間 陷谷
中渚
過 京骨 腕骨 丘墟 合谷 衝陽
陽池
行 崑崙 陽谷 陽輔 陽谿 解谿
支溝
入 委中 小海 陽陵泉 曲池 三里
天井
五竅 二陰 耳 舌 口 目 鼻 脣
五養 精 骨 血 脉 筋 肉 皮毛
五液 唾 汗 淚 涕 涎
五聲 呻 噫 言 呼 哭 歌

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

六氣

咽 吹 呼 呵 噓 嘻

五神

志（精） 神（性又作脉神） 血（魂） 氣（魄） 意（智又作營意）

五有餘病

脹滿 笑不止 怒 喘喝仰息 涇溲不利

五不足病

厥逆 憂（一作悲） 恐 息利少氣 四肢不用

六情

惡哀 怵慮（一作慁） 好喜（一作直喜） 威怒

樂愚 貪狼 廉貞 陰賊 寬大 公正

姦邪

八性

欲忌 友愛 慈（意悲） 氣（正） 公私（怨）

五常

智（謀） 禮（哲） 仁（肅） 義（乂） 信（聖）

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:52
列印頁數：1768
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五事
聽（聰） 視（明） 貌（恭） 言（從） 思（睿）

五咎
急豫狂僭蒙

五音
吟咏肆呼諷唱歌

五聲
羽（四十八絲） 徵（五十四絲） 角（六十四絲） 商（七十二絲） 宮（八十）

五色
黑赤青白黃

五味
鹹苦酸辛甘

五臭
腐焦羶（臊） 腥香 酸甘 苦鹹 辛

五宜（子來扶母）

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:53
列印頁數：1769
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五惡 惡味之
甘鹹辛苦酸
五惡 氣之惡
燥熱風寒濕
五行
五行
一六二七三八四九五十
水火木金土
五行之象
五形 外臺云外應五行之形內法五形之象
五時
冬夏春秋季夏
曲直屈圓
五畜 外臺云
豕鼠 羊蛇馬 鷄虎兔 犬猴鷄
牛羊犬牛 外臺云龍 外臺云 外臺云
五穀

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大豆　麥　麻
五菓　　稻 黍稷
五菜　栗　杏　李　桃　棗
　　薤　韮　蔥　葵
論曰假令人腎心肝肺脾為臟則膀胱小腸膽大腸胃為腑足少陰為腎經足太陽為膀胱經下至五藏五菓五菜皆爾觸類長之他皆倣此 外臺續添二十三條本非千金之舊今更不附入

備急千金要方卷八十八

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,備急千金要方
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷八十九　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

針灸

用針略例第五

夫用針刺者先明其孔穴補虛瀉實送堅付濡以急隨緩榮衛常行勿失其理夫為針者不離乎心口如銜索目欲内視消息氣血不得妄行針入一分知天地之氣針入二分知呼吸出入上下水火之氣針入三分知四時五行五臟六腑逆順之氣針皮毛腠理者勿傷肌肉針肌肉者勿傷筋脉針筋脉者勿傷骨髓針骨髓者勿傷諸絡

東方甲乙木主人肝膽筋膜魂

南方丙丁火主人心小腸血脉神

西方庚辛金主人肺大腸皮毛魄

北方壬癸水主人腎膀胱骨髓精志

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:54
列印頁數：1772
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中央戊巳土主人脾胃肌肉意智
針傷筋膜者令人憒視失魂
傷血脉者令人煩亂失神
傷皮毛者令人上氣失魄
傷骨髓者令人呻吟失志
傷肌肉者令人四肢不收失智
此為五亂因針所生若更失度者有死之憂也所謂針
能殺生人不能起死人謂愚人妄針必死不能起生人
又須審候與死人同狀者不可為醫與亡國同政者不
可為謀雖聖智神人不能活死人存亡國也故曰危邦
不入亂邦不居凡愚人貪利不曉於治亂存亡危身滅
族彼此俱喪亡國破家亦醫之道也
凡用針之法以補瀉為先呼吸應江漢補瀉校升斗經
緯有法則陰陽不相干震為陽氣始(火主於寅)兌為陰氣終
(戊為土坎為太玄華冬至之日夜半一陽爻生)離為太陽精(為中女之象)欲

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

補從卯南（補不足地戶至巽為地虛）欲瀉從酉北（天門在乾）針入因日明向宵至午針出隨月光（從由向午午為日月光之位）如此思五行氣以調榮衛用以將息之是曰隨身寶

凡用鋒針針者除疾速也先補五呼刺入五分留十呼刺入一寸留二十呼隨師而將息之刺急者深內而久留之刺緩者淺內而疾發針刺大者微出其血刺滑者疾發針淺內而久留之刺澀者必得其脉隨其逆順久留之疾出之壓其穴勿出其血諸小弱者勿用大針然氣不足宜調以百藥餘三針者正中破癰堅瘤結息肉也亦治人疾也火針亦用鋒針油火燒之務在猛熱不熱即於人有損也隔日一報三報之後當膿水大出為佳

巨闕太倉上下管此之一行有六穴忌火針也大癥塊當停針轉動須臾為佳

每針常須看脉脉好乃下針脉惡勿亂下針也下針一宿發熱惡寒此為中病勿怪之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

灸例第六

凡孔穴在身皆是臟腑榮衛血脉流通表裏往來各有所主臨時救難必在審詳人有老少體有長短膚有肥瘦皆須精思商量准而折之無得一槩致有差失其尺寸之法依古者八寸為尺仍取病者男左女右手中指上第一節為一寸亦有長短不定者即取手大拇指第一節橫度為一寸以意消息巧拙在人其言一夫者以四指為一夫又以肌肉文理節解縫會宛陷之中及以手按之病者快然如此仔細安詳用心者乃能得之耳

凡經云橫三間寸者則是三灸兩間一寸有三灸有三分三壯之處即為一寸黃帝曰灸不三分是謂徒寃灶務大也小弱灶乃小作之以意商量

凡點灸法皆須平直四體無使傾側灸時孔穴不正無益於事徒破好肉耳若坐點則坐灸之臥點則臥灸之立點則立灸之反此亦不得其穴矣

凡言壯數者若丁壯遇病病根深篤者可倍多於方數

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

其人老小羸弱者可闕半依扁鵲灸法有至五百壯闕千壯皆臨闕息之明堂本經多云針入六分灸三壯闕餘論曹氏灸法有百壯者有五十壯者闕諸方亦皆有此仍須准病輕重以行之不可膠柱守株

凡新生兒七日以上周年以還不過七壯炷如雀屎大凡灸先陽後陰言從頭向左而漸下次後從頭向右而漸下先上後下皆以日正午已後乃可下火灸之時謂陰氣未至灸無不著午前平旦穀氣虛令人癲眩不可針灸也慎之其大法如此卒急者不可用此例

灸之生熟法腰已上為上部腰已下為下部外為陽部榮內為陰部衛故臟腑周流名曰經絡是故丈夫四十已上氣在腰老嫗四十已上氣在乳是以丈夫先衰於下婦人先衰於上灸之生熟亦宜撙而節之法當隨病遷變大法外氣務生內氣務熟其餘隨宜耳頭者身之元首人神之所法氣口精明三百六十五絡皆上歸於頭頭者諸陽之會也故頭病必宜審之灸其穴不得亂

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

灸過多傷神或使陽精玄熟令陰魄再卒是以灸頭正得滿百脊背者是體之橫梁五臟之所繫著太陽之會合陰陽動發冷熱成疾灸太過熟大害人也臂脚手足者人之枝榦其神繫於五臟六腑隨血脉出能遠近採物臨深履薄養於諸經狹淺故灸宜少灸過多即內神不得入精神閉塞否滯不仁即臂不舉故四肢之灸不宜太熟也然腹臟之內為性貪於五味無厭成疾風寒結痼水穀不消宜當熟之然大杼脊中腎輸膀胱八竅太衝陰陽二陵泉上下二廉可至百壯腹上下管中管可至二百壯心主手足太陰可至六十七壯三里太鷄若治諸沈結寒冷病莫若灸之宜熟若治諸陰陽風者太倉關元可至百壯若病重者皆當三報之乃愈病耳身熱脉大者以鋒針刺之間日一報之若治諸邪風鬼注痛處少氣以毫針去之隨病輕重用之表針内藥隨時用之消息將之與天同心百年永安終無橫病此要略說之非賢勿傳祕之凡微數之脉慎不可灸傷血脉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

焦筋骨凡汗已後勿灸此為大逆脉浮熱甚勿灸
頭面目咽灸之最欲生少手臂四肢灸之欲須小熟亦
不宜多胷背腹灸之尤宜大熟其腰脊欲須少生大體
皆須以意商量臨時遷改應機千變萬化難以一准耳
其温病隨所著而灸之可百壯餘少至九十壯大杼胃
脘可五十壯手心主手足太陽可五十壯三里曲池太
衝可百壯皆三報之乃可愈耳風勞沈重九部盡病及
毒氣為疾者不過五十壯亦宜三報之若攻臟腑成心
腹疼者亦宜百壯若卒暴病鬼魅所著者灸頭面四肢
宜多腹背宜少其多不過五十其少不減三五七九壯
凡陰陽濡風口喎僻者不過三十壯三日二報報如前
微者三報重者九報此風氣濡微細入故宜緩火温氣
推排漸抽以除耳若卒暴催迫則流行細入成瘂疾不
可愈也故宜緩火凡諸虚疾水穀沈結流離者當灸腹
背宜多而不過百壯大凡人有卒暴得疾或中時氣凡
百所苦皆須急灸療慎勿忍之停滯也若王相者可得

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

無他不爾漸久後皆難愈深宜知此一條凡人吳蜀地遊宦體上常須三兩處灸之勿令瘡暫瘥則瘴癘瘴温瘧毒氣不能著人也故吳蜀多行灸法有阿是之法言人有病痛即令捏其上若裏當其處不問孔穴即得便快成痛處即云阿是灸刺皆驗故曰阿是穴也

太醫針灸宜忌第七

論曰欲行針灸先知行年宜忌及人神所在不與禁忌相應即可今具如左

木命人行年在木則不宜針及服青藥火命人行年在火則不宜汗及服赤藥土命人行年在土則不宜吐及服黄藥金命人行年在金則不宜灸及服白藥水命人行年在水則不宜下及服黑藥凡醫者不知此法下手即困若遇年命厄會深者下手即死

推天醫血忌等月忌及日忌傍通法

月傍通　正二三四五六七八九十十一十二

天醫　卯寅丑子亥戌酉申未巳午辰　呼師治病吉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

血忌　丑未寅申卯酉辰戌巳亥午子　忌針灸

月厭　戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥　忌針灸

四激　戌戌戌丑丑丑辰辰辰未未未　忌針灸

月殺　戌巳午未寅卯辰亥子丑申酉　不可逆百事凶千金翼外

臺云丑戌未辰丑戌未辰丑戌未辰

月刑　巳子辰申午丑寅酉未亥卯戌　不療病

六害　巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午　不療病

右天醫上呼師避病吉若刑害上凶

推行年醫法

年至　子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

天醫　卯戌子未酉亥辰寅巳午丑申

求歲天醫法

常以傳送加太歲太乙下為天醫

求月天醫法

陽月以大吉陰月以小吉加月建功曹下為鬼道傳送下為天醫

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:58
列印頁數：1780
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

推避病法

以小吉加月建登明下為天醫可於此避病

推治病法

以月將加時天醫加病人年治之瘥

喚師法

未卯巳亥酉 鬼所在喚師凶

推行年人神法

臍心肘咽口頭脊膝足

一二三四五六七八九

十十一十二十三十四十五十六十七十八

十九二十二十一二十二十三十四二十五二十六二十七

二十八二十九三十三十一三十二三十三三十四三十五三十六

三十七三十八三十九四十四十一四十二四十三四十四四十五

四十六四十七四十八四十九五十五十一五十二五十三五十四

五十五五十六五十七五十八五十九六十六十一六十二六十三

六十四六十五六十六六十七六十八六十九七十七十一七十二

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

七十三七十四七十五七十六七十七七十八七十九八十八十一
八十二八十三八十四八十五八十六八十七八十八八十九九十
右九部行神歲移一部周而復始不可針灸
推十二部人神所在法
心辰 喉卯 頭寅 眉丑 背子 腰亥 腹戌 項酉 足申 膝未
陰午 股巳 眉千金翼作肩
一二三四五六七八九十
十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十
二十一二十二二十三二十四二十五二十六二十七二十八二十九三十
三十一三十二三十三三十四三十五三十六三十七三十八三十九四十
四十一四十二四十三四十四四十五四十六四十七四十八四十九五十
五十一五十二五十三五十四五十五五十六五十七五十八五十九六十
六十一六十二六十三六十四六十五六十六六十七六十八六十九七十
七十一七十二七十三七十四七十五七十六七十七七十八七十九八十
八十一八十二八十三八十四八十五八十六八十七八十八八十九九十
九十一九十二九十三九十四九十五九十六

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:59
列印頁數：1782
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右十二部人神所在並不可針灸及損傷慎之

日辰忌

一日足大趾　二日外踝

三日股內　四日腰

五日口舌咽懸雍　六日足小趾 外臺云手小指

七日內踝　八日足腕

九日尻　十日背腰

十一日鼻柱 千金翼云及眉　十二日髮際

十三日牙齒　十四日胃管

十五日徧身　十六日膂乳

十七日氣衝 千金翼云及脇　十八日腹內

十九日足趺　二十日膝下

二十一日手小指　二十二日伏兔

二十三日肝輸　二十四日手陽明兩脇

二十五日足陽明　二十六日手足

二十七日膝　二十八日陰

列印日期/時間：02/04/2005 18:51:59
列印頁數：1783
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

二十九日膝脛顳顬
三十日關元下至足心外臺云足趺上
十干十二支人神忌日
甲日頭 乙日項 丙日肩臂 丁日胷脇 戊日腹
己日背 庚日膝 辛日脾 壬日腎 癸日足
又云
甲乙日忌寅時頭
丙丁日忌辰時耳
庚辛日忌申時腧文
戊己日忌午時髮
壬癸日忌酉時足
子日目
丑日耳
寅日口外臺云胷面
卯日鼻外臺云在脾
辰日腰
巳日手外臺云頭口
午日心
未日足外臺云兩足心
申日頭外臺云二肩
酉日背外臺云脛
戌日項外臺云咽喉
亥日頂外臺云臂脛
建日申時頭外臺云足
除日酉時膝外臺云眼

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

滿日戌時腹
平日亥時腰背
定日子時心
執日丑時手
破日寅時口
危日卯時鼻
成日辰時脣
收日巳時足 外臺云頭
開日午時耳
閉日未時目

右件時不得犯其處殺人

十二時忌

子時踝
丑時頭
寅時目
卯時面耳 外臺云在項
辰時項口 外臺云在面
巳時肩 外臺云在乳
午時脅肋
未時腹
申時心
酉時背胛 外臺云闕
戌時腰陰
亥時股

又

立春春分脾
立夏夏至肺
立秋秋分肝
立冬冬至心

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

四季十八日腎
已上並不得醫治凶
凡五臟王時不得治及忌針灸其經絡凶
又
正月丑　二月戌　三月未　四月辰　五月丑
六月戌　七月未　八月辰　九月丑　十月戌
十一月未　十二月辰
又
春左脇　秋右脇　夏在臍　冬在腰　皆凶
又
每月六日十五日十八日二十二日二十四日小盡
日療病令人長病
戊午甲午　此二日大忌刺出血服藥針灸皆凶千金翼云不出月凶
甲辰庚寅乙卯丙辰辛巳　此日針灸凶
壬辰甲辰己巳丙午丁未　此日男忌針灸
甲寅乙卯乙酉乙巳丁巳　此日女人忌針灸

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:00
列印頁數：1786
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甲子壬子甲午丙辰丁巳辛卯癸卯乙亥 此日忌針灸外臺云
甲子日天子會壬子日百王會甲午日太子會丁巳日王公會丙辰日諸侯會辛卯日大夫會癸卯日大人會乙亥日巳上都會

又

男避除 女避破 男忌戊 女忌巳

凡


五辰 五酉 五未 及八節 先後各一日皆凶

論曰此等法散在諸部不可尋究故集作一處造次易知所以省披討也

備急千金要方卷八十九

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:01
列印頁數：1787
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)



欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷九十 九十一

詳校官翰林院編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄監生臣劉耀馥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷九十 唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

針灸

孔穴主對法第八

論曰凡云孔穴主對者穴名在上病狀在下或一病有數十穴或數病共一穴皆臨時斟酌作法用之其有須針者即針刺以補瀉之不宜針者直爾灸之然灸之大法但其孔穴與針無忌即下白針若温針訖乃灸之此為良醫其脚氣一病最宜針之若針而不灸灸而不針皆非良醫也針灸而藥藥不針灸尤非良醫也但恨下里間知針者鮮耳所以學者深須解用針燔針白針皆須妙解知針知藥固是良醫

頭病

頭面第九

神庭 水溝主寒熱頭痛喘渴目不可視 又云神庭主風頭眩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

善嘔煩滿言

頭維 大陵主頭痛如破目痛如脫 甲乙云喘逆煩滿嘔吐流汗難

崑崙 解谿 曲泉 飛揚 前谷 少澤 通里

主頭眩痛

竅陰 强間主頭痛如錐刺不可以動

腦户 通天 腦空主頭重痛

消濼主寒熱癉頭痛

攢竹 承光 腎輸 絲竹空 瘈脉 和髎主風頭痛 又云瘈脉主風頭耳後痛

上星主風頭眩顏清 又云上星主風頭引領痛

顳會主風頭眩頭痛顏清

天牖 風門 崑崙 關元 關衝主風眩頭痛

合谷 五處主風頭熱

前頂 後頂 頷厭主風眩偏頭痛

玉枕主頭半寒痛 甲乙云頭眩痛頭半寒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

天柱 陶道 大杼 一作本神 孔最 後谿主頭痛

目窗 中渚 完骨 命門 豐隆 太白 外丘

通谷 京骨 臨泣 小海 承筋 陽陵泉主頭

痛寒熱汗出不惡寒

項病

少澤 前谷 後谿 陽谷 完骨 崑崙 小海

攢竹主項強急痛不可以顧

消濼 本神 通天 強間 風府 瘖關 天柱

風池 斷交 天衝 陶道 外丘 通谷 玉枕

主項如拔不可左右顧

天容 前谷 角孫 腕骨 支正主頸腫項痛不

可顧 又云天容主頸項癰不能言角孫主頸頷柱滿

飛揚 涌泉 頷厭 後頂主頸項疼歷節汗出

面病

攢竹 斷交 玉枕主面赤頰中痛

上星 顱會 前項 腦戶 風池主面赤腫

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:03
列印頁數：1791
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

巨窌主面惡風寒頰腫痛

天突　天窗主面皮熱　又云天窗主頰腫痛

腎輸　內關主面赤熱

行間主面蒼黑

大衝主面塵黑

中渚主頷顱痛頷顱熱痛面赤

懸釐主面皮赤痛

目病

大敦主目不欲視大息

大都主目眩

承泉　前頂　天柱　腦空　目窗主目眩瞑

天柱　陶道　崑崙主目眩又目不明目如脫

腎輸　內關　心輸　復留　太泉　腕骨　中渚

攢竹　精明　百會　委中　崑崙　天柱　本神

大杼　頷厭　通谷　曲泉　後頂　胃輸　絲竹

空主目眩眩不明惡風寒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

陽白主目瞳子痛癢遠視眩眩昏夜無所見

掖門　前谷　後谿　腕骨　神庭　百會　天柱

風池　天牖　心輸主目泣出　又云天牖主目不明耳不聰

至陰主目瞤

後谿主背爛有瞤

丘墟主視不精了目瞤子瞳不見

前谷　京骨主目中白瞤　又云京骨主目反白白瞤從內背始

精明　斷交　承泣　四白　風池　巨窌　瞳子窌

上星　肝輸主目淚出多眵矇內背赤痛癢生白膚

瞤照海主目痛視如見星

肝輸主熱病瘥後食五辛多患眼間如雀目

陽白　上星　本神　大都　曲泉　俠谿　三間

前谷　攢竹　玉枕主目系急目上插

絲竹空　前頂主目上插增風寒

承泣主目瞤動與項口相引　甲乙云目不明淚出目眩瞖瞳子癢遠視眩眩

昏夜無見目瞤動與項口參相引喎僻口不能言

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:04
列印頁數：1793
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三間　前谷主目急痛

申脉主目反上視若赤痛從内眥始

陽谿　陽谷主目痛赤

曲泉主目赤腫痛

陽谷　大衝　崑崙主目急痛赤腫 又云大衝主下眥皆痛

束骨主眥爛赤

掖門主目澁暴變

顴窌　内關主目赤黄

二間主眥傷

商陽　巨窌　上關　承光　童子窌　絡却主青

盲無所見

期門主目青而嘔

風池　腦户　玉枕　風府　上星主目痛不能視

先取譩譆後取天牖風池

大泉主目中白睛青

俠谿主外眥赤痛逆寒泣出目癢

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:04
列印頁數：1794
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鼻病

神庭　攢竹　迎香　風門　合谷　至陰　通谷

主鼻鼽清涕出

曲差　上星　迎香　素窌　水溝　斷交　通天

瘡

禾窌　風府主鼻窒喘息不利鼻喎僻多涕鼽衄有

瘡

水溝　天牖主鼻不收涕不知香臭甲乙云鼻衄不得息及衄不止

斷交主鼻中息肉不利鼻頭額顩中痛鼻中有蝕

瘡

承靈　風池　風門　譩譆　後谿主鼻衄室喘息

不通

腦空　竅陰主鼻管疽發為癰鼻

風門　五處主時時噦不已

肝輸主鼻中酸

中管　三間　偏歷　厲兌　承筋　京骨　崑崙

承山　飛揚　隱白主頭熱鼻鼽衄　又云中管主鼻間焦臭

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:05
列印頁數：1795
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

天柱主不知香臭
復留主涎出鼻孔中痛
京骨 申脉主鼻中衄血不止淋瀝
厲兌 京骨 前谷主鼻不利涕黃
耳病
上關 下關 四白 百會 顱息 翳風 耳門
頷厭 天窗 陽谿 關衝 掖門 中渚主耳痛
鳴聾
天容 聽會 聽宮 中風主聾嘈嘈若蟬鳴
天牖 四瀆主暴聾
少商主耳前痛
曲池主耳痛
外關 會宗主耳渾渾淳淳聾無所聞
前谷 後谿主耳鳴仍取偏歷大陵
腕骨 陽谷 肩貞 竅陰 俠谿主頷痛引耳嘈
嘈耳鳴無所聞

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

商陽主耳中風聾鳴刺入一分留一呼灸三壯左取右右取左如食頃

口病

承泣 四白 巨窌 禾窌 上關 大迎 顴骨 頰車 顴窌主口僻痛惡風寒不可以噤

强間 風池 迎香 水溝主口喎僻不能言

頰車 顴窌主口僻痛惡風寒不可以噤

外關 内庭 三里 大泉 甲乙云口僻刺大淵引而下之 商丘主

僻噤

水溝 斷交主口不能禁水漿喎僻

斷交 上關 大迎 翳風主口噤不開引鼻中

合谷 水溝主脣吻不收瘡不能言口噤不開

商丘 曲鬢主口噤不開

地倉 大迎主口緩不收不能言

下關 大迎 醫風主口失欠下牙齒痛

膽輸 商陽 小腸輸主口舌乾食飲不下

勞宮 少澤 三間 大衝主口熱口乾口中爛 又云

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:05
列印頁數：1797
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

勞宮主大人小兒口中腫腥

曲澤 章門主口乾

大谿 少澤主咽中乾口中熱唾如膠

兌端 目窻 正營 耳門主脣吻强上齒齲痛

陽陵泉主口苦嗌中介介然

光明 臨泣主喜齧頰

京骨 陽谷主自齧脣一作頰

解谿主口痛齧舌

欽定四庫全書

備急千金要方

舌病

廉泉然谷甲乙作通谷

陰谷主舌下腫難言舌急語難

風府主舌緩瘖不能言舌瘡涎出

扶突 大鍾 竅陰主舌本出血

魚際主舌上黄身熱

尺澤主舌乾脅痛

關衝主舌捲口乾心煩悶

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中衝主舌本痛
支溝　天窻　扶突　曲鬢　靈道主暴瘖不能言
天突主俠舌縫脉青
復留主舌捲不能言

齒病

厲兌　三間　衝陽　偏歷　小海　合谷　内庭
浮白主牙齒痛不能言
復留主齲齒
大迎　頰顬　聽會　曲池主齒痛惡寒
陽谷　正營主上牙齒痛
陽谷　掖門　商陽　二間　四瀆主下牙齒痛
角孫　頰鼻主牙齒不能嚼
下關　大迎　翳風　完骨主牙齒齲痛

喉咽病

曲鬢　衝陽主齒齲
風府　天窻　勞宮主喉嗌病

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:06
列印頁數：1799
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

扶突　天突　天谿主喉鳴暴忤氣哽

少商　大衝　經渠主喉中鳴

魚際主喉中焦乾

水突主喉咽腫

掖門　四瀆主呼吸短氣咽中如息肉狀

少府　蠡溝主噎中有氣如息肉狀

少衝主酸咽

間使主噎中如扼甲乙作閒

中渚　支溝　内庭主噎痛

復留　照海　大衝　中封主噎乾

前谷　照海　中封主咽偏腫不可以咽

涌泉　大鍾主咽中痛不可内食

然谷　大谿主噎内腫氣走咽喉而不能言

風池主喉咽僂引項攣不收

喉痺

完骨　天牖　前谷主喉痺頸項腫不可俛仰頰腫

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:07
列印頁數：1800
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

引耳後

中府 陽交主喉痺胷滿塞寒熱

天容 缺盆 大杼 膈輸 雲門 尺澤 二間

厲兌 涌泉 然谷主喉痺哽咽寒熱

天鼎 氣舍 膈輸主喉痺哽噎咽腫不得消食飲不下

天突主喉痺咽乾急

大陵 偏歷主喉痺嗌乾

旋機 鳩尾主喉痺咽腫水漿不下

三間 陽谿主喉痺咽如哽

神門 合谷 風池 主喉痺

三里 温留 曲池 中渚 豐隆主喉痺不能言

關衝 竅陰 少澤主喉痺舌捲口乾

凡喉痺胷中暴逆先取衝脉後取三里雲門各瀉之

又刺手小指端出血立已

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:07
列印頁數：1801
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷九十一　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

針灸

心腹第十

胷膺

通谷　章門　曲泉　腦輸　期門　食竇　陷谷

石門主胷膺支滿

肝輸　脾輸　志室主兩脅急痛

腎輸主兩膺引痛

神堂主胷腹滿

三間主胷滿腸鳴

陽谿　天容主胷滿不得息

期門　缺盆主胷中熱息貴膺下氣上

本神　顱息主胷膺相引不得傾側

大杼　心輸主胷中鬱鬱

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

曲池　人迎　神道　章門　中府　臨泣　天池
旋機　府輸主胷中滿
支溝主脅腋急痛
腕骨　陽谷主脅痛不得息
豐隆　丘墟主胷痛如刺
竅陰主脅痛欬逆
臨泣主季脇　支痛胷痺不得息　闕
陽輔主胷脇痛
陽交主胷滿腫
環銚　至陰主胷脇痛無常處腰脇相引急痛
太白主胷脇脹切痛　甲乙云腸鳴切痛
然骨主胷中寒欬唾有血
大鍾主胷喘息脹
膽輸　章門主脇痛不得卧胷滿嘔無所出
大包主胷脇中痛
膻中　天井主胷心痛

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:08
列印頁數：1803
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

華蓋 紫宮 中庭 神藏 靈墟 胃輸 俠谿

步郎 商陽 上廉 三里 氣戶 周榮 上管

勞官 涌泉 陽陵泉主胷脇柱滿

膚窓主胷脇癰腫

乳根主胷下滿痛

雲門 中府 隱白 期門 肺輸 魂門 大陵

主胷中痛 又云雲門主胷中暴逆

鳩尾主胷滿欬逆

巨闕 間使主胷中澹澹 又云間使主胸脾背相引

中管 承滿主脇下堅痛

梁門主胷下積氣

大泉主胷滿嗷呼胷膚痛

魚際主癉走胷背不得息

關元 期門 少商主脇下脹

經渠 丘墟主胷背急胷中彭彭

尺澤 少澤主短氣脇痛心煩

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:08
列印頁數：1804
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

少衝主胷痛口熱
凡胷滿短氣不得汗皆針補手太陰以出汗
心病
支溝　大谿　然谷主心痛如錐刺甚者手足寒至節不息者死　又云然谷主心如懸少氣不足以息
大都　太白主暴泄心痛腹脹心痛尤甚
臨泣主胷癖心痛不得反側　甲乙云不得息痛無常處
行間主心痛色蒼蒼然如死灰狀終日不得太息
通谷　巨闕　太倉　心輸　膻中　神府主心痛
通里主卒痛煩心心中懊憹數欠頻伸心下悸悲恐
尺澤主心痛彭彭然心煩悶亂少氣不足以息
期門　長强　天突　俠白　中衝主心痛短氣
腎輸　復留　大陵　雲門主心痛如懸
章門主心痛而嘔
建里主心痛上搶心不欲食
少衝主心痛而寒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大泉主心痛肺脹胃氣上逆
鳩尾主心寒脹滿不得食息賁唾血厥心痛善噦心
疝太息
上管主心痛有三蟲多涎不得反側
中管主心痛難以俛仰 甲乙云身寒心疝衝胃死不知人
不容 期門主心切痛喜噫酸
育門主心下大堅
靈道主心痛悲恐相引癡癎
間使主心懸如饑
郄門 曲澤 大陵主心痛
商丘主心下有寒痛又主脾虛令人病不樂好太息
凡卒心痛汗出刺大敦出血立已
内關主凡心實者則心中暴痛虛則心煩惕然不能
腹病
動失智
復留 中封 腎輸 承筋 陰包 承山 大敦

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:10
列印頁數：1806
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

主小腹痛又云復留主腹厥
石門商丘主小腹堅痛下引陰中
氣海主小腹疝氣遊行五藏腹中切痛
關元委中照海大谿主小腹熱而偏痛
膈輸陰谷主腹脹胃管暴痛及腹積聚肌肉痛
高曲主腹中積聚時切痛一名商曲
四滿主腹僻切痛
天樞主腹中盡痛
外陵主腹中盡疼
崑崙主腹痛喘暴滿
氣衝主身熱腹痛
腹結主繞臍痛搶心
衝門主寒氣滿腹中積痛疼淫濼
間使主寒中少氣
隱白主腹中寒冷氣脹喘
鳩尾主腹皮痛搔癢

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:10
列印頁數：1807
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中極主腹中熱痛
水分　石門主小腹中拘急痛
巨闕　上管　石門　陰蹻主腹中滿暴痛汗出
行間主腹痛而熱上柱心心下滿
大谿主腹中相引痛
涌泉主風入腹中小腹痛
豐隆主胷痛如刺腹若刀切痛
脹滿病
中極主小腹積聚堅如石小腹滿又云中極主寒中腹脹
通谷主結積留飲癖囊胷滿飲食不消
膀胱俞主堅結積聚
上管主心下堅積聚冷脹
胃管　三焦俞主小腹積聚堅大如盤胃脹食飲不消
三里　章門　京門　厲兌　內庭　陰谷　絡却
崑崙　商丘　陰谷　曲泉　陰陵泉主腹脹滿不

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

得息 又云陰陵泉主腹中脹不嗜食脇下滿腹中盛水脹逆不得卧又云商丘主腹中滿嚮嚮然不便心下有寒痛

隱白主腹脹逆息 又云隱白主腹滿喜嘔

尺澤主腹脹喘振慄

解谿主腹大下重 又云解谿主厥氣上柱腹大

大鍾主腹滿便難

肝輸 包肓主小腹滿

水道主小腹脹滿痛引陰中

日月 大横主小腹熱欲走太息

委中主小腹堅腫

闕元主寒氣入腹

懸樞主腹中積上下行

懸鍾主腹滿

脾輸 大腸輸主腹中氣脹引脊痛食飲多而身羸瘦名曰食晦先取脾輸後取季肋

陰市主腹中滿瘕厥少氣

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丘墟主大疝腹堅

京門主寒熱腹脹

高曲主腹中積聚

肓輸主大腹寒疝 甲乙云大腹寒中

天樞主腹脹腸鳴氣上衝胷

大衝主羸瘦恐懼氣不足腹中悒悒

氣衝主腹中大熱不安腹有大氣暴脹滿癰淫瀼

期門主腹大堅不得息脹癖滿小腹尤大

太陰郄主腹滿積聚

大谿主腹中脹腫

衡門主寒氣腹滿腹中積聚疼痛

巨闕 上管主腹脹五藏脹心腹滿

中管主腹脹不通痓大便堅憂思損傷氣積聚腹中

甚痛作膿腫往來上下

陰交主五藏遊氣

三里 行間 曲泉主腹膜滿

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

陷谷主腹大滿喜噫
衝陽主腹大不嗜食
五里主心下脹滿而痛上氣
太白　公孫主腹脹食不化鼓脹腹中氣大滿
漏谷主腸鳴强欠心悲氣逆腹膜滿急
蠡溝主數噫恐悸氣不足腹中悒悒
凡腹中熱喜渴涎出是蛔也以手聚而按之堅持勿
令得移以大針刺中管久持之中不動乃出針
凡腹滿痛不得息正仰臥屈一膝伸一脚並氣衝針
入三寸氣至瀉之
陰都主心滿氣逆腸鳴
陷谷　温留　漏谷　復留　陽綱主腸鳴而痛
上廉主腸鳴相追逐
胃輸主腹滿而鳴
章門主腸鳴盈盈然
膚窻主腸鳴泄注

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

太白　公孫主腸鳴

臍中主腸中常鳴上衝心

陰交主腸鳴濯濯如有水聲

大小便病

豐隆主大小便澀難

營衝四穴主大小便不利

長彊　小腸輸主大小便難淋癰

水道主三膲約大小便不通

秩邊　包肓主癰閉下重大小便難

會陰主陰中諸病前後相引痛不得大小便又云主小便難

大腸輸　八窌主大小便利

陽綱主大便不節小便赤黃腸鳴泄注

屈骨端主小便不利大便泄數并灸天樞

勞宮主大便血不止尿赤

大谿主尿黃大便難

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中窮　石門　承山　大衝　中管　大鍾　大谿
承筋主大便難　又云大衝主淋不得尿陰上痛　又云中管主小腸有熱尿黃
崑崙主不得大便
育輸主大便乾腹中切痛
石關主大便閉寒氣結心堅滿
中注　浮郄主小腹熱大便堅
上廉　下廉主小便難黃
少府　三里主小便不利癰
腎輸主小便難赤濁滑寒熱
橫骨　大巨　期門主小腹滿小便難陰下縱
大敦　箕門　委中　委陽主陰跳遺小便難
中極　蠡溝　漏谷　承扶　至陰主小便不利失
精　又云承扶主尻中腫大便直出陰胞有寒小便不利
陰陵泉主心下滿寒中小便不利
關元主胞閉塞小便不通勞熱石淋　又云主石淋腸下三十六疾不得小便并灸足太陽又云主傷中尿血

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

列缺主小便熱痛

京門　照海主尿黃水道不通　又云京門主溢飲水道不通溺黃

陰交　石門　委陽主小腹堅痛引陰中不得小便

大陵主目赤小便如血

承漿主小便赤黃或時不禁

完骨　小腸輸　白環輸　膀胱輸主小便赤黃

前谷　委中主尿赤難

陰谷主尿難陰癢不用

中封　行間主振寒溲白尿難痛　又云行間主癃閉莖中痛

凡尿青黃赤白黑青取井黃　閼　白取經黑

取合

閼元　酒泉主胞轉氣淋又主小　閼

陰陵泉　閼元主寒熱不節腎病不可以俛仰氣癃

尿黃

氣衝主腹中滿熱淋閉不得尿

曲泉主癃閉陰癢

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

交信主氣淋

然谷主癰疝

復留主淋 又云主血淋

懸鍾主五淋

大敦 氣門主五淋不得尿

曲骨主小腹脹血癰小便難

通里主遺溺

關門 中府 神門主遺尿 甲乙中府作委中

陰陵泉 陽陵泉主洞泄不化

泄痢病

京門 然谷 陰陵泉主洞泄不禁遺尿不自知

交信主泄痢赤白漏血

丹田主泄痢不禁小便絞痛

復留主腸澼便膿血泄痢後重腹痛如痤狀

脾輸主泄痢不食食不生肌膚

小腸輸主泄痢膿血五色重下腫痛

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:14
列印頁數：1815
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

關元　大腸主泄痢不止
京門　崑崙主洞泄體痛
天樞主冬月重感於寒則泄當臍痛腸胃間遊氣切痛
尺澤主嘔泄上下出兩脅下痛
束骨主腸澼泄
長强主頭重洞泄
太白主腹脹食不化喜嘔泄有膿血
地機主溏瘕腹中痛藏癖
陰陵泉　隱白主胸中熱暴泄
大衝　曲泉主溏泄痢注下血
腎輸　章門主寒中洞泄不化
會陽主腹中有寒泄注腸澼便血
三焦輸　小腸輸　下竅　意舍　章門主腸鳴臚脹欲泄注

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中窌主腹脹飧泄
大腸輸主腸鳴腹膜腫暴泄
消渴病
承漿　意舍　關衝　然谷主消渴嗜飲 又云意舍主消渴身熱面目黃
勞宮主苦渴食不下
曲池主寒熱渴
隱白主飲渴
行間　大衝主嗌乾喜渴
商丘主煩中渴
水腫病
公孫主頭面腫
水溝主水腫人中滿
胃倉主水腫臚脹食飲不下惡寒
章門主身潤石水身腫
屋翳主身腫皮痛不可近衣

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中府　間使　合谷主面腹腫

陰交　石門主水脹水氣行皮中小腹皮敦敦然小

便黃氣滿

關元主小腹滿石水

四滿　然谷主大腹石水

關門主身腫身重

主四肢腫身濕

天樞　豐隆　厲兌　陷谷　衝陽主面浮腫（又云豐隆）

天府主身脹逆息不得卧風汗身腫喘息多唾

氣衝主大氣石水

解谿主風水面附腫顏黑

上廉主風水膝腫

三里主水腹脹皮腫

陷谷　列缺主面目癰腫（又云列缺主汗出四肢腫）

臨泣主掖下腫胷中滿

大敦主大腹腫脹臍腹悒悒

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:15
列印頁數：1818
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

天牖主乳腫缺盆中腫
崑崙主腰尻腫腨跟腫
丘墟　陽蹻主掖下腫寒熱頸腫
曲泉主腹腫
復留　豐隆主風逆四肢腫
陰谷主寒熱腹偏腫
完骨　巨窮主頭面氣附腫
陽陵泉主頭面腫
凡頭目癰腫留飲胷脇支溝刺陷谷出血立已
不能食病
豐隆主不能食
石門主不欲食穀入不化
天樞　厲兌　内庭主食不化不嗜食俠臍急
維道主三膲有水氣不能食
中封主身黃有微熱不嗜食
然谷　内庭　脾輸主不嗜食

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:15
列印頁數：1819
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

胃輸　腎輸主胃中寒脹食多身羸瘦　又云胃輸主嘔吐筋攣食不下不能食

大腸輸　周榮主食不下喜飲

陽綱　期門　少商　勞宮主飲食不下

章門主食飲不化入腹還出熱中不嗜食苦吞而聞食臭傷飽身黃酸疼羸瘦

中庭　中府主膈寒食不下嘔吐還出

食竇主膈中雷鳴察察隱隱常有水聲

巨闕主隔中不利

中極主饑不能食

上管　中管主寒中傷飽食飲不化

凡食飲不化入腹還出先取下管後取三里瀉之

凡不嗜食刺然谷多見血使人立饑

嘔吐病

商丘　幽門　通谷主喜嘔　又云商丘主脾虛令人病寒不樂好太息多寒熱喜嘔

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:16
列印頁數：1820
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

俞府　靈墟　神藏　巨闕主嘔吐胷滿

率谷主煩滿嘔吐

天容主欬逆嘔沫

胃輸　腎輸主嘔吐

曲澤主逆氣嘔涎

中庭　中府主嘔逆吐食下還出

石門主嘔吐

陽陵泉主嘔宿汁心下澹澹

維道主嘔逆不止

少商　勞宮主嘔吐

絶骨主病熱欲嘔

大鍾　大谿主煩心滿嘔

魂門　陽關主嘔吐不住多涎

隱白主膈中嘔吐不欲食

膈輸主吐食又灸章門胃管

巨闕　胷堂主吐食

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:16
列印頁數：1821
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大敦主噦噫又灸巨闕
内庭主喜頻伸數欠惡聞人音
吐血病
上管　不容　大陵主嘔血
胷堂　脾輸　手心主　間使　胃管　天樞
肝輸　魚際　勞宮　肩輸　大谿主唾血吐血
郄門立衄血吐血
委中　隱白主衄血劇不止
大泉　神門主唾血振寒嘔血上氣
手少陰郄主吐血
行間主短氣嘔血胷背痛
大衝主面脣色白時時嘔血女子漏血
涌泉主衄血不止
然谷主欬唾有血
凡内損唾血不足外無膏澤地五會主之刺入三分
特忌灸

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:17
列印頁數：1822
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

凡唾血瀉魚際補尺澤
欬逆上氣
天容 廉泉 魄戶 氣舍 譩譆 扶突主欬逆
上氣喘息嘔沫齒噤甲乙云陽氣大逆上滿於胷中憤膜肩息大氣逆上喘喝坐伏
不得息取之天容上氣胷痛取之廉泉欬逆上氣魄戶及氣舍譩譆主之咽喉鳴喝喘息扶突主之唾沫
天容
主之
頭維主喘逆煩滿嘔沫流汗
缺盆 心輸 肝輸 巨闕 鳩尾主欬唾血又云鳩尾
缺盆 膻中 巨闕主欬嗽
主噫喘胷滿欬嘔
主喘逆卧不安席欬胷下積聚
期門 右手屈臂中橫文外骨上主欬逆上氣又云期門
天府主上氣喘不得息
然谷 天泉 陷谷 胷堂 章門 曲泉 天突
雲門 肺輸 臨泣 肩井 風門 行間主欬逆
維道主欬逆不止

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:17
列印頁數：1823
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

扶突主欬逆上氣咽中鳴喘

魄戶　中府主肺寒熱呼吸不得卧欬逆上氣嘔沫

喘氣相追逐

大包主大氣不得

肺輸　腎輸主喘欬少氣百病

或中　石門主欬逆上氣涎出多唾

天突　華蓋主欬逆上氣喘暴

天池主上氣喉鳴

紫宮　玉堂　大谿主欬逆上氣心煩

膻中　華蓋主短氣不得息不能言

輸府　神藏主欬逆上氣喘不得息

或中　雲門主欬逆上氣溪出多唾呼吸喘悸坐不

安席

步郎　安都主膈上不通呼吸少氣喘息

氣户　雲門　天府　神門主喘逆上氣呼吸肩息

不知食味

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:17
列印頁數：1824
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

俠白主欬乾嘔煩滿

庫房　中府　周榮　尺澤主欬逆上氣呼吸多唾

濁沫膿血 又云中府主肺系急欬輸胷痛

少海主氣逆呼吸噫噦嘔

經渠　行間主喜欬上氣喘掌中熱 又云經渠主欬逆

大陵　少商主欬逆喘 又云大陵主欬逆寒熱發

勞宮主氣逆噫不止

大泉主欬逆胷滿喘不得息

三里主欬嗽多唾

支溝主欬面赤而熱

肩輸主上氣

前谷主欬而胷滿

欬喘曲澤出血立已又卒欬逆逆氣

欬唾噫善欬氣無所出先取三里後取太白章門

賁豚氣

章門　石門　陰交主賁豚上氣 甲乙云賁豚腹腫章門主之賁豚氣

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

上腹膜痛莖腫先引腰後引小腹腰臗小腹堅痛下引陰中不得小便兩丸騫石門主之貴豚氣上腹膜堅痛引陰中不得小便兩丸騫陰交主之

關元主貴豚寒氣入小腹

期門主貴豚上下

歸來主貴豚卵上入引莖痛

中極主貴豚上搶心甚則不得息

天樞主貴豚脹疝 甲乙云氣疝噦噫面膸貴豚

然谷主胷中寒脉代時不至寸口小腹脹上搶心

備急千金要方卷九十一

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:18
列印頁數：1826
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷九十三

詳校官翰林院庶吉士姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄監生臣劉耀馥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷九十二　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

針灸

四肢第十一

手病

掖門主手臂痛

巨闕主手清

肩貞主手髓小不舉

陰交主手脚拘攣

少商主手不仁

列缺主手臂身熱

大陵主手攣不伸　又云主手掣小偏

内關主手中風熱

間使主手痛

曲澤主手青逆氣

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:20
列印頁數：1828
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中衝　勞宮　少衝　大泉　經渠　列缺主手掌熱肘中痛

前掖主臂裏攣急手不上舉

尺澤主掣痛手不可伸

神門　少海主手臂攣攣

內庭主四厥手足悶

養老主手不得上下

腕骨　中渚主五指掣不可屈伸

曲池主手不可舉重腕急肘中痛難屈伸又云主手不舉

陽谿主臂腕外側痛不舉

心輸　肝輸主筋急手相引

臂肘病

尺澤　關衝　外關　竅陰主臂不及頭

前谷　後谿　陽谿主臂重痛肘攣

臑會　支溝　曲池　腕骨　肘窌主肘節癉臂酸重腕急痛肘難屈伸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中脘輸　譩譆主腋攣
腕骨　前谷　曲池　陽谷主臂腕急腕外側痛脫如扳
天井　外關　曲池主臂痿不仁
大泉　經渠主臂内廉痛
巨骨　前谷主臂不舉
肩窌　天宗　陽谷主臂痛
曲池　關衝　三里　中渚　陽谷　尺澤主肘痛
時寒　又云關衝主肘疼不能自帶衣
魚際　靈道主肘攣拄滿
大陵主肘攣腋腫
間使主肘内廉痛
地五會　陽輔　申脉　委陽　天池　臨泣主腋肩背病
下腫
氣舍主肩腫不得顧

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:20
列印頁數：1830
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

曲池　天窗主肩重痛不舉

天井主肩痛癭癖不仁不可屈伸肩肉髒木

肩貞　關衝　肩髃主肩中熱頭不可以顧

巨骨主肩中痛不能動搖

支溝　關衝主肩臂酸重

清冷泉　陽谷主肩不舉不得帶衣

肩外輸主肩甲痛而寒至肘

天宗主肩重臂痛

曲垣主肩甲周癖

後谿主肩臑痛

腕骨主肩臂痛

養老　天柱主肩痛欲折

涌泉主肩背頸項痛

前腋主肩腋前痛與胷相引

天牖　缺盆　神道　大杼　天突　水道　巨骨

主肩背痛

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:21
列印頁數：1831
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

膈輸　譩譆　京門　尺澤主肩背寒痓肩甲内廉痛

列缺主背寒慄少氣不足以息寒厥交兩手而驚凡實則肩背熱背汗出四肢暴腫虚則肩寒慄氣不足以息

腰脊病

神道　谷中　腰輸　長强　大杼　膈關　水分

脾輸　小腸輸　膀胱輸主腰脊急强

腰輸　膀胱輸　長强　氣衝　上窌　下窌

居髎主腰痛

次窌　胞肓　承筋主腰痛如折

小腸輸　中膂輸　白環輸主腰脊疝痛

志室　京門主腰痛脊急

三里　陰市　陽輔　蠡溝主腰痛不可以顧　又云陽輔主腰脊痛惡寒　又云次窌主腰下至足不仁

束骨　飛揚　承筋主腰痛如折　主腰痛如錘居中腫痛不可以欬欬則筋縮急諸節痛上下無常寒熱

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

申脉　大衝　陽蹻主腰痛不能舉

崑崙主脊强背尻骨重

合陽主腰脊痛引腹

委中主腰痛俠脊至頭凡凡然凡腰脚重痛於此刺出血久痼宿疹亦皆立已

大鍾主腰脊痛

委陽　殷門　甲乙云腰痛得俛不得仰　太白　陰陵泉　行間主腰痛不可俛仰

扶承主腰脊尻臀股陰寒痛

涌泉主腰脊相引如解　甲乙云腰痛大便難

陰谷主脊内廉痛

附分主背痛引頭

膈關　秩邊　京骨主背惡寒痛脊强難以俛仰

京門　甲乙云腰痛不可以久立　石關主脊痓反折

脚病

崑崙主脚如結踝如別

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:22
列印頁數：1833
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

陰陵泉主足痺痛

京骨　承山　承筋　商丘主脚攣　又云承山承筋主脚脛酸脚急跟痛脚筋急痛兢兢

浮白主足緩不收

天柱　行間主足不任身　又云行間主厥足下熱

然谷主足不能安脛酸不能久立

中都主足下熱脛寒不能久立濕痺不能行

衝陽　三里　僕參　飛揚　復留　完骨主足痿失履不收　又云僕參主足跟中踝後痛又云飛揚主腦中痛又云復留主脛寒不能自温主脚後廉急不可前脚足跗上痛

京骨　然谷　腎輸主足痛

大谿　次窌　膀胱輸主足清不仁　又云大谿主手足寒至節

地倉　大泉主足蹉躃不能行

光明主痿躄坐不能起

風府　腰輸主足不仁

條口　三里　承山　承筋主足下熱不能久立

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丘墟主腕不收坐不得起髀樞脚痛
陽輔　陽交　陽陵泉主髀樞膝骨痺不仁
環跳　束骨　交信　陰交　陰舍主髀樞中痛不可舉
臨泣　三陰交主髀中痛不得行足外皮痛
申脉　隱白　行間主脛中寒熱
大衝　涌泉主脛酸
付陽主腨外廉骨痛
至陰主風寒從足小指起脉痺上下
至陽主脛疼四肢重少氣難言
厲兌　條口　三陰交主脛寒不得卧
內庭　環跳主脛痛不可屈伸
陽間　環跳　承筋主脛痺不仁
涌泉　然谷主五趾盡痛足不踐地
凡髀樞中痛不可舉以毫針寒而留之以月生死為
息數立已

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:23
列印頁數：1835
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

膝病

風市主兩膝攣痛引脇拘急躄躠或青或焦或枯或黧如腐木木

大衝主膝内踝前痛

梁丘　曲泉　陽關主筋攣膝不得屈伸不可以行

犢鼻主膝中痛不仁　又云主膝不仁難跪

中封主少氣身重濕膝腫内踝前痛

解谿　條口　丘墟　太白主膝股腫脝酸轉筋

合陽主膝股重

上廉主風水膝腫

陰市主膝上伏兔中寒

俠谿　陽關主膝外廉痛

髀關主膝寒不仁痿痺不得屈伸

光明主膝痛脛熱不能行手足偏小

膝關主膝内廉痛引臏不可屈伸連腹引喉咽痛

凡犢鼻腫可灸不可刺若其上堅勿攻攻之即死

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:23
列印頁數：1836
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

四肢病

章門主四肢懈惰喜怒

列缺主四肢厥喜笑

曲泉付陽天池大巨支溝小海絶骨

前谷主四肢不舉

照海主四肢淫濼

五里三陽絡天井屬兌三間主嗜卧四肢不欲動搖

復留豐隆大都主風逆四肢腫

風痺第十二

風病

率谷主醉酒風熱發兩目眩痛甲乙云不能飲食煩滿嘔吐

完骨主風頭耳後痛煩心甲乙云及足不收失履口喝僻頭項搖擾痛牙車急

天柱主風眩

絶骨主風勞身重

天府曲池列缺百會主惡風邪氣泣出喜忘

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

陽谷主風眩驚手捲泄風汗出腰項急 甲乙手捲作手腕痛

陰蹻主風暴不知人偏枯不能行

解谿主風從頭至足面目赤

俠谿主胷中寒如風狀頭眩兩頰痛

崑崙主狂易大風

臨泣主大風目痛 甲乙云目外眥痛

付陽主痿厥風頭重痛

涌泉主風入腹中

巨闕 照海主癡癎引臍腹短氣 又云照海主大風如見星 黙黙不知所痛視黙黙不知所痛悲傷不樂 又云天井主悲愁恍惚悲傷不樂

關衝主面黑渴風

商陽主耳中風生

間使主頭身風熱

內關主手中風熱

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

命門主瘓癈裏急腰腹相引
後谿主風身寒
掖門主風寒熱
上關主瘓癈沫出寒熱痓引骨痛
中胞輸　長强　腎輸主寒熱反折
脾輸　膀胱輸主熱痓引骨痛
肝輸主筋寒熱痓筋急手相引
通理主不能言
魚際主痓上氣失瘡不能言
濕痺
曲池　列缺主身濕搖時時寒
風市主緩縱痿痺脇腸疼冷不仁
中瀆主寒氣在分肉間痛苦痺不仁
陽關主膝外廉痛不可屈伸脛痺不仁
懸鍾主濕痺流腫髀筋急瘓脛痛
豐隆主身熱

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:25
列印頁數：1839
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

曲泉主卒癉病引臍下節

陽陵泉主髀癉引膝股外廉痛不仁筋急

絶骨主髀樞痛膝脛骨搖酸癉不仁筋縮諸節酸折

漏谷主久濕癉不能行

商丘主骨癉煩滿

中封主痿厥身體不仁少氣身濕重

臨泣主身癉洗淅振寒

凡身體不仁先取京骨後取中封絶骨皆瀉之

癲癎

偏歷 神庭 攢竹 本神 聽宮 上星 百會

聽會 築賓 陽谿 後頂 強間 腦戸 胳却

玉枕主癲疾嘔逆 又云偏歷主癲疾多言耳鳴口僻

攢竹 小海 後頂 強間主癎發瘈癡狂走不得

臥心中煩

金門 僕參主癲疾馬癎

兌端 齗交 承漿 大迎 絲竹空 廔會

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:25
列印頁數：1840
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

天柱　商丘主癰疾嘔沫寒熱瘧互引　厥鼓頷癰瘂口噤又云天柱主卒暴痛眩商丘主癇瘛　又云承漿大迎主寒熱提

上關主瘈瘲沫出寒熱瘂

絲竹空　通谷主風癇癲疾涎沫狂煩滿　又云通谷主心中憒憒悸咽中澹澹恐

解谿　陽蹻主癲疾

腦戶　聽會　風府　聽宮　翳風主骨瘦眩狂瘈

瘲口噤喉鳴沫出瘡不能言

膻會　申脉主癲疾腠氣

五處　身柱　委中　委陽　崑崙主脊強反折瘈

瘲癲疾頭痛　又云身柱主癲疾瘈瘲怒欲殺人身熱強走譫言見鬼崑崙主癇瘈口閉不得開

尺澤　然谷主癲疾手臂不得上頭

列缺主熱癇驚而有所見

曲池　少澤主瘈瘲癲疾

飛揚　太乙　滑肉門主癲疾狂吐舌

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

長强主癲疾發如狂面皮敦敦者不治

溫留　僕參主癲疾吐舌鼓頷狂言見鬼

筋縮　曲骨　陰谷　行間主驚癎狂走癲疾

間使主善悲驚狂面赤目黃瘡不能言

陽谿　天井主驚癡

完骨主癲疾僵仆狂癙

天井　小海主癲疾羊癎吐舌羊鳴戾頸

懸釐　束骨主癲疾互引善驚羊鳴

天衝主頭痛癲疾互引數驚悸

風池　聽會　復留主寒熱癲仆

風府　崑崙　束骨主狂易多言不休

腦空　束骨主癲疾大瘦頭痛

風府　肺輸主狂走欲自殺

胳却　聽會　身柱主狂走癡

天柱　臨泣主狂易多言不休目上反

支正　魚際　合谷　少海　曲池　腕骨主狂言

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

驚恐

温留　掖門　京骨主狂仆　又云掖門主喜驚妄言面赤

神門　陽谷主笑若狂　又云神門主數噫恐悸不足

陽谿　陽谷主吐舌戾頸妄言

巨闕　築賓主狂易妄言怒罵　又云巨闕主驚悸少氣

衝陽　豐隆主狂妄行登高而歌棄衣而走

下廉　丘墟主狂言非常

陰蹻主卧驚視如見鬼

勞宮　太陵主風熱善怒心中悲喜思慕歔欷喜笑不止

曲澤　太陵主心下澹澹喜驚　甲乙作内關

陰交　氣海　大巨主驚不得卧　又云大巨主善驚

大鍾　郄門主驚恐畏人神氣不足

然谷　陽陵泉主心中怵惕恐如人將捕之

解谿主癡癎而驚

少衝主大息煩滿少氣悲驚

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

少府主數噫恐悸氣不足
行間主心痛數驚心悲不樂
三間　合谷　厲兌主吐舌戾頸喜驚　又云厲兌主多卧好驚
通里主心下悸
手少陰　陰郄主氣驚心痛
後谿主泣出而驚
腕骨主煩滿驚
卒尸厥
隱白　大敦主卒尸厥不知人脉動如故
中極　僕參主恍惚尸厥煩痛
金門主尸厥暴死
内庭主四厥手足悶者久持之厥熱腦痛腹脹皮痛
邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡者皆會
於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脉動如故其形
無所知其狀若尸刺足大趾内側爪甲上去端如韭

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:27
列印頁數：1844
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

葉後刺足心後取足中趾爪甲上各一痏後取手大指之内去爪甲如韭葉後刺手心主少陰兌骨之端各一痏立已不已以筒吹其兩耳立已不已拔其左角髮方寸燔治飲以醇酒一杯不能飲者灌之立已

卒中惡

百會　玉枕主卒起僵仆惡見風寒

通天　胳却主暫起僵仆

大杼主僵仆不能久立煩滿裹急身不安席

飛屍遁注

天府主卒中惡風邪氣飛尸惡注鬼語遁尸

豐隆主厥逆足卒青痛如刺腹若刀切之狀大便難

煩心狂見鬼好笑面四肢卒腫

旁廷在腋下四肋間高下正與乳相當乳後二寸陷

中俗名注市舉掖取之刺入五分灸五十壯主卒中

惡飛尸遁注胷脇滿九曲中府在旁廷注市下三寸

刺入五分灸三十壯主惡風邪氣遁尸内有瘀血

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:27
列印頁數：1845
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

備急千金要方卷九十二

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:28
列印頁數：1846
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

備急千金要方卷九十三　唐　孫思邈　撰

宋　林億等　校正

針灸

熱病

熱病第十三

魚際　陽谷主熱病振慄鼓頷腹滿陰痿色不變

經渠　陽池　合谷　支溝　前谷　內庭　後谿

腕骨　陽谷　厲兌　衝陽　解谿主熱病汗不出

孔最主臂厥熱痛汗不出皆灸刺之此穴可以出汗

列缺　曲池主熱病煩心心悶先手臂身熱癰癤唇口聚鼻張目下汗出如珠（甲乙云兩乳下二寸堅脇下滿悸）

中衝　勞宮　大陵　間使　關衝　少衝　陽谿

天窮主熱病煩心心悶而汗不出掌中熱心痛身熱

如火浸淫煩滿舌本痛（又云間使主熱病煩心喜噦胷中澹澹喜動而熱）

勞宮主熱病三日已往不得汗怵惕（甲乙云主熱病煩滿而欲嘔噦

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三日已往不得汗悚惕胷脇不可反側欬滿溺赤小便血衄不止嘔吐血氣逆噫不止噎中痛食不下喜渴舌中爛掌中熱欲嘔

三間主氣熱身熱喘甲乙云寒熱口乾身熱喘息目急痛善驚

曲澤主傷寒温病身熱煩心口乾甲乙云心澹然善驚身熱煩心口乾手清逆氣嘔唾肘癋善搖頭頭清汗出不過眉傷寒温病曲澤主之

曲池主傷寒餘熱不盡

掖門中渚通理主熱病先不樂頭痛面熱無汗又云通理主熱病先不樂數日

承漿主汗出衄血不止

温留主傷寒寒熱頭痛噦衄肩不舉

上管曲差上星陶道天柱上窌懸釐

風池命門膀胱輸主煩滿汗不出

飛揚主下部寒熱汗不出體重

五處攢竹正營上管缺盆中府主汗出

巨闕主煩心喜嘔甲乙云心腹脹噫煩熱善嘔膈中不通利

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:29
列印頁數：1848
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

百會主汗出而嘔痙
商丘主寒熱好嘔
懸顱主熱病頭痛身熱
少澤主振寒小指不用頭痛
玉枕　大杼　肝輸　心輸　膈輸　陶道主汗不出
出慳厥惡寒
大椎主傷寒熱盛煩嘔
懸釐　鳩尾主熱病偏頭痛引目外眥
天井主振寒頸項痛
魚際主頭痛不甚汗出
三焦輸主頭痛食不下
曲泉主身熱頭痛汗不出
神道　關元主身熱頭痛進退往來
列缺主寒熱掌中熱
膈輸主嘈卧怠惰不欲動搖身當濕不能食
膈輸　中府主寒熱皮肉骨痛少氣不得卧支病又云

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:29
列印頁數：1849
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

腎輸主頭身熱赤振慄腰中四肢淫濼欲嘔
肩并　關衝主寒熱悽索氣上不得卧
尺澤主氣隔喜嘔鼓頷不得汗煩心身痛
肩貞主寒熱項歷適（甲乙云耳鳴無聞引缺盆肩中熱痛麻小不遬）
衝陽主振寒而欠
委中主熱病俠脊痛
大都主熱病汗出且厥足清（外臺云汗不出厥手足清）
太白主熱病先頭重顏痛煩悶心身熱熱爭則腰痛
不可以俛仰又熱病滿悶不得卧身重骨痛不相知
支正　少海主熱病先腰脛酸喜渴數飲食身熱項
痛而强振寒寒熱（甲乙云主振寒寒熱頸項腫實則肘攣頭眩痛虛則生疣小者痂疥）
後谿主身熱惡寒
光明主腹足清寒熱汗不出
復留主寒熱無所安汗出不止風逆四肢腫
凡熱病煩心足寒清多汗先取然谷後取大谿大指
間動脉皆先補之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熱病先腰脛酸喜渴數飲身清清則項痛而寒且酸
足熱不欲言頭痛顛顛然先取涌泉及太陽井滎熱
中少氣厥寒灸之熱去灸涌泉三壯煩心不嗜食灸
涌泉熱去四逆喘氣偏風身汗出而清皆取俠谿
凡熱病刺陷谷足先寒寒上至膝乃出針身痺先淅
振寒季脇支滿痛
凡温病身熱五日已上汗不出刺大泉留針一時取
針若未滿五日者禁不可刺

凡好太息不嗜食多寒熱汗出病至則喜嘔嘔已乃
衰即取公孫及井輸實則腸中切痛厥頭面腫起煩
心狂多飲不嗜卧虛則鼓脹腹中氣大滿熱痛不嗜
食霍亂公孫主之
黃疸
然谷主黃疸一足寒一足熱喜渴 甲乙云舌縱煩滿
章門主傷飽身黃
太衝主黃疸熱中喜渴

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中封　五里主身黃時有微熱　甲乙云不嗜食膝内廉内踝前痛少氣身體重

脊中主黃疸腹滿不能食

中管　大陵主目黃振寒

勞宮主黃疸目黃

大谿主黃疸　甲乙云消癉善喘氣走喉咽而不能言手足清大便難嗌中腫痛唾血口中熱唾如膠

脾輸　胃管主黃疸　又云脾輸主黃疸喜欠不下食脇下滿欲吐身重不能動

巨闕　關衝　支溝　公孫　陰陵泉主霍亂

霍亂

期門主霍亂泄注

魚際主胃逆霍亂

太陰　大都　金門　僕參主厥逆霍亂

太白主霍亂逆氣

解谿主膝重脚轉筋濕痺

三里主霍亂遺屎失氣

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

承筋主痿癈腳酸（甲乙云霍亂腰不仁）
大泉主眼青轉筋乍寒乍熱缺盆中相引痛
金門僕參承山承筋主轉筋霍亂
丘墟主腳急腫痛戰掉不能久立附筋足攣
竅陰主四肢轉筋
委中委陽主筋急身熱
人迎主凡霍亂頭痛胷滿呼吸喘鳴窮窘不得息
凡霍亂泄出不自知先取大谿後取太倉之原
癉病
列缺後谿少澤前谷主癉寒熱（又云列缺主癉甚熱）
陽谷主癉脇痛不得息
太谿主熱多寒少（甲乙云癉悶嘔甚熱多寒少欲閉户而處寒厥足熱）
太鍾主多寒少熱
崑崙主癉多汗（甲乙云腰痛不能俛仰目如脫項如拔）
中封主色蒼蒼然大息振寒
丘墟主癉振寒（甲乙云腋下腫）

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

臨泣主瘧日西發

然谷主温瘧汗出

天府主瘧病

天樞主瘧振寒熱盛狂言

少海主瘧背振寒甲乙云項痛引肘掖腰痛引小腹中四肢不舉

少商主振慄鼓頷

陽谿主瘧甚苦寒欬嘔沫

商丘神庭上星百會完骨風池神道主寒瘧腹中痛

掖門前谷光明至陰大杼主痎瘧熱又云商丘

陰都少海商陽三間中渚主身熱瘧病

太泉太谿經渠主瘧欬逆心悶不得卧寒熱

太陵腕骨陽谷少衝主瘧乍寒乍熱

合谷陽池俠谿京骨主瘧寒熱

偏歷主風瘧汗不出

譩譆支正少海主風瘧

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:31
列印頁數：1854
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

天井主癉食時發心痛悲傷不樂

三里　陷谷　俠谿　飛揚主痎癉少氣　又云俠谿主癉足痛　飛揚主狂癉頭眩痛痙反折

温留主癉面赤腫

少澤　復留　崑崙主癉寒汗不出

厲兌　内庭主癉不嗜食惡寒

衝陽　束骨主癉從脚脽起　又云衝陽主癉先寒洗淅甚久而熱熱去汗出

癭瘤第十四

癭瘤

天府　臑會　氣舍主癭瘤氣咽腫　甲乙天府作天窻

腦戸　通天　消濼　天突主頸有大氣

通天主癭灸五十壯會堂羊屎灸一百壯

痔瘻

飛揚主痔篡傷痛

絶骨主瘻馬刀掖腫

大突　章門　天池　支溝主漏　又云支溝章門主馬刀腫癭

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:32
列印頁數：1855
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

商丘　復留主痔血泄後重　又云商丘主痔骨蝕喜魘夢

大迎　五里　臂臑主寒熱頸瘰癧

天突　天窗主漏頸痛

勞宮主熱痔

會陰主痔與陰相通者死

俠谿　陽輔　大衝主掖下腫馬刀瘿

承筋　承扶　委中　陽谷主痔痛腋下腫

竅陰主癰疽頭痛如錐刺不可以動動則煩心

大陵　支溝　陽谷　後谿主痂疥

癩疝

曲泉主癩疝陰跳痛引臍中不尿陰痿　一云痛引莖中不得尿

中都主癩疝崩中

中管主衝疝胃死不知人

合陽　中郤主癩疝崩中腹上下痛腸澼陰暴敗痛

照海主四肢淫濼身悶陰恭起疝

大谿主胞中有大疝瘕積聚與陰相引

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:32
列印頁數：1856
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

商丘主陰肢内痛氣癰狐疝走上下引小腹痛不可以俛仰

關元主癲疝 又云主暴疝痛

巨闕主狐疝

肩井傍肩解與臂相接處主偏癲

腧中 石門 天樞 氣海主小腹疝氣遊行五藏

腧衝胷不得息 甲乙云腧疝繞腧痛衝胷不得息灸腧中腧疝繞腧痛石門主之腧疝繞腧痛天樞主之

腧痛時止

四滿主腧下疝積 甲乙云胞中有血

大敦主卒疝暴痛陰跳上入腹寒疝陰挺出偏大腫

腧腹中悒悒不樂小便難而痛灸刺之立已左取右 甲乙云照海主之

右取左

大陰郄 衝門主疝痔陰疝

天樞主氣疝嘔

大巨主癲疝偏枯

交信主氣癰癲疝陰急股樞髀内廉痛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

中封主癲疝癰暴痛癢厥身體不仁
氣衝主癲陰腫痛陰癢莖中痛兩丸騖痛不可仰卧
少府主陰痛實時挺長寒熱陰暴痛遺尿偏虛則暴
癢氣逆卒疝小便不利
大赫　然谷主精溢陰上縮
陰市主寒疝下至腹腢膝腰痛如清水小一作大腹諸
痛按之下至膝上伏兔中寒疝痛腹脹滿癢少氣
大衝　中封　地機主癲疝精不足又云大衝主狐疝嘔厥
魚際主陰濕腹中餘疾
五樞主陰疝兩丸上下小腹痛
陰交　石門主兩丸騖又云石門主腹滿疝積
大衝主兩丸騖縮腹堅不得卧甲乙云環臍痛陰騖兩丸縮腹堅痛不得卧
會陰主陰頭寒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

行間主莖中痛

陰谷主陰痿不用小腹急引陰內廉痛

雜病第十五 論

膏肓輸無所不治主羸瘦虛損夢中失精上氣欬逆狂惑忘誤取穴法令人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動搖從胛骨上角摸索至胛骨下頭其間當有四肋三間灸中間依胛骨之裏肋間空去胛骨容側指許摩胦肉之表肋間空處按之自覺牽引鬲戶中灸兩胛中各一處至六百壯多至千壯當覺氣下磬磬然如流水狀亦當有所下出若無停痰宿疾則無所下也若病人已困不能正坐當令側卧挽上臂令前求取穴灸之也求穴大較以右手從右肩上拄指頭表所不及者是也左手亦然乃以前法灸之若不能久正坐當伸兩臂者亦可伏衣襆上伸兩臂令人挽兩胛骨使相離不爾胛骨覆穴不可得也所伏衣襆當令大小常定不爾則失其穴也此灸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

訖後令人陽氣康盛當消息以自補養取身體平復其穴近第五椎相準望取之

論曰昔秦緩不灸晉侯之疾以其在膏之上肓之下針藥所不及即此穴是也時人拙不能求得此穴所以宿痾難遣若能用心方便求得灸之無疾不愈矣

三里主腹中寒脹滿腸鳴腹痛奪腹中瘀血小腹脹皮腫陰氣不足小腹堅熱病汗不出喜嘔口苦壯熱身反折口噤鼓頷腰痛不可以顧顧而有所見喜悲上下求之口僻乳腫喉痺不能言胃氣不足久泄利食不化脇下柱滿不能久立膝癆寒熱中消穀苦饑腹熱身煩狂言乳癰喜噫惡聞食臭狂歌妄笑恐怒大罵霍亂遺尿失氣陽厥悽悽惡寒頭眩小便不利喜噦凡此等疾皆灸刺之多至五百壯少至二三百壯

涌泉主喜喘喉痺身熱痛脊脇相引忽忽喜忘陰痺腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩男子如盡女子如阻身體腰脊如解不欲食喘逆足下清至膝咽中痛不可

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

內食瘡不能言小便不利小腹痛風入腸中癲疾俠臍痛急胷脇柱滿痛劒不止五疝指端盡痛足不踐地凡此諸疾皆主之

婦人病第十六

小腹堅痛月水不通刺帶脉入六分灸五壯在手肘端一寸八分（端作下）

漏下若血閉不通逆氣脹刺血海入五分灸五壯在膝臏上內廉白肉際二寸中

漏血小腹脹滿如阻體寒熱腹偏腫刺陰谷入四分灸三壯在膝內輔骨後大筋之下小筋之上屋膝乃得之（甲乙云漏血小便黃臨谷主之）

女子疝瘕按之如以湯沃兩股中小腹腫陰挺出痛經水來下陰中腫或癢漉青汁如葵羹血閉無子不嗜食刺曲泉在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝乃得之刺入六分灸三壯

疝瘕按之如以湯沃股內至膝飧泄陰中痛小腹痛堅

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

急重下濕不嗜食刺陰陵泉入二分灸三壯在膝下内側輔骨下陷中伸足乃得之

經逆四肢淫濼陰暴跳疝小腹偏痛刺陰蹻入三分灸三壯在内踝下容爪中即照海穴也

小腹大字難嗌乾嗜飲俠臍疝刺中封入四分灸三壯在踝前一寸半伸足取之

女子不字陰暴出經漏刺然谷入三分灸三壯在足内踝前起大骨下陷中

字難若胞衣不出泄風從頭至足刺崑崙入五分灸三壯在足外踝後跟骨上

月事不利見赤白而有身反敗陰寒刺行間入六分灸三壯在足大趾間動應手

月閉溺赤脊强互引反折汗不出刺腰輸入二寸留七呼灸三壯在第二十一椎節下間

絶子癚寒熱陰挺出不禁白瀝痙脊反折刺上窌入三寸留七呼灸三壯在第一空腰髎下一寸俠脊

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:35
列印頁數：1862
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

赤白瀝心下積脹腰痛不可俛仰刺次窌入三寸留七呼灸三壯在第二空俠脊陷中

赤淫時白氣癰月事少刺中窌入二寸留七呼灸三壯在第三空俠脊陷中

下蒼汁不禁赤瀝陰中癢痛引小腹控胁不可以俛仰

刺腰尻交者兩肿上以月生死為痛數發刺立已一云下窌

腸鳴泄注刺下窌入二寸留七呼灸三壯在第四空俠脊陷中

拘攣腹滿疝月水不下乳餘疾絶子陰癢賁豚上膜腹堅痛下引陰中不得小便刺陰交入八分灸五壯在臍下一寸

赤白裹急瘈瘲刺五樞入一寸灸五壯在帶脉下三寸

腹滿疝積乳餘疾絶子陰癢賁豚上膜小腹堅痛下引陰中不得小便刺石門入五分在臍下二寸忌灸絶孕

絶子衄血在内不在胞轉不得尿小腹滿石水痛刺關元入二寸灸七壯在臍下三寸又主引胁下脹頭痛身

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

背熱貫豚寒小便數泄不止
子門不端小腹苦寒陰癢及痛貫豚搶心饑不能食腹
脹經閉不通小便不利乳餘疾絶子内不足刺中極入
二寸留十呼灸三壯在臍下四寸
赤白沃陰中乾痛惡合陰陽小腹膜堅小便閉刺屈骨
入一寸半灸三壯在中極下一寸
月水不通奔泄氣上下引腰脊痛刺氣穴入一寸灸五
壯在四滿下一寸
胞中痛惡血月水不以時休止腹脹腸鳴氣上衝胷刺
天樞入五分灸三壯去育輸一寸半
小腹脹滿痛引陰中月水至則腰背痛胞中瘕子門空
大小便不通刺水道入二寸半灸五壯在大巨下三寸
月水不利或暴閉塞腹脹滿癰淫燥身熱乳難子上搶
心若胞不出衆氣盡亂腹中絞痛不得反息正仰卧屈
一膝伸一膝並氣衝針上入三寸氣至瀉之在歸來下
一寸動脉應手

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

產餘疾食飲不下貲豚上下傷食腹滿刺期門入四分

灸五壯在第二肋端

乳癰驚癉脛重足跗不收跟痛刺下廉入三分灸三壯在上廉下三寸

月水不利見血而有身則敗乳腫刺臨泣入二分灸三壯在足小趾次趾間去俠谿一寸半

女子疝及小腹腫溏泄癃遺尿陰痛面塵黑目下眥痛漏血刺大衝入三分灸三壯在足大趾本節後二寸中動脈

女子疝赤白淫下時多時少暴腹痛刺蠡溝入三分灸三壯在内踝上五寸

女子無子效而短氣刺涌泉入三分灸三壯在足心陷者中

乳難子上衝心陰疝刺衝門入七分灸五壯在府舍下上去大橫五寸

女子不下月水癉驚善悲不樂如墮墜汗不出刺照海

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

入四分灸二壯在內踝下四分又主女子淋陰挺出四
肢淫濼
血不通刺會陰入二寸留七呼灸三壯在大便前小便
後子藏中有惡血內逆滿痛刺石關入一寸灸五壯在
陰都下一寸
育門主乳餘疾
三里主乳癰有熱
神封　膺窗主乳癰寒熱短氣卧不安
乳根主膺腫乳癰悽索寒熱痛不可按
大谿　俠谿主乳腫癰潰　又云俠谿主小腹堅痛月水不通
大泉主妬乳膺胷痛
大赫主女子赤沃
四滿主子藏中有惡血內逆滿痛疝　又云主胞中有血
中極主拘攣腹疝月水不下乳餘疾絶子陰癢
氣衝主無子小腹痛
支溝主女人脊急目

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:37
列印頁數：1866
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

築賓主大疝絶子
陰廉主絶產若未曾產
涌泉　陰谷主男子如盡女子如阻身體腰脊如解不欲食
水原　照海主不字陰暴出淋漏月水不來而多悶心下痛　又云照海主陰挺下血陰中腫或癢漉清汁若葵汁

小兒病第十七

本神　前頂　顱會　天樞主小兒驚癇
臨泣主小兒驚癇反視
顱息主小兒癇喘不得息
然谷主小兒臍風口不開善驚
癭脉　長强主小兒驚癇瘈瘲嘔吐泄注驚恐失精瞻視不明眵
懸鍾主小兒腹滿不能食飲
讙譆主小兒食晦頭痛

備急千金要方卷九十三

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:37
列印頁數：1867
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

備急千金要方後序

明天子剖符析胙分任將吏而課最之詎徒寵秩華膴為尊顯計唯是體天心好生寄諸百執事百執事奉德意而遐邇布之舉夭札痾癘期以煦嫗而置之春臺壽域也矧含靈生命忍坐眙為顧救病需醫醫需方醫之有方猶般輸之規矩逢門之穀率而孫吳之韜鈐也上溯軒岐下迨諸名家留此奇方以活衆庶惡可以紙上塵蹟而土苴之人命之重奚翅千金卒然疾作忙覓盧扁噬臍何及間有善信好施藥劑然焉得人人而濟故昔人云施人以藥不若施人以方蓋方所濟者遠而遍也吾越起侯先生自登籍後奉璽書宦轍周歷西北迺夙心嗜醫見人有疾如切己身以為丈夫貴拯危度厄儒胡不可兼醫乎故雅慕孫真人千金一書嘆未廣其傳茲司馬榆關公暇偶繙道藏得之遂鞠然喜而持示一時同事諸公咸勃發好生心願付剞劂各捐金有差先生獨肩其事夫自

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

古醫擅名秦越獨越之貴醫如貴儒乃秦不免變而
信巫史祈禳病者疑醫并疑其方非方之可疑以不
善用方者之過也此方初奏之李唐再校於趙宋流
傳至今嫌於殘蠹不無帝虎訛先生恐以濟人者害
人也用是更求善本殫精校讐寘棲方外務在傳信
即最纖瑣如秤尺升斗之制熬煉灸之法銖銖寸
寸靡不裁定惟於疑者則缺之畢寒暑寢食以狗要期
天子命官德意以拯人危篤便人倉卒普天之下可家
喻戶曉矣詎獨利秦乎哉先生家會稽青家句甬僅
一曹江之隔幸為同鄉後輩先生與吾家宮端以文
學相知因而會譜青又叨為同系子行茲者待罪和
門又為屬下小吏遂命青再加訂正初青備員保御
已留心是書因不敢辭然自媿不免金根之誤耳按
是書百病俱已臚列而獨缺瘡科者蓋以瘡疹起於
後世真人不能逆料故也先生又刻經驗瘡書瘡疹

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

一斑等帙用以補是書之未備庶幾為醫方大全矣
工竣敢綴數語而并及之以彰先生好生之心懇切
而周摯云
萬歷四十六年七月吉
總理提調延綏各大營練兵千摠前太醫院吏目屬
下陳青頡首謹書

列印日期/時間：02/04/2005 18:52:39
列印頁數：1870
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司