

欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷二

詳校官太醫院恩禮臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣馮國柄



欽定四庫全書		子部五	
小兒衛生總微論方		醫家類	
提要			
臣		等謹案小兒衛生總微論方二十卷不著	
撰人名氏凡論一百條自初生以至成童無		不悉備論後各附以方前有嘉定丙午和安	
大夫特差判太醫局何大任序稱家藏是書		六十餘載不知作者為誰博加搜訪亦未嘗	
欽定四庫全書		小兒衛生總微論方	
聞此書之流播因鋟於行在太醫院以廣其		傳按宋錢乙仲陽以治小兒得名其藥證真	
訣一書僅有傳本亦不免缺略其他如晁陳		二氏所著錄者有兒童寶鏡小兒靈秘方小	
兒至訣小兒醫方小兒斑疹論諸書皆不可		得見是書詳載各症如梗舌鱗瘡之類悉近	
時醫書所未備其議論亦篤實明晰無明以		來諸醫家黨同伐異自立門戶之習誠保嬰	



欽定四庫全書									
小兒衛生總微論方									
受亦無取焉乾隆四十三年五月恭校上									
總纂官 臣 紀昀 臣 陸錫熊 臣 孫士毅									
總校官 臣 陸費墀									
之要書也此本為明弘治己酉濟南朱臣刻									
於寧國府者改名保幼大全今據嘉定本原									
序復題本名臣序又稱得之醫者鄭和和稱									
得之古冢中其說迂怪蓋方技家自神其授									



小兒衛生總微論方原序

余先君有小兒衛生總微論方二十卷家藏甚久今六十餘載矣不知作者謂誰博加搜訪未嘗聞此書之流播也自嬰孩初育以至成童所謂保衛其生總括精微視古今方書極為詳盡仁哉著書者之心也宗族親舊間幼稚有疾余每口傳指授効如影響又取其可以通用於大人者增湯劑而用之尤為神異豈此書不言之妙有待於余而發耶烏可掩為一家之寶而不與人共

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

之於是集二三同志訂正其謬寫之舛鋟於行在太醫局以廣其傳得此者敬而用之當知余言不繆或未免畫蛇添足之譏不暇顧矣吁齊魯大臣史失其名恨不得詳其人也嘉定丙午立春日和安大夫特差判太醫局何大任序



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷一

醫工論

凡為醫之道必先能明理以盡術而後能用藥以對病
如此則事必濟而功必著矣若不能明理以盡術則豈
能用藥以對病不能用藥以對病則豈能愈疾今冠於
篇首以勸學者

凡為醫者性存溫雅志必謙恭動須禮節舉乃和柔無

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

自妄尊不可矯飾廣收方論博通義理明運氣曉陰陽
善診切精察視辨真偽分寒熱審標本識輕重疾小不
可言大事易不可云難貧富用心皆一貴賤使藥無別
苟能如此於道幾希反是者為生靈之巨寇

凡為醫者遇有請召不擇高下遠近必赴如到其家須
先問曾請未曾請師即問曾進是何湯藥已未經下乃
可得知虛實也如已曾經下即虛矣更可消息參詳則
無誤矣又治小兒之法必明南北稟受之殊必察土地



寒溫之異不可一同施治古人最為慎耳

稟受論

人稟父母精血化生故內經有曰陽施陰化謂之有子
聖經言方其受授之初一月血凝二月胚胎兆三月陽
神為魂四月陰靈為魄五月五行分五臟六月六律定
六腑七月七精開竅八月八景具全九月氣足象成十
月百神集備至日滿而生也又云一月如珠露二月若
桃花三月形象成四月男女分五月府藏具六月筋骨
全七月魂生而動左八月魄長而動右九月三轉身十
月足而生此未知其所出其始有謂之妊者以其陽始
而陰任之也有謂之胚者以其未成為器而猶坯也有
謂之胞者以其已為正陽而陰包之也有謂之胎者以
食於母而為口呂也有謂之娠者以其有時而動也有
謂之懷者以其有身而依也原夫此衆者皆陽始陰任
在有形之先次由五行而後化成也故曰陰陽具而五
行立矣且陰之所任者壬也一陽壬兆則人乃肇生命

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方



門主生氣之原精所藏焉壬陽水也合丁之陰火而生
丙故有命門然後生心心主血神所藏焉丙之陽火合
辛之陰金而生庚故有心然後有肺肺主皮毛魄所藏
焉庚陽金也合乙之陰木而生甲故有肺然後生肝肝
主筋魂所藏焉甲為陽木合己之陰土而生戊故有肝
然後生脾脾主肉意所藏焉戊為陽土合癸之陰水而
生壬故有脾然後生腎腎主骨志所藏焉故腎與命門
一也此陰陽五行夫婦生化自然之理也人之賦稟自
受氣至胎化自成形至生養亦皆由焉

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

初生論

兒纔生出母腹中急當舉之便以綿絮包裹抱大人懷
之溫暖雖暑月亦不可遽去綿絮須漸漸減去之蓋乍
出母腹中不可令冒寒也又急以綿裹手指揩拭兒口
眼中及周圍穢血皆令盡淨不可令入口眼也若舉遲
失於包裹則令兒中寒若穢血得入口眼則令兒生病

其証候方
論並在後



回氣論

兒纔生出母腹中哭聲遲者急以葱白細鞭其背呼父
小名即啼又兒纔生下氣欲絕不能啼者必是難產或
冒寒所致急以綿絮包裹其兒頓放大人懷中溫煖若
已包裹須更添之令極溫煖且未得斷臍將胞衣置炭
火上燒之仍撚大紙脚盛蘸油點著於臍帶上往來徧
燎之以臍帶連臍得火氣由臍入腹故也更以熱醋湯
捋洗臍帶須臾則氣回啼哭然後如常洗浴斷臍此法
甚良救者甚多

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

洗浴論

兒纔生下須先洗浴以蕩滌汙穢然後乃可斷臍也若
先斷臍則浴水入臍而為臍瘡等病及浴水須入藥預
先煎下以瓶貯頓臨時旋煖用之不犯生水即佳并已
後浴之亦用藥煎湯揀所宜時日則大良矣凡浴宜用
寅卯酉日若初生不值但於日中選此三時如時亦不
值唯忌壬午丁巳癸巳日時大凶而與避之餘皆可也



今具煎湯用藥下項

用猪膽汁湯浴兒則不患瘡癬皮膚滑澤用金銀

虎骨丹砂煎湯則癬邪惡去驚單用虎骨亦得用

李葉切半升煎湯則解肌熱去溫壯用白芷二兩苦

參三兩挫碎煎湯則去諸風用蒴藿葱白葫麻葉

白芷藁本蛇床子煎湯退熱用苦參黃連猪膽白

芡杉葉栢葉楓葉煎湯去風用大麻仁苓陵香丁

香桑葢藁本煎湯治諸瘡用金銀桃奴雄黃丹砂

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

煎湯則辟邪除驚用益母草煎湯治疥癬諸瘡

凡煎湯每用水一斗入藥煎至七升去滓適寒溫用之

冬不可太熱夏不可令冷須調停得宜乃可用之兒自

生之後須依時洗浴以去垢污又不可數數若都不洗

浴則皮皺毛落多生瘡疥凡洗浴時於背上則微微少

用水餘處任意即不可極淋其背亦不可久坐水中則

引驚作病切須慎之如常能依法用之令兒體滑舒暢

血脉通流及長少病無不驗也



斷臍論

兒生下須當以時斷臍若不以時斷臍者則令臍汁不乾而生寒為臍風之由斷臍之法當隔單衣以牙咬斷之將煖氣呵七遍若用刀斷之須用剪刀先納懷中煖透然後方用不得使用冷刀多致傷臍生病宜切戒之其斷臍帶當令長至足趺或云當長六寸若太短則傷臍令兒腹中不調若太長則傷肌令兒皮枯鱗起纔斷臍訖須用烙臍餅子安臍帶上燒三壯炷如麥大若兒

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

未啼灸至五七壯灸了上用封臍散封裹之法須搥治帛子令柔軟用方四寸許上置新綿厚半寸及上置藥末適緊慢以封之如不備其藥即用極細熟艾一塊置於上封之但不令封帛緊急急則令兒吐衄又須常切照顧勿令濕著及襁褓中亦不可令兒尿濕恐生瘡腫及引風也

烙臍餅子

豆豉

黃蠟

各一分
射香 少許



右以豆豉為細末入射研均鎔蠟和劑看大小捻作餅用

封臍散

雄鼠糞

七枚兩頭尖者是

乾姜

大棗

甌帶

鷄子許三味同燒灰

綿灰

兩半

別燒

緋綿灰

別燒

胡粉

三錢炒黃

射香

少許

右同研極細末每用半錢至一錢傅臍上封之永不患臍瘡腫如已因風濕患瘡腫者看臍帶落與未落依此用藥便差

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

兒已封裹臍了一切如法得數日許忽然怒啼似衣中有刺者此乃臍燥還刺其腹故也當與解之易去故帛藥物更換裹之如無此證亦於十日許解視換時須避風冷若遇冬月左右置火於溫暖處換之至於尋常換衣用粉亦當如是若失於照顧致傷臍患者具方于後

治小兒初生臍未落時腫痛水出

右取故緋絹燒灰研細末傅之



治小兒臍中汁出不止赤腫	右以白石脂為細末炒令微煖傳之日三四	治小兒臍瘡	右以甌帶燒灰研細末猪膏和傳或以桑白皮汁傳	乳上吮兒飲	又方以東壁上土傳之治歷年不差者伏龍肝亦得	又方以當歸為細末傳之久不差者用之神效	治赤腫或膿血清出者	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	又方以馬齒莧葉燒灰研末傳之或以露蜂房燒末傳之	又方以乾蚶蚶火煨為灰研末傳之佳	又方以黃蘗為細末傳之治久不差者	治小兒臍赤腫	杏仁 半 猪頰車骨中髓 七錢半	右先研杏仁極爛和髓傳之一方研杏仁如脂和髓	中膏傳



治小兒因剪臍傷外風致臍瘡久不乾	白礬 煨 白龍骨 煨等分	右同研為細末傳之少少用如無兩味但得一味亦可	可	又方以綿燒灰研為細末傳之新舊皆可	治小兒臍瘡濕不差若至百日即危極胡粉散	胡粉 一錢細研 乾姜 燒灰一錢細研 白石脂 燒存性稱一錢細研	右同為細末每用一字或半錢傳上	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	凡小兒患臍瘡未愈不可乳令太飽太飽則令兒臍	風	相視壽夭論	兒生下洗浴斷臍之後當視其壽命長短成人不成人	兒生身不收者死 兒生魚口者死 兒生股間無生	肉者死 兒生汗血者死 兒生頤下破者死 兒生	囊下白或赤者皆死 兒生陰不起者死 兒生身如	凝血若無皮者死 兒生臍小者不壽 兒生聲絕而



復揚急者不壽 兒初生目自開者不成人 兒初生	頭四破者不成人 兒初生啼聲散者不成人 兒初	生身軟如無骨不成人 兒初生啼聲深者不成人	兒初生頭毛不周匝不成人 兒初生汗出不流不成	人 兒初生小便凝如脂膏者不成人 兒初生常搖	手足者不成人 兒初生枕骨不成能言而死 兒生	膝骨不成能倨而死一云尻骨 兒生掌骨不成扶伏	而死 兒生踵骨不成能行而死 兒生臍骨不成能	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	立而死 兒初生陰大而與身色同者成人 兒初生	臍中無血者成人 兒初生啼聲相連延屬者壽 兒	初生卵下縫通達而黑者壽 兒初生身體鮮白而長	大者壽 兒初生額上有旋毛者妨父母 兒初生目	視不正數動或哭而豺聲者非佳人 兒初生髮稀少	者不聽人教	初生服藥論	兒初生出母腹揩拭口眼淨洗浴了斷臍畢裯包訖且



未得與乳當用好甘草一中指節許擘碎以水三蜆殼煎二蜆殼以綿纏指蘸與兒吮之若吐出惡汁為佳若服二蜆殼不吐即無穢物不須更服也此法不問兒虛實壯怯皆須服之次看形色若面色紅潤啼聲響快者用擘破黃連以湯浸取濃汁調硃砂末抹兒口中打盡腹中舊糞方可與乳又法以永粉半錢旋旋吮兒良久臍糞乃下為佳故聖濟經云凡兒初生惡血未納者拭以綿指吞而在膈者吐以甘草入而在腹內者利以

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

黃連永粉皆所以革污穢也次用好硃砂一大豆許細研水飛煉蜜一蜆殼看稀稠和膏分三劑每用一劑乳汁化時時滴兒口中三日內服盡即止姚和衆云成煉硃砂能溫腸胃壯血氣也一日只可一豆許勿得過也分三次用次用真牛黃一大豆許細研以煉蜜酸棗大和成膏每用一大豆許乳汁化下時時滴兒口中姚和衆云能去驚辟邪惡之氣若兒形色不實怯弱者不宜服之如胎熱或身體色赤黃者宜多服此法在三日外



也

中寒論

兒纔生舉遲或斷臍晚者令兒冒冷故寒中之也又先斷臍後洗浴則水氣得入之或洗時水氣所干亦為中寒之候其證腹中絞痛天紕啼呼面青黑尿清白當以當歸末為粉著于絮上灸而熨臍腹日日頻熨至啼止臍乾為度仍不可灸令大熱恐引驚也

初生不乳不小便

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

初生洗浴斷臍襁包革穢污下臍糞都了經日不飲乳及不小便者此因難產或包裹舉遲中寒或被風邪微干傷動臟氣所致有此候者多為撮口治不可稍緩通關散治初生兒不飲乳及不小便

以石銀器中貯妳汁二合入四破葱白一寸煎取一合藥注子分灌之服盡立效

臍風撮口

兒自初生至七日內外忽然面青啼聲不出口撮唇緊



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

蘸熟綿子裹手指輕輕擦破即口便開而安

又方視小兒口中上下斷間若有白色如荳大許便以
指甲於當中掐之自外達內令匝至微有血出亦不妨
又於白處兩邊盡頭亦依此掐令內外氣斷不必直破
入指甲矣恐太甚則傷兒此二法相類子母秘錄云於
掐破處以蜈蚣末傅之大良及有治方集之後凡兒產
時諸物但令開口勿閉以厭撮口口噤也

治小兒斷臍之後不慎照管致風濕所乘令兒不能乳

不能哺乳口青色吐白沫四支逆冷乃臍風撮口之證
也此由兒初生剪臍不定傷動或風濕所乘其輕則病
在皮膚而為臍瘡不差其重則病入腑臟而為臍風撮
口亦如大人因有破傷而感風則牙關噤而口撮不能
入食身鞭四肢厥逆與此候頗同故謂之臍風撮口乃
最惡之病也千金有曰小兒忽患臍風撮口者百無一
活皆坐視而斃良可憫惻有一法極驗但世罕有知者
凡遇其患則看兒齒斷上有小泡子如米狀急以溫水



哺名曰臍風宜速療之不久則為撮口也	當歸去鬚半兩洗焙天漿子去殼三個微炒亂髮一錢燒灰	右為細末入射香一字許時時傳臍	又方 黃蘗剉釜下墨煤 亂髮燒灰存性	右各等分同為細末用一字或半錢傳之	治小兒臍瘡不差因風傳變欲為撮口或為發癰者	金兩黃散	川黃連去鬚一分為末胡粉一錢研龍骨一錢煨紅研	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右同為細末每用少許傳之時時用	治小兒剪臍中風唇青撮口吐白沫四支冷	定命散	赤足蜈蚣半條酒炙令乾川烏頭尖三個生射香少許	右為末入射研勻每服半字煎金銀薄荷湯調灌	治小兒初生撮口	蛇脫皮一分微炒鈎藤一分乾蝎一分已上硃砂一分別研	飛射香半錢別研真牛黃半錢別研



右同研細拌勻再研每服一字取竹瀝一兩點同乳
汁調灌下一方只用蛇蛻硃砂射香各一分每用半
字津調塗口中日五七次

又方以鹽豉置臍上炙之

又方以夜合花枝濃煎汁拭口并洗

又方於兒口傍先利令見血碎雀甕汁塗之

又方生搗鼠婦并雀甕汁相和調塗抹口中漸漸乳得

効鼠婦乃濕生虫也

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

胎中病論

兒自生下至一臘前後有病者多是未生之前在母胎
妊之時母食毒物胎有所感至生下之後毒氣發而為
病又有母於妊娠之時失於固養氣形勿充疾疢因之
故聖濟經言病生於中者與生俱生也今敘于後
梗舌 兒纔生出母腹因與揩拭口中惡物便子細看
兒口中如有皮膜似蘆葦管中之膜裹定兒舌或連舌
根者此名梗舌乃胎毒所攻而生或母於妊娠時愛食



飛禽之物感而所致便須急以指甲刺破剥去之揩拭
血淨用燒白礬灰細末傅半菉豆許若不摘去則梗其
舌而不能語令兒啞也及日數多亦不能去也
氣閉 兒初生一兩日間有大小便不通腹脹滿而欲
絕者此胎毒之氣鬱閉所致也便急令一婦人用溫水
先漱口了後吸啞兒前後心并臍下及手足心共七處
各五七次以赤紅色為度須臾氣散則自通矣不爾即
無生意也有此候用此法可謂再生

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

鵝口 兒自初生至七日內外因胎毒上攻於舌上生
白屑如米連口兩角生黃瘡及舌下有膜如石榴子大
令兒聲不發者名曰鵝口

治小兒鵝口保命散

白礬

一分 燒

馬牙硝

半兩 研細

硃砂

一分 研細 水飛乾

右同研勻細末每用一字取白鵝糞以水攪取汁調
之先以手指纏亂髮揩拭兒舌上口角頰中去垢穢
淨然後用藥傅之令遍纏髮揩時以井花水沾用或



以綿纏指頭沾粟莢汁用

治小兒鵝口不能乳

以馬牙硝研細遍搽舌上下兩頰口角內外患處日

三四次

又方以桑白皮汁和胡粉傅之

又方以雞脰中黃皮燒灰研細乳和傅之

又方以白鵝矢汁灌口中

又方以黍米汁傅之

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

又方以全蝎七枚先用薄荷汁浸過後用薄荷七葉裹
之文武火炮過焙令乾研末更入黃丹同研勻細熟
蜜和為膏傅病處

垂癰 兒自初生至七日內外因胎毒上攻血氣不斂
兒口中上□連喉舌生物如蘆箬盛水之狀或作疱在
懸癰之前塞其氣路不通令兒危殆名曰垂癰又兒生
下即死者多此病也人少知之當急視之凡遇是病便
以指甲摘破或以綿纏長針留尖如粟米許刺之令兒



氣泄則活其疱破則出青黃血水使用帛子搵拭及用 鹽湯蘸帛振揩令淨若入喉即傷兒慎之慎之如一刺 復作者再刺	治垂癰如聖散	鉛霜一分 真牛黃一分 大陰玄精石一分 硃砂一分 研細 飛日乾	右件再同研勻入白龍腦細末半錢相和每用抄一 字至半錢摻兒口中	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	重疔重斷重舌 兒初生至七日內外因胎毒上攻於 兒口中若發於疔上作腫作兩重之狀名曰重疔若發 於上下齒斷兩傍腫如疊斷者名曰重斷若發於舌上 腫起初更生一小舌者名曰重舌腫悶作痛令兒多啼 不能哺乳而妨礙	治重疔重斷	右以蛇蛻皮燒灰研細末傅之	又方治如前



右以生蒲黃末傳之

烏鰂骨散治重舌腫悶妨礙吮乳

烏鰂骨一兩 乾蟪半兩 蟪燒灰 蒲黃半兩 研 枯白礬灰一兩 研

右和研如粉每用半錢以雞子黃調塗腫上嚙津不

妨

又方治如前

右以蛇蛻皮為末乾捻傳舌下患處不一時便消不

能飲乳者用之得飲或以雞羽蘸淳醋展藥掠舌下

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

又方以木蘭皮長一尺廣四寸削去麤皮以醋一升漬

之取汁注患處

又方以伏龍肝研細末牛蒡汁調傳或以衣魚塗舌上

又方以馬牙硝末塗舌下日三

又方以三家屠肉切如指大以摩舌上

又方以黃丹豆許納管中吹舌下

又方以蒲黃傳之不過三次差一方微炒以紙鋪地上

出火毒研羅細末先用溫水蘸帛裹指輕輕按掠後



摻藥

又方以桑白皮煮濃汁塗乳上吮兒

治重舌妨悶欲死

右以亂髮燒灰研細末以傳舌下頻頻用或燒簸箕

皮傳上

又方治如前以鹿角炙適溫熱熨之或如米粒大安舌

下

又方以小豆煮汁和鹿角灰傳之日三或以赤小豆末

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

醋和傳舌上

又方以露蜂房燒灰研細末醋和膏傳之

蓐瘡 兒自初生至七日內外因胎毒攻發身生瘡者

名曰蓐瘡謂在產草上生瘡也

治蓐瘡

右以黃連為細末先用生麻油塗盞子內將黃連末

遍摻油上倒合在銚三脚子上下用艾葉火熏令極

乾刮聚再入生油膩粉各少許和膏傳之



又方以澤蘭心細嚼傳之

又方以葵根燒灰傳之

治小兒初生三日頭面生瘡緣起身體壯熱多啼

升麻

柴胡

去苗

石膏

各一分

甘草

當歸

去鬚各半兩

右咬咀每服一錢水半盞煎至二分去滓時時與量

兒大小加之

治小兒初生蓐中生熱瘡

右以雞子五枚敲破去白只取黃又以亂髮如雞子

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

黃許二味相和銚子中煎熬取汁塗之更用苦參末

傳之甚奇劉禹錫云頃在武陵生子蓐內便有熱瘡

發於臂腿蔓延半身初用他藥無益狀候至重晝夜

啼號不乳因閱本草有云亂髮合雞子黃煎消為水

療小兒驚熱下痢注云去痰熱百病又雞子本草云

療熱瘡因用之立效如神煎法雞子黃亂髮初入銚

煎時甚乾少頃髮焦遂有液出旋取置一磁碗中以

液盡為度



口噤 兒自初生至七日內外忽口噤不能乳腹急多	啼下青黑糞或口生瘡如粟米名曰口噤此證牙關急	而口噤與撮口相似然撮口證面色青啼聲不出口吐	白沫比口噤證面色赤而多啼口不吐白沫所以異也	此緣兒在母腹中時為風熱傷胎所致故聖濟經曰風	熱傷胎生而口噤也 千金云赤者為心 噤白者為肺噤	治初生兒口噤不開不收乳立聖散	乾蜘蛛 一箇去足口取新竹瀝一 中蜆殼浸一宿炙焦為末 乾蝎稍七箇 為末	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	膩粉 一錢	右同研勻細末每服一字乳汁調滴兒口中時時用	又方以鹿角粉大豆末等分研細乳和塗乳上以兒吮	服	又方以生甘草一分細剉水一盞煎至六分去滓放溫	分數次灌兒口中令吐出痰涎穢物後取猪乳汁點	兒口中差亦治撮口	又方以真牛黃少許研細淡竹瀝調一字灌之次以猪



乳滴口中

又方以赤足蜈蚣去足炙黃為末以猪乳調半錢分三四次溫灌之一方同雀甕不開口者五枚燒灰研細末飲調服一字

又方以白殭蚕二枚為末蜜和傅兒口內如無以原蚕鵝二枚炙黃代之亦治撮口

又方以雀矢白水和圓麻子大乳服二圓雞矢白亦佳一方雞矢白棗大綿裹水五合煮二沸分服

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

治小兒口噤體熱

右以青竹茹三兩醋一升煎取三分之一溫分數服治小兒口噤牙關不開

右以天南星一箇煨熟急用紙封角莫令透氣却以紙裹近上尖處翦一竅子雞頭大令熱氣出於鼻孔中熏之牙關立開亦治撮口

軀啼 兒自初生已來身色青白無血色好啼哭晝夜不止身體仰而軀夜則甚腹滿不乳大便青白晝夜啼



諸藥不效者此名軀啼乃兒未生已前在胎胞中時為風冷傷而所致故聖濟經曰風冷傷胎生而軀啼千金有云小兒有胎寒則腹痛軀啼時吐衄或腹中如雞子黃按之如水聲便沒沒而後出不急治多變為癰		治小兒胎寒軀啼養藏湯		當歸 去蘆 沉香 丁香 白朮 桂心 川芎 一兩 兩 各半		右為細末每服一錢水一盞姜二片煎半盞去滓滴		欽定四庫全書 小兒衛生總微論方		兒口中		治小兒忽患腹痛天矯汗出者亦胎寒也 出千金		右以黎葉煮濃汁七合分三四次服		又方以當歸為末每用一小豆許乳汁調下日二夜一		病兒大添之		又方以栝子仁為末每服一錢半溫水調下		治小兒胎寒軀啼發癰礬石圓		右以馬齒礬火煨半日為末棗肉和圓黍米大每服	



一圓乳汁送下量兒大小增損以差為度有痰亦去 神良 兼腹脹不嗜食大便青黃色	血癖 又名胎積 兒未生之前在母腹中藉母經血以滋	養焉至生下時須拭去口中惡血及用藥下盡兒腹中	穢血之糞方纔飼乳若於生時揩拭兒口中惡血不淨	吞嚥入腹或腹中舊有穢糞不曾下之或下之不盡因	而成癖故名曰血癖又名胎積至生下百日內外兒生	頭瘡眼目赤澁小便如血口中氣急身體紫色腹脹躁	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	煩多啼不乳	治小兒血癖胎積丸	白丁香 二十錢 輕粉 半錢 滑石 半錢 乳香 半錢	巴豆 三十箇針串燈 上燒焦微存性	右為末糊丸黍米大每一二丸看虛實大小與服煎	柳心七箇湯放溫送下連一二服糞下惡物是效亦	令乳母服和氣藥調養飼兒若兒服藥後吐不止大 便不通面黑氣喘者死



胎赤 兒自生下至開眼已後眼兩眦及臉眶赤爛名
曰胎赤此因兒生時稍難留帶時久或不慎照顧致惡
血入於兒眼又或生下時揩拭兒眼邊惡血不盡亦令
入兒眼潰澀以生是病不急治之則至長不差
治小兒胎赤眼二金散

黃連 去鬚
一錢 黃蘗 一錢

右先為麤末用妳汁同浸一宿焙乾收之每用少許
以新綿裹荊芥湯浸之放溫時時頻洗

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

胎驚 兒在母腹未生之前因有所驚胎內感之至生
下百日以來兒心神不寧睡卧不醒壯熱躁煩啼哭無
時上視發搐面青腰直撮口縮腮糞青黃水者此名胎
驚方論著於驚疾門之中

胎怯 兒自生下以來面無精光肌肉脆薄大便白水
身無血色時時哽氣多噓目黑睛少羸羸多哭此胎怯
也宜天麻浴湯治之

胎肥 兒生下肌肉厚遍身血色紅潤至滿月以後漸



漸肌瘦目白睛粉紅色五心熱大便難時時生涎此胎	肥也更看父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可生肥治亦宜	天麻浴湯	胎熱 兒生下有血氣時叫哭身壯熱如淡茶色目赤	大便黃赤糞稠急食乳此胎熱也治亦宜天麻浴湯	治小兒胎怯胎肥胎熱等諸疾天麻浴湯	天麻 二錢 蝎尾 去毒為末 硃砂末 各半 白礬末 射香 一字	烏蛇肉 酒浸去皮焙乾為末 青黛末 各三錢	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為末勻每服三錢水三碗桃枝葉五七條煎十數	沸帶熱浴之勿得浴背湯須適溫熱用	治小兒胎熱或乳母飲食麤惡辛苦乳汁不起兒色如	淡茶黃色瘦瘠不為肌膚四支痿癱繚戾服之充悅健	壯	芍藥 二兩半 柴胡 去苗二兩 鱉甲 茯苓 去黑皮各一兩半	人參 去蘆 大黃 各一兩 甘草 乾姜 各半兩如熱即用枳實	右為末煉蜜和丸大豆大百日至一歲兒服一丸乳



服日二量兒大小增減	胎不治病	胎內十二證 一雙瞽 二隻眇 三駢拇 四六指	五體殘 六支廢 七獨腎 八瘡啞 九缺唇	十社老 十一攣拳 十二侏儒	胎外十二證 一睛凸 二近覩 三鼻鼈 四耳返	五結喉 六項癭 七舌短 八節彈 九龜背	十駝背 十一膝並 十二交脛	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	小兒衛生總微論方卷一						



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷二

五氣論

兒自胎孕以至生成皆稟五行而生五藏故自五氣以
生五態而各不同聖濟經言五行孕秀有異宜五態委
保有殊氣沖和均賦體性潛異者蓋母氣胎育有盛衰
之虛實故其子生也有剛柔之勇怯又經云心氣虛而
語晚肝氣微而行遲脾氣弱而肉瘠腎氣怯而解顱如
欽定四庫全書
小兒衛生總微論方
此之類悉皆是矣然五藏之氣稟受殊異其於怯弱者
聖人亦有方藥以補養之矣

心 心氣盛者則伶利早言笑形神清而多髮心氣怯
者則性癡而遲語髮久不生生則不黑心主血髮為血
之餘怯則久不生也心繫舌本怯則語遲也

治小兒生下無髮

以鯽魚燒灰末和醬傅之即生

治小兒髮久不生莖勝丹



當歸 去蘆 一兩 生乾地黃 去苗土 一兩 芍藥 一兩已上 並為末	苴勝 一合 別研 胡粉 半兩 別研	右同研勻細煉蜜和丸黍米大每服十粒煎黑豆湯	下兼化塗頭上量大小用	又方以楸葉中心子杵爛絞汁塗之	又方以羊屎燒灰淋汁同豉汁洗之三日一次不過十	次即生	又方治血熱髮薄不生以桃柳煎湯入猪膽汁和沐頭	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	髮自生	治小兒心氣不足從小至數歲不能言昌蒲丸	石昌蒲 二錢 去蘆焙 人參 半兩 去蘆焙 丹參 一錢 去蘆 天門冬 一兩 去心焙	麥門冬 去心焙 一兩 赤石脂 三錢	右同為細末煉蜜丸菴豆大溫水下五七丸至十餘	丸量大小增損日三久服取效為度無時	又方昌蒲 一兩一寸 九節者良 遠志 甘草水煮 去心一兩 桂心 一兩 黃耆 半兩	人參 去蘆 半兩 黃連 去鬚 半兩 酸棗仁 湯浸去 皮半兩



右為細末煉蜜和丸如雞頭實大每服一二粒煎生
姜湯化下無時

又灸法灸心俞三壯灸兩足踝三壯

又方治五六歲不語此心氣不足舌本無力不能發轉
故也一云風冷傷於少陰以赤小豆為末酒和塗舌
上神效以社壇餘酢酒與飲少許

肝 肝氣盛者則躑健而早行立肝氣怯者則長不能
行而脚細名曰鶴膝肝主筋怯則筋弱故長不能行也

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

又或眉久不生眉屬肝肝氣不榮故眉久不生也何以
知眉屬肝且五臟皆有毛其髮屬心心為火火性炎上
故髮生上槍也鬚屬腎腎為水水性潤下故鬚生下順
也是以女人皆無外腎故無鬚也毛屬肺肺在五臟之
上而主外故毛生皮膚之外也眼睫屬脾眼輪亦屬脾
脾在右偏故睫斜生眼輪之上也眉屬肝肝在左偏故
眉斜生眼睫之上也左為上右為下所以眉在上而睫
在下也



治小兒從小至數歲不能行麝茸丹 經大驗	射香 研 茄茸 酥塗 生乾地黄 去苗 虎脰骨 酥塗	當歸 去蘆 洗焙黃耆 剉各半兩	右為細末用羊髓二兩煮爛和丸黍米大每服十九	摩沉香湯送下乳前日三服	又方羚羊角丸	羚羊角 用尖細節密者剉取末 虎脰骨 敲破塗 生乾地黄 去苗	土焙酸棗仁 去皮炒秤 白茯苓 去黑皮 桂 去粗皮不 防風	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	去蘆切焙當歸 去蘆切焙 黃耆 切焙各一分	右為細末煉蜜和劑每用一皂子大食前溫水化下	日三兒大者加之	又方以五加皮為末飲服之取葬家未開戶盜食哺之	日三便能起行	又灸法小兒自小至五歲不能行者灸兩足踝各三壯	又灸法小兒鶴膝脚細不能行者灸膝眼三壯	治小兒生下無眉毛欲得生者



以七月中採烏麻花不拘多少陰乾為末以生烏麻	油浸每夜傳之	治小兒眉毛眼睫因癬退不生名乳頰癬	赤芝散 野油花 旋覆花是也 赤箭 天麻苗 防風 去蘆各等分	右為細末先洗癬淨搥乾以好油調塗之後服烏犀	丸	犀末 錢一 猪牙皂角 二錢末 乾蟾末 三錢 龍腦 少許	右為細末熊膽汁和丸菴豆大每服一丸溫水下量	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	大小加減	脾虛汗脾氣盛者肌肉厚而色紫耐壯而乳多脾氣怯	則肌虛而喜汗汗多則肉瘠脾主肌肉怯則肌虛虛則	榮衛衰故汗多而肉瘠也	治小兒脾怯多汗丁香散	陳皮 一兩 青皮 去穢 訶子肉 去核 甘草 各半兩 丁香 二錢	右為細末每服二錢水一盞煎六分食前溫服兒小	分之



治小兒喜汗香瓜丸	大黃瓜 黃色出 川大黃 濕紙裏 胡黃連 柴胡 種子者 去	青皮 去 鱉甲 醋炙 黃蘗 去 蘆薈 藥各等分 穰 黃 皮 瓜用一箇	右將黃瓜割頂去瓢以諸藥為細末填瓜內至滿却	將頂蓋口杖子簽定慢火內煨熟取藥并瓜研之如	皮研不爛則去之乾却入麵糊和丸菴豆大每服三	二丸乳後冷漿水下兒大加之	粉法 黃連 去 牡蠣 火 貝母 各七 錢	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末以米粉一升同研勻粉身與丁香散同用	肺 肺氣盛者肌膚瑩白滑膩髮細黑淺肺氣怯則肌	膚沮敗若無皮而血凝故寶鑑亦名血凝孫真人言小	兒出腹肌肉猶是血也漸漸堅化肺主皮膚肺氣不充	則血沮敗不成肌膚故若無皮毛而血凝面目繞鼻口	悉黃閉目撮面口中乾燥四支不能伸縮哭無聲不吮	乳此皮毛不斂也多是不育千金治以龍膽湯方具于	後



治初生兒血凝皮肉不飲哭無聲不吮乳

以胡粉研細酒和塗之乾即愈

又方以白殭蚕為末煎湯適寒溫浴之

又灸法初生兒血凝

以臍四邊各去臍半寸并鳩尾下五處各灸三壯

腎氣盛者顙小而合早牙齒早生腎氣怯者解顙

而顙不合牙久不生生則不固面慘目睛多白腎主骨

髓腦為髓海怯則腦髓不成故顙解而不能結解也顙

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

不差而百病交攻極難將護此最為大病矣又腎主骨

牙乃骨之餘怯則牙文不生也

治小兒解顙玉乳丹

鍾乳粉

依法煉者半兩

熟乾地黃

依法蒸者半兩

栢子仁

半兩 當歸

去蘆 防風

去蘆分剉

補骨脂

一分揀淨微炒

或加黃耆茯苓亦

得

右為細末入鍾乳粉栢子仁拌勻煉蜜和丸黍米大

每服十丸煎茴香湯送下乳後



又方 細辛 去苗 桂心 各半 乾姜 七錢	右為細末以乳汁和傅縫上乾即復傅兒面赤即愈	又方以蛇蛻皮炒焦為末用猪頰車骨中髓調傅縫上	日三一方只用猪頰髓	又方以驢蹄燒灰研細末生油和傅縫上以差為度	治小兒顫不合	生蟹足骨 兩半 白欬 兩半	右為細末以乳汁和貼縫上	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	又方以龜甲煮湯適寒溫漬之不得用黑者	治小兒顫不合鼻塞不通	以大天南星微炮去皮為細末淡醋調攤緋帛子上	貼之仍炙手熱頻熨立效	治小兒顫不合顫腫顫陷並主之	蛇蛻皮 半兩燒灰細研 防風 去蘆 白芨 大黃 濕紙裹煨紙焦各一分	右為細末入青黛一分同研極勻每用半錢用猪	膽汁調勻將紙一片依大小長短剪一紙花子攤藥



在上仍於四邊各留少白紙用淡醋糊塗徧以貼病
上不住以溫水潤動一伏時換一方防風一兩 栢子
仁白芨各一兩 為末乳汁和傅顙上十日知二十日愈
日一易之

又法治小兒解顙顙不合作頭巾與裏遮護之久而自
合千金云良法也

治小兒齒久不生

以雄鼠屎三十枚日一枚拭齒斷即生其屎兩角尖

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

者乃雄鼠屎也一云用雌鼠屎

兩頭圓者

又方以黑豈三十粒於牛糞火內燒令煙盡細研入射
香少許再研勻細用針挑不生齒處令血出以藥末
揩上不得見風忌醋多年不生者用之極效

又方以犀坑中竹木正旦刮屑塗之即生

乳母論

兒生自乳養者一切不論若令乳母乳養者必擇其人
若有宿疾狐臭癭癭上氣喘嗽疥癬頭瘡龜背駝背鼻



艱緊唇痴聾啞顛狂驚癇疽癰等疾並不可令乳兒也

凡乳母乃血氣化為乳汁則吾謂善惡悉由血氣所生喜怒飲食一切禁忌並宜戒慎若縱性恣意因而乳兒則令兒感生疾病也若房勞乳兒則令兒瘦瘁交脛不能行若醉以乳兒則令兒身熱腹滿若蓄熱乳兒則令兒變黃不能食若怒作乳兒則令兒驚狂上氣若吐下乳兒則令兒虛羸氣弱是皆所忌也

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

凡每乳兒乳母當先以手按散其熱然後與兒吮之若乳驚汁湧恐兒嚙乳不及慮防槍噎則輒奪之令兒少息又復與之如是數次則可也又當視兒飢飽節度一日之中知幾乳而足量以為常每於早晨若有宿乳須當捨去若夏月不去熱乳令兒吐衄冬月不去寒乳令兒咳利又若兒大喜之後不可便乳令兒驚癇若兒大哭之後不可便與乳令兒吐瀉又乳母不可太飽恐停滯不化若太飽則以空乳令吮則消



凡每乳兒乳母當以臂枕兒頭令兒口與乳齊乃乳之
不可用膊恐太高令兒飲乳不快多致兒噎又乳母
欲寐則奪去其乳恐睡著不覺被乳填沃口鼻別生
其他事又且不知兒饑飽也

凡兒生六十日目瞳子成能識人百日任脉反覆一百
八十日尻骨成能獨坐二百日掌骨成能匍匐三百
日臍骨成能獨立三百六十日膝骨成能移步乳母
常須依時按節續續教引使兒能會此是定法也即
不得常常抱持過時都不教引致令兒筋骨弛墮又
恐成腰脚之疾也

慎護論

凡乳母慎護養兒乳哺欲其有節襁褓欲其有宜達其
饑飽察其強弱適其襪薄循其寒燠蓋自有道不可不
知也

凡兒自初生至滿月宜常常時取猪乳汁滴兒口中令
嚙最為佳妙又以珍珠末一大豆許用蜜一蜆殼和

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方



之分三次或四次每十日內外與一次塗兒口中安
心神鎮魂魄

凡兒生肌肉未成不可與煖厚新綿之衣當與故絮帛
薄衣若與新綿厚煖則蒸燠生熱筋骨緩弱故聖經
云襁褓者衣欲舊帛綿欲故絮非乃惡於新燠亦資
父母之餘氣以致養焉

凡乳母若遇天和無風之時當抱兒在日中嬉戲使數
見風日則血凝氣剛肌肉硬密堪耐風寒若藏幃帳

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

之內重衣溫煖譬如陰地草木不見風日則脆軟不
任易為傷損故聖濟經言重衣溫厚幃帳周密宜與
減損甚則傷皮膚害血脉是生多疾也

凡兒常令薄衣雖冬月但令著兩夾衣及衲衣之類若
極寒即漸加舊絮衣人家多務愛惜乃以新綿厚衣
溫養過宜適以為害薄衣之法當從秋習之若至來
春稍煖須漸減其衣不可便行卒減恐令兒傷中風
寒



凡兒於冬月須著帽項之衣夏月須著背褡及於當脊
更襯綴一重以防風寒所干謂諸藏之俞皆在於背
故也又常令乳母每日三時摸兒項後筋兩轅之間
名曰風池若熱即須熨之令微汗則愈諺云戒養小
兒慎護風池者是也

凡兒於春時不可覆頭裹足致陽氣不得出泄則發熱
矣

凡兒常當看覷消息無令身體有汗若汗出則致腠理

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

虛而受風寒晝夜寤寐皆當慎之須審天氣冷煖衣
服厚薄及以粉粉之

凡兒於暑月時常令在涼處勿禁水漿但少少與之唯
是不宜多與

凡兒不可抱於簷下洗浴又不可當風解脫恐為寒干
又啼哭未斷不可與乳冒冷衝寒不可哺飼恐為食
傷又不可近神佛之前驢馬之畔又不可令兒見怪
異之物及各門異戶不相識之人恐為客忤



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

凡兒生三日之外當與少哺姚和衆云以粟米煮粥飲
研如乳汁每日與半蜆殼許以助穀神導達腸胃孫
真人云以粳米飲七日外與三大豆許慎不可雜與
藥喫巢氏云兒生滿三十日後當哺少物如二棗核
許至五十日如櫻桃許至百日如大棗許若乳少當
以意增之不可多與恐不能勝別生病矣若乳多不
消哺食者亦須少少與之以壯腸胃兒大稍稍增之
當有常劑聖濟經亦云兒生三日用飲過三日用哺
哺之以賴穀氣也哺之多少量日為則如是則五臟
得養而胃氣壯矣今之養小兒者多務愛惜過當往
往至二三歲尚未與食致脾胃虛弱體力怯軟平生
多病若在半年之後宜煮陳米稀粥與之十月以後
漸與稠粥爛飯以助中氣則自然易養少病惟忌生
冷油膩葷茹甜物

凡小兒乳哺既有常劑若忽爾却乳哺少者此是腹中
少有不和也便當與微微下之若都不肯食但飲少



乳者此傷重要下之不可不下也若不與下則生寒	熱或為吐利及為癖積脉大者發癰皆不早治之由	也孫真人亦曰小兒寒熱亦當下之乃差又小兒乳	哺不能無痰癖也常當節適之若稍不進乳食便以	微藥尅化紫圓最妙	方在後	不得行駛藥轉利又不	得為無事而遷延致病大即難治爾小兒微患便與	微下則損不甚而易愈矣若於春夏之時有疾	千金云立	後切不可妄行吐下及微疾亦不可亂行鍼灸蓋鍼	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	灸傷經絡吐下損府藏故也若誤行轉瀉則使下焦	虛而上焦熱變成大病也故巢氏有言小兒春夏自	非甚病決定不可吐下者是也	食忌論	凡小兒有不可食之物不可不知今具于後	小兒不可多食粟子令兒氣弱行遲熱食則氣擁	小兒不可食蕨菜令兒立則無力久不能行	小兒不可食芡令兒不能行



小兒不可食黍米雞肉胡瓜令兒腹中生虫經驗方	云小兒未斷乳食雞肉令兒腹生蛻虫	小兒不可食越瓜令兒發痼疾	小兒不可食麥令兒髮落 麥是蕎麥也	小兒不可食蓖茨令兒臍下痛	小兒不可食鯪魚令兒生癰癖	小兒不可食炒豆猪肉令生氣壅致死	大小論	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	經言六歲已上者為小兒十八已上者為少年據此之言則十八已下者皆為小兒也此乃古之所論爾以今時校之則時世相異理或未當且禮云男子三十曰壯有室又曰男子三十而娶是古之男子皆三十已上方娶故十八以下得為小兒之稱今之時則不然男不過十五而娶至十八已有生一二子者豈得為小兒也以今時言之當以十四以下為小兒治其十五已上者天癸已行婚冠既就則為大人治耳



諸般色澤紋證論

經云小兒六歲已還者經所不載有病難治無承據之也詳之此謂嬰兒未能言者有病則無由問其所苦故無承據也若能言者必能問之小兒豈有六歲尚不能言者哉其不能言者唯一二歲兒也故先賢言嬰兒未能言者最為幼小有病則肌膚未全寸關不辨變蒸交互氣血細微若憑診切實難明曉惟在觀其形色參其證候乃知病之所在者矣其觀視之法須要安神定志

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

勿令情意惑亂不得於兒哭斷之時睡起之際則色不正矣須於辰時之後巳時之前夏即未熱冬即未溫外色不雜內氣閑雅乃可向明而觀察之也聖濟經曰通識之士必察剛柔勇怯視其盛衰虛實適以寒溫平以陰陽病之輕重緩急隨證以治之不必蔽於難治也諸所論繁紊難以執據今採其當者叙而次之

諸色澤候

面上五臟部分色 左頰主肝右頰主肺額上主心鼻



上主脾

一云唇口

頤上主腎色青為風色赤為熱色黃

為食色白為氣色黑為寒也

面上五藏四時色 經言五藏之色皆外榮於面故死

生疾病係焉肝主春其色青心主夏其色赤脾主長

夏其色黃肺主秋其色白腎主冬其色黑是謂五藏

之色隨四時各榮於面也其色不深不淺應常光潤

者為和平也若色深重者其藏實淺淡者其藏虛

面上五藏生死色 經曰滋榮者其色生青如翠羽赤

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

如雞冠黃如蟹腹白如豕膏黑如烏羽枯夭者其色

死青如草茲赤如衄血黃如枳實白如枯骨黑如臭

煤

面上五藏部分相乘色 肝色青者本色也赤者心乘

肝也黃者脾乘肝也白者肺乘肝也黑者腎乘肝也

心色赤者本色也青者肝乘心也黃者脾乘心也白

者肺乘心也黑者腎乘心也脾色黃者本色也青者

肝乘脾也赤者心乘脾也黑者腎乘脾也白者肺乘



脾也肺色白者本色也青者肝乘肺也赤者心乘肺也黃者脾乘肺也黑者腎乘肺也腎色黑者本色也青者肝乘腎也赤者心乘腎也黃者脾乘腎也白者肺乘腎也

面上五藏四時相乘色 經言青赤見於春赤黃見於夏黃白見於長夏白黑見於秋黑青見於冬是謂五藏之生五行相繼也為病輕若肝色見青白心色見赤黑脾色見黃青肺色見白赤腎色見黑黃是謂真藏之色五行相尅也為病重

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

面上死生色 內經曰凡病面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑者皆不死聖濟經言脾真為本而面黃必生者以真氣外榮故也若面青目赤面青目白面青目黑面黑目白面赤目青者皆死謂無脾色外榮而真氣已絕故也

鼻上色 聖濟經曰鼻端青為腹冷黑為水氣白為無血黃為胃寒赤為有風鮮明為留飲



目內色赤者心熱淡紅者虛熱青者肝熱淺淡者肝虛
黃者脾熱無精色腎虛

金匱死色 凡小兒病者有黑色滿面或繞口入口或

延眉繞目或暗人中者皆死有青色延面連目入耳

者死目無精光眼中有物如橫紅針者死

外臺死色 凡小兒病者面上有青黑色如紗蓋定從

髮際至印堂者不以疾狀淺深六十日死至鼻柱者

一月死至人中者十日死滿面者即日死

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

諸處紋狀候

耳後完骨上有青脉如線三兩路卧不靜者此癇疾候

當刺掐破令血出以為小治若自腫破者死候也

手大指後白肉魚際之上有筋絡色青黑者胃中有寒

赤黃者有熱赤青黑雜者寒熱若青而小短者少氣

又手處手大指第二指之間虎口上有筋脉如線看其

顏色曲直以訣其病若紋直者是驚曲者是傷沉隱

為風曲外有冷曲內為食



歌曰虎口青紋直 情知四足驚 黑色元因水
赤乃火飛禽 淡紅人驚發 灣紫有傷尋
外冷內為食 沉隱定風生 長大疾須重
短小得安平 但看叉手處 病候驗虛真
第二指上仄三節名曰三關小兒有男左女右看之有
八般筋脉紋狀以驗其病名曰八片錦最下一節名
為氣關有紋過者病纔覺重諸病既生則氣不調順
故名氣關也
欽定四庫全書 小兒衛生總微論方
第二節名為風關有紋過者須發驚風漸加困重故名
風關也
第三節名為命關有紋過者則病極而命危殆故命關
也
魚刺形主初驚在氣關主壯熱吐瀉在風關主初
驚纔發在命關驚極難治
歌曰形如魚刺是初驚 遍體如湯面色青
吐瀉躁煩如似此 通腸和氣便惺惺



垂針形主瀉痢在氣關主傷冷吐瀉在風關瀉傳
驚風在命關驚傳慢驚風極候

歌曰形如懸針瀉痢多 發驚身熱定違和

此病若變驚風慢 命關已度是沉疴

水字形主肺驚在氣關涎痰咳嗽虛積在風關發

驚喘哽涎在命關困不治

歌曰形如水字肺家驚 虛積相傳面色青

鬲上有涎須與治 命關若過更無寧

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

乙字形又曰中曲主食驚在氣關主食傷吐痢在

風關傳變風乙形屬肝肝刑于脾在命關傳慢脾

風不治

歌曰形如乙曲病因肝 眼慢驚啼瘕癰偏

冷積為傷傳變此 慢脾風已度三關

去蛇形主內熱外虛 來蛇形主外實內虛

蛇中卷形內外俱虛此數樣皆曲虫又曰曲

蛇在氣關主疳積在風關主勞帶驚在命關不治



歌曰形如蛇曲病因深 脾積疳勞又帶驚	未過二關宜早治 若過三關更莫論	長者弓形短者環形主疳積在氣關吐逆疳熱喫	泥土在風關疳極羸瘦在命關不治	歌曰形如環弓疳氣黃 好食泥土是尋常	此病早求良醫治 三關已到命飛揚	亂紋形主虫痛在氣關主氣不和有虫積食諸生	物在風關主虫咬心腹痛在命關病因極難治	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	歌曰紋亂縱橫虫上尋 曉夜啼號不可憐	神佛求遍都無應 安虫取積得康寧	珠形死候此候不拘三關上下見者皆為死候	歌曰琉珠死候不須醫 便是沉疴莫療之	三關若見都休望 安排後事更無疑	諸紋總歌	魚刺初驚候 懸針瀉痢多 水紋驚肺積	乙樣是肝訛 曲虫驚疳病 環弓一論過



亂紋虫咬甚 琉珠病已疴	五藏主病論	諸形證候	肝藏 肝主風肝病實則目直叫哭呵欠頓悶項急治當	瀉之肝病虛前牙多欠口中氣熱則外生口中氣溫則	内生治當補之肝氣則擇衣捻物熱甚則目直不搖風主	動又風淫末疾熱即風動於四末故手擇衣捻物也	熱入於目牽其筋脉則兩眦俱緊不能轉視故目直	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	也治當瀉其心肝肝有風則目連劄風甚則身反折強直不	搖凡病新久皆引風風動止於頭目目屬肝風入於	目則目上下左右如風之吹不輕不重兒不能任故	目連劄也風甚則風入於筋脉筋脉緊急故身反強	直也治當瀉肝補腎肝有熱有風甚則皆兼驚證不搖者謂	未得心熱故也若心熱乘於肝則子母皆有實熱風	火相搏而乃發搖其抽掣之勢如風蕩火也治在驚	中若肝熱擇衣捻物壯熱飲食喘悶者肺乘之也治當



瀉肺肝於四時冬相春王夏衰秋絕若在春肝王之時	亦同反見肺病乘肝者是肺強肝怯也治當瀉肺補其腎今肝虛	補腎者母能令子實也甚則直補其肝或子母補之俱補輕者肺病退則愈重者	目中淡青必發驚若更有赤者當發搐也謂怯則目	淡青色有心熱則赤故當發搐肝虛實皆生風若外	感生者則呵欠頓悶口中氣熱治當發散若能食飲水不	止者當微下之餘不可下也	心藏 心主驚心病熱則叫哭發熱飲水惕跳上竄發	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	搐治當瀉之心病虛則卧而悸動不安手足搖縱治當補之心	病虛實皆主熱心實則喜仰卧謂心氣實則氣上行	澁若合面卧氣則不通快故喜仰卧使氣得上下通	也治當瀉之心熱則視其口中氣溫或合面卧而就冷及	上竄咬牙也謂心熱則胃亦熱兒雖不能言有就冷	之意故合面卧也治當瀉熱若邪熱乘心則為驚啼治當安神	心於四時春相夏王秋衰冬絕若在夏心王之時日	亦同反見腎病乘心者是腎強心弱也治當補其肝心瀉其膀胱今腎



強而瀉膀胱者謂腎主虛而無實
瀉其膀胱之府則藏不得盛也 輕者腎病退則愈

重者悸動不已當發搖也

脾藏 胃附 脾主困脾病實則困睡身熱飲水能食 治當下之

脾病虛則身溫四支冷吐瀉生風 治當補之 脾寒者夜啼

脾屬陰冷即夜間發痛故兒啼哭 治當溫中 脾熱者弄舌

脾熱則舌絡緊故時時舒吐也或時飲水熱則津液

少故也 治當分 不可用涼藥下之加面黃肌瘦五心

煩熱則為疳也 治在疳 若不因脾熱大病未已弄舌

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

者凶也又脾藏冷熱皆主吐瀉困倦若吐乳色黃者
傷熱吐乳色青者傷冷四時之間秋冬春三時皆冷
多唯夏暑時有熱多

胃附 胃熱者若吐瀉昏睡露睛者虛熱也若吐瀉昏
睡不露睛者實熱也胃久虛熱多生疸病胃冷者若
吐痰沫白綠水不食腹痛或瀉青白痢穀不化者胃
虛冷也若胃虛怯有汗者但上至項下至臍也若面
恍白無精光口頻撮口中氣冷不思食者胃不和也



又小兒筋骨未成血脉未全自小多啼哭者胃啼也	脾胃二者腑臟表裡人之司命故同病也脾於四時	王在四旁 證四 若於王時反見他藏病乘脾者是脾	弱也 如春季三月木位土王之時見肺來乘之秋九月金位土王之時見肝來乘之之類是也他放	之治當補弱為 輕者所乘之藏病退則愈重者面目	赤黃脾怯也	肺藏 肺主喘肺病實則身溫悶亂氣促喘急 治當	病虛則身熱哽氣長出氣 治當 肺熱則手陷眉目鼻	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	面甚則吐稠涎及咯血者久則肺虛 治當 若虛熱則	唇深紅色 治當 若實則涎痰潮吐 治宜 肺氣盛而熱	又復有風冷者則胃滿短氣悶亂喘嗽上氣 當先治	風 若肺只傷風者不胃滿也 但只 又肺有虛實寒熱	咳嗽者 並於咳嗽 肺於四時夏相秋王冬衰春絕若	在秋肺王之時 日迭 反見肝病來乘肺者是肝強肺	怯也肺怯則唇色白若病而悶亂氣麤喘促哽氣者	難治為肺虛損也唇白者謂肺脾病久也脾為肺之



母母子皆虛不能相營也故名曰怯

治當補脾肺而瀉其肝也輕

者肝病退則愈重者唇白枯者死白澤者吉

腎藏 腎主虛腎病無實唯斑瘡腎實則變黑陷餘無

實病虛則身冷無精光畏明體骨重蓋腎氣不足則

下竄而骨重惟欲墜於下而縮身也又腎屬水陰也

虛則畏明若因他病致腎虛者非也又腎虛者謂本

怯由胎氣不成精神不足目中白睛多面恍白無光

多解顱此皆難養縱長不過八八之數若恣色欲多

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

不及四十而亡也

治並當補之

腎於四時秋相冬王春衰

夏絕若在冬腎王之時

夜半同

反見心病來乘腎者是

心強腎弱也

治當瀉心而補腎

輕者心病退則愈重者下竄

不語腎怯虛也

凡病必視其新久虛實假令肺病又見肺證若前牙多

欠者則易治謂肝虛不能乘肺也若目直叫哭項急

頓悶者則難治謂肺病久則虛肝強而實反勝其肺

也虛則補其母實則瀉其子又病必視其五藏衰王



時候參其相乘勝負虛實其順易治微邪是也逆者難治	凡病先虛或已經下之有合下之者必先實其母後下其子也假如肺虛而痰實此可下之證當先益其脾	後乃瀉肺也諸病放此	凡病有熱者或疎利解化之後無虛證者勿得用溫補之若用之熱必隨生	諸死絕候	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	喬岳五藏絕歌	心藏 吐瀉變為痢血黑渴難當心主血心絕則血色變黑虛燥而發渴	肌瘦難行坐虛舌不縮藏心主舌絕則不能收兩臉如脂赤久痢	則面當無色今面色反如脂者心絕則虛陽上發也無語口生瘡心主舌絕則不能語若	向夏中得更莫細思量	肝藏 眼目時時澁渾身似醉人頻頻只要睡心煩又	多嗔肝主目絕則不能開故澁而又肝主怒絕則多怒	不止唇白眼胞腫狂躁足啼聲東方應此候病則不



宜春	脾藏 面色黃時好不可見相傳體弱增寒甚虫行覓	食飧 脾主支體絕則體弱又脾絕則腎逆乘之故 噤	乳唇無力齒露蓋時難 脾主唇絕則不能收 眼傾休	下藥 眼眶屬脾 免更住人間	肺藏 肺候應白色莫使見絕形鼻青孔燥黑腹脹眼	胞傾 肺主鼻絕則肝逆乘之而色青又肺絕則 項直	喘氣急腎凸沒迴聲 肺主氣絕則喘急項直以引氣	欽定四庫全書 而無迴 小兒衛生總微論方	氣也 秋間逢此候四方別托生	腎藏 冷汗時時有尿多夜裏驚 腎絕則陰陽相離故	精者神之舍絕則精神離故夜 遍身生粟疥手足冷	如水 陽盡不能 項倒頭難舉面黑沒精神 腎絕則天	目皆黑無 此候應壬癸冬得殞其身	王叔和死證歌 眼上赤脉下貫瞳人顙門腫起兼及	作坑鼻乾黑燥肚大青筋目多直視都不轉睛指甲 黑色忽作鵝鳴虛舌出口齧齒咬人魚口氣急啼不



作聲虺虫既出必是死形用藥速急十無一生	錢乙死證 瀉不定精神好 大渴不定止之又渴	吹鼻不噴 病重口乾不睡 時氣唇上青黑點	頰深赤如塗胭脂 鼻孔開張 喘急不定 面有	五色不常不澤	諸般死證 病困汗出如珠不流 頭毛上逆 唇口	枯乾 口鼻冷氣 頭足相抵 卧正如縛 四支	垂蹶 手足掌冷	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	通真子死候歌	顙陷唇乾目直視 口中冷氣卧如痴	身形强直手足軟 掌冷頭低盡莫醫	小兒衛生總微論方卷二



欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷三

四

詳校官太醫院恩錄臣袁大錫

編修臣倉聖脈履勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣王試



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷三

變蒸論

小兒在母腹中胎化十月而生則皮膚筋骨腑臟氣血雖已全具而未充備故有變蒸者是長神智堅骨脉也變者易也蒸者熱也每經一次之後則兒骨脉氣血稍強精神性情特異是以聖濟經言嬰孺始生有變蒸者以體具未充精神未壯尚資陰陽之氣水火之濟甄陶

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

以成非道之自然以變為常者哉故兒自生每三十二日一次者以人兩手十指每指三節共骨三十段又兩掌骨共三十二段足亦如之以應之也太倉公曰氣入內支長機骨於十變者乃是也聖濟經又曰變者上氣蒸者體熱上氣者則以五藏改易而皆上朝藏真高於肺也體熱者則以血脉敷榮陽方外固為陰使也故變蒸畢而形氣成就者也亦由萬物之生非陰陽氣蘊熱蒸無以榮變也兒自生三十二日為第一變者屬腎又



三十二日再變且蒸者屬膀胱腎與膀胱為表裏共六
十四日也其變則耳與骭骨皆冷者腎為水水數一故
為變蒸之始也又三十二日為第三變屬心又三十二
日為第四變且蒸屬小腸心與小腸為表裏共一百二十
八日也其變則汗出而微驚者心為火火數二故為變
蒸之次二也又三十二日為第五變屬肝又三十二日
為第六變且蒸屬膽肝與膽為表裏共一百九十二日
也其變則目不開而赤者肝為木木數三故變蒸之次

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

三也又三十二日為第七變屬肺又三十二日為第八
變且蒸屬大腸肺與大腸為表裏共二百五十八日也
其變則皮膚熱或汗或不汗者肺屬金金數四故為變
蒸之次四也又三十二日為第九變屬脾又三十二日
為第十變屬胃脾與胃為表裏共三百二十日也其變
則不食腹痛而吐乳者脾為土土數五故為變蒸之次
五也後又六十四日復一大蒸四次積二百五十六日
大蒸畢凡五百七十六日大小變蒸數足其血脉充榮



則手受血而能握足受血而能步此亦手足之應也其
變蒸之候體熱微驚耳冷翕冷上唇頭有白泡起若魚
目珠子脉亂或汗或不汗不欲食食則輒吐目白者重
目赤黑者微閉而不開至變蒸了自然明矣其輕者五
日而衰重者十日而衰或先期五日或後之五日或十
日之中熱乃除耳若熱甚違日不歇不得驚動勿令傍
邊人多而語雜不可妄行灸刺但少與紫丸微利之則
熱便止矣或用孫真人肘後黑散子粉香散調治亦可

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

唯不可餘治若傷寒時行溫病及驚熱溫壯等候雖與
變蒸頗皆相似耳熱翕熱唇上無白泡珠乃為他病各
從其證為治若於變蒸內有寒加之寒熱交爭臍腹天
矯啼不止者熨之則愈

變蒸賦

看病嬰兒先明四時既有變蒸之狀還如溫壯之推寒
熱初來慎一匕而方退周期末滿當四八以重期原夫
魂魄將成筋骸始榮開舒腠理通徹竒經運用而陰陽



以正往來而血氣初平頓覺精神嬰嬰全然有異未知
蒸變一一子細須明肝者幹也東方所屬為木象之三
數發形証於兩目渾身壯熱令瞳子以無輝遍體昏沉
為神魂而未足四數於金二由在火咳嗽頻頻汗珠顆
顆兩日間嚏噴仍加數夜裏虛驚又可暗增骨髓學反
復以番身漸長性情畏傍人而戀我脾土五呼腎水一
稱穀氣暗引精志時增乳哺甘甜尻骨成而獨坐戲經
絡流利掌骨具而匍匐能次後筋脉之稍更膝踝之漸
變氣象而榮於四肢光彩而滋於滿面亭亭立猶未穩
嘍嘍語尚聲顫手足受血移步行而堪憐耳目通神意
智生而可羨斯由呼吸以定肌體乃厚兩氣而外陽內
陰一息而入鼻出口期來應節自然腑臟充盈將養乖
宜致得風邪甚有於是髮豎無潤乳嘔吐口珠起丹唇
冷浸聃耳或腸鳴而微利或驚啼而勿喜經云蒸即蒸
血肉之堅變即變形神之正矣

治方

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方



紫丸治小兒身熱變蒸不解及溫壯傷寒乳哺失節宿	滯痰癖腹滿吐衄便利不調等疾亦治食癰先寒後熱	代赭石 火煨醋 焙十次 赤石脂 各一 兩 巴豆 三十箇去 皮心油 杏仁	五十粒 去皮尖	右上式味為細末下二味搗成膏相和更杵二千下	相得若硬入少蜜同杵作劑密器中收之三十日兒	服麻子許分圓乳汁送下候食頃之後方與少乳勿	得多與至日中當小利即熱除若未除明旦更一服	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	百日兒小豆許以此準量加減夏月多熱喜令發疹	每二三十日輒一服甚佳	黑散子治嬰小身熱變蒸不解及挾時行溫病	麻黃 去根節 二分 大黃 一分 杏仁 一分去皮二 分和皮用	右都燒存性為細末每服壹字或半錢量大小加減	以水半銀盞煎少許須抱兒於煖溫避風處連進二	三服取微汗候身涼以粉香散撲之一方只炒黑用	粉香散



蚌粉

不以多少研極細水飛過射香少許研

右勻末用綿裹撲粉兒身如已涼胃氣未和不快美

乳服觀音散

方在後

熨法治小兒變蒸內有寒加之發寒熱交爭臍腹夭矯

而痛啼不止

竈中灰 食塩

右二味量其相等和勻炒令熱以重帛裹適溫熱熨

兒仍不可太熱恐驚烙兒也

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

已上凡兒於變蒸之內若遇身熱脉亂汗出不欲乳

食乳食後輒吐者必審其日數度是變蒸之時者雖有

是證無所苦也 陳知軍云小兒變蒸但以四君子湯

加茯神與服其方白朮人參茯苓茯神各半兩甘草炙

三錢同末薄荷湯調下一錢慎不可餘治及服驚藥恐

冷傷胃氣也

脉理論

凡兒稟受臟腑氣血榮衛形體雖有生皆全然於未語



之前變蒸之際則血氣未充膚革未固筋骨未堅脉狀	未成若有病也難為診切又難訪問是以先賢言嬰小	之病難治者以無承據也故立其觀視形色之法焉兒	自生積五百七十六日大小變蒸數畢則氣血榮精神	異筋骨壯脉理全然後方可診切又能言問也或以謂	小兒之脉與壯老不同者是不達診治之大體也凡脉	之長短遲速在因形以別之不必拘於至數經言小兒	脉多雀鬬要以三部為主其脉小數小細者平也諸家	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	所言甚衆今擇其當者具之孫真人云小兒之脉固難	分表裡今撮其要者不出數條	總目歌曰	小兒有病須憑脉 一指三關定其息	浮洪風熱數為驚 虛冷沉遲寔有積	浮脉為風秋得之曰平餘時得之主傷風寒頭疼壯熱	或夜熱晝涼咳嗽嚏噴鼻塞清涕嘔逆不食	歌曰



浮為風兮秋日平 餘中風寒頭目疼	壯氣夜極鼻清涕 嚏噴咳嗽吐食頻	洪脉為熱夏得之曰平餘時得之主風熱壅盛身體溫	壯瘡瘍血泄	歌曰	洪為應候夏時和 餘須發熱壯溫多	風壅作驚或瘡腫 有時泄下血滂沱	數脉為驚春得之曰平餘時得之主驚風抽掣脉數小	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	者多睡惕跳直視怕怖盜汗非時咬牙吐舌微吐喘息	脉數大者一兩日間發搐搦也	歌曰	數為驚候春日長 餘時小數睡驚揚	喘息直視舌頻吐 大數潮搐發沈殃	沉遲為虛冷冬得之曰平餘時得之主脾胃虛弱泄瀉	滑腸脫肛吐痢不止日漸尪羸以成脾困或作疳勞	歌曰



沉遲之脉冬日安 餘時脾胃弱虛言	泄瀉滑腸肛脫出 吐利疝羸瘦變疳	寔脉為積滯四時得之皆主食傷積聚面黃腹脹髮焦	煩渴吐衄腹痛	歌曰	寔脉含傷積滯言 壯熱腹脹髮毛乾	吐痢肚疼或為癖 四時無異一般看	寶鑑四時脉謂春弦夏洪秋浮冬沉四季緩各推其王	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	相表裡以察其病假令春得弦而浮者病在表在腑	為陽為順病則易治若得弦而沉者病在裏在臟為陰	為逆病則難治餘時放之	王氏脉歌曰	小兒乳後輒吐逆 更兼脉亂無憂慮	弦急之時被寒纏 脉緩即是不消乳	緊急細駛亦少苦 虛濡邪氣驚風助	痢下宣腸急痛時 浮大之脉歸泉路



脉經曰小兒之脉駛疾一息七八至曰平不及曰損太過曰至	通真子歌曰	小兒三歲至五歲 呼吸須將八至看	九至不安十至困 短長大小有邪干	又曰	小兒脉緊是風癰 沉脉須知乳化難	腹痛緊弦牢寔稔 沉縮有熱在骨間	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	死証脉 脉來三動而止不見者死 脉來速如弦硬	直者死 脉來瞥然不見者死	歌曰	三動而止不來凶 速硬如弦勁在弓	瞥然至而反不見 皆為死脉定由宗	諸般病脉脉弦者為風寒 弦數者為瘧 脉急者為	氣不和或為客忤 脉緊者為痛 緊數者驚癰 脉	浮者為風 浮緊者驚風 浮大者傷寒 浮虛者盜



汗 浮數者風熱 脉伏者為氣滯 脉緩脉細者皆	為冷為乳不化 脉虛脉濡者為虛弱為驚 虛濡者	慢驚風 虛緊者伏熱 脉沉重者為有積 沉數者	骨間冷	一云骨	沉遲者虛冷 沉緩者傷食 脉牢	緊者癰聚 牢寔者腸秘 心脉滿大肝脉小急者驚	癰 心脉數小者疳淋 數急者熱 寸口脉直上直	下者為驚 寸口脉大小脉不勻亂者變蒸 左手寸	口無脉心痛中熱嘔逆口瘡或咳嗽喉中哽聲頭汗出	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	而熱此乳母食冷以乳兒所作也又脉亂者吐逆 右	手寸口無脉胸滿短氣吐逆噫噦喉中響此乳母抱兒	衝風冒風寒所作也 凡脉如雀啄而緊者風癰 凡	脉大小不依部次者惡候 凡小兒脉駛呼吸八至曰	平九至曰病十至曰困 凡小兒脉虛者病亦虛輕手	得也脉寔者病亦寔重手得也故急驚脉促急慢驚脉	虛微	諸身熱論
				間熱															



凡小兒有病皆須身熱其證不一今條而具之小兒於
某時間發熱過時即退至來日依時發熱晝夜同此為潮
熱欲發驚也

小兒身熱但一向壯熱不已者此為壯熱甚則發驚也

小兒身熱但溫而不甚壯熱此為溫熱

小兒身熱口中氣熱叫哭無時呵欠頓悶面目青色此
為風熱甚亦發驚

小兒身熱飲水悸惕手足搖動上視弄舌印內青筋見

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

掌中赤怕物生涎此為驚熱

小兒身熱面赤時以不退睡覺顛叫氣急發渴胸高涎

壅此為積熱與壯熱相似但胸高涎壅為異乃臟腑積

蘊熱毒三焦鬲腕壅滯也又搖頭項鞭者亦三焦鬲腕

壅也已上皆甚則發搐治在驚癇門中

小兒身體發熱氣促鼻塞清涕嚏噴寒毛立眼淚出或

出痰水此為傷寒治在傷寒門中

小兒身熱時發時退退但肚熱或夜發熱面黃腹脹吐



瀉乳食不化糞酸臭異常此為食傷 治在傷食門中	小兒夜發熱曉即如故多涎喜睡此肺虛發熱也此與	食傷夜發熱相似須要識之況二證餘候各皆不同食傷	者可下肺虛者不可下下之則失津液發渴引飲昔錢乙	治朱監簿子五歲夜發熱曉即如故衆醫作熱以涼藥解	之不愈其候多涎喜睡又以藥下其涎病益甚至五六日	大分飲請乙治之乙曰不可下乃取白朮散煎湯三升使任	意取足服朱曰飲多不作瀉否乙曰無生水不能作瀉	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	縱利亦不足怪但不可下耳朱又曰先治何病乙曰止	瀉治痰退熱清神皆此藥也服盡又作兩次與服其子	不渴無痰又投阿膠散二服而安是此証也錢乙方本	集載之小兒每早食後發熱至夜則涼此為血熱 治方在後	小兒身熱形瘦多渴飲食不為肌肉此為疳熱 治在疳門中	小兒血氣旺盛發渴引飲大便黃緊小便赤少四肢身	體翕然而熱此為胃寔熱也	小兒身熱微驚耳冷飮冷上唇頭有白泡起如魚目珠



子或汗或不汗此為變蒸

治在變
蒸門中

小兒身熱昏睡驚悸喜噎噴耳尻冷此為瘡疹候

治在
瘡疹

門此與食傷變蒸相似傷寒耳尻皆熱變蒸唇上有白

疣泡珠子為異

小兒身熱者更有內外在內者多飲水得之在外者多
因風寒得之錢氏有云小兒身熱飲水者熱在內身熱
不飲水者熱在外此大槩之驗也在內者宜下之在外
者宜散之若小兒積蘊內外傷感表裏渾身俱熱頰赤

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

口乾小便赤大便焦黃少者先以四順清涼飲子利動
藏府熱即退矣既而復熱者是裏熱已解而表熱未去
復以惺惺散或紅錦散加麻黃微發其汗表熱乃去既
去又復發熱者世醫盡不能曉再下再表皆為不可誤
傷多矣此表裏俱虛氣不歸元陽浮於外所以再發熱
也但以六神散和其胃氣則收陽歸內身便涼矣
閻孝忠論小兒壯熱傷風溫疫傷寒風熱瘡疹傷食率
皆相似未能辨認之間但與升麻葛根湯惺惺散小柴



胡湯服之甚驗蓋此數藥通治之不致誤也惟傷食者則大便酸臭乳不化畏食或吐宜與微下之

孫真人論小兒內外氣盛眠時小驚或微覺傷風傷食

又慮變蒸身熱者但以紫圓方已在前或龍膽湯為治

此二藥無所不療雖微利動以減盛氣亦不虛人小兒

糞黃而臭者此腹中有伏熱也宜服龍膽湯若糞白而

酸臭者此挾寒不消也宜服紫圓但少與令內消甚者

小增令微稀澹皆須節乳哺一兩日令胃氣平和若不

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

節則病易復復則復下傷其胃氣令腹脹滿若至再三

下之則過傷矣

諸治方

治小兒潮熱溫壯勝金散

雄黃一錢 白附子半錢 甘草半兩 芍藥半兩 南

星半兩 荊芥穗一分

右為末每服半錢水一小盞入薄荷三葉煎至五分

盞去滓溫服無時



治小兒潮熱發躁金花散	川大黃 一兩 秦艽 去蘆半兩	右為末每服一字或半錢水一小盞入青蒿三兩葉	葱白二寸同煎至五分盞去滓溫服若變骨蒸勞氣	用童子小便浸青蒿葱白煎藥	治小兒潮熱減食蒸瘦秦艽散	秦艽 去蘆切焙 甘草 炙各兩 乾猫兒薄荷葉 半兩切焙	右為末每服一二錢水一中盞煎至五分盞去滓食後溫服	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治小兒虛熱潮作亦治溫壯及解傷寒地骨皮散	知母柴胡 去蘆 甘草 炙 半夏 湯洗七次切焙 人參 去蘆頭 地	骨皮 去骨 赤茯苓 去黑皮各等分	右為末每服二錢水一盞生姜五片煎至六分去滓	食後溫服量大小加減	治小兒溫壯身熱臉赤煩渴燥悶涼肌圓	龍膽草 去蘆二兩 玄參 去蘆一兩 當歸 去蘆洗淨一兩	右為細末煉蜜和圓菉豆大每服二十圓竹葉湯下



兒大增之無時		治小兒溫壯風熱牛黃膏		寒水石 四兩煨 雄黃 一兩飛 山梔子仁 一錢半 甘草 一分		牙消 一兩 鉛白霜 半兩		右為細末入射香少許煉蜜和旋取皂子許薄荷水		化下乳食後		治小兒溫壯風熱睡卧不穩咳嗽喘急剋效散		龍腦 一兩 薄荷葉 一兩 白殭蠶 去絲嘴半兩 玄胡索 去皮半兩		欽定四庫全書		小兒衛生總微論方		右為末每服半錢或一錢蜜湯調下無時		治小兒風熱驚熱眠睡不安鎮心丹		鐵粉 一分 蛇黃 一兩煨醋 代赭石 半兩煨醋 馬屁亭		半兩射香 別研		右為細末煉蜜入糊圓如小豆大每服一粒磨剪刀		銀水化下食後亦治驚癇發搐		治小兒風熱昏塞躁悶不食梨汁粥		右以鵝梨三枚切碎以水二升煮取汁一升去滓入	



粳米一合煮粥食之	治小兒驚熱如火亦治溫壯龍齒散	右以龍齒為末調服或以爛龍角研濃汁服一二合	又方人參牛黃散	右以人參牛黃等分為末以薄荷水調下最佳	又方治如前	右以竹瀝二合溫之分三四服無即刮竹茹以醋煎	溫服	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治小兒積熱啼叫三焦壅滯青金丹	青黛 四兩 甘草 二兩 蟬殼 去足一兩 射香 一錢 辰砂 一分	飛 研水 牛黃 別研 腦子 各三銖 龍齒末 半兩 天竹黃 半兩	右為細末以飴糖和圓雞頭大每一粒分四服溫水	化下無時	治小兒積熱痰寔三焦蘊毒及風熱面赤大小便秘澀	犀角圓	生犀末 一分 人參 去蘆半兩 黃蓮 去鬚一兩 枳寔 去穰半兩 檳榔



半 兩 大黃 二兩酒浸切片以巴豆一百个去皮貼在 大黃上紙裹飯上蒸三次切碎炒黃焦去 巴豆只 用大黃	右為細末煉蜜和圓如麻子大每服一二十圓臨卧 時熟水下未利加圓數疎導極穩	治小兒諸熱四順飲子 地骨皮 去 骨 防風 去蘆并 叉枝 山梔子 去殼 取仁 連翹 各等 分	右為細末每用一錢或二錢水一小盞入燈心竹葉 少許煎至五分盞放冷服無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治小兒諸熱甘露散 牙消 一 分 龍腦薄荷葉 一 兩 大黃 半 兩 甘草 半 兩 芎藭 半 兩	一 雄黃 一 分 水飛	右為末每服半錢蜜水調下無時	治小兒諸熱煩躁牛黃散 右鬱金大者濕紙裹慢火煨熟為末入牛黃少許冷 水調下大者一錢小者半錢無時	治小兒身熱不痊



右以熟湯研郁李仁如杏酪一日服二合

又方

右以雞卵一枚和白蜜服之

小兒於立夏之後有病身熱者慎勿妄為吐下但以除熱湯浴之除熱粉粉之赤膏摩塗之出千金

除熱湯

右以白芷根苗苦等分為鹿散用清漿水煎更入鹽少許以浴兒畢用粉粉之

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

又方

白芷苦參秦皮煎湯或無衆藥但得一味煮湯皆可

又方

右切李葉一升水七升煎至五升適溫煖用之澡浴或只用楮葉亦可

涼肌粉

右以白芷楓葉藁本苦參黃連等分為末每用三錢以蛤粉二大塊同研勻細入生絹袋子每浴了以撲



身遍令勻亦治夏月伏喝遍身生赤瘳子用之極妙	赤膏	丹砂 雷元 芒硝 戎塩 大黃 各三兩	右切碎用苦酒半升浸四物一宿以煉成猪脂一斤	煎三上三下去滓入芒硝成膏每用以摩心下及塗	臍中	治小兒血熱早食後發熱至晚則涼猪膽圓	胡黃連 宣黃連 去須各半兩 赤芍藥 一兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末以獺猪膽汁和成劑却入在膽皮中懸鈔	上用漿水煮勿令漿水入煮熟取出圓如菉豆大每	服三十圓米飲湯下食後臨卧日三有生瘰癧一證	亦早食後身熱頗相似但以鼻衄泄瀉宜審辨之	牛黃膏治小兒疳熱引飲亦治傷風溫壯	雄黃 飛研水 甘草末 川喏硝 各一分 鬱金末 一錢 腦子	一錢 寒水石 生一兩 菉豆粉 半兩	右同為細末煉蜜和成膏每用半皂子大薄荷湯化



下食後	治小兒裏熱頭昏頰赤口內熱小便赤大便少要微挨動藏府即安四順清涼飲子	又治睡卧不寧五心煩熱四肢抽掣及乳哺不節并寒溫失度熱久連綿欲發驚癇目赤口瘡瘡疹餘毒	大黃濕紙裹煨熟 當歸去鬚 赤芍藥 甘草炙各一方生用	右為末三歲上兒每服一錢水一盞煎至七分盞分二服更量大小加減食後溫服	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治小兒外熱要微發汗即愈惺惺散良方名桔梗散治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱等	桔梗去蘆 細辛去苗 人參去蘆 甘草炙 白茯苓去黑皮 瓜蒌	根 白朮各等分	右為細末每服一錢匕水一小盞入薄荷三葉同煎至六分去滓溫服凡傷寒溫壯變蒸瘡疹未辨皆可服	治小兒風濕體熱頭目不清紅錦散



白殭蠶 去絲嘴 二兩 天麻 一兩 天南星 二兩薄切作片子油燂黃蘇木	節 二兩半 別研	右為細末每服一錢水一小盞入綿少許同煎至五	分盞去滓溫服若傷風有表証發熱者於本方中入	去節麻黃半錢同煎若裏熱心躁燥煩渴者入滑石	末半錢同煎	治小兒發熱已經汗下仍熱者六神散	人參 去須 白茯苓 去黑皮 乾山藥 白朮 甘草 炙 白	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	扁豆	右為細末每服一錢水一小盞入棗一枚擘破生薑	三片同煎至五分盞通口服此藥用處甚多治胃冷	加附子治風証加天麻治諸痢加罌粟殼若服之熱	猶未退更與銀白散治之	銀白散	乾山藥 白朮 白茯苓 去黑皮 知母 人參 去蘆	白扁豆 甘草 炙 升麻 各一分



右為細末每服一錢水一小盞棗一个同煎至五分 盞溫服無時	治小兒溫壯驚風及傷寒身體發熱或作瘡疹於初身 熱未辨之間並宜服此升麻葛根湯	乾葛細剉 升麻 芍藥 甘草炙各等分 右為麤末每服二錢水一小盞煎至五分盞去滓溫 服無時	治如前小柴胡湯	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方 柴胡去苗二兩 黃芩 人參去蘆各三分 半夏六錢一字湯浸七次 甘 草三分炙	右為粗末每服二錢入生姜三片棗一枚水一小盞 同煎至五分盞去滓溫服無時	治小兒自出腹來血氣寔盛發熱不歇及食不消變蒸 不解客忤鬼氣溫壯寒熱并諸驚癇悉皆主之	龍膽湯	龍膽去蘆 鉤藤 柴胡去蘆 黃芩 桔梗去蘆 芍藥 茯



神去木 甘草炙各一分 羌二 娘个去翅 大黃一分剉碎微炒千金一兩	多疑太 右為粗末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服	無時	治嬰小壯熱未能服藥者粉方	寒水石 芒硝 滑石 石膏 赤石脂 青木	香 大黃 甘草 黃芩 防風去蘆 芎藭 麻	黃根各等分	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	右為末每用藥末三合入牡蠣粉一升細蛤粉亦可	相和再羅細用以粉兒日二次	桔梗治小兒風熱溫壯或傷寒時氣瘡疹未發並宜服	之仍兼小黑膏服尤善	桔梗去蘆 細辛去苗 人參去蘆 栝蒌根 白朮 甘草	川芎 白茯苓去黑皮 各等分	右為末每服二錢水一盞入生姜三片薄荷三葉同煎至七分盞三歲已下兒作四服無時



小兒黑膏

川烏 南星 各一枚
大者

右入一小瓶子內用濕紙密搭封口慢火燒之候火
滅取出削取中心所存白處如皂子大用之須燒數
枚擇中度者方用為末次入薄荷葉玄參末各五錢
匕研勻煉蜜和成劑每用旋□豆許圓之葱白湯下
頻頻服若筋脉或緩或急加乳香同葱白湯下之

治小兒發熱極甚因伏留心經昏冒不省或誤服熱藥

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

畜熱所致用之神效

以生梅花腦子半字或一字取新殺猪心中血一兩
滴同研作一圓新汲水少許化下大良未省即再服
一粒

治小兒驚熱

以水磨犀角汁服之

薄荷散治小兒風熱溫壯及傷寒傷風瘡疹未辨之間
皆可服之



小兒衛生總微論方卷三									
欽定四庫全書									
小兒衛生總微論方									
面風等疾大能清利頭目止昏眩聰明耳目									
右為末每服一錢茶調溫服亦治大人風氣不順頭									
薄荷葉 藿香葉 土荊芥穗 甘松 土白芷 防									
風 去蘆并 川芎 桔梗 去蘆 白殭蠶 去絲 甘草 炙 藁									
本 去土各 細辛 去苗 一兩 半兩									



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷四

驚癇論上

欲發搐

小兒驚癇者世俗之總名須分輕重也輕者但身熱面赤睡卧不安悸惕上竄不發搐者此名驚也重者上視強手足拳發搐者此名癇也其發搐之病最為重大必有因漸亦有將發之候以明之也養小兒之家若能

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

辨之求治於未發之前不惟易愈又不至於危殆今集欲發搐候下項 目上視喜惕者欲發搐也 身熱項強常汗出者欲發搐也 手足喜振掉者欲發搐也 搖頭弄舌者欲發搐也 喜欠目直面青者欲發搐也 潮熱或壯熱不歇者欲發搐也 睡中時笑或狂語言手足搖動者欲發搐也 鼻中燥大便小便不利者欲發搐也 髮上逆啼面暗色不變者欲發搐也 身熱吐衄喘麤者欲發搐也 噫氣下而妄怒者欲發搐



也	鼻口青喜忪悸者欲發搐也	咬牙甚者欲發搐也	目直色赤或青者欲發搐也	瞳子卒大異常者欲發搐也	面色青黃上竄氣急者欲發搐也	眼斜視者欲發搐也	嚙乳不和或噎乳唇舌緊者欲發搐也	涎盛鬲壅呀呷有聲者欲發搐也	卧而不安身熱不乳數惕忪者欲發搐也	體熱口中氣亦熱面目青呵欠頓悶者欲發搐也	掌中赤印內青筋見怕物生涎欲發搐也	吐利不止厥痛時起者欲發搐也	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	唇口頰頤赤者手足心皆熱喜冷者欲發搐也	目痴昏悶撮口吐舌者欲發搐也	身熱小便難或目直視或視不精皆欲發搐也	孫真人曰小兒眠睡不穩或身熱之時見有諸小驚之証輒紫圓微下之減其盛氣令終不病癇發搐也月用一次甚佳	方已在前 變蒸門中	已發搐	發搐之候世俗所說者多矣有言一証屬一藏一証屬



一府喬岳歌曰小兒驚候有多般不顯根源見病難睡
裏咬牙驚入腎非時弔眼病歸肝夜啼到曉元因肺唇
白面青一般看前後心煩四肢熱面紅如火向心間乾
嘔吃水脾驚患脉微氣喘一同言漢東王氏言非時弔
眼驚入肝睡後咬牙驚入腎夜啼到曉驚入小腸面青
乍白驚入膽氣喘喫水驚入肺面紅臉赤驚入心五心
煩熱驚入脾喉中鋸響驚入大腸乾嘔無時驚入胃睡
中啼哭驚入三焦如此之類言至百種叢脞無據何以

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

為治又有言驚發三次為癇者第一次發兩太陽左右
青脉朝眼第二次發山根青脉見第三次發眼下臉連
金匱青脉見又言發搐面赤指內青紋見者為癇又云
耳後完骨上青脉如線者為癇此等之論亦為臆說大
抵不發搐者為驚發搐者為癇也千金論癇証大體只
分三種一曰風癇因解脫衣袂觸冒風邪而作其証先
屈指如數乃發口中氣熱呵欠頓悶手足搖動治當發
散二曰驚癇猛聞大聲或撲仆驚怖而作其証先叫



啼乃發心神不寧不可下之下之內虛則病益盛治當
安神去熱三日食癰因乳哺失節或有積癖而作其証
先不乳而吐先寒後熱乃發其証身體或溫或熱多睡
喜唾吐逆腹脹故小兒有癖積脉大者必發癰治當下
之此三種內風驚二癰時時有之食癰者十中無一下
之便愈詳此三種雖諸病皆能變癰莫不緣於風驚食
之所作也又內經有云五藏主五畜其間發重者各見
其象肝為犬癰目直視身反折手拳犬鳴心為馬癰張
欽定四庫全書
小兒衛生總微論方
口搖頭背強硬馬叫一云心為羊癰脾為牛癰目痴腹
滿牛叫肺為雞癰搖頭反折手縱搖雞叫腎為猪癰
目橫身直如尸吐沫猪叫已上論癰發者乃諸書精要
也然不若錢乙所論發搐者乃心肝二藏為病也其理
有據而妙肝主風心主火風火相加發而為搐前論小
兒諸病新以皆能變癰發搐者以人有病則飲食退減
脾胃不旺肝必凌之引動肝風肝又主掣若不得心火
則不能發搐又人有病則氣血錯亂心神不寧引動心



火心又主驚若不得肝風亦不得發搐也須肝心二藏相
為子母俱有寔熱風火相搏驚掣相持乃能發搐其狀
亦如風之蕩火焰熾掣然也故肝心二藏為病之源餘
藏雖不正主亦有相乘兼見之証及所發亦有其時假
如錢論潮熱變發搐在早晨寅卯辰時者此肝用事之
時也身體壯熱目上視手足搖動口生熱涎項頸強急
此肝旺也錢治補腎瀉肝是謂補其母而瀉其子也發
搐在日中己午未時者此心用事之時也心惕目上白

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

睛赤色牙關緊急口內涎生手足搖動此心旺也錢治
瀉心心熱退則肝母亦不能旺是謂子能令母虛也發
搐在日晚申酉戌時者此肺用事之時也目微斜視不
甚搐而喘身熱睡露睛手足冷大便黃水錢治瀉其肝
心而補其脾發搐者心肝寔為病之源故瀉之手足冷
大便黃水者脾虛候也故補之發搐在夜間亥子丑時
者此腎用事之時也不甚搐眠卧不穩身體溫壯目睛
緊斜喉中有涎大便銀褐色乳食不消多昏不納津液



錢治但瀉其心而補其脾且心肝二藏為病之源今獨瀉其心而不瀉其肝者此本因潮熱所作發在腎用之時是腎虛心熱極甚也故但瀉其心熱退則肝亦平矣若更瀉肝則腎轉虛矣其大便銀褐色乳食不消不納津液皆脾衰之証故補其脾也已上四藏分主十二時脾藏為兼見之証此潮熱發搐治則惟瀉心肝者蓋二藏俱寔為病之源故也其肺臟有虛寔之証見虛則補見寔則瀉况發搐是心火旺所作而肺金寔証亦罕惟欽定四庫全書
小兒衛生總微論方

偏搐者有之外腎藏但主虛而無寔見其虛則補之內經有云虛則補其母寔則瀉其子先補其母後瀉其子子能令母虛母能令子寔錢乙論此發搐元由為治次第乃謂得聖人之經旨深意也可謂出群拔萃矣今更以錢論三事參之一者發搐逆順二者發搐陰陽三者發搐真假及各於逐項之下以錢治法為証後學之士將此三事參推五藏審別形候察其虛寔觀以時刻依法為治則小兒發搐之病無以外也



發搐逆順

男發左搐或手大指屈外或目左視無聲者順也若發
右搐或手大指屈內或目右視有聲者逆也女發右搐
或手大指屈內或目右視無聲者順也若發左搐或手
大指屈外或目左視有聲者逆也順者相勝也左肝為
木右肺為金一負一勝故無聲也逆者戰也二藏俱寔
木金相擊故有聲也順者易治逆者難治男逆稍易女
逆極難更當參其發時以補瀉為治昔錢乙治李寺承

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

子三歲發搐自卯至巳目右視大叫哭乙見曰逆也男
為陽本發左視無聲則順右視有聲則逆所以然者左
肝木也右肺金也逆則二藏相戰金木相擊而有聲也
治乃瀉強補弱假令女發搐目左視是肺來勝肝肝不
能任故叫哭也當瀉其肺後治其心續治其肝若病在
秋日西時同肺兼旺位當大瀉其肺若病在春早晨時同此肝旺
之時尚不能勝肺是肺強而肝大弱也當補其肝腎大
瀉其肺若男發搐目右視是肝來勝肺而叫哭當瀉其



肝心若病在春夏 早晨日 肝心旺時當大瀉其肝若病	在秋 日晡 此肺旺之時尚不能勝肝是肝強而肺極虛	也當補其肺大瀉其肝所以言目反視者乃肝主目也	凡搐則是風熱相搏於內風屬肝故引見於目也今此	病男反女故稍易治於女也先瀉其肺不悶亂以知肺	病退也後補其腎續治其肝心五日而愈乙又治徐氏	子三歲每日西發搐身微熱目微斜露睛四肢冷而喘	大便微黃請乙與李一醫同治乙問李曰病搐何如以	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	何藥治之李對不當乙曰搐者心肝寔也身微熱者日	西肺用事之時肺主身溫今且熱者肺虛也目微斜露	睛者肝肺相乘勝也四肢冷者脾虛也肺若虛甚則脾	母亦弱木氣乘之四肢即冷治當先補脾肺得脾虛証	退然後治其心肝九日乃愈此亦逆搐肝肺相勝目斜	者必當右視也今舉此以明逆順為治之法爾	發搐陰陽 天吊附陽搐 脾風附陰搐	小兒發搐為急慢驚者古書無有惟曰陰癇陽癇所謂



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

雖不因聞聲驚觸亦自發搐小兒本寔者多此候也

天弔

附 小兒心膈壅滯涎盛熱積不得宣通或因母飲酒

食肉無度致煩毒之氣流入於乳因以乳兒令兒宿滯
不消熱毒乘心發為驚搐眼目翻騰壯熱不休甚者爪
甲皆青狀若神祟俗謂之天弔此非天能弔人以其眼
弔上視故取意名之况小兒發搐未有不眼上者寔亦
陽搐之候也治宜去涎熱昔錢乙治麻親宅七太尉子
八使發陽搐自寅至午於未發前錢乙見其目直視而



顯赤此心肝俱熱更坐石杌子就冷此熱甚也又肌體
素肥而本寔其脉急促發搐自寅至午皆心肝用事之
時治乃瀉其心肝而補其腎病遂得愈此亦瀉強補弱
也陰搐者身溫面眇白手足似搐不搐但時時瘳瘳昏
昏似睡而無精神眼露睛微微上視或胃痛而啼作鴉
聲或不能啼哭唇口白色脉沉弱此因大病之後或吐
瀉過甚致脾胃虛損而生風荏苒乃成此陰盛陽虛治
當補其脾胃瀉去肝風小兒虛弱雖不因吐瀉取轉直
欽定四庫全書
小兒衛生總微論方
發陰搐者亦有之本怯者多此候也慢脾風附小兒因傷風
冷或病吐瀉醫以溫藥補之不已復用涼藥治之又不
已本謂傷於風冷醫亂治之致脾虛而內不能散外不
能解至十餘日其証昏睡露睛大便不聚而瀉此脾虛
風入風在脾胃之間故大便不聚而瀉時瘳瘳身體四
肢口鼻中氣皆冷小兒亦有因驚所傳或諸病久變見
此証者皆因脾胃虛怯而生風所為也故俗謂慢脾風
矣寔乃陰搐之危候治當去脾間風風退利止以補脾



胃昔錢乙治王氏子病吐瀉他醫以藥下之至虛變陰
搐其候睡露睛手足痠癢而身冷乙見曰此慢驚也與
藥以寔脾胃即開目身溫王疑其子不大小便又令他
醫以藥利之而復身冷尚欲令乙利小便乙曰不當利
利之必身冷王曰己身冷矣乙曰不能食而胃中虛若
利大小便使脾腎俱虛當閉目身冷即死今此兒幸胎
氣寔而難衰乙復補脾胃則微能飲食所以然者謂利
大小便脾胃虛寒當補脾而不可別攻也後不語他醫

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

作失音治乙曰既失音何開目而能飲食又牙不噤而
口不緊他醫不能曉乙曰此因用清藥利小便致脾腎
俱虛今脾已寔腎尚虛故也遂以藥補腎及依法為治
半月能言一月而痊

發搐真假

真者兒在母胎中時血氣未全精神未脩則動靜喘息
莫不隨母母調適乖宜喜怒失常或聞大聲或有擊觸
母驚動於外兒胎感於內至生下百日以來因有所犯



引動其疾則身熱吐衄心神不寧睡卧昏騰躁啼無時
面青腰直手足搐搦口撮顙縮目瞪氣冷或眼閉膠生
或瀉青黃水是胎癰也是內藏感病發為真搐然亦發
稀而難治不過三兩次必死矣假者兒生出母腹百日
以來肌膚嫩怯血氣軟弱被外風傷之入客於內每遇
則兒不能任故發搐搦口中氣熱呵欠嚏噴此風癰之
候重者亦不呵欠嚏噴與胎癰相似然發頻者輕輕則
易歇故也治當發散昔錢乙治李司戶孫生百日來發
搐日三五次請衆醫治或作熱天弔或作胎驚或作驚
癰治皆無應後請乙治乙曰嬰兒初生肌膚嫩怯被風
傷之兒不能任故發搐也然頻發者輕以客風在內每
遇不任即搐輕則易歇故發頻也搐稀者是內藏發病
不可救也乙用微劑以散風邪兼塗顙浴法治之乃愈
仍不可多服蓋兒至小易為虛寔多即生熱止一服而
已兼用封無不效已上錢乙所用方並本集載之

驚癰雜論

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方



凡小兒急驚雖搐甚不用忙擾亦不足畏慢驚雖微搐切當救乃危候也方搐之時但與扶持慎勿擒捉蓋風氣方盛恐流入筋脉致手足曲戾不隨或成拘攣凡小兒急驚閻孝忠云當其搐勢減時與鎮心治熱藥一二服如射香圓抱龍圓辰砂圓紫雪之類候驚勢已定用藥下其痰熱如射香圓軟金丹桃枝圓之類如此則心神安寧即愈

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

生胃氣以理中并研金液丹末煎生姜米粥調灌之多服乃效候胃氣生手足漸煖四支猶然癱瘓即減金液丹一二分增青州白圓子一二分同研如上服漸漸以意減金液丹加白圓子兼用異攻散羌活膏鈎藤飲之類調理頻頻與粥雖至危者往往死中得生凡小兒急慢驚陰陽異証切宜辨而治之急驚合用涼藥慢驚合用溫藥世人多用一藥不能分別誤小兒多矣殊不知藥性自有溫涼豈可泛用初虞世謂治陰陽



癰寒溫藥性當於方中用時增損則無失矣又閻孝忠
言慢驚藥中宜去龍腦縱須合用必以溫藥為佐或少
少用之惟涼故也

凡小兒於天陰雷發聲之時必掩塞其耳或作雜聲以
亂之恐猛聞大聲而發搐

凡小兒發搐時醒而身軟者為癰若發搐不時醒身硬

者為瘧又名曰瘧乃中風之候論在中風門

凡小兒驚癰洩瀉等諸病煩渴者皆津液內耗也不問

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

陰陽煎錢氏白朮散使任意取足飲彌多彌好

凡小兒驚癰藥中能不用水銀輕粉者尤佳如不得已

而用之僅去其疾即止蓋小兒腸胃易損亦傷口齒今

所集之方多不用銀粉如須用之者當依此酌量減損

凡小兒欲生瘡疹有發搐者當從瘡疹為治餘諸病有

與驚癰相兼可以一方為治者依法用之若不可以一

方為治者則各用所主藥相兼治之

凡小兒驚蟄娘為治第一世醫多不學未見有用者若



用之須擇不傷水者傷水即不堪用去其頭翅足炙令焦乃入藥

凡小兒吐瀉後精神困頓多睡不吃乳食四肢逆冷欲變成癇者以神麴為末入腦射各少許溫水調服若已成癇哭如鴉聲面色青黃手足癱瘓咽中不利更入珠砂同末服之若變癇滑利者以麴末蜜圓如雞頭大溫水化下

又一方麴末一兩琥珀甘草各二錢硃砂雄黃各一分

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

同末蜜圓如雞頭大名太一丹治小兒百病

小兒衛生總微論方卷四



欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷五

詳校官太醫院恩種_臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士_臣繆琪

校對官中書_臣李斯咏

謄錄監生_臣王試



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷五

驚癇方下

定心膏治諸熱安心神截驚癇欲發

生葛根

取汁□合如無生者乾葛細
剉水浸一宿慢火熬取汁

竹瀝

半合依
法旋取

大麻仁

一分三
味同研

菴豆粉

一兩
別研

硃砂

半兩
研飛

牛黃

一錢
研

射香

一錢
研

右同和如稀更入少菴豆粉相拌得所石白中杵三

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

二百下成膏圓雞頭子大每服一丸煎人參湯化下

量大小增減用無時

琥珀丹治如前

琥珀

一兩
令研

白殭蠶

去絲嘴
炒半兩

臘月牛膽製天南星

一兩

天麻

一兩

白附子

半兩

香白芷

半兩已上
先為細末

硃砂

一兩
水飛研

龍腦

一錢
研

右拌勻煉蜜圓如雞頭子大每服一圓煎人參薄荷

湯化下量大小增減用無時



生葛飲子治熱極不已欲發驚癇	生葛汁 一合 竹瀝 一合 牛黃 如杏仁許別研	右相和每服半合量大小與之無時	鈎藤飲子治發熱時時戴眼口吐涎沫欲發癇搐	鈎藤 半兩 蚱蟬 七枚去翅 人參 去蘆一分 黃芩 一分 大黃 一分	右麤末每服一大錢水一盞煎至六分入竹瀝半合	再慢煎數沸下牛黃一小豆許細研入之攪勻放溫	量大小與服得微汗為妙乳母忌蒜麵炙燂之物	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治小兒心胸積熱毛焦睡中狂語欲發驚	硃砂 半兩研 牛黃 六分	右同研如粉每服一錢摩犀角水調服量大小與	之無時	治小兒熱盛夜後狂語欲發驚以竹瀝一歲兒連夜飲	二合少少頻與兒大以意加之無時	參苓散治小兒忽作驚狀目上視手足強未可服驚藥	宜先與此服之



人參去蘆 茯苓去黑皮 甘草一分	右為末每服一錢溫湯調下食空服	茯神散治小兒煩熱心悸手足搖動欲發驚癇	茯神去心 龍齒研 牛黃別研 犀角屑各半 寒水石一兩	石膏研飛 一兩 川大黃一錢	右為麤末每服一錢水一盞煎至五分去滓入竹瀝	半合更煎一兩沸量大小與服無時	又治方如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	茯神去心 龍齒研 升麻 甘草各半 寒水石 石	膏飛 麥門冬去心	右為末每服一錢水一盞煎至五分去滓入竹瀝半	合更煎一二沸量大小與服無時	辰砂金箔散治小兒心忪邪熱神志不寧悸惕煩渴睡	卧不穩美舌齧齒痰寔欬逆咽嗑不利欲發驚癇	辰砂七錢 桔梗去蘆 人參三錢 白茯苓去皮 蛤粉	錢八 牙硝枯研 甘草二錢 腦子半 金箔二片



右為細末百日已下兒用半字至一字薄荷水調膏	塗舌上令自嚙百日上兒或大便澀者蜜湯調一字	與服一歲上者半錢咽喉腫痛口舌生瘡者以少許	搽病處嚙津必效	牛黃散清心涼鬲截驚癇欲發已發	牛黃 半兩 硃砂 一分 射香 一分 蝎 一分 天竺	黃 一分 鈎藤 一分	右同拌研勻每用一字新汲水調下無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	雌黃圓治眼直惡聲嚼舌吐沫欲發驚癇	雌黃 一兩 黃丹 一兩 射香 一錢	右同研細用牛乳半升熬成膏和劑圓菴豆大每服	三圓溫水下日三如無牛乳用羊乳亦得	急風膏利胸鬲清心神截欲發已發驚癇	硃砂 半兩 天漿子 十四個 膩粉 一錢 青	黛 一分 乾全蝎 十四枚	右拌研勻細入龍腦細末半錢再同研勻用軟飯劑



成膏圓皂子大每服一粒煎人參荊芥湯化下無時	消驚膏治小兒風熱涎盛截除驚癇安鎮心神定寧搐	搦利鬲腕去壅滯	龍腦 半錢 硃砂 研水 天南星 白附子 生末 天麻 末 蝎	稍 末 半夏 湯洗淨生為末各二錢 水銀 結砂 膩粉 各一錢	右同勻細用石腦油盞內重湯煮過搜和藥末為劑	圓如黑豆大每服一二圓薄荷湯化下更量大小加	減服無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	神效朱砂圓治小兒溫狀驚風積熱一切壅滯能化痰	清神利鬲消驚截搐	朱砂 研細水飛 膩粉 各一分 連六金箔 七片 乾蝎 十個 天麻	一 分 白附子 炮一分 半夏 湯洗七次去滑焙乾一分 白殭蠶 炒去絲一分	右同為細末研勻煮棗肉和如小豆大每服二圓煎	荊芥薄荷湯化下無時	剪刀股圓治小兒驚風欲發未見的証但先服一圓無	不消退用之常驗



五靈脂去砂石一分 乾蝎紫小全者 龍腦別研半錢 乾蟾淨洗去五	足慢火炙令黃色一分 牛黃別研細一錢 蛇黃火煨醋淬七次 白	殭蠶直者去絲嘴畢微炒用 天竺黃別研半兩 朱砂研一錢水飛 射香	別研半錢	右順手研令極細糊圓櫻桃大每服一圓金銀薄荷	湯以剪刀股研化服之三歲下者只半圓無時	治風癰方	蟬娘散治小兒風癰發搐	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	乾蟬娘三分 天麻兩半 防葵兩半 蝎稍一分 葳靈仙半兩	已上先為末 川芒硝 天竺黃各一分二味同研細	右同拌勻為散每服一字或半錢乳香湯調下量大	小加減與服無時	麻黃蝎稍散治如前	麻黃去根節半兩 蝎稍十四箇	右將二味碎之用薄荷葉裹遍外更用紙裹了於水	蘸濕慢火中煨紙及葉乾透取出為末每服半錢金



銀薄荷湯調下無時	芎藭散治風癰多困不省	川芎 犀角屑 獨活 去蘆各半兩 蝎稍 人參 去蘆 天	麻 各半兩	右為細末每服半錢溫酒調下無時	葱湯圓治風癰發搐痰盛壅熱	天南星 炮裂為末 蝎稍 一分 半夏 一分湯洗七次 寒水石	煨熟為末 朱砂 半錢 殭蠶 炒去絲 末 一分 水飛 殭蠶 嘴一分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末麵糊圓菴豆大燒葱白泡湯送下三五	圓量大小加減無時	人參化風膏治風癰發搐涕效無時	天麻 一兩 全蝎 十四個 殭蠶 去絲嘴 人參 去蘆 川芎	白附子 各半兩 羌活 去蘆 獨活 去蘆 防風 去蘆并義 枝 各一分	右為細末煉蜜圓如皂子大每服一圓荊芥湯化下	量大小與之無時	治小兒風癰



以鼈甲去裙襴炙黃杵末每服一錢乳汁調服之或以蜜和圓如小豆大服之亦可無時

雞蘇散治小兒風癇

雞蘇 木賊 荊芥

右各等分為細末以茶清調下半錢或一字無時

皂莢煎圓治如前

肥嫩不艸皂角

十挺去皮稜以水二大碗按汁至滓無味將汁熬成膏別頓 號

丹

不拘多少於熨斗內簇熟炭火煨至炭過吹去其灰

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

右研號丹為細末量其所用入皂莢膏和劑圓菴豆

大每服五七圓溫湯送下乳食前

榴梅散治如前

以大石榴一枚割頂去子剝作甕入全蝎五个在內却以頂蓋之紙舂槌黃泥封裹了先用微火炙乾漸加大火煨通赤良久去火放冷去泥取其中焦者細研為散每服半錢乳調下搗者服之便定不會服者灌之兒稍大用防風湯調下無時



大青膏治風癰發搐	青黛 一分 射香 一字 天麻 末一分 白附子 末生一分 蝎	尾 去毒一錢 朱砂 半錢 水飛 研 烏蛇肉 酒浸一宿去骨焙取末一錢半 天竺	黃 五分	右為細末和勻生蜜劑膏每用月中兒粳米大百日	兒半皂子大一歲兒一皂子同牛黃膏溫薄荷水化	開一處服之五歲上者同甘露散一處服之	牛黃膏	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	確黃 小麥大一塊用獨蘆薤蘆薈根同醋一大盞煮至醋盡為度 甘草 三錢末 川甜	硝 三錢 硃砂末 半錢別 龍腦 一字 寒水石 五錢末並抄	右為細末研勻蜜和劑溫薄荷水化如前法服之無	時	甘露散 一名玉露散	寒水石 半兩嫩而帶青 石膏 半兩堅白者 甘草 生	分	右同為細末每服一字半錢溫湯調下食後



治驚癇方		蟬殼散治驚癇熱盛發搐		右同勻細每用半錢煎荊芥薄荷湯調服無時		鎮心膏治驚癇發搐熱盛悶亂		遠志 甘草水炙 去心一兩 防已 兩半 茯神 去心內 木半兩 人參 去蘆 半兩 大		黃 半兩微炮 已上細末 辰砂 研飛 一兩 雄黃 一分研 水飛 金箔 三十片 細研		欽定四庫全書 小兒衛生總微論方		銀箔 三十片 細研 龍腦 一錢 細研		右拌勻煉蜜和膏每服一皂子薄荷湯化下無時		金銀丹治驚癇發搐安神定志解煩熱化痰涎		羌活 去蘆 人參 去蘆 茯苓 去 川芎 山藥 南星 蛇		黃 火燉醋淬 別研各一兩 蜈蚣 三分 腦子 錢一 乳香 分一 全蝎 分一		雄黃 水飛 一分 蟬殼 去土半 兩微炒 土殭蠶 炒去 絲嘴 鐵粉 各半 兩 射香 錢一 朱		砂 半兩 為衣		右為細末麵糊和圓作二三等圓子隨大小量圓數	



服無時		安神湯治驚癇搐搦精神傷動心意不寧		白茯苓 兩一 白鮮皮 兩一 昌蒲 節者一兩九 人參 去蘆一兩 遠志		甘草水 煮 石膏 半兩 甘草 一分 犀角末 一分		右為細末每服一錢水一盞去心麥門冬少許煎至五分去滓放溫時時與服		鎮驚圓治驚癇發搐中焦壅熱痰盛		茯神 去皮及心內木 人參 去 防葵鐵粉 研 朱砂 研水飛各半兩		欽定四庫全書 小兒衛生總微論方		雄黃 研水飛 犀角屑龍齒 研別 大黃 蒸各一分 牛黃 研 龍		腦 研各一錢 金銀箔 各三片		右為細末煉蜜和圓小雞頭大每服半圓或一圓薄荷湯化服量大小加減無時		治食癇方 千金用紫圓方具前變蒸門中		真珠圓治食癇發搐		滑石末 錢三 輕粉 錢三 乾蝎 七個 巴豆 四十個去皮膜出油盡用 半夏		麴末 錢二 南星 錢末一 射香 許少	



右為末蒸餅和圓菴豆大一歲下者一圓上者二圓 葱湯下乳食前	蚬蟬散治食癰發搐身熱眼上眵 乾蝎 白附子 朱砂 各一錢 研水飛膩粉 半錢 巴豆 二十個 去皮膜出油一云不出油研 天漿子 三個 去壳射香字	右同研細每用一字薄荷湯調下量大小虛寔加減 乳食前	大青圓治食癰發搐及有驚積 許宣贊方	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	青黛 錢抄五 蜈蚣 一對全 二十一個 者微炒蝎 全者微炒 巴豆 二十一個 心膜出油盡用	右為末用驚梨汁煎菴豆粉作糊和圓豌豆大每服 一圓酒一匙水一匙薄荷汁少許同化下食癰或急 驚發搐服之立效乳食前	銀湯圓治如前	天南星 醋煮透切焙乾 棘岡子 十四個 為末抄一錢七 巴豆 十四個 去壳	皮心出油盡 雄黃末 錢抄七 蝎稍 十個 朱砂末 五分



右為細末煎薄荷湯調麵作糊圓如黍米大每服五	圓煎金銀湯下乳前食更量大小加減	妙聖丹治食癰發搐利胸膈	蝎稍四十九个微炒木香一分代赭火煨醋浸十分牙硝一分大黃	一分炮已膩粉半朱砂半射香半腦子	半錢巴豆七个去皮心紙裹出盡油	右為細末滴水 和圓黍米大每服三五圓沉香湯下	乳食前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	蟾酥丹治食癰毒盛湯藥不下	蟾酥一分真珠末一分甘遂一分火煨黃牡蠣粉一分犀角末	一分巴豆七个去皮心杏仁一分射香一分	右拌研勻細糯米飯和圓黍米大每服三圓煎荊芥	湯放溫送下量大小加減乳食前	靈朱圓治食癰乳食不消心腹壅滯四肢抽掣	五靈脂去砂朱砂研水飛巴豆五枚去皮心	右同研細如粉燒粟米飯和圓黃米大一二歲兒溫



水下二圓取或利或吐效更在量大小加減服之乳 食前	三癰丹治癰証發未能分辨皆可治之	黑錫 一兩水銀半兩二味同結沙子研極細 蝎 稍半 木香 兩半 天南星	半兩 炮烈 殭蠶 去絲嘴半 人參 去蘆半兩 半夏 半兩洗七次 防風	去蘆并义 枝半兩	右為細末石腦油半盞研極細入射香一錢腦子半	錢各研細與衆藥末拌勻棗肉和圓黍米大每服三	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	五丸至十丸煎荊芥薄荷湯下無時	治五藏五畜癰方	治肝病犬癰	伏日取犬齒水磨汁服	又方	取犬頷骨為末服	治心病羊癰	三月三日取羊齒水磨汁服



又云心病馬癰	取馬齒水磨汁服	又方	取馬毛燒灰為末水服一云馬蹄	治脾病牛癰	取牛齒水磨服烏牛齒最佳	又方	取白牛屎中豆服之	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	又方	燒蹄末服	又方	取牛鼻中木燒灰服	治肺病雞癰	取白雞腦水調服	治腎病猪癰	五月五日取猪齒水磨汁服



又方	取猪乳服	五色圓治五藏五種癰並主	朱砂 半兩研 水飛 水銀 一分 雄黃 二兩研 真珠末 一兩令研極細	鉛 三兩同 水銀熬	右為末煉蜜和圓麻子大每服三四圓煎金銀薄荷	湯下無時	露蜂房散治五種疾發搐口吐涎沫	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	露蜂房 一兩洗 石昌蒲 一兩九 桂心 半兩 遠志 甘草	去心 半兩 人參 半兩 牛黃 一分 杏仁 湯浸麸炒去 朱砂 一分	一分研 水飛	右同為細末每用半錢射香湯調下無時	治偏搐方	雙劍金治驚癇偏搐	赤足蜈蚣 一條 紫色大螳螂 一個	右噉至乾以利刀當脊分切作兩畔各逐左右別研



為細末不得交錯各用貼子盛之於貼子上號記左
右遇其患者每用一字許鼻內任搐之左治左右治
右俱搐者任右則右住任左則左住左右任皆住
雙金散治如前

右以蜈蚣一條大者去頭足尾用真酥塗慢火上炙
黃置粘子面南用快竹刀子當脊縫中停利作兩半
用兩貼子號記左右字不得交差差則誤矣 又以
射香一錢亦分左右兩處先將左分一半在左字貼

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

內與蜈蚣同研作細末却入左字貼內盛訖次將右
分一半入在右邊貼內與蜈蚣同研作細末却入右
字貼內盛訖不得相犯每遇病者眼睛弔上止見白
睛搐搦不省不能出聲者用細筆筒子置藥少許在
中隨搐者左右鼻孔中吹之用藥不可多若眼弔全
未下即添些小以意度量其眼隨手便下搐亦便止
餘同上法二方相犯
保壽散治驚癇偏搐



雄黃研細 茯苓去黑皮 人參去蘆各一分 朱砂半兩 牙硝一錢	右細勻每用半錢熟水調下一歲用一字無時	治陽搐急驚方	軟紅膏治急驚潮搐涎盛	天南星一兩生為末 朱砂半兩 水銀一分用真石腦油半盞同研細	乾蝎稍四十五個為細末	右拌勻入腦射各一錢再研棗肉和劑入石臼中杵	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	三五百下圓如皂子大每服一圓煎薄荷湯化下神驗無時	朱粉丹又名鶴頂丹 治急驚壯熱吐涎發搐	朱砂半兩 膩粉一分 蝎稍半兩 巴豆七個去心皮膜出油盡用	一方只用五个	右為細末糊圓黍米大每服三兩圓煎桃仁湯下一方無巴豆但作散每服半錢湯使如前無時	百靈圓治急驚化涎定搐



黑鉛 一分 水銀 一分 同結砂子 二分 天南星 一分 炮烈 一分 白附子 一分 炮烈 一分	乾蝎 一分 天麻 一分 蟬殼 一分 射香 一分 牛黃 一分	研	右為末勻細糯米飯和圓黍米大溫酒下三圓量大	小加減服無時	天漿子圓治急驚發搐	天漿子 十四个 牛黃 一分 射香 一分 白附子 一分	炮犀角末 一分 半夏 一分 蟾酥 一分 猪膽 一分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末入猪膽汁和劑如汁少入少麵糊圓黍米	大每服三五圓薄荷湯下無時	朱砂散治如前	朱砂 一分 膩粉 半錢 射香 半錢 盧會 二錢 胡黃連	一蝎 七 白附子 二錢 金箔 七片 殭蠶 十個 赤足蜈	蚣 一條 甘草 二錢	右為細末二歲上兒半錢七已下者一字金銀薄荷	湯調下三歲上者一錢七如口噤不開灌入鼻中無



時	白金散治如前	天南星 一兩大者 四破之 朴硝 一兩 半 白礬 一錢 甘草 半兩	右為麤末用水五盞慢火一處煮水盡為度焙乾為	細末入硃砂末乙錢拌勻每用半錢煎金銀薄荷湯	放溫調下無時	七寶牛黃圓治急驚目睛上視手足發搐	朱砂 水飛 粉霜 別研 輕粉 雄黃 研水飛 牛黃 半錢 別研 腦	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	子 一字 研 射香 一字 研	右為細末糯米粥和圓小豆大二歲下兒半圓上者	一圓金銀薄荷湯磨化服之月內兒一圓分四服百	日分三服看兒大小壯怯及病勢輕重以意加減無	時	水銀圓治急驚痰壅發搐悶亂口噤	水銀 一分入棗肉少 許同研至星盡 膩粉 一分 研 南星 一分 炮烈 乾蝎 一分	炒 微



右為末再用棗肉和圓黍米大每服五七圓乳香湯 下量大小加減無時	小朱砂圓治急驚發搐痰壅 朱砂 一分 研 水飛 巴豆 三十個 去心皮 膜出油令盡 半夏 湯洗七次 焙乾為末	抄二 杏仁 五個 熟灰內炮過 大錢 湯浸去皮尖炒黃	右為細末麵糊和圓菴豆大二歲兒一圓荊芥薄荷 湯下三歲加一圓五歲者三圓如有驚在內者利動 至病盡藥圓乃出如無驚者藥不下也甚妙而穩乳	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	食前	至聖膏治急驚發搐手拳緊多睡啼叫煩熱鬲寔 朱砂 一分 水飛 天南星 臘月牛膽 製用半兩 鐵粉 一分 水研 蝎稍 十個	續隨子 去皮四 十九個 腦射 各少許	右為細末煉蜜和圓菴豆大薄荷溫湯化下一圓如 涎多加輕粉半錢更量大小加減無時	牛黃散治急驚搐搦壯熱鬲壅痰盛	乾全蝎 七個 巴豆 二粒 去皮 輕粉 半錢 雄黃 二錢 水飛 川蔚金 一分



劉用皂莢半錢採
汁煮過炒至乾用朱砂一錢
水飛

右為細末入腦射各少許每用一字薄荷湯下或得

吐瀉或得睡汗皆愈如牙關噤即先用藥開然後

服之
開噤方
在後

蚬散治急驚風潮搐

以全蝎中中緊寔者去尾尖上毒炒焦為末每服一

錢濃煎防風湯調下予相識王宣教諱循一子病驚

搐得此方治安渠恐再發遂與常服之妙選同與烏

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

蛇散服之尤佳

四聖散治一歲至五六歲兒急驚潮搐

天漿子一枚朱砂二豆許全蝎一枚射香一小豆大

右同研膏每服少許薄荷溫水化下無時

治小兒卒得急癇

鈎藤 甘草炙各半兩

右剉碎以水五合煮取二合分八服日五夜三

治急驚風搐痰盛



天漿子 三个去壳生用 乾蝎 七枚生用 朱砂 一錢水飛	右同為末軟飯和圓粟米大每服二圓荊芥湯下不計時更量大小加減	又方治如前	以全蝎一枚薄荷四葉裹合火上炙令薄荷葉焦同研細末分作四服溫湯調下亦治大人風涎只作一服無時	治急驚發癇迷悶不省嚼舌仰目瘈瘲	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	以真牛黃一大豆許研細和蜜水服之	以犀角末半錢錢溫水二合分服	以真熊膽二大豆許以乳汁或竹瀝服之能去心中涎即愈	以虎睛研末以水調灌之量大小與一方用一豆許炙乾研末猪乳三合和之綿纏蘸浸與兒吮之頻頻以多為佳	治小兒卒驚似有痛處而不知疾狀



以刺雄雞冠血滴少許入兒口中	治小兒初發驚搐壯熱痰壅嘔吐不止	蝎 一枚 炙焦 麻黃 一尺不 去節 薄荷 四葉 炙焦	右為細末量大小用藥以水六分煎一呷溫服	牛黃膏治驚風邪熱痰盛鬲壅時發潮搐痰嗽不時上	視咬牙服之退驚化涎涼鬲鎮心祛邪止嗽美進乳	食	牛黃 別 研人參 去蘆各 一錢 甘草 炙二 錢 牙硝 枯 朱砂 研水 飛各	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	半錢 雄黃 一錢半 水飛 蛤粉 三錢 半 金箔 一 片 銀箔 一 片 龍腦 少 許	右為細末煉蜜和劑每九錢重分作一十圓以金箔	為衣每服一圓溫薄荷水化下乳後	天弔附	治孩童天弔癇搐	以東行桑根取汁與服 亦能傳 鵝口瘡	保生圓治天弔搐搦壯熱蕨府壅滯	蝎 五枚 生 天南星 一枚 炮烈 巴豆 七枚 皮心



右於清明時初夜將藥露北極下一宿明旦杵羅為末以鼓四十九粒口含不語津潤至脫去皮研爛和圓黍米大隨年圓數溫水下乳食前

治天弔脩急塗頂法

川烏 末一錢生 芸薹子 末三錢生

右用新汲水調塗貼頂上立驗一方用稀糊調塗顙上

一字散治天弔眼上能退風爽神

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

大天南星 半兩微炮烈 乾蝎 一分 殭蠶 去絲嘴一分 蟬殼 去土一分微炒

右為細末次入蕎麥麵一分用酸石榴一个去穰子

留殼將諸藥入在內塩泥封裹於竈內慢火燒至泥

乾燥為度取出再研極細每服一字溫酒調下無時

蠹魚膏治天弔目睛上眵手足唇口搐掣

右以壁魚兒乾者十个濕者五个用乳汁相和研爛

再入乳汁少許灌之

琥珀散治天弔驚風發搐



琥珀末一分 真珠末一分 朱砂末半分 鉛霜半分 赤芍藥一分	半	右拌勻每服一字煎金銀薄荷湯調下無時	殭蠶散治天弔目上視發搐	白殭蠶去絲嘴炒半兩 馬牙硝半兩 蔚金半兩 乾蝎半兩	右為末每服一字乳汁調下急者服半錢無時	治陰搐慢驚方	犀角散治吐瀉變慢驚發癎瘕	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	犀角屑錢一 白朮二兩 甘草半兩 橘皮半兩	右為細末每服半錢水一盞入金銀薄荷煎至七分 溫服連進三服無時	銀白散治吐瀉生風發慢驚癎瘕此藥收涎醒脾去風 右用大天南星一个重一兩者換酒浸七伏時取出 置新瓦上周圍以炭火炙令乾烈頓於地上去火毒 用甕器合之候冷取出杵羅為末次入朱砂細末一 分拌勻每半錢荊芥湯調下早晨午前各一



青金膏治因吐瀉變慢驚癎	烏蛇肉 一宿酒浸 蝎 稍分 天麻 一分 白附子 一分 大附	子 一分炮烈 青黛 一分 射香 一分 天竺黃 一分	右為細末入研藥拌勻煉蜜和膏圓皂子大煎人參	薄荷湯化下量大小與服無時	睡驚圓治慢驚身熱癎瘕昏憤	朱砂 末一錢 香墨 末一錢 青黛 末一錢 盧會 末一錢 膩粉	錢 一 龍腦 半錢 使君子 二个去	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右拌勻細寒食麵作糊和圓桐子大薄荷湯化下一	圍無時	附子散治慢驚身冷癎瘕昏困 保生名	大附子 一枚重九錢上 天南星 二錢 半夏 沸湯洗	錢 二 白附子 半一錢 朱砂 二錢 射香 一錢	右為末同勻每服一字薄荷湯調下無時	羗活膏治脾胃虛而生風或因吐利或取轉過度發為	慢驚



羌活 去蘆 川芎 人參 去蘆 白附子 炮 赤茯苓 去皮各	天麻 一兩 僵蠶 去絲嘴酒浸 乾蝎 去毒炒 附子 炮去	二錢 白花蛇 酒浸肉炒 防風 去蘆并叉 牛黃 研一 麻	黃節 去根 肉豆寇 麵裹 藿香葉 去土 沉香 雞舌香 丁母	也香 木香 各二錢 真珠 末 射香 各一錢半 輕粉 一字 腦子 半	研 雄黃 飛 辰砂 研水飛各	右為細末同勻煉蜜和臍旋圓如大豆許每服一圓	薄荷湯或去心麥門冬湯下一二圓量大小加減若	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	急驚者勿服此藥性溫故也服之無時	溫白圓治脾困瘦弱或因吐瀉或久病成慢驚身冷瘳	癰	天麻 半兩 僵蠶 炒去絲嘴一分 白附子 生一分 乾蝎 去毒一分 天南	星 湯洗七次剉碎一分	右為細末以湯調下食麵作糊圓菴豆大圓了頓寒	食麵中養七日畢取而用之若急用未足日數亦可 用每服五七圓至一二十圓量大小加減生姜米飲



下空心服看病勢漸加圓數多與服炒	鈎藤飲子治陰癇多昏睡手足冷時瘈瘲直視不乳	鈎藤鈎子 三 分 殭蠶 去絲 川芎甘草 炙 蟬殼 去土并頭	翅足 蛇蛻 炙焦黃 各一分 蟬螂 翅足炙黃	右為末每用二錢水一盞生姜五片煎至七分去滓	量大小與服小者分三四次與服不會服即灌之若	審是陰癇的當用藥末二錢入炮過附子碎用指面	許依前煎之溫服日三夜一急驚不用附子服之無	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	時	七聖圓治陰癇體虛羸瘦多困	烏蛇 酒浸軟去皮 蝎稍白殭蚕 炒去絲 青黛白	附子 各一分 蟬螂 五个去頭翅 蟾酥 二皂子大	右為細末煉蜜圓桐子大如遇病者先以半圓湯泡	薄荷水化開灌兒鼻中如得嚏則可醫以金銀湯化	下一圓日二三若灌藥不嚏難治服之無時	天漿子散治陰癇昏困多睡時時瘈瘲



天漿子 三个去壳用虫 白殭蠶 三个微炒 乾全蝎 三个微炒	右為細末每服一字煎去根節麻黃湯調下日三得汗出為效服之無時	七神丹治陰癰面青口噤喉內涎吼手足瘰癧搐搦	朱砂 研水飛 牛黃 研 羌活 去蘆各一分 天南星 半两炮烈 射香 一錢 蝎尾 炒 殭蠶 去絲嘴炒各七个	右為細末以熟棗肉和圓菴豆大薄荷湯下二三圓	兒小化服亦得無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	天南星煎圓治陰癰慢驚瘰癧	天南星 一两細剉水二盞慢火熬至半盞去滓再煎成膏 白附子 半两炮烈 天	麻 一两 乾蝎 一两	右下三味為細末入膏和圓菴豆大三歲兒二圓五	歲兒三圓薄荷湯送下日二服無時	五靈脂圓治如前	五靈脂 去砂 白附子 生 天南星 生 乾蝎 生 蟬殼 去土	生各一兩



右為細末用醋二盞先以藥末一两同熬成膏入餘藥和圓菴豆大未滿月兒以乳汁化下一圓二歲下二圓大者以意加之金銀薄荷湯化下服畢鼻上汗出是效無時	蜆殼膏治如前	右以螻蛄一个去頭翅足入射香輕粉各黃米許同研極細以新水少許就之用蜆殼灌之立效	必救丹治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	赤足蜈蚣 一条去頭足 蝎稍 七个 生犀尖 錯末一錢 染坯 半錢 朱砂 半錢研 射香 一字	右為細末煎猪脂油丸黍米大每服三五圓用大金散下無時	大金散	辰砂 水飛五錢 真鐵粉 一錢 輕粉 一錢 金箔 一大片	右為細末分作九服如遇患者將一服分二處每一半用童子小便并酒共半盞煎三四沸放冷調藥一





水 飛白朮 一錢 焙 蔚金 一錢 半夏 一錢 洗淨生薑汁浸	右為細末入腦射各少許煉蜜和圓雞頭子大薄荷湯化下一圓無時	塗顙法治陰癰慢驚	右以天南星洗十遍為細末用生薑自然汁煮糊調塗顙頂上	妙聖散治慢驚以不差兩手痙攣抽掣不定	赤足蜈蚣 一條 葱汁浸 一日焙乾 草烏頭尖 十四個 薄荷生薑自然汁浸一	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	伏時焙乾 射香 一錢 龍腦 半錢 同為末 研	右拌勻每用半字以小葦筒吹入兒兩鼻孔中候兩手定時方可兼服別藥	天麻鈎藤湯治因吐利脾胃虛而生風變慢驚	鈎藤 三錢 天麻 三錢 蟬殼 去土 防風 去蘆并 人參 去蘆 麻黃 去根 僵蠶 去絲嘴 炒黃 蝎尾 去毒炒 甘草 炙 芎藭 各一分	射香 一錢 研	右同為細末每用二錢水一盞煎至六分量大小與



服如冷多面青唇白四肢冷入附子末半錢無時	喝起散治因吐瀉生風變慢驚或作慢脾風	半夏 一兩湯洗七次為末 生薑 四兩研取汁和半夏末捏作餅如稀入少麵 朱砂	飛 水 滑石 白礬 生各一分 沒石子 三	右為末每服一字煎冬瓜湯調下如一服醒便止後	服無時	生銀散治慢驚乍靜乍動手足瘳癢時發時止	生銀末 半錢 蛇黃 三分煨醋 黑鉛 一錢 天南星 二錢	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	炮磁石 一錢煨醋 鐵華粉 二錢 朱砂 一錢 射香 一錢	右為細末每服一字煎犀角屑湯調下如見沉困者	用薄荷乳汁調下汗出為效	治陰癇者多用性溫熱之藥有至癇証已退未退之間	却生熱証或反為急驚者甚多如治病必當先問病者	之家所患幾日因何得之曾服何藥如此詳審若服熱	藥太過可用解毒藥治之無不効者	豆卷散治陰癇慢驚服溫藥太多而却生熱証反為急



驚	大豆卷黃 水浸黑豆生芽是也 貫衆 板藍根 甘草	炙各一兩	右同為細末每服半錢或一錢白水煎放冷服甚者	用藥三錢漿水入油數滴煎之又治吐蟲無時	龍腦散治如前	大黃 過 半夏 湯洗滑淨薄切用姜汁浸一日焙乾炒用 甘草 炙 金星石	銀星石 寒水石 禹餘糧石 火煨醋淬七次 不灰木	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	火煨 青蛤粉 即青黛也	右等分為末入龍腦一字再研新水調下一字或半	錢量大小加減此舊方也錢乙入甘松兩枝霍香末	一錢金牙石一分却減大黃一半服之無時	慢脾風 附	銀白散治慢脾驚風危困者	天南星末生姜自然汁和劑捻作餅子炙黃白附子	薄荷自然汁和劑捻作餅子炙乾



右同為細末每服半錢或一錢煎冬瓜子湯調下	羗活膏治慢驚嘔吐及脾風及身體冷四肢硬危急將	不救者	羗活 去蘆 獨活 去蘆 人參 去蘆 茯苓 去皮 防風 去蘆并枝 桂	去粗皮先為 一錢酒 乾蝎 浸炒研 水銀 半錢與水同研如	泥後 一字 射香 研	右先研硫黃次入射香水銀研至無星極細又入諸	藥末拌勻煉蜜和膏圓皂子大薄荷湯化下保生治	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	胃虛吐瀉生風羗活天麻防風各半兩人參茯苓蝎	桂一分朱砂水銀硫黃各一分服之無時	大天南星散治吐瀉或服轉藥過度脾虛生風為慢驚	或作脾風危急之候	右以天南星一枚重八九錢至一兩者先掇一地坑	深三寸許用炭火五斤燒通赤去火入好酒半盞在	內然後入天南星却用炭火三兩條蓋却坑子候天南	星微烈取出剉碎再炒令勻熟不可稍生放冷為細



末每服一字或半錢濃煎生姜 防風湯調下無時	又方治如前	梓州厚朴 去粗皮生薑製一兩細剉 半夏 一錢湯洗七次生薑汁浸半日控乾用	右用米泔三升同浸一百刻周一伏時以水盡為度	如至百刻水未盡加少火熬乾去厚朴只用半夏為	細末每服半字或一字薄荷湯化下無時	辰砂膏治陰癰搗掣昏困傳為脾風	右以大附子一枚重六七錢上微炮去皮臍於頂頭	剉一竅子入粉霜礪砂各半錢却用取下附子末填	滿於火上燒存性次用天南星 半兩炮烈 蝎稍 一分 羌活 去	一分朱砂 半兩研 同為細末煉蜜和圓雞頭子大每服一	丸射香薄荷湯入酒三兩滴化服無時	丙丁散 丙日作麴丁日製藥	天南星 烏蛇肉 酒浸去骨各五錢 天麻 麻黃 去根節各半兩	大附子 一枚重半兩上 全蝎 半錢 白附子 三錢 白	僵蠶 去絲嘴四錢



右為末以水一升浸三日濾去其滓用寒食麵一袋和勻踏作麴楮葉罨七日取出以紙袋盛吊起十四日可用遇小兒吐瀉精神昏困多睡不乳四支逆冷欲發慢驚者以麴一两為末入腦子末一字每服半錢或一錢溫水調下若已發慢驚者此五藏俱虛皆受其病心主血病則血亂肺主氣病則氣并肝主筋病則抽掣脾主困病則昏困腎主寒病則身冷故病者血亂氣并四支抽掣吐瀉昏困唇口色白身體冰冷

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

冷神情忪悸面青喉響哭如鴉聲將上件已成藥更入朱砂末一錢半拌勻服依上法若慢驚吐利傳為脾風者用麴末一两朱砂末一錢半拌勻煉蜜和丸雞頭大名丙丁膏溫水化下又別以麵末一两朱砂末雄黃末各抄一錢琥珀末甘草末各抄二錢拌勻煉蜜圓雞頭大名太乙丹治小兒百病此方陳易簡家藏服之無時

閻孝忠云小兒吐瀉脾胃虛而生風以為慢驚或傳成



脾風大便不聚至虛損危憊者當速生胃氣宜與理中丸并研金液丹作末煎生姜米飲調灌之多服乃効服至二三兩無害候胃氣生手足漸煖陰退四支猶然瘕瘕即減金液丹一二分却用青州白圓子一二分同研如上法與服以意詳之漸減金液丹加白圓子兼用異攻散 此乃溫中正氣治虛吐瀉藥方具吐瀉門 羌活膏溫白圓鈎藤飲子之類 方並具前 依此治之仍頓與粥食雖至危殆往往死中得生十有七八予於岳太尉處得一方稱自王運使所傳	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治小兒急慢驚風吐瀉不止危不可治者名為安胃圓與上相似大同而小異	好青州白圓子 三十粒 好金液丹 三十粒 全蝎 一枚去刺射	香 少許	右同研為細末以糯米飯和丸黍米大每服三二十丸煎蘿蔔糯米湯下無時	射香牛黃丸治小兒急慢驚風慢脾風	牛黃 一錢研 射香 一錢研 蝎稍 一錢生 乳香 一錢研 沒藥 一錢



研 蜈蚣 一條 酥炙 花蛇肉 去骨一錢 酒浸一宿 天南星 二錢 半 炮 草烏 二錢 半 天麻 二錢 半 剉研 防風 去苗并叉 枝二錢 半 雄黃 半 錢 研 朱砂 八錢 研	右為細末酒糊劑如皂子大一歲至三歲兒每服一	圓研細煎金銀薄荷湯調下七歲至十歲服二丸至	三丸煎人參湯調下慢驚風細研三丸灌下大有神	効無時	射香餅子治小兒吐瀉之後脾虛生風目睛斜視背脊	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	強硬手足癱瘓乃治心肺中風昏塞不省 此方與前方相犯而小異	川烏 炮去皮 一分 天南星 炮一分 白花蛇 酒浸一宿去皮 骨取肉焙乾用	一分 蝎稍 一分 蜈蚣 一條去頭足亡 朱砂 半 分 研 射香	一分 乳香 半 分 鐵粉 半 分 牛黃 半 分 研	右為末同勻細酒糊圓如雞頭大捏作餅子每服一	二餅煎人參薄荷湯化下	聖脾散治慢脾風	香附子 炒去皮 一合 小黑豆 炒一合 甘草 半 分



右為細末每服半錢飯飲調下無時	急慢驚通用治小兒急慢驚風聲已不出危殆命在須	臾者男在女右屈中指在手心橫紋當中點炷及與	頭上同時下灸壯如麥粒甚者不過三壯聲回即止	法王運 使傳妙	天麻膏治小兒急慢驚風及慢脾風搐搦瘈瘲昏塞牙	噤一切惡候及吐瀉等疾	全蝎分一錢牛黄一錢白附子四錢天麻二錢雄黄四錢水飛研	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	訶子去核六錢白朮二錢藿香葉去土四錢白荳蔻仁三錢縮砂	仁三錢白殭蠶去絲嘴四錢炒	右為細末煉蜜丸如雞頭大每服一丸煎薄荷湯化	下甚者兩丸泄瀉者煎冬瓜子湯下嘔吐者煎丁香	湯化下並不拘時候更量大小臨時加減亦看病之	輕重用藥則無失矣	牛黄丸治急慢驚發歇不止	牛黄研天竺黄研犀角屑研胡黄連各半兩芎藭



人參去蘆 白茯苓 丁香 鈎藤 龍齒研各一分 射香	一錢 腦子研半錢	右為細末煉蜜和菴豆大每服三丸粥飲下無時	黑神圓治急慢驚	膩粉一錢半 香墨一錢 白麵一錢 盧會一錢 牛黃別研 青黛	使君子去壳麵裏煨熟用各半錢 腦子一字 射香一字	右為末糊圓桐子大每服半圓薄荷水下要利動服	一圓楚州小醫王鑑因此藥致富甚保惜之未嘗傳	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	人予得之乃睡驚丸小異耳治驚極效垂死一服立	差無時	青金丹治如前	雄黃一錢 朱砂末一錢 鐵粉二錢 乳香末一錢 南星末二錢 蝎	微炒 輕粉 青黛各三錢 射香一字 花頭蛇一箇酒浸一宿取肉	炒	右為末以梨汁和劑分三等圓之黍米麻子菴豆大	量大小與之一圓薄荷水送下煎金銀湯亦得無梨



汁用薄荷汁無時

雄朱丹治如前

雄黃水飛朱砂水飛
等分

右為細末用白項曲蟾一條放藥中令纏濕以竹篦
子刮下丸如芥子大每服三丸金銀薄荷湯下其曲
蟾却須放了不可壞死服之無時

軟金丹又名聖力丹治小兒急慢驚風三癰瘰癧頭項
動搖目睛上視或牽斜偏搐背脊強直或反折如弓口

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

噤牙緊或屈指如數或溫壯連綿或服涼藥過多内生
虛風或因傷寒變搐發渴或因吐痢生風為癰一切諸
証乳食不進昏冒不省凡此急候服之皆愈但不喘急
者此藥必効如已喘急者更須審詳虛寔若涎寔者同
水銀圓化此藥服之二藥引化驚涎則潮搐立止虛者
但只服此藥即便放下眼來如小兒涎熱風熱有諸驚
証服之便差更無變動又治大人卒中風病涎潮不省
此藥神聖救人不可具載





粟家方	天竺黃 一斤 墨 二錠不計大小 射香 一錢 朱砂 一錢	飛 研水 水銀 半兩 錫 半兩	右於鉢內先鎔錫化入水銀結砂子乳鉢內研開次	入諸藥末研勻細方用濃墨水和丸彈子大以灰頓	盆內鋪紙於紙上布藥浥乾十歲兒一粒分三四服	七八歲兒作四服五六歲兒分六服三四歲兒分十	服一二歲兒分十六服新生百晬兒分三十服並微	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	利常服者須隔旬日服一服小兒風熱發癇潮搐涎	盛嗽喘並臨時加減如吐瀉後生風服亦不妨此藥	性溫宜少服並用湯化下如煎湯不可犯鐵器入口	如聖服之無時	治急慢驚發搐	乳香 半兩 甘遂 一錢	右同研細每服半錢乳香小便調下妙	又治方如前



蝎稍 二十一个 朱砂 一皂子許 射香 一莖許	右同為末每服一字或半錢用赤小豆拌勻薄荷溫酒調下無時	定命丹治急慢驚風弔眼撮口搐搦不定壯熱困重	蟾酥 一錢乾者 乾蝎 七枚 南星末 一分 白附子末 半錢	青黛 半錢研 射香 少	右勻細末粟米粥和丸菴豆大別以青黛為衣每服	一丸荊芥薄荷湯下服藥後困睡無疑凡病者先化	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	半丸點鼻中得噴者必効如新生兒用膩粉二捻生	油一滴新水半茶脚化一丸服之取下胎中所受病	更無諸驚邪熱服之無時	射香餅子治如前	烏頭蛇 一對酒浸一宿取肉 蝎稍 半兩 白附子 一兩 天南星 一兩	炮白殭蠶 一兩炒 乳香 半兩 朱砂 一兩 天漿 四兩	去壳射香 一錢 金箔 十片	右為細末煉蜜和丸桐子大捻扁作餅子用金銀荊



芥湯化服大小加減無時此便是除風膏若以麥飯和丸便是麥飯膏此黑孩兒柏防禦真方也

如聖散治如前

白附子二錢 僵蠶炒去絲 全蝎二錢中中者用麵

參去蘆 草烏半兩炮 牙硝二錢 丁香一錢不 膩粉半錢

天竺黃一錢 天南星米泔浸一宿 龍齒二錢 蔚金一錢 腦

射各少

右為細末十歲下兒半錢上者一錢冷薄荷湯調下

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

如兒驚結大小便不通連進二三服無時

南星湯治如前

右以大天南星一枚重四錢者細研為末用漿水一

碗冬瓜子四十九粒同煎至一盞去滓取青汁半盞

分三服病愈以四君子湯補之一方每用南星末一

錢上下以水半盞漿水半盞或薑汁亦得入生姜三

片冬瓜子數粒煎至半盞以下分二服尤治慢驚服

之無時



南朱膏治如前

右以大天南星二兩為末用臘月黃牛膽取汁和之
 却入膽中如膽汁少量可用之寧乾為細末入朱砂
 末一錢射香少許煎甘草膏子和劑丸雞子大每一
 歲半丸熟水化下量大小加減如一膽盛南星末不
 盡用二膽亦得服之無時

朱金湯治如前

右以代赭石火煨醋淬十次為細末水飛過日中曬

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

乾每服半錢或一錢煎真金湯調下量大小與之連
 進三服兒脚脛上有赤斑點者即是邪氣已出兒當
 安也若無赤斑點者出不可治也服無時

如聖青金丹治忽發身熱吐逆變急慢驚潮搐

龍腦一錢 射香一錢 膩粉一錢 白麵三錢 香墨一錢半

青黛二錢 使君子去壳二个 金箔各五 銀箔各五

研片

右細勻末滴水丸雞頭子大慢驚用冷薄荷湯化下



人參半兩 天南星炮 白附子半兩 乾蝎去毒 朱砂		水銀二錢 黑鉛二錢 天麻半兩 花蛇肉酒浸炙取		罷搐丸治急慢驚發搐牙關噤身反強	丸相宜加減無時	右為細末煉蜜和丸雞頭寔大荆芥薄荷湯化下一	木一分 朱砂三錢 射香一分 全蝎一分 腦子少		去蘆一分 天麻一分 防風去蘆 白殭蠶炒去絲 茯神		牛黃錢一 牛膽製天南星末錢一 滴乳香末令研 人參		欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	牛黃丸治急慢驚發搐痰壅及吐瀉生風	小加減無時	右同研自然成膏丸楊梅核大梨汁化下一丸量大		銀二錢 砂子結 牛黃一 射香一		龍腦一 朱砂一錢 鵬砂末三錢 馬牙硝五錢 鉛霜二錢 水		滾涎膏治慢驚風潮搐無時	九下涎一合以來神効無時	一丸須更便睡覺立愈更服三兩服急驚化下半	



半兩 水飛青黛 一腦子 射香 各少許	右為細末石腦油研和丸小麻子大每服一丸薄荷湯化下無時	虎睛丸治急慢驚搐涎熱多睡及諸惡証	虎睛 一對碎切酒浸一宿焙乾通明天麻 兩半白茯苓 木去心內兩白	附子 一分天漿子 五十個炒使君子 一百個去壳朱	砂 二兩全蝎 半兩去毒牛黃 兩半天南星 一兩二錢京墨	半兩燒過青黛 兩射香 輕粉 各一分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右同勻細末酒糊丸桐子大每服一丸薄荷湯化下有急病加作二三丸極妙無時	烏蛇散治急慢驚搐如弓危困難治療之者此方主之	烏蛇肉 酒浸去皮赤足蜈蚣 二條去頭足全蝎 二錢	去毒天麻 兩半白茯苓 兩半黑附子 半兩炮炙焦白附子 一分	炮射香 少許	右為細末每服半錢用舊斷井索煎湯調下其効如	神如急用無斷井索煎荊芥湯代之無時



治胎癰發搐真假方	虎睛丸治自生蓐內至百日以來壯熱驚搐凡發在百	日內者雖發搐真假相似然發頻者多是外風傷之也	虎睛 一對酒浸微炙取二个 牛黃 一分別研朱砂 一分研水飛 雄黃 一分	射香 一分研	右為細末煉蜜和丸菴豆大以乳汁研化三五丸	烏金膏治胎癰發搐頻併	烏蛇 一條水浸去皮骨只取肉別用酒浸一宿焙 蠶紙 一張燒灰蟬殼 半兩去土	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	全蝎 半兩上先為末朱砂 半兩研飛射香 半錢腦子 半錢金箔 三十片	細研	右拌勻煉蜜和膏丸皂子大當每服一粒煎人參薄	荷湯化開服無時	牛黃丸治自生至百日以來五臟多熱而發驚搐	牛黃 一分令研龍腦 一分黃芩末 半兩朱砂 半兩研飛乾蝎 一分犀	角末 半兩	右同研如粉粟米飯和丸麻子大溫水化一丸與服



無時	羌活膏治胎癰發搐昏困不省	羌活 去蘆 一兩烏蛇肉 一兩酒浸 獨活 去蘆 一兩天麻 半兩 全	蝎 半兩 白殭蠶 去絲嘴 人參 去蘆	右為細末煉蜜和膏每服一皂子大射香荆芥湯化	下無時	銀朱丹治如前	乾蝎 一分 天漿子 一分 朱砂 一分 牛黃 一分 露	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	蜂房 一分 水銀 一分 射香 半錢	右同拌勻麵糊和丸黍米大每服三五丸金銀薄荷	湯化下兒小乳汁化下亦得無時	甲灰圓治生下便喜多驚	右剪父母两手爪甲燒灰研細麵糊和丸麻子大井	花水化下一丸無時	生摩膏治新生兒肌膚幼弱為風邪所中身體壯熱手	足驚掣



甘草 防風 去蘆并叉 枝各一兩 白朮 二十 錢 雷元 二錢 桔梗
右咬咀以猪肪脂一斤煎油入藥微火上煎之良久
視稠濁得所膏成乃去滓丸如彈子大每服一粒炙
手摩兒百徧寒者更熱熱者更寒小兒無病早起常
以摩顙上及手足心甚辟風寒之邪
朱砂散治一臘至月內兒發驚轉為慢驚
朱砂 一分 研 牛黃 一分 研 射香 一錢 乾蝎 十四 個 微炒 天漿
欽定四庫全書 小兒衛生總微論方
子 十四 個 去殼 取出 用
右各研細一處再研極細散每服半錢乳汁調抹兒
口中以乳汁送下無時
保生散治新生兒胎驚此在母胎中時因有所驚乃感
至生下百日之內心神不寧睡卧不醒壯熱躁煩啼哭
無時面青赤腰直身冷搐縮口撮或糞青黃水
胡黃連 半兩 鵬砂 研 鐵粉 各一 錢 輕粉 各一 錢
右為末每服一字薄荷乳汁調下服藥後有青赤物



下是効如無隔日服琥珀丸服之無時	琥珀丸	乾全蠋 二枚 琥珀 令研 鐵粉 炒各二錢 輕粉南星 炮 白附	子 炮各三錢 龍腦 半錢研	右為末酒糊和丸黍米大薄荷溫湯下一二丸如服	此藥眼反牙噤如魚口者乃死候也服之無時	治嬰小初生未滿月驚著似中風欲死者此方主之	以好朱砂用新汲水磨濃汁塗五心上神驗	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治嬰小新生中風	以射香一分驢前背交脊上會中毛拔取手指大許	一把以乳汁和令得所於銅器中慢火炒令焦燥與	射香同研如粉每服一字乳汁調下日三服	小兒衛生總微論方卷五



欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷六
七

詳校官太醫院典醫臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣王鍾岱



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷六

驚癇別論

驚癇咬牙

小兒驚癇發搐有咬牙不休及未發發過時亦常咬牙者予在行朝有李統制一子病症如是遂請衆醫詢治有言是驚入於腎者此乃喬岳漢東王先生歌中睡裏咬牙驚入腎之句其意謂牙為骨骨入腎故以言之此

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

常流無據語也古書無有亦無驚入腎之理果用藥無

驗今詳校其証特為明之乃足陽明之病也足陽明為

胃之經起鼻交額循鼻外入齒中還出俠口環唇下交

承漿過頤後出大迎循頰車且發搐為風風屬木胃屬

土木能刑土是以牙齒受風則痒頰車邪干則緊故使

咬牙不休以緩頰車之急以解牙齒之痒也治當去胃

中風

暗癇



暗癇其病似驚癇又似中風瘧病遇其發時則暗地急
至令人僵仆心神昏塞志意迷悶氣亂不省手足彈撥
戰掉搐搦喉中涎響或吐痰沫或作吼叫其脉三部陰
陽俱盛每發遠則終日或半日近則一兩時辰發過便
起却如不病之人俗呼謂之癇病稍輕者謂之暗風古
人又云小者發則為驚大者發則為癇小者氣血怯嫩
發即難當而傷多大者氣血壯盛即易任而失少

驚癇餘証

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

小兒驚癇搐搦至發定之後有諸餘証不退者雖大勢
已罷而病本尚在或服冷熱藥過多或汗下之失宜故
癇搐難退而有餘証也

驚癇兼別病

小兒病久發搐則五臟俱虛並受其病故發則血亂心
氣并肺搐搦肝昏困脾體冷腎又有因虛而別病兼發
或別病而因帶驚癇或有一方兼治之者並採而具之
治驚癇咬牙方



蟬花散治驚風咬牙并夜咳嗽 蟬花和殼去土 僵蚕去絲背直者 甘草各一分 玄胡索去皮	右為細末一歲上兒一字至三四歲者半分煎去土	蟬殼湯調下無時	小鎮心圓治諸驚咬牙不寧大便色青	朱砂水飛 鐵粉 京墨各一兩 腦子 射香各一字	右為細末陳米飯和圓菴荳大每服二三圓荊芥湯	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	化下無時	治暗癇方	真熊膽半兩 生天南星末半兩 粉霜一分 硃砂半兩 雄	黃半兩 腦子半錢 射香一錢	右勻研細用獾猪膽汁和丸粟米大每服五七丸至	十五丸金銀薄荷湯下無時	神烏散治暗風癇極妙	歌曰



臘月烏鴉一箇全 半兩硃砂口內填	麻纏烏觜安瓶內 用瓶 盛 盛 塩泥固濟火中安 窖乾	黃昏上火天明住 用木炭 一稱半取出篩羅為末研	每服一錢射酒下 一日 服之十日定須痊	又方	名同治同前	渾黑老鴉 一箇 胡桃 七 枚 七 蒼耳心子 七 個	右用一藏瓶入逐藥味在內塩泥固濟木炭火煨煙	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	盡為度取出研細每服一錢空心熱酒調下如患疝	氣腎腫陰囊偏墜更入新生孩兒胎衣一副同燒亦	依上法葱椒熱酒調下看大小加減	異聖散治癰病日發數次諸藥不能差	猪蹄甲 不以多少 淨洗去帶毛處剉碎於鍋內炒 令烟盡 取出於地上厚鋪帨薄攤其藥以	盆蓋之候三日出金星石銀星石青礞石 各	火毒畢為細末 火 三石同入一盒內以馬糞和泥固濟晒乾先用	熟火漸燒之次添炭火煨令通赤取出仍先令	撮一坑深一尺取藥合在地坑內用土蓋埋二日出火毒為細末



右用猪啼甲末二两石末一两半再研勻細入生麻	油半两再研極勻每服半錢以漿水研百遍調下空	心食前服小者減之	日應丹治癰病連年不差	黑錫 硫黃 水銀 鐵粉 各一 兩 金箔銀箔 各三 十片	右先將錫於鐵銚內鎔化次入水銀不住手攪令勻	次入硫黃諸藥同炒攪勻離火再炒良久都傾出用	紙襯地上頓一宿出火毒訖再研令勻細以熟軟粟	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	米飯和丸菴荳大每服五七粒煎人參湯送下無時	接生如聖丸治癰病暗風年深不差	赤石脂 二 兩 硝石 半 兩 白礬 枯過 一分	右為細末糯米粥和丸菴荳大每服十九十五丸溫	水送下食後日三服如日一次發者服半月即愈	啄木散治多年癰病	臘月啄木鳥一個用無灰酒三升先以瓦罐子一個	底鋪荊芥穗葉厚一寸上頓啄木鳥又用荊芥穗葉



蓋一寸厚傾酒在內仍用紙封合塩泥固濟炭煨之
候酒乾青煙出為度去火放冷只取啄木鳥研為
末次入下項藥

石膏

二兩
煨研

鐵粉

用漿水半升煮盡
研細末用一兩

朱砂

一分
水飛研

附

子

一兩正坐者
炮烈去皮臍

射香

一分
研

腦子

一錢
研

右同勻細末每服一錢先令病人呷溫水三两口以
溫酒一盞先少許調藥飲之餘酒送之服畢便就枕
睡少時臨發時一服候一兩日更服一次每兩日一

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

服不過十服即愈予有一親姓王患病十餘年發即
涎潮手足僵蹇顛仆不省服此藥百服而愈小兒可
減服

又方

取芭蕉自然汁時時呷一两口甚者服及五升必愈
前有親姓王同服此得効二者恐不可病廢此亦治
驚癇搐搦邵通直云加射香尤妙

治諸癇通用方



開闕散治諸癰潮發牙關緊急口噤不開不能進藥 蟾酥 片一小 鉛白霜 一字	右研令極細用烏梅肉醮藥於兩口角揩擦良久乃 開以進別藥	蝎稍散治如前 蝎稍 七個 朴硝 一錢	右同研細每用一字或半錢揩牙須臾即牙關口噤 自開然後進別藥	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	定命丹治諸癰發搐壯熱昏塞不省 蝎 七個 天南星 炮烈為末一分 白附子 炮過為末半分 青黛 半錢研	蟾酥 一錢乾者酒浸一宿 射香 一字研	右為細末粟米粥和丸菴荳大別以青黛為衣新生 兒用細粉一捻油兩滴新汲水一蜺殼化藥一米粒 許與服便當小利取下胎中舊糞則驚熱諸疾不生 若患驚癇困重者用荊芥薄荷湯化下一丸得困睡 無疑至覺乃愈但有患者先化下一丸滴入鼻中得



欽定四庫全書		小兒衛生總微論方		鐵粉丹治諸癰瘡搗包絡有涎膏膈不利		半盞去滓溫服無時		右為末每服一錢水一盞入姜二片薄荷三葉同煎		白鮮皮 已上各半兩 天竺黃 甘草 各一分		羚羊角屑 人參 去蘆 茯神 剉去心木已上各一兩 天門冬 去心		人參茯神湯治諸癰發瘡精神昏憤		噎者為必差不噎者難治	
為末 炙焦為末 蠲稍 七箇		鐵粉 一兩 硃砂 半兩 牛黃 一分 乾蟾 一隻生薑自煎汁浸一時		右為細末糯米飯為丸黍米大每服三五丸煎人參湯下無時		大驚丸治諸癰發瘡神志昏亂痰涎壅塞		雄黃 一錢 青礞石 火煨研一錢 鐵粉 二錢 硃砂 三錢 蛇黃 火煨醋淬九次研飛二錢 蝦蟆灰 一錢半		右研勻以水浸餅和丸桐子大每服一圓煎薄荷水磨剪刀股化下日二三此藥治驚化涎不用銀粉							



服之則無他苦不拘時候	睡驚丸治諸驚癇搐搦痰壅昏憤咽膈不利	鐵粉 研末 茯苓 重羅 蛇黃 火煨赤米醋淬七次將醋煮乾為度 使君子	肉天南星 碾為粉以薄荷汁和為餅炙乾	右各秤捌錢末入金銀箔各乙拾片射香一錢腦子	半錢拌研勻細糯米稀糊丸皂子大朱砂為衣每用	五歲上兒一九分二服三歲下兒分三四服並薄荷	湯磨下無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	猪膽半夏丸治諸般癇搐	右以半夏乙兩湯洗七遍用獐猪膽三箇取汁浸半	夏於磁器中日曬乾切片焙燥為細末生姜自然汁	煮麵和丸桐子大每五七丸至十丸煎麥門冬熟水	下食後臨卧各一服忌動風毒物其効如神	天麻防風丸治一切諸癇抽掣搐捻精神昏憤痰涎不	利及風溫邪熱等疾	天麻 防風 去蘆并枝 人參 去蘆各一兩 乾蝎 白殭蠶



去絲嘴並 炒各半兩 硃砂 水飛 雄黃 各研 甘草 炙各一分 牛黃 射香 各研各一錢	右為細末煉蜜和丸桐子大每服乙二丸薄荷湯化下無時	神聖辰砂南星丹諸癰發搐服之曾經大効	右以天南星四十九箇乙般大者於五月五日取活	蝎四十九箇與南星同頓在乙瓦器中盛之用塩泥	固濟外邊周密吊於淨室中至臘日取出揀天南星	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	曾被蝎蜇者用之曾經蜇者有小竅子為驗其不曾	經蝎蜇者不用將可用南星以酒浸乙宿焙乾杵為	末次用好辰砂乙分真牛黃射香龍腦各乙錢研細	乙處拌勻生姜汁和丸桐子大每服乙二粒煎人參	薄荷湯化下無時	蚬散治諸癰經驗	右以蚬蚶三十枚全者用乙大石榴割開頂上取去	穰子作一甕子入蚬蚶在內却以割下頂子蓋之紙



筋黃泥固濟厚半指許初近火炙漸至乾入火燒令		通赤良久放冷取其中焦黑者細研為散每服一字		乳汁調下兒稍大用半錢防風湯下無時		白金散治諸癇潮發不省困重		白殭蠶 去絲嘴直好者半兩 湯洗焙為末 天竺黃一分 真牛黃 細研		一錢 別研 射香 研 龍腦 研各半錢		右拌研勻細每服半錢生姜自然汁調灌服無時		神授至聖保命丹治一切驚癇風瘕中風并胎驚內弔		欽定四庫全書		小兒衛生總微論方		腹肚堅硬夜啼發熱急慢驚風惡候困重上視搐掣角		弓反張倒仆不省昏憤悶亂等疾		全蝎 十四箇青色者 朱砂 水飛二錢 射香 半錢 防風 去蘆并叉枝一錢		金箔 十片 天麻 二錢 白殭蠶 去絲嘴直者一錢 白附子 二錢好者		天南星 一錢 蟬殼 去土泥二錢		右為細末粳米飯和丸櫻桃大以硃砂為衣初生兒		半丸周晬兒一丸乳汁或薄荷水化下三五歲有急		候者用二丸五七歲至十歲常服只一丸此藥性平	



溫不冷不熱大能鎮心神退驚癇安魂定魄祛風逐邪化涎消痰甚有神効世之名醫固多妙藥如或未得此方請試合一料驗之方知子細養小之家能自合之庶不為銀粉藥所誤兼緩急亦可救人服之無時									
青金定命丹治諸驚癇抽掣癡等疾									
水銀研膏辰砂水飛全蝎小者天南星生犀角屑各八分天									
麻白附子燒存性白殭蠶去絲嚼直者各一两青黛半射香									
欽定四庫全書 小兒衛生總微論方									
錢二									
右同為細末先用煮熟棗肉與水銀研膏至無星為度然後和藥末如硬更入棗肉候得所即丸如鷄頭大每服一丸薄荷溫湯下無時									
治驚癇後餘證方									
延壽散治癇搐止後再被驚著仍要發搐									
鷄舌香錢一分黃芪一分蜜一分辰砂水飛五靈脂去砂石半錢研									
右為細末嬰小用一字二三歲半錢四五歲一錢糯									



米飲調下無時

迴魂散治癇搐差後多吐逆腹脹氣急不食及罷驚之後一切虛候皆主之

人參去蘆 茯苓去皮 甘草 白殭蠶去絲 硃砂水飛

分 白附子一錢 全蝎一錢 蟬殼去土淨洗去

右為細末每服半錢或一錢煎冬瓜子薄荷清米飲調下量大小與之乳食前

仙烏豆治因發驚癇之後心神失守而癡

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

號丹二兩 晉礬二兩

右同為末入一合子盛先用蛤粉封口縫後以塩泥固濟炭火煨通赤放冷取出研末以水一斗黑豆五升同藥末於鍋中煮至水盡為度曬乾任意與食服無時

通關散治驚癇退後只是聲啞不能言

右以天南星炮烈為細末嬰小半字一字二三歲至四五歲兒半錢六七歲兒一錢獺猪膽汁調服啞下



便能言語昔錢乙治王氏子慢驚退後不語他醫作	
失音治之不差一曰既失音何開目而能食飲又牙	
不噤而口不緊也諸醫皆不曉一曰此前患驚癇時	
曾用清藥利大小便致脾腎俱虛今補脾實而治驚	
已退腎尚虛怯不能上接於陽故也遂以地黄丸補	
數日能言其方本集載之	
天茄散治驚癇退後筋脉不舒不能行步或因汗出驚	
退而汗出不通所致	
欽定四庫全書	
小兒衛生總微論方	
茄種	見霜者半兩
切碎焙乾	附子
	半兩炮烈
	去皮臍
羌活	去蘆一
分焙	
右為末二三歲兒一字五七歲半錢七八歲一錢射	
香酒調下日三疾愈止服不拘時候	
治驚癇兼別病方	
射香餅子治慢驚因虛而風邪又從背俞襲之入傷心	
肺之經為相合之病成慢驚本証之外更加胃滿短氣	
胃悶不省汗出無時	
外但心中風	
者具中風門中	
川烏頭	半兩炮
去皮臍	天南星
半兩炮	白花蛇
酒浸一宿去	皮骨焙乾半



兩 乾蝎稍 兩半 赤頭蜈蚣 二條酒浸酥炙 射香 兩半 研 乳香 一分 硃砂 一分 飛鐵粉 一分 牛黃 一分	右同拌研勻細酒糊丸鷄頭實大捻扁每服一餅人參薄荷湯化下	烏稍丹治如前	烏稍蛇 水浸去皮 骨二兩 天漿子 二十一箇 天麻 兩 防風 兩 去蘆并叉 天南星 一兩 乾金蝎 一兩 白附子 一兩 枝一兩剉 微炮 去毒	大附子 一枚炮烈 半夏 一兩湯洗七次 人參 一兩 去皮臍 去蘆	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右都一處好酒浸三宿取出焙乾為細末次用水磨雄黃一兩辰砂一兩同研細水飛焙乾射香二錢龍腦一錢各研細與上件同拌勻糯米飯和丸黍米大每服五七粒至十粒十五粒量大小加減金銀薄荷湯送下神驗不拘時候	乾漆 杵碎炒令 白蕪荑 去皮各等分	呼搐搦漸成危急	乾漆 杵碎炒令 白蕪荑 去皮各等分



右為末每小者一字大者一錢米飲調下日三量大 小加減以差為度乳食前	絳朱丹治驚癇涎痰咳嗽喘滿 南星 二兩 炮 半夏 三兩 湯洗 七次去滑 白礬 一兩 過秤 滑石 二兩 火煨	通赤鉛霜 半兩 研	右為末糊丸麻子大朱砂為衣每服十丸生姜湯送 下乳食前	緩息湯治虛而生風發搐喘滿 此慢驚候	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	桑白皮 三兩 去黑皮 白茯苓 一兩 白殭蠶 一兩 去絲嘴 杏仁 一兩 去皮 尖炒黃荊 一兩 後入 研 甘草 半兩 炙 人參 半兩 去蘆 桔梗 兩 去挫 白	術 二兩 陳皮 一兩 去白	右為末每服一錢水一盞入生姜三片同煎至六分 去滓放溫時時呷之此黑孩兒栢防禦方也服之便 定	青金丹治諸癇諸疳諸蟲瀉痢等疾	青黛 二分 研 雄黃 二分 研 硃砂 二分 研 胡黃連 二分 膩粉



熊膽化溫水 盧會各一分 白附子 腦子 射香各半	蟾酥一皂子 水銀皂子大一塊	右為末同勻用獺猪膽汁熬過浸少蒸餅和丸黃米	大一歲兒二丸量大小增減如諸癰潮搗先以一丸溫	水化破滴鼻中令嚏吊眼者自下搗搦亦定更用薄	荷湯化下一二服如變蒸寒熱亦薄荷湯化下諸般	瀉痢米飲下諸疳粥飲下疳蟲虻咬苦練子湯下疳	蝕口瘡鼻爛乳汁研塗疳眼雀目白羊子肝一片竹	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	刀批開研藥作末摻在肝片內麻纏米泔煮熱空心	服乳母常忌毒魚大蒜鷄鴨猪肉	如聖青金丹治一切風癰搗搦及寒熱腹痛諸蟲五疳	八痢肚大脚細泄瀉無時天弔胎驚睹風癰病熱疳口	瘡等疾悉能主之	青黛半 瓜蒂一分 硃砂一分 水飛輕粉一分 蟬殼去土 雄黃	一分 盧會一分 胡黃連一分 熊膽一分 射香少	右為末勻細用獺猪膽汁和丸桐子大磁合貯之諸



般驚癇風疾搐搦上視溫水化一九滴鼻中嚏噴立
効更用薄荷水化下一丸以患泄瀉腹脹肚大脚細
諸疳米飲化下餘同前方

射香丸治諸癇諸疳等疾

龍膽草去蘆 胡黃連去須各半兩 木香 蟬殼去土一分 瓜蒂

龍腦 射香 牛黃各一錢

右為末勻細猪膽汁和丸作兩等丸大者如菴豆小
者如黍米治疳眼用猪肝湯下五七丸至一二十丸

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

量大小用藥增減疳渴者猪肉湯下驚癇發搐上視
薄荷湯下更研一九滴鼻中牙疳鼻疳口瘡研末傳
之蟲痛煎苦練湯或白蕪荑湯下百日內兒大小便
不通水研封臍中諸蟲証加乾漆射香各少許入生
油一兩滴溫水化下驚疳或瀉清米飲下病急者研
碎服之病緩者浸化服之若極虛慢驚者不得與服
急驚痰熱尤宜服之

奪命丹治一切諸般驚風天吊暗風癇病胎驚發搐上



視身直背強及治五疳肌瘦羸瘠肚大脚細髮稀饒渴 又治便痢膿血水穀不化洞泄下注并溫壯身熱口瘡 煩燥叫啼等疾 硃砂 半錢 研 射香 研 麒麟竭 半錢 研 牛黃 研 龍腦 研 沒藥 研 熊膽 研 粉霜 一錢 研 青黛 三錢 研 使君子 十箇 去殼 麵裹煨熟為末	右相和再研勻細取井花水滴水為丸如豌豆大每 服一粒以薄荷自然汁半蜆殼許化開入溫湯半茶	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	脚調勻服之若諸疳瀉痢不止或驚熱涎盛弔眼發 搐者以三丸化下更量大小加減	治諸驚癇客忤 以射香當門子一粒好朱砂一塊如當門子大同研	極細溫熟水調下未能服者灌之	治驚癇夜啼 以仙人杖安兒身邊令睡 仙人杖乃笋欲成竹時立死者	中風論



小兒血氣柔弱肌肉脆薄若寒溫失度則膚開而為風邪所中始著俞穴而行經脉次隨血氣而入府藏從其所著即生病焉其入府藏者唯心肺二藏居膜鬲之上空隙之處又俞穴亦在於上故風乃易中而有患者其狀昏困不省手足抽掣心胃滿氣短多汗此尤為急大抵其餘府藏皆居鬲膜之下疊實之處又俞穴亦在於下故風乃難中而無患者其入於經脉者為病甚多今採其有患者具之風癰者一云風座風邪傷中陽經也或因

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

解脫或臍瘡未合為風所傷皆令發癰其狀口噤不開項背身體強直耳中策策而痛一向昏憤不省其脉如弦直上下也雖與驚癇相似然發而時省身軟者驚癇也若發不時醒身鞭強直者風癰也其卒然身癰者死風角弓反張者亦由風傷陽經也故令腰背反折不能俛屈如角弓之狀此亦頗似癰病然癰病身體強直此病身體反折所以異也 風口噤者手三陽之筋入絡領頰足陽明之筋上夾於口風邪中於諸陽之筋使關



為末 一兩 硃砂 半兩 研飛龍腦 一錢	烏蛇肉 酒浸去皮 骨焙一兩天麻 兩 全蝎 兩 去毒一 殭蠶 兩 去絲 嘴炒	出不休	半金散治心肺中風昏困不省心胃滿悶抽掣短氣汗	治心肺中風方	不出體直者死	邊人中左右有色白可治若一黑一赤吐沫者難治汗	人事喉中噫噫有聲舌強不能言汗出身軟眼下鼻兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	不省者由風邪先中於陰病發於五藏其狀奄忽不知	又云夜卧當耳有隙因風入耳亦令人口喎也 風癱	喎斜目不能平視語不能正也診其脉浮而遲者可治	眼喎斜者由風邪入於頷頰之筋其脉偏急故令口眼	絃者筋急拘攣也若脾脉緩弱者四支不隨也 風口	邪冷則四支拘攣熱則緩縱不隨也診其脉脉急細如	拘攣及不隨者風邪寒熱入於經絡搏於筋脉筋脉受	機攣急不利故使口噤不能開也診其脉遲者生 風



右為末拌勻細每服半錢溫湯調下無時	比聖丹治如前	乾全蝎 去毒一兩 微炒 羌活半兩 白附子 半兩 天南星 半兩	黑附子 一枚重半兩上 炮烈去皮臍	右為細末入膩粉一錢研勻煉蜜和丸菴豆大每服	五七粒荊芥湯下無時	白花蛇散治心肺中風聲不能出	白花蛇 腰以上者酒浸去皮骨炙黃一兩 羚羊角屑 一兩 桂心 一兩 葛	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	蒲 一寸九節者一兩 人參 去蘆一兩 川烏頭 半兩炮烈去皮臍稱	右為細末每服一字或半錢射香荊芥湯調下併二	三服無時	治風瘧方	通聖散治中風瘧病口噤體強耳中策痛昏憤發不時	省	蝎尾 二十一箇 去毒 晚蠶蛾十四箇 天漿子 去殼十箇 白附子	半兩已上為末硃砂 一分 飛射香 一錢 研



右拌研勻每服一字或半錢薄荷湯入酒兩滴調下	天南星膏治如前	天南星 二兩為細末酒調慢火熬成膏 赤頭蜈蚣 半兩酥炙 全蝎 半兩烏	蛇肉 酒浸去皮骨半兩 硃砂 一兩飛 牛黃 一分 射香 一分	研	右同勻細入南星膏和劑石臼中杵膏軟硬得所為度每服一皂子大薄荷自然汁入酒一滴同化服之無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	二証同治方	烏犀煎治心肺中風及風癰病	烏犀屑 一兩 天南星 半兩 白附子 半兩 天麻 半兩 白花	蛇 酒浸去皮骨 蝎 半兩 稍 去毒	右為細末用無灰酒兩大盞銀器中同熬成膏每用皂子許射香湯化下無時	奪命散治如前	乾蛇頭 一箇酒浸 赤頭蜈蚣 一條酥炙 乾全蝎 去毒一分



麻黃去根節 一分 草烏頭一箇去皮尖炒 硃砂研 一分 牛黃研 一分 龍腦研 一錢	右拌勻細每服一字溫酒調下無時	烏蛇散治如前及治風角弓反張并一切諸風之病	烏蛇肉生 一兩 石菖蒲節者良 一兩九 天麻兩 半 全蝎去毒 半兩 殭	蠶炒去絲 半兩 附子一枚半兩者 一兩 羌活去蘆 半兩 人參去蘆 半兩	半夏一分湯洗 一分 白附子炮 一分	右為麤末每二錢水二盞生姜十片薄荷五葉同煎	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	至一盞濾去滓放溫時時滴口中	治中風角弓反張方	歸魂散治中風腰背反折如角弓之狀	蝎稍一錢 半 赤足蜈蚣半條 水銀粉字 一 川烏頭尖二	炒令深 半 白花蛇肉酒浸取炙 天南星切碎生薑自然汁浸一宿	焙乾 半 腦子一 半 射香字 一	右勻細末三歲下兒一字上至四五兒半錢金銀薄	荷湯調下量大小虛實加減無時



水銀丸治如前	水銀 蛇黃 燒赤米醋 輕粉 三錢 雄黃 研水飛 生犀	末 半錢	右同為末勻以青州棗肉和丸大豆大一歲兒蜜水	化一丸無時	治中風口噤方	石膏湯治中風口噤頰緊急冥冥如醉	石膏 獨活 去蘆 川升麻 各一兩 麻黃 去根 桂枝 赤	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	芍藥 防風 去蘆并 細辛 去苗各半兩 甘草 一分	右為末每服一大錢水一盞入薄荷竹葉各數片煎	至五分去滓溫服無時	羌活紫湯治中風口噤身體強直	右以羌活一兩去蘆頭剉碎酒三升浸一宿用黑豆	一升淨淘炒煙出乘熱就鍋中以酒藥沃之放溫去	滓每服一注子灌之日二三服無時	雀矢丸治中風口噤聲音不出飲食不下



右取雄雀糞研末糊丸麻子大飲下三二丸薄荷湯亦得大良雀矢白亦佳	又方	治口噤領急風中陽經	右以白棘燒灰研為末水調一錢匙服	又方	治卒口噤不開	右以附子末蘆管吹入口中甚良	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治牙噤不開	以天南星一枚煨熟乘熱用紙封裹不令透氣仍於上尖處剪一雞頭大竅子透氣於鼻中立開	治中風拘攣不隨方	獨活黃芪湯治中風四肢拘攣	獨活 黃芪 酸棗仁 湯浸一次 各一兩 麻黃 去根 節 羚羊	角屑 桑白皮 剉 肉桂 去粗皮 芎藭 各半 兩	右為細末每服一大錢水一盞入生姜薄荷各三片



煎至五分去滓溫服無時	赤箭湯治中風半身不隨	赤箭 一兩 殭蠶 去絲嘴微炒半兩 白附子 半兩 獨活 去蘆半兩 麻黃 去根節 白花蛇 酒浸去皮骨各半兩 杏仁 三十箇鉄炒去皮尖研後入	右同為末每服一錢水八分煎入石榴皮少許煎至五分溫服無時	治中風口眼喎斜方	防己湯治中風口眼喎斜視不能平語不能正	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	漢防己 川升麻 天麻 川芎 各一兩 桂心 羚羊	羊角屑 麻黃 去根節各半兩	右為細末用杏仁一分湯浸去皮尖炒黃研細拌勻每服一錢水一盞入生姜三片薄荷三片同煎至五分去滓稍熱時時與服	二聖散專治中風口眼喎斜	蟬殼 去土一兩五月五日取東南枝上者 寒食麵 一兩	右同研勻細每用半錢以醖醋調攤薄紙上如膏藥



花子貼患處左斜貼右右斜貼左如口正急以水洗去之		全蝎散治中風口眼喎斜語言不正手足偏廢不舉		全蝎 去毒炒 蠶 去絲嘴直者炒 川芎 黄芩 大天南星		湯洗七次去皮臍切焙 甘草 炙 桂 不見火 赤芍藥 麻黄 去根節各		三錢 天麻 六錢		右為粗末每服二錢水一盞生姜七片煎至六分溫服無時		欽定四庫全書 小兒衛生總微論方		硃砂丸治中風口眼喎斜筋急牽引		硃砂 半兩研飛 乾蝎 微炒 天麻 白附子 炮 牛黄 白蠶 去絲嘴微炒 乾姜 炮 射香 研各一分		右為細末拌勻軟粳米飯和丸黍米大每服三錢乳汁送下日三服無時		又方名同治同		硃砂 研水飛 乾蝎 去毒微炒 蠶 去絲嘴微炒 天南星 炮烈各半兩		白附子 炮一分	



右為細末糊丸菴荳大一歲兒一九薄荷湯下隨數加之無時	治風癱不省方	槐子煎治中風癱困不省	槐子微炒白殭蠶去絲嘴防風去蘆白附子炮各乾姜	炮麻黃去根節半夏湯洗七次各半硃砂半兩牛黃	一分射香一分金箔二十片研後入	右用好醋兩大盞與前藥熅火熬成膏次後入後藥	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	和勻成劑圓菴荳大每服五丸溫酒送下量大小加	減牙關噤者斡灌之	急風散治如前	白附子四枚大者全蝎去毒五枚炙天南星一箇剉炙	半夏十箇湯洗七次去滑蟲天麻一分膩粉半錢	右為細末每以一錢分四服薄荷酒調下立效能治	一切諸風更量大小與之	愈風湯治如前





欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷七

傷寒論

經曰傷寒有五有中風有熱病有溫病有中濕有傷寒

其所苦各不同此五者配入五氣隨四時為病故春風

夏熱秋濕冬寒中溫而傷寒則居一焉

其細論在傷寒類証集中

四時之病皆謂之傷寒者乃總槩之名也內熱病者乃

盛暑之時炎熱之氣中人為病也又名曰中暍濕病者

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

乃雨露霜霧烟嵐水漬濕氣中人為病也小兒無此二

病謂小兒不治家事未有幹辦早卧晚起不致衝冒故

也外傷風傷寒溫病小兒有此三病謂嚴寒厲風溫氣

無所不至小兒肌肉脆軟氣血柔弱易為傷之故也是

三病者其證其脉不可診切兒稍大者可切脉而別之

傷風之脉陽浮而陰弱也傷寒之脉陰陽俱盛而緊瀼

也溫病之脉行在諸經未知何經之動隨其經之所在

而取之也若嬰小未能診切者但看其形候耳



夏應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反溫言此時	溫病者四時之間非節候邪氣傷人如春應溫而反寒	宜溫之	若脉微細身冷不甚頭痛體疼面青四肢冷者為陰証	脉洪盛身體壯熱頭痛面赤四肢暖者為陽証宜汗之	惡寒者雖不當風而亦自憎寒也以此別之治者若	不惡風而惡寒其惡風者當風而乃憎寒也其	而不舒手足指末微冷不煩燥而惡寒	涕咳嗽寒毛立氣促急或嘔吐白水寒多熱少面色慘	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	後非中膈	之熱病	其候面赤渾身壯熱頭痛體疼鼻塞聲重清	發者為溫病	一云在夏至之前	夏發者為熱病	一云在	者氣行而已怯者則着而為病其即發者為傷寒至春	傷寒者乃冬時嚴寒之氣傷人入於腠理當是之時壯	者有不能食者其飲水能食者可微下之餘不可下也	光而不慘手足皆熱煩燥治當發散有飲水者有能食	悶口中氣熱或自汗惡風發熱鼻鳴乾嘔熱多寒少面	傷風者乃四時八方為厲之風傷人其候昏睡呵欠頻



通行此氣為病無少長畧同故名天行時氣又名時行
溫病其候頭痛身重壯熱體疼與傷寒相似但臨時看
其脉與其証以屬何經受病隨經而辨之為治也已上
三病通以傷寒為治邪在外者解之汗之邪在內者溫
之下之當隨証按法而行之錢乙言傷寒男體重面黃
女喘急面赤各憎寒口中氣熱呵欠頓悶項急此乃不
分傷風傷寒而槩言之也況傷風傷寒証候傳變多端
自有專經可憑孫真人云治小兒與大人無異惟減用

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

湯劑極少耳更有傷風寒而兼食者俗呼謂之夾食傷
寒也其候壯熱煩渴鼻塞聲重四肢困倦眼黃腹中脹
痛延唾嘔逆或呵欠頓悶治者不先攻所傷但先解表
候已表解然後下之則病與食皆去也若不顧其表便
以藥攻之多致結痞也又有因失饑而食寒飲冷傷於
脾胃而中風寒其候胃膈不快腹脹而痛面色唇口皆
青手足逆冷脉沉細者此寒傷於脾寢屬太陰庸工不
識以為胃膈不快妄用針灸或便投駛藥則胃膈愈不



快而吐利只一兩日間便致危殆此不明之誤非其治也所謂傷寒本經藥証甚多難以具述今採其小兒常所患者之方及有兼見之証畧為條叙傷風寒手足冷身熱面赤頭痛者此脾怯也宜先和脾然後發散傷風寒自利者脾虛也宜先補脾然後發散未差者先調順其中有下証者微下之有驚者退之

傷風寒腹脹而喘者脾虛也宜先補脾去脹定喘候喘定然後發散

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

傷風寒得下後大勢已退而餘熱未解者是下之太過胃虛而熱乘之故也胃中虛熱者飲水無多當生胃中津液津液得生則熱與渴皆止矣

已上錢乙論其治方本集載之

傷風寒其熱在外者為表病若未入於裏而下之太早裏虛氣逆熱結胃中堅鞭而痛者此為結胃但若硬滿而不痛者此為痞氣若因飲水得者則為水結若三四日外熱入於裏則腹滿痛內實有燥糞者當下之若熱入大腸則為大便秘澀不通若熱入小腸則為小便難



澁不通熱入大小腸則為大小便不通熱入脾胃脾胃
屬土候於肌肉熱盛蘊蒸於外則為發黃熱熏於心胃
則為煩躁津液耗減者則為發渴熱上衝咽喉口舌者
則生瘡腫疼痛有血泄者血得熱則流溢妄行從鼻出
者則為衄血從口出者則吐血從大便出者則便血從
小便出者則遺血若壯熱未汗躁喘鼻鳴因衄一升數
合而熱得歇者病則解矣若出至二三升者危矣若熱
毒積滿於內不得時下致毒乘瘀血則煩盛發狂若燠
欽定四庫全書
小兒衛生總微論方
塞昏冒悶亂者死若胃有寒氣相搏則嘔哕咳逆若肺
有寒相搏則咳嗽氣急若氣怯者傳變入陰則四肢厥
逆面青體冷下利清穀並當隨証施治
錢乙論傷風傷寒瘡疹傷食壯熱昏睡一皆相似若倉
卒未能辨認之間但與升麻葛根湯惺惺散小柴胡湯
此數藥通治甚驗
聖惠方云嬰孩傷寒不可用性燥藥發汗燥加腑臟熱
極傷心則厥逆而難治又不可用性熱藥乃助陽陽極



則陰爭四肢汗出如油手足或冷或熱多致發狂顛癇
搐搦為難治又不可用性寒藥寒則陽受其冷則寒熱
相擊一向叫啼不睡使熱上衝於腦則頭骨縫開為難
治予流落錢塘就館於親僚蘇伯正防禦家伯正以醫
治傷寒名聞予常觀其用藥次第若小兒傷寒壯熱頭
痛體疼脉大鼻寒聲重嚏咳呵欠惡風憎寒病在表可
汗者用銀白散熱多者甘露散有食飲宿滯脾胃不和
者以安胃丸間服膏膈不快者以香殼散間服煩渴飲
水或作寒熱者炙砂散間服有驚者天麻防風丸人參
化風膏涎盛咳嗽者小珍珠丸如此施治隨手得愈者
十有八九餘一二者乃病久傳深或已成壞証方纔請
召亦依法調治乃得痊可其所用之藥多非古方性不
燥熱率皆溫平是謂達南北之異地識寒熱之所宜深
通古人治病之大體也予盡得其方今與諸方共叙于
後

銀白散治傷寒壯熱頭痛體疼脉大解表發汗夾驚者

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方



皆可服

右以煨熟寒水石半斤研極細入炒熟黃丹一錢半
研勻如淡即添入些小以紅粉色為度每服一錢生
姜湯調下未能飲者稠調抹口中以乳汁送下無時
甘露散治傷寒壯熱頭疼體痛解表發汗及熱多者
右以好滑石二兩研細入甘草末半兩拌勻每服一
錢以濃煎蘿蔔湯調下一方更有防風半兩為末同
研勻滑石可用桂府白色者妙

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

安胃丸

乃化滯丹
小丸子也

香殼散治傷寒心胃滿悶不快

右以橘皮洗去穰為細末每服一錢生姜湯調下乳
前食

靈砂散治傷風寒溫熱表裏未解頭痛發熱口燥咽乾
煩渴引飲或水入即吐小便不利或作寒熱及汗出表
解而煩燥不止

右以五靈散半兩入硃砂細末一錢同研勻每服一



小錢米飲調服無時	天麻防風丸人參化風膏二方俱具驚癇門	小珍珠丸治風壅痰實利咽膈除咳嗽止煩熱清頭目	半夏 湯洗七次焙乾為末 白礬 燒汁盡研末 寒水石 煨通赤出火毒	研一兩	右拌勻研細麵糊和丸黃米麻子菴荳三等丸子每	服五七丸至十丸溫生姜湯下食後量大小加減與	服	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	歡喜散治傷風寒發熱頭痛無汗惡風或溫熱鼻塞清	涕淚出嚏噴	防風 去蘆并義枝 人參 去蘆 甘草 炙 天麻 去蘆 前胡 去蘆各	白茯苓 去黑皮 桔梗 去蘆各 枳殼 去穰麸炒 川芎 三錢	右為細末每三歲已上抄一錢水六分薄荷兩葉同	煎三兩沸通口服無時	紅綿散治傷風寒及夾驚取汗	麻黃 去根節 全蝎 炒 大黃 紙裹煨熟切焙 甘草 炙 白附子



蘇木劉生各炒天麻一分	右為細末一歲下兒服一字已上兒半錢四五歲一錢水一小盞以綿少許裹藥煎之至綿紅色即去綿	溫服	坯煎散治傷風寒夾驚潮發頭痛體熱咳嗽手足冷	麻黃去根節人參去蘆茯苓白殭蠶去絲全蝎	天麻白附子甘草炙各一分硃砂三錢川烏炮去皮尖	半一錢	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為末每服半錢至一錢水五分入坯子烟脂一豆大薄荷兩葉葱白一寸同煎至四分放溫服不拘時	千金丸治傷寒夾風夾驚夾食取微利	硃砂末一錢全蝎七箇白丁香七箇膩粉一錢射香半錢	右為末勻白飯和丸蘿蔔子大薄荷湯下一歲兒三丸量大小加減無時	茯苓散治傷寒數日膏膈不利調中養胃	赤茯苓一兩陳皮三分桔梗去蘆甘草炙半兩



右為末每服一錢水六分入生姜二片煎至四分溫服無時	枳實散治傷寒已汗未汗卒胃膈痞痛	右以枳實麵炒黃為末每一錢或半錢米飲調下無時	竹瀝治傷寒數日煩燥不解	右以竹瀝新汲水各半茶脚和勻服無時	真珠散治傷寒口乾心神煩燥	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	真珠 末研 龍腦 末研 牛黃 各研半錢 瓜蒌根 茯神 去心木 硃砂 一分 牙硝 寒水石 各煨半	右為末勻每服半錢蜜水調下無時	秦艽煎治傷寒心神煩燥口乾煩渴	右以秦艽半兩去蘆細剉用牛乳半盞煎至六分去滓放溫分三四服無時	藕汁蜜治傷寒煩渴	右以生藕搗取汁半茶脚許入蜜一錢調勻服無時



葛根湯治傷寒發熱煩渴	葛根 人參 去蘆各半兩 麥門冬 去心 白茯苓 甘草 炙
澤瀉 各一分	右為末每服半錢或一錢水半盞薄荷兩葉煎至四分
去滓溫服無時	百合散治傷寒腹中滿痛
右以百合半兩炒黃為末每服半錢或一字米飲調	下無時
欽定四庫全書	小兒衛生總微論方
黃芩散治傷寒五六日大便不通熱燥悶亂	黃芩 枳殼 去穰 大黃 大腹子 各半兩
右為粗末每服一錢水半盞煎至四分去滓服不拘	時
犀角散治如前	犀角屑 川大黃 炮 柴胡 去苗各半兩 人參 去蘆一分 朴硝
甘草 各半分	右為末每服半錢水五分入棗一箇煎至四分去滓



溫服量大小加減	石驚散治傷寒小便不通小腹脹滿	右以石燕火煨為末葱白湯調下一字以通為度無	時	又方	右以萱草根煎湯調五苓散服之乳前食	葛根汁治傷寒衄血不止	右以生葛根汁一小盞分三四服即止無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	立應散治如前	蒲黃 乾葛根 末 石榴花 焙乾末 各一分	右為細末每服半錢或一字生地黃汁調下併二三	服止無時	又方	以黃藥為末每服半錢或一字新汲水調下無時	金汁蜜治傷寒衄血數日不止	生地黃汁 小半 白蜜 小半 蒲黃 半



右和勻微煖過每服半茶脚許無時	神白散治傷寒吐血衄血咯血大小便利血	槐花 一分 蛤粉 半	右同為細末每服一錢或半錢煎柳枝湯放溫調下	如脩合不及但以柳枝為末新水調下亦可	香墨圓治傷寒衄血兒小不能服散藥者	右以好細墨為末雞子清和圓黍米大每五七圓飲	下或灌之	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	地黃汁治傷寒吐血心育不利煩渴不已	右以生地黃杵絞取汁量大小與之亦治衄血	麥門冬湯治傷寒咳嗽喘息	麥門冬 去心 欵冬花 去枝 人參 去蘆 紫苑 洗焙各 桂心	半 甘草 一分	右為末後入杏仁二十枚麸炒去皮尖研細拌勻每	服一錢水一盞生姜二片煎至六分去滓溫服無時	一捻金散治傷寒風熱咳嗽



白殭蠶去絲嘴 一錢 甘草半兩 炙 延胡索去皮 一分	右為細末每服一捻薑汁調下無時	潤肺散治傷寒鼻塞涎壅咳嗽肺氣不利語聲不出	麻黃去根 節 人參去蘆 各一兩 杏仁去尖 炒 貝母去心 炒	甘草炙 半兩 陳皮去白 一分 桔梗去蘆 一分 阿膠蛤粉炒 如珠子	大用 一分	右為末每服一錢水八分煎至六分去滓溫服無時	赤芍藥散治傷寒陽証咳逆	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右以赤芍藥沸湯浸七遍每遍以瓦盆蓋少時數足	取出炒燥為末每服一錢豆豉三粒生姜一片水七	分煎至五分发溫服無時	葶良湯治傷寒寒多咳逆	葶澄茄 良姜各等分	右為末每服一錢水六分煎數沸入醋少許攪勻帶	熱服	靈砂膏治傷寒脉數熱入胃嘔吐



澤瀉 二兩 半 桂 去皮 一兩 猪苓 去皮 一兩 赤茯苓 去皮 一兩 白朮 去蘆 各 半	右為末煉蜜和膏雞頭大每服一丸生姜自然汁化破與服只未用便是五靈散亦治發熱煩渴飲水水入即吐或小便不利瘀熱在裏發黃濃煎茵陳蒿湯	調下餘病飲調	四味人參湯治傷寒脉遲胃冷嘔吐	乾姜 炮 黃芩 黃連 去蘆 各 須人參 等分	右為粗末每服一錢水六分煎至四分去滓溫服無	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	時	附子姜朴丸治傷寒寒多嘔吐手足厥冷	附子 炮去皮 臍半兩 乾姜 一分 炮 厚朴 去粗皮 生 姜製 一分	右為末糊丸麻子大每服五七丸米飲下無時	半夏湯治傷寒嘔逆不下乳食	右以半夏半兩湯洗七次去滑生姜一两同剉碎焙	乾每服一錢水一盞煎至五分去滓時時與服無時	蘆根飲子治傷寒乾嘔及反胃嘔吐



生蘆根 切 青竹筍 各二 糯米 半 生姜 半	右咬咀先以水一升煮千里鞋底取半升澄清下藥 再煮取二三合隨意服量大小加減	小半夏湯治傷寒乾嘔欲死	半夏 生姜 各一	右咬咀以水一大盞入藥煎留半盞去滓分數服	三黃散治傷寒發黃	川大黃 半兩剉 黃芩 一分 黃連 一分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為末每服半錢水六分煎半去滓溫服無時	大麥苗汁治如前	右取大麥苗搗爛絞汁與服小麥苗亦得	人參柴胡 去 白朮 白茯苓 青皮 去 桔梗 去	項背拘急支體疼痛乾嘔逆或作寒熱發歇無時煩 渴不食	麥門冬 去 川芎 白芍藥 甘草 炙 桑白皮 升



麻各等分	右為末每服一錢或二錢水一盞烏梅一箇同煎至六分量大小分服無時	治傷寒時氣頭痛不可忍	右以朴硝研細末生油調塗頂上	治傷寒毒攻手足痛者	右以羊桃汁雜塩豉汁漬之	黑龍散治小兒傷寒在表服冷藥寒伏於中危困不得	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	汗	麻黃去根節三分竹筴一分蘇木一分蝎稍二十箇烏龍土一分	乃火團也	右為末每服半錢水五分煎至三分溫服無時	鷄白調散治傷寒傷風發寒熱似瘧久不差漸變骨間	蒸熱	硃砂飛水白礬枯鐵華粉粉霜鈆白霜各一錢輕	粉白附子各二錢蝎稍六箇龍腦射香各少許



右為末每服半錢入鷄子白井花水共約一茶脚調 勻服無時	茵陳散治傷寒發黃不可下 茵陳 一兩 白朮 半兩 甘草 半兩	右為散每服半錢沸湯調下小便不利者加茯苓一兩	絳雪丹治傷寒五六日發黃小便不利煩躁熱悶飲水 煩躁不解	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方 硃砂 半兩 研 硝石 二兩 研 龍腦 少許	右同研勻細白米飯和丸鷄頭子大沙糖水化下量 大小服	商陸散治傷寒咽喉腫痛 右以商陸根切碎杵爛炒熟用手帕子裹之熨腫處 冷即易之	甘桔湯治傷寒咽喉妨腫 桔梗 去蘆一兩 米泔浸一宿焙乾用 甘草 二兩 炒



右為末每二錢水一盞煎六分放溫冷細細呷服	黃蘗蜜治傷寒熱毒口舌生瘡赤爛	右以黃蘗去粗皮用蜜漬一宿微煎過含之嚥汁勿絕或以黃蘗為末同煎膏含之量多少	黃芩湯治傷寒口舌諸病舌黃舌黑舌腫舌裂舌上生	芒刺舌上出血皆治	黃芩 三錢 赤芍藥 二錢 甘草 二錢	右呖咀每二錢水一盞煎至六分去滓溫服亦主鼻	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	魴	勝金錠子治傷寒結育氣痞並主之	大黃 半兩 枳殼 去穰麸炒 黃 淨一兩	右為細末煉蜜和劑捏作餅子如小錢大結育者用	芒硝半錢同生姜水化半餅或一餅服之痞氣者煎	陳皮湯化下無時	生熟散治傷寒結育硬痛	右以草烏頭二箇一生一炮同為末生姜自然汁和



勻為丸如鷄頭子大每一丸用蜜湯化下	芫花熨法治傷寒因飲水心下結痞硬痛名水結	右以芫花醋拌勻慢火炒熟用綿裹熨之冷即易再	炒用以効為度	藍靛治傷寒熱毒乘心神志胃悶煩躁昏亂	右以藍靛一字或半錢新水調下	苦參酒治傷寒熱毒結在膏膈六七日望死	右以苦參半兩剉碎用酒一盞煎至半盞去滓放溫	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	分三四服連併服之須臾吐出羊膽汁立愈	黃連湯治傷寒熱入腸胃下痢膿血	黃連去須微炒二兩黃蘗一兩剉微炒阿膠一兩蛤粉炒梔子仁兩半	右為麤末每服一二錢水六分煎至四分去滓溫服	無時	梔子仁湯治傷寒熱毒攻於腸胃下赤汁或如爛肉鴨	肝壯熱腹痛	梔子仁二十箇豉二合薤白一握切



右以水二大盞同煎至一盞去滓量大小分作數服
無時

烏仙散治陰証傷寒四肢厥逆

右以川烏不拘多少童子小便浸不計日數直至浸
脫皮時用水淨洗切碎燉至八分乾便以紙袋盛弔
於當風處用時旋取為末臘茶調下半錢量大小及
病勢與之

燒附散治傷寒陰盛隔陽身冷厥逆脉沉細而煩躁體

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

冷

右以大附子一枚半兩者入急火燒微存中心二三
分取出用甕器合蓋放冷為末更入臘茶末一大錢
同研勻細每服半錢水一小盞蜜少許同煎半盞去
滓溫服服訖須臾躁止得睡汗出而解又一方燒附
末每一字或半錢酒調下頻服取汗出差小兒本怯
者最宜服

茱萸熨法治傷寒陰証厥逆



小兒衛生總微論方卷七				証依法為治耳	詳脩今集小兒傷寒截方如或有証候未盡者請照類	傷寒之病傳變証候甚多予當編傷寒類証論方亦頗	時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	錢水一盞半入生姜七片棗一枚煎至四分溫服無	右以川烏一两火炮去皮臍為細末每服一錢或半	玉女散治傷寒汗後潮熱日發諸藥不効	右以牛蒡根杵爛絞取汁服看大小多少與之	不能食	牛蒡根汁治傷寒汗後餘熱不退煩躁發渴四肢無力	以熨脚心冷即易之候氣通暢勻暖即止	右以茱萸半升酒和勻濕用絹袋二枚盛蒸令熱甚



欽定四庫全書

子部
小兒衛生總微論方卷
九

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣王鍾岱



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷八

瘡疹論

瘡疹之候古今皆云大率與傷寒相似然亦有小異也其初覺之時頭痛體重面赤氣麤壯熱多睡驚悸呵欠頓悶咳嗽嘔逆噎噴此皆同也其瘡疹者不惡寒而惡熱面色與四支俱赤眼睛黃手足厥唇紅耳尖冷尻骨冷小便赤大便秘其脉三部皆洪數絕大不定是其候

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

也此小異耳傷寒者宜發散解之瘡疹者宜溫平處惟不可妄發妄下又不可令受風冷其瘡疹乃兒在母胎中之時食母血穢滋養兒五藏之氣至生下已後其毒不拘何時須當出矣惟年小者皮膚嫩軟瘡出駛易

歲已下者

若長大者皮膚厚鞭瘡出艱難

謂數歲已上者

然小兒所

謂數

蓄胎中穢毒因中寒溫蘊發生熱三日已上熱運入皮膚始如蚊蚤咬成赤點或如沙粟癰疹風痲之類漸漸出而作瘡也前人言瘡疹有表裏証其瘡皮厚如赤根



白頭漸加赤腫有膿差遲者謂之大痘此謂表証發於
藏也其瘡皮薄如水泡破即易乾者謂之水痘此為表
証發於府也此言雖簡然未盡善此但言膿泡水泡二
種外斑疹又不知屬何所主也不若錢乙所論其瘡出
有五名以屬五藏之液其狀有五象以屬五藏之色肝
為水泡主淚以淚出清如水其色青而大肺為膿疱主
涕以涕出濁如膿其色白而大心為斑主血其色赤而
稍大脾為疹主裏血其色黃赤而小腎為倒靨其色黑
欽定四庫全書
小兒衛生總微論方

細說
在后諸藏內惟涕淚出多故水泡膿疱皆大血營於內
所出不多故斑子疹子皆小也又病水泡膿疱者涕淚
俱少以液從瘡出故也譬如泡中容水水去則泡瘦矣
凡瘡疹初欲出之時則五藏証皆見以熱併動於五藏
也及至已出時乃得歸一藏者以一藏受穢多而毒氣
盛也亦有兩証三証同出者所受同而併發也

細說
在后昔
錢乙治睦親宅十太尉疹子與衆醫坐上問曰疹未出
何屬一曰胃熱一曰傷寒不退一曰在母腹中時有毒



乙曰若言胃熱何乍涼乍熱若言傷寒不退七日之外則為再經何証不相應若言母腹中之毒今發屬何藏皆無以對乙復曰兒在母胎中至六七月已成形食母腹中穢液入兒五藏至十月即穢液滿胃至生時兒口中猶有不潔產母以物拭清又以黃連汞粉下其臍糞之穢此母穢液不潔餘氣在兒藏中因遇寒溫邪氣相搏而發熱出成瘡疹也未出欲作之時熱動五藏則五藏之証皆見呵欠頓悶肝也時發驚悸者心也乍涼乍熱手足冷者脾也面頰赤咳嗽嚏噴者肺也惟腎無証以其腎在府下不能食其穢液其候平者但骭冷耳冷者是也骭耳俱屬於腎居北方主冷故也瘡既出則歸一藏肝為水泡肺為膿疱心為班脾為疹腎雖無証其候惡者瘡變倒撮而黑陷則歸腎也此由不慎風冷內虛所致瘡黑陷骭耳反熱者逆也今十太尉疹子無他証當用平和藥為治用抱龍圓數服而愈其方在本集載之

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方



凡瘡疹欲出者身必發熱其發亦自有時隨藏所主如
早晨發熱不已為水泡日午發熱不已為班晡時發熱
不已為疹日晚發熱不已為膿疱發熱三日已上熱運
入皮膚即出也其熱重者瘡亦重其熱輕者瘡亦輕方
其身熱瘡未出之時須審認証候子細不可有誤誤則
為害大矣 瘡疹欲作之時皆身熱熱則瘡亦未出熱
至三四日乃歇瘡方出也若腹痛者是腹中先出眼澁
者是眼中先出咽喉口舌痛者皆先出也若三日已後
不出或出不快熱留膚腠之間故也當以藥微發之止
可服升麻葛根湯抱龍圓之類平平者藥或兒身不甚
熱者與少胡荽酒飲之此微發不出即加藥發之既發
之後出不多脉平無他証者即是瘡本稀也不可更發
若不能審察病勢輕重但務多以熱藥發之則熱藥薰
蒸瘡出轉難別生熱証大小便不通更以駛藥下之便
致危殆此誤之甚矣若瘡欲發之時有大熱甚者只可
與利小便如覺熱極毒盛服常藥不可及者宜微與利

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方



之以減其毒不可大利須是子細常與看覷雖夜間亦
不住用灯觀照若未有赤紅點子出時乃可與微利若
已有出者則不可利也錢乙有曰身熱煩渴腹滿而喘
大小便秘澀面赤悶亂大吐者當利小便不差者微導
利之此亦瘡疹未出之前有此熱濕之証解而不減乃
可與微利之張渙亦曰瘡疹未出脉洪數甚大不定而
小便赤大便秘者此証正宜疎利渙頃年在禁中及在
外治此証甚多皆獲安愈亦與上証並同者也若紅點
未出之前無此熱實之証者亦不可利朱肱曰傷寒身
熱在表固不可下瘡疹身熱在表亦不可下蓋傷寒與
瘡疹一體之病是以傷寒証中有出瘡疹之候也世人
不學妄云瘡疹初覺未出時宜先利其毒已出者不可
利若出已定膿血太盛者亦可與利此皆非也大抵瘡
疹首尾皆不可下此言甚善醫者當務從之若能審察
瘡疹於未出之前別無熱毒之証者不可與下有熱毒
之証輕者與利小便重者利小便不減方可與微下若

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方



已出者慎不可下至出足已定亦未可與下須直候瘡
痂焦落美飲食能舉動之後方可與解餘毒藥下之
亦不可用駛藥過多如此則無誤矣是以瘡疹變
黑陷者多因誤投冷藥妄亂下之及不慎風冷乳食
不飽內虛脾弱所致也故兒病瘡疹不得令受風
冷冬月必在暖處夏月雖不可擁遏亦須避其風
涼在涼瘡處則可又當頻頻喂飼乳食常令飽足
無令饑餒今俗輩多禁食餌殊不知饑則內虛

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

脾胃氣弱別生他証也且瘡疹欲發之時身必壯
熱二三日漸涼瘡方始出其出快瘡紅肥脉浮大而數
者毒氣出也若瘡出多却身熱疼痛者是內熱
外瘡焮之所作至出盡則涼也庸工不明為見身熱
疼痛以為熱盛便投涼藥致身反涼而瘡出不快變
黑掀倒陷脉沉細壞亂到此病家方覺醫者拱手
如是夭傷誠可哀惜昔倉公扁鵲論小兒疾証湯
藥有可服不可服之別宜先順陰陽次調榮衛然



後方利藏府古聖立言垂法為後世逆治之戒豈
可忽諸故衆病之中惟瘡疹切忌妄下為最昔
錢乙治睦親宅一大王兒疹子始用一李醫以藥妄
下之其疹稠密乃召乙乙見大驚曰若非轉下則
為逆病也王曰已下之乙曰疹始出未有他証不
可下但用平和之藥頻與乳食不受風冷可也如
三日外出不快者當依次發之有大熱者當利小
便如瘡痂起能食者微利一兩行即止今先下早

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

瘡未盡出而稠密已盛為難治此誤也縱雖得安

其病有三一者疥二者癰三者赤目李不能治經三

日黑陷復召乙乙曰幸不發寒未致困也蓋瘡黑者

歸腎腎旺勝脾土不能制水脾虛寒戰則難治

也今未發寒乃用藥瀉膀胱之府府若不實則腎

之藏自不盛也乃得安愈或曰何不瀉腎以腎主虛

而不受瀉若二服不效加寒則死矣乙之治方本集載

之



凡瘡疹欲作有發驚搐搦者以疹瘡由熱所生心主熱而為驚又熱則生風風屬肝心肝二藏風火相搏故發驚搐也輕者瘡出熱去則自愈重者亦當瀉其心肝之盛也又有因驚而發瘡疹者驚本亦由熱作治當退執定驚庸工不明更以熱藥發之致發熱入表表熱而班出也昔錢乙治四王宮五大尉因墜秋千發驚搐搦前醫以熱藥發散不愈召乙乙曰本乃急驚後生大熱初當合用利驚藥治之今發散乃逆也乙用藥退解之至三日肌膚尚熱乙曰更二日不愈必發瘡疹蓋熱不能出也後二日果瘡疹出以藥治之七日愈其錢乙治方本集載之

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

凡瘡疹出有輕重逆順輕重者若只出一般或出作數次者輕若三兩般同出或一次便出盡者重出稀者輕出密者重裏紅外肥者輕外黑裏赤者重裏外俱黑者大重瘡端裏有黑點如針孔者勢劇也青乾紫陷昏睡汗出不止煩躁熱渴腹滿而喘大小便不通者困也逆



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

順者先發膿疱後發疹子者順先發水泡後發疹子者
逆先發膿疱後發水泡多者順少者逆先發水泡後發
班子多者逆少者順先發疹子後發班子順先出疹子
班子者後必更出水疱膿疱先出水疱膿疱者後必不
出疹子班子蓋以水泡膿疱重而毒氣出甚班子疹子
輕而毒氣出微甚者必帶了微者也微者不帶甚者故
也予家有數小兒皆先出疹子次出水疱次出膿疱共
三次而已其先出疹子者或恐有班子兼出以班疹相
似此兩般乃子母之藏故又輕重順逆更看時月大抵
瘡疹之病在表屬陽出則為順不出則為逆春夏病之
則順秋冬病之則逆又冬月腎旺寒冷之時病者多歸
腎而變黑也又當辯春膿疱夏黑癰秋班子冬疹子者
亦不順也病雖重瘡紅肥猶當十活四五若黑陷者無
問何時十難救一其候寒戰牙噤或身腫瘡黑紫者急
以藥瀉膀胱之府以減腎氣而救之若服藥後身熱氣
溫欲飲水者可治以脾氣生而勝腎寒冷去而溫熱生



也若服藥之後惡寒不已身冷汗出耳聾反熱者死候
也以腎大旺脾虛不能制也

凡瘡疹出多稠密遍身其勢太甚兒甚苦之及變黑倒
掀不出者急以猪血腦子救之沈存中侍郎有方治瘡
疹欲發及伏陷危困者取臘月猪血瓶盛掛風中令乾
每用半棗大加生龍腦豆許溫酒下甚效予家有小女
病傷寒但腰痛晝夜號哭手足厥冷日加昏困形証極
惡予疑是倒發瘡子先不畜此藥急令就屠家處買少

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

生猪血時盛暑投之血已敗惡無可奈何遂多以龍腦
和而嚥之一服遂得少睡須臾一身瘡點出獲安不爾
幾死

凡瘡疹若黑陷而忽瀉便膿血并痂皮者此却為順也
如水穀乳食不化者逆也何以然且瘡黑屬腎今脾氣
本壯或舊服補脾藥脾氣得實腎雖用事脾能制之今
雖入腹為膿血及痂皮得出是脾強腎退即出而安也
若瀉米穀乳食不化者是脾虛不能制腎則自洩也此



必難治

凡瘡疹若嬰小及乳下兒病者不可與稚一等為治妄施湯藥小者宜少少服藥惟忌多服多則反為累也又令母慎口又不可令兒失饑避其風冷及用藥調理乳母為佳若斷乳兒患者亦當審其輕重大小用藥如至八九歲以上至十歲外者方可施藥也

凡瘡疹兒病大盛遍身潰潰膿血沾黏衣衾睡卧不得及有瘡成片段無皮或作竇穴痘癰膿血多盛者用臘

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

月黃牛糞日乾燒灰鋪一寸許厚令在上卧之及摻其瘡潰無皮之處即愈一方用黑牛糞燒灰傳亦得

凡瘡疹兒病面上有者纔膿出急以真酥潤之頻潤為佳如有痂便揭去更潤之縱雖揭損有少血亦不妨或以酥或麵油塗潤之若不潤及揭遲則瘡痂乾硬不落有礙肉生即隱成盤子也此理昭然人多不曉反謂揭早成盤甚誤也

凡瘡疹切忌雜人恐有汗氣狐臭觸之又不可令兒聞



穢惡臭物也故左右不可闕於胡荽以胡荽能禦汗氣
及辟諸惡氣故也家有數兒一兒既患餘兒次皆及之
便當為脩以防之以穢氣轉相傳染也兒能食者可時
與少葡萄食之蓋能利小便及取如穗出快之義也

凡瘡疹兒患者切不可洗面恐生水入眼即損眼也若
初欲發時驗得的當急以胭脂或藥塗兒面目周圍令
疹不 上面入眼也若瘡入眼者是毒氣入於肝經上
衝於目若瘡初出時覺眼腫痛便與時時開眼看之睛

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

上無瘡即不妨矣若有瘡須服藥治之睛破者無奈也
若瘡乾以後無故眼腫痛者是餘毒不盡所攻也又瘡
疹已發及或入眼切要慎口止可食粥及鯽魚青魚鰾
子餘魚及猪羊等物皆不可食最忌者雞卵鴨子食之
即目盲漫若卵白之狀其應如神

凡瘡疹兒病出盡至痂焦落身已涼喜飲食能起動者
以清涼飲子濃煎量大小與服微利一兩行去其餘毒
即安無後病也若不下則後恐發熱為腫腮鼻衄下利



世人不用此法者於此數証或不能免也

凡瘡疹治療之法初覺之時身熱未出証候未明未能

辯認者與升麻葛根湯消毒散服若熱二三日証候已

明者則塗面目辟穢氣若出快別無他証者平和藥調

之出不快者發之出太盛者散之變黑掀者救之又毒

攻咽喉口舌則腫痛生瘡毒衝心胃者則煩渴躁悶毒

入大小腸則大小便不通或遺瀉下血毒攻肝經則目

生瘴醫瘡生於睛則損瞳人以至滅瘡癰退餘熱一切

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

諸候皆隨証用藥其乳下兒患者可令乳母同服其藥
則病得易愈

升麻葛根湯治瘡疹初覺未出身熱不能辯認恐是傷

寒驚風變蒸溫壯疑惑之間皆可與服

升麻

葛根

芍藥

甘草

炙各
等分

右為麤末每二歲上兒用二錢水一盞煎至六分去

查溫服無時

消毒散治瘡疹已未出皆可服未出即消毒已出即滅



牛蒡子 二兩炒 紙襯 甘草 半兩 劉炒 荊芥穗 一分	右為麤末每服一大錢水一盞煎至五分去滓溫服 下利者不可與服若咽喉腫痛者尤宜服之一方更 有防風一两荊芥穗亦一两此千金方中	紫草飲子治如前	右以紫草二兩細剉用百沸湯一大盞沃之	化毒湯治如前 本方治瘡疹欲出渾身壯熱情意不佳 不思飲食服之即內消已出即十解六	七全出者當日 頭三服立效	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	嫩紫草 去麤梗 升麻 甘草 炙各半兩	右剉如麻苳以水二盞糯米五十粒同煎至一大盞 去滓放溫量大小 三四次與服一方瘡疹未出服 之內消已出減輕全出即當日焦痂三服立效	人參散治瘡疹纔覺出便服令稀少輕可	人參 白朮 貫衆 甘草 炙 羌活 去芦各等分	右為細末每服一錢水一盞煎至六分去粗溫服無 時



紫草如聖湯治瘡疹纔初出便急與服之令減毒輕可
 乳下兒與乳母兼服之斷乳令自服

紫草 去麤梗 二兩 陳橘皮 去白焙 乾一兩

右為末每服一大錢水一盞入葱白二寸煎至六分

去粗溫服無時

臘胭脂瘡疹纔初出使用塗眼周圍以防瘡子入眼也

左右悉塗之

黃蘗膏 又名護目膏

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

瘡疹纔出急用以塗面從耳前眼眶邊厚塗之以防瘡

子入眼及面作癢痕能早用即能護目及面上不生若

用遲縱出亦少塗畢後可用胡荽酒噴髮

黃蘗 一兩去麤皮一方用 新葦荳 一方用一兩揀淨一 甘

草 半兩生一方用四兩分兩少者出妙選更有紅 藍花 一兩分兩多者出錢氏只三味薑汲方同

右為細末用好生芝蔴油調為膏從耳前眼背外及

腮面塗之日三五次

胡荽酒



右以胡荽四兩細切用酒三盞煎沸沃胡荽便以物
合之勿令透氣候冷濾取胡荽焙乾以紅絹袋子盛
之縫合令乳母并兒帶之其酒吸一兩口從兒項下
噴及肩背膏腹四肢令徧不得噴頭面餘酒與乳母
飲之為佳能令瘡出快速妙選不論及噴餘皆並同
又於兒左右常令多多頓帶胡荽能辟汗穢之氣故
也

鼠黏子湯治瘡初生纔作赤點毒氣未得透皮膚出作

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

瘡恐出不快而微發之

鼠黏子

二兩
炒香

荊芥穗

一兩

甘草

半兩
炙

防風

去芦并
叉枝

右為末每服二錢沸湯調服及利喉鬲化涎止嗽一

方只鼠黏子一兩甘草半兩為末每服二錢水一盞

煎至八分去粗溫服無時

紫草散治如前

鈎藤鈎子

紫草茸

等分

右為細末每服一字或半錢溫酒調下無時此先微



用藥發之經夕未出加藥發之

必勝散治瘡疹出未能遍勻服之能透肌解毒

右以牛蒡子不限多少炒令香熟為細末每服一錢

八荊芥二穗水一盞煎至七分放溫服無時

龍腦膏子治瘡疹未透心煩狂躁氣喘妄語或如見鬼

右以生龍腦半錢研細旋滴猪心血和丸鷄頭肉大

每服一圓煎紫草湯化下少時心神煩躁便定得睡

瘡子已發得透了自然依常法取安此方亦治黑陷

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

伏攝者如用以溫酒化下

又方

只用猪血一椀斗許腦子一小塊研細酒少許和服

之極有神效之驗此沈存中所用之方也

安斑散治瘡疹出快肥紅平調之

川升麻

赤茯苓

綿黃芪

羌活

去芦各一兩

人參

去

枳殼

去穰炒

桔梗

去

甘草

各半兩

右為細末每服一大錢水一小盞入紫草薄荷各少



許煎至五分去滓溫服無時

快斑散此方治病如前

貫衆一兩揀洗 赤芍藥一兩 甘草半兩 川升麻半兩 枳殼

麸炒去
穢半兩

右為末每服一錢水一小盞八竹葉七片煎至五分

去滓溫服無時其效如神

抱龍圓治如前

天南星為末用臘月牛膽汁和成劑再釀蔭百日而乾

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

四兩如無只以漿水或新水浸天南星三日候透軟煮
 三五沸取出乘軟去皮臍只取白軟者薄切焙乾炒黃
 色為末用八兩以甘草二兩半擘破水二碗浸一宿慢
 火煮至半碗去粗旋旋洒入天南星末內慢慢研之令
 甘草水盡次入於餘藥

天竺黃一兩 雄黃一分 辰砂半兩 射香半兩

右同勻末煮甘草膏子和圓皂子大溫水化服百日
 兒一圓分三四服五歲兒一圓若用臘月中雪水煮



甘草和藥尤佳此藥治傷風傷寒溫疫風熱痰實咳嗽驚風潮搐蠱毒中毒溫壯及室女白帶錢乙治瘡
疹出快紅肥只以此藥平調最好
小品犀角地黃湯治瘡疹太甚解散之
赤芍藥 一分半 生地黃 四分 牡丹皮 去心半兩 犀角屑 半兩無即
以升 麻代
右為麤末每服二錢水一小盞煎至六分去粗溫服
有大熱如狂者加黃芩半兩更量大小與服
欽定四庫全書 小兒衛生總微論方
木香湯治瘡疹太盛煩痛
青木香 一兩 丁香 薰陸香 白礬 各半兩 射香 二錢
右為麤末每服二錢水一小盞煎至六分去粗溫服
熱盛者加犀角屑半兩輕者去白礬大效
猪膽醋治瘡疹內發盛者
醋 四兩 大猪膽 一個取汁用
右合煎三四沸每服半合上下量大小與之日四五
服無時



菜菔汁治瘡疹出不快	右以開花蘿蔔煎汁時時與飲	紫葺汁治如前	右以紫葺葺水煎汁服	活血散治如前	右以白芍藥為末每服半錢或一字溫酒調下如只欲止痛者溫熱水調下無時	蟬蛻 子治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右以蟬蛻十枚去泥土洗淨碎之用水三大盞煎至八分去粗分二服出不快者帶熱服之若出多要消退者放冷服之神效	四聖散治瘡疹出不快小便赤澁心腹脹滿一切惡候	亦治倒癰	紫葺葺 一兩 木通 細剉 枳殼 麸炒去穰 黃芪 炙剉 甘草 半兩	兩半	右為末每服二錢水一盞煎至六分去滓放溫時時



呷之	川芎升麻湯治瘡疹已出未能勻遍或毒氣壅遏雖出不快此藥禦風透肌發瘡甚效	川芎 川升麻 當歸 去芦洗淨 白芍藥 各半兩	右為麤末每服一錢水七分盞煎至五分去粗溫服不拘時候	解毒湯治藏府蘊熱積毒發泄班瘡稠密膿血大盛狂躁發渴咽嗑不利遍身潰潰苦無全膚不能轉側疼痛	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	不任	生地黄 四兩 犀角屑 白芍藥 牡丹皮 去心各半兩	右為麤末每服一錢水七分盞煎至五分去粗放溫服之	黑龍散治小兒瘡疹纔發服冷藥伏撼三日間危篤急進此藥	麻黃 去根節三分 竹筴 一分 蝎稍 二十個 蘇木 一分 烏龍土 一分	乃火團也



右為細末每服半錢水五分煎至三分溫服	白虎化班湯治瘡疹赤黑出不快毒盛煩躁或云大虎	湯有為大人藥者殊不知孫真人言大人小兒為治不	別但用藥多少耳	石膏 四兩 知母 一兩 甘草 炙三分 人參 去芦半兩	右為末每服二錢水一盞入粳米二十粒同煎至半	盞去粗溫服小兒量大小分減初春深秋冬月寒時	加棗煎服并乳母兼服大妙斷乳兒只自服	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	神通散治瘡疹倒掀伏陷不出毒氣稍輕大小便通利者	地龍 緊者去土微炒一兩 朱砂 一兩別研 生乾地黄 一兩已上先為末	右同拌勻每服一字煎胡荽酒少許同溫湯調下無	時	如聖散治瘡疹已生反倒掀內陷舌縮啼聲不出腹脹	肚急一切惡証	右用蛇蛻皮於燈焰燒先用椀一隻在下纔燒焰絕



放在碗內急用碗一覆之不令透氣良久揭開細研
為末每服一字或半錢調藿香湯調下若變紅活時
則用牛蒡子炒熟為細末每服二錢水一盞煎至六
分放冷澄清以匙抄清汁頻頻與服能滋潤咽喉肺
經大解瘡毒

七神散治瘡疹毒氣內攻黑紫倒陷伏攪危惡之候

臘月獐猪血

新瓦罐盛密封至
滲漚乾秤一兩

牙硝

一兩

礞砂

牛

黃射香

龍腦

各一錢細
研別入

餘血依舊封收之以

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

備再合要用

右拌勻研細以甕合貯之每二歲兒用一錢新水調
服利下惡物瘡子紅活為度又一方更有朱砂細末
一錢餘並同名救生散治如上甚者不過再服神驗
無比又一方無礞砂却有膩粉朱砂各一錢研同勻
名無比散小獐猪尾上血三五滴相拌小者一字乳
汁調抹口中大者半錢新水調下餘並同
宣毒膏治如前曾經大效神妙



朱砂 一兩 研 水飛 乳香 一兩 研 一分 甘草 半兩 研 一分 牙硝 半兩 研 一分 射香	右於臘月八日取獺猪尾後刺血一升用新瓦盆盛 入諸藥同拌攪勻以一寬大舊竹筒底留一節都入	在內用紙數重密蓋緊繫封合却入筒口邊通一竅 子以麻索繫垂在大糞坑屋梁上至清明日取出曝	乾更入龍射各一錢研細勻滴水和圓皂子大每服 一圓煎人參湯化下若毒盛瘡子倒攪變黑服之則	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	紅活而長	猪血腦子治瘡疹黑紫倒攪不出	生龍腦 一字 研細 猪尾上取血 半蛤 蜊殼	右二味相和以帛子裹薄荷揉汁半合調上件藥勻	於湯中盪溫作一服飲之神驗一方取小猪兒尾尖	血三五滴研生龍腦末少許新水調下治如前 又	一方治瘡疹黑癩惡候醫所不治者用獺猪第二番	血清半合酒半合研龍腦細末少許和攪令勻服之



利一兩行十救十人大驗小者量與 又一方治瘡	疹發心間有熱或誤服熱藥致富熱在心昏冒不省	人事瘡子黑擗用新殺猪心一個取心中血以生龍	腦一字同研合作一圓新汲水化下未省者再服	又一方治瘡疹黑擗倒陷於臘日收生猪血新瓦瓶	中密封候自然滲泣至乾每用半錢許研散入射香	少許同勻細新水調下其瘡變紅便出已上數方皆	與沈存中龍腦膏相似少有異爾並經大驗今俱錄	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	之	人齒散治瘡疹黑擗發搐危困	右以人牙齒三五枚炙令黃一方燒存性研為末入	射香少許每半錢溫酒少許調下一方用乳香湯調	下沈存中言屢見人用之效	白丁香散治如前	右以白丁香為末入射少許研勻每服一字米飲調	下無時



桃膠湯治如前

右以桃膠煎湯飲之大效一方以水熬成膏溫酒調下無時

又方治如前

右以黑狗一隻牢繫住不與物喫一兩日候腸中舊糞盡與生粟米喫候粟米糞下於活水中淨淘只留化不盡米曝乾收之每用二錢再淘淨研為細末入射香少許新水調下頃刻間瘡變紅活

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

百祥圓牛李膏錢乙用此二藥治瘡疹惡候見於皮膚之下不出或出而不長反變黑紫倒撮內陷一切危急用百祥圓以瀉膀胱之府減腎氣不旺用牛李膏為治則病得從順也董汲云汲小年自病此幾殆父母已不忍晚服此牛李膏得安然此方得於世甚久惟收得不知早晚故無效今以收得併叙載之

百祥圓

又名南陽圓

右以紅牙大戟不拘多少陰乾漿煮軟去骨日中曝



乾復納汁中煮汁盡焙乾為末水和圓粟米大每服
 一二十圓研赤脂麻湯送下無時吐利是效

牛李膏 又名必勝膏

右以牛李子不拘多少須於九月後取之乃野生道
 邊至秋結實黑子成穗九月後乃得成熟者氣全故
 也爛研絹濾取汁於石銀器中熬成膏可圓時秤每
 膏二兩入研細射香末半錢和勻圓桐子大每二歲
 兒一圓或圓作皂子大量大小分減用以漿水煎杏

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

膠湯化下凡瘡疹黑紫倒撮者不過再服當取下惡
 血或如魚子惡物其瘡黑陷於皮下者即紅大而出
 保生方論小兒瘡疹誤服涼藥太過身冷瘡陷不紅活
 脉沉細者急投金液丹麻子大一二百粒或有可生之
 意至兒困極則無及矣方在和劑集中

調肝散治瘡疹平調肝經使毒氣通流瘡不入眼

生犀 錯屑 一分 草龍膽 去芦 半分 黃芪 半兩 炙甘草 一分 炒 大黃

炒過 桑白皮 一分 炙 鈎藤鈎子 一分 麻黃 一分 根節 去 石膏



半兩 研 括萆實 半兩 去皮	右為散每服二錢水一盞煎至五分去滓溫服無時	兔肝圓治瘡疹入眼初覺眼腫痛便時時看之若睛上	無瘡即無害若有時須先服清涼飲子每日食後一服	取微利以去其毒然後服此二藥雖有赤白瘴膜遮交	其睛但瞳子不破陷者皆可治	黃蘗 一兩 去皮 蒼朮 半兩米泔 水浸一日 石決明 一兩 生	右為細末煮兔肝爛漚和圓菴豆大每服三十圓米	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	泔水送下食後臨卧時服	龍蛤散與前藥服	龍膽草 去 芦 蛤粉 等 分	右為細末每服二錢獐猪肝半兩薄批摻藥在中以	線纏定用米泔於銀石沙銚內炭火慢慢煮至肝熟	為度食後少頃食之以汁送下日三須先以清涼飲	子利動方服此二藥必效	煎柿散 又名通 聖散 治瘡疹入眼



穀精草 去根 白菊花 無即用甘菊 菘豆皮 各一分	右為細末每服一錢用柿子一個粟米泔一盞同煎至水盡取柿子喫之日三一月驗一云淺者五七日效重者半月日效	仙靈脾散治瘡疹入眼	仙靈脾 威靈仙 去芦等分	右為細末每服半錢米湯調下食後	珍珠散治瘡疹入眼翳膜赤痛羞明	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	括樓根 一兩 蛇蛻皮 全者炙焦一錢	右為末用羊子肝一葉批開去筋膜摻藥末二錢麻縷纏定米泔煮熟任意食之乳下兒未能食者以肝研爛和圓黃米大生米泔下十圓乳頭餵亦可日三令乳母兼食之佳	浮萍散治瘡疹入眼痛楚不可忍恐傷其目	右以浮萍草陰乾為末每服一二錢用羊子肝半片入盆子內以竹杖子刺碎爛投水半合絞取肝汁調



藥服之食後不甚者一服便差若目已傷者十服差
 蛇蛻散治瘡疹入眼翳膜侵睛成珠子

馬勃一兩 皂莢子十四個 蛇蛻皮全者一條

右入一小罐子內泥封燒不得出煙燒存性研為末

溫水調下食後

仙朮散治瘡疹入眼生瘴膜丁子先用硃砂水銀粉各

一錢粉霜三錢一處拌勻入一小砂鍋子內盛訖新盞

一隻蓋口黃土泥縫炭火燒赤少時取出放冷收之如

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

左眼有病即取藥一豆大綿裹塞左耳中右眼有病塞

右耳中然後服此仙朮散

紫蘇一兩 蒼朮米泔浸一宿焙二兩 穀精草去根一兩 青蛤粉一兩

右為末每用獐猪肝一片批開摻藥三錢在內麻縷

纏定米泔熟煮先於氣上熏眼然後食之

煮肝散治瘡疹入眼諸藥不效

青箱子 草決明 車前子 密蒙花各等分

右為細末用羊子肝竹刀薄批開摻藥二錢在內荷



葉裏麻縷縛定石器內煮熟任意喫	如聖湯治瘡疹毒攻咽喉腫痛	桔梗 去芦 甘草 生 牛旁子 炒 麥門冬 去心	右為末每服二錢沸湯點細細呷八竹葉煎之更炒	食後服	治班瘡入眼	夜明砂 半 木香 半 淡竹葉 半	右為細末每服半錢或一錢井水調下食後服	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	紫雪治瘡疹毒攻咽喉腫痛水漿下難方載於和劑集中	通關散治瘡疹心經有熱煩躁發渴口舌生瘡及大小	便不通	大黃 瞿麥 木通 山梔子仁 滑石 甘草	各半 地扁竹 一 車前子 半	右為末每服一錢水半盞入紫草少許同煎三兩沸	放冷溫服乳前食



甘露飲治瘡疹已發熱毒上衝牙斷宣腫不能嚼物并乳母可俱服之	生乾地黃 焙切 熟乾地黃 焙切 天門冬 去心 麥門冬 去心 枇杷	杷葉 去毛 黃芩 去心 石斛 去根 甘草 炙 枳實 去穢 山茵陳	葉 去土各一兩	右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服無時	青黛治瘡疹熱盛心神煩躁	右以青黛細研每半錢溫磨刀水調下日三	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	敗毒散治如前	白芍藥 甘草 炙 雄黃 醋炙水飛各一分	右為末每服一字或半錢密水調下無時	牛黃散治瘡疹毒氣入胃便血日夜無度腹痛啼哭	鬱金 一兩 牛黃 一錢	右研勻細每二歲兒半錢漿水半盞煎至三分和滓	溫服日二	升麻湯治瘡疹已愈餘毒未解瘡痂雖落癰色黯慘或



凹凸肉起宜用此滅癰消毒	右以川升麻不限多少細剉水一大盞煎至七分取	汁以綿蘸洗拭瘡癰	青金散治瘡疹愈而癰不消	白蒺藜 兩半 山梔子 兩半 青黛 研半兩 膩粉 研一錢	右拌勻每用少許生麻油調塗癰上	又方治瘡疹癰子	右以密陀僧細研為末水調夜塗明且洗之	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	又方	右以真玉時時磨瘡疹癰子以則平滑	清涼飲子瘡疹後解去餘毒	大黃 濕紙裹煨 當歸 洗去 赤芍藥 甘草 炙各等分	右咬咀每服一錢水一大盞入薄荷兩葉同煎至半	盞去滓溫服食後更看虛實以意分減	神朱散治瘡疹後解去餘毒	赤小豆 炒二錢 槐花 炒二錢 射少許



小兒衛生總微論方卷八										欽定四庫全書		小兒衛生總微論方										微利之		右為細末每服半錢或一字溫酒調下臨卧只一服	



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷九

吐瀉論上

小兒吐瀉者皆由脾胃虛弱乳哺不調風寒暑濕邪干
於正之所致也其証不一今條叙之

吐哕嘔附

吐逆自生下便吐者此是兒初生之時拭掠口中穢血
不盡因咽入喉故也

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

吐逆胃鬲滿悶氣急者此因兒啼哭未定氣息未勻乳
母忽遽以乳飼之兒氣尚逆乳不得下停滯於胃鬲之
間因更飲乳前後相沓氣不宣通故氣逆而乳隨出之
為吐也宜調其氣而止吐古書亦曰大哭之後食乳者
多成吐瀉也

吐逆腹脹喘息乳不化夾青水面青唇白者此因乳母
胃寒取涼食冷飲寒致冷氣入乳變壞其汁而不捨去
仍以飼兒或能食者因以冷物飼之其冷乳冷食入腹



與氣相搏傷於脾胃則氣逆而吐也其証若此宜溫胃
止吐調氣若傷重有停滯者以穩藥磨化不可駛下恐
脾胃愈虛而生風也凡風冷變壞之乳當捨去之暫斷
乳兒令乳母服藥溫腹然後飼兒若不捨去非只令兒
吐逆腸胃虛者冷因得入亦下利也

吐逆身熱吐奶成片子者胃有熱也此因乳母胃熱或
因飲酒熱入其乳變壞其汁而不捨出仍以飼兒或兒
乘熱哺啜致熱氣入胃與氣相搏致氣逆而吐也其証

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

若此如久有積熱者必四肢生瘡多渴而面黃宜微下
之虛者以穩藥磨化後調其氣

吐逆身熱鼻青呵欠頓悶口中氣熱夜間發躁者此傷
風吐也因解脫失宜風冷襲之搏於血氣故身熱呵欠
頓悶口中氣熱也氣不得順故逆而作吐也宜調氣止
吐發散風冷

吐逆唇黑面黃多啼有痰吐氣臭者此脾胃有傷也宜
先下之後調其氣



吐逆早晚發熱睡卧不安者此驚吐也心熱則生驚故
睡卧不安而神不寧也心神不寧則氣血逆亂而吐也
宜與鎮驚去熱止吐

吐逆面眊白無精光口中氣冷口頻撮不思乳食吐水
者胃氣不和也宜補脾胃

吐逆痰涎色黃稠黏上壅者胃熱也若吐痰涎白沫或
吐沫者胃虛冷也熱者宜微利之冷者宜溫補之

吐逆痰涎及有血者此肺熱也久則肺虛成痿昔錢乙

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

治段齋郎子四歲身熱吐痰嗽數日而咯血他醫以桔
梗湯防己圓治之不愈涎上攻吐喘不止遂請乙治乙
下襁銀圓大一服復以補肺湯補脾散為治乙曰此子
咯血肺虛也肺雖咯血有熱故也以則虛痿今涎上潮
而吐當下其涎若不下涎則不甚便蓋吐涎能虛又生
驚也痰實上攻亦能發搐依法只宜先下痰而後補脾
肺必涎下而吐愈為順治也若先補肺為逆耳乙所用
藥方本集載之此所謂識病之輕重先後為治也



哕者比吐逆異也吐者乃邪搏胃氣逆而上行穀不能傳化隨氣出也哕者但氣逆而欲吐吐則穀無所出故俗謂乾嘔也哕者乃兒因吮乳汁過多胃滿而上溢出也故俗呼謂之噫奶當便與空乳令吮即定若頻久吮之亦能為病

瀉

瀉色白者冷瀉也此由小兒腸胃虛弱因解脫風冷干之或因食寒飲冷入於腸胃冷氣相搏為利下也其色

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

白面白或腹痛者並宜調中若又傷風冷前後重沓冷甚則瀉不止而為泄注也

瀉色赤者熱瀉也此由小兒腸胃本拔虛熱而風冷乘之入於腸胃之間熱氣相搏而為利下故其色赤也宜微下之以導其熱後調其氣

瀉色乍赤乍白或水或穀者此冷熱瀉也由小兒腸胃先因有冷而復傷熱或先有其熱而復傷冷腸胃宿虛冷熱交攻而為利下宜調其冷熱和養其氣



瀉色黃赤紅黑者皆熱也赤黑者有毒並微下之然後
調氣

瀉色青發熱有時睡卧不安者此驚瀉也小兒糞黃脾
胃土之本色也色青者肝木為風肝木來刑脾土宜早
治之不爾則變脾風而發癰癰則難治也所謂糞青者
須纔便下便色青是也若初下時黃良久乃青者非也
小兒安者皆然不可認為青糞也若瀉色青白穀不化
者此謂冷也宜溫補脾胃發散風冷

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

瀉瀉下色赤白腹大上青筋見髮稀饒啼或喫泥土時

有蛭蟲此疳瀉也宜止瀉退疳

治方具于
疳門之下

瀉多日唇口及糞色皆白糞頗多者以因成冷脾胃衰

困恐變脾風發癰宜以藥防脩而溫養補助脾胃

瀉於暑熱時多患者謂時熱及飲食皆冷故也不傷於

熱必傷於冷若傷熱伏暑而瀉者則心藏煩熱必小便

不利清濁不分瀉色赤黃宜利小便解暑熱若小便快

而瀉者冷瀉也色必青白穀不化宜溫脾胃止瀉



瀉者不可急以熱藥止之多變為痢而下膿血也當審
察冷熱証候詳度緩急施治也

吐瀉

吐瀉多病於春夏秋三時惟冬時絕少者蓋吐瀉皆因
脾胃虛冷熱所致以冬時陽氣在內多食溫暖少飲水
漿故也設有患者必因傷於乳食也若春時病吐瀉者
多因於風夏時病者多因於熱秋時病者多因於冷凡
治吐瀉者必當參其時候觀其形証察其溫涼寒熱如
此則無誤矣

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

傷風吐瀉

傷風吐瀉身溫乍涼乍熱呵欠頓悶多睡口中氣麤而
熱大便黃白色嘔吐乳食不消時咳嗽宜散風補脾如
先已曾經下或無下證慎不可下也此由脾肺受寒不
能入脾也更有五藏兼見之証發散者化大青膏服之
補脾者後服益黃散此錢乙所用藥也方在本集
傷風吐瀉身熱多睡能乳呵欠頓悶口中氣熱飲水不



止吐痰大便黃水此為胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴錢乙用白朮煎湯服之然後發散風冷亦用大青膏又云吐瀉昏睡露睛者胃虛熱也吐瀉昏睡不露睛者胃實熱也

傷風吐瀉身涼吐沫瀉青白色呵欠悶亂不渴哽氣長出氣睡露睛此傷風荏苒輕怯因成吐瀉當先補脾錢乙先用益黃散後發散其風用大青膏此二病於春冬多也

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

傷食吐乳

吐瀉乳食不化其吐及糞皆有酸臭氣者此傷食吐瀉也凡吐乳瀉黃赤者傷熱乳食也若吐乳瀉青白者傷冷乳食也並宜微下之後和胃氣虛者以緩化滯藥漸磨化之

吐瀉在初生三日內壯熱不乳大便乳不消化或白色者是傷乳當微與下後和胃氣虛者以緩化滯藥漸磨化之



吐瀉在初生三日已上至十日身溫涼不思乳大便青
白乳不消化此上實下虛也更有五藏兼見証瀉其所
實者而補其脾胃虛者也

吐瀉有兼藏証者兼肺則睡露睛喘氣兼心則驚悸飲

水兼脾則困倦饒睡吐瀉乃脾胃之本病兼肝則呵欠頓悶兼腎

則不語畏明

昔錢乙治馮承務子五歲吐瀉壯熱不思食乙見兒目

中黑睛少白睛多面色眇白乙曰此子必多病面色眇

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

白者神怯也黑睛少者腎虛也本怯而虛故多病也縱

長成必肌膚不壯不耐寒暑易虛易實脾胃亦怯更不

可縱於酒慾若不保養不過壯年也面上常無精神光

澤如婦人之失血也今吐瀉不食壯熱者微有傷食也

又虛怯則不可下下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則

困倦入腎則加虛但當以藥磨化之為微有食傷也若

重傷則須下之不下則成癖也若實食在內乃可下也

下畢補脾必愈隨其虛實無不效者乙所用藥在本集



載之

冷熱吐瀉

吐瀉在五月中已後身壯熱者此熱也小兒藏府中十分中九分熱此因傷熱乳或胃熱入內吐乳不消瀉深赤色宜與解熱錢乙用玉露散

吐瀉在六月中已後身大溫而似熱藏府中六分熱四分冷也嘔吐乳食不消瀉色黃多白少似褐或食乳或不食乳宜少補脾而大解熱錢乙少用益黃散多用玉

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

露散更宜審察冷熱如兒大熱瀉色赤黃者此熱多依五月中後治之

昔錢乙治廣親北宅四大王宮五太尉六月中吐瀉米穀不化衆醫用溫藥一日而加喘吐不定乙曰當用涼藥治之謂傷熱在內也衆醫皆言吐瀉多而米穀不化當補脾胃何得用涼藥王信衆醫又用補脾溫藥乙曰不可服此三日外必腹滿身熱飲水吐逆三日外一如所言謂六月熱甚伏入腹中而令引飲熱傷脾胃即大



吐瀉他醫又行溫藥即上焦亦熱故喘而引飲三日當
死衆醫不能治復召乙乙見有熱証以白虎湯三服更
以白餅子下之一日減藥二分二三日又與白虎湯二
服四日用石膏湯及旋合麥門冬黃芩腦子牛黃天竺
黃茯苓以朱砂為衣竹葉湯下五圓熱退而愈乙所用
方本集載之

吐瀉在七月中已後身溫藏府中三分熱七分冷也不
能食乳多似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛唇白多哕而

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

不渴錢乙於食前令多服補脾益黃散於食後少服解
熱玉露散更宜相度冷熱若身大溫瀉浚黃者依六月
中已後為治也

昔錢乙治廣親七大尉七歲吐瀉是時七月其証全不
食而昏睡睡覺而悶亂哽氣乾嘔大便或有或無不渴
衆醫疑睡作驚治之不愈乙曰當先補脾而後退熱與
使君子圓補脾石膏湯退熱次日以水銀硫黃二物末
之生姜水調下一字乙曰凡吐瀉五月內九分下而一



分補八月內九分補而一分下此者是脾虛瀉醫妄治之至於虛損下之即死故只當補脾若以使君子圓恐緩已又留溫胃益脾藥止之有一李醫問曰何食而噦乙曰脾虛不能食津液少即哕逆又曰何瀉青褐水乙曰腸胃至虛冷極故也乙治而愈其方本集載之

吐瀉在八月中已後身冷無陽也不能食乳乾哕瀉青褐水錢乙只用益黃散補脾不可下

吐瀉所論冷熱時月此錢乙以中原之地言也今較之

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

江浙則氣候不同今江浙之地二三月尚寒四五月溫暖六月入伏之後纔熱七月熱盛八月熱尚未退雖冬月晴多便暖雖夏月陰多便寒不可槩以中原冷熱時候便為定論經所謂東西南北之異地溫涼寒熱之異宜況每歲寒熱自隨時令早晚難以拘定月日也候之者乘其至也謂至其熱則從熱治至其溫則從溫治至其寒則從寒治至其涼則從涼治此乃隨四時之氣各適其宜



吐瀉於夏秋大熱之時伏暑傷冷則心藏煩躁小便不利清濁不分陰陽二氣相干名曰氣亂亂於腸胃之間名曰霍亂其証乘熱傷冷氣逆而喘腹脇脹滿身熱脉亂頭痛體疼如傷寒之狀上即大吐下即大瀉重者四支厥冷脚脛轉筋法當調順其氣分別清濁升降陰陽若只伏暑吐瀉者則小便不利其証雖與上証稍同而輕非霍亂比瀉色赤黃此但只名伏暑吐瀉不為霍亂也治霍亂吐瀉若熱多而渴者五苓散寒多不渴而心

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

腹身體疼痛及煩躁渴不能飲者可服理中湯寒甚腹痛轉筋四支拘急者理中湯加附子汗出惡寒手足厥冷下利清穀內寒外熱脉微欲絕者並四逆湯已上諸証並可與香薷散服之以他藥不能療此証也治伏暑吐瀉若小便不利與五苓散利小便及與香薷散解伏暑坏蓮散救生丹止吐

吐瀉不拘何時則令脾胃虛弱多致生風而為脾風慢驚也以脾土衰而肝木來刑故爾當先補脾胃不令困



弱則風不生而病易愈也 吐瀉已定未定煩渴者皆津液內耗也不問新久宜煎 錢乙白朮散使滿意取足飲之多即愈好不爾即津液 內耗而引飲不止內生其熱外邪相干則証變百端以 成他病漸至危困也	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	小兒衛生總微論方卷九



欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷十

纂校官_臣醫院恩_臣表天錫

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官_臣進士_臣繆琪

校對官_臣中書_臣李斯咏

謄錄監生_臣譚世緯



欽定四庫全書	小兒衛生總微論方卷十	吐瀉方下	治吐方	木瓜圓治自生下便有吐症此因初生時拭掠口中穢	液不盡所致	乾木瓜末 麝香 膩粉 木香末 檳榔末 各	右研勻麵糊和丸粟米大每服一二丸甘草水下無	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	時服	塌氣丸治啼哭未定便令食乳氣逆停滯心胃滿悶氣	急吐逆	巴豆 三個去皮 胡椒 十個 丁香 十個 青橘 十個湯浸一宿不去穢每	香一個入巴豆一片胡椒一個丁香一個以麻縷纏之餘並同	右用釀米醋一碗煮藥至醋盡為度取出細切焙乾	同為細末粟米糊和丸粟米大每一二歲兒三二丸	三四歲兒四五丸飲下日三服此藥利胃鬲然後復



進觀音散一二服補氣食前

和胃膏治啼哭飲乳氣逆噎塞及胃虛氣不升降胃高

痞滿吐逆不時

人參去蘆藿香葉去土水銀 枇杷葉先炙去毛生薑汁塗炙令香熟

白伏苓各一兩甘草炙皆各半兩肉豆蔻麵裹煨熟

硫黃研細入鐵銚同水銀一處拌勻於火上炒不住手研攤放冷各半兩

右同為末次將硫黃水銀砂子入之再研勻細煉蜜

和膏每一歲兒桐子許生姜棗湯化下量大小加減

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

亦治人翻胃服一皂子許

白附子丸治傷風冷吐逆及治糞青下瀉

白附子一分末蝎稍一分研舶上硫黃半兩研細

右先將半夏半兩湯洗淨生為末生姜自然汁和劑

捻作餅子小錢大沸湯內煮至熟取出研成膏入三

味藥末和之如乾添少湯丸蘿蔔子大每服二三十

丸米湯或乳汁送下無時

羌活膏治傷風吐逆亦能截癇定瀉



羌活去蘆獨活去蘆人參去蘆白茯苓去蘆并防風去蘆并	肉桂去麤皮全蝎炒各一分硫黄三錢	水銀一錢與硫黄同研青色至不見水銀星子為度	右同為細末煉蜜和膏每用量大小旋為丸嬰孩大	豆許三二歲鷄頭大五七歲兒龍眼大並薄荷水化	下	托養丸治傷食吐逆心胃滿悶陰陽痞手足厥冷煩熱	躁悶	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	硫黄各半兩同研水銀細不見星附子半兩炮去皮臍木香半兩	當歸去蘆洗淨大黃一兩濕紙裏煨熟	右為細末煉蜜和丸櫻桃大每服一粒生姜湯化下	無時	朱砂丸治驚吐不止	朱砂各一錢乳香各一錢半夏二十一箇洗淨七次薑汁浸一宿切焙	右同為細末姜汁糊丸黃米大每服五七丸乳香湯	下無時



紫霜丸治如前	朱砂 半錢 杏仁 三十個去皮尖炒黃	右同研細糊丸麻子大每服五七丸桃心湯下乳食前	三香丹治挾驚吐逆不止	藿香葉 去土 丁香 各半兩 麝香 當門子半錢 膩粉 半分	半夏 一錢湯浸七次焙乾 龍腦 半錢	右為末拌勻生姜自然汁糊和丸黍米大每服十粒	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	人參薄荷湯送下無時	四季散治驚吐及番胃諸藥不效者服之立驗	右以好硫黃半兩研細入水銀一分同再研至無星	如墨煤色每用一錢或半錢以生姜自然汁同酒各	半同煎用少許調藥空心服之服畢覆卧當自汗出	乃愈	集香散治脾胃不和氣虛吐逆不食漸成羸瘦	丁香 沉香 木香 白朮 藿香葉 去土



製厚朴 各半兩 白茯苓 白豆蔻 各一分
右為細末入麝香少許拌勻以水半升蜜四兩大棗
十五個生姜十五片於銀器內慢火熬成膏去姜棗
不用以膏和藥丸如皂子大於當風處窰乾每服一
丸米飲化下量兒大小加減乳食前
人參白朮散治胃氣不和吐逆不思乳食亦治霍亂吐
逆
厚朴 去麤皮生薑製二兩 人參 去蘆 白朮 湯洗七次 半夏
欽定四庫全書 小兒衛生總微論方
陳皮 去白各一兩
右為細末每服一錢水一小盞生姜二片煎至六分
去滓溫服
人參藿香散治脾胃不和吐逆不定
人參 去蘆一兩塗薑汁微炙 藿香葉 去土半兩 白朮 剉炒 丁香
良姜 枇杷葉 去毛薑汁塗炙令香熟 甘草 各一分炙
右為細末每服一錢水一小盞入木瓜一片煎至五
分溫服無時去滓通口服



欽定四庫全書		小兒衛生總微論方	
萬安丹治胃虛傷冷吐逆		右為細末每服半錢或一錢水一小盞生姜三片煎至六分去滓溫服無時	
半夏	一分湯洗七次焙乾	白朮	一分附子一個炮製
朱砂	半兩研飛	硫黃	一分研
右三味先為末入研藥拌勻生姜汁和丸黍米大每服十粒米飲下乳食前		聖石散治如前經驗	
礞石	四兩炭火燒一伏時	不灰石	二兩炭火燒一伏時
母丁香	一兩	木香	
人參	一兩去蘆	白茯苓	一兩
半夏	半兩湯洗七次焙乾	真陽起石	
上為末	同	阿魏	湯化去砂石以麝
巴豆	杏仁	各十四個並連皮燈	上燒作炭畧存性
右同勻細湯泡蒸餅和丸荔枝子大每服一粒水一		藿香散治脾胃氣不和吐逆心腹脹滿	
藿香葉		土半夏	去各
厚朴		製各二兩人參	去蘆
甘草		一兩	陳皮
白朮		各半	白



欽定四庫全書		小兒衛生總微論方	
人參 去蘆 滑石 去土 藿香葉 去土 丁香 一分 甘草 二錢		朱砂 一錢半 研水飛	
右為末煉蜜和膏每用皂子大米飲化下無時		枳皮湯治胃冷吐逆正氣	
右以枳木皮煎湯汁服之		溫脾散治寒濕吐逆	
厚朴 去皮塗姜汁炙 丁香 白朮 乾姜 各半兩焙		肉桂 一分	
白茯苓 一兩 肉豆蔻 半兩 厚朴 去皮生薑製一兩		枇杷葉 炙去毛	
右為細末每服一錢水一小盞生姜二片煎至六分		去滓空心溫服無時	
人參膏治脾胃虛冷乳食不化吐逆連併不喜乳食		藥須用銀石器	
厚朴散治胃冷氣逆吐不思食		盞入姜皂子大擘破同煎至五分放溫時時服之煎	



右為細末每服一錢煎人參湯調下無時	香參湯治寒痰吐逆	丁香 藿香葉 去土 丁香皮 人參 去蘆 白茯苓 各一兩	青皮 去穢 木香 甘草 炙各半兩	右為末每服一錢水一小盞生姜二片煎至五分去	滓溫服無時	三黃散治傷熱吐逆	五靈脂 大黃 雄黃 各等分研水飛	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末每服一字磨刀水調下無時治熱吐尤佳	槐花散治熱吐不止	皂角 去皮燒烟盡 白礬 枯 槐花 炒 甘草 炙各等分	右為細末每服一錢白湯調服無時	丁香益胃湯治胃虛挾熱吐逆不止	丁香 人參 去蘆各一兩 桂皮 去 大黃 炮黑黃色 訶黎勒皮 一分	右為細末每服一錢水一小盞生姜二片煎至五分	去滓溫服無時



人參桂姜湯治熱氣不調吐逆腹滿脹痛	人參 去蘆三分 桂皮 去良姜各一兩 甘草 炙半兩	右為細末每服一錢水一小盞生姜三片煎至六分	溫服無時	白朮湯治吐逆熱煩而渴津液燥少	白朮 乾葛根 人參 去蘆各一兩 木香 藿香葉 去土	白茯苓 甘草 炙各半兩	右為細末每服一錢水一小盞生姜三片煎至六	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	分去滓溫服或用生沸湯調下無時	香朴散治冷熱吐逆調順其氣	厚朴 去皮姜製一兩 人參 去蘆一兩 丁香 半兩 麥門冬 去心半兩	右為細末每服一錢水一小盞入生姜二片棗一個	同煎至五分去滓溫服無時	坯蓮丸治一切冷熱吐逆不止	半夏 一兩湯浸洗七次槌碎 胡椒 一分二味同炒紫黑色 丁香 四十個	蓮子心 一百個



右為末姜糊和丸菜子大每服三二十九煎坯子石	蓮湯送下無時	清鬲飲子治伏暑吐逆	淡竹葉 一兩去枝梗 香薷 一兩 檀香 半兩 人參 去蘆半兩	半夏 半兩湯洗七次焙乾 白茯苓 半兩 甘草 半兩 白粳米 一合	右為麤末每服一錢水一小盞煎至六分去滓溫服	時時如熱水服	燈花圓治伏暑吐逆頭目痛四肢冷煩躁不解	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	半夏 二兩姜製 硫黃 一兩 白善土 一兩	右為末滴水丸大豆大每用一二丸以針穿於燈	上燎過吐逆者鹽艾湯下煩躁者生薑湯下四肢冷	者熱酒下頭痛者臘茶下兒小者服一丸	雙金圓治霍亂吐逆不止又治番胃及沉積赤白惡痢	五靈脂 去砂石二兩半研 揀丁香 一錢為末	巴豆 半兩去壳并心皮細研入上二味和勻	右以棗肉和丸黃米大每用量大小虛實加減二歲



上五七丸三歲上十丸煎丁香藿香湯放冷送下服	藥畢須候兩時辰不得與乳食候大便過一兩次服	補藥四聖圓如吐後躁熱心間煩悶服四順飲子此	三藥乃一宗也兒本壯食傷積滯者宜服虛者更宜	斟酌	四聖圓	白荳蔻 肉荳蔻 麩裏 草荳蔻 去 乾姜 炮 良姜	藿香葉 去 丁香枝杖 各等	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為末醋糊和圓菴豆大每服三十圓煎人參或白 朮湯下如止瀉米飲下無時	四順飲子	地骨皮 去骨 防風 去蘆并 山梔子仁 連翹 各等	右為末每服一二錢水一盞生姜三片煎至五分去	滓臨卧溫服如大便秘澀煎燈心竹葉湯放冷服亦	治諸熱心胃煩躁懊悶	乳吮散治嬰兒吐乳不定



枇杷葉 一分去毛 母丁香 一分	右為末每服少許或半字一字塗乳上吮兒便止	馬通汁治嬰兒吐乳黃色	右以新馬糞一塊絞汁量大小分減灌之	葛根粉治小兒吐逆壯熱不下食	右以葛根粉二大錢水二合調勻瀉入沙羅中側轉	令遍如盪粉皮法重湯內煮令熟以糜飲相和食之	亦治癇	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	白魚灰散治百日內兒涎壅吐乳	右以書中白魚七枚燒灰研細乳汁調服一字與服	或傳在乳上吮之	丁香散治胃虛氣逆嘔吐不定霍亂不安精神困弱	丁香 一分 人參 半兩 藿香葉 去土一分	右為末每服一錢水半盞煎三五沸入乳汁三五滴	更煎一兩沸帶熱服無時頻頻服效	聖白圓治小兒吐逆



半夏 半兩湯洗十次竹刀切作片子焙令乾 丁香 半兩	右於木臼中同杵為末生姜自然汁和丸麻子大每服十丸十五圓溫湯送下無時	白朮散治小兒吐逆或加喘促	白朮 二兩 乾山藥 白茯苓 各一兩 人參 去蘆 木香	白扁豆 炮 藿香 去土各半兩 甘草 一分	右為末每服一錢紫蘇湯下喘者陳皮湯下無時	附子散治小兒虛風呵欠吐逆涎盛	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	白附子 炮 南星 炮各半兩 黑附子 炮去皮臍一分	右為末每服一錢水一小盞生姜二片同煎仍不住	手攪煎至半小盞分三服量大小與甚效	滑石散治胃熱吐瀉食	白滑石 白善土 好者等分	右為末研勻每服半錢葱白煎米飲調下	坯蓮散治一切吐逆及煩渴	枇杷葉 大者五片洗刷去毛 麥門冬 去心一分



紫蘇葉 四十粒 丁香 一百粒 石蓮心 一百個 藿香葉 去土半兩	甘草 一分	右為末每服半錢煎坯子烟脂石蓮湯調下無時	白茅散治吐逆不定	丁香 花桑葉 人參 去蘆 藿香葉 去土 白茅根 剉各一分	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量大小	分服無時	白附散治小兒吐逆不定虛風喘急	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	白附子 藿香葉 去土等分	右為細末每服半錢或一錢米飲調下無時	油滴散治小兒胃氣虛冷痰盛吐逆	半夏 大者十枚 胡椒 四十粒	右為麤末每服半錢水一小盞入生油七滴煎至五	分去滓服無時	二白剉散治小兒膈上痰壅吐逆不食漸生驚候脅中	滿塞咽嗑不利



大天南星 二個炮烈 出火毒 大半夏 四個湯洗七次去滑	右並剉作塊子以水一大盞半入生姜七片慢火煎至一呷服之入冬瓜子同煎更妙	五香半夏圓治小兒鬲滿氣不升降吐逆痰壅或作咳嗽	沉香 麝香 丁香 木香 各一分 藿香 去土半兩用葉	半夏 湯洗七次姜汁拌炒黃三兩 肉苳蔻 麵裹煨去麵 人參 去蘆	陳皮 去白各一分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末姜汁糊丸黃米大每服三十丸生姜湯下乳後	定吐香銀圓治小兒脾胃氣弱挾於風寒嘔哕亦治便青泄利	丁香 乾葛 各一兩 半夏 湯洗七次切焙 水銀 後入各半兩	右上三味先為末入水銀研勻生姜汁和圓麻子大每服三五圓至十數圓量兒大小與服藿香湯下無時



龍虎救生丹治一切吐逆不下食	水銀 半兩 硫黃 一兩二味同研 丁香 半兩 半夏 一兩	人參 去蘆一分 天南星 半兩 白附子 一分	右為末生姜汁煮糊和丸蘿蔔子大每服一二十九	煎藿香湯下伏熱吐者煎蓮子心湯下量大小服又	治妊婦阻病立效	枇杷葉湯治一切吐逆煩渴	枇杷葉 一兩拭去毛 丁香 半兩 人參 去蘆半兩 甘草 炙	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	白茯苓 各半兩	右為細末每服半錢煎紫蘇湯調下無時	定命丹治一切吐逆不止	巴豆 十個 丁香 一兩炒	右為細末以煮酒蠟就劑旋圓如菽豆大每服三五	丸米飲湯下腹脹皂兒湯下夜啼朱砂湯下兒本壯	實者有積食宜服	五倍子散治吐逆不定



右以五倍子二箇一生一熟甘草一寸用濕紙裹煨 同為細末每服半錢米泔調下立差	壁錢湯治如前	右以壁錢窠煎湯飲之一方用二七箇其蟲似蜘蛛 作白幕如錢於壁上土人呼為壁璽	麻仁汁治如前 此李諫議方嘗用極妙	右以麻子仁二兩杵爛熬以水研取汁入鹽少許服 之立效	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	丁香散治如前	丁香 藿香 去土代赭石 火煨醋淬不計遍數以易碎為度	甘草 炙各一分	右為末每服半錢煎薄荷湯下如吐瀉更與木香白 朮散同服方具于治瀉門中	生姜湯治吐逆百藥不差	以生姜一兩細剉米豆大將七合於銀器中煎取四 合空腹旋呷大者和滓



羊糞酒治無故吐逆酸水不止或三五口食後如此	右以羊糞十顆好酒二合煎取一合頓服未愈再服	更量大小加減	碗覘附羊乳治碗覘乾嘔煩熱	右以羊乳一升煎至減半分五服無羊乳只牛乳亦	得小者減之一方與生姜汁合煎牛乳二合姜汁一	合銀器中慢火煎五七沸一歲兒服半合	鹿角粉治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右以鹿角粉大豆末等分相和乳汁塗上令兒吮服	之	枇杷葉汁治如前	右以枇杷葉拭去毛淨煮汁飲之亦治咳嗽	玉真散	白朮 半兩 半夏 七錢 湯洗七次 為末 生姜汁製胡椒 半錢	右為末每用半字以水一呷調下大者一字	消乳丸治飲乳過多嘔吐瀾瀾不消好令常服



丁香 木香 青皮 去穢炒黃 肉荳蔻 麩裹煨	牽牛子 炒黃各半兩	右為末滴水丸針頭大每服三五丸乳上沾吮服	蟾蜍飲治嘔乳不止	右取田中曲蟾蜍一兩研末空心米飲調下半錢一	二服立效兒小減服	蘆蟲湯治飲乳嘔吐不入腹	右取蘆中蟲二枚煮汁飲之須破蘆取蟲似小蠶	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治瀉方	粟煎湯治腸胃受風寒下瀉不止身體壯熱	白朮 當歸 去蘆 川芎 人參 去蘆 肉桂 去皮 芍藥 各一兩	右為末每服一錢水一盞入姜三片粟米半匙煎至	米熟去滓溫服	惺惺散治傷風挾驚下瀉日久脾困不食及恐作脾風	發痢	天麻 半錢 全蝎 半錢 糯米 一錢 甘草 一錢 木香 一錢



白扁豆炒一錢 山藥焙一錢 茯苓微炒一錢 人參微炒一錢	右為末嬰孩一字二三歲上兒半錢水半銀盞以下 棗半箇煎三五沸溫服	白附子圓羌活膏皆治傷風或驚泄瀉不止方已具于 吐門之下	人參生犀散治風寒驚悸痰嗽服尋常藥即瀉	前胡去蘆八錢 桔梗去蘆半兩 人參去蘆三錢 甘草炙黃二錢	杏仁去皮尖五錢末	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右上四味為末後入杏仁拌勻麤羅羅過每服二大 錢水一盞同煎至八分去粗溫服無時	訶子湯治傷冷瀉不止	訶梨勒皮 人參去蘆 木香 白茯苓各一兩 甘草炙	陳皮湯浸去白各半兩	右為末每服一錢水一小盞入生姜二片煎至五分 溫服無時	訶梨荳蔻丹治如前



訶梨勒皮 草荳蔻仁 各一兩 白朮 乾姜 炮	川黃連 去 當歸 去蘆洗焙各半兩	右為細末粟米飯和圓黍米大每服十粒飲湯下無	時	肉荳蔻散治胃寒下瀉	肉荳蔻 麵裹煨 白礬 枯各一兩	右為末溫米飲調下一錢或半錢空心服	益脾散治脾胃傷冷泄瀉腹痛全不入食	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	陳皮 一兩去白 青皮 去穰半兩 訶子肉 半兩 甘草 剉炒半兩 丁香 二錢	乾山藥 二兩	右為細末每服一大錢水一小盞生姜三片棗一箇	煎至六分去滓溫服與益兒圓間服甚妙	川椒圓治夏月傷濕冷泄瀉不止	川椒 一兩去目并閉口者不用揀淨慢火炒香熟為度 肉荳蔻 麵裹煨半兩	右為細末粳米飯和圓黍米大每服十粒米飲下無	時



栢葉治泄瀉洞下	右以栢葉煮汁服之或焙乾作末煎服	烏姜圓治脾虛泄瀉不入食	生姜 二兩切 黃連 去鬚二兩剉豆大 二兩切	肉荳蔻 二十五箇每箇入丁香二箇共五十箇在內 訖別用生姜研爛取汁和麵裹煨熟和麵符之	右同為細末滴水 和圓芥子大每二三十圓 棗湯下	乳食前	龍香散治腸胃虛弱滑泄無度腹痛腸鳴或疳瀉不止	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	當歸 去蘆 龍骨 煨 赤石脂 烏魚骨 白朮	香白芷 人參 去蘆各等分	右為細末每服半錢至一錢溫米飲調下乳食前	如聖散治傷熱生風聚瀉不定或時驚悸睡卧不寧	板藍根 肥者二兩 丁香 半兩 甘草 一兩 乳石 一兩	井泉石 一兩半	右為細末每服半錢米飲調下併服三服立效如驚	風薄荷湯調下



治小兒水穀不調

右以枳實麵炒黃枰末米飲服半錢匕二歲下兒一

錢匕量大小加減服

溫脾散治瀉泄食不化

蒼朮半兩米泔浸一宿去黑皮甘草炙厚朴去麤皮訶子炮

木香 乾姜炮茯苓 人參去蘆桔梗去蘆各一錢

右為末每服一字或半錢米飲調下食不化者紫蘇

鹽湯調瀉不止者木瓜湯調下乳食前

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

二和圓治瀉不止

黃連去鬚一兩南木香一兩二物各半生半炒

右為末醋糊和圓菴豆大每服三四十九米飲下乳

食前

還肌散治洞瀉聚瀉疳瀉等肌膚瘦弱乳食不進

肉苳蔻一箇訶子三箇沒石子一箇三味各用大參麵裹慢火煨黃熟勿令烟出

右為細末每服半錢米飲調下如人行五里久再一

服須用陳米飲下神效



和中散治痰逆胃虛泄瀉	白朮 陳皮 去白 厚朴 去麤皮 甘草 炙各等分	右為細末每服一大錢水一小盞生姜三片棗一箇	同煎至六分溫一方更有藿香葉減半	附子散治胃寒泄瀉不止	右以半兩附子一枚炮烈去皮臍為細末每服一錢	水一盞鹽半錢煎至五分溫服亦治洞泄乳食前服	赤石脂丸治泄瀉虛滑無度	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	赤石脂 乾姜 炮等分	右為末糊丸麻子大每服一二十丸米飲下空心服	荳蔻丸治泄瀉米穀不化	肉荳蔻 麵裹煨各一兩 木香 青皮 去穰炒黃半兩 黑牽牛 一分微炒	右為細末滴水丸黍米大每服十丸生姜米飲下	乳食前	建胃散治泄瀉身熱煩渴	厚朴 去麤皮生薑製一兩 川黃連 去鬚一兩 白朮 肉荳蔻 麵裹煨一兩



宿砂仁兩半 乾姜炮半兩 木香兩半	右為細末每服一錢水一小盞入生姜粟米各少許	煎至五分去滓溫服無時	順胃丹治泄瀉蟲煩腹痛	白朮 良姜 乾漆炒烟 肉桂各一兩 肉豆蔻麵裹煨半兩	右為細末麵糊和丸黍米大每服十粒米飲下乳食	前	建中丹治泄瀉腹痛多啼	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	胡椒 蓬莪茂煨 全蝎一錢 肉苳蔻麵裹煨各半兩	右為細末麵糊和丸黍米大每服十粒米飲下乳食	前	茱萸散治脾胃弱食不消泄瀉無度	吳茱萸揀淨半兩用鹽二錢水一盞煮之如此換水煮十四次各至水盡遍數足曬乾炒令	紫黑 甘草一兩 陳皮去白二兩	右為細末每服一錢或半錢沸湯點服無時	乳香苳蔻丸治泄瀉不已腸中有惡氣故爾



右用肉荳蔻一枚斫分兩半中間剗開安乳香一皂 子大在內相合以線扎定和白麵裹如胡桃大煨熟 為末陳米飯和丸菴豆大每服二十九丸陳米飲下空 心食前	香礬丹治泄瀉浸久不差	白礬 一兩慢火 枯研成粉 木香 一兩 訶梨勒皮 半兩 微炒	酸石榴皮 半兩 炒黑	右為細末煉蜜和丸黍米大每服十粒粥飲下乳食	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	前	二白丸治泄瀉滑數不止	白石脂 白龍骨 煅等 分	右為末滴水和丸黍米大每服三五丸紫蘇木瓜湯	下無時	溫白丸治久患泄瀉脾虛不進飲食或食訖仍前瀉下	米穀不化	白朮 一分半 一時切焙乾 半夏 一錢半 浸洗七次 丁香 半錢 炒



右為細末生姜自然汁糊丸黍米大每半歲兒三丸	三五歲兒五七丸淡生姜湯下早晚各一	沒石子丸治泄瀉白濁及滑腸腹痛亦治痢利	木香 黃連 去鬚各一分 沒石子 筒一 肉荳蔻 二筒麵裹煨	訶子肉 三筒	右為細末飯和丸麻子大米飲下量大小加減與之	無時	銀白散治脾胃不和泄瀉不止不思飲食身體煩熱	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	人參 去蘆 白茯苓 白扁豆 炒熟 甘草 炙 白朮 炒各一分	嬰粟米 微炒二錢別研	右為末同勻每服半錢或一錢紫蘇湯調下無時	乾姜散治水瀉無度	右以乾姜末粥飲調下半錢或一字量大小與	椒紅丸治如前	右以椒二兩去目用醋二升煮至醋盡焙乾為末糊	圓菴豆大瓷盒收之每服十九十五丸米飲下一方



治嬰小水瀉癰疳以椒一分去目為末酥調少少傳腦上日三	烏藥散治乳母冷熱不調變壞乳汁不好兒因飲之心腹時痛下瀉如水	香附子 破揀白者 良姜赤芍藥天台烏藥 各等分	右為細末每服一錢水一盞煎至六分溫服心腹痛者入酒少許同煎只水瀉者米飲調下量大小與服	白石脂散治水瀉形羸不勝大湯藥	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右以白石脂半兩研如粉和白粥空心與服	藥皮丸治熱瀉	右以黃蘗削去麤皮焙乾為末用薄米飲和丸粟米大每服十丸米飲下食前	清胃散治挾熱下瀉頻	川練子 去核 黃蘗 炙 地榆 炙 當歸 去鬚洗焙 黃連 去鬚炒	右各半兩為細末每服一錢水一小盞煎至六分溫服無時



香石散治伏熱中暑煩躁發渴泄瀉小便不利	丁香 滑石 舶上硫黃 白芍藥 甘草 各等分
右為末每服一錢米飲調下亦治吐瀉無時	
分水車前散治暑月傷熱暴瀉小水不分	
右以車前子為末米飲調下半錢或一錢量大小加減	
白朮膏治暑月中熱泄瀉小便不利腹滿氣痞	
白朮 半兩 白茯苓 人參 去蘆 滑石 各一分 澤瀉 半兩	
欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	
右為末煉蜜和膏每用一皂子大米飲化下無時	
香連散治伏暑泄瀉清濁不分	
木香 川黃連 去鬚各一兩 人參 去蘆 厚朴 去麤皮生薑製各半兩	
右為細末每服半錢或一錢米飲調下乳食前	
草節湯治冷熱不調下瀉	
胡黃連 半兩 綿姜 一兩炮熟	
右為細末每服半錢草節湯調下食前	
樗根散治水瀉裏急後重頻數	



檮根皮一兩 枳殼半兩 甘草一分	右為末每服半錢或一錢粥飲調下立止無時	厚朴散治洞瀉注下	訶梨勒皮一兩 厚朴去麤皮生 肉荳蔻麵裹煨	白朮半兩 乾姜半兩	右為細末每服一錢水一小盞入生姜粟米各少許	同煎至五分去滓溫服食前	香蟾散治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右於五月五日取蟾一隻燒末飲調一錢服之兒小	量減食前	阿膠丹治洞瀉暴注	真阿膠一兩 乾姜一兩 芍藥半兩 當歸去蘆	川黃連去鬚 肉荳蔻麵裹煨	右為細末煉蜜和丸黍米大每服十粒粟米飲下食	前	助胃丹治洞注不止手足冷



附子一枚重半兩 炮烈去皮臍硫黃半兩乾姜半兩肉苳蔻麵裹煨	肉桂半兩白朮半兩	右為細末麵糊和丸黍米大每服十粒米飲下食前	亦治瀉脫危困	火輪散治虛滑洞泄注日夜無度	附子一枚半兩者 炮烈去皮臍肉苳蔻半兩麵裹煨麵姜一錢半	右為末每服一字或半錢陳米飲調下乳食前	木香散亦治冷熱不調下瀉	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	木香 黃蘗蜜炙各一兩人參去蘆宿砂仁各一兩半	右為細末每服半錢米飲調下亦治痢	荳蔻香連丸治寒熱失宜陰陽不調泄瀉無度腹痛腸鳴	黃連去鬚三分炒肉苳蔻麵裹煨南木香各一分	右為細末粟米飯和丸粟米大每服三二十九米飲	下日夜四五服量大小與之如聖	小香連丸治冷熱不調水穀滑腸泄瀉腹痛脾胃不和



乳食不化皆治之	木香 訶子肉 各一分 黃連 去鬚半兩炒	右為細末飯和菉豆大每服一二十九丸米飲下乳食	前一方便肉荳蔻三箇甘草一分同為末每服半錢	飲調下名香連散	石榴汁治下瀉五色	右以酸石榴五箇同穰殼擣爛絞取汁每服半合量	大小與之	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	四色圓治瀉青色	硫黃 厚朴 去麤皮生薑製	右各等分為細末糊丸黍米大每服十五丸米飲下	無時	木香白朮散治下瀉色青如涎或如白沫	木香 白朮 陳皮 去白 丁香 各一錢 麥蘖 炒黃半兩	右為末每服半錢或一錢水半盞煎至三分溫服如	吐瀉與前丁香散兼服在吐門下



六神散治瀉多日糞色與唇口皆白因成虛困亦治洞	瀉吐利疳瀉	人參 去蘆 白茯苓 乾山藥 白朮 白扁豆	甘草 炙	右各等分為細末每服一錢水一小盞生姜二片棗	一箇煎至六分通口服	此藥用處甚多調氣和脾胃大良如治冷瀉宜用末	二錢附子末一錢匕煎之分三四服量大小與之	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	又治風症加天麻治痢加罌粟殼吐瀉者服之以助	胃氣防變癰病	荳蔻丸治傷乳食脾胃不和泄瀉無度	木香 一分 肉荳蔻 麵裹煨 草荳蔻 檳榔	青皮 去穢 陳皮 去白 各 一分 京三稜 一兩 炮剉	右為細末麵糊和丸棗豆大每服五七丸姜湯下無	時	黃連棗莢散治傷乳食下瀉



黃連去鬚 一兩 吳茱萸揀去枝梗 半兩 乾姜二錢 巴豆肥大者一箇去皮	右剉細同炒至焦黃去巴豆不用外為細末每服一	錢煎陳米飲調下日三乳食前	緩中丸治有傷泄瀉	神麴炒黃 訶子皮炮各半兩 吳茱萸揀淨炒黑二兩	右為末煉蜜和丸麻子大每服三二十九棗湯下無	時	迴陽散治下瀉虛極或因服轉藥瀉脫四肢逆冷目瞪	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	項強大便不禁心曾煩悶不能乳食	附子大者一箇炮去皮臍 天南星大者一箇炮過為末生薑汁和作餅焙乾	木香一分 人參去蘆一分 硫黃一分 朱砂一分 麝香許少	右為細末艾湯調半錢乳食前服	艾黃熨法治瀉脫困乏危篤	華麻七箇去殼研如泥 熟艾半兩 硫黃末二錢	右拌勻於臍上先鋪紙付藥在上又用紙鋪襯稍厚	用熨斗適溫涼熨之不可令熨斗大熱以臍內響為



度

吐瀉方閻孝忠曰凡小兒吐瀉多因寒冷當溫補之余
每用理中丸以溫其中五苓散以導逆五苓治小兒
吐尤妙逆者吐也連與數服兼與異攻散正氣溫藥
調理之往往便愈若已虛損當速生其胃氣與理中
丸并研金液丹末煎生姜米飲調灌之惟多服乃効
服至二三兩無害得胃氣生手足漸暖仍頻與粥雖
至危者往往死中得生十有八九金液丹治小兒吐

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

瀉虛極最妙沈存中論金液丹親見小兒吐利劇氣
已絕服之得活者數人真不妄也須多服方驗若因
吐瀉生風身冷瘕瘕變慢驚者論在於驚門具之其
理中丸五苓散金液丹方並在和劑集載之

異攻散治吐瀉虛冷病先與數服正氣能溫中和氣進
食

人參

去蘆

茯苓

去皮

白朮

甘草

炙

陳皮

各等分

右為細末每服二錢水一盞生姜五片棗二枚同煎



至七分通口服無時		參苓散治傷風冷脾胃不調一切吐瀉		人參 去蘆 茯苓 白附子 羌活 去蘆 白朮 各一分		肉桂 犀角 鎊 藿香 去土 川芎 芍藥 甘草 各一錢		右為細末每用半錢金銀薄荷湯調下無時		團參散治脾胃虛弱氣不調順傷於風冷一切吐瀉手足厥逆		人參 去蘆 白朮 白扁豆 炒一兩 嬰粟米 四兩別研		欽定四庫全書 小兒衛生總微論方		山藥 三兩 陳粟米 三兩用生薑自然汁浸三宿取出曝乾		白茯苓 一兩 木香 三兩 川芎 一兩 烏藥 一兩半剉碎		甘草 三兩 厚朴 去蘆皮生薑製二兩 白芷 一兩		右為細末每服一錢水一小盞生薑三片棗一箇去核同煎至半盞溫服空心食前		和中散治三焦不調停寒鬲上吐瀉不定		藿香 去土 白芷 去蘆 人參 去蘆 木香 丁香		乾姜 炮 厚朴 去皮生薑製各半兩 甘草 一分	



右為細末每服一錢水一小盞入生姜三片煎至六分溫服無時	益中湯治脾胃不和傷冷吐瀉	丁香 半兩 草荳蔻 去皮三箇炒 人參 去蘆半兩 青皮 去穢半兩	桂心 一分 訶梨勒 去核一分	右為細末嬰孩一字二三歲半錢五六歲一錢煎木	爪紫蘇湯調下日三無時	沉香散治脾胃不和吐瀉不進乳食	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	沉香 一分 丁香 一分 炒 一錢 木香 半錢 炮 一錢 桂心 半錢 見火 不	甘草 一錢 炙 一錢 茯苓 一分 藿香 去土一錢 法如前方用	觀音散治如前	人參 去蘆 甘草 炙 白扁荳 炒 石蓮肉 去心各一分	茯苓 半一錢 白芷 一錢 黃耆 搥碎塗蜜炒 木香 炮各一錢 神麴 二錢	右為細末每服一錢水半盞棗半箇煎三兩沸溫服	無時	人參散治如前



人參 茯苓 石蓮肉 去心各一分 甘草 二錢	黃耆 半兩 蜜炙	右為細末每服一錢水半盞棗半箇煎三兩沸溫服	無時	白朮散治胃氣虛弱吐瀉發渴	白朮 人參 去蘆 木香 白茯苓 藿香葉 去土	甘草 炙各一分 乾葛 二分	右為末每服一錢水一小盞煎至六分溫服無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	半夏湯治脾胃虛寒吐瀉及有冷痰等疾	半夏 好者一兩湯浸洗七次切焙乾 陳粟米 三分無即用陳粳米亦得	右呖咀每服三錢水一大盞入生姜七片煎至四分	溫服無時	張渙七香丸治吐瀉不進乳心腹脹滿小便不利	青皮 浸去穢穢一半生 肉荳蔻 半兩麵裹煨令香熟 牽牛 一兩炒	右為末糊丸麻子大每服二三十丸生姜米飲下無	時



治嬰小吐瀉	亂髮 燒半兩 鹿角 末一分	右同研細米飲服一錢日三	治嬰小吐瀉	右以特猪屎燒為末水調汁少少與服	丁香安胃丸治小兒胃虛氣逆嘔吐泄瀉煩渴欲飲精	神昏困	肉桂 半兩 丁皮 藿香 去土 滑石 茯苓 各一兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末煉蜜和丸鷄頭大每服一丸溫湯化下無	時	溫中丸治胃寒瀉白腹痛腸鳴吐酸綠水不思乳食	人參 去蘆 甘草 炙 白朮 各一兩	右為末姜汁糊丸菉豆大米飲下一二十丸無時	糯米湯治吐瀉不止	糯米 粒一百 木香 黃連 去鬚三味剉碎如米	右同炒至米焦黃去木香黃連不用只以米為末後



用枇杷葉去毛淨焙乾等分為末和勻白湯調半錢 無時	進食丸治傷飽乳食不消壯熱腹痛脹滿吐衄無度 木香 枳殼 去穢炒 當歸 去鬚洗焙 代赭石 火煨醋淬不計遍數以易	碎為度 朱砂 研飛各半兩 巴豆霜 一分	右為末糊丸黍米大一歲兒一丸溫水下無時	不二丸治傷食吐瀉不止	巴豆 三十粒去皮心膜研細別用好黃連半兩水浸濃汁染紙二張裹巴豆壓去油	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	朱砂 末一錢水飛 寒食麵 一錢	右同研細滴水丸和丸菴豆大新水磨化一丸服無時	感應丸治脾胃虛怯乳食過度吐瀉身熱腹滿	肉苳蔻仁 四箇麵裹煨 丁香末 三錢 川姜末 二錢 木香 三錢	百草霜 四分 杏仁 二十八箇去皮尖別研取霜 巴豆 十四箇去皮膜出油盡取霜	黃蠟 二兩熔濾去滓却入好酒同煮半時放冷凝	右同為細末研勻先熔煉蠟和藥成膏恐硬時更入	油少許每用旋丸如黍米大三四粒溫水下乳食前



荳蔻散治伏暑傷熱吐瀉煩渴腹脹小便少	硫黃 一分 白滑石 三分 丁香 一分 白荳蔻 各半	右為細末每服一字或半錢米飲調下無時	藿香散治伏暑冷熱不調吐瀉不止	藿香 去土 白芷 各等分 丁香 各等分 縮砂仁 各等分	右為末每服半錢沸湯點服無時	香石散治伏暑煩躁吐瀉發渴	丁香 各等分 滑石 各等分 硫黃 各等分 白芍藥 各等分 甘草 各等分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末每服半錢米飲調下無時	三和散治伏暑吐瀉津液燥少	白茯苓 一兩 烏梅肉 半兩 乾木瓜 半兩	右為細末每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服無時	烏燼散治中暑暈煩躁悶亂吐瀉	右以穀精草不限多少燒存性用器覆之放冷研為	細末每服半錢或一錢冷米飲調下無時



大七寶散治霍亂吐瀉	木香炮 丁香炒 桂去麋皮 茯苓 人參 麻黃去節	訶子去核 當歸去鬚 甘草炙 大腹皮 川練子去核	秦艽去蘆炒已 地榆二錢 藿香去土一錢半炒	肉苳蔻一箇麵裹煨	右為末每嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢水半	盪入棗半箇煎數沸溫服無時	建脾膏治霍亂吐瀉	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	丁香 藿香去土 人參去蘆各一兩 沉香 木香各半兩	右為細末煉蜜和膏每用鷄頭子大粟米飲化服無時	人參湯治如前	人參去蘆一兩 厚朴去麋皮生 甘草半兩炙 白朮三分	生姜三分	右咬咀以水一升二合煮取半升六十日兒服一小	合百日兒分四服周晬兒分二服乳空服之乳母忌



生冷油膩	蒼朮湯治小兒霍亂吐瀉	人參 去蘆 蘆薈 各半 扁豆藤 二兩 蒼朮 一撮	右為麤末每服二錢水七分煎至五分去滓溫服立	驗無時	又方名同治同	人參 一兩 木瓜 一箇 蒼朮 一撮	右㕮咀量兒大小用煎如前服立效	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治小兒霍亂吐瀉	右以牛涎一合灌兒口中量大小加減	人參調胃膏治霍亂吐逆服藥不下煩渴者宜先服此	藥	人參 去蘆 白朮 丁香 各一兩 乾姜 炮 甘草	赤茯苓 各半兩	右為細末煉蜜和丸皂子大每服一丸熱湯化破以	新水沉極冷即服無時



快鬲散治霍亂吐逆服藥多即吐先服此藥	甘草 半 兩良姜 微 炮肉荳蔻 麵裹 丁香 各一分	右為細末每服半錢新汲冷水調下	白朮膏治傷暑伏熱頭目昏痛霍亂吐瀉煩躁作渴	小便不利心胸滿悶	白朮 澤瀉 各半兩 茯苓 人參 去蘆 滑石 各一分	右為細末煉蜜和膏每用一皂子大煎麥門冬湯放	溫化下無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治霍亂不止	右以訶梨勒一枚去核為末沸湯研頓服如未差再	作	丁香丸治霍亂吐瀉面青四肢冷虛汗出	丁香 藿香 去土各一分 人參 去蘆 半兩	右為末煉蜜和丸麻子大每服五丸粥飲下無時	丁香散治霍亂不食	丁香 一分 人參 半兩



右為麤末每服一錢水一小盞煎至五分去滓服	斗門散治霍亂吐瀉轉筋	附子 生一枚 胡椒 一百粒	右為末每服半錢漿水一小盞煎至四分溫服	七寶散治霍亂吐瀉腹內撮痛	白朮 四兩 人參 去蘆 白茯苓 各半兩 甘草 一兩	草薢子 大者二箇 訶子 四箇 乾姜 一錢	右為細末每服一錢水半盞入棗一枚姜三片同煎	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	至七分帶熱服三歲下者藥半錢水半合煎之瀉不	止與香連丸間服	香連丸治冷熱不調霍亂吐瀉服內疴痛	黃連 去鬚擇盡一兩杵碎微炒 木香 一分 訶子 七箇	肉荳蔻 二箇 麵 裹煨	右為細末姜汁糊和丸菴豆大每服十丸十五丸米	飲下無時日四五服	治霍亂不止



寡婦薦草治如前小兒霍亂吐瀉	右取寡婦薦草二七莖煮飲之	又方 右取蠟 音 螭 音 窠微炙為末乳汁調下一字乃	螺贏蟲	又方 右取芹葉細切煮熟汁飲之任意多少得止為	度	香豆散治霍亂煩渴吐瀉	藿香 去 甘草 一 肉荳蔻 麵裹煨 白扁豆 各一兩	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	人參 去蘆各半兩	右為末每服一錢水八分盞入生姜二片煎至五分	去滓溫服	吐瀉後証附	醒脾散治吐瀉初定脾胃虛弱恐生風者便當與服	右以天南星沸湯浸洗七次為細末一歲兒半錢七	用河水七分盞入冬瓜子七粒同煎至半放溫旋旋	與之



碧香丹治吐瀉後大渴不止不得眠睡甚則變疳	天竺黃 不灰木 燒赤放冷 赤石脂 龍骨 煨各一兩先為細末	膩粉 定粉 鉛 白霜 蛤粉 各一兩別研	右拌勻入麝香半兩再研滴水和丸雞頭子大每用一粒或半粒同蛇螺兒三箇細研沸湯浸化却用冷水沉極冷服大渴即與神驗	丁香黃耆散治吐瀉後脾胃虛弱不能飲食漸成羸瘦面色青白或作痢時下時止	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	丁香 綿黃耆 剉 人參 去蘆 白朮 當歸 洗	鼈甲 酥炙黃去裙襴各一兩 胡黃連 甘草 炙各半兩	右為細末每服一錢水一小盞入生姜二片棗一箇同煎至五分去滓溫服食前	香茂散治瀉後但胸中不快	藿香 去土 蓬茂 炮 茯苓 焙各等分	右為細末每服半錢或一錢白湯點服無時	中和散治吐瀉定後煩渴



人參去蘆 白茯苓 白朮 甘草炒劉 乾葛劉 白扁荳炒 黃耆切 藿香去土各等分 右為細末每服二錢水一盞棗一箇去核生姜三片煎至七分放溫服無時		欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	小兒衛生總微論方卷十



欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷十二

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣譚世緯



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷十一

八痢論

小兒氣血怯嫩藏腑軟弱因觸胃風寒飲食冷熱以邪干正致脾胃不和凝滯停積蘊毒結作或水穀不聚或膿血純雜變而為痢其候有八一曰水穀痢謂便下糞稀薄而不聚駛利出易水穀不化也然雖是瀉便時亦覺裏急後重故為痢也二曰冷痢謂便下純白膿也三

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

曰熱痢謂便下純赤血也四曰滯痢謂便下膿血相雜也五曰積痢謂有積傷為痢浸久或差而復發也六曰疳痢謂患疳瘡而下痢也七曰蠱痢謂如蠱毒下紫黑血或如赤豆汁或如鷄鴨肝片也八曰休惜痢謂下血黑黯中有白物如腸中之脂或如爛魚腸之狀此腸胃潰傷患者更休愛惜故以名之亦名休息者謂患即無休息而至死也凡痢若粥藥不能進者此便為死候也治水穀痢方已具前瀉項之下



治冷痢方	玉腸散治冷痢初即大便青色後乃作膿	白石脂 當歸 洗 丁香 白朮 各一兩 草薢 去皮	厚朴 姜製各半兩	右細末每服半錢粥飲調下無時	厚朴圓治藏寒泄瀉下痢純白腹中絞痛虛氣脹滿手足逆冷	厚朴 姜製半兩 訶子 半兩炮去核 白龍骨 半兩 白礬 半兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右用一器盛之鹽泥固濟留一竅子木炭火煨烟息為度取出為末麵糊和圓黍米大每服十圓米飲下食前	烏骨散主治如前	右烏魚骨去皮研細末每服半錢米飲調服或炙黃用之亦治婦人漏血	藍汁主治如前	右以藍青取葉搗令極爛絞取汁略溫每服半合或



一合無時	馬齒汁主治如前	右杵生馬齒菜絞汁略溫每服一合入蜜一匙頭許	調勻空心服	石蓮散主治如前	右以石蓮不拘多少去皮用沙糖炒過為細末每服	一錢米飲調下乳食前累驗	胡黃蓮圓治血痢下多久而不差或作藏毒下血帶青	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	黃色	胡黃連 炒 蕪荑 揀淨 夜明沙 各一分	右末猪膽汁和圓黍米大每服十圓陳米飲下無時	治赤白滯痢方	嬰粟飲子治赤白滯痢	嬰粟殼 半兩 蜜炙人參 去蘆一分 厚朴 去麤皮生 白茯苓 半兩	甘姜 一分 烏梅 三箇 連核用 御米殼 三箇 阿膠 三片 炒焦去粉	右同末每服一錢水酒各半盞煎數沸溫服乳食前



嘔吐者不可服	三奇湯治白痢	御米殼 二兩塗蜜炙 酸石榴皮 一兩塗蜜炙 阿膠 半兩蛤粉炒去粉	右細末每服半錢烏梅甘草湯調送下乳食前	治熱痢方	勝金圓治熱痢下血	黃蘗 去麤皮半兩 赤芍藥 四錢	右末飯和圓如麻子大每服一二十圓米飲下乳食	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	前	當歸散治如前	當歸 去蘆并土一分焙 芍藥 一分炒 黃蓮 去鬚一分炒	枳殼 一分去穰炒黃	右細末每服半錢水五分煎至三分溫服下血多者	入甘草一寸同煎乳食前	槐花散治血痢不差	槐花 揀淨炒 地榆 炒各等分



右細末每服半錢一錢米飲調下乳食前	聖効散治血痢久不差	赤石脂 一兩 白龍骨 一兩 阿膠 一兩 劉蛤 粉炒去粉	訶黎勒 煨去核 木香 半兩 黃連 半兩 乾姜 半兩 炮	甘草 半兩 炙	右細末每服半錢煎粟米飲調下食前	厚腸圓治血痢腸虛	黃連 去鬚 川練子 去核各 木香 阿膠 劉蛤粉炒去粉	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	當歸 去蘆并土 吳茱萸 去枝梗微炒各半兩	右細末粟米飯和圓黍米大每服一二十圓米飲下	食前	白梅飲子治血痢不止	右以白梅一枝去核鹽水研爛合臘茶醋湯沃服之	昔陳應之治曾相痢血百餘日諸醫不能療陳用此	一啜而差又梁相亦病痢血應之曰此挾水穀者用	三物散數服而愈



三物散	胡黃連 烏梅肉 竈下土 各等分	右末每服一錢臘茶清調下食前空腹溫服	又方治熱痢下血頻併不差	右以白梅五箇取肉臘茶二錢同研勻細每服一錢	或半錢白湯調服或以醋湯沃服之量大小加減食	前	黃蓮丹治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	黃連 去鬚二兩 當歸 去蘆并土一兩 白頭翁 去蘆三分	蔓菁根 三分洗焙乾 木香 半兩 川練子 麵裹煨去核用半兩	右細末粳米飯和圓黍米大每服十粒米飲下乳食	前或十五粒	必効圓主治如前	川黃連 去鬚二兩 大棗 半升 乾姜 一兩 肉苳蔻 一分麵裹煨香去麵	右細末糊圓黍米大每服五七圓米飲下乳食前兒	大增之



雄黃散治腸胃虛冷下痢頻併腹痛不可忍後重努軀	肛脫	雄黃 一分研細水飛 乳香 一分研細 白礬 飛過一錢研細	右同研勻每服嬰孩一字二三歲半錢陳米飲調下	日三服乳食前	艾葉湯治虛冷下痢白膿	艾葉 一兩微炒 當歸 去蘆并土一兩 乾姜 一兩炮 木香 半兩	訶梨勒 煨去核用半兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右細末每服一錢水一小盞入粟米少許同煎至五分去滓溫服食前大小以意加減	又方治如前	右以臘茶一錢入熱醋少許調服乳食前大小以意加減	又方治如前	右以沙牛角鯁燒存性為末粥飲調下一錢或半錢乳食前



阿膠圓治如前

赤茯苓 赤芍藥 各一兩
為細末

右以米醋煮阿膠一兩和圓菴豆大米飲下一二十

圓乳食前

酒煎湯治腸胃虛冷泄瀉不止變成白痢

甘草 半兩
炙

右麤末每服二錢水一盞生姜三片棗一箇煎至半

盞去渣放溫量大小加減服赤多者加黑豆十粒同

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

煎

三神丹治如前

右以肥大無尖草烏頭三箇各去皮一箇生一箇炮

熟一箇燒作黑灰同為細末麵糊圓如蘿蔔子大每

服三粒水瀉井花水下白痢乾姜湯下赤痢甘草湯

下赤白滯痢乾姜甘草湯下食前

木香炒蓮圓治脾胃虛弱寒濕冷熱相搏滑泄下痢赤

白



黃蓮 二兩 龕好折開如金色者剉勻如豆大又用 生薑四兩淨洗亦勻切如豆大同入石銀器 中炒不住手攪貴得勻也炒至 生薑焦脆去姜不用只用黃蓮 訶子 煨去核 用半兩	木香 兩半	右同細末以濕紙包粟米飯慢火煨水脉溜取出和	藥圓如菉豆大每服二三十圓食前米飲下神効	金鎖散治赤白滯痢日久不差	黃蓮 去鬚一分用菉萸一分同 炒去菉萸不用只用黃蓮 厚朴 去龕皮半 兩生薑製	右同細末嬰孩一字二三歲半錢紫蘇木瓜湯調下	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	日三服食前	赤脂丹治如前	赤石脂 乾姜 炮 肉荳蔻 各一兩 麵裹 煨香去麵用	右細末麵糊圓黍米大每服十粒米飲下食前	治小兒下痢膿血	華澄茄 兩一破故紙 半兩 炒黃 黃蓮 去鬚 半兩 木香 一分	右細末每服半錢陳米飲調下食日二服量兒加減	治小兒風邪所干下痢頻併裏急後重



以天南星一兩生為末每服半錢水二盞生姜十片
米十粒煎至半盞溫服食前

治小兒久痢藏毒下膿血不止

以好大棗一箇去核入黃丹半錢硃砂一皂子許膩
粉十文並研細置棗肉內用大麥麵裹慢灰火中炮
香熟去麵并棗皮了研極細入少軟飯圓如麻子大
量兒大小加減圓數煎槐花湯下甚者二服定食前
小桃花圓治小兒赤白痢

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

赤石脂 龍骨

煨

蜜陀僧

定粉

黃丹

炒紫黑
色用

右等分醋糊圓菜豆大每服十圓十五圓米飲下乳
食前

治赤白諸痢

以蜂房燒末飲服量大小與又以鷄腸草取汁一合
和蜜溫服良以雲母粉半兩更研極細量兒大小加
減煮白粥拌只空腹食之

又以胡粉熟蒸熬令色變飲服之亦治無辜痢良大



小以意加減	治久痢不差	以沒石子二箇剉熬令黃研細作餛飩食之	治小兒諸痢香蓮圓	黃蓮 去鬚 龍骨 煨 白石脂 川姜 炮 枯礬 各一兩	右末以粟米粥和圓麻子大每服三十圓米飲下乳	食前量大小與服	木香黃連圓治冷熱相雜下痢赤白裏急後重腹痛絞	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	撮及腸胃氣虛暴傷乳哺	木香 黃連 去鬚各一分 白附子尖 二箇炮	右細末粟米飯和圓菴豆大或黍米大每服十圓至	二三十圓量大小與之食前米飲下日夜三四服	四神散治諸般赤白痢	當歸 去蘆并土焙 乾姜 炮 黃蘗 炒 黃連 去鬚炒各等分	右四味各自為末如水殼利各用半錢和勻量兒大	小一錢至半錢濃煎烏梅湯調下赤痢者加黃蘗倍



之白痢者加乾姜倍之後重裏急腸痛者加黃連倍
之腹中絞痛者加當歸倍之並空心食前服沈存中
言予家常作此藥最獲大効

櫟皮湯治如前

右以新櫟皮不拘多少去外黑皮細切曬乾每服二
錢水一盞煎至半盞去渣更煎如膏量大小溫服立
差食前

又方治如前

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

右以鷄子一箇取清攤連紙一張令徧曬乾疊作四
重包撮烏梅十箇有肉好者安熨斗內炭火燒烟欲
盡存性取出頓一椀中上用盞子合之候冷研細更
入水銀粉少許和勻量兒大小分三五服空心井花
水調下如一服微利止後服

二色圓治如前神

吳茱萸

揀去枝梗二兩

黃連

去鬚二兩

巴豆

四十九箇去皮

右同於銚子內炒令黃赤色去巴豆不用只將上面



二味各自為末麵糊和圓如蘿蔔子大看大小緊慢 加減圓數如白痢只服茱萸圓赤痢只服黃連圓白 多赤少者多服茱萸圓赤多白少者多服黃連圓赤 白相等者中半服之	御米湯治如前	御米十箇和甘草二錢當歸去蘆洗黃連去鬚 殼用	右末每服一錢米飲調下乳食前	嬰粟圓治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	嬰粟殼一兩蜜炒一錢酸石榴皮燒存性甘草半兩 四錢	阿膠一錢粉炒劉蛤去粉	右末煉蜜和圓小鷄頭肉大每服一圓水六分盞化	開煎至四分溫服乳食前	三烏圓治如前	川烏一箇草烏一箇巴豆七箇	右各燒及九分同研細酒煮黃蠟鎔化入少好油拌 和攪勻成膏每用旋圓茱萸豆大每服三圓看大小加



減血痢黃連湯下白痢乾姜湯下水穀痢倒流水下	赤白痢乾姜甘草湯下	固腸圓治赤白滯痢多日不可漸成羸瘦	黃連 去鬚 二兩 木香 二兩 半夏 二兩 洗七次 乾姜 二兩	赤石脂 二兩 厚朴 二兩 白朮 二兩	右為細末麵糊和圓黍米大每服十圓米飲下乳食	前	建胃丹治赤白等痢疾日久尪羸	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	黃連 去鬚 炒一兩 白龍骨 半兩 白石脂 半兩 神麴 半兩	烏梅肉 半兩 乾姜 半兩 白礬 一兩	右細末醋糊圓和黍米大每服十粒十五粒米飲下	乳食前	妙應膏治久痢赤白諸藥不効	蜜陀僧 半兩 黃丹 半兩 定粉 半兩 巴豆 十粒	茶火熬 如 訶梨勒皮 各一兩 木香 並末	油砒霜 半錢 麝香 一錢



右同研勻細先以黃蠟四兩慢火鑠化入藥拌勻熬成膏每用旋圓黍米大未晬兒一粒二三歲兒二粒四五歲三粒六七歲五粒血多冷甘草湯下膿多溫艾葉湯下臨卧服忌熱物亦治積痢

金華散治滯痢多時羸瘦體弱不堪疾勢困重

右好黃連為細末每服一錢水一小盞煎至半盞入蜜少許和勻放溫服之日五六服食前

又方治如前

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

右以麻子一合炒香熟為末每服一錢溫蜜漿水和服立効

木香三使湯治赤白久痢拖延時月至天寒不斷

右以木香方寸許黃連半兩水半升同煮至水乾去黃連不用只將木香薄切焙乾為末分三服第一服橘皮湯調下第二服陳米飲下第三服甘草湯調下乳食前

烏金散治赤白滯痢及有所傷下痢



右以青州棗不拘箇數去核入白礬末滿以紙裹煨
 存性為末每服半錢米飲調下未愈宜取之如赤者
 更入好茶半錢同調服白者不用

治積痢方

軟金丹治久積成痢

砒霜 雄黃 飛 研水 巴豆 去皮膜

右三味等分各研細末先以黃蠟看多少於石銀器
 內炭火鎔化入藥末竹篦子左右手各攪四十九遍

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

如此七次數足取下火乘軟搓成小鋌以油單裹置
 新磁器中要用火烘軟旋圓如粟米大或如蘿蔔子
 大三五粒量大小病勢加減赤痢溫蘼汁下白痢或
 赤白雜下並米飲下乳食前

大尊重圓治虛中有積腸滑下痢裏急後重臍腹疼痛

粉霜 錢三 黃丹 兩半 定粉 兩半 礪砂 兩半 膩粉 錢二

京三稜末 兩一 白麵 錢五 少即 添些小

右為末同勻滴水和圓曬乾炭火上炒令烈焦再



杵羅為末棗肉和圓菴豆大每服一二丸米飲下乳食前	朱砂萬應丸治積痢久痢滯痢一切諸痢多日不差 朱砂末 錢一 礪砂末 錢一 巴豆 七箇去皮膜 臘 二棗大許	右於銚子內先鎔蠟化入巴豆熬至黑焦去巴豆不用却入上二味攪極勻放凝為劑如用旋丸如菴豆大每服三丸白痢艾湯下赤痢黃連湯下赤白痢黃連艾湯下水穀痢新水下乳食前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	針頭丸治如前	朱砂半錢砒一錢 巴豆七箇用油煎 硫黃只使骰子大 研末更用蠟為丸	右旋丸針頭大每服一圓米飲下量兒大小加減圓數食前	燒青丸治諸積痢	輕粉 錢二 玄精石 一分 霜粉 錢一 礪砂 錢一	右為末入白麵二錢拌勻滴水 和劑 捻作餅子文武



火燒熟再研為細末滴水 和丸芥子大漿水下三四	丸一方保州邵廉訪方無礪砂却有龍腦一字餘並	同亦不燒只為末水浸蒸餅圓麻子大一歲兒 一丸	二三歲二丸四五歲三丸六七歲五圓並夜深空腹	冷水送下如虛中沉積泄痢膿血交下腹痛煩渴百	藥不効不敢取轉者服之便愈並不動氣忌一切生	冷油膩毒物又名瑞白丸	治疳痢方 在疳疾之下	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治蠱毒痢方	育腸湯治蠱痢下血如豆汁赤水腹痛	罌粟殼 五兩細剉蜜水酒勻炒 地榆 槐花 蜜拌炒赤 厚朴 去麋皮生薑製	甘草 炙 橘皮 去白 酸石榴皮 當歸 去蘆洗焙 白芍藥	五倍子 去其中蟲各一兩三錢 阿膠 蛤粉炒二兩去蛤粉	右為麤末每服二錢水一盞入陳粳米二十粒 湯一	塊皂子大煎至五分去滓溫服食前	緩腸湯治蠱痢如前



人參去蘆 白朮 當歸去蘆並土 白茯苓 厚朴去麋皮生薑製 白芍藥 甘草炙各一兩 阿膠蛤粉炒去蛤粉 黃耆蜜炙 陳粳米炒各二兩 御米殼蜜炙三兩 右為麤末每服二錢水一盞入生薑三片棗一箇同煎至五分去渣溫服空腹食前日三服 犀角散治蠱痢如前	犀角屑 地榆剉 黃連去鬚剉 栝葉微炒 黃蘗微炙	黃芩 當歸去蘆土洗淨微炒 赤薜荔取葉 生地黄各一兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末每服一錢粥飲調下乳食前	地榆圓治蠱痢腸中畜毒下血如豆汁或諸惡物	地榆一兩剉多 黃連去鬚一兩 乾藍葉一兩 川升麻一兩	川練子去核半兩 苦練子去核半兩	右為細末軟飯和丸如黍米大每服十九米飲下量	大小加減乳食前	地榆樗皮丸治如前	地榆四錢 樗根白皮三錢 白芍藥一錢半 阿膠蛤粉炒去錢



當歸去蘆洗淨一錢烏梅肉二錢木瓜一錢枳殼去穰一錢	茯苓一錢肉苳蔻一箇甘草二錢木香一錢	綿姜半錢金櫻子二錢人參半錢	右為末煉蜜丸麻子大每服三二十九米飲下乳食	前	地榆散治蠱毒痢下血或如鷄鴨肝片腹痛不止	地榆一兩甘草半兩赤芍藥一兩栝葉一兩茜根一兩	當歸去蘆洗淨一兩訶梨勒一兩黃連去鬚微炒一兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為麤散每服二錢水一小盞煎至六分去滓溫服	乳食前	白頭翁散治蠱毒痢如鷄鴨肝片隨膿血而下	白頭翁去蘆黃連去鬚微炒茜根焙蘇枋木剉	故鼓皮炙焦各一兩犀角屑半兩地榆半兩甘草一分	右為細末每服一錢水一小盞煎至六分去滓溫服	乳食前	地黃汁治蠱痢畜毒下血



右以生地黄汁一升分四五服量大小與服食前立効	治休息痢方	鮓湯丸治休息痢下五色膿血如爛魚腸無糞腸中攪痛	粉霜錢一輕粉錢一朱砂研末硃砂研末白丁香錢末四	乳香研半錢巴豆七箇去皮心不出油	右為末和勻蒸去皮棗肉為丸粟米大嬰孩二三圓	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	二三歲兒四五丸旋丸兒大者圓如麻子大鮓湯送下日三服及與調胃氣藥間服大良亦治積痢蠱痢藏毒痢	神安圓治如前	砒霜字一龍骨煨二字烏魚骨字三赤石脂字二茯苓字三	黃連去鬚三字定粉字三乾姜炮三字黃丹火飛三字	右為細末入麝香少許拌勻飯和丸黍米大每服五圓輕粉湯下亦治諸痢赤者甘草湯下白者乾姜湯



下赤白雜者乾姜甘草湯下	樗根散治積年毒痢無休息	樗根白皮 大眼樹是也取北陰下根一截 擘破用之無北陰下者亦可	訶子 七箇取 皮去核	右用河水三升煮取一升去滓時時呷服一方二味	等分為麤末每服二錢水一大盞煎至半盞去渣溫	服時時呷服痢住喫淡粥飲乳將息	治諸痢雜証	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	龍骨散治下痢體熱煩渴	白龍骨 一兩 煨 茯神 三分 人參 三分 去蘆 胡黃連 兩半	茅根 三分 剉 麥門冬 三分 去心焙	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓服乳食	前	青黛散治下痢發渴不止 時舉方	青黛 一分 乾藕節 兩一分 蜜陀僧 兩半 漢羅 乃早螺 一分	右為末每服半錢米飲調下無時



冬瓜汁治如前	右杵冬瓜汁飲之	烏梅飲治如前	烏梅 十箇 去核 麥門冬 一分 去心 蜜 二兩	右分為五七服用水一小盞煎半盞入蜜攪勻服之	無時	楮葉湯治下痢發渴得水飲便嘔逆不止	右以楮葉炙令黃香用漿水半升浸之候水綠色去	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	葉以木瓜一箇切碎內汁中煮五七沸去木瓜放溫	細細服無時	治嬰小下痢腹大且堅	右以衣中白魚摩腹上	治小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中瘡爛坐蠶生	蟲	黃連 去鬚 土 藥皮 炒 苦參 鬼舊 獨活 去蘆 橘皮	芍藥 阿膠 蛤粉炒去蛤粉各半兩



右為末以藍汁及蜜和丸小豆大日服五圓至十九 冬時無藍汁用子一合為末入藥內	治小兒久痢膿汁濕蟹生瘡 右以艾葉一味每服二錢水一盞煎至半盞去滓溫 服更量大小加減乳食前	治小兒下痢腹脹堅硬 右以故衣帶多垢者切碎水三升煮取一升分服	治小兒卒暴下痢	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	以小鯉魚一頭燒灰末之米飲調下	以鷄子和黃蠟作煎餅與服	又以林檎楮子同杵取汁服以意服之	黃柿餅治秋痢	以黃柿搗和米粉作餅或作粥與食之	治小兒洞下滑痢	以羊角中骨燒存性為末飲調服方寸匕	治小兒脾胃虛怯泄痢腹痛



以揀肉荳蔻絕大好者一箇開一深竅填乳香一塊	用酵麵裹了慢火煨麵熟將藥為細末麵糊和丸棗	豆大每服二十丸乳食前米飲下	養胃丹治小兒藏寒下痢白膿頻數	附子 一枚重半兩者 赤石脂 一兩 川姜 一兩	訶梨勒皮 一兩	右為細末粟米飯丸黍米大每服十粒米飲下乳食	前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	脫肛	小兒脫肛者謂大腸肛頭脫出也此因瀉痢日久腸滑	冷氣相搏裏急下重而便難用力努軀致肛頭脫而下	出寒冷干乘不能收返得入今叙治方于後	治小兒肛頭脫出	以故麻鞋底炙熱得所按令入頻頻按之即不出或	燒鼈頭灰研細附上然後按入永差	以木賊燒存性為末摻上用手接按令入



鼈頭丸治小兒因瀉痢及冷搏積久脫肛下出不能返	收腸中疼而不得入	死鼈頭二箇灸小蝟皮一箇灸磁石火煅米醋淬	易碎為桂心三兩不	右為細末煉蜜和丸小豆大三歲至五歲兒五七丸	溫米飲下日三服一方不用鼈頭只三味	赤石脂散治因瀉痢努軀氣下推出肛頭不入	真赤石脂 伏龍肝等分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末每用半錢傅肛頭上頻用按入	蛛丹散治因瀉痢脫肛疼痛又名黑神散	右以大蜘蛛一箇瓠葉重裏繫定入合子內燒黑灰	存性入黃丹少許研勻凡用先煎白礬葱椒湯洗拭	乾將藥末摻在軟綿上手掌按入收之甚妙亦治	大人又一方桑葉裏鹽泥固燒	蕪荑丹治久痢大腸虛冷肛門脫出	白蕪荑去枝一兩炒鼈甲一兩酥炙蝸牛殼一兩



磁石 燒醋淬十次研水飛 黃連 去鬚微炒半兩 蚺蛇膽 兩半	右為細末軟飯和丸黍米大每服十粒粥飲下乳食前	二金散治久痢腸頭虛冷肛門脫出	龍骨 一兩煨 枯鼈殼 一枚塗酥炙黃用一兩	右為細末每用一字或半錢乾摻上按按內之	又方以白龍骨研如粉撲之	又以鼈頭燒灰細末撲之	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	又以沿桑螺燒末和猪膏傅上立縮收之此螺全似	蝸牛而微黃小雨後沿葉而生	又以虎骨燒末水調服半錢或一錢日三甚良	治小兒大腸隨肛帶出轉久不能收之	以生括樓取汁塗之	以猪肉汁蘸手隨按之令暖自入	又以乾胡荽切一升燒烟熏之則縮入	又以木賊不拘多少燒存性為末摻上按按之



縮沙散治小兒滑泄肛頭脫出	以縮沙一兩去皮為末每用一錢以猪腰子一片批	開入藥末在內線繫米泔煮熟與兒食之次服白礬	丸如脫肛氣逆遍身虛腫喘急者死不治	白礬丸	白礬 ^枯 定粉 寒水下 ^{煨各等分}	右為細末爛飯研細和丸黍米大每服五丸煎烏梅	湯送下乳食前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	斗門散治小兒瀉痢多時青黃羸瘦脫肛不收	訶子肉 枳殼 ^{去穰麩炒黃} 地榆 ^{各等分}	右為細末每服一錢米飲調下一歲下者半錢乳食	前	又方治如前	香附子 荊芥穗 ^{等分}	右為麤末每用三匙以水一大碗煎十數沸淋 [□]	又方以浮萍草不拘多少曬乾杵為細末乾貼上以蠅



蝶兒不拘多少陰乾為末塗手心接上即止										欽定四庫全書		小兒衛生總微論方										小兒衛生總微論方卷十一									



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷十二

五疳論

小兒疳病諸論叢雜唯五疳之說為當其証候外則傳
變不同內則悉屬五藏一曰肝疳其候搖頭揉目白膜
遮睛遍身多汗喜覆面而卧眼中澁痒色澤青黃髮豎
頭焦筋青腦熱腹中積聚下痢頻多日漸羸瘦二曰心
疳其候渾身壯熱煩赤面黃心胃鬲腕煩躁滿悶口舌生

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

瘡盜汗多驚下痢膿血神彩衰耗三曰脾疳其候腹大
如鼓上多筋脉喘促氣麤心腹壅脹多啼咳逆水穀不
消唇口乾燥好食泥土情意不樂憎明好暗痢多酸臭
肌肉內消形枯力劣甚則大肉陷下四曰肺疳其候咳
嗽氣逆皮毛焦落咽喉不利操鼻咬甲口鼻生瘡腹內
氣脹乳食不進大腸不調泄利不常憎寒體慄糞中米
出洞下白泔五曰腎疳其候上熱下冷寒熱時作齒斷
生瘡耳焦腦熱手足逆冷吐逆滑泄下部生蠶脫肛不



收夜啼饒哭漸成困重甚則高骨乃敗小兒疳疾乃與
大人勞瘵相似故亦名疳勞大人勞者因腎藏虛損精
髓衰枯小兒疳者因脾藏虛損津液消亡病久相傳至
五藏皆損也大人勞疾骨削而氣耗小兒疳疾腹鼓而
神羸以其病之始也其藏之傳受不同故也至於傳久
五藏皆損則一也故五損者經言一損於皮毛皮聚毛
落肺也二損於肌肉肌肉消瘦飲食不為肌肉脾也三
損於血脉血脉虛少不能榮於藏府心也四損於筋筋

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

緩不能自收持肝也五損於骨骨痿不能起於牀腎也
病極則大肉陷下高骨敗壞以至死矣凡小兒疳疾多
是轉下所壞小兒藏府嫩軟易虛易實一切於諸病悞
行轉下致脾胃虛弱津液內耗皆能成疳且如潮熱日
中時發者是脾藏虛心藏實日中乃心用事之時而內發其熱法
當先補其肝母肝乃心之母也肝實而後瀉心心得母氣則平
而潮熱乃愈醫見潮熱妄謂其實便以大黃牙硝等冷
藥利之利既多而不能禁則津液內亡漸成疳也又如



癖病發作寒熱飲水脇下有形而硬痛法當用藥漸消
磨之醫見有癖便以巴豆礪砂輩駛藥下之下既多而
津液耗則漸成癖也又如傷寒五六日之後有下証因
以冷藥下之太過致脾胃虛而津液耗即便引飲不止
而熱生如此則熱氣內耗於津液肌肉外消而羸瘦他
邪相干証變百端亦因成癖也又如吐瀉病久津液耗
亡亦能成癖也又如小兒食肥甘物多因傷為積則蘊
痢發熱津液內耗亦能作癖故甘即癖也聖濟經云肥

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

甘之過積為癖黃乃謂是矣故諸病皆能成癖也甘癖
之候眼濇多困或生白膜唇口淡白身色黃黑食泥土
生米喜卧冷地疥癬頭瘡洞泄青白黃沫下痢膿血腹
滿喘咳耳鼻生瘡髮稀作穗頭大項細肚大青筋脚手
垂蹶瘦瘠飲水筋痿骨重形劣尪羸皆其証也本因脾
虛津耗久則傳變而成傳緩者則為慢癖傳緊者則為
急癖又當辨認冷熱肥瘦其肥熱癖者乃因食肥甘積
聚生熱而作故多病於初也錢乙治用黃連丸其瘦冷



疳者乃因轉下瀉痢生冷而作故多病於久也錢乙用
木香丸通治冷熱疳者錢乙用如聖丸凡治小兒之病
必量虛實冷熱不可妄行轉下恐變生疳也若病初之
脾虛津少發渴欲飲者當生胃中津液煎錢乙白朮散
與服惟多則漸好其錢乙諸方本集載之

又有一証其候腹中有塊身體羸瘦毛髮焦稀腹大氣
喘冷痢脫肛喫食愛吐俗曰無辜寶鑑云按玄中記有
無辜之禽一名姑護一名鈞星鬼但喜夜飛人有暴露

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

小兒衣袂裯包其禽飛立在上令兒患此疾也予性好
尋閱異書十餘年間竟不知玄中記之所出又此禽既
云夜飛必有形狀世間亦莫之曾見是必巫覡假以鬼
名而偽言者也今詳其証而對其病實乃疳疾之候耳
特為破其邪說以祛惑亂矣

治五藏疳方

地黃丸治肝疳拘急疳氣入眼隱澁或生白膜暈翳赤

脉等疾



熟地黄 錢八 山茱萸 取肉 錢四 乾山藥 錢四 澤瀉 錢三	牡丹皮 去心 錢三 白茯苓 去黑皮 錢三	右為細末煉蜜和丸桐子大三歲下兒一二丸上者	三四丸溫水化下空心	熊膽天麻丸治肝疳羸瘦搖頭揉目百脉拘急	熊膽 天麻 羌活 去蘆 蟬殼 土 去殼 使君子 去殼	胡黃連 各一兩 盧會 乾蟾 塗酥炙黃 各半兩	右為細末粳米飯和丸黍米大每服十丸煎荊芥湯	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方 下量大小與無時	奪命丹治心疳體熱驚搐煩渴髮稀肚大泄瀉羸瘦	朱砂 麝香 牛黃 腦子 盧會 沒藥	硼砂 熊膽 麒麟 兩 蝸半 粉霜 錢一 使君子 十箇 去殼	青黛 錢三	右為末滴水丸豌豆大每服一粒薄荷水化下日	三兒大二三丸	朱黃丹治心疳挾驚發熱煩渴盜汗羸瘦



朱砂一分研 天竺黃半兩研 乾全蝎二十一箇微炒去毒	天漿子十四箇去殼微炒 人參去蘆一兩 胡黃連一兩 青黛一分研	龍腦一錢研	右為末拌勻煉蜜和丸黍米大每服十粒人參湯下	無時	黃聖丸治脾疳發黃身腫	黃土一兩末 陳皮去白一兩 木香一分 巴豆二十箇去皮膜出油盡	右為末飯和圓粟米大每服三二丸煎黑豆汁送下	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	無時	木香煎治脾疳因不知飢飽積滯內停腹大脚細下痢	無度	南木香一兩剉 肉荳蔻一兩煨去麩 乾蟾二箇炙	胡黃連一兩 使君子去殼一兩 五靈脂一兩 巴荳七箇去皮心膜紙裏	出油 麝香一分研	右為末細勻滴水和劑入石臼杵一二百下圓如黍米大每服一二丸至五七丸量大小與溫生薑湯下



乳食後一歲下者一丸二歲上者三丸以意加之	肉荳蔻丹治脾疳如前	肉荳蔻 一兩 麩 使君子 去殼 一兩 青皮 去穰 一兩 炒黃	牽牛子 一分 炒黃 四味為末 盧會 一分 研 麝香 半錢 研	右研勻細糯米飯和丸黍米大每服十圓生姜湯下	食後	香連散治脾疳泄瀉腹大脚細漸成瘦弱及諸脾胃不	和氣不調順並能治之	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	木香 一分 黃連 去鬚 半兩 訶子 煨去核 取皮 一分	肉荳蔻 三箇 麩 甘草 一分 炙	右為細末每服一字或半錢米飲湯調下乳食前	麝香丹治肺疳皮毛枯燥咳嗽上氣	胡黃連 一兩 半 半夏 半兩 湯洗七次 紫蘇子 一分 微炒 五味子 一分	乾蟾 一箇 酥炙焦 已上先為末 麝香 一分 研 盧會 一分 研 朱砂 一分 研	右為末細勻棗肉和丸黍米大每服五七粒米飲下	無時



靈砂丹治肺疳因咳嗽羸瘦皮枯毛落	人參 去蘆半兩 甜葶藶 炒一分 五靈脂 一分 胡黃連 一分 黃連 味為末	辰砂 研半兩 麝香 研一分 盧會 研一分 杏仁 炒黃一分	右為末拌勻粳米飯和圓黍米大每服十丸人參湯	下無時	石綠散治腎疳耳上生瘡及治肥疳頭瘡鼻爛浸久不	差	石綠 白芷 各等分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為末先以生甘草水洗瘡拭乾傳藥一日愈	蛙鷄灰散治腎疳成蟹腸虛蟲蝕下部肛盡腸等	右以長脚蛙青背一枚鷄骨一分同燒為灰細研為	末吹入下部中令深入數用大効	桃白散治如前	桃根白皮 一兩 黃蘗 一兩 蜜煉黃連 去鬚一兩 蛇蛻 燒灰半兩	乾蝸牛 燒灰一分 青州棗 五十箇去核燒灰	右為細末入定粉一分麝香末一錢同研勻每服一



字至半錢粥飲調下乳食前量輕重加減用藥		如聖丹治如前		乾蟾 七箇 燒灰 蟬殼 去土盡 半兩 蚬蛇膽 一分 大棗 一分 燒灰 已上		先為末 黃丹 一分 定粉 一分 麝香 一錢		右同拌研勻細用好醋看乾濕拌勻白杵一二百下		成膏丸黍米大每服五七粒米飲下量大小加減又		化三二粒調塗患處若蟲出乃愈		烏金膏治腎疳入經灌注陰囊黃亮色腫		欽定四庫全書		小兒衛生總微論方		通草 一分 黃皮 一分 大黃 一分 各存性		右同研為末每用一錢以獐猪膽調成膏於陰腫處		徧塗之如未退更煎蛇床子湯洗之再調塗必効		二肝丸治疳痢不止		龍膽草 去蘆 一兩漏蘆 去蘆 一兩菖蒲 一兩 胡黃連 半兩		地榆 半兩 已上 雞肝 一兩 猪肝 一兩		右將藥末入二肝內裹定以水二盞入鹽少許煮至		肝熟於石臼中杵一二百下成膏丸黍米大每服十	



粒麝香湯下食前

金靈散治腎疳時久骨沉力弱項細頭重致天柱骨倒
不能擎舉擡頭

右以白殭蠶不拘多少揀直者去絲嘴炒焦為末每
服半錢或一字一錢薄荷酒調下日三須臾用生力
散塗之

生力散

右以鼈子三箇草麻子三十箇各去殼取肉同研細

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

每用一錢許津唾調攤紙上先緊抱定兒措項上令
熱貼之

治疳瀉痢方

赤石脂散治疳瀉不止

赤石脂 川芎 各等分

右為細末量大小多寡米飲調下乳食前

二聖丸治瀉久不愈羸瘦成疳宜常服之

川黃連 黃栢 各一兩



右為細末將藥入猪膽內湯煮熟取出丸菴豆大每服二三十丸米飲下無時	竹筴丸治疳氣泄瀉煩渴其効如神	好黃連去鬚土一兩剉作塊子一一相侶 吳茱萸揀去枝梗一兩	右二味以蜜相和拌勻炒赤黃色去茱萸只用黃連為末薄糊和丸蘿蔔子大每服十丸煎竹筴米飲送下無時	六神丹治疳氣羸瘦藏府怯弱泄瀉虛滑乳食減少引	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	飲無度心腹脹滿	丁香 木香 肉荳蔻各半兩並麵裹煨用 訶子半兩煨去核稱	使君子去殼半兩 盧會一兩細研	右為細末棗肉和丸麻子大每服五七丸溫米飲下乳食前服此藥於夏秋間應小兒泄瀉色白或瀉多服藥不差者但與之便定	如聖丸治冷熱疳瀉	胡黃連 川黃連去鬚土 白蕪荑去扇取仁炒各二兩



使君子 去殼 一兩 麝香 半錢 研 乾蟾 三箇 剉 酒熬膏	右為細末入蟾膏和丸麻子大二三歲以下者兒五 七丸以上者十丸一十五丸人參湯下食前	木香散治疳瀉腹脹	木香 去穢 各一兩 青皮 去穢 各一兩 陳粟米 一合 巴豆 三十粒 去皮 同米炒至巴	豆黑色去巴 豆留米用 草荳蔻 二箇 一箇生用 一箇麵裹煨熟 蜣螂 二箇 去頭足翅	糯米炒 焦去米	右為細末每服一字或半錢米飲調下食前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	硫黃丸治疳瀉色白如米泔	巴豆 十四箇 去皮 膜出油盡 硫黃末 一錢 青黛 一錢 匕末	蕪荑 去皮 一錢 匕末	右拌研勻細水浸蒸餅和丸菴豆大米泔水送下三	丸食前	金粟丹治疳瘦泄瀉腹大好食泥土	母丁香 龍膽草 去蘆 厚朴 去薑皮 薑製 朱砂 飛 研	青黛 一兩 研各 夜明砂 炒 微 蟾殼 去土 盡 訶子肉 炒 微



右為細末和蜜一半麵糊一半相和丸黍米大每服	十粒米飲下無時	橘香丸治疳積黃瘦盜汗腹脹泄瀉宿滯不化氣促發	喘	陳皮 木香 各一兩 姜黃 片切 草荳蔻仁 白朮 炒劉	牽牛子 炒各半兩	右為細末滴水丸麻子大每服十丸葱白米飲下	食前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	木香芥粒丸治如前	陳粟米 二合 巴豆 半兩去皮膜同米炒 陳皮 半兩	檳榔 一兩 人參 去蘆一分 木香 一分	右為細末飯和丸芥子大每用看虛實大小加減三	五丸木湯下不拘時	麝香丸治脾熱生疳泄瀉氣弱不食	川苦練 取肉一兩用童子小便浸一宿焙乾 巴豆 半兩去皮膜同苦	色去巴豆不用 盧會 檳榔 蕪荑 半兩 沒石子 一分



麝香 許少	右為細末猪膽汁浸蒸餅和丸黃米大每服十九米飲下食後	吳婆散治疳瀉不止不計度數漸成羸瘦飲食減少衆藥不効	桃根白皮 一分 黃栢 蜜炙一分 蕪荑 去皮一分 黃連 去鬚一分微炒	沒石子 半錢 厚朴 去麤皮姜製一錢 木香 一錢 丁香 一錢	棟根白皮 半分 檳榔 一錢	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為末三歲以下兒每用半錢以上至六七歲者一錢煎紫蘇木瓜米飲調下食前日三屢驗此藥性小溫暴熱瀉者不可服一方無沒石子丁香檳榔三味	水蓼丹治疳氣羸瘦血痢	蛇蛻 一兩 牛黃 一分 雞頭殼 一兩二味 胡黃連 半兩	水蓼 半兩 硃砂 半兩 盧會 一分 粉霜 一分	右拌勻細軟飯和丸黍米大每服五七粒麝香湯下無時



龍骨湯治疳氣瘦弱下痢白膿久而不差	龍骨 兩半 訶梨勒皮 兩半 焙炮赤石脂 兩半 酸石榴皮 炒一分	木香 分一 使君子仁 分一	右為細末每服一字或半錢麝香湯調下無時	丁香散治如前	丁香 二箇 黃連 一寸 大棗 一箇 去核	右以棗裹二藥麻纏火上燒存性研為細末米飲調下無時	下無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	芫薺粥治如前	右以芫薺葉 即益母草也 煮粥食之或取汁飲亦妙	薔薇汁治如前	右以生薔薇根洗淨細切煎濃汁稍稍飲之	勝金丸治如前及加腹脹	右以鷄子一枚打一眸子如豆大入去皮巴豆一粒	膩粉一錢在內以五十重紙裹於飯甑內蒸三次取	鷄子肉同藥研更入麝香少許細勻添少糊丸如黍



米大食後臨卧溫湯下二三丸量大小與服一方用 鷄子一枚打破和膩粉炒乾為散米飲調一字或半	錢服	薤糯餅治如前	右以薤白一握生杵如泥同蜜和糯米粉研作餅炙	熱與喫不過二三次差	檮白棊子治如前	右以檮根白皮瀉細碎麵拌和切作小顆棊子日曬	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	少時又拌麵一次凡三過為度水煮熟加鹽醋頓服	量大小與困重者服之差	檮根米泔汁治如前	右以檮根白皮煮濃汁半鷄子殼和粟米泔半鷄子	殼同灌下部再作即差其驗如神	木香使君丹治疳氣羸瘠雖能食不生肌肉時時泄利	無休	使君子 去殼二兩炒 木香 一兩 丁香 一兩 厚朴 去麤皮生薑製一兩



沒石子 一兩 胡黃連 一兩 肉荳蔻 兩 麵裹煨去麵一兩已上先為末	盧會 一分 麝香 一分 研	右為末同勻以粟米飯和丸黍米大每服十粒煎陳	橘皮湯下無時乳食前	君子丸治疳勞發熱掃眉咬甲髮疎腹脹不思乳食羸	瘦虛滑下痢無度愛食泥土	厚朴 去麤皮 甘草 炙 青黛 訶子 姜製 炒去核取皮用各半兩一方一	兩半生陳皮 一分 白蕪荑 去扇 使君子 去殼一兩 半熟 去白 麵裹煨熟	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為末煉蜜和丸鷄頭子大三歲下兒半丸上者一	丸乳汁或米飲化下若夾驚熱瀉用之極妙	青黛散治諸疳瀉痢毛焦羸瘦	右以青黛研為細散水調服之量大小與	歌曰	孩兒雜病變成疳 不問強羸女與男	或侶積傷食不進 漸成柴瘦困耽耽 體熱口乾頻飲水 皮毛枯槁四支攤



腹大時時更下痢	青黃白赤一般般
眼濇面黃鼻爛赤	口氣增寒卧不安
忽然瀉下如泔淀	又似膿膠涕作團
肛頭凸出饒□哇	不忤哺乳淚潛潛
腹中有病須醫療	何須祈禱賽神盤
此方便是青黛散	孩兒服餌立安痊
赤虎丸治疳積瀉痢	
朱砂 別研 胡黃連	川黃連 去鬚 盧會
	膩粉 各一錢
欽定四庫全書	
小兒衛生總微論方	
硫黃 別研二錢 肉苳蔻	麵裹煨一 箇去麵 巴豆
去麩用巴豆別研 麝香 少許	二十四箇去皮用麩炒至麩黑
右為末研勻細麵糊和丸如蘿蔔子大甘草湯下一	
歲兒一丸以意加減	
漏蘆煮肝散治疳氣肚脹冷熱不調瀉痢無度	
右以漏蘆一兩為末每服一錢匕猪肝一兩鹽少許	
水煮熟空心頓服大治無辜疳	
君子散治五疳小便白濁瀉痢無度	



右以使君子仁為末米飲調服食前	厚脾丸治疳勞虛冷白痢泄瀉手足逆冷	厚朴 去麤皮姜製半兩 肉苳蔻 一箇麤裏煨去麤 龍骨 半兩煨	訶子肉 煨去核用半兩	右為細末糊丸菴豆大米飲下十丸無時	蝦蟇丸治諸疳疳瀉	盧會 研 黃連 去鬚 穀精草桂心朱砂 研各一錢	縮紗仁 二錢 熊膽 半錢溫水浸磨 麝香 半錢研	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右除研藥外細剉用一大蝦蟇去了肚腸入剉藥在	內以線縫合先用好醋浸少時次慢火炙洒醋又炙	至焦黑放冷杵研為末入研藥拌勻取獾猪膽汁和	丸菴豆大每服五七丸米飲下量大小加減此乃知	信州王紹祖方	治諸疳蟲動方	肥兒丸治諸疳久患藏府胃虛蟲動日漸羸瘦腹大不	能行髮豎作穗肌體發熱精神衰弱



黃連去神麴炒各使君子仁一兩肉荳蔻去麴	麥蘖炒各木香二錢檳榔二箇不	右為細末麵糊和丸蘿蔔子大每服二三十九熟水	下食空服	盧會九治五疳羸瘦蟲咬腹痛肚大青筋一切疳疾	盧會 木香 胡黃連各一乾蟾一箇酒檳榔二錢	青黛二錢青皮去穰稱一分切碎入去皮巴豆	使君子仁三十燕蕒一錢麝香一	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末用猪膽汁和丸黍米大每服十丸米飲下	無時	又方	盧會 木香 胡黃連 川黃連去青皮去	白燕蕒取雷元仁鶴虱微炒各麝香一錢	右為細末粟米飯和丸菴豆大米飲下一二十九無	時	又方



盧會 半錢 赤石脂 一錢 使君子 七箇 雷元 一錢 姜黃 一錢	川練子 一錢 檳榔 一錢 巴豆 七箇 膜出油盡	右為細末獐猪膽汁糊丸黍米大一歲兒二三丸以上者三四丸量大小與之冷木香湯下無時	麝香黃連丸治疳氣羸瘦白蟲作	胡黃連 去扇各一兩半 白蕪荑 去鬚半兩 宣連 去鬚半兩 辰砂 一分	麝香 一字 木香 半兩	右為細末糊丸菉豆大米飲下五七丸三歲上者十	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	丸無時	榆仁丸治疳熱瘦悴蟲作腹痛	榆仁 去皮 黃連 去鬚各一兩	右為細末用猪膽七箇取汁在碗中和藥安甑上蒸九次每日一次候數足研麝香半錢入之以白湯浸	蒸餅和劑丸菉豆大每服五七丸至一二十丸米飲	下無時	雄黃丹治五疳羸瘦多生蟲動



乾蟾焦 酥炙 胡黃連 白蕪荑去 扇 川黃連去 鬚 乾漆半兩 炒烟 盡先為末 雄黃半兩 研 水飛 麝香一錢 研	右為末拌勻猪膽汁和丸黍米大每服十粒新汲水下無時	乾漆散治疳疾虯動腹肚疼痛 乾漆一錢 炒 烟盡 使君子十四箇 去壳 白蕪荑六十片 去扇	棟樹東邊皮日曬去粗皮 取白皮一分 右為細末每二三歲兒半錢下者一字沙糖熟水調下無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	使君子散治如前 使君子仁一錢 炒 黑牽牛炒過為末 二錢 輕粉二錢	右為末每用半錢於五更初疎米飲調下無時	三根散治疳疾虯作腹痛啼叫不止每至月初間即甚狀如神崇	貫虫根去土 棠梨根 取皮 酸石榴根各一兩 栗刺	故綿 乾漆各半兩



右六味並燒存性為細末每服一錢水八分盞煎至四分去滓溫服無時	猪肚丹治疳瘦盜汗少力大便有蟲曾經大効	川黃連去胡黃連 木香各一兩羌活去蘆盧會	肉荳蔻去麵裹煨白蕪荑去鼈甲酥炙焦去裙襴各半兩	右為細末用猪肚一箇先刷令淨以好白芷二兩內肚中蒸極軟熟去白芷不用却入諸藥縫合再蒸如泥取出同肚入白杵二三百下成膏丸黍米大每服	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	十粒米飲下量大小加減無時	綠礬丸治疳疾有蟲愛食泥土	右以綠礬為末猪膽汁和丸菴豆大每服五七丸米飲下無時	又方治如前	右以市合人聚時買市中羊肉半斤用繩繫之頓地上令人把繩頭拖至家水洗淨炒炙依科與兒食之未能食者煮至汁與飲一方肉一斤繩繫曳數里勿



洗灸與食	除毒丹治疳蚘不差傳染兄弟姊妹	鬼白 一兩去毛 苦參 半兩剉 青箱子 半兩 龍膽草 去蘆半兩	硫黃 一分 緋絹 一分 乾蟾 一分 白礬 一分	右件藥剉拌一處並燒存性為末煉蜜和丸麻子大	每服十粒磨沉香湯下無時	治小兒疳蚘	右以鷓鴣糞乾為末炙猪肉蘸與之啖奇妙糞多在	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	水山石之上紫色如花就上刮取之	治小兒疳濕痛痒下部生蟹蟲蝕瘡	以没石子為末吹下部中又以地榆煮汁洗之日	二 又以鐵衣著下部中	治小兒疳濕生蟹蝕痛	以地篇蓄一把水二升煮至半升空腹服半合大小	以意加減	治小兒疳熱伏結腸中下赤黃汁沫及如魚腦雜血肛



中瘡坐蠶生蟲痛痒	黃連 去鬚 藥皮 炒 苦參 鬼白 獨活 去蘆 橘皮	芍藥 阿膠 各半兩剉蛤粉炒去蛤粉	右為末以藍汁入少熟蜜和丸小豆大每服五七丸	米飲下無時冬時無新藍取汁用子一合舂為末入	藥內蜜丸	治小兒疳濕生蠶蝕下部痒痛	胡粉 雄黃 各一分水研飛	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右同研細每用少許傅下部中	治小兒疳痢不差久成濕蠶	右以艾葉半兩水一升煮取半兩量兒大小以意加	減與服	治諸疳雜証方	五疳保童丸治五藏諸疳一切並主	青黛 研 雄黃 研 麝香 研 盧會 研 熊膽 研 胡黃連	黃連 去鬚 龍膽 去蘆 苦楝皮 取皮 蝦蟇灰 蝸牛 微炒



白鰾魚炙焦黃無即夜明沙微炒五倍子 青皮去白	天漿子微炒各一分蟾頭一枚炙令黃	右為細末糯米飯和丸麻子大每一歲兒十丸溫米	飲下日三服無時	龍香散治五疳瘦悴多啼口瘡髮穗	白朮一分石膽半錢龍齒一錢陳皮末一錢麝香半字	右為細末每服半錢米飲調下二歲下者服一字無	時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	聖功散治五疳	苦楝根皮生子東引者鶴虱各等分	右二味為末拌勻每服半錢熟水調下連進二服無	時	使君子丸治諸疳和脾胃	使君子仁一分川芎一分厚朴去粗皮生薑汁塗炙用一分	陳皮一分去白	右為細末煉蜜和丸皂子大三歲已上一粒已下半



粒陳米飲化下無時	三香青蟾丸治久疳積熱面青口乾咬甲掃眉愛鹽食	土咳嗽肚大青筋紫瘦疳羸	母丁香 三箇 麝香 半字 青黛 一分 蟾 一隻去腸肚	右為細末煮漿水飯和圓粟米大溫水送下三丸無	時	盧會丸治五疳不長肌肉食減日漸黃瘦	盧會 蕪荑 去皮 青黛 檳榔 黃連 去鬚各一分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	胡黃連 兩半 蟬殼 二十一箇去土 猪膽 二箇 麝香 少許	右除猪膽外為細末却用猪膽和丸麻子大每服五	七丸飯飲下無時	橘連丸治疳氣脾胃不和飲食不化日漸羸瘦	陳皮 一兩 黃連 去鬚一兩半 米泔浸一宿	右為細末別研麝香末半錢拌勻用猪膽七箇分藥	入膽內漿水煮候至臨熟各以針微剗破以熟為度	取出入粟米飯和丸菉豆大每服一二十丸米飲下



無時	熊膽丸治諸疳羸瘦	熊膽 使君子仁 各等分	右研細放入磁器中蒸熔宿蒸餅就丸麻子大米飲送下二十九無時	蝸牛殼治一切諸疳	右以蝸牛殼七箇洗去塵土曬乾內酥蜜於殼中磁器盛之紙封糊蓋於蒸飯下饋時頓饋中蒸至飯熟	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	取出細研漸漸令服一日至盡	香蟾丹治諸疳肌瘦肚大筋多髮稀脚細	乾蟾 五箇水浸去骨用瓦藏瓶一箇頂上取一竅入蟾肉在內鹽泥固濟通留竅子木炭火燒至烟息存性取出放地	上一宿出火毒為末 胡黃連 二兩 蛇蛻 一兩 燒灰	地龍 去土半兩 天竺黃 一分 朱砂 半兩 麝香 一分 研	右為末勻細糯米飯和丸黍米大每服十粒米飲下	無時	夜明沙丹治五疳腹脹目濇多睡



夜明沙 一兩 微炒 胡黃連 半兩 去蘆 龍膽草 半兩 去蘆 苦棟根皮 半兩	乾蟾 五箇 燒存性 已 青黛 麝香 盧會 各一分 研細	右研勻細粳米飯和丸黍米大每服十粒米飲下無	時	紫霜丸治諸疳發熱肚大脚細髮穗面黃宿滯不消或	作寒熱腹內疼痛經年瘦弱及中惡等病	代赭石 火煨米醋淬不拘過數以手 搥得碎為度 半兩 研細 水飛 牛黃 二錢 研	朱砂 一分 研 麝香 一錢 研 鼈甲 一分 醋炙 巴豆 一分 去皮心 膜出油盡	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	枳殼 去穰 炒二錢 煅 當歸 去蘆并土 二錢 炙 甘草 三分 炙 木香 一分	生犀末 二錢 大黃 三分	右為細末煉蜜和丸黃米大每服三五丸米飲下無	時	如聖丸治五疳羸瘦面黃腹急盜汗體熱乳食不消	白蕪荑 微炒 去皮 二兩 黃連 去鬚 炒 神麴 炒 麥蘖 微炒 各一兩 淨	右為細末猪膽汁煮糊和丸黍米大每服一二十九	米飲下量大小虛實加減一方有陳皮木香各半兩



又名益兒丸	鼈甲黃連丸治諸疳羸瘦發熱盜汗寒熱肚大脚細不	肯進乳食氣粗促急脾胃不調等証	鼈甲 童子小便米醋各半盞慢火 上 火 蘆 至盡色焦黃 黃連 用巴豆七箇去皮膜用水	一盞同煮水盡去巴豆不用只使黃連白朮 去 人參 去 茯苓	甘草 炙 川練子 肉 使君子 仁 木香 去 草荳蔻 皮 炮 去	柴胡 去 蘆 去 陳皮 去 白草龍膽 兩 各半	右為細末獐猪膽汁和丸菴豆大每服一二十丸米	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	飲下如有潮熱體熱不解烏梅湯下	熊膽丸治一切諸疳羸瘦	熊膽 兩 盧會 各半 胡黃連 兩 牛黃 一分 麝香 一分 麝香 研 一錢	蟾酥 少許研入麵煮糊和劑	右勻細末入蟾酥糊和丸菴豆大每服五七丸麝香	湯下	金瓜丸治疳熱黃瘦作熱發渴久服解熱進食肥肌	黃連 去 黃蘗 去 甘草 炙 青皮 去 等 分 各



右為細末獐猪膽汁和勻却入膽中線繫定於銀石器內以漿水煮五七沸取出風裏懸一宿於膽內出藥入鉢再入麝香少許同研爛勻丸菴豆大三歲下五七丸上者十數丸空心米飲湯下日三服無時肥肌丸治五疳黃瘦久不美食手與脚俱浮腫煩渴飲水常服退熱肥肌殺蟲去疳此衛小兒之寶也	川練子去核取肉二兩川芎二兩橘皮揀淨四兩龍膽去蘆二兩	巴豆十四箇去皮同橘皮龍膽炒至焦去巴豆不用	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末麵糊和丸麻子大朱砂為衣每服十九十五丸米飲下腹脹橘皮湯下無時	香蟾丸治諸疳	大蟾一隻去腸肚好醋浸三日焙焦乾蕪荑去皮一分黃連去鬚一分	甘草一分夜明沙半合用粳米百粒同炒至焦黃去米使君子去壳一分	麝香一字研	右為細末猪膽汁和丸蘿蔔子大每服五七丸米飲下無時



又方名同治同		乾蟾 三箇酥炙焦黃 五靈脂 去沙石二兩 蟬殼 去土半兩 雄黃 半兩研飛
訶子肉 兩半 母丁香 兩半 胡黃連 兩一 黃連 去鬚一兩		
使君子仁 兩一 青黛 一分		
右為細末麵糊和丸菴豆大湯下二三十九無時		
又方名同治同		
鼈甲 去裙襴醋炙黃 蝦蟇 炙黃 訶子 炮取肉 木香 各一兩 盧會 研		
鐵粉 研 雄黃 飛研 胡黃連 各半兩 麝香 二分研		
欽定四庫全書		
小兒衛生總微論方		
右都如粉細勻糊丸粟米大每服一十九米飲下病		
大羸瘦者不過五七服愈曾經効驗		
牛黃煎治諸疳食傷氣脹體瘦壯熱髮穗多困疳羸齒		
爛鼻瘡瀉痢丁奚潮熱等疾		
大蟾 一隻去皮骨肚腸炙焦為末用無灰酒一盞獐猪膽一箇取汁同熬成膏		
胡黃連 炮取肉 訶子 炮取肉 使君子仁 炮取肉 蟬殼 去土		
沒石子 盧會 蕪荑 去扇 熊膽 去 夜明沙		
朱砂 水飛 雄黃 水飛各一分 木香 肉荳蔻 二麵裹煨去用		



半分秋 冬一分牛黃一錢別研麝香一錢別研腦子半錢別研	右為末入蟾膏和丸麻子大米飲下五七丸驚疳金	銀薄荷湯下乾疳腹脹桃仁茴香湯下疳虵東引石	榴苦楝根湯下五歲上者十丸此藥尤治疳痢若挾	熱者不可服	黃連丸治疳氣眼濇多困手足發熱脾胃虛弱髮黃作	穗漸漸羸瘦不思乳食	胡黃連使君子肉白蕪荑去扇各一分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	巴豆十四箇去皮膜出油盡	右為末猪膽汁和丸麻子大每服三五丸米飲下空	心日二服	盧會丸治五疳面黃肌瘦腹脹髮穗目濇口臭斷爛鼻	瘡咬甲搨眉愛喫泥土瀉痢無度寒熱往來	乾蟾大皂角二味等分同燒存性為末每一兩用下項藥青黛一分研	盧會一錢研麝香一錢研朱砂一錢研	右為末和勻浸蒸餅和丸麻子大每三歲下兒一十



丸上者以意加至二十九丸溫水飲送下無時	龍膽丸治諸疳發熱	龍膽草 去蘆 黃連 去鬚 使君子肉 青皮 去穰各等分	右為細末猪膽汁和丸蘿蔔子大每服一二十丸熟	水下無時	粉糖丸治疳愛食泥土	右以膩粉一分用沙糖搜和丸如麻子大米飲下一	丸良久取下泥土立差	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	龍粉丸治疳渴飲水	龍膽草 去蘆 定粉 微炒 烏梅肉 焙稱 黃連 去鬚各半兩	右為細末煉蜜和丸麻子大米飲下一二十丸	香葛散治如前	藿香 去土 乾葛 甘草 炙各一兩 白梅肉 半兩炒	右同為細末煎浮萍草湯調下半錢量大小與服無	時	熊膽丸治疳瘦肚腫煩渴喫水



熊膽 雄黃 佛頂青 各半兩入麝香少許同研肉桂末	人參 各一錢末 右為末同勻糯米粥和丸菴豆大每服五七丸米飲下無時此方大妙	推水散治疳渴衆藥不効	天仙子 不以多少新瓦上焙乾四月間採又名水仙子乃蝌蚪也乾姜一兩炮	烏梅肉 一兩焙稱湯瓶釀兩甘草一分	右為細末每服半錢或一字煎水索頭湯放冷調下	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	無時良久推水不要飲是効	覆蠶丸治諸疳瀉痢驚風等疾久不痊差及斷乳後羸瘦漸困不能治者回死神妙	覆蠶 一箇以線串其頭陰乾只取向後有糞處細研覆蠶是第二次出者蠶	辰砂 三錢研 麝香 三字 華撥 三錢半 雄黃 三錢半 水飛	胡黃連 三錢半	右為末以新蒸粟米飯一塊泥裏煨之取中心軟者和藥丸菴豆大每服五七丸麝香湯送下



雞肉煎丸治十歲已上疳勞壯熱形瘦骨熱漸成勞瘵者

宣連去鬚土 柴胡去蘆 蕪荑去扇 川鶴虱半兩

知母一兩 秦艽去蘆并土 黃芩一兩 使君子肉一兩

右為細末以黃鷄一隻重一觔許者籠之專以大

麻子飼五日殺之去毛令淨於臀間開一孔去腸肚

淨洗拭乾入藥末在鷄腹內以線縫合用一小甑先

於甑底鋪黑豆厚三寸頓鷄在中四傍又以黑豆圍

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

塞上亦以黑豆蓋之自日出蒸至晚銜後放溫冷取

鷄出腹中藥別頓將鷄擘剔去筋骨頭翅以淨肉研

和藥得所如乾入少酒糊丸如麻子大及菴豆大兩

等每服一二十丸以意量大小加減空心臨卧煎麥

門冬熟水下如疳勞骨熱發蒸年十五已上溫酒下

忌猪肉

蝎骨丹治一切諸疳羸瘦下痢証候全備又如有邪此

乃疳毒傳深俗呼無辜者此乃疳毒也



乾蝎虎雄者一箇微炙 蝸牛殼一分細研 蘭香根一分 靛花一分 雄黃一分水飛 麝香一分研 龍腦半分研	右為末入研拌勻米醋煮麵糊和丸黍米大每服十粒煎芝麻湯下乳食後量大小輕重加減無時	香甲湯治如前能祛毒辟邪	漏蘆去蘆一兩 沉香半兩剉 牛蒡子半兩微炒 安息香半兩	訶梨勒皮半兩微炒 鼈甲塗酥炙焦黃去裙襴半兩 乳香半兩研細	右為末勻細每服一錢水八分入人參少許同煎至	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	四分去滓溫服量大小加減無時	大麝香丹治諸疳積癖羸瘦肚大青筋頭重頂細腹中有積毛焦氣急俗呼為丁呼為無辜此皆疳証也	麝香半兩研 朱砂半兩研 粉霜半兩研 五靈脂揀淨一兩	肉苳蔻麵裹煨一兩 乾蟾一兩 夜明沙半兩 白礬枯半兩	地龍去土一分炒 乾蜣螂七箇去翅足炙黃焦	右為細末入研拌勻煉蜜和丸黍米大每服五七粒溫水下無時



問命散一切諸疳可分輕重逆順	爪蒂 半兩 細莘 去苗一分 乾地龍 去土一分炒 白礬灰 一分	藜蘆 去蘆一分	右為細末每用少許吹鼻中得嚏即吉若有蟲出即	愈	治小兒腦疳鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦	以鯽魚膽汁滴鼻中連三五日効	治小兒腹疳	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	以蜘蛛燒熟噉之	治小兒疳熱煩渴乾瘦	以蝸牛三四十箇放一淨盤中以物蓋之令行即有	涎似銀泥同膩粉和揩便丸如黍米大溫水送下三	丸無時	治小兒疳渴飲冷水不休	麝香 人中白 各一分	右同為末蒸餅和丸麻子大一二歲服二丸煎皂子



湯送下空心服

還肌散治小兒疳瀉及洞瀉穀不化

肉荳蔻一箇訶子二箇沒石子一箇三味各用大麥麩裏慢火煨焦黃香

熟勿令木香半皂
有烟出

右為細末每服半錢米飲調下如人行五里久更進

一服神驗仍調服須用陳米飲也

又方治如前

黃連去鬚木香半蕪荑去扇檳榔一

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

右為末猪膽汁和丸菴豆大每服十丸米飲下無時

作三等丸量大小與服治疳痢日夜無度

治疳瀉

以赤石脂研如麵粥飲調半錢服立差一方以川芎

等分同為末服妙

盧會丸治小兒諸疳

盧會 檳榔 蕪荑炒取胡黃連 川苦楝和核剉

使君子仁 雷元浸刮去黑橘皮半兩



巴豆 四十九箇去皮膜同橘皮炒至巴豆焦色只留二箇半餘者巴豆不用全用橘皮	右為細末獐猪膽汁煮糊和丸麻子大朱砂麝香細末為衣每服十丸十五丸如頭面浮腫木瓜湯下若瀉而發渴陳米飲下更量大小加減	又方名同治同	盧會 黃連 去 川楝子 和核 蕪荑 去扇各三分	天竺黃 一錢半 麝香 少許	右為細末以猪膽汁和飯研爛和劑於甑上蒸兩次	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	丸菴豆大以朱砂為衣每服五七丸至十丸熱水下無時	鼈血煎丸治小兒諸疳	吳茱萸 胡黃連 剉碎用鼈血浸一宿同吳茱萸炒令乾焦去茱萸不用	白蕪荑仁 柴胡 去蘆各等分	右為細末用獐猪膽汁浸蒸餅和丸菴豆大每服十丸熟水下無時	捉疳丸治小兒一切諸疳



蛆退先用米泔浸三日以杖子攪擊漉出又以泔水浸三日五日攪擊淘漉如前次入清水浸淘二日至無穢氣淨時於日中曬乾男子患用黃連女兒患用黃蘗與蛆退等分為末每藥末半兩入麝香半錢同研勻以獾猪膽汁和丸黍米大每服三四十丸量大小加減空心陳米飲送下神効屢驗一方六月取糞坑中蛆水淘淨入竹筒盛封口至乾時為末每服一二錢入麝香米飲調下甚妙	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	消疳丸治小兒諸般腹脹四肢腫滿氣上喘促小便不利	木香 檳榔 各二兩 青皮 去穢 姜黃 蘿蔔子 炒	牽牛子 各取七錢半	右為末糊丸黍米大每服二三十丸食後姜湯送下無時	治小兒一切疳疾	以棘針爪蒂等分為末每用取黍米許吹鼻中日二



次用	治小兒諸疳	以黃連不拘多少同烏梅煮至黃連透時只用黃連	為末別以烏梅肉和丸如麻子大每服二十丸溫水	下無時量大小加減	熊膽麝香丸治小兒一切疳疾心腹虛脹愛食泥土四	支壯熱	熊膽 一錢 麝香 半錢 壁宮 一枚去頭足尾	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	黃連 去鬚取末一錢	右同研極細以蟾酥和丸黍米大每服五丸米湯送	下量大小加減無時	香蟾散治小兒食疳羸瘦不進乳食	乾蟾 一枚塗酥炙微黃 蜣螂 一分去翅足微炒 麥蘖 一分微炒	神麴 一分微炒	右同為細末每服半錢粥飲調下無時	又方治同前



朱砂一錢 研 水飛麝香半錢 研 端午日蟾眉脂	右將蟾眉脂和二味丸麻子大空心米飲下一丸如 腦疳以乳汁調內鼻中無時	治妳疳水瀉	以川椒一分去目并閉口者為末酥調少許傳腦上 日三次	治疳痢垂死	以益母草煮食之取足即差甚佳取汁飲之亦治痔	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	妙以地榆煮汁和錫糖食之	以檇白皮和倉朮米葱白甘草香豉同煎飲服	治小兒疳渴飲水無度	以大鮎魚一頭先燒一地坑令紅投魚坑中便以蛤 粉專令一人摻在魚上須臾取出用蘆刀刮下粉入	麝香少許拌勻和丸蘿蔔子大每服五丸桶繩根煎	湯送下一方云冷水旋丸服	五疳丸治小兒一切諸疳



川棟子 川芎 等分

右為細末以漿水煮猪膽取汁和丸麻子大每服一
二十丸溫水送下日三四服

治小兒疳氣不可療者

以綠礬火煨通赤礮醋淬之如此三次細研為末棗
肉和丸菉豆大每服五七丸溫水下無時日二三服
桃柳湯一切諸疳服諸藥後皆可用此法也

右以桃柳枝各一握並剉用水兩大碗煎數沸通手

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

浴兒甚佳浴畢用一青衣蓋之疳蟲自出為驗

小兒衛生總微論方卷十二



欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷十三
四

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯永

謄錄監生臣姜士安



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷十三

諸蟲論

經言人臟腑中有九虫內三虫偏能發動為病人臟腑
實強則不能為害若臟腑虛弱則隨虫所動而生焉故
經亦別立三虫之名一曰蛭虫又曰長虫居胃脘之間
動則令兒吐青白沫或吐清水心腹刺痛若虫貫心者
即死二曰蟯虫居洞腸之間多則發動為痔瘻蠹蝕

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

瘡疥癩癰三曰寸白虫居腸胃之間動則損人精氣令
腰脚痛弱更有一虫形若細絲或如馬尾故俗呼謂之
馬尾虫此虫不拘九虫之數或云飲食中誤嚥油髮所
變亦居胃中動則令兒腹中攪刺發痛不可忍受小兒
虫動者多病於諸病之生皆由臟腑虛弱故也患疳勞
吐瀉者尤甚錢乙論小兒虫動之證面眊白心腹痛唯
是口不吐沫及無清水出也故乙又言心腹痛而吐者虫痛
也心腹痛而不吐水者冷痛也但吐水不心腹痛者胃冷



也又虫痛亦與驚癇証畧畧相似但目不邪手不搐也
以此別之則無悞矣乙治虫痛者用安虫散然世人用
治虫之藥多於臨卧服之並無日分故多不驗唯於每
月初四五日間在五更時服之至日午前虫盡下矣後
以平調藥一兩服和之不可多也凡虫在人腹中每月
上旬頭向上中旬橫之下旬頭向下是以中下旬服藥
則不入虫口所以不驗也亦如牛馬生子上旬生者行
在母前中旬生者並母而行下旬生者行在母後又如
貓之食鼠上旬則食前段中旬則食中段下旬則食下
段此物理之自然莫不知也然虫痛極者雖不貫心亦
能斃人昔錢乙治辛氏女五歲病虫痛他醫以巴
砂之屬藥治之不効至五日外多哭而俛仰睡卧不安
自按心腹時大叫面無正色或青或黃或白或黑目無
光而慢唇白吐沫至六日育高而卧轉不安召乙至詳
而視之用蕪荑散三服見目不除青色大驚曰此病大
困若更加瀉則為逆矣至次日見辛曰夜來三更而瀉

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方



乙於瀉盆中看如藥汁以杖攪之見有藥丸乙曰此子	肌厚當氣實今證反虛不可治也何以然師曰脾虛胃	冷則虫動今目青此肝乘於脾又更加瀉知其氣極虛	也而藥丸隨糞下即脾胃已絕兼形病不相應故知死	病後五日昏篤七日而死	錢乙用方 本集載之	學者當此以為法	爾今除疳勞虫動者已具於疳疾門之下外諸虫之方	叙而具後	使君子治虵咬心腹疼痛	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	右以使君子火煨熟去殼與食以殼煎湯送下	紅桃散治虵咬心腹痛發歇有時	風化石灰	一兩燒赤 細研為末 硃砂一錢細研 為末水飛	右拌勻細用飯飲一大盞入艾三五葉煎二三沸	看其多少調一字或半錢與服但須少用多則難	喫	龍膽湯治虵虫攻心其痛如刺吐出清水	右以草龍膽一两剉碎水二盞煮取一盞去滓隔宿



不食至五更頭頓服量大小與	三角散治如前	右於七月七日採蒺藜子不以多少陰乾為散每服半錢或一錢匕飲服日三量大小加減無時	木香桃仁丹治虻攻心痛不可忍	木香 一兩 桃仁 湯浸去皮去尖并雙仁者麸炒香熟一兩 檳榔 一分	鶴虱 一兩 黑狗脊 一兩 苦楝根白皮 半兩	右為細末獐猪膽汁和丸黍米大每服十粒射香湯	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	下無時	奪命丹主治如前病至危困者	狼牙草 一兩 篇蓄 一兩 苦參 一兩 雷元 半兩 薏苡仁 半兩	鶴虱 半兩	右為細末糯米和丸黍米大每服十粒生地黃汁下	無時	乳香丸治虫動心腹疼痛	乳香末 青皮 去穰炒黃為末各一分 槐花 半合 風化石灰



研細 半兩	右為末勻細每服半錢槐花湯調下無時	乾漆散治如前	乾漆 炒煙盡 一錢 使君子仁 二七 蕪荑 去扇六 十片 棟根白	皮 取東邊 者一錢	右為細末每服一字沙糖熟水調下二三歲半錢四	五歲一錢無時	棟皮汁治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右取棟根皮削去外蒼皮不用只用白者以煮濃汁	量大小與服	抵聖散治如前痛不可忍者	苦棟根白皮 二兩 白蕪荑 去扇半兩	右為末每服一錢水一小盞煎取半盞放冷待發時	服量大小加減無時	勝丸子治如前	龍腦 研 蘆薈 研 射香 各一分 牛黃 半字 胡黃連 半錢



右為末同研勻熊膽和丸菴豆大每服三五丸生米 汁水化服無時	又方	以檳榔生為末用東引石榴根煮湯調下量大小與 服或半錢一錢治寸白虫神効上旬空心食前服之	治小兒蛭虫動作	以棟實一枚煮濃汁內孔中亦治蟯虫以槐子杵爛 內孔中亦治蟯虫	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治小兒寸白虫	以桃葉杵爛絞汁服之	雷元散治小兒三虫	雷元 川芎 錢 等	右為細末每服一錢飲調之日二服無時	胡粉牛黃丸治小兒蛭虫動腹內時時疼痛	胡粉 三錢 牛黃 一錢 射香 一錢	右同研為末用獺猪膽一枚取汁浸蒸餅和丸菴豆



大五歲兒溫水下七丸以意加減無時

又方治如前

以葶藶子一分生為末水三合煎取一合一日服盡

以薏苡根煮汁作糜食之甚香而効

治蟯虫內齧心腹疼痛

以鶴虱為細末用肥猪肉汁調服五歲兒服二合虫

出便止更以意加減

治蟯虫及虫攻蝕下部痒痛

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

以篇蓄一把水二升煮熨五歲兒空腹服三二合乳

食前

治蟯虫攻蝕下部

以胡粉雄黃各一分同研為末每以少許傳下部

補胃膏治如前痛甚不可忍啼哭不止

良姜一兩 肉桂去粗皮 肉荳蔻麵裹煨 乾漆炒烟

烏梅肉兩 炒乾

右為細末煉蜜和丸鷄頭子大每服一二粒米飲化



下無時	香雷散治如前	雷元 鶴虱 苦楝根皮 白蕪荑 去扇各半兩	右為細末每服一字或半錢用生猪肉煮淡湯調下	無時	化虫丸治虫咬腹中攪刺疼痛	蕪荑 去扇一分 檳榔 二錢 川鶴虱 一分	右為細末猪膽汁和丸麻子大每三歲五丸五七歲	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	十九陳米飲下無時	川楝丸治胃寒虫動心腹疼痛及上中二處焦因虛而	虫動	乾漆 三分杵碎炒烟出盡 雄黃 一分研水飛 巴豆霜 一錢	右為細末糊丸黍米大每服五七丸量大小加減取	東引石榴根煎湯下痛甚者煎苦楝根湯或煎蕪荑	湯下	蕪荑散治上中二焦虛及胃寒虫動心腹刺痛危惡証



候與驚癇相似	白蕪荑 揀淨乾漆炒烟盡等分	右為末每服一字或半錢米飲調發時服兒大者一	錢無時	五靈脂散治虫動攻心痛欲絕	五靈脂 去沙石末二錢 白礬 枯半錢	右拌勻每服一錢或半錢水八分煎至減半溫服當	吐虫出	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	綠礬丸治腹中有虫愛食生物	右以綠礬不拘多少為細末猪膽汁和丸菴豆大每	服五七丸米飲下無時	蜂巢蛹子治腹有諸虫口中吐出	右以蜂巢中蛹子與食之	檳榔散治寸白蟯蚘諸虫	檳榔 一箇 木香 一錢	右同為末每用一錢煎棟根白皮湯調下如棟根赤



者不堪用即害人須在月初四五日間至五更頭先嚼肉脯一小片只嚙其汁少頃服藥至日午前蛭下勿登廁但用盆子或在淨地上庶見取下蛭多少也一服永絕根本且食粥一二日不須服補藥忌生冷硬物五七日佳	碧金散治寸白蛭蟯諸蛭隨時大便糞下	苦楝根皮炒一兩微 鶴虱半兩 檳榔半兩 猪牙皂角三錢	燒灰使君子仁半兩 青黛半兩 射香一分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右拌勻細每服一字淡猪肉湯調下無時	化蛭丹治數歲上食肥甘物多而蛭動	鶴虱一兩 檳榔一兩 苦楝根皮一兩 胡粉半兩	白礬半兩	右為細末拌勻麵糊和丸黍米大每服十粒溫漿水入生油一兩點攪勻送下無時	黑金散治蛭煩擾亂服之煩已得睡為驗	乾漆一兩 肉桂半兩 草薢一分 石榴根一分 雄黃一分



右都於一瓦器中燒存性研為極細末每服一字或半錢研射香少許煎粟米飲調下	黃金散專治吐利後重動	雄黃 三分 研 水飛	右研拌勻細每服半錢煎葱白湯入生油一二點同調下須調令勻熟即得如藥冷再上火溫服不拘時候	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	胡粉丹治蟻虫發動甚者成痔漏癰疥	大棗 五十箇 蒸熟 取肉去皮核 水銀 半兩 二味同研勻細成膏 胡粉 一兩 研	雄黃 半兩 研 水飛	右同入棗膏研勻丸黍米大每服十粒煎苦楝根湯送下無時	蝟皮散治蟻虫耗損氣血已成痔者	蝟皮 一兩 燒灰 鱉甲 一兩 酥炙 蛇蛻皮 一兩 燒灰 露蜂房 半兩 微炙	右為細末入射香末一錢拌勻每服半錢米飲調下



無時	櫻櫚散治如前	櫻櫚一兩燒灰一兩荊芥穗一兩側栢一兩炙黃一兩牛膝去蘆半兩枳殼去穰半兩	右為細末每服半錢米飲調下乳食前	神蟾穀精丹治諸病有虫下如絲或如馬尾甚者便至	危殆	乾蟾三枚五月五日取者酥炙黃穀精草三兩入一瓶內塩泥固濟慢火煨通赤	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	胡黃連半兩皂角三寸瓜蒂半兩母丁香半兩粉霜先為末	一分蘆薈一分射香	右同拌勻以猪膽汁和丸黍米大每服十粒温米飲	下無時	食氣積癖論	小兒積聚癖癥者其證不同積聚乃氣之所為癖癥乃	食飲所作經言積者陰氣也聚者陽氣也故陰沉而伏	陽浮而動氣之所積名曰積乃五藏所生其發有常



處其痛不離其部氣之所聚名曰聚乃六腑所成其發無
根本其痛無常處是以積聚皆氣之所為也癖癥者其始
因脾胃虛冷乳食不化而成傷不早治停滯留結乃成癖
癥癖者邪癖也所居在脇下癥者正証也所居在腹中皆
有形或長或短或塊或片其狀不一皆堅硬作痛其因乳
得者名曰乳癖癥俗云癩癖者是也其因食得者名曰食
癖癥其因水漿得者名曰水癖癥若因按之或因轉動時
自有聲響此乃水癖癥也是以癖癥皆食飲所作也故小

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

兒常當節適乳哺調順寒溫若少失保衛則病從生矣如
或乳哺不時寒溫失宜則脾胃不和氣不調順其候口頻
撮面眇白無精光口中氣冷不思乳食便當以藥和之若
不即治則成胃冷其候乳食不化或但吐水急當用藥溫
之又不與治則脾胃浸以成虛其候面眇白色弱腹痛口
吐痰沫白綠急當用藥溫補若下痢者更與調養其中又
不與治脾胃既已虛冷飲食先已不化哺乳再稍失宜即
便成傷也其候身體壯熟口中氣溫面黃腹脹目無精光



或白睛多喜睡四肢垂憊畏食肚熱大便酸臭或為吐
瀉水穀不消須宜穩藥剋化不可便行駛藥取轉小兒
氣實脾胃壯者患之有漸若氣怯脾胃弱者但稍失調
養便成傷也昔錢乙治黃承務子十歲因傷食而瀉他
醫與止之十餘日便青白乳不消身涼加噤氣昏睡以
謂困篤而召乙乙先與益黃散補肺散三日而身溫不
噤氣後以白餅子微下之復與益脾散而痢止得安或
問何以其然乙曰此本脾虛傷食而作痢初不與下之

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

留連十餘日上實下虛脾氣弱則引肺亦虛脾肺子母
故也今先補脾腑病退身溫不噤氣是也然後下其所
傷又問既有所傷何不先下而後補乙曰糞青白為虛
冷若先下之必大虛也故先實而後下則不虛矣後更
與補之乃安此乃治所傷也若傷重而不與急治則停
滯留結而為癖癥其候與食傷相侶而加更困重及一
向不食但微飲少乳或渴而飲水時作寒熱亦與潮熱
相似昔錢乙治曹宣德子三歲病面黃時發寒熱不食



而微飲乳及飲水不止衆醫以為潮熱用退熱藥不愈											
又用止渴藥反吐請乙至乙曰此乃癖也與白餅子下											
之後補脾乃以消積丸磨之果愈或問何以故乙曰不											
食但飲水者食伏於胃脘內不能消致令發渴服止渴											
藥吐者藥衝於脾氣逆不得下故也下之乃愈又錢乙											
論小兒癖癥由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱飲水不											
止或喘而嗽與潮熱相似不早治之必成疳勞以其有											
癖癥則令兒不食致脾胃虛而發熱故引飲也飲多則											
欽定四庫全書											
小兒衛生總微論方											
蕩條腸胃亡失津液脾胃不能傳化水穀脉沉細益不											
能食遂漸羸瘦而成疳也錢乙所用之方本集載之及											
脾胃虛冷米穀不化下痢者已具于前瀉門之下外合											
用諸方叙後											
半兩丸治五積六聚											
巴豆											
去皮大戟剉碎各半兩											
右二味同入銚內油炒焦黃為細末糊丸麻子大每											
服三丸量虛實大小加減與服臨卧米飲下乳食前											



三稜汁治諸氣積氣聚氣癖

右以京三稜取汁作羹粥米麵任為與乳母食之每日取棗大與兒喫大者漸加之又治十歲以下至百日兒無辜疳癰瘰癧神妙大効功不可述

三稜煎丸治氣積氣聚氣塊瘰癧水氣奔豚腎餘五鬲

五噎及一切諸般氣滯凝結

京三稜 炮 蓬莪茂 炮各四兩洗淨 元花 一兩去枝梗

右將上二味入磁瓶內以米醋五升浸滿封閉瓶口

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

用炭火攢煮之度量微乾時取出以餘醋炒元花至醋盡藥乾為度同上二味剉焙乾為末醋煮糊丸棗豆大每服三五丸生姜塩湯下乳食前更量大小加減

姜橘丸治乳哺失宜脾胃不和

右以好陳橘皮不拘多少極陳者尤妙洗淨去白焙乾為細末每五兩入生姜末三兩和勻煉蜜丸麻子大每服三四十九米飲下無時更量大小加減與服



調中散治乳哺冷熱失宜脾胃不和	木香 一两 人參 去蘆一两 青皮 去穰一两 丁香 半两 白朮 半两	白茯苓 半两 大腹皮 半两 甘草 半两	右為細末每服一錢水一小盞入生姜三片煎至五	分去滓服無時	益胃丹治如前	當歸 去蘆洗焙 木香 白朮 沉香 各半 白芍藥 劉	人參 去蘆劉 蓬莪茂 炮劉 宿沙仁 各一分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末麵糊和丸黍米大每服十粒射香湯送下	無時	枳木汁治胃冷正氣	右以枳木皮煎汁服之	益兒丸治胃冷氣不和食不消化亦治疳氣	神麴 炒黃 白蕪荑 去扇炒 宣連 去鬚 陳皮 木香 各半	右為細末猪膽汁和藥末成劑再入膽內繫口定以	漿水煮數取汁和丸菴豆大每服一二十丸米飲下



腹脹木瓜湯下無時一方有沒石子蘆薈各半兩	益脾散治脾胃虛冷腹痛不利全不入食	陳皮 一兩 青皮 去穢半兩 訶子肉 半兩 甘草 半兩 丁香 二錢	乾山藥 三兩	右為細末每服二錢水一盞入生薑二片棗一箇同	煎至五分去滓溫服無時	消食丸治傷飽乳食不化壯熱腹脹疼痛	木香 半兩 枳殼 去穢炒黃 當歸 去土 代赭石 火煨紅米醋淬不計	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	過數以手撚得碎為度 硃砂 研水飛各半兩 巴豆 一分取霜	右為細末糊丸黍米大一歲兒一九溫水下乳食前	服	大麥麵治乳食過飽煩悶腹脹但欲睡	右以大麥生麵水調服一錢如無麥藥亦得如無只	用白麵炒微香調服一錢小兒食不知飢飽但燒鼠	二枚為末服之	香橘丸治宿食不消痰滯



木香 陳橘皮 各半 牽牛子 炒黃取末一分 白朮 一分	草豆蔻仁 一分 薑黃 一分	右為細末滴水丸黍米大每服十粒葱白湯下大	小便秘澀不通乳食前服之	惺惺丸治宿食不化心腹脹滿身熱不思乳食	青皮 溫湯浸軟去穢 胡黃連 一兩 蓬莪茂 一兩	巴豆 霜半	右為細末麵糊和丸黍米大每服三五丸乳汁下大	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	者白湯下量大小加減乳食前	小沉麝煎丸治宿滯不化滿悶身熱	烏梅 一箇連核去仁 巴豆 二箇去殼并心膜 丁香 三箇 胡椒 四箇	右為末醋糊為丸芥子大每服三四丸飲下臨卧	消乳丹治傷乳凝滯能磨積化疳大妙	蝦蟇 十箇 木香 一兩 蓬莪 半 青皮 一兩 青黛 一兩	肉豆蔻 麵裏煨去 膩粉 二錢 續隨子 一分 麝香 許	右為細末麵糊和丸黍米大每服五七丸乳汁下無



時	蝎稍丸治乳食所傷涎痰壅滯諸般積聚急驚食癇	黑鉛 二錢 以水銀 輕粉 二錢 粉霜 天南星 一分 木香	白丁香 四錢 炒 青黛 二錢 去毒 全蝎 二錢 去毒 乳香 一錢 巴豆 一霜	滑石 半錢 麝香 半錢 腦子 半錢	右為細末麵糊和丸黍米大每服五七丸乳汁或米	飲下治驚風搐搦者更入天麻白附子各二錢此藥與	千金紫丸同然効更妙	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	大真珠丸治如前	滑石末 三錢 輕粉 三錢 半夏麴末 二錢 天南星末 二錢	全蝎 七箇 巴豆 十四箇 去皮 膜出油取霜 麝香 少許	右為細末蒸餅和丸菴豆大一歲兒一丸葱湯送下	乳食前	小真珠丸治宿食凝滯不消乳癖積聚大小便秘瀝腹	脹氣痞取磨虛中之積	木香 白丁香 直者 丁香 各半 滑石末 二錢 巴豆 十四箇 去



皮膜水浸一宿研細爛輕粉半錢留少許為衣	右細勻以濕紙裹陳米飯燒取中間軟者和丸麻子	大一歲兒一丸炮皂子湯放溫送下挾風熱秘澀難	動者先服涼藥一服乳癖者虛實加減丸數隔日臨	卧更服	葱湯丸治諸般積癖腹脹顙腫	天南星末二錢白附子末二錢滑石末二錢全蝎	七錢輕粉二錢硃砂一錢巴豆十四箇去皮心	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為末麵糊和丸黍米大每服三五丸葱湯送下臨	卧	水晶丹治一切積癖及百物所傷	天南星一錢滑石一錢水銀粉半錢蕪荑仁去扇半錢巴豆四十	箇去皮膜取盡油留霜	右為細末爛飯和丸菉豆大每服二三丸其湯泡生	葱湯送下服時須令空心不可與乳食放稍飢臨卧	服痢過忌生冷粘膩硬食果子等物以藥補之



北亭丸治一切積癖黃度吐食	北亭 一錢 硃砂 一錢 膩粉 一錢 牙硝 一錢 巴豆 二十一箇	右同勻細末用蒸餅劑裹藥煨熟去焦硬者取中心	軟處近藥潤者用藥和劑如硬滴入水得所丸菴豆	大每一歲兒一丸荊芥湯下乳食前	消堅丸取積癖下交嬭隔實消食乳癖	硃砂 一錢 水銀沙子 一兩皂 明膠 五錢 巴豆霜 一錢	輕粉 一錢 細墨 少	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右同為細末麵糊和丸麻子大一歲兒一丸倒流水	下食後	神妙丸取虛中積滯化痰涎乳癖	白丁香 半錢 硃砂 一錢 定粉 半兩 粉霜 一錢 輕粉 一錢	麝香 少	右為末粟米飲和丸黍米大捻作餅子火炙紫色粟	米飲下一餅乳食前	妙香丸取虛中積及治發寒熱心腹脹滿疼痛



辰砂 水飛 一兩 牛黃 龍腦 麝香 各一分 金箔 十四片	粉霜 膩粉 各一分 蠟 二兩 巴豆 一百二十粒 去皮 膜出油盡為霜	右於銚子內先鎔化蠟入巴豆霜拌勻及入諸藥攪	勻和劑量大小虛實旋丸麻子大每丸米飲下要藥	勢緊者捻藥匾若兒大或疾重者加之皆用針刺藥	餅作孔以行藥力如取積癖丸菴豆大治吐逆下育	中虛煩積滯尤妙	靈砂丹取虛中積滯及治臟腑虛滑久經取轉裏急後	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	重久積惡痢或暴瀉不止神效無比	通明辰沙 顆塊有墻 壁者一分 通明礪砂 一錢 各研細	右拌研細用蠟半兩先於盞內鎔化成汁以去皮全	者巴豆二十一粒入內煎至紫色漉巴豆出研細與	上二味拌勻將蠟用三分中取一分再鎔成汁頃藥	於內急攪令勻下火凝冷刮出成劑磁合貯之如用	取即絕手三九菴豆大濃煎甘草湯放冷送下臨卧	時服久積病大者藥隨病共下小可病輕者不動便



安治暴瀉惡痢濃煎艾湯先呷三五口候冷下藥治	水瀉者冷水下兒大稍增丸數	蒜貼膏治乳癖	石燕子煨半夏各等分	右為末用蒜一頭杵爛攤在舊緋絹帛子上比兒患	處大小煎作麝子摻藥上貼患處候病兒口鼻中蒜	氣時揭去綿子作効更不得喫藥	神應散治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	硫黃菓子大鵬砂菓子大訶子一箇蜜陀僧菓子大	右為細末每服半錢乳汁調下服了時就有癖處卧	少時當取下黑物効	丁香餅子治如前	大丁香二錢蜜陀僧二錢木香一錢硫黃一錢	白丁香一錢棟直兩頭尖者礪砂半錢甘草一錢麝香少	右為細末湯浸蒸餅丸菴豆大捻作餅子每服二餅	乳香生薑湯下乳食前



軟銀丸治如前	水銀 一錢用鉛一錢結沙 續隨子 四十九箇去殼 白丁香末 一錢	膩粉 一錢一分 鷹糞白 末一錢一分 巴豆 十四箇去皮膜出油盡	右為細末棗肉和丸菴豆大一歲兒一丸溫水下乳	食前	丁香散治如前	黑丁香 七箇 蜜陀僧硫黃白丁香 各一分 肉豆蔻 一箇	麵裹煨去麵	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末每服半錢溫水飲調下乳食前	白丁香散治如前	白丁香 十四箇直者 石燕子 一箇火煨瘦者乃是雄 硫黃 一箇子大	膩粉 十箇 蜜陀僧 半兩 黑丁香 二十箇	右為細末每料分作十服用麵絲湯調下或煮麵湯	亦得服了取下如蝦蟇胎之類惡物是効	三稜散治妳癖結實服藥不差	京三稜 一兩炮剉碎 鱉甲 一兩酥炙去裙襖 赤茯苓 去黑皮一兩



白朮 半兩 木香 半兩 枳殼 麸炒去穢半兩	右為細末每服一錢水一盞入生薑五片煎至五分去滓溫服時時與也	聖餅子治乳癖疳瘦	粉霜 錢一 硃砂 錢一 膩粉 錢五 石燕子 火一箇 玄胡索 去皮三箇	巴豆霜 錢一	右為細末入生麵一大錢拌勻滴水調和劑分十二處捻作餅子用刀上焙熟每服一餅煎皂子湯下	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	鼠肉汁粥治諸癥	右以鼠肉煮汁作粥與食	聖効丹治癥結癖積久不差	當歸 去蘆土一兩 木香 一兩 桂心 一兩 甘遂 一兩 煨黃 一兩 硃砂 一兩	一兩 研 京三稜 半兩 炮 鱉甲 半兩 炙 麝香 一分 巴豆 二十一箇 去皮心膜 研	湯浸去 麝香 一分 巴豆 二十一箇 去皮心膜 研	右為末拌勻細研用黃蠟六兩慢火鎔化入藥攪勻	成膏丸黍米大一歲兒一粒二三歲者二粒四五歲



者三粒六七歲者五粒溫米飲下乳食前

大腹湯治癥癖腹脹小便不利

大腹皮剉炒 檳榔兩半 枳殼麸炒去穢 人參去蘆半兩 知母

兩半 陳皮去白穢 甘遂一分慢火煨令黃

右為細末每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫

服無時

治幼小胎中宿熱乳母飲食麤惡及多辛苦乳汁不起

兒乳哺宿滯不為肌膚心腹痞滿萎黃瘦瘠四肢萎蹙

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

服之充悅

芍藥二兩 大黃 人參去蘆各一兩 柴胡去蘆二兩 鱉甲酥炙

去裙襴 茯苓各一兩 甘草半兩 乾薑半兩有熟者去乾薑用枳實麸炒

右為末煉蜜和丸大豆大一歲已下兒服一丸上者

二丸乳服

牛黃鱉甲丸治幼小癖實壯熱食不消中惡忤氣

牛黃兩半 鱉甲酥炙去裙襴 麥麴炒 柴胡去蘆 枳實麸炒 大黃

煨 芎藭各一兩 厚朴去皮姜製 茯苓 桂心不見火 芍藥



乾薑 各半 兩炮	右為末煉蜜為丸如小豆大以意量大小與服日二	服無時	丁香散治小兒癩癖一服取効不動臟腑不損胃氣	舶上硫黃 一棗 大塊 丁香 二十 一箇 蜜陀僧 一棗 大	右研細量大小臨卧以荊芥湯調下來日下黑物乃	病故也永不再發	治小兒乳癖脇下結塊不消	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	膩粉 一錢 雄雀糞 一分 微炒兩 頭失者是	右同研勻細去皮棗肉和丸粟米大新汲水下一丸	取下惡物是効更量大小虛實用之	治小兒閃肭成癖腹大痞滿	以鶴雀脚骨及嘴煮汁服之亦可燒灰存性研為末	飲服	治小兒積癖髮黃羸瘦及生癰瘰	以生林檎杵爛醋和傅上若癖移則就傳之以苦瓠



末破者煮令熱解開熨之亦入熱湯在內熨之	治小兒乳癖	橘皮 揀淨 青皮 去穢 牽牛 各一分三味並為末	右用蒜一顆每瓣入巴豆一粒煨熟去巴豆研如泥	和藥末豌豆大硃砂為衣每服一丸細嚼酒送下一	方用蒜去青皮同巴豆研爛和丸臨卧冷茶清下一	丸更量大小加減乳食前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	小兒衛生總微論方卷十三						



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷十四

心腹痛論

小兒心腹痛者由臟腑虛而寒冷之氣所干邪氣與臟氣相搏上下衝擊上則為心痛下則為腹痛上下俱作心腹皆痛更有一證發則腹中撮痛乾啼無淚腰曲背弓上唇乾額上有汗此名盤腸內吊之痛亦由冷氣入臟所為也今叙諸方于後

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

木香丸治心腹痛及脾胃

木香一分肉桂一分茯苓去黑皮檳榔半兩當歸去蘆一分
一宿炙
令黃焦

右為細末酒糊丸黍米大每服五七丸柳枝湯下不

拘時候

蓬莪散治氣刺心腹痛

右以蓬莪朮炮熟透剉杵擣為細末每服一錢熱酒

調下無時



寬中湯治心腹疼痛不可忍斷乳啼哭不止	良薑 木香 各半 丁香 桔梗 去 青皮 炒 穰	甘草 炙各 一分	右為細末每服半錢溫酒調下無時	當歸木香丸治如前	當歸 去蘆 一兩 蓬莪術 一兩 木香 半 人參 半 桂心 半	不見 黑牽牛 一錢炒 微黃	右為細末麵糊和丸黍米大每服十丸生薑湯下無	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	時	當歸丸治腸胃冷襲而痛啼哭不休	當歸 去 蘆 芍藥 等 分	右為細末麵糊和丸棗豆大米飲湯下不拘時候	乳香湯治如前	木香 五靈脂 去砂 乳香 各一錢 天南星 取中心 末一錢	右為細末同研勻每服半錢水半鍾生薑一片煎至	三分去滓溫服無時



溫胃丸治腹痛哭不止	人參 去蘆 白朮 一兩 木香 一兩 良薑 半兩 五味子 去枝梗	當歸 半兩	右為細末麵糊和丸黍米大每服十丸米飲湯下無	時	橘香湯治如前	青皮 去穰 吳茱萸 揀淨 木香 一兩 當歸 去蘆 乾薑	丁香 半兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為末每服一錢水八分生薑二片煎至五分去滓	稍熱服無時	烏藥散治乳母冷熱不調敗壞乳汁因心飼兒致兒心	腹疼痛或時下利但令乳母服藥調和乳汁哺兒	香附子 炒去毛 良薑 赤芍藥 烏藥 各等分	右為細末每用一大錢酒水各半盞煎至六分去滓	溫服無時兒能服藥者兼與之	鯉魚腸治腸胃中有瘡而作疼痛



右以鯉魚腸煮食之	鈎藤膏治盤腸內吊腹痛	好乳香 研 沒藥 研 木香 各四錢 薑黃 各四錢 木鱉子仁 二十箇	右為細末煉蜜為劑收之一歲兒半皂角子大煎鈎	藤湯化下無時量大小加減次用魏香散	魏香散	右以溫水化阿魏一錢去沙石浸蓬莪朮半兩一晝	夜取出焙乾為細末每服半錢煎米飲紫蘇湯調	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	下空心服	阿魏丸治盤腸吊痛日夜叫啼不止	右以阿魏為末用大蒜半瓣火炮熟研爛和末丸麻	子大每服五七丸煎艾湯送下無時	乳香蠟稍丸治盤腸內吊痛不可忍	乳香 一錢半 別研蠟稍 十四箇 沒藥 半錢 沉香 一錢半	右為細末煉蜜和丸黍米大嬰孩三丸一歲兒五丸	三歲兒七丸乳香湯下不拘時候



桃符丸治如前

銀硃一錢 乳香一錢 大蒜一瓣 煨熟
研 研 研 研 為膏

右上二味和勻入蒜膏再研硬軟得所丸菴豆大每
嬰孩三丸半歲五丸一歲七丸二三歲七丸薄荷湯

下無時

腹脹論

小兒腹脹有虛有實或因吐瀉或因乳食動於脾胃致
脾胃虛而氣攻所作也實者悶亂喘滿治可下之錢乙

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

用紫霜丸白餅子虛者不喘治不可下又不可以丁香
木香橘皮豆蔻大溫藥治之以脾胃虛氣未出故雖腹
脹而不喘只好用藥使上下分消其氣則愈錢乙用塌
氣丸若悞下之則脾虛氣上附肺而行脾肺子母皆虛
也肺主目胞腮之類脾主四肢色黃虛甚則目胞顙頰
四肢黃色而腫錢乙用塌氣丸若虛氣已出附肺而行
即脾胃內弱每生虛氣入於四肢面目矣小兒易為虛
實脾虛則不受寒溫服寒則生冷服溫則生熱當識此



勿悞也胃久虛熱多生痘病或引飲不止脾虛不能勝
腎隨肺氣上行於四肢面目腫若水狀腎氣浸浮於肺
即大喘也錢乙亦用塌氣丸未愈漸加丸數病愈後面
未紅者虛衰未復故也若治虛腹脹塌氣丸未愈腹中
有食積法糞小便黃時微喘脉伏而實飲水能食者亦
可下蓋脾初虛而後有積法也所治宜先補脾後與下
之下後又復補脾即愈也若不先補而便下之則大虛
矣又不可補肺恐生虛喘也錢乙所用方本集載之外
欽定四庫全書
小兒衛生總微論方

叙諸方于後

家寶塌氣丸治小兒啼哭未定或氣息未調遽以乳飲
或寒冷相干腹脹氣急乳食不化

巴豆十片胡椒十粒丁香十箇青皮十箇湯浸一宿令軟去穢

右將青皮每箇入巴豆一片胡椒一粒丁香一箇裹
了以麻線纏定都裹十箇畢頓鍋內入醋一盞煮
至醋乾取出細切同諸藥焙乾為末粟米糊和丸粟
米大每三歲下兒二三丸上者五丸五歲兒七丸七



歲兒十九丸米飲湯下無時	編銀丸治痰涎氣壅鬲實上熱乳食停滯腹脹喘急	巴豆去壳半兩取霜好墨八錢射香半錢水銀半兩用鉛二錢半結	子沙	右將巴豆霜與墨再研勻次入沙子麝香又拌研至	細勻以陳米粥和丸菴豆大捻褊一歲兒一丸二三	歲三丸煎薄荷湯放冷送下不得化破食後服	厚朴丸治風冷寒邪客於臟腑腹脹滿悶氣不宣通	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	厚朴去麁皮一兩丁香一兩木香一兩白朮一兩青皮去穰半兩	牽牛子一錢	右為細末煉蜜和丸黍米大每服十丸煎陳皮湯下	無時	分氣丸治腹脹腹痛	巴豆十箇去壳皮膜出油盡木香一錢附子一箇重半兩炮去皮臍尖	右為細末麵糊和丸麻子大每服三二丸熟水送下	又方治腹脹 又名塌氣丸



蠟半胡椒一木香半巴豆一分去壳皮	右為細末麵糊和丸黍米大每服三五丸葱白湯下 無時	胡粉鹽治腹脹	右以胡粉鹽炒色變以摩腹上或以車轂中脂和輪 下土作丸吞之	萐根汁治如前	右杵萐根汁和猪脂煎服或燒父母指甲灰乳頭上	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	飲	半夏丸治腹脹及暴腹脹欲死	右以半夏隨多少火炮為細末酒和丸粟米大每服 三五丸兒小者乳汁下大者生薑湯或米湯下未差 加之日二服只用末貼臍亦佳	又方治心腹脇肋脹滿煩悶欲死	右以雞子殼燒末酒服一錢或半錢	塌氣丸治脾胃氣虛腹脹滿悶



全蠍一錢黑牽牛四錢一半熟蘿蔔子四錢一半炒	陳皮二錢青皮二錢京三稜二錢蓬莪木二錢	右為細末麵糊和丸蘿蔔子大每服一二十九生薑	湯下無時	塌氣丸治腹脹氣滿如腫	胡椒半兩甘遂一分黑牽牛炒一兩木香一錢	右為細末糊丸菉豆大每服五七丸薑湯送下無時	塌氣丸治脾虛腹脹或面目四肢發腫	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	胡椒一兩蠍尾半兩是錢乙集中方也	右為細末麵糊和丸粟米大每服五七丸至一二	丸陳米飲下無時量大小加減一方有木香一錢一	方全蠍一枚胡椒十粒同為末一剗耳米飲調下	五百丸治氣虛腹脹	郁李仁別研胡椒 丁香 黑牽牛 蘿蔔子各一百粒	右為細末葱汁和丸菉豆大每服三五丸兒大加之 煎葱湯下無時



白朮膏治脾胃不和腹脹氣痞小便不利	白朮 半兩 白茯苓 去黑皮一分 人參 去蘆一分 滑石 一分 澤瀉 兩半	右為末煉蜜和膏每用皂子大米飲化下無時	豆蔻散治腹脹煩渴小便少而吐瀉	硫黃 一分 白滑石 三分 丁香 半 肉豆蔻 麵裹煨半分	右為細末每服一字或半錢米飲調下無時	托養丸治陰陽氣痞不通腹脹膨悶嘔吐煩渴手足時厥	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	硫黃 各半兩 水銀 同 附子 炮去皮 木香 去 當歸 去	洗焙各半兩 大黃 一兩濕紙裹煨火煨熟	右為末拌勻煉蜜和丸櫻桃大每服一丸生薑湯化下無時	木香丸治小兒氣脹腹滿不下食能去惡氣	木香 等分 訶梨勒 煨去核	右為末以沙糖水煮糊和丸菴豆大每服一二十丸米飲下無時



葛根汁治小兒熱氣痞滿腹脹	以生葛根杵爛絞汁飲下	桂心丸治小兒食雜果腹脹氣急	以桂心為末飯和丸菴豆大熟水下五丸未差再服	不拘時候	治嬰小腹中脹滿	以父母指甲燒灰乳上服	治小嬰腹中脹滿或未能服藥者	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	以晚桑葉不以多少濃煎湯熏下部通手時淋洗肚腹	治小兒腹脹滿急不能服藥	以生薑煨熱綿裹內下部冷即易	賺氣丸治小兒腹脹	丁香 錢一 蘿蔔子 半兩用巴豆一分拍破同炒至黑色去巴豆不用	右為末水浸蒸餅心和丸菴豆大每服五丸橘皮湯下無時



治小兒上熱痞悶氣壅脹滿

以葛根搗汁量大小輕重與服

腫病論

小兒腫病有二一者氣腫因脾胃虛而氣攻腹腹脹誤行轉藥下之致虛氣上附於肺行入四肢面目而作腫也疳氣亦然二者水腫因上焦煩渴飲水無度脾胃虛而不能約制其水腎反乘脾土隨水行上附於肺肺主皮膚脾主四肢故水流走於四肢皮膚而作腫也甚則

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

腎水浸浮於肺則生大喘為難治也

欸肺散治小兒風痰欬喘氣逆嘔吐面目浮腫

白姜蠶

五兩湯洗去灰系并頭足焙乾

玄胡索

去皮三兩生

右為細末每服一字或半錢煎淡薑汁放溫調下如

嬰孩乳汁調半字不拘時候

熊膽丸治小兒疳氣體瘦肚腫喫水

熊膽

雄黃

研水飛

佛頭青

各半兩入射香少許同研細

桂心

人參

去蘆各一錢為末



右拌研勻糯米粥和丸菴豆大每服五七丸米飲下食後	檳榔丸治小兒疳氣腹脹四肢腫滿氣急喘悶小便不利	檳榔 木香 各二錢 青皮 薑黃 各一兩 蘿蔔子 炒	牽牛子 各取末七錢半	右為末糊丸黍米大生薑湯下二三十丸食後	緋綬丸治小兒疳氣黃瘦肚大手脚浮腫飲水不休	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	川棟子 去核 各一錢 橘皮 去穰 四兩 龍膽 去蘆 二兩 巴豆 十四箇去	皮膜將陳皮龍胆同巴豆炒焦黑時去巴豆不用	右四味為末糊丸麻子大朱砂末為衣每服十五丸或二十九丸米飲下腹脹陳皮湯下食後	治小兒手足身體浮腫	以小便溫煖漬之大良	又方治如前 以巴豆五十箇去皮心水三升煮取一升綿蘸拭病



上隨手即消	治小兒渾身頭面及陰囊虛腫	以使君子一兩去殼用蜜半兩炙盡為細末每服一錢米飲調下食後只三服效	內消丸治小兒頭面手脚虛腫	青皮 五箇湯泡去穢 巴豆 七箇去壳 木香 一錢炮 防已 一錢半	丁香 十四箇	右先以青皮巴豆銚內同炒至巴豆蒼黑去巴豆不	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	用將青皮諸藥為細末蒸餅和丸麻子大每服三五丸量大小加減男孩兒煎陳米湯下女孩兒煎艾葉湯下七八歲者十丸不拘時候	紅粉散治渾身虛腫氣喘不食	硃砂 錢一 檳榔 錢一 輕粉 錢半	右為末每服一字或半錢薄荷湯調下一服利止後服用家寶觀音散或人參散調補忌生冷堅硬之物通草散治一身黃腫透明



通草蜜塗炙乾為末木猪苓去黑皮為末各等分	右為細末再入研細去土地龍麝香少許每服半錢 或一錢米飲調下神效亦治腎腫	聖餅子治氣腫	大戟子半兩甘遂末一分牽牛末一兩	右拌勻每用半錢以白麵半錢水和作餅子如錢大 煮令熟放冷細嚼薑湯下小者一餅大者三餅食前	金華散治水氣腫滿通身明亮	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	大黃末四錢牽牛末四錢朴硝八錢巴豆肉五箇	右同拌勻每服一字生薑蜜水調下此方猛烈斟量 所宜	葶藶丸治水氣腹腫小便澀滯	右以葶藶子半兩微炒杵如泥入棗肉再杵和丸棗 豆大每服五丸棗湯下空心晚後	郁李仁丹治一切諸腫	郁李仁半兩湯浸去皮微炒檳榔半兩牽牛子一錢炒



右為細末滴水丸每服十粒煎葱白湯下空心服	海蛤散治身體腫滿大小便不利	海蛤 桑白皮 各一兩 漢防已 半兩 赤茯苓 去黑皮半兩	白朮 半兩 甜葶藶 紙襯炒紫 川朴硝 木猪苓 去黑皮各一分	右為細末每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服乳	後食	杏仁膏治小兒卒然面目浮腫	以杏仁杵膏傳之	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治小兒渾身虛腫及頭面陰囊並腫	木香 一錢 檳榔 一枚剉以茱萸炒去茱萸 青皮 一錢以巴豆七箇	右同為末每服半錢或一錢陳米飲調下食前	治小兒因瀉痢後身體虛腫	硫黃 一兩 焰硝 三錢	右同研細蒸餅和丸蘿蔔子大蜂粉為衣每服十丸	米飲下量兒加減食前	虛羸論



小兒虛羸者由諸病之後或誤行轉藥或吐而利致脾
胃虛弱不能傳化穀氣飲食不入肌膚消瘦乃成虛羸
也有冷者時時下痢唇口青白有熱者身體溫壯肌肉
微黃此冷熱虛羸也錢乙治冷者木香丸夏月不可服
如有症則少服之治熱者胡黃連丸冬月不可服如有
症則少服昔錢乙治齊郎其人好收藥散施有子忽患
臟熱齊自取青金膏三服併一服餌之服畢至三更瀉
五行其子困睡齊言子睡多生驚又與一服再瀉兩行
欽定四庫全書
小兒衛生總微論方

加口乾而身熱齊言尚有其熱又欲與青金膏其妻曰
用藥瀉十來行未安莫生病痞召乙看之乙曰已成虛
羸也先多煎白朮散時時與服後用香瓜丸十日愈乙
又治朱監簿子五歲發熱腮赤唇紅煩躁引飲前鑒曰
此心熱也遂用牛黃圓及以一物瀉心湯下之來日加
無力而不能食又下之乃便利黃沫召乙看之乙曰此
心經虛而有留熱在內必被涼藥下之致此虛羸也乙
先用白朮散生胃中津液以生犀散治之朱曰大便黃



沫何如乙曰胃氣正即瀉自止此虛熱也朱曰鑿用瀉
心湯何如乙曰瀉心湯黃連一物耳性寒多服則利能
寒脾胃也坐久前鑿至曰實熱乙曰虛熱若實熱何以
瀉心湯下之不愈又加面黃頰赤五心煩熱不食而引
飲前鑿曰既虛熱何大便黃沫乙笑曰便黃沫者服瀉
心湯多故也乙復與胡黃連丸愈乙又治一子夜發熱
曉即如故前鑿作熱治以涼藥解之不愈其候多涎而
喜睡鑿又以鉄粉丸下之其病益甚至五日大引飲唇
白不食召乙看之乙曰此肺怯有熱不可下之若下之
則損脾胃致虛羸也乃用白朮散更以朮一两煎藥汁
三升使任意取足服朱曰飲多不作瀉否乙曰無生水
不作瀉縱瀉亦不作恠也但不可下耳朱曰先治何病
乙曰止瀉止涎退熱清神皆此藥也至晚服盡乙看曰
更可服之又作三升服盡稍愈第三日又作三升與服
其子不渴無涎遂投阿膠散二服而安已上三證皆因
誤行轉下之藥亡耗津液致胃虛發渴不食而成虛羸

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方



錢乙並先煎白朮散與服以生胃中津液得胃氣正然後依本病為治也如齊郎中子臟熱與香瓜丸朱監薄子心虛熱與生犀散胡黃連丸次子肺怯與阿膠散並皆安愈故閔忠孝云轉下過多洩瀉等諸病煩渴者皆津液內耗也不問陰陽煎錢乙白朮散使滿意取足飲之彌多彌好今特為詳而論之使學者法矣錢乙所用方本集載之外治虛羸諸方具于後									
丁香黃耆散治脾胃虛弱不能食漸致肌瘦虛羸									
欽定四庫全書 小兒衛生總微論方									
丁香 綿黃耆 判 人參 去 白朮 當歸 去 鱉甲 塗									
炙焦去裙 欄各一兩 胡黃連 甘草 炙各 半兩									
右為細末每服一錢水一小盞生薑二片棗一箇煎至五分去粗溫服食前									
集香煎治如前									
丁香 沉香 木香 藿香 去 厚朴 去 麝皮姜									
白朮 白茯苓 白豆蔻 各半 兩									
右為細末入研細麝香一錢拌勻以水一升蜜半觔									



大棗三十枚生薑二十片於銀器中燉火熬成膏去
薑棗不用攪勻頓當風處蔭乾每用皂角子大米飲
化下乳食前

國老丸治瘦瘠虛羸慓少氣

右以甘草炙焦黃杵末煉蜜和丸菴豆大每服五丸
溫水下日三服一歲兒五丸已上者七八丸以意加
減無時

欬嗽論

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

夫欬嗽者內經以為肺感微寒而所作也若七八月之
間肺氣旺盛之時病嗽者其病必實非久病也其症面
赤痰盛而身熱治當下之錢乙用葶蘆丸若病久者不
可下若十一月十二月嗽者乃傷風寒嗽也風寒從背
第三椎肺俞穴入其症頓悶惡風憎寒晝輕夜甚治當
汗之錢乙用麻黃湯若有熱症則面赤飲水涎壅咽喉
不利錢乙兼用甘桔湯若嗽於五七日間其病身熱痰
盛唾粘或痰盛不甚喘面赤或時飲水錢乙並以編銀



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

虛乙曰先實其脾然後瀉肺故不虛也

又傷風寒欬無熱症而但嗽者錢乙用麻黃湯及化痰藥治之若肺虛而嗽有哽氣時時長出喉中有聲者此久病當補也錢乙用阿膠散昔錢乙治杜氏子五歲自十一月病嗽至三月未止始得嗽而吐痰乃風寒入肺也風在肺中故嗽而吐痰宜以麻黃湯發散後用涼藥壓之即愈他醫却以諸藥下之其肺即虛而嗽甚至春三月間尚未愈乃召錢氏看之其候面青而光嗽而

丸下之若肺盛嗽而後喘身熱悶亂面腫或飲水不飲水者錢乙用瀉白散昔錢乙治張氏孫兒九歲病肺熱欬嗽前醫以珠犀龍麝牛黃藥治之一月不愈其症欬喘喘急悶亂飲水不止全不能食召乙治之乙用使君子丸益黃散張曰本有熱何又行溫藥他醫用涼藥攻之一月尚無効乙曰涼藥久則胃寒不能食小兒虛不能食當與補脾候飲食如故即瀉肺經病必愈矣服補脾藥二日其子欲飲食以瀉白散瀉肺遂愈張曰何以不



喘促哽氣又時長出氣錢曰病困十已八九矣所以然者面青而光乃肝氣旺也春三月者肝之位肺衰之時也嗽者肺之病自十一月至三月久即肺虛痿又曾下之脾肺子母俱虛復為肝所勝此為逆也故嗽而喘促哽氣長出氣也乙急與瀉青丸瀉肝後與阿膠散實肺次日面青而不光乙又與補肺其嗽如前又與瀉肝未已而又加肺虛唇白如練乙曰此病必死不可治也何者肝大旺而肺虛絕肺病不得時而肝勝之今三瀉

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

其肝而肝病症不退三補其肺而肺病尤虛此不久生故言死也此症病於秋者十救三四病於春夏者十難救一果大喘而死

又肺氣不足謂寒邪所干欬喘滿短氣者治補肺昔錢乙治李轉運孫八歲病嗽而喘滿短氣他醫以為肺經有熱用竹葉湯牛黃膏治之三日加喘召乙治之乙曰此肺氣不足復有寒邪即便喘滿當補肺脾勿服涼藥李曰已服竹葉湯牛黃膏乙曰何治也前鑒至曰退



熱退涎乙曰何熱所作鑿曰肺經熱而生嗽嗽久不除
生涎乙曰本虛而風寒所作何熱也若作肺熱何不治
肺而反調心也竹葉湯牛黃膏皆治心藥也鑿有慚色
乙依所論而治愈

又嗽咯膿血者肺熱也錢乙用甘桔湯若嗽而吐痰
涎喘者先實其脾錢乙用益黃散後微下之錢乙用褊
銀丸涎退即補肺乙用阿膠散昔乙治段齊郎子四歲
病嗽身熱吐痰數日咯血前鑿以桔梗湯防已丸治之

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

不愈涎上攻吐喘不止請乙治之乙下褊銀丸一大服
復以補脾藥治之或問此子咯血肺虛何以下之乙曰
肺雖咯血有熱故也久則虛痿今涎上潮而吐當下其
涎若使不吐涎為甚便盖吐涎能虛又生驚也痰實上
攻亦使發搐故依法只宜先下其痰為順此治先下後
補與前論先補後下其意相反者經以謂病有緩急治
有先後也治病症如錢乙所以得聖人之旨趣學者宜
為法耳嗽而吐青白綠水者此胃冷有停飲也乙用百



祥丸下之嗽而吐痰涎乳食者此有傷宿滯不化也乙
 用白餅子下之

若久嗽肺虛亡津液者乙用阿膠散補之治嗽大法盛
 則下之久則補之風則散之更量大小虛實意以施治
 是以慎護小兒須常著夾背心雖夏月熱時於單背心
 上當背更添襯一重蓋肺俞在背上恐風寒傷而為嗽
 嗽久不止亦令生驚若百晬內兒病嗽者十中一二得
 全亦非小疾也

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

又有停飲作痰者由兒乳飲失宜致脾胃不和停滯其
 飲不散留結成痰若隨氣上干於肺而嗽者此為痰嗽
 若不嗽者則肺壅不利咽塞唾涎脇腹隔滯

又脾胃冷熱不調涎不歸胃致涎流口角而無休止冷
 者鼻上色青及大便青白熱者鼻上赤色及大便赤黃
 已上除錢乙所用方本集載之外今叙諸方于後

金黃散治嬰小嗽

欬金 兩 半
 防風 枝 去蘆及叉 一分
 半夏 分 一
 巴豆 一 二十粒
 皂角 錠 一



以水一升於銀器用煮諸藥至水乾去巴豆皂角
不用外三味別用溫湯洗淨焙乾為細末每嬰孩一
字二三歲半錢四五歲上者一錢薄荷蜜水調下不
拘時候

藿香散治不因風寒所得肺胃氣不和而欬嗽

藿香 去土二十
一箇葉 枳殼 二片去穰濕
紙裏煨令熟 蚌粉 枳殼大
一塊

右為細末嬰小服一字二三歲半錢蜜水調下不過
二三服安兒大以意加之無時

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

紫金丸治諸欬嗽墜化痰涎

右以葉子雌黃不拘多少研細入鍋子內微火中燒
令成汁候冷取出再研細軟飲和丸蘿蔔子大熟水
下丸二箇臨睡

杏仁煎治小兒欬嗽上氣

右以去皮尖炒黃杏仁一升熟搗用蜜三合先入一
合搗令強次入一合搗如膏又入一合搗熟每食後
用少許頓兒口中含化咽之日三次無時



生薑煎治幼小欬嗽	生薑 一兩 乾薑 六錢 桂心 一分 甘草 四錢 杏仁 去皮稍炒
欬冬花 去枝梗 紫苑 各四錢	右為末以蜜一兩入藥在內微火上煎之如飴量大
小多少與含化嚥百日兒如棗核大日三甚效	欬冬花丸治小兒欬嗽日差夜甚初不得息不能復啼
欬冬花 各一兩 紫苑 半兩 桂心 半兩 伏龍肝 一分	右同為細末煉蜜和如泥每取棗核大傅乳上令兒
欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	吮之漸漸令兒飲一日三次
麥門冬湯治初生兒十日上至五十日卒得聲欬吐乳	嘔逆暴嗽晝夜不息
麥門冬 去心 紫苑 去蘆 甘草 二錢 桂枝 半兩	右為末每服二錢水一盞煎至七分以綿蘸滴兒口
中晝夜四五過仍節乳哺	五味子湯治小兒風冷入肺咳嗽氣逆面青喘迫晝夜
不息飲食不下	



五味子去枝梗 當歸去蘆各半兩 麻黃去節 乾薑炮 桂心	人參去蘆 紫苑 甘草各分 細辛去苗半分 大棗三枚	右為麤末每服二錢水一盞煎至半盞去滓溫服量	兒大小	人參半夏湯治小兒痰逆咳嗽不止	人參去蘆 半夏去 白芷各半兩 藿香葉去土一分 丁香	杏仁霜各半分	右為細末每服二錢水一鍾生薑五片陳粟米五十	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	粒煎至七分去滓時時呷服日三四忌醋鹹炙煨生	冷	欵肺散治小兒風壅痰盛欵嗽氣急壯熱頰赤昏憤嘔	吐面目浮腫乳食減少	白殭蠶五兩淨洗去系頭足焙乾 玄胡索去皮三兩	右為末每服一字或半錢淡蘆汁溫調服之無時嬰	孩只乳汁調半字	治小兒咳嗽聲不出



杏仁 一兩湯浸去皮尖及雙仁者以水一鍾一絞取汁 紫苑 去蘆半兩洗去土為末	右將紫苑末入杏仁汁中更入蜜一合同煎成膏每服半茶匙清粥飲調下無時	皂莢豉湯治小兒咳嗽	右以皂莢燒灰研細末每服半錢或一錢豉湯調下無時	露蜂房散治如前	右以露蜂二兩淨洗去蜂糞塵土以快火燒為灰研末每服一字米飲下無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	甜葶藶 半兩炒 麻黃 去根節一分 甘草 一分炙 貝母 去心炒一分	杏仁 去皮尖一分炒黃研	右為細末每服半錢水半盞煎至三分去粗溫服無時	訶子膏治如前	右以訶子一兩每箇分作兩片甘草一分水一大盞



煮至水盡為度焙乾為末煉蜜和膏雞頭子大每用	一大豆許薄荷熟水化下無時	生薑浴湯治如前	右以生薑四兩煎湯沐浴	一捻金散治風痰欬嗽頰赤痰盛喘促氣急吐嘔浮腫	乳食減少	白殭蠶 直者去系 嘴一兩 甘草 半兩 炙 玄胡索 去皮 一分	右為細末每服一捻蠶汁調下嬰孩只乳汁調下半	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	字食後	惺惺散治傷寒風熱痰壅咳嗽	桔梗 去蘆 細辛 去葉 人參 去蘆 甘草 剉炒 白茯苓 去皮 白朮	瓜蒌根 各半兩	右為細末每服二錢水一盞薄荷五葉煎至半盞溫服如要和氣更入生薑三片同煎一方更有防風一分	保肺丸治肺胃受風熱痰盛欬喘吐連聲不止及治



久嗽不愈	白殭蠶 去系嘴 炒二兩	山藥 半兩	白茯苓 去皮 一兩	紫蘇葉 一兩
藿香 去土 一兩	百部 半兩	黃芩 一兩	防風 去蘆 一兩	杏仁 去皮尖 炒一兩
百合 半兩	五味子 去枝梗 一兩	右為細末煉蜜和丸雞頭大每服半丸一九煎桔梗湯化下食後臨卧服		
貝母湯治肺感風邪咳嗽喘滿	貝母 去心 一兩	半夏 一兩 白礬湯洗七次焙乾	乾薑 半兩 炮	
欽定四庫全書	小兒衛生總微論方			
麻黃 去根節 半兩	款冬花 去枝梗 半兩	甘草 半兩 炙	右為細末每服一錢水一小盞生薑三片杏仁三箇去皮尖同煎五分去粗溫服不拘時	
葛蒲煎治肺中風邪肩息喘鳴或發咳嗽	石葛蒲 一兩一寸 九節者良	款冬花 去枝梗 一兩	紫苑 去土淨洗 焙乾 一兩	
人參 去蘆 一兩	桂心 一兩	右為細末煉蜜和劑入石臼中杵一二百下丸皂子大每服一粒煎糯米飲化下食後臨卧服		



絳朱丹治驚風涎痰咳嗽喘滿	天南星 二兩 半夏 二兩湯洗七次去滑 枯白礬 一兩 滑石 二兩	火煨 通赤 鉛白霜 一分	右為細末麵糊和丸麻子大硃砂為衣每服十粒薑	湯送下食後臨卧服	人參犀角散治時氣寒壅咳嗽痰逆喘滿驚悸風熱	前胡 去蘆八錢 桔梗 五錢 人參 去蘆三錢 甘草 三錢炙黃	杏仁 浸去皮尖乾為末五錢	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右先將上四味為末入杏仁末拌勻麤羅篩過每服	二錢水一盞煎至七分去粗溫服食後亦能調和五	臟六腑進美乳食又治一切風熱服尋常涼藥即瀉	減食者尤宜與服	油滾丸治痰盛咳嗽亦治乳嗽	五靈脂 末一錢 雷丸 末一錢 巴豆 三十箇去皮膜取霜	右為細末滴水丸芥子大每服三五丸油滾井水送	下臨卧而服



龍瓜散治涎喘咳嗽	右以猪蹄甲四十九箇洗淨控乾每箇猪甲內入半	夏白礬末各一字入一罐子內封閉不透烟火煨通	赤放冷為細末入研細麝香一錢拌勻每服半錢糯	米飲調下空腹	辰砂半夏丸治寒痰咳嗽	瓜蒌根 蜜 天南星 湯 洗 半夏 湯 洗 乾薑 炮 各 半 兩	右為末生薑自然汁和丸麻子大硃砂為衣每服十	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	丸生薑湯下不拘時候	玉珠丸治諸涎嗽	半夏 一 兩 湯 洗 七 次 硝石 一 分	右為細末滴水丸麻子大每服三五丸生薑湯送下	不拘時候	百部丸治肺寒咳嗽微喘	百部 焙 乾 秤 三分 麻黃 去 根 節 秤 三分 杏仁 四 十 箇 去 皮 尖 微 炒 更 煮	三五沸 焙 乾 研 細



右同勻細末煉蜜和丸皂子大溫水化下二三九日	三服錢乙加松子仁五箇糖和丸含化大妙	露蜂房丸治肺胃虛寒咳嗽喘滿嘔逆不食	露蜂房 二錢 蟬殼 去土二錢 蛤蚧 一隻重四錢 丁香	木香 人參 去蘆 地黃 麻黃 去節 馬兜鈴子	五倍子 去虫各二錢 五味子 去枝梗 貝母 去心 杏仁 童子小	宿 去皮 半夏 錢半 欵冬花 去枝梗	右為細末煉蜜和丸菉豆大每服二三十九丸生薑湯	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	下日三四服食後	緩息湯治風傷肺氣虛喘咳嗽上氣	桑白皮 一兩 白茯苓 半兩 白殭蠶 半兩 甘草 一分	杏仁 半兩 人參 去蘆一分 桔梗 半兩 白朮 半兩	陳皮 半兩	右為細末每服一錢水一盞生薑三片杏仁二箇煎	至六分去滓時時溫服	白朮五味湯治氣逆上喘咳嗽



白朮 五味子 去枝 梗炒 人參 去蘆 款冬花 去枝 梗 各半兩	細辛 去土葉 一分	右為細末每服一錢生薑三片煎至四分去滓放溫時時服	桔梗湯治咳嗽痰壅呀咽不利	桔梗 去蘆 半兩 甘草 炙 半兩 紫蘇葉 半兩 去土微炙 石膏 半兩	半夏 半兩 湯泡七次 皂莢 一分 燒灰存性	右為末每服一錢水一盞生薑三片煎至五分去滓	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	放溫時時服無時	淡竹瀝治咳嗽短氣胸中吸吸咯唾稠濃臭粘 唾音 睡	右以淡竹瀝一合服之日三四次	木香半夏丸治肺胃有寒咳嗽	木香 半夏 湯泡七次 焙乾 肉豆蔻 麩裏煨 各一兩 藿香 去土	丁香 白朮 各半兩	右為細末生薑自然汁和丸黍米大每服十九煎人參湯送下不拘時候



白蜆殼散治卒然暴嗽不止	右以白蜆殼不拘多少杵研極細每服半錢米飲調	下無時	五靈脂丸治久嗽漸成羸弱恐變疳勞	五靈脂 去沙土半兩 蟾頭 一枚酥炙黃 蟬殼 去土半兩微炒	欵冬花 去枝梗半兩 青黛 一分研 雄黃 一分研水飛	右同研勻細糯米飯和丸黍米大每服十丸煎人參	湯下食後	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	人參半夏丸治痰飲咳嗽	人參 去蘆 半夏 湯泡七次 白朮 炮 川薑 炮 南星 微炒各半兩	右為細末生薑自然汁煮糊和丸黍米大每服十丸	薑湯下月內百晬兒丸針頭大乳上吮服不拘時候	馬兜鈴治肺壅咳嗽氣喘大便不利	馬兜鈴 炒 紫蘇子 炒 人參 去蘆各一兩 木香	欵冬花 去枝梗各半兩 杏仁 湯浸去皮尖研後入一分	右五味先為末入杏仁末拌勻研煉蜜和丸黍米



大每服十丸生薑湯下不拘時候	百合丸治肺經風寒痰壅不利	百合 焙洗 紫苑 焙洗 白朮 去蘆各 人參 去蘆各 白茯苓 去黑皮	青皮 穰去 甘草 穰去 麥門冬 去心各	右為末每服一錢水八分淡竹葉三片薄荷二葉煎	至五分去滓溫服不拘時候	爽神湯消寒痰除肺壅清神爽意	白朮 去 人參 去 白茯苓 去 桔梗 去 瓜蒌 去	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	甘草 各半 細辛 去苗	右為末每服一錢水八分荊芥薄荷各少許煎至五	分去滓溫服不拘時候	蘇香湯治肺壅消痰滯	紫蘇葉 去 土木香 去 人參 去蘆各 五味子 去枝	甘草 各半 陳皮 各半	右為細末每服半錢生薑自然汁少許荊芥湯調下	不拘時候



蟬殼湯治肺氣壅滯不利	蟬殼去土 人參去蘆 五味子去枝梗 陳皮 甘草炙各	右為細末每服半錢生薑湯調下無時	神麴湯治痰涎壅滯氣不和順腹脇滿悶	神麴一兩 木香一兩 半夏一兩 炒一兩 用薑半觔同杵爛	蕪荑一兩 青皮去穰半 甘草炙半兩 白茯苓兩半	右為細末每服半錢鹽少許沸湯調溫服無時	白金丹消肺壅痰實治胸膈不利	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	桑白皮一兩 前胡去蘆 半夏一兩 白朮一兩	人參去蘆半兩 陳皮半兩 甘遂一分	右為細末煉蜜和丸黍米大溫水下五七丸周晬至	一二歲兒三丸已上者以意量加不拘時候	前胡半夏丸治風熱痰實肺氣壅滯涎流口出	前胡去蘆一兩 半夏一兩 七次焙乾 大黃半兩 麥門冬去心半兩	川朴硝半兩	右為細末生薑自然汁和丸黍米大每服十九煎人



參湯下不拘時候

犀角丸治風熱面赤胃氣不和大小便秘瀝痰實涎盛

三焦壅滯及積熱蘊毒

瀝音

生犀末一分人參半兩黃連去蘆枳實去穰炒

檳榔半兩大黃二兩酒浸一宿切片子以巴豆一

蒸三次去巴豆切研炒焦

右為細末煉蜜和丸麻子大每服五七丸臨卧熟水

下未動加丸數服此疎利極穩之藥

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

治小兒痰壅肚熱諸病

以雞子亂髮熬良久得汁與服之良

枳殼湯治痰實肚熱心膈煩悶氣不調順不早治恐生

驚癇

枳殼一兩乾薑半兩甘草半兩前胡去蘆木香一兩

半夏一兩洗七次

右為末每服一錢水一小盞生薑三片陳皮一片煎

至六分去滓溫服不拘時候



溫脾丸治脾胃宿冷口角涎流若涎漬頤頰口角生瘡名曰滯頤別立于后	丁香一兩木香一兩半夏一兩同杵爛炒令黃青皮去穢半兩	白朮半兩乾薑半兩微炒	右為末煉蜜和丸黍米大每服十丸米飲下不拘時候	丁香湯治如前	丁香一兩白朮半兩肉豆蔻半兩半夏半兩白礬半兩洗淨	炒乾薑半兩甘草半兩人參半兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末每服一錢水八分薑二片煎至五分去滓溫服不拘時候	治小兒口中涎出	以白羊屎內口中	麻黃湯治小兒風中肺經喘急肩息氣上不安	麻黃去根節二兩半夏半兩生薑各二兩甘草一兩桂心半兩	五味子去枝梗半升	右咬咀每服二錢水一盞煎六分去滓服無時



馬通粟粒丸治小兒喘急肩息氣逆脇下作痛寒熱往	來不能乳食漸成羸瘦	馬通中粟粒 三分 杏仁 湯浸去皮尖 紫苑 去蘆 細辛 去苗各半兩	石膏 秦艽 去蘆 半夏 湯泡七次 茯苓 去皮 五味子 去枝梗各一分	右為末煉蜜丸小豆大每服十丸生薑湯下日三服	加至十二丸不拘時候			欽定四庫全書 小兒衛生總微論方							小兒衛生總微論方卷十四



欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷十五

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣姜士安



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷十五

黃疸論

小兒有身體肌膚面目悉黃者此黃病也因將息過度飲食傷飽脾胃受熱與穀氣相搏蒸發於外脾胃象土其色黃候肌肉故為是病也慎不可灸灸則熱轉甚矣若身體痛背膊強大小便澀腹脹滿一身盡黃及目睛爪甲皆黃小便如屋塵色著物皆黃此疸病也若發渴

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

小便澀腹滿脉沉細為難治也黃病者稍輕疸病者極重又有自生下面身深黃者此胎疸也因母臟氣有熱熏蒸於胎故也經言諸疸皆熱色深黃者是也若身微黃者胃熱也若但面黃腹大渴而食泥土者脾疳也此二項各在本病具之外黃病疸病叙方於後

三黃散治黃病

川大黃

一兩剉碎微炒

黃芩

半兩

黃連

去鬚半兩

右為細末每服一錢水一盞煎至五分去滓放溫食



後時時服	子芩散治如前	黃芩 瓜蒌根 茯神 去心內木 各一兩 甘草 炙	胡黃連 各半兩	右為細末每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服不	拘時候	萐根汁治如前	右杵萐根取汁滴兒鼻中大豆許	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	丁香散治黃病遍身如金色	右六月六日收瓜蒂四十九箇丁香四十九箇入乾	鍋子內火燒烟盡取出放冷研細末每用半字吹鼻	中及揩牙	蔓菁子汁治如前	右以蔓菁子汁水和服之半錢或一錢亦治痘病	豬苓通草散治黃病透明黃腫	木猪苓 去黑皮 通草 塗蜜炙乾 各等分



右為細末更入研細麝香去土地龍末各少許拌勻	每服半錢或一錢米飲調下不拘時候神效	括蓼根汁治小兒忽發黃面目皮膚悉黃	右以生括蓼根杵取汁三合蜜一大匙煖鎔相和量	兒大小服之不拘時候	雙連丸治諸痘病	川黃連 去鬚 一兩 胡黃連 一兩	右為細末用黃瓜一枚切蒂頭留作蓋子去穰入藥	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	末在瓜中却以蓋子蓋定用麵裹慢火煨令麵熟焦	去麵杵爛成劑丸菴豆大每服五七丸至十九丸溫米	飲下量大小加減不拘時候	茅煎湯治黃疸病	柴胡 去苗淨洗 焙乾一兩 甘草 一分	右呖咀每服二錢水一盞白茅根少許同煎至五分	去滓溫服無時	螺肉酒治如前



右取田螺肉一二十箇作刮剝酒服之

驢乳汁治嬰小熱黃胎疸

右取驢乳汁少少與服

客忤論

小兒中客忤者小兒神氣嫩弱忽有非常之物或未經識見之人偶然觸而見之其客氣與兒神氣相忤以生病謂之客忤其候吐下青黃白色水穀解離腹痛夭矯面色變易五色不常狀似驚癇但目不上視其脉弦急

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

數者是也若不即治久則難療聖濟經曰出處不時而為客忤戒其恐見非常人物為病也千金曰小兒衣帛綿絮及鞋襪中皆不得令有頭髮又青衣不可用白帶白衣不可用青帶或諸識人物外來者並當令兒避之勿見若誤有触犯並令兒患客忤或有犯而患者急視其兒口中懸癰左右有腫核如麻豆大者便須刺摘令潰之用綿纏釵襜頭展去其血兼服諸藥為治
治小兒客忤腹痛夭矯面色變易



以香豉數合水拌令濕搗熟丸作丸子如鷄子大用 摩兒顙上及手足心各七遍及摩兒心臍上下行轉 摩之食頃破其丸視其中當有細毛即擲弃丸於道 中痛乃便止	治小兒卒中客忤塗法	竈中黃土 蚯蚓糞 等分	右研細水調塗兒頭上及五心中大良	又方浴法治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	以馬糞三升燒令烟絕用酒三升煮數沸去滓將以 浴兒	以猢猻糞二升熱湯灌攪適溫煖浴兒	又方治小兒客忤服法	以牛口沫塗乳上飼兒	以銅鏡鼻燒令赤內酒中能飲者令自飲不能飲者 含而灌之	治小兒中客忤吐青白沫及乳食皆出腹中痛氣欲絕



者	以桂心一两為末一二百日兒以半錢用水一小盞煎至五分去滓溫分四服不拘時候量兒大小加減	又方治小兒客忤	右以白殭蠶七枚為末酒調服半錢至一錢	又方治如前	右取書中白魚十枚傳乳頭令兒吮服 今人呼為衣魚	又方治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右取驢乳汁少少與服或以熱馬屎一塊絞汁飲嚥下即愈	麝香乳治客忤項強欲死	良 右以麝香少許研細用乳汁調抹兒口中如大豆許	又方治如前	右以桔梗燒末半錢調服量大小加減	治馬毒客忤



右以馬尾於兒面前燒令兒嚙烟氣每日用之取差 治客忤夜啼襁法	右用本家厨下燒殘火柴頭一箇以焦頭為上朱書 云吾是天上五雷公將來作神將能收夜啼鬼一縛 永不放急急如令書了勿令兒知立在兒床下倚前 脚裏廂立之男左女右	辟邪膏治客忤及治中惡邪厲鬼氣其候似癇但目不 視上倒視脉弦急中之卒暴者立至蘇省	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	降真香剉 白膠香別 沉香 虎頭骨酥炙 鬼白去毛	草龍膽去蘆 人參去蘆 白茯神去心 內木各半兩	右為細末次入研飛過雄黃末半兩研細麝香一錢 拌勻煉蜜和丸鷄頭子大每服一粒煎乳香湯化下 及丸一彈子大用綠絹袋盛之帶兒衣上仍於卧處 常燒炒	三疰論	小兒疰病有三一者鬼疰小兒神氣弱早晚抱持出



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

入無時為鬼厲邪氣所干其候皮膚掣痛游易無常或
心腹刺痛天矯悶亂欲死迺名中惡甚者卒致於死緩
者延引歲月更變沉滯以致於死又注傍人二者尸疰
人腹中有虫曰尸疰小兒血氣嫩弱邪氣外傷留滯身
中尸虫移引相乘為病其候沉沉嘿嘿不知的病之處
或寒或熱或心腹悶痛涉引歲月遂至於死又注傍人
三曰蠱毒疰謂諸毒虫之中有一能噉其餘者即為之
最名之曰蠱或因人作或因引注隨飲食入而兒腹中
食人臟腑其候心腹刺痛燠悶欲絕利下無時或便血
片急者即死名曰中蠱之毒緩者涉引歲月以至臟爛
乃死又注傍人今叙諸治方于後

虎頭枕治中鬼氣為遊氣為魔

右以虎頭骨為枕與兒枕之

千金湯治小兒暴驚啼絕死因人從外來邪氣所逐令
兒得疾衆醫不治

右以蜀椒左顧牡蠣各六銖碎之酢漿一升煮取五



合分服		豆豉丸治中惡鬼氣寒熱		右以溫豉丸鷄子大摩兒腮上及手足心六七遍又		摩心腹臍上旋旋以言祝之了即破其豉丸看之當		有細毛奔道中		又方治中惡邪鬼氣或於病間忽然而卒絕		右以生菖蒲根杵爛取汁灌之		又方治如前		欽定四庫全書		小兒衛生總微論方		右以羊屎燒烟以熏鼻中		又方治如前		右視其死者上唇裏弦有核子如黍米以針挑破之		復蘇		又方治如前		右以皂莢末或生半夏末少許吹兩鼻中		又法治如前		右凡中惡邪或魘死者不得用灯火照之亦不得近	



前急喚或與接氣恐被注染多致殺人但只與痛咬
脚跟及足把指甲邊多唾其面即活

又方治如前

右以好酒浸綿半盞及手按其汁灌鼻中

又法治如前

右以蘆管吹兩耳并取病人髮二七莖撚作任子刺

鼻中

又方治中惡鬼邪遊痛如刀刺或胸脇腹中絞痛急切

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

手不可近而按摩

右以好酒灌鼻孔亦治中惡吐血下血

又方治如前

右以鹽一錢水一盞攪和令勻服并以冷水嚥之取

吐即差

又方治如前

右以蓬茂酒研令服

又方治如前



右取灶下黃土水調服之	又方治中惡鬼邪為祟及鬼疰尸疰	右以桃仁研碎水煮頓服當吐即差不吐或吐不盡	病再作或以桃仁汁煮米為粥與食	鰲頭散治尸疰瘦瘠時發寒熱	右以鰲頭一枚燒灰杵末新汲水調下半錢	雌黃丹治尸疰	雌黃 研水飛 雄黃 研水飛 川大黃 燉火燉黑色 鬼白 去毛各一兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	麝香 研一分 桃仁 三十箇湯浸去皮尖研 白頭翁 去蘆半兩 巴豆 十箇	去皮膜紙 裹去油盡	右為細末拌勻以羊脂五兩鎔化和藥成膏丸黍米	大每服三五粒荊芥湯下無時	立効散治尸疰	川大黃 炮一兩 乾桃柳葉 各一兩洗焙 梔子仁 兩半 赤芍藥 兩半	硃砂 一兩別研水飛 雄黃 一分別研水飛 麝香 一分別研	右為細末拌勻每服半錢蜜湯調下無時



神攻散治中蠱毒	大甘草 生末 半兩 晉礬 末 一兩	右拌勻新水調下一錢或半錢吐出毒物効	雄射散專治蠱毒	雄黃 飛研 一兩 射香 研 一兩 羚羊角 屑 一兩 鬼白 去毛 半兩	赤芍藥 一兩 薺芩 去蘆 半兩 敗鼓皮 一兩 馬兜鈴根 半兩	右除雄射外為細末入二味拌勻每服半錢濃煎甘	草湯調下無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	射犀湯治如前	犀角 屑 一兩 鬼箭 取羽 一兩 安息香 一兩 苦參 半兩 牡丹皮 去心 一兩	先為末 雄黃 水飛 一兩 射香 研 半兩	右拌勻細每服一錢水一盞煎至五分去滓放溫時	時服	甘草湯治中蠱毒欲死	右以甘草半兩剉碎用水一盞煎至五分去滓溫服	當吐出毒物



寶靈丹治中蠱毒

硃砂

水飛 一兩 研

雄黃

水飛 一分 研

黃丹

研 一分

苦藥子

一分

續隨子

皮毛 一分 去

山豆根

生 一兩

蜈蚣

二條 微炙 一條 生用

斑猫

足 一分 去頭 半生 半炒

巴豆

出油 二分 去膜

射香

研 二分

右為細末拌研勻於端午日重九日合之最佳事急

者不拘脩合時忌見鷄犬婦人用糯米粥和丸麻子

大若未能語兒中毒即休如能語兒但將藥一粒入

門即患兒先聞其香是驗以臘茶清送下壹丸不得

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

嚼破須臾患兒必言心頭作響聲毒物便下或從口

鼻出或自大便下嫩即是血老即如諸虫狀其形不

一藥隨物下凝血中裏之取出丸以香水洗淨收之

一丸可救四五兒口噤者拘灌之如知用蠱之人即

不得根究必再發不可治

治中蠱下血欲死

以藍搗汁頻頻服半合

治中蠱毒腹中堅痛面目青黃淋露骨立病變無常以



桃上寄生為末茶點服日四五

桔梗丸治鬼疰尸疰蠱疰皆療

桔梗去蘆 黎蘆去蘆 皂莢去子 巴豆去皮 附子去膜 各半

右為末煉蜜和劑入白杵萬下每服二丸或一丸如
黍米大芥子大仰卧勿側眠至食時許病在膈上者
即吐在膈下者即瀉取下惡物如蝌蚪蝦蟇胎或長
一二尺下後大虛口乾但作鷄羹飲五合與極飲或
食粥三四日乃痊病未除盡再服

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

夜啼論

小兒夜啼者症候甚多其所專者不出三種一者冷謂
脾臟寒則腹痛而啼其候面青白手冷腹肚冷口中氣
亦冷曲腰而啼不肯吮乳又有從生下多啼入夜則甚
者此胃寒也亦曰胎寒聖濟經言積冷而夜啼夜則為
陰冷則作痛故夜間痛甚令兒啼哭也二者熱謂心臟
熱則煩噪而啼其候面赤小便赤口中氣熱心腹亦煖
仰身而啼不肯吮乳又有多饒驚悸惕跳或睡中忽然



叫啼此風熱也亦曰驚啼心主熱其候驚故熱則生驚
 又心為火熱則火旺故熱邪燥甚令兒啼哭也三者邪
 祟謂有鬼氣所持其候睡卧不穩或作疼痛且鬼祟者
 陰物也入夜則旺小兒精神怯弱血氣嫩微夜間被鬼
 所持故令兒啼哭也外客忤蟲動重舌口瘡等病亦皆
 能為夜啼其治方各逐本項下具之非若此三等之
 為專也今叙方于後

蒜香膏治冷症腹痛夜啼

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

右以大蒜一顆慢火煨香熟取出切細研爛於日中
 暴或火上炕半乾可丸時即以好乳香秤半錢研細
 如粉入拌再研細勻丸如芥子大每服七丸乳頭粘
 服或乳汁送下食空

當歸丸治如前

當歸

去蘆洗淨
焙乾秤

白芍藥

人參

去蘆各
一分

甘草

炙

桔梗

去蘆陳皮
半分

右為細末每半錢水煎時時服之



龍角丸治小兒五驚夜啼	龍角 一分 黃芩 半 兩牡蠣 一分半 火燉 一作牡丹 蚱蟬 去土二枚
牛黃 小豆大五塊 川大黃 一分半	右為末煉蜜和丸麻子大蓐中兒二丸大小以意加減
芎藭散治小兒夜啼至明則安	芎藭 白朮 防己 各半兩
右為末以乳和與兒服以意量大小多少又母用手掩入兒臍中摩兒頭脊大驗兒生二十日以裏末	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方
能服者以乳和麻子大一丸置兒口中乳汁送下	又方
交道中土 伏龍肝 各一把	右同研細水調少許飲之
治小兒夜啼	以蟬蛻去土為細末用生薑蜜水調塗兒下唇
又方治如前	男左女右臂上書尹喜二字更於手心內書天字一箇



又方治小兒驚啼夜啼	以臘月縛猪繩燒灰水調服	以蝟皮三寸燒灰著乳上飲之療如物刺啼	燈花丸治如前能祛邪止痛	以燈花二十箇乳香皂子大兩塊同為末粟米飲和	丸芥子大每服七丸桃心湯下無時	萬金散治臟寒氣弱面色青白遇夜多啼狀若神祟	沉香 剉 丁香 剉 人參 去蘆 五味子 去枝梗炒	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	當歸 去蘆洗焙 白朮 剉 赤芍藥 各半 桂心 一分	右為細末每用一錢淡漿水一小盞煎至五分发溫	時時滴口中兒大稍稍飲立効	當歸散治胎寒氣啼不止久能變癰	右以當歸為末每用小豆許乳汁調抹兒口中日夜	五服	三黃丸治熱症心燥夜啼及諸熱症	黃芩 半 大黃 去皮濕紙裏 黃連 去鬚



右為細末麵糊和丸菴豆大每服五七丸人參湯下	亦治晝啼	又方治熱煩腹痛夜啼	右以真牛黃少許如小豆大乳汁化服又於臍下書	一田字差	又方治熱症心躁夜啼	右以燈花三兩顆用燈心湯調抹兒口中乳汁送下	日三錢氏亦治臟冷夜啼但頓乳上令兒吮之又經驗	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	方以燈心燒灰塗乳上吮兒	紅桃散治風熱體如湯火夜啼不乳	天南星 二箇每箇中心剉作窩子入硃砂裝滿用木蓋蓋之水調取下中心末塗縫撮一地坑頓	在內以炭蓋之用火 全蠋 半錢 白附子 大者二十箇為末	膩粉 一錢	右拌研勻每用一字金銀薄荷湯調下	綠霞散治如前	栢葉 二錢末 蝎末 一錢 天南星 炮過為末一分 白殭蠶 去絲嘴末一錢



鬱金 末一錢 雄黃 末一錢 水飛	右拌勻細每服一字或半錢薄荷蜜水調下無時	前胡丸治風熱氣啼	右以去蘆前胡為末煉蜜和丸小豆大日服一九熟	水下服至五六丸即差	牛黃膏治兒睡着時忽然乍驚哭而覺面赤口乾狀若	神崇此雖夜啼非名夜啼也乃風熱邪氣乘心臟而	作名曰驚啼	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	真牛黃 研 煅過牡蠣粉 研 硃砂 研水飛 雄黃 研飛各一分	人參 去蘆 甘草 炙各半兩 龍腦 研半分	右為末拌勻煉蜜和膏鷄頭子大每服半粒或一粒	薄荷湯化下乳食後	安神丸治如前	麥門冬 焙去心 馬牙硝 白茯苓 乾山藥	甘草 半兩 寒水石 研各半兩 硃砂 水飛一兩 龍腦 研一字	右為細末煉蜜和丸鷄頭子大每服半丸沙糖水化



下無時	虎睛散治驚惕夜啼	右以虎睛為散竹瀝調少許抹口中	又方治如前	右取車轄脂小豆許內口中又取內臍中	又方治如前	右以父亂頭髮燒灰研末酒調服一字更量大小溫	水亦得	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	又方治如前	右以鷄糞白燒灰研末米飲調服	明砂丸治心神不寧多驚心腹疼痛夜啼不止	硃砂 通明者 杏仁 十四箇去皮尖炒黃 好坯子 半錢	右為末軟飯和丸黍米大每服三五丸薄荷湯下	麝香散治驚啼夜哭發歇不止	右以麝香研細用半字清水調下日二三服	鐵涎膏治諸驚夜啼



丁頭代赭石 半兩火煨醋淬不記 遍數以易碎為度 鐵鏽粉 一錢	白附子 一錢 辰砂 一錢 麝香 一字 龍腦 一字	右為細末拌勻蒸棗爛和成膏旋用嬰孩半皂子許至二三歲一皂子許金銀薄荷湯化下不拘時候	七寶輕青丹治驚啼夜哭及諸熱等疾	螺青 半兩 蛤粉 一分 鈎藤 炒為末 白附子 三字 鉛錫灰 二錢	丁香 一字 天竺黃 一錢	右為細末入麝香半皂子許研細拌勻米粉煮糊和	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	丸豌豆大每服一九薄荷湯磨水下無時	又方治夜間卒驚啼哭似有痛處而不知疾狀	右取雄雞冠血臨兒口上滴少許入口中即差	又方治如前	右以亂髮燒灰為末塗乳上令兒吮之能食者飲調亦得	甌帶法治鬼祟邪厲夜啼	右取甌帶懸戶上



又法治如前

右以胡粉水調二大豆許與服日三

馬骨末治小兒諸夜啼

右以馬骨為細末傅母乳頭上令小兒吮服即止

又方治如前

右取狼糞中骨燒灰研為細末服黍米許便止

又方治如前

右取鷄窩中草安於卧席之下勿令乳母知之

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

諸汗論

小兒有遍身喜汗出者此榮衛虛也榮衛相隨通行經絡營周於身環流不息榮陰衛陽榮虛則津液泄越衛虛則不能固密故喜汗出遍身也錢乙用香瓜丸若睡中汗出不自知覺者此肌肉虛而盜汗也如盜者竊物使人不知覺也又有但額上汗出者此厚衣溫暖將養過宜也上二項錢乙並用止汗散若上至頭下至項有汗而不曾過膏者此六陽虛汗也六陽脉皆上至於頭



故也若上至項下至臍有汗者此胃虛汗也當與補胃 昔錢乙治張氏三子大者喜遍身汗出次者汗上至項 下至臍小者但額面有汗至項下而無他醫以麥煎散 治之不効遂請乙治之大者與香瓜丸次者與益黃散 小者與石膏湯各五日而愈錢乙治方本集載之外收 諸方叙之後	沉香黃耆散治榮衛虛遍身喜汗	沉香劉 綿黃耆劉 人參去蘆 當歸去蘆洗 赤芍藥已上	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	各一 木香 桂心 各半	右為細末每服一大錢水一小淨盞入生薑三片棗	一枚同煎至半盞去滓放溫食前時時與服	茯苓丸治血少喜汗	肉茯苓一两酒浸一宿 鱉甲一两酥炙 綿黃耆半	何首烏半	右為細末煉蜜和丸黍米大每服十丸米飲送下食	前



木槿花治盜澤	右取木槿花開而再合者焙乾為末每用一錢猪皮	煎湯調下食後臨卧	牡蠣散治盜澤	牡蠣 一兩 煨赤麻黃根 二兩 甘草 半兩	右為末每用二錢以野水一盞煎至七分去滓放溫	無時	升麻湯治肌熱盜澤	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	升麻 綿黃耆 去蘆各一兩 熟乾地黄	天竺黃 研 牡蠣粉 研各半兩	右為細末拌勻每服半錢或一錢煎竹葉湯調下無	時	柴胡人參散治如前	柴胡 去蘆 人參 去蘆 白朮 白茯苓 青皮 去穢 桔梗 去蘆	麥門冬 去心 川芎 白芍藥 甘草 炙 桑白皮 升麻	右等分為末每服一錢水一盞煎至七分溫服無時



紫蘇飲治肌熱煩躁多渴盜汗揉鼻腹滿	柴胡 去苗 藿香 去土 甘草 去土 烏梅肉 去土 紫蘇葉 去土 乾葛 去土	人參 去蘆 茯苓 去蘆 麥門冬 去心 秦艽 去蘆 地骨皮 去骨 防風 去枝	右等分為末每二錢水一盞煎至七分去滓放溫時	時呷	沉香鱉甲丸治潮熱盜汗	沉香 去 草龍膽 去 鱉甲 童子小便浸一宿塗酥炙焦去裙襴各一兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	綿黃耆 一兩 川黃連 去鬚半兩 川大黃 微炮	右為細末煉蜜和丸黍米大每服十丸用麥門冬去	心煎湯送下無時	柴胡黃連膏治盜汗潮熱往來	柴胡 去苗 胡黃連 等分	右為末煉蜜和膏丸鷄頭子大每一二丸銀器中用	酒少許化開入水五分重湯煮二三十沸放溫服無時	黃耆散治虛熱盜汗



牡蠣粉 黃耆 生乾地黄 焙乾等分	右為細末每服一錢水一小盞煎至六分去滓溫服 無時	虎杖散治實熱盜汗	右以虎杖剉細水煎服之量大小多少與服	黃連粉治盜汗	黃連 去鬚 牡蠣粉 貝母 去心各等分為細末	右如三味各一兩即入米粉一兩研勻細以粉身	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	龍膽粉治如前千金治頭汗	牡蠣粉 茯苓 各二兩	右同為細末於生絹袋子盛之有汗即撲身	牡蠣粉治諸汗	牡蠣粉 二兩 麻黃根 赤石脂 糯米粉 各一兩	右勻為細末入龍腦末一錢拌之每用一時頭新綿	包撲有汗之處止盜汗最佳	又方名同治同



牡蠣粉 二兩 麻黃根 二兩 蛇床子 乾薑 各半兩	右同為細末用如上法	治小兒臟熱多淫犀角飲子	犀角屑 三分 茯神 去心 龍齒 各一兩 麥門冬 去心一兩半	甘草 半兩 白朮 一分	右為末每服一錢水一盞煎至七分去滓溫服無時	不語論	小兒有不能語者其證有三一者心氣不足心繫舌本	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	氣營而舉之則舌本動而語聲作矣今氣怯而不能營 用於舌故不能語也此證已在五氣項下具之二者卒 不能語因風寒之邪干於啞門連絡舌本使舌本緊急 故卒不能語也又一證喉嚨為氣之道路會厭為聲之 門戶暴為風容於喉厭則失音而語聲不出非不能語 也三者因病後不能語此因服清藥以利小便致腎虛 而不能上接於陽故不能語昔錢乙治王氏慢驚病愈 後有聲而不能語眾以為失音乙曰既失音何開目而



能飲食又牙不噤口不緊而能嚥藥衆醫皆不曉乙曰	此因用清藥利小便致虛腎氣不能上接於陽故也遂	用地黃元補腎而漸漸能言一月而愈其方本集載之	外收方具後	葛蒲散治感風寒干於啞門卒不能語	葛蒲 桂心 遠志 去心甘草水 煮各一分	右為細末每一錢水一鍾煎至五分溫服無時	桂散治風寒容於喉厭語聲不出	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	川芎 三分 遠志 去心甘草 水三分 麥門冬 去心 三分 人參 去蘆 半兩	右為細末煉蜜和丸小豆大平旦空心米飲下五丸	日三兒大加之久服取効	渴論	小兒有渴而飲水者此因臟腑有熱熱則臟燥故多體	熱發煩亡耗津液即令作渴欲飲水以解之也又有疳	渴吐瀉發渴霍亂發渴者各逐本項具之閔孝忠云凡	小兒諸渴因亡失津液引飲者但多煎錢氏白朮散與



服使任意取足飲之彌多彌好其方本集所載熱渴者 叙方于後	蓮湯散治嬰小發渴心燥	右以粉霜研極細每嬰孩一字三四歲下者半錢煎	蓮花湯調下冬月無花時蓮肉代之	香葛湯治渴甚津液燥	木香 乾葛根 剉 人參 去蘆各一兩 白茯苓	藿香葉 去土 甘草 炙各半兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末次用麝香半錢研細入藥拌勻每服半錢 或是一錢生薑湯調溫服無時	葛根湯治體熱煩渴	葛根 人參 去蘆各一兩 麥門冬 去心 白茯苓 澤瀉	甘草 炙各半兩	右為細末每服一錢水八分入生薑二片薄荷三葉	煎六分去滓溫量大小服無時	涼肌丸治肌熱臉赤煩渴燥悶



龍膽草

去蘆
二兩

玄參

去蘆
一兩

當歸

去蘆洗
淨一兩

右為細末煉蜜和丸菴豆大每服一二十丸竹葉湯

下無時

葛根飲子治熱渴久不止

右以葛根半兩剉碎水一盞煎至六分去滓頻頻服

無時

神蠟散治一切諸渴

右以大牡蠣於臘日端午日用黃泥裹煨通赤放冷

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

去泥為細末取活鯽魚煎湯調下半錢只一二服差

治小兒熱渴久不止

右以石蓮心三十箇炒黃浮萍一分水一鍾生薑少

許同煎至六分去滓每服半合徐徐服

血溢論

小兒諸血溢者由熱乘於血氣也血得熱則流溢隨氣
而上從鼻出者為鼻衄從口出者多則為吐血少則為
唾血若流溢滲入大腸而下者則為便血滲入小腸而



下者為溺血又有血從耳目牙縫斷舌諸竅等出者是	血隨經絡虛處著溢自皮孔中出也今叙方于後	盆硝研一分 亂髮一分燒 紅藍花一分為末	右同勻細以綿纏之搵藥塞鼻孔中	槐花散治如前	槐花炒一兩 蒲黃半兩 川芎薑一分	右為細末每服半錢新水調下無時	又方治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右以滑石為細末飯丸蘿蔔子大每服二三十丸微	微嚼碎新水嚥下未能嚼者槌碎與之	又方治如前	右以生蘿蔔剉碎研取汁入酒相當量大小溫服立	止	華蓋散治唾血吐血	阿膠半兩蛤粉炒如 黃芩一分 人參去蘆一分	右為細末每服半錢陳米飯調下無時



紫參散治如前	紫參 山梔子仁 生乾地黄 刺芥 兩 各一 灰 燒	亂髮 蒲黃 伏龍肝 灰 燒 研 研 各一分	右拌細勻每服半錢或一錢煎竹茹湯調下無時	黃連散治吐血	右以黃連一兩去鬚為細末每服一錢水七分入豉	二十粒同煎至五分去滓溫服無時	又方治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右取蒲黃細研每服半錢用生地黄汁調下無時	又方治如前	右以蛇蛻皮炒焦黃為末乳汁調下	又方治如前	右以黃明膠新綿各一兩並燒灰研為細末每服半	錢或一錢糯米飲下日三	又方治如前	右以燈心淨碗內燒灰以物蓋之研為末每服半錢



或一錢麝香湯調下	甌帶灰治大便下血	右以甌帶燒灰研末塗乳下與兒吮之南人以蒲為 甌帶久經烝溜或敗爛者良	又方治如前	右以車釐燒赤內水中飲服	又方治如前	右取鷓鴣翅下血與服或以鼈頭一枚炙黃焦為末	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	飲調半錢服	車前散治小兒尿血	車前子 一分 牡蠣 半兩 為粉 甘草 一分 川朴 一分 硝	右為細散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服	又方治如前	右以甘草二兩炙黃為細末煉蜜和圓菴豆大每服 五七丸溫水下日二或生剉以水六合煎取二合去	滓服



神白散治諸吐衄便溺等血妄出	槐花 半兩 微炒 蛤粉 一兩	右為細末每服半錢或一錢煎柳枝湯調下	青龍丹治小兒熱盛一切血妄行神効	甘草 貫衆 茯苓 乾葛 龍腦 薄荷葉	藿香 各一兩 縮砂 五兩 山茵陳葉 寒水石 各六兩	右為細末麪糊和丸櫻桃大別研青黛為衣	又方治諸血妄行從耳目口中鼻中出	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	右以赤馬糞燒灰研為細末溫酒調下一字或半錢	看大小與服	地黃散治舌上出血如針孔	生乾地黃 一兩 明膠 半兩 炒	右為末溫湯調下一二錢	又方治如前	右以豉一合水一盞煎數沸溫服半盞或一盞亦治	下血



又方治如前	右以小豆一合為末水三盞和攪汁飲之	戎鹽丸治舌上有數黑孔血出如湧泉	戎鹽 黃芩 黃蘗 大黃 各二兩 人參 桂心 各一兩	甘草 半兩	右為細末煉蜜和丸菴豆大飲下五七圓日三如舌	上孔穴大血不止者仍燒鐵烙之	苦竹葉汁治牙齒斷縫間血不止	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右以苦竹葉不拘多少水煎濃汁入鹽少許通口漱鹽	又方治如前	右以童子小便半盞煖熱通口漱鹽	嚙法治九竅四肢指岐間皆出血此暴驚所致	右勿令患人知覺以井花水猛嚙其面	治小兒尿血	以鵲巢燒灰井花水調服	以川升麻五分水五合煎取一合去滓一歲兒日服



小兒衛生總微論方卷十五								欽定四庫全書								盡
								小兒衛生總微論方								



欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷十六
十七

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣譚世緯



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷十六

寒熱論

小兒寒熱者由風邪外客於腠理痰飲內漬於藏府致血氣不足陰陽更勝而所作也陽勝則發熱陰勝則發寒陰陽交爭邪正相干則寒熱往來時發時止然此症與瘧相似而發寒不致戰慄發熱不至悶亂所以異也今叙方于後

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

人參前胡散治寒熱往來

人參

去蘆柴胡

去苗各一兩

前胡

去蘆一兩

桔梗

去蘆

半夏

湯洗七次焙乾

地骨皮

去骨

甘草

炙各半兩

右為細末每一錢水一盞入生姜二片煎至半盞去

滓服無時

秦艽湯治如前

秦艽

去蘆一兩鱉甲

焦黃去爛大黃

碎微炒

竹筴

一分

麻黃

去根節半兩

甘草

一分



右為麤末每服一錢水一盞入葱白二寸煎至五分	去滓溫服無時	又方治如前及治赤氣中人	右以猪後蹄燒灰研末以乳汁調服一錢治中熱亦	佳	香甲散治寒熱肌瘦	木香 一兩 鰾甲 一兩 酥 炙 川大黃 半兩 剉 炒	當歸 去蘆洗淨 檳榔 三 陳皮 湯浸去白 焙 秤半兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	柴胡 去苗 知母 半 甘草 半	右為麤末每服一錢水一盞生姜二片煎至六分去	滓溫服無時	二姜圓治痺疾發寒熱似癰	乾姜 良姜 各等分	右細剉同炒黃為細末餗餅和圓菴荳大每服三五	圓煎楊柳枝湯送下空心服亦治癰	冬瓜汁治生下至五月以裏乍寒乍熱往來無時



瘧病論

右以冬瓜炮熟絞汁與服或剉柳枝煮汁浴兒

瘧病者由夏傷於暑客於膚裏致肌腠虛隙至秋又寒濕乘之動前暑熱邪正相搏陰陽交爭會遇有時更相勝負陽勝則發熱陰勝則發寒陰陽互勝則發寒熱熱則煩躁悶亂寒則慄慄戰悚陰陽會遇交爭已過邪正相離則寒熱俱歇若邪動氣至又復發作故瘧休作有時也其發晏者邪正會遇遲也其發朝者邪正會遇早

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

也其間日發者邪氣入深而行差遲不能日作故間日乃發也今叙方于後

桃仁湯治小兒發瘧不止

桃仁

湯浸去皮尖并雙仁者麩炒黃一兩

鰲甲

一兩酥炙黃去裙

桂心

半兩

黃芩

半兩 川升麻

半兩

赤茯苓

去黑皮半兩

右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服

無時

靈豆膏治如前



大蒜 一枝去 皮研 巴豆 三斤去 皮心	右同濕紙褱煨熟一處研為膏圓麻子大每服二三錢圓醋湯送下吐瀉即差後用藿香補之	藿香湯	藿香 去土 肉豆寇 麵裹 甘草 各一分	右為細末每服半錢水一盞煎至七分溫服連服三服無時	朱衣使者治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	砒 半兩 葶豆末 一分 黑豆末 一分	右同研勻細滴水研黍米大辰砂為衣間日發者於好日夜臨卧時面北冷醋水送下二圓頻日發者只於當日夜服如上法兒極小者與一圓端午日合佳	又方如前治	右以生鹿角為細末發已前乳汁調服一字	又方治如前 右以鷄脰中黃皮炒極燥為末乳汁服之男雄女雌



又方治如前	右以蛇蛻皮一兩取每條長五尺以上者燒灰存性	研細末每服一錢新水調下未發前服三歲上半錢	下者一字	又方治如前	右以黃丹二分蜜水和之與服如冷者以酒和冷服	萬金丹治痰盛挾積發瘧久不差	阿魏 一錢湯化去砂石和麵作餅煨熟剉細炒乾 朱砂 一分研水飛	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	砒霜 一錢用醋半盞慢火上熬醋盡 丁香 半兩 巴豆 七個去皮膜油盡取霜	木香 半兩 相思子 十四個	右為細末煉蜜和圓黍米大未發前冷水下一二粒	一歲加一粒至十歲上止十粒絕早服忌熱物一辰	時	知母圓治瘧疾熱甚者	知母 一兩 鱉甲 一兩酥炙 川 大黃 一兩細	朱砂 一錢水飛研 赤茯苓 去黑皮 川芒硝 半兩



川升麻半兩龍腦一錢	右為末拌勻細煉蜜圓黍米大每服五七圓生姜湯送下得利即愈量大小加減	小兒溫瘧灸兩乳下一指三壯壯如小麥大	恒山湯治小兒瘧疾	恒山一兩小麥三合淡竹葉切一升	右為麤末水煎去滓臈中兒服一蜺殼半月者二蜺殼滿月者半小合以意增之	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	烏梅圓治瘧疾寒甚者	烏梅肉一兩母丁香半兩桂心半兩當歸去鬚洗焙半兩	乾漆半兩烟出炒	右為細末入研細射香末半錢拌勻煉蜜和圓黍米大每服十圓粥飲下	茶清散治諸瘧疾	人言一兩黑豆一升河水四升	右同煮至水盡炒乾為末每服一字或半錢熱多者



腦茶清調下寒多者草茶清調下間日者投發夜臨	卧服頻日者但臨卧忌熱物一辰時此方宜斟酌	鬼見愁治乳妳嬰小患瘡無計可治服此的驗神應	代赭石 用丁頭五粒火煨 醋淬十次研極細朱砂 透明塊子 半錢水飛	砒霜 皂子 大	右三味用濕紙七重同裹慢火內煨至紙乾取出頓 地上出火毒次入腦射各半字金箔五片同研共為 細末每一字於發日早以麻油一滴調藥傳鼻尖上	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	立止	草菓子湯治脾寒發瘡	草菓子 三個甘草 五寸大棗 七個	右並剉碎分三服水一盞煎至半盞放溫服更量大	小加減	符法治諸瘡 僊 採 謹	右於發日不得梳頭洗面嗽口及弄水漿日出時用 朱砂書上第一字於淨紙上剪下於兩脚心於兩手



心兩頰上并額上并前後心共九處帖了然後喫
 飲食如未止書第二字永除根本鮮有書及第三字
 者

弄舌論

小兒弄舌者其症有二一者心熱心繫舌本熱則舌本
 乾澁而緊故時時吐弄舒緩之二者脾熱脾絡連舌熱
 則舌亦乾澁而緊故時時吐弄舒緩之皆欲飲水心熱
 則發渴脾熱則津液耗皆引飲二症相似宜加審別心

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

熱者面赤睡即口中氣熱時時煩躁喜就其冷咬牙上
 竄治宜退熱脾熱者大便稠硬赤黃色面黃身亦微黃
 治宜微導之不可用冷藥又不可轉下若悞下之則脾
 胃虛津液耗又加五心煩熱面黃肌瘦變為疳也若大
 病未已用藥弄舌者大凶也今叙方于後

人參知母散治心熱弄舌

知母 一兩 藍葉 半兩 人參 半兩 去蘆 鈎藤 一分 川升麻 一分

乾葛 一分 黃芩 一分



右為細末每服一錢水八分入竹瀝三兩滴煎至五	分去滓溫服無時	瀉黃散治脾熱弄舌	藿香葉 去土七錢 山梔子仁 一兩 石膏 半兩 甘草 三兩	防風 去蘆并丫枝切焙四兩	右並剉以蜜酒洒拌勻炒香燥為細末每服一錢水一盞煎至六分去滓放溫取清汁服一方有山藥二	兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	魛 音奇 病論	小兒魛病其論有二一者聖惠云小兒生十餘月已後	母又娠因以乳兒令兒生病其候精神不爽身體痿痺	骨立髮落名曰魛病又曰繼病又曰交嬾二者巢氏云	小兒在母胎妊之時其母被惡神導其腹中胎氣至兒	生下往往疳羸微微下利寒熱往來毛髮焦豎多嗔不	悅其候頗似於疳今叙方于後	虎骨丹治魛病



虎頭骨 塗酥炙 鬼白 一兩 草龍膽 去蘆一兩 鬼箭 取羽一兩	琥珀 半兩 白膠香 半兩	右為細末同研勻煉蜜和圓黍米大每服十粒乳香湯下無時	又方治如前	右取伏翼蝙蝠是也燒灰研細末粥飲調下半錢日三若炙令香熟嚼爛哺兒亦効如得重一斤者尤佳又得黃精自然汁塗炙之最良	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	又方治如前	右取百勞鳥毛與兒帶之又名博勞又名鷄	骨蒸論	小兒自周晬已上至十餘歲血氣隆盛因厚衣溫燠將養過宜食羊肉肥甘果食諸物臟腑生熱熏蒸肌骨身體發熱夜有盜汗漸漸瘦悴乃成骨蒸若不即治則為急勞今叙方于後	秦艽散治潮熱蒸瘦減食



秦艽去蘆切焙甘草炙各一兩乾猫兒薄荷葉半兩不見火	右為麤末每服一二錢水一中盞煎至七分去滓溫服食後	地骨皮湯治骨蒸體熱肌瘦	地骨皮去骨胡黃連各一兩鱉甲塗酥炙黃柴胡去苗	犀角錯取屑嫩桃枝剉川大黃炮知母各半兩	右為細末每服一大錢水一盞煎至五分去滓溫服	無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	麥煎散治童男室女骨蒸肌熱盜汗減食痿瘦	鱉甲醋炙去裙襖大黃紙裹煨熟恒山柴胡去苗赤茯苓去黑皮	乾生漆炒烟盡當歸去蘆洗淨酒浸一宿白朮生地黄	石膏各一兩甘草半兩	右為末每服二錢水一盞入小麥五十粒煎至六分	去滓溫服食後臨卧有虛汗者加麻黃根一兩	連芩散治骨蒸肌瘦漸為急勞	黃連去鬚一兩秦艽去蘆一兩天靈蓋一枚塗酥炙黃甘草半兩



右為細末每服半錢粥飲調下無時

腹皮青黑論

小兒腹肚皮腠虛薄為風寒邪氣所乘而真氣微弱不能滋其血氣失榮養之致邪氣著而不去故腹皮卒然青黑也此候危惡今叙方于後

二聖散治腹肚皮膚忽然青黑

右以胡粉苦參各一兩為細末每服一錢溫酒調下

兼塗患處

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

又方治卒腹皮青黑不能喘息宜急用此方

右以大青為末納口中酒送之

又方治卒腹皮青黑不急治須臾即死

右以酒和胡粉塗之乾則再塗仍於臍四邊各半寸

并鳩尾下一寸共五處各灸三壯

難乳論

小兒難乳有二一者兒初生客風邪熱中臍流入心脾之經即令舌厚唇燥而急口不能乘乳故乳而不能啞



飲也二者兒初生時拭掠口中穢血不及嚥而入腹則 令兒心腹痞滿短氣促急故口不能吮乳飲之也今叙 方于後	五福化毒丹治心脾經熱舌厚唇燥急不能乘乳	生乾地黄焙稱熟乾地黄焙稱各半兩天門冬去心稱	麥門冬去心稱玄參去蘆甘草炙甜硝各三錢青黛一錢半	右先六味為細末後硝研入硝黛拌勻煉蜜和圓鷄 頭大每服半圓或一圓食後水化服之無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	又方治兒飲乳不快喉舌似緊不相從順	右以沙牛角燒灰存性研細末塗乳上放兒口中捻 汁飲吮嚥下	又方治胃腹痞滿短氣促急不能飲乳	右取鷄子殼燒灰酒服半錢	又方治心胃熱痞飲乳不快	右以生葛根杵爛絞汁飲灌之如無以乾葛煮灌 之亦得



治小兒不能乳

右以雀矢四枚末之著乳上令吮之兒大增服

治小兒初生不飲乳及不小便

右以乳汁二合葱白一寸四破於銀器內煎取一合

藥注灌之立効

大小便倫

小兒大便有祕澁者有不通者皆由府臟有熱乘於腸

胃胃熱則津液少少則糞燥結實而鞭大便難下則

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

為祕澁甚者則不能便乃為不通也小便有滴瀝者

有不通者由小腸與膀胱有熱二經俱主水水入小

腸傳於膀胱循水道出而小便也熱氣乘之則水耗

少而行澁故滴瀝而下也甚者水道乾而不通也若

熱入小大腸則皆壅滯不得宣利故大小便俱不通

也

金花散治大便秘澁便難

皂角仁

炒一錢

檳榔

生一個

甘草

錢一



右為細末每服一字或半錢沙糖熟水調下
栢子仁膏治如前

栢子仁揀淨松子仁 胡桃仁 各等分

右研和膏每彈子大熱湯化下未快再服

人參荊芥湯

右以人參荊芥各自為末每用人參末半錢荊芥末
一錢和勻水一盞煎至七分放冷量大小時時與服

木香麝散治大便不通

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

木香 訶子 煨取皮等分

右為麝末每半錢或一錢水煎去滓放溫時服

又方治如前

右以猪苓一兩為末水少許煮雞矢白湯調下一錢差

又方治如前

右以醇不拘多少先搗乾曝為末麵糊為圓菴豆大
每服五七丸至十餘丸量大小米飲下

木通散治小便澁滯滴瀝不得通快



木通 滑石 甘草炙 焰硝研各半兩 三葉草一分	右為末細勻每服一字或半錢沸湯點服乳食前	滑石散治如前	滑石 瞿麥 葵子炒 芸臺子 甘草炙	山梔子仁 蔚金 海金沙炒各一錢	右為細末每服半錢煎燈心葱湯調下乳食前	如聖散治如前	海金沙炒 滑石等分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末每服一字或半錢煎燈心湯調下乳前食	八正散治如前又治心經邪熱又治熱淋	瞿麥 木通 山梔子仁 地扁竹 車前子	甘草 滑石各三錢 大黃一錢半	右為細末每服一錢水七分入薄荷二葉同煎二分	去滓溫服無時	治小兒小便不通三日欲死	葵根一握 壁魚七枚



右以水一大盞煎葵根取汁六分入壁魚末再煎三	五沸去滓放溫服	治小兒小便赤澀不通	蒲黃 滑石 各等分	右研勻細每服一錢煎燈心湯調下沙糖水亦得亦	治淋痛乳食前	治小兒卒不得小便以鹽安臍中灸之	治小兒小便赤澀不通	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	滑石 二兩 木通 一兩 葵子 一合	右為麤散每服一錢水一小盞煎五分去滓溫服無	時	冬葵子散治小兒卒小便不通小腹急悶	冬葵子 一兩 木通 半兩	右為麤末每服一錢水一小盞煎至五分去滓不拘	時候	捻頭散治小便不通



延胡索去皮 川苦棟去核	右為細末每服半錢或一錢捻頭湯調下如無捻頭	即於湯中滴油三兩點食前服一方車前草小麥各	一升水二升煮取一升二合去滓煮粥服日二量兒	大小加減	葶藶散治如前	葶藶半兩炒 青皮去穰炒	右為細末每服半分或一分空心姜湯調下乳食前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	殭蚕散治如前	白殭蠶炒去絲嘴 當歸去蘆洗淨等分	右為細末每服半錢或一錢煎車子湯調下亦治血	淋若沙淋者煎羊蹄草湯調下無時	又方治如前	右以綿黃耆為末每服一錢水一盞煎至五分溫服	無時 又方治如前



右以烏梅肉為末每服一錢水調服神效	又方以地扁竹煎湯放溫服如熟水飲之效	白朮膏治小便澀滯不通脅腹痞滿	白朮 兩半 白茯苓 一分 澤瀉 兩半 人參 去蘆一分 滑石 一分	右為末煉蜜和膏每皂子大米飲化下亦治脾胃不	和不美乳食	朱砂散治小便赤澀不通心神煩躁	朱砂 研一兩 滑石 研半兩 犀角屑 兩半 黃芩 一分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	車前子 炒一分 甘草 一分	右為散拌勻每服半錢煎竹葉湯調下乳食前	葵石散治小便不通悶亂	葵根 剉一握 滑石 兩一 木通 兩一 牽牛子 炒半兩	右為麤散每服一錢水一大盞入燈心葱白各少許	煎至六分去滓放溫食前服	鷄腸草散治小腸膀胱有熱小便難澀服冷藥過多却	致小便不能禁止



雞腸草一兩牡蠣粉三分龍骨火煨半兩麥門冬去心焙半兩	白茯苓去黑皮半兩桑螵蛸米泔水煮半兩	右為麤散每服一錢水一盞入生姜二片棗一個煎	至六分去滓溫服亦治遺尿乳食前	郁李仁丸治大小便秘瀯不通	郁李仁二兩湯浸去皮大黃一兩檳榔三兩青皮去穰半兩	右為細末煉蜜和丸菴豆大每服十丸至十五丸姜	湯下無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	芎黃散治如前	芎藭一兩川大黃三分剉碎微炒郁李仁三分溫湯浸去皮微炒黃	右為散每服一錢溫水調下乳食前	朱粉丹治如前心神煩腹脇悶卧中多驚	朱砂半兩研細水飛膩粉一錢續隨子半兩	右為末研拌勻煉蜜和丸黍米大每服七粒溫水送	下食後	木通剉散治大小便不通



木通 瞿麥 滑石 山梔子仁 各三錢 茯苓 去黑皮	甘草 各四錢 續隨子 三錢 車前子 一分	右咬咀每服一錢水一盞煎至半盞去滓溫服更量大小加減乳食前	紅綿散治如前	朱砂 飛研水 蔚金 輕粉 各一分 馬牙硝 兩半	右入麝香少許研勻細每服半錢薄荷蜜水調下無時	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	又方治如前	右以滑石為末每服半錢清油調如稀糊再入好酒一茶脚許攪勻服之如一時久未通再服	又方治如前	右以不蛀皂角去皮核生為末用二錢取獨頭蒜一顆沙盆內同皂角末磨擦蒜盡以釀米醋少許和之捻作餅子如香花子貼臍中立通	又方治如前



右以露蜂房燒灰研細酒調一錢或半錢日二
 郁李仁膏治襁褓小兒大小便不通

郁李仁 一兩浸 去皮 滑石 半兩 研

大黃 去麤皮取實者一兩剉碎 酒浸半日控乾炒焦為末

右先將郁李研為膏和二味丸黍米大每服一二十
 圓量大小與小者乳汁下大者薄荷湯下要踈風熱
 痰實服但微澹極穩

五淋論

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

淋病有五一日熱淋血淋二曰寒淋膏淋三曰氣淋四
 曰勞淋五曰石淋五淋之中小兒有所患者惟寒熱氣
 之三症外勞石二症虛極所致小兒未親色慾故無患
 者內石淋恐兒本怯腎弱者有之亦千金中無一矣今
 並具五淋之症于下 熱淋者因熱乘小腸膀胱二經
 皆主水水入小腸傳於膀胱行於水道出於陰中而為
 小便也故陰為水液之路膀胱為津液之府熱則水道
 燥燂水液行澁致水道不利小便淋瀝因名曰淋其候



出少而起數小腹急痛引臍連莖中痛也熱甚者溺血
故亦曰血淋血得熱則流散滲入於胞隨淋溺而下也
寒淋者因寒冷干於二經而作其候先寒戰而後溺
之是邪氣與正氣交爭也寒氣勝則發寒戰正氣勝則
寒戰解而得溺溺則出少澁滯小腹連莖中而痛寒甚
者溺白如稀膏故亦曰膏淋亦如痢下熱則便血寒則
便膿也痢下者寒熱搏於大腸也今淋者寒熱搏於小
腸也 氣淋者小兒因怒而啼氣入二經留滯不散邪

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

正相搏胞內氣脹其候每溺則臍下憋膨水道澁不能
下莖中相引而痛常有餘瀝也 勞淋者因房事過度
腎虛精竭氣通於陰水道乾澁之所為也腎與膀胱為
表裏今腎虛精竭則膀胱亦虛不能約制其水故水液
頻數而下水道乾燥則不能通利其候尿留莖內數起
不出引小腸連莖而痛也 石淋者小者為沙大者為
石皆云腎主水水為熱結化而為石其言雖近而不知
其本也且腎有二藏左者為腎右為命門主水而為壬



聖濟經云壬者一水一石之謂歟不知一水一石之道	告未達生化之妙本太一精真在上兆於水立於石是	腎中本有真之物也患者乃真精化而真物出焉其候	沙石從水道中出塞痛悶絕故痊者鮮矣	琥珀圓治熱淋疼痛	琥珀 _{研 半兩} 乳香 _{研 半兩} 桃膠 _{研 半兩}	右拌研勻糊為丸菴豆大每服一二十丸煎萱草湯	下	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	又方治如前	右以黃芩二兩絹袋貯之用水二升煮取一升時時	服無時	蒲黃散治血淋澀痛	蒲黃 _{兩 半} 冬葵子 _{兩 半} 生地黄 _{兩 半}	右為細末每服一錢水一盞煎至六分去滓溫服無	時	又方治如前



右以雄鷄屎尖白如粉者炒微黃研細末酒糊圓棗	豆大酒下三五丸日連連四五服取効	玉粉丹治寒淋膏淋如神又治下痢	牡蠣粉 四兩 乾姜 末二兩	右拌勻麵糊為丸麻子大每服一二十九米飲送下	無時	二膠散治氣淋小腸慙 不通	桃膠 李膠 等分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為末每服半錢葱白湯調下無時	又方治氣淋	右以蠶退紙燒灰研細每服半錢或一錢煎去心麥	門冬湯調下無時	又方治如前	右以馬兜鈴炒焦黃為細末每服半錢或一錢麝香	酒調下溫酒亦得無時	葵子散治沙石淋痛不可忍



冬葵子一兩 石南葉 榆白皮去末 石葦去毛	木通剉各半兩	右為細末每服半錢葱白湯調下一方只煮冬葵子汁服	二石散治如前	滑石 石葦去毛各一兩一方更有瓜樓根一兩	右為末每服半錢煎大麥湯清調下無大麥米飲亦得	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治小兒淋閉	露蜂房 亂髮灰等分	右為末每服一錢水調服之日二	又方治如前	以冬葵子一兩杵麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服無時	又方 以衣中白魚摩臍下及小腹	又方治如前經効小兒諸淋



治小兒遺尿 瞿麥穗 龍膽草去蘆 皂莢去皮 桂心各半 人參一兩 雞腸草一兩 車前子一分 石葦去毛 右同為末煉蜜和丸小豆大每服五丸食分日三 又方 以小豆葉搗汁服之以雞腸燒灰研末漿水調服一錢面北斗服日三	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	小兒衛生總微論方卷十六



欽定四庫全書									
小兒衛生總微論方卷十七									
癰疽論									
小兒癰疽由怒啼軀氣衝擊腎經氣下通於陰囊故令									
腫大堅硬 又偏腫者氣乘偏虛而作也其有水者腎									
主水下通陰因怒啼軀氣腎水隨氣而下作									
海蛤散治氣擊於下陰腎腫大而堅硬									
海蛤		三分	研		藁香子		三分	炒	
					薏苡仁		兩	半	
					白朮		兩	半	
欽定四庫全書									
小兒衛生總微論方									
檳榔		半兩	裹炮						
右為細末每服半錢溫酒調下早晚乳食前									
又方治外腎腫硬漸欲成癰									
右以乾地龍去土盡為細末唾調塗之常避風冷濕									
地									
勝金桃仁膏治卵癰腫大									
右杵去皮尖桃仁為膏傅之									
川楝子丸治疝氣偏墜一大一小									



川棟子去核取肉一錢續隨子去皮淨一錢輕粉二錢	右為細末麵糊和丸黍米大每服十丸葱白湯下不過十服愈	荊三稜散治如前	荊三稜炮班猫去足並翅等分	右為細末每服半錢米飲調下	三香昆布丸治如前	薰陸香三分青木香三分藿香葉去土半兩昆布三分洗去鹹味	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	牽牛子半兩微炒	右為細末棗肉和圓麻子大每服十丸空心牡蠣湯下	治小兒狐疝傷損生癰	地膚子一兩半白朮一兩三分桂心三分	右為末煉蜜圓如小豆大酒服七圓量大小增減	又方治如前	芍藥 茯苓各三分防葵一作防風大黃各半兩半夏



桂心 蜀椒 去目並閉口者一分	右為末煉蜜和丸如大豆每服一圓日三四	五等圓治小兒卵核堅癰或陰卵偏大	黃蘗 炒 香豉 牡丹 去心 防風 去蘆并枝 桂心 各半兩	右同為末煉蜜和圓如大豆許三歲兒飲服五丸	又方治小兒癰 以蜥蜴二條燒灰研為末酒服之一	二歲兒半錢	治小兒卵腫 以鷄翅六莖燒灰服之隨在左右取翮	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	能治陰大如蚪	治小兒氣癰	土瓜根 芍藥 當歸 去鬚洗焙各一兩	右咬咀每服二錢水一盞煎至半盞去滓溫服量大	小加減	又方治如前 以三月上除取白頭翁去蘆搗之隨左	右偏處傳一字作瘡二十日愈亦治腎癰	又方治小兒卵腫 搗牆衣傳上



治小兒偏癰或氣攻小腹痛疼	蛇床子 為末 馬鞭草 取汁	右相和如膏塗病處	又方治如前	以枳壳去穰三兩微炒杵為細末每用煎至栢枝濃	汁調膏厚塗腫處良妙	治小兒陰癰腫大不消	以鵬沙一分以水研化塗之立效	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治小兒陰癰偏大氣脹	以雄黃一兩研極細甘草一錢剉同煎湯淋渫	又方治如前	牡丹皮 去心 防風 去蘆并丫	右為末每服半錢米飲調服無時	治小兒卒卵腫痛而脹	赤小豆 末半 桂心 末一	右以生牛蒡取汁二大盞煎稠入二味相和為膏塗



病處即消	治小兒陰囊腫痛虛熱以蚯蚓屎用甘草汁調塗之	又方治疝氣腫痛連小腹如刺	右以生麝干杵汁服之亦可作丸服	又方治如前	右以藜葉煎濃汁一升煮取七合每服半合頓服量	大小加減	蜘蛛散治癰疔或腫堅或偏墜或大小時時上下	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	蜘蛛 十四個 焦炒桂心 半兩	右為散每服一字或半錢米飲調下或蜜丸服	玉粉散治水癰上下不定	煨熟牡蠣粉 二兩 炮烈乾姜末 一兩	右拌勻冷水調稀稠得所塗病處以小便大利即愈	此方若用糊為圓服之治冷淋膏淋下痢膿血及婦	人帶下	陰腫生瘡論



小兒有陰腫及生瘡者由腎經虛而邪氣乘之腎氣通於陰邪搏衝於下則陰為腫甚者衝攻以生瘡又有因風濕外干皮膚則陰為之痒搔之以成瘡者並叙方于後	桃仁圓治小兒陰腫	白蒺藜 半兩炒 桃仁 三分湯浸去皮尖	牡丹 去心 桂心 半兩 郁李仁 一分湯浸	右為細末煉蜜和丸黍米大每服十圓溫酒下乳食	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	前	胡連散治陰腫生瘡	胡黃連 半兩 胡粉 半兩 白礬灰 一分	右為細末每用少許油調塗患處一方只用黃連胡粉等末香脂油和傳	又方治如前	右以人屎或狗屎燒灰傳之	又方 右以馬骨或狗骨燒灰研細傳之



治小兒陰腫	以狐莖炙焦黃杵細末服之	以茺青
搗傅上	以衣中白魚傅之	以斫取桑白皮汁塗
上		
治小兒陰瘡痛痒搔之黃赤水出不差		
五倍子	腦茶	等分
右為末更入膩粉少許先以漿水葱白椒煎湯洗之		
帛子拭乾用藥傅之		
治小兒陰上生癰瘍醫不能療		
欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	
右以鰐甲一枚燒灰研末鷄子白和傅之		
治小兒陰瘡		
右以黃蘗水煮汁洗了拭乾白蜜塗之		
治小兒惡毒瘡腫生於陰髀間痛牽入腹不可忍一宿		
殺人		
右以茴香苗葉搗取汁量大小與服日二三其滓傅		
腫處冬月無苗葉取根用		
又方治小兒陰腫生瘡		



右濃煎狼牙草湯洗之冬月取根用或搗爛傅之
治小兒卒然陰腫痛脹

赤小豆 末半兩 肉桂 末一分 生牛蒡根 取汁二盞

右先將牛蒡汁煎稠後入二末和膏傅病處

治小兒陰腫虛熱作痛

以蚯蚓糞用甘草汁調輕輕塗上

治小兒陰頭忽生腫瘡此名尿灰瘡

以黑豆皮嚼爛傅之以伏龍肝研末和鷄子白塗之

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

又方治陰頭生瘡

右以蜜煎甘草塗之若陰頭生瘡不痒不痛但潰蝕者此名下疳瘡方具于後

又方治陰腫瘍搔之成瘡

蛇床子 細辛 吳茱萸 去枝梗各一兩

右為末每用一匙水一大碗葱白三莖煎至數沸通手淋洗三五上極妙

又方治陰痒生瘡



胡椒

半兩 紫稍花 一兩

右為麝末水煎浴洗如前

又方治如前

右以黃蘗剉碎煎湯洗浴

腋氣論

小兒腋氣者血氣不榮腋下有孔一如毛孔而稍大臭穢之氣從其中出若狐氣之臭故俗呼曰狐臭也亦有父母遺體相傳者又有乳養之人而有染著者今叙方

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

于後

綠銀散治腋氣

銅綠

蜜陀僧

各三錢

白芨

一個燒存性九錢

右為細末每用半錢津唾調塗腋下三五日一次以效為度

又方 右以輕粉一錢七分兩處麝香酒調一半服之好酒調一半塗腋下以不臭為度

又方 右以左挑開通錢五文火燒通赤內醋中焯之



凡七次杵羅為末用老生姜一塊刀背斫斷將生姜以斫斷處擦腋下有毛擦不倒者乃是病也拔去其毛以生姜自然汁調藥塗之屢驗若些小腋氣汗氣只以生姜擦塗腋下亦可

顙門腫陷論

小兒初生皆有顙門者藏氣未充骨髓未完滋養未備藏故也藏腑皆以脾胃為養兒自生以後得五穀所滋則藏氣充而骨髓完所以兒至能食則顙門合也顙門

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

者繫於脾胃聖濟經言衛顙之天五五者土也脾胃屬焉小兒有顙腫者由脾胃不和冷熱不調或怒啼飲乳或喘急咳嗽致陰陽氣逆上衝而顙腫也熱則腫而軟冷則腫而硬又有顙陷者或因瀉痢或小便頻數或曾服清藥以利小便或本怯氣弱或別病纏綿皆使藏虛而不能上榮於顙故令顙陷也此皆小兒惡症得愈者鮮矣

治小兒顙腫軟



右以青黛冷水調傅之及兼服化毒丹 方已具前	治小兒顫腫硬及陷	乾熟地黄八錢 焙稱 山茱萸去肉 乾山藥各四錢 澤瀉	牡丹皮去心 白茯苓去皮各三錢	右為末煉蜜和丸菴豆大三歲下者三五丸溫水化	下空心及兼服錢氏益黃散	治小兒顫陷	以狗頭骨炙黃杵末鷄子清調傅	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	滯頤論	小兒滯頤者脾冷所致也脾之液為涎脾冷則不能約	制故涎常從口角流出滯漬於頤頤浸久生瘡名曰滯	頤	治小兒滯頤涎從口出浸漬頤頤口角下生瘡	以桑白皮汁塗口中	又方治如前	以東行牛口中沫塗兒口及頤上



治小兒口角下黃肌瘡	以殺羊髭燒灰和臘月猪脂傳上 以羊角燒灰和	臘猪脂傳	溫脾圓治脾冷多涎流漬頤下生瘡	丁香 木香 半夏 用生姜六兩同杵 碎炒黃色各一兩	青皮 白朮 乾姜 去穢 剉碎微炒 各半兩	右為細末煉蜜和丸黍米大每十九丸米飲下無時服	溫脾散治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	丁香 肉豆蔻 半夏 白朮 一兩 兩 兩 兩 麩煨 白礬水浸 去滑炒黃	乾姜 人參 甘草 炮 去 各半 兩	右為末每服一錢水八分生姜二片煎至五分去渣	溫服食前	又方治口中涎出流漬頤下不乾	右以白羊屎內口中服前藥仍更洗瘡淨以燒錫末	傳之	腸癰論



小兒腸中有癰瘡者由寒熱之氣搏於腸間氣血結滯而生也其候食少腹中痛悶小腸微強者是也

治小兒腸生癰瘡

右以鯉魚腸煮令食之

針刺候傷論

小兒有因動作候被針刺骨刺竹木簽刺傷而入肉或已折在內不出者叙方于後

右以白梅肉爛杵和象牙末傅上若針即以象牙屑

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

水調傅之或以磁石末傅之仍更以瞿麥為末水服方寸匕或煮汁飲之日三

又方 以松脂如乳香者末傅之帛裹三五日不覺而出落

諸物梗喉論

入腹附

小兒有候吞諸物在喉中不能下不能出妨碍飲食氣出不快甚者塞刺疼痛時霎不任便致危殆

磁石治候吞針刺喉中



右以磁石如棗核大磨令光鑽作竅子以線穿繫定 令兒含之針則自出若悞吞錢者用棗大	又方治悞吞竹木入喉	右燒稱錘通赤漬酒飲之	又方治悞吞金銀銅鐵錢物在喉中不下	右以南天竹根燒灰研細熟水調服一錢立下	通氣散治如前及治鈎繩之類在喉	鵝毛 一錢燒灰 磁石 一皂子大塊 象牙 一錢燒存性	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末每服半錢新水調下	又方治悞吞金銅銀鐵錢等物在腹內不下	右以石灰一皂子許硫黃半皂子許同研為末酒服之	又方治如前	右以胡粉一兩水調分服量大小加減	又方治魚骨鯁喉不下	右以礪砂少許口中咀嚼嚥之立下



又方治如前	右以故魚網覆頸項則下未可煮汁飲之立下	又方治如前	右以鷓鴣毛燒灰水調服量大小與	又方治一切諸般骨刺竹木簽刺梗不下	右於臍月取鰕魚膽北簷下陰乾每用少許酒煎化	溫呷得逆便吐梗乃隨出未吐再服其梗刺雖嚥在	腹內久痛黃瘦者服之亦出極妙無鰕魚取青魚鯉	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	鰕魚膽亦可并治喉痺	又方治桃李果梗	右以狗頭煮湯摩頭上	又方治一切諸物梗喉	右以瞿麥為末水調半錢或一錢服	大聖玉屑無憂散治諸物梗喉及一切咽喉諸病解毒	治百疾	玄參 去蘆 貫衆 炒 白茯苓 黃 縮沙仁 炒 滑石



荊芥 川黃連去 山豆根 甘草炙

硼砂各半 寒水石三兩火燉埋土中出火毒七日

右同為末每用半錢抄口中新汲水一口嚥之治誤吞叫子骨刺棗核金銀銅鐵瓦石麥稻針刺等諸物梗喉及治咽喉一切諸疾喉痺乳鵝等疾又解巴豆杏仁諸藥之毒能殺人者又治蛇蝎諸虫咬蜇毒氣入腹并心腹脹滿脾積癥塊風涎癰瘰他藥不能治者但服此藥立見效驗能潤三焦消五穀除九虫益

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

五藏辟溫疫無所不治

治小兒一切珠璫錢等梗喉

右以弩銅牙燒赤內水中放冷飲之

疣子論

小兒有附貼皮膚生核如麥豆大其色與皮肉無異謂之疣子有一兩個生者又有數個連續生者割破其裏狀如結筋亦有微血亦與肉相似此由風邪搏客血氣變化所生又有一種初生核小日久漸長滋益而大名



曰瘤子亦由邪搏血氣變化所生則氣血順活故漸長大也今叙方于後

以針或小刀子決疣子四面微微血出取患瘡人瘡中膿汁傳之莫得近水三日外膿潰其根動自落

以白梁米粉於銚內炒令赤色用衆唾相和傳上厚一寸許即消

治疣子連續生十數箇者

以艾炷一枚如麥豆大灸最生者一箇名疣母餘即

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

自消核大者稍增艾炷

治瘤子 以稻科上花蜘蛛十餘箇取頓於桃科子枝

上放之候絲垂下取東邊撚為線子繫定瘤子上七

日後換其瘤自落沈興宗待制有老母病瘤如拳用

此法繫之至三換遂乾落於枕畔得之一似乾栗

諸虫咬蜇論

小兒有為諸毒虫咬蜇者多於夏熱之時取涼解脫就地坐卧忽然悞有觸遇因被咬蜇其痛不可忍直至終



夜乃歇甚者連引一邊痛無少止又有毒瘤瘡中腫潰
苦楚或有虫因卧誤入耳中不出者並叙方于後

治蛇咬所傷

以生猪血調雄黃末傅之如倉卒間只用猪血亦效
若獨用雄黃即不驗以冷水先洗瘡了搵乾用茱
萸一合水半碗研取汁服之將渣傅瘡上

一方用酒調茱萸末服之油調末傅瘡上

治蛇咬毒氣內攻腫痛不任

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

以人屎厚傅之用綿裹即消 以白礬雄黃等分研
末於刀頭上焙令熔便滴瘡上即自差

治蝎蜇

以吃勒藤令患人自嚼爛塗之 以乾姜令患人自
嚼爛塗之

治蜈蚣咬

以醋磨生鐵汁塗之亦治蜘蛛咬以獨頭蒜磨咬著
處痛止為度以活蜘蛛一箇安口在咬著處則自然



吸嚥其毒痛乃即減至蜘蛛肚脹時放之別取如前
用不爾則直脹死不休恐傷生命故放之又同將用
過蜘蛛放水水中即解其毒不死

治蜘蛛咬

以活蚯蚓入葱葉筒中緊捻兩頭勿令泄氣頻頻搖
動則自然化為水滴在咬著處又治蜒蚰入耳不出
點藥滴入即化為水

治壁鏡咬

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

以生姜汁調皂角末塗之破者取烏梅肉貼

治蜒蚰入耳

以醃醋灌耳中即出以小蒜汁灌之以驢乳汁灌之
以龍腦大豆許線繫左入塞右右入塞左立效以香
油灌之

又方治如前 道人頭 棟葉 車前子

各等分

右為末唾調置耳門中則自出傳方人直尋蜒蚰自
送入耳用此藥試之乃出



治百蟲入耳

以椒末醋調灌耳中如行十里久自出 以猪肉炙

香熟掩耳虫聞則出

又方治如前

白礬

雄黃

各半兩

右研為細末生油調成膏用皂子許塞耳虫自出

撲墜損傷論

人之血氣循身周流而無停止小兒有因落床或從高

墜墮或打撲損傷致血氣失度隨損處停留或流行入

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

腹瘀蘊不散致羸瘦痿黃時作疼痛嗆嗆微寒翕翕微

熱重者有至筋傷骨損舉動不能叙方于後

蒲黃散治小兒因打撲墜墮血氣停滯或敗血入腹不

散作疼痛寒熱羸瘦痿黃

蒲黃

當歸

去鬚
洗焙

生地黃

乾各
一兩

琥珀

另研

赤芍藥

桂心

各半兩

右為細末每服一錢水一小盞煎至五分去渣溫服

無時



茯神丸治如前	茯神去心 當歸去蘆 麥門冬去心 人參去蘆	黃芩 草龍膽去蘆 桃仁湯浸洗去皮尖并雙仁者麩炒香熟研細後入各半兩	右為細末拌勻煉蜜和丸黍米大每服十圓用生地	黃汁少許同酒送下無時	三黃散治小兒因損傷敗血不出但傷不斷者服之立	效	黃連去須 黃芩三分 甘草半兩 玄胡索去皮	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為末每服一分用童子小便半小盞酒三分之二	同煎四五沸熱服取下惡物立差	靈龜散治撲墜內有傷損	當歸去蘆洗淨三分 白芷 漏蘆去蘆各半兩	右為末每服一錢溫酒調下食前	又方 以生地黃不拘多少杵爛絞汁用溫酒調服量	大小與之其效如神如內損熱血衝心甚者氣絕不	認人下咽即醒取下惡物遂好



沒藥丸治撲墜損傷骨節痛疼或已可而有時發作痛不可忍時發赤腫數服立效永除根本	沒藥 澤蘭葉 香白芷 骨碎補 草烏去皮	破故紙炒 敗龜酥炙 虎骨塗炙 白頭翁去蘆	烏金石各一兩 自然銅燒赤醋淬過	右為細末醋糊圓桐子大焙乾醋磨濃墨為衣生姜溫酒下三五圓筋骨損者用虎骨散帖之	虎骨散	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	虎骨塗炙 金毛脊去毛 穿山甲一兩 骨碎補一兩	右為末以倉米煮粥臨熟更入米醋煮如糊攤紙上然後摻藥在上包裹貼損處如大段損折即以杉夾	正不過三上即安此二方屢用大效亦治大人	四黃散治落床墜地瘀血在腹陰陰寒熱不乳啼哭	蒲黃 大黃 黃芩各十銖 黃連去鬚 麥門冬十銖	甘草八銖 芒硝七銖	右呔咀以水二升煮取一升去滓內硝令烺看大小



分服羸瘦者忌冷食大小便血即愈

藥毒論

小兒腸胃怯弱藏腑嫩軟血氣未壯因服藥不勝其味
 之毒致煩躁悶亂或口舌麻木或如針刺甚者吐利有
 至碗血也

玄胡索散 解諸藥毒煩躁悶亂吐利嘔血

玄胡索 去皮 甘草 生 白礬 生各
一兩 半兩

右為末每服半錢水一小盞煎至六分去渣放溫服

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

時時呬

礬茶散 治諸藥毒煩躁口舌麻木或如刺痛

草茶 一兩 北礬 一兩

右為末每服半錢或一錢汲新水調下立解

又方解百毒藥 以白扁豆為末水調一二錢服以出

了蠶者故紙燒灰細研冷水調下半錢頻服

龍腦散治藥毒吐血如神

大黃 蒸 半夏 湯洗七次薄切 甘草 炙 金星石
姜汁浸一日焙乾



[illegible]

欽定四庫全書

子部

小兒衛生總微論方卷十八

詳校官太醫院史目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣譚世緯



欽定四庫全書	小兒衛生總微論方卷十八	頭上諸病論	頭瘡	小兒頭瘡者由藏腑有熱上衝於頭外被風濕復相乘之搏於血氣而生其瘡故曰頭瘡此候與禿瘡特異且禿瘡者有白有赤硬痂遍滿其頭此頭瘡者但一兩處生其痂並不自硬而乾時時常有膿血濕汁俗呼為長	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	頭瘡小兒失於沐髮者便生此瘡也	玄精石散治小兒頭瘡	太陰玄精石 寒水石 各一分 輕粉 麝香 各少許	右為細末先以淡漿洗去瘡痂拭乾油調藥塗之甚	者不過再	栝樓散治如前	栝樓 一合 鹽豉 一合 入栝樓中和 灶下黃土 一分	賦粉 一分



右為末入麝香一字拌勻每用少許油調塗之濕者 乾摻	淡鼓散治如前 淡鼓炒黑 絳礬各一 賦粉二錢	右上一味先末入粉研勻先以桑柴灰淋汁熱洗瘡 淨用甘草末摻瘡上後以生油調藥塗之濕者乾摻	黃連散治如前	黃連去須 胡粉一兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末先洗去瘡痂拭乾傅之即差再發用前	胡粉膏治頭瘡久不差經隔年歲	松脂 苦參 黃連去須 大黃生 胡粉各一兩	黃芩 水銀各一兩 白礬半兩 蛇床子三分	右為細末以臘月猪脂和研至不見水銀星為度傅 之	又方治頭瘡久不差	賦粉少 胡桃和皮燈上燒過存性



右為細末以生油調塗仍剃去瘡上髮塗之只一二
次差

又方治如前 以上塵和油脚塗之仍先用皂莢湯洗
訖塗藥 以馬骨燒灰研末醋和傅之 以虎脂焯
令凝塗之日三四次 以蓼末蜜和塗之有虫出而
愈不作

又以鷄卵七枚去白皮於銅器內熬和油塗之亦治乾
禿不出汁者 以鷄卵壳燒灰研末猪脂和傅之

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

又以鷄屎研末傅之 以醋少許和淨水洗去瘡痂再
以溫水洗之挹乾用百草霜入輕粉研細用少許生
油調塗 以兔絲煎湯洗之 以竹葉燒灰研細猪
脂和塗 以黑豆炒烟盡杵為末入膩粉研勻細生
油調塗之

治頭瘡出膿水不差差而復發

以杏仁一百枚燒灰入膩粉一分同研勻細生油調
塗



治頭瘡漸引不較

以烏油麻嚼爛塗之亦治浸淫瘡及乾瘡

治頭上惡瘡以黃泥裹豆豉煨熟放冷取豉研末以純

菜油調傅上

軟癰

小兒頭上生軟癰者由風邪冷熱之氣客於皮膚搏於
血氣壅滯經絡蘊結而生亦如身上生癰無異但生在
頭上始則赤腫而硬其邪微者散則自消其邪甚者腫

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

赤內搖潰濃血作痛以頭上皮緊至熟多不能去膿根
中有惡汁不盡因而復發或在根邊別生連續不差常
常快膿故名曰軟癰

如聖膏治軟癰

菜油

兩^一黃臘^半

兩^半歷青

錢^一

黃丹

錢^半

羊筒骨內髓

筒^一

右一處熬成膏於紙上攤貼患處上用冷鐵一片於
瘡口上壓定四面針破如濃出不快以紙撚任之熬
藥不得犯銅鐵器



又方以青澁柿子連皮薄切焙乾杵為細末每用時先
以溫湯洗捻去其膿血用藥少許入輕粉三分之一
拌勻以薄薄牛皮膠水調成膏攤熟帛子上貼之愈
又以炒油麻銚子中取乘熱嚼爛傅之
以生油餅劑子一箇捻薄留一竅於癰上貼來日膿
自出便較屢驗
又以兔毛皮不拘多少燒灰研細入膩粉少許生油調
塗

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

又方用枳殼去穰週圍用糊合於瘡上去膿生肌即愈
極效

治頭皮虛腫如烝餅裏水之狀以口嚼麥麵傅之

禿瘡

小兒頭有禿瘡者按九蟲論云是蟻蟲動作與風邪相
乘上于頭之皮膚搏於血氣傷其榮衛而所生也榮為
血受病則為赤禿衛為氣受病則為白禿榮在內邪稍
難干故患赤禿者少衛在外邪易得著故患白禿者最



多其始生如癬之斑點上有皮屑漸漸作痂以成其瘡 遂至滿頭髮落逮盡若刮去其痂則瘡皆是孔眼大小 不等如蟲之窠有膿汁出不痛而痒痒乃不可憐是知 有蟲為風也又一種俗呼為鬼舐頭小兒有頭瘡遇夜 被鬼舐之則引及滿頭有赤痂或云便赤禿也	治小兒白禿頭上團團然以蒜搯白處早晚拭之	治小兒白禿乾殼不出汁	以鷄子七枚去白皮銅器中熬和油塗之	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治小兒白禿以葶藶子杵末湯洗去痂塗之	以陳香薷煮濃汁少許同脂和胡粉傳之	以白頭翁根杵爛傳一宿已作瘡者二十日愈	以榆白皮杵末醋和塗蟲當出 以鷄窠中草和白	頭翁花一處燒灰研細用臘月猪脂和勻先用醋泔	洗瘡後傳之	又以椿楸桃三般葉心取汁傳之大效一方只用楸葉	杵汁傳以人屎燒灰末之用臘月猪脂和傳



治赤禿以白馬蹄燒灰細研臘月猪脂和傳以靛滓傳之	治鬼舐頭以兒糞臈猪脂和傳以臘月猪屎燒灰末傳以屎燒灰研細和臘月猪脂塗傳	耳中諸病論	耳聾	小兒有忽患耳聾沉聽者由風邪乘於手太陽之經也邪隨其經入於耳內邪正相搏氣停塞滯則令耳聾不	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	能聰聽於音聲也輕者則為沉聽謂耳中沉沉然輕小之音則不辨重大之聲纔聞也	通鳴散治風邪惡入耳令兒耳聾	葛蒲 一寸九節者良 遠志 甘草水煮去心各一兩 柴胡 去苗 麥門冬 去心	防風 去蘆並叉枝各半兩 細辛 去苗 甜葶藶 炒 磁石 火煨醋淬十次研各一分	杏仁 十四箇湯浸去皮尖雙仁者炒黃	右為細末每服半錢煎葱白湯調下乳食後日二三服



烏麝湯治如前	大川烏頭	一箇重二錢上者以猪脂油煎令烈不得削了面上塊子只刮去皮盡切碎杵
羅為通草	半兩薄切作片子片子相似以糯米粉作稀糊拌勻焙乾杵羅為末	
右二味入麝香末少許研勻每服一錢水一小盞入	薄荷二葉棗一枚煎數沸放溫服或只以溫酒調服	
葛蒲圓治如前	葛蒲 一寸 巴豆 一粒去皮心	
右二物合杵為劑分作七丸用一粒綿裹塞耳中一日一易	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方
又方	葛蒲 末一分 杏仁 半兩湯浸去皮尖雙仁者	
右二物合杵如泥每服用一麻子許綿子裹內耳中一日一易	葶麻膏治如前	
葶麻子 十枚 去皮棗肉 七枚		
右同研為膏每用麤核許綿裹內耳一日一易		
治新久耳聾		



以巴豆一粒蠟裹針刺令通透塞耳中 以貓兒捉住老鼠奪之取其鼠膽汁灌病耳中一云只以鼠膽用之亦可 以地龍一條鹽少許俱貯葱筒中時動搖則化為水用點耳中 以米醋一碗用鐵一塊彈子大燒赤投醋中令病耳就上使氣薰入耳中即效 三二日可治
又以葱白於灰火中煨令熟將葱白頭內耳中一日三易 以芥子杵爛人乳汁和綿裹內耳中一日一易
欽定四庫全書 小兒衛生總微論方
以荊子中蚰蟲白粉和油滴耳中日二亦治沉聽新聾耳 以驢脂和生椒杵爛作丸綿裹塞耳中治久聾耳
又以醇醋微火煎附子至軟削令尖塞耳中
耳中鳴痛
小兒有耳中或鳴或痛者由風邪入耳與正氣相干搏於血氣者即為鳴搏於經絡者即為痛也
治耳中痛



龍朱散	龍腦	一字	朱砂	一錢	研	竹箭幹內	蚰蟲糞	三錢	研
諸病悉皆主之									
治耳內腫及生瘡出膿汁或只痒痛虛鳴應耳中一切									
正氣亦為濃汁俱名停耳又名膿耳也									
津液結漬變為膿血汁出又有因水或眼淚入耳停搏									
邪正相干搏於氣血傷於經絡輕則為腫重則生瘡若									
小兒有耳中腫或生瘡出膿汁者由風濕相乘入於耳									
耳中腫瘡出膿汁									
以生地黃截塞病耳數數易之或以紙裹微煨用									
夜用旦易不過三日愈及治耳痒無即用乾者									
治耳中常鳴									
以生烏頭纔掇得乘濕削如棗核塞耳中旦用夜易									
治耳鳴如流水或如風聲									
三升蒸熱包裹以耳枕之冷即易亦治洪洪聲									
以乾百合為末溫水調下一錢乳後以柳樹蚰蟲									
糞水化取汁調白礬末少許滴耳中為妙以鹽二									
欽定四庫全書									
小兒衛生總微論方									



坯子臘脂 半錢 麝香 一字	右勻研細末以幹耳子挑藥入病耳中如有濃水者 先以新綿撚子纏之淨盡方傾入藥每夜臨卧時一 次	治耳中腫或生瘡	以白礬燒灰研細每用少許以葦筒吹耳內日三四 次或以綿裹塞耳中生瘡者胡桃油調藥著耳	治小兒聾耳內生瘡或有膿汁	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	礬香散 白礬 一兩 燒灰蛇床子 一分 為末	右相和入麝香末五分同研細每用一字摻入病耳	藍花散治如前	紅藍花 一兩 焙乾黃蘗 一兩 剉烏魚骨 半兩 黃芩 半兩 已上為末	雄黃 半兩 水飛麝香 一分 研	右拌勻每用少許以新綿子纏撚子搵藥塞耳中一 日二易	麝香散治如前



蜘蛛 一 罇子 半 臘脂 錢 麝香 半字	右嚙極乾研勻細每用半幹耳許以鵝毛管吹入耳	桃紅散治如前	白礬 一錢 燒灰 一錢 罇子 一錢 臘脂 一錢 麝香 一字	右研勻細每用少許以綿撚子振耳中膿盡搽藥入	耳內	箭艸散治如前	箭竹內蛀蟲糞屑 二錢 罇子 二錢 臘脂 二錢 凌霄花 乾者二錢	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	海螵蛸 二錢 麝香 一字 後入	右為細末拌勻每用時先以綿撚子振耳中膿盡乃	以紙撚蘸藥入耳中日三	紅綿散治如前	信砒 一錢 罇子 三錢 臘脂 三錢 麝香 一字	右為末拌勻以柳絮滾和勻每用黃米許搽入耳中	如遠耳生瘡膿汁不差者依此傳瘡上紙片封之妙	油引散治如前



石鷺子 雌雄一對用磚壘一地 號丹 飛等分	膩粉 麝香 各少許	右同研勻先以綿撚子振耳中膿汁盡時側卧搽藥一字許入耳中以好酒一滴引下立效	綿裹散治如前	桂心 一分 青羊屎 一分炒令轉色	右同末每用一字綿裹塞耳中	治小兒停耳膿汁出	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	以琉黃細研每用少許摻入耳中日一次夜一次	以白礬末一錢麝香一字研勻少少摻入耳	以桑木上毒蜂房炙黃杵末溫酒調下半錢空心	以蚯蚓糞研細吹耳中極效	治小兒耳上生瘡 以鷄子白傅之	眼目病論	小兒眼目生病者多因恣食甘酸藏生邪熱熏炙肝經衝發於目或為赤腫痒痛或眵淚隱澁或生赤脉或生



腎膜又痰飲毒氣漬肝致臟氣不得宣通者則精華不得明審故黑睛雖全而視物眊眊此名睛盲若晝日明至暝不見物者此邪干經之陰也謂之雀目言如鳥雀之目暝時無所見也又有障眼者乃氣毒障縵其睛也又有疳肝之氣衝於目者亦能生其腎膜以為遮障也
博金散治眼赤腫痛不可忍
白藥子 半兩 黃芩 一錢半
右為末每用一字沸湯點洗之
欽定四庫全書
小兒衛生總微論方
又方治如前
右取嫩槐芽或嫩葉煎湯放溫洗之白睛如血淚多者最宜用
又方治如前治赤眼腫痛纔覺便截
右以銅綠研細抄二錢半用乳香皂子大二塊同研勻極細點之立效
又方治赤目
右以黃芩為末煎湯灑脚神效



又方治如前	天南星 一分去皮 乾蝎 一分半	右為末每用一字茶調下服了搖頭數次立驗	又方洗熱毒眼	右以細朴硝沸湯浸澄去滓乘熱洗之	又方洗風毒熱赤	銅碌 一錢 滑石 二錢	右研極細每用少許沸湯點洗	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	洗心散治心藏邪熱目赤腫痛	大黃 一兩 荆芥穗 一兩 甘草 半兩 麻黃 一兩去節	右為細末每服半錢或一字蜜水調下	洗肝散治三焦壅熱眼目赤腫隱澁多淚	芍藥 一分 羌活 去蘆 防風 去蘆并叉 大黃 半 甘草 半	右為細末嬰小一字二三歲半錢上者一錢水半盞	入燈心黑豆各少許煎數沸食後放冷服須銀石沙	銚中煎仍與四順散間服并用清涼膏貼太陽穴



四順散 當歸 去蘆 洗焙 芍藥 大黃 紙裏 煨 甘草 炙各 等分	右為末每服一錢水一盞煎至半盞去渣溫服更量 大小加減無時	清涼膏治眼赤腫痛貼太陽穴	右須立秋日已後取芙蓉葉陰乾為末每一字或半	錢井花水調貼太陽穴	地黃散治壅熱目赤腫疼或赤脉白膜四邊散漫者猶	為易治若遮黑睛多致失明宜用此	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	生乾地黃 切焙 稱 熟乾地黃 切焙 稱 當歸 去蘆焙 稱 各等分	黃連 去須 處剉 大黃 去皮取實 處剉 防風 去蘆并 義枝 稱 羌活 去蘆	生犀屑 蟬壳 去土 沙苑蒺藜 炒去 刺 木賊	穀精草 去根 白蒺藜 炒去 刺 各一錢 玄參 去芦 半錢 木通	甘草 剉炒各 一錢半	右為細末每服一字或五分煮羊肝湯調下日三乳	食後	玄精石散治眼生赤脉



玄精石一兩 甘草半兩	右為細末每服半錢竹葉湯調下	羌菊散治眼生浮翳障膜	羌活去蘆一分 菊花揀淨半兩 防風去蘆并叉枝一分	山梔子去殼一分炒 甘草一分炒 白蒺藜炒去刺半兩	右為末每服半錢或一錢蜜湯調日三與決明丸間	服	決明圓	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	決明子揀淨 車前子 菊花揀淨 川芎 宣連	當歸去蘆洗淨各一分 大黃 黃芩各半	右為細末煉蜜和丸麻子大每五歲下三五丸上者	七八丸煎桑枝湯或麥門冬湯送下	又方治目生黑花浮翳澁痛	右以貝子一兩燒灰研極細入龍腦末少許點之	又方凡小兒數歲眼中生膚翳未堅者不可妄用但以	珊瑚研如粉每日少少點之三日見效



鎮肝散治痰熱眼生翳膜	胡黃連 梔子仁 各一兩 甘草 微炒 馬牙硝	青箱子 已上各半兩 真珠 一分 牛黃 別研一分	右為末拌勻每服一錢水八分入荊芥薄荷各少許	煎至半盞去滓溫服食後	又方治目睛上生白膜	右以白礬一分水四合於熱銅器中煎取半合下白	蜜調之用綿摠過每用芥子許點之日三	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	又方治翳膜重厚	右以猪膽白皮曝乾合作小繩如麤釵股大燒作灰	放冷研細點翳上三五度差	真珠膏治眼眵不見物睛盲者	真珠末 一分 甘菊花 揀淨一分 香豉 一分 井泉石 一分	右為末拌勻用白蜜一合鯉魚膽一枚同藥於石銀	器中慢火熬成膏次入好龍腦末一錢攪勻每少許	時時點之



又方治目盲

右以猪膽一枚取汁微火上煎之可圓黍米大或

芥心大每用一丸內眼中食頃

又方治睛盲神法也如用之視物如鷹鵠有奇效

右於正月八日二月八日三月六日四月四日五月

五日六月二日七月七日八月二十日九月十二日

十一月二日十二月晦日每遇上件神日用桑柴灰

一合煎湯於磁器中澄令極清稍熱洗之如覺冷即

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

重湯煮令得所不住手沃之如遇上件神日不得不

洗此神日本法也

復明散治雀目至瞑不見物

蒼朮

二兩米泔浸
去皮切焙乾

穀精草

一兩

地膚子

半兩

決明子

半兩

黃芩

半兩

右為細末每服一錢水八分入荊芥少許煎至五分

去滓溫服食後

又方治如前



右以黃蠟不拘多少器內熔成汁取下入蛤粉相和
得所團成毬子每用以刀子切下一二錢許以猪肝
一二兩批開摻藥在內麻縷扎水一碗銚內煮熟乘
熱氣熏眼至溫時并肝食之神效日二服
又方治如前
右以豆豉於新瓦上炒令黃色入雄黃半兩同研為
細末每用藥一錢獐猪肝一片批開摻藥裹合陳米
飲煮熟與食之

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

又方治如前

右以石膏為細末每用一錢猪肝一片薄批摻藥在
中麻縷纏定入砂瓶中煮熟切作塊子與食此方治
諸藥不效者服之如神

千金僊術散治氣障眼又治肝熱目赤生病

蒼朮

四兩米泔浸七日逐日換泔至日足取出刮
去黑皮細切入青鹽一兩同炒色黃去鹽

木賊

二兩童子小便浸一宿水淘
淨焙乾一方又有甘草一兩

右二味同為細末每用米飲調下一錢服之甚效



四仁膏治毒氣障眼亦治疳眼	桃仁四箇去皮尖杏仁四箇去皮尖薤仁五箇去皮尖	郁李仁五箇去皮尖燕薹五箇取內海螵蛸取中心末半錢	北亭關豆大一塊小碾砂是也	右於乳鉢內研極細將白蜜看多少攪勻絹或綿濾	過別入龍腦細末輕粉細末各少許點之	治小兒雀目	以夜明沙炒過為末猪膽汁和丸菴豆大每服十丸	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	米飲下	井泉石散治疳熱攻眼生障腎致損睛腫	井泉石一兩決明石半兩甘菊花揀淨半兩夜明沙半兩微炒	黃連去鬚半兩晚蠶沙半兩微炒	右為細末每用一錢米泔一盞入猪肝少許煎至肝	爛熟為度放溫時服	又方治疳眼	右以烏鰂魚骨牡蠣各等分研為細末糊丸皂子大



每用一丸用猪肝一葉同藥入清米泔煮至肝熟為
度和肝食之汁送下

目病別論

小兒有腦熱注目則臉澁常閉不開又有諸物因入眼
眯之不出又有悞被諸物衝觸傷損目睛者叙方于後
治腦熱注目常閉不開

右以大黃一分麤剉以水三合浸一宿一歲兒每日
分半合餘塗頂上乾即更塗兒大以意加服

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

治悞飛麥芒入目不出

右用新布覆目上持蟬螬於布上摩之其芒出著布
上甚良

又方治諸物入眼眯之不出

右用好墨清水研汁銅筋點之即出

又方治悞被諸物衝觸傷目

右以牛尿點之日二仍避其風雖黑睛破損亦愈

鼻中病論



肺氣通於鼻氣不和謂風冷所乘停滯鼻中搏於津液
 使涕凝結壅氣不通快不聞臭香謂之鼻塞若風冷搏
 於血氣而生息肉塞滯者謂之鼈鼻若風濕相搏則鼻
 内生瘡而有膿汁出也若腦熱攻鼻中乾燥或生瘡痂
 鞭而無膿汁也

辛夷散治鼻塞

辛夷葉 一兩洗焙乾 細辛 去苗半兩 木通 半兩 白芷 半兩

木香 半兩已上為末 杏仁 一分湯浸去皮尖研後入

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

右為末拌勻用羊髓猪脂各二兩同諸藥於石銀器
 內慢火熬成膏赤黃色入腦麝各少許攪勻放冷每
 用少許塗在鼻中乳下兒因母吹著顙子鼻塞者只
 塗顙上

菊花散治鼻塞涕濁

甘菊花 揀淨 防風 去蘆并叉枝 前胡 去蘆各一兩 細辛 去苗

桂心 各半兩 甘草 炙一分

右為末每服半錢入乳香少許煎荊芥湯調下食後



服	痰藟子散治鼻塞不聞香臭水出不止	右以痰藟子半掬為細末以水一小盞煎至減半令	患人仰卧滿含飯一口以藥汁灌鼻中不過再即嚏	病出兒大者有此病小者未有	治鼻中生瘡有膿	右取黑牛耳中垢先撮鼻中膿盡傳之	犀角升麻散治腦熱攻鼻燥燂生瘡鼻中乾鞭	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	犀角屑 一兩 馬牙硝 半兩 川升麻 半兩 黃連 去鬚半兩為末	朱砂 研飛半兩 牛黃 一分 龍腦 一分	右拌勻細每服半錢溫蜜湯調下	清柿膏治鼈鼻不聞香臭出氣不快或生瘰肉	瓜蒂 半兩 赤小豆 一分 細辛 去苗一分 甘草 一分	附子 一箇炮去皮臍	右為細末入龍腦少許拌勻煉蜜和丸皂子大綿裹	納鼻中



又方治翳鼻有宿肉出氣不快不聞香臭	出	面上瘡論	小兒面上忽遇有經絡虛隙為風濕寒熱所乘搏於氣血則生其瘡或如火燒或出膿或出黃水日久不能痊差今叙方於後	治面上生瘡如火燒	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右以赤薜荔葉杵末生油調傅一名山喬麥	又方治如前	右以黃梁米一升杵末蜜水和傅以差為度	又方治面上生瘡出膿汁	右蛇蛻皮炙焦為末和猪脂傅上	又方治面瘡出黃水	右以鯽魚頭燒灰研末和醬清汁傅上一日易	又方治面生諸般瘡



右以兔絲湯洗之

又方以大麥燒存性為末生油膩粉調塗神妙大麥只炒黑焦亦得

又方治面瘡出黃水

豆豉一合炒黃蘗一兩

右為細末每用先以熱灰汁洗瘡淨拭乾傅之亦治身生如此瘡

又方治面瘡赤腫焮痛

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

以地榆八兩細剉水一斗煮至五升去滓適寒溫洗之

唇口病論

風毒濕熱隨其虛處所著搏於血氣則生瘡瘍若發於唇上生瘡乍差乍發謂之緊唇又曰審唇其發頻者唇常腫大麤厚或上有瘡不較甚者以至唇腭若發於唇裏連兩頰生瘡者名曰口瘡若發於口吻兩角生瘡者名曰驚口俗云因乳食看視燕子則生驚口瘡也並叙



方于後	葵根散治緊唇	葵根 一兩 燒灰 半兩 烏蛇 半兩 燒灰 半兩 黃蘗 半兩 為末 半兩 鱉甲 半兩 燒灰 半兩	右為末每用半錢猪脂少許和塗唇上時時用	青液散治赤口瘡	以青黛一錢研末入腦子少許拌勻少少傳上	治小兒及老人虛人口瘡咽痛	吳茱萸 去枝梗 地龍 去土等分	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為末米醋入生麵調塗足心	治小兒口傍瘡久不軟	亂髮 燒灰 故絮灰黃連 去鬚土 乾姜 各等分	右為末每少許用傳上不過三次愈	治小兒緊唇	右以馬芥汁 即大刺芥是也 先刺唇血出以汁傳之日七次	治小兒熱口瘡	以故錦燒灰研末傳瘡上



治小兒諸口瘡	以五月五日蝦蟇炙燥為末傅瘡上兼治蓐瘡	治小兒唇口邊肥瘡	白礬 一兩 燒灰蛇床子 一兩 為末	右為末乾摻瘡上立效亦治耳瘡頭瘡癩瘡	綠雲散治如前	黃蘗 半錢 螺青 二錢	右同研勻細每服一字或半錢摻患處	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	又方治口中赤爛	右取牯羊生乳含之	又方治白口瘡	右以黃丹一兩入龍腦少許研勻蜜和調傅瘡上	又方治口中瘡通白者或白漫漫然亦治疳蝕	右以白殭蠶炒黃色拭去毛盡為末蜜和傅之立效	或以父髮拭口中淨桑汁塗	又方治諸口瘡



右以大天南星去皮只取中心龍眼大一塊為細末醋調塗脚心	又方治如前	右以香白芷銅綠等分為末摻上立效	又方治如前	右以湯瓶內減為末臨卧時以好醋調於脚心底明書箇十字立驗	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	各等分	檳榔 銅綠 貝母	右為細末如患乾口瘡生蜜調掃之若患濕口瘡乾	摻	血餘散治驚口瘡吻兩角生	右以亂髮燒灰研細和猪脂傳之	又方治如前	右以白錫燒灰傳之	牙齒病論



小兒牙齒病者由風熱邪毒干於手太陽之經隨經入於斷齲搏於血氣則生宣爛又云因恣食酸甘肥膩油麵諸物致有細粘漬著牙根久不刷摻去之亦發為疳宣爛斷作臭氣惡血若風濕相搏則為牙癰如風毒入於牙中與正氣交爭則為風痛有蟲動齧齒則為虫病更有一証疳蝕口鼻牙齒者名曰走馬疳別具疳瘡門之下收之外叙方于後 治牙齒宣爛臭氣有血	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	皂角 一挺肥好者連皮 羊脰骨 一鈹	右並於炭火燒烟盡以盆覆之候冷用紙一張鋪濕地上頓藥出火毒一夜為末如常揩牙用之三上差 又方治如前	蕪荑 半兩 白礬 半兩 炒黑生	右為細末入麝香少許拌勻先以水漱口齒淨然後用少許揩牙	又方治如前



右以風化石灰一塊大火中煨通赤取出放冷為末 每用少許旋入麝香少許傅牙根瘡上	桃紅散治牙癰腫爛膿血 朱砂 一錢 研 葶豆粉 一兩 研 砂 半錢 腦麝 各一字	右為末每用一字傅患處或揩貼之	麝香散治如前 銅綠 半錢 葶豆粉 一兩 膽礬 半錢 火 半錢 腦子 一字	右為末入麝少許研勻每服一字擦貼患處有涎即	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	吐 甘露散治小兒胃熱牙斷宣露出血口臭臉腫赤眼口 瘡不欲乳食肌體煩熱及瘡疹已未發皆可服	熟乾地黄 生乾地黄 天門冬 去心 麥門冬 去心 枇杷葉 刷去毛 枳殼 去穰 苦參 石斛 去根 山茵陳	甘草 各等分	右為末每服二錢水一盞煎至半盞去滓溫服食後 量大小加減



治小兒牙宣常有鮮血斷縫臭穢	砒黃 錢一麝香半錢	右同研細以紙條子生油塗過摻藥在上少少用末煎作小紙碁子看大小用插在病處縫內	治小兒牙齒宣疳	以黃連為末入麝研勻貼病處亦治口瘡	治風虫牙疼	右以馬鞭草煎湯含漱之	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	又方治如前	莽草 升麻 細辛 去苗 甘草 各一分	右麝剉水一碗煎數沸鹽漱之冷即吐別含漱	藁本散治如前	藁本 去蘆 白附子 川芎 莽草 各半兩先為末 青黛 錢一	盧會 錢一麝香一字並各研	右拌勻細每服一字或半字搯患處	又方治如前



右以肥皂一箇去子滿填鹽在內炭火燒烟盡放冷
研細每用一字或半錢揩患處有涎即吐

舌病論

小兒舌上偶生瘡腫者由風毒邪熱搏於血氣隨其虛
處著而生病也發於舌上紫腫者名曰紫舌脹若腫龕
大木悶而鞭者名曰木舌脹若風濕相搏而生瘡者名
曰舌瘡若風多而舌腫如吹胞者名曰鼓舌其紫舌木
舌鼓舌腫甚者則滿口溢出塞閉氣門皆能殺人

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

治紫舌腫 右取羊乳飲之 又方治如前

右以新鯽魚薄起肉片子頓舌上數數易之

治舌上生瘡不能飲乳

右以白礬研末和鷄子置醋中塗兒足底一七愈

又方治如前

右以蒲黃傅之

又方以桑白皮汁塗乳上吮服

又方治如前



右以胡粉細研用猪筒骨中髓調傅之日三
治木舌腫鞭滿口逡巡氣閉則殺人

右以釜底煤和鹽等分以酒調表裡塗舌須臾即消
無酒亦得

又方治如前

川朴硝^半兩真紫雪^一分白鹽^半分

右和研勻細每用半錢入竹瀝三兩滴白湯少許調
塗舌上咽津不妨

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

治舌卒腫如吹胞滿溢出氣不得通無可治奈

右以半夏十枚湯洗去滑盡以苦酒一升煮取五合
稍稍含漱之不得咽津戟人咽喉加以生姜一兩同
煮亦得

又方煎甘草濃汁含之又方以糖醋滿口含之良

又方治紫舌木鼓腫滿閉氣諸藥不效當用此救

右以舌兩邊以指刮破或以鉞刀決破出其毒血慎
勿傷舌下中央脉也若血出不止已及數升者燒鐵



[illegible]

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷十九

咽喉病論

小兒咽喉生病者由風毒濕熱搏於氣血隨其經絡虛處所著則生其病若發於咽喉者或為喉痺或為纏喉風或為乳鵝重者或為馬喉痺又或懸癰腫或腮領腫或喉中生瘡一切諸病隨症具方于後

治喉痺腫悶

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

以露蜂房燒灰研細末每服一錢乳汁調服

以蛇蛻皮燒灰研細末每服一錢乳汁調服

以鯉魚二七枚和灶底土塗患處

以川升麻令含一片

以萐一把杵爛熬傳上冷即易

以白礬棊子大含之

以陳白梅一箇取肉裹白殭蠶一枚含咽津

以地龍一條研爛內鷄子白和勻便傾入喉中



以繩纏扎手大指屈於節上針挑刺出血即差	鐵粉散治如前	鐵葉粉 分一 鵬砂 分一 白礬 生半兩	右為末每服半錢冷水調下連二三服	蛇蛻散治如前	蛇蛻 分一 白梅肉 分一 牛蒡子 炒半兩 甘草 生一分	右為散每服一錢七綿裹湯浸少時含咽津汁小兒	吮之	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	又方治喉痺咽腫出氣不快	右以鼠粘子二兩炒焦甘草半兩炙黃同為細末每	服一錢新水調下更入蜜少許	又方治喉痺不能語	以大豆煎汁放冷含之以龜膽少許生姜薄荷汁化	服得吐便愈 青魚膽亦得收得以青黛釀之	治纏喉風束氣不通	蛇蛻 炙令焦黃 當歸 去蘆焙各等分



右為末溫酒調下半錢得吐良	又方治如前	草麻子 去皮 二箇 朴硝 二錢	右為末新水調下一錢未效再服	又方治如前	天南星 生 白殭蠶 生去絲嘴 各等分	右為末每服一字或半錢生姜自然汁調下	又方治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右以白殭蠶二箇去絲為末生姜自然汁調更入蜜少許拌勻分二三服或只用半錢一字旋調服之	定命散治纏喉乳鵝等病	川大黃 剉炒 黃連 去鬚 白殭蠶 直者炒 去絲嘴 甘草 生各半兩	五倍子 一分 膩粉 五箇	右為細末每用一字竹葦筒子吹入喉中如毒氣攻心肺喉中生瘡嚙飲不得者以男孩兒乳汁調藥一字鷄羽蘸之深探入喉中得吐者活不吐者死



又方治纏喉乳鵝喉痺咽喉領項腫悶閉塞氣不得通者	右令患人先呷好麻油少許後以□葉燒灰研細末水調下半錢立效大者增之	犀角散治馬喉痺其候如喉痺更加連咽項領頰腫甚咽喉閉塞但數數噴氣此症極惡	犀角屑 半兩 麝干 三分 桔梗 去蘆三分 馬蘭根 三分	甘草 半兩 川升麻 半兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為麤末每服一錢半水一盞入竹葉五片煎至六分去滓入馬牙硝半錢攪勻細細含嚥	又方治如前	右以馬嚼一具水二盞煎至半量大小分服	治懸癰暴腫妨悶	以乾姜半夏等分為末少少以飭點藥著上半夏以白礬湯洗數次去滑以礪砂半錢綿裹含之細細嚥	津



又方治懸癰忽倒

右以白礬灰鹽各半兩研細筋頭點上撥正亦治腫

悶日七八遍

治咽喉腮頰腫悶右以蒜塞耳鼻中

又方治如前

右以馬鞭草根截去兩頭取在中者搗汁服之

又方治如前

右以黃蘗寒水石等分為末量腫處以薄荷水調藥

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

用鷄羽掃上乾即再掃

綠雲散治喉痺馬喉纏喉鵝乳重舌木舌一切咽喉之疾

螺青 盆硝 生蒲黃 生甘草 各等分

右為細末每服一錢生姜自然汁調細細含咽若已

閉塞不通者用葦筒入藥吹入喉中重舌木舌生姜

汁調塗患處腫痛咽領者依此用之口瘡舌上生瘡

用此藥塗之最效李方叔閻孝忠皆以此方救人甚

多以磁合密封收貯



如聖湯治咽喉一切諸疾	甘草 二兩 桔梗 去蘆 一兩	右為麤末每服一大錢水一盞煎六分去滓溫服時	時呬	龍石散治如前并治口舌瘡腫	寒水石 煨通赤 一斤 朱砂 研飛 一分 腦子 研半 分	右為細末每用少許摻患處病在咽喉者吹入喉內	細細嚥津日五七次臨卧一兩次用妙	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	如聖圓治咽喉一切諸病	川大黃 一分 白礬 一分 馬屁勃 一分 蝸牛 十四箇	陳白梅肉 十分	右於五月五日午時取蝸牛以白梅肉同研爛入藥	和丸如練子大每用一丸綿裹含化嚥津若病重不	能開口即研藥作末葦筒吹入喉中滴水三兩點送	之或以淨水磨藥灌之立差	通關散治如前



枯白礬 雄黃水飛 藜蘆微炒 白殭蠶去絲嘴 猪牙皂角去皮	右各等分為細末每用一字鼻內搐之甚者葦筒吹入喉中涎出或血出立愈	治小兒咽喉腫痛塞悶	以桑上螳螂窠一兩燒灰馬屁勃半兩同研勻細煉蜜和丸桐子大三歲下煎犀角湯研下三圓大者加之	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治小兒飲乳不快覺似喉痺	以沙牛角燒刮取灰塗乳上吮兒嚥下即差	射干湯治如前咽喉一切諸病	射干 川升麻各一兩 馬牙硝 馬屁勃各半兩	右為末每服一錢水一盞煎至六分去滓溫服	金露膏治如前	寒水石煨通赤 雄黃一兩研 鵬砂二錢研	甘草末 腦子四錢一字研



右拌勻煉蜜和圓桐子大食後含化一圓	荊芥桔梗湯治喉中生瘡	荊芥穗 桔梗 去蘆 甘草 生 牛蒡子 炒各等分	右為細末每用一錢水一小盞煎至六分去滓溫服	之	又方治如前	桔梗 去蘆 甘草 生 牛蒡子 炒各一兩	右為麤末每用一錢水一小盞入青筍少許煎至六	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	分去滓放溫時時呷	又方治如前	右以葱鬚陰乾為末又別以膽礬為末並各自每用以	葱末二錢膽礬末一錢和勻以半字或一字葦筒吹	入喉中病處	項癭論	小兒項癭由啼怒未定遽以乳飲致氣逆不散留結而	生其狀在項壘壘然漸漸長大而分有瓣又云葛根在



地泉流浸之人因取其水以食飲則生項癭故近山居人多有之以葛生在山中故也

昆布圓治項癭

昆布 一兩洗 海藻 一兩洗 草龍膽 去蘆一兩 檳榔 半兩

甜葶藶 一兩隔紙炒 牽牛子 半兩炒

右為細末麵糊和圓黍米大每服十圓人參湯下

又方治或生項癭已及一二年

右以黃藥子半斤須萬州緊重者為上若輕虛者即

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

是別州所出力慢須用一倍取無灰酒一斗入藥固瓶口以糠火煨燒一伏時不可楹酒不可有灰待冷即開瓶令患者時時飲半合一合不可令絕酒氣經三五日看之覺消即止飲不爾便令兒項細也劉禹錫亦著效驗其驗如神唯燒酒候香氣出瓶頭有津出便止不必須待一伏時也仍禁喜怒但以線子逐日圍度乃知其效也

惡核癰癰論



小兒腑臟不和及遇項邊經絡虛隙為風熱毒氣所干 與血氣相搏於項邊結成核子復遇風寒所加則不消 不潰名曰惡核若更風溫相加搏於津液與腑臟相乘 則潰化膿血或瘡而復發或根傍別生以至數箇連續 不差名曰癰癰俗呼癰子此腑臟血氣內外相屬之病 也	皂角膏治項邊生核子不消	皂角 大者一挺 燒存性 糯米 一合炒 黑焦 草烏頭 二錢 生	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	黃皮 二錢炒 黑色	右為末量多少以井花水調貼核上未消與水晶丹	下之利過以觀音散補之仍再貼之即消	水晶丹	天南星 洗淨生為末 一分 滑石 生為末 二錢 水銀粉 稱半 錢	蕪荑 取仁一百片 巴荳 五十粒去 壳不去油	右先研巴豆極細次入蕪荑仁復研方入衆藥研勻 爛飯和圓黍米大每服三五圓量大小加減臨卧稍



饑葱白米湯送下利過忌生冷硬物仍以觀音散補之方已具前	如聖散治如前	綿黃耆一兩 連翹一兩 鴿糞半合 燒灰 川大黃半兩 剉	糯米半兩 斑貓七箇 犀角屑半兩 同炒米黃去班貓	右為細末每服一錢水八分入酒三四滴同煎至五分去渣放溫時時呷	紫檀散治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	紫檀香 木香 川朴硝研 卷栢各一兩 赤芍藥	川大黃各半兩	右為細末每服少許以鷄子白調稀稠得所塗患處取瘰癧內消	右以長三寸鯽魚一箇去腸以和皮巴豆填滿麻皮扎定以一束稗草燒烟盡取出放冷研為細末爛稠粥和圓黍米大每服一丸粟米飲下臨卧未利加一丸以利為度



又方治如前

右以斑猫一兩去翅足用粟米一升同炒至米焦去
米不用只以斑猫為細末入薄荷細末四兩拌勻烏
鷄子清和丸黍米大空心茶清下一丸一日加一丸
至五丸止一日却減至一丸以後每服五丸

胡麻圓治療癰

胡麻 四兩 羊躑躅 一兩
炒香 焙

右以為末煉蜜和丸麻子大每服七圓漸加至二十

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

一圓熟水下日二見效為度已破者更用黑母牛糞
燒灰研末傳之

治一切瘰癧經效方

右以牡礪火煨通赤取出濕地上紙襯出火毒一宿
每四兩用玄參三兩同為末麵糊和丸菴豆大早晚
食後酒下各下三十丸藥盡則病除根本

又方治療癰已破未破其效如神

右以如前煨過牡礪四兩用甘草二兩同為細末每



服一錢臈茶點服日二	治小兒瘰癧	以蝸牛殼一兩用牛乳半升銚子中慢火熬令乳盡 取蝸牛殼研如粉入大黃末一分更研勻每服半錢	皂莢子仁湯調下大小便中出惡物差	又方治如前	以白殭蠶去絲嘴炒過為末每服半錢溫水調下日	三	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	龜胃論	小兒有龜胃者因乳母有宿乳惡汁不捨去之仍以飼	兒忽遇風熱邪毒相干乘傷於肺經致肺氣滯停重壅	胃鬲骨漸高起狀如龜殼故曰龜胃	百合圓治小兒龜胃	百合 一兩 川朴 半兩 硝 半兩 杏仁 半兩 湯浸 去皮尖 木通 半兩	桑白皮 半兩 川大黃 半兩 天門冬 半兩 去心	右為細末煉蜜和圓黍米大每服十圓米飲下



又方治如前

右以龜尿摩擦胛骨取龜尿法以蓮葉內頓一物安

龜在上用鏡照之則尿自出流蓮葉以物盛用之甚佳

龜背論

小兒有龜背者由兒在嬰小時髑骨未成強令獨坐則

背隆阜而偶為風邪干襲與血氣相搏入骨髓壅滯不

散致背高隆起若龜殼之狀故曰龜背又名隆背若如

陀有峯塊起者是名駝背乃胎孕之病不可不治

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

松藥丹治兒龜背

松花一兩洗只殼麸炒去獨活去蘆防風去蘆并

川大黃半兩前胡去蘆麻黃去根節桂心半兩

右為細末煉蜜和丸黍米大每服十粒米飲下

又方治如前

右以龜尿摩背脊骨取尿法在前

手足拳攣論

小兒有手脚拳攣者由本氣不强筋骨力弱血氣不榮



而為風邪所乘搏於經絡則筋脉縮急骨本無力則手 拳而不能展用脚攣而不能伸舉也若生下便拳攣者 此胎孕中病不可治也		薏苡仁圓治手拳不能展開		薏苡仁 一兩湯浸洗淨去皮 當歸 去蘆一兩洗焙乾 秦艽 去苗一兩		防風 去蘆義枝一兩 羌活 去蘆一兩 酸棗仁 去皮一兩		右為細末煉蜜和丸鷄頭實大每服一圓麝香荊芥 湯化下兒大增之		欽定四庫全書 小兒衛生總微論方		海桐皮散治脚攣不能伸舉		海桐皮 去蘆洗淨焙乾 牡丹皮 去心熟乾 地黃		牛膝 去蘆酒浸焙乾各一兩 山茱萸 補骨脂 各半兩		右為細末每服一錢水八分入葱白二寸煎至五分 去滓溫服		風痲癰疹論		小兒風痲癰疹者小兒肥膚嫩血氣乘弱或因暖衣而 膝理疎開或天暄而汗津潤出忽為風邪所干搏於血	



防風去蘆 鼠粘子 荊芥穗 人參去蘆各一兩	防風湯治如前	右以白礬一兩二錢煖酒投化用馬尾搥塗之	又塗方治如前	鮮鮓醬毒物	處浴身體候有汗出即用藥湯淋洗洗畢避風忌海	葉枝莖細剉同煎至葉爛傾盆中先以尋常熱湯煖	右為麤末每用兩大匙水一桶取羊蹄菜一科連根	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	荊芥 細辛去苗 白芷 薄荷葉各等分	又洗方治如前	細末生姜蜜水調下一錢或半錢	服一錢或半錢溫酒調下若色赤者以灶下黃土研	右先看其色澤白者以牛膝酒浸一宿焙乾為末每	疹改赤赤紫發搔痒搔之不解甚者使人心神悶亂	其狀如生姜片輕者名曰風痲不至改色重者名曰癰 氣藏流於皮膚之間不能消散而成碣成□相連而生



甘草炙 天麻各半兩	右為細末每用一錢水八分入生姜薄荷各少許同煎至五分去滓溫服	治卒發風疹	右以石灰不拘多少和酸漿水調塗之隨手滅	治小兒癰疹若不治入腹即能殺人	以鹽湯洗了用蓼子搗爛傅之又以枳殼剉末煎湯	洗之又以蠶沙二盞水二碗煮一碗洗之	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	又方治如前	右以吳茱萸半升酒二升半煮取五合以綿蘸拭	三竒散治風痲癰疹遍身搗之不任痛痒	凌霄花 白扁豆 甘草各等分	右為細末每用一字或半錢蜜湯調服	又方治風痲癰疹心神迷悶	右以巴豆二兩槌破用水七升煮取三升綿蘸搗拭	之



麝犀丹治風疹不差甚者如癩服之神驗

犀角屑一兩 烏蛇肉半兩 天麻半兩 白附子半兩

白殭蠶半兩 朱砂一兩 龍腦 麝香各一錢

右拌勻煉蜜和圓黍米大每服十粒煎金銀薄荷湯

下

又方治風疹入腹身強舌乾亦能殺人

右以蔓青子為末溫酒調下一錢或半錢又以蠶沙

二盞水二碗煮一碗洗之

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

疥癬論

小兒血氣熱為風濕所干搏於血氣散於皮膚之間而

生疥癬又云蟻蟲作動內外相乘之所生也

雄黃膏治小兒遍身疥癬如粟痒而搔之膿血出

雄黃一兩 雌黃一兩 松脂一分

川烏頭一箇 亂髮一分

右以猪脂六兩於銚子中煎成油入烏頭松脂亂髮

煎至髮消盡以綿濾去麤入二黃末攪勻盛磁器中



候冷成膏每用少許塗擦瘡上日三亦治癬	又方名同治同	雄黃 錢末一 黃丹 錢一 膩粉 匣一 蠟塊 一 巴豆 十粒 葱 五根 錢末一 錢一 匣一 塊一 豆十粒 葱五根	右用油一兩入葱巴豆煎黑焦濾去滓入餘藥攪勻	候蠟熔取下磁器中盛放冷成膏每用抓破疥瘡塗	擦	碧粉散治如前	蛇床子 一兩 微炒狼毒 半兩 硫黃 半兩 青黛 半兩 一兩 微炒 半兩 半兩 半兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為末膩粉少許拌勻好油調塗擦神效	又方治如前	大腹子 二分 蛇床子 二分 硫黃 一分 二分 二分 一分	右為細末入輕粉少許好油調勻臨卧抓破擦疥上	及以藥少許塗手心脚心用手擦極熱甚者不過兩	次上	治癬新生	右以沙糖礪砂各一小塊同爛抓破塗之



又方治諸癬	右以蛇床子為末和猪脂為膏塗之	又方治濕癬	右以桃樹青皮為末和醋傳之	又方治圈而癬	右以羊蹄根乾生為末與白礬等分研細勻好醋調塗	又方治諸癬	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右以決明子為末入少水銀粉研勻以物擦破癬上塗之立差	又方治如前	斑猫 五箇去翅足微炒 鹽豉 四十九粒浴令潤 砂糖 皂子大一塊	右先研斑猫將細入二味同研成膏每用一大豆許唾津調塗上大效	又方治爛癬	黃連 去鬚 赤芍藥 等分



右為細末入輕粉少許嚼芝麻揉汁調藥先洗淨拭
乾以藥傅之不過數次而愈

治下練癰瘡常對在兩腳

右以白犬血塗之立差

治上練癰常在頭上

右以盧會一兩甘草半兩同為末先以溫漿水洗之
以帛子拭乾用藥傅之立乾便差甘草炙過用

又方治如前

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

右以大梔子不限多少燒存性為末好油調傅之

又方治疥癬因用硫黃砒霜藥病愈後臭毒之氣不歇
欲去之又以藁本煎湯浴之及用浣衣

金瘡論

小兒有誤被尖刀硬物傷其肌膚其輕淺者雖有血出
不至危殆其重深者有損傷於經脉血出不止又有因
傷中風者則口噤身強俗云破傷風也

治諸金瘡



檳榔 黃連 去鬚各一兩 木香 半兩	右為細末如治一切金兩所傷血出疼痛以末傅之 血定不痛不膿如斫下指來血未定速將藥裹便得 連接	又方治諸金兩所傷血出不止	檳榔 黃連 去鬚各一兩 石膏 各一兩 黃蘗 半兩	右以為細末隨多少摻傅瘡上血定便入水不妨	又方治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右以白芍藥為末貼傅即住	又方金瘡深者不可以藥速合則內潰傷肉	右但以黃丹滑石等研細末傅之	天蛾散治諸金瘡	右以晚蠶蛾不拘多少為細末摻傅傷上用絹帛封	裹隨手血止瘡合大妙	又方治如前	右以五倍子刷淨為末掩傷處血立止較即無痕



又方治如前

右磁石末燒氈灰甑帶燒灰千金方云石灰末若倉卒之間得一味傳之皆可

治破傷風口噤身強

右以天南星一箇防風二寸同為末先用童子小便洗瘡口後用藥傅之追出赤水是效

又方治如前

右以肉蓯蓉切作片子曬乾用一小盞子底上穿一

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

孔合著火燒藥如香烟從孔中出熏瘡口累驗

又方治如前

右以好鰾膠二錢火上炙焦為末熱湯調下分二服連服一方用一仰一合瓦內燒鰾至烟斷研細末熱酒調下汗出愈

又方治破傷風腰脊反張牙關噤急四支強直

右以鷄糞白半升大豆二升半和炒令變色乘熱用酒沃之微煮令豆味出量性飲之



追風散治破傷風	草烏頭四箇 二箇生用 二箇炮熟 椒二十八粒	右為末貼瘡上風毒自出	又方治如前	右以黑豆四十粒朱砂一字同研為末酒半盞調下	一字差	又方治如前	右以白麵鹽各一撮新水調塗瘡	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	又方治如前	右以蘇木剉煎濃汁灌瘡中十數盞不令絕候瘡中	黃水出是效	又方瘡口作白痴無血者殺人最急以雄雀直糞研	熱酒調下一字或半錢	又方治破傷風經驗	右以狗頂上毛燒灰貼瘡上	湯火傷論



小兒有偶被湯盪火燒成瘡者輕則初乃炮起破有黃水而為瘡也重則便皮破肉傷而為瘡也切不可使用冷物泥蜜之類塗之恐令熱氣不出伏留潰爛深傷經脉宜加慎之今叙方于後

麻子膏治湯火瘡經驗

大麻子

合

一 栢木白皮

一 兩

一 香白芷

一 兩

一 甘草

一 兩

生地黄

一 兩

右為麤末以猪脂八兩同藥熬色黃以綿濾去滓盛

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

磁器中成膏每用少許塗瘡上

又方以洗麵脚日曬乾炒焦黑研細好麻油調塗更解

熱毒以□葉燒灰研細油調塗之止痛無癰經驗以

水煮大豆汁塗之易差無癰

又方以醋和泥傅之孫光憲家婢抱一孩兒誤落炭火

上燒瘡便以醋和泥傅之較無癰痕

以栢子房曬乾通風處掛之要用時旋為末好油調鷄

翎掃上如鋪冰痛便止



以蛤蜊殼為細末油調塗之如水無癢

以小麥麵炒焦黑研如粉生麻油調塗鷄羽掃上大
妙又以風化石灰不拘多少銚子中炒黃色地上出
火毒畢研細末生麻油調塗凡傷至重愀痛不已敗
壞筋骨皮肉者皆治

又以捉一大活鼠先用銚子煎芝麻油一斤至熱旋打
死鼠候冷頓油內煎直至毛骨俱散濾去滓不用入
乳香末沒藥末各半兩攪勻上炭火熬成膏磁器盛

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

封繫定掘一坑深一尺許窖之候三月取出凡遇湯
火傷塗之立效亦治金瘡

小兒衛生總微論方卷十九



欽定四庫全書

子部
小兒衛生總微論方卷二十

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆 瑤

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣譚世緯



欽定四庫全書

小兒衛生總微論方卷二十

疳瘡論

小兒有諸疳瘡者由內有疳氣因而蟲動外被風毒所
干內外相乘搏於血氣蝕發之所作也若發於口鼻牙
齒者初則瘡小漸漸蝕大其蝕有緩急緩者名曰常疳
急者名曰走馬疳有至鼻口蝕爛牙齒脫落者若發於
緣身四支者只名疳瘡若發於陰物者名曰下疳皆不
甚痛但微痒而已不覺之間蝕以深大若不早治皆能
為害也

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

澤瀉散治疳蝕其鼻生瘡及鼻下赤爛

澤瀉 川鬱金

生

甘草

炙

山梔仁

炒各一分

右為細末每嬰小一字二三歲半錢五七歲一錢甘
草湯調下日二及用青金散傳之

青金散

銅青

白礬

生各一錢



右為末每少許傳瘡上	黃連散治如前	右先以米泔水洗瘡訖用黃連細末傳之日三四	盧會散治如前	右以盧會為末吹鼻中鼻下有瘡即傳	又方治如前	右以熊膽半分湯化塗患處	又方治如前	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	右以黑牛耳中垢傳瘡上	又方治如前	右以鯽魚膽滴鼻中連三五日甚效	石膽散治疳蝕口鼻生瘡赤爛	石膽 一兩 亂髮 燒灰 葭子 半兩 地龍 去土洗淨	右為細末入麝香半錢同研勻細每用一字貼瘡上	又方治疳瘡口齒蝕透	右以白殭蠶去絲嘴炒黃為末蜜和傳之



又方治疳蝕牙齒斷爛瘡潰	右以髮不拘多少燒作灰麝末少許同研細勻搽上	立効	龍骨散治走馬疳蝕口齒瘡爛	砒霜 字一 粉霜 錢半 龍骨 錢一 定粉 半一錢 蟾酥 字一	右先研砒細入龍骨研細方入諸藥入龍腦半字同	研勻細每用少許傳上	治小兒牙疳蝕斷肉潰血出	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	人中白	取法用一瓦盆盛衆人尿旬餘日至滿澄去其清取白脚暴乾稱半兩	麝香 錢半	右為細末入糯米飯研勻和劑搓細小短條子臨時	隨牙縫大小割在病處縫中甚効一方只用末傳之	治小兒走馬牙疳	右以雄黃不拘多少研細以連紙條子搽上撚作紙	燈上燒過入鉢中同麝香少許研細搽瘡上	治小兒走馬疳蝕牙斷損爛



以膽礬為末薄切蘿蔔作片子反覆搥末於火上炙
令乾研更入麝香研勻傳患處立安已驗

以五倍子中蚰末研細更於麝香拌勻先用漿水漱口

小兒未能漱者以帛子搥漿水挹之須令留漿水氣

以藥傳之若斷爛即病已深矣若小兒面上或骨節

上生赤瘡無頭如爛梨麝者即用此藥貼之一方用

五倍子燒存性為末傳之

又方以不蚰皂莢一鉗燒灰膽礬四錢為末鹽一彈子

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

大用紙包了黃泥固濟炭火煨青烟起為度頓冷地

上碗覆一宿出火毒三味同研勻細每用先以鹽湯

漱口了以藥於病處揩至痛復用鹽湯漱之妙

以楊花少許燒灰存性入麝研勻傳之

治小兒急疳蝕口鼻數日至盡欲死

以文蛤燒灰臘月猪脂和傳

治小兒疳蝕鼻爛

以膽礬一塊燒令烟盡研末摻病處一二日差



治小兒疳蝕口鼻作瘡黃瘦	石膽 一分 盧會 一分	右同研細末摻病處但頻用即爛肉自然成膿便生好肉亦不別損漸漸差愈	治小兒疳蝕鼻下兩道赤者名曰疳鼻	以黃連去鬚為末先以米疳洗淨用末傅之日三四	次	又方治如前	欽定四庫全書	石膽 一分 黃連 一分 去鬚末	右同研勻細生油調塗之	又方治如前	五倍子 三分 黃丹 一分 為末火飛	右同研勻細以綿裹貼病處或塗之亦得日四五次	治小兒疳蝕滿口徹鼻	麝香 一錢 蟾酥 三片 研末慢火煉焦黃色別研末	五靈脂 去砂石 蜜 半



右相和於銚子內慢火熔成膏每用先去却瘡上爛物後以藥塗之日夜四五次

治疔瘡 以胡粉熬八分猪脂和傅油亦得

又方 以蛆殼洗淨焙乾為末每用先以葱湯洗瘡拭乾用藥摻之以栗子嚼爛傅之

龍腦膏治走馬急疔蝕口鼻

龍腦字一麝香字一砒字一白欽字一

右為細末用獾猪膽汁調藥適稀稠以紙任子塗上

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

即差

又方治走馬急疔蝕口鼻數日間欲死

右以藍靛傅之令遍日十次夜四次取差

又方治走馬急疔蝕牙齒斷透損骨

右以天南星一箇當心取作坑子安雄黃一塊在內用麵裹燒之候雄黃作汁取出以盞子合在淨地上出火毒了即去麵裹研為細末入麝香少許勻之傅瘡上量多少用



熊膽膏治走馬急疳蝕口鼻牙齒	熊膽 半兩 研 蚺蛇膽 一分 研 盧會 一分 研 牛黃 一分 研	龍腦 一錢 研	右同末更入麝香末一錢拌勻以井花水一小盞攪	和藥勻入磁器中重湯慢火熬煮成膏每服一豆大	薄荷湯化下兼塗瘡上一方更有黃礬一分治緣身	疳瘡用少許塗之	蟾蜍散治走馬急疳蟲傷府藏上蝕口鼻牙齒赤爛	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	乾蟾 燒灰稱 半兩 葭苈子 半兩炒 微黑 白礬 半兩 生硫黃 一分 先末	熊膽 半兩 雄黃 一分 水飛 盧會 一分 麝香 一分 研	右拌勻細末每用一字煎荊芥湯調下及傳瘡鼻中	痒生瘡者以少許吹入鼻中日三	蘭覆散治走馬急疳蝕口齒惡血臭氣不喜所聞牙齒	脫落	黃連末 去鬚 三錢 銅綠 一錢 水銀 一錢用煮棗 肉 一箇同研 麝香 一字 研
右同勻細先淨漱口了以藥傳瘡上用生蘭香葉覆															



之蝕肉成坎者一傅肉生	三白散治走馬急疳蝕唇口牙齒臭爛逡巡狼狽者	砒霜 粉霜 二物先研細末 石灰 研細羅三次用各稱等分	右相合先左研千下却右轉研千下當極細膩如粉	每用以鷄羽尖撫少許掃瘡上其瘡便乾慎勿多用	恐毒入腹無令嚙津此藥兒小者難用	治疳瘡立効方	黃連 去鬚一分 膩粉 二筒 麝香 少許	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細末先含水洗瘡淨乾貼之	又方治如前	大糞內蛆 踏洗淨 蝦蟇 只用四脚 蜜陀僧	史君子 去殼	右各等分為末先以溫水洗瘡淨用藥摻貼之及以	滴水丸菴豆大煎史君子湯下五七圓	又方治急疳瘡	右以蚬蛇膽研細水調傅之



治下疳定効散

訶子

一兩
去核

好臘茶

一兩
膩粉

麝香

十
許

右同為末先用漢葱木賊川椒三味煎湯乘熱熏瘡
候通手洗潔令膿血淨將藥量多少傅之

又方治如前

右先以葑菜根打碎百沸湯泡洗瘡淨帛子搵乾用
蜜陀僧不以多少研細末入輕粉和勻乾摻傅之効

又方治如前

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

右以朝生暮老花一錢為末入膩粉十文同研極細
勻生油調塗仍先以葱椒湯洗瘡淨帛子搵乾然後
用藥忌酸辣鮓醬等毒物

癰癤論

小兒生癰癤者由六府不和風毒邪熱干於皮膚搏於
血氣入客經絡之間留結而生小而有頭者為癰大而
無頭者為癰初生則赤腫漸漸腫起外則皮薄而光內
則肉腐敗潰變而為膿無頭者須針刺破有頭者不必



刺也熟則捻去膿血得盡者隨即便差若膿血不盡瘡口合者雖時暫得差終須更發或根邊別生若邪毒入深附骨留結者則為附骨癰若出膿血復遇風冷所乘傳搏日久不差者則為疽瘡若外面皮膚雖合而毒氣入裏攻潰轉深只有瘡孔時出惡汁者此變癰瘡也	
右以甘草一兩剉各二寸長用水八分一碗將甘草	
蘸水文武火上炙至水盡為麤末別用水一碗煎至	
半碗放溫時時量性服取微利其毒自消未利再服	
欽定四庫全書	小兒衛生總微論方
又方治癰癤欲成未見其頭但腫痛不已	
官桂	陳皮 等分
右杵末水調傅腫處	
又方治如前	
右以大黃朴硝等分為末每用三錢入麴一錢新水	
調塗	
雄黃膏治癰癤纔發赤腫作痛使用龍角散忍冬散三	
方大妙	



雄黃半兩 研 水飛 天南星半兩 生末 寒水石兩 煨過一 黃丹一分	乳香半兩 研	右拌勻細蜜調成膏攤帛子上貼之	龍角散	地龍去土稱 一兩 荊芥穗一兩 甘草炙 一兩	角刺一兩 取紫色不枯者 淨洗 擗去骨只用皮	右為麤末每用一合水三盞酒一盞煎至二盞半去	滓再至二盞入研細乳香末一錢匙調勻量大小旋	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	旋與服五七歲兒半盞已下分二服日三神驗	忍冬散	忍冬草乾者 一兩 甘草節半兩 大黃生 半兩	右同為細末每用三錢匕水一大盞煎至七分調乳	香末半錢匕服如上法	又方治癰癤無頭要生	右以葵菜子一粒新汲水吞下即生頭破而膿出要	兩處破服二粒要破處即逐粒加之



又方治癰癤無頭	右以川山甲猪牙皂角去皮絃各一兩共炙焦黃為末每用一錢熱酒調下服藥畢其瘡便破甚妙仍以冬瓜藤為末傅瘡乾即水調傅之諸癰瘡皆可用	乳香膏貼癰癤	乳香 一兩 膩粉 半兩 松脂 半兩 蜜陀僧 半兩	生地黄汁 半兩	右拌勻先用一銚子煎好油四兩黃蠟二兩至熔熟	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	下諸藥攪勻入麝香細末一錢熬成膏取下磁器盛之審一宿每用看大小剪貼子攤藥在上貼之一日兩換	沉香散治癰癤	沉香 半兩 黃耆 半兩 白欽 一分 川朴硝 一分 川大黃 一分	甘草 一分	右為麝散每用一錢水一小盞入麝香少許煎至五分去滓溫服



又方治背上生癰癤凡瘡生背上者非善瘡也	右以多年烟熏壁土并黃蘗二味等分為細末生姜	自然汁調成膏攤紙上貼之更以茅香湯調下一錢	匕大妙	治附骨癰	右以槲皮燒末每服一錢匕已破者以蜣螂七枚和	大麥爛搗貼封之	治癰瘡久不差敗壞成蟲	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	大蝦蟇 一枚自死者 亂髮 一塊鷄子大 猪脂 一斤	右同煎之至消盡上二物時取下入鹽一合攪勻放	冷成膏每用先以龍骨研作粉圍瘡四面厚二分許	以膏藥着瘡中日二易有蟲出如髮出盡愈	又方治如前	右以白楊葉杵末傅之	又方治如前鷄舌香散	鷄舌香 木香 沉香 各一兩 麻黃 去根 海藻 洗去鹹味



大黃 炮各
半兩

右為麤散每用一大錢水一盞入竹瀝二三點煎至

五分去滓溫服兼煎適溫熱淋瀝其瘡

治癰疽癰瘡

餘治癰瘡方並在後

銅綠 濕生蟲

右同研細末每用芥子心許紙撚蘸藥任入瘡口

惡瘡論

小兒有緣身生諸惡瘡者由府藏有熱衝發於外外被

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

風濕所干內外相乘搏於血氣隨其經絡虛處停滯留

結而生或大或小或痒或痛破潰成瘡或膿或血或腐

或敗挾毒所作者久而不差皆曰惡瘡若毒行攻裡亦

皆能變癰瘡也

治兒身生小瘡作痒痛

宣連 去鬚
一兩 膩粉 一 白芨 一 蕪荑 去皮
半兩

右為細末先洗瘡淨拭乾生油調塗

治生大瘡作焮痛



黃丹	一兩 膩粉 一錢
右研勻細嚼杏仁取汁調傳	
治生瘡如火燒	
右以赤薜荔葉杵末油調塗之	
治肺毒風瘡如癩	
右以好桑葉洗淨蒸一宿日曬乾為末每服一錢溫水調下無時	
治惡瘡不識者	
欽定四庫全書	小兒衛生總微論方
右以蜣螂杵爛絞汁傳之亦治疔瘡	
治諸惡瘡	
右以黃牛蹄甲燒灰湏再三燒令極細末入麝香少許拌勻乾摻瘡上	
又方治如前	
右以地骨皮先刮取浮皮別收之次取浮皮下白皮如粉者為細末又以其下赤堅皮細剉共浮皮一處相和為麤末麤細各貯之每用一麤末一合煎濃汁	



乘熱洗瘡直候湯冷以軟帛拭乾用細末傅之每日洗傅一次取差	又方治如前	右炒豉焦至烟絕為細末傅之不過數次差	又方治如前	右以陳小麥半升不犯鐵器中炒黑色枯白礬灰半錢同為細末每用少許貼瘡上	又方治如前	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	黃蘗 厚者去 黃連 去 山梔子 去 甘草 各一兩	右各剉如豆大於沙石銚子內炒令烟絕如敷炭樣放冷研細入麝末一錢拌勻先以溫漿洗瘡去膿血	淨軟帛拭乾摻藥在瘡上以紙片子蓋了軟帛子包繫護之隔日再用不得入水昔衛州一老兵患瘡九年潰爛見骨得此藥効愈	治久惡瘡	右以骨內髓膩粉和為劑却入骨內泥裏火煨熟取



出先以鹽水洗瘡淨後乃傳之立効
追惡瘡膿血

右以巴豆二十粒槌碎用清麻油二兩煎至黑焦去
豆濾過入黃丹一兩以東引柳條數枝攪之煎成膏
每用以絹帛攤藥貼之以芟節燒灰傳之

治小兒魚臍瘡謂瘡形狀似魚臍也此亦惡瘡候
以蛇蛻皮炙焦黃一兩燒灰細研用鷄子清旋調少
許塗之

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

治小兒魚臍瘡

以寒食錫燒灰研末傳之以白蒿苳杵爛絞汁先以
針刺瘡四畔滴汁於瘡口上

治小兒風氣相搏身生瘡瘍

地龍去土一兩白殭蠶去嘴絲一兩川芎一兩甘草一兩用節

右為細末薄荷湯調下一錢或半錢

治惡瘡久不差肉黑爛膿色黑赤

右先以不灰木檳榔各一分為細末摻貼瘡上候肉



紅膿黃即用後木香散	木香 二錢 檳榔 一錢 黃連 去鬚四錢	右同為細末乾摻貼上用之必効	馬莧散治諸瘡久不差變癰瘡	馬齒莧 一兩 上生者 烏蛇肉 一兩 酒浸 一宿 焙乾 蒺藜子 半兩 去刺 炒	亂髮 半兩 燒灰 曲頭棘針 半兩 燒灰 緋帛子 半兩 燒灰	右為細末每量瘡大小用白酒調藥攤帛子上貼瘡	上	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	貼久癰瘡	白膠香 赤石脂 黃蘗 蜜陀僧 各半兩	右為細末乾貼瘡上	又方治諸癰瘡	右以蝸牛三箇磁合子內收入麝香少許蓋了火內燒過研為細末水和小圓子每用一圓內瘡中又方以牛膝末傅之妙	又方治如前



右以赤小豆黃連等分為末溫漿水入鹽洗瘡淨摻藥或只以白膠香末摻之亦効

烏金散治疔瘡癰出膿水痛不止諸藥無效者有蟲

右以羊羔兒骨不以多少入藏瓶內鹽泥固濟炭火燒合宜研細每用末五錢入麝末一錢雄黃末一錢同研拌勻時看瘡大小先以通手湯洗膿血淨口含洗之軟帛拭乾將藥滿填瘡口當次生肉三日外瘡合

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

浸淫瘡

小兒生浸淫瘡者由府有熱熏發皮膚復為風濕相持搏於血氣而其瘡初生碎小後有膿汁浸淫漸大膿汁著處便生故謂之浸淫瘡也又一証風毒濕瘡頗似浸淫瘡亦膿汁浸淫而生但膿痂遍周比浸淫瘡稍大爾治浸淫瘡痛不可忍發寒熱

右以刺薊為細末新水調傅瘡上乾則易之

雄黃膏治浸淫瘡經効



雄黃 一兩 研 水飛 雌黃 一兩 研 水飛 川烏頭 一箇 去皮 研為末	松脂 一分 研 亂髮 一分 燒灰	右以猪脂六兩於銚子內熬成油後入下三味煎至 髮消盡以綿濾去滓入二黃末攪勻盛磁器中成膏 每用少許塗瘡上日三次	又方治如前	右以蠟胭脂於燈下用鏡子照瘡口念咒曰浸淫瘡 好夜粧明鏡照紅粉粧每念一遍抹胭脂塗瘡上如	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	此七遍胭脂抹周遍其瘡即愈此法極驗甚者不過 再	苦瓠散治風毒濕瘡	乾苦瓠 一兩 蛇蛻 半兩 燒灰 露蜂房 半兩 微炙 樛	右為細末每用半錢生油調塗瘡多添之	四生散治惡瘡	綿黃耆 白附子 羌活 去蘆 各等分 蒺藜	右為細末每服一錢溫酒調下



標漿瘡論

小兒生標漿瘡者由風熱毒氣客於皮膚搏於血氣而
所生也始生如火燒湯盪作泡而起尋即皮破漂漿出
以成瘡亦甚疼痛漸引相續而生有至遍身潰爛皮肉
不可救者故又名爛瘡宜速治之又一証生瘡狹長如
魚臍黃水出四面亦標漿泡起此雖與標漿相似而有
少異標漿瘡者先起漿泡破而成瘡此瘡先乃生瘡後
即四面續生漿泡其狀狹長渾似魚臍故名曰魚臍瘡

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

標漿瘡即不似魚臍也

治標漿瘡神效屢驗

右以栢葉洗淨切碎細研傅之隨手便乾更取汁半
盞水解服之

又方 以桃仁去皮尖熟研和面脂傅之

又方治標瘡黃爛

右燒艾葉灰傅之一方燒馬骨灰傅之

生地黃膏治標瘡毒甚發引遍身



生地黄

去蘆
洗淨

川升麻

藍葉

梔子仁

大黃

各一兩

右研細以猪脂八兩同於鉢內慢火煎色變濾去滓
以磁合盛放冷成膏每用少許塗瘡上

治小兒面目緣身卒生皽泡

右以殺羊角燒灰研細末鷄子白和塗神驗卒無和

亦妙

治小兒皽漿如魚胞赤爛成瘡熱痛不可忍

右以磨家驢糞或塊結而不散者不以多少曬乾地

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

上堆定用手壘作屋狀以燈點着燒至欲過盆子合

殺令作黑灰勿令白研為末每用一錢和膩粉二錢

殘燈油調塗如冰除熱痛甚妙

治小兒皽漿瘡起如丁蓋發頭上一兩日後面上曾背

緣身皆生其瘡熱痛

朱砂

半兩研
水飛

胡粉

一兩
半

水銀

半兩

右一處研入水二三滴研至水銀無星用臘月猪脂三
兩於鉢內慢火熬熔去滓入藥末攪勻成膏磁合盛



放冷即用少許塗之

治緣身生火標瘡如麻豆有膿汁作痒痛一身盡徧

甘草 芍藥 白欽 黃芩 黃連 黃蘗 去麤皮

苦參 各等分

右為細末用蜜和傅之日二夜一亦可作麤散煎湯洗之

治小兒標爛瘡

以鐵燒赤淬水中二七遍浴洗以燒艾熱灰傅之又

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

以酒煎茱萸拭上又以桃仁杵爛和面脂傅又以赤小豆煮汁冷洗不過三次差

凍瘡論

小兒有凍瘡者多生於耳輪或脚上由冬月嚴寒之氣傷容於肌膚搏於血氣所作初即腫痒須漸破而成瘡頗難得差至春暖時自可到冬月冷時復發故名凍瘡黃蘗膏治凍瘡

黃蘗 末 白欽 末 各一兩 白芨 末 半兩 生芝麻 二合 杵爛取汁



右同研勻細以蒸蘿蔔一枚好酒一盞一處杵爛成膏每用少許先以童子小便洗瘡了後以藥塗又方以雀兒腦髓塗之立差

癩瘡論

小兒夏月多生癩瘡此由盛熱汗津出而腠理開被風熱毒氣干於血氣所生其狀細碎苦蕒如粟芥之類色赤而痒多生額頭曾背之上甚者徧身俗呼癩子痒而搔之亦能成瘡

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

治癩瘡

以免絲子莖接湯洗之亦治頭瘡及女人面瘡

治癩瘡痛不止

乾藕節末三兩生油麻合三

右先杵油麻爛后下藕節末更入生蜜和調得所塗之三五次差

龍腦散治癩瘡

龍腦研一分黃蘗末半兩白麵兩二臘茶研末一兩



右拌勻每以新綿搵藥撲上破者傳之取差	又方	右以蚌粉研細用雪水稀調臨卧塗之能以熱湯浴畢塗之更佳無雪水用新水	又方	右以雪水磨檀香鵝毛蘸掃上	漆瘡論	小兒有偶為漆傷者本不耐漆或因見聞或因使新漆器被漆氣所觸便著其毒而生腫赤狀似癰疹破而作瘡微有濃汁亦頗疼痛俗呼為漆咬瘡也	化毒散治漆瘡痒痛	木通 剉一兩 藍葉 半兩 麥門冬 半兩 犀角屑 一分	馬牙硝 一分 甘草 一分 微赤剉	右麤散每服一錢水一小盞煎至半盞去滓溫服	垂柳膏治如前	垂柳枝 五兩 苦參 二兩 黃芩 一兩



右剉散每用三匙水兩碗煎至一碗去滓研入好墨 汁半匙攪勻再熬成膏以磁合盛候冷用少許塗瘡 上	又方 以好麻油生用塗上以黃蘆朮剉碎煎濃汁放 冷淋之	月蝕瘡論	小兒有月蝕瘡者或生耳鼻或生手指隨月生死世云 月初生之時兒以手指月乃生其瘡故因以名之	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	治耳伴生月蝕瘡	右以黃連為末傅之	治手指生月蝕瘡或腫或破隨月生死	右以生薤一把苦酒中煮數沸熟出以傅之	治諸處月蝕瘡	右於月望夕取兔屎內蝦蟇腹中同燒研細傅之	又方治如前	右於五月五日取蝦蟇燒灰研細末和猪膏傅之



又方治如前

右取蛇蛻皮燒灰研末和猪脂傳

又方治如前亦治月蝕九竅皆有瘡

右燒蚯蚓糞研末和猪脂傳

治月蝕瘡生兩耳出膿水不止

水銀 胡粉 各一兩入水銀三兩
點研至水銀星盡 黃連 去鬚為末二兩

松脂 一兩
研末

右並同研勻細以粉瘡上若乾即用煉成猪脂和膏

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

傳仍先以鹽湯洗瘡淨拭乾塗藥一方只用胡粉和

土傳之

又方治耳後月蝕瘡

敗鼓皮 一兩
燒灰 蝦蟇 一枚
燒灰

右同研為末以煉成猪脂和膏塗之

蠼螋瘡論

小兒生蠼螋瘡者因居處屋壁之間有其蟲名曰蠼螋其形寸許脚甚多而細瘦其遊走之時偶遇人影則尿



之隨所尿著處人身則應而生瘡多在腰間初生赤小
瘡如黍粟麻豆荏苒不已長出濃汁成瘡因其蟲名
而名之也北方人便為浸淫瘡也未知的否今兩存具
之

治蠹蝮尿瘡

右取胡鷺巢中土水和傅之或以猪脂苦酒和傅

又方 右取白扁豆葉傅之最佳

又方治蠹蝮瘡繞身周匝則死一云繞腰腹

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

右取蒺藜葉擣傅之無葉用子

水毒論

小兒有諸般瘡瘍因洗面或洗手脚或澡浴等偶然水
入瘡中則發腫而疼痛名曰水毒宜早治之不爾則潰
發其瘡變出膿汁遷延時日久不能較也

治湯水入瘡為水毒發腫痛

右以香附子乾姜各一分皆燒存性研細末傅之

赤遊論



小兒患赤遊腫痛者由內有積熱熏發於外外被風毒
所干內外相乘搏於血氣則皮膚赤腫其風邪毒氣隨
經絡行遊不定故為赤遊也若重者隨血氣虛處流注
為赤腫或片或渦毒漸引大疼痛難忍若遊至於心或
毒入腹者皆能殺人

治赤痛遊遍身上下不定若至於心即危

右以芒硝投湯中取濃汁拭之亦治丹毒

又方治如前

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

右以蒴藿煎汁澆淋之

治小兒緣身赤腫漸引腫起

以米粉熬令黑色研細唾和傅之

治小兒半身赤漸漸長引不止

以牛膝甘草二味等分咬咀一方甘草減半每用一

兩水一盞煎五分去滓調伏龍肝末塗之大効

又方治如前

以亂髮燒灰同伏龍肝末用膏油和傅



治赤熱毒腫遊行身上下至心即死	以草鞋亂髮燒灰醋和傳之以伏龍肝研末鷄子白	和傳乾再傳又以生景天杵爛傳上亦治丹發一方	用一握絞汁拭之以水中苔杵爛傳之又以松菜杵	爛傳之以白豆末水和傳之乾即易	治頭面緣身生赤毒腫起作片	以枯樓根二兩伏龍肝半兩為末醋調塗之乾即再	傳	欽定四庫全書	小兒衛生總微論方	治赤游腫半身紅漸漸展引不止	以紅藍花末醋調傳之又以芸薹葉杵爛傳之	又方治如前赤腫遊行上下遍身不定	右以芭蕉根汁煎塗之	防己散治如前	防己 ^{半兩} 川朴硝 犀角屑 黃芩 黃耆	川升麻 ^{各一分}	右為細末每服半錢煎竹葉湯調下



木通散治赤遊成片渴赤色如染腫毒漸漸引大	木通 一兩 川升麻 川大黃 剉碎 微炒 川朴硝 各半兩	梔子仁 甘草 微炙 各一分	右為麤散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服	之	截毒散治如前	川大黃 生 鬱金 赤芍藥 膩粉	猪牙皂角 去皮子絃 各半兩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	右為細散每用少許生油調塗之	又方治如前	右以五味子去枝梗焙乾為末熱酒調下一錢痛自	消神効	又方治如前	右以黃蘗寒水石等分為末用薄荷水稀調鷄翎掃	塗之乾即再	治赤遊腫遍身入腹即殺人



右取竈下黃土研為末油調塗勿令乾若入腹及入陰者以慎火草取汁一盞分服如無生者用乾者末之水調服

赤毒論

小兒丹毒者由風熱毒邪容於腠理搏於血氣發於皮膚之所作也又千金論小兒黃丹惡毒皆熱積所成或冬間向火烘衣夜間蓋覆太暖或乳母愛食燒炙飲酒皆令兒病丹發處其熱如火輕輕手近則痛不可忍又

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

有五色丹雖赤色者最多皆焮熱作痛甚者遍身壯熱煩渴悶亂更有諸火丹其名証甚多不可盡述皆赤丹之異名也其毒入腹者亦能殺人宜速治之

治赤丹此熱毒所作其色純赤如丹塗之故名赤丹

右以蕎麥麵醋和傳之一方用蕎麥麵用鳩腦和餅索串吊起放乾要用時研末鷄子清調膏以鷄羽翎掃上効如神

又方以胡荽汁傳之又以寒水石半兩白土一分研



細末米醋調傅以藍淀或慎火草水苔生地黃梔子	仁但得一味為末水調傅之皆可	治白丹虛腫如吹此風熱所作而風多者其色則白	香鼓 二合炒 伏龍肝 一兩	右同為細末每用半錢生油調塗之	治黑丹痛腫此本熱毒復有冷以乘之互相瘀抑故黑	色	川升麻 川芒硝 漏蘆 去蘆各二兩 黃芩	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	梔子仁 各一兩	右為麤末每用兩匙水三盞煎至二盞去滓稍熱以	軟帛蘸塌患處以消為度	治丹五色變易不常此風毒冷熱相搏盛衰不同故色	無定也	棗木根 四兩 丹參 去蘆三兩 菊花 揀淨二兩	右細剉拌勻每用兩匙水二碗煎數沸適溫熱避風	處浴洗



又方治如前

右以蜜和乾姜傳之

治急丹引

右以鷄子白和赤小豆傳之

治赤丹

以葛勒藤蔓輕輕摩破醋研訶梨勒汁塗之妙以淬鐵水飲一合得打鐵處淬鐵槽中水澄清用

治黑丹此本熱毒搏於血氣熱輕而挾於風多故色黑

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

也

以風化石灰二兩屋四角茅草三兩燒灰同研細末鷄子白調塗日三五次効以猪槽下泥塗之

治白丹此本熱毒搏於血氣熱輕而挾於風多故色白也

以猪糞燒灰研末鷄子白調塗

治殃火丹生於兩脇腋及膀上

以川朴硝研細竹瀝調下半錢更量大小加減



治天竈火丹發於髑裏尻間正赤流陰頭腫或血出 以蠶沙一升水煮去滓取汁洗之	治廢竈火丹發足趺赤色	以赤小豆末一兩牛角二兩燒灰同研勻細鷄子白 和塗	治尿竈火丹發膝股起臍間走腹頭	以屋四角茅草燒灰研細鷄子白和傳	治火焰丹發兩臂及背膝如火灸	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	以老雅眼睛草葉和醋研爛傳之亦治赤腫	治五色丹遍身壯熱如焚燒若遶臍即損人	以蒴藿葉杵爛水和傳之	治丹毒從臍中起	以伏龍肝研末用屋漏水和傳之乾即再用取効為 度如無屋漏水新汲水亦得	治丹腫起於兩脇心背不速治即殺人	以殺羊角屑八兩水五升煎至一升絹濾去滓入煉



了猪脂五兩和勻傳之	治丹毒忽生頭上皮膚赤腫起暈有碎瘡初發如錢漸開及身長一二尺良久遍體入口耳到藏府胃爛即死此候可畏宜速治之	以甘草一兩擘破入水一大盞煎湯溫溫令乳母滿口呷含鼓漱徐徐吐洗病處以手掌摩揩不得犯指甲恐傷破仍更甘草湯服之三用即差	治丹毒	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	以鯽魚肉細切五合小豆屑三合同杵如泥水和傳上	千金漏蘆湯治小兒熱毒赤白諸丹癰疽瘡癰	漏蘆 去蘆 連翹 白欽 芒硝 甘草 炙各一分 大黃 煨	升麻 枳實 炒 麻黃 去根節 黃芩 各三分	右呔咀以水一升半煎取五分量兒大小增減服	治一切諸丹	以馬齒莧杵爛傳之治赤丹熱如火遶腰即損以黃



芩末水調傅之以葦麻子五箇去殼并皮研細入麵一匙水調傅之以水煮棘根洗之以栗子刺殼煎湯洗之以柳葉一斤水一斗煮取三升去滓挹洗病處日五六次以蚯蚓糞水和傅之以蒴藿葉浮萍草五葉藤海藻葉但得一味為末水調傅之	又方治諸丹已破作瘡出黃水皸痛	右以豆豉炒焦烟絕為細末油調傅之	千金麻黃湯治諸丹惡毒發處如火輕輕手近則痛不	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	可忍急與砭針出血仍與此湯并塌湯治之	麻黃去根節升麻各一兩葛根各一兩射干各一兩雞舌香	甘草炙各半兩石膏半兩	右咬咀以水三升煮取一升三歲兒分三服日盡	塌湯治諸般數十種丹毒	大黃生甘草生當歸生芎藭生白芷生獨活去蘆	黃芩生赤芍藥生升麻生沉香生木香生	木蘭皮各一兩芒硝各三兩



右咬咀以水一斗二升煮取四升去滓內芒硝覽烊以綿搗塌之乾則易仍適溫熱用取差止

消毒散治諸丹發赤腫作痛甚並赤遊腫背

川升麻

黃芩

各半兩

麥門冬

川大黃

剉碎微炒

川朴硝

各一分

右為麤末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服

鱗體論

鱗體者謂皮膚之上如蛇皮鱗甲之狀故又名蛇體此

欽定四庫全書

小兒衛生總微論方

由氣血否澁不能通潤於皮膚矣又生下便有者此兒

在母腹形像未具之時母曾觀看或曾食喫或服藥餌

有犯鱗甲網罟穢毒之物兒胎中感而化之故又謂之

胎垢謂生下身皮黑垢若鱗者也此必難治

治小兒身上皮膚若蛇皮之鱗

以白殭蠶去絲嘴為末煎湯適溫煖浴之一云與蛇

蛻同煎

疵靨論



疵靨者謂皮膚之上生赤色或黑色之點大小不等如 滓粒之狀緣身猶可若生面上則多惡之女子尤甚此 由風邪搏於津液之氣而作又言因傅胡粉皮膚虛而 謂粉氣入於腠理化生又有生下便有者此由兒在胎 中形像未具之時母食雜有毒感氣而化又有父母遺 體所生者此下二項不可治也	治小兒皮膚上生赤疵	以馬尿洗之日四五次	欽定四庫全書 小兒衛生總微論方	又方治小兒生赤黑疵	以針刺父脚中血滴疵上即消	又以狗熱尿傳之疵自卷落	小兒衛生總微論方卷二十

