

欽定四庫全書

子部
外科理例卷二

詳校官太醫院史司_臣宋桂

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士_臣何思鈞

校對官助教_臣胡子襄

謄錄監生_臣馬步蟾



欽定四庫全書									
外科理例									
提要									
臣 等謹案外科理例七卷附方一卷明汪機									
撰機字省之號石山祁門人有鍼灸問對已									
著錄是書成於嘉靖辛卯凡分一百四十七									
類又補遺七類共為一百五十四門後附方									
一卷凡一百六十五則前有自序稱外科必									
本諸內知乎內以求乎外其如視諸掌乎治									
外遺內所謂不揣其本而齊其末可謂探源									
之論其曰理例者謂古人所論治無非理欲									
學者仿其例而推廣之也大旨主於調補元									
氣先固根柢不輕用寒涼攻利之劑又分為									
舍脈從証舍証從脈及治之不應別求其故									
三例用法通變亦異於膠轕之談惟措詞拙									
澁驟讀之或不了了是其所短然方技之書									
欽定四庫全書					外科理例				



欽定四庫全書									
外科理例									
允良亦有由也乾隆四十四年二月恭校上									
醫名二人同時而虛心從善如是其持論平									
治武宗時廷杖諫官事則機在正德中亦以									
則已為弘治正德間人是書杖瘡門中記療									
考新甫為薛已之字已父鎧弘治時官太醫									
新甫薛先生心法發揮復采其說參入其中									
引外科精要朱震亨之論又稱輯已成編得									
不能責以文章之事存而不論可矣書中多									
總纂官 臣 紀昀 臣 陸錫熊 臣 孫士毅									
總校官 臣 陸 費 墀									



外科理例原序

外科者以其癰疽瘡瘍皆見於外故以外科名之然外科必本於內知乎內以求乎外其如視諸掌乎經曰膏梁之變足生大疔由膏梁蘊毒於內而生也又曰榮氣不從逆於肉理乃生癰腫是癰腫由榮氣逆於肉理之內而生也有諸中然後形諸外治外遺內所謂不揣其本而齊其末殆必已誤於人已尚不知人誤於己人亦不悟嗚呼已雖不知天必知之人雖不悟神必識之異

欽定四庫全書

外科理例

日明受天責陰獲神譴不在於身則在於子孫矣予於是懼因輯此書名曰外科理例蓋其中古人所論治無非理也學者能做其例而推廣之於焉而求古人不言之妙旨庶幾小不誤已大不誤人抑亦有補於將來矣輯已成編復得新甫薛先生心法發揮讀之觀其論治亦皆一本於理而予竊喜暗與之合於是復采其說參於其中庶得以為全書而學者無復有遺憾矣是為序
嘉靖辛卯冬十一月長至日祁門汪機識



欽定四庫全書

外科理例卷一

明 汪機 撰

瘡疽脈一

浮 主表症浮數之脈應發熱不發熱反惡寒癰疽也

洪 主血實積熱腫瘍洪大則瘡勢進膿未成宜下潰

膿後洪大難治若自利不可救

滑 主熱主虛膿未潰者宜內消膿潰後宜托裡所謂

欽定四庫全書

外科理例

始為熱終為虛也

數 主熱仲景曰數脈不時見生惡瘡又曰肺脈俱數

則生瘡諸瘡脈洪數裏欲有膿結也

散 膿潰後煩滿尚未全退其脈洪滑麤散難治以正

氣虛邪氣實也又曰肢體沉重肺脈大則斃謂浮

散也

芤 主血虛膿潰後見之易治

牢 按之實大而弦且沉且浮而有堅實之意癰癰結



核得之不可內消	實 久病虛人得此最忌瘡疽得此宜急下之以邪氣 與臟腑俱實故也	弦 浮弦不時見為飲為痛主寒主虛弦洪相搏外緊	內熱欲發瘡疽	緊 主痛瘡腫得之氣血沉滯	滯 主氣滯血虛膿潰後得之無妨	短 諸病脈短難治瘡腫脈短真氣短也	欽定四庫全書 外科理例	細 主亡陽陽氣衰也瘡腫脈來細而沉時直者裏虛 欲變症也	微 主虛真氣復者生邪氣勝者危瘡腫潰後脈微而 勻當自差	遲 痼疾得之則善新病得之主血氣虛憊瘡腫潰後 得之自痊	緩 瘡腫潰後其脈滯遲緩者皆易愈	沉 水氣得之則逆瘡腫得之邪氣深



虛	脈虛血虛血虛生寒陽氣不足也瘡腫得之宜托
裡	和氣養血也
與	瘡腫得之補虛排膿托裏
弱	主氣血俱虛形精不足大抵瘡家沈遲與弱皆宜
托裏	
促	主熱蓄于裏下之則和瘡腫脈促亦急下之
代	諸病見之不祥瘡腫脈促結難治况代脈乎
動	動於陽陽虛發厥動於陰陰虛發熱
欽定四庫全書	
外科理例	
治瘡脈訣	
身重脈緩濕勝除濕	身熱脈大心躁熱發腫乍來乍
去除熱	諸痛眩暈動搖脈弦去風
脈濇氣滯燥渴亡津液脈濇瀉氣補血	寒勝則浮食
不入便溺多惡寒脈緊細瀉寒水	
數脈不時見當生惡瘡	諸浮數脈應發熱反洒淅惡
寒	若有痛處當發癰疽
脈滑而數滑則為實數	
則為熱	滑則為榮數則為衛榮衛相逢則結為癰



熱之所過則為癰膿

機按今之瘍醫多不診脈惟視瘡形以施治法蓋瘡有表裏虛實之殊兼有風寒暑濕之變自非脈以別之安得而察識乎東垣云瘡瘍憑脈此之謂也因詳列其脈之所主揭之於首學者宜加意焉

七惡五善二

醫瘡概舉七惡五善此特謂腸胃之內藏府瘡疽之證也發背腦疽別有善惡載之於後

欽定四庫全書

外科理例

七惡者煩躁時嗽腹痛渴甚或泄利無度或小便如淋
一惡也 膿血既泄腫焮尤甚膿色敗臭痛不可近
二惡也 目視不正黑睛緊小白睛青赤瞳子上看
三惡也 喘粗短氣恍惚嗜卧四惡也 肩背不便
四肢沉重五惡也 不能下食服藥而嘔食不知味
六惡也 聲嘶色敗唇鼻青赤面目四肢浮腫七惡也

五善者動息自寧飲食知味一善 便利調勻二善



膿潰腫消水鮮不臭三善 神彩精明語聲清亮四善 體氣平和五善	五善之中乍見一二善證瘡亦回也七惡之內忽見一二惡證當深懼之又有證合七惡皮急緊而知善	又或證合五善皮緩虛而知惡此又在人詳審大抵虛中見惡證者不可救實證無惡候者自愈	膿潰後尚煩疼 脈洪滑粗散者難治 微濇遲緩者易痊	欽定四庫全書 外科理例	諸惡瘡五逆三 白睛青黑眼小 服藥而嘔 腹痛渴甚肩項中不便	聲嘶色脫是為五逆其餘熱渴利嘔蓋毒氣入裏臟府之傷也	機按以上不治皆五臟氣已絕	定癰死地分四 一茯兔 二腓脰 三背 四五臍俞 五項 六腦	七髭 八髻 九頤



背上九處不可病癰五

第一入髮際為玉枕亦為舌本 第二頸項節 第三

椎為崇骨 第四大椎為五臟 第五脊骨兩邊肺俞

穴 第六夾脊兩邊脾俞及肝俞 第七脊骨兩邊腎

俞二穴 第八後心鳩尾 第九鳩尾骨穴

附 正面五處不可患癰

第一喉骨為垂膺 第二當胃為神舍 第三心鳩尾

第四當兩乳穴 第五臍下二寸為腸屈間

欽定四庫全書

外科理例

附 側面三處不可患癰

耳下近耳後牙車尖夾陷中為喉脈一穴

當膊下一穴為肩骨 承山上三寸一穴膈腸

癰發有不可治六

腦上諸陽所會穴則髓出 頸項近咽喉一有所礙藥

食莫進 腎俞與腎相抵乃命之所繫穴則透空 此

三處有疽並難治

發背透膜者不治

此言肝俞以上

未潰肉陷面青唇黑便瘀者



死 此言臟壞 右頤後一寸三分毒銳者不治 潰喉者

不治陰入腹者不治入囊者死 鬢深及寸餘者不治

病瘡腰背強急癰瘕者皆不治

發背治之難易七

疽發背上以兩手上搭著者謂之左右搭頭多如蜂窠

者易治 以兩手下搭著者謂之腰疽亦易治 以兩

手上下俱搭不著者謂之發背此証最重

大抵以上所言地分皆脈絡所會內系臟府患者得

欽定四庫全書

外科理例

而早言醫者審證按法治之皆為不死設不早治治

不對證雖發於不死之地恐亦致死也

占色候生死八

病人目中赤脈從上下貫瞳人一脈一年死二脈二年

死若脈下者療之差 面上忽多赤貫上下如脂 赤

色從額上下至鼻 黑色出額上大如指反連鼻上至

肩又有赤色垂並為死候

機按赤脈屬火瞳人屬水赤脈貫瞳火反乘水面屬



陽陽部赤色陽勝陰微額上黑色陽微陰勝故多危也

癰之源有五九

天行一 瘦弱氣滯二 怒氣三

腎氣虛四 服法酒食灸燂服丹藥熱毒五

蓋治癰疽不可一概視為熱其治難易當自一而至

五動

生癰所感不同十

欽定四庫全書

外科理例

膏梁之變足生大丁受如持虛膏梁厚味熱毒內積

其變多生大疽受毒部分其毒從虛處受之大

丁大疽也以其根深在內也 此言疽因厚味內熱

為變而生

陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃生

大僂陷脈為癭留連肉腠

人身陽氣其精微以養神其柔和以養筋陽氣在身

表開闔失宜在外寒氣從而襲之如襲其筋絡則筋



絡拘急為僂俯如陷入經脈則經脈凝瘀為瘍癰留
連分肉節腠間不易散矣

此言瘍癰因陽氣閉闕失
宜外寒襲陷經脈凝瘀而

生

營氣不從逆於肉理乃生癰腫

營生血營氣流行失宜不從其道阻逆於肉理則血
鬱熱聚而為癰腫

此言癰腫因營氣失宜逆於肉理血鬱熱聚而生
三陽為病發寒熱下為癰腫

欽定四庫全書

外科理例

三陽手陽明大腸太陽小腸足太陽膀胱其三陽為
病在上發寒熱在下為癰腫

此言癰腫在下從三陽而生當視三陽脈而辨

東方之域魚鹽之地其民食魚嗜鹹安其處美其食魚
熱中鹽勝血故其民黑色踈理其病為癰瘍

此言癰疽因土地瀕海食魚嗜鹹安居不勞美味
不節魚熱中鹽勝血而生

諸癰腫筋攣骨痛此寒氣之腫八風之變也



經曰寒傷形形傷腫八風八方之風靈樞云東南方	來名弱風傷人也在肌西南來名謀風傷人也在肉	東方來名嬰兒風傷人也在筋北方來名大剛風傷	人也在骨此寒氣之腫八風之變而為癰腫筋攣骨	痛	此言癰疽因四方寒氣八風過傷而生	腎移寒於脾癰腫少氣	夫腎傷於寒轉移於脾脾主肉分肉之間衛氣行處	欽定四庫全書 外科理例	腎寒復傳脾則分肉寒而衛氣凝故堅結為癰腫肉	結血傷而少氣	此言癰腫因腎寒傳脾而生	脾移寒於肝癰腫筋攣	脾主肉肝主筋肉溫則筋舒今脾傳寒於肝故肉寒	則衛氣結聚為癰腫筋寒則急為筋攣	此言癰腫因脾寒傳肝而生	肝滿肺滿腎滿皆實則為肝肺腎癰



滿實脈氣滿實也以臟氣邪盛滿實故脈氣如是	此言肝肺腎癰因臟氣邪盛滿實而生當視脈氣	滿實而辨	肺肝腎癰症十一	肺癰主肱滿 肺臟氣而外主息其脈支別者從肺系	橫出腋下故喘而兩肱滿 此言肺癰所見症	肝癰主小便肝主驚肝脈循股入毛中環陰器抵	少腹直上貫肝膈布脇肋故兩肱滿兩肱滿卧則驚	欽定四庫全書 外科理例	不得小便 此言肝癰所見證	腎癰主少腹滿 此言腎癰所見證	癰生原於臟府十二	五臟菹熟癰發六府	菹積也熟熱也五臟積熱六府受之陽熱相薄熱之	所過則為癰也	此言五臟積熱六府受之而生	六府不和留結為癰



欽定四庫全書		外科理例	
六府屬陽而主氣肌肉上為陽脈邪氣遊於六府則	肌肉上之脈不和邪氣停留肌膚結聚為癰腫矣	此言六府受邪而生	辨臟府內瘡十三
中府隱隱痛者肺疽	其上肉微起者肺癰	巨闕隱隱痛者心疽	其上肉微起者心癰
期門隱隱痛者肝疽	其上肉微起者肝癰	章門隱隱痛者脾疽	其上肉微起者脾癰
京門隱隱痛者腎疽	其上肉微起者腎癰	中脘隱隱痛者胃疽	其上肉微起者胃癰
天樞隱隱痛大腸疽	其上肉微起大腸癰	丹田隱隱痛三焦疽	其上肉微起三焦癰
關元隱隱痛小腸疽	其上肉微起小腸癰	明瘡瘍本末十四	
今富貴之人飲食肥濃日以太過其氣味俱厚之物乃			
陰中之陽不能走空竅先行陽道反行陰道逆於肉理			



則濕氣大勝子^土能令母^火實火乃大旺熱濕既盛必
來尅腎若雜以不順必損其真水腎既受邪積久水乏
水乏則從濕熱之化而上行其瘡多出背出腦此為大
疔之最重也若毒氣行於肺或脾胃之部分毒之次也
若出於他經又其次也濕熱之毒所止處無不潰爛故
經言膏粱之變足生大疔受如持虛如持虛器以授物
物無不受故治大疔之法必當瀉其營氣以標本言之
先受病為本非苦寒之劑為主為君不能除其苦楚疼
痛也

欽定四庫全書

外科理例

陰滯於陽為疽陽滯於陰為癰十五

癰疽因陰陽相滯而生蓋氣陽也血陰也血行脈內氣
行脈外相並周流寒與濕搏之則凝結行遲為不反熱
與火搏之則沸騰行速為大過氣得邪而鬱則津液稠
粘為痰為飲積久滲入脈中血為之濁此陰滯於陽也
血得邪而鬱隧道阻隔或溢或結積久滲出脈外氣為
之亂此陽滯於陰也病皆由此不特癰疽陽滯於陰謂



陽盛而滯其陰脈則浮洪弦數陰滯於陽謂陰弱而滯其陽脈則沈弱細瀋陽滯以寒治之陰滯以熱治之

瘡疽分三治十六

瘡瘍者火之屬須分內外以治其本經曰膏粱之變足生大疔其源在裏發於表也受如持虛言內結而發諸外皆是從虛而出也假如太陽經虛從鬢而出陽明經虛從髭而出督脈經虛從腦而出經曰地之濕氣感則害人皮肉筋脈其源在外盛則內行也若脈沈實當

欽定四庫全書

外科理例

先疎內以絕其源若脈浮大當先托裏以防邪氣侵內又有內外之中者邪氣至盛遏絕經絡故發癰腫經曰營氣不從逆於肉理乃生癰腫是也此因失托裏及失疏通及失和榮衛而然也治瘡大要須明托裏疏通行榮衛三法托裏者治其外之內也疏通者治其內之外也行榮衛者治其中也內之外者其脈沈實發熱煩躁外無焮赤痛深在內邪氣沈於裏也故先疏通以絕其源如內疏黃連湯是也外之內者其脈浮數焮腫在外



形證外顯恐邪氣極則內行或汗或先托裏以防入內
如荆防敗毒散內托復煎散是也內外之中者外無焮
惡之氣內則臟府宣通知其在經當和榮衛如當歸黃
耆湯東垣白芷升麻湯是也用此三法雖未痊差必無
變証亦可使邪氣峻減而易痊也其汗下和之間又有
外治之次第詳見天容穴疔瘡條

瘡腫分淺深十七

瘡疽有三種高而軟者發於血脈腫下而堅者發於筋

欽定四庫全書

外科理例

骨皮肉色不辨者發於骨髓又曰以手按搖瘡腫根牢
而大者深也根小而浮者淺也又驗初生瘡時便覺壯熱
惡寒拘急頭痛精神不寧煩燥飲冷瘡疽必深也若起
居平和飲食如故其瘡浮淺也惡瘡初生其頭如粟微
似有痛痒誤觸破之即焮展有深意酌其深淺浮則表
之深則疎之

辨癰與疽治法十八

精要云始患高腫五七日勿平陷者是攻內之候以托



裏散內補湯填補臟府令實最怕透膜透膜者十無一生

丹溪曰癰之邪淺其稽留壅遏濁在經脈之中而專於外故初發時身表便熱患處便如枕如盆高腫痛甚者縱欲下陷緣正氣內固不肯受故或便秘或發渴發逆以拒之是以骨髓終不焦枯五臟終不損也 疽之邪其稽留壅遏內連五臟而不專攻於外故身或無熱患處或不腫痛甚者聲嘶色脫眼黑青小十指腫黑如墨

欽定四庫全書

外科理例

多死也 治癰初發當以潔古法為主表者散之裏者下之火以灸之藥以敷之膿未成者必消已成者速潰 治疽初發當以消子法為主填補臟府令實勿令下陷之邪延蔓外以火灸引邪透出使有穴歸而不亂攻可轉死為生變凶為吉今世不分癰疽一概宣熱拔毒外以五香耗其氣內以大黃竭其血終不自悟其藥之非惜哉

瘡名有三曰癰曰癰曰疽十九



癰者初生突起浮赤無根脚腫見於皮膚止濶一二寸
有少疼痛數日後微軟薄皮剥起始出青水後自破膿
出如不破用簪針丸 癰者初生紅腫突起濶三四寸
發熱惡寒煩渴或不熱抽掣疼痛四五日後按之微軟
此證毒氣浮淺春夏宜防風敗毒散加葱姜棗煎秋
冬去葱姜棗加木香身半以上加瓜蒌身半以下加射
干又有皮色不變但肌肉內微痛甚發熱惡寒煩渴此
證熱毒深沈日以按之中心微軟膿成用火烙烙開以
欽定四庫全書
外科理例
決大膿宜服托裏之藥 疽者初生白粒如粟米便覺
癢痛觸著其痛應心此疽始發之兆或誤觸著便覺微
赤腫痛三四日後根脚赤暈展開渾身壯熱微渴瘡上
亦熱此疽也疽上或漸生白粒如黍米逐箇用銀篦挑
去勿令見血或有少血亦不妨不見血尤妙却用老皮
散傳之五七日瘡頭無數如蜂房膿不肯出冬用五香
連翹湯夏用黃連羌活散夏初用防風敗毒散加葱棗
秋去之加木香若形氣實脈洪滑有力痛腫焮開壯熱



便閉宜五利大黃湯復元通氣散選用通利又有初生
白粒誤觸後便覺情思不暢背重如石身體煩疼胸膈
痞悶怕聞食氣此謂外如麻裏如瓜疽毒深惡內連府
臟疽頂白粒如椒者數十間有大如蓮子蜂房者指捺
有膿不流時有清水微腫不突根脚紅暈漸漸展開或
癢痛或不痛疽不甚熱瘡反陷下如領之皮漸變黑色
恍惚沈重脈若虛弱使用大料參耆歸朮濃煎調理
瘡瘍有癰疽癰癰輕重淺深或止發於一經或兼二

欽定四庫全書

外科理例

經者止當求責於一二經不可干擾餘經也若東垣
用藥處方是矣矧有兼風兼濕兼痰兼氣兼血兼
陰虛等證者病本不同治當求責

瘡瘍鬱冒俗呼昏迷是也宜汗之則愈

辨瘤二十一

若發腫都軟不痛者血瘤虛腫而黃者水也發腫日漸
增長而不大熱時時牽痛者氣瘤氣結微腫久而不消
後亦成膿諸癰瘤疔等至年衰皆自內潰治於壯年



可無後憂

疽分虛實用藥二十二

瘡疽痛息自寧飲食知味脈證俱緩緩則治本故可以王道平和之藥徐而治之亦無不愈若脈實焮腫煩躁寒熱脈證俱實非硝黃猛烈之劑不能除投以王道之劑則非也若瘡瘍聚腫不潰潰而膿水清稀或瀉利腸鳴飲食不入嘔吐無時或手足並冷此脈證俱虛非大補之藥不能平投以硝黃攻伐之劑亦非也故治其證

欽定四庫全書

外科理例

者當辨表裏虛實隨宜治之庶得萬全

治瘡須分補瀉二十三

東垣云瘡疽受之有內外之別治之有寒溫之異受之外者法當托裏以溫劑反用寒藥則是皮毛之邪引入骨髓矣受之內者法當疎利以寒劑反用溫劑托裏則是骨髓之病上徹皮毛矣殆必表裏通潰共通為一瘡助邪為毒苦楚百倍輕則危重則死矣

男女癰疽治法不同二十四



男婦癰疽精要謂治法無異丹溪曰婦人情性執著比
之男子其難何止十倍雖有虛證宜補亦當以執著為
慮向見有一婦早寡善飲啖形肥偉性沈毒年六十六
七月間背疽近正脊醫乃橫直裂開取血雜以五香十
宣散酒飲月餘未嘗及其寡居之鬱酒肉之毒執著之
滯時令之熱竟至平陷淹延兩三月不愈

小兒瘡疽二十五

小兒純陽多熱心氣鬱而多瘡疽胎食過而受熱毒犀

欽定四庫全書

外科理例

角散為最餘如常法大下恐傷其胃

癰疽當分經絡二十六

丹溪曰六陽六陰經有多氣少血者有少血多氣者有
多氣多血者不可概論諸經惟少陽厥陰生癰理宜預
防以其多氣少血血少肌肉難長瘡久不合必成死證
或者遽用驅毒利藥以伐陰分之血禍不旋踵纔得腫
痛參之脈證若有虛弱便與滋補氣血無虧可保終吉
若用尋常驅熱拔毒及散氣藥虛之禍如反掌耳



一人年三十左腿外廉紅腫一人年四十脇下紅腫二人皆不預防本經少陽血少猛浪用大黃攻裏而死
一人年六十左膊外側一核一女髀骨中痛二人亦不預防本經血少猛浪用五香十宣散表而死

按此分經不致有犯禁壞逆之失然手少陽少陰太陰足少陽少陰太陰俱多氣少血也手厥陰太陽足厥陰太陽俱多血少氣也手足陽明俱多血多氣也

欽定四庫全書

外科理例

以上病例不係膏梁丹毒火熱之變因虛勞氣鬱所致只宜補形氣調經脈瘡當自消不待汗下而已也若不詳脈證經絡受病之異下之先犯病禁經禁故致失手
論內消二十七

內消當審淺深大小經絡處所形脈虛實如腦背腰頂臀膈皆太陽經宜黃連羌活背連脇處為近少陽宜敗毒散形實脈實者宜漏蘆湯五利大黃湯等疎利之氣虛參耆為主血虛當歸人參為主佐以消毒加以引



經六經分野各隨本經標本寒溫氣血多少以行補瀉
惟少陽一經治與氣血虛同法

凡瓜蒌射干山甲蟾酥
追翹地丁鼠粘子金銀

花木鱉之類
皆內消之藥

內托二十八

一凡癰疽或已成血氣虛者邪氣深者邪氣散慢不能
突起亦難潰膿或破後膿少或膿清稀或堅硬不軟或
雖得膿而根脚紅腫開大皆氣血虛邪氣盛兼以六淫
之邪變生諸症必用內托令其毒熱出於肌表則易愈
也內托以補藥為主活血驅邪之藥為臣或以芳香之
藥行其鬱滯或加溫熱之藥禦其風寒

欽定四庫全書

外科理例

亦有瘡疽腫痛初生一二日便覺脈沈細而煩悶臟府
弱而皮寒邪毒猛烈恍惚不寧外證沈深者即當用托
裏散或增損茯苓湯及溫熱之劑以從治之

或問內托河間治腫焮於外根盤不深形證在表其
脈多浮病在皮肉非氣盛則必侵於內急須內托宜
服煎散除濕散鬱使胃氣和平如或未已再煎半料





湯若脈數便閉用清涼飲尺脈洪大按之無力而渴用
加減八味丸若治口燥舌黃飲水不歇此丸尤妙

精要曰口渴與口乾不同不宜用丹藥鎮墜禍如反
掌惟桑枝煎五味湯以救陰水甚妙

丹溪曰不言食味起火怒氣生火房勞激火吾恐渴亦
未易止也

精要曰瘡作渴甚急與神仙追毒丸取下惡毒清腫

湯千金漏蘆湯五香連翹湯六味車螯散萬金散皆

欽定四庫全書

外科理例

可選用利後仍渴却用生津補氣藥津液生氣血完
渴自止

丹溪曰大渴而與利藥非明示脈證何以知其當下後
言利後仍渴却用補藥又不明言脈證恐是但有大渴
必下下後尚渴方與補藥古人治未病如此用藥可乎
況渴屬上焦當腫瘍時猶或可用若潰瘍後渴多因血
氣之虛何待利後方議其虛也

癰疽發渴乃氣血兩虛用參耆以補氣歸芩以養血



或忍冬丸黃耆六一湯

一人渴後發背未潰脈數無力此陰虛火動用加減

八味丸咬咀二劑稍緩次用丸劑而愈

一人腦疽作渴脈雖洪按之無力治以此藥不信自

用滋陰等藥愈盛七惡併致而沒

東垣云論人病疽愈後發渴多致不救惟加減八味

丸最妙蓋癰疽多因虛而得疽安而渴者服此丸則

渴止安而未渴者服此丸永不發渴或未疽而先渴

欽定四庫全書

外科理例

者服此不惟渴止而疽亦不作

一貴人疽未安而渴作一日飲水數升予用加減八

味丸諸醫大笑云此能止渴我輩不復業醫矣皆用

木瓜烏梅紫蘇參苓百藥煎等劑而渴愈甚不得已

用此藥三日渴止其疾本以腎水枯竭心火上炎是

以生渴此藥生水降火為最患者鑒之

附子氣味勁悍有回陽之功命門火衰非此不補

性雖有毒但炮製有法或用甘草防風同炒或童



便以浸以去其毒復與地黃等味同用以制其熱
潤其燥緩其急假其克捷之功而駕馭其慄悍之
勢則雖以服亦無害也觀東垣八味丸論則較然
矣

精要曰疽向安後發渴與加減八味丸

丹溪曰夫當此時氣血兩虛當用參耆補氣歸芩補
血渴當自止何必澤瀉茯苓佐以肉桂以導水耶若
忍冬丸黃耆六一湯亦為切當忍冬養血黃耆補

欽定四庫全書

外科理例

氣渴何由作機按丹溪所言與前八味丸論治不合
宜以脈證別之庶幾兩得其宜而無背馳之失也

瘡瘍嘔逆三十三

精要云有二證一謂初發不曾得內托散伏熱在心一
謂氣虛脾氣不正其伏熱在心者與內托散氣虛者
宜嘉禾散有寒熱宜正氣散兼與山藥丸以補腎
丹溪曰諸逆衝上嘔噦皆屬於火托裏散性涼固有降
火之理若嘉禾散徒溫煖以助火耳山藥丸補腎以壯



下焦之陰粗為近理然治嘔須分先後腫瘍時當作毒
氣上攻治之潰瘍後當作陰虛補之若年老因疽潰後
嘔不食者宜參耆白朮膏佐使藥隨時隨證加減亦用
獨參湯而愈者山藥丸緩急未易治 河間謂病瘡嘔
逆濕氣侵於胃也藥中宜倍加白朮

海藏云吐者有物無聲乃血病也噦者無物有聲乃氣
病也嘔者有聲有物氣血俱病也仲景曰嘔家雖有陽
明證勿下之欬逆者火自下衝上胃口而作聲也病後

欽定四庫全書

外科理例

胃虛所致陰大虛也病而至此多危善於治者豈可泛
言嘔吐無分別耶

熱盛脈數精要與漏蘆湯單煮大黃湯等若不甚熱
脈緩弱只投五香連翹湯

丹溪曰熱盛脈數若腫瘍時臟府祕而體實者猶可與
也若潰瘍膿血出多熱盛脈數去死為近豈可下乎緩
弱之脈古人皆以為邪毒已散五香之飛走升散其可
用乎



瘡腫寒熱用藥法三十四

嘗見治寒以熱而寒彌甚治熱以寒而熱彌熾何也假如心實生熱者當益其腎腎水滋熱自除腎虛生寒者當補其心心火降寒自退此所謂寒之而熱取之陰熱之而寒者取之陽也又寒因熱用熱因寒用要在通其理類而已又聞寒熱逆之甚者從之蓋治寒以熱必涼而行之治熱以寒必溫而行之此亦欲其調和也其間有正有權者蓋病有微有甚微者逆治理之正也甚者

欽定四庫全書

外科理例

從治理之權也

瘡瘍面赤不得攻下三十五

瘡瘍及諸病面赤雖伏大熱禁不得攻裏為陽氣怫鬱邪氣在經宜發表以去之故曰火鬱則發之雖大便數日不去亦宜攻其表以發散陽氣少加潤燥之藥若見風脈風證只宜用發表風藥便可以通利也若只乾燥祕澀只宜潤之

瘡瘍發寒熱或汗三十六



瘡瘍發寒熱多汗或先寒後熱或先熱後寒或連日作
寒熱或間日作必先嘔痰然後寒熱寒熱解大汗出精
要言以上之證不可專以為熱亦有氣虛而得亦有因
怒而得或先感寒邪脾氣不正而然者

丹溪曰因氣虛者當以補氣藥補之因怒者當以順氣
藥和之脾氣不正者當以脾藥調養之今用不換金

正氣散悉是溫散瀉衛之藥欲以一兩人參收拾十四

兩之瀉衛可乎若用於腫瘍時感寒邪者猶或庶幾彼

欽定四庫全書

外科理例

氣虛者因怒者脾氣不正者此方能兼治乎抑不知其
用於腫瘍耶潰瘍耶

論疽疾咽喉口舌 三十七

凡疽疾咽喉口舌生瘡精要 罪不得內托以致熱毒

與琥珀犀角膏一日而安

尚為近理若潰瘍後用之

彼 寧不助邪致虛以速其死也後有犀角

散以黃佐黃著用黃著則知為虛矣用黃又似疑



其有實熱夫瘡膿體虛縱有舊熱將自漸因膿血而消何必以峻冷利動臟府若在秋冬何異刀劒

論瘡瘍食肉三十八

東垣曰瘡瘍食肉乃自棄也瘡瘍乃營氣而作今反補之自棄何異雖用藥治不能愈也 精要曰羊鷄牛驚魚麵煎燂炒炙酒等味犯之必發熱用梔子黃芩湯最効

丹溪曰梔芩苦參犀角佐輔人參固可解食毒之熱若

欽定四庫全書

外科理例

寒月與虛人寧無加減乎內經謂膏粱之變足生大疔此言瘡疽之因也禁戒厚味恐其引起宿火之熱此誠富貴養口腹者所當謹若素貧者大不然矣予曾治一人背癰徑尺穴深而黑家貧得此急作參耆歸朮膏多肉餽飽與之而安多肉餽飽補氣之有益者也

論氣血喜香惡臭三十九

精要曰凡氣血聞香則行聞臭則逆飲食調令香美益脾土養真氣瘡瘍或為穢氣所觸可用香藥薰之



丹溪曰甘而淡者可養脾土若香美者但能起火故經以熱傷脾熱傷氣為戒今日益脾養氣施之腫瘍似有暢達之益潰瘍後用香美恐有發濕熱損真陰之患

論膿潰四十

夫癰疽瘡癤皆由氣血壅滯而生當推虛實表裏而早治之可以內消此內托裏之意也若毒氣已結者勿泥此內消之法當辨膿之有無淺深急酌量刺之緩則穿通臟府腐爛筋骨可不慎哉若脈緊而數為膿未成

欽定四庫全書

外科理例

緊去但數為膿已成以手按上熱者有膿不熱無膿按之牢硬未有膿按之半軟半硬已有膿大軟方是膿成若大按之痛者膿深按之不甚痛者膿未成按之即復痛為有膿不復痛者無膿薄皮剥起者膿淺皮色不變不高阜者膿深淺者宜砭深者宜針足指稍及乳上宜膿大軟方開麻豆後肢癰有癰稍覺有膿便用決破遲則成攣曲之疾

論癰疽膿成十死一生四十一



凡癰疽膿已成十死一生故聖人弗使已成已成膿血
砭石鋒針取之也但病者多喜內消而醫者即用十
宣散敗毒散流氣飲之類殊不知十宣散雖有參耆
然防風白芷厚朴桔梗皆足以耗氣況不分經絡時
令氣血多少安可概用敗毒散乃表散藥也雖有表
證不過一二服況非表證寧用之乎流氣飲乃行氣
散血之劑服之過度則氣血虛耗何以為膿此三藥
不可輕用明矣若膿既成昧者待其自穿殊不知少

欽定四庫全書

外科理例

壯充實者或能自破若老弱之人又有攻發太過不
行針刺膿毒乘虛內攻穿腸腐膜鮮不誤事

一婦乳癰膿成針刺及時不月而愈 一人腿癰膿
成畏針幾殆後為針之大補三月而平 一人腿癰
脈證俱弱亦危證也治以托裏得膿不急針刺膿水
開瀉不斂而死 一婦發背待自破毒內攻 一人
腹癰潰透穢從瘡口出皆由畏針而斃

論惡肉四十二



惡肉者腐肉也癰疽潰後腐肉凝滯必須去之推陳致新之意若壯者筋骨強盛氣血充溢真能勝邪或自去或自平不能為害若年高及怯弱之人血液少肌肉澁設或留而不去則有爛筋腐肉之患一人取之及時而新肉早生得以全愈一人去之稍遲幾致不救一人取之失期大潰而斃嘗見腐肉既去雖少壯者不補其氣血亦不能收斂若怯弱者不取惡肉不補養氣血未見其生也

欽定四庫全書

外科理例

腐肉可用手法去之或用雄黃輕粉傅之蠹肉努出用遠志末酒調塗之又法息肉突出烏頭五錢苦酒三升浸漬三日洗之日夜三四次諸瘡努肉如蛇出數寸硫黃末傅之即縮膿潰後蠹肉不腐亦用硫黃輕粉傅之四圍仍有腫焮處用毫針燒赤刺之約一米深紅腫則縮

論蝕膿四十三

追蝕膿法使毒氣外泄而不內攻惡肉易去好肉易生



也若經其瘡血出不止者未可經但摻追蝕藥於瘡上
待其熟可經方經 經之痛應心者亦不可經誤觸其
焮痛必倍必生變症 若瘡癰膿成未破者於上薄皮
剥起者當用破頭代針之藥安其上以膏貼之膿出之
後用搜膿化毒藥若膿血未盡使用生肌務其早愈則
毒氣未盡必再發

生肌止痛四十四

肌肉脾之所主也潰後收斂遲速者乃氣血盛衰使然

欽定四庫全書

外科理例

世人但知生肌用龍竭止痛用乳沒予謂不然生肌之
法當先理脾胃助氣血為主則肌肉自生豈假龍竭之
屬設若膿毒未盡就用生肌反增潰爛壯者輕者不過
復潰或遲斂而已怯者重者必致內攻或潰爛不斂者
亦多矣止痛之法熱者清之寒者溫之實者損之虛者
補之膿鬱者開之惡肉侵蝕者去之如是則痛自止豈
特乳沒之屬

一人發背毒氣未盡早用生肌竟背潰爛治以解毒藥



而愈 又有患此毒氣始發驟用生肌其毒內攻而死
一人腿癰因寒作痛與乳香定痛丸 一婦時毒因
熱作痛與防風通聖散 一人腿癰膿潰因虛作痛與
益氣養榮湯 一人腹癰因實作痛與黃連內疏湯
一人腿癰膿成作痛予為刺之 一婦發背腐肉不去
作痛予為取之痛各自止專用龍竭生肌乳沒止痛未
之察也

瘡痛不可忍者苦寒藥可施於資稟厚者若資稟素

欽定四庫全書

外科理例

薄者宜補中益氣湯加苦寒藥血熱者四物湯加黃芩
鼠粘子連翹在下加黃栢若肥人濕熱瘡痛者羌活防
風荆芥白芷取其風能勝濕也

每見瘡作先發為腫氣血鬱積蒸肉為膿故痛多在瘡
始作時膿潰之後腫退肌寬痛必漸減而反痛者虛
也宜補參芪之屬亦有穢氣所觸者宜和解之乳香
芍藥之屬亦有風寒所逼宜溫散之羌桂之屬

論癰並治法四十五



諸瘡患久成癰常有膿水不絕其膿不臭內無歹肉須
先服參芪歸朮芎大劑托裏為主或服以丸尤宜用附子
浸透切作片厚二三分於瘡上著艾灸之仍服前托裏
之藥隔三日再灸不五七次肌肉自長滿矣

至有膿水惡物漸潰根深者用麵硫黃大蒜三物一

處搗爛看瘡大小捻作餅子厚三分安瘡上用艾炷

灸二十三壯一壯一易後隔四五日方用闕霞錠子

並信効錠子 用絛入瘡內歹肉盡去好肉長平然

欽定四庫全書

外科理例

貼收斂之藥內服應病之劑調理則差矣

論附子餅四十六

附豆豉餅

附子為末唾津和為餅如三錢厚安瘡上以艾炷灸之
漏大炷大漏小炷小但灸令微熱不可令痛乾則易之
如困則止來日如前再灸直至肉平為效仍用前補藥
作膏貼豆豉餅專治發背已潰未潰用江西淡豆豉為
末唾津作餅置患處灸之餅乾再用唾津和之瘡大用
水和搗成硬泥依瘡大小作餅子厚三分如已有瘡孔



勿覆孔上四布鼓餅列艾其上灸之使微熱勿令破肉
如熱痛急易之日灸二度先有瘡孔者孔出汁即差

論隔蒜灸四十七

隔蒜灸 元戎云瘡瘍自外而入者不宜灸自內而出
者宜灸外入者托之而不內內出者接之而令外故經
云陷者灸之 丹溪曰癰疽之發或因內有積熱或因
外寒而鬱內熱若於始發之際外灸以散其毒治之之
早亦可移重就輕轉深於淺 東垣曰初覺發背欲結

欽定四庫全書

外科理例

未結赤熱腫痛先以濕紙覆其上立視紙先乾處即癰
頭也取蒜切片如三錢厚安頭上用大艾炷灸之三壯
換一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛早覺早灸為
上一日三日十灸十活三日四日六七活五六日三四
活過十數日不可灸若有十數頭作一處者用蒜研成
膏作薄餅鋪頭上聚艾燒之亦能活也若初發赤腫中
間有一黃粟米頭使用獨蒜切去兩頭取中間片厚薄
安頭上著艾灸十四壯多至四十九壯 本事方云一



人四月背疽治之踰月益甚矣以艾加瘡頭自旦及暮
灸百五十壯知痛乃已明日鐮去黑痂膿盡不痛始別
以藥傅之日一易易時旋前去黑爛月餘乃平

灸法總論四十八

瘡瘍在外者引而拔之在內者疏而下之灼艾之功甚
大若毒氣鬱結氣血凝聚輕者或可藥散重者藥無全
功東垣云若不針烙則毒氣無從而散膿瘀無從而瀉
過時不烙反攻於內故治毒者必用隔蒜灸舍是而用

欽定四庫全書

外科理例

苦寒之劑其壯實內有火者或可彼怯弱氣寒未有不
敗者也又有毒氣沈伏或年高氣弱若服剋伐之劑氣
血愈虛膿因不潰必假火力以成功

一人足患疔已十一日氣弱灸五十餘壯更以托裏藥
而愈 黃君腿癰膿清脈弱 一婦臂結一塊潰不收
斂各灸以豆豉餅更飲托裏藥而愈 一人胃腫一塊
半載不消明灸百壯方潰與大補藥不斂復灸以附子
餅而愈 一人發背焮痛如灼隔蒜灸三十餘壯腫痛



悉退更服托裏消毒而愈 一人發背瘡頭甚多腫硬
色紫不甚痛不腐潰以艾鋪患處灸之更服大補藥數
日死肉脫去而愈 一人發背已四五日瘡頭雖小根
畔頗大隔蒜灸三十餘壯其根肉消惟瘡頭作濃而愈
精要曰灸法有回生之功信矣大凡蒸灸若未潰則
拔引鬱毒已潰則補接陽氣祛散寒邪瘡口自合其功
甚大嘗治四肢瘡瘍氣血不足者祇以前法灸之皆愈
疔毒甚者痛則灸至不痛不痛則灸至痛亦無不愈

欽定四庫全書

外科理例

若中虛者不灸而服敗毒藥則瘡毒未除中氣先傷
未有不敗者也李氏云治疽之法著艾勝於用藥緣熱
毒中隔外內不通不發泄則不解散又有處貧居僻一
時無藥用灸尤便大概蒜用大者取其散毒有力用著
艾炷多者取其火力透也如法灸之瘡發膿潰繼以神
異膏貼之不日而安一則瘡不開大二則內肉不潰三
則瘡口易合見效甚神

辨精要曰始發時用針灸十死八九丹溪曰火以暢達拔



引鬱毒此從治之意因灸而死者蓋虛甚孤陰將絕脈	必浮數而大且鼓精神必短而昏無以抵當火氣故也	豈可泛言始發不可灸以悞人 精要又謂頭上有毒	不得灸恐火拔起熱毒而加病丹溪曰頭為諸陽所聚	艾炷宜小而少小者如椒粒少者三五壯而已若猛浪	如灸腹背炷大數多斯為悞矣 按東垣灸元好問腦	疽以大艾炷如兩核許灸百壯始覺痛而安由是推之	則頭上發毒灸之痛則炷宜小數宜少不痛者炷大數	欽定四庫全書 外科理例	多亦無妨也	經曰陷者灸之如外微覺木硬不痛者是邪氣深陷也	急灸之淺者不可灸又曰淺者有數頭腫痛亦灸之無	妨	竹馬灸法四十九	丹溪曰諸項灸法皆好惟騎竹馬灸法尤為切要此消	患於未形也 先令病人以肘憑几豎臂腕腰直用篾	一條自臂腕中曲紋盡處男左女右貼肉量起直至中



通谷 在足小指外側 本節前陷中 束骨 在足小指外側 本節後陷中 崑崙 在足外側 踝後跟	從背出者當從太陽五穴選用至陰 在足小指外側 爪甲角如韭葉	河間謂灸刺瘡瘍須分經絡部分氣血多少俞穴遠近	論灸刺分經絡五十	暢血脈流通即能奏效起死回生	氣滯則血不行故逆於肉理而生癰灸此穴使心火調	脈所過處經曰諸痛癢瘡瘍皆屬心火又云心主血心	發於左灸左發於右灸右甚則左右皆灸蓋此二穴心	欽定四庫全書 外科理例	癰在何處及乳癰並用此法灸之無不愈者 一云疽	盡處即是灸穴兩穴各灸五壯或七壯不可多灸不問	為則男左女右截為一則就前所點記處兩邊各量開	是取中非灸穴也另用薄篋量病人中指節相去兩橫	盡處直豎竹上貼脊背量至篋盡為則用墨點此只	扶定勿令僵仆却將所量臂腕篋從竹扛坐處尾骶骨	騎定令身正直前後二人扛起令脚不著地又令二人	指尖盡處為則不量指甲却用竹扛一條令病人脫衣



骨上 陷中 委中 在足中央約紋中動脈 從鬢出者當從少陽五穴選用	竅陰 在足小指之次指端去爪甲如韭葉 夾谿 在足小指次指岐骨間本節前陷中 臨泣 在足	小指次指本 節後間陷中 陽輔 在足外踝上四寸輔骨前絕骨端如前三分 陽陵泉 在膝下一	寸外廉 從鬢出者當從陽明五穴選用厲兌 在足大指次指去爪	甲如 韭葉 內庭 在足大指次指外間陷中 陷谷 在足大指間本節後陷中 衝陽 在足趺上五寸	骨間動脈去 陷谷三寸 解谿 在衝陽後一寸五分腕上陷中 從腦出者則以絕骨	一穴 在外踝上三寸動脈中	一說癰疽初發必先當頭灸之以開其戶次看所發分	欽定四庫全書 外科理例	野屬何經脈即內用所屬經脈之藥引經以發其表外用所屬經脈之俞穴針灸以泄其邪内外交治邪無容矣	針法總論五十一	經曰冬則閉藏用藥多而少針石少針石者非謂癰疽也癰疽不得頃時回回者遠也 遠頃時而不瀉則爛筋骨穿臟府矣 又曰癰疽之生膿血之成積微之所生也故聖人自治於未	有形愚者遭其已成也已成膿者唯砭石鉞鋒之所取



也

瘡瘍一科用針為貴用之之際須視其潰之淺深審其肉之厚薄若皮薄針深反傷良肉益增其潰肉厚針淺膿毒不出反益其痛至於附骨疽氣毒流注及有經久不消內潰不痛宜燔針開之若治咽喉當用三稜針若丹瘤及癰疽四畔赤焮疼痛如灼宜砭石砭之去血以洩其毒重者減輕者消

一婦患腹癰膿脹悶脅卧針膿出即蘊

欽定四庫全書

外科理例

一人囊癰膿熟腫脹小便不利幾殆急針膿水大泄氣通而愈

大抵用針迎而奪之順而取之所謂不治已病治未病不治已成治未成此意也今之患者或畏針而不用醫者又徇患者之意而不針遂或潰成而不得潰或得潰而所傷已深灸卒之夭枉十常八九悲夫精要謂癰如椒眼十數頭或如蜂窠蓮房膿血不出者用針橫直裂之如無椒眼之類只消直入取膿不必裂



之一法當椒眼上各各灸之亦佳不必裂也

小兒瘡癰先當溫衣覆蓋令其凝結壅滯血脈溫和則
出血立已不如此血脈凝便針則邪毒不泄反傷良
肉又益其瘡勢也

精要曰癰者皮薄腫高多有椒眼十數粒疽者皮膚頑
硬狀如牛頸之皮癰成膿則宜針針宜用馬御鐵為之
形如薤葉樣兩面皆利可以橫直裂開五六分許攻去
毒血須先灸而後裂 疽成膿則宜烙可用銀篦大二

欽定四庫全書

外科理例

寸長六寸火上燒令赤急於毒上熨烙得膿利為效

又曰一婦病癰在背之左高大而熟未破醫云可烙
傍有老成者曰凡背之上五臟俞穴之所係隔膜之
所近烙不得法必致傷人醫曰但宜淺而不宜深宜
橫而不宜直入恐傷
隔膜宜下而不宜上恐貯
膿血謂此訣儘
無妨也於是燒鐵筋烙之肉破膿出自此而愈當時
直驚人非創子手者不能為也

又曰方其已熟未潰之時用鐵筋一烙極是快意



方扇火欲著時誠是驚人予嘗用矣臨時猶且顫悸
況未曾經歷者乎烙後膿水流通百無所忌名曰熟
瘡其瘡突者針口宜向下然須是熟於用烙者識淺
深知穴道審生熟非其時則所出皆生血當其時則
出黃膿瘀肉用尖針烙者不得法尖針頭細其口易
合惟用平員頭者為妙蓋要孔穴通透或恐瘡口再
合用細牛膝根如瘡口之大小畧割去粗皮插入瘡
口外留半寸許即用嫩橘樹葉地錦草各一握研成
膏傅之牛膝能使惡血常流二草溫涼止痛隨乾隨
換此十全之功也

欽定四庫全書

外科理例

火烙針其針員如筋大如緯挺頭員平長六七寸一
樣二枚撚蘸香油於炭火中燒紅於瘡頭近下烙之
宜斜入向軟處一烙不透再烙必得膿瘡口烙者名
曰熟瘡膿水常流不假按抑仍須絰之勿令口合

論蟬針五十二

蟬針吮出血可施於輕小症候若積毒在臟府徒竭其



血於外無益一兒二歲赤軫取大蜚數條吮其血軫消
予曰非治也三日大熱而死外血去氣不能獨居故
也

論金銀花酒五十三

金銀花生取藤葉一把磁器內爛研入白酒少許調和
稀稠得宜塗敷四圍中心留口以洩毒氣又法取藤
五兩木杵槌碎生甘草節一兩二味以水二碗用砂
瓶文武火煎至一碗入無灰酒一碗再熬十數沸去

欽定四庫全書

外科理例

查分溫三服查敷患處一日夜吃盡病勢重日夜兩
劑服至大小便通利藥力到矣或用乾者終不及生
者力大效速或只用藤五六兩搗爛入熱酒一鍾絞
取汁酒溫服查罨患處四五服而平此藤延蔓附樹
或園圃牆垣之上藤方而紫葉似薜荔而青三月間
花微香蒂帶黃色花初開色白經一二日色黃故又
名金銀花又名鷺鷥藤又名金釵股又名若翁鬚因
藤左纏又名左纏凌冬不彫又名忍冬在處有之治



癰疽發背乳癰初發便當服此不問疽何處皆有奇
効兼麥飯石膏神異膏貼之尤効

論槐花酒五十四

槐花酒 槐花四五兩炒微黃乘熱入酒二鍾煎十餘
滾去查熱服未成者二三服已成者一二服 一人
髀髁患毒痛甚服消毒藥不減飲槐花酒一服勢隨
大退再服托裏消毒藥而愈 一人發背十餘日勢
危脈大先飲槐花酒二服殺其勢退再服敗毒散二

欽定四庫全書

外科理例

劑托裏藥數劑漸潰又用桑柴燒灸患處每日灸良
以仍以膏藥貼之灸至數次膿潰腐脫以托裏藥加
白朮陳皮月餘而愈 一人肩疽脈數用槐花酒一
服勢頓退更與金銀花黃耆甘草十餘服而平
大抵腫毒非用蒜灸及飲槐花酒先去其毒雖服托裏
諸藥其効未必甚速槐花治濕熱之功最為神速但胃
寒人不宜過劑

八味丸治驗五十五



外科理例卷一		治驗數條見前渴論	腎非用附子不可	手足冷或面白或鰲黑或畏寒短氣以上諸症皆屬	腿無力或嚔津或呼吸覺令氣入腹或陰囊濕癢或	或口舌常破如瘡服涼藥盛盜汗不止小便頻數腰	嘗驗人有不耐勞不能食冷或飲食作脹大便不實	欽定四庫全書 外科理例	反用寒藥遂致不救	常赤澁服此而安 一人患脾服此將驗而庸醫阻之	一人貌豐氣弱遇風則眩勞則口舌生瘡膏常有痰目	味丸三料而平 一人脾虛發腫服此丸不半年而康	一人病脾胃服補劑及針灸脾俞等穴不應幾殆服八	命門火衰不能生土遂以八味丸補土之原食進而愈	或作脹或吞酸日漸羸瘦參苓等藥不應右尺脈弱此	一人年踰三十素怯弱不能食冷臂癰愈後飲食少思



欽定四庫全書

外科理例卷二

明 汪機 撰

論十六味流氣飲五十六治無名惡腫癰疽

丹溪曰夫十六味流氣飲乃表裏氣血藥也復以疎風助陽之藥參入非脈之洪緩沈遲緊細者不宜用諸家徃徃不分經絡脈症不具時宜但云消毒化毒又云不退加補氣血藥此又使人不能無疑也

欽定四庫全書

外科理例

論十宣散五十七

經曰諸痛癢瘡瘍皆屬心火言其常也如瘡盛形羸邪高痛下始熱終寒此反常也故當察時下而權治可收十全之功此表裏氣血之藥若用於癰疽初發或已發或內托或身倦惡寒熱少或脈緩濇或弦或緊細宜用之散風寒以助陽乃始熱終寒之變也若施於積熱焮毒更不分經絡時宜不能無懼也

丹溪曰精要謂治未成也速散已成者速潰若用於



輕小症候與冬月時令儘有內托之功冬月腫瘍用之亦可轉重就輕移深於淺夏月潰瘍用之其桂朴之溫散佐以防風白芷雖有參芪亦難倚仗世人用此不問是癰是疽是冬是夏無經絡無前後如盲人騎瞎馬半夜臨深池危哉又曰燥血瀉氣藥太多涉虛者勿輕用一士背醫腿節次生疽率用五香連翹湯十宣散致不救 一人年六十好酒肉背疽與獨參膏十五六斤而愈若用十宣寧保無危

欽定四庫全書

外科理例

論內托散五十八

精要謂一日至三日進十數服防毒氣攻臟府名護心散切詳菴豆解丹毒又言治石毒味甘入陽明性寒能補為君以乳香去惡毒入少陰性溫善竄為佐甘草性緩解五金八石及百藥毒為使想此方專為服丹石發疽者設不因丹石而發疽恐非必用之劑
丹溪曰癰疽因積毒在臟府非一朝一夕治當先助氣壯胃使本根堅固而以行經活血為佐參以經絡時令



使毒外發施治之早可以內消此乃內托之本意

又云

內托散性冷治嘔有降火之理若夫老年者病深諸症
備者體虛者菽豆雖補將有不勝重任之患矣

一婦年七十形實性急好酒冬病腦疽與麻黃桂枝湯
而愈此亦內托豈必皆冷藥哉

論神仙追毒丸五十九

精要曰初成膿宜烙得膿利為効亦服追毒丸

丹溪曰追毒丸下積取毒之藥決無取膿之効今用

欽定四庫全書

外科理例

烙而得膿若在裏而血氣實則膿自出如托不出何
不以和氣活血藥佐以參芪補劑使膿托出也其方
用五倍子消毒殺蟲解風為君山茨菇千金子大戟
皆驅逐走泄為臣佐以射香升散用之以治癰疽實
非所宜果見臟府有積毒或異蟲纏滯深固而體氣
不虛者亦是快藥但戒勿輕用耳

論獨勝散六十

謂癰疽皆緣氣滯血凝或因怒氣所致用香附子去毛



以生姜汁淹一夕研乾為末白湯調服二錢無時	丹溪曰本方謂疽後常服半年尤効此皆施於體實	氣鬱之人也	一人厚味氣鬱形實性重年近六十背疽醫與他藥皆	不行惟飲香附米甚快始終止此一味而安此千百	而一二	論柞木飲子六十一	乾柞木葉 四兩半 乾荷葉中心蒂乾萱草根	欽定四庫全書 外科理例	甘草節地榆 各一兩 細剉每服半兩水	二碗分二服早晚各一服未成者自消膿者自乾	丹溪曰荷蒂去惡血萱根下水解毒利膈柞木有芒	刺能驅逐地榆主下焦血病輕小症候或可以為防托	論阿膠飲子六十二 蠟礬丸 國老膏遠志酒	丹溪曰阿膠飲子以牛膠屬金屬土補肺氣實大腸壯	胃止泄黃蠟丸以蠟味甘淡實大腸補而難化	國老膏以甘草化毒行經遠志酒忍冬酒皆有



補性歸心歸血用之頗切善用者以之配入腫瘍之散結潰瘍之補虛亦奏捷効

論六味車螯散六十三

車螯

四個黃泥煨紅
出火毒研末

瓜蒌仁

新瓦上
炒令香

甘草節

二錢
炒

燈草

三十
莖

右除車螯為粗末作一服用酒二碗煎耗

半碗去查入蜜一大匙和勻調車螯末二錢膩粉少

許空心溫服取下惡物

丹溪曰車螯散一以輕粉為佐一以燈心為佐其散腫

欽定四庫全書

外科理例

消毒下積安詳穩重輕小症候亦可仗之

論飛龍奪命丹六十四

飛龍奪命丹 治疔瘡惡腫初發或發而黑陷毒氣內

陷者

丹溪曰世多用之香竄燥毒之劑無經不至故能宣

泄備汗吐下三法病因食一切禽畜毒發及瘡脈沈

緊細數蘊毒在裏並濕毒用之神効若大熱

大渴毒氣熅發而脈浮洪在表及膏梁積熱之



人未宜輕舉

論加味十全湯六十五

凡治癰疽後補血氣進飲食實為切要蓋膿血出多陰陽兩虛此藥可以回生起死惜其不分經絡時令須在識者觸而長之今醫以腫平痛寬遂以為安漫不加省徃徃於結痂後兩三月或半年虛證乃見醫者不察而加補養之功因而轉成他病者多矣 一人因脚弱詳見後條

欽定四庫全書

外科理例

論五香湯六十六

精要云大凡癰疽不可舍五香湯

丹溪曰吾不知良甫之時有許多大府祕堅病氣鬱塞若是之頑厚可以驟散而大下者耶亦當開陳時之先後症之可否庶乎後人不敢猛浪殺人殊不知些小寒熱或者由其氣血不和而然便以為外感而行表散害人最速

論防風通聖散六十七



此表裏氣血藥也治一切風毒積熱瘡腫脈候弦洪實數浮緊氣血盛實者不可缺此

丹溪曰祕傳以是方加人參黃耆蒼朮赤茯苓金銀花名消腫托裏雖以參耆為主復云人參無亦可則又不能無疑而難用也且臨症加減須較表裏如表症多者當從此方以辛甘為主散之也裏症多者須當從變

論大黃六十八

欽定四庫全書

外科理例

精要云大黃宜熱散毒治癰疽要藥癰疽始作皆須大黃等湯極轉利之排日不廢又曰瘡疽泄利皆是惡候

丹溪曰此皆不能使人無疑借曰用大黃恐因大府祕而病體實有積熱沈痼者發也止可破結導滯推令轉動而已豈可謂極轉利之而且排日不廢耶若下利之後又與利藥恐非防微杜漸之意瘡之始作腫在肌肉若非大滿大堅實之症自當行仲景發表



欽定四庫全書		之法借五香湯為例散之於外可也何必遽用峻下之藥奪其裏哉或曰癰疽用大黃走瀉以去毒孫真入嘗言之良甫祖述其說耳曰孫以盛名行奇術於公卿間者良甫宋人若其交遊亦皆公卿之家肉食之輩故皆捷効今不分貧富苦樂一概用之寧免孟浪之過乎况有心勞而虛者憂怒而虛者強力勞動而虛者大醉飽而虛者皆氣少而澁血少而濁生疽固是難治若大府祕而稍安穀甘淡薄而守戒律猶為可治不免尚費調補苟因旬日半月大府祕實不知亦有其氣不降而然者便以為實而行大黃豈不殺人									
外科理例		論白蠟六十九									
		白蠟稟收斂堅凝之氣外科要藥生肌止痛接骨續筋補虛用合歡樹皮同入長肉膏有神効但未試其可服否合歡皮嘗服之驗矣									
論草麻子七十		附皂角刺 神異膏 麥飯石膏									



草麻子性善收能追膿取毒亦要藥也 皂角刺治癰
疽未破已破能鑽引至潰處 神異膏一說膏藥方甚
多神効無出於此 麥飯石膏膿後圍瘡口一說內冷
惡寒不宜用

論流氣飲十宣散七十一

夫氣血凝滯多因營衛之氣弱不能運散豈可復用流
氣飲以益其虛况各經氣血多少不同心包絡膀胱小
腸肝經多血少氣 三焦膽腎心脾肺少血多氣人年

欽定四庫全書

外科理例

四十以上陰血日衰若於血少經分而病癰腫或脈證
不足當以補接為主丹溪曰腫瘍內外皆壅宜托裏表
散為主乃補氣血藥而加之以行散之劑非專攻之謂
也或者腫焮痛甚煩燥脈大其辛熱之劑不但腫瘍不
可用雖潰瘍亦不可用也 凡患者須分經絡血氣地
部遠近年歲老幼稟氣虛實及七情所感時令所宜而
治之常見以流氣十宣散二藥概治結腫之症以致取
敗者多矣



大抵證有主末治有權宜治其主則末病自退用其
權則不拘於時泥於守常必致病勢危甚况雜用攻
劑動擾各經故丹溪云凡瘡發於一經只當求責本
經不可干擾餘經是也

論敗毒流氣飲七十二

凡治瘡瘍不審元氣虛實病在表裏便服敗毒流氣
等藥蓋敗毒散發表藥也果有表證止宜一二服多則
元氣損毒愈盛雖有人參亦莫能補流氣飲耗血藥也
欽定四庫全書
外科理例
果氣結胸滿只宜二三服多則血反致敗雖有芎歸亦
難倚仗丹溪曰此不係膏梁丹毒之變因虛勞氣鬱所
致也

蠟礬丸七十三

一人肩患毒腫硬作痛惡症遞見用礬末三錢糊丸以
葱白脈實而不斂或不消者下之

瘰癧者結核是也或在耳後耳前或在耳下連及頤
頰或在頸下連缺盆皆謂之瘰癧或在脅及脅之側



熱能散結積瘡症屬陽須少用之寒因熱用也又寒覆其瘡以大辛熱消浮凍之氣或燥煩者去之麥



芽一錢治腹中縮急 兼能消食補胃 柴胡八分說 鼠粘子無腫不用	扶瘻不在少陽 羌活一錢 獨活半錢 防風半錢	陽經藥脊痛項強不可回顧腰似折項似拔者用之 或只用防風一味亦可瘡在膈以上雖無手足太陽	經證亦當用之為能散結去上部風 麴末炒黃二分	病身拘急者風也諸瘡見此症亦用 黃連去毛三分 廣茂三分	昆布二分味大鹹酸能熨 黃連治煩悶	三稜二分煨堅者用之 人參三分補肺氣如氣	之厚朴姜制一錢二分 益智仁二分唾多者胃不和	凡瘡不起者托而起之不成膿者補而成之使不內攻	欽定四庫全書 外科理例	膿成宜及時針之若畏痛而不肯針之又有恐傷良	肉而不肯針殊不知瘡雖發於肉薄之處若膿成其	腫亦高寸餘瘡皮又厚分許用針深不過二分若發	於背腫高必有三四寸針入止於寸許況患處肉已	壞矣何痛之有何傷之慮怯弱之人及患附骨疽待	膿自通必致大潰不能收斂血氣瀝盡而亡者多矣	論痛七十六	上部脈數實而痛者宜降火



上部脈數虛而痛者宜滋陰降火為主

尺部脈數而作渴者滋陰降火 如四物加黃柏知母
大抵瘡之寒熱虛實皆能為痛熱毒痛者藥用寒涼折
之寒邪痛者藥用溫熱散之因風痛者除風因濕痛
者導濕燥而痛者潤之塞而痛者通之虛而痛者補
之實而痛者瀉之膿鬱而閉者開之惡肉侵蝕者去
之陰陽不和者調之經絡閉澀者利之慎勿概用寒
涼之藥蓋血脈喜溫而惡寒若冷氣入裏血即凝滯

欽定四庫全書

外科理例

反難瘡矣又曰大抵瘡疽之症雖發疼痛形勢高大
煩渴不寧脈若有力飲食頗進可保無虞其膿一潰
諸症悉退多有因膿不得外瀉以致疼痛若用敗毒
寒藥攻之反致誤事若有膿急針之膿出痛止膿未
成而熱毒作痛用解毒之藥亦有腐爛尺餘者若無
惡症投以大補之劑肉最易生亦無所妨

論癰疽虛實七十七

瘡瘍之症五善之中見一二善症者可治七惡之內見



一二惡症者難治若虛中見惡症者不救實中無惡
者自愈此症雖云屬火未有不由陰虛而致者故經
云腎經虛從腦出膀胱經虛從背出豈可專泥於火
而用苦寒藥治夫苦寒之藥雖治陽症尤當分表裏
虛實次第時宜豈可始末悉用之

凡瘡腫堅而不澤

不澤不
澤而色天

堅如牛領之皮瘡頭如粟

脈洪大按之則濇此精氣已絕不治亦死

凡癰疽之作皆五臟六腑蓄毒不流非獨榮氣壅塞而

欽定四庫全書

外科理例

發其行也有處其主也有歸假令發於喉舌者心之
毒皮毛者肺之毒肌肉者脾之毒骨髓者腎之毒發
於下者陰中之毒發於上者陽中之毒外者六腑之
毒內者五臟之毒故內曰壞外曰潰上曰從下曰逆
發於上者得之速發於下者得之緩感於六腑者易
治感於五臟者則難治也

發背腦疽大疔懸癰脫疽脚發之類皆由膏粱厚味盡
力房勞七情六淫或丹石補藥精虛氣耗所致非獨



因榮衛凝滯而生也必灸之以拔其毒更辨其因及
察邪在臟腑之異虛實之殊而治之庶無誤也

凡大癰疽藉氣血為主若塌而不起或潰而不腐或不
收斂及膿少或清皆氣血虛也宜大補之最忌攻伐
之劑亦有膿反多者乃氣血虛不能禁止也若潰後
發熱作渴脈大而膿愈多屬真氣虛邪氣實也皆不
治 嘗見氣血充實之人患瘡皆腫高色赤易腐潰
而膿且稠又易收斂怯弱之人多不起發不腐潰及

欽定四庫全書

外科理例

難收斂若不審察妄投攻劑虛虛之禍不免矣

大抵瘡之始作先發為腫氣血鬱積蒸肉為膿故多痛
膿潰之後腫退肌寬痛必漸減若反痛乃虛也宜以
補之有穢氣所觸者和解之風寒所逼者溫散之齊
氏云 名德之元
太醫令 瘡疽之症有臟腑氣血上下真邪虛
實不同也不可辨如腫起堅硬膿稠者實也腫下
軟慢膿稀者虛也瀉痢腸鳴飲食不入嘔吐無時手
足並冷脈弱皮寒小便自利或小便時難大便滑利



聲音不出精神不爽悉臟腑虛也大便秘小便澀飲
食如故腹滿膨脹胸膈痞悶肢節疼痛口苦咽乾煩
躁多渴身熱脈大精神昏塞悉臟腑實也凡諸瘡疽
膿水清稀瘡口不合聚腫不赤肌寒肉冷自汗色脫
者氣血虛也腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱膿水稠
粘頭目昏重氣血實也頭痛鼻塞目赤心驚咽喉不
利口舌生瘡煩渴冷睡語咬牙者上實也精滑不禁
大便自利腰脚沈重睡卧不能者下虛也肩項不便

欽定四庫全書

外科理例

四肢沈重目視不正睛不瞭瞭食不知味音嘶色敗
四肢浮腫者真氣虛也腫焮尤甚痛不可近多日不
潰寒熱往來大便秘澀小便如淋心神煩悶恍惚不
寧者邪氣實也又曰諸痛為實諸癢為虛又曰其脈
洪大而數者實也微細而軟者虛也虛則補之和其
氣血托裏也實則瀉之疏利而導其氣內經謂血實
則決之氣虛則掣引之

潰瘍雖有表症發熱宜以托裏藥為主佐以表散之



劑

論附骨疽七十八

骨疽乃流注之敗症也如用涼藥則內傷其脾外冰其血脾主肌肉脾氣受傷飲食必減肌肉不生血為脈絡血既受冰則血氣不旺而愈滯宜用理脾脾健則肉自生血氣自運行矣 又曰白虎飛尸留連周期或展轉數歲冷毒朽骨出盡自愈若附骨腐者可痊至骨腐則為終身廢疾矣 有毒自手足或頭面腫

欽定四庫全書

外科理例

起或兼疼痛止至頸項骨節去處如癰瘍貫珠此風濕流氣之症也宜加減小續命湯獨活寄生湯主之有兩膝腫痛起或至遍身骨疼痛者此風濕痺又名癰節風宜附子八物湯 又有結核在項腋或兩胯軟肉處名曰癰癰屬冷症也又有小兒宿痰失道致結核於項頸臂膊背之處亦冷症也俱用熱藥敷貼

以上諸症皆原於腎腎主骨腎虛則骨冷而為患



也所謂骨疽皆起於腎亦以其根於此也故用大
附子以補腎氣腎實則骨有生氣而疽不附骨矣
論瘡疽所致之由七十九

若氣血充實經絡通暢決無患者若氣血素虧或七情
所傷經絡鬱結或腠理不密六淫外侵隧道壅塞醫
者須當察其所由辨其虛實庶不誤人

論癰可治不可治八十

發背腦疽脫疽腫痛赤色水衰火旺之色尚可治若黑

欽定四庫全書

外科理例

或紫火極以水之象也乃腎水已竭精氣已涸決不

治

凡腫不高色不赤不焮痛脈無力不飲食腫不潰腐不

爛膿水清或多而不止肌肉不生屬元氣虛也皆難

治宜峻補之或膿血既洩腫痛尤甚膿水敗臭煩躁

時嗽腹痛渴甚瀉利無度小便如淋乃惡症也皆不

治

未成膿不灸膿熟不開腐不去多致不救



腫而一日至四五月未成膿而痛者宜灸至不痛灸而不痛或麻木者明灸之

腫硬不作膿或痛或不痛或微痛或瘡頭如黍者灸之尤効亦有數日色尚微赤腫尚不起痛不甚膿不作者尤宜多灸勿拘日期更服甘溫托裏藥切忌寒涼之劑

瘀肉不腐桑柴火灸之

脈數發熱而痛者發於陽也可治脈不數不熱不痛者

欽定四庫全書

外科理例

發於陰也難治不痛最惡不可視為常疾此症不可不痛不可大痛頓悶者不治

腫瘍八十一

腫高焮痛脈浮者邪在表也宜托之 如內托復煎散

腫硬痛深脈沈者邪在內也宜下之 如黃連內疎湯

仙方活命飲苦參丸

外無焮腫內則便利調和者邪在經絡也宜調和榮衛

托裏榮衛湯白芷升麻輩



燉痛燥煩或咽乾作渴者宜降火 如黃連解毒湯 燉痛發熱或拘急或頭痛者邪在表也宜散之 如荆 防敗毒散人參敗毒散輩 大痛或不痛者邪氣實也隔蒜灸之更用解毒 如仙 方活命飲	煩躁飲冷燉痛脈數者邪在上也宜清之 如清涼飲 或金銀花散	惡寒而不潰者氣實兼寒邪也宜宣而補之 如十宣 散	欽定四庫全書 外科理例	燉痛發熱汗多大渴便秘譫語者結陽症也宜下之 如黃連內疎湯破棺丹輩	不作膿或熱而不潰者虛也宜補之 如補中益氣湯 八物湯 十全大補湯輩	燉痛或不痛及麻木者邪氣盛也隔蒜灸之 腫痛或不作膿者邪氣凝結也宜解之 如仙方活命 飲



腫痛飲冷發熱睡語者火也宜清之 如清心湯或防風通聖散加黃連	不作膿或不潰及不斂者陽氣虛也宜補之 如托裏消毒散 瘡後當調養	患後當調養若癰癰流注之症尤當補益否則更患他症矣必難措治慎之 蠟礬丸 敗毒散 流氣飲	潰瘍八十二	膿熱不潰者陽氣虛也宜補之 如聖愈湯	欽定四庫全書 外科理例	瘰癧肉不腐者宜大補陽氣更以桑柴火灸之 如參芪歸朮	膿清或不斂者氣血俱虛宜大補 如八物湯	潰後食少無睡或發熱者虛也宜補之 如內補黃芪湯	倦怠懶言食少不睡者虛也宜補之 如黃耆人參湯	寒氣襲於瘡口不斂或陷下不斂者溫補之 如十全大補湯



脈大無力或濇微而肌肉遲生者氣血俱虛也峻補之
如十全大補湯

出血成膿多煩燥不眠者乃亡陽也急補之 膿多或
清者血氣俱虛也宜峻補之

右關脈弱而肌肉遲生者宜健脾胃 如六君子湯

膿清補之不應及不痛或木悶及堅硬者俱不治

潰瘍作痛八十三

膿出而反痛者虛也宜補之

欽定四庫全書

外科理例

凡膿潰之後脈濇遲緩者易愈以其有胃氣故也脈細
而沈時直者裏虛欲變症也若痛尚未痊洪滑粗散
者難療以正氣虛邪氣實也

脈數虛而痛者屬虛火宜滋陰 如托裏散加生地黃

脈數實而痛者邪氣實也宜泄之

脈實便秘而痛者邪在內也宜下之 如清涼飲

脈濇而痛者氣血虛寒也溫補之 如定痛托裏散

若有膿為脂膜間隔不出或作脹痛者宜用針引之或



用利刀剪之腐肉堵塞者去之

潰瘍發熱八十四

脈浮或弱而熱或惡寒者陽氣虛也宜補氣 如補中

益氣湯

脈濇而熱者血虛也宜補血 如四物湯 人參養榮

湯

午前熱補氣為主 如四君子湯

午後熱者補血為主 如四物湯

欽定四庫全書

外科理例

脈浮數發熱而痛者邪在表也宜散之 如補中益氣

湯

脈沈數發熱而痛者邪在內也宜下之

東垣云發熱惡熱大渴不止煩燥肌熱不欲近衣服

洪大按之無力或目痛鼻乾者非白虎湯症也此血

虛發熱宜用當歸補血湯又有火鬱而熱者如不能

食而熱自汗氣短者虛也以甘寒之劑瀉熱補氣如

能食而熱口舌乾燥大便難者以辛苦大寒之劑下



之以泄火補水

膿血大泄當大補氣血為先雖有他症以末治之

凡癰大潰發熱惡寒皆屬氣血虛甚若左手脈不足者

補血藥當多於補氣藥右手脈不足者補氣藥當多

於補血藥切不可發表

附餘諸症十五條

論寒熱八十五

大抵七情皆能動火各經之熱亦異當分治之東垣

欽定四庫全書

外科理例

曰晝則發熱夜則安靜是陽氣自旺於陽分也 晝

則安靜夜則發熱煩燥是陽氣下陷入陰中也名曰

熱入血室 晝則發熱煩燥夜亦發熱煩燥是重陽

無陰也當急瀉其陽峻補其陰 王註曰病熱而脈

數按之不動乃寒盛格陽非熱也 形症是寒按之

而脈鼓擊於指下而盛者此謂熱盛拒陰非寒也傷

寒論曰寸口脈微為陽不足陰氣上入陽中則洒淅

惡寒 尺脈弱為陰不足陽氣下陷入陰中則發熱



也 肺熱者輕手乃得微按全無日晡熱甚乃皮毛
之熱其症必見喘欬寒熱輕者瀉白散重者涼膈散
地骨皮散 心熱者微按至皮膚之下則熱少加力
按之則不熱是熱在血脈也其症煩悶心痛掌中熱
而噦以黃連瀉心湯導赤散硃砂安神丸 脾熱者
輕按之不熱重按之亦不熱不輕不重熱在肌肉遇
夜尤甚其症必怠惰嗜卧四肢不收無氣以動瀉黃
散 肝熱者重按之肌肉之下至骨之上乃熱寅卯

欽定四庫全書

外科理例

時間尤甚其脈弦四肢滿悶便難轉筋多怒多驚四
肢困熱筋痿不能起於牀瀉青丸柴胡引子 腎熱
者重手按至骨分其熱蒸手如火其人骨蒸又如蟲
蝕其骨困熱不任亦不能起於牀滋腎丸主之 徐
用誠云面熱者足陽明 口中熱如膠足少陰 口
熱舌乾足少陰 耳前熱手太陽 掌中熱手厥陰
少陰太陰 足下熱而痛足少陰 足外熱足少
陽 身熱膚痛手少陰 身前熱足陽明 洒淅



寒熱手太陰 肩上熱肩似拔手太陽 中熱而喘
足少陰 肩背熱及足小指外腠脛踝後皆屬足太
陽 一身盡熱狂而妄聞妄見妄言足陽明 熱而
筋縱緩不收足痿足陽明厥陰手少陰

丹溪曰惡寒者衛氣虛衰不能溫分肉實表而惡寒者
又有上焦之邪隔絕營衛不能升降出表而惡寒者
東垣云晝則惡寒夜則安靜是陰氣上溢於陽中也
夜則惡寒晝則安靜是陰血自旺於陰分也夜則惡

欽定四庫全書

外科理例

寒晝亦惡寒是重陰無陽也當急瀉其陰峻補其陽

七情所傷

經云神傷於思慮則肉脫 意傷於憂愁則肢癢
魂傷於悲哀則筋攣 魄傷於喜樂則皮槁 志傷
於盛怒則腰脊難以俯仰也七情所傷氣血所損之
症也當先滋養血氣

論精血

夫月水之為物乃手太陽手少陰二經主之此二經



相為表裏在上為乳汁下為月水為經絡之餘氣苟
外無六淫所侵內無七情所傷脾胃之氣壯則衝任
之氣盛故為月水適時而至然面色痿黃四肢消瘦
發熱口乾月水過期且少乃陰血不足也非有餘瘀
悶之症宜以滋養血氣之劑徐而培之則經氣盛而
經水自依期而下

又云精未通而御女以通其精則四體有不滿之處
異日有難狀之疾陰已痿而思色以降其精則精不

欽定四庫全書

外科理例

出而內敗小便道澀而為淋精已耗而復竭之則大
小便道牽疼愈疼則愈欲大小便愈便則愈疼女人
天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年思男
子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或潰而入
骨或變而為腫或雖合而難子合男子多則瀝枯虛
又產乳衆則血枯殺人觀其精血思過半矣又曰夫
人之生以血氣為本人之病未有不先傷其氣血者
世有室女童男積想在心思慮過當多致勞損男子



則神色先散女子則月水先閉何以致然蓋憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭則神色先散而月水先閉也火既受病不能營養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧故發嗽嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒鬢髮焦筋骨痿俟五臟傳遍故卒不能死然終死矣此一種於勞中最難治蓋病起於五臟之中無有已期藥力不可及也若或自能改易心志用藥扶接如此則可得九死一生

欽定四庫全書

外科理例

又云室女月水以不行切不可用青蒿等涼劑醫家多以室女血熱故以涼藥解之殊不知血得熱則行冷則凝養生必用方言之甚詳此說大有理不可不知若經候微少漸漸不通手足骨肉煩疼日漸羸瘦漸生潮熱其脈微數此由陰虛血弱陽往乘之少水不能滅盛火火逼水涸亡津液當養血益陰慎无以毒藥通之毒藥慄悍甚助陽火陰血得之則妄行脾胃得之則愈虛惟宜栢子仁丸澤蘭丸



論水腫八十八

月水不通以則血結於內生塊變為血瘕亦作血瘕
血水相併壅塞不通脾胃虛弱變為水腫所以然者
脾候身之肌肉象於土土主剋水水血既併脾氣衰
弱不能剋消致水氣流溢浸漬肌肉故腫滿也觀此
豈宜用剋伐之劑

論婦人病八十九

婦人性情執滯不能寬解多被七情所傷遂致遍身

欽定四庫全書

外科理例

作痛或肢節腫痛或氣填胃滿或如梅核塞喉嚨吐
不出或痰涎壅盛上氣喘急或嘔逆惡心甚者渴悶
欲絕產婦多有此症宜服四七湯先調滯氣更以養
血之藥若因思憂致小便白濁者用此藥吞青州白
丸子屢効

論婦人熱勞九十

婦人熱勞者由心肺壅熱傷於氣血氣血不調臟腑
壅滯熱毒內積不得宣通之所致也其候心神煩燥



頰赤頭痛眼澁神昏四肢壯熱煩渴不止口舌生瘡
神思昏沈嗜臥少寐飲食無味舉體酸疼或時心怔
或時盜汗肌膚日漸消瘦故名熱勞也

自汗忌利小便九十一

自汗小便少不可以藥利之既已自汗則津液外亡
小便自少若利之則榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚
當俟熱退汗止小便自行也兼此症乃陽明經大忌
利小便

欽定四庫全書

外科理例

論下血九十二

下血服涼血藥不應必應中氣虛不能攝血非補中
升陽之藥不能愈切忌寒涼之劑亦有傷濕熱之食
成腸癖而下膿血者宜苦寒之劑以內疎之脈弦絕
濇者難治滑大柔和者易治

論血崩九十三

婦人崩中由臟腑傷損衝任二脈血氣俱虛故也二
脈為經脈之海血氣之行外循經絡內營臟腑若氣



血調適經下依時若勞動過極臟腑俱傷衝任之氣
虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中治宜大
補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心
補陰瀉陽經自止矣

論治病不可責効太速九十四

凡治病若患者責効太速及不戒七情或藥不分經
絡虛實俱難治

論寡婦病九十五

欽定四庫全書

外科理例

寡婦之病自古未有言者惟倉公與褚澄畧而論及
寡者言師尼喪夫之婦獨居無陽欲男子而不可得
是以鬱悒而成病也夫處閨門欲心萌而未遂致陰
陽交爭乍寒乍熱有類癰疾以則為勞又有經閉白
淫痰逆頭風膈氣痞悶面黧瘦瘠等症皆寡之病胗
其脈獨肝脈弦出寸口而上魚際皆血盛而得經云
男子精盛則思室女人血盛則懷胎是也

論痿與柔風脚氣相類九十六



人身有皮毛血脈筋膜肌肉骨髓以成其形內則有心肝脾肺腎以主之若隨情妄用喜怒勞佚致內臟精血虛耗使皮血筋骨肉痿弱無力以運動故致痿躄狀與柔風脚氣相類柔風脚氣皆外所因痿則內臟不足之所致也

論病犯不治九十七

飲食不為肌膚水谷不能運化精微灌溉臟腑週身有脈神將何依故氣短而促真氣損也怠惰嗜卧脾

欽定四庫全書

外科理例

氣衰也小便不禁膀胱不藏也時有燥熱心下虛痞胃氣不能上榮也恍惚健忘神明亂也犯此數者病皆不治

論脚氣九十八

若飲食自倍脾胃乃傷則胃氣不能施行脾氣不能四布故下流乘其肝腎之虛以致足腫加之房事不節陽虛陰盛遂成脚氣亦有內傷食脾胃之氣有虧不能上升則下注為脚氣者宜用東垣開結導引丸



開導引水運化脾氣如脾氣虛濕氣壅遏不通致面
目發腫或痛者宜用導滯通經湯以疎導之

脚氣由腎虛而生然婦人亦有病脚氣者乃因血海
虛而七情所感遂成斯疾今婦人病此亦衆則知婦
人以血海虛而得之與男子腎虛類也男女用藥同
無異更當兼治七情無不効也脚氣雖云腫有淺深
感有輕重其所受皆因真氣虛弱邪氣得以深襲若
真氣壯實邪氣焉能為患耶故附骨疽及鶴膝風症
腎虛者多患之前人用附子者以溫補腎氣而又能
行藥勢散寒邪也

欽定四庫全書

外科理例

凡濕痰濕熱或死血流注關節非辛溫之劑開發腠
理流通隧道使氣行血和焉能得愈但人謂附子有
毒多不肯服若用童便炮製何毒之有況不常服何
足為慮予中氣不足以補中益氣湯加附子服之三
年何見其毒也經云有是病用是藥也故大防風湯
活絡丹治脚氣鶴膝風症多効



活絡丹 夫病深伏在內非此藥莫能通達但近代
始云此藥引風入骨如油如麵之說故後人多不肯
服

大抵有是病用是藥豈可泥此言以致難瘥

論表虛及小便多少肺癰肺痿九十九

經曰肺內主氣外司皮毛若肺氣虛則腠理不密皮
毛不澤肺受傷則皮毛錯縱故患肺癰肺痿腸癰必
致皮毛如此以其氣不能榮養而然也亦有服表藥

欽定四庫全書

外科理例

見邪不解又復發表殊不知邪不解者非邪不能解
多因腠理不密而邪復入也專用發表則腠理愈虛
邪愈易入反為敗症矣宜診其脈邪在表者止當和
解而實腠理乘虛復入者亦當和解兼實腠理故用
托裏益氣之藥若小便赤澀為肺熱所傳小便短少
為肺氣虛蓋肺為母腎為子母虛不能生子故也亦
有小便頻數者亦為肺虛不能約制耳

大抵勞傷血氣則腠理不密風邪乘肺虛風熱相搏



欽定四庫全書										外科理例									
外科理例卷二										鬱滯結不散以致喘嗽若誤汗下過度則津液重亡 遂成肺癰肺痿之症矣 楠按以上一十五條原係後病案中忽發揮者雖 非外科以其議論有切於雜症不敢脫畧故采附 諸論之後俾學者以便觀覽									



欽定四庫全書

子部
外科理例卷三

詳校官太醫院吏目_臣宋杜

編修_臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士_臣何思鈞

校對官助教_臣胡子襄

謄錄監生_臣王時發



欽定四庫全書

外科理例卷三

明 汪機 撰

頭面赤腫一百

裏實而不利者下之

表實而不解者散之

表裏俱實而不解者解表攻裏

表裏俱解而不消者和之

欽定四庫全書

外科理例

腫甚焮痛者砭去惡血更用消毒之劑

不作膿或不潰者托之

飢年普患者不宜用峻利當審而治之

時毒者爲四時邪毒之氣感之於人也其候發于鼻

面耳項咽喉赤腫無頭或結核有根令人增寒發熱

頭痛或肢體痛恍惚不寧咽喉閉塞人不識者將爲

傷寒便服解藥一二日腫氣益增方悟始求瘡醫原

夫此疾古無方論世俗通爲丹瘤病家惡言時毒切



恐傳染考之經曰人身忽經變赤狀如塗丹謂之丹毒此風熱惡毒所為與時毒特不同耳蓋時毒初狀如傷寒五七日間乃能殺人治者宜精辨之先論其脉滑數浮洪沉緊弦濇皆其候蓋浮數者邪在表也沉濇者邪氣深也氣實之人急服化毒丹以攻之熱實不利大黃湯下之有表証者解毒升麻湯以發之年高氣軟者五香連翹湯主之又于鼻內搐通氣散取十餘嚏作効若搐藥不嚏者不可治如嚏出膿者

欽定四庫全書

外科理例

治之必愈左右之人每日用嚏藥搐之必不傳染其病人亦每日用嚏藥三五次以泄熱毒此治時毒之良法也經三四日不解者不可大下猶宜和解之犀角連翹散之類至七八日大小便通利頭面腫起高赤者可服托裏散黃芪散宜針鏃出血泄其毒氣十日外不治自愈也此病若五日已前精神昏亂咽喉閉塞語聲不出頭面不腫食不知味者必死治之無功矣然而此病有陰有陽有可汗有可下粗工但云



熱毒就用寒藥殊不知病有微甚治有逆從不可不審也

一人頭面腫痛服硝黃敗毒之劑愈甚診之脉浮數邪在表尚未解用荆防敗毒散二劑勢退大半更以葛

根牛旁子湯四劑而痊

此憑脉發表

經云身半已上腫天之氣也身半已下腫地之氣也乃邪客心肺之間上攻頭目而為腫此感四時不正之氣也與膏梁積熱之症不同硝黃之劑非大便秘實

欽定四庫全書

外科理例

不可用若不審其因及辨其虛實表裏概用攻之必致有悞常見飢饉之際藟藟之人多患之乃是胃氣有損邪氣從之不可不察予常治邪在表者用葛根牛旁子湯人參敗毒散或普濟消毒飲子邪在裡者五利大黃湯梔子仁湯表裏俱不解者防風通聖散表裏俱解而腫不退者犀角升麻湯腫甚者砭患處出惡血以泄其毒十日外自愈若嘔出膿血即愈欲其作膿者用托裏消毒散欲其收斂者用托裏散此



法最為穩當五七日咽喉不開言語不出頭面不腫 食不知味者不治
一人患此腫痛發熱作渴脉實便閉以五利大黃湯下 之諸症悉退以葛根牛旁子湯四劑而痊
此憑脉 攻裏
一人表裏俱解腫痛尚不退以葛根升麻湯二劑而消
此憑 症也
一人腫痛發寒熱脉浮數以荆防敗毒散二劑少愈再 人參敗毒散二劑勢減半又二劑而瘥
此憑脉 發表
欽定四庫全書 外科理例
一人耳面赤腫作痛咽乾發熱脉浮數先以荆防敗毒 散二劑勢退大半又以葛根牛旁子湯四劑而瘥
憑脉
表發
一婦表邪已解腫尚不消診之脉滑而數乃瘀血作膿 也以托裏消毒散潰之而愈
此憑脉托 裏消毒也
一人焮腫脹痛作渴煩熱便秘脉數按之尤實用防風 通聖散一劑諸症頓退以荆防敗毒散加玄參牛旁黃
芩二劑而差
此憑症憑脉 發表攻裏



一老冬月頭面耳項俱腫痛甚便秘脉實此表裏俱實	也飲防風通聖散不應遂砭患處出黑血仍投前藥	即應又服荊防敗毒散而瘰蓋前藥不應者毒血凝	聚上部經絡藥力難達故也惡血既去其藥自効或	拘用寒遠寒及年高畏用硝黃而用托裏與夫尋常	消毒之劑或不砭泄其毒專假藥力鮮不危矣	症	一人表裏俱解惟腫不消以托裏消毒散四劑膿成針	欽定四庫全書 外科理例	之而愈	一婦腫痛用硝黃之劑攻之稍緩翼日復痛診之外邪	已退此瘀血欲作膿也用托裏消毒散潰之而愈	脉與 症也	一人表散藥愈熾發熱便秘診脉沈實此邪在裏也以	大黃湯下之裡症悉退以葛根牛旁子湯浮腫亦消	惟赤腫尚存以托裏藥潰之而愈	一人冬月病頭面赤腫耳前後尤甚痛不可忍發熱惡



寒牙關緊急涕唾稠粘飲食難下不得安卧醫砭腫 上四五十針腫赤不減痛益甚予診其脉浮緊按之 洪緩知爲寒覆皮毛鬱遏經絡熱不得升聚而赤腫 且夫天令寒冷之時腠理閉汗不出血氣強肉堅濇 善用針者不得取四厥必待天溫又云冬月閉藏用 藥多少針石也宜以苦溫之劑溫經散寒所謂寒繳 腠理以苦發之以辛散之									
方名									
托裏溫經湯									
麻黃 苦溫發之爲君 防風 辛溫散之 升麻 苦辛 葛根									
甘平解肌出汗專治 白芷 歸身 血流行則痛白芷									
陽明經邪故以爲臣 蒼術 濕熱則腫蒼術甘溫體輕浮力 人參 去芦									
滯各 甘草 甘溫 白芍藥 酸微寒調中益氣使									
二錢 右剉每服一兩水二盞先煎麻黃令沸去沫再下餘									
藥同煎至一盞去渣大溫服訖以薄衣覆首厚被覆									
身卧煖處使經血溫腠理開寒乃散陽氣升大汗出									



腫減七八分再服去麻黃防風加連翹鼠粘子腫痛
悉愈經言汗之則瘡已信哉

或曰仲景言瘡家雖身痛不可汗何也予曰此言營
氣不從逆于肉理乃主癰腫而作身痛則非外感寒
邪作痛故戒不可汗汗之則成瘡又問仲景言鼻衄
者不可汗復言脉浮緊者以麻黃湯發之衄血自止
何也予曰血與汗異名同類奪汗者無血奪血者無
汗今衄血妄行爲熱所逼更發其汗反助邪熱重竭

欽定四庫全書

外科理例

津液必變凶症故不可汗若脉浮爲在表緊則爲寒
寒邪鬱遏陽不得伸熱伏榮中迫血妄行上出于鼻
故用麻黃湯散其寒邪陽氣得舒其衄自止潔古之
學可謂知其要矣

泰和二年四月民多疫癘初覺增寒體重次傳頭目腫
盛目不能開上喘咽喉不利舌乾口躁俗云大頭天行
親戚不通染之多殆

一人病此五六日醫以承氣加藍根下之稍緩翼日其



病如故下之又緩終莫能愈漸至困篤予曰身半已上天之氣也身半已下地之氣也此邪熱客于心肺之間上攻頭目腫盛以承氣瀉胃中之實熱是誅罰無過不知病源之所為故遂用	黃連 黃芩 味苦寒各半兩泄心肺間熱為君 橘紅 苦平 玄參 苦寒	生甘草 甘寒各二錢 人參 三錢泄火補氣為臣 連翹 鼠粘子	薄荷葉 苦辛平 板藍根 苦寒 馬勃 各一錢 白僵蠶 炒七分 升麻	柴胡 苦平各二錢行少陽陽明二經氣不得伸 桔梗 辛溫為舟楫不使下行	欽定四庫全書 外科理例	共為細末半用湯調時時服之半用蜜丸噙化服盡良愈凡他處有病此者書方貼之名曰	普濟消毒飲 或加川芎歸身咬咀如麻豆每服五	錢水二鍾煎至一鍾去滓食後稍熱時時服如大便	硬加大黃 酒煨一錢或二錢 以利之腫勢甚宜砭刺之	按時行疫疾雖由熱毒所染有氣實人下之可愈氣虛者概下之鮮不危矣故東垣製此方救斯人其惠	博哉



一人年踰三十肩患毒服人參敗毒散一劑更服十宣散去參桂加金銀花天花粉四劑而潰因怒動肝火風熱上壅頭面赤腫焮痛飲冷以荆防敗毒散加芩連薄荷二劑不應急砭患處出黑血琰許仍以一劑勢退大半再服人參敗毒散四劑而愈 夫病有表裏上下之殊治有緩急攻補之異若不砭刺氣血結爲肉理藥不能及腫焮日盛使峻利之藥則上熱未除中寒已作必傷命矣	欽定四庫全書 外科理例	升麻牛旁子散 治時毒瘡發頭面胸膈脉浮洪在表者	升麻 牛旁 甘草 桔梗 葛根	玄參 麻黃 連翹 各一錢	剉作一服姜三片水二盞煎	一黃門腮赤腫痛此胃經風熱上攻以犀角升麻湯三六二劑而平又一大理患此用前湯爲人所惑謂湯內白附子性溫故也另用荆防敗毒散愈盛後用此



湯尚去白附子不應再用全方三劑而愈	本草云白附子味甘辛氣溫無毒主面上百病及一	切風瘡乃風熱之主藥經曰有是病用是藥苟不用	主病之藥安得而愈	一人腮頰腫焮至于牙齦右關脉數此胃經風熱上攻	也治以犀角升麻湯三六而消	瘰癧百一	腫痛脉浮數者祛風清熱	欽定四庫全書 外科理例	脉濇者補血為主	脉弱者補氣為主	腫硬不潰者補血氣為主	鬱抑所致者解鬱結調氣血	潰後不斂者屬氣血俱虛宜大補	虛勞所致者補之	因有核而不斂者腐而補之	脉實而不斂或不消者下之



氣一錢反活枯皮毛實膝理補表之元 白芍藥 寒三分補中益肺	芎二分 牡丹皮 諸經中和血生血涼血滯血三味 黃芪	藥連翹一錢 神藥十二經瘡藥不可無 歸身三分熟	升麻一錢 葛根半錢 真漏蘆 三味俱足陽明本經	之	乃足陽明經分受心脾之邪而作宜將二症合而治	至肩或入缺盆乃手足少陽經分其在頰下或頰車	救苦化堅湯瘰癧瘰癧馬刀挾癭或耳下或耳後下頸	欽定四庫全書 外科理例	生稍久轉為潮熱危矣自非斷欲神仙不治也	有相火且氣多血少婦人見此若月經不調寒熱變	須分虛實實者易治虛者可慮以其屬膽經主決斷	之厚鬱氣之積曰毒曰風曰熱皆此三端拓引變換	瘰癧必起于少陽一經不守禁忌延及陽明大抵食物	或在兩脇皆謂之馬刀手足少陽主之	領或在頸下連缺盆皆謂之瘰癧或在胸及胸之側	瘰癧者結核是也或在耳後耳前或在耳不連及頤



氣散而不收故用酸寒以收散氣散痛必用夏	月倍之冬寒下用酸寒故也又治腹中不和	肉桂	三分大辛熱能散結積瘡症屬陽須少用之寒因熱	用也又寒覆其瘡以大辛熱消浮凍之氣或躁煩者	去麥芽	一錢治腹中縮急	柴胡	八分說	鼠粘子	無腫	之麥芽	兼能消食補胃	獨活	半錢	防風	三味	少陽經矣去此二味	乃手足大陽經藥脊痛項強不可回顧股似	援者用之或只用防風一味亦可瘡在膈已上雖無	手足太少經症亦當用之為能散結去上	部風病身拘急者風也諸瘡見此症亦用	麵末	炒分	化為消	昆布	一分味大鹹酸能要	黃連	去毛三分	廣茂	三分	三稜	硬甚者用之不甚勿用人參	如氣短氣喘
欽定四庫全書																																	
外科理例																																	
氣下調	厚朴	薑制一錢二分	益智仁	二分唾多者胃	吐食胃土	黃栢	炒三分有熱或脚膝無力加之或煩	寒者加之	甘草	炙五分或二分調中益胃泄火和諸藥分兩不	定者瘡宜瀉營氣而甘入脾胃生濕助瘡邪故	也	右為細末湯浸蒸餅和作餅子日乾搗如米粒每服																				
二錢或三錢白湯下量病人虛實無令藥多妨其飲		食此治之大法也		如在少陽經分為馬刀挾癭者去獨活漏蘆升麻葛根																													



加瞿麥 三分 氣不順加橘皮甚者加木香 少許 人素	氣弱若病來氣盛不短促者不可拘其平素只作盛	氣治之而從病變之權邪在上焦加黃芩 一半酒制	在中焦加黃連 一半酒制 在下焦加黃栢知母防己	皆酒制選用之大通不通滋其邪盛急加酒大黃以	利之	如血燥不行加桃仁酒大黃如風結燥不行加麻仁	大黃風澁不行加煨皂角仁秦艽大黃如脉瀯覺身	欽定四庫全書 外科理例	氣滯不行加郁李仁大黃以除氣燥如陰寒秘結不	行以局方半硫 或加附子乾薑冰冷與之	大抵諸病素氣弱者當去苦寒之藥多加參耆甘草之	類泄火而補元氣少佐寒涼可也	散腫潰堅湯 治馬刀堅硬如石在耳下至缺盆或	肩上或脇下皆手足少陽經分或頰或頰車堅硬如	石在足陽明經分或二經瘡已破流膿並皆治之	柴胡 四錢 升麻 三錢 甘草 炙 歸尾 葛根



白芍 各二錢 黃連 一錢 三稜 酒制 連翹 各三錢 昆布 去土	知母 酒制 黃栢 酒制 土瓜根 酒制 草龍膽 酒制 桔	梗 各半 黃芩 八錢 廣茂 酒制	右剉每服五錢或七錢水二盞八分浸大半日煎至	一盞熱服卧宜去枕頭低脚高每噙一口作十次嚥	留一口送下後項丸藥服畢卧如常取藥在膈上停	畜故也若能食糞硬者旋加作七八錢止可秤半料	作末煉蜜丸如菉豆大每服百丸或二百丸此制之	欽定四庫全書 外科理例	緩也 一方	海藻 昆布 二味洗淨焙乾爲末何首烏木白	搗末皂角刺炒黃色 公蛇退一條樹上墻上者是	右五味爲末用猪項下刀口肉燒熟醮藥末吃食從	向患處一邊側卧一伏時每核上灸七壯烟從口中	出爲度膿盡即安	連翹散堅湯 治耳下或肩上及缺盆瘡硬如石動	之無根或生兩脇或已膿流作瘡未破此手足少陽



經分也		柴胡 一兩 歸尾 酒制 黃芩 生 廣茂 酒炒 三稜 酒炒
連翹		芍藥 各半 黃連 酒炒 蒼朮 各二 土瓜根 一
炒草龍膽 一兩 黃芩 酒炒 甘草 三錢		
右秤一半蜜丸一半剉煎如前法服		
柴胡連翹湯 治男婦馬刀瘡		
黃芩 炒 知母 酒制 連翹 柴胡 各半 中桂 三分		
甘草 炙 黃栢 酒制 生夏 各三 歸尾 錢半 瞿麥穗 六錢		
欽定四庫全書		外科理例
鼠粘子 二錢		
剉如麻豆每服五錢或三錢水二盞煎一盞食後稍		
熱時服之		
柴胡通經湯 治小兒項側有瘡堅而不潰名曰馬		
刀		
柴胡 歸尾 桔梗 甘草 生 連翹		
三稜 鼠粘子 黃芩 各二 紅花 少許 黃連 五		
分		



剉作一服二大盞煎一盞食後稍熱服忌苦藥泄大便	項上瘰癧馬刀將初生者用四稜鐵環按定作口子以油紙撚絛之勿令合了以絕其瘡之源其効至速如	瘰不破或畏破以龍泉粉塗	龍泉粉炒半潤瓦粉各半昆布去土三錢廣茂酒制	三稜酒制炒	右細末熟水調塗之用此去疾尤速一二日一易龍	欽定四庫全書 外科理例	泉粉即磨刀水濃汁青石者佳	瘰癧馬刀血少肚泄	四物湯加芍藥炒牡蠣細研陳皮柴胡甘	草黃連玄參神麴炒及桑椹膏	桑椹膏取極熟黑色者二斗以布濾取自然汁砂器內文武火慢熬成薄膏每日白湯點一匙	服	夏枯草本草言大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脉之



功而經亦言觀其能退寒熱虛者可伏實者以行散之藥佐之外以艾灸亦漸取効

一婦患瘰癧延至胸腋膿水淋漓日久五心煩熱肢體

疼痛頭目昏重心忪頰赤口乾咽燥發熱盜汗食少

嗜卧月水不調臍腹作痛予謂血虛而然非疔故也

服逍遙散_三月餘少可更服八珍湯_四加牡丹皮香

附子又月餘而經通再加黃芪白斂兩月餘而愈_{此憑}

也症

欽定四庫全書

外科理例

一婦久患瘰癧不消自汗惡寒此血氣俱虛服十全大

補湯_三月餘而潰然堅核雖取瘡口不斂灸以豆豉

餅_一仍與前藥加香附烏藥兩月而愈_{此憑症也}

一人勞倦耳下焮腫惡寒發熱頭疼作渴右脉大而軟

當服補中益氣湯彼自用藥發表遂致嘔吐始信予

用六君子湯_二更服補中益氣湯_六而愈_{此憑症也}

大抵內傷榮衛失守皮膚間無氣滋養則不任風寒

胃氣下陷則陰火上衝氣喘發熱頭痛脉大此不足



證也誤作外感表實而反瀉之寧免虛怯之禍東垣云內傷右脉大外感左脉大當以此別之

機按左脉大屬外感此亦難憑必須察形觀色審症參之以脉乃得不誤丹溪治一老人飢寒作勞患頭疼發熱惡寒骨節疼無汗妄語脉洪數而左甚治以參芪歸朮陳皮甘草每貼加附一片五貼而愈

又一少年九月間發熱頭痛妄語大渴形肥脉數大左甚以參朮君茯苓臣耆佐附一片使蓋人肥而脉

欽定四庫全書

外科理例

左大于右事急矣非附則參芪無捷効五十貼大汗而愈此皆左脉大丹溪悉以內傷治之若依東垣認作外感寧不殺人

一婦年二十耳下結核經每過期午後頭痛服頭痛藥

愈甚治以八珍湯十加柴胡地骨皮二十餘貼愈此

症也

一婦癰潰後發熱煩燥作渴脉大無力此血虛也以當歸補血湯六劑頓退又以聖愈湯數劑少健加以八



珍湯加貝母遠志三十餘劑而斂

此憑脉也

一癰婦四肢倦怠類痿症以養氣血健脾胃而愈

此憑症也

一人素弱潰後核將不腐此氣血皆虛用托裡養榮湯

氣血復核尚在以簪挺撥去又服前藥月餘而痊

此憑症也

症也

一人患嗽痰盛胸膈痞悶脾胃脉弦此脾土虛肝木乘

之也當實脾土伐肝木為主彼以治痰為先乃服苦

寒化痰藥不應又加破氣藥病愈甚始用六君子湯

欽定四庫全書

外科理例

加芎歸數劑飲食少思以補中益氣湯倍加白朮月

餘中氣少健又以益氣養榮湯四月腫消而血氣亦

復矣夫右關脉弦弦屬木乃木盛而尅脾土為賊邪

也虛而用苦寒之劑是虛虛也况痰之為病其因不

一主治之法不同凡治痰利藥過多則脾氣愈虛虛

則痰愈易生如中氣不足必用參朮之類為主佐以

痰藥

此憑症與脉也

一人久而不斂神思困倦脉虛予欲投以托裡彼以為



迂乃服散腫潰堅湯半月餘果發熱飲食愈少復求
治投益氣養榮湯三月喜其謹守得以收救此憑症
齊氏曰結核癰癰初覺宜內消之如經久不除氣血
漸衰肌寒肉冷或膿汁清稀毒氣不出瘡口不合聚
腫不赤結核無膿外症不明者並宜托裡膿未成者
使膿早成膿已潰者使新肉早生血氣虛者托裡補
之陰陽不和托裡調之大抵托裡之法使瘡無變壞
之症所以宜用也

欽定四庫全書

外科理例

一人久而不斂膿出更清面黃羸瘦每侵晨作瀉與二
神丸數服泄止更以六君子加芎歸月餘肌體漸復
灸以豆豉餅及用補劑作膏藥貼之三月餘而愈此憑
也症

一婦潰後核不腐以益氣養榮湯三十餘劑更敷針頭
散腐之再與前湯三十餘劑而斂此憑
症也

一人患而腫硬久而不消亦不作膿服散堅毒藥不應
令灸肘尖看尖二穴更服益氣養榮湯月餘而消此憑



也 症	一人尚硬亦灸前穴飲前藥膿成針之而斂	一婦久潰發熱月經過期且少用逍遙散兼前湯兩月	餘氣血復而瘡亦愈但一口不收敷針頭散更灸前	穴而痊	常治二三年不愈者連灸三次兼用托裡藥即愈	條俱 憑症	一人患此腫痛發寒熱大便秘以射干連翹散六劑熱	欽定四庫全書 外科理例	退大半以仙方活命飲四劑而消	一婦肝經積熱患而作痛脉沉數以射干連翹湯四劑	少愈更用散腫潰堅九月餘而消	一婦耳下腫痛發寒熱與荆防敗毒散四劑表症悉退	以散腫潰堅湯數劑腫消大半再以神效瓜蒌散	四劑而平	一人肝經風熱耳下腫痛發熱脉浮數以薄荷丹治之	而消



一人年二十耳下患癰焮痛左關脉數此肝經風熱所致以荆防敗毒散 ^七 三貼表症悉退再與散腫潰堅	丸 ^四 八月餘平復 ^{此憑脉也}	一婦因怒耳下腫痛以荆防敗毒散 ^七 加連翹黃芩四劑而愈 ^{此無脉症而用發表必有所見也}	嘗治此旬日不消者以益氣血藥及飲遠志酒並効無膿自消有膿自潰	一婦因怒耳下焮痛頭痛寒熱以荆防敗毒 ^七 加黃芩	欽定四庫全書 外科理例	表証悉退但飲食少思日脯發熱東垣云雖有虛熱不可大攻熱去則寒起遂以小柴胡加地骨皮芎歸芩朮陳皮十餘貼而愈次年春復腫堅不潰用八珍湯 ^{四十} 加香附柴胡地骨皮桔梗服至六七貼以為延緩仍服人參敗毒散勢愈盛又服流氣飲則盜汗發熱口乾食少至秋復求診視氣血虛極辭之果沒 ^{此憑也}	一人每怒耳下腫或脇作痛以小柴胡湯加青皮紅花



桃仁四劑而愈 此憑症也	一人腫硬不作膿脉弦而數以小柴胡湯兼神効瓜蒌散 一五各數劑及隔蒜灸數次月餘而消 此憑脉與症也	一婦頸痛不消與神効瓜蒌散 一五六劑少愈更以小柴	胡加青皮枳殼貝母數劑痛腫減大半再以四物對	小柴胡數劑而平 此憑症也	羅宗伯耳後髮際患毒焮痛脉數以小柴胡 三加桔梗	牛旁子金銀花四劑而愈 此憑脉症也	欽定四庫全書 外科理例	一人氣血已復核尚不腐用針頭散及必効散各三次	不旬日而愈 此憑症處治	一婦瘰癧與養氣順血藥不應服神効瓜蒌散二劑 一五	頓退又六劑而消却與托裡藥氣血平復而愈 此憑症也	一婦年踰二十瘰癧已潰不愈與八珍湯 四十加小柴胡	地骨皮夏枯草香附貝母五十餘劑形氣漸轉更與	必効散 七四二服瘡口遂合惟氣血未平再用前藥三	十餘劑而平 此憑症也



治療癰用必効散與瓜蒌散相間服神効

後有不問虛實概用必効散殊不知班貓性猛大毒利

水破血大損元氣若氣血實者用此劫之而投補劑

或可愈若虛而用此或用追蝕之藥癰肉雖去而瘡

口不合反至不救

一婦因怒結核腫痛察其氣血俱實先以神効散下之

更以益氣養榮湯三十餘劑而消

此憑症也

常治此症虛者先用益氣養榮湯待其氣血完充乃

欽定四庫全書

外科理例

取神効散去其毒仍進前藥無不効者

一人耳下患五枚如貫珠年許尚硬面色痿黃飲食不

甘勞而發熱脉數軟而濇以益氣養榮湯六十餘劑

元氣已復患處已消一核尚存以必効散二服而平

此憑症脉也

一婦癰癰不消膿清不斂用八珍湯

四十

少愈忽肩背痛

不能回顧此膀胱經氣鬱所致當服防風通氣湯彼

云癰癰膽經病也是經火動而然自服涼肝降火之



藥反致不食痛甚予診其脉胃氣愈弱先以四君子	六加陳皮炒芍藥半夏羌活蔓荊子四劑食進痛止	繼以防風通氣散 四 劑而愈 此憑脉與症也	一人神勞多怒頸腫一塊久而不消諸藥不應予以八	珍湯 四十 加柴胡香附每日更隔蒜灸數壯及日飲遠	志酒二三盞漸消 此憑症也	一婦月水不行漸熱欬嗽肌體漸瘦胸膈不利頸腫一	塊日久不消令服逍遙散月餘更服八珍湯 四十 加牡	欽定四庫全書 外科理例	丹皮香附又月餘加黃芪白斂兩月餘熱退腫消經	行而愈 此憑症也	一人年踰三十每勞心過度頸腫發熱服敗毒散愈盛	用補中益氣湯數貼而消 此憑症也	張通府耳後髮際患腫一塊無頭肉色不變按之微痛	彼謂痰結脉軟而時見數經曰脉數不時見瘡也非	痰也仲景云微弱之脉主血氣俱虛形精不足又曰	沉遲軟弱皆宜托裏遂用參芪歸朮川芎炙甘草以



托裡少加金銀花白芷桔梗以消毒彼謂不然內飲	降火消痰外貼涼藥覺寒徹腦患處大熱頭愈重食	愈少復請治以四君子加藿香炮乾薑數劑食漸進	膿成刺之更以十全大補湯 三十 去桂灸以豆豉餅又	月餘而愈 此憑脉症也	一人耳內出膿或痛或痒服聰耳益氣湯不應服防風	聖散愈甚予用補腎丸而愈	機按前條瘰癧治法虛者補之而補有先後溫涼之殊實者瀉之而瀉有輕重表裏之異或行消削或開	欽定四庫全書 外科理例	鬱滯或合時從症或變法從權或針或砭或灸或敷其法亦粗備矣醫者能倣是例而擴充之庶幾亦可以應變矣	一兒宿痰失道癰腫見于頸項或臂膊胸背是為冷症	宜四生散 五七 敷貼內服附子八物湯及隔蒜灸 此無脉可	憑而治當時必有所見也	一人因暴怒項下腫痛胸隔痞悶兼發熱用方脉流氣	二劑胸膈利以荊防敗毒散二劑而熱退肝脉尚弦	瀉以小柴胡加芎歸芍藥四劑脉症頓退以散腫潰



堅丸一料將平惟一核不消服遇神仙無比丸二兩而
瘰 此憑症
憑脉也

一兒甫周歲項患胎毒予俟有膿刺之膿出椀許乳食
如常用托裡藥月餘而愈又一兒患此待膿自出幾

至不救 此憑症也

大抵瘡淺宜砭深宜刺使瘀血去于毒聚之始則易
消也況小兒氣血又弱膿成不針不砭鮮不斃矣

一人項下患毒膿已成因畏針焮延至胸赤如霞其脉

欽定四庫全書

外科理例

滑數飲食不進月餘不寐甚倦予密針之膿出即睡
覺而思食用托裡散兩月餘而愈又一人患此及時
針刺數日而愈一人素虛患此不針潰透頰頰血氣
愈虛而死 此憑症也

一人耳後患毒脉症俱實宜用內疎黃連湯彼以嚴冬
不服寒劑竟至不起

羅謙甫曰用寒遠寒用熱遠熱假者反之雖違其時以
從其症又云凡治病必察其下謂察時下之宜而權



治之故曰經者常也法者用也醫者意也隨其所宜而治之則萬全矣	一婦因怒項腫後月水不通四肢浮腫小便如淋此血分症也先以椒仁丸數服經行腫消更以六君子湯	加柴胡枳殼數劑頸腫亦消矣亦有先因小便不利後身發腫致經水不通名曰水分宜葶藶丸治之	良方云婦人腫滿若先因經水斷絕後致四肢浮腫小便不通名曰血分水化為血血不通則復化為水矣	欽定四庫全書 外科理例	宜服椒仁丸 此憑症也	一癰婦咽間如一核所鯁嚥吐不出倦怠發熱先以四七湯而咽利更以逍遙散 此憑症也	一婦所患同前兼胸膈不利肚腹膨脹飲食少思卧睡不安用分心氣飲並効 此憑症也	一女年十七項下時或作痛乍寒乍熱如癰狀肝脉弦長此血盛之症也先以小柴胡湯二劑少愈更以生	地黃丸而痊 此憑脉症也



一貴人女適夫夫早逝患十指攣拳掌垂莫舉膚體瘡瘍粟粟然湯劑雜進飲食頓減幾于半載診之非風也乃憂愁悲哀以致耳病屬內因宜用內因藥仍以鹿角膠輩多用射香熬膏貼癢處攣能舉指能伸病漸安	此因情而治也	一女性急好怒耳下常腫痛發寒熱肝脉弦急投小柴胡加青皮牛旁子荆芥防風而寒熱退更以小柴胡對四物數劑而腫消其父欲除病根予謂肝內主藏血外主榮筋若志怒氣逆則傷肝肝主筋故筋蓄結而腫須要自加調攝庶可免患否則肝迭受傷不能藏血血虛則難差矣後不戒果結三核屢用追蝕不斂而歿	此因情而治	一人先于耳前耳下患之將愈延及項側缺盆三年遂延胸腋診之肝脉弦數以龍會散堅二丸治之將愈肝脉尚數四年後小腹陰囊內股皆患毒年餘不斂脉診如前以清肝養血及前丸而愈	此憑脉也
欽定四庫全書					
外科理例					



一人因怒耳下及缺盆患癰潰延腋下形氣頗實瘡口不合治以散腫潰堅丸 四 而愈 此憑形症也	一兒七歲項結二核時發寒熱日久不愈治以連翹丸數服而消若患在面臂等處尤宜此丸若潰而不斂	兼以托裡之藥 此憑症也	一兒項結一核堅硬如癰面色痿黃飲食不甘服托裡藥不應此無辜疳毒也以蟾蜍丸治之而愈若數服不消按之轉動軟而不痛者內有虫如粉急針出之	欽定四庫全書 外科理例	若不速去則虫隨氣走內蝕臟腑不治 按此因治不應而變法也 蟾蜍夏月溝渠中腹大不跳不鳴者先取糞蛆一杓置桶中以尿浸之桶近上令乾使蛆不得出將蟾蜍撲死投蛆中任蛆食晝夜次以新布袋包繫置水急處浸一宿取出瓦上焙為末入射香一字軟飯丸如麻子大每服二三十九 空 心米飲送下	一人眼赤癢痛時或羞明下淚耳內作癢服諸藥氣血日虛飲食日減而癢愈盛此肝腎風熱上攻也以四生散酒調四服而愈 此憑症也	一婦久鬱患而不潰既潰不斂發熱口乾月水短少飲



食無味日脯尤倦益氣養榮湯二十餘劑少健予謂	須服百劑庶保無危彼欲速効反服班猫之劑及數	用追蝕毒藥去而復結以致不能收斂出水不止遂	致不救	此憑症也	一婦久不作膿脉浮而濇此氣血俱虛欲補之使自潰	彼欲內消專服班猫及散堅之藥血氣愈虛而死	此憑	也	一人因勞而患怠惰發熱脉洪大按之無力宜用補中	欽定四庫全書	外科理例	益氣湯	六十	彼不信輒服攻伐之劑吐泄不止亦死	此憑	脉因補誤治致死	大抵此症原屬虛損若不審虛實而犯病禁經禁鮮	有不誤常治先以調經解鬱更以隔蒜灸之多自消	如不消即以琥珀膏貼之俟有膿則針之否則變生	他症設若兼痰兼陰虛等症只宜加兼症之劑不可	干擾餘經或氣血已復而核不消却服散堅之劑至	月許不應氣血亦不覺損方進必効散或遇神仙無



比丸其毒一下即止二藥更服益氣養榮湯數劑以
調理瘡口不斂豆豉餅琥珀膏貼氣血俱虛或不慎
飲食起居七情者俱不治然此症以氣血為主氣血
壯實不用追蝕之劑彼亦能自腐但取去使易于收
斂若氣血虛不先用補劑而數用追蝕之藥適足以
敗矣若發寒熱眼內有赤脉貫瞳人者亦不治一脉
者一年死二脉者二年死

一女年十九頸腫一塊硬而色不變肌肉日削筋攣急

欽定四庫全書

外科理例

痛此七情所傷氣血所損之症當先滋養血氣不信

乃服風藥後不起

此憑症也

一人耳後漫腫

闕

一少婦耳下患腫素勤苦發熱口乾月水過期且少嫗

以爲經閉用水蛭之類通之以致愈虛而斃

一女年十七患瘰癧久不愈月水尚未通發熱欬嗽飲

食少思老嫗欲用巴豆肉桂之類先通其經予謂此

症潮熱經候不調者不治但喜脉不濇且不潮熱尚



可治須養氣血益津液其經自行彼欲効仍用巴桂
此慄悍之劑大助陽火陰血得之則妄行脾胃得之
則愈虛果通而不止飲食愈少更加潮熱遂致不救
一人遠途勞倦發熱脉大無力耳下患腫此勞損也宜
補中益氣養榮湯六自然熱退腫消彼不聽服降火
藥及必効散果吐瀉不食而死

夫勞倦損氣氣衰則火旺火乘脾土故倦怠而熱此
元氣傷也丹溪曰宜補形氣調經脉其瘡自消不可

欽定四庫全書

外科理例

汗下若不詳脉症經絡受病之異而輒用峻利之劑
鮮不危矣

一婦因怒不思食發熱倦怠骨肉痠疼體瘦面黃經漸
不通頸間結核以逍遙散三八珍湯四十治之少可彼

自誤服水蛭等藥血氣愈虛遂致不救此憑症也

一人耳後寸餘發一毒名曰銳疽焮痛寒熱煩燥喜冷
此膽經蘊熱而然先用神仙活命飲一劑勢減二三
時值仲冬彼惑于用寒遠寒之禁自用十宣托裡之



藥勢漸熾耳內膿潰喉腫閉藥不能下而歿	一放出宮女年踰三十兩胯作痛不腫色不變大小道	作痛如淋登廁尤痛此瘀血漬入隧道爲患乃男女	失合之症也難治後潰不斂又患瘰癧而歿	此久鬱也	此婦爲人之妾夫爲商常在外可見此婦久懷憂鬱	及放出又不能如願是以致生此疾其流注瘰癧乃	七情氣血皆已損傷不可用攻伐之劑皎然矣	流注百二	欽定四庫全書 外科理例	暴怒所致胸膈不利者調氣爲主	抑鬱所致而不痛者宜調經脉補氣血	腫硬作痛者行氣和血	潰而不斂者益氣血爲主	傷寒餘邪未盡者和而解之	脾氣虛濕熱凝滯肉理而然健脾除濕爲主	閃肭瘀血凝滯爲患者和氣血調經絡	寒邪所襲筋攣骨痛或遍身痛宜溫經絡養血氣



大抵流注之症多因鬱結或暴怒或脾虛濕氣逆于	肉理或腠理不密寒邪客于經絡或閃撲或產後瘀	血流注關節或傷寒餘邪未盡為患皆因真氣不足	邪得乘之常治鬱者開之怒者平之閃撲及產後瘀	血者散之脾虛及腠理不密者除而補之傷寒餘邪	者調而解之大要以固元氣為主佐以見症之藥如	久而瘡口寒者更用豆豉餅或附子餅灸之有膿管	或瘀肉者用針頭散腐及錠子尤效若不補血氣及	欽定四庫全書 外科理例	不慎飲食起居七情俱不治	一人因怒脇下作痛以小柴胡對四物加青皮桔梗枳	殼而愈 因情處治	一人臀腫一塊微痛脉弦緊以瘡科流氣飲四劑而消	因情處治	一人因怒脇下腫痛胸膈不利脉沉遲以方脉流氣飲	數劑少愈以小柴胡對二陳加青皮桔梗貝母數劑	頓退更以小柴胡二十餘劑而痊 因七情處治



一婦因閃肭肩患腫遍身作痛以黑丸子二服而痛止	以方脉流氣飲二劑而腫消更以二陳對四物加香	附枳殼桔梗而愈 憑症 處治	一婦腿患筋攣骨痛諸藥不應脉遲緊用大防風湯一	劑頓退又二劑而安 又一婦患之亦然先用前湯	二劑更服黑丸子而痊此二患若失治潰作敗症 憑症	憑脉 處治	一婦稟弱性躁脇臂腫痛胸膈痞滿服流氣敗毒反發	欽定四庫全書 外科理例	熱少食用四七湯數劑胸寬氣利以小柴胡對四物	加香附陳皮腫痛亦退 此因治不對 病而變方	一人腿患潰而不斂用人參養榮湯及附子餅灸更以	補劑煎膏貼之兩月餘愈 憑症 處治	一人脾氣素弱臂腫一塊不痛肉色不變飲食少思半	載不潰先以六君子加芎歸芍藥二十餘劑飲食漸	進更以豆豉餅日灸數壯于前藥再加黃耆肉桂三	十餘劑膿熟針去以十全大補湯及附子餅灸之月



餘而飲 此憑症 處治	一人腿腫肉色不變不痛脉浮而滑以補中益氣湯加	半夏茯苓枳殼木香飲之以香附餅熨之彼謂氣無	補法乃服方脉流氣飲愈虛始用六君子湯加芎歸數劑	飲食少進再用補劑月餘而消 憑脉憑 症處治	夫氣無補法世俗論也以其為病痞滿壅塞似難為	補殊不知正氣虛不能運行則邪氣滯而為病不用	補法氣何由行乎	欽定四庫全書 外科理例	一人臂腫筋攣骨痛年餘方潰不斂診脉更虛以內塞	散一料少愈以十全大補湯及附子餅灸而愈 憑症 憑脉	處治	精要云留積經久極陰生陰寒反為熱以此潰多成	癰宜早服內塞散排之	一人腿腫一塊經年不消且不作膿飲食少思強食則	脹或作瀉日漸消瘦診脉微細此乃命門火衰不能	生土以致脾虛而然也遂以八味丸飲食漸進腫患



亦消 憑症憑 脉處治	一人背髀患之微腫形勞氣弱以益氣養榮湯間服黑 丸子及木香生地黃作餅覆患處熨之月餘膿成針之仍 服前藥而愈 此憑所 因而治	一人腿患久而不斂飲大補藥及附子餅及針頭散經 之而愈 憑症 處治	一人臂患年餘尚硬飲食少思朝寒暮熱八珍湯加柴 胡地骨牡丹皮月餘寒熱少止再用益氣養榮湯附	欽定四庫全書 外科理例	子餅灸兩月餘膿成針之更服人參養榮湯半載而 愈 憑症 而治	一婦膿潰清稀脉弱惡寒久而不愈服內塞散灸附子 餅而瘳 憑脉憑 症而治	一人臂患出腐骨三塊尚不斂發熱作渴脉浮大而濇 乃氣血俱損須多服生氣血之劑庶可保全彼謂火 尚未盡乃用涼藥內服外敷幾危求治其形甚悴脉 愈虛先以六君子加芎歸月餘飲食漸進以八珍湯



加肉桂三十餘劑瘡色乃赤更以十全大補湯外以	附子餅僅年而差	憑症 憑脉	一老傷寒表邪未盡股內患腫發熱以人參敗毒散二	劑熱止灸香附餅又小柴胡加二陳羌活川芎歸朮	枳殼數劑而消	憑症 處治	一婦腰間患一小塊肉色如常不潰發熱予欲治以益	氣養榮解鬱之劑彼却別服流氣飲後針破出水年	餘而沒	欽定四庫全書	外科理例	一婦久不斂忽發寒熱予決其氣血俱虛彼反服表散	之劑果發大熱亦死	憑症 處治	一人元氣素弱將患此胸膈不利飲食少思予欲健脾	解鬱養氣血彼反服辛香流氣之劑致腹脹又服三	稜蓬木厚朴之類飲食少四肢微腫兼腰腫一塊不	潰而沒	一婦經不調兩月或三月一至四肢腫飲食少日脯發	熱予曰此脾土氣血虛也用養脾滋氣血藥飲食進



則浮腫自消血氣充則經水自調彼以爲緩用峻劑 先通月經果腹疼泄不止遍身浮腫飲食少沒于木	旺之月	一人年踰三十小腹腫硬逾年成瘡頭破時出血水此	七情所傷營氣逆於肉理也名曰流注胗之肝脉瀉	盖肝病脉不宜瀉小腹正属肝經須瀉属金脉退乃	可予欲以甘温之藥補其氣血令自消潰彼不信乃	服攻伐之藥氣血愈虛果沒于金旺之月	此憑脉也	欽定四庫全書 外科理例	丹溪曰諸經惟少陽厥陰二經癰疽宜預防之以其 多氣少血也少血則肌肉難長瘡久不斂必成敗症 若不知此輒用峻利之藥以 攻伐其陰分之血禍不旋踵	懸癰百三	焮腫或發熱者清肝解毒 小柴胡製甘草	腫痛者解毒爲主 製甘草	不作膿或不潰者氣血虛也 八珍湯	腫痛小便赤滯者肝經濕熱也宜分利清肝 龍膽泄肝湯	一人穀道前患毒焮痛寒熱此肝經濕熱所致名曰懸



癰屬陰虛先以製甘草百二五二服頓退再以四物加	車前青皮甘草節酒製黃栢知母數服而消此憑症也	一人年踰五十患懸癰膿清脉弱此不慎酒色濕熱壅	滯而然膿清脉弱老年值此何以收斂况谷道前為	任脉發源之地肝經宗筋之所予辭果沒治此癰	惟潤水製甘草有效已破者兼十全大補湯三十為要	一人患此焮痛發熱寒以小柴胡湯加製甘草百二五二	劑少退又製甘草四劑而消按小柴胡清肝製甘草解毒	欽定四庫全書 外科理例	大抵此症屬陰虛故不足之人多患之寒涼之劑不	可過用恐傷胃氣惟製甘草一藥不損氣血不動臟	腑其功甚捷	一人腫痛小便赤澁以加減龍膽瀉肝湯加製甘草二	劑少愈以參耆歸朮黃栢知母製甘草四劑百二五而潰	更以四物加黃栢知母參耆製甘草而痊按此先瀉後補當時	以有所據但不知其脉耳	一人腫痛未作膿以加減龍膽瀉肝湯二劑少愈再以



四物加黃栢知母木通四劑消 按此先治濕熱後養血	一人膿熟不潰脹痛小便不利急針之尿膿皆利以小	柴胡加黃栢白芷金銀花四劑痛止以托裡消毒散	數劑而愈	常見患者多不肯針待其自破殊不知緊要之地有	膿宜急針之使毒外發不致內潰故曰宜開戶以逐	之凡瘡若不針烙毒氣無從而解膿瘀無從而泄今	之患者反謂緊要之處不宜用針何相違之遠耶	欽定四庫全書 外科理例	一人膿清不斂內有一核以十全大補湯加青皮柴胡	製甘草更以豆豉餅灸核消而斂 此憑症也	一人久而不斂脉大無力以十全大補加五味麥門灸	以豆豉餅月餘而愈 此憑症也	一老年餘而不斂診脉尚有濕熱以龍膽瀉肝湯 六二	劑濕退以托裏藥及豆豉餅灸而愈 此憑症也	一人腫痛發熱以小柴胡加黃連青皮 五 四劑少愈更	以龍膽瀉肝湯 六 而消 此憑症也



一人膿熟不潰脉數無力此氣血俱虛也宜滋陰益氣 血之藥更針之使膿毒外泄彼反用敗毒藥致元氣 愈虛瘡勢愈盛後潰不斂竟致不救	按此不憑脉 症而誤治也	懸癰原係肝腎二經陰虛須一于補尤恐不治况膿成 而又剋伐不死何待常治初起腫痛或小便赤澁先 以製甘草一二劑及蒜灸更飲龍膽瀉肝湯若發熱 腫痛者以小柴胡加車前黃栢芎歸膿已成即針之 已潰用八珍湯	四十	加製甘草柴胡稍酒炒黃栢知母	欽定四庫全書	外科理例	小便澁而脉有力者仍用龍膽瀉肝湯加製甘草小 便澁而脉無力者用清心蓮子飲加製甘草膿清不 斂者用大補劑間以豆豉餅灸或久而不斂者亦用 附子餅灸並効	囊癰百四	腫痛未作膿者踈肝導濕	腫硬發熱清肝降火	膿清不斂者大補血氣



已潰者滋陰托裡

膿成脹痛者急針之更飲消毒之劑

囊癰濕熱下注也有作膿者此濁氣順下將流入滲道

因陰道或虧水道不利而然膿盡自安不藥可也惟在

善于調攝耳又有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開

丸懸掛水出以麩炭杉木炭也末傳外以紫蘇葉包裹仰卧

養之

精要謂癰入囊者死將以為屬腎耶予治數人悉以

欽定四庫全書

外科理例

濕熱入肝經施治而以補陰佐之雖膿潰皮脫罽丸

懸掛亦不死但未知下虛年老者如何耳

大抵此症屬陰道虧濕熱不利所致故滋陰降濕藥

不可缺常治此腫痛小便秘滯者用除濕為主滋陰

佐之腫痛已退便利已和者除濕滋陰藥相兼治之

欲其成膿用托裡為主滋陰佐之候膿成即針之仍

用托裡滋陰若濕毒已盡者專用托裡如膿清或多

或斂遲者用大補之劑或附子餅灸之



一人年踰五十患此瘡口不斂診之微有濕熱治以龍 膽瀉肝湯濕熱悉退乃以托裡藥及豆豉餅灸而愈	一人年踰三十陰囊濕癢莖出白物如膿舉則急痛此 肝疝也用龍膽瀉肝湯 此因症處治 而愈陰莖或腫或縮或挺 或癢皆宜此藥治之	一人年踰四十陰囊腫痛以熱手熨之少緩服五苓散 不應尺脉遲軟此下虛寒邪所襲而然名曰陰疝非 瘡毒也治以蟠葱散 五九 少可更服葫蘆巴丸而平 此因	脉遲為寒脉 軟為虛而治	欽定四庫全書 外科理例	一人年踰三十餘劑始差 此憑症也 托裡藥至三十餘劑始差 此憑症也	睡覺神思少健但針遲須服解毒藥亦潰盡矣故用	一弱人膿熟脹痛大小便秘急針之膿出三碗許即斂	芷金銀花四劑少愈更托裡消毒散數劑而消 此憑症也	一人膿熟作脹致小便不利急針以小柴胡加黃栢白	愈更以四物加木通知母黃栢而消 此憑症也	一人囊癰未作膿而腫痛以加減龍膽瀉肝湯二劑少



次年復患濕熱頗盛仍用前湯四劑而退又以滋陰藥而消若潰後虛而不補少壯者成漏老弱者不治膿清作渴脉大者亦不治	此憑脉也
一人年踰五十陰囊腫痛得熱愈盛服蟠葱散不應肝脉數此囊癰也乃肝經濕熱所致膿已成急針之進龍膽泄肝湯	五六
脉症悉退更服托裡滋陰藥外敷杉木炭紫蘇末月餘而愈	此因脉處治
一人年踰六十陰囊潰痛不可忍畢丸露出服龍膽泄	
肝湯敷麩炭紫蘇末不應予意此濕氣熾盛先飲槐花酒一椀次服前湯少愈更服托裡加滋陰藥而平設以前藥不應加之峻劑未有不損中氣以致敗也	
此因處治不効而知為濕盛	
一少年玉莖挺長腫而癢皮塌常潤磨股難行兩脇氣衝上手足倦弱先以小柴胡加黃連大劑行其濕熱少加黃栢降其逆氣腫漸收莖中有堅塊未消以青皮為君少佐散風之藥末服之外以絲瓜子汁調五	



倍子敷愈

此憑症也

一人囊腫狀如水晶時痛時癢出水小腹按之作水聲

小便頻數脉遲緩此醉後飲水入房汗出遇風寒濕

毒乘聚于囊名水疝也先以導水丸二服腹水已去

小便如常再以胃苓散倍白朮茯苓更用氣針引去

聚水而差

此憑症脉也

一弱人莖根結核如大豆許勞則腫痛先以十全大補

湯去桂加車前麥門酒製黃栢知母少愈更加製甘

欽定四庫全書

外科理例

草四劑仍以四物車前之類而消 又有患此焮痛

發熱服龍膽泄肝湯二劑製甘草四劑而潰再用滋陰

之劑而愈或膿未成以葱炒熱敷上冷易之隔蒜灸

亦可數日不消或不潰或潰而不斂以十全大補加

柴胡稍爲主間服製甘草並愈若不保守必成漏矣

已上二條

此憑症也

一弱人拘中作痛小便淋瀝此因火躁下焦無血氣不

能降而滲泄之令不行用四物加黃栢知母茯苓牛



膝木通十餘劑痛止便利	此憑症也
一人氣短拘中若瘡小便不通用四物加參耆煎吞滋	
腎丸而愈	此憑症也
前症以虛爲本以病爲末益其本則末自去設若不	
固元氣專攻其病寧無害耶	
一人遺精勞苦愈盛拘中結核服清心蓮子飲連翹消	
毒散不應予以八珍湯	十四
加山藥山茱萸遠志十餘	
劑漸愈更服茯苓丸遂不復作又有患此諸藥不應	
欽定四庫全書	外科理例
服八味丸而愈	此因處治不應故推求另為之治
一人尿血陰莖作痛服清心蓮子飲不應服八正散愈	
盛予以髮灰醋湯調服少愈更服班龍丸	百而平此因
處治不應	
以推求也	
一人患而久不斂以十全大補加五味麥門灸以豆豉	
餅月餘而平	此憑症也
一弱人腫痛未成膿小便赤澁以製甘草青皮木通黃	
栢當歸麥門四劑少愈以清心蓮子飲四劑而消	此憑症也



一人焮腫痛甚小便澁發熱脉數以龍膽瀉肝湯倍車
前木通澤瀉茯苓勢去半仍以前湯加黃柏金銀花
四劑又減二三便利如常惟一處不消此欲成膿再
用前湯加金銀花皂角針白芷六劑微腫痛脉滑數
乃膿已成針之腫痛悉退投滋陰托裡藥及紫蘇末
敷之而愈

一人病勢已甚脉洪大可畏用前湯二劑腫少退以仙
方活命飲二劑痛少止脉洪數膿已成須針之否則

欽定四庫全書

外科理例

陰囊皆潰彼不信更他醫果大潰罩丸掛復求治脉
將靜以八珍湯加黃芪黃柏知母山枝更敷紫蘇末
數日而痊

一人患此腫痛發熱以小柴胡加黃連青皮四劑少愈

更以龍膽瀉肝湯而消

凡腫屬濕痛屬熱
故痛者宜清濕熱

一兒生三月病熱左右脇下節次生癰用四物湯敗毒
散倍人參香附為佐犀角為使大料飲乳母兩月而
愈踰三月腹脹生丹癰又半月移脹入囊為腫黃瑩



裂開兩丸顯露水出以紫蘇葉盛熨炭末托之旬餘

而合此因父病瘡遺熱于胎也

此憑症也

一人玉莖腫痛服五苓散等藥不應其脉左關弦數此

肝經積熱而成以小柴胡

五

送盧薈丸一服勢去三

四再服頓愈

此憑脉憑症也

一人連日飲酒陰挺并囊濕癢服滋陰等藥不應予謂

前陰肝脉絡也陰氣從挺而出素有濕繼以酒為濕

熱合于下焦而然經曰下焦如瀆又云在下者引而

欽定四庫全書

外科理例

竭之遂以龍膽瀉肝湯及清震湯而愈此或不應宜補

肝湯及四生散治之

此憑症也

一婦隱內膿水淋漓或癢或痛狀如虫行少陰脉活數

此陰中有瘡也名曰蠹由心神煩鬱胃氣虛弱氣血

凝滯所致與升麻白芷黃連木通當歸川芎白朮茯

苓柴胡煎服以搗腫湯熏洗更搽蒲黃水銀兩月餘

而愈 此條因脉而知瘡其曰胃氣虛者當時必有

見也 或有包絡虛風邪乘陰血氣相搏令氣痞澀



致陰腫痛治以菖蒲散 八 更以枳實炒熱帛包熨之	冷則再炒	或有子藏虛冷氣下衝致陰脫出謂之下脫或因產 努力而脫者宜當歸散久不愈者補中益氣湯倍加	升麻柴胡舉之	下疳百五	腫痛或發熱者肝經濕熱也清肝除濕	腫痛發寒熱者邪氣傷表也發散之	欽定四庫全書 外科理例	腫痛小便赤澀者肝經濕熱壅滯也疎肝導濕	一人患此腫硬焮痛寒熱先以人參敗毒散二劑而止	更以小柴胡加黃連青皮而愈 此因症 因經也	一人潰而腫痛小便赤澀以加減龍膽瀉肝湯加青皮	黃連二劑少愈以小柴胡加黃栢知母當歸茯苓數	劑而愈 此因症 因經也	一人莖腫不消 一人潰而腫痛發熱小便秘澀日晡	或熱 一小兒腫痛諸藥不應 各以小柴胡吞盧



薈丸數劑並愈

一人陰莖或腫或作痛或挺縱不收 一人莖中作痛

筋急縮或作癢白物如精隨溺而下此筋疝也並用

龍膽瀉肝湯皆愈

此因症也

張子和曰遺精癰閉陰痿瘰癧精滑白淫皆男子之疝

不可妄歸之腎冷 若月涸不月月罷腰膝上熱足

熱噤乾癰閉少腹有塊或定或移前陰突出後陰痔

核皆女子之疝也但女子不謂之疝而謂之瘰

欽定四庫全書

外科理例

一人潰而腫痛發熱日晡尤甚以小柴胡加黃栢知母

當歸而愈

此因症也

一人已愈惟莖中一塊不散以小柴胡加青皮荆防治

之更以荆防牛膝何首烏活石甘草各五錢煎湯熏

洗各數劑而消

此因症也

一人年踰四十素有淋患疳瘡焮痛倦怠用小柴胡

五

加連栢青皮當歸而愈

此因症而治

一人因勞莖竅作癢時出白物發熱口乾以清心蓮子



飲而安 此因勞處治	一人玉莖腫痛小便如淋自汗甚苦時或尿血少許尺	脉洪滑按之則瀋先用清心蓮子飲加牛膝山枝黃	栢知母數劑少愈更以滋腎丸一劑而痊 此因症也	前賢云如自汗小便少不可以藥利之既已自汗則	津液外亡小便自少若利之則榮衛涸竭無以製火	煩熱愈甚當俟熱退汗止小便自行也兼此乃陽明	經大忌利小便也	欽定四庫全書 外科理例	一老患疔瘡小便淋瀝脉細體倦此氣虛兼濕熱也用	清心蓮子飲及補中益氣湯 六十 而愈下疳瘡丹溪用	青黛蛤粉密陀僧黃連爲末敷又以鷄肫皮燒存性	爲末敷	下疳瘡并賺瘡	蛤粉 蠟茶 苦參 密陀僧	爲末河水洗淨臘猪油調敷	又方



米泔水洗瘡淨用頭髮鹽水洗去油淨再用清湯洗	晒乾燒灰敷瘡即生靨	又方 治下注疔瘡蝕臭腐爛疼痛難忍兼治小兒	疔瘡	黃栢 蜜炙 黃丹 輕粉 錢半 乳香 三分 蜜陀僧	高末茶 各三分 射香 少許	右末用葱湯洗瘡次貼此藥	洗藥	欽定四庫全書 外科理例	黃連 黃栢 當歸 白芷 獨活	防風 荊芥 朴硝等分水煎入錢五十文烏	梅五个鹽一匙同煎溫洗日五七次數下項藥	敷藥	木香 栴榔 黃連 銅青 輕粉	枯礬 海螵硝 射香等分爲末洗後至夜敷	上	外科理例卷三



欽定四庫全書

子部
外科理例卷四

詳校官太醫院吏目_臣宋桂
編修_臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士_臣何思鈞
校對官助教_臣胡予襄
謄錄監生_臣崔堂



欽定四庫全書	外科理例卷四	明 汪機 撰	便毒一百六	內蘊熱毒寒邪者解散之	勞役而患者補之	不遂交感或強固精氣致敗而結者解散之	濕熱而致者清肝導濕	欽定四庫全書	外科理例	一人患此未作膿小便秘澀以八正散三劑少愈以小	柴胡加澤瀉山枝木通二劑而消 此憑症也	一老婦腫痛膿未作小便滯肝脉數以加減龍膽瀉肝	湯加山枝黃栢四劑而消 此因症也	一人腫痛發寒熱以荊防敗毒散二劑而止以雙解散	二劑而消 此因寒熱認作外邪處治	一人膿未成大痛服消毒托裡內疎藥不應脉洪大毒	尚在以仙方活命飲一劑痛止又劑而消 此因治不應而處也



一人腫痛日晡發熱以小柴胡加青皮天花粉四劑痛止熱退以神效瓜蒌散四劑而消 此因症也	一人焮腫作痛大小便秘脉有力以玉蠟散二劑頓退更以龍膽瀉肝湯四劑而消 此因症因脉而治	一人潰而痛不止諸藥不應診之脉大按之則數乃毒未解也以仙方活命飲而止又二劑而消 此因症因脉而治	一人潰而痛不止以小柴胡加黃栢知母芎歸四劑少止更以托裡當歸湯數劑而斂 此因症也	欽定四庫全書 外科理例	一人服尅伐藥以求內消致瀉利少食以二神丸先止其瀉以十全大補倍加白朮茯苓數劑而消 此因症也	大抵此症多患于勞役之人亦有內蘊熱毒而生者須辨虛實及膿成否不可妄投藥餌常見治此概用	大黃之類下之以求內消或膿成令膿從大便出鮮有見其痊者人多欲內消者恐收之難也若補養氣	血不旬日而收矣若膿既成豈有可消之理再用尅伐之劑反為難治



一人不慎房勞患此腫痛以雙解散二服其病即止更以補中湯數劑而膿成針之以八珍湯加五味麥門	柴胡三十餘劑	此因症也	大抵便癰者血疝也俗呼爲便毒言于不便處患之故也乃足厥陰肝經絡及衝任督脉亦屬肝之旁絡也是氣血流通之道路今壅而腫痛此則熱毒所致宜先疎導其滯更用托裡之劑此臨症制宜也	一人年踰四十患便毒尅伐太過飲食少思大便不實	欽定四庫全書	外科理例	遺精脉微東垣云精滑不禁大便自利腰脚沉重下虛也仲景曰微弱之脉主氣血俱虛先以六君子 二加 破故紙肉豆蔻煎服瀉止食進更以十全大補湯 三十	加行經藥十餘劑而消	此因脉症也	一人患便毒膿稀脉弱以十全大補湯加五味麥門白欵三十劑稍愈更以參耆歸朮膏而平因新婚復發聚腫堅硬四肢冷脉弱皮寒飲食少思此虛極也仍用前藥加桂附三劑稍可彼欲速愈自用連翹消毒散



瀉利不止而沒 此因症脉也	一人年踰四十素勞苦患便毒發寒熱先以小柴胡加	青皮一服表症悉退次以補中益氣湯加川山甲二	劑腫去三四更以托裡之藥五六服膿成刺去旬日	而歛 此因症也	夫便毒足厥陰濕氣因勞倦而發用射干三寸同生	薑煎食前服得利一二行効射干紫花者是紅花者	非	欽定四庫全書 外科理例	又方	破故紙 牛旁子 微炒 牽牛 炒 大黃 酒拌	等分末之每服一兩酒調下	又方 已成膿者	大黃 連翹 各五錢 枳實 三錢 厚朴 甘草節 各二錢	桃仁 二十粒	薑三片分三貼煎服	消毒飲便毒初發三四日可消



皂角刺 金銀花 防風 當歸 大黃	甘草節 瓜蒌仁	等分水酒各半煎食前溫服仍頻提掣頂中髮立効	又方	白僵蠶 槐花	爲末酒調服一方加酒大黃	又方	木筆子 大黃 瓜蒌 桃仁 草龍膽	欽定四庫全書 外科理例	咬咀濃煎露一宿清晨溫服立愈	又方	山梔 大黃 乳香 沒藥 當歸 各半錢	瓜蒌仁 二錢 代赭石 一錢	右作一服煎	一人腫而不潰以參耆歸朮白芷皂角針柴胡甘草節	數劑而潰以八珍湯加柴胡數劑愈 此因症也	一人潰而腫不消且不斂診之脉浮而濇以豆豉灸更



以十全大補湯月餘而愈	此因症也
乳癰一百七	附乳岩 無乳并男子乳癰
暴怒或兒口氣所吹痛腫者疎肝行氣	
腫焮痛甚者清肝消毒	
焮痛發寒熱者發散表邪	
未成膿者疎肝行氣	
不作膿或不潰托裡為主	
潰而不斂或膿清者大補氣血	
欽定四庫全書	外科理例
一婦稟實性躁懷抱久鬱左乳內結一核不消按之微	
痛以連翹飲子二十餘劑少退更以八珍湯加青皮	
桔梗香附貝母二十餘劑而消	此因症因情也
一婦發熱作渴至夜尤甚兩乳忽腫服敗毒藥熱反熾	
診之肝脉洪數乃熱入血室以加味小柴胡治之熱	
止腫消	此因症因脉也
一婦兩乳內時常作痛口內常辣卧起若急臍下牽痛	
以小柴胡加青皮黃連山梔而愈	此因症也



一婦鬱久左乳內結核如杏許三月不消心脉瀦脾脉	大按之無力以八珍湯加貝母遠志香附柴胡青皮	桔梗五十餘劑而潰又三十餘劑而愈	此因情因脉也	一婦久鬱右乳內結三核年餘不消朝寒暮熱飲食不	甘此乳岩也乃七情所傷肝經血氣枯槁之症宜補	氣血解鬱結遂以益氣養榮湯百餘劑血氣漸復更	以木香餅灸之嘉其謹疾而消	此因症因情也	一婦膿成不潰脹痛予欲針之令毒不侵展不從又數	欽定四庫全書	外科理例	日痛極始針湧出敗膿三四椀虛症蜂起幾殆用大	補藥兩月餘始安	此因症也	夫乳者有囊橐有膿不針則遍患諸囊矣少壯者得	以收斂老弱者多致不救	一婦腫而不作膿以益氣養榮湯加香附青皮數劑膿	成針之旬日而愈	此因症也	一婦右乳腫發熱怠惰嗜卧無氣以動致夜熱尤甚以	補中益氣湯兼逍遙散而痊	此因症也



一產婦因乳少服藥通之致乳房腫脹發熱作渴狀若
傷寒以玉露散補之而愈

夫乳汁乃氣血行化在上為乳在下為經若衝任脉
盛脾胃氣壯則乳汁多而濃血衰則少而淡所乳之

子亦弱而多病此自然之理也亦有屢產有乳再產

乳無或大便澁滯乃亡津液也

三因論

云產婦乳脉

不行有二有氣血盛閉而不行者有血氣弱澁而不

行者虛當補之盛當疎之盛者當用通草漏蘆土瓜

欽定四庫全書

外科理例

根輩虛者當用煉成鍾乳粉猪蹄鯽魚之類概可見

矣亦有乳出不止者多屬于虛不約束也

一婦乳癰愈後發熱服養氣血藥不應八珍湯加炮薑

四劑而愈仍以前湯加黃耆香附三十餘劑而安

此因症也

一婦患此膿成畏針病勢漸盛乃強針之膿出三椀許脉數發渴

以大補藥三十餘劑而愈

此因症也

一婦乳癰膿成針刺之及時不月而愈

一婦產次子而無乳服下乳藥但作脹予謂乳皆血氣



所化今脹而無乳是氣血竭而津液亡也當補氣血 自有乳矣與八珍湯倍加參朮少加肉桂二十餘劑	乳遂生後因勞役乳復竭 此因症也	蓋初產有乳再產而無其氣血祇給一產耳其衰可知	聞有產後乳出不止亦為氣虛宜補藥止之其或斷乳	兒不吮亦能作脹用麥芽炒為末白湯調服以散之若	兒吮破乳頭成瘡用蒲公英末或黃連胡粉散摻之若	乳頭裂破以丁香末或蛤粉臘脂末敷之並効	欽定四庫全書 外科理例	一婦因怒兩乳腫兼頭痛寒熱以人參敗毒散二劑表	症已退以小柴胡加芎歸桔梗枳殼四劑而痊 此因症也	一婦鬱久右乳內腫硬以八珍湯加遠志貝母柴胡青	皮及隔蒜灸兼服神効瓜萋散兩月餘而消 此因情因症也	一婦左乳內腫如桃許不痛色不變發熱漸消瘦以八	珍湯加香附遠志青皮柴胡百餘劑又間服神効瓜	萋散三十餘劑膿潰而愈 此因症也	患者或責効太速或不戒七情俱難治大抵四十已



後者尤難治蓋因陰血日虛也況醫用藥不分經絡
虛實未有能保痊也

一婦乳內腫一塊如鷄子大勞則作痛久而不消服托

裡藥不應此乳勞症也肝經血少所致先與神効瓜

蒺散四劑更隔蒜灸腫少退再服八珍湯倍加香附

夏枯草蒲公英仍間服前散月餘而消

此因症因
治而處也

又有乳疽一症腫硬木悶雖破而不潰腫亦不消尤當

急服此散及隔蒜灸此二症乃七情所傷氣血所損

欽定四庫全書

外科理例

亦勞症也宜戒怒節飲食慎起居否則不治

一婦年逾二十稟弱乳內作痛頭疼脈浮與人參敗毒

散倍加參一劑表症悉退但飲食少思日晡微熱更

以小柴胡合六君子二劑熱退食進方以托裏藥加

柴胡十餘劑針出膿而愈

此因稟受因
症因脈也

一婦亦患此予謂須多服養氣血解鬱結藥可保無害

不信乃服剋伐之劑反大如碗日出清膿不斂而歿

此悞
治也

一婦鬱久乳內結核年餘不散日晡微熱飲食少思治



以益氣養榮湯嫌緩乃服行氣之劑勢愈甚潰而日
出清膿不止復求治診之脉洪而數辭不治又年餘
果歿

一人年踰五十患子不立致左乳腫痛左脇脹痛肝脉
弦數而濇先以龍薈丸二服諸症頓退又以小柴胡
對四物加青皮貝母遠志數劑膿成予欲針之仍用
養氣血解鬱結不從乃雜用流氣敗毒之劑致便秘
發熱作渴復求治予謂膿成不潰陽氣虛不能鼓舞

欽定四庫全書

外科理例

也
此因情
因脉也

一妾放出宮人年四十左乳內結一核堅硬按之微痛
脉弱懶言此鬱結症也名曰乳岩須服解鬱結益氣
血藥百貼可保彼不爲然服十宣散流氣飲瘡反盛
逾二年復請予視其形如覆碗腫硬如石膿出如泔
予曰膿清脉大寒熱發渴治之無功果歿
此因情因
脉因症而

治處

一婦因怒左乳內腫痛發熱表散太過致熱益甚以益



氣養榮湯數劑熱止膿成焮痛針之不從遂腫脹大

熱發渴始針膿大泄仍以前湯百餘貼始愈

此因候治也

一婦因怒左乳作痛胸膈不利以方脉流氣飲加木香

青皮四劑而安

此因情也

一男子左乳腫硬痛甚以仙方活命飲二劑更以十宣

散加青皮香附四劑膿成針之而愈若膿成未破瘡

頭有薄皮剥起者用代針之劑點皮起處以膏藥覆

之膿亦自出不若及時針之不致大潰如出不利更

欽定四庫全書

外科理例

經搜膿化毒之藥若膿血未盡輒用生肌之藥反助

邪氣縱早合必再發不可不慎

一人因怒左乳腫痛肝脉弦數以復元通氣散二服少

愈以小柴胡加青皮芎歸而消

此因情因脉也

一婦年踰三十每怒後乳內作痛或腫此肝火也與小

柴胡合四物湯加青皮桔梗枳殼香附而愈彼欲絕

去病根自服流氣飲遂致朝寒暮熱益加腫痛此氣

血被損而然予與八珍湯三十餘劑賴其年壯元氣



易復得愈	一治婦人兩乳間出黑頭瘡瘡頂陷下作黑眼子脉弦	洪按之細小并乳癰初起亦治宜內托升麻湯	升麻 葛根 連翹 黃耆 歸身	甘草 肉桂 黃栢 鼠粘子	剉作一服水二分酒一分同煎食後服 此足陽明	厥藥 此因症也	一後生作勞風寒夜發熱左乳痛有核如掌脉細濇而	欽定四庫全書 外科理例	數此陰滯于陽也詢之已得酒遂以瓜蒌子石膏乾	葛川芎白芷蜂房生薑同研入酒飲之四貼而安 此因	症因脉 處治	一乳頭厥陰所經乳房陽明所屬厥陰者肝也乃女子	致命之地宗筋之所且各有囊橐其始焮腫雖盛受	患止于一二橐若膿成不刺攻潰諸囊矣壯者猶可	弱者多致不救所以必針而後愈用蒲公英忍冬藤	入少酒煎服即欲睡是其功也及覺而病安矣未潰



以青皮瓜萋桃仁連翹川芎橘葉皂角刺甘草節隨
症加減煎服已潰以參耆芎歸白芍青皮連翹瓜萋
甘草節煎服

一婦乳癰氣血頗實但瘡口不合百法不應與神効瓜

萋散四劑少可更與數劑及豆豉餅灸而愈

此因人
因治而

處也

又有患此未潰亦與此散三劑而消良甫云如有乳勞

便服此藥可杜絕病根如毒已成能化膿爲水毒未

欽定四庫全書

外科理例

成者從大小便中散矣

一婦乳癰寒熱頭痛與荆防敗毒散一劑更與蒲公英

一握入酒二三盞再搗取酒熱服查熱罨患處而消

此因頭痛發熱乃表症也故用表散蒲公英俗呼孛

孛丁夏秋間開黃花似菊散熱毒消腫核散滯氣解

金石毒聖藥

乳硬多因乳母不知調養所致或忿怒所逆鬱悶所

遏厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅閉而汁不通



陽明之血沸騰故熱甚而化膿或因乳子膈有滯痰	含乳而睡口氣焮熱所吹而成結核初便忍痛揉軟	吮令汁透可散否則結成矣治以青皮踈厥陰之滯	石膏清陽明之熱生甘草節行污濁之血瓜蒌子蘗	毒消腫或加沒藥清橘葉皂角刺金銀花當歸或湯	或散佐以少酒若加艾火兩三壯于痛處尤妙粗工	使用針刀必惹崛病	機按前條用針以已成膿言此 條禁針以未成膿言未成膿而	針則傷良肉反增瘡勢已成膿不針則 膿蝕良肉延潰無休其意各有在也	欽定四庫全書	外科理例	一婦形脉稍實性躁難于後姑乳生隱核以單味青皮	湯間以加減四物湯加行經絡之劑兩月而安	此因 情也	腹癰一百八	一人年踰三十腹患癰腫脉數喜冷齊氏曰瘡瘍腫起	堅硬者實也河間曰腫硬脅悶煩躁飲冷邪在內也	用清涼飲 二 倍大黃三劑稍緩次以四物湯加芩連	山梔木通四劑而潰更以十宣散 四 去參耆桂加金	銀花天花粉彼欲速効自服溫補藥肚腹遂腫小便



不利仍用清涼飲膿潰數碗再以托裡藥治之而愈
此因症因
脈處治

一人腹癰焮痛煩躁作嘔脈實河間曰瘡瘍火屬須分
內外以治其本又云嘔噦心煩腫硬脅悶或皮肉不
變脈沉而實毒在內也當踈其內以絕其源用內踈
黃連湯利二三行諸症悉去更以連翹消毒散而愈

此據脈
症而治

一人腹癰膿熟開遲脈微細膿出後瘡口微膿如蟹吐

欽定四庫全書

外科理例

沫此內潰透膜也瘡瘍透膜十無一生雖用大補亦
不能救此可為待膿自出之戒也

此據
症也

一恭人腹內一塊不時作痛痛則不知人事良久方甦

諸藥不應其脈沉細非瘡也河間云失笑散

百七
治疝

氣及婦人血氣痛欲死並効與一服痛去六七再服

而平此藥治產後心腹絞痛及兒枕痛尤妙

按此憑
脈處治

一兒十歲腹脹痛服消導藥不應彼以為毒其脈右關

沉伏此食積也河間云食入則吐胃脘癰也更兼身



體痛難移腹脹善噫舌本強食後其氣繭然衰皆脾病也審之因食粽得此以白酒麴熱酒服而愈	憑症而治也	一人素嗜酒色小腹患毒脉弱微痛欲求內消予謂當	助胃壯氣兼行經活血佐之可消彼欲速効自用敗	毒等藥勢果盛瘡不潰膿飲食少思兩月餘復請診	脉愈弱盜汗不止聚腫不潰肌寒肉冷自汗色脫此	氣血俱虛故不能發腫成膿以十全大補湯三十餘	欽定四庫全書 外科理例	劑膿成針之反加煩躁脉大此亡陽也以聖愈湯二	劑仍以前湯百劑而愈	此憑脉症處治	疔瘡一百九	脉浮數者散之	脉沉實者下之	表裡俱實者解表攻裡	麻木大痛或不痛者並灸之更兼攻毒	疔瘡以其瘡形如丁盖之狀也多因肥甘過度不慎房



酒以致邪毒蓄結遂生疔瘡經曰膏梁之變足生大丁是也亦有人汗滴入食肉而生亦有悞食死牛馬而生不可不慎初生頭凹腫痛青黃赤黑無復定色便令煩躁悶亂或增寒頭痛或嘔吐心逆者是也急于艾炷灸之若不覺痛針瘡四邊皆令血出以迴瘡錠子從瘡孔絀之貼以膏藥仍服五香連翹湯漏蘆湯等疎下之爲効若針之不痛無血者以猛火燒鐵針通赤于瘡上烙之令如焦炭取痛爲効亦絀前錠子貼以膏藥經一二

欽定四庫全書

外科理例

日膿潰根出服托裡湯散依常療之如針不痛其人眼黑或見火光者不可治此毒已入臟腑也

一人足患作癢惡寒嘔吐時發昏亂脉浮數明灸二十餘壯始痛以奪命丹一服腫起更以荆防敗毒散而愈

一人左手臂患之是日一臂麻木次日半體皆然神思昏潰遂明灸二十餘壯始不痛至百壯始痛以奪命丹一服始腫起更用神異膏及荆防敗毒散而愈

此憑



也 症	一婦忽惡寒作嘔肩臂麻木手心瘙癢遂瞽悶不自知其故但手有一泡此疔毒也急灸患處五十餘壯而甦又五十餘壯知痛投荆防敗毒散而愈	此因惡寒故用發表	一人脚面生疔形雖如粟其毒甚大宜峻利之藥攻之因其怯弱以隔蒜灸五十餘壯癢止再灸片時知痛更貼膏藥再以人參敗毒散一服漸愈至陰之下道遠位僻藥力難達若用峻劑則藥力未到胃氣先傷	欽定四庫全書 外科理例	不如灸之爲宜	此據形症而治	一人感痘毒面生疔十餘枚腫痛脉數服荆防敗毒散稍愈尚可畏更用奪命丹一服而愈	此憑脉症而治	一婦六十右耳下天容穴間一疔其頭黑靨四邊泡起黃水時流渾身麻木發熱譫語時時昏沉六脉浮洪用烏金散汗之就用鉗針刺瘡心不痛周遭再刺十餘下紫黑血出方知疼痛即將寸金錠子紮入瘡內外用提疔錠子放瘡上膏日貼護次日汗後精神微



爽却用破棺丹下之病即定其疔潰動後用守効散貼塗紅玉錠子絀之八日疔出茲所謂審脉症汗下之間外治次第如此殊勝不察脉症但見發熱譫語便投下藥或兼香竄之藥遂致悞人遠矣

世人多云是瘡不是瘡且服五香連翹湯然或中或否致悞者多蓋不審形氣虛實瘡毒淺深發表攻裡所因不同故也此既善于驅逐又以五般香竄佐之與漏蘆湯相間大黃爲佐大黃入陽明太陽性走不

欽定四庫全書

外科理例

守泄諸實熱以其峻捷故號將軍雖各有參耆漏蘆甘草之補藥寧免驅逐之禍乎

一人胸患遍身麻木脉數而實急針出惡血更明灸數

壯始痛服防風通聖散得利而愈

此憑脉症而治

一夫人面生疔腫焮痛甚數日不潰脉症俱實治以荆

防敗毒散加芩連稍愈彼以爲緩乃服托裡散一劑

勢盛痛極始誤再用涼隔散

二

劑痛減腫潰又與

連翹消毒散

二十餘劑而愈

此憑脉症也



一人唇生疔瘡已五日腫硬脉數煩躁喜冷此胃經積

熱所致先以涼膈散_{六一}服熱去五六更與奪命丹

二粒腫退二三再以荆防敗毒散四劑而愈

按此先攻裡因其脉症而施後
發表不言脉症當時必有所見

一人患之發熱煩躁脉實以清涼飲下之而愈<sub>此憑脉
症而治</sub>

一鄭氏舉家生疔多在四肢皆食死牛肉所致刺去惡

血更服紫金丹_{百廿}悉愈

一人唇下生疔脉症俱實法宜下之反用托裡故口鼻

欽定四庫全書

外科理例

流膿而死是謂實實之禍也

一老婦足大指患疔甚痛令灸之彼不從專服敗毒藥

致真氣虛而邪氣愈實竟不救

蓋敗毒藥須能表散瘡毒然而感有表裡所發有輕

重體段有上下所稟有虛實豈可一概而用之耶且

至陰之下藥力難到專假藥力則緩不及事不若灸

之爲速故下部患瘡皆宜隔蒜灸之不痛者宜明灸

之及針疔四畔去惡血以奪命丹一粒入瘡頭孔內



仍以膏藥貼之若患在手足紅絲攻心腹者就於絲
盡處刺去惡血宜服荊防敗毒散若絲近心腹者宜
挑破瘡頭去惡水亦以膏藥貼之如麻木者服奪命
丹如牙關緊急或喉內患者並宜噙一二丸

又方

巴豆十粒半夏一大顆附子半箇蜣螂一枚各爲末
用麝相和看瘡大小以紙繩子圍瘡口以藥泥上用

欽定四庫全書

外科理例

帛貼傳時換新藥以差爲度活人甚多

痔漏一百十

附便血
脫肛

大便秘澀或作痛者滋躁除濕

下墜腫痛或作癢者祛風勝濕

肛門下墜或作痛瀉火導濕

腫痛小便秘澀者清肝導濕

一人患痔大便躁結焮痛作渴脉數按之則實以秦艽

蒼朮湯一劑少愈更以四物加芩連槐花枳殼四劑



而愈

一人素不慎酒色患痔焮痛肛門墜痛兼下血大便乾躁脉洪按之則瀋以當歸郁李仁湯加桃仁四劑少愈更以四物加紅花桃仁條芩槐花數劑而愈

大抵醉飽入房則經脉橫解則精氣脫泄脉絡一虛酒食之毒乘虛流注或淫極強固精氣遂傳大腸以致木乘火勢而毀金或食厚味過多必成斯疾

夫受病者燥濕也為病者濕熱也宜以瀉火和血潤

欽定四庫全書

外科理例

躁踈風之劑治之若破而不愈即成漏矣有串醫者有串陰者有串陽者有穢從瘡口出者形雖不同治法頗似其腸頭腫成塊者濕熱也作痛者風也大便燥結者火也潰而為膿者熱盛血也當各推其所因而治之

一人患痔成漏登側則痛以秦艽防風湯加條芩枳殼四劑而愈以四物加升麻芩連荆防不復作

一人患痔漏登側則肛門下脫作痛良久方收以秦艽



防風湯數劑少愈乃去大黃加黃芩川芎芍藥而痛止更以補中益氣湯二十餘劑後再不脫

一婦患痔漏焮痛甚以四物加芩連紅花桃仁牡丹皮四劑少止又數劑而愈

一人便血春間尤甚兼腹痛以和血除濕湯而愈

一人素有濕熱便血治以槐花散而愈

一人糞後下血諸藥久而不愈甚危診之乃濕熱用黃連丸二服頓止數服而痊

欽定四庫全書

外科理例

一婦素患痔漏而安因熱則下血數滴以四物加黃連治之而愈後因大勞瘡腫痛經水不止脉洪大按之無力此勞傷血氣火動而然也用八珍加黃芩連蒲二劑而止後去蒲黃芩連加地骨皮數劑而安

丹溪曰婦人崩中者由臟腑傷損衝任二脉血氣俱虛故也二脉為經脉之海血氣之行外循經絡內營臟腑若氣血調適經下依時若勞動過極



臟腑俱傷衝任之氣虛不能約制其經血故忽然而下謂之崩中暴下治宜大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣

一人因飲法酒肛門腫痛便秘脉實用黃連內疎湯而愈

一人便血過勞益甚飲食無味以六君子加黃耆地黃地榆而愈

欽定四庫全書

外科理例

一人糞後下血久不愈中氣不足以補中益氣湯數劑更以黃連丸數服血止又服前湯月餘不再作

一人臟毒下血服涼血敗毒藥不惟血不止且飲食少思肢體愈倦脉數按之則澹先以補中益氣湯數劑少止更以六君子加升麻炮薑四劑而止乃去炮薑加芎歸月餘脾胃亦愈常治積熱或風熱下血者先以敗毒散散之胃寒者氣弱者用四君子或參苓白



木散補之並効

一人臟毒下血脾氣素弱用六君子加芎歸枳殼地榆
槐花而愈後因謀事血復下諸藥不應予意思慮傷
脾所致投歸脾湯四劑而痊

大抵此症所致之由不一尚究其因而治之丹溪
云芎歸湯調血之上品熱加茯苓槐花冷加茯苓
木香此自根自本而論也蓋精氣生于谷氣惟大
腸下血以胃氣收功或四君子或參苓白朮散或

欽定四庫全書

外科理例

枳殼散小烏沉湯以和之胃氣一回血自循經絡
矣

腸風者邪氣外入隨感隨見臟毒者蘊積毒久而始
見人惟坐卧風濕醉飽房勞生冷停寒酒麪積熱
以致榮血失道滲入大腸此腸風臟毒之所作也
挾熱下血清而色鮮腹中有痛挾冷下血濁而色
黯腹內畧痛清則為腸風濁則臟毒有先便而後
血者其來也遠有先血而後便者其來也近世俗



糞前糞後之說非也治法先當解散腸胃之邪熱
則敗毒散冷則不換金正氣散加芎歸後隨其症
冷熱治之

河間云起居不節用力過度則絡脉傷陽絡傷則
血外溢而衄血陰絡傷則血內溢而便血腸胃之
絡傷則血溢腸外有寒汁沫與血相轉則併合凝
聚不得散而成積矣經云腸癖下膿血脉弦絕者
死滑大者生血溢身熱者死身涼者生諸方皆謂

欽定四庫全書

外科理例

風熱侵于大腸而然若飲食有節起居有時腸胃
不虛邪氣何從而入

一人痔漏每登廁脫肛良久方上脉細而微用補中

益氣湯六十三餘劑遂不再作

丹溪曰脫肛屬氣熱氣虛血虛血熱 氣虛者補

氣參耆芎歸升麻血虛者四物湯九血熱者涼血

四物湯加黃栢肺與大腸為表裡故肺臟蘊熱則

肛閉結肺臟虛寒則肛脫出 有婦人產育用力



及小兒久痢亦致此症治宜溫肺腑腸胃以自然收矣

人痔漏口乾胃脉弱此中氣不足津液短少不能上

潤而然治以黃耆六一湯^三十七味白朮散^廿一或曰諸

痛瘡瘍背屬心火宜服苦寒以泄火因致大便不禁

而歿

夫諸痛瘡瘍皆屬心火言其常也始熱終寒則反常

矣可泥此而不察乎

欽定四庫全書

外科理例

一婦糞後下血面色痿黃耳鳴嗜卧飲食不甘服涼血

藥愈甚右關脉浮而弱以加味四君子湯加升麻柴胡

數劑脾氣已腥兼黃連丸數劑而愈

大凡下血服涼血藥不應必因中氣虛不能攝血非

補中益陽之藥不能愈切忌寒涼之劑亦有傷濕熱

之食成腸癖而下膿血者宜苦寒之劑以內疎之脉

弦絕瀉者難治滑大柔和者易治

一人年五十每至秋脉沉瀉而糞後下紅飲食少進倦



欽定四庫全書

外科理例

胃之劑則陰血自循經隧矣數十劑後不復作

一人痔瘡腫痛便血尤甚脉洪且瀉經曰因而飽食筋脉橫解腸癖爲痔盖風氣通肝肝生風風生熱風客則淫氣傷精而成斯疾與黃耆黃連當歸生地防風枳殼白芷柴胡槐花地榆甘草斬愈次以黃連丸三丸而瘥又有便血數年百藥不應而色痿黃眼花頭暈亦用黃連丸而愈

一人患痔脉浮鼓午後發熱作痛以八珍湯加黃耆柴



胡地骨皮稍可彼欲速効以劫藥蝕之痛甚絕食而
歿

夫瘡之貴歛氣血使然也脉浮鼓日晡痛此氣血虛
也安曹五方爲高宗取痔得効官封至察使

人痔者貧富男女皆有之富者酒色財氣貧者擔輕負

重飢露早行皆心肝二血喜則傷心怒則傷肝喜怒

無常風血侵于大腸到穀道無出路結積成塊出血

生乳各有形相婦人因經後傷冷月事傷風餘血在

欽定四庫全書

外科理例

心經血流于大腸小兒痢後或母腹中受熱也治方

于後

水登膏 治痔護肉

欝金

白芨 各一兩 一方加黃連

右二味爲細末如內痔候登廁翻出在外用溫湯洗

淨側卧于床用溫水調令得中篋塗谷道四邊好肉

上以紙蓋藥留痔在外良久方用粘藥搽痔上時時

筆蘸溫水潤之不令藥乾亦勿使四散



好白礬

四兩

生信石

二錢五分

硃砂

一錢生研極細

右各研細末先用砒入磁泥罐次用白礬末蓋之煨令烟斷其砒盡隨烟去止借砒氣于礬中耳用礬爲極細末看痔大小取礬末在掌中更以硃砂小許以唾調稀篋挑塗痔上周遍一日三五上候痔顏色焦黑爲効至夜有黃水出盡爲妙至中夜上藥一遍來日依然上藥三次有小痛不妨換藥時以碗盛新水或溫湯在痔邊用筆輕洗去痔上舊藥再上新藥仍

欽定四庫全書

外科理例

用護肉膏次用荊芥湯澆之三兩日後黃水出將盡却于藥中增硃砂減白礬則藥力緩矣三兩日方可增減漸漸取之庶不驚人全在用藥人看痔頭轉色增減厚薄敷之此藥只借砒氣又有硃砂解之有將此二方在京治人多効二富丹溪曰瘡口不合補以大劑參耆歸朮灸以附子餅貼以補膏藥是也一人年踰四十有痔漏大便不實服五苓散愈加泄瀉飲食少思予謂非濕毒乃腸胃虛也宜理中湯彼不



爲然仍服五苓散愈盛復請治以理中湯及二神丸
月餘而愈

此因治而知中虛

一人因痔瘡怯弱以補中益氣湯

十六

少加苓連枳殼稍

愈後因怒加甚時仲冬脉得洪大予謂脉不應時乃

腎水不足火來乘之藥不能治果歿火旺之月常見

患痔者腎脉不足俱難治

一人有痔肛門脫出此濕熱下注真氣不能外舉其脉

果虛以四君子加芎歸黃耆蒼朮黃柏升麻柴胡治

欽定四庫全書

外科理例

之更以五味子煎湯熏洗彼以爲緩乃用砒霜等毒

藥蝕之而歿 夫劫藥特治其末耳能伐真元鮮不

害人戒之

一人因痔氣血愈虛飲食不甘小便不禁夜或遺精此

氣虛兼濕熱非瘡也用補中益氣湯

十六

加山藥山茱

萸五味子兼還少丹

九

治之而愈

一人痔漏膿出大便諸藥不應其脉頗實令用猪腰一

箇切開用黑牛末五分線札用荷葉包煨熟空心細



嚼溫溫鹽酒送下數服頓退更服托裡藥而愈

髮疽百十一

焮痛或發熱者祛風清熱

焮痛發寒熱或拘急者發散表邪

作膿焮痛者托裡消毒

膿已成作痛者針之

不斂或膿清者宜峻補

不作膿或膿成不潰者並用托裡

欽定四庫全書

外科理例

一人患此焮痛作腫發熱以小柴胡湯加連翹金銀花

桔梗四劑而消

此因症也

一人因怒後髮際腫痛發熱以小柴胡湯加連翹金銀

花天花粉四劑根畔俱消惟瘡頭作痛以仙方活命

飲二劑痛止膿熟針之更以托裡消毒藥而愈

此因情也

一老腫痛發熱膿清作渴脉軟而澹此氣血俱虛也欲

補之彼見作渴發熱乃服降火之劑果作嘔少食復

求治投六君子湯四劑嘔止食進仍用補藥月餘而



愈

此因症與脉也

夫患者臟腑氣血上下虛實

詳見潰瘍作痛第十

三條

況陰症似陽陽症似陰

治論見外科心法

豈可以發熱作

渴而遂用寒涼之劑常治患者正氣虛邪氣實以托裡為主消毒佐之正氣實邪氣虛以攻毒為主托裡佐之正氣虛邪氣實而專用攻毒則先損胃氣宜先服仙方活命飲托裡消毒散或用灸法俟邪氣退正氣復更酌量治之

大抵正氣奪則虛邪氣盛則實蓋邪正不並立一勝

欽定四庫全書

外科理例

則一負其虛不待損而自虛矣若發背腦疽疔毒及患在四肢必用灸法拔引鬱毒以行瘀滯尤不可專于攻毒診其脉而辨之庶不有悞

一官肩患毒發熱惡寒大渴煩躁症似有餘脉雖大而無力却屬不足用當歸補血湯治之

此憑脉也

一人膿熟不潰脹痛針之而止更以托裡消毒散而愈凡膿熟不潰血氣虛也若不托裡必致難差

一人作膿焮痛發嘔少食以仙方活命飲一劑而止以



六君子加當歸桔梗皂角刺潰而愈	此憑症也
一人膿清不斂以托裡散加五味麥門而愈	此憑症也
一人嗜酒與煎燂年五十餘夏初左絲竹空穴忽努出	
一角長短大小如雞距而稍堅予曰此少陽所過氣	
多血少未易治也須斷肉味先解其食毒針灸以開	
洩其壅滯彼不聽以大黃朴消腦子等冷藥盒之一	
夕豁開如醬蚶徑三寸二日後蚶中濺血高數寸而	
死因冷外逼氣鬱不得發宜其發之暴也如此	此憑症也
欽定四庫全書	外科理例
一人腫痛寒熱拘急脉浮數以荆防敗毒散二劑表症	
悉退更以托裡消毒散潰之而安	此因症也
一人焮腫痛甚發寒熱服十宣散愈熾診之脉數而實	
此表裡俱有邪也以荆防敗毒散加芩連大黃二劑	
少愈更以荆防敗毒散四劑而消	
俞黃門年踰三十冬患鬢毒腫焮煩躁便秘脉實此膽	
經風熱壅上也馬氏曰瘡瘍熱實不利者大黃湯下	
之一劑便通瘡退更以荆防敗毒散	七
二劑十宣散	



去桂加天花粉金銀花數劑而愈

此憑症
脉也

一人頭面焮腫作痛時仲冬脉弦緊以托裡溫經湯汗之而消

趙宜人年踰七十鬢疽已潰焮腫痛甚喜冷脉實便秘

東垣云煩躁飲冷身熱脉大精神昏悶者臟腑實也

以清涼飲

二

腫痛悉退更以托裡藥三十餘劑而平

此憑脉
症也

機按前疽雖出少陽血少之分然症與脉皆属于實

欽定四庫全書

外科理例

故年壯者用瀉劑之重老年者用瀉劑之輕若拘以年老或守其經禁而投補劑實實之禍難免矣

脇疽一百十二

一人年踰五十腋下患毒瘡口不合右關脉數而渴此

胃火也用竹葉黃耆湯

二

而止再用補氣藥而愈嘗

治午後發渴或發熱用地骨皮散効

一人性急味厚常服躁熱之藥左脇一點痛輕胗弦重

芤知其痛處有膿與四物加桔梗香附生薑煎十餘



貼痛處微腫如指大針之少時屈身膿出與四物調
理而安

此因症因
脉而處治

一夫人左脇內作痛牽引胸前此肝氣不和尚未成瘡

用小柴胡

五

加青皮枳殼四劑少可加芎歸治之而

愈

一人連年病瘧後生子三月病熱右脇下陽明少陽之

分生一癰甫平左脇下相對又一癰膿血淋漓幾死

醫以四物湯敗毒散數倍人參以香附為佐犀角為

欽定四庫全書

外科理例

使大料飲乳母兩月而愈踰三月忽腹脹生赤瘡如

霞片取剪刀草汁調原蠶沙傳隨消又半月移脹入

囊為腫黃瑩裂開兩丸顯露水出以紫蘊葉盛熨炭

末托之旬餘而合此胎毒症也

一婦因忿鬱腋下結一核二十餘年因怒加腫痛完谷

不化飲食少思此腸胃虛也以六君子

六

加砂仁肉

桂乾薑肉豆寇泄雖止而膿清瘡口不合用十全大

補湯

十

三月餘而愈

此憑
症也



機按前項二條脇瘡一因其性多躁急故用四物湯
陰柔之劑以安靜之一因其肝氣不平故用小柴胡
疎理之劑以和解之此又因其性情爲治不恃專于
攻毒也

張通北人年踰四十夏月腋下患毒潰後不斂膿出清
稀皮寒脉弱腸鳴切痛大便溏泄食下即嘔此寒變
而內陷也宜大辛溫之劑遂以托裡溫中湯一二貼
諸症悉退更以六君子二加炮乾薑肉桂數劑再以

欽定四庫全書

外科理例

十全大補湯而愈

此憑症也

一人脇腫一塊日久不潰按之微痛脉微而澹此形症
俱虛也經曰形氣不足病氣不足當補不當瀉宜用
人參養榮湯彼不信乃服流氣飲虛症悉至方服前
湯月餘少愈但腫尚硬以艾葉炒熱熨患處至十餘
日膿成以火針刺之更灸豆豉餅四又服十全大補
湯三百貼而愈此憑脉症也
蓋流氣飲通行十二經諸經皆爲所損况膽經之血



木少又從而損之寧不傷生東垣曰凡一經受病止
當求責其一經不可干擾餘經苟泛投剋伐之劑則
諸經被戕寧無危乎

一人年三十素飢寒患右肋腫如覆瓢轉側作水聲脉
數經曰陰虛陽氣湊襲寒化為熱熱甚則肉腐為膿
即此症也及按其腫處即起是膿成遂濃煎黃耆六
一湯令先飲二鍾然後針之膿出數椀虛症並至遂
用大補三月餘而愈

此憑脉
症也

欽定四庫全書

外科理例

大抵膿血大泄血氣俱虛當峻補之雖有他病皆宜
緩十全大補湯^十加遠志貝母白欬續斷灸以附子
餅膿漸少調護歲餘而愈

此憑
症也

一少婦胸膈間潰一竅膿血與口中所效相應而出以
參耆當歸加退熱排膿等藥而愈一說此因肺痿所
致

一人胸腫一塊半載不消令灸百壯方潰服大補藥不

欬灸附子餅而愈

此憑
症也



一百戶胸患毒腫高焮赤發熱脉數大小便澁飲食如	常齊氏曰腫起色赤寒熱疼痛皮膚壯熱頭目昏重	氣血實也又曰大小便澁飲食如故腸滿膨脹胸膈痞	悶肢節疼痛身熱脉大精神昏塞臟腑實也進黃連	內疎湯 ^三 二劑諸症悉退更以荊防敗毒散加黃芩	山梔四劑少愈再以四物加芩連白芷桔梗甘草金	銀花數劑而消 ^{此憑脉} 症也	機按此項治法雖因脉症皆實而用泄法然瀉法又	欽定四庫全書 外科理例	有前後次序先攻裡後發表最後又用和解前賢治	病不肯孟浪如此學者可不以此為法哉	腦疽一百十二	腫痛未作膿者宜除濕消毒 黃連消毒飲之類	大痛或不痛或麻木者毒甚也 隔蒜灸之更用解毒	藥	腫痛便秘者邪在內也泄之	不甚痛或不作膿者虛也托裡為主



膿成脹痛者針之更以托裡

不作膿或不潰者托裡藥為主

膿潰或不斂或多者大補氣血

大凡元氣一復諸病自退老弱之人不問腫潰尤當
補也

一人因勞發熱脇下腫痛脉雖大按之無力此氣血虛
腠理不密邪氣襲于肉理而然也當補之以接虛怯
之氣以補中益氣湯加羌活四劑少可去羌活又百

欽定四庫全書

外科理例

餘劑而愈

此憑脉也

一人面白神勞脇下生一紅腫如桃教用補劑不信乃
用流氣飲十宣散血氣俱憊而死

一人年踰二十腋下患毒十餘日腫硬不潰脉弱時嘔
予謂腫硬不潰陽氣虛嘔吐少食胃氣弱宜六君子
湯加砂仁藿香彼謂腫瘍時嘔毒氣攻心潰瘍時嘔
陰虛宜補予曰此丹溪大概言也若腫赤痛甚煩躁
脉實而嘔為有餘當作毒氣攻心而下之以瘡屬心



火故也腫硬不潰脉弱時嘔爲不足當補之亦有痛
傷胃氣或感寒邪穢氣而嘔者雖腫瘍尤當助胃壯
氣蓋腫瘍毒氣內侵作嘔十有一二潰瘍濕氣內傷
作嘔十有八九彼不信飲攻伐藥愈甚復請診脉微
弱而發熱予謂熱而脉靜及脫血脉實汗後脉躁皆
難治果歿

此憑脉
症也

胸瘍一百十四

一夫人性剛多怒胸前作痛肉色不變脉數惡寒經曰

欽定四庫全書

外科理例

洪數脉應發熱反惡寒瘡疽也今脉洪數則膿已成
但體豐厚故色不變似乎無膿以痛極始肯針入數
寸膿數椀以清肝消毒藥治之而愈設泥其色而不
用針無可救之理

此憑症
脉也

一人年踰四十胸患瘡成漏日出膿椀許喜飲食如常
用煩躁飲冷脉實而痛宜瀉火

一人素不慎起居飲食焮赤腫痛尺脉洪數以黃連消
毒散一劑濕熱頓除惟腫硬作痛以仙方活命飲二



劑腫痛悉退但瘡頭不消投十宣去桂加金銀花藁
本白朮茯苓陳皮以托裡排膿彼欲全消自制黃連
解毒散二服反腫硬不作膿始悟仍用十宣散加白
朮茯苓陳皮半夏腫少退仍去桂又四劑而膿成腫
勢亦退繼以八珍湯加黃耆五味子麥門月餘膿潰
而愈

此憑脉
症也

夫苦寒之藥難治陽症尤當分表裏虛實次第時宜
豈可始末悉用之然焮腫赤痛尺脉數按之則濡乃

欽定四庫全書

外科理例

膀胱經濕熱壅盛也故用黃連消毒散以解毒除濕
顧腫硬作痛乃氣血凝滯不行而作也遂用仙方活
命飲以散結消毒破血也其瘡頭不消蓋因熱毒薰
蒸氣血凝滯而然也宜用甘溫之劑補益陽氣托裡
以腐潰之況此症原屬腎脉經因虛火盛而出若不
審其因專用苦寒之藥胃氣以傷何以腐化收斂幾
何不致于敗耶凡瘡易消散易腐潰易收斂皆氣血
壯盛故也



一人耳後漫腫作痛肉色不變脉微數以小柴胡湯加	芎歸桔梗四劑腫少起更以托裡消毒散數劑脉活	數此膿已成宜針彼畏不從因痛極始針出膿梔許	以托裡藥兩月餘始安	此憑脉症也	一人腦疽腫痛脉數以黃連消毒散二劑少退與仙方	活命飲二劑而止再以當歸川芎芍藥金銀花黃柏	知母而潰又以托裡藥而愈	此憑脉症也	一人頭項俱痛雖大潰腫痛益甚兼作瀉煩躁不睡飲	欽定四庫全書	外科理例	食少思其勢可畏診其脉毒尚在與仙方活命飲二	劑腫痛退半與二神丸及六君子湯加五味麥門酸	棗仁四劑諸症少退食頗進睡少得及與參苓白朮	散數服飲食頗進又與十全大補湯加金銀花白芷	桔梗月餘差	一老患此色赤腫痛脉數有力與黃連消毒散二劑少	退更與清心蓮子飲四劑而消	此憑脉症也	一人腫硬不作膿惟瘡頭出水疼甚以仙方活命飲二



劑痛止而膿成針之更以托裡藥而愈

一婦腦左腫痛左鼻出膿年餘不愈時或掉眩如坐舟

車許叔微曰肝虛風邪襲之然也以川芎一兩當歸

三錢羌活旋覆花細辛防風蔓荊子石膏藁本荊芥

穗半夏麴乾地黃甘草各半兩每服一兩薑水煎服

一料而愈

機按此條認作肝虛風邪襲之而治以去風清熱養血

祛痰之劑因其掉眩痛偏于左也經曰諸風掉眩皆

欽定四庫全書

外科理例

屬肝木又病偏左乃肝膽所主又曰風從上受之又

曰無痰不成眩暈又曰肝藏血又曰風乃陽邪故方

以風熱痰血而主治者理也

一人腦疽已十餘日面目腫閉頭焮如斗脉洪數煩燥

飲冷此膀胱濕熱所致用黃連消毒飲

百十九

二劑次

飲槐花酒二碗頓退以指按下腫則復起此膿已成

于頸額肩頰各刺一孔膿並湧出口目始開更以托

裡藥加金銀花連翹三十餘貼而愈

此憑脉症也



一兒頭患白瘡皮光且急諸藥不應名曰腦疳瘡乃胎毒挾風熱而成服龍膽丸三百十及吹蘆會末鼻內兼搽解毒散而愈若重者髮結如穗腦熱如火遍身出汗腮腫胸高尤宜此藥

機按龍膽丸蘆會末皆涼肝膽殺虫之劑蓋肝膽主風又風木自甚則生虫故治疳多此藥也

一人素飲酒九月患腦之下項之上出小瘡後數日腦

項麻木腫勢外焮瘍醫處五香連翹且云不可速療

欽定四庫全書

外科理例

俟膿出用藥或砭刺三月可平四月如故予曰凡瘡見膿九死一生果如醫言則束手待斃矣且膏粱之變不當投五香當先火攻然後用藥以大艾炷如兩核許者灸至百壯乃痛次爲處方足太陽膀胱經其病逆當反治脉得弦緊按之洪大而數有力必當伏其所主而先其所因其始則同其終則異以時言之可收不可汗經與病禁下法當結者散之鹹以熨之然寒受邪而又禁鹹遂以諸苦寒爲君甘寒爲佐酒



熱爲因用大辛以解結爲臣三辛三甘益元氣而和
血脉淡滲以導酒濕扶持秋令益氣瀉火以入本經
藥通經爲引用故以羌活獨活防風藁本連翹以解
結黃連芩栝知母酒製以瀉火生甘草泄胃火補下
焦元氣參耆橘皮以補胃但參耆甘草配諸苦寒藥
三之一多則滋營氣補土濕邪也蘓木歸尾去惡血
生地黃補血酒防已除膀胱留熱澤瀉助秋去酒濕
熱凡此諸藥必得桔梗爲舟楫乃不下沉服之投床

欽定四庫全書

外科理例

大斲日出乃寤以手捫瘡腫減七八至瘡痂斂都十
四日而已

機按脉之緊弦主瘡痛按之洪數主內熱大陽寒水
而受陽熱故曰其病逆寒水之經而用寒涼之藥故
曰反治此因脉因經因其所嗜而制此方也

一人患腦疽勢劇脉實用黃連消毒散不應以金銀藤
二兩水二鍾煎一鍾入酒半碗服之勢去三四再服
漸退又加黃栝知母瓜蒌當歸甘草節數劑而潰止



加黃耆川芎白芷桔梗數劑而愈	機按此條憑脉而治也
一人腦疽其頭數多痛不可忍服消毒藥不應更以金銀花服之即鼾睡覺而勢去六七再四劑而消	
一人所患尤甚亦令服之腫痛頓退但不能平加黃耆當歸瓜蒌仁白芷桔梗甘草節數劑而愈	
前條因治不應而變法後條因疽而處治	
一人膿將成微痛兼渴尺脉大而無力此陰虛火動之症彼謂心經熱毒自服清涼降火藥愈熾復求治乃	
欽定四庫全書	外科理例
以四物湯加黃栢知母五味麥門黃耆及加減八味丸渴止瘡潰更以托裡藥兼前丸而愈	此憑脉也
一婦膿成不潰脹痛欲嘔飲食少思急針之與托裡藥而愈	此憑症也
一婦腦疽不甚痛作膿以托裡消毒膿成針之補以托裡藥亦愈	此憑症也
一老人膿清兼作渴脉軟而濇予以爲氣血俱虛用八珍湯加黃耆五味彼不信乃服降火之劑果反作嘔	



少食始信服香砂六君子湯四劑嘔止食進仍投前
湯月餘而愈

此脉憑
症也

一人未潰兼作渴尺脉大而無力以四物湯加黃栢知
母黃耆麥門四劑而渴減又與加減八味丸渴止瘡

潰更用托裡藥兼前丸而愈

此憑
症也

一夫人年踰八十腦疽已潰發背繼生頭如粟許脉大
無力此膀胱經濕熱所致脉無力血氣衰進托裡藥
消毒數服稍可更加參耆雖起而渴此血氣虛甚以

欽定四庫全書

外科理例

參耆各一兩歸地各五錢麥門五味各一錢數服渴
止不潰加肉桂十餘劑膿成針之瘀肉漸腐徐徐取
去而膿清不斂投十全大補湯^十加白斂貝母遠志
三十餘劑膿稠而愈設不峻補不去腐肉以渴爲火
投以涼藥寧免死哉 瘡疽之症雖屬心火當分表
裏虛實果元氣充實內有實火寒劑或可責効若寒
涼過度使胃寒脾弱陽症變陰或結而不潰或潰而
不斂陰陽乖戾水火交爭死無日矣

機按此憑形憑
脉憑症而治之



也

一人腫痛脉數以荆防敗毒散二劑而痛止更以托裡

消毒藥而消

此憑脉也

一人焮腫疼痛發熱飲冷脉洪數與涼膈散二劑而止

以金銀花四劑而潰更以托裏藥而愈

此憑症脉也

一老婦稟實潰而痛不止脉實便秘以清涼二劑而止

便以托裏消毒藥而愈

此憑脉也

一婦年踰七十冬至後腦出疽如甌面大瘍醫診視候

欽定四庫全書

外科理例

熟以針出膿因怒答婢疽輒凹陷一韭葉許面色青

黃不澤四肢逆冷汗出身清時嘔吐脉極沉細而遲

盖緣衰老之年嚴寒之時病中苦楚飲食淡薄肥膿

之氣色滌瘦悴之形獨存加之暴怒精神愈損故有

此寒變也病與時同速製五香湯一劑加丁香附子

冬五錢劑盡疽復大發隨症調理而愈

經曰治病必察其下謂察時下之宜諸痛瘡瘍皆屬

心火言其常也如瘡盛形羸邪高痛下始熱終寒此



反常也固當察時下之宜而權治之不可執一
機按此條年老冬寒理宜溫補茲用五香湯加丁附
以辛散何也蓋因其怒氣鬱結阻碍陽氣不得營運
致疽凹陷且脉極沉細而遲其爲氣鬱可知矣故用
五香以開結丁附以助陽則鬱散陽復疽乃大發此
亦因其性因其脉而爲治也

一人腦疽作渴脉雖洪按之無力予咬咀加減八味丸
與之彼不信自用滋陰等藥七惡併至而歿精要曰

欽定四庫全書

外科理例

患疽雖云有熱皆因虛而得之愈後作渴或先渴後
疽非加減八味丸不能治

一婦年將七十形實性急好酒腦疽纔五日脉緊急又
瀉急用大黃酒煨細切酒拌炒爲末又酒拌人參炒
入薑煎調一錢服過兩時再與得卧而上半身汗睡
覺病已失此亦內托之意

機按此治因性急因好酒兼因其脉而制此方脉緊
急且瀉由其性急嗜酒以傷其血而然故用大黃以



洩酒熱人參以養氣血也

一人便血數年舌下筋紫午後唇下赤胃肺脉洪予謂
大腸脉散舌下大腸有熱故舌下筋紫而又便血胃
脉環承漿唇下即承漿午後因火旺故承漿發赤盖
胃爲本肺爲標乃標本有熱也用防風通聖散^{十四}爲
九治之而愈後每睡覺驚跳而起不自知其故如是
者年餘腦發一毒焮痛左尺脉數此膀胱經熱而然
服黃連消毒散數劑少愈次服金銀花瓜蒌甘草節

欽定四庫全書

外科理例

當歸月餘而平

機按便血之後睡覺驚跳者由失血陰虛心失所養
而然陰虛陽必亢頭爲諸陽之首故亢陽上從于陽
疽發于腦此條治法因經因脉而制方也

杜清碧病腦疽療之不愈丹溪往視之曰何不服防風

通聖散^{十四}曰已服數劑丹溪曰合以酒製之清碧乃

自悟以爲不及

^{此因症也}

一舉人年踰四十患腦疽腫焮其脉沉靜此陽症陰脉



斷不起果歿													
欽定四庫全書													
外科理例													
外科理例卷四													



欽定四庫全書

子部
外科理例卷五

詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官助教臣胡子襄

謄錄監生臣崔堂



欽定四庫全書

外科理例卷五

明 汪機 撰

臂疽一百十五

一人年將六十五月患右臂膊腫盛上至肩下至手指
色變皮膚涼六脈沉細而微此脈症俱寒乃附骨癰
也開發已遲以燔針啟之膿清稀解次日肘下再開
之加呃逆不絕與丁香柿蒂散兩服稍緩次日吃逆

欽定四庫全書

外科理例

尤甚自利臍腹冷痛腹滿食減時發昏憤灸左乳下
黑盡處二七壯又處托裡溫中湯一兩半與服或曰
諸痛瘡瘍皆屬心火又時當盛暑而用薑附可乎予
曰經云脈細皮寒瀉利前後飲食不入是為五虛况
呃逆胃中虛寒此症內外相反須當舍時從症遂投
之諸症悉去飲食倍進瘡勢溫膿色正復用五香湯
數服月餘而愈

機按此症多屬虛寒此方專用辛熱以治之其寒



不用參朮以補其虛蓋因呃逆腹滿乃氣鬱壅也
想必其人年雖老脈症雖虛而形體頗實非陰虛
呃逆比

一揮使臂腫一塊不痛不赤脈弱懶食時嘔以六君子

二加藿香酒炒芍藥嘔止食進再以八珍湯_{四十}

餘劑膿成刺之又以十全大補而愈次年傷寒後臂

復腫微痛乃傷寒餘毒也然無表症但虛弱耳先用

十宣散四劑取參耆芍歸扶助元氣防風桔梗白芷

欽定四庫全書

外科理例

厚朴行散腫結肉桂引經破血腫退三四再用八珍

湯膿潰而愈至冬臂復作痛因服祛風藥反筋攣痛

甚此血虛不能養筋筋虛不能束骨用加味十全大

補湯_{二十}百貼而愈

一女臂患腫潰久不斂寒熱交作五心煩熱飲食少思

月水不通以逍遙散月餘少可更服八珍湯_{四十}加牡

丹皮香附又月餘經通再加黃耆白朮兩月餘而愈

此憑
症也



一人臂腫患毒作痛服寒涼藥食少大便不實予用理
中丸二服更以六君子加砂仁藿香再以托裡膿潰
而愈

此因治不應而變方也

凡瘡痛甚者若稟厚有火宜苦寒藥若稟薄者宜補
中益氣湯加芩連之類在下加黃栢人肥加荆防獨
羌之類取其風能勝濕也

婦左臂膽經部分結腫一塊年許不潰堅硬不痛肉
色不變脈弱少食月水過期日晡發熱遇勞或怒則

欽定四庫全書

外科理例

痛此不足症也與參耆歸朮芍地芍藥貝母遠志香
附桔梗牡丹皮甘草百餘貼而消

此因症脈也

大抵婦人之病多起於鬱鬱則氣血受傷百病
生矣

一人臂患漏口乾發熱喜膿不清稀脈來遲緩灸以豆
豉餅服八珍湯

四十

加麥門五味軟柴胡地骨皮三月

餘而愈後因房勞復潰膿清脈大辭不治果歿

河間曰因病致虛為輕蓋病勢尚淺元氣未虛也若



病初愈或飲食勞倦房勞加至羸損此因虛致損則為重病勢已過元氣已索故也

一兒臂患痘毒作抄按之復起此膿脹痛也刺之以托裡而愈

一婦臂結一塊已潰不斂灸以豆豉餅更服托裏藥而愈

一人年踰三十素怯弱不能食冷臂患一毒脈虛弱予以托裏藥而消但飲食少思或作脹或吞酸日漸羸

欽定四庫全書

外科理例

瘦參苓等藥不應右尺脈弱此命門火衰不能生土

遂以八味丸補土之原飲食漸進而愈

此憑脈症也

一媼左臂結核年餘方潰膿清不斂以十全大補湯

三十

外用附子餅灸及貼補藥膏調護得宜百貼而愈

此憑

症也

一人多慮神勞年近五十左膊外側紅腫如粟予曰勿

輕視得獨參湯數斤乃佳數貼而止旬餘值大風拔

木瘡上起一紅線繞背抵右肋與大料人參湯加芎



木補劑兩月而安 機按此條因形因經而為治也	一婦臂痛筋攣不能屈伸遇寒則劇脈緊細此良甫所謂肝氣虛為風寒流於血脈經絡搏於筋筋不榮則	乾急為痛先用舒筋湯三更用四物湯九加牡丹皮	澤蘭白朮而愈亦有臂痛不能舉或轉左右作痛由	中脘伏痰脾氣滯不行宜茯苓丸一百或控涎丹治	之處此因脈之治	欽定四庫全書 外科理例	一人手臂結核如粟延至頸項狀似癰瘰此風濕流注	用加減小續命湯七及獨活寄生湯七更以托裡藥	倍加參耆歸朮百貼而愈	機按此條有症急脈認作風濕流注而治當時必	有所見也後用補劑百貼而愈是終不離于虛也	一兒三歲臂患毒焮痛服解毒丸搽神功散六而消此	症脈不詳當一嘗治臂毒便閉煩燥服五福化毒丹百	亦効若膿成急刺用紙撚醯麻油絰瘡內以膏藥



貼之若兒安靜不必服藥候有膿取去仍用絛貼

一人肩患疽脈數飲槐花酒一服勢頓退再與金銀花

黃耆甘草十餘服而平

此憑脈也

槐花治濕熱之功最為神速胃寒不宜過劑

尹老家貧形志皆苦自幼顏疔孟冬於手陽明大腸經分出癰

第四日稠膿臂外皆腫痛在手陽明左右經中其脈俱弦

按之洪緩有力此得自八風之變以脈斷之邪氣在表

飲食如常大小便如故腹中和口知味知不在裡也不惡

欽定四庫全書

外科理例

風寒只熱躁脈不浮知不在表也表裏既和邪在經脈

之中故曰凝手血脈為癰是也癰出身半已上故風從

上受因知為八風之變而瘡只在經脈之中法當却寒

調和經脈中血氣使無凝滯可愈矣宜用以白芷升麻湯

一百三十九

機按此方舉一身而言故陽明為一身之中若以

各經言之而陽明亦自有表裏中三等之劑太陽

亦有表裏中之方餘經皆可以類推也

一人年踰三十臂患癰潰而不痛膿稀脈弱丹溪曰疽



潰深而不痛者胃氣大虛不知痛也東垣曰膿水清
稀瘡口不合氣血俱虛也理宜大補彼不聽服消毒
藥氣血愈虛遂不救

丹溪曰纔見腫痛叅之脈症倘有虛弱便與滋補氣
血可保終吉又曰潰瘍內外皆虛補接為主茲則見
善不從自用已智寧免死乎

一人年逾四十臂患毒焮痛作嘔服托裏消毒藥愈盛
予用涼膈散二劑頓退更以四物湯加芩連四劑而

欽定四庫全書

外科理例

消

機按此則所謂腫瘍熱毒攻心而作嘔也

一人兩臂腫痛服托裏藥日盛予謂腫屬濕痛屬大此
濕熱流注經絡也用人參敗毒散加威靈仙酒炒黃
芩南星數劑漸愈更以四物湯九加蒼朮黃柏桔梗
二十餘劑而消 按此托裏藥日盛故改作濕熱
治也

一尚書左臂肘患一紫泡根畔腫赤大腸脈芤予謂芤



主失血或積血公曰血痢未瘳以芍藥湯^九十二劑更
以人參敗毒散^六二劑瘡痢並愈

機按用芍藥湯以治血痢用敗毒散以治紫泡但
所錄脈症未甚詳悉觀其所治多屬血熱而近實
也

背疽一百十六

焮痛或不痛及麻木者邪氣盛也隔蒜灸之痛者灸至
不痛不痛者灸至痛毒隨火而散再不痛者須明灸

欽定四庫全書

外科理例

不隔蒜灸之或用黃連解毒散之類

右關脈弱而肌肉遲生者宜健脾胃

頭痛拘急乃表症先服人參敗毒散一二劑如焮痛用

金銀花散或槐花酒神効托裏散

焮痛腫硬脈實者以清涼飲仙方活命飲苦參丸

腫硬木悶疼痛發熱煩燥飲冷便秘脈沉實者內疎黃

連湯或清涼飲大便已利欲得作膿用仙方活命飲

托裏散蠟礬丸外用神異膏



飲食少思或不甘美用六君子湯加藿香連進三五劑
更用雄黃解毒散洗患處每日用烏金膏塗瘡口處
候有瘡口即用紙作捻蘸烏金膏絛入瘡內若有膿
為脂膜間隔不出而作脹痛者宜用針引之腐肉堵
塞者去之若瘡肉腐動用猪蹄湯洗如膿稠或痛飲
食如常瘡肉自腐用消毒與托裏藥相兼服之仍用
前二膏塗貼若腐肉已離好肉宜速去之如膿不稠
不稀微有疼痛飲食不甘瘡肉腐遲更用桑柴灸之

欽定四庫全書

外科理例

亦用托裏藥若瘡肉不腐或膿清稀不焮痛者急服
大補之劑亦用桑柴灸之以補接陽氣解散鬱毒
大抵氣血壯實或毒輕少者可假藥力或自腐潰怯
弱之人熱毒中膈內外不通不行針灸藥無全功然
此症若膿已成宜急開之否則重者潰通臟腑腐爛
筋骨輕者延潰良肉難於收功因而不斂者多矣
一人患此痛甚服消毒藥愈熾予為隔蒜灸之而止與
仙方活命飲二劑頓退以托裏藥潰而愈

此憑
症也



一婦發熱煩躁飲冷與黃連解毒湯四劑少愈更與托裏消毒散始潰與托裏藥而斂 此憑症也	一人已愈惟一眼番出努肉如菌三月不愈乃傷風寒也以生豬油調藜蘆末塗之即愈亦有努出三寸許者烏梅塗之亦効但緩硫黃亦可 此憑症也	一人年踰五十患已五日焮腫大痛赤暈尺餘重如負石勢熾當峻攻察其脈又不宜遂先砭赤處出黑血碗許腫痛背重皆去更敷神効散及服仙方活命飲	欽定四庫全書 外科理例	二劑瘡口及砭處出黑水而消 此憑症也	大抵瘡毒勢甚若用攻劑怯弱之人必損元氣因而變症者多矣	一人焮腫作痛脈浮數與內托復煎散二劑少退與仙方活命飲四劑痛止而潰再與托裏藥而愈 此憑脈症也	一人毒勢熾甚痛不可忍諸藥不應以仙方活命飲二劑諸症悉退又二劑而潰以金銀花散六劑而愈 此憑症也	也



一人厚味氣鬱形實性重年近六十背疽醫與他藥皆	不行惟飲香附末甚快自腫至潰始終只此一味而	安然此等體實而又病實蓋千百而一見也每思香	附經不言補惟不老湯乃言有益於老人用片子姜	黃甘草香附三味以不老為名且引鐵瓮先生與劉	君為證夫豈無其故哉蓋於行中有補之理耳天之	所以為天健而有常因其不息所以生生無窮正如	芫蔚活血行氣有補陰之妙故名益母胎產所恃者	欽定四庫全書 外科理例	氣血也胎前無滯產後無虛以其行中有補也夏枯	草治療瘰亦然 此因情性而治	一人感冒後發瘰不醒人事磨死贅肉三寸許一塊此	膀胱經必有濕熱其脈果數予謂死肉最毒宜速去	之否則延害良肉多致不救取之果不知痛因瘰不	止疑為去肉所觸予曰非也由風熱未已彼不聽另	用乳沒之劑愈盛復請治予以怯風消毒敷貼飲以	怯風涼血化痰降火之劑而愈 按此因脈因症



而處治也

一通府發背十餘日勢危脈大先飲槐花酒二服殺其
勢退再飲敗毒散二劑更飲托裡藥數劑漸潰又
周桑柴燃灸患處每日灸良以仍貼膏藥灸至數次
膿潰腐脫以托裏藥加白朮陳皮月餘而愈

按此先發後補當時必有所見也惜乎脈症不甚
詳悉

一縣尹發背六七日滿背腫痛勢甚危隔蒜灸百壯飲

欽定四庫全書

外科理例

槐花酒二碗即睡覺用托裏藥消毒十去五六令將
桑柴燃患處而潰數日而愈

一侍御髀髀患毒痛甚服消毒藥不減飲槐花酒一服
勢隨大退再用托裏消毒藥而愈

大抵腫毒非用蒜灸及飲槐花酒先殺其勢雖用托

裏諸藥其効未必甚速

按前條皆先
瀉後補法

一園丁發背甚危取金銀藤五六兩搗爛入熱酒一鍾
絞取汁溫服粗罨患處四五服而平彼用此藥治瘡



足以養身成家遂棄園業蓋金銀花治瘡未成即散
已成即潰有回生之功

一婦半月餘尚不發起不作膿痛甚脈弱隔蒜灸二十
餘壯而止更服托裏藥漸潰膿清而瘡肉不腐以大

補藥及桑柴灸之漸腐取之而尋愈

此憑脈症也

一人腐肉漸脫而膿微清飲食無味以十宣散去白芷

防風加茯苓白朮陳皮月餘而斂

此憑症也

一人將愈但肌肉生遲脾胃俱虛以六君子湯加芎歸

欽定四庫全書

外科理例

五味黃耆治之而愈

此憑症也

一人已愈惟一口不斂脈浮而濇以十全大補湯治之

而愈

此憑脈也

一老人七十餘背疽徑尺餘雜服五香湯十宣散數十
貼膿血腥穢嘔逆不食旬餘病人自言服十宣散膈
中不安且素有淋病三十年今苦淋痛嘔逆及不得
睡而已急煎參耆歸朮膏以牛膝湯入竹瀝調化與
之三日盡藥斤半淋止思食七日盡藥四斤膿自湧



出得睡兼旬而安時六七月也

此憑症也

一人年六十餘好酒肉背疽見膿嘔逆發熱得十宣已多醫以嘔逆投嘉禾散加丁香時七月大熱脈洪數有力予曰脈症在潰瘍尤忌然形氣尚可為只與獨參湯加竹瀝盡藥十五六斤竹百餘竿而安予曰此幸耳不薄味必再發後因夏月醉坐池中左脇傍生軟塊如餅二年後潰為疽自見脈症如前仍服參膏竹瀝而安

欽定四庫全書

外科理例

二人年老血氣弱無以供給膿血胃虛而嘔若與十宣寧保無危

機按後條乃膏粱積熱之變宜用寒涼之劑茲用驟補蓋以年老潰瘍故也

一婦發背用托裏消毒藥二十餘劑而潰因怒頓吐血五六椀氣弱脈細此氣血虛極也令服獨參膏斤許少緩更以參耆歸木陳皮炙甘草三十餘劑瘡口漸合若投犀角地黄湯沉寒之藥鮮不悞矣

此憑脈症也



一婦年踰四十發背治以托裏藥而潰或嘔而瘡痛胃
脈弦緊彼為餘毒內攻東垣云吐嘔無時手足逆冷
臟腑虛也丹溪曰潰後發嘔不食者濕氣侵內也又
云膿出反痛虛也今胃脈弦緊木乘土位其虛明矣
用六君子^二加酒炒芍藥砂仁藿香彼自服護心散
嘔愈盛復邀治仍用前藥更以補氣血藥兩月而愈
此憑脈
症也

欽定四庫全書

外科理例

毒內攻而作嘔必喜涼而脈數必須辨認明白亦有
大便不實或腹痛或膨脹或嘔吐或吞酸噯腐此腸
胃虛寒宜理中丸不應加熟附子二三片有侵晨作
瀉者名曰腎泄宜二神丸有食少漸瘦者為脾腎虛
尤宜二神丸又治夢遺生肌肉聖藥予嘗飲食少思
吞酸噯腐諸藥不應惟服理中丸及附子理中丸有
効蓋此皆因中氣虛寒不能運化鬱滯所致故用溫
補之劑中氣溫和自無此症



一人渴後發背未潰脈數無力此陰虛火動咬咀加減
八味丸二劑稍緩次用丸藥而愈

此憑脈
症也

一人年踰五十發背生肌太早背竟腐潰更泄瀉脈微

緩用二神丸先止其瀉次用大補藥以猪蹄湯洗淨

用黃耆末填滿患處貼以膏藥喜其初起時多用蒜

灸故毒不內攻兩月而愈

此憑脈
症也

一婦因子遲服神仙聚寶丹背生癰甚危脈散大而瀉

急以加減四物湯百餘貼補其陰血幸質厚易於收

欽定四庫全書

外科理例

救

機按此條因服食因脈而處治也

一人背瘡如碗大潰見五臟僅隔膜耳自謂必死精要

取大鯽魚一枚去腸臟以羯羊糞填實焙令焦黑極

燥為末乾摻之瘡口遂合累用有效須膿少欲生肌

時用之

機按此二味有補土功土主肌肉故用生肌

一人背疽徑尺穴深而黑家貧得此急作參耆歸朮膏



與之三日以艾芎湯洗之氣息奄奄然可飲食每日
作多肉餛飩大碗與之盡藥膏五斤餛飩三十碗瘡
漸合肉與餛飩補氣有益者也

機按此條因饑寒多虛故用此補法也

一老婦患此初生三頭皆如栗腫硬木悶煩躁至六日
其頭甚多脈大按之沉細為隔蒜灸及托裏漸起發
尚不潰又數劑內外雖腐惟筋所隔膿不得出脹痛
不安予謂須開之彼不從後雖自穿毒已攻深矣亦

欽定四庫全書

外科理例

沒

一婦素弱未成膿大痛發熱予欲隔蒜灸以拔其毒令
自消不從而歿

大抵發背之患其名雖多惟陰陽二證為要若發一
頭或二頭其形焮赤腫高頭起疼痛發熱為癰屬陽
易治 若初起一頭如黍不腫不赤悶痛煩躁大渴
便秘睡語咬牙四五日間其計數十其瘡口各含如
一粟形似蓮蓬故名蓮蓬發積日不潰按之流血至



欽定四庫全書

外科理例

者未見其能自潰也

一弱婦外皮雖腐內膿不潰脹痛煩熱不安予謂宜急
開之膿一出毒即解痛即止諸症自退待其自潰不
惟疼痛潰爛愈深彼不從待將旬日膿尚未出人已
痛疲矣須針之終不能收斂竟至不起
一人潰而瘻肉不腐予欲取之更以峻補不從而沒
一婦發背待其自破毒氣內攻而歿開遲故也東垣云
過時不烙反攻於內內既消敗不死何待



一指揮年踰五十發背形症俱虛用托裏藥而潰但腐肉當去彼懼不從延至旬日則好肉皆敗矣雖投大劑毒甚不救 古人謂壞肉惡如狼虎毒如蜂螫緩去則戕性命信哉

一人年踰四十發背心脈洪數勢危劇經曰痛癢瘡瘍屬心火心脈洪數乃心火熾甚心主血心氣滯則血不流故生癰也騎竹馬灸 其穴是心脈所遊之地急用隔蒜灸以瀉心火拔其毒再用托裏消毒而愈

欽定四庫全書

外科理例

此憑脈也

一人發背十八日瘡頭如粟內如錐痛極時有悶瞽飲食不思氣則愈虛以大艾隔蒜灸十餘壯不知熱內痛不減遂明灸二十餘壯內痛悉去毒氣大發飲食漸進更用大補湯及桑柴燃灸瘡肉漸潰

此憑症也

一人發背瘡頭甚多腫硬色紫不甚痛不腐潰以艾鋪患處灸之更用大補藥數日死肉脫去而愈

此因症處治也

一人發背焮痛如灼隔蒜灸三十餘壯腫痛悉退更用



托裏消毒藥而愈

此憑症也

一人發背已四五日瘡頭雖小根畔頗大隔蒜灸三十

餘壯其根內消惟瘡頭作膿數日而愈

一人忽惡心大椎骨甚癢須臾臂不能舉神思甚倦此

謂天疽危病也隔蒜灸癢愈盛乃明灸

著肉灸也

五十餘

壯癢止旬日而愈精要謂之灸有回生之功信矣

一人患此已四日瘡頭如黍焮痛背重脈沉實與黃連

內疎湯二劑少退更與仙方活命飲二劑而消

此憑脈症

欽定四庫全書

外科理例

也

一婦腫痛發熱睡語脈大用清心湯一劑而安以金銀

花甘草天花粉當歸瓜蒌黃耆數劑漸潰更以托裏

藥而愈

此憑脈症也

一人背毒焮痛發熱飲冷多汗便秘謔言以破棺丹二

丸而寧以金銀花四劑而膿成開之更用托裏藥而

愈

一太監發背腫痛色紫脈息沉數良甫曰脈數發熱而



痛者發于陽也且瘡瘍赤甚則紫火極似水也詢之
常服透骨丹半載乃積溫成熱所致遂以內疎黃連
湯再服稍平更用排膿消毒藥及猪蹄湯太乙膏而
愈

機按此條因脈因服食而為之處治也

一人傷寒後亦患此甚危取去死肉以神効當歸膏敷

貼飲內疎黃連湯狂言愈盛脈愈大使用涼隔散

二

二劑又以四物湯

九

加芩連數劑而愈

欽定四庫全書

外科理例

機按此條脈症不甚詳悉觀其下後狂愈盛脈愈
大似屬虛也仍用涼隔散下之此必形實進食故
用此也

大凡患瘡者責效太迫一二劑未應輒改服他藥反
致有悞不思病有輕重治有緩急而槩欲效于一二
劑難矣況瘡瘍一症其所由來固深以久又形症在
外肌肉潰損較之感胃無形之疾不同安可旦夕取
效患者審之



一人形實色黑背生紅腫近髀骨下痛甚脈浮數而洪
緊正冬月與麻黃桂枝湯加酒栝生附子瓜蒌子甘
草節人參羌活青皮黃耆半夏生薑六貼而消此亦
內托裏之意

機按此條因時因脈而制方也

一水部年踰四十髀髁患毒已半月頭甚多大如栗許
內痛如刺飲食不思怯甚脈歇至此元氣虛疽蓄於
內非灸不可遂灸二十餘壯飲以六君子

二加藿香

當歸數劑瘡勢漸起內痛頓去胃脈漸至但瘡色尚

欽定四庫全書

外科理例

紫瘀肉不潰此陽氣尚虛也用桑柴火灸以接陽氣

解散其毒仍以前藥加參耆歸桂色赤膿稠瘀肉漸

腐取去兩月餘而愈

此憑脈症也

夫邪氣沉伏真氣怯弱不能起發須灸灸而兼大補

若投常藥待其自潰鮮不悞矣

一人年踰六十冬至後疽發背五七日腫勢約七寸許

不任其痛視之膿成彼懼開發越三日始以燔針開

之以開遲迨二日變症果生覺重如負石熱如炳火



痛楚倍常六脈沉數按之有力此膏梁積熱之變邪
氣酷熱固宜治之以寒藥但時月嚴凝有用寒遠寒之
戒經曰假者反之雖違其時以從其症可也急作清
涼飲子加黃連秤一兩半作一服利下兩行痛減七
分翌日復進其症悉除月愈平復

機按此條因厚味因脈而為之治法也

一人初生如粟悶痛煩渴便秘脈實此毒在臟也予謂
宜急疎去之以絕其源使毒不致外侵彼以為小恙

欽定四庫全書

外科理例

乃服尋常之藥後大潰而沒

一士因脚弱求診兩手脈背浮洪稍鼓飲食如常懶於
言動肌起白屑如麸片時在冬月予作極虛處治詢知
半年前背臀腿三處自夏至秋冬節次生疽率用五
香連翹湯十宣散今結痂久矣急煎參耆歸朮膏以
二陳湯化開服之三日盡藥一斤半白屑沒大半呼
吸覺有力補藥應効已漸病家嫌緩自作風病治煉
青礞石二錢半以青州白丸作料煎飲子頓服之予



諫不聽因致不救

一人背瘡毒氣未盡早用生肌背竟潰爛予以解毒藥

治之得愈 又一人患毒氣始發驟用生肌其毒

內攻而死

一人年踰四十發背五日起肉色不變脈弱少食大

便不實予謂凡瘡未潰脈先弱難於收斂用托裏消

毒散服二劑方起發彼惑一嫗言貼膏藥服攻毒劑

反盛背如負石復請予治隔蒜灸三十餘壯彼云負

欽定四庫全書

外科理例

石已去但癢痛未知更用托裏藥知痛癢膿清前藥

倍加參著佐以薑桂膿稍稠又為人惑外貼猪腰子

抽膿血內服硝黃遂流血五六椀許連泄十餘行腹

內如冰飲食不進不得已速予診之脈盡脫不可救

蓋其症屬大虛一於溫補猶恐不救况用攻伐不死

何待

一人發背十餘日瘡頭如粟許腫硬木悶肉色不變寒

熱拘急脈沉實此毒在內也先以黃連內疎湯次以消



毒托裏藥其毒始發奈速用生肌患處忽若負重身
如火燉後竟不起

東垣云毒氣未盡速用生肌縱平復必再發若毒氣
入腹十死八九大抵毒氣盡脾氣壯則肌肉自生生
肌藥不用亦可

一宜人年逾六十發背三日肉色不變頭如粟許肩背
加重寒熱飲冷脈洪數良甫曰外如麻裏如瓜齊氏
曰增寒壯熱所患必深又曰肉色不變發於內也用

欽定四庫全書

外科理例

人參敗毒散

六二

劑又隔蒜灸五十餘壯毒始發背

始輕再用托裏藥漸潰顧氣血虛甚作渴服參耆歸

芩等渴止彼欲速愈自用草藥罨患處毒氣復入遂

不救

大抵老弱患瘡瘡頭不起或堅如牛領皮多不待潰
而死潰後氣血不能培養者亦死凡瘡初潰毒正發
越宜用膏藥吸之參耆等藥托之若反用藥遏之毒
氣內攻者必不救也



一女背髀結一核如錢大不焮但倦怠少食日晡發熱
脈軟而濇此虛勞氣鬱所致予用益氣養血開鬱之
藥復令飲人乳精神稍健彼不深信又服流氣飲食
遂少四肢痿其父悔復請予予謂決不起矣果歿
一婦發熱作痛專服降火敗毒藥潰後尤甚煩躁時嗽
小便如淋皆惡症也辭不治果歿

此症雖云屬火未有不由陰虛而致者故經云督脈
經虛從腦而出膀胱經虛從背而出豈可專泥於火

欽定四庫全書

外科理例

一太守腫硬不澤瘡頭如粟脈洪大按之即濇經云骨
髓不枯臟腑不敗者可治然腫硬色天堅如牛領之
皮脈更濇精氣已絕矣不治

一宜人發背膿熟不開昏悶不食此毒氣入內也斷不
治強之針膿椀許稍甦須臾竟亡

大抵血氣壯實膿自湧出老弱之人血氣枯槁必須
迎而奪之順而取之若毒結四肢砭刺少緩腐潰深
大亦難收斂結於頰項胸腹緊要之地不問壯弱急



宜針刺否則難治	一人背瘡潰陷色紫舌卷予謂下陷色紫陽氣脫也舌卷囊縮肝氣絕也經曰此筋先死庚日篤辛日死果立秋日而歿	臀癰一百十七 附腿痛 環跳疽 腿氣 脚跟疽 腿癰	焮痛尺脈緊而無力者托之	腫硬痛甚者隔蒜灸之更以托裡	不作膿而痛者解毒為主	欽定四庫全書 外科理例	不作膿者托裏為主	不潰或潰而不斂者托裏為主	一人臀癰腫硬作痛尺脈浮緊按之無力以內托羌活湯一劑痛止再金銀花散四劑膿潰而愈	一人臀癰腫硬痛甚隔蒜灸之更服仙方活命飲二劑痛止腫消以托裡消毒散加黃栢蒼朮羌活瘡頭潰而愈	一人臀癰作膿而痛以仙方活命飲二劑痛止更以托



裏消毒散膿潰而瘡

此條無脈可據

一人臀癰不作膿飲食少思先以六君子加芎歸黃耆

飲食漸進更以托裡散膿潰而愈

一人潰而膿清不斂灸以豆豉餅更飲十全大補湯兩

月餘而瘡

凡瘡不作膿或不潰或潰而不斂皆氣血虛也若膿清

稀尤虛甚也

一人臀癰膿水不止肌漸瘦食少思胃脈微弦以六君

欽定四庫全書

外科理例

子加藿香當歸數劑食遂進以十全大補湯灸以豆豉

餅兩月餘而瘡

一弱人臀癰膿成不潰以十全大補湯數劑始托起乃

針之又二十餘劑而愈夫臀居僻位氣血罕到老弱

患之尤宜補其氣血庶可保瘡

一人腿內側患癰未作膿而腫痛以內托黃耆柴胡湯

二劑少愈又二劑而消

一人臀漫腫色不變脈活數無力膿將成尚在內欲治



以托裏藥待發出而用針彼欲內消服攻伐藥愈虛
復求治仍投前藥托出針之以大補藥而愈
凡瘡毒氣已結不起者但可補其氣血使膿速成而
針去不可論內消之法膿成又當辨其生熟淺深而
針之若大按乃痛者膿深也小按便痛者膿淺也按
不甚痛未成膿也按之即復起者膿也按之不復起
者無膿也若腫高而軟者發於血脈也腫下而堅發
於筋骨也肉色不變者發於骨髓也

欽定四庫全書

外科理例

一人腿外側患癰漫腫大痛以內托黃耆湯酒煎二劑
少可更以托裏數劑潰之而愈

一婦腿癰久而不愈瘡口紫陷膿水清稀予以為虛彼
不信乃服攻毒之劑虛症蜂起復求治灸以附子餅
服十全大補湯百餘貼而愈

凡瘡膿清及不斂者或陷下皆氣血虛極也最宜大
補否成敗症若更患他症卒難治療

一人腿癰內潰針之膿出四五椀許惡寒畏食脈診如



絲此陽氣微也以四君子加炮附子畏寒少止又四劑而止以六君子加桂數劑飲食頗進乃以十全大補及灸附子餅兩月而愈

一老腿癰膿自潰忽發昏瞽脈細而微此氣血虛極也以大補之劑而甦

一弱人流注內潰出敗膿五六碗口眼歪斜脈亦虛極乃虛甚也非真中風以獨參湯加附子一錢二劑更以大補藥月餘而痊

欽定四庫全書

外科理例

大抵膿血大泄當大補氣血為先雖有他症以末治之凡癰大潰發熱惡寒皆屬氣血虛甚若左脈不足者補血藥多于補氣藥右脈不足者補氣藥多於補血藥切不可發表

一婦腰痛脚弱弛長不能動履以人參敗毒散加蒼朮黃栢澤瀉而愈

此條脚弱弛長屬濕熱也故憑症而治

一婦環跳穴痛肉色不變脈緊數此附骨疽也膿未成



用內托黃蓍酒煎湯加青皮龍膽草山梔數劑而止

一人腿癰兼筋攣痛脈弦緊用五積散加黃栢柴胡蒼

朮而痊

此憑脈憑症而
作濕熱治也

一婦附骨疽久不愈膿水不絕皮膚瘙癢四肢痿軟予

以為虛欲補之彼惑為風疾遂服祛風藥竟致不救

陳無擇云人身有皮毛血脈筋膜肌肉骨髓以成其

形內則有心肝脾肺腎以主之若隨情妄用喜怒勞

佚致內臟精血虛耗使皮血筋骨肉痿弱無力以運

欽定四庫全書

外科理例

動故致痿[圖]狀與柔風脚氣相類柔風脚氣皆外所

因痿則內臟不足也

一人拊骨疽腫硬發熱骨痛筋攣脈數而沉用當歸拈

痛湯而愈

一人腿根近環跳穴痛徹骨外皮如故脈數帶滑此附

骨疽膿將成用托裏藥六劑腫起作痛脈滑數已成

針之出碗許更加補劑月餘而瘳

一人腿內患癰漫腫作痛四肢厥咽嚨塞發寒熱諸治



不應乃邪鬱經絡而然也用五香連翹湯一劑諸症
少退又服大便行二次諸症悉退而愈此因諸治不
効故作懣治

而用五
香也

一婦左腿痛不能伸脈弦緊按則濇以五積散二劑痛

少止又二劑而止以神應養真而愈

脈弦緊濇屬寒
故用五積散辛

熱以
散之

一人腿痛膝微腫輕診則浮按之弦緊此鶴膝風也與

大防風湯二劑已退二三彼謂附子有毒乃服敗毒

欽定四庫全書

外科理例

藥日漸消瘦復求治予謂今飲食不為肌膚水穀不
能運化精微灌溉臟腑週身百脈神將何依茲故氣
短而促其氣損也怠惰嗜卧脾氣虛也小便不禁膀
胱不藏也時有躁熱心下虛痞胃氣不能上榮也恍
惚健忘神明亂也不治後果歿 此症多患於不足
之人故以加減小續命大防風二湯有効若用攻毒
藥必悞

一婦患脚氣或時腿腫筋攣腹痛諸藥不應漸危篤諸



書云八味丸治足少陰脚氣入腹疼痛上氣喘促欲死遂投一服頓退又服而愈腎經虛盡之人多有此患乃腎水乘心尅火死不旋踵宜急服

一人腿痛兼筋攣骨痛脈弦緊以大方風湯六劑筋攣少愈又二劑而腫消但內一處尚作痛脈不弦緊此寒邪已去乃所滯瘀濁之物欲作膿故痛不止用托裏藥數劑腫發起脈滑數乃膿已成針之用十全大補湯月餘而安

按已前數條皆筋攣骨痛而脈弦緊可見弦緊多主寒邪

欽定四庫全書

外科理例

一婦膝腫痛遇寒痛益甚月餘不愈諸藥不應脈弦緊此寒邪深伏於內也用大方風湯與火龍丹治之而消

大抵此症雖云腫有淺深感有輕重其所受皆因真氣虛弱而邪得以深襲故附骨癰疽及鶴膝風症腎虛者多有之前人用附子者以溫補腎氣而又能行藥勢散寒邪也亦有體虛之人秋夏露卧為冷氣所襲寒熱伏結多成此症不能轉動乍熱而無汗按之



痛應骨者是也若經久不消極陰生陽寒化為熱而潰也若被賊風所甚傷患處不甚熱而洒淅惡寒不時汗出熨之痛少止須大防風湯火龍膏治之又有攣曲偏枯堅硬如石謂之石疽若熱緩積不潰肉色赤紫皮肉俱爛名緩疽其始末皆宜服前湯欲其驅散寒邪以補虛托裏也

一人右腿赤腫焮痛脈沉數用當歸拈痛湯四肢反痛乃濕毒壅遏又況下部藥力難達非藥不對症遂砭

欽定四庫全書

外科理例

患處去毒血仍用前藥一劑頓減又四劑而消

一人先腿痛後又四肢皆痛遊走不定至夜益甚服除

濕敗毒之劑不應脈滑而濇濕痰濁血為患以二陳

湯加蒼朮羌活桃仁紅花牛膝草烏治之而愈

活與
濇相

反北云
活謂少

凡濕痰濕熱或死血流注關即非辛溫之劑開發腠理流通隧道使氣行血和安能得愈

一人腿痛每痛則痰盛或作嘈雜脈滑而數以二陳湯



加升麻二朮澤瀉羌活南星治之而安

此憑脈也

一人素有脚氣脇下作痛發熱頭暈嘔吐腿痺不仁服消毒護心等藥不應左關脈緊右關脈弦此亦脚氣也以半夏左經湯治之而愈

一人脚軟腫痛發熱飲冷大小便秘右關脈數乃足陽明經濕熱下注也以大黃左經湯服而愈

一人膝脛兼膝脚皆焮痛治以加味敗毒而愈

一人兩腿痛脈活而遲此濕痰所致以二陳湯加朮黃

欽定四庫全書

外科理例

栝朮活澤瀉而愈

此憑脈也

一人兩腿腫痛脈滑而緩此濕痰所致先以五苓散加

蒼朮黃栝二劑少愈再以二陳二朮檳榔紫蘇羌滑

獨活牛膝黃栝而差

此憑脈也

夫濕痰之症必先以行氣利濕健中為主若中氣和則痰消而濕亦無所容矣

一婦兩腿痛脈濇而數此血虛兼濕熱先以蒼朮黃栝知母龍膽草茯苓防風防己羌活數劑腫痛漸愈又



以四物加二朮黃栢牛膝木瓜月餘而愈 此憑脈也	一人肢節腫痛脈遲而數此濕熱之症以荊防敗毒散加麻黃二劑痛減半以檳榔敗毒散四劑腫亦除後更以四物湯加二朮牛膝木瓜數劑而愈 按脈遲與數相反遲	惡作細	一婦人脚脛腫痛發寒熱脈浮數此三陽經濕熱下注為患尚在表用加味敗毒散不應乃瘀血凝結藥不能及於患處砭去瘀血乃用前藥二劑頓退以當歸	欽定四庫全書 外科理例	拈痛湯四劑而愈	古云脚氣是為壅疾治當宣通使氣不能成壅也壅既成而甚者砭去惡血而去重勢經云畜則腫熱砭射之後以藥治之	一婦兩腿痛遇寒則筋攣脈弦緊此寒邪之症以五積散對四物湯數劑痛止更以四物湯加木瓜牛膝枳殼月餘而安	一人腿腫筋攣不能動履以交加散二劑而愈



一婦患腿不能伸屈遇風寒痛益甚諸藥不應甚苦先
以活絡丹一丸頓退又服而瘳次年復痛仍服一丸
亦退大半更以獨活寄生湯四劑而愈
一人素有脚氣又患附骨癰作痛服活絡丹一丸二症
並差
一人素有疝不能愈因患腿痛亦用一丸不惟治腿有
効而疝亦愈矣

一太安人臂痛數年二丸而差

欽定四庫全書

外科理例

一女患驚風甚危諸醫莫救自用一丸即愈且不再作
夫病深伏在內非此藥莫能通達但近代始云此藥
引風入骨如油入麵故後人多不肯服大抵有是病
宜用是藥豈可泥于此言以致難差

一婦兩腿作痛時或走痛氣短自汗諸藥不應診其尺
脈弦數此寒濕流注于腎經也治以附子六物湯愈
但人謂附子有毒多不肯服若用童便炮製何患之
有況不常服何足為慮予中氣不足以補中益氣湯



加附子服三年何常見其有毒經云有是病用是藥
一婦肢節腫痛脛足尤甚時或自汗或頭痛此太陽經
濕熱所致用麻黃左經湯二劑而愈

前條脈弦數而病寒濕恐濕生

熱故也

一婦血痔兼腿酸痛似痺此陰血虛不能養於筋而然
宜先養血為主遂以加味四斤丸治之而愈

一老筋攣骨痛兩腿無力不能步履以局方換腿丸治
之

欽定四庫全書

外科理例

一婦筋攣痺痛兩腿無力不能步履以三因勝酸丸治
之並愈

河間云脚氣由腎虛而生然婦人亦病脚氣者乃因
血海虛而七情所感遂成斯疾血海虛與男子腎虛
類也男女用藥固無異更當兼治七情無不効也

一婦腿痛兼足脛攣痛服發散藥愈甚脈弦緊此腎肝
虛弱風濕內侵也治以獨活寄生湯痛止更以神應
養真丹而不攣矣



一人素有腿痛飲食過傷痛益甚倦怠脈弱以六君子
加山查神麴蒼朮芎歸升麻柴胡而愈

一老素善飲腿常腫痛脈洪而緩先以當歸拈痛湯濕
熱少退後用六君子加蒼朮黃柏澤瀉而痊

一人飲食少過胸滿痞悶或吞酸兩腿作痛用導引丸
二服頓愈更以六君子湯加神麴麥芽蒼朮二十餘
劑遂不復作而愈

經云飲食自倍腸胃乃傷是胃氣不能施行脾氣不

欽定四庫全書

外科理例

能四布故下流乘其肝腎之虛以致足腫加之房事
不節陽虛陰盛遂成脚氣亦有內傷飲食脾胃之氣
有虧不能上升則下注為脚氣者宜用東垣開結導
引水運化脾氣如脾氣濕氣壅遏不通致面目發腫
或痛者宜用導滯通經湯以疎導之

已上十九條乃脚氣症雖非瘡毒因治有驗故錄之
臀居小腹之後此陰中之陰其處下其道遠其位僻太
陽雖多血其氣少也氣少則運行不到血亦因而少



來中年已後生疽須預補之若無積補之功其禍多在瘡成痂後或半年乃發故多惑畧

一人腿癰脈症俱弱亦危症也治以托裏急使針刺彼因不從後膿開瀉淋漓不能收斂而死

一人年踰五十冬患腿癰脈數煩躁飲冷便秘腫痛熅甚此熱淫於內也宜用苦寒之藥投清涼飲

二倍加

黃芩其勢頓退更以四物湯加黃芩而愈

此條因症因脈而藥之也

欽定四庫全書

外科理例

一人年三十連得憂患作勞好色左腿外側廉紅腫如栗醫以大府實與承氣兩貼下之又一醫與大黃朱砂血竭三貼而脈大實後果死此厥陰多氣少血經也

一侍御患臀腫痛小便不利彼謂關格以艾蒸臍大便亦不利治以降火分利藥不應予胗其脈膿已成此患癰也針之出膿數椀大便即利五日後陰囊腫脹小便不行針之尿膿大泄氣息奄奄脈細汗不止潰



處愈脹用參著歸木大劑猶緩俾服獨參湯至二斤
氣稍復又服獨參膏至十餘斤兼以托裏藥兩月餘
而愈

大抵瘡瘍膿血大泄先補氣血為主雖有他病當從
末治

一人腿癰膿成針之出膿二椀許飲托裏藥一劑大發
熱更用聖愈湯^七二劑而止翌日惡寒不食脈細如
絲以人參一兩熟附三片薑棗煎服而愈但食少不

欽定四庫全書

外科理例

寐更以內補黃耆湯而平

一人腿腫發熱惡寒以補中益氣湯治之彼以為緩乃
服芩連等藥熱愈盛復請予治以人參養榮湯^八二
十餘劑而潰更以參著歸木炙甘草肉桂月餘而斂
夫火之為病當分虛實芩連苦寒能泄心肺有餘之
火若老弱或飲食勞倦而發者此為不足當治以甘
溫之劑未嘗有實熱而畏寒虛熱而喜寒者此其驗
也



一人年踰三十左腿微腫痛日久肉色如故不思飲食
東垣云瘡瘍腫下而堅者發於筋骨此附骨疽也乃
真虛濕氣襲於肉理而然蓋諸虛皆稟於胃食少則
胃弱法當助胃壯氣以六君子加藿香當歸數劑飲
食漸進更以十全大補湯而愈

此條因症制方而處治也

一婦年二十餘飲食後每有怒氣吞酸噯腐或兼腿根
胯內焮腫服越鞠丸不應此肝氣虛濕氣下注而然

欽定四庫全書

外科理例

以六君子^二加香附砂仁藿香炮薑數劑少愈更以
六君子數劑而愈

此條因症而制方也

一人年踰二十稟弱左腿外側患毒三月方潰膿水清
稀肌肉不生以十全大補湯^十加牛膝二十餘劑漸
愈更以豆豉餅灸月餘而痊

一人膝腿腫筋骨痛服十宣散不應脈沉細予用五積
散二劑痛止更以十宣散^四去桔梗加牛膝杜仲三



十餘劑膿潰而愈此寒氣之腫八風之變也

此條因脈制方處治

一人遍身走痛兩月後在脚面結腫未幾腿股又患一
塊脈輕胗則浮重胗浮緩此氣血不足腠理不密寒
邪襲虛而然以加減小續命湯^{三七}四劑及獨活寄生
湯^{四七}數劑疼痛頓去更以托裏藥倍加參耆歸朮百
貼而愈

此條因脈制方而治也

欽定四庫全書

外科理例

一人年及二十腿膝腫痛不能屈伸服托裏藥不應以
人參敗毒散加檳榔木瓜柴胡紫蘇蒼朮黃柏而愈
此因症制方以治之也

一人年逾五十兩腿痛脹或生痞癰小便頻而少聲如
瓮出服五皮散不應予胗之右關沉緩此脾虛濕氣
流注而然非瘡也經曰諸濕腫滿皆屬脾土按之不
起皆屬於濕以五苓散加木香倍蒼朮白朮亦不應
予意至陰之地關節之間濕氣凝滯且水性下流脾



氣既虛安能運散非辛溫之藥開通腠理行經活血
邪氣安得發散遂以五積散二劑勢去大半更以六
君子加木香升麻柴胡薏苡仁兩月餘而愈設使前
藥不應更投峻劑虛虛之禍不救矣

此因滲泄不效
故用辛溫以散

也之

一人腿癰膿清脈弱灸以豆豉餅更以托裏藥而愈

一人年二十餘股內患毒日久欲求內消胗脈活數知

膿已成因氣血虛不潰刺之膿出作痛用八珍湯稍

欽定四庫全書

外科理例

可但膿水清稀用十全大補湯

三十餘劑而痊蓋

膿出反痛者虛也

一僧股內患腫一塊不痛不潰治托裏二十餘劑膿成

刺之作痛予謂腫而潰潰而反痛此氣血虛甚也宜

峻補之彼云氣無補法予曰正氣不足不可不補補

之則氣化而痛自除遂以參耆歸朮熟地治之兩月

餘而平

大抵瘡瘍先發為腫氣血鬱積蒸肉為膿故多痛膿



潰之後腫退肌寬痛必漸減而痛愈盛者氣血不足也即丹溪河間虛甚之說

附骨癰皆因以得厚味及酒後涉水得寒故熱深入髀樞穴左右積瘀瘀血相搏而成也

一女髀樞穴生附骨疽在外側廉少陽經分始末用五香湯十宣散一日惡寒發熱膈滿猶大服五香湯一夕喘死此升散太過孤陽發越於上也

一人年踰四十夏患附骨癰予以火針刺去瘀血更服

欽定四庫全書

外科理例

托裏藥而愈至秋忽不飲食痰氣壅盛勞則口舌生瘡服寒藥腹痛彼疑為瘡脾胃脈輕診似大按之無力此真氣不足虛火炎上也治以八味丸彼不信自服二陳四物幾殆復請予仍以前丸治之而愈
有脾土虛不能剋制腎水吐痰而不效者尤宜用此丸

王老年七十季春因寒濕地氣得附骨疽於左腿足少陽分微侵足陽明闊六七寸長一尺堅硬漫腫肉色



不變皮澤深但行步作痛以指按至骨大痛服內托	黃耆湯一服立止再服腫消	柴胡 錢半 連翹 錢半 肉桂 錢各一 黃耆 錢各二 歸尾 錢各二	鼠粘子 錢炒一 黃栢 錢半 甘草 錢半 升麻 錢七分	右剉酒盞半水盞半同煎至二盞去查空心宿食消	盡大溫服少時以早饊壓之不令大熱上攻犯中上	二焦也	一兒年十歲四月于左腿近膝股內出附骨癰不辨肉	欽定四庫全書 外科理例	色漫腫皮澤木硬瘡勢甚大左腿乃肝之髀上也足	厥陰肝經之分少侵足太陰脾經其脈左三部細而	弦按之洪緩微有力用內托黃耆柴胡湯	黃耆 二錢 柴胡 錢半 連翹 一錢二分 羌活 半錢 生地 二分	歸尾 七分 官桂 七分 土瓜根 酒洗各二分 黃栢 酒洗各二分	右剉作一服水酒各盞半同煎至一盞去查空心稍	熱服	一人附骨癰畏針不開臀膝通潰脈數發渴煩躁時嗽



飲食少思齊氏曰瘡瘍煩躁時嗽腹痛渴甚或泄利
無度或小便如淋此惡症也膿出之後若脈洪數治
微瀋遲緩易治刺之膿出四五椀即服參耆歸朮大
劑翌日脈稍斂更服八珍湯^十加五味麥門肉桂白
斂三十餘貼脈緩膿稠三月乃愈

一老腿患附骨疽腫硬大按方痛口乾脈弱腫聚不潰
飲食少思予謂腫下而堅者發於筋骨肉色不變者
發於骨髓遂托以參耆等藥三十餘劑膿雖熟不穿

欽定四庫全書

外科理例

予謂藥力難達必須針刺不聽至旬日方刺湧出清
膿五六椀然衰老氣血不足養毒又以竟不救
大抵瘡疽旬日不退宜托之有膿刺之有腐肉取之
虛則補之此十全之功也

一人患貼骨疽腿細短軟瘡口不合以十全大補湯外
灸附子餅貼補藥膏調護得宜百貼而愈

一人環跳穴患附骨疽彼謂小瘡服敗毒藥外以寒藥
敷貼因痛極針之膿瘀大泄方知為癰請治其脈右



關浮大此胃氣已傷故瘡口開張肉紫下陷捫之不
熱彼謂瘡內更覺微冷自謂必成漏矣灸以豆豉餅
飲六君子加藿香砂仁炮薑數劑胃氣漸醒飲食漸
進患處漸煖肌肉漸生再以十全大補湯而愈

一人亦患此內痛如錐外色不變勢不可消喜其未用
寒劑祇因痛傷胃氣而不思食以前藥去炮薑治之
飲食稍進更以十全大補湯二十餘劑膿成針去仍
以大補湯倍加參耆芎歸膿久不止更加麥門五味

欽定四庫全書

外科理例

貝母遠志數服漸止瘡亦尋愈

二症蓋因濕熱滯於肉理真氣不能運化其始宜除
濕熱實脾土和氣血則濕自消散若膿未成以隔蒜
灸之立効

環跳穴痛防生附骨疽以蒼朮佐黃柏之辛行以青皮
冬加桂枝夏加黃芩體虛加杜牛膝以生甘草為使
大料煎入薑汁食前飲之痛甚者恐十數貼發不動
少加麻黃一二貼又不動恐疽將成急掘地成坎以



火煨紅沃以小便赤體坐其中以席圍下體使熱氣薰蒸腠理開氣血暢而愈

一婦四十餘近環跳生疽尺脈沉緊腿不能伸經曰脾移寒於肝癰腫筋攣蓋脾主肉肝主筋肉溫則筋舒肉冷則筋急遂與乳香定痛丸少愈更以助胃壯氣血藥二十餘劑而消

按此因脈沉緊又因筋攣是脈症俱寒故治以此

一人因痢驟澁環跳穴作痛與四物湯加桃仁酒黃芩

欽定四庫全書

外科理例

紅花蒼朮枳殼黃栢柴胡青皮生薑十餘劑稍可更刺委中出黑血而愈

一後生骨痛以風藥飲酒一年予以防風通聖散十四

去硝黃加生犀角浮萍百餘貼成一疽近皮革膿出而愈後五六年其處再痛予曰舊病作無能為矣蓋發於新娶之後多得香辣肉味若能茹淡遠房勞猶可生也出膿血四五年延及腰背皆空又三年而死此純乎病熱者



一少年天寒極勞骨痛兩月後生疽深入骨邊卧二年取剝骨而安此寒搏熱者也

取以疽及痔漏中朽骨用烏骨雞脰骨以砒實之鹽泥固濟火煨紅地上出火毒去泥用骨研細飯丸如粟米大以紙撚送入竅內更以膏貼之

一人年踰五十臀癰膿熟不開攻通大肛膿從大便而出予辭不治果歿 丹溪謂中年後不宜患此膿成不刺不亡得乎

欽定四庫全書

外科理例

一人左膝腫大三月不潰予謂體虛風邪襲於骨節使氣滯不行故膝愈大而腿愈細名曰鶴膝風以大防風湯三十餘劑而消 又有患此伏枕半載流膿三月彼云初服大防風湯_五去附子將潰服十宣散今用十全大補湯去桂皆不應視脈症甚弱予以十全大補湯一貼加熟附一錢三十餘劑少愈乃減附子五分服至三十餘劑將愈却去附子更用三十餘劑而痊



夫立方之義各有所宜體氣虛弱邪入骨界遏絕隧
道若非桂附辛溫之藥開發腠理關節之寒邪通暢
榮衛經絡之氣血決不能愈

一人脚跟生毒如豆許痛甚狀似傷寒予謂獵人被兔
咬脚跟成瘡淫蝕為終身之疾因名兔齒以還少丹
九內塞散五治之稍可次因納寵作痛反服攻毒藥
致血氣愈弱腿膝軟痿而死

蓋足跟乃二蹻發源之處腎經所由之地瘡口不合

欽定四庫全書

外科理例

則蹻氣不能發生腎氣由此而泄故為終身之疾况
彼瘡先得於虛復不知戒雖大補氣血猶恐不及安
服攻毒暴悍之藥以戕賊乎

一人腿痛筋攣遍身酸軟方士與痰藥及托裡藥期三
日可痊不應予謂非瘡毒也大筋軟短小筋弛長此
濕熱為患以人參敗毒散加蒼朮黃栢檳榔木瓜少
愈更以清躁湯二十貼而愈

此因症也兼之屢治不
効此作濕熱而治有所

也本



夫內有濕熱外有風寒當瀉不當補托裡甘溫之劑
安得取効

冷漏精要治冷漏諸瘡與桂附丸

丹溪曰此冷只因瘡久不合風寒乘之氣血不朝而
成厚朴雖溫泄散尤速恐不若參耆佐以陳皮庶乎
與病相得

大凡瘡口久不合肉白膿少此為瘡口冷滯氣血枯竭
不朝於瘡以致如是精要用北艾葉一握煎湯避風

欽定四庫全書

外科理例

處以絹兜艾葉乘熱澆洗瘡口四圍淨肉一日一次
仍燒松香薰瘡口良久以神異膏貼之

丹溪曰血氣枯燥不知補虛於內惟務熱洗於外不
揣其本而齊其末却乃歸罪於冷滯大抵潰瘍宜洗
若無補藥以實其內切恐有時之快少頃疲憊有不
耐煩之意非虛而何可不先議補接乎

內托羌活湯 治足太陽經尻臀生癰堅硬腫痛大作
左右尺脈俱緊按之無力



防風 膏本 歸尾 各一錢 羌活 黃栢 酒制各二錢	肉桂 三分 連翹 甘草 炙 蒼朮 各五分 陳皮 各五分	黃耆 半錢 右剉水酒各半煎食前溫服取汁內托	一官兩腿作痛形體清瘦肝脈弦數却屬有餘之症治	以龍膽瀉肝湯並愈 此憑症也	瘡腫之症若不診候何以知陰陽勇怯氣血聚散耶又云脈洪大而數者實也細微而數者虛也河間云脈沉實者邪在藏浮大者邪在表觀此誠發前言所未發診候之道豈可缺耶	腰疽一百十八	欽定四庫全書 外科理例	一婦年逾七十腰生一瘤作癢異常疑虫蟲所毒胗脈	浮數齊氏曰脈浮數反惡寒者瘡也翌日復胗脈乃	弱予謂未潰而脈先弱何以收斂况大便不通則真	氣已竭治之無功固請不得已用六君子 二 加藿香	神麴飲食漸進大便始通更用峻補之劑潰而膿清	作渴再用參耆歸地麥門五味而渴止喜曰可無虞	矣予曰不然不能收斂先入之言也彼疑更醫果歿	一人年十九腰間腫一塊無頭不痛色不變三月不潰



飲食少思肌肉日瘦此氣搏腠理榮氣不行鬱而為	腫名曰濕毒流注元戎曰若人飲食疎精神衰氣血	弱肌肉消瘦榮衛之氣短促而澁滯故寒搏腠理閉	鬱為癰者當補以接虛怯之氣遂以十全大補湯 _{三十}	加香附陳皮三十餘劑始針出白膿二椀許仍用藥	倍加參耆仍灸以豆豉餅漸愈彼乃惑於速効內服	敗毒外貼涼藥反致食少膿稀患處色紫復請予治	喜得精氣未衰仍以前藥加遠志貝母白歛百劑而	欽定四庫全書 外科理例	愈此或久而不愈或膿水清稀當服內塞散 _{十五} 及附	子餅灸然後可愈	一婦年踰二十腰間突腫寸許肉色不變微痛不潰發	熱脈大此七情所損氣血凝滯隧道而然當益氣血	開鬱結更以香附餅熨之使氣血充暢內自消散若	爾雖潰亦無危不聽乃服十宣流氣之藥氣血愈虛	潰出清膿不斂而死 按此脈大非七情脈也當時	必有所見



一婦產後腰間腫兩腿尤甚此瘀血滯於經絡而然不早治必作癰遂與桃仁湯二劑稍愈更沒藥丸 _{四五} 數服而痊亦有惡血未盡臍腹刺痛或流注四肢或注股內痛如錐刺或兩股腫痛此由冷熱不調或思慮動作氣乃壅遏血蓄經絡而然宜沒藥丸 _{四五} 治之亦有或因水濕所觸經水不行而腫痛者宜當歸丸 _五 治之	凡惡血停滯為患匪輕治之稍緩則為流注為骨疽多致不救	欽定四庫全書 外科理例	一老人患痢驟用澁藥致大腸經分作痛此濕毒流於經隧而然以四物加桃仁酒芩紅花升麻枳殼陳皮甘草治之漸愈因年高胃弱竟歿	一人年二十遍身微痛腰間作腫痛甚以補中益氣湯 _十 加羌活四劑少可又去羌活十餘劑而愈	此條以盧治當時於形色脈上必有所見也	一人年踰四十患腰痛服流氣飲寄生湯不應以熱手



欽定四庫全書										外科理例									

欽定四庫全書

子部
外科理例卷六

詳校官太醫院史目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官助教臣胡予襄

謄錄監生臣崔堂



欽定四庫全書

外科理例卷六

明 汪機 撰

脫疽一百十九

丁生手足指或足潰而自脫故名
 脫疽有發於手指者名蛇節丁重

者腐去本節
 輕者筋攣

焮痛者除濕攻毒更隔蒜灸至不痛

焮痛或不痛者隔蒜灸更用解毒藥若色黑急割去速

服補劑庶可救黑延上者不治

欽定四庫全書

外科理例

色赤焮痛者托裡消毒更兼灸

作渴者滋陰降火色黑者不治

一人足指患此焮痛色赤發熱隔蒜灸之更以人參敗

毒散去桔梗加金銀花白芷大黃二劑痛止又十宣

散去桔梗官桂加天花粉金銀花數劑而平

此憑
 症也

一人年逾四十左足大指赤腫焮痛此脾經積毒下注

而然名曰脫疽喜色赤而腫以人參敗毒散去人參

桔梗加金銀花白芷大黃二劑更以瓜蒌金銀花甘



草節四劑頓退再以十宣散去桔梗桂加金銀花防
己數劑愈

一人患此色紫赤不痛隔蒜灸五十餘壯尚不痛又明
灸百壯方知乃以敗毒散加金銀花白芷數劑而愈
一膏梁年逾五十亦患此色紫黑脚焮痛孫真人曰脫
疽之症急斬之去毒延腹必不治色黑不痛者亦不
治喜其飲食如故動息自寧為瘡善症遂以連翹敗
毒散服六劑更以金銀花瓜蒌甘草節二十餘劑患

欽定四庫全書

外科理例

指潰脫更以芎歸生地連翹金銀花白芷二十餘劑
而愈

次年忽發渴服生津等藥愈盛用八味丸而止

大抵此症皆由膏梁厚味或房勞太過丹石補藥所
致其發於指微赤而痛可治治之不愈急斬去之庶
可保否則不治色紫黑或發於脚背亦不治或先渴
而後發或先發而後渴色紫赤不痛此精氣已竭決
不可治



一芻蕘左足指患一泡麻木色赤次日指黑五日連足
黑冷不知疼痛脈沉細此脾胃受毒所致進飛龍奪
命丹一服翌日令割去足上死黑肉割後骨始痛可
救治以十全大補湯而愈此因症肉黑知為
毒盛不在於脈也
蓋死肉乃毒氣盛拒截榮氣所致況至陰之下血氣
難達經曰風淫末疾是也向若攻伐之則邪氣乘虛
上侵必不救矣

一人足指患之大痛色赤而腫隔蒜灸之痛止以人參

欽定四庫全書

外科理例

敗毒散去桔梗加金銀花白芷大黃而潰更以仙方

活命飲而痊

此憑
症也

此症形勢雖小其惡甚大須隔蒜灸之不痛者宜明
灸之庶得少殺其毒此症因膏粱厚味酒麵灸燂積
毒所致或不慎房勞腎水枯竭或服丹石補藥故有
先渴而後患者有先患而後渴者皆腎水涸不能制
火故也初發而色黑者不治赤者水未涸尚可若失
解其毒以致肉死色黑者急斬去之緩則黑延上足



必死而患不問腫潰惟隔蒜灸有効亦有色赤作痛而自潰者元氣未脫易治夫至陰之下血氣難到毒易腐肉藥力又不易到況所用皆攻毒之藥未免先肝腸胃又不能攻敵其毒不若隔蒜灸并割去最為良法孫真人云在指則截在肉則割去即此意也

一人足指患之色黑不痛令明灸三十餘狀而痛喜飲食如常予謂急割去之速服補劑彼不信果延上遂致不救

欽定四庫全書

外科理例

一人脚背患之色黯而不腫痛煩躁大渴尺脈大而濇此精氣已絕不治後歿

又有手指患此色黑不痛其指已死予欲斬去速服補藥恐黑上臂不治彼不信另服敗毒藥手竟黑遂不救

一人足指患之色紫不痛隔蒜灸五十餘狀尚不知痛又明灸百壯始痛更投仙方活命飲四劑乃以托裡

藥潰脫而愈

此憑症也



一人脚背患此赤腫作痛隔蒜灸三十餘壯痛止以仙方活命飲四劑而潰更以托裡消毒藥而愈	此憑症也
一人足指患之色赤焮痛作渴隔蒜灸數壯以仙方活命飲三劑而潰更服托裏藥及加減八味丸潰脫而愈	
一婦修傷次指成膿不潰焮痛至手悞敷冷藥以致通潰飲食少思彼為毒氣內攻胗脈沉細此痛傷胃氣	
而然遂刺之服六君子加藿香當歸食進更以八珍	
欽定四庫全書	外科理例
湯加黃耆白芷桔梗月餘而愈	此憑症脈也
一人傷拇指色紫不痛服托裏藥及灸五十餘壯作痛潰膿而愈	此憑症也
一幼女因凍傷兩足至春發潰指俱壞令取之服大補藥而愈	此憑症也
一女患嵌甲傷指年逾不愈日出膿數滴予謂足大指乃脾經發源之所宜灸患處使瘀肉去陽氣至瘡口自合否則不治彼惑之不早治後變勞症而歿	



蓋至陰之下血氣難到女人患此多因紮縛致血脈
不通或被風邪所襲則無血氣榮養遂成死肉惟當
壯脾胃行經絡生血氣則愈有成破傷風以致牙
關緊急口眼喎邪者先玉真散一百一二服然後投
以生血通經則可

面瘡一百二十 附頤毒

一人年逾三十夏月熱病後患頤毒積日不潰氣息奄
奄飲食少思大便不禁脰脈如無經曰脈息如無似

欽定四庫全書

外科理例

有細而微者陽氣衰也齊氏曰飲食不入大便滑利
腸胃虛也以六君子加炮姜肉豆寇破故紙數劑泄
稍止食稍進更加黃栢當歸肉桂潰而膿水清稀前
藥每服加熟附一錢數劑泄止食進膿漸稠再以十
全大補湯加酒炒芍藥白欬月餘而愈 此憑脈
症也

一人年踰四十胃氣素弱面常生瘡盜汗發熱用黃耆

建中湯少愈更用補中益氣湯而平 此憑
症也

東垣云氣虛則腠理不密邪氣從之逆於肉理故多生



瘡若以甘溫之劑實其根本則腠理自固即無他疾	一人年三十面患瘡潰已作渴自服托裡及降火藥不	應脈浮而弱丹溪曰潰瘍作渴屬氣血俱虛遂以參	著各三錢歸芎木各二錢數服渴止又以八珍湯加	黃耆數劑脈斂而愈	此憑脈症也	一人年四十頭面生瘡數枚焮痛飲冷積日不潰服清	熱消毒不應脈數按之即實用防風通聖散	四十二劑	頓退又以荊防敗毒散	七此憑脈症也	欽定四庫全書	外科理例	一人年逾六十素食厚味頰頤患毒未潰而肉先死脈	數無力此胃經積毒所致然頰頤正屬胃經未潰肉	死則胃氣虛極老人豈宜患此果歿經曰膏粱之變	足生大丁受如持虛此之謂也	口齒一百二十一	一人齒痛脈數實便秘用防風通聖散即愈	此憑脈症也	一人齒痛甚胃脈數實以承氣一劑即止	此憑脈症也	一老齒痛午後則發至晚尤甚胃脈數而實以涼隔散



加荊芥防風石膏一劑而瘳 此憑脈也	一人齒痛胃脈數而有力以清胃散加石膏荊芥防風	二劑而痊 此憑脈也	一人齒痛脈浮無力以補中益氣湯加黃連生地黃石	膏治之不復作 憑脈也	一人齒痛脈數無力用補中益氣加生地牡丹皮而愈	一人齒腫痛焮至頰頤素善飲治以清胃散數劑而愈	一人齒痛服清胃散不應服涼隔散愈盛予用補腎丸	欽定四庫全書 外科理例	四而愈 此條因治不効而知為腎虛也	一人頰頤腫焮至牙齦右關脈數此胃經風熱上攻也	治以犀角升麻湯而消 此憑脈也	一婦常口舌糜爛頰赤唇乾眼澁作渴脈數按之則澹	此心肺壅熱於氣血為患名熱勞症也當多服滋陰	養血藥彼欲速効用敗毒寒劑攻之後變瘵而歿	良方云婦人熱勞者由心肺壅熱傷於氣血氣血不	調臟腑壅滯熱毒內積不得宣通之所致也其候心



神煩躁煩赤頭痛眼澁唇乾四肢壯熱煩渴不止口
舌生瘡神思沉昏嗜卧少寐飲食無味舉體痠疼或
時心怔或時盜汗肌膚日漸消瘦故名熱勞也

口舌瘡一百二十二

一人胃弱痰盛口舌生瘡服滾痰丸愈盛吐瀉不止惡
食倦怠此胃被傷也予以香砂六君子湯服數劑少
可再以補中益氣加茯苓半夏二十餘劑而愈

夫胃氣不足飲食不化亦能為痰補中益氣乃治痰

欽定四庫全書

外科理例

之法也苟虛症而用峻利之藥鮮有不殆

一人年踰四十貌豐氣弱遇風則弦勞則口舌生瘡胸

常有痰目常赤澁服八味丸而愈

此憑症也

一人脾胃虛初服養胃湯枳朮丸有效久服反虛口舌

生瘡勞則愈盛服敗毒藥則嘔吐此中氣虛寒也治

以理中湯少愈更以補中益氣加半夏茯苓月餘而平

夫養胃湯香燥藥也若飲食停滯或寒滯中州服則

燥開脾胃宿滯消化少為近理枳朮丸消導藥也雖



有白朮終是燥劑故以服此二藥津液愈燥胃氣愈	虛況胃氣本虛而用之豈不反甚其病哉 亦有房	勞過度真陽虛憊或元稟不足不能上蒸中州不運	致食不進者以補真丸 ^三 治之使丹田之火上蒸脾	土則脾土溫和中焦自治飲食自進經曰飲食不進	胸膈痞塞或食不消大府滯泄此皆真火不能上蒸	脾土而然也若腎氣壯則丹田之火上蒸脾土則無	此病矣 一方 小兒口瘡江茶粉草為末傅之	欽定四庫全書 外科理例	一方 用黃丹	又方 苦參 黃丹 五倍子 青黛等分研為末敷	又方 青黛 芒消 為末傅	胎毒口瘡 五倍子 黃丹 江茶 芒硝 甘草等	分為末傅	咽喉一百二十三	疼痛或寒熱者邪在表也宜發散	腫痛痰涎壅盛者邪在上也宜降之



痛而脈數無力者屬陰虛宜滋陰降火

腫痛發熱便秘者表裡俱實也宜解表攻裡如症緊急

便秘刺患處或刺少商穴

一人咽痛脈數以荊防敗毒散加黃連二劑少愈乃去

芩連又六劑而愈

此憑脈症也

一人乳蛾腫痛脈浮數尚未成膿針去惡血飲荊防敗

毒散二劑而消

此憑症也

一人咽喉作痛痰涎上壅予欲治以荊防敗毒散加連

欽定四庫全書

外科理例

翹山梔玄參牛旁子飲自服甘寒降火之藥反加發

熱咽愈腫痛急刺少商二穴仍以前藥加麻黃汗之

諸症並退惟咽間一紫泡仍痛此欲作膿以前藥去

麻黃一劑膿潰而愈

此憑症也

凡咽痛之疾治之曰或勢輕者宜荊防敗毒散以散

之治之遲或勢重者宜刺少商穴瘀血已結必刺患

處亦有刺少商咽雖利而未痊消者必成膿也然膿

去則安若有大便秘結者內經針刺去血必以防風



通聖散急攻之然甘寒之劑非虛火不宜用	一婦咽喉腫痛大小便秘以防風通聖散 六 一劑諸症	悉退又荆防敗毒散服三劑而安 此憑症也	治此輕則荆防敗毒散吹喉散重則用金鑰匙及	刺患處出血最效否則不救針少商二穴亦可但不	若刺患處之神速耳	一人咽喉腫痛脈數而實以涼隔散一劑而痛止再以	荆防敗毒散加牛蒡子二劑而腫退以荆防敗毒散	欽定四庫全書 外科理例	二劑又以甘桔荆防玄參牛蒡子四劑而平	一人噤癰腫痛脈浮數更沉實飲防風通聖散 六 一劑	瀉一次勢頓退又荆防敗毒散二劑而消 此憑症脈也	一人咽喉腫秘牙關緊急針不能入先刺少商二穴出黑	血口即開更針患處飲清咽利隔散一劑而愈 此憑症也	大抵吐痰針刺皆有發散之意故多効不用針刺多	致不救	一人咽喉腫閉痰涎壅甚以膽礬吹咽中吐痰碗許更



以清咽利隔湯四劑而安 此憑症也	一人咽喉腫痛藥不能下針患處出紫血少愈以破棺丹噙之更以清咽消毒散飲而愈 此憑症也	一人咽喉乾燥而痛以四物湯又加黃栢知母玄參四劑少愈再用人參固本丸只一劑不復發	一人口舌生瘡服涼藥愈甚治以理中湯 二 而愈 此因治誤	而變	一人咽痛午後益甚脈數無力以四物湯 九 加黃栢知	欽定四庫全書 外科理例	母荆防四劑而愈仍以前藥去荆防加玄參甘桔數劑後不再發	一人口舌糜爛服涼藥愈甚脈數無力以四物加酒炒	黃栢知母玄參一劑頓退四劑而痊 此憑脈症也	一人口舌生瘡飲食不甘勞而愈甚以理中湯頓愈 此憑症也	症也	一人口舌生瘡脈浮而緩用補中益氣湯 十 加炮乾薑	更以桂末含之即愈



一人患之勞而愈甚以前藥加附子三片二劑即愈	丹溪曰口瘡服涼藥不愈者此中氣不足虛火從上	無制用理中湯甚則加附子	一弱人咽痛服涼藥或遇勞愈甚以補中益氣湯 十六加	芩連四劑而愈乃去芩連又數劑不再發 此憑症也	常治午後痛去芩連加黃栢知母玄參亦効	一老咽痛日晡甚以補中益氣湯 十六加 酒炒黃栢知母	數劑而愈 此憑症也	欽定四庫全書 外科理例	一人乳蛾腫痛飲食不入瘡色白其膿已成針之膿出	即安 此憑症也	一人咽喉腫痛予欲針之以泄其毒彼畏針止服藥然	藥既熟已不能下矣始急針患處出毒血更以清咽	消毒藥而愈	一患者其氣已絕心頭尚溫急針患處出黑血即甦如	鮑符卿喬侍郎素有此症每患針去血即愈	大抵咽喉之症皆因火為患其害甚速須分緩急及



膿成否若腫閉及壅塞者死如反掌宜用金鑰匙吹
患處吐出痰涎氣得流通則蘇若吐後仍閉乃是惡
血或膿毒須急針患處否則不治前人云喉閉之火
與救火同不容少待治喉之方固多惟用針有回生
之功學者不可不察

一婦咽間作痛兩月後始潰突而不斂遍身筋骨作痛
諸藥不應先以葶藶湯數劑而斂更以四物湯

九倍

用葶藶黃耆二十餘劑諸症悉退

此憑症也

欽定四庫全書

外科理例

一彌月小兒先於口內患之後延於身年餘不愈以葶

藶為末乳汁調服毋以白湯調服月餘而愈

此憑症也

一人咽間先患及於身服輕粉之劑稍愈已而復發仍

服之亦稍愈後大發上腭潰蝕與鼻相通臂腿數枚

其狀如桃大潰年餘不斂神思倦怠飲食少思虛症

悉具投以葶藶湯為主以健脾胃之劑兼服之月餘

而安

此憑症也

一婦患之臉鼻俱蝕筋骨作痛脚面與膝各腫一塊三



月而潰膿水淋漓半載不斂治以前藥亦愈	此憑症也
一人咽喉腫痛口舌生瘡先以清咽消毒散	六二服更
以玄參升麻湯而愈	此憑症也
一人咽喉作痛午後尤甚以四物加酒炒知母黃栢桔	
梗治之而愈	此憑症也
一人喉閉服防風通聖散腫不能嚥此症惟針乃可牙	
關已閉刺少商出血口即開以膽礬吹患處吐痰二	
碗許仍投前藥而愈	嘗見此疾畏針不刺多斃
	此憑症也
欽定四庫全書	外科理例
一人喉閉腫痛寒熱脈洪數此少陰心火少陽相火二	
臟為病其症最惡惟刺患處出血為上彼畏針以涼	
隔散	二服之藥從鼻出急乃願針則牙關已緊遂刺
少商二穴以手勒出黑血口即開仍刺喉間治以前	
藥及金鑰匙	四吹之頓退又以人參敗毒散
	六加芩
連玄參牛旁子四劑而平	
經曰太鬱發之出血亦發汗之一端河間曰治喉閉	
之火與救火同不容少怠嘗見喉閉不去血喉風不	



去痰以致不救者多矣每治喉咽腫痛或生瘡毒以	荆防敗毒加芩連重者用防風通聖散並效	一人患此勞則愈盛以補中益氣加元參酒炒黃栢知	母而愈 此憑症也	一人口舌常破如無皮狀或咽喉作痛服清咽利膈散	愈盛治以理中湯而愈 此因治不應而更方也	精要曰凡癰疽失於治療致令熱毒衝心咽嚔口舌	生瘡甚至生紅黑菌難於治療宜琥珀犀角膏	欽定四庫全書 外科理例	生犀角屑真琥珀 研 辰砂 研 茯神桂 皮	酸棗仁 去殼研 人參 各一錢 腦子 研一字 右為細末入	乳鉢研勻煉蜜搜為膏磁器盛貯疾作每服一彈子	大濃煎麥門冬湯化下一日連進五服或先服犀角	散以解之生犀角屑 去 玄參 去 升麻生黃耆赤芍藥	麥門冬生甘草當歸 各一兩 大黃 微炒二兩 為粗末每服	三錢水盪半煎至七分去滓溫服	諸哽一百二十四



諸骨哽用象牙末吹患處或取犬涎徐徐嚥下立効用 芋根搗爛丸如彈子大就將所鯁物煎湯化下 又 方食橄欖用核為末含之亦効		穀麥芒在咽不出取雞驚涎含之立消	誤吞金銀等物多食諸般肥肉膏滑自從大便出	誤吞銅錢用炭末白湯調服 多食蜜食飴糖自從 大便出或多食葶薺或胡桃肉錢自消	誤吞針用磁石如棗核大磨令光鑽一孔用線穿含	欽定四庫全書 外科理例	之針自口出	傷損脈法一百二十五 附破 傷風	經云肝脈轉堅而長色不青當病墜若轉因血在脇下 令人嘔逆	金匱云寸口脈浮微而瀋當亡血若汗出者當身有瘡 被刀斧所傷亡血故也	脈經云金瘡出血太多脈虛細者生數實大者死 金 瘡出血脈沉小者生浮大者死斫刺出血不止者脈



來大者七日死滑細者生

從高顛仆內有瘀血腹脹脈堅強者生小弱者死

破傷有瘀血在內脈堅強實則生虛小弱者死皆為脈

病不相應故也

一婦臀癰瘡將愈患破傷風發熱搐搦脈浮數治以當

歸地黃湯不信乃服發散敗毒藥果甚始信而服之

至數劑而痊

脈浮數而發表今用發表而病重可見脈之浮數

欽定四庫全書

外科理例

亦有主陰虛者必兼症參之為穩認作陰虛由臀

癰後也

夫破傷風症須分表裡別虛實不可一槩治之

原病式經

云破傷中風之由因瘡熱甚鬱結而榮衛不得宣通

沸熱因之遍體故多白痂是時瘡口閉塞氣難通泄

熱甚則生風也不已則表傳於裡矣但有風熱微甚

兼化故殊異耳

一法破傷中風風熱燥甚拂鬱在表而裡氣尚平者善



伸數欠筋脈拘急時或惡寒或筋暢而播脈浮數而
弦者宜辛熱治風之藥開衝結滯而猶傷寒表熱拂
鬱而以麻黃湯辛熱發散者同也凡用辛熱開衝風
熱結滯宜以寒藥佐之則良免致藥雖中病而風熱
轉甚也如治傷寒發熱用麻黃桂皮加黃芩知母石
膏之類足也若世以甘草滑石葱豉寒藥發散甚妙
若表不已漸傷入裡裏又未大甚而脈在肌肉者宜
以退風熱開結滯之寒藥調之或微加治風辛熱亦
得猶傷寒在半表半裡以小柴胡和解之意也若裡
熱已甚而舌強口禁項背反張驚搐惕搦涎唾涸枯
胸腹滿塞而或便秘結或時汗出脈洪數而弦也
然汗出者由風熱鬱甚於裡而表熱稍罷則腠理疎
泄而心火熱甚故汗出也法宜除風散結寒藥下之
後以退風熱開鬱滯之寒藥調之而熱退結散則風
自愈矣凡治此亦宜按摩導引及以藥斡開牙關勿
令口禁使粥藥得下也

欽定四庫全書

外科理例



病機云破傷風者有因卒暴損傷風襲之間傳播經絡
致使寒熱更作身體反張口禁不開甚者邪氣入藏
有因諸瘡不差榮衛俱虛肌肉不生瘡眼不合邪亦
能外入於瘡為破傷風之疾有諸瘡不差舉世皆言
着灸為上是為熟瘡而不知火熱客毒逐經傳變不
可勝數微則發熱甚則生風而搐或角弓反張口禁
目斜亦有破傷不灸而病此者因瘡着白痴瘡口閉
塞氣難通泄故陽熱易為鬱結熱甚則生風也

徐用

欽定四庫全書

外科理例

誠

云此論所因有四一者因瘡口入風似屬外因一

者因瘡口閉塞內熱生風似屬內因也

又云

破傷風

症古方藥論甚少豈非以此疾與中風同論故不另
立條目也唯河間論與傷寒表裡中三法同治用藥
甚詳其言病因有因外傷於風有因灸及內熱所作
者然與中風相似也但中風之人尚可淹延歲月而
破傷風者犯之多致不救蓋中風有在經在臟在府
之異獨入臟者最難治破傷風或始而出血過多或



瘡早閉合瘀血停滯俱是血受病屬陰五臟之所主
故此風所傷始雖在表隨則必傳入裡臟故多死也
此病或瘡口袒露不避風寒而有所傷或瘡口閉合
密被風邪而及病已十分安全而忽有此大抵皆由
內氣虛而有鬱熱者得之若內氣不虛而無鬱熱者
雖傷而無所害也

跌撲一百二十六

一人墜馬兩脇作痛以復元活血湯二劑頓止更以小

欽定四庫全書

外科理例

柴胡加當歸桃仁二劑而安

此憑症也

一老墜馬腹作痛以復元通氣散用童便調進二服少

愈更以四物加柴胡桃仁紅花四劑而安

此憑症也

一人跌仆皮膚不破兩脇作疼發熱口乾自汗須先飲

童便一甌煩渴頓止隨進復元活血湯倍用柴胡青

皮一劑脹痛悉愈又劑而安

發明經

曰從高墜下血

流於內不分十二經絡聖人俱作風中肝血留於脇
下以中風療之血者皆肝之所主惡血必歸於肝不



問何經之傷必留於脇下蓋肝主血故也痛甚則必
自有汗但人汗出皆為風症諸痛皆屬於肝木況敗
血凝滯從其所屬入於肝也從高墜下逆其所行之
血氣非肝而何故用破血行經

一人青腫作痛以蘿蔔汁調梔子末敷之以四物湯加

柴胡黃芩天花粉川山甲二劑少愈更以托裡散健

脾藥而愈

此憑症也

杖瘡血熱作痛一百二十七

欽定四庫全書

外科理例

胸膈脹滿宜行血老弱者宜行氣活血更飲童便酒腸
痛者宜下血血去多而煩躁者補血如不應獨參湯
或瘀肉不潰或潰而不斂宜大補氣血

一人杖瘡瘀肉不腐乃大補之漸腐更以托裡健脾藥

而愈

此憑症也

一人風入杖瘡牙關緊急以玉真散一服少愈再服而

安

一官諫南巡受杖瘀血已散壞肉不潰用托裡藥稍潰



膿清此血氣虛也非大劑參耆不能補彼恐腹滿予
強之飲食稍思遂加大補肉潰膿稠而愈

此憑症也

一嘗治被杖數人皆先散其瘀血漸用排膿托裡之藥

俱愈 夫叫號傷氣忍痛傷血氣血虛明矣况脾主

肌肉脾氣受傷飲食必減血一冰則肌肉不生故必

理脾脾健肉自生非參耆歸耆之類培養脾土則肌

肉何由而生 又須分人虛實及有無瘀血蓋打撲

墜墮皮肉不破肚腹作疼者必有瘀血在內宜復元

欽定四庫全書

外科理例

活血湯

三

攻之老弱者加桃仁紅花川山甲補而行

之 若血去多而或煩燥此血虛也宜獨參湯補之

有打撲墜墮稍輕別無瘀血等症但只痛不止者

惟和氣血調經脈其痛自止更以養氣血健脾胃無

有不効 亦有痛傷胃氣作嘔或不飲食以四君子

加藿香砂仁當歸治之

若有瘀血不先消散而加補劑則成實實之禍設無

瘀血妄行攻利則致虛虛之禍矣



一人因杖臀膝俱潰膿瘀未出時發昏憤此膿毒內作也急開之昏憤愈盛此虛也投入珍湯 十一服少可 數服死肉自潰頓取之用猪蹄湯洗淨以神効當歸膏塗貼再服十全大補湯兩月而愈若更投破血之劑危矣	此憑症也	大抵杖瘡皆瘀血為患宜速治療淺者砭之深者刺之更以活血流氣藥治之內潰者開之有腐肉取之以壯胃生血藥托之可保無危 有傷筋骨而作痛	欽定四庫全書	外科理例	者以沒藥降聖丹治之 若牙關緊急或腰背反張者以玉真散治之並効	杖瘡熱血作痛以涼血去瘀血為先須下雞鳴散之類	黃栢 生地黄 紫金皮皆要藥 生地黄 黃栢	為末童便調傅或加韭汁不破者以韭菜蔥頭舂碎炒熱貼冷則易	膏藥 紫金皮 生地黄 黃栢 乳香 沒藥 大黃之類 又方 大黃 黃栢為末生地黄汁調傅



乾則易 又方 野苧根嫩者不拘多少洗淨同鹽
搗傳傷重多用鹽効

嘗見覆車壓傷者七人仆地呻吟一人未甦俱即令以
熱童便灌之皆得無事又曾被重車研傷脅悶良久
復甦胸滿如築氣息不通隨飲熱童便一椀胸寬氣
利惟小腹作痛與復元活血湯三百一劑便血數升許
痛腫悉退更服養血氣藥而痊

大凡損傷不問壯弱有無瘀血俱宜熱童便以酒佐

欽定四庫全書

外科理例

之推陳致新其功甚大 若脇脹或作痛或發熱
煩躁口乾喜冷飲熱童便一甌勝服他藥他藥雖亦
取効但有無瘀血不能盡識反致悞人惟童便不動
臟腑不傷血氣聞操軍或墜馬傷者服之亦佳又凡
腫痛或傷損者以葱搗爛熱罨之尤妙本草云葱大
利傷損

一人墜馬傷頭并臂取葱搗爛炒熱罨患處以熱手熨
之服沒藥降聖丹四百而愈



一人誤傷去小指一節牙關緊急腰背反張人事不知	用玉真散 ^{一百} 一 ^{一百} 青州白丸子 ^六 各一服未應此亦藥	力不能及也急用蒜搗爛裹患指以艾灸之良久覺	痛仍以白丸子一服及托裡散數服而愈	夫四肢受惠風邪所襲遏絕經絡者古人所制淋瀝	貼熗鐮刺等法正為通經絡導引氣血也	火瘡一百二十八	一人火瘡驟用涼藥敷貼更加腹脹不食予以人參敗	欽定四庫全書 外科理例	毒散 ^六 加木通山梔外用栝葉炒為末麻油調搽漸	愈	嘗用煮大汁上浮脂調銀硃更效若用涼藥逼火毒	入內多致不救	湯火瘡以淋了第二次灰搽傳	患處	又方 以臘月猪膽塗黃栢灸乾為末傳	熱油湯火傷皮爛肉大痛冷霜散 牡蠣 ^煨 寒水石 ^生	明朴硝 青黛 ^{各一} 輕粉 ^{一錢} 桐油 ^{二錢} 水一錢以



桃柳枝不住手攪成膏再以少水溶塗之外用貓兒 肚底毛細剪摻上新水或油調濕則乾貼痛立止 漆瘡一百二十九 一人漆瘡作嘔由中氣弱漆毒侵之以六君子加砂仁 藿香酒炒芍藥彼不為然服連翹消毒散嘔果盛復 邀治以前藥外以香油調鐵絢末塗之而愈	欽定四庫全書 外科理例	外科理例卷六



欽定四庫全書

外科理例卷七

明 汪機 撰

天泡瘡一百三十

脉浮發熱或拘急者發散表邪

脉沉發熱便秘者解表攻裡

發熱小便赤澀者分利消毒

一小兒患此焮痛發熱脉浮數挑去毒水以黃栢滑石

欽定四庫全書

外科理例

末敷之更飲荊防敗毒散^七二劑而愈^{此憑症也}

一人焮痛發熱服祛風清熱藥愈熾其脉沉實乃邪在

內也用防風通聖散^四十一劑頓退又荊防敗毒散^七

二劑而安^{此憑症脉也}

此症須為風熱當審表裡治無悞矣

一兒焮赤發熱以黃栢滑石末敷之飲大連翹湯^六二

劑少愈更以金銀花散^{一百}二劑而痊^{此憑症也}

一兒十餘歲背側患水泡數顆發熱脉數此肺胃風熱



所致名曰天泡瘡以荆防敗毒散^七加芩連外去毒 水以金黃散^六敷之又四劑而愈^{此憑症也}	一有腹患此延及腰背焮痛飲冷脉數按之愈大乃表 裡俱實也用防風通聖散^四十一劑更敷前藥勢減大	半再以荆防敗毒散^七二劑而愈	楊梅瘡一百三十一^{有從咽喉患起者見咽喉}	濕勝者宜先導濕 表實者宜先解表	裏實者宜先疎裏 表裏若俱實解表攻裏	欽定四庫全書 外科理例	表虛者補氣 裏虛者補血 表裏俱虛者補氣血	一人遍身皆患左手脉數以荆防敗毒散^七表症乃退	以仙方活命飲^{元立}六劑瘡漸愈兼葶藶湯服月餘而	瘡	一婦焮痛發熱便秘作渴脉沉實以內疎黃連湯^三二	劑裏症已退以龍膽泄肝湯^六立敷劑瘡毒頓退間服	葶藶湯至月餘而瘡^{此憑症脉症也}	一人下部生疳諸藥不應延及遍身突腫狀如翻花筋



攣骨痛至夜尤甚此肝腎二經溫熱所致先以導水	丸令進五服次以龍膽瀉肝湯_{五六}數劑再與除濕健	脾之藥外貼神異膏吸其膿膈蒜灸拔其毒而愈_{此憑}	也_症	若表實者以荆防敗毒散 裏實者以內疎黃連湯	表裏俱實者防風通聖散_四氣虛者四君子 血	虛者四物仍加兼症之藥並愈 若服輕粉等藥反	收毒于內以致迭發 槩服防風通聖則氣血愈虛	欽定四庫全書 外科理例	因而不治者多矣	一人患之發寒熱作渴便秘兩手脉實用防風通聖散	而退以荆防風敗毒散_七兼龍膽瀉肝湯_{五六}而痊	此憑_{症也}	一人患之腫痛先以龍膽瀉肝湯_{五六}導水丸各四劑少	愈再以小柴胡加黃栢蒼朮五十餘劑而平_{此憑症也}	一人玉莖腫潰小便赤色肝脉弦數以小柴胡加木通	青皮龍膽草四劑又龍膽瀉肝湯_{五六}數劑而痊_{此憑脉症}



也

一童玉莖患之延及小腹數枚作痛發熱以小柴胡湯

五

吞蘆會丸更貼神異膏月餘而痊

此憑症也

一人愈後腿腫一塊久而潰爛不斂以蒜搗爛敷患處

以艾灸其上更貼神異膏及服黑丸子並托裡藥兩

月而愈

此憑症也

一婦燃輕粉藥於被中薰之致遍身皮塌膿水淋漓不

能起居以滑石黃栢為末綠荳粉等分鋪席上令可

欽定四庫全書

外科理例

卧更以金銀花散月餘而痊

此憑症也

一人皆愈但背腫一塊甚硬肉色不變年餘方潰出水

三載不愈氣血俱虛飲食少思以六君子湯

三加當

歸藿香三十餘劑更飲葶薤湯兩月餘而痊

此憑症也

一人患之勢熾兼脾胃氣血皆虛亦服前藥而差

一婦患之皆愈惟兩腿兩膝各爛一塊如掌兼筋攣骨

痛三載不愈諸藥不應日晡熱甚飲食少思以葶薤

湯兼逍遙散倍用白朮茯苓數劑熱止食進貼神異



膏更服八珍湯十加牛膝杜仲木瓜三十餘劑而痊
此憑症也

又捷法治楊梅瘡不問新舊並効不過旬日每日用膽
礬白礬末並水銀各三錢五分入香油津吐各少許
和勻坐無風處取藥少許塗兩脚心以兩手心對兩
脚心擦磨良久再塗藥少許仍前再擦用藥盡即卧
汗出或大便去垢口出穢涎為驗連擦三日煎通聖
散十四澡洗更服內疎黃連湯敗毒散愈後服葶藶湯

欽定四庫全書

外科理例

有熱加芩連氣虛參耆血虛四物之類

一人楊梅瘡後兩腿一臂各潰二寸許一穴膿水淋漓
少食不睡久而不愈以八珍湯加茯神酸棗仁服每
日以蒜搗爛塗患處灸良以隨貼膏藥數日已可却
用豆豉灸更服十全大補湯三十而愈此憑症也
凡有腫硬或作痛亦用蒜灸及敷中和膏內服補

藥並効

班疹一百三十二

附小兒丹
毒痘後毒



脉浮者消風為主	脉浮數者祛風清熱	脉數按之沉實者解表攻裏	一婦患班作癢脉浮以消風散 ^七 四劑而愈 ^{此憑症也}	一婦患班作癢脉浮數以人參敗毒散 ^六 二劑少愈更	以消風散 ^七 四劑而安 ^{此憑症也}	一人患班色赤紫焮痛發熱喜冷脉沉實以防風通聖散一劑頓退又以荆防敗毒散 ^七 加芩連四劑而愈	欽定四庫全書 外科理例	一老患疹色微赤作癢發熱以人參敗毒散 ^六 二劑少愈以補中益氣湯加黃芩山梔而愈 ^{此憑症也}	一婦患班癢痛大便秘脉沉實以四物加芩連大黃槐花而愈 ^{此憑症也}	一兒患班作痛發熱煩渴欲服清涼飲下之胗脉不實舉按不數此邪在經絡不可下用解毒防風湯二劑而安	此症小兒多患之須審在表在裏及邪之微甚而



治之前人謂首尾俱不可下者何也曰首不可下者
為班未見於表下則邪氣不得伸越又脉症有表
而無裏故禁首不可下也尾不可下者班毒已顯
於外內無根蒂大便不實無一切裡症下之則班
氣逆陷故不可下也

一人作癢發熱以消毒犀角飲甫一劑作吐瀉此邪上
下俱出也毒自解少頃吐瀉俱止其疹果消吐瀉後
脉見七診此小兒和平脉也邪已盡矣不須治果愈

欽定四庫全書

外科理例

潔古云班疹為症各異發焮腫于外者少陽屬三焦
相火也謂之班若小紅靨行于皮膚之中不出者屬
少陰君火也謂之疹凡顯班症若有吐瀉者甚勿亂
治而多吉謂邪上下出也班疹並出小兒難禁是以
別生他症也首尾不可下大抵安裏之藥多發表之
藥少秘則微疎之令邪氣不壅併而作次以出使兒
易禁也身溫暖者順身涼者逆
一子痘毒及時針刺毒不內侵數日而愈



大抵古人制法淺宜砭深宜刺便瘀血去于毒聚
之始則易消況小兒氣血又弱膿成而不針砭鮮
不斃矣

一兒臂患痘毒作炒按之復起此膿脹痛而然遂刺之
以托裡而愈

痘後肢節作腫而色不赤宜金銀花散一百一十更以生黃

豆末熱水調敷乾以水潤自消若敷六七日膿已成

急刺之宜服托裏藥

欽定四庫全書

外科理例

一兒痘瘡已愈腿上數枚變疔蝕陷用雄黃銅綠等分
為末敷兼金銀花散而愈若患遍身用出蛾綿璽填
實白礬末燒候汁乾取出為末放地上蓋良久出火
毒服之効

一兒痘後搔癢搔破成瘡膿水淋漓用經霜陳茅草為
末服之及鋪席上兼服金銀花散一百一十而愈若用菴
荳活石末亦可但不及茅草功速

一兒周歲患丹毒延及遍身如血染用磁鋒擊刺遍身



出黑血以神功散

六

塗之服大連翹飲而愈

又兒未滿月陰囊患此為前治之而愈

又兒不欲刺毒入腹而死

河間云丹從四肢延腹

者不治予嘗刺毒未入腹者無不効

一小兒腿患丹如霞遊走不定先以麻油塗患處砭出

惡血更以金銀花

一百一十一

一劑而安

此憑症也

一小兒遍身皆赤砭之投解毒藥即愈

此憑症也

一人患丹毒焮痛便秘脉數而實服防風通聖散不應

欽定四庫全書

外科理例

令砭患處去惡血仍用前藥即愈

此憑脉症也

一小兒患之外勢須輕內則大便不利此在藏服大連

翹飲數神功散而差

此憑症也

一小兒遍身亦赤不從砭治以致毒氣入腹而死此症

乃惡毒熱血蘊蓄于命門遇相火而合起也如霞片

者須砭去惡血為善如腫起赤色遊走不定者宜先

以生麻油塗患處砭之以洩其毒凡從四肢起入腹

者不治須丹有數種治者有數法無如砭之為善常



見患稍重者不用砭法俱不救也

腸癰一百三十三

小腹硬痛脉遲緊者瘀血也宜下之

小腹軟痛脉洪數者膿成也宜托之

一產婦小腹痛小便不利以薏苡仁湯二劑痛止更以

四物加桃仁紅花下瘀血升許而愈

大抵此症皆因榮衛不調或瘀血停滯所致若脉洪

數已有膿脉但數微有膿脉遲緊乃瘀血下之則愈

欽定四庫全書

外科理例

若患甚者腹脹大轉側作水聲或膿從臍出或從大

便出宜蠟礬丸太乙膏及托裡藥

一婦小腹腫痛小便如淋尺脉芤而遲以神効瓜蒌散

二劑少愈更以薏苡仁湯二劑而愈

此憑脉症也

一人膿已成用雲母膏一服下膿升許更以排膿托裡

藥而愈後因不守禁忌以致不救

此憑症也

一人裡急後重時或下膿脹痛脉滑數以排膿散及蠟

礬丸而愈

此憑脉症也



一婦小腹痛有塊脉芤而澀以四物湯加玄胡紅花桃仁牛膝木香而愈 此憑脉也	一婦小腹痛隱痛大便秘澀腹脹轉側作水聲脉洪數以梅仁湯一劑諸症悉退以薏苡仁湯二劑而差 此憑脉症也	一婦腹脹痛皮毛錯縱小便不利脉數滑以太乙膏一服膿下升許脹痛頓退以神効瓜蒌散二劑而全退更以蠟礬丸及托裡藥十餘劑而安 此憑脉症也	欽定四庫全書 外科理例	一婦因經水多服澀藥止之致腹作痛以失笑散用二服而瘳 此憑症也	一人小腹痛而堅硬小便數汗時出脉遲緊以大黃湯一劑下瘀血合許以薏苡仁湯四劑而安 此憑脉也	一婦小腹痛惡露不盡小腹痛以薏苡仁湯 五下瘀血而	瘳 此憑症也 凡瘀血停澀宜急治之緩則腐為膿最難治療若流滿節骨則患骨疽失治多為敗症	腸癰身甲錯腹皮急按之濡如腫狀腹無聚積身無熱



此以積冷所致故金匱有用附子溫之若小腹腫痞按之痛如淋小便自調發熱身無汗復惡寒脈遲緊膿未成可下之常有血洪數者膿已成不可下此內結熱所成故金匱有用大黃利之甚者腹脹大轉側聞水聲或繞臍主瘡膿從瘡出者有出臍中者不治必死惟大便下膿血者自愈

一婦病少腹痞堅小便或澀或時汗出或復惡寒此腸癰也脈滑而數膿為已成設脈遲緊即為瘀血

欽定四庫全書

外科理例

下則愈

此憑症脈也

內經載有息積病此得之二三年遍身微腫續乃大腸與臍連日出膿遂至不救此亦腸癰之類

腸癰作濕熱積治入風難治千金謂妄治必殺人要略以薏苡仁附子敗毒散千金以大黃牡丹湯三因以薏苡湯千金又有灸法曲兩肘頭正肘銳骨灸百壯下膿血而安

一人傷寒踰月既下內熱未已脇及小腹偏左腫滿肉



也脉	乙膏膿下升許更以排膿托裡藥及蠟礬丸而愈	數此腸癰也滑數膿成以廣東牛皮膠酒溶化送太	一人年踰五十腹內隱痛小便如淋皮膚錯縱而脉滑	此憑脉也	以牛皮膠溶入酒中並水吞之餉時服盡下膿血愈	沉細今滑數此腸癰也以雲母膏一兩丸如梧桐子	一女腹痛百方不應脉滑數時作熱腹微急曰痛病脉	欽定四庫全書 外科理例	而安	也以雲母膏分作百十丸煎黃耆湯吞之利膿數升	一婦腸中痛大便自小便出胗之朮脉見于關此腸癰	而差	此憑脉症也	用硝黃作湯下之膿如糜者五升許明日再圍餘膿	時見當生惡瘡關朮為腸癰用保生膏外衣以乳香	流入罌丸赤腫如瓠翁胗關尺滑數且朮曰數脉不	色不變俚鑿為風矢所中以膏摩之月餘毒循宗筋



一婦產後小腹作痛諸藥不應其脉滑數此瘀血內潰	為膿也服瓜子仁湯^五痛止更以太乙膏而愈^{此憑脉也}	今人產後多有此病縱非癰毒用之更効 有人臍	出膿水久而不愈亦以前膏及蠟礬丸而痊	一兒年十二患腹脹臍突頗銳鑿謂腸癰舍針臍無他	法翁曰臍神闕也針刺當禁况癰舍于內惟當以湯	丸攻之進透膿散止一劑膿自潰繼以十奇湯^四下	善應膏丸而漸差^{此憑症也}	欽定四庫全書 外科理例	肺癰肺痿一百三十四	喘嗽氣急胸滿者表散之	欬嗽發熱者和解之	欬而胸膈隱痛唾痰醒臭者宜排膿	喘急恍惚疾盛者宜平肺	欬膿脉短者宜補之	肺痿寸口脉數而虛肺痿之候久嗽不已汗出過度重	亡津液便如爛瓜下如豕脂小便數而不渴渴者自愈



欲飲者差此由多唾涎沫而無膿

肺疽寸口脉數而實肺疽之候口乾喘滿咽噪而渴甚者四肢微腫欬唾膿血或腥臭濁味胸中隱隱微痛候始萌則可救膿成則多死脉若微緊而數者未有膿緊甚而數者已有膿嘔膿不止者難治久久如粳米粥者亦難治嘔膿自止者自愈其脉短而濇者自痊浮大者難治面色當白反赤者此火尅金皆不可治

內疽皆因飲食之火七情之火相鬱而發飲食者陰

欽定四庫全書

外科理例

受之七情者臟腑受之宜其發在腔子而向內非肝腸胃育膜也

肺癰先須發表千金曰欬唾膿血其脉數實或口中咳胸中隱痛脉反滑數者為肺癰脉緊數為膿未成緊去俱數為膿已成

要畧先以小青龍湯服一貼以解表之風寒然後以葶藶大棗瀉肺湯桔梗葦葉湯隨症用之以取膿此治腫瘍例也終以黃耆湯以補裡之陰氣此治潰瘍例也



肺癰已破入風者不治或用太乙膏凡服以搜風湯吐之吐膿血如肺癰狀口臭他方不應者宜消風散入男子髮灰清米飲下兩服可除	一人喘欬脉緊數以小青龍湯服一劑表症已解更以	葶藶大棗湯而喘止乃以桔梗湯愈	此憑脉症也	一人欬嗽氣急胸膈脹滿睡卧不安以葶藶散二服少	愈更桔梗湯差	此憑症也	一人嗽嗽項強氣促脉浮而緊以參蘇飲二劑少愈更	欽定四庫全書	外科理例	以桔梗湯四劑而安	此憑脉症也	一人欬嗽脇脹滿咽乾口燥欬唾腥臭以桔梗湯四劑	而陰膿以排膿數服而止乃以補陰托裡之劑而瘳	此憑症也	一人欬而膿不止脉不退諸藥不應甚危用柘黃丸一	服少愈再服頓退數服而痊潰者尤効	此憑症也	一婦唾膿五心煩熱口乾胸悶以四順散三劑少止以	排膿散數服而安	此憑症也



一人面白神勞欬而胸膈隱痛其脉滑數予以為肺癰
欲用桔梗湯不信乃服表藥致欬愈甚唾痰腥臭
始悟乃服前湯四劑欬少止又以四順散四劑而
脉靜更以托裡藥數劑而愈

此憑脉
症也

大抵勞傷血氣則腠理不密風邪乘肺風熱相搏蘊
結不散必致喘嗽若悟汗下過度則津液重亡遂成
斯症若寸脉數而虛者為肺痿數而實者為肺疽脉
微緊而數者未有膿緊甚而數者已有膿唾膿自止

欽定四庫全書

外科理例

者脉短而面白者易治膿不止脉洪大而面色赤者
不治使其治早可救膿成則無及矣 金匱方論熱
在上焦者因欬為肺痿得之或從汗出或從嘔吐或
從渴消小便不利或從便難又被下藥快利重亡津
液故寸口脉數其人燥咳胸中隱隱而痛脉反滑數
此為肺癰咳唾膿血其脉數虛者為肺痿實者為肺
癰

一童氣稟不足患肺癰唾膿腥臭皮毛枯槁脉浮按之



瀉更無力治以鍾乳粉湯

此憑脉
症也

一弱人咳膿日晡發熱夜間盜汗脈浮數而緊用人參

五味湯數劑頓退以紫苑茸湯月餘而痊

此憑
症也

一僕年踰三十嗽久不愈氣壅不利睡卧膿血甚虛其

主已棄矣予以寧肺散一服少愈又服而止大半乃

以寧肺湯數劑而痊所謂有是病必用是藥若泥前

散性澁而不利何以得愈

此憑
症也

凡腫而一日至四五日未成膿而痛者宜灸至不痛灸

欽定四庫全書

外科理例

而不痛或麻木者明灸之

腫硬不作膿或痛或不痛或微痛或瘡頭如黍者灸之

尤効亦有數日色尚微赤腫尚不起痛不甚膿不作

者尤宜多灸勿拘日期更服甘溫托裏藥切忌寒涼

之劑

瘰癧肉不腐桑柴火灸之

脈數發熱而痛者發于陽也可治脈不數小熱不痛者

發于陰也難治不痛最惡不可視為常疾此症不可



不痛不可大痛頓悶者不治	腫瘍八十一	腫高焮痛脈浮者邪在表也宜托之 如內托復煎散	腫硬痛深脈沉者邪在內也宜下之 如黃連內疎湯	仙方活命飲苦參丸	外無焮腫內則便利調和者邪在經絡也宜調和榮衛	如托裏榮衛湯白芷升麻輩	焮痛燥煩或咽乾作渴者宜降火 如黃連解毒湯	欽定四庫全書 外科理例	焮痛發熱或拘急或頭痛者邪在表也宜散之 如荊	防敗毒散人參敗毒散輩	大痛或不痛者邪氣實也隔蒜灸之更用解毒 如仙方活命飲	煩躁飲冷焮痛脈數者邪在上也宜清之 如清涼飲	或金銀花散	惡寒而不潰者氣實兼寒邪也宜宣而補之 如十宣	散	焮痛發熱汗多大渴便秘譫語喉結陽症也宜下之



如黃連內疎湯破棺丹輩

一人患肺痿咳嗽喘急吐痰腥臭胸滿咽乾脈洪數用

人參平肺散六劑及飲童便諸症悉退更以紫苑茸

湯而愈

此憑脈症也

童便雖云專治火虛常治瘡瘍腫焮疼痛發熱作渴及肺

痿肺癰發熱口渴者尤効

一婦患肺痿咳嗽吐痰腥臭日晡發熱脈數無力治以

地骨皮散熱止更用人參養肺湯月餘而安

此憑脈症也

欽定四庫全書

外科理例

一人咳嗽喘急發熱煩燥面赤咽痛脈洪大用黃連解

毒湯

八

二劑少退更以梔子湯服四劑而安

此憑脈症也

一人春間咳嗽唾膿腥穢胸滿氣促皮膚不澤項強脈

數此肺疽也蓋肺系在項肺傷則系傷故牽引不能

轉側肺主皮毛為氣之本肺傷不能攝氣故脇脹氣

促而皮膚縱東垣云肺瘡脈微緊而數者未成膿緊

甚而數者已有膿其脈緊數膿為已成以參耆歸芎

白芷貝母知母桔梗防風甘草麥門瓜蒌仁兼以蠟



礬丸及太乙膏膿盡脈濇而愈至冬脈復數經曰飲	食勞倦傷脾脾傷不能生肺形寒飲冷傷肺肺傷不	能生腎腎水不足則心火熾盛故脉洪數經曰冬見	心而莫治果歿火旺之月	一人年踰三十患咳嗽項強氣促右寸脈數此肺疽也	東垣云風傷皮毛熱傷血脈風熱相搏血氣稽留于	肺變成瘡疽今脈滑疽膿已成以排膿托裏之藥及	蠟礬丸脈漸濇而愈	欽定四庫全書	一人病胃膈壅滿昏不知人予以杏仁薏苡之劑灌之	立甦繼以升麻黃耆桔梗消其膿踰月而愈予所以	知其病者以陽明脈浮滑陰脈不足也浮為風滑為	血聚始由風傷肺故結聚客于肺陰脈不足過于宣	逐也諸氣本于肺肺氣治則出入順而苑陳除故行	其肺氣而病自己	一人腎氣素弱咳唾痰涎小便赤色服腎氣丸而愈	
								外科理例								
		</														

一瘰婦咳而無痰咽痛日晡發熱脈浮數先以甘桔湯	少愈後以地骨皮散而熱退更以腎氣丸及八珍湯	加柴胡地骨皮而愈	此憑脈症也	丹溪云咳而無痰者乃火鬱之症及痰鬱火邪在中	用苦梗開之下用補陰降火之劑不已則成勞嗽此	症不得志者多有之又 原病式瘦人腠理疎通而	多汗血液衰少而為燥故為勞嗽之症也	一人年前病肺癰後又患咳嗽頭眩唾沫飲食少思小	欽定四庫全書	外科理例	便頻數服解散化痰藥不應診之脾肺二脈虛甚予	謂眩暈唾涎屬脾氣不能上升小便無度乃肺氣不	得下制內未成癰宜服以加味理中湯脈四劑諸症	已退大半更用鍾乳粉湯而安	此憑脈也	河間曰肺痿屬熱如咳久肺痿聲啞聲嘶咯血此屬	陰虛熱甚然也本論治肺痿吐涎沫而不咳者其人	不渴必遺尿小便數以上虛不能制下故也此為肺	中冷必眩多痰唾用炙甘草乾姜此屬寒也肺痿涎



唾多心中濕液濕液者用炙甘草湯此補虛勞也與
補陰大熱不同是皆宜分治故肺痿又有寒熱之異
一人因勞咳嗽不止項強而痛脉微緊而數此肺癰也
尚未成膿欲用托裏益氣藥彼不信仍以發散藥以
致血氣愈虛吐膿不止竟致不救

經云肺內主氣外司皮毛若肺氣虛則腠理不密皮
毛不澤肺受傷則皮毛錯縱故患肺癰肺痿腸癰者
致皮毛如此以其氣不能榮養而然也亦有服表藥

欽定四庫全書

外科理例

見邪不解仍復發表殊不知邪不解者非邪不能解
多因腠理不密而邪復入也專用發表則腠理愈虛
邪愈易入反為敗症矣若診其脉邪在表者止當和
解而實腠理乘虛復入者亦當和解兼實腠理故用
托裏益氣之藥若小便赤澀為肺熱所傳短少為肺
氣虛蓋肺為母腎為子母虛不能生子故也亦有小
便頻數者亦為肺虛不能約制耳

一人年踰四十喘咳脇胸痛滿氣促右寸脉大此風熱



蘊于肺也尚未成瘡屬有餘之症欲用瀉白散_五彼 謂肺氣素祛自服補藥喘嗽愈盛兩月後復請視汗 出如雨喘而不休此肺氣已絕安用治果歿 夫肺氣充實邪何從襲邪氣既入則宜散之故用瀉 白散乃瀉肺之邪氣邪氣既去真氣自實 一有患此吐膿面赤脈大予謂肺病脈宜濇面宜白今 面赤脈大火尅金不可治果歿	胃脘癰一百三十五	欽定四庫全書 外科理例	胃脘癰當候胃脈人迎者胃脈也其脈沉細氣逆則甚 甚則熱聚胃口而為癰若脈洪數膿已成遲緊雖膿未 就已有瘀血宜急治之否則邪毒內攻腐爛腸胃不可 救也宜射干湯	射干_{去毛} 赤茯苓 梔子 升麻_{各一兩}	赤芍_{兩半} 白朮_{半兩} 右剉水煎入地黃汁一合蜜半	合溫服 芍藥甘草湯 升麻湯隨選用之	腦疳一百三十六



欽定四庫全書		外科理例		飲及化慝丸治之而愈		肺疳一百三十七		出顙腫胞高尤當服此藥		一兒頭患白瘡皮光且急諸藥不應名曰腦疳瘡乃胎毒挾風熱而成服龍膽丸及吹蘆會末于鼻內兼搽解毒散而愈若重者髮結如穗腦熱如火遍身汗	
一兒歔嗽喘逆壯熱惡寒皮膚如粟鼻癢流涕咽喉不利頤爛吐紅氣脹毛焦作利名曰肺疳以地黃清肺		一兒眉歔多啼嘔吐清沫腹痛肚脹筋青唇口紫黑肚		門作癢名曰蛔疳服大蘆會丸而愈		脊疳一百三十九		有虫蝕脊膂食熱黃瘦煩溫下痢拍背如鼓鳴脊骨如		一兒十歲患瘡疥久不愈肌瘦寒熱作時腦熱足冷滑	
一兒十歲患瘡疥久不愈肌瘦寒熱作時腦熱足冷滑		腎疳一百四十		鋸齒十指生瘡常嚙此脊疳也亦宜大蘆會丸治之							



瀉肚痛齟爛口臭乾渴爪黑面鰲此腎疳也服六味
地黃丸更搽解毒散而愈

鬼擊一百四十一

一人被鬼擊身有青痕作痛以金銀花煎湯飲之即愈

歷節風一百四十二

一婦患癰寒熱熾痛服人參敗毒散翌日遍身作痛不
能轉側彼云素有此疾每發痛至月餘自止服藥不
應婦人體虛因受風邪之氣隨血而行淫溢皮膚卒

欽定四庫全書

外科理例

然掣痛遊走無常名曰歷節風治以四生丸而愈

此憑

脉也

一宜先兩膝後至遍身骨節皆痛脈遲緩用羌活勝

濕湯及荆防敗毒散七加滲濕藥不應次以附子八

物湯七一劑悉退再服而愈

此憑脉也

若脈洪數而痛者宜人參敗毒散六有毒自手足起

至遍身作痛或頸項結核如貫珠此風濕流氣之症

宜加減小續命及獨活寄生湯

七四



一人年踰五十筋骨痿軟卧床五年遍身瘙癢午後尤甚治以生血藥癢漸愈癢少可更以加味四斤丸治之調理謹守年餘而痊	此憑症也	或曰熱淫于內藥用溫補何也蓋因血衰弱不能養筋筋緩不能自持陽躁熱淫于內宜養陽滋陰陽實則水升火降矣	瘡疥一百四十三	瘙癢或膿水浸淫者消風除濕	欽定四庫全書	外科理例	瘙癢無膿者祛風潤躁	瘙癢或疼午後尤甚者益陰降火	焮痛大便秘澀者滋陰瀉火	搔起白屑耳作蟬聲者祛風清熱	一婦患此作癢膿水不止脈浮無力以消風散 七 四劑	少愈再四生丸 八 月餘而平 此憑症脈也	一人癢少痛多無膿水以芩連荆防山梔薄荷芍藥歸	身治之而愈 此憑症也



一婦作癢午後尤甚以當歸飲子數劑少愈更以人參 荊芥散數劑而安 此憑脉 症也	一人以而不愈搔起白屑耳作蟬聲以四生散數服癢 止更以當歸飲子數劑而痊 此憑 症也	一人下體居多焮痛日晡尤甚腿腕筋紫而脹就于紫 處刺去瘀血以四物加芩連四劑而安在上體若臂 腕筋紫脹亦宜刺去其血以前湯加柴胡黃芩即愈 此憑 症也	欽定四庫全書 外科理例	一人搔癢成瘡日晡痛甚以四物加芩連荊防數劑而 止更以四物加蒺藜何首烏黃耆二十劑而愈 此憑 症也	一人頭目昏眩皮膚瘙癢搔破成瘡以八風散治之而 愈	一人患瘡疥多在兩足午後痛甚腿腕筋紫而脹脉洪 大此血熱也于紫處砭去毒血更以四物加芩連柴 胡地骨皮而愈 此憑脉 症也 如手臂有瘡臂腕筋紫亦	宜砭之 老弱人患此作痛須補中益氣湯加涼血



藥

一兒周歲先頭患瘡疥漸至遍身久而不愈用四物湯

^九加防風黃芩升麻外搽毒藥散月餘而愈

此憑症也

一小兒瘡毒不愈或愈而復發皆因母食炙煇辛辣或

有熱宜先治母熱若小兒不能服藥者就于母藥中

加漏蘆煎服兒瘡亦愈

一兒頭面生瘡數枚作癢瘡痂積累名曰粘瘡以枯礬

黃丹等分麻油調搽更服敗毒散而愈

此憑症也

欽定四庫全書

外科理例

一人腿生濕瘡數年不愈尺脉輕胗似大重胗無力此

腎虛風邪襲之而然名曰腎藏風瘡以四生散為治

之彼不信自服芩連等藥遂致氣血日弱膿水愈多

形症愈憊迨二年復請予治仍用前藥而愈

此憑症脉也

夫肢體有上下臟腑有虛實世人但知苦寒之藥能

消瘡毒不知腎藏風因腎不足所致遂以蒺藜為主

黃耆為臣白附子獨活為佐使再若服敗毒等藥則

愈耗元氣促之死矣



一人濕熱下注兩腿生瘡以人參敗毒散加蒼朮黃柏服之外貼金黃散	此憑症也
一兒鼻下生瘡不時揉擦延及兩耳諸藥不効服蘆會丸搽松香菴荳末而愈	
一兒遍身作癢搔破成瘡出水脉浮數此手足陽明經風熱所致以人參敗毒對四物湯再加芩連外以松香一兩枯礬五錢輕粉三錢為末麻油調敷月餘而愈	此憑症也
一兒頭面胸腹患水瘡數枚潰而成瘡此風邪乘于皮膚也名曰癰瘡飲荆防敗毒散更以牛糞燒存性	
欽定四庫全書	外科理例
為末傳之而愈	此憑症也
癰疽為患最毒形如粟許大者如粟患無常處多在手指潰而出血用南星半夏白芷末傳之重者見骨或狂言煩悶	
一兒鼻下生瘡不時揉擦延及兩耳諸藥不効服蘆會丸搽松香菴荳末而愈	
一人濕熱下注兩腿生瘡以人參敗毒散加蒼朮黃柏服之外貼金黃散	此憑症也



一人焮痛寒熱便秘脉數有力以防風通聖散二劑少	愈更荆防敗毒散 加黃芩山梔四劑而愈	此憑症也	有患此但脈沉實以前藥加大黃漸愈再服人參敗	毒散而平	此憑脈也	一僧患瘡疥自用雄黃艾葉等藥燃于被中熏之翌日	遍身焮腫皮破水出飲食不入予投以解藥不應而	死	又有患此久而不愈以船板灰存性一兩輕粉三錢為	欽定四庫全書	外科理例	末麻油調貼更以知母黃栢防己龍胆茯苓歸芎著	末服之而愈	大凡下部生瘡雖屬濕熱未有不因脾腎虛而得	之	一人兩腿生瘡每服敗毒散則飲食無味反增腫脹此	脾虛濕熱下注也以六君子加蒼朮升麻酒炒芍藥	服之以黃蠟麻油各一兩輕粉三錢為膏貼之而愈	此憑症也



兩腿生瘡作痛或遍身作痛用當歸拈痛湯甚効 一人年踰五十兩膝生瘡日久不愈飲食失節或勞苦 或服滲利消毒之劑愈盛脾脈大無力此脾虛兼濕 熱也用補中益氣湯數劑少愈更六君子加蒼朮升 麻神麴治之而愈 此憑症也		大凡下部生瘡焮痛或發寒熱或脚氣腫痛以人參 敗毒散加枳榔紫蘇蒼朮黃栢並効久不愈以四物 湯 九 治之愈後以補腎丸補之庶不再發		欽定四庫全書 外科理例		賺瘡方 乳香 沒藥 水銀 當歸 各半兩 川芎 貝 母 黃丹 各二錢半 真麻油 五兩 除黃丹水銀將餘藥		同香油熬黑色去渣下黃丹水銀又煎黑色挑柳枝 攪成膏油紙攤貼		又方 龍骨 生用 血竭 赤石脂 各一兩 頭髮 如指大		黃蠟 白膠香 各一兩 香油不拘多少煎髮三五沸去 髮入蠟白膠再以龍骨血竭石脂攪勻安水盆中候 冷磁器盛每用捻作薄片貼瘡口外貼竹箬三日後	



番過再貼仍服活血藥

又方 用砂糖水煎冬青葉三五沸撈起石壓平貼瘡

日換二次 又方頭垢燒灰和棗肉搗膏先以葱椒

葉煎湯洗淨用輕粉摻上却以前膏傘紙攤貼之

又方 地骨皮^{一兩}甘草^{半兩}入香油熬熟去渣入黃丹

^半白蠟^兩緊火熬黑提起白紙攤貼次用醋煎冬

青葉攤藥貼之

凍瘡 用煎熟桐油調蜜陀僧末服

欽定四庫全書

外科理例

牛皮癬 用牛膽調燒酒敷之

諸瘡痛不可忍者用苦寒藥 黃連黃芩詳上下及引

經藥則可 又云諸瘡以黃連當歸為君連翹甘草

黃芩為佐 在下者加黃柏

若稟受壯盛宜四物湯^九加大承氣下之

若性急黑瘦血熱之人瘡痛宜四物加芩連大力子甘

草若肥胖人瘡痛乃濕熱也宜羌活防風荆芥白芷蒼

朮連翹取其風能勝濕也



欽定四庫全書		外科理例	
末油調付	又方	蕪荑	枯礬
枯礬	錢各一	蒼朮	厚朴
雄黃	分各五	輕粉	十貼
右為			
沙瘡	蕪荑	寒水石	錢各二
剪草	吳茱萸	黃栢	
白芷	輕粉	木香	少許
為末油調敷			
蛇床	寒水石	兩各三	黃丹
白礬	錢一	無名異	少許
膿疱瘡	治熱為主	黃連	黃芩
大黃	各三錢		
方解石	陰囊瘡加茱萸	脚腫出血	分濕熱用藥
柳	紅色加黃丹	青色加青黛	頭上瘡加黃連
硫黃水	銀樟腦松香	虫多加藜蘆斑貓	或錫灰栴
疔瘡如癰狀	退熱殺虫為主	用蕪荑黑狗脊	白礬雄黃
石	定瘡殺虫	用蛇床	
濕多者油調敷	瘡多加枯礬	痛多加白芷	方解
瘡出血多者	加大黃黃連猪脂	調敷	
膿乾疥開鬱為主	吳茱萸	腫多者加白芷	開鬱乾
敷藥	膿窠治熱燥濕為主	無名異	松皮炭亦主
在上者多通聖散	在下多須用下		



章腦 右為末先洗去瘡痂油調敷		一上散		雄黃 硫黃 錢各三 半 寒水石 白膠香 黑狗脊 蛇		床 兩 各一 黃連 枯礬 錢各五 吳茱萸 錢三 斑貓 去翅足 十四個 右		除硫黃雄黃寒水石另研為粉外餘皆研極細末次		以斑貓同餘藥研勻先洗瘡令湯透去痂用臘猪油		手心中擦熱鼻中嗅二三次却擦瘡上一上即愈如		痛甚腫滿高處加寒水石一倍 如不苦癢只加狗		欽定四庫全書 外科理例		脊 微癢只加蛇床 有虫加雄黃 如喜火炙湯		炮加硫黃 只嗅不已亦可愈也		疥瘡 春天發者開釐為主 吳茱萸 白礬 錢各三		樟腦 分輕粉 十 寒水石 半 蛇床 錢三 黃栢 大黃		硫黃 錢各一 梔榔 個一 為末油調莫抓破敷		小兒頭瘡 川芎 片苓 酒炒白芍 陳皮 兩 各半 酒		歸酒白朮 半 各兩 天麻 洗酒 蒼朮 蒼耳 錢各七 半 酒栢 酒		粉草 錢各四 防風 錢三 為末水盪起煎服日四五次服後	



睡片時	又方 臘猪油半生 雄黃 水銀等分為末洗淨瘡敷	上	小兒癩頭並身癩 松皮燒灰 白膠香 枯礬 大黃	黃栢 為末熟油調傅	耳後月蝕瘡 黃連 枯礬 為末傅	小兒瘡 牙皂去皮 胡椒少 枯礬 輕粉 樟腦 為末	柏燭油調搽七日如櫻桃膿窠乃去	欽定四庫全書 外科理例	小兒禿頭 通聖散酒制取大黃另用酒炒入研為末	再仍通用酒拌焙乾每服一錢水煎頻服用白炭燒	紅淬長流水令熱洗之外用胡荽子伏龍肝梁上塵	黃連白礬為末油調服	又方松樹厚皮燒炭 黃丹一兩 寒水石一兩 枯礬 黃	連 大黃各半 白膠香熟飛 輕粉四盞或	右為末先洗去瘡痂熬熟油調敷	癬瘡 用防風通聖散去硝黃加浮萍皂角刺



又方 浮萍 一兩 蒼耳 蒼朮 各二兩 苦參 一兩 黃芩 半兩	香附 二錢 為末酒糊丸	敷藥 先用洗藥後上敷藥 蘆會 大黃 輕粉	雄黃 蛇床 栴榔 槿樹皮 右為末先刮癬用	米醋調塗 又方 蘆會 三盛 巴豆 去壳十粒 白蠟	草麻子 去壳四粒 斑貓 七箇去翅足	右用香油二兩熬巴豆草麻斑貓三藥以黑為度去	粗入蠟並蘆會末在內用磁罐盛貯微微刮癬令破	欽定四庫全書 外科理例	以油塗上過夜略腫而愈	洗藥 紫蘇 樟樹 蒼耳 浮萍煎湯洗先洗後上	敷藥	諸虫傷一百四十四 附犬 蛇咬	一人被犬傷痛甚惡冷急吮去毒血隔蒜灸患數壯痛	即止更貼太乙膏服玉真散而愈	一人風犬所傷牙關緊急不省人事急針患處出毒血	隔蒜灸良久而醒用太乙膏封貼飲玉真散二服更



甦更以解毒散^百八二服而痊若患重者須先以蘇合香丸灌之後進湯藥

針灸經云外邱穴治獠犬即風犬所傷發寒熱速灸三壯更灸患處立愈春末夏初狂犬咬人須過百日得安終身禁犬肉蠶蛹食此即發不可救也宜先去惡血灸咬處十壯明日以後日灸一壯百日乃止忌酒七日搗薤汁一二盞一狂犬傷令人吮去惡血灸百壯効

欽定四庫全書

外科理例

治蛇入七竅急以艾灸蛇尾 又方以刀破蛇尾少許入花椒七粒蛇目中即用雄黃朱砂末煎人參湯調灌之內毒即解 山居人被蛇傷急用溺洗患處拭乾以艾灸之大効 又方 獨頭大蒜切片置患處以艾子蒜上灸之每三壯換蒜効 一人被蝎螫手痛徹心傾刻焮痛至腋寒熱拘急頭痛惡心此邪正二氣相搏而然以飛龍奪命丹塗患處及服止痛之藥俱不應乃隔蒜灸之遂愈



後有被螫如前灸之痛即止

一人蜈蚣傷指亦用前法而愈

凡蛇毒之類所傷依此療之並効本草謂蒜療瘡毒
有回生之功

一獵戶腿被狼咬痛甚治以乳香定痛散不應予思至
陰之下氣血凝結藥力難達令隔蒜灸至五十餘壯
痛去仍以托裏藥及膏藥貼之愈

一人彼鬪犬傷腿傾間焮痛至腋翌日牙關緊急用玉

欽定四庫全書

外科理例

真散不應隔蒜灸三十餘壯而甦仍以玉真散

一百一十二

及托裏消毒藥而愈

諸虫傷白礬一塊於端午日自早晒至晚收貯用時旋
為末水調搽患處痛即止

誤吞水蛭一百四十五

一人腹痛食熱則甚諸藥不應半年後腹加腫脹面色
痿黃脈不洪滑非癰也詢之始因渴甚俯飲澗水意
其誤吞水蛭令取黃泥為丸空心用水送下百丸果



下蛭而愈

一兒因跌溝中腹痛服驚積等藥不應亦依前症療之
愈

虫入耳一百四十六

一人睡間有虫入耳痛脅將生姜擦貓鼻其尿自出取
尿滴耳內虫出

一人耳內生瘡不時作痛欲死痛止如故脈皆安靜非
瘡也話間痛忽作予意有虫入耳急取貓尿滴耳果

欽定四庫全書

外科理例

出一臭虫不復痛 或用麻油滴之則虫死難出

或炒脂麻枕之則虫亦出但不及貓尿速也

血風瘡一百四十七

脈浮者祛風為主益氣佐之

脈濇者祛風為主養血佐之

脈浮而濇者祛風養

一婦患此作癢五心煩熱以逍遙數劑而止更人參荊

芥散二十餘劑而愈



一婦遍身作癢秋冬尤甚脈浮數飲消風散敷蛇床子散數月頓愈

一婦遍身赤色撥破成瘡膿出不止以當歸飲子及蛇床子散而愈

一老婦遍身作癢午前益甚以四君子加荆防芎歸而安

一婦洗頭致頭患腫兼癢以人參荆芥散數劑而愈

一婦作癢成瘡久而患處仍癢搔起白屑以四生散數

欽定四庫全書

外科理例

服癢止以人參荆芥散二十餘劑而愈

一人遍身瘙癢諸藥不應脈浮按之而瀋以生血藥為

主間以益氣百貼而愈

此憑脈也

一兒癰癢瘙癢發熱不安以消風散治之

一兒亦患此咳嗽時嘔以葛根橘皮湯並愈

一婦生風癰似癰三年不愈五心煩熱脈洪按之則瀋

此血虛症也以生血為主風藥佐之若專攻風毒則

血愈虛而熱愈熾血被煎熬則發癰瘰或為怯症遂



以逍遙散 數劑及人參荊芥散 二十餘劑而愈
此憑脈
症也

一婦遍身瘙癢秋冬則劇脈浮數此風邪客于皮膚名

曰血風癬飲消風散及搽蛇床子散少可更以四物

湯加荊防數劑而愈
此憑脈
症也

又一婦患此夏月尤甚脈洪大用何首烏散
七九

一婦患赤癬瘙癢搔破成瘡出水久而不愈內服當歸

飲外搽蛇床子散並愈
此憑
症也

欽定四庫全書

外科理例

一婦亦患此諸藥不應以四生散數服而愈

大抵婦人體虛風邪客于皮膚則成白癬寒濕客於

肌肉鬱熱而為赤癬色雖有異治法頗同 凡人汗

出不可露卧及浴經日汗出見濕乃生瘰癧雷公云

遍身風癬酒調生栢子用屢驗

一人每至秋冬遍身發紅點如癬作癢此寒氣收斂腠

理陽氣不得發越怫鬱內作也宜人參敗毒散解散

表邪再以補中益氣湯實表益氣彼以為熱毒自用



涼藥愈盛復請仍用前湯加茯苓半夏羌活四劑更 用補中益氣湯而愈 此憑症也	河間曰瘡腫因內熱外虛風濕所乘蓋肺主皮毛脾 主肌肉肺氣虛則腠理開為風濕所乘脾氣濕而內	熱則生瘡也 腫者由寒熱毒氣客於經絡使血澁 壅結成腫 風邪內作者則無頭無根 血氣相搏	作者則有頭有根 赤核種則風熱流會 瘡以痛 為實癢為虛虛非為寒乃熱之微甚也	欽定四庫全書 外科理例	麥飯石膏治諸般癰疽神効 附	麥飯石膏不拘多少炭火煅至紅以好米醋淬之 如此煅淬十數次研為末重羅去粗者取細末入乳	鉢數人更遞研五七日如麵極細為妙 白歛 研為末	鹿角 不用自蛻者須擇帶腦頂骨全者却是生取之 角截作二三寸長炭火燒令烟盡研羅如末再	入乳鉢更遞 研令極細	右用麥飯石膏細末二兩白歛末二兩鹿角灰四兩 最要研得極細方有効粗則反致甚痛細則大能止



痛收口排膿

精粗之異如此

和合量藥末多寡用經年好米

醋入銀石器內熬令魚眼沸却旋又入藥末用竹篾

子不住手攪熬一二時久令稀稠得所提出以磁器

盛之候冷以紙蓋覆勿令著塵用時先以猪蹄湯洗

去膿血以故帛挹乾鵝翎蘸膏塗傅四圍凡有赤處

盡塗之但留中心一口如錢大未潰能令內消已潰

則排膿如湍水逐日瘡口收斂瘡久肌肉腐爛筋骨

出露用舊布片塗藥貼瘡但內膜不穿亦能取安洗

欽定四庫全書

外科理例

瘡勿可手觸嫩肉亦不可口氣吹着合藥亦忌腋氣

之人及月經有孕婦人見之仍可熬好米醋一大碗

收磁器內候逐日用藥於瘡上久則藥乾以鵝翎

點醋拂濕其藥勿令綳也初則一日一洗一換藥十

日後兩日一換 古方云麥飯石顏色黃白類麥飯

曾作磨者尤佳按麥飯石不可作磨狀如麥飯團生

粒點如無此石常以舊麵家磨近齒處石代之取其

有麥性故也或溪中尋白石如豆如米大者即是也



其石大小不等或如拳如鵝卵略如握聚一團麥飯	古之呂西華秘傳此方雖在至親亦不可得裴員外	啗之以名第河南尹脅之以重刑呂寧守死不傳君	子責其存心雖隘尚可恕也近世鑿者每見已効之	方設為詭詐之術使人勿復用之其罪不容誅矣常	有趙尹來宰龍泉速於赴任單騎兼程到任未幾鼻	衄大作日出血數升有鑿教服藕汁地黃膏趙曰往	年因勞感熱而驟得此尋叩名鑿服藥遂愈臨分袂	欽定四庫全書 外科理例	時鑿者屬云疾若再作不可輕信鑿者服生地黃藕	汁冰冷脾胃無復可療因此半月間易數鑿無効前	鑿遂密製藕汁地黃膏進之即愈趙問蒙惠藥與吾	初衄時所服之藥氣味相似得非方同乎鑿曰即日	前所獻藕汁地黃膏也趙驚嘆曰鑿乃詭謀以誤我	耶早信此方不受苦許人	補遺	癰癰一百四十八



些小癰癤方結未成不可貼膏藥取生鹿角尖於砂盆
內同老米醋濃磨以鵝翎塗拂癰之四圍當中留一
口遇乾再塗一二日即內消

又方 用吳茱萸微炒為細末鷄子清調塗病處神効
些小癰癤疼痛發熱時用生粉草節不炙不焙只日晒
乾無日於焙籠蓋上微火焙乾研為細末熱酒調服
一二錢連追數服痛熱皆止 微覺惡寒似欲發背
或已生瘡腫癰疹以硝石三兩煖水一升和令消待

欽定四庫全書

外科理例

冷取故青布沓三重於赤處方員濕布搨之熱則頻
易立差

發背及諸癰毒一百四十九

黑鉛一片甘草三兩微炙剉用酒一斗置磁瓶中然
後鎔鉛投酒中却出酒另以瓶盛取出鉛依前鎔投
如此者九度并甘草去之只用酒令病人飲醉寢則
愈

又方 甘草三兩生搗為末大麥麵九兩大盤中攪和



令勻取上好醋少許別捻入藥令勻百沸水溲作餅	方員大於瘡一分熱傅腫上以細片及故紙隔令通	氣冷則換之已成膿自出未成膿便內消	發背欲死一百五十	取冬瓜截去頭合瘡上瓜當爛截去更合之瓜未盡	瘡已斂小矣即用膏養之	又方 取獨頭大蒜兩頭細搗以麻油和研厚傅瘡上	乾即易 或以苧根爛搗傅之數易	欽定四庫全書	外科理例	石癰堅如石不作膿者一百五十一	生商陸根搗爛搽之燥則易	乳硬欲結膿一百五十二	以鹿角於白內磨取白汁塗之乾又塗不得近手並	令人啣去黃水一日許即散	癰癰欲愈必癢又治腎藏濕癢一百五十三	一人髀上生癰數日瘡口欲合四邊癢甚以絹帛蘸湯	熨洗甚快再癢再熨覺倦鑿云洗熨最損人氣血或



至眩絕於是取鹽於四緣遍擦覺瘡內外清涼更不復癢如或癢甚則重擦隨其輕重鹽入瘡內亦無害	刀傷磕損血不止一百五十四	一人磕損大指甲離肉血淋急取葱白煨爛乘熱縛定	痛與血隨止葱冷再易	一匠斧傷脚跟乘急用泥塞延後攻注腫盛發寒熱遂	令剔去舊土使血再出却用煨葱白傅之不移時痛	住血止 又遇殺傷氣偶未絕急令取葱白鍋內炒	欽定四庫全書 外科理例	熱以傅傷處繼而呻吟再易已無事矣無葱白用葉亦可只要炒熱為上時易為佳若傷多煨炮不及但以乾鍋且烙且杵令延出葱熱用之妙	外科理例卷七		



欽定四庫全書

子部
外科理例附方

詳校官太醫院吏目臣宋純

編修臣倉聖脈履勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官助教臣胡予襄

謄錄監生臣翟灝



欽定四庫全書		子部五	
外科理例附方		醫家類	
		明 汪機 撰	
一 托裏溫中湯 治瘡為寒變而內陷者膿出消解皮		膚涼心下痞滿腸鳴切痛大便微澹食即嘔氣短呃	
逆不絕不得安卧時發憎憤			
丁香 沉香 茴香 益智仁 陳皮			
木香 羌活 乾姜 炮各 甘草 炙 附子 炮去			
欽定四庫全書		外科理例	
皮臍各 二錢			
作一劑水二鍾姜三片煎八分不拘時服			
二 六君子湯 治一切脾胃不健或胸膈不利飲食少		思或作嘔或食不化或膨脹大便不實面色痿黃四	
肢倦怠			
人參 白朮 炒 茯苓 半夏 姜製 陳皮 各一錢			
甘草 炙五錢			
作一劑水二鍾姜三片煎八分不拘時服			



三 內疎黃連湯 一名黃連內疎湯 治瘡瘍腫硬發熱作	嘔大便秘澀煩躁飲冷嘔哕心煩脉沉實此邪在臟 也急服以內除之使邪不得犯經絡	黃連 山梔子 當歸 酒拌 芍藥 木香	枳榔 黃芩 薄荷 桔梗 甘草 各一錢	連翹 大黃 炒各一錢	作一劑水二鍾煎八分食前服	四 十宣散 治瘡瘍脉緩瀉身倦怠惡寒或脉弦或緊	欽定四庫全書 外科理例	細者皆宜用之散風寒助陽氣也	人參 當歸 酒拌 黃芪 鹽水拌炒 甘草	白芷 川芎 桔梗 炒各一錢 厚朴 姜汁製 炒五分	防風 肉桂 各三分	作一劑水二鍾煎八分服	五 小柴胡湯 治瘰癧乳癰便毒下疳及肝經分一切	瘡瘍發熱或飲食少思	半夏 姜製 一錢 柴胡 二錢 黃芩 炒二錢 人參 一錢 甘草 炙五分



六 作一劑水二鍾姜三片煎八分食遠服	防風通聖散 治一切風熱積毒瘡腫發熱便秘表裏俱實者	芍藥炒 芒硝 滑石煨 川芎 當歸酒拌	桔梗 石膏煨 荊芥 麻黃各四分半 薄荷	大黃煨 山梔炒 白朮炒 連翹 甘草炙	防風 黃芩炒各五分	作一劑水二鍾煎八分服	欽定四庫全書 外科理例	七 荊防敗毒散 治一切瘡瘍時毒腫痛發熱左手脉浮數	荊芥 防風 人參 羌活 獨活	前胡 柴胡 桔梗 枳殼 茯苓	川芎 甘草各一錢 即人參敗毒散加荊芥防風	八 作一劑水二鍾煎八分食遠服	黃連解毒湯 治積熱瘡瘍焮腫作痛煩躁飲冷脉洪數或口舌生瘡或疫毒發狂



黃芩 黃栢炒 黃連炒 山梔各一錢半	作一劑水二鍾煎七分熱服	九 四物湯 治一切血虛或發熱之證	當歸酒拌 川芎各一錢 芍藥炒 生地一錢	作一劑水二鍾煎八分食遠服	加四君湯即八物湯又名八珍湯治症詳見于後	十 大黃牡丹湯	大黃四兩 牡丹皮三兩 芒硝一兩 桃仁五十箇	欽定四庫全書 外科理例	每服五錢水煎服	十一 隔蒜灸法 治一切瘡毒大痛或不痛或麻木如痛	者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨而散蓋火以暢	達拔引鬱毒此從治之法也有回生之功	大蒜去皮切三文銅錢厚安瘡頭上用艾壯于蒜上	灸之三壯換蒜復灸未成者即消已成者亦殺其大	勢不能為害若瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒	之蒜敗再換如不痛或不作膿及不發起或陰瘡尤



宜多灸	二十 清涼飲 治瘡積熱煩躁飲冷熅痛脉實大小便秘	澀	大黃 炒 赤芍 當歸 甘草 各二錢	水二鍾煎八分食前服	三十 十全大補湯 治瘡潰膿清或不潰不斂皆由元氣	虛弱不能營運服此生血氣壯脾胃兼補諸虛及潰	瘍發熱或惡寒或作痛或膿多或自汗盜汗及流注	欽定四庫全書 外科理例	瘰癧便毒久不作膿或膿成不潰而不斂若血氣不	足結腫未成膿者加枳殼香附連翹服之自消	人參 肉桂 地黃 酒蒸 川芎 白芍 炒	茯苓 白朮 炒 黃耆 鹽水拌炒 當歸 酒拌各一錢	甘草 炙五分	作一劑水二鍾姜三片棗二枚煎八分食前服	四十 八珍湯 調和榮衛順理陰陽滋養血氣進飲食退	虛熱此氣血虛乏之藥也



當歸 酒拌 川芎 芍藥 炒 熟苧 酒拌 人參	白朮 炒 茯苓 各一錢 甘草 炙五分	水二鍾姜三片棗二枚煎八分食前服	五十加味十全大補湯	人參 肉桂 地黃 川芎 白芍藥	茯苓 白朮 黃耆 甘草 當歸	烏藥 香附 各等分	姜棗水煎空心溫服每劑一兩	欽定四庫全書 外科理例	六十補中益氣湯 治瘡瘍元氣不足四肢倦怠口乾發	熱飲食無味或飲食失節或勞倦身熱脉洪大無力	或頭痛或惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩	黃耆 炙一錢半 甘草 炙 人參 當歸 酒拌 白朮 炒各一錢	升麻 柴胡 陳皮 各三分	水二鍾姜二片棗二枚煎一鍾空心服	七十聖愈湯 治瘡瘍膿水出多或金瘡出血心煩不安	睡卧不寧或五心煩熱



地黃 酒拌蒸 生地黄 酒拌 川芎 人參 各五錢	當歸 酒拌 黃耆 鹽水浸炒 各一錢	水二鍾煎八分食遠服	八 人參養榮湯 治潰瘍發熱或惡寒或四肢倦怠肌	肉消瘦面色痿黃呼吸短氣飲食無味或氣血原不	足不能收斂若大瘡愈後服之不變他病	白芍 一錢五分 人參 陳皮 黃耆 蜜炙 桂心	當歸 酒拌 白朮 甘草 炙各一錢 熟芩 酒拌 五味子 炒	欽定四庫全書 外科理例	碎 茯苓 各一錢半 遠志 去心炒 五分	水二鍾姜三片棗一枚煎八分食前服	九 歸脾湯 治思慮傷脾不能統攝心血以致妄行或	吐血下血或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛	茯神 白朮 人參 黃耆 蜜炙 龍眼肉	酸棗仁 蒸各一錢 木香 各三分 甘草 炙一分半	水一鍾姜一片棗一枚煎六分食遠并臨卧服	十二 遠志酒



遠志 不拘多少泔浸洗去土槌去心	右為末每三錢用酒一盞調遲少頃澄清飲之以滓 敷患處治女人乳癰尤效	一黃耆建中湯	黃耆 蜜製 肉桂 去皮各三兩 甘草 炙二兩 白芍	每服一兩姜棗水煎服	二內補黃耆湯	黃耆 炙 麥門冬 各一兩 熟地黄 人參 茯苓	欽定四庫全書 外科理例	甘草 炙各一錢 白芍 川芎 官桂 遠志	每服一兩姜棗水煎服	二逍遙散 治婦人血虛五心煩熱肢體痛頭昏重心	三松頰赤口燥咽乾發熱盜汗食少嗜卧及血弱榮衛	不調痰嗽潮熱飢體羸瘦漸成骨蒸	當歸 酒拌 芍藥 茯苓 白朮 炒 柴胡 各一錢	甘草 七分	水二鍾煎八分食遠服



二 四 栝子丸 治月經短少漸至不通手足骨肉煩疼日漸羸瘦漸生潮熱其脉微數此由陰虛血弱陽往乘之少水不能勝火逼水涸亡津液當養血益陰慎毋以毒藥通之宜此丸與澤蘭湯主之	栝子仁 炒研 牛膝 酒拌 卷栝 兩 各半 澤蘭葉	續斷 兩 各二 地黄 三兩 酒拌 蒸 半日 杵膏	右為末入地黄膏加煉蜜丸梧子大每服三十九空心米飲下	欽定四庫全書 外科理例	二 五 澤蘭湯 治症同前	澤蘭葉 三兩 當歸 酒拌 芍藥 炒各 一兩 甘草 五錢	右為粗末每服五錢水二鍾煎一鍾去滓溫服	二 六 連翹消毒散 即涼膈 散 治積熱瘡瘍焮痛發熱 煩渴大便秘及	咽喉腫痛 或生瘡毒	連翹 一兩 山梔子 大黃 薄荷葉	黃芩 各五錢 甘草 一兩 朴硝 二錢 半	每服一兩水煎溫服



二 理中湯 治脾胃不健飲食少思或作嘔傷寒及肚 腹作痛	人參 乾姜炮 甘草炙 白朮炒各錢半	水一鍾煎五分食遠服	二 八二神丸 治脾腎俱虛侵晨作瀉或飲食少思或食 而不化或作嘔或久瀉不止如脾經有濕大便不實 者神效一人年踰四十遍身發腫腹脹如鼓甚危諸 藥不應用此數服飲食頓進其腫漸消兼以除濕健	欽定四庫全書 外科理例	脾之劑而愈	破故紙炒四兩 肉苳蔻生用二兩	右為末用大紅棗四十九枚生姜四兩切碎同棗用 水煎熟去姜取棗肉和藥丸梧子大每服五十丸空 心鹽湯送下	二 九竹葉黃耆湯	淡竹葉二錢 生苳 麥門冬去心 黃耆炙	當歸酒拌 川芎 甘草 黃芩炒



芍藥 人參 半夏 姜製 石膏 煅各一錢	水二鍾煎八分食遠服 三黃耆六一湯 治潰後作渴必發癰瘡宜常服此可	免 綿黃耆 六兩一半生焙一半鹽水潤磁器飯上蒸三次焙乾 甘草 一兩半生半炙	每劑一兩水二鍾煎八分食遠服或為末每服二錢 早晨日午白湯調服更妙加人參尤效	一三七味白朮散 欽定四庫全書 外科理例	白朮 去皮 茯苓 各半 人參 兩 甘草 兩 木香 二錢 霍香 半兩 葛根 一兩	右為末每服五錢白湯調下 三猪蹄湯 消腫毒去惡肉潤瘡口止痛	白芷 黃芩 當歸 羌活 赤芍	露蜂房 蜂兒多者佳 生甘草 各五錢 用猪蹄一隻水四五碗煮熟去油查取清湯入前藥煎數沸去查溫洗以膏藥貼之



三 復元活血湯 治墜墮或打撲瘀血流于脇下作痛 或小腹作痛或痞悶及便毒初起腫痛 柴胡 錢半 天花粉 當歸 酒拌各二錢 紅花 甘草 各七分 川山甲 錢各一 大黃 酒拌炒三錢 桃仁 二十粒去皮尖酒浸研	三 桃仁承氣湯 治傷損瘀血停滯腹痛發熱或發狂 或便毒壅腫疼痛便秘發熱用此通之	桃仁 五十粒去皮尖 桂枝 芒硝 甘草 炙各一錢	欽定四庫全書 外科理例	大黃 二錢	水二鍾煎一鍾空心服	五 當歸地黃湯 治破傷風氣血俱虛發熱頭痛服此	養血氣祛風邪不拘新舊並治之	當歸 酒拌 地黃 酒拌 芍藥 川芎 藁本	防風 白芷 錢各一 細辛 五分	六 補真丸	肉蓯蓉 酒浸 葫蘆巴 炒 附子 炮去皮 陽起石 煨



鹿茸 酒浸 兔絲子 淨洗 肉苳蔻 麩裏 川烏 炮去	五味子 各五錢	右為末用羊腰子兩對治如食法葱椒酒煮搗爛入酒糊丸如梧子大每服七十丸空心米飲鹽湯任下	三 七 玄參升麻湯	玄參 赤芍藥 升麻 犀角屑	桔根 管仲 黃芩 各一錢 甘草 五分	作一貼水姜煎食後服	欽定四庫全書 外科理例	三 八 犀角升麻湯	犀角 七錢半 升麻 五錢 防風 羌活 川芎	黃芩 白附子 各二錢半 甘草 一錢半	每服一兩水煎食後服	三 九 清胃散 治胃經濕熱牙齒或牙齦腫痛或牽引頭	腦或面發熱	歸身 酒拌一錢 黃連 生地黃 酒拌各一錢 牡丹皮 錢半	升麻 二錢



十四 水二鍾煎七分食遠服	金銀花 防風 荊芥 薄荷 桔梗	黃芩 黃連 山梔 連翹 玄參 錢各半	大黃 煨 朴硝 牛蒡子 甘草 分各七	作一貼水煎服	一四 聰耳益氣湯	黃耆 一錢 甘草 炙五分 人參 三分 當歸 二分 焙乾 酒	欽定四庫全書 外科理例	橘皮 二分 升麻 二分 柴胡 三分 白朮 三分 葛蒲	防風 荊芥	作一服水煎空心服	二四 防風通氣湯	羌活 獨活 防風 甘草 炙 藁本 錢各二 錢各一	川芎 五錢 蔓荊子 三錢	剉分二貼水煎服	三四 豆豉餅 治瘡瘍腫硬不潰及潰而不斂并一切頑



瘡惡瘡用江西豆豉為末唾津和作餅如錢大厚如三文置患處以艾裝于餅上灸之餅乾再用唾津和作瘡大用嗽口水調作餅覆患處以艾鋪餅上燒之未成者即消已成者雖不全消其毒頓減甚有奇功不可忽之				
四四 流氣飲 治流注及一切恚氣結腫作痛或胸膈痞悶或風寒濕毒搏于經絡致氣血不和結成腫塊肉色不變或漫腫木悶無頭 即瘡科流氣飲				
欽定四庫全書 外科理例				
桔梗 炒 人參 當歸 酒拌 官桂 甘草 炙				
黃耆 鹽湯浸炒 厚朴 姜製 防風 紫蘇 芍藥				
烏藥 枳殼 各七分 檳榔 木香 川芎				
白芷 各五分				
水二鍾煎八分食遠服				
四 獨參湯 治潰瘍氣血虛極惡寒或發熱或失血之証葛可久血脫補氣即此方也				
人參 一兩 水二鍾棗十枚煎一鐘徐服若煎至稠				



厚即為膏	六四補腎丸	巴戟 去心 山藥 補骨脂 炒 小茴香 炒	牡丹皮 各三錢 清鹽 二錢半 肉蓯蓉 酒洗一兩 枸杞子 一兩	右為末蜜丸梧桐子大每服五十丸空心鹽湯下	七四地骨皮散 治骨蒸潮熱自汗咳吐腥穢稠痰	人參 地骨皮 生地黄 各錢半 白茯苓	柴胡 黃耆 炙 知母 炒 石膏 煨各一錢	欽定四庫全書 外科理例	水二鍾煎八分食遠服	八四金鑰匙 治喉閉纏喉風痰涎壅塞甚者水漿難下	焰硝 一兩五錢 礞砂 五錢 腦子 一個 雄黃 二錢 白殭蠶 一錢	各研為末和勻以竹管吹患處痰涎即出如痰出喉	仍不消急針患處去惡血	九四必效散 治癰未成膿自消已潰者自斂如核未去	更以針頭散腐之若氣血虛者先服益氣養榮湯數劑然後以此散服而癰毒已下再服前湯數劑



南礪砂 二錢 半 輕粉 一錢 斑猫 四十箇 炒熟去翅及頭	射香 五分 巴豆 五粒 殼心膜去 白檳榔 一箇	右為末每服一錢壯實者錢半五更滾湯調下小水	澀滯或微痛此癰欲下也進益元散一服其毒即下	斑猫巴豆似為峻利然巴豆能解斑猫之毒用者勿	畏嘗遇富商項有癰痕頗大詢之彼云因怒而致困	苦二年百法不應方與藥一服即退二三再服頓退	四服而平旬日而痊以重禮求之乃是必效散一老	欽定四庫全書 外科理例	媼亦治此症索重價始肯治其方乃是中品錠子絀	瘡內以膏藥貼之其根自腐未盡再用去盡更搽生	肌藥數日即愈予見血氣不虛者果驗血氣虛者潰	去亦不愈丹溪亦云必效散與神效瓜蒌散相兼服	之有神效常以二藥兼補劑用之效按錠子雖峻利	蓋結核堅硬非此未見易腐必效散雖有斑猫峻利	然癰毒深者非此莫能易解又有巴豆解毒但有氣 血虛者恐亦不能治也



五 十散腫潰堅丸	知母酒浸炒 黃柏酒洗炒 昆布 桔梗各半兩 瓜蒌根酒洗	廣茂 三稜酒洗炒 連翹各三錢 升麻六分 白芍藥	黃連 葛根各二錢 草龍膽四兩酒洗炒 黃芩稍一錢半酒洗	半洗一 生	為末蜜丸如梧子大每服五十丸滾湯下	五 一香附餅 治療癰流注腫塊或風寒襲于經絡結腫	或痛用香附為末酒和量瘡大小作餅覆患處以熨	欽定四庫全書 外科理例	斗熨之未成者內消已成者自潰若風寒濕毒宜用	姜汁作餅	五 二內塞散 治陰虛陽氣湊襲患腫或潰而不斂或風	寒襲于患處致氣血不能運至久不愈遂成漏証	附子童便浸三日一日一換切作四塊再浸數日炮一兩 肉桂去皮 赤小豆	甘草炙 黃耆鹽水浸炒 當歸酒拌 茯苓 白芷	桔梗炒 川芎 人參 遠志去心 厚朴姜製各一兩	防風四錢



為末每服二錢空心溫酒下或酒糊丸鹽湯下亦可 或煉蜜丸亦可	三五 神效瓜蒌散 治乳癰乳勞已成化膿為水未成即 消治乳之方甚多獨此神效療癰瘡毒尤效	甘草 當歸 各五錢 另研 沒藥 另研 乳香 各一錢 另研	瓜蒌 大者二箇 杵 作二劑用酒三碗煎至二碗分三次飲更以查罨患 處一切癰疽腫毒便毒並效如數劑不消不痛兼服	欽定四庫全書 外科理例	補氣血之藥 四五 黃連胡粉散	黃連 二兩 胡粉 一錢 水銀 一兩 同粉 研令消	三味相和用皮包裹熟接良久付患處 五五 桃仁湯	桃仁 蘇木 蠻蟲 去足 炒 水蛭 三十箇 炒 生地黃 每服三錢水一鍾煎六分空心服 五 沒藥丸



當歸 一兩 桂心 芍藥 各半 沒藥 研各 桃仁 去皮尖炒 研碎一分 蠻蟲 去足 翅炒 水蛭 炒各三 十箇 右為末醋糊丸梧子大每服三五丸空心醋湯下 七五 當歸丸	當歸 半兩 大黃 桂心 各三 赤芍藥 葶藶 各二 人參 一錢 甘遂 半錢 煉蜜為丸如彈子大空心米飲化下一丸	八五 當歸散 治婦人陰中突出一物長五六寸名陰挺	欽定四庫全書 外科理例	當歸 黃芩 各二 牡蠣 兩半 蝟皮 一兩 赤芍 五錢 為末每服二錢食前溫酒或滾湯調下如不應更以 補中益氣倍加升麻柴胡兼服之	九五 瓜子仁湯 治產後惡露不盡或經後瘀血作痛或 腸胃停滯瘀血作痛或作癰並治	薏苡仁 四錢 桃仁 去皮 研 牡丹皮 瓜蒌仁 各一 錢半 水二鍾煎八分食前服	十六 瀉白散



桑皮 炙 桔梗 括萎實 升麻 半夏	杏仁 去皮尖炒 地骨皮 各一錢 甘草 五分	作一貼姜水煎服	一六 神仙活命飲 治諸瘡未作膿者內消已成膿者即	潰又排膿止痛消毒聖藥也	川山甲 蛤粉炒黃色 甘草節 防風 沒藥	赤芍 白芷 歸尾 乳香 各一錢	天花粉 貝母 各八分 金銀花 陳皮 各三錢	欽定四庫全書 外科理例	皂角刺 炒黃一錢	用酒一碗同入瓶內紙糊瓶口勿令泄氣慢火煎數	沸去渣分病上下食前後服之能飲酒者再飲三二	盃尤妙	二六 蠟礬丸 治一切癰疽托裏止痛護藏府神效不問	老幼皆可服	白礬 一兩明亮者研末 黃蠟 一兩黃色好者溶開離火入礬末一方用七錢	衆手急丸 梧桐子大每服十丸漸加至二十丸熟水



或溫酒送下日進二服一法將蠟水煮用匙挑浮水上者和礬末丸則軟而易丸 三六 四君子湯 治脾胃虛弱便血不止 甘草 炙五分 人參 白朮 炒 白茯苓 各一錢 水一鍾姜三片棗二枚煎八分食遠服 四六 人參敗毒散 一切瘡瘍焮痛發寒熱或拘急頭痛脉數有力者	人參 羌活 獨活 前胡 柴胡	欽定四庫全書 外科理例	桔梗 枳殼 茯苓 川芎 甘草 各一錢	水二鍾煎八分食遠服	五六 清咽消毒散 治咽喉生瘡腫痛痰涎壅盛或口舌生瘡大便秘結 即荆防敗毒散加芩連硝黃	六六 金黃散	滑石 甘草	各為末等分付搽	七六 龍膽瀉肝湯



柴胡 澤瀉 錢各一 車前子 木通 分各五 生地黃	當歸尾 酒洗 草龍膽 酒浸炒黃 色各三錢	作一貼水煎食前服	八神異膏 治癰疽瘡毒甚效此瘡中第一藥也	露蜂房 兒多者一兩 蛇蛻 鹽水洗焙半兩 玄參 半兩 黃耆 三錢	男髮 洗如雞子一圓 杏仁 去皮尖一兩 黃丹 十一兩 真麻油 二斤	先以玄參黃耆杏仁入油煎至黑色方入蜂房蛇蛻	男髮再煎至黑濾去查徐徐入黃丹慢火煎以柳枝	欽定四庫全書 外科理例	不住手攪滴水捻軟硬得中即成膏矣	九冲和膏 治一切瘡腫不甚熱積日不消	紫荊皮 炒五錢 赤芍藥 炒二兩 獨活 去節炒二兩 白芷 一兩	葛蒲 一兩	右為末葱頭煎湯調搽	十七神功散 即四生散 治膝腿生瘡浸淫不愈類風癰名	腎藏風瘡如上攻則目昏花視物不明并一切風癰	疥癩



白附子 生用 黃耆 獨活 蒺藜	等分研末每服二錢用猪腰子一箇批開入藥濕紙裏煨熟空心連腰細嚼鹽湯下風癰酒下	一七 大連翹飲 治丹毒斑疹瘙癢或作痛及大人風邪熱毒焮腫或癢小便澀	連翹 瞿麥 荊芥 木通 芍藥	蟬蛻 當歸 酒拌 甘草 防風 柴胡	滑石 煨 山梔 炒 黃芩 各一錢	欽定四庫全書 外科理例	水鍾半煎七分小兒宜為末每服一二錢滾湯調下	二七 通氣散 治時毒焮腫咽喉不利取嚏以泄其毒	玄胡 錢半 牙皂 川芎 各一錢 藜蘆 五分	躑躅花 二分半	為細末用紙撚蘸少許經鼻內取嚏為效	三七 羌活勝濕湯	羌活 去蘆 獨活 去蘆 藁本 一錢 防風 去蘆半錢 川芎 二分	甘草 炙半 蔓荊子 二分



作一貼姜水煎服	四七 附子八物湯	附子炮 乾姜炮 芍藥炒 茯苓 人參	甘草炙各一錢五分 肉桂一錢 白朮二錢炒	作一貼水煎食前服	五七 加減小續命湯	麻黃去節 人參 黃芩 芍藥 杏仁去皮尖	甘草 防己 肉桂各一兩半 附子炮去皮	欽定四庫全書 外科理例	每服一兩姜水煎服	六七 獨活寄生湯	白茯苓 杜仲 當歸酒洗 防風 牛膝	白芍藥 人參 細辛 桂心 秦艽	熟地黃 芎藭 甘草各二兩 獨活三兩	桑寄生二兩	姜水煎服每服一兩	七七 五香連翹湯 治諸瘡初覺一二日便厥逆咽喉塞



寒熱	沉香 木香 射香 連翹 射干	升麻 丁香 獨活 甘草 炙 桑寄生 錢各一	大黃 木通 乳香 錢各一	每服五錢水一鍾煎八分取利	七八風散	霍香 半斤 白芷 前胡 各半斤 黃耆 甘草	人參 各二斤 羌活 防風 各三斤	欽定四庫全書 外科理例	右為細末每服四錢薄荷煎滾湯調服	九七人參荊芥散 治婦人血風發熱或瘡毒瘙癢肢體	疼痛頭目昏澀煩渴盜汗或月水不調臍腹疼痛瘰癧	癰積塊	人參 桂心 柴胡 鱉甲 醋炙 荊芥蕙	枳殼 麸炒 生地黃 酒拌 酸棗仁 炒 羚羊角 白朮 炒各一錢	川芎 當歸 酒拌 防風 甘草 炙各五分	水二鍾姜三片煎八分入羚羊末食遠服



十八消風散 治風熱癰疹瘙癢及婦人血風瘙癢或頭 皮腫癢或諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻流清水 嚏噴聲重耳作蟬聲	陳皮錢 焙五 甘草炒 人參 茯苓 荊芥蕙	防風 川芎炒 白姜蠶炒 蟬蛻各二兩 厚朴姜制五錢	藿香 羌活一兩	右為末每服三錢茶清調下瘡癰溫酒下	一八何首烏散	欽定四庫全書 外科理例	何首烏 防風 蒺藜 枳殼 天麻	胡麻子 殭蠶 芫薺子各等分	每服五錢茵陳湯下	二八神效當歸膏	當歸 黃蠟各一兩一方用白蠟尤效 麻油四兩	先將當歸入油煎至黑濾去入蠟溶化即成膏矣	三八乳香定痛丸	乳香 沒藥研各另 羌活 五靈脂 獨活各三錢



川芎 當歸 交趾桂 川白芷 真菴荳粉 白膠香 各半兩	右為末煉蜜丸如彈子大每服一九細嚼薄荷湯送 下手足損痛不能舉動加草烏用五錢鹽湯下	四八 五積散 治風寒濕毒客于經絡致筋攣骨痛或脚 腰痠疼或身重痛拘急	蒼朮 二錢 半 桔梗 炒錢 半 陳皮 去白 六分 白芷 三分 甘草 當歸 酒拌 川芎 芍藥 炒 半夏 姜制 茯苓 去皮各 三分	欽定四庫全書 外科理例 麻黃 去節 六分 乾姜 炮四 枳殼 麩炒 六分 桂心 一錢 厚朴 姜制 四分	水二鍾姜三片棗一枚煎一鍾服 五八 舒筋湯	片子姜黃 甘草 炙 羌活 各一錢 當歸 酒洗 赤芍藥 白朮 海洞皮 各二錢	作一貼姜水煎服 六八 四生丸 治血風骨節疼痛不能舉動或行步不前 或渾身瘙癢或麻痺



地龍 去土 殭蠶 炒去絲 白附子 生 五靈脂 草烏 去皮尖 各等分	為末米糊丸梧子大每服二三十丸茶酒任下或作末酒調服	八 七 大防風湯 治三陰之氣不足風邪乘之兩膝作痛	久則膝大腿愈細名曰鶴膝風乃敗證也非此不治	又治痢後脚痛緩弱不能行步或腿腫痛	附子 炮一錢 白朮 炒 羌活 人參 各二錢 川芎 錢半	防風 二錢 甘草 炙一錢 牛膝 酒浸一錢 當歸 酒拌二錢 黃耆 炙二錢	欽定四庫全書 外科理例	白芍 炒二錢 杜仲 姜製三錢 生地黃 酒拌蒸半日忌鐵器一錢	作一服水二鍾姜三片煎八分空心服愈後尤宜調	攝更服還少丹或加桂以行地黃之滯若脾胃虛寒	之人宜服八味丸	八 八 蘆薈丸 治下疳潰爛或作痛及小兒肝積發熱口	鼻生瘡或牙齦蝕爛	胡黃連 黃連 蘆薈 木香 白蕪荑 炒	白雷丸 青皮 鶴虱草 各一兩 射香 三錢



為末蒸餅糊丸麻子大每服一錢空心米湯下		九當歸拈痛湯 治濕熱下注脚膝生瘡或膿水不絕		或赤腫或癢痛或四肢遍身腫痛		防風 歸身 知母 酒炒 澤瀉 猪苓 各三錢		白朮 錢半 羌活 五錢 人參 苦參 酒製 升麻		葛根 蒼朮 各二錢 甘草 炙 黃芩 酒炒		茵陳葉 酒炒 各五錢		作四劑水二鍾煎一鍾空心并臨卧服		欽定四庫全書 外科理例		九清震湯		升麻 柴胡 蒼朮 黃芩 各五錢 甘草 炙二錢		藁本 二分 當歸身 二分 麻黃根 防風 猪苓 各三錢		紅花 一分 澤瀉 四分 羌活 酒黃蘗 各一錢		作一服水煎臨睡服		九補肝湯		黃耆 七分 人參 葛根 白茯苓 各三錢 升麻		猪苓 各四錢 柴胡 羌活 知母 連翹	



澤瀉 防風 蒼朮 當歸身 麴末	炒黃蘗 陳皮 各二分 甘草 炙五分	作一服水煎空心熱服	芍藥湯 九	芍藥 四錢 當歸 黃連 黃芩 官桂 各二錢	枳榔 一錢二分 甘草 炙一錢 木香 八錢 大黃 一錢二分	分二貼水煎服如後重加大黃臙毒加黃栢	三清燥湯 九	欽定四庫全書 外科理例	白朮 黃耆 黃連 各一錢 蒼朮 半錢 白茯苓	當歸 陳皮 各一錢 生地黃 人參 各七分 神麴 炒	猪苓 麥門冬 去心 黃栢 酒炒 甘草 澤瀉 各五分	柴胡 升麻 各三分	作一服水煎服	黃連丸 四 治大腸有熱下血	黃連吳茱萸等分熱湯拌濕罨二日同炒揀出各另 研末亦各米糊丸梧子大每服二三錢糞前紅服茱



黃九 黃連後紅服黃連丸俱酒下	五九 黃連消毒散 治癰疽腫勢外感熈痛或不痛麻木	服此更宜蒜灸	黃連 酒拌 羌活 酒拌 黃芩 酒拌 黃柏 酒拌 生地黄 酒拌	知母 酒拌 獨活 酒拌 防風 酒拌 歸尾 酒拌 連翹 各一錢	蘇木 酒拌 藁本 酒拌 防己 酒拌 桔梗 酒拌 陳皮 酒拌	澤瀉 酒拌 人參 酒拌 甘草 各五分 黃耆 各五分 鹽水拌	作一貼水二鍾姜三片煎八分食後服	欽定四庫全書 外科理例	六九 還少丹	遠志 茴香 巴戟 山藥 牛膝	杜仲 肉蓯蓉 枸杞子 熟地黄 石菖蒲	五味子 白茯苓 楮實子	另為末各等分用棗肉同蜜丸如梧子大每服五十	丸空心酒下	七九 蟠葱散	肉桂 乾姜 炮二 蒼朮 甘草 炙各 半斤 礞砂



丁皮 檳榔 各四兩 蓬朮 三稜 煨 茯苓	青皮 去白各六兩 延胡索 二兩	為末每服五錢葱湯空心調下	九 葫蘆巴丸	葫蘆巴 炒一斤 茴香 去臍炒十二兩 川練子 炒一斤二兩	大巴戟 去心炒六兩 川烏 炮去皮尖六兩 吳茱萸 湯洗七次炒十兩	右為末酒糊如梧子大每服十五丸空心溫酒下小	兒茴香湯下	欽定四庫全書 外科理例	九 塌腫湯 治婦人陰戶生瘡或腫或痛或膿水淋漓	甘草 乾漆 各三兩 黃芩 當歸 生地黃	川芎 各二兩 龜甲 五兩	用水數碗煎良久去查塌洗患處	百一 菖蒲散 治婦人陰戶腫痛月水澀滯	菖蒲 當歸 各一錢 秦艽 七錢半 吳茱萸 五錢製	為末每服三錢空心葱湯調下更以枳實炒熱頻熨 患處陰內膿水淋漓或癢痛以升麻白芷黃連木通



當歸川芎白朮茯苓煎服更用塌腫湯浴洗	一百 清心連子飲 治心經蘊熱小便赤澀或莖腫竅痛	及上下虛心火炎上口苦咽乾煩躁作渴發熱小便	白濁夜則安靜晝則發熱	黃芩炒 黃耆蜜炙 石連肉去心 赤茯苓 人參各一錢	甘草炙 車前子炒 麥門冬去心 地骨皮各五分	水二鍾煎八分空心食前服	二百 班龍丸	欽定四庫全書 外科理例	鹿茸為末炙 山藥為末 熟地黄酒蒸 栢子仁搗膏	兔絲子各等分	蜜丸梧子大每服八十九丸空心鹽湯下	三百 滋腎丸 治下焦陰虛小便澀滯或膝無力陰汗陰	痿或足熱不履地不渴而小便閉	肉桂二錢 黃栢酒拌焙 知母酒洗焙各一兩	四百 為末水丸梧子大每服百丸加至二百丸百沸湯下 茯苓丸



兔絲子 五兩 白茯苓 二兩 石連肉 去心 三兩	酒糊丸 梧子大每服五十九丸空心塩湯下	五百 木香餅 治一切氣滯結腫或痛或閃肭及風寒所傷作痛並效	木香 五錢 為末 生地黄 一兩 杵膏	和勻量患處大小作餅置腫上以熨熱斗熨之	六百 沒藥降聖丹	川烏頭 炮去 臍 骨碎補 炙 白芍藥 沒藥 另研	欽定四庫全書 外科理例	當歸 焙 乳香 各研 生地黄 川芎	蘇木 各一兩 自然銅 火煨醋淬十次為末一兩	右為末生姜汁與蜜和丸每一兩作四每服一丸水	酒各半盞煎至八分空心熱服	七百 乳香定痛散 治瘡痛不可忍	乳香 沒藥 各二錢 寒水石 煨 滑石 各四錢 冰片 一分	為細末搽患處痛即止甚妙此方乳沒性溫佐以寒劑制之故寒熱之痛皆有效也



百八 青州白丸子	白附子炮二兩 半夏姜製 南星各二兩 川烏炮去皮剉半兩	為末用糯米糊丸如菉豆大每服二十九丸生姜湯下	癰瘰溫酒下小兒驚風薄荷湯下	百九 失笑散 治產後心腹絞痛欲死或血迷心竅不知人事及尋常腹內瘀血或積血作痛婦人血氣痛之聖藥也亦治疝氣疼痛	五靈脂 蒲黃俱炒等分	欽定四庫全書 外科理例	每服二三錢醋一合熬成膏入水一盞煎七分食前熱服	百一十 解毒散 治一切毒蛇惡虫并獸所傷重者毒入腹則眼黑口噤手足強直此藥平易不傷氣血大有神效不可以為易而忽之	白礬 甘草各一兩	為末每服二錢不拘時冷水調下更敷患處	百一十五 福化毒丹	玄參 桔梗各一兩半 茯苓二兩 人參 牙硝



青黛 各一兩 甘草 七錢半 射香 少許 金銀箔 各十片	右為末煉蜜丸芡實大每服一九薄荷湯下痘毒上 攻口齒生瘡以生地黃汁化服及用雞翎傳患處	一百 十二連翹丸	連翹 防風 去蘆 黃栢 肉桂 去粗皮 桑白皮	香豉 獨活 秦艽 牡丹皮 各半兩	海藻 二錢半	右為末煉蜜丸如菉豆大每服十丸燈心湯下	欽定四庫全書 外科理例	一百 十三當歸飲子 治血燥作癢及風熱瘡疥癢癢或作痛	當歸 酒拌 川芎 白芍 防風 生地黃 酒拌	白蒺藜 荊芥 各錢半 黃耆 何首烏 甘草 各五分	水二鍾煎八分食遠服	一百 十四葛根橘皮湯	葛根 陳皮 杏仁 去皮尖 麻黃 去節 知母	黃芩 甘草 各等分	每服二錢水煎服



一百 十八 大蘆薈丸	湯下	猪膽浸糍丸如麻子大每服十九丸食後并臨卧杏仁	白芷 胡黃連 各等分	燕薹 青黛 蘆薈 川芎 蝦蟇灰	一百 十七 化蠶丸	每服三錢水煎食後服次進化蠶丸	生地黄 錢各二	桑白皮 灸半兩	欽定四庫全書 外科理例	當歸 連翹 桔梗 甘草 天門冬 去心	紫蘇 前胡 防風 黃芩 赤茯苓	一百 十六 地黃清肺飲	猪膽浸羔丸如麻子大每服二十九丸薄荷湯下	青黛 黃連 錢各三	防風 蘆薈 油髮灰 錢各二	龍膽草 赤茯苓 升麻 苦練根皮	一百 十五 龍膽丸



黃連 蘆薈 木香 青皮 胡黃連	雷丸 用白 白蕪荑 鶴虱 各半 射香 二錢 另研	用粟米飯丸菴豆大每服一二十丸米飲下	一百 六味地黃丸 即腎氣丸 治腎氣素虛不交於心浸液	不降敗毒為痰欬逆	乾山藥 四兩 澤瀉 蒸 牡丹皮 白者 佳 白茯苓 各三兩	山茱萸 去核 四兩 酒拌 熟苧 四兩 酒拌 磁器 蒸半日 搗膏	餘為末加蜜丸如梧子大每服五六十丸空心滾湯	欽定四庫全書 外科理例	或鹽湯溫酒下	一百 槐花酒 治一切瘡毒不問已成未成及焮痛者並	治之槐花四五兩微炒黃乘熱入酒二鍾煎十餘沸	去查熱服未成者二三服已成者一二服又治濕熱	瘡疥腸風痔漏諸瘡作痛尤效	一百 黃連消毒飲 即黃連消毒散方見第一卷	一百 紫金錠 一名神仙追毒丸又名太乙丹治一切癰疽	五味子 焙三兩 山茨菇 焙二兩 射香 三錢 另研入



紅牙大戟

焙一兩半續隨子
去殼去油一兩

右除續隨子射香外三味為細末却入研藥令勻用

糯米煮濃飲為丸分為四十錠每服半錠各依後項

湯使服如治一切藥毒蠱毒瘴氣喫死牛馬駝驢等

肉毒發惡瘡癰疽發背無名疔腫及蛇大惡蟲所傷

湯盪火燒急喉閉纏喉風諸般頭風牙疼用涼水磨

搽并治四時瘟疫感冒風寒暑熱悶亂及自縊溺水

鬼迷驚死未經隔宿心頭微溫並用涼水磨灌良久

欽定四庫全書

外科理例

復甦男子婦人急中顛邪鬼氣狂亂及打撲傷損中

風中氣口眼喎邪牙關緊急語言蹇澁筋脉攣縮骨

節風腫手脚疼痛行履艱辛應是風氣並用熱酒磨

服小兒急慢驚風八疳五痢脾病黃腫癰疹瘡瘤並

用蜜水磨服並搽有效諸般瘡疾不問新久發日用

桃柳枝煎湯磨服

一百
二三

玉真散 治破傷風重者牙關緊急腰背反張并蛇

犬所傷又名定風散



天南星 防風 各等分	為末每服二錢溫酒調下更搽患處若牙關緊急腰	背反張者每服三錢童便調服雖內有瘀血亦愈至	于昏死心腹尚溫者連進二服亦可保全若治風犬	咬用漱口水洗淨搽之神效	一百 二四 奪命丹 又名蟾蜍丸 治疔瘡發背及惡症不痛或麻	木或嘔吐重者昏憤服此不起發者即發不痛者即	痛痛甚者即止昏憤者即甦嘔吐者即解未成者即	欽定四庫全書 外科理例	消已成者即潰有回生之功乃惡症中至寶也	蟾酥 乾者 輕粉 各五 酒化 分 白礬 枯 銅綠 寒水石 煅	乳香 沒藥 射香 各一 硃砂 三錢	蝸牛 二十箇另 研無亦效	右研細末將蝸牛研爛入藥末搗勻丸如菉豆大如	丸不就入酒糊些少每服一二丸用生葱白三五寸	病者自嚼爛吐于手心男左女右包藥在內熱酒連 葱送下如人行五七里汗出為效重者再服一二丸



一百 二五 茯苓丸	茯苓 一兩 半夏 二兩 枳殼 五錢 風化朴硝 一兩	姜汁糊丸梧子大每服二十九丸食後姜湯下	一百 二六 控涎丹	甘遂 去心 大戟 真白芥子 各等分	糊丸梧子大每服五七丸臨卧姜湯下	一百 二七 製甘草法 詳見外科精要 治懸癰腫痛或發寒熱不	問腫潰神效其法大甘草每一兩切三寸許開潤水	欽定四庫全書 外科理例	一椀浸透慢火炙乾仍投前水浸透再炙再浸以椀	水乾為度剉細以無灰酒一椀煎至七分去查空心	服	一百 二八 五苓散	澤瀉 一錢 肉桂 五分 白朮 猪苓 赤茯苓 各一錢	作一貼水煎服	一百 二九 忍冬酒 一名金銀花一名鸞鷟藤詳見外科精要	忍冬藤 生者四五兩如乾 大甘草節 一兩 生用



二味入磁器內以水二碗慢火煎至一碗再入無灰酒一碗再煎十餘沸去渣飲之查敷患處 一百三十回陽玉龍膏 治癰腫堅硬不痛內色不變久而不潰或潰而不斂或筋攣骨痛及一切冷症 草烏炒三兩 南星煨一兩 軍姜煨二兩 白芷一兩 肉桂半兩 赤芍藥炒一兩 為末葱湯調搽	一百三蛇床子散 治風癰疥癩瘡癢膿水淋漓	欽定四庫全書 外科理例	蛇床子 獨活 苦參 防風 荊芥 蕙各一兩 枯礬 銅綠各五錢 為末麻油調搽	一百三二人參平肺散 治心火剋肺傳為肺痿欬嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗑不利 人參 陳皮去白 甘草炙 地骨皮各五分 茯苓 知母炒七分 青皮 天門冬去心 五味子搗四分 桑白皮炒一錢



水二鍾姜三片煎八分食後服	一百三如聖柘黃丸 治肺癰欬而腥臭或唾膿痰不問膿	盛否並效肺家雖有方惟此功效甚捷	柘黃 一兩 為末 百齒霜 即梳垢 二錢	糊丸梧子大每服三五丸米飲下柘黃乃柘樹所生	色黃狀如靈芝江南最多北方鮮有	一百三四萬金散 治癰疽惡核腫痛發背等瘡不問已潰未	潰	欽定四庫全書 外科理例	括萇 一兩 沒藥 乳香 各一錢 甘草節 二錢	先以括萇甘草用無灰酒二碗煎至一碗去渣入乳	沒不拘時服	一百三五蝟皮丸 治痔久而不愈或作漏	蝟皮 一兩 槐花 微炒 艾葉 炒 枳殼 炒 白芍藥	地榆 川芎 當歸 酒洗 白礬 煅 黃耆 鹽水炒	貫衆 各半 頭髮 三錢 燒存性 猪後懸蹄甲 十枚	盈尺皂角 一挺去弦醋炙



為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸食前米飲下若氣血虛或腫痛先投他藥待氣血稍復腫痛已去方可服此此乃收後之劑	一百 三六 苦參丸 治一切瘡毒焮痛作渴或煩躁苦參不拘多少為末水糊丸如梧子大每服二三錢溫酒下	一百 三七 秦艽蒼朮湯 治腸風痔漏大小秘澀	黃栢酒拌 澤瀉 歸尾酒拌 防風各一錢 草角仁燒存性	秦艽 蒼朮米泔浸炒 桃仁各錢半 檳榔五分 大黃燒量入	水二鍾煎八分空心服	欽定四庫全書 外科理例	一百 三八 卷栢散 治臟毒便血	卷栢生石上高四五寸根黃如絲上有黃點焙乾 黃耆鹽水浸炒	右為細末每五錢空心米飲調下	一百 三九 寒水石散 治痔發熱作痛	寒水石 朴硝各等分	為末溫水調服	一百 四十 內托羌活湯 見醫癰條	一百 四一 白芷升麻湯 治醫癰腫痛右手脉大未成膿者



白芷 半一錢 升麻 桔梗 錢各一 生黃芩 三錢	紅花 甘草 炙各五分 酒黃芩 四錢	作一服水一鍾酒半鍾煎至八分食後服	一百 內托黃耆柴胡湯 見附骨癰條	一百 內托升麻湯 治婦人乳中結核或腫痛並效久而	不消者宜以托裏藥為主間服此藥	瓜蒌仁 錢三 升麻 連翹 青皮 甘草節 錢各二	作一服水煎服若數劑不消宜以托裏	欽定四庫全書 外科理例	一百 升麻牛旁子散 治時毒瘡疹發于頭面或胸膈之	際及一切瘡毒並效	升麻 桔梗 葛根 玄參 牛旁子	麻黃 甘草 錢各一 連翹 二錢	作一貼水姜煎食遠服	一百 黃耆人參湯 治潰瘍虛熱無睡少食或穢氣所觸	作痛 人參 白朮 炒 歸身 酒拌 麥門冬 去心



蒼朮 米泔浸 各一錢 甘草 炙 陳皮 升麻	神曲 炒各五分 黃耆 鹽水拌炒二錢 黃柏 酒炒三分 五味子 九粒 搗碎	水二鍾姜三片棗一枚煎八分食遠服	一百四十六 雄黃解毒散 治一切癰腫毒爛毒勢甚者先用此	藥二三次後用猪蹄湯	雄黃 一兩 白礬 四兩 寒水石 煅一兩	用滾水二三碗乘熱入前藥末一兩洗患處以太乙	膏或神異膏貼之	欽定四庫全書 外科理例	一百四十七 玉粉散 治一切疔瘡	輕粉 銀硃 滑石 寒水石	孩兒茶 各二錢 片腦 二分	右為細末香油調搽乾搽亦可若腫硬不消以防風	荊芥牛膝甘草滑石各五錢用水三碗煎二碗乘熱	熏洗	一百四十八 千兩金丸 治喉風喉閉及一切急證腫塞立效真起死回生之藥也



蚶蜆草 銅青 大黃 牙硝 各五錢 右為末以白梅肉爛研一處搗勻每一兩作五丸以新綿裹噙化嚥津涎吐出	一百四 破關丹 治乳蛾喉閉纏喉風等症	蓬砂末 五錢 霜梅肉 一兩	搗爛為丸如芡實大噙化嚥下內服荊防敗毒散重者服防風通聖散	一百五十 如聖黑丸子 治風寒襲于經絡腫痛或不痛或打	欽定四庫全書 外科理例	撲跌墜筋骨疼痛瘀血不散遂成腫毒及風濕四肢疼痛或手足緩弱行步不前并婦人血風勞損	白芨 當歸 各四錢 白欽 一兩 南星 三錢 百草霜	芍藥 各一兩 牛膝 六錢 川烏 二錢 赤小豆 一兩 六錢	骨碎補 八錢	為末煉蜜丸梧子大每服三十九丸鹽湯或酒下風疾更煨葱一莖溫酒下孕婦勿用	一百五 一 如聖丸 治癩風 即大麻風蘇州欽院使方甚妙



全蠋 酒洗 連翹 天麻 防風 各一兩半 荊芥	川芎 白芷 當歸 酒洗 黃柏 羌活	桔梗 大黃 煨 滑石 石膏 煨 白朮	麻黃 苦參 殭蠶 炒 蟬蛻 芍藥	山梔 枳殼 細辛 皂角刺 大風子 肉各一兩	獨活 人參 鬱金 芒硝 黃連 各五錢	共三十味為細末用紅米糊為丸如梧子大每服五	七十丸用六安茶煎湯送下日進三服半年全愈小	欽定四庫全書 外科理例	便尿如靛水黑色此病之深者只用此藥二料如眉	毛鬚髮脫落日漸生者切不可食羊肉鵝雞豬頭蹄	鯉魚生冷如肯食淡百日全愈如瘡破裂只用大風	子殼煎湯洗春夏滑石石膏依方用秋冬二味減半	遇春分秋分服防風通聖散一貼空心服利三四次	以粥補之	一百 五二四七湯	半夏 五兩 紫蘇 二兩 茯苓 四兩 厚朴 三兩



水鍾半姜三片棗一枚煎熱服		一百五十三玉燭散		治便癰初起腫痛發熱大小便秘用此行	
散		川芎		當歸 酒拌	
大黃 二錢		甘草 炙五分		芍藥	
水二鍾煎八分食前服		芒硝		生地黃 酒拌	
一百五十四神效活絡丹		官桂		羌活	
麻黃 一半		貫薊		白花蛇 酒浸	
欽定四庫全書		甘草 炙		草豆蔻	
外科理例		天麻		白芷	
兩頭尖 去皮		零陵香		黃連	
熟地黃		黃芩		何首烏 酒浸	
木香 各二兩		赤芍藥		細辛 去土	
沒藥 另研		朱砂 另研		丁香	
白殭蠶 炒		虎骨 酒炙		龜板 酒炙	
人參		黑附子 炮去		青皮	
香附子		茯苓		安息香 另研	
白豆蔻		烏藥		白豆蔻	



白朮 骨碎補 沉香各一兩 威靈仙酒浸	全蝎新者 葛根 當歸各兩 射香	烏梢蛇去皮骨 酒浸 烏犀屑地龍 去土 松香脂各五錢	血蝎七錢半 另研 防風二兩 牛黃二錢半 另研	金箔為衣 冰片一錢半 另研	右共五十二味為末煉蜜和杵千餘杵每藥兩半作 十丸如彈子金箔為衣每服一丸細嚼溫酒茶清漱 下臨卧空心各一丸隨症上下食前後服頭搗茶下	欽定四庫全書 外科理例	男婦暴卒中風不省人事喎斜口噤失音涎盛拘攣 臨睡爛研一丸好酒化下便睡覺有汗將病人手背 隨即舒拳天明用人扶行早飯日西再服一丸可痊 產後暗風及破傷風內外一切傷寒人年四十已上 間二三日服一丸永無風疾	一方無白花蛇零陵香黃連黃芩熟地黃大黃虎骨 龜板烏藥安息香青皮白豆寇骨碎補茯苓白朮松 香脂多藿香



五 一 百 七	托裏散 治瘡飲食少思或不腐或不收斂
五 一 百	內托復煎散 治瘡瘍腫焮在外其脉多浮邪氣勝必侵內
地骨皮	黃芩 炒
茯苓	人參
白芍藥 炒	
黃耆 鹽水拌炒	白朮 炒
肉桂	甘草 炙
防已 酒拌	
當歸 酒拌	防風 二錢
先剉蒼朮一升水五升煎先去朮入藥再煎至二升	
終日飲之蒼朮查外再煎服	
五 一 百 六	托裏消毒散 治疽已攻發不消者服此未成即消
欽定四庫全書	外科理例
已成即潰腐肉易去新肉易生有瘡口宜貼膏藥斂	
則不用切忌早用生肌又治時毒表裏俱解腫肉不	
退欲其作膿	
人參	黃耆 鹽水拌炒
當歸 酒洗	川芎
芍藥 炒	
白朮 炒	茯苓 各一錢
白芷	金銀花 各七分
甘草 五分	
作一劑水二鍾煎八分瘡在上下分食前後服	



人參 黃耆 鹽水拌炒 當歸 酒拌 川芎 白朮 炒	茯苓 芍藥 各一錢 厚朴 姜製 白芷 甘草 各五分	作一劑水二鐘煎八分服	一百五十八代針膏 治膿熟不潰	乳香 二分 巴豆 去殼炒焦 礞石 細直者是 白丁香 各五分	為末熟水調點瘡頭上常以碱水潤之勿令乾	一百五十九托裏榮衛湯 治瘡外無焮腫內亦便利乃邪在經絡用此調理 見汗之則瘡已條	欽定四庫全書 外科理例	一百六十定痛托裏散 治瘡血虛疼痛聖藥也	當歸 酒拌 白芍 炒 川芎 各錢半 乳香 沒藥	肉桂 各一錢 粟殼 去蒂炒二錢	水二鍾煎八分服	一百六十一內托黃耆湯 治潰瘍作痛倦怠少食無睡自汗口乾或發熱久不愈	黃耆 鹽水拌炒 麥門冬 去心 熟地黃 酒拌 人參 茯苓 各一錢	白朮 炒 川芎 官桂 遠志 去心 當歸 酒拌各五分



甘草 炙二分	作一劑水二鍾姜三片棗二枚煎八分食遠服	一百 六二當歸補血湯 治瘡潰後氣血俱虛肌熱躁熱目赤	面紅煩渴引飲晝夜不息脉洪大而虛重按全無此	脉虛血虛也若悞服白虎湯必死	黃耆 炙六錢 當歸 酒拌一錢	水鍾半煎六分服	一百 六三玉露散 治產後乳脉不通身體壯熱頭目昏痛大	欽定四庫全書 外科理例	便澁滯	人參 白茯苓 甘草 各五分 桔梗 炒 川芎	白芷 各一錢 當歸 五分 芍藥 七分	水二鍾煎八分食後服如熱甚大便秘加大黃三分	煎服	一百 六四加味小柴胡湯 治婦人熱入血室致寒熱如瘧晝	則安靜夜則發熱妄語	柴胡 二錢半 黃芩 人參 生芩 甘草 各一錢



半夏 六分	水鍾半姜三片煎八分食遠服	一百六十五 清心湯 治瘡腫痛發熱飲冷脉沉實睡語不寧即	防風通聖散每料加黃連五錢每劑一兩水二鍾煎	八分食遠服	一百六十六 破棺丹 治瘡熱極汗多大渴便秘譫語或發狂結	陽之症	芒硝 各二兩 甘草 二兩五錢 大黃 半生半熟	欽定四庫全書 外科理例	為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後童便酒下白	湯亦可	一百六十七 箍藥 治發背毒甚散走不住此藥圖之而解	白芷 大黃 白芨 黃栢 炒 芙蓉葉	山茨菇 寒水石 煨 蒼耳草 各等分兩	右另為末用水調搽四圍留中如乾以水潤之	一百六十八 烏金膏 解一切瘡毒及腐化瘀肉最能推陳致新	用巴豆去殼炒焦研如膏點腫處則解毒塗瘀肉則



自化加乳香少許亦可如紅瘡內能搜膿化毒加香	油少許調稀可用若餘毒深伏不能收斂者宜此紅	之不致成瘡	一百六十九援生膏 治一切惡瘡及癰癤初起點破雖未全消	亦得以殺其毒	輕粉 三錢 乳香 沒藥 血竭 各一錢 蟾酥 三錢	射香 五分 雄黃 五錢	用蕎麥箕灰或真炭灰一斗三升淋灰湯八九碗將	欽定四庫全書 外科理例	粟或桑柴文武火煎作三碗以備日久藥乾添用取	二碗盛磁器內將前藥研為極細末入灰湯內用鉄	幹或柳枝順攪再入好細石灰一升再攪勻過一宿	却分于小磁器收貯凡遇諸腫點當頭一二點一日	換二次次日又一次須出血水為妙如藥乾却加所	存灰湯少許調之	一百七十神效托裏散 治一切腫毒焮痛增寒壯熱 又名金銀花散	黃耆 鹽水炒 當歸 粉草 忍冬藤 各一錢



酒水各一鐘煎一鐘分病上下食前後服少頃再進 一劑查罨患處不問陰陽腫潰老少虛實皆可服為 末酒調服尤效消膿托裏止痛排膿 一百一托裏溫經湯 治寒覆皮毛鬱遏經絡不得伸越熱 伏榮中聚結赤腫作痛惡寒發熱或痛引肢體若頭 腫痛焮甚更宜砭之 見頭面赤腫門	一百二五利大黃湯 治時毒焮腫赤痛煩渴便秘脉數	大黃煨 黃芩 升麻各二錢 芒硝 梔子各一錢二分	欽定四庫全書 外科理例	作一貼水鍾半煎六分空心熱服	一百三梔子仁湯 治時毒腫痛便秘脉沉數	鬱金 枳殼麸炒去瓢 升麻 大黃煨 山梔仁炒	牛蒡子炒各等分兩	為細末每服三錢蜜水調下	一百四葛根牛蒡子湯 治時毒腫痛脉數而少力者	葛根 管仲 甘草 豆豉江西者	牛蒡子半生炒各二錢



作一服水鍾半煎八分食後服	一百五 普濟消毒飲 治時毒疫癘初覺增寒體重次傳頭	面腫痛或咽喉不利口乾舌燥	黃芩 黃連 各五錢 人參 三錢 橘紅 玄參	甘草 各二錢 柴胡 桔梗 二錢 炒各 連翹 鼠粘子	板藍根 馬勃 各一錢 升麻 白殭蠶 炒各七分	作一貼水二鍾煎一鍾去查稍熱食後徐服之如大	便硬加大黃 煨酒 一錢或二錢腫勢甚者砭之去惡血	欽定四庫全書 外科理例	一百七 內托羌活滑 見醫癰條	一百七 內托黃耆酒煎湯 治寒濕腿外側少陽經分患癰	或附骨癰堅硬漫腫作痛或侵足陽明經亦治之	柴胡 錢半 連翹 肉桂 各一錢 黃栢 五分 黃耆 鹽水拌炒二錢	歸尾 二錢 升麻 七分 甘草 炙五分 大力子 炒一錢	作一服水酒各一鍾煎八分食前服	一百七 附子餅 治潰瘍氣血虛不能收斂或風邪襲之以	致氣血不能運于瘡所致難收斂用炮附子去皮臍



研末唾津和為餅置瘡口處將艾于餅上灸之每日 灸數壯但令微熱勿令痛餅乾再用唾津和做以瘡	口活潤為度	一百 七九二陳湯 和中理氣健脾胃消痰進食	半夏 姜製 陳皮 炒 茯苓 各錢半 甘草 炒五分	水一鍾姜三片煎六分食遠服	一百 八十火龍膏 治風寒濕毒所襲筋攣骨痛或肢節疼痛	及濕痰流注經絡作痛不能行步鶴膝風歷節風疼	欽定四庫全書 外科理例	痛其效尤速	生薑 半斤 取汁乳香 為末 沒藥 末各五錢 射香 為末二錢	牛皮膠 廣東者二兩切	先將姜汁并膠溶化方下乳沒調勻待溫下射香即	成膏攤貼患處更服五積散如鶴膝風須大防風湯	一百 八一半夏左經湯 治足少陽經為四氣所乘以致發熱	腰脇疼痛頭目眩暈嘔吐不食熱悶煩心腿痺縱緩	半夏 姜製 乾葛 細辛 白朮 茯苓



桂心 防風 乾姜 炮 黃芩 麥門冬 去心	柴胡 甘草 炙各一錢	水二鍾姜三片棗二枚煎八分食前服	一百八二 大黃左經湯 治四氣流注足陽明經致腰脚腫痛	不能行大小便閉或惡聞食氣喘滿自汗	細辛 茯苓 羌活 大黃 煨 甘草 炙	前胡 枳殼 厚朴 姜製 黃芩 杏仁 各一錢	水二鍾姜三片棗二枚煎八分食前服	欽定四庫全書 外科理例	一百八三 加味敗毒散 治足三陽經受熱毒流于脚踝焮赤	腫痛寒熱如瘧自汗短氣小便手足或無汗惡寒	羌活 獨活 前胡 柴胡 枳殼	桔梗 甘草 人參 茯苓 川芎	大黃 蒼朮 各一錢	分二劑水一鍾姜三片煎八分不拘時服	一百八四 遵滯通經湯 治脾經濕熱壅遏不通面目手足作痛即五苓散減猪苓官桂加木香陳皮每服二錢滾



湯下	一百五 附子六物湯 治四氣流注于足太陰經骨節煩痛	四肢拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫	附子 防已 各四錢 甘草 炙二錢 白朮 炒 茯苓 各三錢	桂枝 一錢	分二劑水鍾半姜三片煎一鐘食遠服	一百八 八味丸 治命門火衰不能上生脾土致脾胃虛弱	飲食少思或食不化日漸消瘦及虛勞渴欲飲水腰	欽定四庫全書 外科理例	腫痛疼小腹不利及腎氣虛寒臍腹作痛夜多漩溺	脚膝無力肢體倦怠 即腎氣丸每科加肉桂一兩	附子一兩每日用新童便數碗浸五六日切作四塊	再如前浸數日以草紙包裹水濕紙炮半日出去皮	臍尖切作大片如有白星再用火炙以無為度	一百八 七 交加散 治風寒濕毒所傷腿脚痛或筋攣骨痛腰	背掣痛或頭痛惡寒拘急遍身疼痛一切寒毒之病	並治即五積散對人參敗毒散



一百八十八 檳榔散 治風濕流注脚脛酸痛或嘔吐不食	檳榔 木瓜錢各一 香附子 紫蘇各三分 陳皮	甘草炙各一錢	水鍾半姜三片葱白三莖煎一鍾空心服	一百八十九 麻黃左經湯 治四氣流注足太陽經腰足攣痺關	節重痛增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛	麻黃去節 乾葛 茯苓 蒼朮米泔浸炒 防已酒拌	桂心 羌活 防風 細辛 甘草炙各一錢二分	欽定四庫全書 外科理例	水二鍾姜三片棗一枚煎八分食前服	一百九十 加味四斤丸 治肝腎氣血不足足脛酸痛步履不	隨如受風寒濕毒以致脚氣者更宜	虎脛骨一兩另研 沒藥另研 乳香另研各五錢 川烏一兩炮去皮	肉蓯蓉 牛膝各一兩半 木朮一斤去穢蒸 天麻一兩	木瓜蓯蓉搗膏餘為末加酒糊和勻熟杵丸梧子大	每服七八十丸空心溫酒或鹽湯任下	一百九十一 局外換腿丸 治足三陰經為四氣所乘攣痺緩縱



上攻胸脇肩背或下注脚膝作痛足心發熱行步艱辛		薏苡仁	石楠葉	南星	湯泡	石斛	檳榔
草薺		炙	牛膝	羌活	防風	木瓜	各四兩
黃耆		炙	當歸	天麻	續斷	各一兩	
為末酒糊丸梧子大每服五十丸鹽湯下							
一百九十二三因勝駿丸							
治元氣不足為寒濕所襲腰足攣拳或脚面連指走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益							
真氣壯筋骨							
當歸		天麻	牛膝	木香			
熟地黄		酒拌蒸半日杵膏	酸棗仁	炒	防風	各二錢	
木瓜		四兩	羌活	乳香	各五錢	射香	二錢
全蝎		炒	沒藥	甘草	炙各一兩	附子	製法見八味丸二兩
地黄三斤用無灰酒四升煮乾再晒二日杵如膏入							
餘藥末杵千餘下每兩作十丸每服一丸細嚼臨卧							
酒下作小丸服亦可							

欽定四庫全書

外科理例



一百 九三神應養真丸 治厥陰經為四氣所襲脚膝無力或 左癱右瘓半身不遂手足頑麻語言蹇澁氣血凝滯	通身疼痛	當歸 酒洗 川芎 芍藥 地黄 酒蒸 羌活	天麻 木瓜 兔絲子 酒製各 等分兩	為末入地黄膏加煉蜜丸梧桐子大每服百丸空心 酒下鹽湯亦可	一百 九四開結導引丸 治飲食不消心下痞悶腿脚腫痛	欽定四庫全書 外科理例	白朮 炒 陳皮 炒 澤瀉 茯苓 神曲 炒	麥牙 炒 半夏 姜製 各一兩 青皮 乾姜 各五錢 巴豆霜	枳實 炒各 錢半	為末湯浸蒸餅丸梧子大每服四五丸或十丸溫水 下 此內傷飲食脾胃營運之氣有虧不能上升則 注為脚氣用此導引行水化脾氣也	一百 九五青龍湯 治肺受寒咳嗽喘	乾姜 炮 細辛 麻黃 去節 肉桂 各三兩 半夏 湯泡七次 二兩半



芍藥 甘草炙各三兩 五味子二兩搗炒	每服五錢水一鍾姜三片煎七分食後服	一百九十六 葶藶大棗瀉肺湯 治肺癰胸膈脹滿上氣咳嗽或	身面浮腫鼻塞聲重	葶藶炒黃研末每三錢	水二鍾棗一枚煎一鍾去棗入藥煎七分食後服	一百九十七 升麻湯 治肺癰胸乳間皆痛吐痰腥臭	川升麻 苦梗炒 薏苡仁 地榆 黃芩炒	欽定四庫全書 外科理例	赤芍藥炒 生甘草 牡丹皮去心各一錢	水二鍾煎八分食遠服	一百九十八 參蘇飲 治感風欬嗽涕唾稠粘或發熱頭痛或頭	目不清胸膈不利	木香 蘇葉 葛根姜製 前胡 半夏湯泡七次	人參 茯苓各七分 枳殼麩炒 桔梗炒 甘草	陳皮去白各五分	水二鍾姜一片葱一莖煎八分食遠服



一百九十九 桔梗湯 治欬而胸膈隱痛兩脚腫滿咽乾口燥煩	悶多渴時出濁涕腥臭	桔梗 炒 貝母 去心 當歸 酒浸 瓜蒌仁 枳殼 麸炒	薏苡仁 炒 桑白皮 炒 甘草節 防己 去皮各一錢 黃耆 鹽水拌炒	百合 蒸各錢半 五味子 搗炒 甜葶藶 炒 地骨皮 知母 炒	杏仁 各五分	水鍾半生姜三片煎七分不拘時溫服欬加百藥煎	熱加黃芩大便秘加煨大黃少許小便澀加木通車	欽定四庫全書 外科理例	前子煩燥加白茅根欬而痛甚加人參白芷	二 百 排膿散 肺癰吐膿後服此排膿補肺	嫩黃耆 鹽水拌炒 白芷 五味子 杵炒 人參 各等分	細末每服三錢食後蜜湯調下	二 百 四順散 治肺癰吐膿五心煩熱壅悶欬嗽	貝母 去心 紫苑 去苗 桔梗 炒各錢半 甘草 七分	水二鍾煎八分食遠服欬嗽加杏仁亦可為末白湯調服



二百 二 葶藶散 治過食煎燂或飲酒過度致肺壅喘不卧 及肺癰濁唾腥臭	甜葶藶 桔梗 炒 瓜蒌仁 川升麻 薏苡仁	桑白皮 炒 葛根 各一錢 甘草 炙五分	水鍾半生姜三片煎八分食後服	二百 三 鍾乳粉散 治肺氣虛久嗽皮毛枯槁唾血腥臭或 喘不已	鍾乳粉 煅煉 桑白皮 蜜炙 麥門冬 去心 紫蘇 各五分	欽定四庫全書 外科理例	水一鍾姜三片棗一枚煎六分食後服	二百 四 紫苑茸湯 治飲食過度或煎燂傷肺欬咽乾吐 痰唾血喘急胸痛不得卧	紫苑茸 去苗 犀角 一錢 甘草 炙 人參 各五分	欸冬花 桑葉 經霜 百合 蒸焙 杏仁 去尖皮	阿膠 蛤粉 貝母 去心 半夏 湯炮七次 蒲黃 炒各一錢	水鍾半姜三片姜八分入犀末食後服	二百 五 人參五味子湯 治勞復欬膿或咯血寒熱往來盜



汗羸瘦困乏一切虛損並治 人參 五味子杵炒 前胡 桔梗炒 白朮炒 白茯苓去皮 陳皮去白 甘草炙 地黃生者酒拌蒸半日 當歸酒拌炒 地骨皮 黃耆炙 桑白皮炒 枳殼去穰炒 柴胡各七分 水鍾半姜三片煎八分食後服	二百六 寧肺湯 治榮衛俱虛發熱自汗或喘急欬唾膿 人參 當歸 白朮炒 川芎 白芍	欽定四庫全書 外科理例	熟地黃酒蒸 五味子杵炒 麥門冬去心 桑白皮炒 甘草炙 白茯苓 阿膠蛤粉炒	水二鍾姜三片煎八分食後服	二百七 知母茯苓湯 治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗 茯苓 黃芩炒各二錢 甘草炙 知母炒 人參	五味子杵炒 桔梗 薄荷 半夏姜製 柴胡	白朮 麥門冬去心 款冬花各三錢 川芎	阿膠蛤粉炒各二錢



作一貼水二鍾姜三片煎一鐘食後服	二百 人參養肺湯 治肺痿欬嗽有痰午後熱并聲颯者	人參 五味子 搗炒 貝母 去心 柴胡 各四分	桔梗 炒 茯苓 各錢半 甘草 五分 桑白皮 炒一錢	枳實 錢半 杏仁 炒 阿膠 蛤粉炒各一錢	水鍾半姜三片棗一枚煎八分食後服	九 二百 梔子仁湯 治肺痿發熱潮熱或發狂煩躁面赤咽	痛	欽定四庫全書 外科理例	梔子仁 赤芍藥 大青葉 知母 炒各七分	黃芩 炒 石膏 澀 杏仁 去皮尖炒 升麻 各錢半	柴胡 二錢 甘草 一錢 豆豉 百粒	水二鍾煎八分食遠服	二百 一十 甘結湯 治肺氣壅熱胸膈不利咽喉腫痛痰涎壅	盛	甘草 炙 桔梗 各五錢	水鍾半煎八分食遠服



二百 十一加味理中湯 治肺胃俱寒發熱不已	甘草炙 半夏姜製 茯苓 乾姜炮 白朮炒	橘紅 細辛 人參 五味子搗炒各五分	水一鍾煎六分食遠服	二百 十二大黃湯 治腸癰小腹堅腫如掌而熱按之則痛肉色如故或焮赤微腫小便頻數汗出增寒其脉遲緊	未成膿宜服	朴硝 大黃炒各一錢 牡丹皮 瓜蒌仁研	欽定四庫全書 外科理例	桃仁去皮尖各二錢	水二鍾煎八分食或空腹溫服	二百 十三牡丹皮散 治腸癰腹濡而痛時時下膿	牡丹皮 白茯苓 薏苡仁 人參 天麻	黃耆炒 桃仁去皮尖 白芷 當歸酒浸 川芎各一錢	官桂 甘草炙各五分 木香二分	水二鍾煎八分食遠服	二百 十四梅仁湯 治腸癰隱痛大便秘澀





右除血竭乳沒射黃丹鹽花硝石七味另研外餘並
剉入油浸七日文火煎以柳篋不住手攪候匝沸乃
下火沸定又上火如此三次以藥黑色為度紙濾去
渣再熬續入丹將凝再下餘味藥末仍不住手攪又
熬滴水成珠為度磁器收之候溫將水銀絹包以
手細彈鋪在上謂之養藥母用時刮去水銀或服或
貼隨用其功甚大

二百
十七 神仙太乙膏 治一切瘡毒不問年月深淺已未成

欽定四庫全書

外科理例

膿先以溫水洗淨軟帛拭乾用緋帛攤貼亦可丸即
用冷水吞下血氣不通溫酒下赤白帶當歸酒下效
嗽及喉閉纏喉風並用綿裹含化諸風弦赤眼捏作
小餅貼太陽穴以山梔湯下打撲傷損外貼內服橘
皮湯腰膝痛貼患處鹽湯下唾血丸以蛤粉為衣桑
白皮湯下瘰癧鹽湯洗貼酒下一丸婦人經脈不通
甘草湯下其膏可收十餘年不壞愈久愈烈一切疥
別煉油少許和膏塗之諸虫蛇并湯火刀斧傷皆可



內服外貼		玄參 白芷 當歸 肉桂 生地黃		大黃 赤芍 各一兩		咀用麻油一斤入銅鍋內煎至黑濾去渣入黃丹十		二兩再煎滴水中捻軟硬得中成膏矣予嘗用治瘡		毒并內癰有奇效一婦月經不行腹結塊作痛貼之		經行痛止愈此方之妙也		二百十八排膿散 治腸癰少腹痛脉滑數或裏急後重或時		欽定四庫全書 外科理例		時下膿		黃耆 炒 當歸 酒浸 金銀花 白芷 川山甲 蛤粉 拌炒		防風 連翹 瓜蒌仁 各一錢		水二鍾煎八分食前服為末每服三錢食後蜜湯調		下亦可		二百十九射干連翹散 治寒熱瘰癧		射干 連翹 玄參 木香 赤芍藥		升麻 前胡 當歸 山梔仁 甘草 各七分	



大黃錢炒二	水二鍾煎八分食後服	二百薄荷丹 治風熱癰癰久服毒自小便宣出未作膿	者自消	薄荷弦 皂角去皮 三稜煨 連翹	何首烏米泔浸 蔓荊子各一錢	荊芥穗一兩 豆豉末二兩半	為末醋糊丸如梧子大每服三十九丸食後滾湯下日	欽定四庫全書 外科理例	二服病難愈須常服之	二百益氣養榮湯 治抑鬱或勞傷氣血或四肢頸項患	腫或軟或赤不赤或痛不痛或日晡發熱或潰而不	斂	人參 茯苓 陳皮 貝母 香附	當歸酒拌 川芎 黃耆鹽水拌炒 熟苧酒拌 芍藥炒各一錢	甘草炙 桔梗炒五分 白朮炒二錢	水二鍾姜三片煎八分食遠服



胸膈滿加枳殼香附 錢各一 人參熟苳 各減二分	飲食不甘暫加厚朴蒼朮 痰多加橘紅半夏	往來寒熱加柴胡地骨皮 發熱加柴胡黃芩	膿潰作渴加參耆歸朮 膿多或清加歸芎	脇下痛或痞加青皮木香 肌肉生遲加白斂官桂	口乾加五味子麥門冬 渴不止加知母赤小豆	俱酒 拌炒 膿不止倍加參耆當歸	二百 二針頭散 治一切頑瘡瘰癧肉不盡及癰核不化瘡口	欽定四庫全書 外科理例	不合宜此腐之	赤石脂 五錢 白丁香 乳香 各二錢 黃丹 一錢	砒生 二錢 輕粉 射香 各五分 蜈蚣 一條	為末搽瘰癧肉上其肉自化若瘡口小或痔瘡用糊和	作條子陰乾經之凡瘡久不合者內有膿管須用此	藥腐之兼服托裏之劑	二百 三如神散 治療癰已潰瘰癧肉不去瘡口不合	松香末 一兩 白礬 三錢



為末香油調搽乾搽亦可	二百 四 當歸龍會丸 治瘰癧腫痛或脇痛以有積塊及下	疳便癰小便澀大便秘或瘀血凝滯小腹作痛	當歸 酒浸 梔子仁 炒 黃連 青皮 龍膽草 酒拌炒	黃芩 各一錢 大黃 酒拌炒 蘆薈 青黛 柴胡 各五錢	木香 二錢半 射香 五分 另研	為末神曲糊丸每服二三十九丸姜湯下	二百 五分 心氣飲 治七情鬱結胸膈不利或脇肋虛脹噎	欽定四庫全書 外科理例	塞不通或噫氣吞酸嘔噦惡心或頭目昏眩四肢倦	怠面色痿黃口苦舌乾飲食減少日漸羸瘦或大腸	虛秘或病後虛痞	木通 赤芍 官桂 半夏 姜製 赤茯苓	桑白皮 炒 大腹皮 陳皮 去白 青皮 去白 甘草 炙	羌活 各五分 紫蘇 二錢	二百 六 生地黄丸 許白雲云有一師尼患惡風體倦乍寒	水二鍾姜三片棗二枚燈心十莖煎八分食遠服



乍熱面赤心煩或時自汗是時疫氣大行醫見寒熱	作傷寒治大小柴胡湯雜進數日病劇予胗三部無	寒邪但肝脉弦長上魚際宜用抑陰之藥遂用此方	秦艽 黃芩 硬柴胡 赤芍藥 一兩	生地黄 一兩酒 蒸搗膏	為末入地黃骨加煉蜜少許丸如梧子大每服三十	丸烏梅湯下日進二服	二百 二七 遇仙無比丸 治癰未成膿其人氣體如常宜服此	欽定四庫全書 外科理例	丸形氣覺衰者先服益氣養榮湯待血氣少充方服	此丸核消仍服前湯潰後有瘀肉宜頭散若不斂亦	服此丸斂後再服前湯	白朮 炒 檳榔 防風 蜜陀僧 郁李仁 湯炮 去皮	甘草 各五錢 斑貓 去翅足用糯米同 炒米不用五錢	細末水糊丸梧子大每服二十九丸早晚煎甘草檳榔	湯下服至用許覺腹微痛自小便中取下癰毒如魚目狀已破者自合未膿者自消



二百 二八三品錠子	上品 去十八種痔	白礬 二兩 乳香 三錢 沒藥 三錢 牛黃 三錢 白礬 一兩零五分	中品 去五漏及蕃花瘤氣核	白礬 二兩 白砒 一兩 乳香 沒藥 各三錢	下品 治療瘰氣核疔瘡發背腦疽諸惡症	白礬 二兩 白砒 一兩 乳香 沒藥 各二錢半 牛黃 三分	先將砒末入紫泥罐內次用礬末蓋之以炭火煅令	欽定四庫全書 外科理例	烟盡取出研極細末糯米糊和為挺子狀如線香陰	乾紐瘡內三四次年深者五六次其根自腐潰如瘡	露在外更用蜜水調搽乾上亦可	二百 二九益元散	滑石 煅六兩 甘草 炙二兩	各研為末和蜜與服三錢熱湯冷水任下	二百 三十治血分椒仁丸	續隨子 去皮研 郁李仁 黑牽牛 研 五靈脂 研



吳茱萸 延胡索 椒仁 甘遂	附子 當歸 各五錢 芫花 醋浸一錢 石膏	膽礬 一錢 人言 一錢 蜃青 十枚去頭翅足同糯米炒黃米不用	為末麵糊丸如豌豆大每服一九橘皮湯下此方藥	雖峻利所用不多畏而不服是養病害身也嘗治虛	弱之人亦未見其有悞	二百 一治水分葶藶丸	葶藶 炒另研 續隨子 去殼研各半兩 乾笋末 一兩	欽定四庫全書 外科理例	為末棗肉丸如梧子大每服七丸煎扁蓄湯下如大 便利者減葶藶續隨子各一錢加白朮五錢	又方 治經脉不利即為水水流四肢即為腫滿名曰 血分其候與水相類作水治之非也宜用此方	人參 當歸 桂心 赤芍 瞿麥穗	白茯苓 大黃 濕紙裹三斗米下蒸米熟去紙切炒各半兩 葶藶 炒另研一錢	為末煉蜜丸如梧子大空心米飲下十五至三十	丸



二百 三二托裏養榮湯 治療癰流注及一切不足之證不作	膿或不潰或潰後發熱惡寒肌肉消瘦飲食少思睡	卧不寧盜汗不止	人參 黃耆炙 當歸酒拌 川芎 芍藥炒	白朮炒各一錢 五味子炒 麥門冬 甘草各五分 生芩酒拌蒸半日	水二鐘姜三片棗一枚煎八分食遠服	二百 三三琥珀膏 治頸項及腋下初如梅核腫結硬強漸如	連珠不消不潰或潰而膿水不絕經久不瘥漸成漏	欽定四庫全書 外科理例	症	琥珀一兩 木通 桂心 當歸 白芷	防風 松脂 硃砂研 木鱉子各五錢肉	麻油二斤 丁香 木香各三錢	先用琥珀丁香桂心硃砂木香為末餘剉以油二斤	四兩浸七日入鐺慢火煎白芷焦黃瀉出徐徐下黃	丹一斤以柳枝不住手攪煎至滴水捻軟硬得中却	入琥珀等末攪勻磁器盛用時取少許攤紙貼之



二百 三四方脉流氣飲 治瘰癧流注及鬱結腫塊或走注疼	痛或心胸痞悶咽塞不通脇腹膨脹嘔吐不食上氣	喘急欬嗽痰盛面目四肢浮腫大小便秘	紫蘇 青皮去白 當歸酒拌 芍藥炒 烏藥	茯苓 枳實麸炒 桔梗炒 半夏姜製 川芎	黃耆炙 防風 陳皮去白 甘草炙各一錢 木香	大腹皮 檳榔 枳殼麸炒各五分	水二鍾姜三片棗一枚煎八分食遠服	欽定四庫全書 外科理例	二百 三五加減八味丸 治瘡瘻後口乾渴甚則舌或黃及未	患先渴此腎水枯竭不能上潤以致心火上炎水火	不能既濟故心煩躁作渴小便頻數或白濁陰痿飲	食不多肌膚漸削或腿腫膝先瘦服此以生腎水降	心火諸症頓止及治口舌生瘡不絕	山茱萸淨肉一兩 五味子炒二兩 牡丹皮半兩 白茯苓半兩	山藥一兩 桂心去皮半兩 澤瀉切片蒸焙半兩 生地黄二兩酒拌	膏 蒸搗



為末入地黃膏加煉蜜少許丸梧子大每服六七十	九五更初未語前或空心淡鹽湯下	二百 三六香砂六君子湯 治脾胃不健飲食少思或作嘔或	過服涼藥致傷脾胃 即六君子加藿香砂仁	二百 三七不換金正氣散 治瘡脾氣虛弱寒邪相搏痰停	胸膈以致發寒熱服此正脾氣則痰自消寒熱不作	厚朴 去皮姜製 藿香 半夏 姜製 蒼朮 米泔浸 陳皮 去白各一錢	甘草 炙五分	欽定四庫全書 外科理例	水二鍾姜三片棗二枚煎七分食遠服	二百 三八清咽利膈湯 治積熱咽喉腫痛痰涎壅盛或胸膈	不利煩躁飲冷大便秘結	金銀花 防風 荊芥 薄荷 桔梗 炒	黃芩 炒 黃連 炒各錢半 山梔 炒研 連翹 各一錢 玄參	大黃 煨 朴硝 牛旁子 炒 甘草 各七分	水二鍾煎一鐘食後服	二百 三九刺少商穴法 穴在手大指內側去爪甲如韭葉刺



入二分許以手自臂勒至刺處出血則消若重者及	膿成者必須患處否則不治	二百 四十承氣湯 治腸胃積熱口舌生瘡或齩作痛	大黃 煨 甘草 朴硝 各一錢	水鍾半煎七分食前服	二百 一人參固本丸 治肺氣燥熱作渴或小便短赤如淋	此治虛而有火之聖藥也	生地黄 酒拌 熟地黄 酒洗 天門冬 去心 麥門冬 去心各一兩	欽定四庫全書 外科理例	人參 五錢	除人參為末餘藥搗膏加煉蜜少許丸梧子大每服	五十丸空心鹽湯或溫酒下中寒人不可服	二百 四二消毒犀角飲子 治班或癰癤瘡癢或作痛及風熱	瘡毒	荊芥 防風 各錢半 甘草 三分 牛蒡子 二錢	水一鍾煎五分徐徐服	二百 四三解毒防風湯 治班或癰癤瘡癢或痛



防風 一錢 地骨皮 黃耆 芍藥 荊芥	枳殼 各二錢炒	水一鍾煎五分徐徐服	二百四 砭法 治小兒丹毒色赤遊走不定用細磁器擊碎	取有鋒芒者一塊以筋一根劈開頭尖夾之以線縛	定兩指輕撮筋稍令磁器芒者正對患處懸寸許再	用筋一根頻擊筋頭令毒血遇刺皆出却以神功散	敷之毒入腹者不救	欽定四庫全書 外科理例	二百四 草薺湯 治楊梅瘡不問新舊潰爛筋骨作痛並效	川草薺 俗呼土茯苓 每用二兩水三鍾煎二鍾去渣不拘	時徐徐溫服若患久或服攻擊之劑致傷脾胃氣血	者以此一味為主而加以兼證之劑	二百四 雙解散 治便癰內蘊熱毒外挾寒邪或交感強固	精氣致精血交錯腫結疼痛大小便秘宜此通解更	隨症調治	辣桂 大黃 酒拌炒 白芍 澤瀉 牽牛 炒杵



杏仁去皮 甘草炙 乾姜炮各五分	水二鍾煎八分空心服	二百 七八正散 治積熱小便不通及淋症脉實	大黃酒拌炒 車前子炒 瞿麥 篇蓄 山梔仁炒	木通 甘草各一錢 活石煨二錢	水二鍾煎八分食前服	二百 八導水丸 治便癰初起腫痛及下疳大小便秘又治	楊梅瘡初起濕盛之際宜先用此數服	欽定四庫全書 外科理例	大黃酒拌炒 黃芩炒各二錢 黑丑末炒 活石煨各四錢	為末糊丸梧子大每服五十丸臨卧溫水下	二百 九托裏當歸湯 治潰瘍氣血俱虛發熱及瘰癧諸癰	不問腫潰皆宜服之久服能斂瘡口	當歸酒拌 黃耆鹽水拌炒 人參 熟苳酒拌 川芎	芍藥炒各一錢 柴胡 甘草炙各五分	水二鍾煎八分食遠服	二百 五十加減龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱玉莖患瘡或便毒



二百 五 一 胃苓散	猪苓 澤瀉 白朮 茯苓 蒼朮	欽定四庫全書 外科理例	厚朴 陳皮 甘草 肉桂 各一 各五	水二鍾姜三片棗二枚煎八分服	二百 五 二 當歸郁李仁湯 治痔漏大便結硬大腸下墜出血	苦痛難忍	歸尾 酒拌 郁李仁 澤瀉 生苳 大黃 煨	枳實 蒼朮 秦艽 麻黃仁 皂角 各一 錢半 一錢另研細末	水二鍾煎八分入皂角末空心服	二百 五 三 秦艽防風湯 治痔漏結燥每大便作痛



藜蘆 防風 當歸 酒拌 白朮 各錢 黃柏 陳皮 柴胡 大黃 煨 澤瀉 各一錢 紅花 桃仁 去皮 升麻 甘草 炙各五分 水二鍾煎八分空心服 二百四 加味四君子湯 治痔漏下血面色痿黃心忪耳鳴	脚弱氣乏及脾胃虛口淡食不知味又治中氣虛不能攝血致便血不禁	人參 白朮 炒 茯苓 黃耆 炙 白扁豆 蒸	欽定四庫全書 外科理例	甘草 炙各等分	為末每服三錢滾白湯點服	二百五 除濕和血湯 治陽明經濕熱便血腹痛	生地黄 牡丹皮 生甘草 各五分 熟甘草 黃耆 炙各一錢	白芍 錢半 升麻 七分 歸身 酒拌 蒼朮 藜蘆	陳皮 肉桂 熟苧 酒拌各三分	水二鍾煎八分空心俟宿食消盡熱服	二百五 槐花散 治腸風藏毒下血



槐花 生地黃 酒拌 青皮 白木	荊芥蕙 各六分 川芎 四分 歸身 酒拌 升麻 各一錢	為末服三錢空心米飲調下水煎亦可	五七參苓白朮散 治脾胃不和飲食不進或嘔吐泄瀉	凡大病後皆宜服此以調理脾胃	人參 茯苓 白朮 炒 連肉 去心	白扁豆 去皮姜汁拌炒 砂仁 炒 桔梗 炒	山藥 甘草 炙 薏苡仁 炒各二兩	欽定四庫全書 外科理例	細末每服三錢石菖蒲煎湯下	五八小烏沉湯 治氣不調和便血不止	烏藥 一兩 甘草 炙二錢 香附 醋製四兩	每服二錢食前鹽湯下	五九枳殼散 治便血或婦人經候不調手足煩熱夜多	盜汗胸膈不利	枳殼 麸炒二錢 半夏曲 赤芍藥 炒各一錢 茈蒞 黃芩 炒各錢半 水二鍾姜三片棗二枚煎八分食遠服



二百 六十芎歸湯 治便血或失血過多眩暈	芎藭 當歸 酒拌各五錢	二百 水鍾半煎六分食後服	二百 一如神千金方 治痔無有不效	二百 水澄膏 治痔護肉	二百 桔藥 已上三方俱見前痔瘡條下	二百 連翹飲子 治乳內結核服數劑不消宜兼服八珍	湯初起有表症者宜先解表	欽定四庫全書 外科理例	連翹 川芎 瓜蒌仁 研 皂角刺 炒 甘草節	橘葉 青皮 去白 桃仁 各一錢半	水二鍾煎一鍾食遠服	二百 六五復元通氣散 治乳癰便毒腫痛及一切氣滯腫毒	如打撲傷損閃肭作痛及疝氣尤效	木香 茴香 炒 青皮 去白 陳皮 川山甲 蘇炒	白芷 甘草 漏蘆 貝母 去心各等分	為末每服三錢溫酒調下



														欽定四庫全書		外科理例	