

欽定四庫全書

子部

先醒齋廣筆記卷一

評校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勣

總校官檢討臣何思鈞

校對官編修臣勵守謙

謄錄監生臣卞敬修



欽定四庫全書

子部五

先醒齋廣筆記

醫家類

提要

臣

等謹案先醒齋廣筆記四卷明繆希雍撰

希雍字仲醇常熟人明史方技傳附見李時

珍傳中天啟中王紹徽作點將錄以東林諸

人分配水滸傳一百八人姓名稱希雍為神

醫安道全以精於醫理故也是編初名先醒

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

齋筆記乃長興丁元薦取希雍所用之方裒

為一編希雍又增益羣方兼采本草常用之

藥增至四百餘品又增入傷寒溫病時疫治

法故曰廣筆記希雍與張介賓同時介賓守

法度而希雍頗能變化介賓尚溫補而希雍

頗用寒涼亦若易水河間各為門徑實各有

所得力朱國禎湧幢小品記天啟辛酉國禎

患膈病上下如分兩截中痛甚不能支希雍





先醒齋廣筆記自序

予既不事王侯獨全微尚幽棲自遂遠於塵累以保天  
年然無功及物亦豈道人之懷乎於是蒐輯醫方精求  
藥道用存利濟隨所試效病家藏之好事者抄錄轉相  
授受復多獲驗先是長興丁客部長孺手集予方一冊  
命之曰先醒齋筆記梓行於世板留巖邑未便流通交  
游中多索此書者卒無以應予適旅泊金沙文學莊君  
斂之時時過從請增益羣方兼采本草常用之藥增至  
四百餘品詳其修事又增入傷寒溫病時疫治法要旨  
併屬其季君葭之鏤板流行傳之遠邇庶窮鄉僻邑舟  
次旅邸偶乏明醫俾病者按方施治以瘳疾苦則是書  
或有補於世也夫斂之曰善時天啓二年歲次壬戌仲  
冬既望東吳繆希雍自序

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記



欽定四庫全書

先醒齋廣筆記卷一

明 繆希雍 撰

中風

治法大畧

凡言中風有真假內外之別差之毫釐謬以千里何者  
西北土地高寒風氣剛猛真氣空虛之人猝為所中中  
臟者死中腑者成廢人中經絡者可調理而瘳治之之

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

道先以解散風邪為急次則補養氣血此真中外來風  
邪之候也其藥以小續命湯桂枝麻黃生熟附子羌獨  
活防風白芷南星甘草之屬為本若大江已南之東西  
兩浙七閩百粵兩川滇南鬼方荆揚梁三州之域天地  
之風氣既殊人之所稟亦異其地絕無剛猛之風而多  
濕熱之氣質多柔脆往往多熱多痰真陰既虧內熱彌  
甚煎熬津液凝結為痰壅塞氣道不得通利熱極生風  
亦致猝然僵仆類中風證或不省人事或言語謇澁或



口眼歪斜或半身不遂其將發也外必先顯內熱之候  
或口乾舌苦或大便閉澀小便短赤此其驗也劉河間  
所謂此證全是將息失宜水不制火丹溪所謂濕熱相  
火中痰中氣是也此即內虛暗風確係陰陽兩虛而陰  
虛者為多與外來風邪迥別法當清熱順氣開痰以救  
其標次當治本陰虛則益血陽虛則補氣氣血兩虛則  
氣血兼補久以持之設若誤用治真中風藥如前種種  
風燥之劑則輕變為重重則必死禍福反掌不可不察

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

也初清熱則天門冬麥門冬甘菊花白芍藥白茯苓括  
婁根童便順氣則紫蘇子枇杷葉橘紅鬱金開痰則貝  
母白芥子竹瀝荆瀝括婁仁次治本益陰則天門冬甘  
菊花懷生地當歸身白芍藥枸杞子麥門冬五味子牛  
膝人乳白膠黃柏白蒺藜之屬補陽則人參黃耆鹿茸  
大棗

乙卯春正月三日子忽患口角歪斜右目及右耳根俱  
痛右頰浮腫仲淳曰此內熱生風及痰也治痰先清火



錢三 貝母 錢三 黃柏 五一分錢 括婁根 錢二 五味子 分七 鮮沙參 錢三 玄	天門冬 錢三 麥門冬 錢五 真蘇子 五分錢 廣橘紅 五分錢 白茯苓	二月十二日定方	分八 河水三鍾煎一鍾飢時服	錢二 黃柏 五分錢 甘菊花 五分錢 鮮沙參 錢三 廣橘紅 錢二 五味子	甘草 錢一 貝母 錢二 括婁根 錢二 蓮肉 粒四十 酸棗仁 錢六 真蘇子	天門冬 錢三 麥門冬 錢五 生地黄 錢五 白芍藥 錢四 牛膝 酒蒸 錢五	正月廿二日定方 初日進二劑後每日一劑	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	白藕荳 粒四十 加蓮肉 錢二 乾葛 分八 十八日去連翹天麻乾葛	五味子 分七 白藕荳 錢二 乾葛 分八 十八日去連翹天麻乾葛	錢三 初十加牛膝 錢四 黃柏 錢二 十三日去連翹加石斛 錢三 五分	膠四五錢飢時服日二劑初四至初九日加懷生地黄	連翹 錢二 河水二鍾半煎一鍾加竹瀝童便各一杯霞天	冬 錢五 白芍藥 錢四 甘草 分七 鮮沙參 錢三 明天麻 錢一 甘菊花 錢三	真蘇子 錢三 廣橘紅 錢三 括婁根 錢三 貝母 錢四 天門冬 錢三 麥門冬	清火先養陰最忌燥劑
--	---	---------	------------------	--	--	--	-----------------------	------------------	---	--	--	-----------------------	--------------------------------	---	---	-----------



兩	二	鐵	兩	二	蒸	肉	人	二	二	牛	蒼	胡	九	升	去	藥	參	
鹿	白	川	牛	沙	杞	八	參	黃	欽	膝	朮	麻	方	覺	玄	牛	甘	
角	茯	牛	膝	苑	子	兩	去	定	如	二	仁	三	升	浮	參	錢	錢	
霜	苓	膝	去	蒺	同	兩	蘆	四	法	二	黑	即	即	火	加	四	二	
飛	拌	去	十	藜	酒	兩	人	庫	二	又	芝	桑	去	上	石	錢	五	
麩	炒	十	兩	一	浸	兩	乳	全	二	拌	蔞	葉	之	三	斛	五	二	
十	研	兩	天	打	乾	兩	浸	書	二	凡	三	酒	三	錢	三	蓮	分	
二	如	兩	門	糊	十	兩	飯	先	二	三	洗	拌	二	至	六	肉	錢	
兩	乳	兩	冬	和	兩	兩	上	時	二	次	淨	蒸	五	五	十	粒	一	
鹿	黃	六	六	藥	兩	兩	五	合	二	蒸	刮	何	月	月	日	十	錢	
茸	柏	兩	蓮	末	兩	兩	味	成	二	時	去	首	盡	後	後	日	五	
毛	蜜	兩	肉	一	兩	兩	子	病	二	須	皮	烏	病	去	去	後	分	
切	炙	兩	去	半	兩	兩	蒸	中	二	烘	拌	三	始	括	括	日	錢	
片	砂	兩	塊	兩	兩	兩	烘	仲	二	晒	黑	九	全	婁	婁	三	五	
酥	仁	兩	瓦	兩	兩	兩	乾	淳	二	極	豆	蒸	愈	根	根	月	錢	
炙	炒	兩	器	兩	兩	兩	十	以	二	乾	又	九	二	三	三	廿	四	
菟	二	兩	內	兩	兩	兩	兩	如	二	氣	拌	蒸	錢	月	月	八	錢	
絲	懷	兩	炒	兩	兩	兩	兩	法	二	方	至	九	服	廿	廿	日	四	
子	生	兩	焦	兩	兩	兩	兩	去	二	透	一	晒	二	八	八	日	錢	
末	地	兩	黃	兩	兩	兩	兩	骨	二	蒸	倍	人	劑	日	日	日	四	
兩	二	兩	忌	兩	兩	兩	兩	兩	二	二	兩	兩	反	日	日	日	錢	
八	十	兩	六	兩	兩	兩	兩	兩	二	兩	兩	兩	反	日	日	日	錢	





加甘菊花 <small>六兩</small> 煉蜜同蒺藜糊和丸如梧子大每六錢空	心飢時各一服淡鹽湯吞	治右半身不遂 <small>右屬氣虛</small>	白蒺藜 <small>炒去刺</small> 甘菊花何首烏 <small>如法</small> 黃耆 <small>蜜炙</small> 天門冬 <small>去心</small> 麥	門冬 <small>去心</small> 人參 <small>去蘆</small> 漆葉 <small>酒拌九蒸九晒各一觔</small> 白茯苓 <small>澄水</small> 白芍藥 <small>炒酒</small>	牛膝 <small>去蘆酒蒸</small> 川續斷 <small>十兩</small> 橘紅 <small>八兩</small> 煉蜜丸梧子大空心	白湯下忌食白菜菹牛肉牛乳若在左者屬血虛宜	加當歸身熟地黄鹿角膠柏子仁 <small>各觔許</small> 杜仲 <small>八兩酥炙</small> 如	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	火盛多痰肺經有熱者去人參加青蒿子鱉甲 <small>各十兩</small> 如	左右臂俱轉掉不便者亦用此方	王宇泰治臧位宇氣虛痰多脾胃有濕晚年半身不遂	神效	人參 <small>一觔</small> 半夏 <small>二觔</small> 薑汁 <small>竹瀝製</small> 白朮 <small>半觔</small> 牛膝 <small>一觔</small> 天門冬 <small>一觔</small> 懷	生地 <small>一觔</small> 用長流水煎成膏再入鹿角膠 <small>一觔</small> 虎骨膠 <small>一觔</small> 霞	天膠 <small>一觔</small> 河間府黎膏 <small>一觔</small> 煉蜜 <small>二觔</small> 各製膏和勻重湯煑一	日夜出火氣每空心臨卧取半酒杯以竹瀝梨汁各二
---	------------	----------------------------	--	---	--	----------------------	---	------------------	---	---------------	-----------------------	----	---	---	---	-----------------------



杯人乳桑瀝各一杯和勻重湯頓熱調服  
寒

傷寒時地議并六經治法

夫傷寒者大病也時者聖人所不能違者也以關乎死  
生之大病而藥不從時顧不殆哉仲景醫門之聖也其  
立法造論後之明師如華佗孫思邈輩莫不宗之漢末  
去古未遠風氣猶厚形多壯偉氣尚敦龐其藥大都為  
感邪即病而設况南北地殊厚薄不侔故其意可師也

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

其法不可改也循至今時千有餘年風氣澆矣人物脆  
矣况在荆揚交廣梁益之地與北土全別故其藥則有  
時而可改非違仲景也實師其意變而通之以從時也  
如是則法不終窮矣故作斯議備列其方稍為損益以  
從時地俾後之醫師知所適從庶幾患斯疾者可免於  
夭枉爾

辨驗外感真偽法

凡外感必頭疼其疼也不間晝夜探其舌本必從喉嚨



內乾出於外多兼煩躁不煩躁者即輕證也不頭疼而發熱不發熱而頭疼頭雖疼而有時暫止口雖乾而舌本不燥骨雖疼而頭不疼雖渴而不欲引飲至夜或偶得寐遇食不好亦不惡居處雖若尪怯而神氣安靜凡若此者皆非傷寒也

### 三陽治法總要

太陽病 其證發熱惡寒惡風頭痛項強腰脊強遍身骨痛脉雖浮洪而不數多不傳經煩躁脉數急者是欲

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

傳經宜先發汗以解表邪 其藥以羌活湯為主羌活

三錢前胡二錢甘草八分葛根二錢生薑三片棗二枚

杏仁九粒去皮尖  
研爛水煎服秋深冬月應用此方亦可量

加紫蘇葱白如冬月天氣嚴寒感邪即病服此藥不得

汗本方加麻黃一錢生薑四片共前七片得汗勿再服

如病人自覺煩躁喜就清涼不喜就熱兼口渴是即

欲傳入陽明也若外證頭疼遍身骨疼不解或帶口渴

鼻乾目疼不得卧即係太陽陽明證羌活湯中加石膏



知母麥冬大劑與之得汗即解 如自汗煩躁頭疼遍  
身骨疼不解者羌活一錢桂枝七分石膏一兩二錢麥  
冬六錢知母三錢竹葉一百二十片白芍藥二錢甘草  
八分 如冬月即病太陽證惡寒畏風頭疼遍身骨疼  
自汗不渴宜用桂枝八分芍藥二錢甘草一錢大棗二  
枚生薑一片 太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自  
下者愈其外證不解者不可下當先解表表證罷少腹  
急結者乃可下之桃仁承氣湯無蓄血證大承氣湯

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

正陽陽明病正陽陽明者胃家實是也 其證不大便  
自汗潮熱口渴咽乾鼻乾嘔或乾嘔目眴眴不得眠畏  
人聲畏木聲畏火不惡寒反惡熱或先惡寒不以旋發  
熱甚則譫語狂亂循衣摸床脉洪大而長宜急解其表  
用竹葉石膏湯大劑與之不嘔無汗與葛根湯亦須大  
劑若表證已罷脉緩小便利是病解矣 若表證罷後  
邪結於裏大便閉小便短赤宜用調胃承氣湯或小承  
氣湯下之下後按其腹中不作痛而和病即已解如作



痛是燥糞未盡也再用前藥下之以腹中和二便通利	為度 陽明病不能食若其人本虛勿輕議下 陽明	病頭眩欬而咽痛者用葛根甘草桔梗麥冬四味濃煎	數數與之 陽明病無汗小便不利心中懊懣者當發	黃急用梔子麥冬淡豆豉大劑濃煎與之如已見身黃	急加茵陳為君主之 陽明病衄血此緣失於發汗宜	用荊芥二錢葛根三錢麥冬五錢牡丹皮一錢五分蒲	黃二錢茅根二兩側柏葉二錢生地黄三錢濃煎與之	欽定四庫全書	先醒齋廣筆記	兼飲童便 陽明病心下硬滿者此邪未入於腹中慎	勿下之用竹葉石膏湯加括婁一個搗碎桔梗二錢黃	連一錢 陽明病邪結於裏汗出身重短氣腹滿而喘	潮熱手足濇然汗出者此大便已鞭也六七日已來宜	下之用小承氣湯不行換大承氣湯勿大其劑若大便	不鞭者慎勿輕下 陽明病發汗不解腹滿急者亟下	之 傷寒六七日目中不了了睛不和無表證大便難	宜承氣湯下之 陽明病下之早外有熱手足溫不結
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



胃心中懊憹不能食但頭汗出梔子豉湯主之 陽明  
病發潮熱大便澹胸滿不去者與小柴胡湯去人參加  
括婁黃連 陽明病自汗出或發汗後小便利津液內  
竭大便雖硬不可攻之須俟其自大便用蜜導或膽導  
法通之 大下後六七日不大便煩不解腹滿痛本有  
宿食宜再用承氣湯下之 食穀欲嘔屬陽明非少陽  
也胸中煩熱者竹茹湯主之竹茹三錢麥冬五錢枇杷  
葉三大片蘆根三兩內無熱證者小便利口不渴此為

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

陽明虛也吳茱萸湯主之吳茱萸二錢人參三錢生薑  
一錢五分大棗三枚水煎日三服 凡陽明病多汗津  
液外出胃中燥大便必鞕鞕則譫語以小承氣湯下之  
若一服譫語止者勿再服 陽明譫語發潮熱脉滑而  
數者小承氣湯主之服藥後腹中轉氣者更與一服若  
不轉氣者勿更與之若服藥後次日不大便脉反微瀋  
者裏虛也為難治勿復議下 陽明病下血譫語者此  
為熱入血室汗止在頭用荆芥三錢葛根三錢黃芩一



錢五分麥冬五錢牡丹一錢五分生蒲黃二錢濃煎以	童便對飲之 陽明病脉浮緊咽燥口苦腹滿而喘發	熱汗出惡熱身重若下之則胃中空虛客氣動膈心中	懊懣舌上有胎者梔子豉湯主之 若渴欲飲水舌燥	者白虎湯加人參主之 若脉浮發熱口渴小便不利	者猪苓湯主之 陽明病協熱下利者宜六一散心下	痞者以黃連括婁湯調服之 脉浮遲表熱裏寒下利	清穀者四逆湯主之附子乾薑甘草 跌陽脉浮而漇	欽定四庫全書	先醒齋廣筆記	小便數大便鞭其脾為約麻子仁丸主之麻仁十二兩	芍藥四兩枳實四兩大黃八兩厚朴三兩杏仁六兩蜜	丸如梧子大每用十九日三服 陽明實則譫語虛則	鄭聲鄭聲者重語也直視譫語喘滿者死下利者亦死	發汗多若重發其汗譫語脉短者死脉和者不死	若吐若下後不解不大便五六日或至十餘日日晡時	發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循	衣妄撮惕而不安微喘直視脉弦者生瀋者死
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------



也脉微者但發熱譫語者大承氣湯下之利勿再服 陽

明病發狂棄衣而走登高而歌此陽明實也以承氣湯

亟下之如便不結者大劑白虎湯灌之石膏四兩麥冬

二兩知母一兩五錢加大青一兩甘草七錢太陽陽明

病協熱下利者宜六一散以黃連煎湯調服之 太陽

陽明并病六七日表證仍在其人發狂者以熱在下焦

少腹當硬滿小便自利下其血乃愈當用桃仁承氣湯

又二陽并病太陽證罷潮熱汗出大便難譫語者宜

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

### 大承氣湯

少陽病 其證口苦咽乾眩往來寒熱脇滿胸痛滿或

痛耳聾脉法弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗

發汗則譫語胃和者當自愈不和者則煩而悸 傷寒

三日少陽脉小者欲已也 凡太陽病不解傳入少陽

者脇下鞭滿乾嘔不能食往來寒熱未經吐下脉沉緊

者與小柴胡湯柴胡二錢四分人參九分黃芩九分甘

草九分半夏一錢五分生薑九分大棗二枚水煎溫服





日三 加減法 若胸中煩而不嘔去半夏人參加括	婁實一枚 若脇下痞鞭去大棗加牡蠣二錢半 若	渴者去半夏加人參括婁根 若腹中痛者去黃芩加	芍藥三錢 若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓二	錢 若不渴外有微熱者去人參加桂一錢 <small>夏勿用</small> 溫覆	取微汗愈 若效者去人參大棗加五味子一錢少佐	以乾薑 陽明少陽并病必下利脉滑而數有宿食也	當承氣湯下之 若已吐下發汗溫針譏語柴胡湯證	欽定四庫全書 <small>先醒齋廣筆記</small>	罷此為壞病知犯何逆以法治之 三陽合病脉浮大見	關上但欲睡眠目合則汗藥用百合一兩麥門冬五錢	炙甘草一錢知母二錢竹葉五十片括婁根二錢鱉甲	如法三錢白芍藥二錢 三陽合病腹滿身重譏語遺	尿白虎湯加百合主之 傷寒六七日無大熱其人煩	躁者此為陽去入陰故也 傷寒三日三陽為盡三陰	當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也	三陰治法總要
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------



三陰病其證有二一者病發於三陽不時解表以致邪熱傳入於裏雖云陰分病屬於熱糞結宜下腹滿不可按宜下有燥糞協熱下利宜下腹痛下利宜芍藥黃芩炙甘草以和之如便膿血即加滑石黃連佐以升麻乾葛如邪雖入裏糞猶未結宜清其熱渴者用白虎湯竹葉石膏湯不渴或心下痞者宜黃連黃芩芍藥枳殼麥冬括婁輩以清之或邪未結於下焦少腹不堅痛而誤用芒硝以伐真陰洞泄不已元氣將脫宜用人參

欽定四庫全書  
先醒齋廣筆記

白朮炙甘草大棗乾薑芍藥大劑與之不止佐以升提升麻葛根柴胡之類

若從無陽邪表證從不頭疼發熱寒邪直中陰經此必元氣素虛之人或在極北高寒之地始有是證法宜溫補以接其陽附子人參乾薑官桂大劑與之陽回寒退即以平補之劑調之勿過用桂附以防其毒

三陰各經見證悉從仲景傷寒論法治之如少陰咽痛咽中生瘡聲不出用苦酒湯到咽即效故知古人立法



非今人可及也

春溫夏熱病大法

冬傷於寒至春變為溫病大都頭疼發熱或渴或不渴  
三陽證俱然亦間有先微寒後即發熱者大抵發熱其  
常也藥用辛溫佐以辛寒以解表邪太陽宜羌活湯陽  
明宜白虎湯無汗不嘔者間用葛根湯少陽往來寒熱  
等證不可汗吐下宜和解小柴胡湯渴者去半夏加括  
婁根耳聾熱盛去人參加麥冬知母括婁根渴亦加之

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

至夏變為熱病其表證大約與春溫同但熱比於溫則  
邪氣更烈耳解表用白虎湯竹葉石膏湯有太陽證則  
加羌活有少陽證則加柴胡黃芩如發斑白虎湯竹葉  
石膏湯加玄參梔子桔梗鼠粘連翹大青小青青黛大  
劑與之二證若大便秘宜按之其邪已結於內便鞭宜  
察邪結中焦小承氣湯調胃承氣下之邪結下焦少腹  
堅痛始用大承氣湯下之  
傷寒溫疫其不可治及難治者皆屬下元虛



傷寒溫疫三陽證中往往多帶陽明者以手陽明經屬大腸與肺為表裏同開竅於鼻足陽明經屬胃與脾為表裏同開竅於口凡邪氣之入必從口鼻故兼陽明證者獨多

邪在三陽法宜速逐遲則胃爛發斑或傳入於裏則屬三陰邪熱熾者令陰水枯竭於法不治矣此治之後時之過也

近代醫師鹵莽既不明傷寒治法又不識雜證類傷寒

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

往往妄投汗下之藥以致虛人元氣變證叢生元氣本虛之人未有不因之而斃者矣戒之哉汗下之藥焉可嘗試也

時氣傷寒 除陰症不可服

苦參一兩水酒各一碗煎八分重者水醋各半服之一汗

而愈不論傷寒以近立效本草云天行尤良

史鶴亭太史丁亥春患瘟疫頭痛身熱口渴吐白沫晝

夜不休醫師誤謂太史初罷官歸妄投解鬱行氣藥不



效又投以四物湯益甚諸醫謝去謂公必死遣使迎仲	淳至病二十餘日矣家人具以前方告仲淳曰誤也瘟	疫者非時不正傷寒之謂發于春故謂瘟疫不解表又	不下使熱邪彌留腸胃間幸元氣未盡故不死亟索淡	豆豉 <small>約二合</small> 許炒香麥門冬 <small>兩</small> 許知母 <small>錢數</small> 石膏 <small>兩</small> 許一劑大汗而解	時大便尚未通太史問故仲淳曰昨汗如雨邪盡矣第	以病津液未回故大便不通此腸胃燥非有邪也今日	食甘蔗二三株兼多飲麥門冬湯不三日去燥糞六十	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	餘塊而愈	章衡陽銓部患熱病病在陽明頭痛壯熱渴甚且嘔鼻	乾燥不得眠診其脉洪大而實仲淳故問鑿師鑿師曰	陽明證也曰然問所投藥曰葛根湯仲淳曰非也曰葛	根湯非陽明經藥乎曰陽明之藥表劑有二一為葛根	湯一為白虎湯不嘔吐而解表用葛根湯今吐甚是陽	明之氣逆升也葛根升散故用之不宜白虎湯硬石膏	知母甘草加麥門冬竹葉名竹葉石膏湯石膏辛能解
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



肌鎮墜能下胃家痰熱肌解熱散則不嘔而煩躁壯熱  
皆解矣遂用大劑竹葉石膏湯疏方與之且戒其仲君  
曰王翦取荆非六十萬人不可李信二十萬足矣臨別  
去囑曰斯時投藥五鼓瘥天明投藥朝瘥已而果然  
或謂嘔甚不用半夏何也仲淳曰半夏有三禁渴家汗  
家血家是也病人渴甚而嘔是陽明熱邪熾盛劫其津  
液故渴邪火上升故嘔半夏辛苦溫而燥有毒定非所  
宜又疑其不用甘草何也曰嘔家忌甘仲景法也

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

高存之隣人賣腐者傷寒發噦兩日夜不省人事其子  
乞方仲淳問曰汝父當時曾頭疼身熱乎曰然曰曾服  
汗藥乎曰未也曾吐下乎曰未也仲淳因索傷寒書檢  
之其方類用乾薑柿蒂丁香及附子等溫熱之藥末條  
僅載白虎湯一方仲淳思之曰傷寒頭痛身熱口渴本  
屬陽明熱邪傳裏故身涼發噦未經汗吐下邪何從而  
出第其人年老多作勞故于白虎湯加人參三錢二劑立  
起



于潤父夫人娠九月患傷寒陽明證頭疼壯熱渴甚舌  
上黑胎有刺勢甚危仲淳投竹葉石膏湯索白藥子馬鑿  
者病不得即以井底泥塗臍上乾則易之一日夜盡石膏

十五兩五錢病瘳越六日產一女母子並無恙

存之一家人婦傷寒來乞方仲淳已疏方與之矣見其

人少年問曰若曾病此乎曰然曰愈幾日而妻病曰八

九日曰曾有房慾否曰無之仲淳故曰若有房慾此方

能殺人也其人即置方不取遂以禪襠雄鼠糞麥冬韭

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

白柴胡二劑勢定更用竹皮湯二三劑全愈

姚平子傷寒頭疼身熱舌上胎胸膈飽悶三四日熱不

解奄奄氣似不屬者一鑿以其體素弱病从虛甚意欲

投參少許仲淳叱曰參一片入口死矣亟以大黃一兩瓜

萋二枚連子切片黃連枳實下之主人驚疑不得已減大

黃之半二劑便通熱立解遂愈

張太學璇浦內人患熱入血室發狂欲殺人白下醫以

傷寒治之煎藥未服陳錫玄邀仲淳往診仲淳云不可



服其藥投一劑而安先與童便繼與涼血行血安心神藥遂定

翁文學具茨感冒壯熱舌生黑胎煩渴勢甚劇時稽勳諸昆仲環視揮涕羣醫束手仲淳以大劑白虎湯一劑立甦或問仲淳治傷寒有秘法乎仲淳云熟讀仲景書即秘法也

白虎湯中曾加人參三錢

四明虞吉卿因三十外出疹不忌猪肉兼之好飲作泄八載矣忽患傷寒頭痛如裂滿面發赤舌生黑胎煩躁

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

口渴時發譫語兩眼不合者七日洞泄如注較前益無度其尊人虞仰韶年八十二矣客寓莊斂之處方得長郎凶問懷抱甚惡膝下止此一子坐待其斃腸為寸裂斂之向余曰此兄不祿仰韶必繼之即不死八十二老人挾重貲而聽其扶櫬東歸余心安乎萬一有此惟有親送至鄞耳余聞其語為之惻然急往診其脉洪大而數為疏竹葉石膏湯方因其有腹瀉之病石膏止用一兩病初不減此兄素不謹良一友疑其虛也云宜用肉





桂附子斂之以其言來告余曰誠有是理但余前者按  
脉似非此證豈不數日脉頓變耶復往視其脉仍洪大  
而數余曰此時一投桂附即發狂登屋必不揀矣一照  
前方但加石膏至二兩斂之曰得毋與泄瀉有妨乎余  
曰熱邪作祟此客病也不治立殆渠泄瀉已八年非暴  
病也治病須先太甚急治其邪徐并其夙恙除之急進  
一劑夜卧遂安即省人事再劑而前惡證頓去不數劑  
霍然但瀉未止耳余為疏脾腎雙補丸方更加黃連乾  
欽定四庫全書  
先醒齋廣筆記  
葛升麻以痧痢法治之不一月瀉竟止八載沉疴霍然  
失仰韶耄矣別余歸老拜謝垂涕謂父子得以  
皆余賜也  
莊斂之一庄僕因受寒發熱頭痛如裂兩目俱痛渾身  
骨內疼痛下元尤甚狀如刀割不可堪忍口渴甚大便  
日解一次胸膈飽脹不得眠已待斃矣斂之以其證來  
告為疏一方乾葛三錢石膏一兩麥門冬八錢知母三錢羌  
活二錢大括婁半個連枳殼一錢桔梗一錢竹葉一百片河水



煎服四劑而平此太陽陽明病也貧人素多作勞故下  
體疼痛尤甚以羗活去太陽之邪石膏竹葉乾葛知母  
麥門冬解陽明之熱括婁枳殼桔梗疏利胸膈之留邪  
故遂愈

一奴傷寒熱解後復下血不止主人以痢藥投之更甚  
仲淳云此傷寒失汗之餘症也用地榆麥門冬知母竹  
葉以代仲景諸血證藥遂愈

常熟吳見吳在京邸時有小青衣患傷寒愈而復復而  
欽定四庫全書  
先醒齋廣筆記

愈愈而再復不知其幾趙文肅公謂仲淳曰此非兄不  
能救他人亦不肯往仲淳亟馳診之病人面色黃白六  
脉微弱大便不通胸中不快亦不思食曰此為傷寒百  
合壞證之餘邪且退矣胸中不快虛而氣壅非實邪也  
不大便者以病津液枯氣弱不能送也投以人參

門冬兩枳殼錢炒盡劑立解而瘥

莊斂之一僕因傷寒後勞復發熱頭痛腹內作瀉勢甚

危急余為疏方山梔仁錢四枳實錢二豆豉兩一川黃連錢二乾



<p>葛<small>錢三</small>調六一散五錢服二劑熱退瀉止頭痛亦愈但不</p>	<p>思飲食為去山梔枳實黃連加鱉甲<small>錢四</small>炙甘草<small>二錢半</small>麥</p>	<p>門冬<small>錢五</small>不數劑而愈</p>	<p>梁谿一男子素虛春中感冒頭痛肌痛發熱羗活<small>錢二</small>麥</p>	<p>門冬<small>錢三</small>炙甘草<small>錢一</small>紫蘇<small>五分</small>北細辛<small>七分</small>前胡<small>五分</small>次日</p>	<p>頭痛止熱未退口渴仲淳用芍藥五味子人曰風邪未</p>	<p>退遽用酸斂何也曰因人而施爾一杯即愈麥門冬<small>錢三</small></p>	<p>甘草<small>錢一</small>括婁根<small>五分</small>乾葛<small>五分</small>桑白皮<small>錢三</small>桔梗<small>錢一</small>白芍</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>藥<small>錢一</small>五味子<small>五分</small></p>	<p>從祖近湖公少年因房勞食犬肉傷寒諸醫以其虛也</p>	<p>攻補兼施至發狂登屋奔走呼號日夜令壯夫看守者</p>	<p>幾月餘急走使延朱遠齋遠齋先命煎人參膏二觔以</p>	<p>待用潤字號丸藥數錢下之去黑糞無筭勢遂定奄奄</p>	<p>一息隣於死矣徐以參膏灌之至百二十日全瘳</p>	<p>治傷風後耳聾 仲淳定 甘菊花<small>錢二</small>石菖蒲<small>忌鐵</small>柴胡<small>六分</small>括婁根<small>錢二</small>貝母<small>去心</small>前</p>
--	--	---------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	---



胡錢一甘草六分北細辛四分蘇梗錢一桑白皮忌鐵加竹瀝一  
 杯不拘時服

趙和齋年六十患外感予以他事請見延至中堂云偶  
 因勞倦體疲正欲求教予為之診視細按其六部并察  
 其形神謂云翁病屬外邪非勞發也須着意珍重時葛  
 存誠在坐予私謂云此病是極重外感邪氣有內陷之  
 兆恐難挽回別去三日大雨中復來邀看則神氣已脫  
 脉無倫次問其所服何藥云石膏湯予云病證固重服

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

藥又差無汗發熱非陽明症何得用石膏此太陽症未  
 經發汗邪氣傳裏裏虛水涸不勝邪熱真氣已脫必不  
 可救時猶以予言為妄不兩日而斃矣

魏季嘗室產後飲食不節復感風寒遂致發熱譫語喘  
 咳氣逆惡露絕不至勢甚急迫予謂此症俱係外來客  
 邪尚屬可救設正氣虛脫現諸症者必無幸矣何以見  
 之以脉氣浮大有力故也用大劑疏風消食之藥二劑  
 便霍然先是有用白朮歸芎等補藥幾為所悞

二條附



暑

治傷暑

高存之次郎童時夏月身熱十晝夜止飲白湯諸醫汗  
之不解以麻仁丸下之熱如故惶急中仲淳忽至診曰  
此傷暑也白虎湯是其本方因誤汗下虛甚加人參  
一劑微汗瞑眩少頃熱解又疏一方防其瘧痢仍用人  
參錢二兼健脾清暑導滯之劑未幾瘧作如方飲之瘧止  
痢又作存之不得已于生脉散中加益元散飲之兒尪

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

羸甚諸醫曰數日後死矣舉家惶急禳禱紛紜仲淳復  
自松陵來存之語之故仲淳曰生脉益元散得之矣不  
診而諦視兒問糜甘否曰甘大呼曰病去矣存之且喜  
且訝兒旦夕虞不保兄言何易也仲淳曰視兒目光炯  
炯且飲食味甘是精神已王胃氣轉矣尋果脫然起  
臧玉涵子歲半盛夏咳嗽七日因浴受驚又傷食大熱  
倦頓三日不敢與藥目翳脣靈舌乾謀之仲淳曰此暑  
病也當與白虎湯玉涵曰腹瀉石膏無害乎曰先以天



水散探之服二錢少頃藥夾痰而吐微汗身涼黃昏復熱又以天水散二錢不效仲淳曰其為暑症無疑當以白虎湯加人參因兒患肺熱且止仲淳再診之曰暑邪客於皮膚分肉有熱無寒是為痺癰斷當用白虎湯連服二劑不效鼻露眼開口不納氣勢甚危叩仲淳曰此正氣不足勝邪也偶思刺癰論有云凡癰先時一食頃乃可治過時則失之也又云無刺熇熇之熱無刺渾渾之脉無刺漉漉之汗意者服藥不得時耶將前藥并劑

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

煎露一宿鷄鳴溫服之病頓失更不須調理精神漸復經年無病以此知仲淳察病望氣靈心慧眼又知服藥貴及時當早服晚投當晚服早投當熱而溫當溫而熱均失之也 此玉涵自定案

任邱裴在澗棄家逃禪持戒茹素遍遊五岳足跡幾滿天下偶客金壇寓西禪寺僧舍酷暑中坐卧小樓日持準提咒三千念佛號三萬忽患頭痛如斧劈身熱發躁口乾日飲冷水斗餘渴猶未解自分必死莊斂之憐其



旅病時過視疾一日急走倉頭召斂之永訣以所攜書  
畫玩器盡授斂之泣而言曰兄其為我收藏吾死後切  
勿用世俗禮葬我惟以兩缸盛吾尸其中以三尺地埋  
之耳斂之涕泗填胸束手無策余時將遊梁谿陽羨間  
斂之命余僕克勤相追歸視其脉知係受暑為疏竹葉  
石膏湯方斂之如方製藥躬為煎服不二劑發熱口渴  
俱止幾十劑病始退旋加健脾藥十餘帖而安

傷暑霍亂神方 包瑞溪學憲傳仲淳累驗

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

絲瓜葉片一白霜梅肉枚一并核中仁同研極爛新汲水調

服入口立瘥

又方 馬銘鞠傳

用粟米連殼搗碎煎湯溫服下口立愈屢試神效

又方 梁谿顧聖符傳

取藕豆葉搗汁一碗飲之立愈

又方

高存之家僕婦患此仲淳以砂仁一兩炒研鹽一撮沸湯調冷



定服一劑愈傷冷物者加吳茱萸

錢四

又方

用青蒿嫩葉手揉如豆大井水吞下數枚立愈

治中暑昏眩煩悶欲死

挖地深尺餘取黃土以新汲水調化飲一二甌立愈

又方

取田中泥漿塗臍上令壯者溺其上并溺口中得嚙立

起

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

治中暑大小便不通

用田螺三枚搗爛入青鹽三分攤成膏貼在臍下一寸

即愈

瘧

如發熱口渴先服此方一二劑

麥門冬

錢五

知母

蜜炙二錢

硬石膏

研細五錢

竹葉

三十片

粳米

一撮

煎八分不拘時服

治熱多作吐頭痛口渴無汗或汗少





門冬 錢五	牛膝 錢五	者前方中去白朮乾薑加鱉甲 細二錢	只用第二方加人參 錢五	生薑片 錢五	如寒熱俱甚久不止	廣陳皮白芍藥人參白芫薹山查等劑是也 如寒甚	劑方可換健脾胃藥或兼用健脾胃藥如白茯苓白朮	夏當用第一方加天花粉 錢二	倍用麥門冬知母須三四	寇末 分七	神麩 錢二	厚朴 錢一	薑汁炒	如渴甚者不可用半	三錢	去柴胡 錢三	如傷食必惡食第二方加山查 錢五	白芫	熱者第二方加黃芩 錢一	如汗多加白芍藥 酒炒三錢	黃耆	欽定四庫全書	先醒齋廣筆記	乾薑 生用一錢	柴胡 五分	當歸廣皮吳茱萸白朮 土炒各三錢	如吐嘔而寒甚者此方去柴胡當歸加人參 錢二	半夏 錢二	薑汁	錢炒一	如瀉去當歸加茯苓 錢二	如有食脾胃不健第	二方去當歸加白芫寇末 分七	如寒熱相半及先寒後	熱者第二方加黃芩 錢一	如汗多加白芍藥 酒炒三錢	黃耆	錢四	硬石膏 錢五	研細	白茯苓 錢三	橘紅 錢二	山查肉 錢二	竹茹 錢二	知母 錢二	蜜炙	麥門冬 錢二
----------	----------	---------------------	----------------	-----------	----------	--------------------------	-----------------------	------------------	------------	----------	----------	----------	-----	----------	----	-----------	--------------------	----	----------------	-----------------	----	--------	--------	------------	----------	--------------------	-------------------------	----------	----	-----	----------------	----------	------------------	-----------	----------------	-----------------	----	----	-----------	----	-----------	----------	-----------	----------	----------	----	-----------



兼前症此太陽陽明也本方加羌活 錢二 如在秋末冬	兼惡寒甚指爪色黯本方加桂枝 錢五分 頭痛骨痛又	錢三 汗多本方去乾葛加人參 虛倍之 白朮 錢三 如	錢三 橘紅 錢三 竹瀝 杯一 如嘔本方去竹葉換竹茹 錢三 橘紅	初發汗未大透本方加乾葛 錢三 痰多本方加括婁根	至四十片加 一百片 粳米 撮一 水三大碗煎一碗不拘時服 如瘧	硬石膏 細研 麥門冬 各五錢加至 知母 錢加至一兩 竹葉	陽明經瘧熱甚渴甚煩躁惡人聲惡心不眠主方	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	人參白虎湯中加桂枝素有血證及咳嗽者勿用參桂	治秋深寒熱甚而汗多者	參	加麥門冬知母竹葉白朮 以病用黃耆 虛甚加人	惡寒加薑皮甚則加桂枝 渴則加乾葛 渴甚汗多	羌活 二錢此係 太陽主藥 前胡 一分錢 猪苓 錢一 澤瀉 錢炒一 陳皮 錢二	兼陽明矣	太陽經瘧頭痛遍身骨痛項脊覺強主方如渴則
-------------------------------	-------------------------------	--	--	-------------------------------	---	--	---------------------	------------------	-----------------------	------------	---	-----------------------------	-----------------------------	--	------	---------------------





夏加石膏錢八 麥門冬錢五 竹葉片三十 每日下午別服開胃

健脾消食消痰兼除寒熱瘧邪等藥如前方

太陰脾瘧寒從中起寒甚而後熱嘔甚嘔已乃衰

主方

桂枝錢二 人參錢三 白芍藥酒炒三錢 薑皮錢三 水二鍾煎一鍾空

心飢時各一服再煎五六分下午別服開胃健脾消食

消痰兼除寒熱瘧邪藥如前方

少陰經瘧惡寒心煩而渴小便艱澁無汗躁欲去

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

衣或手足冷或欲飲水或咽痛主方

鱉甲牛膝各三錢至七錢 知母二錢至五錢 桂枝一錢至二錢 細辛五分 橘

紅錢三 白茯苓錢三 猪苓錢一 澤瀉錢一 人參三錢 薑皮錢一 火勿用有肺

參薑皮 如熱甚倍鱉甲牛膝加烏梅肉有痰加竹瀝

下午別服開胃健脾消食消痰除寒熱藥大畧如前方

厥陰經瘧色蒼蒼然善太息不樂主方

厥陰經瘧色蒼蒼然善太息不樂主方

桂枝一錢至三錢 柴胡一錢至三錢 鱉甲二錢至四錢 當歸三錢至五錢 橘



黃芩 二錢 <small>酒炒</small>	柴胡 一錢	硬石膏 二兩 <small>五錢至</small>	麥門冬 去心 <small>五錢</small>	知母 一兩
紅三錢 <small>二錢至</small>	牛膝 五錢 <small>二錢至</small>	何首烏 錢五	水三碗煎一碗空心	
飢時服	便燥及昏暈欲死本方加麥門冬竹瀝下午			
別服開胃健脾消食消痰除熱藥如前方	如有肺火			
及內熱去桂枝加知母	錢三			
治陽分間日瘧寒熱俱甚煩躁舌胎				
硬石膏 錢三	知母 錢五	麥門冬 一兩	竹葉 片一百	括婁根 錢六
貝母 錢五	廣陳皮 錢三	發日加人參 五錢 <small>有肺熱者勿用</small>	薑皮 錢一	隔夜煎
成露一宿五更服				
欽定四庫全書				
先醒齋廣筆記				
治隔一日一發先熱後寒熱少寒多午時發頭疼				
筋骨痛脣燥口乾惡心無汗後半夜涼天明頭痛				
止				
羌活 二錢 <small>頭不痛即去之</small>	乾葛 二錢 <small>五分</small>	陳皮 錢三	麥門冬 錢五	知母 錢二
生薑皮 錢二	炙甘草 五分	何首烏 錢五	水二鍾煎八分露一宿天	
明溫服				
治胎前瘧熱多口渴方				



<p>母<small>去皮蜜炙忌鐵</small>廣橘紅<small>二錢至三錢</small>白茯苓<small>三錢</small>竹葉<small>五片至十片</small></p> <p>胃虛加人參<small>二錢至三錢</small>河水二碗煎八分飢時服</p>	<p>發日五更溫服滓再煎六分并進 如熱甚寒亦甚本</p> <p>方加生薑皮<small>二錢至四錢</small>白朮<small>三錢</small></p>	<p>治胎前瘧寒甚不渴少汗方</p>	<p>人參生薑皮<small>各五錢至一兩</small>廣橘紅<small>去白二錢至四錢</small>河水二碗煎八</p>	<p>分五更溫服再煎五六分并進寒甚者陽氣虛而下陷</p>	<p>也益陽氣則寒自止邪自散矣故應多服人參如汗多</p>	<p>欽定四庫全書                  先醒齋廣筆記</p>	<p>并加黃耆<small>五錢至六錢</small></p>	<p>治產後瘧主方</p>	<p>當歸<small>三錢至五錢</small>柴胡<small>一錢</small>鱉甲<small>四錢至七錢</small>牛膝<small>一兩</small>白茯苓<small>三錢</small>廣</p>	<p>橘紅<small>三錢</small>生薑皮<small>一錢至二錢</small>乾薑<small>炒黑四分至六七分</small>水二鍾煎八分</p>	<p>露一宿五更溫服 如渴加麥門冬<small>六錢</small>竹葉<small>五十片青蒿三五錢</small></p>	<p><small>去生薑皮乾薑</small>如渴甚更加知母<small>三錢</small>括婁根<small>三錢</small>痰多并加</p>	<p>貝母<small>四錢</small>如脾胃弱加人參<small>三錢至一兩</small>元氣虛亦如之</p>	<p>有肺熱者去人參加白芍藥<small>四錢</small>如汗多加黃耆<small>二錢至五錢</small></p>
---	--	--------------------	--	------------------------------	------------------------------	---	---------------------------------	---------------	--	--	---	--	---	---



<p>錢 寒甚加桂枝 七分至一 錢二分 乾薑 炒黑 七分 亦如之并加益母草 五錢 黑豆 炒一兩 蘇木 五錢 打碎別以綿裹入藥煎</p>	<p>熱多加青蒿三四錢</p>	<p>治三日瘧寒多</p>	<p>當歸 酒洗二錢 五分 桂枝 一錢 五分 乾薑 二錢 廣陳皮 五錢 何首烏 洗淨切片</p>	<p>錢五 人參 三錢至一兩</p>	<p>治三日瘧寒熱俱甚或早晏不齊作止不一</p>	<p>鱉甲 牛膝 何首烏 廣橘紅 麥門冬 各五錢 知母</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>錢三 桂枝 一錢 五分 薑皮 三錢 無汗倍之 烏梅 一錢 去之無汗倍之 乾葛 三錢 汗多或嘔</p>	<p>水三鍾煎一鍾露一宿發日五更溫服查再煎七分餘</p>	<p>日空心飢時服 如渴加石膏兩 竹葉 五十片 渴止去之</p>	<p>氣虛加人參 五錢 如汗多加黃耆 三錢 兼便燥加歸身</p>	<p>錢五 不思食及食難化加人參 五錢 白荳蔻仁 七分 厚朴 一錢</p>	<p>分五 如泄去石膏知母竹葉倍白朮加茯苓 三錢 車前子</p>	<p>錢二 肉荳蔻 一錢 澤瀉 一錢 痰多加竹瀝一大杯</p>	<p>治三日瘧熱多渴甚</p>
---	-----------------	---------------	--	------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---	--	---	-----------------



<p>驚甲 牛膝 何首烏 麥門冬 各五錢加 知母 四錢</p>	<p>錢七 橘紅 錢五 石膏 至八錢加 竹葉 至三十片 水三大碗煎一碗</p>	<p>露一宿發日五更溫服 如惡食加青皮 醋炒一分 白荳</p>	<p>寇仁 分七 無汗或有汗而少加乾葛 錢四 汗多本方加</p>	<p>人參白朮氣虛倍加人參 如嘔本方加竹茹烏梅</p>	<p>便燥加當歸 得汗渴止去石膏乾葛下午別服開胃</p>	<p>健脾消食消痰藥如前法</p>	<p>治三日瘧寒多熱少汗少或無汗</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>人參 白朮 各五錢至一兩 橘紅 四錢至六錢 桂枝 二錢至三錢 薑皮 錢五</p>	<p>至一兩 白荳寇仁 分七 水三碗煎一碗露一宿發日五更溫</p>	<p>服渣再煎七分連進不拘時空心飢時服</p>	<p>治三日瘧陰分 黃氏姑服之立起</p>	<p>何首烏 兩一 牛膝 兩一 當歸 五錢便燥用 鱉甲 醋炙一兩 廣橘紅</p>	<p>錢三 水三鍾煎一鍾空心服立愈虛極者加人參 兩一</p>	<p>治三日瘧</p>	<p>人參 兩一 生薑皮 錢五 水二鍾煎八分空心服 于中父病</p>
-------------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------	--	--------------------------------	-------------	------------------------------------





<p>瘧初服此不效仲淳堅持此方加參至  <small>三兩</small>生薑皮  <small>兩至五</small></p> <p>錢  <small>二服即起</small></p>	<p>治瘧邪未盡而痢作者先服此方二三劑</p>	<p>鱉甲<small>三錢</small>廣陳皮<small>三錢</small>白茯苓<small>三錢</small>柴胡<small>一錢</small>白芍藥<small>三錢</small>乾葛<small>一錢</small></p>	<p>如惡寒寒熱交作加柴胡<small>二錢</small>生薑皮<small>一錢</small>如渴去</p>	<p>薑皮加寒水石<small>七錢</small>滑石<small>四錢</small>如無汗加乾葛<small>二錢</small>至<small>三四錢</small>可</p>	<p>服參者加參<small>三錢</small></p>	<p>次服方  <small>服之滯下必止</small></p>	<p>欽定四庫全書  <small>先醒齋廣筆記</small></p>	<p>乾葛<small>二錢</small>升麻<small>七分</small>蓮肉<small>十粒</small>炙甘草<small>一錢</small>烏梅肉<small>二枚</small></p>	<p>廣橘紅<small>三錢</small>白藕豆<small>二錢</small>鱉甲<small>二錢</small>白茯苓<small>二錢</small>白芍藥<small>三錢</small></p>	<p>黃芩<small>闕</small>川黃連<small>加至三錢</small>河水二鍾半煎八分調</p>	<p>水飛過滑石末<small>四錢</small>兼吞滯下丸二三服送以葛根湯或</p>	<p>蓮子湯亦佳如腹痛以炒砂仁三四錢濃湯吞滯下</p>	<p>丸</p>	<p>治久瘧不已似勞證</p>	<p>當歸<small>酒洗五錢</small>牛膝<small>酒浸五錢</small>鱉甲<small>三錢</small>何首烏<small>白採者五錢</small>廣橘</p>
--	-------------------------	--	---	--	-------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	----------	-----------------	---



紅生薑皮三錢五分柴胡一錢五分已上二味熟多貝母無汗者用有汗則去之  
水三鍾煎一鍾加竹瀝一大杯發日五更時服隔夜  
先煎露一宿臨服時再重湯頓溫 蓋瘧者暑氣為病  
也暑得露即解世鮮知者

防瘧方

夏秋不輟必無瘧矣

何首烏十二兩真茅山蒼朮十兩半夏六兩橘紅八兩人參四兩  
茯苓八兩藿香葉三兩白荳蔻仁一兩為細末米粉糊加薑  
汁丸如菉豆大每五錢下午及臨卧白湯吞

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

仲淳年十七時為瘧所苦凡湯液丸飲巫祝靡不備嘗  
終無抹於病徧檢方書迺知瘧之為病暑邪所致也經  
曰夏傷於暑秋必痎瘧遂從暑治不旬日瘳後數以意  
消息散邪之外專養胃氣痰多者消痰氣虛者補氣血  
虛者益血又分臟腑經絡各從其類以施向導即經年  
不愈者竟霍然起矣

沈少卿中丞請告時苦瘧仲淳往診之憊甚曰再一發  
死矣先生何方立止之仲淳曰何言之易也疏三方作



五劑一日夜飲盡次早瘧止先二劑清暑用大劑竹葉石膏湯加桂枝以其渴而多汗也次二劑健脾去積滯用橘紅白豆蔻白朮茯苓穀蘖烏梅白藕豆山查麥芽最後一劑人參一兩生薑皮一兩水煎露一宿五更溫服盡劑而效

顧伯欽患瘧仲淳之門人疏方以白虎湯加人參一兩一庸工云豈有用參至兩數者乎改用清脾飲二十餘劑而瘧不止體尪弱仲淳至笑曰此虛甚非參不可吾

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

徒不謬也投以大劑參芪一劑而瘧

人參一兩黃芪一兩知母五錢陳皮二錢乾葛二錢甘草八分石

膏五錢莊斂之妾患瘧寒少熱甚汗少頭痛不嗜飲食余為診

脉洪數而實用麥門冬五錢知母三錢石膏一兩竹葉六錢

片粳米一撮橘紅二錢牛膝一兩乾葛三錢白茯苓三錢白藕豆三錢

三劑不應忽一日凡寒熱者再昏迷沉困不省人事勢

甚危急斂之過余云恐是虛弱前方石膏知母竹葉似



近寒涼非其治也余亦心疑為去石膏等而加人參二錢已別矣余追想前脉的非屬虛急令人往視令其將參煎好勿輕與服待按脉加斟酌焉次早往視其脉洪數如初急止人參勿服惟仍用前方而加石膏至二兩何首烏五錢令其日進二劑瘧遂止

莊斂之前患瘧妾越一載忽頭痛如裂心內雜亂不清喉作痛失音舌破咳嗽有痰胸膈飽脹惡心不思飲食如此者四日矣日漸增劇陡發寒熱如瘧狀寒少熱多

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

熱後頻出汗方解平時有心口痛證并作下元無力如

脚氣狀斂之疑為傷寒余曰此受暑之證即前年所患

瘧而勢加劇耳法當先去其標令以石膏二兩麥門冬五錢

知母三錢橘紅二錢牛膝五錢鱉甲四錢竹葉一百五十片貝母三錢

括婁根三錢河水煎服三四劑心內清頭疼喉痛失音舌

破飽脹寒熱俱愈但惡心不思食如故而心口痛下元

無力不減余為去石膏知母竹葉鱉甲貝母括婁根而

加延胡索二錢五靈脂七分生蒲黃一分薏苡仁八錢木瓜二錢



石斛錢三 白藕豆錢三 白芍藥錢三 竹茹錢二 枇杷葉片三 炙甘  
草分四 幾十劑而愈

高存之甥女嫁後患胎瘧久不止仲淳云病在陰分以  
人參錢五 牛膝兩一 兼健脾清暑一劑而止

章衡陽子室患瘧後失音寒熱愈甚告急仲淳仲淳云  
此必瘧時不遇明眼人妄投半夏故也投以大劑麥門  
冬 白茯苓 炙甘草 鱉甲 知母 貝母數劑瘳

治停食發瘧

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

梁溪王興甫偶食牛肉覺不快後遂發瘧飲食漸減至  
食不下咽已而水飲亦不下白湯過喉間嘔出作碧色  
藥不受小便一滴如赤茶大便閉諸醫束手仲淳忽至  
視之令仰臥以指按至心口下偏右大叫因詢得其由  
用丸藥一服至喉輒不嘔水道漸通次日下黑物數塊  
如鐵丸藥用礬紅和平胃散作末棗肉和丸白湯下三  
錢其病如失再以人參錢五 麥門冬錢五 橘紅錢三 白芍藥錢三  
水煎服四日起



<p>關 丸方</p>	<p>關 蟲<small>煨存性研極</small>廣橘紅<small>十兩</small>射干<small>一兩</small></p>	<p>關 人參<small>八錢</small>肉桂<small>六錢</small>乾漆<small>煨烟起存性研</small>為極細</p>	<p>末醋煮稀糯糊和丸如梧子大每四錢空心淡鹽湯下</p>	<p>痢</p>	<p>滯下如金丸 <small>滯下俗呼痢疾</small></p>	<p>真川黃連<small>真薑汁浸隔土如法</small>細末薑汁和水跌丸如</p>	<p>梧子大貯磁器中封固如胃弱以蓮子四十粒橘紅<small>二錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>人參<small>二錢</small>升麻<small>七分</small>煎湯吞四錢腹痛以白芍藥<small>三錢</small>炙</p>	<p>甘草<small>一錢</small>黃檗<small>一錢</small>升麻<small>七分</small>煎湯吞四錢已後各條加減</p>	<p>皆以丸藥四錢為率裏急甚以白芍藥<small>三錢</small>炙甘草<small>一錢</small></p>	<p>當歸<small>二錢</small>升麻<small>七分</small>煎湯吞四錢後重甚加檳榔<small>五分</small></p>	<p>枳殼<small>一錢</small>木香汁<small>七匙</small>調入口渴及發熱調滑石末<small>三錢</small>去</p>	<p>木香小便赤澁短少或不利加滑石末<small>三錢</small>調入各症</p>	<p>湯中吞藥赤多加烏梅肉<small>二錢</small>山查肉<small>三錢</small>紅麴<small>二錢</small>兼</p>	<p>裏急用當歸等加入如前方白多加吳茱萸<small>湯泡七分</small></p>
-----------------	---	---	------------------------------	----------	--	---	--	--------------------------	--	---	---	---	---	---	--	---



黃芩	酒炒一分	惡心欲吐即噤口痢多加人參石蓮肉
綠色升麻	醋炒可用至八分或一錢	白藕豆
痢不止加肉苳蔻	錢一	蓮肉
白藕苳	炒去殼二錢	炙甘草
二錢	細末煉蜜丸如梧子大每服三錢米湯下若積滯未	橘紅
盡加滑石末	錢三	白芍藥
人參橘紅炒砂仁湯吞三錢	凡治滯下非元氣壯實	白茯苓
多噉能食之人慎勿輕用大黃巴豆牽牛甘遂大戟等		
欽定四庫全書	先醒齋廣筆記	
下藥	凡產後滯下積滯雖多腹痛雖極不可用大黃	
等藥行之致傷胃氣遂不可救但用人參白芍藥當歸		
紅麴升麻	醋炒	益母草加炙甘草一倍滑石末四五錢足
矣	若惡露未盡兼用乳香沒藥	各七分
以之自愈血虛可加阿膠	二錢	粉炒
凡胎前滯下宜用		
黃芩黃連白芍藥炙甘草橘紅赤麴枳殼蓮肉	炒	畧用
升麻未滿七月勿用滑石證急者必須用之不拘此例		
護心奪命丹	治虛弱人患痢及痢以脾胃虛者	



<p>肉豆蔻 <small>一兩</small> 白芍藥 <small>六兩</small> 炙甘草 <small>一兩</small> 廣橘紅 <small>三兩</small> 白藕莖 <small>五錢</small></p>	<p>炒 <small>三兩</small> 滑石 <small>六兩</small> 赤麩 <small>四兩</small> 蓮肉 <small>去心炒焦</small> 綠色升麻 <small>二兩</small></p>	<p>川黃連 <small>五錢</small> <small>切片拌好酒同吳茱萸浸二宿瓦上炒乾分</small> 細末煉蜜丸如菘豆大每服三錢白湯吞 如噤口痢</p>	<p>并虛弱人即以前方中去豆蔻另用人參三錢煎濃湯</p>	<p>吞</p>	<p>加味滯下丸</p>	<p>川黃連 <small>白痢如前法赤痢用濕</small> 白芍藥 <small>酒浸切片</small> 烏梅</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>肉 <small>二兩</small> 滑石 <small>水飛如</small> 炙甘草 <small>二兩</small> 升麻 <small>綠色者醋</small> 蓮肉 <small>去心</small></p>	<p>法 <small>六兩</small> 白藕豆 <small>炒去殼</small> 紅麩 <small>簸淨炒</small> 乾葛 <small>二兩</small> 為細末蜜丸</p>	<p>每五錢白湯吞飢時服證重者日三服</p>	<p>又滯下丸</p>	<p>川黃連 <small>如法製</small> 滑石末 <small>八兩</small> 檳榔 <small>四兩</small> 炙甘草 <small>三兩</small> 木香 <small>為末</small></p>	<p>隔湯燂 <small>二兩</small> 枳殼 <small>炒</small> 白芍藥 <small>酒炒</small> 細末荷葉湯稍加薑</p>	<p>汁糊成丸如菘豆大每服三四錢烏梅湯吞 若加吳</p>	<p>菜萸白藕豆陳皮各三兩治白痢作四樣一無木香一</p>
--	--	---	------------------------------	----------	--------------	--	----------------------	--	--	------------------------	-------------	---	---	------------------------------	------------------------------





<p>無檳榔枳殼一加當歸一加吳茱萸白藕豆橘紅去檳榔枳殼 燥熱煩渴惡心者勿用木香 元氣虛弱者勿用檳榔枳殼 積滯多而後重者用檳榔枳殼 裏急色赤者用當歸惟惡心嘔吐及不思食者勿用 痢加肉豆蔻</p>	<p>治血痢痛甚湯液 <small>仲淳傳自包瑞溪學憲試之神效</small></p>	<p>白芍藥 <small>酒炒五錢此一</small> 枳殼 <small>槐花同炒去</small> 升麻 <small>醋炒七分</small> 真</p>	<p>川黃連 <small>薑汁炒</small> 滑石末 <small>三錢</small> 乳香 <small>各七分</small> 山查肉 <small>五錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>錢三分 甘草 <small>五分</small></p>	<p>治噤痢神效</p>	<p>綠色升麻 <small>醋炒</small> 人參 <small>三錢</small> 蓮肉 <small>去心炒焦</small> 水一鍾煎半鍾</p>	<p>飲之蜜和為丸更妙每四錢一服白湯吞</p>	<p>治久痢紅中兼有青色白痰間發熱</p>	<p>真川黃連 <small>槐花炒一分</small> 白芍藥 <small>酒炒二錢</small> 廣陳皮 <small>三錢</small> 人參 <small>一錢</small> 蓮</p>	<p>肉豆蔻 <small>炒十分</small> 炙甘草 <small>八分</small> 山查肉 <small>二錢</small> 綠升麻 <small>醋炒五分</small> 砂</p>	<p>仁 <small>炒一錢</small> 滑石末 <small>二分</small> 調服</p>
---	---	---	---	----------------------	---------------------------------	--------------	--	-------------------------	-----------------------	---	---	--



治噤口痢吐不納藥者

人參一兩 川黃連五錢 薑汁製 石蓮子五錢 炒去心 水二鍾煎八分

小杯緩服之吐止痢亦止

大黃丸

痢初起壯實者可用胃弱者禁施

川大黃切片蜜 白芍藥酒浸切片 甘草炙三兩 檳榔四兩

香切片不見火 枳殼炒四兩 細末煉蜜同水煎木香和搗

為丸如菘豆大白菜菴湯吞三錢重者五錢以行兩三

次腹中爽快為度胃氣虛極之人勿輕用之積滯重而

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

元氣虛者以人參湯吞 孕婦以人參縮砂湯吞行後

另用人參丸補之

予家夏秋患此甚衆輒依前方療之歲為常并以應里

中之索方者一一神驗黃聚川年兄太夫人年八十餘

偶患痢曾膈脹絕粒數日予以升麻人參黃連蓮肉方

授之參至一兩諸子駭甚再問予予曰遲則不救矣一

劑啜粥再劑腹中響一泄痢即止今年九十餘尚健也

陳赤石督學因校士過勞感暑遂滯下純血醫皆難之



陳刺史曰此非繆仲淳莫能療也使者旁午得之吳門 一日夜馳至武林仲淳診得其所由遂用人參 <small>錢五</small> 升麻	分 <small>七</small> 炙甘草 <small>一錢</small> 烏梅 <small>二枚</small> 紅麴 <small>一錢</small> 川黃連 <small>三錢</small> 白芍藥 <small>二錢</small>	蓮肉 <small>四十粒</small> 煎調滑石末 <small>五錢</small> 二劑而愈督學曰痢止矣心	摇摇不能閱卷奈何仲淳曰此勞心太過暑因客之故	爾加竹葉乾葛酸棗仁一劑遂平	姚公遠幼子病痢一醫誤下之遂下純血氣喘身熱不	思食仲淳偶至亟以人參 <small>四錢</small> 石蓮子白芍藥升麻橘	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	紅草石蠶白藕豆滑石末炙甘草投以一劑喘平血止	又數劑痢止仲淳臨別囑公遠曰兒百日內不出痘則	生以下多元氣未復故也未幾即痘果殤	家弟稚端幼病痢甚日夜數十次服數劑即愈	人參 <small>三錢</small> 吳茱萸 <small>滾湯泡七次一錢</small> 川黃連 <small>薑汁炒一錢</small> 後二味飯鍋	上蒸水煎至八分溫服如不受以藥一匙間米湯一匙	漸漸飲之胃氣漸復如頭痛發熱前方中加寒水石 <small>六錢</small>	石膏 <small>即硬一錢</small> 乾葛 <small>一錢</small> 別調六一散四錢冷水服
--	--	---	-----------------------	---------------	-----------------------	--	------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	--------------------	--	-----------------------	--	--



肉 一枚	鮮金銀藤 <small>冬藤即忍</small> 數兩煎濃汁三大碗入地榆 <small>川黃連</small>	槐花 濕拌 炒四錢	黃檗 二錢	黃芩 二錢	白芍藥 三錢	炙甘草 二錢	升麻 二錢	川黃連 四錢	白芍藥 三錢	黃芩 三錢	白藟豆 二錢	蓮肉 四錢	橘紅 十粒	枳殼 三錢	紅麴 二錢	乾葛 半錢	升麻 五分	炙甘草 一錢	烏梅 一錢	已滯下全愈	次為定此方甫服一鍾覺藥行至腹即解一次痛亦隨	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	友人虞元靜房中人方孕五月患滯下腹痛日不下數	感服	紅 再進如金丸二劑勢稍定更數服愈華水部至今	參 炒黃連 白藟豆 升麻 滑石 炙甘草 橘	不以藥試之服如金丸因思飲予固守仲淳前方以人	先王母病留湖濱憐其促治後事甚亟曰既已知危何	數十聲不絕吳醫爭欲下之且曰補即死矣時仲淳以	庚子秋華氏妹歸寧忽痢日夜幾百行身熱發嘔一嘔
---------	--	-----------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	-------	-----------------------	------------------	-----------------------	----	--------------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



綠色者醋  
炒六分 同煎至一碗調水飛過滑石末五錢不拘時服

治濕熱腹痛

一少年貴介暑月出外飲食失宜兼以暑熱遂患滯下途次無藥病偶自止歸家腹痛不已徧嘗諸醫之藥藥入口痛愈甚亦不思食仲淳視之曰此濕熱爾其父曰醫亦以濕熱治之而轉劇仲淳曰投何藥曰蒼朮黃連厚朴枳殼陳皮等仲淳曰誤也朮性溫而燥善閉氣故

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

滯下家忌之郎君陰虛人也尤非所宜更以滑石一兩

為細末以牡丹皮汁煮之別以白芍藥酒炒五錢炙甘草二錢

炒黑乾薑五分水煎調滑石末服之須臾小便如注痛立

止

秦公蕃病痢醫誤投澁劑一服痢止濕熱無自而出遍

攻肢體骨節間以致項強目赤肩臂腕膝足脛俱發腫

痛甚不能轉側仲淳疏方寄之用白芍藥石斛牛膝木

瓜黃槩薏苡仁炙甘草車前子茯苓痛雖止尚不能轉



側更用蒺藜菊花何首烏胡麻黃檗炙甘草復逾年愈  
其始病時一醫稍投參朮痛極欲死此係本證陰虛有  
火又加濕熱暑濕交攻故現此證名痢風陰虛火多故  
不受補又不宜燥惟微寒清平之劑調之以之自愈  
凡治滯下與大腸滑泄自利不止不同滑泄自利不止  
有可澁之道故古人有間用罌粟殼及訶利勒以止其  
滑泄若夫滯下本屬濕熱瀉滯不行法宜疏利藥忌兜  
澁大腸者肺之腑也大腸既有濕熱留滯則肺家亦必

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

有熱肺乃華蓋之藏經曰脾氣散精上歸於肺通調水  
道下於膀胱是肺氣喜通利惡閉澁故古人藥性中每  
云通肺氣其意槩可見已倘誤用罌粟殼訶利勒使濕  
熱無所宣洩肺氣不得下行非惟滯下增劇濕熱熏蒸  
上干乎肺則脹悶氣逆不得眠不思食諸證至矣 又  
有以嗽不愈緣於肺虛有火法當清肺潤肺忌用澁燥  
閉氣之藥設若誤用粟殼訶子俾火壅於肺不得下降  
若兼參朮半夏即死不旋踵矣世醫往往蹈此覆轍相



尋卒無悟者聊為論著敢告方來

已上癰痢二門諸方皆仲淳斟酌所定因證加減與時消息可謂詳且盡矣然不盡用方書所載投之輒效百不爽一蓋獨開門戶者也

外有時行疫痢一證三十年前間或有之今則往往夏末秋初沿門闔境患此其證大都發熱頭疼口渴煩躁下痢溺瀉甚者一日夜行百次或兼發斑疹勢甚危迫世醫妄指為漏底殊不知此是時氣使然因世人稟賦

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

漸薄積感濕蒸厲氣所致治法當清熱解毒表散為急如升麻葛根柴胡黃連黃芩之類或熱甚渴甚前藥中可加寒水石更有別證以意加減切忌下行破氣收瀉如大黃芒硝檳榔枳實烏梅粟殼等犯此者多致不救

上一條附

先醒齋廣筆記卷一



欽定四庫全書

子部  
先醒齋廣筆記卷二

詳校官太醫院醫士趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣何思鈞

校對官編修臣勵守謙

謄錄監生臣邵敬修





欽定四庫全書

先醒齋廣筆記卷二

明 繆希雍 撰

脾胃

黃病有積神方 一平頭試之神驗

蒼朮 炒 厚朴 薑汁炒 橘紅 甘草 山查肉 白茯苓

麥芽 各二兩 檳榔 一兩 綠礬 火煨研細 為末棗肉丸如梧子

大每服一錢白湯吞日三服凡服礬者忌食蕎麥河豚

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

犯之即死

治老人傷冷食及難化之物

生薑或紫蘇煎湯置浴鍋內令病者乘熱浸湯內以熱

手揉心胃肚腹氣通食化矣

又方

蕪艾灸胃脘并肚氣從口鼻出立愈

治胃脘痛屬火證者 一女婢患此數十年一劑良已

橘紅 淡豆豉 山梔仁 炒黑各三錢 生薑 五片 枳殼 一錢 水一



鍾半煎七分服

又治胃脘痛 仲淳療瑤母方

橘紅 二錢 白豆蔻仁 五分 香附 童便炒忌鐵 延胡索 醋煮切

金黃色者良 白芍藥 酒炒 甘草 四分 白茯苓 三錢 白木香

五分磨汁 紫蘇子 研二 紫蘇梗 二錢 河水二鍾煎一鍾不

拘時服 豆蔻仁口 嚼之下藥

又方 口渴肩骨疼酸痛不能飲食者神效

真紫蘇子 隔紙焙 橘紅 白茯苓 各三錢 竹茹 二錢 白芍藥

欽定四庫全書 先醒齋廣筆記

酒炒 木瓜 忌鐵 石斛 酒蒸 酸棗仁 炒爆研 麥門冬 五錢 甘

草 五分 白豆蔻仁 四分先 飢時服

治胃中有痰欲吐 陳潛齋傳

廣橘紅 瓜蒌仁 各四兩 薑汁竹瀝和丸 梧子大食後服

治脾經痰飲五更咳嗽喉中如有物咽之不下服

之甚驗 仲淳立

白茯苓 四兩 蘇子 另研如泥 白豆蔻仁 七錢 貝母 去心 括

婁根 三兩 薄荷葉 一兩 連翹 三兩 礞砂 另研如飛 廣橘紅 四兩



麥門冬 <small>去心</small> 三兩	貓兒殘葉 <small>六兩</small>	山查肉 <small>三兩</small>	麥芽 <small>炒取淨麪</small> 一兩五錢	神
麪 <small>炒一兩五錢</small>	出峽江縣	霞天膏麪 <small>四兩</small>	枇杷葉 <small>四兩</small>	為極細末懷山
藥粉糊和丸如麻子大白湯吞三四錢				
治痰嗽吐不已曾膈有冷物上塞飲熱湯稍下				
橘紅	白茯苓	蘇子 <small>研細</small>	瓜蒌仁 <small>蛤粉拌炒研細</small>	半夏 <small>薑汁</small>
炙一錢	遠志 <small>去心甘草汁浸</small>	白荳蔻仁 <small>五分</small>	吳茱萸 <small>湯泡去梗</small>	一錢
河水二鍾半煎八分飢時服加薑汁五匙竹瀝一杯				
化痰生津噙化丸	治膠痰不治陰虛痰火			
欽定四庫全書	先醒齋廣筆記			
五倍子揀粗大者安大鉢頭內用煮糯米粥湯浸蓋好				
安靜處七日後常看待發芽黃金色又出黑毛然後將				
箸試之若透內無硬即收入粗瓦鉢中搗如醬連鉢日				
中晒至上皮乾了又搗勻又晒晒至可丸方丸彈子大				
晒乾收用其味甘酸能生津化痰				
治痰				
用樞木葉搗煎湯不時呷漸漸痰少兼治膈氣嘔吐趙				
太學文度頑痰積血仲淳以霞天膏加化痰消瘀之劑				



治之而愈

痰厥

金壇庠友張逢甫內人方食時觸暴怒忽仆地氣遂絕  
延一醫視之用皂角灰吹鼻中不嚏用湯藥灌之不受  
延至午夜謂必不治醫告去逢甫急叩莊一生一生過  
視之六脈尚全而獨氣口沈伏細尋之滑甚曰此肝木  
之氣逆衝入胃胃中素有痰致痰夾食閉胃口氣不得  
行而暴絕也但歷時久湯藥不入矣急宜吐之可活所

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

謂木鬱則達之也亟令覆其身垂首向床下以鵝翎蘸  
桐油啓齒探入喉中展指引吐出痰與食纔一口氣便稍  
通再探吐至兩三口便覺油臭以手推翎但不能言一  
生曰無妨矣知其體怯不宜多吐急煎枳橘推蕩之藥  
灌之盡劑而甦後以平肝和胃藥調理數劑復故此因  
暴怒怒則氣上逆痰因氣壅故現斯證耳所謂痰厥也  
治厥往往有誤予故表其證以示後來云

飲



飲與痰不同痰膠黏而飲惟水治法亦異飲雖有五總  
 之或緣飲酒過多酒後發渴多飲茶湯或好飲冷酒或  
 因天暑煩渴多飲凉水及冰因酒而得者則多濕熱因  
 飲冷而得者則多寒濕或因鬱而得者則屬木氣侵脾  
 藥亦小有不同要以降氣燥濕散鬱健脾行水為宗乃  
 治法之要領也

方

半夏 薑汁明礬 廣陳皮 去白 白茯苓 四兩 猪苓 二兩 澤瀉 米

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

浸炒 旋復花 兩 厚朴 薑汁炒 白朮 土炒 枳實 二兩 炒

人參 一兩 酒濕者加川黃連 一兩 木香 錢五 寒濕者加蒼

朮 二兩 木香 錢五 白豆蔻 錢五 因鬱者加紫蘇 四兩 蒼朮 去

右為細末稀米糊入薑汁和丸如棗豆大每五錢淡薑

湯下連進三服空心飢時皆可服如卒急不及治丸取

二十倍中一倍作湯入豆蔻仁末木香汁薑汁和飲亦

立効

丹陽葛文學字十內人因作家勞鬱患飲證每發吐嘔



不已腸如欲出所吐俱清水動以盆桶計日夜不止不  
思飲食就醫金壇諸醫以健脾行氣理鬱清痰藥投之  
愈劇困頓待斃宇十計無復之矣適予偶從茗上來莊  
斂之與宇十姻戚也向余語故余即與斂之偕往視脈  
審證知為飲無疑乃用前方加人參三錢一劑吐止再  
劑霍然隨啖粥糜脾氣漸復至今每病作檢余方服之  
即平

雲間康孟修患寒熱不食久之勢甚危以治寒熱劑投  
欽定四庫全書  
先醒齋廣筆記

不應徧檢方書與王宇泰議投五飲丸立瘥蓋飲證原  
有作寒熱之條故治飲病自去矣

治痺方  
朱比部  
大復傳

真茅山蒼朮十觔洗淨先以米泔浸三宿用蜜酒浸一  
宿去皮用黑豆一層拌蒼朮一層蒸二次再用蜜酒蒸  
一次用河水砂鍋內熬濃汁去渣隔湯煮滴水成珠為  
度每膏一觔和煉蜜一觔白湯調服  
一老人專用此方八十餘身輕趨捷甚於少年



蕪州何刺史年七十餘守桐川飲啗過少年叩其故曰  
平生服蒼朮丸每日數錢

真茅山蒼朮四觔如法洗浸去皮切片以桑椹懷生地  
何首烏各一觔熬濃汁至無味而止去渣濾清下蒼朮  
浸之晒乾復浸汁盡為度細末又以人乳拌勻晒乾數  
次約重數兩煉蜜為丸白湯或酒吞

治蠱脹由于脾虛有濕

黃司寇葵峰中年病蠱得異方乃真茅山蒼朮末也每

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

清晨米飲調三錢服不數月強健如故終身止服朮七  
十餘終少停疾作矣

又方

通血香錢一取小葫蘆一個不去子膜入香在內再入煮  
酒仍以所開之蓋合縫封之以酒入鍋懸葫蘆酒中挨  
定不可傾側蓋鍋密煮以三炷線香為率煮時其香透  
達牆屋外煮完取葫蘆內子膜并藥烘乾共為細末每  
服一錢空心酒送下間五日服一錢服盡葫蘆內藥約



有五六錢之數病已釋然矣通血香陝西羊羸客人帶來蘇杭有

又方

徐文江夫人病蠱脹張漣水治之百藥不効張曰計窮矣記昔年西山有一嫗患此意其必死後過復見之云遇一方上人得生徐如言訪嫗果在也問其方以陳葫蘆一枚去頂入酒以竹筋鬆其子仍用頂封固重湯煮數沸去子飲酒盡一吐幾死吐後腹漸寬調理漸愈蓋

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

元氣有餘而有痰飲者也若腎虛脾弱者宜用金匱腎

氣丸十全大補湯去當歸加車前子肉桂

沈孝通觀察中年無子患中滿蠱脹勢孔棘靜養郭外

小園中脩然獨坐獨宿食淡者五年歸脾湯六味地黃

丸朝暮間服不輟連舉二子

顧奉常務遠目黃脾氣弱仲淳疏方用

山茵陳三錢 人參三錢 薏苡仁三錢 蓮肉焙三錢 木通八分 黃連酒炒一錢

山梔仁炒八分 白朮土炒一錢 石斛酒蒸三錢 皆治疸之劑以事冗





未服既而身目皆黃小便亦赤乃服仲淳先見飲前藥	稍愈一按摩者投以草汁藥酒脾敗遂不起臨没下瘀	血數升亦蓄血證也以其年邁不絕慾故爾前方尚有	茯苓 <small>錢二</small>	施靈修乃兄七年前曾患疸症服草藥愈後復發坐多	氣多勞故草藥不效服田螺發脹一日夜大作寒熱因	發渴小便如油眼目黃且赤手足黃紫仲淳以闕血發	黃服後藥大小便通黃及渴俱減	欽定四庫全書	先醒齋廣筆記	橘紅 <small>錢一</small> 五分紅麴 <small>炒研</small> 二錢山查肉 <small>錢五</small> 欝金汁 <small>十五</small> 薏苡 <small>錢六</small> 木	瓜 <small>忌鐵</small> 三錢牛膝 <small>去蘆酒蒸</small> 五錢麥門冬 <small>去心</small> 五錢車前子 <small>二錢</small> 赤茯苓	苓 <small>錢三</small> 川通草 <small>分五</small> 白芍藥 <small>酒炒</small> 四錢竹茹 <small>錢二</small> 河水二鍾煎八分	飢時服三日後加人參三錢	孫俟居比部病腹中若有癥瘕不食不眠煩懣身熱仲	淳投以人參芍藥茯苓麥門冬木通棗仁石斛方甫具	史鶴亭太史至見方中有大劑人參駭曰向因投參至	劇此得無謬乎仲淳曰病勢先後不同當時邪未退滯
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	--------	--------	--	--	--	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



未消故不宜今病久飽脹煩悶者氣不歸元也不食者  
 脾元虛也不眠而煩者內熱津液少也今宜亟用此藥  
 矣四劑而瘳後復病仲淳診之曰此陰虛也非前證矣  
 更以麥門冬白芍藥甘枸杞五味子生地黃車前子而  
 熱遂退

神效沉香丸又名聚寶丹

真沉香二錢 真麝香八分 血竭一錢 乳香一錢 縮砂仁二錢

香二錢 玄胡索一錢 沒藥五分 細末糯米糊丸如彈子大用辰

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

砂一分 為衣治男子翻胃嘔吐飲食不通此是胃腕寒

痰結阻諸醫無効屢試神驗燒酒磨服男婦腹痛諸氣

作痛產後血氣攻心用陳酒磨服如熱氣痛葱湯嚼下

小兒天弔作痛啼叫不已葱湯磨服

太學顧仲恭遭乃正之變復患病在牀延一醫者診視

驚訝而出語其所親云仲恭病已不起只在旦晚就木

可速備後事仲恭聞知憂疑殊甚舉家惶惶計無所出

來請予診脈按其左手三部平和右手尺寸無恙獨關



部杳然不見諦視其形色雖尪羸而神氣安靜予詢之  
曾大怒乎病者首肯云生平不善怒獨日來有拂意事  
惱怒異常予曰信哉此怒則氣并于肝而脾土受邪之  
證也經云大怒則形氣俱絕而况一部之脈乎甚不足  
怪第脾家有積滯目中微帶黃色恐成黃疸兩三日後  
果遍體發黃服茵陳利水平肝順氣藥數劑而瘳

李文孺四年前曾患黃疸嗣後每診其脈甚沈澹肝脾  
尤甚望其面色如黃土予嘗私語相知云文孺色脈不

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

佳恐非久于人世者且又好勞損神多怒傷氣後疸果

復發不起

已上二  
條附

### 洩瀉

天地之間動靜云為者無非氣也人身之內轉運升降  
者亦氣也天地之氣不和則山川為之崩竭人身之氣  
不調則腸胃失其轉輸外則風寒暑濕之交侵內則飲  
食勞倦之不節腸胃因之而變此洩瀉之由也致疾之  
端匪一治療之法自殊經云春傷於風夏生飡泄春者



木令風為木氣其傷人也必土臟受之又風為陽邪其性急速故其泄必完穀不化洞注而有聲風之化也古之所謂洞風是也宜先以風藥發散升舉之次用參芪白朮茯苓大棗甘草肉桂等藥以制肝實脾芍藥甘草乃始終必用之劑傷暑作瀉必暴注大孔作痛火性急速失於傳送也口多渴小便多赤或不利身多發熱瀉後則無氣以動熱傷氣也清暑用十味香薷飲清暑益氣湯內虛之人中氣不足用六和湯不止用黃連理中湯或加減桂苓甘露飲腎泄者難經所謂大瘕泄也好色而加之飲食不節者多能致此其泄多於五更或天明上廁澹而弗甚累年弗瘳服補脾胃藥多不應此其候也夫脾胃受納水穀必藉腎間真陽之氣熏蒸鼓動然後能腐熟而消化之腎臟一虛陽火不應此火乃先天之真氣丹溪所謂人非此火不能有生者也治宜益火之原當以四神丸加人參沈香甚者加熟附茴香川椒

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記



又有醉飽行房腎氣虛乏濕熱乘之下流客腎久泄不止治宜升陽除濕次用八味丸加山藥茯苓地黃減半腎司二便久泄不止下多亡陰當求責腎破故紙肉豆蔻茴香五味子之屬不可廢也白朮陳皮雖云健胃除濕救標則可多服反能瀉肝以其燥能損津液故耳長夏濕熱令行又歲濕太過民多病泄當專以風藥如羌活防風升麻柴胡白芷之屬必二三劑緣除風能勝濕故也

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

泄而少食胃弱故也人參為君扁豆橘皮佐之

泄而食不消縮砂人參肉豆蔻

泄而腹痛白芍藥炙甘草防風木香

泄而氣弱乾葛人參白朮白茯苓

泄而小水不利車前子末木通

中焦有濕熱者當用猪苓澤瀉

肉積作瀉用肉豆蔻山查蒜

麵積作瀉蘿蔔子

感寒而瀉理中湯加紫蘇



濕痰作瀉半夏白朮茯苓為君神麩為佐

九製黃連最能止瀉須與人參等分廼可蓋久瀉不止

多緣氣虛純用苦寒胃氣愈閉又下多亡陰必用人參

亦陽生陰長之意也

然此亦指腸胃虛熱者而言如虛寒者不宜概用

### 脾腎雙補丸 治腎泄

人參

去蘆

蓮肉

去心每粒分作八

兔絲子

如法另末

五

一斛半

蜜蒸烘乾

味子

蜜蒸烘乾

山茱萸肉

揀鮮紅肉厚者

真懷山藥

炒

一觔半

炒

黃

一觔半

米泔淘淨

肉豆蔻

十兩

橘紅

六兩

砂仁

六兩

炒

入巴

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

戟天

十二兩甘草

補骨脂

圓而黑色者佳鹽

為細末煉

水拌炒研末一觔

為細末煉

蜜和丸如菘豆大每五錢空心飢時各一服

如虛而

有火者火盛肺熱者去人參肉豆蔻巴戟天補骨脂

忌羊肉羊血

梁溪一女人茹素患內熱每食腸鳴清晨大瘕泄脾腎

雙補丸內去肉豆蔻以白芍藥代之外加白扁豆十二

兩立愈

無錫秦公安患中氣虛不能食食亦難化時作泄胃膈



<p>不寬一醫誤投枳殼青皮等破氣藥下利完穀不化面色黯白仲淳用人參<small>錢四</small>白朮<small>錢二</small>橘紅<small>錢許</small>乾薑<small>泡七分</small>甘草</p>	<p>錢<small>灸一</small>大棗肉豆蔻四五劑漸愈後加參至兩許全愈三年後病寒熱不思食他醫以前病因參得愈仍投以參</p>	<p>病轉劇仲淳至曰此陰虛也不宜參乃用麥門冬五味子牛膝枸杞芍藥茯苓石斛酸棗仁鱉甲等十餘劑愈</p>	<p>從妹患泄後虛弱腹脹不食季父延諸醫療之予偶問疾見其用二陳湯及枳殼山查等味予曰請一看病者</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>見其向內卧眠兩手置一處不復動曰元氣虛甚矣法宜用理中湯恐食積未盡進以人參三錢橘紅二錢加薑汁竹瀝數匙夜半思粥神思頓活季父大喜盡謝諸醫再以六君子湯加山查肉砂仁麥門冬調理之數劑立起</p>	<p>治腹痛作泄<small>予患腹痛泄日十餘度仲淳以一劑止之</small></p>	<p>人參<small>錢一</small>蒼朮<small>米泔浸炒三錢</small>黃連<small>薑汁炒三錢</small>北五味<small>蜜蒸錢一</small>橘</p>	<p>紅<small>錢一分</small>肉豆蔻 吳茱萸<small>湯泡</small>白茯苓<small>錢各一</small>藿香<small>錢五分</small></p>
---	---	---	---	--------------------------	---	---	--	---



莊斂之平日素壯實善啖丁巳四月忽患泄瀉凡一應藥粥蔬菜入喉覺如針刺下咽即辣因而滿腹絞辣隨覺腹中有氣先從左升次即右升氤氳遍腹即欲如廁彈響大泄糞門恍如火灼一陣甫畢一陣繼之更番轉廁逾時方得離廁諦視所泄俱清水盈器白脂上浮藥粥及蔬菜俱不化而出甚至夢中大遺了不收攝諸醫或云停滯或云受暑或云中寒百藥雜投竟如沃石約月餘大肉盡脫束手待斃斂之有孀母朝夕相視哀號

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

呼天恨不以身代也余於仲夏末偶過金壇診其脈洪大而數知其為火熱所生病為疏一方用川黃連三錢白芍藥五錢橘紅二錢車前子三錢白扁豆三錢白茯苓三錢石斛三錢炙甘草一錢祝其煎成將井水澄冷加童便一杯始服臨別再三叮嚀云此方勿出以示人恐時師見之大笑不已也若為軀命計須堅信服之耳斂之却衆醫下鍵煎服藥方入喉恍如飲薄荷汁隱隱沁入心脾腹中似別成一清涼世界甫一劑夜卧達旦





洞瀉頓止連服三劑大便已實前泄時藥粥等物凡溫者下咽腹中遂覺氣升即欲大解一切俱以冷進方快家人日以為常至是啖之覺惡心畏冷旋易以溫始相安余曰此火退之徵也前方加人參二錢半蓮肉四十粒紅麴一錢五分黃耆三錢升麻五分黃連減半五六劑後余將返長興斂之持方求余加減余曰此已試效方宜固守多服但去升麻可耳越月餘余再過金壇斂之頻顧向余曰自先生去後守方煎服幾三十餘劑矣

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

今瀉久止而脾氣困頓不知飢飽且稍飲茶湯覺腸滿急脹如欲寸裂柰何余曰大瀉之後是下多亡陰也法宜用補倘此時輕聽盲師妄用香燥諸藥取快暫時元氣受傷必致變成蠱脹即不救矣復為疏一丸方人參五兩白芍藥六兩炙甘草一兩五味子六兩綿黃耆五兩山茱萸肉五兩懷山藥五兩熟地黃八兩牛膝六兩紫河車二具蜜丸空心飢時各一服而日令進前湯液方斂之相信甚力堅守二方服幾年脾胃始知飢而



嗜食四體亦漸豐矣斂之恒對余言每遇脾胃不和時  
或作瀉覺腹中有火則用黃連否則去之一照余方修  
治煎服泄遂止而脾頓醒迄今以余所疏方儼如重寶  
什襲珍藏謂余不啻起死而生之也其病初平後余勸  
其絕慾年餘斂之因出妾得盡發家人私謀乃知向之  
暴泄由中巴豆毒本草中巴豆毒者用黃連冷水解之  
余用大劑黃連澄冷方服政為對治向使如俗醫所疑  
停滯受寒中暑法治之何啻千里即信為是火而時師

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

所投黃連不過七八分至錢許止矣況一月之瀉未有  
不疑為虛寒者用黃連至四錢此俗醫所必不解也向  
余祝其勿出以示人為是故耳始知察脈施治貴在合  
法神而明之存乎其人耳

余治斂之瀉止後恐其元氣下陷急宜升舉用升麻以  
提之初不知其為中毒也乃因用升麻太早致濁氣混  
于上焦胸中時覺似辣非辣似嘈非嘈迷悶之狀不可  
名狀有時滴酒入腹或啖一切菓物稍辛溫者更冤苦



不勝莊一生知其故曰此病在上焦湯液入口即下注  
 恐未易奏功宜以噙化丸治之用貝母五錢苦參一兩  
 真龍腦薄荷葉二錢沉香四錢人參五錢為極細末蜜  
 丸如彈子大午食後臨卧時各噙化一丸甫四丸胸中  
 恍如有物推下三年所苦一朝若失

治泄瀉在陽明胃太陰脾經者

白茯苓三錢 白朮炒二錢 炙甘草三錢 車前子炒三錢 陳皮二錢 升

麻五分 乾葛一錢 薑片三大 砂仁炒一錢 川黃連炒一錢五分 薑汁如無濕熱者

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

之去河水二鍾加棗肉二枚飢時服

治大便不通 張選卿屢驗

硃砂研如飛 真蘆薈研細 滴好酒少許和丸每服一錢

二分好酒吞朝服暮通暮服朝通須天晴時修合為妙

唐震山年七十餘闕 此血液

枯槁之候用

大肉菘蓉三兩白酒浸洗 白湯三碗煎一碗頓飲飲竟

大便通胸中快然偶一醫問疾曰此劫藥也當調補脾



山茱萸 四兩 <small>去核</small>	懷生地 八兩 <small>如法製</small>	加味六味地黄丸 <small>滋陰固精明目不寒不熱和平之劑久服延年</small>	時噲化後飲燈心湯一小杯	末煉蜜丸如彈重一錢 硃砂兩一研極細為衣食遠臨卧	味者 <small>去枯</small> 杜仲 六錢 <small>以上七味各</small> 遠志 三錢 <small>三分</small> 白茯苓 錢一兩五分 <small>淨</small>	白者 <small>去粗皮堅</small> 石菖蒲 毛 <small>去</small> 栢子仁 佳另研 <small>去油者</small> 甘草 潤灸 <small>長流水</small> 北五	天門冬 三錢 <small>去心各一分</small> 丹參 八錢 <small>去黃皮</small> 百部 土 <small>去蘆</small> 白茯苓	人參 懷山藥 <small>堅白</small> 麥門冬 <small>去心</small> 當歸身 <small>酒洗各</small> 懷生地	化痰涎去煩熱除驚悸療咽乾養育心神	寧心保神益氣固精壯力強志令人不忘清三焦	天王補心丹 陳練塘先生得自蠻洞中	虛弱	補精血驟用之反動大便藥性載甚明也	仍飲前藥立解高存之聞而叩其故仲淳曰肉蓯蓉峻	胃為主易以白朮厚朴茯苓陳皮病如故唐翁曰誤矣
-----------------------------	------------------------------	--	-------------	----------------------------	---	---	--	---	------------------	---------------------	------------------	----	------------------	-----------------------	-----------------------



<p>菊花 <small>苦者不用六兩</small> 真甘枸杞 <small>去蒂六兩</small> 北五味 <small>去枯者六兩</small> 細末蜜丸 <small>炒去刺五兩</small></p> <p>如梧子大空心淡鹽湯服四錢又方加白蒺藜</p>	<p>治目疾久不愈</p>	<p>天王補心丸臨卧服加味六味地黄丸空心服虛甚者</p> <p>地黄丸加紫河車一具酒洗極淨磁罐內酒煮極爛搗</p> <p>如泥或焙乾為末 二方朝夕並進久久自効世醫治</p> <p>目多補腎不知補心心君火也</p>	<p>治虛眼方</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p>	<p>枸杞子 生地 麥門冬 <small>各三錢</small> 龍膽草 <small>一錢下焦無濕熱者勿用</small> 水</p>	<p>二鍾煎七分半飢時服如脾氣不佳加白豆蔻末 <small>五六分</small></p>	<p>治肝腎二經目疾 從父病後眼花服此立愈</p>	<p>真甘枸杞 <small>一觔去蒂</small> 真懷生地黃 <small>一觔極肥者酒洗淨</small> 河水砂鍋內</p>	<p>熬膏以無味為度去渣重湯煮滴水成珠便成膏也每</p>	<p>膏一觔入煉蜜六兩空心白湯化下</p>	<p>又丸方仲淳立</p>	<p>真甘枸杞 <small>一觔</small> 甘菊花 <small>去蒂一觔</small> 白蒺藜 <small>炒去刺一觔</small> 細末煉蜜丸</p>
---	---------------	--	-------------	-----------------------------	--	---	---------------------------	---	------------------------------	-----------------------	---------------	--



<p>梧子大每四五錢空心白湯吞入地黄觔許更妙</p> <p>黃學諭潛白患風淚眼每出則流淚盈頰仲淳疏一方</p> <p>寄之穀精草為君蒺藜和枸杞之屬佐之羊肝為丸不</p> <p>終劑愈</p>	<p>治不眠 <small>以清心火為第一義</small></p>	<p>麥門冬 <small>錢五</small> 茯神 丹參 沙參 <small>各三錢</small> 竹茹 <small>二錢</small> 炙甘草 <small>一錢</small></p> <p>竹葉 <small>六十片</small> 石斛 <small>三錢</small> 遠志 <small>一錢</small> 生地 <small>四錢</small> 棗仁 <small>炒五錢</small> 五味子</p>	<p>分八有痰者加竹瀝</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p>	<p>烏鬚明目丸 <small>脾胃不佳者去槐角子仲淳立</small></p>	<p>女貞實 <small>酒拌九蒸九晒淨末一觔</small> 甘菊花 <small>兩十二</small> 何首烏 <small>赤白各半淨二觔如法蒸</small></p>	<p><small>晒</small> 桑葉 <small>一觔</small> 牛膝 <small>一觔</small> 懷生地 <small>酒洗淨二觔</small> 甘枸杞 <small>去枯者一觔半</small> 乳</p>	<p>拌茯苓酥 <small>一觔</small> 麥門冬 <small>去心一觔半</small> 槐角子 <small>兩十</small> 蒼朮 <small>蜜酒拌蒸晒十二兩</small></p>	<p>人參 <small>一觔人乳拌烘乾</small> 山茱萸肉 <small>酒蒸十兩</small> 烏飯子之黑者取汁</p>	<p>熬膏每觔加煉蜜半觔丸如梧子大每日三服服五錢</p>	<p>白湯吞忌白菜菹牛肉牛乳蒜桃李雀蛤</p>	<p>補心腎久服輕身延年 仲淳定有熱人宜之</p>
---	------------------------------------	---	-----------------	-----------------------------	--	---	--	---	--	------------------------------	-------------------------	---------------------------



<p>頭桑葉<small>九蒸九</small> 晒<small>一</small> 觔 黑芝蔴<small>九蒸九</small> 晒<small>一</small> 觔 甘菊花<small>去蒂</small> 八兩 何首烏<small>一</small> 觔</p>	<p>甘枸杞<small>一</small> 觔 白蒺藜<small>炒去刺</small> 另<small>一</small> 觔 女貞實<small>酒拌</small> 九<small>蒸</small> 晒<small>一</small> 觔 細末煉</p>	<p>蜜丸 梧子 大白湯或酒服</p>	<p>補虛丸方 許廓如丈傳服之有奇驗</p>	<p>棉花子仁<small>一</small> 觔 補骨脂<small>四</small> 兩 白茯苓<small>二</small> 兩 沒藥<small>二</small> 兩 煉蜜丸如梧</p>	<p>子空心淡鹽湯服</p>	<p>涼血去濕補陰益氣丸<small>子服之甚驗</small> 仲淳立</p>	<p>真茅山蒼朮<small>二</small> 觔 懷生地<small>酒洗</small> 一<small>觔</small> 甘菊花<small>一</small> 觔 車前子<small>米泔浸</small> 八兩</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>人參<small>八</small> 兩 牛膝<small>八</small> 兩 白茯苓<small>八</small> 兩 積粉<small>至</small> 一<small>觔</small> 天門冬熬膏和丸</p>	<p>治虛弱陰精不足</p>	<p>白茯苓<small>粉一觔</small> 至<small>一</small> 觔 另將童便重湯頓溫取壯盛女</p>	<p>子月經布一二個洗入便內拌入茯苓粉晒乾將茯苓</p>	<p>粉再磨加鹿角膠<small>四</small> 兩 酒化同煉蜜丸如梧子大空心服</p>	<p>白湯吞三錢服久痰從大便出</p>	<p>又方前方</p>	<p>加熟地黄<small>半</small> 觔 蒼朮<small>八</small> 兩 鹿角膠<small>四</small> 兩 黃檗<small>四</small> 兩 兔絲子<small>半</small> 觔 砂仁</p>
--	---	---------------------	------------------------	--	----------------	--	--	--------------------------	---	----------------	---	------------------------------	--	---------------------	-------------	--



角膠 <small>四觔</small> 人參 <small>二觔</small> 黃檗 <small>一觔半</small> 杜仲 <small>一觔半</small> 肉蓯蓉 <small>三觔</small> 覆盆子		懷山藥 <small>二觔</small> 天門冬 <small>一觔</small> 麥門冬 <small>三觔</small> 栝子仁 <small>二觔</small> 鹿角霜 <small>二觔</small> 鹿		天 <small>一觔</small> 甘菊花 <small>二觔</small> 枸杞子 <small>三觔</small> 生地黃 <small>三觔</small> 熟地黃 <small>三觔</small> 狗腎 <small>四觔</small>		五味子 <small>三觔</small> 山茱萸 <small>二觔</small> 兔絲子 <small>二觔</small> 砂仁 <small>一觔</small> 車前子 <small>一觔</small> 巴戟		或酒調服 通真延齡丹		懷熟地黃 <small>七味各一觔</small> 河水砂鍋熬膏如法加煉蜜白湯		人參 枸杞 牛膝 <small>酒蒸</small> 天門冬 <small>去心</small> 麥門冬 <small>去心</small> 懷生地黃		欽定四庫全書 先醒齋廣筆記		集靈方 <small>出內府補心腎益氣血延年益壽</small>		膝 <small>四兩</small> 煉蜜為丸空心白湯服五錢仲淳定		泥 車前子 <small>三兩</small> 兔絲子 <small>淨末八兩</small> 枸杞子 <small>去枯者八兩</small> 遠志肉 <small>三兩</small> 牛		黃檗 <small>四兩</small> 砂仁 <small>二兩</small> 甘草 <small>一兩</small> 懷山藥 <small>四兩</small> 栝子仁 <small>揀淨八兩酒蒸另研細如</small>		丹皮 <small>三兩</small> 白茯苓 <small>三兩</small> 天門冬 <small>四兩</small> 杜仲 <small>去皮切片</small>		麥門冬 <small>六兩</small> 鱉甲 <small>六兩</small> 五味子 <small>六兩</small> 懷生地黃 <small>八兩</small> 山茱萸 <small>四兩</small> 牡		養陰涼血補心滋腎丸 <small>子長兒久服此神驗</small>		兩三	
--	--	--	--	---	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	----------------------------------	--	---------------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	----	--





<p>一 沒食子 一 紫河車 十 何首烏 四 牛膝 三 補骨脂 一 胡</p>	<p>二 鹿茸 一 沙苑蒺藜 四 藥二 磨粉打糊 為末同栢</p>	<p>子仁胡桃肉泥蒺藜糊酒化鹿角膠揀蜜和丸如梧子</p>	<p>大每服五錢空心飢時各一服龍眼湯吞有火者不可</p>	<p>服</p>	<p>夢遺封髓丹</p>	<p>黃檗 去皮蜜 炙半 砂仁 四兩最後炒 甘草 二兩 山藥糊為丸加</p>	<p>遠志肉 甘草汁煮 去骨二兩 猪苓 一兩 白茯苓 五錢 蓮鬚 二兩 山茱萸</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>三 北五味 去枯者一 兩五錢 名大封髓丹出暨壘元戎仲淳屢</p>	<p>用之驗</p>	<p>種子方 鴻一兄傳 自高中白</p>	<p>沙苑疾藜 八兩粗者四兩為末精者四兩為膏 川續斷 酒蒸 二兩 兔絲子 三兩 煮三</p>	<p>日 山茱萸肉 生用 芡實粉 生用 蓮鬚 各四兩 覆盆子 生用 甘枸</p>	<p>杞子 各二兩 前末以蒺藜膏同煉蜜和丸如梧子大每服</p>	<p>四五錢空腹鹽湯下有火者宜服此兼治夢遺</p>	<p>又方 此方仲淳傳自江右鄧醫官</p>
---	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------	--------------	--	---	----------------------	-------------------------------------	------------	----------------------	--	--	---------------------------------	---------------------------	-----------------------



真合州補骨脂

沉實者  
二觔

以食鹽

四兩

入滾湯乘熱浸一宿

晒乾次用杜仲

去皮酒炒  
去絲四兩

煎濃湯浸一宿晒乾次用厚

黃檗

去皮蜜  
炙四兩

煎濃湯浸一宿晒乾別用魚膠

四兩

剪碎以

蛤粉炒成珠同補骨脂炒香磨細末將胡桃肉搗如泥

盛以錫盆蒸之取油和末量加蜜搗和丸如梧子大空

心用三錢白湯或淡鹽湯吞晚間或飢時更一服老年

人及陽虛無火者宜此有火者忌之

### 種子奇方

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

栝子仁

去油者好酒浸一宿  
砂鍋上蒸搗爛如泥

鮮鹿茸

火燎去毛淨酥炙  
透如帶血者須慢

火防其皮破血  
走也切片為末

等分和栝子仁泥搗極勻加煉蜜丸如

梧子大每服空心三錢淡鹽湯吞

補腎健脾益氣方 朱鶴山老年久患腰痛日服

一劑強健再生子八十未艾

白茯苓

三錢

枸杞子

一兩

懷生地

二錢

麥門冬

三錢

河水

二鐘煎八分

白朮

三錢

人參

二錢

高存之長郎患腹痛仲淳問曰按之痛更甚否曰按之



則痛緩仲淳曰此虛症也即以人參等藥飲之數劑不愈但藥入口則痛止其痛每以卯時發得藥漸安至午痛復發又進再煎而安近晚再發又進三劑而安睡則不復痛矣如是者月餘存之疑之更他醫藥則痛愈甚藥入痛不止矣以是服仲淳方不疑一年後漸愈服藥六百劑全愈

人參 三錢 白芍藥 三錢 炙甘草 一錢 橘紅 五分 後加木瓜 一錢 麥

門冬 三錢 當歸身 二錢

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

又重定方

人參 四錢 白芍藥 三錢 麥門冬 三錢 甘草 一錢 當歸 三錢 枸杞子

山茱萸肉 二錢 木瓜 二錢 黃檗 一錢 鱉甲 二錢 又以鹿角膠

間服又以飲食少時惡心去當歸黃檗加牛膝 三錢 秦艽

一錢 石斛 二錢 酸棗仁 三錢 延胡索 一錢

丸方

鱉甲 北五味 白芍藥 各四兩 當歸身 五錢 麥門冬 牛

膝 黃檗 蜜 枸杞 各四兩 炙甘草 二兩 川續斷 三兩 杜仲 炙 酥



<p>三兩 懷熟地 五兩 山茱萸肉 四兩 白茯苓 三兩 車前子 二兩 懷山藥 三兩 炒 人參 四兩 天門冬 去心 鹿角膠 各四兩 煉蜜丸</p>	<p>每服四錢</p>	<p>高存之長郎兩年腹痛愈後又患臂痛每發一處輒於                  手臂指屈伸之間腫痛不可忍三四日方愈痛時在手                  即不能動仲淳曰此即前病之餘虛火移走為害也立                  丸方凡四五更定服至此方全愈</p>	<p>治臂痛方</p>	<p>欽定四庫全書                  先醒齋廣筆記</p>	<p>懷生地黃 一兩 牡丹皮 潤而厚者良 山茱萸肉 八兩 白茯苓</p>	<p>為末水澄去筋膜蒸晒再 磨以人乳拌晒數次六兩 山藥 八兩 切 澤瀉 米泔浸切</p>	<p>天門冬 去心酒蒸 六兩 麥門冬 去心烘 八兩 五味子 如法烘 八兩 牛膝</p>	<p>酒蒸 八兩 黃檗 切片蜜拌炒 枸杞子 去枯者及 砂仁 二兩 甘</p>	<p>菊花 八兩 何首烏 一兩 虎前脛骨 二對酒蒸三 白蒺藜 炒去</p>	<p>兩 兔絲子 三兩 為細末煉蜜丸如梧子大每服五錢空心</p>	<p>白湯下</p>	<p>高存之壻浦生氣上逆每飯下一二口輒噯氣數十口</p>
--	-------------	---	-------------	---	--------------------------------------	--	---	--	---------------------------------------	----------------------------------	------------	------------------------------



得眠大小便通啖粥	君 白芍藥 君 蘇子 炒研極 細佐 枇杷葉 三片 大 白茯苓 佐 二服	陸祚先乃正咳嗽飽脹痰喘水火不通眠食俱廢人參 又十倍為末山藥糊丸空心白湯吞	片 三 大 水煎臨服加沉香汁十五匙逆水蘆根汁一大盞	角 沉香 五分 益智仁 一分 錢 山茱萸肉 三錢 真蘇子 二錢 枇杷葉	人參 六錢 麥門冬 三錢 五味子 二錢 橘紅 一錢 砂仁 一錢 白芍藥 二錢	復作復用六錢而安一月後方減參二錢服半年全愈	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	索粥頓食三四盃不上逆也服五六劑減參二錢噯逆	口下如爆一聲上則噯氣下則小遺無筭上下洞然即	動服再煎不動然亦不如他湯藥輒嘔也服三煎忽心	氣不屬分必死存之坐其家迫令服仲淳藥服首劑不	錢 六 矣不信又逾月飲食不下每嘔冷氣如團而出上下	仲淳云今須參 錢 四 矣不信又逾二三月仲淳云今須參	也每劑須人參 錢 二 不信服他醫快氣藥愈甚逾二三月	再飯再噯食頃三四作仲淳曰此氣不歸元中焦不運
----------	--	---	------------------------------------	---	---	-----------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------



顧仲恭心腎不交先因失意久鬱及平日勞心致心血耗散去歲十月晨起尚未離牀忽左足五指麻冷倏已至膝便不省人事良久而甦乍醒乍迷一日夜十餘次醫者咸云痰厥仲淳云純是虛火服丸藥一劑今春覺體稍健至四月後丸藥不繼而房事稍過至六月初十偶出門前症復發扶歸良久方醒是日止發一次過六日天雨稍感寒氣前症又發二次見今兩足無力畏寒之甚自腹以上不畏寒仲淳云人之五臟各有致病之

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

由謹而察之自不爽也夫志意不遂則心病房勞不節則腎病心腎交病則陰陽將離離則大病必作以二臟不交故也法當清熱補心降氣豁痰以治其上益精強腎滋陰增志以治其下則病本必拔以心藏神腎藏精與志故也平居應獨處曠野與道流韻士討論離慾之道根極性命之源使心境清寧暫離愛染則情念不起真精自固陰陽互攝而形神調適矣

暫服湯液方



貝母 <small>錢三</small> 白茯苓 <small>錢三</small> 遠志肉 <small>錢一</small> 酸棗仁 <small>錢五</small> 蘇子 <small>錢二</small> 石斛 <small>錢二</small>	麥門冬 <small>錢五</small> 甘草 <small>錢五</small> 木瓜 <small>錢三</small> 牛膝 <small>錢八</small> 石菖蒲 <small>錢一</small> 竹瀝 <small>錢一</small>	水二鍾煎八分調入牛黃末 <small>分一</small> 天竺黃末 <small>分二</small>	一大杯臨卧飢時各一服三劑後加人參 <small>錢五</small> 枇杷葉 <small>片三</small>	調入牛黃 <small>分一</small> 天竺黃 <small>分三</small> 霞天膏 <small>錢五</small>	丸方	遠志肉 天門冬 麥門冬 白茯苓 <small>人乳</small> 白茯苓 <small>拌晒</small>	各六兩 棗仁 <small>八兩</small> 杜仲 <small>四兩</small> 懷生地 <small>八兩</small> 白芍藥 <small>六兩</small> 甘草 <small>蜜炙三兩</small>	川黃檗 <small>六兩</small> 牛膝 <small>十兩</small> 五味子 <small>六兩</small> 蜜丸如梧子大每空心服	五錢臨卧六錢石斛湯加竹瀝送下忌猪牛羊肉 羊	血 麵蒜 胡椒 鯉魚 牛乳 白菜菹	一人年三十三歲因努力即發心腹飽滿疼痛直至臍	下皆板兩脇空鬆不可言腹寒即欲就火火至稍睡痛	止大便不通小便短縮似宿茶日夜不卧至五週時飲	食漸加時常舉發大約性嗜酒善怒勞碌所致仲淳為	之疏方用當歸身 <small>錢五</small> 牛膝 <small>錢四</small> 麥門冬 <small>錢五</small> 白芍藥 <small>酒炒錢五</small> 炙
--	---	--	--	--	----	---	--	---	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--



甘草分七五味子錢一廣橘紅錢二茅根打碎一分懷生地錢三宜  
多食菲菜童便胡桃肉

婁東王官壽患遺精聞婦人聲即泄瘠甚欲死醫告術  
窮仲淳之門人以遠志為君蓮鬚石蓮子為臣龍齒茯

神沙苑蒺藜牡蠣為佐使丸服稍止然終不斷仲淳於

前方加鰾膠一味不終劑即愈

治腰痛

錢晉吾文學腰痛甚診之氣鬱兼有傷瘀血停滯仲淳

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

投以

牛膝錢五當歸身錢二炙甘草錢一紫蘇梗錢一五加皮錢三廣

橘紅錢二香附炒二錢川續斷錢二水二鍾煎八分飢時

加童便一大杯服二劑愈

又方

先外祖李思塘公少年患腰痛至不能坐立諸醫以補

腎藥療之不効朱遠齋者湖明醫也用潤字號丸藥下

之去黑糞數升蓋濕痰乘虛流入腎中作苦痰去方以





補藥滋腎不逾月起惜其方傳者不真

治盜汗

予婦幼患此仲淳以二劑  
療之今二十餘年不發

黃耆

蜜炙  
三錢

北五味

二錢

酸棗仁

炒研  
五錢

炙甘草

一錢

麥門冬

去心

人參

三錢

白芍藥

酒炒  
三錢

香附

童便浸  
炒二錢

龍眼肉

十枚

治噎

蘇子

研細  
二錢

廣橘紅

二錢

麥門冬

去心  
五錢

白芍藥

酒炒  
四錢

枇杷

葉

去毛刷淨蜜  
炙三大片

山查肉

三錢

白豆蔻仁

四分先  
嚼下

人參

三錢

逆

水蘆根汁一大盞河水一鍾半同蘆根汁煎至八分加

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

薑汁三匙竹瀝一杯飢時服

治溺有餘瀝精不固

兔絲子

半觔  
淨

牛膝

與何首烏同  
蒸半觔淨

栝子仁

去油者酒蒸另  
研如泥十二兩

杜仲

四兩  
淨

麥門冬

去心  
六兩

枸杞

六兩

北五味

六兩

血鹿角

一觔  
鹿

茸

去毛酥  
炙六兩

車前子

米泔浸  
四兩

白茯苓

多人乳  
拌晒四兩

大何首烏

赤白各半蒸

如法一觔

沒石子

三兩

細末煉蜜丸如梧子每服五錢

空腹白湯吞

治鼻衄腸風腹脹便燥



<p>麥門冬 <small>去心</small> 十兩 懷生地 <small>十兩</small> 天門冬 <small>去心</small> 六兩 五味子 <small>去枯者</small> 四兩 鱉</p>	<p>虱胡麻 <small>酒拌九蒸九晒去殼</small> 另研如泥十二兩 山茱萸肉 <small>六兩</small> 白芍藥 <small>八兩</small> 當</p>	<p>歸身 <small>五兩</small> 砂仁 <small>炒二兩</small> 紫蘇子 <small>六兩</small> 另入煉蜜丸如梧子大每</p>	<p>五錢空心白湯吞</p>	<p>治腿酸足脛痛</p>	<p>牛膝 <small>去蘆酒</small> 八兩 杜仲 <small>六兩</small> 懷生地 <small>蒸熟</small> 八兩 甘枸杞 <small>八兩</small> 山茱萸肉</p>	<p>六兩 五味子 黃檗 <small>各六兩</small> 白茯苓 <small>三兩</small> 砂仁 <small>三兩</small> 細末煉蜜丸</p>	<p>如梧子大每五錢空心白湯吞皆仲淳定</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>補腎固精方</p>	<p>北五味如法為細末每服以好酒下方寸匕久之兼可</p>	<p>御女</p>	<p>治弱症吐血夜熱不眠腰痛 陳潛齋傳</p>	<p>紫河車十具 <small>男而首胎佳</small> 自採側栢葉 <small>東南枝去粗梗陰乾四觔</small> 將河車</p>	<p>入石臼內木杵輕輕搗漸下栢葉以極爛為度起置磁</p>	<p>盆內砂鍋上蒸熟烈日曝乾如無日色或夏天將栢葉</p>	<p>攤成薄餅於磁盆上火烘乾研細末蜜丸如梧子大空</p>
--	---	--	----------------	---------------	--	--	-------------------------	--------------------------	--------------	------------------------------	-----------	-------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------



心淡鹽湯下五錢家叔久患腸風百藥不効服此頓釋

久嗽噲化丸 仲淳定

真龍腦薄荷葉三兩 百部酒浸去心 麥門冬去心 天門

冬去心 桑白皮蜜炙 枇杷葉蜜炙 貝母去心 桔梗米泔

去蘆 甘草蜜炙 天花粉二兩 玄參一兩 北五味蜜炙 欵冬花

薤二兩 紫苑八錢 真柿霜二兩 橘紅一兩 極細末煉蜜丸如彈子

大不時噲化臨卧更佳

于中父患目珠痛如欲墮胸脇及背如槌碎狀晝夜咳

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

嗽眠食俱廢自分不起促仲淳訣別仲淳曰何至是耶

今日進童便三大碗七日下黑血無數痛除咳熱如故

再投以二冬貝母蘇子橘紅白芍藥鱉甲青蒿子桑根

白皮五味子百部枇杷葉竹瀝童便久之未痊太夫人

及胞弟潤父疑其虛促用參耆仲淳不可潤父陰以黃

耆二錢入前藥嘗之竟夕悶熱目不交睫始信仲淳不

謬固守前方兼服噲化丸勿輟逾月平蓋中父病起于

乃翁之變衰傷過甚更觸惱怒所致非虛也肺熱而實



肝火上冲故不宜參耆爾

里中一童子年十五患寒熱咳嗽面赤鼻塞夜劇家人以為傷風仲淳視之曰陰虛也蓋傷風之證面色宜黯今反赤而明傷風發熱必晝夜無間今夜劇鼻塞者因虛則火上升壅肺故鼻塞以是知其陰虛也投以麥門冬五味桑皮貝母百部鱉甲生地黄沙參不四劑瘳臧儀部靜涵患氣喘自汗晝夜不眠食諸醫以外感治之病甚仲淳診之曰此腎虛氣不歸元故火上浮喘汗

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

交作脾虛故不思食亟以麥門冬五味子枸杞子滋陰斂肺以蘇子橘紅降氣消痰以芍藥酸棗仁茯苓補脾斂汗不數劑瘳

趙景之太史未第時因肄業勞心太過患夢遺證已三四年矣不數日一發發過則虛火上炎頭面烘熱手足逆冷終夜不寐補心腎及瀉精藥無不用過壬申春偶因感冒來邀診視談及前證之苦予為之疏一丸方以黃檗為君佐以地黄枸杞蓮鬚膠山茱萸五味車前天



麥門冬之類不終劑而瘳初時景之意恐黃檗太寒不欲用予謂尊恙之所以久而不愈者政未用此藥耳五臟苦欲補瀉云腎欲堅急食苦以堅之黃檗是矣腎得堅則心經雖有火而精自固何夢遺之有哉向徒用補益收瀦而未及此故難取效

湖廣張仲虎客邸耽于青樓且多拂意之事至冬底發太寒熱咳嗽吳中醫者皆以外感治之發表和解無不遍試適毛子晉拉予視之見其神色消耗脈氣虛數中

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

時復一結咳嗽有血卧不貼席予謂子晉曰此陰虛內傷證也陰精虧竭故脈見虛數內有瘀血故結脈時見肺肝葉損所以卧不能下此不治之證况誤認外感多服發散復蹈虛虛之故耶不數日而歿

太學許韜美形體卑弱神氣短少且素耽酒色時嘗齒芻辛未春偶患右乳傍及肩背作痛異常手不可近捫之如火日夜不眠醫以內傷治之服桃仁紅花乳沒延胡靈脂等藥廿餘劑不効邀予診視六脈虛數肝腎為



甚予斷為陰虛火旺之證當滋養陰血扶持脾胃俾陰	血漸生虛火降下則痛不求其止而止矣如必以和傷	治痛為急則徒敗胃氣剋削真元非所宜也疏一方付	之用生地牡丹皮芍藥牛膝枸杞續斷石斛甘草桑枝	麥冬蘇子囑其服十劑方有效以陰無驟補之法耳服	至八劑後復邀過看診其脈氣漸和精神漸旺向未出	房室至此則能步至中堂但痛處未盡除然而生機則	躍躍矣惜其欲速太過惑于羣小棄置予方復以前藥	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	雜進一月後胃氣果敗作嘔逆陰血愈耗發潮熱脾氣	傷盡作腹脹再半月而死矣 <small>已上三條附</small>	吐血三要法	宜行血不宜止血	血不行經絡者氣逆上壅也行血則血循經絡不止	自止止之則血凝血凝則發熱惡食病日痼矣	宜補肝不宜伐肝	經曰五臟者藏精氣而不瀉者也肝為將軍之官主
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	----------------------	--------------------	---------	----------------------



藏血吐血者肝失其職也養肝則肝氣平而血有所歸伐之則肝虛不能藏血血愈不止矣

宜降氣不宜降火

氣有餘即是火氣降則火降火降則氣不上升血隨氣行無溢出上竅之患矣降火必用寒涼之劑反傷胃氣胃氣傷則脾不能統血血愈不能歸經矣今之療吐血者大患有二一則專用寒涼之味如芩連山梔四物湯黃檗知母之類往往傷脾作泄以致不救

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

一則專用人參肺熱還傷肺咳嗽愈甚亦有用參而愈者此是氣虛喘嗽氣屬陽不由陰虛火熾所致然亦百不一二也仲淳立論專以白芍藥炙甘草制肝枇杷葉麥門冬薄荷葉橘紅貝母清肺薏苡仁懷山藥養脾韭菜菴降香真蘇子下氣青蒿鱉甲銀柴胡牡丹皮地骨皮補陰清熱酸棗仁炒白茯苓研養心山茱萸肉枸杞子補腎予累試之輒驗然陰無驟補之法非多服藥不效病家欲速其功醫者張皇無主百



藥雜試以致殞身覆轍相尋不悟悲夫  
爾者  
醫金治吐血  
聖藥患無真

顧季昭患陰虛內熱仲淳云法當用甘寒不當用苦寒  
然非百餘劑不可慎勿更吾方欲加減使吾徒畧加增  
損可也果百劑而安

天門冬 麥門冬 桑白皮 貝母 枇杷葉  
錢 各二

骨皮 錢三 五味子 錢一 白芍藥 錢二 鱉甲 錢三 蘇子 研細 車前子 錢二

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

王司丞遜之患吐血仲淳診之云多服童便自愈別去  
貽書門人張選卿曰遜之旋已勿藥矣但相公年尊右  
手脈弱甚此非細故可致意遜之預為計時文肅公尚  
無恙不兩月而遜之疾瘳文肅一病不起

加味六味地黄丸 治吐血趙冠山  
子服之立起

地黄 半 天門冬 麥門冬 牛膝 鱉甲 黃檗 青

蒿 五味子 橘紅 枇杷葉 懷山藥 山茱萸肉

兩各四 澤瀉 牡丹皮 白茯苓





煎方	蘇子 <small>二炒研</small> 枇杷葉 <small>三片大</small> 生地黄 <small>三錢</small> 廣陳皮 <small>二錢</small> 白芍藥 <small>三錢</small>	茅根 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>五錢</small> 桑白皮 <small>二錢</small> 番降香 <small>一錢二分</small> 貝母 <small>二錢</small>	牛膝 <small>四錢</small> 鱉甲 <small>四錢</small> 甘草 <small>一錢</small> 天門冬 <small>二錢</small>	治陰虛喉痛喉間血腥氣聲啞到此便難措手	麥門冬 <small>三錢</small> 天門冬 <small>三錢</small> 薄荷 <small>八分</small> 貝母 <small>三錢</small> 蘇子 <small>研一錢</small> 橘紅 <small>二錢</small>	炙甘草 <small>一錢</small> 百部 <small>三錢</small> 欵冬花 <small>二錢</small> 鱉甲 <small>四錢</small> 桑白皮 <small>如法</small>	三錢 懷生地 <small>三錢</small> 河水二鐘煎八分加童便一杯飢時服	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	丸方	六味地黄丸中加鱉甲 天門冬 麥門冬 百部	五味子 真阿膠 各如山藥之數煉蜜丸每六錢空	心淡鹽湯吞飢時白滾湯吞 <small>已上皆仲淳法</small>	消渴證	湖州庠友張君時泰辛酉正月驟發齒痛十餘日而愈 四月間焦勞過多齒痛大發醫用石膏知母等藥投之 不効用刀去齒間紫血滿口痛不可忍齒俱搖動矣至
----	--	---	--	--------------------	--	---	--	------------------	----	----------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----	---



<p>六七月間飲食益多小便如注狀如膏肌肉盡削至十一月身不能起冬末用黃耆地黃等藥稍能起立然善食易飢如故小便如膏亦如故今年二三月愈甚亦不服藥齒痛如故當門二齒脫落復加口渴晝夜不止此中下二消證也予為立後方服未數劑而瘳</p>	<p>麥門冬<small>兩五</small> 五味子<small>錢三</small> 黃連<small>錢三</small> 蘆根<small>兩五</small> 黃耆<small>錢五</small> 懷生地黃</p>	<p>錢六 天門冬<small>兩一</small> 用縲絲湯十碗煎二碗不拘時服丸方於</p>	<p>前藥中加黃檗<small>兩三</small> 牛膝<small>兩五</small> 沙參<small>兩六</small> 枸杞子<small>兩四</small> 五味子<small>兩六</small></p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>蜜丸常服遂不復發</p>	<p>婦人</p>	<p>治婦人血熱經行先期</p>	<p>枇杷葉<small>一觔</small> 白芍藥<small>半觔</small> 酒浸切 懷生地黃<small>六兩</small> 酒洗 懷熟</p>	<p>地黃<small>兩四</small> 青蒿子<small>五兩</small> 童 五味子<small>四兩</small> 蜜蒸 甘草<small>一兩</small> 去皮 山茱</p>	<p>萸肉<small>兩四</small> 黃檗<small>兩四</small> 蜜拌炒 川續斷<small>四兩</small> 酒洗炒 阿膠<small>五兩</small> 粉炒無</p>	<p>真者鹿角膠代 杜仲<small>兩二</small> 去皮 細末 懷山藥粉<small>四兩</small> 打糊</p>	<p>同煉蜜和丸如梧子大每五錢空心淡醋湯吞飢時更</p>
--	---	---	--	--------------------------	-----------------	-----------	------------------	--	---	---	--	------------------------------



進一服忌白蘿蔔

加減正元丹

治婦人經不調無子

香附

炒一分 同艾二兩 醋浸二宿 分作四分 一分用鹽水

當歸身

酒洗五兩 川芎二兩 白芍藥八兩 酒浸切 生地六兩 酒洗阿

膠

四兩 蛤粉炒成珠 枳殼三兩 江西者 艾附醋打糊餅

乾

為末米醋煮山藥粉糊丸如梧子大每四錢空腹淡

醋湯吞

忌白菜菘 右八味乃正元丹後加減法也

加青蒿子

三兩 山茱萸肉三兩 銀柴胡一兩 五味子三兩 鱉甲三兩 醋炙

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

如法

四兩 如經調後覺經不行恐有妊娠即勿服如後期去

青蒿子銀柴胡鱉甲

治血熱經行先期腰腹痛發熱

血熱忌用芎歸 常用第一方

正元丹中去香附換入枇杷葉

十兩 蜜炙杜仲去皮酥 鹿角

膠

蛤粉炒四兩 麥門冬去心四兩 青蒿子 山茱萸肉 北五味

子

各三兩 銀柴胡一兩

治血虛經行後期

白芍藥

六兩 半熟香附四兩 童便浸炒 蘄艾葉一兩 五錢 懷生地六兩



<p>麥門冬<small>六兩</small> 杜仲<small>三兩</small> 酥炙橘紅<small>二兩</small> 枇杷葉<small>六兩</small> 甘草<small>一兩五錢</small></p> <p>白膠<small>四兩</small> 蛤粉<small>兩</small> 川芎<small>二兩</small> 青蒿子<small>四兩</small> 當歸<small>六兩</small> 用醋</p>	<p>煮懷山藥糊丸 梧子大每服五錢 白湯送下</p> <p>治血虛經行後期太甚 半邊頭疼</p>	<p>當歸身 白芍藥<small>各二錢</small> 川芎<small>一錢</small> 甘菊花<small>三錢</small> 藁本<small>一錢</small> 懷</p> <p>生地<small>二錢</small> 荆芥穗<small>八分</small> 天門冬<small>二錢</small> 麥門冬<small>三錢</small> 炙甘草<small>一錢</small> 河</p>	<p>水煎臨服加童便一小杯</p> <p>又治經行後期太甚</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p> <p>香附<small>一兩</small> 懷生地<small>五兩</small> 白芍藥<small>八兩</small> 枳殼<small>二兩</small> 砂仁<small>二兩</small> 阿膠<small>四兩</small></p>	<p>蘄艾<small>二兩</small> 為末醋煮懷山藥糊丸 梧子大每服四錢 空</p> <p>心淡醋湯下 一方加懷熟地<small>三兩</small> 川芎<small>二兩</small> 去砂仁一味</p>	<p>俱神效</p> <p>治腎泄兼脾泄</p>	<p>肉苳蔻<small>粉裹煨</small> 北五味子<small>四兩</small> 補骨脂<small>如法製</small> 白芍藥<small>二兩</small></p> <p>砂仁<small>一兩</small> 甘草<small>八錢</small> 人參<small>三兩</small> 吳茱萸<small>湯泡去</small> 為末山藥</p>	<p>粉糊丸如梧子大 空心白湯下三錢至五錢</p>
--	--	--	-----------------------------------	--	---	--------------------------	---	---------------------------



澤瀉 三錢半 切片炒	白荳蔻仁 三錢 不可見火	川黃連 次三錢 如法炒	廣陳皮 二兩 去白畧	山查肉 兩 蒸二	甘草 五錢 去皮蜜	懷山藥 片切	人參 三兩 蒸烘乾飯上	白朮 兩 三	白茯苓 兩 細末水澄蒸晒乾入	保胎資生丸 胎無所養故胎墮也服資生丸	次服立愈此方出本草予偶閱之傳一門人試之如神	懷生地 兩 二	酒炒砂仁末 兩 一	水酒各二碗煎一碗分作二	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	安胎將墮欲死方	以為積血或以為血枯經閉仲淳云孕也若行血則禍不旋踵但分娩後恐不能全吉爾已而果然	李博士本石內人患痰嗽三年骨立矣經不行諸醫或	每服三四錢空腹白湯下	參一兩 木香六錢 砂仁八錢 細末山藥粉糊丸如梧子大	肉荳蔻 四兩 粉裹煨	吳茱萸 兩 湯泡二錢	補骨脂 兩 三	五味子 兩 三人	治婦人腎泄無子
------------------	--------------------	-------------------	------------------	----------------	-----------------	-----------	-------------------	--------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------	---------	--	-----------------------	------------	------------------------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	---------



<p>淨麪 一兩 右藥共十七味如法修事細末煉蜜丸如彈子大</p>	<p>每丸重二錢用白湯或清米湯橘皮湯炒砂仁湯嚼化</p>	<p>下忌桃李雀蛤生冷</p>	<p>治惡阻 <small>即胎前嘔吐</small></p>	<p>橘紅 錢一 麥門冬 錢二 人參 錢一 木瓜 錢二 竹茹 錢一 枇杷葉 片三</p>	<p>藿香 分五 下咽即驗</p>	<p>烏蠱魚湯治妊娠腹脹滿 <small>顧仲穆子婦患此數劑而安</small></p>	<p>白茯苓 錢二 白朮 五分 炒二錢 廣橘紅 木瓜 桑白皮 蜜如法</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>紫蘇葉 錢一 秦艽 三錢 酒洗 生薑皮 五分 用大蠱魚一枚</p>	<p>河水五碗煎至三大碗去魚骨濾清始入前藥煎至一</p>	<p>碗服之以愈為度</p>	<p>治子懸 <small>即胎上沖</small></p>	<p>紫蘇 橘紅 麥門冬 各等分為細末每服四錢用</p>	<p>枇杷 片三 竹茹 五分 煎湯調服</p>	<p>治胎驚胎熱一受孕即宜預服 <small>姚康成乃正服之神驗</small></p>	<p>木瓜 錢一 天門冬 黃耆 白芍藥 各三 麥門冬 錢五 鼠粘</p>
--	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--	-----------------------	--	--	--------------------------	--	------------------------------	----------------	--------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--	--



川牛膝	人參	沈香	乳香	沒藥	真阿膠
玄胡索	懷熟地	當歸身	川續斷	川芎	
琥珀丸	專治婦人生產艱難下胎衣血	李玄白傳神驗			
清入膠同煮化調二末服之	已上調經胎產諸方仲淳手定				
水酒各鍾半將柞枝白芷煎濃至一碗去渣濾					
魚膘	刺燈火上炙脆研柞枝	四兩蠶食者一葉一刺者			
不結子其	白芷	一錢	百草霜	山家者	千里馬
裏純白	五分		良一錢		舊草鞋燒
灰存性					
欽定四庫全書	先醒齋廣筆記				
生試之神驗					
傳自京華祝					
羊角	磨汁入藥汁中	河水二鍾煎八分空心饑時服			
二錢	木通	貝母	牡丹皮	金銀花	荆芥穗
錢一	錢二	錢一	錢五分	錢四	錢一
甘草	生用	懷生地	連翹	黃連	玄參
錢二	錢四	錢二	錢一	錢二	括婁根
治小兒臍風撮口孕時母服可預解一切胎毒					
分食遠溫服服至百帖神效					
炙甘草	貝母	砂仁	人參	河水	大碗煎八
錢一	錢二	錢一	錢五分		
子	金銀花	甘菊花	石斛	懷生地	連翹
錢一				錢各三	錢一







<p>二錢酒化開和童便下 如不能飲者酒化開白湯下</p>	<p>產後腹痛者酒化開益母湯下 更有男婦年久腹</p>	<p>痛諸藥不效者服兩三丸即愈 室女經脈不通者用</p>	<p>桃仁蘇木紅花當歸煎湯下惟勞熱有肺火者不宜服</p>	<p>治橫生 <small>高存之 試驗</small></p>	<p>益母草 <small>六兩</small> 酒煎濃汁加童便一大杯</p>	<p>治胞衣不下 <small>高存之 屢試驗</small></p>	<p>芒硝 <small>三錢</small> 酒煎服宜加牛膝當歸各五錢然芒硝鹹寒太</p>	<p>甚用時極宜斟酌</p>	<p>產後調理方 <small>仲淳立 如產時惡露過多 無兒枕痛者不可用此方</small></p>	<p>當歸身 <small>三錢</small> 川芎 <small>一錢</small> 生地 <small>二錢</small> 赤芍藥 <small>一錢</small> 延胡索 <small>二錢</small></p>	<p>牛膝 <small>五錢</small> 蒲黃 <small>一分</small> 乾薑 <small>七分</small> 肉桂 <small>七分</small> 山查肉</p>	<p>五靈脂 <small>醋煮去沙一錢</small> 桃仁 <small>去皮尖</small> 紅花 <small>各八分</small> 黑豆 <small>炒一合</small> 杜仲</p>	<p>續斷 <small>二錢</small> 益母草 <small>五錢</small> 澤蘭葉 <small>一錢</small> 荆芥穗</p>	<p>水煎入童便服過五七日覺少腹已軟無塊按之</p>	<p>不痛即將赤芍藥蒲黃肉桂五靈脂桃仁紅花六味盡</p>
------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------	--	----------------	--	--	--	---	---	----------------------------	------------------------------



去之另加白芍藥 <small>錢二</small> 麥門冬 <small>錢三</small> 五味子 <small>分七</small> 如虛汗去	荊芥川芎加棗仁 <small>錢五</small> 驚悸亦加之汗不止加黃芪人	參 <small>錢各二</small> 虛甚作喘倍加人參黃耆倍麥門冬去生地	當歸桃仁紅花如脾胃弱不食泄瀉加人參 <small>多少</small> 肉	果 <small>錢一</small> 砂仁 <small>分七</small> 橘紅 <small>分八</small> 腰痛無力是血虛以鹿角膠	<small>錢五</small> 酒漿化空心溫服血暈及血不止發熱作渴用童便	一味是產後聖藥	預防血暈神方 <small>古方</small>	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	將產預將荊芥穗末 <small>錢三</small> 童便沸湯各一杯聽用兒一產	下即將前末同童便入湯調服永無血暈之病荊芥能	引血歸經也虛脫者人參 <small>錢五</small> 乾薑 <small>錢二</small> 肉桂 <small>錢二</small> 虛甚者參	至 <small>一加</small> 附子 <small>童便製過一錢夏月</small>	治產後虛脫兼防血暈 <small>予家素試之神驗</small>	人參 <small>兩一</small> 真蘇木 <small>打碎</small> 鹿角膠 <small>錢五</small> 水二碗酒一碗煎至一	碗加童便一杯預煎候產下即服	治產後虛喘
--	--	--	---------------------------------------	---	--	---------	--------------------------	------------------	---	-----------------------	---	--	----------------------------------	--	---------------	-------



已丑予婦產後五日食冷物怒傷脾作泄乃微嗽又三	日泄不止手足冷發喘床亦動搖神飛蕩不守一醫以	人參 <small>錢五</small> 附子 <small>錢五</small> 療之如故加參附又不效漸加至參 <small>兩三</small>	附子 <small>錢三</small> 一劑霍然起	于中甫夫人產後氣喘仲淳投以人參 <small>錢五</small> 蘇木 <small>錢五</small> 麥門	冬 <small>錢五</small> 一劑愈五日後忽自汗無間晝夜聞響聲及飲熱	茶湯即汗徧體投以人參 <small>錢五</small> 黃芪 <small>錢五</small> 加當歸身生地黃	二劑不効即令停藥彌日金壇俗忌未彌月不得診視	欽定四庫全書	先醒齋廣筆記	仲淳徧檢方書至證治要訣治汗門內有凡服固表藥	不効者法當補心汗者心之液也洒然曰是已于夫人	素稟有火氣非不足也產後陰血暴亡心主血故心無	所養而病汗亟以炒酸棗仁 <small>兩一</small> 為君生地黃白芍藥麥	門冬五味子枸杞牛膝杜仲當歸身阿膠牡蠣龍眼肉	大劑與之至三十二劑罔效中甫懼曰得無不起乎或	藥應更改乎仲淳曰非也吾前所以投參芪不應而遽	止之者以參芪為氣分藥劑且大其不應者必與證不
-----------------------	-----------------------	--	----------------------------	---	---	---	-----------------------	--------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



子貝母 錢各二	加荆芥 錢一	子生地黃 錢一	錢四牛膝 錢四	鱉甲 錢四	薑桂勢甚劇數劑輒定	施靈修乃正產後發寒熱咳嗽不止因本元虛弱誤用	昔人治病必求其本非虛語也	欽定四庫全書	苓黃槩為臣甘草車前為使投之一劑輒效四劑而起	斛木瓜牛膝白芍藥酸棗仁為主生地黃甘枸杞白茯	故病下體向所飲藥雖多皆苦燥之劑不能益陰用石	之極仲淳診之曰此脾陰不足之候脾主四肢陰不足	王善長夫人產後腿疼不能行立久之飲食不進困憊	愈熟睡至四日夜一醒霍然顏色逾常血足則色華也	可責效旦夕仍投前劑至四十二帖忽得睡汗漸收睡	合也茲得其情復何惑乎蓋陰血者難成易虧者也不
腰痛加枸杞子 錢五	咳嗽甚加桑白皮 錢三	茯苓神 錢三	錢五分杜仲 錢五分	錢五分橘紅 錢二	當歸 錢二	遠志肉 錢一	青蒿子 錢二	先醒齋廣筆記	白芍藥 錢二	白茯 錢二	石 錢二	脾 錢二	困 錢二	色 錢二	睡 錢二	不 錢二
關血未盡加黑豆	有痰加蘇	偶傷風	麥門冬 錢五	五味	青蒿子 錢二	白芍藥 錢二	石 錢二		白芍藥 錢二	白茯 錢二	石 錢二	脾 錢二	困 錢二	色 錢二	睡 錢二	不 錢二



炒一大把 脾胃不佳去牛膝生地益母草

丸方

鱉甲<sup>六兩</sup> 牛膝<sup>六兩</sup> 酒蒸 青蒿子<sup>四兩</sup> 懷生地 白芍藥 棗仁

各六兩 當歸身 真阿膠<sup>重蕩酒頓化</sup> 白茯苓<sup>六兩</sup> 遠志肉

杜仲<sup>各三兩</sup> 麥門冬<sup>六兩</sup> 五味子<sup>四兩</sup> 枸杞子<sup>六兩</sup> 懷山藥<sup>片切</sup>

炒黃<sup>四兩</sup> 牡丹皮<sup>酒蒸二兩</sup> 山茱萸肉<sup>四兩</sup> 砂仁<sup>炒二兩</sup> 牡蠣粉<sup>火</sup>

通紅<sup>七次</sup> 淬入醋中<sup>如此</sup> 細末煉蜜丸如梧子大每五錢空

心白湯吞飢時更進一服

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

黃桂峯乃正產後頭疼大便秘用生料五積散一劑不

效仲淳加歸身<sup>一兩</sup>一服大便通頭疼立止

張璇浦乃正產六朝發狂持刀殺人陰血暴崩肝虛火

炎故也仲淳令先飲童便一甌少止再服

龍齒 澤蘭 生地 當歸 牛膝 茯神 遠志

酸棗仁 大劑仍加童便頓服而止

王六息乃正產後驚悸聞聲輒死非用力抱持則虛煩

欲死如是累月仲淳曰此心脾肝三經俱虛也用人參



酸棗仁茯神遠志芍藥石斛甘草麥門冬五味丹砂為丸以龍眼湯吞彌月而愈

賀函伯乃正小產後陰血暴崩作暈惡心牙齦浮腫喉

嚨作痛日夜叫號不絕仲淳曰此證因失血過多陰氣

暴虧陽無所附火空則發故炎上胸中覺煩熱所謂上

盛下虛之候也法當降氣氣降則火自降矣火降則氣

歸元而上焦不煩熱齒齦腫消喉嚨痛止陽交於陰而

諸病自已爾

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

蘇子研細二分麥門冬去心四錢白芍藥酒炒四錢青蒿子二分牛

膝四錢五味子打碎五分鱉甲各四錢生地黄各四錢甘枸杞各四錢枇杷

葉三片川續斷二錢酸棗仁炒爆研五錢橘紅二錢河水二鍾半

煎一碗加童便一大杯鬱金汁十二匙空心服時進童

便一杯

莊斂之次女產後惡露未淨至夜發熱脾胃却弱腰腹

大痛時師謂產後氣血俱虛投以人參當歸諸補劑轉

劇斂之深以為憂恐其成蓐勞也余診視之謂不數帖



<p>治女人血崩</p>	<p>菜菔 丸如梧子大每服五錢空心淡鹽湯吞忌食鯽魚子白</p>	<p>厚者三兩半 鹿角膠 藥酒六兩入 橘紅 兩三 砂仁 兩炒二 細末煉蜜和</p>	<p>兩 茯苓 兩三 青蒿子 兩四 山藥 炒五兩 山菜萸肉 兩五 牡丹皮 兩瀾</p>	<p>法如 川續斷 去蘆各五兩 五味子 兩三 栝子仁 六兩如法 酸棗仁 炒六</p>	<p>懷生地 熟地 各五兩 麥門冬 去心 甘枸杞 去枯者及蒂各六兩 杜仲</p>	<p>調理丸方</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>錢五 膝十餘劑脾胃亦佳其疾遂瘳</p>	<p>錢三 杜仲 錢二 五味子 錢一 山菜萸肉 錢二 炙甘草 分五 沙參 錢三 牛</p>	<p>肉 錢三 橘紅 錢三 砂仁 錢二 麥芽 錢三 石斛 錢三 蓮肉 粒四十 白扁豆</p>	<p>未盡除而脾胃尚未健更為改定一方白芍藥 錢一 山查</p>	<p>青蒿子 錢四 十劑而惡露淨發熱已腹痛亦止但腰痛尚</p>	<p>分八 乾葛 半一錢 白扁豆 錢三 杜仲 錢三 牛膝 錢五 黑豆 錢八 澤蘭 錢一</p>	<p>黃肉 錢四 橘紅 五分 麥門冬 錢四 蘇子 錢二 車前子 錢二 炙甘草</p>	<p>即痊矣安用過慮為為疏一方白芍藥 錢二 紅麩 錢二 山菜</p>
--------------	-------------------------------------	---	---	--	--	-------------	--------------------------	----------------------------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	--



人參 黃芪 麥門冬 各三錢 五味子 七分 杜仲 熟地

山茱萸 各二錢 枸杞子 三錢 續斷 一錢 荊芥穗 八分 阿膠 二錢 河

水煎日進三服

又丸方

黃耆 二兩 人參 兩 熟地 兩 白芍藥 一兩 五錢 酒浸 五味

子 懷山藥 續斷 洗酒 杜仲 炙酥 栝子仁 酒浸 二宿 青蒿

子 童便浸 麥門冬 酸棗仁 各一兩 鹿角膠 三兩 酒 共

末將酒化鹿角膠栝子仁泥同煉蜜丸如梧子大每服

欽定四庫全書 先醒齋廣筆記

五錢空心白湯下

董龍山夫人患血崩由于中年鬱怒諸醫百藥不効用

大劑參耆徧覓胎髮百餘丸火煨調入藥服久之漸愈

火煨髮用小砂罐鹽泥煉極熟將髮入罐中封固陰乾

以炭火圍之俟黑煙將盡即起若青煙出髮枯不可用

矣非細心人不可任蓋火候不可過也

顧太學叔夏內人舟中為火所驚身熱羸弱幾成瘵羣

醫誤投參芪勢危甚仲淳以清肌安神之劑與之戒以





勿求速效凡數十劑而安

麥門冬

二錢

鱉甲

小便炙三錢

青蒿子

銀柴胡

桑白皮

自採

忌鐵蜜炙各二錢

五味子

一錢

枇杷葉

二錢

白芍藥

一錢

生地黄

酒洗一錢

薏苡仁

三錢

包海亭夫人患腹痛連少腹上支心日夜靡間百藥不

效仲淳診其脈兩寸關俱伏獨兩尺實大按之愈甚詢

知其起自暴怒風木鬱于地中投以芎藭

上

柴胡

中

麻下下咽噎氣數十聲痛立已已而作喘仲淳曰是升

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

之太驟也以四磨湯與之遂平

甲申夏舊婦因鬱火痰喘身熱手拳目張半月不眠食

按其胃口不痛諸醫疑其虛也或云中暑百藥試之痰

喘滋急以皂角末嚏鼻通竅痰上逆如沸延楊石林診

視請嘔吐之先大夫曰病久矣虛甚可奈何石林曰經

云上部無脈下部有脈其人當吐不吐則死即以鹽湯

吞之去白痰數盃喘定先大夫曰何以藥之石林曰吐

即藥也待其熟寢勿服藥以養胃氣夜半啜粥二碗詰



且投六君子湯數劑而起石林者里中博雅士不行術而精方脈者也

高存之夫人患心口痛一日忽大發胸中有一物上升

沖心三婦人用力捺之不下叫號欲絕存之曾預求仲

淳立此方是日急煎服之服一盞沖上者立墮下腹中

作痛不升矣再服腹中痛者亦消二日後以病愈起洗

沐又忽作嘔頭痛如劈存之曰此即前症煎前藥服之

立安

欽定四庫全書  
先醒齋廣筆記

白芍藥 三錢 酒炒 炙甘草 五分 吳茱萸 湯泡三分 白茯苓 二錢 延胡 一錢

蘇子 炒研一分 橘紅 一錢 鹽水潤過 後加半夏 一錢 薑汁

旋覆花 一錢 木通 七分 竹茹 一錢

予婦今春忽患心痛連下腹如有物上下撞痛不可忍

急以手重按之痛稍定按者稍鬆即叫號仲淳曰此必

血虛也脈之果然急投以白芍藥 五錢 炙甘草 七分 橘紅 三錢

砂仁 三錢 炒鹽 五分 二劑稍定已久以牛黃蘇合丸疏其

氣噎氣數次痛徐解予問故仲淳曰白芍藥甘草治血



虛之聖藥也因久鬱氣逆故減甘草之半仲景甲已化  
 土之論詳矣諸醫不解爾炒鹽者何曰心虛以炒鹽補  
 之即水火既濟之意也予懼俗師槩以痰火食積療心  
 腹之痛故疏其詳如左

昔年予過曲河適王宇泰夫人病心口痛甚日夜不眠  
 手摸之如火予問用何藥曰以大劑參歸補之稍定今  
 尚未除也曰得無有火或氣乎宇泰曰下陳皮及涼藥  
 少許即脹悶欲死非主人精醫未有不誤者予又存此

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

公案以告世之不識虛實而輕執方者

梁溪一婦人喉間如一物上下作梗前後板痛服仲淳

方二十劑全愈

番降香 錢一  
 川通草 五分  
三劑去之  
 蘇子 錢三  
 橘紅 錢二  
 枇杷葉

片人參 錢一  
 炙甘草 七分  
 石菖蒲 錢一  
 麥門冬 錢三  
 甘菊花 錢二  
 白

芍藥 錢三  
 遠志 錢一  
 白豆蔻仁 四分  
 木瓜 錢二  
 石斛 酒蒸 錢二  
 加蘆根

汁一鍾同煎入薑汁二匙

梁溪一女子頭痛作嘔米飲不能下仲淳云因於血熱



血虛火上炎

麥門冬錢五 橘紅錢二 枇杷葉片三 蘇子錢一 白芍藥錢三 木

瓜錢二 白茯苓錢二 甘菊花錢一 烏梅肉錢二 竹瀝杯一 蘆根汁

碗半 一二劑嘔止頭尚痛加天門冬錢二 頭痛少止再加土

茯苓兩二 小黑豆撮一 全愈

白帶赤淋

婦人多憂思鬱怒損傷心脾肝火時發血走不歸經此

所以多患赤白帶也白帶多是脾虛蓋肝氣鬱則脾受

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

傷脾傷則濕土之氣下陷是脾精不守不能輸為榮血

而下白滑之物矣皆由風木鬱於地中使然耳法當開

提肝氣補助脾元宜以補中益氣湯加酸棗仁茯苓山

藥黃檗蒼朮麥冬之類濃煎不時飲之再用六味丸中

加牡蠣粉海螵蛸杜仲牛膝蜜丸光大如豆空心飢時

吞下五六錢陰虛火熾加枸杞子五味子黃檗

白帶多屬氣虛補氣健脾治法之要領也

帶下如濃泔而臭穢特甚者濕熱甚也且多有濕痰下



墜者宜蒼朮白朮黃檗黃芩茯苓車前子為主佐以升  
提

帶下如雞子清者脾腎虛極也面色必不華足脛必浮

腰腿必酸宜五味子八味丸間用開脾養心之劑如歸

脾湯之類陰虛有火宜六味丸中加五味子兔絲子車

前子黃檗叔和云崩中日久為白帶漏下多時骨肉枯

蓋言崩久血氣虛脫而白滑之物下不止耳此症雖有

血氣寒熱之分要歸總屬於虛赤淋多因於心火肝火

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

時熾不已久而陰血漸虛中氣漸損遂下赤矣治宜養

心為主兼以和肝緩中涼血清氣赤帶久不止則血虛

宜膠艾四物湯加便煨牡蠣粉酸棗仁麥門冬

標急而元氣不甚憊者先救其標

標急而元氣衰劇者則當本而標之也

### 治白帶

蛇床子

米泔淘取沈水者蒸晒乾去皮炒為細末

每一兩加枯白礬末

五分

菜菔肉

五味子

車前子

米泔浸蒸

香附

醋煮各三錢

細末山



藥糊丸如梧子大每四錢空心淡醋湯吞飢時再進一服後用四物湯加山茱萸 五味子 炒砂仁 白芍藥 杜仲 黃檗 車前子 鹿角膠醋化丸如梧子大每日空心白湯吞五錢調理自除

治老年白帶

黃檗 去粗皮切片 蜜炒四兩 砂仁 炒二兩 杜仲 去皮切片鹽酒炒去絲四兩 川續

斷 酒洗二兩 補骨脂 酒浸瓦上炒三兩 川芎 二兩 香附 八兩醋浸二宿

一分酥炙一分童便炒 蕪艾 用浸香附醋炒加山藥粉一分醋炒一分鹽水炒 艾 煮作糊拌艾打成餅晒乾

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

一兩 山茱萸肉 四兩 白茯苓 如法水澄蒸 白芍藥 酒浸六錢 鹿角膠 醋化五兩 北五味 蜜蒸四兩 車前子 米泔浸蒸 牡蠣粉

半 鹿角膠 醋化五兩 北五味 蜜蒸四兩 車前子 米泔浸蒸 牡蠣粉

火煨醋淬研 細末和鹿角膠丸如梧子大空心淡薑湯

送下五錢

庶母因兒痘驚苦積勞虛煩不得卧心膽虛怯觸事驚

悸百藥不效家弟長文偶于友人許聞興化陳丹崖療

一女人甚奇其症與母類叩其方乃温膽湯也試之數

劑而效



瞿元立夫人素清癯不耐煩勞一日謂仲淳曰弟婦未	此盡吾心爾病不起矣逾年醫家百藥雜試竟天	也不半歲夜熱咳嗽勢漸劇倉皇延仲淳疏方予之曰	婚亡大恙何至是耶予私扣之仲淳曰脈弦數真弱症	姚公遠內子病延仲淳入診其繼母乘便亦求診仲淳	語伯道曰婦病不足慮嫂不救矣聞者駭甚曰吳方新	素問木鬱則達之顧諸君不識爾	疼仲淳曰愈矣再煎淳服立起予駭問故仲淳曰此在	欽定四庫全書	錢二 乳香 沒藥 各七分半燈心同 研細臨服下之	白芍藥 錢三 橘紅 錢二 白芷 錢二 炙甘草 錢一 香附 童便浸炒三錢	肉桂	曰此非腎虛也如腎虛不能延至今日矣用	投以鹿角膠不斂以濕痰療之亦不斂徧走使延仲淳	先安人因亡女忽患腰痛轉側艱苦至不能張口受食	人參 錢二 質之仲淳曰此必有痰而善飯者也果然	各二分半 分二劑薑棗煎服外加酸棗仁 錢五 後因虛極加	半夏 錢七 竹茹 枳實 錢各三 陳皮 半四錢 白茯苓 炙甘草
-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	--------	-------------------------------------	--	----	-------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------------	--



生子而弱煩兄為診其故次日仲淳往診得其脈弦細無神趙文肅公問曰兄從元立許來診其嫂得何脈曰今雖無恙必不久矣文肅頓足曰有是哉天胡厄善人甚耶此丙戌事也至秋夫人歿

祝氏婦年五十餘患中滿腹脹兼崩漏下虛清上則下虛彌甚實下則上脹彌甚仲淳為立二方以蘇子石斛陳皮貝母玄參人參白芍藥治其上以地榆阿膠木瓜牛膝杜仲茜根椿皮治其下各為丸分食前後服之漸

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

愈

顧太學叔夏內人患陰虛火證徹夜不眠者兩月飲食俱廢形體日削中外疑其必無救矣予為之診視決其必無大害第要多需時日耳用大劑人參棗仁茯神遠志生地當歸五味麥冬因虛甚氣怯佐以琥珀辰砂金銀器之類約百餘劑而瘳後友人詢其故予謂此病雖屬虛幸臟腑無損心經雖有火幸不至燼肺多服補陰收斂之劑則水火自然升降所云壯水制陽光正此謂





耳至于久病脈調身不發熱豈有他虞哉

太學朱方仲內人稟賦極弱兼之作勞善怒內熱怔忡  
膽虛氣怯已三四年矣壬申夏忽發厥冒痰氣上升則  
兩目上竄手足發搐不省人事初時一日一發三四日  
後則連發不止日夜幾百次牛黃竹瀝遍嘗不効予計  
已窮意欲用參附峻補因其時常口渴大便不通不敢  
輕投適一友至極其讚決謂非附不可強用附子二錢  
人參六錢作一劑投下午後進藥黃昏發大熱煩躁渴

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

甚不兩日斃矣此固非因附子而然第證候決不宜用

傲倖之愈念漫試也

上三  
條附

先醒齋廣筆記卷二



欽定四庫全書

子部

先醒齋廣筆記卷三

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勣

總校官編修臣何思鈞

校對官編修臣勵守謙

謄錄監生臣李源



欽定四庫全書

先醒齋廣筆記卷三

明 繆希雍 撰

幼科附痘疹

小兒初生即以粉草

三錢  
切片

江西淡荳豉

三錢

入沸湯一碗

隔水煮乾至一二小杯以綿為乳蘸藥汁入兒口吮之  
以盡為度腹內有聲去胎糞數次方飲乳月內永無驚  
風諸病

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

兒初生不可剪臍帶三朝用麪和水成薄餅置兒腹穿  
臍帶於麪上將薪艾火灸臍帶近臍處或三炷或五七  
炷灸須下帳避風灸畢仍將臍帶紮好聽其自脫至七  
日方脫者元氣足也璫兒九日方脫其神甚王  
凡兒生下每日夜時將清湯或苦茶蘸軟絹攪兒口內  
如齒邊有白點即以指爪或細針挑破取桑樹內汁濾  
清塗之永無驚風撮口之患予家用前三方兒月內並  
無殤者



治撮口 其症必先大便熱

用生犀角及真羚羊角磨和蜜汁飲之有效急則用大

黃二錢甘草二錢煎服

治月內啼

飛辰砂極細末各五厘塗兒舌上立止

治胎驚 仲淳定有驗

人參 白芍藥酒炒各一兩 白茯神 酸棗仁各一兩五錢 炙甘

草 遠志肉甘草汁浸蒸晒乾各一兩 真天竺黃另研如飛麪 硃砂另研如法

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

各五錢 臍帶新瓦土炙焦存性另研細三條 天麻 犀角 滑石末各一兩

如有紫河車加一具火烘乾研細忌鐵 右天竺黃硃砂臍帶另研

外餘篩極細末然後加入另研三味再研和令極勻用

鈎藤濃汁四兩和煉蜜半觔搗和前藥每丸重一錢二

分飢時臨卧以燈心薄荷湯調化服日可與二三服或

以鈎藤湯煎濃化藥更佳 如治急驚本方去臍帶河

車人參加白殭蠶蜜炙六錢 全蝎六錢 牛黃一錢二分 琥珀一錢 膽星

麝香八錢分三



治胎瘧 家弟患此服之神驗

人參 三錢 虛甚瘧久者加至一兩 止 白芍藥 三錢 酒炒 廣陳皮 二錢 鼈甲 二錢 醋炙

麥門冬 三錢 厚朴 二錢 青皮 七分 醋炒 山查肉 三錢 水二鍾煎八分

溫服 脾胃不佳加川黃連 一錢 薑汁炒 真藿香 五分 白芷

寇 二分 薑皮 五分 竹葉 三十片 白茯苓 二錢

治小兒癇症或驚風不止 黃孟芳幼患此症久服効

天竺黃 五錢 酸棗仁 二兩 麥門冬 二兩 人參 一兩 明天麻 五錢

門冬 去心 白茯苓 一兩 橘紅 七錢 遠志肉 甘草汁煮 白芍

欽定四庫全書 先醒齋廣筆記

藥 酒浸 一兩 鈎藤 五錢 細末煉蜜和丸如彈子大水飛極細硃

砂為衣每服一丸燈心湯或龍眼湯化下又一方加紫

河車一具酒洗淨煮爛或焙乾為末入前藥中

疳積散 宋二懷傳累試神效

治兒乳食不節過飽傷脾面黃腹大小便濁如

米泔大便黃泄酸臭皮毛枯索甚而雙目羞明

生翳形骸骨立夜熱晝涼等證並用此方主之

厚朴 去皮切片薑汁炒熟淨末一兩 廣陳皮 去白淨末八錢 粉甘草 去皮炙七錢 真



<p>蘆薈 <small>明如漆苦如膽淨末七錢</small> 蕪荑 <small>真孔林大而多白衣者佳去白衣殼淨末五錢</small> 青黛 <small>取料舖中浮碎花</small> 百草霜 <small>取山莊人家鍋底煤二錢五分</small> 旋覆花 <small>淨末一錢五分</small></p>	<p>勻和成劑小兒每一歲用藥一分燈心湯空心調服服</p>	<p>後病愈再用肥兒丸調理如脾氣未實用啓脾丸或大</p>	<p>健脾丸如疳氣未盡用陳皮 <small>兩一</small> 白木香 <small>錢三</small> 白茯苓 <small>錢五</small> 加</p>	<p>平胃散 <small>錢三</small> 為末陳米湯調下</p>	<p>肥兒丸</p>	<p>人參 <small>錢三</small> 蕪荑 <small>兩一</small> 史君子肉 <small>兩一</small> 白芍藥 <small>兩一</small> 橘紅 <small>錢八</small> 黃連 <small>兩一</small></p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>甘草 <small>錢五</small> 紅麴 <small>錢七</small> 麥芽 <small>錢七</small> 砂仁 <small>錢五</small> 白茯苓 <small>兩一</small> 山查肉 <small>錢七</small> 滑</p>	<p>石 <small>兩一</small> 蓮肉 <small>兩二</small> 稿荳 <small>兩一</small> 青黛 <small>兩一</small> 煉蜜丸彈子大每服一丸</p>	<p>空心白湯化下</p>	<p>治疳瀉痢見紅白積者</p>	<p>用前散子加黃連 <small>薑汁土炒</small> 肉荳蔻二味燈心湯少入熟蜜</p>	<p>調服</p>	<p>治食積成疳</p>	<p>用前散砂仁湯調服 四方俱宋二懷傳</p>
--	------------------------------	------------------------------	--	--------------------------------------	------------	---	--------------------------	--	--	---------------	------------------	---	-----------	--------------	-------------------------



治小兒疳症唇白或紫腹大面黃髮乾上指

施季泉有丸藥如龍眼大納猪肝内白酒煮之止食肝  
一劑而愈其丸取出尚可搽人方不傳兒輩累試之奇  
驗價亦廉

治疳眼

生雞肝一具不拘大小雌雄二三歲者只用半具外去  
衣内去筋膜研極細如麪入疳積散若干調極勻加熟  
白酒厚薄相和隔湯頓極熱空心服或用甜酒少加熟  
白湯調服至眼開翳散乃止

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

又方

白芙蓉花陰乾三四錢聽用 另以不油不蛀肉荳蔻一枚粉 真

胡黃連五分 共細末將赤雄雞軟肝去筋膜入前藥末同

研極細丸如龍眼核大白酒隔湯煮熟空心與兒吃其  
藥約分三分如兒小可再分作四分兒大者可一二次  
頓服立效

治小兒走馬牙疳百驗方



<p>冰片<small>三分</small> 黃連<small>不犯</small> 括婁<small>為末</small> 紅褐子<small>煨存性</small> 黃蠶繭殼<small>存煨</small></p> <p>性研各<small>五錢</small> 明礬<small>一錢五分</small> 五穀蟲<small>要有尾者瓦上煨過</small> 各</p>	<p>末和勻再碾連吹數次立効吹藥時先以米泔漱淨吹藥後仍以米泔漱淨</p>	<p>又將夜壺底內積垢取出燒灰存性研極細敷牙根腫爛處立愈前方中加入更效</p>	<p>又將蝸牛連殼煨灰存性研極細末吹患處立愈</p>	<p>右二方俱施季泉傳</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p>	<p>治小兒心口疼 仲淳定<small>非蟲積作痛者不宜用</small></p> <p>牽牛<small>炒八錢</small> 白木香<small>三錢</small> 檳榔<small>一兩</small> 紅麴<small>炒一兩</small> 甘草<small>炙三錢</small> 橘</p> <p>紅<small>八錢</small> 綠礬<small>火煨紅以米醋淬</small> 細末粉糊和丸如梧子大</p>	<p>每四錢白湯吞終身不可食蕎麥</p>	<p>存之幼郎病內傷大小便俱血諸醫競用紅花桃仁病愈甚仲淳曰桃仁之類疏其瘀也血且行奈何又重傷之傷則補之而已以生地黄<small>四錢</small> 川續斷及杜仲牛膝等</p>	<p>飲之稍平而腹痛不已仲淳曰是在內經强者氣盈則</p>
---	--------------------------------------	---	----------------------------	-----------------	-----------------------------	--	----------------------	---	------------------------------





愈弱者着而成病加人參錢二一劑而愈

月埠張氏兒十歲自幼心痛得於母氣不時發者發時

飲食不進呻吟反覆三四日仲淳疏方藥入口即止

檳榔錢一黑丑錢一木香分五史君子錢二橘紅錢二白茯苓錢三白

芍藥錢二旋覆花錢二猪苓分五

義興楊純父幼兒病寒熱勢甚棘諸醫以為傷寒也藥之不效仲淳曰此必內傷純父不信徧詢乳媪及左右並不知所以傷故仲淳固問不已偶一負薪者自外至

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

聞而訝曰曩見郎君攀竹梢為戲梢折墜地傷或坐此乎仲淳曰信矣投以活血導滯之劑數服而起仲淳嘗言古人先望聞問而後切良有深意世人以多問嘲醫醫者含糊胗脉以致兩誤悲夫

猴疔方 此胎毒濕熱從肛門或陰囊邊紅暈爛

起漸至皮膚不結靨不治必爛死

生薑兩四鱧魚觔一共煮爛取濃汁塗之次用貝母灰存性

錢二牛黃 冰片錢各一共研細末敷之如復發用綿花



油一 大楓子肉 蛇床子 乳香 沒藥共四 青黛一  
五味研細浸油內青布蓋口以青錢壓之數日後以鷺  
翎蘸油塗之再用鰻骨灰君 牛黃 冰片各少 共為末  
敷之愈

兒服末藥

人中白煨 胡黃連 青黛各五 辰砂三 甘草二 人參一  
共為末蜜調服之

乳母服藥

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

當歸 黃連 金銀花 桔梗 連翹 川芎 甘草

山梔 薄荷各等 水煎服以上三方

張守為幼郎患癆疔嗜食易飢腹如蜘蛛過數日一瀉

瀉則無度面目黧黑指節中亦幾無剩肉矣其母亦病

診脉緊數骨蒸勞熱大渴引飲淋閉然馬銘

鞠曰兒病實母病也用麥門冬枇杷葉懷生地白芍藥

青蒿鼈甲之屬以治母用乾蟾為君加犀角羚羊角白

芙蓉花牛黃每用分許日入雞肝內飯上蒸服以治兒



再用滑石白扁豆白茯苓車前子山查肉五穀蟲等分  
 為末拌人乳晒乾七次畧入砂仁末陳米湯丸彈子大  
 日進兩丸不二十日子母俱痊二方絕無藥氣故兒喜  
 啖之

華叔蟾乃郎慢脾風五六日愈愈甫三四日即過多飲  
 食連浴兩宵復痰壅沉迷面目俱浮胸腹腫滿嘔吐乳  
 食不進角弓反張二便交秘有欲進以牛黃丸者馬銘  
 鞠曰下咽死矣此病後虛症也然參且勿用用麥門冬

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

三錢 枇杷葉 片 貝母 五分 桑白皮 一分 杏仁 一錢 藿香 一錢 新

鮮大糖球 一枚 蒼朮 用人乳汁炒 橘紅 一分 加燈心煎臨

服入薑汁逾時小便隨利腹即寬而諸證悉退盡劑竟  
 愈以此知嬰兒病後不可不慎即此兒半年後下午連  
 食冷鴨子二枚午間又縱恣飲食更餘病發上不吐下  
 不瀉胸腹脹滿目閉氣喘身熱按其胸腹則雙手來護  
 馬曰食也鴨子黃閉氣得水則化今尚在胃口急索大  
 棗數枚煎湯入砂仁錢許以通其氣兒渴頓飲碗許氣



漸通目開手足亦漸流動再煎飲之夜半吐瀉交作次日勿藥而愈

萬中丞涵臺患痰症合琥珀丸不用棄去馬銘翰曰此幼科絕勝藥也開緘而琥珀清香之氣觸鼻入腦光瑩可愛取之凡遇慢驚所投神驗兼治小兒一切虛證如華虛舟五郎疔甚善哭週歲中每哭即氣絕絕而甦一飯時許矣至三歲外其病日深哭而絕絕而甦甚至經時初或一月一發後則頻發有日再發者投以此藥人參圓眼湯下數丸遂瘥

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

### 琥珀丸方

琥珀錢三 天竺黃錢二 人參錢三 茯神錢二 粉甘草錢三 硃砂錢一

山藥兩一 膽星錢二 蓮肉錢三 煉蜜丸硃砂為衣每服錢一

莊斂之艱嗣辛酉幸舉一子未及三月乳婦不善撫養盛暑中擁衾令卧忽患丹毒遍遊四肢漸延腹背斂之倉皇來告予曰兒方數月奈何苦之以藥急以犀角絞鮮梨汁磨服斂之問故予曰犀角能解心熱而梨汁更



<p>能豁痰且味甘則兒易服別疏一方用荆芥穗<small>二錢</small>鼠</p>	<p>黏子<small>二錢</small>懷生地<small>四錢</small>牡丹皮<small>一錢五分</small>玄參<small>三錢</small>括婁根<small>三錢</small>薄荷</p>	<p>葉<small>一錢</small>竹葉<small>百片</small>麥門冬<small>四錢</small>生甘草<small>三錢</small>連翹<small>三錢</small>貝母<small>三錢</small><small>去心</small></p>	<p>生蒲黃<small>二錢</small>令煎與乳婦服之乳汁即湯液矣斂之依法</p>	<p>治之一日夜赤者漸淡再越日丹盡退後卒以乳婦不</p>	<p>戒患驚風而殤</p>	<p>稀痘神方</p>	<p>金銀花為末糖調不住服有效<small>顧驥字傳</small></p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>又方<small>江右米以功傳神方也</small></p>	<p>赤豆<small>小飯</small>黑豆 菘豆 粉草<small>各一兩</small>為細末用竹筒削</p>	<p>去皮兩頭留節一頭鑿一孔以藥末入筒中用杉木砧</p>	<p>塞緊黃蠟封固外以小繩繫之投入臘月廁中滿一月</p>	<p>即取出洗淨風乾每藥一兩配臘月梅花片三錢和勻</p>	<p>若得雪中梅花片落地者不着人手以針刺取者更妙</p>	<p>如急用入紙封套內略烘即乾兒大者用一錢小者用</p>	<p>五分俱以霜後絲瓜藤上小藤絲煎湯調空腹服湯宜</p>
---	---	---	--	------------------------------	---------------	-------------	--	--------------------------	-----------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



多服服後忌葷腥十二日解出黑糞為驗一次可稀三次不出每年服一次

又方 婁江王相公傳甚效

菟絲子

半觔好酒浸二宿煮乾去皮

黑玄參

四兩

為極細末煉蜜丸如

彈子大每空心白湯調化一九日二次

又方加生地黃

麥門冬

各四錢

犀角末

一兩

又方

兔腦不去骨兔肚不去糞瑣瑣葡萄

五錢

白葡萄

五錢

共炙

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

蜜丸每一錢白湯下此候少芝方

又方 丁見源比部傳

用白牛虱數百枚焙燥和糖令兒服之服數次有紅點發出此毒解之候也不效再服先頭面次心坎次腰肚次四肢以漸見點痘必稀白牛惟江北多虱藏牛耳中不多得須多服方效

痘症有二一曰血熱毒盛一曰氣虛毒盛氣虛者可以徐補血熱毒盛者勢必亟一發熱便口渴面赤氣喘狂



噪譫語此其證也一見點即宜涼血解毒急磨犀角汁  
多飲之十可療四五稍遲難抹矣又有血熱兼氣虛者  
初發先服涼血解毒之劑五六朝後可以併力補氣助  
漿唯初時不早涼血則毒不解毒不解延至六七朝勢  
必以參耆助漿漿必不來反滋毒火又有血熱毒盛似  
氣虛者初熱放點神思昏亂足冷痘色白如水窠唯有  
唇腫口渴辨其火症醫者反以氣虛治之十無一生孫  
生東療鄭黃門子血熱毒盛初起急以犀角地黄湯療  
欽定四庫全書  
先醒齋廣筆記  
之不效至用白芍藥錢八一泄毒解徐補收功家弟玄箸  
一發熱即譫語唇腫齒黑痘欲出不出醫者以為發斑  
傷寒也延仲淳施季泉不至予曰事急矣以生地錢八白  
芍藥錢五黃芩黃連各二稍加發藥日三劑勢稍定痘漸  
次出醫者曰爾時宜發痘奈何以涼劑遏之予曰解毒  
即所以發也未幾季泉至以予言為然第減地黃芍藥  
之半復於助漿中兼清涼之劑九十朝漿足卒傷一目  
仲淳曰使子之言盡行則目亦可不眇矣屬後方大便



此真血熱症也

松江黃綺雲療徐氏兒痘兒幼遇冬月痘不起熾炭圍

爐抱兒火邊以酒漿挹火火氣薰兒痘立起

又有痘而腰痛者一醫以人參蘆三煎湯飲之一吐痘

起痛尋解叩其故曰毒在下部提之則上升而毒散矣

大抵痘家利吐吐中便有散毒之義

施季泉曰凡成婚或破陽後出痘而腰痛者可療童子

而腰痛是先天之水不足也不治驚痘易治者以毒由

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

心經出故輕非因恐嚇成驚反易治也其言甚有味故

存之

施君謨一中住良渚去  
杭州塘棲二十五里

顧叔夏次郎八歲出痘而先腰痛予斷以不治果殤

附

一小兒初痘血熱甚黃綺雲用懷生地三濃煎頓飲其

痘紫色立轉紅

臧玉涵次郎年十六因新婚兼酒食忽感痘諸醫以為

不可治施季泉至八日漿清寒戰咬牙謔語神思恍惚

諸醫皆欲以保元湯大劑補之季泉以為不然改用犀





角地黄湯得脫痂後忽嘔吐大便燥結淹延一年羣醫束手告急仲淳視其舌多裂文曰必當時未曾解陽明之熱故有是症命以石膏 <small>一人</small> 參 <small>一</small> 麥門冬 <small>五</small> 杷葉橘紅竹瀝童便為佐一劑即安再進二劑鬲間如冷物隔定父母俱謂必斃仲淳曰不妨當以參湯投之服兩許即思粥食晚得大便夙疾頓瘳
治痘喘
取白花地丁以水煎服止喘甚神
欽定四庫全書
先醒齋廣筆記
治火痘毒盛遇火令 施季泉傳
白花地丁濾汁和淡白酒漿少服之立解
治痘泄
長兒痘初熱即泄日十數行見痘泄不止時醫以脾胃藥止之愈甚施季泉曰是在不治予強之曰止泄不難發藥中加黃連 <small>二錢</small> 黃芩 <small>一錢</small> 一劑泄止予喜甚施君曰非也毒火太熾故泄初泄時即以解利藥乘熱導之或可望生今遲矣過四日即欲解毒無及矣坐視七日死



臧玉涵幼兒甫半週身熱一日即見痘郡有專門知名者延治之云樹小花多頂平脚塌根窠薄百死一生之症也五朝固辭去藥以保元湯為主擬六朝多用人參加附子疑慮間施季泉忽至曰此險症且誠云必發痒異常須看守嚴密藥用涼劑與前治大別七朝大發痒作瀉一日夜二十餘行或藥水或乳或湯飲俱傾注不變色舉家謂必無幸矣季泉怡然自若因強之用參必不許藥內加炒黑黃連瀉止十三朝復發痒口渴唇燥舌生白胎又加炒黃連白胎去到底不用參十九朝季泉別又誠曰慎防痘疔口疔疔之發也必在腦後枕骨間當以收口膏藥貼之禁用摻藥口疔惟君家人中白散為妙不數日發疔口生疔如其言治之輒効季泉口授一家傳秘方治痘後餘毒如神

人參 白茯苓 金銀花 犀角 甘草 羚羊  
角 珍珠 蜜九 每服一錢日二服

錢一 分八  
錢各三 錢一分  
錢五分

一小兒痘泄諸鑿以升澁之劑投之不効黃綺雲至以

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記



白芍藥約三兩餘酒炒一劑即止此脾虛有熱故也

治痘虛寒將行漿時作泄

若係火熱泄者不可用

蓮肉

炒去心

一味為末每末一兩加雲南鴉片五分研勻

兒大者用末五分兒小者三分白湯調下立止虛癢或

虛煩躁不止亦如之

于中甫長郎痘患血熱兼氣虛先服解毒藥後毒盡作

泄日數次不止痘平陷矣仲淳以真鴉片

五厘

加炒蓮肉

末

五分

米飲調飲之泄立止王宇泰繼以人參

二兩

黃芪

三兩

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

鹿茸

三錢

煎服補其元氣漿頓足蓋以先服解毒藥已多

無餘毒矣故可補而無餘證

存之孫女痘後泄以鴉片如法飲之不止仲淳更以糯

米蓮肉作糜一甌立愈

一老醫有孫痘已脫痂少腹脹小水不通衆鑿以為痘

後餘毒以利水解毒藥投之愈脹老醫忽悟曰痘後無

實證土堅則水清脾虛下陷故也用後方一服立效

人參

一兩

大棗

五枚

水薑

五片



治痘後脾虛作泄老人脾虛作瀉亦甚效

黃耆兩四 人參兩四 肉豆蔻兩二 五味子兩四 山茱萸肉兩四 蓮肉

白扁荳兩四 白朮兩三 為細末棗肉搗膏和丸如彈子大

每用一丸薑湯磨化下

一小兒痘已脫痂初無他苦一鑿視其目精無神帶白

曰不可為已逾日亡

治痘痂艱脫

血熱又養血虛故艱脫也尚宜保養俟脫盡乃可見風

人參一錢五分 白芍藥三錢 甘草炙一錢 麥門冬去心五錢 五味子

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

錢六 懷生地錢四 金銀花錢四 水煎飢時服

痘毒非元氣壯實者不可外治大忌圍敷藥戒之

痘疔神效方

雄黃牛糞尖燒灰存性為末每一錢加冰片二分 研細吹

患處立愈

治痘後翻癍

不拘上下部腫爛淋漓者俱效

象牙末三錢 真珠末三錢 白殭蠶炒二錢 孩兒茶一分 為極細

末以濟寧胭脂調敷毒水如注漸漸收口



<p>防痘傷目方 吳季泉傳自王府</p>		<p>雌雄檳榔二枚每枚用清水粗碗上磨一百轉隨將痘</p>		<p>兒目閉者以口津潤開用雞毛蘸檳榔水拖眼稍三四</p>		<p>次其痘痂即落永不傷目</p>		<p>又方</p>		<p>用真濟寧油胭脂塗眼眶週遭三四次永不傷目試之</p>		<p>累驗</p>		<p>治痘後病目兼治血熱病目而脾胃壯實者</p>		<p>欽定四庫全書</p>		<p>先醒齋廣筆記</p>		<p>天門冬 兩四 麥門冬 兩四 枸杞子 兩四 甘草 兩一 生地黃 兩八 五味子 兩二 甘菊花 兩三 玄參 兩三 地骨皮 兩二 白蒺藜 兩五 穀精草 兩三 木賊草 兩三 蜜蒙花 兩二 草決明 兩二 女真實 兩九 槐角 兩四 羚羊角 兩三 蜜丸</p>		<p>梁溪一女子痘後目痛上白靨不見物服二十劑</p>		<p>全愈 仲淳立</p>		<p>芎 八分 甘草 六分 白蒺藜 一錢 柴胡 七分 甘菊花 二錢 石菖蒲 一錢</p>		<p>穀精草 二錢 草決明 炒研五分 川黃連 酒炒一分 懷生地 二錢 川</p>	
----------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	-------------------	--	-----------	--	------------------------------	--	-----------	--	--------------------------	--	---------------	--	---------------	--	---	--	----------------------------	--	---------------	--	--	--	--	--



木賊草 一錢五分 玄參 一錢五分 連翹 一錢 麥門冬 二錢

### 痧癍論并治法

痧癍者手太陰肺足陽明胃二經之火熱發而為病者也小兒居多大人亦時有之殆時氣瘟疫之類歟其證類多咳嗽多嚏眼中如淚多泄瀉多痰多熱多渴多煩悶甚則躁亂咽痛唇焦神昏是其候也治法當以清涼發散為主藥用辛寒甘寒苦寒以升發之惟忌酸收最宜辛散誤施溫補禍不旋踵辛散如荊芥穗乾葛西河柳石膏麻黃鼠黏子清涼如玄參括樓根薄荷竹葉青黛甘寒如麥門冬生甘草蔗漿苦寒如黃芩黃連黃檗貝母連翹皆應用之藥也量證輕重制劑大小中病則已母太過焉

### 痧癍續論

痧癍乃肺胃熱邪所致初發時必咳嗽宜清熱透毒不得止嗽癍後咳嗽但用貝母括樓根甘草麥門冬苦梗玄參薄荷以清餘熱消痰壅則自愈慎勿用五味子等

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記



收斂之劑多喘喘者熱邪壅於肺故也慎勿用定喘藥  
惟應大劑竹葉石膏湯加西河柳兩許玄參薄荷各二  
錢如冬天寒甚痧毒為寒氣鬱於內不得透出者加蜜  
酒炒麻黃一劑立止凡熱勢甚者即用白虎湯加西河  
柳切忌過用升麻服之必喘多泄瀉慎勿止瀉惟用黃  
連升麻乾葛甘草則瀉自止癰家不忌瀉瀉則陽明之  
邪熱得解是亦表裏分消之義也痧後泄瀉及便膿血  
皆由熱邪內陷故也大忌止澁惟宜升散仍用升麻乾

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

葛白芍藥甘草白扁豆黃連便膿血則加滑石末必自  
愈痧後牙疳最危外用雄黃牛糞尖煨存性研極細加  
真片腦一分研勻吹之內用連翹荆芥穗玄參乾葛升  
麻黃連甘草生地黃水煎加生犀角汁二三十匙調服  
緩則不可救藥痧後元氣不復脾胃虛弱宜用白芍藥  
炙甘草為君蓮肉白扁豆山藥青黛麥門冬龍眼肉為臣  
多服必漸強慎勿輕用參朮痧後生瘡不已餘熱未盡  
故也宜用金銀花連翹荆芥穗玄參甘草懷生地鼈虱



胡麻黃連木通濃煎飲之良

痧癍不宜依證施治惟當治本本者手太陰足陽明二

經之邪熱也解其邪熱則諸證自退矣

治痧癍發不出喘嗽煩悶躁亂

西河柳葉風乾為細末水調四錢頓服立定此神秘方

也砂糖調服兼可治癍後痢去歲銘鞠救吳少海子及

其姪湯水不入矣逐口強灌之而生今歲張守為長郎

初婚亦危矣治之亦愈皆仲淳法也

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

又方 仲淳立

蟬蛻錢一鼠黏子炒研一錢五分荆芥穗錢一玄參錢二甘草錢一麥門

冬去心三錢乾葛一分薄荷葉錢一知母蜜炙一錢西河柳錢五竹葉

片三十甚者加石膏錢五冬米撮一又方加三黃

賀知忍少子病痧癍家人不知尚以肉飯與之仲淳適

至驚曰此痧症之極重者何易視之遂以西河柳兩許

雜以玄參錢三知母錢五貝母錢三麥門冬兩許石膏兩半竹葉七

片二劑而痧盡現徧體皆赤連進四劑薄暮矣知忍曰





草 分七 麥門冬 三錢 去心 知母 二錢 一分 白茯苓 二錢 乾葛 五錢 柴胡	鼈甲 二錢 如法 山查肉 三錢 橘紅 二錢 五分 貝母 三錢 竹葉 五片 炙甘	治痧後瘧 仲淳立	硼砂 三錢 銅青 三錢 痛可去之 研細以鵝翎管吹入患處	雄黃牛糞尖一個 火煨過 明礬 五分 冰片 一分 皮硝 一錢 白	治痧後口瘡	錢八 滑石 一兩 如法 懷山藥粉和丸白湯吞三五錢	川黃連 一兩 酒炒 升麻 七分 乾葛 八錢 甘草 四錢 黃芩 八錢 白芍藥 酒炒	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	治痧後下積滯 仲淳立	河柳甘草知母	中一服立透藥用乾葛麥門冬貝母前胡荆芥玄參西	去節湯泡過以蜜酒拌炒加一錢或七八分于治痧藥	冬月痧癍因寒不得發透喘渴悶亂煩躁不定用麻黃	西河柳 一兩 竹葉 二百片 濃煎飲之煩躁遂定而瘥	以石膏 三兩 知母 一兩 麥門冬 三兩 加黃芩 黃連 黃栢 各五	兒今無恙乎仲淳曰痧雖出盡煩躁不止尚不可保再
---	---	-------------	--	---	-------	--------------------------------------	--	------------------	---------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------------	---	-----------------------



秘傳治癰疽訣	加鹽水炒黃芪 <small>錢五</small> 麥門冬 <small>錢五</small> 五味子 <small>錢一</small>	水六碗煎三大碗去渣入前藥煎一碗不拘時服潰後	白芨 <small>錢三</small> 連翹 <small>錢二</small> 五爪龍 <small>錢五</small> 先用夏枯草六兩河	分 <small>五</small> 括婁根 <small>錢二</small> 貝母 <small>錢三</small> 去心 金銀花 <small>錢五</small> 白芷 <small>錢一</small> 五分 懷生地 <small>錢三</small>	生甘菊 <small>一</small> 連根打碎 紫花地丁 <small>錢五</small> 甘草 <small>三</small> 水炙 鼠黏子 <small>一</small> 砂研	疔疽一切腫毒神方 仲淳立屢試神驗	腫毒	病全在活法不宜拘滯 <small>附</small>	治脾虛之法而不知甘寒滋潤益陰之有益于脾也治	日後飲食頓加半年肌體豐滿世人徒知香燥溫補為	芍藥蓮肉扁豆為佐更定一加味集靈膏相間服之百	為憂予為之疏一九方以人參為君茯苓山藥橘紅白	脣父母強之終日不滿稀粥半盂形體倍削鳴六深以	顧鳴六乃郎稟賦素弱年數歲患脾虛證飲食絕不沾	錢一	如不渴去知母渴甚加石膏 <small>錢五</small>
															欽定四庫全書	先醒齋廣筆記



<p>凡未發疽大熱作渴及愈後作渴大小便秘神昏作嘔</p>	<p>不食不知痛全犯者不治腰痛者不治清便自調神思</p>	<p>清爽能食知痛不嘔夜能睡微發熱者易治</p>	<p>癰疽發熱作渴不知痛用黃芪<small>君</small> 麥門冬<small>上</small> 五味<small>中</small> 甘</p>	<p>草<small>下</small> 煎湯服大小便秘用大黃下之毒氣攻心神昏作</p>	<p>嘔不食用護心托裏散菘豆粉<small>上</small> 硃砂<small>中</small> 乳香<small>下</small> 俱為</p>	<p>極細末和勻每服三錢白滾湯下</p>	<p>圍陰症瘡瘍<small>外勢平而不起色黑黯其痛沉在肉裏者用此</small></p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>紅藥子<small>兩四</small> 白芨<small>一兩</small> 白芨<small>五錢</small> 白芨<small>一兩</small> 乳香<small>六錢</small> 沒藥<small>六錢</small> 硃砂<small>三錢</small></p>	<p>雄黃<small>三錢</small> 麝香<small>一錢</small> 冰片<small>一錢</small> 黑狗下頰<small>一個</small> 豌豆粉<small>一兩</small> 各</p>	<p>另研為極細末和勻以醋蜜調敷四圍以極滾熱醋蘸</p>	<p>潤兼可服</p>	<p>圍陽症瘡瘍<small>外勢高腫散大色紅甚者帶紫但發亮鮮明發熱大小便不利用此</small></p>	<p>大同城<small>以桑皮綿紙襯</small> 滾湯淋下十分加桑灰淋汁<small>三分</small> 下硃砂 雄黃</p>	<p>乳香 沒藥 冰片 白芨 白芨 蟾酥<small>俱</small> 麝</p>	<p>香 牛黃<small>俱</small> 明礬<small>上</small> 五倍子 大黃<small>上上</small> 各藥另碾為</p>
------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	--	--	----------------------	---	--------------------------	---	---	------------------------------	-------------	---	---	--	--



細末待汁冷和勻入上好小口磁器罐中口上用鉛套  
套上外以黃蠟封好令固密聽用

### 灸癰疽藥餅

夜明砂

錢五

月經布灰

存性  
錢一

麝香

分三

冰片

分三

乳香

錢一

沒藥

錢一明礬

研細

錢五分雄黃

錢一蕎麥麪

拌勻做薄餅放疽頭上

加大炷艾火灸之先令病者吃些米飲及托裏等湯藥  
每灸至百壯痛者灸至不痛不痛者灸至痛但得一爆  
其瘡立愈元氣弱者停一會再灸鎮日夜灸方好

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

### 治發背及腫毒圍藥

騰黃

三錢五  
分研細

五倍子末

二兩

米醋調敷圍

### 治發背神方

一法單用敗龜板一味去肋塗黃蠟灸透內服外敷錫  
山保安寺僧秘訣也有奇效 馬銘鞠傳

### 又方

血竭

錢一

雄黃

錢一

沒藥

分五

麝香

厘五

研細末用綿紙為燃長

一尺二寸將藥四五分以真蘇油潤燃着燈頭令病人



避風處端坐執燃者離瘡四五分自外而內徐徐照之	
瘡上微微覺熱即心神快爽不可太過恐傷好肉初用	
三條每日加一條漸加七條勢消每日減一條直燻至	
紅腫消盡為度可貼太乙膏加琥珀燻一次隨用敷藥	
日日如此燻時將猪蹄湯掠去油用新羊毛筆潤湯將	
敷藥洗淨始燻燻罷用後敷藥車前子 <small>連根</small> 葶菴草	
金銀花 五爪龍 <small>俱用</small> 各等分搗爛加多年陳小粉調	
敷四圍紅腫處中留一孔恐出膿如瘡口大用葱葉滾	
欽定四庫全書	
先醒齋廣筆記	
水泡批開去內涎水拍熟貼之如瘡口久不合恐流膿	
水再以藥敷之	
太乙膏方	
玄參白芷生地甘草當歸血餘 <small>多</small> 大黃 <small>多</small>	
治背毒初起 <small>由於鬱者遠志一味可治</small>	
遠志肉 <small>甘草汁煮去骨五錢</small> 甘草 <small>一錢五分</small> 甘菊花葉 <small>一兩</small> 貝母 <small>三錢</small> 鮮	
忍冬藤 <small>五錢</small> 紫花地丁 <small>五錢</small> 連翹 <small>一錢</small> 白芨 <small>三錢</small>	
托裏敗毒散	



<p>綿黃芪 <small>鹽水炒三錢或五錢</small> 甘草節 <small>水炙二錢可加至四五錢</small> 赤芍藥</p> <p>二錢 金銀花 <small>三錢</small> 茜草 <small>江西出細如燈心者佳三錢</small> 何首烏 <small>鮮者五錢</small> 真白殭</p> <p>蠶 <small>炙研六分</small> 白芨 <small>二分錢</small> 皂角刺 <small>一錢</small> 貝母 <small>去心二錢</small> 括婁根 <small>三錢</small> 穿山</p> <p>甲 <small>土炒研一錢</small> 鼠黏子 <small>炒研一錢</small> 蟬蛻 <small>去翅爪一錢</small> 先用夏枯草五兩</p> <p>河水五大碗煎三碗入前藥同煎至一碗不拘時服陰</p> <p>症去後五味加人參 <small>三錢</small> 麥門冬 <small>五錢</small></p>	<p>潰後服藥</p> <p>人參 <small>三錢</small> 麥門冬 <small>五錢</small> 綿黃芪 <small>蜜炒五錢或一兩</small> 甘草 <small>炙二錢</small> 五味子</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p> <p>蜜蒸 白芍藥 <small>三錢</small> 金銀花 <small>三錢</small> 山藥 <small>炒三錢</small> 水二鍾煎一鍾</p>	<p>難得收口加肉桂胃氣弱加生薑 <small>三五片</small> 大棗 <small>三枚</small> 癰疽潰</p> <p>瘍忌術腫瘍忌當歸</p>	<p>替針散</p>	<p>蠶殼一個煨存性為末酒調下不可多服</p>	<p>去爛肉方</p>	<p>用巴豆炒烟起焦黑為度碾極細末敷上去舊生新</p>	<p>長肉方</p>
--	--	--	--	------------	-------------------------	-------------	-----------------------------	------------



用無人見處自死竹蘸菜油燒滴下油用磁碟盛之搽  
上即生肉神驗

護膜礬蠟丸

白礬

明亮者  
研二兩

黃蠟

一兩溶化提起待稍冷入礬末  
不住手攪勻加蜜五六錢和勻

衆手

丸如梧子大蠟冷不能丸以滾湯燂之便軟硃砂為衣

每二十九丸漸加至三四十丸白湯或酒吞此藥護膜防

毒氣內攻未破即內消已破即便合一日之中服百粒

方有功終始服過半觔必萬全病愈後服之尤佳

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

又方

白礬

生研末  
四兩

真黃臘

二兩

加煉蜜七八錢硃砂研如飛

麪水飛如法六錢攪勻急須衆手為丸如梧子大每四

錢白酒吞

治癰疽對口疔瘡發背一切無名惡腫毒方名無

敵大將軍

桑柴灰

將柴另燒取其炭火置一大缸內待其自化成  
白灰取一斗綿紙襯入淘籬內清滾水淋下汁

磁缸盛貯淋至汁味不苦澁鹹則止將  
汁入磁碗中重湯燂濃如稀糊為度

茄桿燒灰

淋製  
如前



無許多好藥即製半料亦救人無算矣	及托裏解毒之劑此藥有奪命之功難以盡述倘一時	金錠一錠須內府者方効若係癰疽等症別服蠟礬丸	一分研如麪和入多塗其正頂信宿其根爛出內服紫	不可着在好肉上或用蕎麥麪調若係疔瘡加鐵鏽黃	和蜜少許潤之其毒黑血或毒水爆出即時鬆解切忌	蠟勿令一毫氣走每遇毒取少許塗其頂乾則以米醋	勻入磁罐內罐須小口者妙以烏金紙塞口封以好黃	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	同前各藥研細末和勻再碾數千下將前膏加入攪得極	砂 <small>二分</small> 五厘 <small>火硝</small> 錢三 <small>輕粉</small> 錢二 <small>乳香</small> 二錢 <small>打碎人</small> 沒藥 <small>一分</small> 製法	方妙真麝香須用當門子 <small>即麝香最上乘</small> 者一錢碾勻 <small>銅青</small> 一分 <small>硃砂</small> 五分	雄黃 <small>二錢</small> 明礬 <small>三錢</small> 硃砂 <small>五分</small> 白礪砂 <small>二錢</small> 八味另研如飛麪	酒化 <small>梅花冰片</small> 錢二 <small>真正牛黃</small> 錢一 <small>珍珠</small> 二錢 <small>三味俱</small> 透明	開細藥則成全方每三仙膏五兩真正自收蟾酥 <small>三分</small>	膏亦可點癰疽之稍輕者再和城水熬膏一兩加入後	法用 <small>一斗</small> 礦灰 <small>即石灰須柴燒者佳</small> 一斗淋汁如前法 <small>三味熬調和勻名三仙</small>
-----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	------------------------	--	--	--	---	---------------------------------------	-----------------------	--





治疔丸

蟾酥錢三 冰片錢一 麝香分七 眞白僵蠶錢一 明礬錢三 牛黃錢一

硃砂錢五分 黃白錢五分 占溶成油須令軟冷定加前藥末和丸

如麻子大每七分葱頭白酒吞下取汗汗後即以半枝

蓮為君連翹上 赤芍藥甘草白芨白薇金銀花俱中 紫花

地丁錢五 生甘菊兩二 河水二鍾煎一鍾下大黃隨病勢加

之一滾即起服後必行然須察病人胃氣壯者可用後

方用敗毒托裏之藥調理之可不死矣大抵治疔毒在

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

急急則毒氣未走若走黃多不可治走黃後發狂咬人

便能發疔汗下時其穢氣觸人亦能發疔宜謹避之看

瘡瘍疔毒須飲酒以麻油塗鼻

治疔膏 金太初傳神驗

以透明松香瀝青各五錢 麻子肉二錢如冬 三味大青石季加五分

上以鐵鎚鎚細鎚至前藥粘在鎚上拈起如清水一般

為度又加飛丹錢一 再鎚數百下取收小磁杯內如遇初

起疔毒以新青布照疔瘡一般大小攤膏藥貼之痛即



止少頃毒水漸漸流盡疔根如燈心一條拔出仍用原  
舊膏貼上至重者再換一膏藥全痊矣攤膏藥小磁盃  
隔湯燂化竹筴攤膏約一文錢厚

疔毒神驗方

用陳年露天鐵鏽碾如飛麪將金銀簪脚挑破毒處一  
孔納鐵鏽末於內仍將皮蓋好少頃黑水流盡中有白  
絲如細線慢慢抽盡此疔根也盡即立愈  
又方用甘菊花并根葉搗汁以酒下之立消

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

顧聖符幼弟患髭疔醫者先用火針圍藥腫脹至目與  
鼻俱隱入肉牙關緊急馬銘鞠用患者耳垢齒垢刮手  
足指甲屑和勻如豆大放茶匙內燈火上炙少許取作  
丸令洗淨圍藥將銀簪挑開疔頭抹入外用綿紙一層  
津濕覆之痛立止半日腫半消目可開次日服仙方活  
命飲二劑愈此法兼可治紅絲疔長洲華承溪指節間  
患之得此而痊又云可治面白疔未試也此方傳自道  
人



顧博士伯欽內人左耳患疔時方孕仲淳先以白藥子末雞子清調塗腹上護胎次以夏枯草甘菊貝母忍冬地丁之屬大劑飲之一服痛止疔立拔胎亦無恙白藥子療馬病者也

治耳邊發腫連太陽腮齒俱痛不可忍

大黃一兩青木香三錢姜黃三錢檳榔三錢為末醋蜜調勻貼患

處中留一孔出氣

治乳鷺

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

芒硝研細一分膽礬八分雄黃八分明礬八分俱研細和勻吹入

喉中

又方

用蛤蚧草即土牛膝葉如荔枝枝搗汁灌鼻內右鷺灌左鼻內左鷺

灌右一吐而愈或急不及藥以針或蘆管刺喉令出黑

血復以蚰蜒加烏梅少許搗爛取亂髮裹箸上塗前藥

攪患處去其膩痰則愈矣蚰蜒不能卒辦梅雨時取貯

磁瓶內封固久而不壞



纏喉風方 即喉痺仲淳  
試過有驗

明礬 三錢 巴豆 七粒 去殼 溶礬入巴豆燒至礬枯去巴豆研細

吹入喉中流出熱涎立開

治喉癰內熱

貝母 三錢 去心 鼠黏子 二錢 酒炒研 玄參 二錢 五分 射干 二錢 不辣者是 甘草

五分 括婁根 二錢 懷生地 三錢 白僵蠶 一錢 炒研 連翹 一錢 竹葉

二十片 水二鍾煎八分飢時服

倪仲昭患喉癰邑中治喉者遍矣喉漸漸腐去飲食用

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

粉麪之爛者必仰口而咽每咽泣數行下馬銘鞠曰此

非風火毒也若少年曾患微瘡乎曰未也父母曾患微

瘡乎曰然愈三年而得我銘鞠以為此必誤服昇藥之

故凡患此瘡者中寒涼輕粉之毒毒發於身昇藥之毒

毒發於愈後所生子女毒深者且延及於孫若甥倘不

以治結毒之法治之必死以甘桔湯為君少入山豆根

草龍膽麝干每劑用土茯苓半觔濃煎送下牛黃二分

半月而瘡竟不用吹藥既而詢之云父母病時果服丸



藥而痊痊後曾口碎非昇藥而何今醫家恬然用之不  
曉其中毒之深故特明其說

喉痺

雄黃 芒硝 各一錢 研細以鷺毛管吹少許數吹立散但

待其腫甚而吹為妙

又方用半枝蓮搗汁吃立散其渣須藏於家中勿令見

風

吹喉方 治雙鷺單  
驚神效

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

火硝 一錢五分 官硼砂 五分 片腦 三厘 即冰片 雄黃 一分 不用亦可 鷺管 蘆

管銀管共可盛吹前藥用三匙吹上喉即吐痰涎愈從

鼻孔中吹入亦效

癩癧丸方

貝母 二兩 去心 天花粉 一兩 五錢 玄參 一兩 五錢 甘草 一兩 五錢 斑貓 古米炒去

頭足 肥皂 二觔 每一肥皂去核入斑貓四個線縛 聽用 蒸取出 去斑貓并肥皂皮觔淨肉十兩 前藥

為末共搗如泥丸如梧子大每服一錢白滾湯吞服後

腹疼勿慮此藥力追毒之故



又方

取過冬青即荔枝草正名天明精五六枝同鯽魚入鍋煮熟去草

及魚食汁數次即愈

朱文學鑣患癰仲淳為灸肩并肘尖兩穴各數壯而愈

治療癰

同燕骨仲淳試之有效

真芝蔴油二觔胎髮四兩如無以童男髮洗淨代之川山甲五錢白礬飛過一兩

黃蠟四兩飛丹二兩松香六兩輕粉五錢乳香各五錢沒藥各五錢

燕窩泥朝北者二兩五靈脂淘淨五錢麝香另研五錢蜜陀僧五錢將

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

川山甲五靈脂煎數沸下胎髮熬溶濾去渣稱淨熟油

二十四兩仍入鍋內下白礬煎二三沸下黃臘黃丹煎

一沸下松香官粉六兩再煎一沸下燕土如沉香色滴

水成珠住火方下乳香沒藥攪勻少頃下輕粉桃柳枝

攪溫可入手然後投麝香攪勻水浸去火毒七日用貼

癰癰未破者軟已潰者乾內服夏枯草湯

夏枯草湯

金銀花五錢夏枯草二兩柴胡七分貝母二錢土茯苓白色者二兩鼠



<p>黏子 <small>一錢</small> 微炒 鼈虱 胡麻仁 <small>二錢</small> 微炒 酸棗仁 <small>二錢</small> 瓜蒌仁 <small>二錢</small> 陳</p> <p>皮 <small>一錢</small> 皂角子 <small>一錢</small> 白芍藥 <small>一酒錢</small> 當歸身 <small>二錢</small> 粉甘草 <small>一錢</small> 荆芥</p> <p>穗 <small>一錢</small> 連翹 <small>五分</small> 何首烏 <small>五錢</small> 漏蘆 <small>二錢</small> 水煎食後服</p> <p>又方</p> <p>夏枯草 蛇苗草 紫背天葵 紫花地丁 金銀花</p> <p>九龍草或汁者汁或末者末俱要以好酒調服</p>	<p>又方 <small>藻星膏兼治魚口一切等瘡</small></p> <p>巴荳 <small>一兩</small> 炒黃色復以紙條點火燒之候黑色用 海藻 <small>二錢</small> 炒 昆布 <small>一錢</small> 炒 天</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>南星 <small>一錢</small> 切碎醋浸二日炒 升麻 <small>五分</small> 天花粉 <small>五分</small> 各為極細末以</p>	<p>香油和成稀膏用文火熬候燒乾入巴荳下巴荳後畧</p>	<p>熬退火冬月加巴荳 <small>五錢</small> 南星 <small>一錢</small> 夏月減南星 <small>五分</small> 加天花</p>	<p>粉 <small>一錢</small></p>	<p>治熱癰 廖憲副夢衡傳</p>	<p>黃梅水時取新出蝦蟆 <small>黑而細者是</small> 置瓶內木蓋口蠟封埋</p>	<p>地下久化成清水取出蘸抹之兼可治疔疽</p>	<p>治對口癰 <small>試之神效</small></p>
---	--	----------------------	---	------------------------------	--	----------------------------	-------------------	---	--------------------------	---------------------------------



鮮茄蒂 <small>七個</small> 鮮何首烏 <small>輕重等分</small> 水二鍾煎八分一服出膿再服收口	又方	金銀花 <small>一兩</small> 木槿樹根皮 <small>一片</small> 酒水各一碗煎食後服	面上疔加白芷 <small>一錢</small> 蒲公英 <small>即直下根</small> 和黃蜆打爛罨患處以真麻布包之三日立愈	梁谿一女子頰下發一硬塊而不痛有似石癭仲淳疏方服十劑全消	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	貝母 <small>三錢</small> 連翹 <small>二錢</small> 鼠黏子 <small>酒炒研一錢五分</small> 括婁根 <small>二錢</small> 金銀花 <small>五錢</small>	何首烏 <small>去皮竹刀切片三錢</small> 白芨 <small>二錢</small> 蒼耳子 <small>研細一分</small> 生甘菊 <small>五錢</small>	青木香 <small>一分</small> 紫花地丁 <small>五錢</small> 先用夏枯草 <small>五兩</small> 河水五碗煎至三碗去渣納煎藥同煎至一碗	敷藥方	南星 <small>三兩</small> 海藻 昆布 檳榔 薑黃 白藪 猪牙皂	角 <small>各一兩</small> 細末醋調敷	梁谿一婦人生癰臂上服此半日立出血膿愈
---	----	---	---	-----------------------------	------------------	--	--	---	-----	---	----------------------------	--------------------





<p>連翹<small>錢二</small> 白芷<small>錢二</small> 甘菊<small>兩一</small> 紫花地丁<small>錢五</small> 白芨<small>錢二</small> 粉甘草<small>錢三</small></p> <p>金銀花<small>錢五</small> 生地<small>錢三</small> 地榆<small>錢四</small> 皂角刺<small>錢一</small> 括婁根<small>錢二</small> 茜草<small>錢三</small></p> <p>鼠黏子<small>錢一</small></p> <p>治肺癰 馬銘鞠傳</p>	<p>其法用百年芥菜鹵久窹地中者數匙立起此鹵嘉興府城中大家多藏之目擊神效</p> <p>又方</p>	<p>魚腥草水煮不住口食之治肺癰吐膿血神方也正名</p> <p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p>	<p>蕺草 兼治魚口</p> <p>又方</p> <p>金絲荷葉搗汁同生白酒數飲立效</p>	<p>乳癖乳痛方 神驗</p> <p>用活鯽魚<small>個一</small> 山藥<small>一段如魚長</small> 同搗汁敷乳上以紙蓋之立愈</p>	<p>乳癖方 張王屋屠後江孟脩兄驗過</p> <p>白芷<small>錢一</small> 雄鼠糞<small>錢一</small> 二種晒乾為末用好酒調服必多飲</p>
---	--	--	--	--	---



取一醺睡而愈 雄鼠糞尖者是

又方

顧文學又善內人患左乳岩仲淳立一方夏枯草蒲公  
英為君金銀花漏蘆為臣貝母橘葉甘菊花雄鼠糞連  
翹白芷紫花地丁山茨菰炙甘草瓜蒌茜根陳皮乳香  
沒藥為佐使另用夏枯草煎濃汁丸之服觔許而消三  
年後右乳復患用舊存餘藥服之亦消後以此方治數  
人俱效

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

里中婦沈姓者患乳癰潰爛經年不見臟腑者一膜爾

馬銘鞠用鼠糞三錢土棟樹子三錢經霜者露蜂房三錢俱

煨存性各取淨末和勻每服三錢酒下間兩日一服痛

即止不數日膿盡收斂此方傳自江西販糖客因治祝

氏喉證得之

圍藥

白芨研末一兩水調敷乳癰處候乾再以水潤二三次愈

會膿散 治腹中腫毒



川山甲 <small>炙</small> 白殭蠶 <small>炒去絲嘴</small> 白芷 <small>各五錢</small> 大黃 <small>二兩</small> 乳香 沒藥	五靈脂 <small>各五錢</small> 為末每服五錢酒服膿從大便出幼者	用三錢	治脇癰 <small>杜武服之甚驗</small>	金銀花 <small>五錢</small> 貝母 <small>二錢</small> 皂角刺 <small>一錢五分</small> 連翹 <small>一錢五分</small> 穿山甲 <small>三錢</small> 赤芍藥 <small>三錢</small> 白芷 <small>一錢五分</small> 地榆 <small>五錢</small> 甘草節 <small>一錢</small> 當歸 <small>二錢</small> 夏枯草 <small>一兩</small>	煎汁和藥復煎 鼠黏子 <small>一錢五分</small> 紫花地丁 <small>一兩</small> 生甘菊花根 <small>二兩</small> 搗汁	和藥內服	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	一人患腸癰偃僕痛不能伸有道人教以飲純黃犬血 二碗和白酒服其人遂飲至四碗次日下膿血盡而瘳	治便毒 <small>仲淳親試之甚驗加穿山甲同患處者二片土炒引經更妙</small>	棉地榆 <small>四兩</small> 白酒三碗煎一碗空心服雖有膿者亦愈	又方	全蝎 生礬 貫衆 等分為末空心調下	又方	棉地榆 <small>四兩</small> 粉甘草 <small>一兩</small> 金銀花 <small>一兩</small> 白芷 <small>三錢</small> 皂角刺 <small>二錢五分</small> 水
--	---	-----	---------------------------	--	--	------	------------------	--	--	---	----	-------------------	----	---



二鍾煎一鍾空心溫服

治下疳

仲淳治數友下疳用黃栢官粉膩粉杏仁珠末冰片敷之無不愈者後去膩粉杏仁加黃芩更以小大薊地骨皮湯洗淨敷之效更良

又方

蟬蛻分七真白僵蠶紫蘘葉包杏仁七粒去皮尖芭蕉根五錢搗爛

獨核肥皂仁七粒雪裏紅一把打爛土茯苓白色者去皮二兩白蘚皮

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

牛膝錢二黃栢錢一木通分七皂莢核粒七薏苡仁錢二連翹錢一

漢防已酒浸甘草節錢一石斛錢三柴胡分六草薺錢二地骨皮

水三大碗煎不拘時飢則服日三服氣虛脾弱加蜜

炙黃芪錢三血虛加生地錢三

又極秘神方治一切極痛下疳仲淳屢用甚效

鮮小薊 鮮地骨皮各五兩煎濃汁浸之不三四日即愈

治疔瘡服藥

珍珠生研牙末 牛黃 冰片各一錢真白僵蠶 皂角



各二錢 滴乳石 一兩研細 細末每服九厘土茯苓湯吞下

以乾物壓之

蛀疔摻方

橄欖燒灰研細末摻上

治痔瘡出血過多

東垣名黑地黄丸  
臧晉叔試之效

生懷慶

一觔酒洗淨用水煮透汁  
磨為末重湯熬成膏聽用

茅山蒼朮

一觔切片  
用真麻油

浸一日夜去  
油晒乾為末

北五味

半觔晒  
乾為末

炒黑乾薑

淨末  
八錢

用黑棗肉

半觔去皮入前藥搗丸空心白湯每服三錢

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

治痔瘡 歸安陳汝良傳

用荔枝草即天明精一名地菘煎湯洗仍以草手搓軟

塞患處

治漏

鉛花

四兩研  
如麪

黃牛腮邊合扇骨

二兩酥炙  
燥為末

雄猪前脚踏

二兩酥炙  
燥為末

青黛

二兩

槐花

二兩

人中白

五錢  
煨過

罐內用鐵油盞鹽泥封好置淘濕大米數粒於盞上四

面用火煨以米熟為度取出研細煉蜜丸如梧子大每



五錢空心下午各進一服淡鹽湯吞水白酒二杯以猪  
蹄下酒醋紫蘓畧吃些亦可

坐板瘡方 丁右武親驗有效

松香

五錢  
研細

雄黃

一錢  
研細

如濕癢加蒼朮

三錢

各末和勻以綿

紙包裹撚成紙撚二條臘月猪油浸透點火燒着取滴

下油搽上立效

治臀癰

一人患臀癰用五爪龍連枝搗汁酒漉服日進四五次

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

膿從大便出未成膿者內消如有頭以渣敷上立散治

魚口極效

治下部火丹 馬銘鞠傳

用蠶砂山梔黃連黃芩黃檗大黃寒水石共末水調敷

上立效

切勿用  
芭蕉根

又方

川黃連末蜜和雞子清調敷 馬銘鞠云若遇抱頭火

丹必砭去惡血方效每用此法治人其不肯砭者多誤



事 予家兒輩試之甚驗

煎方

牛膝 錢三 木瓜 錢二 石斛 錢三 生地 錢五 連翹 錢三 黃檗 錢二 甘草 錢一

金銀花 錢五 地榆 錢三 茜草 錢三 赤芍藥 錢二 水煎服

治懸癰

一名鶴口疽生在陰囊後穀道前療之不早變為漏則難治矣一僕試之立消

大粉甘草

一觔 每根劈作四片或二片用泉水二碗輪流

蘸炙以水盡為度切片河水十碗熬至一碗空腹服盡

即愈 此孫真人方

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

談公武患跨馬癰外勢不腫毒內攻膿多瘡口甚小突

出如指大一塊觸之痛不可忍多飲寒劑外敷涼藥毒

內攻胃氣俱損銘鞠盡去圍藥洗淨瘡口但用一膏藥

以護其風用大劑黃芪山藥懷生地白芷牛膝米仁金

銀花雜以健脾藥十餘劑膿盡再敷劑肉長突出者平

矣後服六味丸觔許精神始復

江都尹奉麓乃尊斃於腿癰其子九歲亦患之就醫彌

月勢漸盛銘鞠按之堅如石幸兒氣厚可內消用牛膝



<p>薏苡地榆生地鼠黏子金銀花連翹粉草皆仲淳常用法也初劑加利藥微利之即稍寬過兩劑加汗藥微汗之勢益寬至數劑取穿山甲末<small>錢五</small>半入煎半調藥送下兒善飲令兒一醉自此頓消半月地下行矣初一醫欲開刀遇銘鞠中止凡外科宜以開刀為戒</p> <p>梁谿一男子生癰膝下楚甚仲淳適至即於席間作劑服之飲酒數杯癰立破出鮮血愈</p>	<p>連翹<small>錢二</small> 白芷<small>錢二</small> 粉甘草<small>水炙三錢</small> 金銀花<small>錢五</small> 牛膝<small>錢三</small> 懷生地</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>地榆<small>錢四</small> 皂角刺<small>錢一</small> 鼠黏子<small>酒炒研一錢</small></p>	<p>陸封公養質患腿癰瘍醫用忍冬花角刺連翹白芷貝母天花粉陳皮乳香沒藥治之不效仲淳即前方加綿</p>	<p>地榆炙甘草紫花地丁服三四劑愈</p>	<p>治鶴膝風<small>一人患此五年數藥三日即愈王心涵傳</small></p>	<p>乳香<small>各一分</small> 沒藥<small>各一分</small> 地骨皮<small>錢三</small> 無名異<small>錢五</small> 麝香<small>一分</small> 各為</p>	<p>末用車前草搗汁入老酒少許調敷患處</p>	<p>瘡方<small>章字泰傳六郎乳母試之神效</small></p>
---	--	--------------------------	---	---	-----------------------	--	---	-------------------------	--------------------------------------





木瓜 錢二	生甘菊 錢一兩	亦妙 入芝蔴油 乳香更妙	黃占 白占 輕粉 韶粉 臘月猪板油麻油各半	緊三次三日一換膏藥半月必愈	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	成膏貼於瘡上將寸許濶絹條紮急勿使泄氣一日收	稠糊用筋挑起以不斷絲為度仍用極緊細松江布攤	研如飛麪後加韶粉研勻入真麻油勿令太薄調如極	松香 兩四 好韶粉 兩二 先將松香投入滾水中一撈即起另	又方 曹和尚傳	黃水流盡爛肉生肌	頭花椒煎濃湯燻洗淨用布攤膏厚貼患處以絹縛定	松香 兩一 輕粉 錢三 乳香 錢五 細茶 錢五 四味共打成膏先將葱
牛膝 錢五	紫花地丁 錢八		化勻調和前藥用薄油紙攤貼瘡上血風瘡久不結痂										
薏苡 兩一	金銀花藤 兩一												
生地 錢五	穿山甲 炒研細 三片土												
連翹 錢三													
白芨 錢三													
夏枯草													



兩六

李行甫患徽瘡

俗呼廣瘡

誤用水銀番礬等藥搓五心三日

間舌爛齒脫喉潰穢氣滿室吐出腐肉如猪肝色湯水

不入腹脹二便不通醫皆謝去獨用治喉藥吹喉痰壅

愈甚痛難忍幾死銘鞠按其腹不痛雖脹滿未堅猶未

及心知水銀毒入腹未深法宜以鉛收之急用黑鉛觔

餘分作百餘塊加大劑甘桔湯料金銀花粉草各用四

五兩水二三十碗鍋內濃煎先取三四碗入湯注中徐

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

灌之任其自流逾時舌漸轉動口亦漱淨即令恣飲數

盞另取渣再煎連前濃汁頻濯手足次日二便去黑水

無算始安方用吹口藥及敗毒托裏藥數劑而愈後賈

僕有顏孝者亦患徽瘡誤用水銀薰條其證一如行甫

即以前法治之次日立起

治徽瘡

猪胰脂

二兩

金銀花

二錢

皂角刺

一錢

芭蕉根

一兩

雪裏紅

五錢

五

加皮

二錢

土茯苓

二兩

白色者

皂莢子

七粒

打碎

獨核肥皂仁

七粒

切片



<p>白僵蠶<small>分 七</small> 木瓜<small>錢 一</small> 白蘚皮<small>錢 一</small> 蟬蛻<small>錢 一</small> 年久力衰者加</p> <p>薏苡仁<small>錢 五</small> 甘草節<small>錢 二</small> 綿黃芪<small>錢 三</small> 懷生地<small>錢 二</small> 人參<small>錢 二</small> 久不</p> <p>愈加胡黃連<small>錢 三</small> 胡麻仁<small>錢 二</small> 全蝎<small>枚 七</small> 水三大碗煎一碗不</p> <p>拘時飢則服</p> <p>又方</p> <p>棉花子仁一味研如泥入細槐花末和丸如菘荳大每</p> <p>四錢空心及飢時吞</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p> <p>獨核肥皂仁<small>粒 七</small> 千年矮<small>紅 一 兩</small> 皂莢子<small>粒 七</small> 甘草節<small>五 分</small></p> <p>木瓜<small>一 錢</small> 蟬蛻<small>錢 一</small> 青木香<small>錢 一</small> 土茯苓<small>二 兩</small> 綿黃芪<small>水 鹽</small></p> <p>白殭蠶<small>蜜 炙 炒 七 分</small> 鼈虱胡麻仁<small>三 錢 研</small> 白芷<small>錢 一</small> 何首烏</p> <p>金銀花<small>錢 三</small> 連翹<small>錢 一</small> 水三大碗煎一碗不拘時飢則服</p>	<p>結毒丸方</p> <p>鍾乳石<small>研 如 飛 麩 水</small> 真牛黃<small>研 如 飛 錢</small> 珍珠<small>研 如 飛 錢</small> 猪牙</p> <p>皂角<small>去 皮 膜 為 極 細 末 七 錢</small> 樺皮灰<small>存 性 研 如 錢</small> 百草霜<small>庄 家 鍋 底 者 佳 七 錢</small></p> <p>牛黃丸 神效</p>
---	---	--



<p>牛黃<small>真者研</small> 象牙末<small>三錢</small> 白殭蠶<small>二錢</small> 紅鉛<small>二錢</small> 冰片<small>五分</small> 明礬<small>五分</small></p> <p>極細末煉蜜丸如麻子大每服五分土茯苓<small>木槌打</small></p> <p>砂鍋內煮汁吞丸藥空心上下午飢時日三次</p>	<p>洗方</p>	<p>五倍子<small>四兩</small> 地骨皮<small>四兩</small> 皮硝<small>五錢</small> 甘草<small>二兩</small> 苦參<small>四兩</small> 葱頭<small>十個</small> 河</p>	<p>水煎濃湯一鍋於無風處乘熱蘸日浴三次浴時先吃飽或服煎藥一貼忌食茶醋牛肉麩河鮑火酒</p>	<p>摻方</p>	<p>欽定四庫全書  <small>先醒齋廣筆記</small></p>	<p>粉霜<small>一錢五分</small> 真冰片<small>三分</small> 二味和勻洗淨摻上立</p>	<p>癢</p>	<p>浸酒方</p>	<p>防風 當歸 羌活 白芷 白蘚皮 五加皮 蒼</p>	<p>木 牛膝<small>各二兩</small> 荆芥 薏苡 蔓荊子 木瓜 白蒺</p>	<p>藜<small>去刺各一兩</small> 生地黄<small>三兩</small> 烏稍蛇<small>出吳江尹山方額者佳一尾</small> 好酒十觔</p>	<p>浸煮三炷香卧時服丸亦可</p>	<p>治頭面結毒</p>
--	-----------	--	--	-----------	--	---	----------	------------	------------------------------	---	--	--------------------	--------------



勻調前藥末攤成膏貼之戒房事必效	銀硃 <small>三錢</small> 輕粉 <small>三錢</small> 白占 <small>三錢</small> 黃占 <small>三錢</small> 用麻油 <small>三兩</small> 先將二占化	又方	藥中病不在珍貴之劑也	乳香膏止痛生肌甚捷及用此二味功效彌良乃知方	松脂鉛粉麻油調敷應手而減公亮先用喬伯珪所贈	寶丹非完方也無紅鉛靈柴不能奏功時無紅鉛姑以	譚公亮患結毒醫用五寶丹餌之三年不效仲淳云五	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	子者名樞木亦可用取其葉或泡湯或為末不住服	極木一名十大功勞一名貓兒殘 <small>俗呼光</small> 黑子者是紅	又治結毒方 兼治積年虛勞痰火健脾進食	服十全大補湯十數劑 <small>川椒出桃花洞者佳嚼</small>	服至瘡口平復方住 忌牛羊魚腥房慾患久者宜間	送下每服三錢服後二三日瘡口乾燥不臭是其效也	薪艾 <small>去筋膜</small> 一兩 川椒 <small>去核</small> 八錢 麻黃 <small>去節</small> 二錢 川芎 <small>二錢</small> 猪頭天靈蓋
-----------------	---	----	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	----------------------	--	--------------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---



<p>凡父母正患徽瘡時育兒鮮有免者其證渾身破爛自頂至踵兩目外幾無完膚日夜號泣或吐或瀉似瘡似驚變態百出父母不知見有他證別作治療十無一生治法以牛黃為君再加犀角羚羊角硃砂冰麝和入土茯苓粉生蜜調服使兒日日利去惡毒見有他證隨宜治之母亦隨宜用藥加以散毒劑不住口服其外用大粉草金銀花為極細末二三升破爛處洗淨大握敷之半月後方易神效敷藥再敷數日自愈愈後一兩月當復發再後兩三月當再復發漸輕仍如法治之自愈愈後或口角眉角或肛門存二三餘毒不必治矣其渾身或癬或瘡忽聚忽散敷之便愈大抵年餘始得除根若母不禁口或兒漸大不能禁口有延至二三年者然不斃足矣胎中之毒徹骨入髓焉能旦夕除哉 馬銘</p>	<p>鞠傳</p>	<p>昇藥五靈散 馬銘鞠傳</p>	<p>膽礬 治筋而滋肝其色青應東方木 辰砂 養血而益心其色赤應南方火 雄黃 長肉而補脾其</p>
---	-----------	-------------------	--

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記



色黃應 中央土明礬 色白應西方金 磁石 榮骨液而壯腎其 色黑應北方水	此方見焦氏筆乘喜其不用水銀製而用之功效遲緩	後因加水銀一兩與前五味等分和勻入陽城礮內打	火三香取出加敷藥中用之效如神	神效敷藥方 馬銘鞠傳	夜合花 白者良 陰乾 象皮 同黃砂炒候脆方研 棒香 炒 研乳香	沒藥 各去 汗 血竭 孩兒茶 濕紙 包煨 花蕊石 五倍子 色帶 紅者	良半生半 煨各一兩 白占 八錢 珍珠 五錢 冰片 一錢 各極細末方入白占	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	研勻最後入冰片如欲去腐每兩加五靈散 二錢 欲生肌	每兩加前散三分或五分如治痘後膿水淋漓下疳等	瘡只加一二分治湯火傷每兩加絲綿灰 二錢 剔牙松皮	煨存性 五六錢 韶粉雄黃 五六錢 或乾摻或香油調一切外症俱	效	附海上單方	里中有周七者少年曾患毒左腋下得一異方用糯米	炊飯乘熱入鹽塊夾葱管少許搗極爛如膏貼患處輒
---	-----------------------	-----------------------	----------------	------------	--	--	--	------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	---	-------	-----------------------	-----------------------



消至中年腰間忽生一毒熱如火板硬痛不可忍佝僂  
跣躄自分必死屢藥不效急思前方如法貼之未幾大  
便去糞如宿垢甚多硬者漸軟數日而起

雜症

腦漏

腦者諸陽之會而為髓之海其位高其氣清忽下濁者  
其變也東垣云上焦元氣不足則腦為之不滿經云膽  
移熱於腦為鼻淵夫髓者至精之物為水之屬腦者至

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

陽之物清氣所居今為濁氣邪熱所干遂下臭濁之汁  
是火能消物腦有所傷也治法先宜清肅上焦氣道繼  
以鎮墜心火補養水源此其大畧耳藥多取夫辛涼者  
辛為金而入肺有清肅之義故每用以引散上焦之邪  
如薄荷荆芥甘菊連翹升麻鼠黏天麻之屬鎮墜心火  
補養水源如犀角人參天冬麥冬五味朱砂甘草山藥  
生地茯苓牡丹皮之屬然須兼理乎肺肝蓋鼻乃肺之  
竅而為腦氣宣通之路又治乎上焦而行清肅之令膽





<p>為春升少陽之氣與厥陰為表裏而上屬於腦戴人有</p>	<p>云膽與三焦尋火治內經謂膽熱所干義亦明矣理肺</p>	<p>用桑皮鼠黏桔梗二冬花粉竹瀝清肝膽以柴胡白芍</p>	<p>羚羊竹茹棗仁川芎或者又謂世人多用辛溫辛熱之</p>	<p>藥取效此義何居蓋辛熱甘溫多能宣通發散故病之</p>	<p>微者亦能奏效耳此從治切法非不易常經明者察之</p>	<p><b>頭風神方</b> <small>沈觀頤中丞傳自一道人予僕婦患此痛甚欲自經服二劑數年不發</small></p>	<p>土茯苓<small>忌鐵</small>四兩 金銀花<small>三錢</small> 蔓荊子<small>一錢</small> 玄參<small>八分</small> 防風<small>一錢</small> 明天</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>麻<small>錢一</small> 辛夷花<small>分五</small> 川芎<small>分五</small> 黑豆<small>四十九粒</small> 燈心<small>二十根</small> 芽茶<small>五錢</small> 河</p>	<p>水井水各一鍾半煎一鍾服</p>	<p><b>治半邊頭痛</b> <small>屬火證者用之妙</small></p>	<p>大黃末<small>三分</small> 黃芩末<small>一分</small> 二味和生白酒一碗頓熱調勻服</p>	<p>之即愈</p>	<p>又方</p>	<p>用芝蔴炒熱舂碎乘熱將好燒酒入磁器中重湯熱入</p>	<p>芝蔴扎緊只用一葱管孔插入磁瓶口內引鼻吸其氣</p>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	--	--------------------------	---	--------------------	--	--	------------	-----------	------------------------------	------------------------------



左則薰左右亦如之虛寒用燒酒虛熱用好米醋代之  
內服對病方藥

鬱證

紀華山先生雅自負數奇更無子時邑邑不快漸至痞

脹四年肌肉盡削自分死矣姑蘓張漣水胗而戲之曰

公那須藥一第便當霍然以當歸六錢韭菜子一兩香附童便

炒八錢下之紀有難色不得已減其半張曰作二劑耶一

服夜夢遺舉家慟哭張拍案曰吾正欲其通爾仍以前

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

半劑進胸膈間若勇士猛力一擁解黑糞數升尋啜粥

二碗明日巾櫛起見客矣逾年生一子即表弟汝占也

治筋骨疼甚如夾板狀痛不可忍者李景渠中丞傳

將驟子脩下蹄爪燒灰存性研末或酒白湯調服立愈

癩症方名補心寧志丸

天竺黃另研如錢五沉香另研如錢三天門冬去心酒洗蒸二兩白芍藥

酒炒三兩白茯苓去心四兩遠志肉甘草汁浸蒸二兩麥門冬去心二兩炙甘

草六錢旋覆花一兩真蘇子研一兩香附醋浸晒乾童便炒三兩半



夏薑汁拌以明礬末皂角莢不蛀者去黑皮酥為末和

勻懷山藥粉糊丸如豌豆大硃砂一兩研如法為衣每

服三錢用竹瀝點湯下

風癩病神方

好生犀角兩四剉末每用一兩加清水十碗入砂鍋內熬

至一碗濾淨再加水十碗熬至二酒杯加淡竹葉兩四水

六碗煎二碗去渣加犀角汁同服盡四劑即愈

治火上升有痰留滯喉間如有核上法宜降氣清

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

火

真蘇子錢研二廣橘紅錢三貝母錢三括萎根錢三白茯苓錢三麥

門冬錢五白芍藥酒三錢黑連翹錢一黃檗蜜炙一分五味子

一錢打碎水煎加竹瀝服

施靈修有一里人善酒卧床褥者三年靈修憐而索方

於仲淳仲淳親診之知其酒病也夫酒濕熱之物多飲

者濕熱之邪貫於陽明濕熱勝則下客於腎而為骨痿

昔人治痿病取陽明以五味子為君黃連為臣麥門冬



乾葛白扁豆為佐服之立起

治血痞沉香丸

沉香 血竭 辰砂 各二錢 木香 一錢 真麝香 一錢 琥珀 五分 玳瑁 三分

五分 當歸尾 二錢 牡丹皮 二錢 延胡索 一錢 為細末用

磁器煎甘草湯打糯米糊為丸凡氣痛酒磨葱湯亦可

產後血塊酒磨服

烏鬚神方

女貞實一斗如法去皮每斗用馬料黑豆一斗揀淨淘

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

洗晒乾同蒸透九蒸九晒先將女貞實為末加生薑自

然汁三兩好川椒去閉口者及蒂為末三兩同黑豆末

和勻蜜丸如梧子大先食服四五錢白湯或酒吞

又方

將鱧腸草採鮮者二三十觔搗汁入九蒸九晒過女貞

實末再晒乾如前為丸亦佳但服之腹痛作泄不若薑

汁椒末為佳蒸女貞實先將上好老酒浸一宿次日用

黑豆蒸如此者九以其性寒故也更服八珍丸以實根



皮硝 兩一 杏仁 尖去皮 銅綠 明礬 分各三 側栢葉 錢三 甘菊花	洗眼方 仲淳立予親試驗	者七日迎風冷淚三日見效 <small>賀知忍傳</small>	盞浸磁盒內日洗五六次一丸可洗七日重者半月輕	如豆大用銅綠一兩五錢為衣每用一丸以新汲水半	五倍以川黃連去鬚切片三錢熬成膏子和前藥為丸	香 <small>各一錢</small> 馬牙硝 乳香 <small>各五分</small> 俱極細末比飛麪更細三	當歸 沒藥 <small>各二錢</small> 血竭 白丁香 硼砂 冰片 麝	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	碧霞丹 <small>治內障外障暴赤 眼眵淚昏花翳膜</small>	每五錢空心飢時各一服白湯吞	為細末以旱蓮草膏烏飯子膏同煉蜜和丸如梧子大	木 <small>米泔浸蒸晒三次</small> 真川椒紅 <small>十二兩去白</small> 沒石子 <small>十</small>	九 <small>酒拌九蒸</small> 旱蓮草 <small>二兩</small> 烏飯子膏 <small>即南竺枝子</small> 茅山	何首烏 <small>勿去皮烏豆同牛膝蒸裂如常法最後</small> 女貞實	又方 <small>舊傳女貞實旱蓮草二方試之甚驗苦于 腹痛作泄仲淳再為更定涼血兼理脾</small>	本
--	----------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	---	------------------	---	---------------	-----------------------	---	--	--	---	---



三錢桑白皮五錢河水五碗煎至二大碗置銅盆內洗眼及

眉稜骨兩太陽涕出即爽然矣日夜不拘次數一服冬

可半月夏十日

牙痛方 鄧定宇先生傳

經霜西瓜皮燒灰敷患處牙縫內立效

擦牙散 章泰宇傳

石膏半觔火煨熟白蒺藜去刺四兩為極細末每日擦牙漱口牙

痛時頻頻擦之立愈

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

又方 陳筠翁傳自江陰云旱蓮草開紅花者與此地不類

旱蓮草以青鹽醃一二宿曬乾為極細末置磁罐內擦

牙以沸湯漱口嚥下久久兼能烏鬚種子

治胃火牙疼

馬蘭頭葉并放水溝內青苔搗爛以絲綿卷之左齒痛

塞左耳右亦然

治聾 王槐亭服之驗

白蒺藜炒去刺為末蜜丸空心服 沈四明相公專服此



方延年益壽

治耳中腫痛或出水出膿

金絲荷葉

即名虎耳草

搗汁滴入耳中如有膿可加枯礬末

及乾胭脂末各少許

又方

用鮮薄荷葉同蝸牛搗汁滴耳中亦妙

顧奉常女臂患紫雲風仲淳用稀蒼耳雄黃末之醇

漆為丸或疑漆有毒競沮之然竟以此藥收功

製漆用生蟹黃

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

攪和可化作水入藥

稀蒼丸 治爛風及風癩作癢如神

稀蒼草取末調吞治癰瘰甚驗初時以人參蘓木等分

熬膏和酒吞傷損皆除曾有八十老人試過五七九月

採近根處剝開有小蟲一條能治小兒疳症

解牛肉毒

取蝦蟆一隻置滾酒內數沸去蝦蟆飲酒一吐即愈

又方 馬銘鞠傳



用甘菊花連根葉搗爛和酒服一兩碗立愈

治疝氣痛方

顧冲吾司馬傳表兄  
李瀛洲試之神驗

六味地黄丸古方加北五味

三兩肉桂

二兩味  
甘者真枸杞子

去  
蒂

四兩車前子

米泔浸  
蒸三兩

將糯米一斗炊飯乘熱下白酒藥并

前藥料和勻如常製白酒法三兩日後漿來用上好鏡

面燒酒五十觔連酒漿并糟入大甕內泥封固一月開

去糟濾清酒味甘香異常空心或飢時隨量飲飲多不

渴

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

疝攻上作痛秘方 陳敬泉親驗

闕

子根有葉時用根葉搗爛絞汁和好酒服之覆被

出汗永不發

木腎方

用豆田中菟絲子草

一名黃  
絲草

煎濃湯洗之時以手搓之

隨消

治便紅或因酒毒發者 南昌鄧思濟傳

先用川黃連

去鬚切  
片酒炒

細末一服三錢空心白酒調下忌





<p>暈腥一日服連末後必腹痛去血愈多復用白芍藥<small>一兩</small></p> <p>白朮<small>五錢</small>甘草<small>三錢</small>同炒揀開先用白芍藥煎湯服腹痛自</p> <p>止後以白朮甘草同煎服遂愈又一法以粳米三分糯</p> <p>米七分煮粥空腹服遂愈此無他補胃氣則陽明調所</p> <p>以便紅自除也</p>	<p>腸風</p> <p>黃芪<small>蜜炙三錢</small>白芍藥<small>酒炒三錢</small>炙甘草<small>一錢</small>麥門冬<small>去心五錢</small>生地<small>酒洗</small></p> <p>四錢當歸<small>酒洗二錢</small>荆芥<small>炒一錢</small>白芷<small>一錢</small>柴胡<small>五分</small>地榆<small>酒洗三錢</small>人參</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p>	<p>錢一五味子<small>八分去枯者</small>河水二鍾煎八分空腹飢時服</p> <p>治腸風<small>因飲酒過多得之者效甚</small></p> <p>專服北五味打碎蜜蒸為細末蜜丸每清晨服三錢服</p> <p>至半年因味酸甚服後喉中覺吞酸加熟地黄等分為</p> <p>丸服久腸風頓止</p>	<p>治獬犬傷</p> <p>野葡萄根搗汁酒服</p>	<p>治蜈蚣傷</p>
---	---	-----------------------------	---	-----------------------------	-------------



用舊竹筋火中將頭上燒黑取下少許研細敷患處立愈

又方 馬銘鞠傳

一法取蜒蟒塗上其痛立止屢試神驗

治蛇傷

雄黃 雌黃 等分極細末先以白芷磨菜油調塗患處以溫火薰之滴盡黃水為度水出腫漸消

又方

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

明礬 麝香 二味為末摻上以艾灸之隨灸隨消

又方

慎火草 即牆頭草  
色綠極脆 搗汁同酒飲一面搗敷咬傷處立愈

一婦人於壁上取雞翎卷耳適蜈蚣生子在翎上帶入耳中生小蜈蚣穿腦內且痛且癢百藥莫效夢神人傳一方令炒雞肉熱置一器內留一小孔蓋上令病者以耳受之雞氣薰入蜈蚣悉攢雞肉上其病立愈

跌打秘方



用露天糞窖中磚瓦塊多年者或碗架濁水長流處磚

瓦塊火煨紅研極細跌打傷者酒調服五分立愈未打

服之可不痛不宜多服令人骨軟

金瘡并跌打破損出血方

煉過雲母粉菜油調敷立止痛更不作膿

金瘡止血方

真番降香

紫糖色者真切如豆  
大炒器焦研再炒

五味子

一兩

二味共研敷

上

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

又方

舊毡帽簷燒灰敷上

舊網巾灰亦好

金石湯火跌損方

用花蓋石舊家有用作几上小屏風者取三錢為極細

末真麻油調敷患處當日者立愈隔日敷之痛輕易收

口亦治產後瘀血攻心血暈神丹

桃花散治跌損刀傷狗咬爛脚

用陳年風化石灰一官升錦紋大黃

一兩焙  
燥研末

并石灰炒



桃花色存性真麻油調敷患處當日敷之更妙

火傷兼治湯泡方

大松樹皮 川大黃 二味等分為細末生桐油調敷

立愈

又方

用大黃一味為細末砂糖調敷立愈

火燒爛神方

將好煮酒一二甕入浴缸內令患者浸酒中極重不死

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

又方

用鼠初生者以真麻油浸之入磁瓶內封固患者將油

搽上痛處即愈

湯火神驗方

猪毛煨存性研細末加輕粉白礪砂少許麻油調和敷

之立效無癢痕

治水滄

出說海

凡遇溺水者視其心坎尚溫以圓器覆地下置門一扇



<p>於上令溺者仰臥以鴨血灌之口中或大小便出水即甦</p>	<p>臨杖預服藥 <small>湖州司獄司杖單神效</small></p>	<p>胎元 <small>一個煨</small> 黑犬對前脚上邊頂骨一副 <small>酥炙</small> 川麻皮</p>	<p>麝香 <small>五分</small> 乳香 沒藥 <small>各五分</small> 煉蜜丸如梧子大每服</p>	<p>三錢酒吞</p>	<p>杖後煎劑</p>	<p>紅花 紅麴 <small>各一錢</small> 延胡索 牛膝 <small>各三錢</small> 牡丹皮 五靈</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>脂 赤芍藥 番降香 <small>各二錢</small> 炙甘草 <small>七分</small> 桃仁 <small>七分</small> 肉桂 <small>五分</small></p>	<p>水酒煎若傷重出虛汗加參耆</p>	<p>杖丹</p>	<p>風化石灰 <small>君</small> 真番降香末 <small>上</small> 半夏末 <small>上</small> 黃芩 黃連</p>	<p>黃檗 大黃 <small>俱中</small> 為細末麻油調敷患處</p>	<p>杖丹散血</p>	<p>龍鬚草 <small>二兩</small> 大黃 <small>三兩</small> 二味為末用麻油一觔蒸大黃焦色</p>	<p>濾淨去渣加後藥 樟腦 <small>一兩</small> 麝香 <small>四錢</small> 冰片 <small>四錢</small> 降香末</p>
-------------------------------	---------------------------------------	--	--	-------------	-------------	--	----------------------	---	---------------------	-----------	--	--	-------------	--	---



<p>一兩乳香 沒藥 各五錢 自然銅 燒紅醋淬九次 共熬成膏</p>	<p>藥先劃碎杖處用軟帛攤成膏繫於杖處蒸熟熱韭菜熨之黑血出盡愈</p>	<p>杖丹長肉</p>	<p>臘月猪油 一兩 白占 黃占 各二兩 黃連 四兩 以猪油熬黃連</p>	<p>轉焦色去渣下占熬敷上帛紮緊自愈</p>	<p>湯洗</p>	<p>用葱頭煮爛揩洗杖瘡傷</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>治杖夾神方</p>	<p>狗胎 五分 封固 煨 遠年糞缸內瓦片 醋淬七次 雄黃 一分 硃砂 一分</p>	<p>木香 五分 麝香 三厘 細末和勻用芊芊活 最能活血 搗爛絞汁和</p>	<p>丸金箔為衣酒磨下</p>	<p>杖傷丸方</p>	<p>乳香 沒藥 血竭 孩兒茶 自然銅 煨 川木鼈</p>	<p>人中白 孩兒骨 如無以狗胎代之倍加 地龍 土木鼈 無名</p>	<p>異 為細末煉蜜丸如梧子大杖過酒服百丸</p>
------------------------------------	-------------------------------------	-------------	---------------------------------------	------------------------	-----------	-------------------	--------------------------	--------------	--	--	-----------------	-------------	-------------------------------	------------------------------------	---------------------------



杖癰方

水銀分五 輕粉 乳香 象牙末各一錢 細茶二錢 木香五分 麝

少許 為細末雞子黃蠟羊油調搽

杖丹

如遇打出即將松香兩四溶化又將葱一握搗入松香內

攪勻攤一膏藥貼患處外以綿帛掩上紮定五六日愈

又方 朱南溪傳

杖傷及跌磕者用落得打草似孩兒菊對節生枝不拘多少搗爛

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

酒服 如伏天杖傷出蛆 真麻油澆之立盡

附海上單方

顛犬咬方

先用蓑衣草紮住患處兩頭以衆人熱小便捻洗去血  
水次用胡桃殼半箇以本人熱糞裝滿蓋患處艾火灸  
七壯如本人不欲大便傍人者亦可急取斑猫七箇去  
頭足并翅酒洗和濕糯米銅杓內炒米熟為度隨將二  
物研成細末加六一散三兩分作七服每清晨一服白



滾湯調下本人頭頂心必有紅髮一根要不時尋覓拔去

劉襟湖驗過顛犬咬方

防風錢五 黑牽牛錢三 雄黃錢三 斑蝥錢一 真麝香錢三 錦紋錢三

大黃錢三 右為末溫滾水調下空心每日服二錢 先將

斑猫去頭翅足兩一 和白粘米升半 共炒去斑猫食米二撮

許後服前藥其斑猫即合入前藥內服一料後斑猫不

可用外加雄黃錢一 或蜜或米粉丸藥再服即間二三日

欽定四庫全書  
先醒齋廣筆記

服亦可每服分三 茄子茄地切不可踐食即茄漿水亦須

忌之二三年後不必忌也 此劉友自患顛犬咬三日

內即服此方小便下血塊有形得以全愈有一人患犬

吠六日服此方小便下血塊竟似犬狀亦終不救矣然

劉友所傷不曾破皮或毒輕而得愈總不如前方歷試

歷驗且犬咬之毒入心經則以益元散為引經之藥甚

為有理山鄉一時無處買藥多蓄斑猫預製益元散以

救人大是恩德





治酒疸

用苜蓿煎湯漸飲之愈

治刀瘡

化屍塲取燒過人骨

不化者更佳

研細末敷刀瘡患處立愈

治小兒疳症方

用天南竺煎湯飲神效

以上二方俱馮權奇傳

治蛔結丸方

胡黃連

八錢

白芍藥

一兩五錢

檳榔

八錢

粉草

五錢

廣陳皮

二兩

肉豆

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

寇

不油不註者五錢

史君子肉

五錢

為細末白糖調服

先醒齋廣筆記卷三



欽定四庫全書

子部  
先醒齋廣筆記卷四

詳校官太醫院醫士趙正池

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣何思鈞

校對官編修臣勵守謙

謄錄監生臣趙希南



欽定四庫全書

先醒齋廣筆記卷四

明 繆希雍 撰

炮炙大法

按雷公炮製法有十七曰炮曰熅曰燂曰炙曰煨

曰炒曰煨曰煉曰製曰度曰飛曰伏曰鎊曰掇曰

噉曰曝曰露是也用者宜如法各盡其宜

水部

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

雨水

立春節雨水 梅雨水芒種後逢壬為入梅小暑後逢壬為出梅 液雨水立冬後十日為入液至

小雪為出液得 雨謂之液雨

冬霜

凡收霜以鷄羽掃之瓶 中密封陰處久亦不壞

臘雪

用淨瓶收淨雪築實密封瓶口置於陰室中 不見日色春雪有蟲水亦便敗所以不收

神水

五月五日午時有雨急伐竹 竿中必有神水瀝取為藥

半天河

此竹籬頭水及 空樹穴中水也

流水

千里水東流水二水皆堪蕩滌邪穢煎煮湯液勞 水即揚泛水張仲景謂之甘爛水用流水二斗置

大盆中以杓高揚之千萬遍有沸珠相逐乃取煎 藥蓋水性本鹽而體重勞之則甘而輕取其不助



<p>腎氣而益脾胃也虞搏醫學正傳云甘爛水甘温而性柔故烹傷寒陰證等藥用之順流水性順而下流故治下焦腰膝之證及通利大小便之藥用之急流故治上峻急之水其性急速而下達故通二便風痺之藥用之逆流水洄瀾之水其性逆而倒上故發吐痰飲之藥用之也</p>	<p><b>井泉水</b> 反酌而傾曰倒流出曰未放曰無根</p>	<p><b>地漿</b> 此掘黃土地作坎深三尺以新汲水沃入攪濁少頃取清用之</p>	<p><b>熱湯</b> 飲之反傷元氣作脹</p>	<p><b>生熟湯</b> 以新汲水百沸湯合一盞和勻</p>	<p><b>菊潭水</b> 山澗兩岸有天生甘菊其下流泉是也</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>漿水</b> 漿酢也炊粟米熟投冷水中浸五六日味酢生白花色類漿故名若浸至敗者害人</p>	<p><b>米泔水</b> 即淘米汁也</p>	<p><b>繅絲湯</b> 以磁瓶收密封埋淨土地中任經數年久而愈妙</p>	<p><b>火部</b></p>	<p><b>桑柴火</b> 凡一切補藥諸膏宜此火煎之</p>	<p><b>炭火</b> 機炭火宜煎煉一切金石藥煇炭火宜煎焙炙百藥丸散</p>	<p><b>蘆火竹火</b> 宜煎一切滋補藥凡服湯藥雖品物專精脩治如法而煎藥者鹵莽造次水火不良火</p>	<p>候失度則藥亦無功觀夫茶味之美惡飯味之甘錫皆係於水火烹飪之得失即可推矣是以煎藥</p>
--	--------------------------------------	---	-------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	---	-----------------------------	---	------------------	------------------------------------	---	--	---



<p>須用小心老成人以深罐密封新水活火先武後文如法服之未有不効者火用陳蘆枯竹取其不強不損藥力也</p>	<p><b>土部</b></p>	<p><b>黄土</b> 三尺以上曰糞三尺以下曰土凡用當去上惡物勿令入容水</p>	<p><b>東壁土</b> 此屋之東壁上土爾當取東壁之東邊謂常先見目光刮取用之</p>	<p><b>伏龍肝</b> 凡使勿悞用竈下土其伏龍肝是十年以來竈額內火氣積久自結如赤色石中黃其形貌八稜</p>	<p>取得後細研以滑石水飛過兩遍令乾用熟絹裹却取子時安於舊額內一伏時重研了用</p>	<p><b>自然銅</b> 生出銅處方圓不定色青黃如銅凡使用甘草湯煮一伏時至明漉出攤令乾入白中搗了重</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>篩過以醋浸一宿至明用六一混泥瓷盒子盛二升文武火養三日夜纔乾用蓋了火</p>	<p><b>墨</b> 陳久而料精者入藥新而粗者不堪</p>	<p><b>百草霜</b> 此乃竈額及烟爐中墨烟也其質輕細故謂之霜山莊人家者良</p>	<p><b>梁上塵</b> 須去烟火遠高堂殿上者拂下篩用之一云凡用倒掛塵燒令烟盡篩取末入藥雷氏所說似</p>	<p>是梁上灰塵 今人不用</p>	<p><b>全部</b></p>	<p><b>金銀銅鐵</b> 凡使只可渾安在藥中借氣生藥力而已勿入藥服能消人脂</p>	<p><b>赤銅屑</b> 即打銅落下屑也或以紅銅火煨水淬亦自落下水淘淨用好酒入砂鍋內炒見火星取研</p>
---	------------------	---	---	---	--	--	--------------------------	--	------------------------------------	---	--	-----------------------	------------------	---	---



<p><b>丹砂</b> 即朱砂也。有數種。硫砂如拳許大。或重一鎰。有十四面。面如鏡。若遇陰沉天雨。即鏡面上有紅漿汁。</p>	<p><b>鐵鏽</b> 此鐵上赤衣也。刮下用。</p>	<p><b>古文錢</b> 周秦漢五代者。磨用。入散者。用胡桃研成粉。</p>	<p><b>密陀僧</b> 凡人使搗細。安甕中。重紙袋。盛柳蛀末。焙之。次下。東流水。浸滿。火煑。一伏時。去柳末。紙袋取用。</p>	<p><b>鉛丹</b> 即黃丹也。生鉛一味。火煨。研成細末。水飛過。用今去砂。石澄乾。微火炒。紫色。</p>	<p><b>鉛霜</b> 以鉛打成錢。穿成串。瓦盆盛。生醋。以串橫盆中。離醋三寸。仍以瓦盆覆之。置陰處。候生霜。刷下。仍合住。</p>	<p><b>鉛</b> 凡用以鐵銚。鎔化。瀉瓦上。瀝去渣脚。如此數次。收用。其黑錫灰。則以鉛沙取。黑灰白錫灰。不入藥。</p>	<p><b>銅青</b> 生熟銅。皆有青。則銅之精華大者。即空綠。以次空青也。銅青。則是銅器上綠色者。淘洗用之。近時人取。收晒乾。貨之。</p>	<p><b>用末</b> 煨兩伏時。去上研如粉。用凡修事。五兩。以醋兩。鎰為度。今人只以火煨。醋淬七次。研細。水飛過。用一云。製後。半年方可入藥。否則殺人。</p>
---	----------------------------------	---	--	---	---	---	--	--



<p>出有梅栢砂如梅子許大夜有光生照見一室有 白庭砂如帝珠子許大面上有小星現有神座砂 又有金座砂玉座砂不經丹竈用之而自延壽命 次有神錦砂芙蓉砂箭鏃砂已上九種皆可入藥 用丹砂入藥祇宜生用慎勿升煉一經火煉餌之 殺人研須萬適要若輕塵以磁石吸去鐵氣惡 磁石畏鹽水車前石韋皂莢決明瞿麥南星烏 頭地榆桑椹紫河車地丁馬鞭草地骨皮陰地厥 白附子 忌諸血</p>	<p><b>雲母</b> 凡使色黃黑者厚而頑赤色者為上几脩事一斤先 不中用須要光瑩如水色者為上几脩事一斤先 用小地膽草紫背天葵生目草地黃汁各一鎰乾 者細剉濕者收汁了於甕中安雲母於諸藥了 下天池水三鎰著火煮一日夜火勿令失度 其雲母自然成碧玉漿在鍋底却以天池水猛投</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記 其中將物攪之浮如塌涎者即去如此三度淘淨 了取沉香一兩搗作末以天池水煎沉香湯三升 已來分為三度再淘雲母漿了日中晒任用之 澤瀉為之使惡徐長卿羊血畏鮫甲礬石東 流水百草上露茅屋漏 水割汞伏丹砂</p>	<p><b>石鐘乳</b> 凡使勿用頭粗厚并尾大者為孔公石不用色 黑及經大火驚過并久在地上收者曾經藥物 制者並不得用須要鮮明薄而有光潤者似驚翎 筒子為上不得有長五六寸者凡修事法以五香水煮 過一伏時然後灑出又別用甘草紫背天葵汁漬 再煮一伏時凡八兩鐘乳用沉香零陵藿香甘松 白茅等各一兩以水先煮過一度了第二度方用 甘草等二味各二兩再煮了拭乾緩火烘之 然後入白杵如粉篩過却入鉢中令有力少壯者 三兩人不任研三日夜勿歇然後用水飛澄了以</p>
--	--	--	---



<p>以甕盒子收貯用之令乾又入鉢中研二萬遍後 石牡蒙人參二朮忌羊血畏紫石英菘 草韭實獨蒜胡葱胡荽麥門冬貓兒眼草</p>	<p><b>礬石</b> 生用解毒煨用生肌甘草為之 使惡牡蠣畏麻黃紅心灰藿</p>	<p><b>芒硝</b> 水飛過用五重紙滴過去脚於鑊中乾之方入乳 鉢研如粉任用芒硝是朴硝中煉出形似麥芒者 號曰芒硝火為之使惡苦 參苦菜畏女苑杏仁竹葉</p>	<p><b>滑石</b> 以刀刮去浮面黃者研如粉以牡丹皮同煨一伏 時出去牡丹皮取滑石却用東流水淘飛去下脚 者良石韋為之使惡曾青制雄黃</p>	<p><b>赤石脂</b> 研如粉新汲水飛過三度曬乾用亦有火煨水 飛者惡大黃松脂畏芫花鼓汁畏黃芩</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>白石英</b> 可煑汁用張仲景只令咬咀 不為細末惡馬目毒公</p>	<p><b>紫石英</b> 煑汁用或火燒醋淬為末傳毒長石為之使 得茯苓人參芍藥主心中結氣得天雄葛</p>	<p><b>爐甘石</b> 以炭火煨紅童便淬七次 水洗淨研粉水飛過晒用</p>	<p><b>綠礬</b> 火煨通紅淬入米醋中 烘乾研如飛粉畏醋</p>	<p><b>雄黃</b> 取透明色鮮紅質嫩者研如飛塵水飛數次畏 南星地黃萬苣地榆黃芩白芷當歸地錦苦參五 加皮紫河車五葉藤鷲腸草鷄 腸草鷲不食草圓桑葉蝟脂</p>
---	---	--	--	--	--------------------------	---	--	---	---	--





<p><b>石硫黃</b> 研如飛塵用以殺蟲行血 曾青石亭脂為之 使畏細辛朴硝鐵醋黑錫猪肉鴨汁餘甘子 桑灰益母天鹽車前黃蘗石韋蕎麥獨帚地骨皮 地榆蛇牀蓖麻兔絲蠶沙紫河波稜桑白皮馬鞭 草</p>	<p><b>食鹽</b> 凡鹽多以礬消石灰之類雜之入藥須用水 化澄去脚滓煎鍊白色乃良 漏蘆為之使</p>	<p><b>水銀</b> 凡使草中取者并舊朱漆中者經別藥制過者在 屍過者半生半死者俱勿用在朱砂中產出者其 色微紅收得後用葫蘆收免遺失先以紫背天葵 并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退若 修十兩用前二味各七鎰和合煮足為度 畏 磁石砒石黑鉛硫黃大棗蜀椒紫河車松脂松葉 荷葉穀精草金星草萱草夏枯草菝葜子 鴈來紅馬蹄香獨脚蓮水慈姑瓦松忍冬</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>水銀粉</b> 凡水銀一斤用明礬煅硝皂礬食鹽冬二兩同 一處研以不見汞星為度用烏磁盒二箇以藥 鋪盆內上用一盒合定以鹽泥石膏蜜醋調封盆 口勿令泄氣下盆底用鐵釘三脚支住四五寸高 用炭火先文後武蒸半日次日冷定輕輕取起上 盆則輕粉盡騰其上以驚翎掃下聽用此乃真正 輕粉生肌立效市肆多攙寒水石銀母石石膏焉 得有用乎 黃連土茯苓陳醬黑鉛鐵漿可制其 毒</p>	<p><b>戎鹽</b> 即青鹽溫水洗去 塵土淨晒乾入藥</p>	<p><b>石膏</b> 雪白有墻壁者真即市之寒水石也石白中搗成 粉以密絹羅過生甘草水飛過了水澄令乾重研 用之作散者煨熟入煎劑半生半熟鷄子 為之使畏鐵 惡莽草巴豆馬目毒公</p>
--	--	---	--------------------------	---	--	---



<p><b>磁石</b> 欲驗者一斤磁石四面只吸鐵一斤者此名延年 沙四面只吸得鐵八兩者號曰續末石四面只吸 得五兩已來者號曰磁石修事一斤用五花皮一 鎰地榆一鎰故綿十五兩三件并細剉以槌於石 碎作二三十塊子將磁石於甕瓶中下草藥以東 流水煮三日然後瀉出拭乾以布裹之向大石 上再槌令細了却入乳鉢中研細如塵以水沉飛 過了又研如粉用之柴胡為之使殺鐵毒消</p> <p>金 惡牡丹莽草 畏黃石 脂 伏丹砂養永去銅暈</p>	<p><b>陽起石</b> 惡澤瀉雷丸菌桂石葵蛇蛻皮 桑螵蛸為之使 子</p> <p>忌羊</p>	<p><b>瑪瑙</b> 犬肉內煮之火煨紅醋淬用試</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>石灰</b> 凡使用醋浸一宿瀉出待乾下火煨令腥口之氣 出用瓶盛著密蓋放令拭上灰令浮細研用去</p>	<p><b>砒霜</b> 凡使用小甕瓶子盛後入紫背天葵石龍芮二味 三件便下火煨從已至申便用甘草水浸從申至</p>	<p>錫 暈 割 三 黃 礪 砂 消 石</p>	<p>子出拭乾入瓶盛於火中鍛別研三萬下用之一 法每砒霜一兩打碎用明礬一兩為末蓋砒上貯</p>	<p>確中入明火一煨以枯礬為度砒之悍氣隨烟而 去駐形於礬中者庶幾無大毒用之不傷也用砒</p>	<p>霜即用礬霜是也似簡便 畏菘豆冷水 青鹽 鶴頂草消石蒜水 蓼常山益母獨帚木律菖蒲二</p>	<p>角酸鷲不食草波 稜 莖 皆 能 伏 砒</p>	<p><b>礞石</b> 與火硝相半入陽成罐封固煨存 性研如飛塵入藥得焙硝良</p>
---	---	-----------------------------------	--------------------------	---	--	------------------------------	--	--	---	--------------------------------	--



<p><b>花乳石</b> 出陝華諸郡色正黃形之大小方圓無定凡入丸散以罐固濟頂火煅過出火毒研細水飛晒</p>	<p><b>蓬砂</b> 即礪砂也白如明礬者良研如飛塵 畏知母 葶藶 紫蘇 蘇 帶何首烏 驚不食草</p>	<p>草部</p>	<p><b>人參</b> 色微黃皮薄滋潤明亮潤而獨株味甘回味不苦者良去蘆 茯苓 馬蘭 為之使 惡 鹵 鹹 溲 疏</p>	<p>畏五 靈脂</p>	<p><b>天門冬</b> 劈破去心用柳木甑燒柳木柴蒸一伏時酒酒令逼更添火蒸出曝 地黃 貝母 垣衣 為之使 忌 鯉魚 畏 曾青 浮萍 制 雄黃 礪砂</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>先醒齋廣筆記</p>	<p><b>麥門冬</b> 產杭州 莧橋 細白而皺者良水洗去心大抵一斤須減去五六兩凡入湯液或以水潤去心或</p>	<p>以瓦焙乘熱去心若入丸散須瓦焙熱即於風中吹冷如此三四次即易燥且不損藥力或以湯浸搗膏和藥亦可滋補藥則以酒浸搗之 地黃 車前 為之使 惡 欬 冬 苦 笑 苦 瓠 畏 苦 參 青 菖 木</p>	<p>耳伏 石鍾乳</p>	<p><b>甘草</b> 須去頭尾尖處頭尾土人截作三寸長劈破作六片以篋器盛之用浸蒸從巳至午出曝乾或用</p>	<p>清水蘸炙或切片用蜜水拌炒如瀉火生用 木 苦 參 乾 漆 為 之 使 惡 遠 志 忌 猪 肉</p>	<p><b>生地黃</b> 大如大指堅實者佳酒洗晒乾以手擘之有聲為度好酒拌勻置甕甕內包固重湯煮一晝夜</p>	<p>勝於蒸者名熟地黃生者酒洗用 得酒 麥門冬 蘊 汁 縮 沙 良 惡 貝母 畏 蕪 蒺 忌 葱 蒜 蘿 蔔</p>
--	---	-----------	--	--------------	--	---------------	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--



黃連	非真川黃連不効折之中有孔色如赤金者良去鬚切片分開粗細各置薑汁拌透用綿紙襯先用山黃上炒乾研細再炒至將紅以連片隔紙放上炒乾再加薑汁切不可用水紙焦易新者如是九次為度赤痢用濕槐花拌炒上法入痢藥中至於治本臟之火則生用之治肝膽之實火則以豬膽汁浸炒治肝膽之虛火則以醋浸炒治上焦之火則以酒炒治中焦之火則以薑汁炒治下焦之火	欽定四庫全書	則以鹽水或朴硝炒治氣分濕熱之火則以茱萸湯浸炒治血分塊中伏火則以乾漆水炒諸法不獨為之導引蓋辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之黃芩龍骨理石為之使忌	胡黃連	似乾柳枝心黑外黃折之塵出如烟者真忌惡同黃連忌鐵	菊花	真者味甘色黃單瓣光心去蒂用木枸杞根桑根白皮青箱葉為之使	白朮	米泔浸去油者山黃土裹蒸晒九次洗淨去皮切片曬乾防風地榆為之使忌桃李雀肉菘菜	蒼朮	出茅山細而帶糖香味甘者真米泔浸洗極淨刮去皮拌黑豆蒸又拌蜜酒蒸又拌人乳透蒸凡三次
----	--	--------	--	-----	-------------------------	----	-----------------------------	----	--------------------------------------	----	---



<p>蒸時須烘晒極乾 氣方透忌同白木</p> <p>兔絲子 米泔淘洗極淨畧晒揀去穉草子磨五六次酒 浸一宿慢火煑乾木槌去殼一法用酒煮一晝 夜搗作餅晒乾然後復研方細一法以白紙條同 研方細薯蕷松脂為之使得酒良惡蘿蔔 酒浸蒸曝乾形長二尺五寸已上者方佳蜀地及 懷慶產者良惡螢火龜甲陸英畏白前忌</p> <p>牛膝 肉牛 凡使莖長軟皮赤黃髮鬚出在平州平縣即今銀 州銀縣也西畔生處有白鶴綠鶴於此翔處是柴 胡香直上雲間若有過徃聞者皆氣爽此種治骨 蒸不入發表藥去髭并頭勿令犯火立便無効也</p>	<p>花紅者良忌鐵</p> <p>菟蔚子 制三黃砒石</p> <p>柴胡 凡使莖長軟皮赤黃髮鬚出在平州平縣即今銀 州銀縣也西畔生處有白鶴綠鶴於此翔處是柴 胡香直上雲間若有過徃聞者皆氣爽此種治骨 蒸不入發表藥去髭并頭勿令犯火立便無効也</p> <p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>半夏為之使惡</p> <p>皂莢畏女菀藜蘆</p> <p>前胡 切開白色者良水洗用竹刀刮去蒼黑皮并髭上 了細剉以甜竹瀝浸令潤日中曬乾用使惡畏 胡同柴</p>	<p>細剉拌淫羊藿衰二日後曝乾去淫羊藿用 免煩人心此服食家治法尋常去皮或焙用</p> <p>獨活羌活 為之使 雨蟲實</p>	<p>綠色者良治滯 下用醋拌炒</p> <p>升麻</p>	<p>自收玄色者良賣家多以葶藶子代充不可不 辨使葉勿使葶藶入補益藥中用米泔淘淨蒸 車前子 未入水利水治泄瀉藥炒為 常用山為之使</p>
--	---	---	--	-----------------------------------	---



<p>豆 惡凝水石巴 畏雷丸</p>	<p>石斛 出於日中實味不苦者真去頭土了用酒浸一宿澆 用石斛鎖陽澁丈夫元氣如斯修寧服滿一鎰永 不骨痛斃使酒蒸用服鉶當如法陸英為之使</p>	<p>滑石 消石</p>	<p>細辛 揀去雙葉服之害人洗淨去泥沙曾青草根為 之使忌生菜狸肉惡黃芪狼毒山茱萸畏</p>	<p>黃防 葵</p>	<p>龍膽草 甘草湯中浸一宿至明漉出曝乾用勿空腹餌 之令人溺不禁貫衆赤小豆為之使惡地</p>	<p>廉藜蘆齊蛤 畏真珠飛</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>先醒齋廣筆記</p>	<p>遠志 浸一宿漉出曝乾用之得茯苓龍骨冬葵子良 去心若不去心服之令人悶去心了用熟甘草湯</p>	<p>澤瀉 米泔浸去毛蒸或搗碎焙畏海蛤文蛤忌鐵 不油不蛀者良細剉酒浸一宿漉出曝乾用一法</p>	<p>泡 鹽湯煮過亦得一法瀼湯 三次去油蒸氣日乾用</p>	<p>薏苡仁 以糯米一兩同炒令糯米熟去糯米取使或以 顆小色青味甘用糯米炒咬着粘人齒凡一兩</p>	<p>蒸了焙乾用畏鹵鹹 節皮洗淨以蜜水浸一宿</p>	<p>姜蕤 凡使勿用黃精并鉤吻二物相似姜蕤上有鬚毛 莖班葉尖處有小黃點為不同采得以竹刀刮去</p>	<p>薯蕷 補益藥及脾胃中熟用外科生用 切用銅刀紫芝為之使惡甘遂</p>	<p>木香 形如枯骨油重者良忌見火入煎藥磨 汁內熟湯中服若實大腸宜麩煨熟用</p>
----------------------------	---	------------------	---	-----------------	--	-----------------------	---------------	---------------	--	---	---------------------------------------	--	--------------------------------	---	--	---



<p><b>巴戟天</b> 去心用枸杞子湯浸一宿待稍軟漉出却用酒浸一伏時又漉出用菊花同熬令焦黃去菊花用布拭令乾用今法惟以酒浸一宿判焙入藥若急用只以溫水浸軟去心也 覆盆子為之使</p> <p>參 惡雷丸丹</p>	<p><b>菴藺子</b> 可灸汁作飲為末作散俱</p> <p>形塊重實色白者良 白芷</p>	<p><b>芎藭</b> 為之使 畏黃連 伏雌黃</p>	<p><b>刺蒺藜</b> 淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木白中春令皮上刺盡用酒拌再蒸從午至酉出日乾用一法炒研去刺為末如入煎藥臨時調服不入湯煎 烏頭為之使</p>	<p><b>沙苑蒺藜</b> 綠色形如腰子細而香如天池茶者真即同州多偽者或炒或酒漿拌蒸亦不入湯藥</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>黃耆</b> 軟如綿直而細中有菊心味甘者良補氣藥中蜜炙用瘡瘍藥中鹽水炒用俱去皮 茯苓為之使 鮮 惡白 龜甲</p>	<p><b>肉蓯蓉</b> 肥大者良用清酒浸一宿至明以椶刷上去沙土浮甲盡劈破中心去白膜一重如竹絲草樣</p>	<p>是此偏隔人心前氣不散令人上氣不出凡使用先須酒浸并刷草了却蒸從午至酉出又用蘇炙得所 忌鐵</p>	<p><b>防風</b> 實而潤頭節堅者良去蘆并叉頭又尾者形彎者令人吐勿用 畏葶藶 惡乾薑藜蘆白藜芫花</p>	<p><b>蒲黃</b> 自採者真勿用 松黃并黃薈其二件全似只是味粗及吐人凡欲使蒲黃須隔三重紙焙令色黃蒸</p>	<p>半日却焙令乾用之妙 行血生用止血炒用</p>
---	---	------------------------------	---	--	----------------------	---	--	--	---	--	---------------------------



<p><b>王不留行</b> 者去蘆白實味甘 良惡防已 拌濕蒸之從已至未以 漿水浸一宿焙乾用</p>	<p><b>沙參</b> 者去蘆白實味甘 良惡防已 砂礪</p>	<p><b>茵陳蒿</b> 須用葉有八角者採得陰乾去根細剉用勿令 犯火山茵陳俗呼為帝鐘茵陳即八角也伏</p>	<p><b>蛇床子</b> 凡使須用濃鹽汁百部煎濃汁二味同浸三伏 時漉出日乾却用生地黄汁相拌蒸從午至亥</p>	<p><b>忍冬</b> 花四月采藤葉不拘時 采俱陰乾不見日火</p>	<p><b>烏頭勝</b> 烏頭勝</p>	<p><b>欽定四庫全書</b> 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>五味子</b> 遼東者佳去枯者銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從 已至申或晒或烘炒 茯苓為之使 惡葳蕤</p>	<p><b>茜根</b> 勿用赤柳草根真似茜根只是滋味澁不入藥中 用若服令人患內瘴眼遠服甘草水解之凡使用</p>	<p><b>丹參</b> 去蘆賣家多染色 須辨之 畏鹽水</p>	<p><b>决明子</b> 炒研 著實為之 使惡大麻子</p>	<p><b>天名精</b> 一名過冬青即荔枝草吳人又呼為天 地菘搗汁服 垣衣地黃為之使</p>	<p><b>漏蘆</b> 蒸從已至由去甘草揀淨用 遠翹為之使 枯黑如漆味不苦酸者真細剉拌生甘草相對</p>	<p><b>續斷</b> 皺皮黃色折之烟塵起者良用酒浸一伏時 槌碎去筋焙乾用 地黃為之使 惡雷丸</p>
--	--	--	---	---	---------------------------	---------------------------------	---	--	--	---	---	---	--





<p><b>乾薑</b> 馬湖者良微炒若治產後血虛發熱及止血俱炒 黑溫中炮用散寒邪理肺氣止嘔生用秦椒為 之使殺惡黃芩黃連天鼠 糞殺半夏南星蓖苳毒</p>	<p><b>生薑</b> 不宜使熟宜搗絞汁待藥煎成傾入方不失生字 之義如入藥煎乃熟薑非生薑矣使惡殺同乾 薑</p>	<p><b>泉耳實</b> 蒸用或炒熟搗去刺用 忌猪肉馬肉米泔</p>	<p><b>葛根</b> 雪白多 粉者良</p>	<p><b>葛花</b> 消酒 煎飲</p>	<p><b>括樓根</b> 雪白多粉者良 使惡乾薑 畏牛膝乾漆 枸杞為之</p>	<p><b>括樓仁</b> 搗碎用粗 紙壓去油</p>	<p><b>苦參</b> 先須用糯米濃泔汁浸一宿上有腥穢氣并在水 面上浮並須重重淘過即蒸從已至申出曝乾細</p>	<p><b>當歸</b> 包白味甘者良去塵并頭尖硬處一分已來洗淨 酒浸一宿若要破血即使頭一節硬實處若要止 痛止血即用尾若一槩用不如不使服食無効單 使妙也惡藺茹濕麪制雄黃畏菖蒲生薑</p>	<p><b>麻黃</b> 陳以者良去節并沫若盡服之令人悶用夾刀 剪去節并頭槐砧上用銅刀細剉煎三四沸竹 片掠去上沫盡瀝出熬乾用之 厚朴白微為之使惡辛夷石韋</p>
--	---	---	----------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	--

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記



<p><b>白芍藥</b> 以竹刀刮去麤皮并頭土了對之將蜜水拌蒸從已至未曝乾用之今人多以酒浸蒸切片或藥為之使惡石斛芒硝</p>	<p><b>赤芍藥</b> 製度并使惡</p>	<p><b>瞿麥</b> 只用葶殼不用莖葉若一時使即空心令人氣咽小便不禁凡欲用先須以莖竹瀝浸一伏時漉出晒乾用牡丹葶草為之使惡嫫蛸伏丹砂</p>	<p><b>玄參</b> 墨黑者良用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時後出乾勿令犯銅鐵鉶之噎人喉喪人目揀去蒲草盡了用之一法用酒洗去塵土切片晒乾用惡黃芪乾蘆大棗山茱萸</p>	<p><b>秦艽</b> 凡使秦并艽須於脚文處認取左文列為文即治疾艽即發脚氣凡用秦先以布拭上黃肉毛盡然</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>後用童便浸一宿至明日乾 用菖蒲為之使畏牛乳</p>	<p><b>百合</b> 白花者良 酒拌蒸</p>	<p><b>知母</b> 皮黃肉白者良於槐砧上細剉焙乾木白杵搗一法去毛蜜炙勿令犯鐵器得黃蘗及酒良伏蓬</p>	<p>鹽砂</p>	<p><b>貝母</b> 黃白輕鬆者良先於柳木灰中炮令黃劈破去內口鼻上有米許大者心一小顆後拌糯米於銚上同炒待米黃熟然後去米取出其中有獨顆圓不作兩片無皺者號曰丹龍精不入藥用若誤服令人筋脉不收用黃精小藍汁合服立愈厚朴人筋脉不收用黃精小藍汁合服立愈厚朴</p>	<p><b>白芷</b> 白色不蛀者良當歸為之使惡旋覆花制雄黃硫磺</p>
---	-----------------------------	---	---	---	--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	-----------	---	---



<p><b>淫羊藿</b> 細剉用羊脂相對拌炒過待羊脂盡為度每修 事一斤用羊脂四兩為度也 薯蕷紫芝為之</p>	<p><b>黃芩</b> 大肺經用枯芩去腐酒浸切炒入大腸或安胎等 俱用子芩酒浸切炒 龍骨山茱萸為之使 惡</p>	<p><b>狗脊</b> 凡修事火燎去毛細剉了酒拌蒸從巳至申 出曝乾用 葶藶為之使 惡莎草敗醬</p>	<p><b>茅根</b> 洗淨搗爛 勿用露根</p>	<p><b>紫菀</b> 用東流水淘洗令淨用蜜浸一宿火上焙乾用凡 修事一兩用蜜二分 欵冬為之使 惡天雄藁</p>	<p><b>紫草</b> 真者方佳須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔 鬚細剉用每修事紫草一斤用蠟三兩於鐺中鎔</p>	<p><b>通草</b> 即木通也有紫白二色紫者皮厚味 辛白者皮薄味淡二者皆能通利</p>	<p><b>藁本</b> 去蘆水洗切 惡 藁茹 畏青箱子</p>	<p><b>石韋</b> 背有黃毛須拭極淨羊脂拌炒焦黃色 滑石 杏仁射干為之使 得萆薢良 制丹砂礬石</p>	<p><b>葶藶</b> 其根細長淺白者真酒浸一宿焙乾 忌鐵 薏苡為之使 畏前胡柴胡牡蠣大黃葵根</p>	<p><b>土茯苓</b> 忌鐵</p>	<p><b>白薇</b> 用糯米泔汁浸一宿至明取出去鬚了於槐砧上 細剉蒸從巳至申出用夏月浸二時許 惡黃芪</p>
---	--	---	------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--------------------------	--

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記



<p>乾薑大棗山茱萸 大黃大戟乾漆 處處有三四 月采莖陰乾</p> <p><b>大青</b></p> <p>產蕪州者良入藥用新灸火 用陳苦酒香附為之使</p> <p><b>艾葉</b></p> <p>一名鼠粘子一名牛旁子一名大力子用酒拌蒸 待上有薄白霜重出却用布拭上然後焙乾搗如 用粉</p> <p><b>惡實</b></p> <p>紫背浮萍七月采之揀淨以竹篩 攤晒下置水一盆映之即易乾也</p> <p><b>水萍</b></p> <p>根能吐下子生用潤心肺治黃病炒用治肺痿吐 血腸風瀉血赤白痢反胃吐食 取汁制雄汞</p> <p><b>王瓜</b></p> <p>切之如綿者良酒洗得髮良 惡麥門冬伏丹砂雄黃硫黃</p> <p><b>地榆</b></p>	<p>消腫搗汁止 血燒灰存性</p> <p><b>大小薊根</b></p> <p>凡使先須用生鳥豆并紫背天葵和海藻三件同 蒸一伏時候日乾用之近人但洗淨鹹味焙乾用</p> <p><b>海藻</b></p> <p>甘草反</p> <p><b>澤蘭</b></p> <p>凡使先要別識雄雌其形不同大澤蘭形葉皆圓 根青黃能生血調氣與缺合小澤蘭迥別採得後 看葉上斑根須細到之用網袋盛懸於屋南畔角 亭大小澤蘭須細到之用網袋盛懸於屋南畔角</p> <p>上令乾用 防己為之使</p> <p><b>昆布</b></p> <p>一斤用甌箬十個用昆布細到二味各一處下東 水流從巳至亥 水旋添勿令少</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p>
--	--	-----------------------------



<p><b>防己</b> 凡使勿使木條以其木條已黃腥皮皺上有子足 子不堪用凡使防己要心花文黃色者然後細剉 卓前草根相對同蒸半日後取出去卓前草根細 剉用之一法用酒洗切 殷孽為之使 惡細辛</p>	<p>畏葶黃硝石毒 殺雄黃硝石毒</p>	<p><b>天麻</b> 透明者良天麻十兩用蒺藜子一鎰緩火熬焦熟 後便先安置天麻十兩於瓶中上用火熬過蒺藜 子蓋內外使用三重紙蓋并繫從已至未時又出 蒺藜子再入熬炒准前安天麻瓶內用炒了蒺藜 子於中依前蓋又隔一伏時後出如此七遍瓶盛出 後用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單搗一法麪</p>	<p>裹煨 透切</p>	<p><b>阿魏</b> 凡使各有訛偽有三驗第一驗將半銖安於銅器 中一宿至明露阿魏處白如銀汞無赤色第二驗</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>將一銖置於五斗草自然汁中一夜至明如鮮血 色第三驗將一銖安於榆樹上樹立乾便是真色 黑者力微黃澹者力上凡使先於淨鉢中 研如粉了於熱酒器上裏過任入藥用</p>	<p><b>香薷</b> 八九月開花着穗時采之去根留葉陰乾勿 令犯火服至十兩一生不得食白山桃也</p>	<p><b>百部根</b> 去心皮用酒浸一宿 漉出焙乾細剉用</p>	<p><b>款冬花</b> 花未舒者良去梗蒂甘草水浸一時晒乾用 杏仁為之使 得紫苑良 惡玄參皂莢消石</p>	<p>畏貝母麻黃辛夷 黃芩黃芪連翹青箱</p>	<p><b>紅藍花</b> 自種者真 得酒良</p>	<p><b>牡丹皮</b> 凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨了細剉如 大豆許用清酒拌蒸從已至未出日乾用潤而</p>
--	--------------------------	---	------------------	--	--------------------------	---	---	--	--	-----------------------------	------------------------------------	---



<p><b>厚者良</b> 忌蒜胡荽 伏  <b>砒</b> 畏兔 絲子 貝母 大黃  <b>三稜</b> 去毛 米醋 浸一日 切片炒  或 煑熟 乾入藥 乃良</p>	<p><b>青黛</b> 水飛 去脚 綠中有 石灰 入服 餌藥 中  宜 飛淨 用一法 用青布 浸汁 代之</p>	<p><b>鬱金</b> 色赤 似薑 黃蟬 肚者 良置 生雞 血  中 化成 水者 真磨 汁臨 服入 藥</p>	<p><b>盧會</b> 搗上 有青 竹文 斑并 光膩 味極 苦勿 便和 衆藥 中</p>	<p><b>延胡索</b> 產茅 山谿 陵澗 澗粒 粒  <b>肉豆蔻</b> 不油 不蛀 不皴 皮者 佳糯 米作 粉使 熱湯 披裏  豆蔻 於糖 灰中 炮待 米團 子焦 黃熟 然後 出去  <small>米粉 用勿 令犯 銅鐵</small></p>	<p><b>欽定四庫全書</b>  <b>先醒齋廣筆記</b></p>	<p><b>白豆蔻</b> 藥煎 成方 炒研 入一 二沸 即起 入  <b>砂仁</b> 畧炒 吹去 衣研 入湯 丸法 同白 豆蔻 得白 檀  香豆 蔻為 使入 肺得 人參 益智 為使 入脾 得黃 檗  茯苓 為使 入腎 得赤 白石 脂為 使  入大 小腸 得訶 子白 蕪荑 鱉甲 良</p>	<p><b>補骨脂</b> 即破 故紙 形圓 實色 黑者 良此 藥性 本太 燥每  用酒 浸一 宿後 漉出 浮者 去之 却用 東流 水浸  三日 夜却 蒸從 已至 申出 日乾 用  <small>得胡 桃胡 麻良 惡甘 草忌 諸血 芸薹 鐵</small></p>	<p><b>蓬莪茂</b> 凡使 於砂 盆中 用醋 磨令 盡然 後於 火畔 吸令  乾重 篩過 用一 法火 炮醋 浸煨 切  用生 甘草 水浸 一伏 時後 漉出  去頭 鬚了 焙乾 任入 藥中 用</p>	<p><b>白前</b> 解百 藥毒 生搗 汁  服或 末煑 俱可</p>	<p><b>薺芎</b></p>
--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	------------------



<p>白藥子 末用</p>	<p>香附 細者佳去毛以水洗淨揀去砂石於石白內搗去皮用童便浸透晒搗用或以酒醋酥鹽水薑汁浸</p>	<p>俱瓦上焙乾得芎藭蒼 米醋童子小便良忌鐵</p>	<p>鱧腸 即旱蓮草性太寒宜煎 膏用須日色中忌鐵</p>	<p>使君子 慢煨香熱用或云七生七煨 食亦良忌飲熱茶犯之即瀉</p>	<p>翦草 治肺熱吐血有神舊 出婺州今產寧州</p>	<p>附子 底平有九角如鐵色一箇重一兩即是氣全堪用 修事十兩於文武火中炮令皺折者去之用刀刮 上孕子并去底尖微細劈破於屋下午地上掘一 坑可深一尺安於中一宿至明取出焙乾用鉄炒</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>欲炮者灰火勿用襍木火只用柳木最多若陰制 使即生去尖皮底薄切用東流水并黑豆浸五日</p>	<p>夜然後瀉出於日中曝今乾用凡使須陰割去皮 尖了每十兩用生烏豆五兩東流水六升一云此</p>	<p>物性太烈古方用火炮不若用童便煮透尤良 地膽為之使得蜀椒食鹽下達命門惡蜈蚣</p>	<p>鼓汁畏防風甘草人參 黃芪綠豆烏韭童溲犀角</p>	<p>半夏 陳久者良若修事四兩用搗了白芥子末二兩頭 醋六兩二味攪令濁將半夏役中洗三遍用之半</p>	<p>夏上有巢涎若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿若入 治痰飲藥用白礬湯入薑汁浸透洗淨用無白星</p>	<p>為度造麵法用半夏不拘多少將滾湯泡過宿搗 爛每一斗入生薑一斤同搗之作餅子用乾稻稈</p>	<p>或粟麥稗黍之如黍鉤法乾久用 之使惡皂莢海藻飴糖羊血畏生薑乾薑胡為</p>
-------------------	--	--------------------------------	--------------------------------------	--	------------------------------------	---	--------------------------	--	--	---	---------------------------------	---	--	--	---



<p><b>白欬</b> 腫生取代緒為之使</p>	<p><b>甘遂</b> 煨熟去麩瓜蒂為之使惡遠志</p>	<p><b>常山</b> 明瀉出日乾熬搗少用勿令老人久病者服之切</p>	<p><b>射干</b> 不辣者良米泔水浸一宿瀉出然後用</p>	<p><b>旋覆花</b> 去裏花蘆殼皮并蒂</p>	<p><b>草蒿</b> 即青蒿葉細而香自採佳陰乾凡使唯中為妙到</p>	<p><b>桔梗</b> 味苦而有心中者良凡使去頭上尖硬二三分已來</p>	<p><b>大黃</b> 用細切內文如水旋斑緊重剉蒸從已至未晒乾又</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>若同使翻然成痼疾採得葉不計多少用</p>	<p>童溺浸七日七夜後瀉出晒干伏硫黃</p>	<p>龍膽龍眼忌猪肉伏砒</p>	<p>分搗作膏投於水中浸一法用米泔浸一宿微焙</p>	<p>時瀉出緩火熬令乾用每修事四兩用生百合五</p>	<p>并兩畔附枝子於槐砧上細剉用百合水浸一伏</p>	<p>使忌惡乾漆</p>	<p>為妙下藥酒浸一時黃二三沸即服黃芩為之</p>	<p>蒸一伏時其大黃譬如烏膏樣於日中晒乾用之</p>	<p>皮龜甲</p>
-------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------	--	---	---	--------------------------	-------------------------	------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------	---------------------------	----------------------------	------------





<p>河物 鮪魚 魚鰕</p>	<p><b>蘆根</b> 逆水并赤黃皮用其汁消痰開胃下氣除熱解一切食</p>	<p><b>白頭翁</b> 花子莖葉同 蟲實</p>	<p><b>苧根</b> 此物大能補陰而行滯血方</p>	<p><b>稀莨</b> 方赤莖者良採葉陰乾醇</p>	<p><b>天南星</b> 漆為之使 得火牛膽良 惡莽草 畏</p>	<p>粉丹 霜砂</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>蓖麻子</b> 形似巴豆節節有黃黑斑點凡使先須和皮用</p>	<p><b>牽牛子</b> 即草金零入水中淘浮者去之取沉者 煎乾拌</p>	<p><b>威靈仙</b> 去蘆酒洗 忌茶麪湯</p>	<p><b>何首烏</b> 冬至後採者良入春則芽而中空矣北人以贗</p>	<p><b>貫衆</b> 洗淨切片炒 伏石鍾乳小</p>	<p><b>白及</b> 水洗切 紫石英為之使</p>
-------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	------------------	--------------------------	--	---	---------------------------------	--	----------------------------------	---------------------------------



<p><b>劉寄奴</b> 凡使去梗以布拭上薄殼皮令淨拌酒蒸 從已至由出曝乾用之莖葉花子皆可用</p>	<p><b>骨碎補</b> 生江蘇南根着樹石上採得用銅刀刮去上黃赤 毛盡便細切用蜜拌令潤架柳甌蒸一日後出 曝乾用一法去毛細切後 用生蜜拌蒸從已至亥</p>	<p><b>連翹</b> 黑而閉口者良 去蒂根研</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>續隨子</b> 凡用去殼取色白者以 紙包壓去油取霜用</p>	<p><b>山豆根</b> 或末或研 或噙咽</p>	<p><b>白附子</b> 竹節者良炮去 皮得火良</p>	<p><b>預知子</b> 去皮 研服</p>	<p><b>木賊草</b> 去節童便浸 一宿焙乾</p>	<p><b>蒲公草</b> 自採鮮者入湯藥煎入 丸末傳瘡毒搗爛用</p>	<p><b>穀精草</b> 土瓜為之使 忌鐵伏汞砂</p>	<p><b>夏枯草</b> 土瓜為之使 忌鐵伏汞砂</p>
---	---	--------------------------------------	--------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------------



<p><b>山慈菘根</b> 出浙江處州府遂昌縣洪山地方市中無真者形光無毛本草註中云有毛誤也</p> <p><b>燈心草</b> 蒸熟待乾折取中心白穰燃燈者是為熟草不蒸者生乾剝取為生草入藥用之最難研以梗</p> <p>米粉漿染過晒乾研末入水</p> <p>澄之浮者是燈心也晒乾用</p> <p><b>海金沙</b> 或丸或散沙及草俱可入藥</p> <p><b>萱草根</b> 晒乾為末或用水煎酒煎研汁皆可服</p> <p><b>藿香</b> 自種者良採之如藿香氣者真薄荷香者非也</p> <p><b>絡石</b> 凡採得後用倉布楷葉上莖蔓上毛了用熟甘草水浸一伏時出切日乾任用 杜仲牡丹為之使</p> <p>惡鐵落 畏貝母</p> <p>葛蒲 殺孽毒</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p>	<p><b>木部</b></p> <p><b>桂</b> 凡使勿薄者要紫色厚者去上竈皮取心中味辛者使每斤大厚紫桂只取得五兩取有味厚處生</p> <p>用加末用即用重蜜熟絹并紙裹勿令犯風其州</p> <p>上只有桂草元無桂心用桂草葢丹陽木皮遂成</p> <p>桂心凡用即單搗用之 得人參甘草麥門冬大</p> <p>黃黃芩調中益氣得柴胡紫石英乾地黃療吐逆</p> <p>葱 忌生</p> <p>石 脂</p>	<p><b>桂枝</b> 即桂之枝條輕薄者</p>	<p><b>槐實</b> 凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者凡</p> <p>使用銅槌槌之令破用烏牛乳浸一宿蒸過用</p> <p>景天為</p> <p>之使</p>
--	-----------------------------	--	---------------------------	---



<p><b>槐花</b> 未開時收采陳久者良入藥  <b>枸杞根</b> 即地骨皮凡使根掘得後用東流水浸一宿然後  <small>焙乾用其根若似物命形狀者上春食棗  夏食子秋食根并子也 制硫黃丹砂</small></p>	<p><b>栢實</b> 去油者酒拌蒸另搗如泥或蒸熟曝烈春簸取仁  <small>砂研入藥 瓜子牡蠣桂為之使 畏菊花羊蹄  諸石及麪麵 伏砒硝</small></p>	<p><b>栢葉</b> 向月令採之春東夏南秋  <small>西冬北 使畏伏同實</small></p>	<p><b>茯苓</b> 堅白者良去皮搗為末於水盆中攪三次將濁浮  <small>者去之是茯苓筋若誤服之令人眼中童子并黑</small></p>	<p>欽定四庫全書  先醒齋廣筆記  <b>茯神</b> 用赤茯苓則不必飛也 使惡畏忌同茯神  <small>去皮木用 馬問為之使 得甘草防風芍藥麥  門冬紫石英療五臟 惡白藜 畏地榆秦芫牡  蒙龜甲雄黃  忌米醋及酸物</small></p>	<p><b>琥珀</b> 凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀璧珀琥珀紅  <small>淺黃多窟皮皺石珀如石重色黃不堪用花珀文  似新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其內自  有物命動此使有神妙堅珀其珀是象珀之長故  號曰璧珀琥珀如血色於布上拭吸得芥子者真  也大率以輕而透明者為佳入藥中用水調側栢  子末安於甕鍋子中安琥珀於末中了下火煮從  巳至申別有異光別搗如粉重篩用一法用細布  包內豆腐鍋中煮之然後灰火畧煨過入目製用</small></p>
--	---	---	--	--	---



<p>酸棗 藥粒如砂仁法勿隔宿惡防已</p> <p>生用 安神</p>	<p>黃檗木 即日瀉出晒乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為度</p> <p>凡修事五兩用蜜三兩一法用鹽</p> <p>酒拌炒褐色惡甘漆伏硫黃</p> <p>凡使採得後用水浸三日將物攪旋投水浮者去</p> <p>之 乾用</p>	<p>楮實 之 乾用</p>	<p>松脂 凡用以胡葱同煮二十沸入</p> <p>冷水揉扯數十次晒乾用</p>	<p>降真香 以菴舶來者色較紅香氣恬而不</p> <p>辣用之入藥殊勝色深紫者不良</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p>	<p>茗苦茶 入清頭目藥用苦茶</p> <p>消食下氣用佳茗</p>	<p>南燭 莖葉搗汁漬米炊飯</p> <p>子入澁精補益藥用</p>	<p>乾漆 火煨黑烟起盡存性研如飛塵</p> <p>使 畏雞子紫蘇杉木漆姑草蟹 半夏為之 忌油脂</p>	<p>五加皮 五葉者是剥皮去骨陰乾</p> <p>遠志為之使 畏玄參蛇皮</p>	<p>蔓荊實 凡使去蒂子下白膜一重用酒浸一伏時後蒸</p> <p>從已至未出晒用一法炒搥碎用 惡烏頭石</p> <p>膏</p>	<p>辛夷 凡用去麤皮拭上白赤毛了去心即以芭蕉水浸</p> <p>一宿瀉出用漿水煮過從已至未出焙乾用若治</p> <p>使 眼目惡五石脂 畏葛蒲黃石膏黃環 芎藭為之</p>
-------------------------------------	--	----------------	---	---	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--



<p><b>桑上寄生</b> 凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用銅刀和根枝莖細剉陰乾了用忌火</p> <p><b>杜仲</b> 極厚者良削去麤皮每一斤用酥一兩蜜三兩和塗火炙以盡為度一法用酒炒斷絲以漸取屑方</p> <p>不焦惡玄</p> <p>參蛇蛻皮</p>	<p><b>女貞實</b> 按本草女貞實與冬青似是而非也女貞葉長四五寸子黑冬青葉圍子微紅俱霜後採陰乾</p> <p>去粗皮內更有細皮實白</p> <p>色酒拌黑豆同蒸九次</p>	<p><b>楓香脂</b> 凡用以蠶水煮二十沸入冷水中揉扯數十次晒乾用</p>	<p><b>麩核</b> 凡使湯浸去皮尖擘作兩片用芒硝木通草二味和麩仁同水煮一伏時後瀉出去諸般藥取麩仁研成膏任加減入藥中使每修事四兩用芒硝一兩木通草七兩一法去衣綿紙包研去油用</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p>	<p><b>丁香</b> 凡使有雄雌顆小雌顆大似櫻棗核方中多使雌力大膏煎中用雄若欲使雄須去下蓋乳子發人背癰也入煎藥為末調入或將好投入一二沸即傾畏鬱金忌火</p>	<p><b>沉香</b> 凡使須要不枯色黑潤者良如背角硬重沉於水下為上也半沉者次也入散中用須俟衆藥出即入拌和用之入煎</p> <p>磨汁忌見火</p>	<p><b>乳香</b> 圓小光明者良古方以燈心同研或以糯米數粒同研或以人指甲二三片同研或以乳鉢坐熱水中乳之云皆易細總不如研細和人乳畧蒸再研勻晒乾研如飛塵為紗藥將沉下一二即起勿多煮</p>	<p><b>沒藥</b> 透明者良製</p> <p>同乳香法</p>	<p><b>金櫻子</b> 熬膏服或和藥霜降後採金櫻子不拘多少以粗氣微搗去毛刺淨復搗破去子約有一斗用</p>
--	---	---	---	-----------------------------	--	---	--	------------------------------------	--



<p>度沸後入菜莢為之使</p> <p>丹參消石白堊畏紫石</p>	<p>一百度洗別有大効若用醋煮即先沸醋三十餘</p>	<p>十兩用鹽二兩研末投東流水四斗中分作</p>	<p>吳茱萸 凡使先去葉核并襍物了用大盆一口使鹽水</p>	<p>竹皮茹 取極鮮竹刮皮碾去外硬青勿用</p>	<p>澱澱滴瀝於盤中竹將自燃瀝便盡矣就將滴過</p>	<p>瀝竹為薪又架新竹於磚上如前燒逼任取多少</p>	<p>淡竹 篋竹苦竹慈竹惟四種各有瀝堪用 薑汁</p>	<p>為之</p>	<p>使</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p>	<p>竹瀝 用取新鮮金竹鋸尺許中留節兩頭去節劈兩開</p>	<p>淡竹葉 別有用</p>	<p>桑葉 煎湯研汁為末俱可</p>	<p>桑根白皮 自採入土東行者或竹刀或銅刀刮去黃粗</p>	<p>方二仙丹即此</p>	<p>收貯磁中坐涼水內一宿用服之大能固精良</p>	<p>水二斗煮之一飯時瀝起清汁又入白水煮之又</p>
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------	----------	-----------------------------	-------------------------------	----------------	--------------------	-------------------------------	---------------	---------------------------	----------------------------



<p><b>檳榔</b> 凡使取外存坐穩心文如流水碎破內文如錦別 紋者妙半白半黑并心虛者不入藥用凡使須別 檳與榔頭圓身形矮毗者是榔身形尖紫文窳者 是檳檳力小榔力大欲使先以刀刮去底細切勿 經火恐無力效若 熟使不如不用</p>	<p><b>梔子</b> 腦并鬚長有九路赤色者上凡使先去皮鬚了取 凡使勿用顆大者號曰伏尸梔子無力須要如雀 九稜者仁以甘草水浸一宿漉出焙乾搗晒如赤 金末用大率治上焦中焦連殼用下焦去殼洗去 黃漿炒用治血 病炒黑用</p>	<p><b>騏驎竭</b> 凡使勿用海母血真似騏驎竭只是味鹽并腥 氣騏驎竭味微鹽甘似梔子氣是也欲使先研 作粉重篩過丸散膏中任使用勿與衆 藥同搗化作飛塵也 得蜜陀僧良</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>龍腦香</b> 即冰片也形似白松脂作杉木氣明淨者善久 經風日或如雀屎者不佳今人多以樟腦身打 亂之不可不辨也云合糯 米炭 相思子貯之則不耗膏主耳聾</p>	<p><b>蕪荑</b> 妙去穀氣嗅 如信者真</p>	<p><b>枳殼</b> 凡使勿使枳實緣性効不同若使枳殼取辛苦腥 并有隙油能消一切瘴要陳久年深者為上用時 先去瓢以麩炒過待麩黑焦遂出用布拭 上焦黑然後置搗如粉用產江右者良</p>	<p><b>枳實</b> 色黑陳久者良 去穢麩炒黃色</p>	<p><b>厚朴</b> 凡使要用紫色有油質厚者良去麩皮用酥炙過 每修葺一斤用酥四兩炙了細剉用若湯飲下使 用自然蓋汁八兩炙一升為度 乾薑為 之使惡澤瀉消石寒水石忌豆</p>
---	--	--	--------------------------	--	-------------------------------------	---	--	--





<p><b>山菜萸</b> 凡使勿用雀兒酥真似山菜萸只是核八稜不入藥用圓而紅潤肉厚者佳酒拌砂鍋上蒸去核了一斤取肉皮用只秤成四兩已來凡蒸藥用柳木甌去水八九寸水不泛上餘悉准此 蓼實</p> <p><b>胡桐淚</b> 形似黃礬而堅實有夾爛木者木淚乃樹脂流出者其狀如膏油石淚乃脂入土石間者其狀成塊以其得鹵斥之氣故入藥為勝 伏砒石</p> <p><b>猪苓</b> 用銅刀削去麤皮一重薄切下東流水浸一夜至明漉出細切蒸一日出曬乾用一云猪苓取其行更濕生用 洗淨切</p>	<p><b>烏藥</b> 遠珠者良 洗淨切</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p>	<p><b>龍眼</b> 生者沸湯瀹 遇食不動脾</p>	<p><b>安息香</b> 或燒薰 或末服</p>	<p><b>仙人杖</b> 此是笋欲成時立死者 色黑如漆五六月收之</p>	<p><b>海桐皮</b> 酒浸服亦 可入煎</p>	<p><b>五倍子</b> 或生或炒 為末入藥</p>	<p><b>大腹</b> 擘去垢黑用溫水洗淨再用黑豆汁洗方可用日 乾此樹鳩鳥多棲之遺屎在皮上不淨恐有毒今</p>	<p>製人用之不 製大誤</p>	<p><b>天竺黃</b> 輕者真 伏粉霜</p>
---	---------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--	------------------	---------------------------



<p><b>蜜蒙花</b> 凡使先揀令淨用酒浸一宿漉出候乾却拌蜜 日乾用每修事一兩用酒八兩浸待色 變用蜜半兩蒸為度此元名水錦花</p>	<p><b>巴豆</b> 凡使巴之與豆及剛子須在仔細認勿誤用殺人 巴顆小紫實色黃豆顆有三稜黑色剛子顆小似 棗核兩頭尖巴與豆即用剛子勿使凡修事巴豆 敲碎去油淨用白絹袋包甘草水浸凡焙乾或研膏 用每修事一兩以酒麻油各七合盡為度為瘡瘍 傳藥須炒黑存性能去瘀肉生新肉有神 為之使 得火良 惡葦草牽牛 畏 大黃藜蘆黃連蘆筍醬豉豆汁冷水</p>	<p><b>蜀椒</b> 一名南椒凡使須去目及閉口者不用其椒子先 須酒拌令濕蒸從巳至午放冷密蓋除下火四畔 無氣後取出便入甕器中盛勿令傷風用也 仁為之使 得鹽良 畏欵冬花防風附子雄黃</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>橐吾冷水 麻仁漿</p>	<p><b>皂莢</b> 凡使須要赤膩肥并不蛀者用新汲水浸一宿用 銅刀削上窰皮用酥反覆炙酥盡為度取出槌之 去子搗篩皂莢一兩酥二分收得揀取圓滿堅 硬不蛀者用瓶盛下水於火畔煮待炮熟剝去硬 皮一重□取向裏白嫩肉兩片去黃其黃消人腎 氣將白兩片用銅刀細切於日中乾用一法麪裹 煨去核 栢實為之使 惡參門冬 畏 空青人參苦參 伏丹砂 紛霜硫磺礪砂</p>	<p><b>訶子</b> 本名訶黎勒凡使勿用毗梨勒菴梨勒榔精勒 路勒若訶黎勒文只有六路或多或少並是襍路 勒毗路勒個個毗祿路勒皆圓露文或八路至十 三路號曰榔精勒多滋不入用凡修亭先於酒內 浸然後蒸一伏時其訶黎勒 以刀削路細剉焙乾用之</p>
---	---	--	--------------------------	---------------------	--	--



<p><b>無食子</b> 凡使勿令犯銅鐵并被火驚者顆小文細上無 却焙乾研了用勿 搗能為黑犀色</p>	<p><b>雷丸</b> 赤色者殺人取肉白者用甘草水浸一宿銅刀刮 上黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>實為之使 惡葛根</p>	<p><b>蘇方木</b> 紅潤者良凡使去麤皮并節了若有中心文橫 如紫角者號曰木中尊色甚緻倍常百等須細</p>	<p>剉了重搗拌細條梅枝 蒸從已至申出陰乾用</p>	<p><b>胡椒</b> 凡使只用內無皺殼者用方大漢椒使殼胡 椒使子每修煉了於石槽中碾碎成粉用</p>	<p><b>益智子</b> 去殼炒 臨用研</p>	<p><b>樺木皮</b> 主諸黃疸濃 莖汁飲之良</p>	<p><b>樞實</b> 同鷲肉食生斷節風又上壅人 皮反綠豆能殺人忌火氣</p>
---	--	--------------------------	---------------------	---	--------------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------------	--



羊肉羶	可食解 氣不補益人蒸炒熟食氣凡患風人及小兒不	栗 日中曝乾食下氣補益火煨去汗亦佳生食有木	大棗 葱同食令人五臟不和與魚同食令人腰腹痛	青皮 以湯浸去瓢切片 醋拌瓦炒過用	橘核 以新瓦焙香去殼 取仁研碎入藥	橘皮 真廣陳皮豬踪紋香氣異常去白時不可浸於水 中止以滾湯手蘸三次輕輕刮去白要極淨	荷鼻 採荷葉近蒂者是畏 桐油伏白銀硫黃	藥白朮枸杞子良 用之得茯苓山	蓮肉 去心勿去皮分作兩片每片分作四小塊瓦上焙 焦色一法每一斤用豬肚一個盛貯煮熟搗	皮及子 杵用之	豆蔻 俗名草菓者是也去蒂并內裏子後取皮同菓莢 於鍋中緩炒待菓莢微黃黑即去菓莢取草豆蔻	果部	木槿 入藥炒用取汁度 絲使得易落	椶櫚子 入藥燒灰用不可絕過即是煨存 性研如飛塵散瘀止血之神藥也	柞木子 能開交骨所 以僅生有神	木鼈子 入藥去 油者
-----	---------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--	---------------------------	-------------------	--	------------	--	----	------------------------	---------------------------------------	-----------------------	------------------

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記



<p><b>覆盆子</b> 凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂盡子用酒拌蒸一宿以東流水淘兩遍曬乾方用為妙也</p> <p><b>鷄頭實</b> 凡用蒸熟烈日曬裂取仁亦可舂取粉用入澀煎湯浸過用且經久不壞</p> <p><b>烏梅</b> 去核微炒用造法取青梅籃盛於火上薰黑若以稻灰淋汁潤濕蒸過則肥澤不蠹 忌猪肉</p> <p><b>木瓜</b> 產宣州者真即彼處多以小黎充之勿令犯鐵用銅刀削去硬皮并子薄切於日中曬却用黃牛乳汁拌蒸從巳至未其木爪如膏煎却於日中攤曬乾用也今止去穰槌碎用</p> <p><b>柿</b> 不用火烘日晒採青者收置器中自然紅熟滋味盡去而甘不可與蟹同食作瀉准木香磨汁飲可解</p> <p><b>柿霜</b> 用大柿去皮捻遍日晝夜露至乾內甕中待生白霜乃取出市者多偽不入藥</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p>	<p><b>烏芋</b> 即芋薺也 能消瘴氣</p>	<p><b>枇杷葉</b> 凡使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三葉重一兩是氣足堪用以籠布拭上毛令盡用甘草湯洗一遍却用綿再拭極淨每一兩以酥一分炙之酥盡為度如治肺病以蜜塗炙治胃病以薑汁塗炙此物治咳嗽如去毛不盡反令人嗽也</p>	<p><b>甘蔗</b> 榨漿飲消渴解酒痧疹最宜</p>	<p><b>桃仁</b> 七月采之去皮尖及雙仁者麩炒研如泥或燒存性用此破血行瘀血之要藥也雷公法用白木烏豆一味和桃仁同於坩堝子中煮一伏時後瀉出用手擘作兩片其心黃如金色任用之行血宜連皮尖生用</p>	<p>香附為之使</p>
---	-----------------------------	----------------------------	---	------------------------------	---	--------------



<p>致猪 死肉 十小 有兒 八九 十炒 歲豆 以猪 上肉 不食 畏必 也瘵 氣</p>	<p><b>生大豆</b> 仁或 牡搗 蠣或 諸莢 膽汁 汁或 良炒 肉屑 同各 食五 必參 瘵龍 氣膽 得前 豆胡 黃烏 屑喙 忌杏</p>	<p><b>飴糖</b> 者糯 次米 之作者 餘者 但入 可藥 食粟 耳米</p>	<p><b>麻子</b> 一極 夜難 勿去 令殼 着取 水帛 次日包 日置 中沸 曝湯 乾中 就浸 新至 瓦冷 上出 接垂 去井 殼中</p>	<p><b>胡麻</b> 凡修 從事 已至 亥出 攤晒 乾於 白中 春令 麤皮 一重 盡</p>	<p><b>米穀部</b></p>	<p><b>欽定四庫全書</b> 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>山查</b> 水潤 核淨 肉蒸 去</p>	<p><b>橄欖</b> 汁中 服河 或豚 生毒 嚼煮</p>	<p><b>黎子</b> 湧消 有神 解熱 熱加 毒牛 久黃 服未 不療 患小 癰兒 疽風 疾痰</p>	<p><b>杏仁</b> 風五 寒月 肺采 病之 藥以 中湯 亦有浸 連去 皮皮 尖尖 及及 雙雙 仁仁 者者 取其發 散炒 也研 用治</p>	<p><b>桃梟</b> 已至 一未 法焙 搗乾 碎以 炒銅 若刀 止血 炒切 黑焙 存取 性肉</p>	<p><b>桃花</b> 是千 得一 云葉 正月 采花 之結 中子 實之 者樹 良上 凡不落 修者 事於 以十 酒一 拌月 蒸內 從採</p>	<p><b>桃花</b> 止三 目月 黃三 凡日 用采 揀陰 令乾 淨之 以勿 絹使 袋千 盛葉 於者 簷能 下使 懸人 令鼻 乾劔 去不</p>
--	---	---	---	--	-------------------	---------------------------------	---	---	--	--	--	---	---



<p><b>麩</b></p> <p>凡使須陳久者搗作末後掘地坑深二尺用物裹內坑中至一宿明出焙乾用</p>	<p><b>蕎麥</b></p> <p>壓丹石毒作麪和猪羊肉熟食不過八九頓即患熱風鬚眉脫落還生亦希涇汾以北多此疾又不</p>	<p><b>麥麩</b></p> <p>性涼用炒諸藥</p>	<p><b>小麥</b></p> <p>浮者止汗須揀淨焙用</p>	<p>於常</p>	<p>力倍</p>	<p><b>春杵頭細糠</b></p> <p>凡穀皆有糠粳稻粟稗者勝北方多用杵南方多用碓入藥並用丹家云糠火煉物</p>	<p>導 粟藥 稻藥 糠麥藥各有用</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p>	<p><b>蘖米</b></p> <p>凡穀皆可生蘖有粟黍穀麥豆諸蘖皆水浸脹候生芽曝乾去鬚取其中米炒研麪用其功皆主消</p>	<p><b>粳米</b></p> <p>陳者下氣病人宜之</p>	<p><b>秣米</b></p> <p>小兒病人不宜多食</p>	<p><b>粟米</b></p> <p>即小米陳者與杏仁同食令人吐瀉</p>	<p><b>酒</b></p> <p>人為火燎以陳酒浸之止痛拔出火毒令人不死</p>	<p><b>大豆黃卷</b></p> <p>或研爛絞汁或炒為末用黑大豆為藥牙生水浸大豆候生芽取皮陰乾用得前胡杏子牡蠣烏喙天雄鼠屎共蜜和良惡海藻龍膽</p>	<p><b>赤小豆</b></p> <p>法同大豆合魚酢食成消渴</p>
---	--	--------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------	---	-----------------------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	--	--	---	--------------------------------------



<p>瓜蒂 凡使勿用白瓜蒂要採取青綠色瓜待瓜氣足其瓜蒂自然落在蔓莖上採得未用時使櫛櫛葉裏於東牆有風處掛令吹乾用</p>	<p>菜部 罌子粟 用熱水泡軟擘去筋膜切成絲用蜜水或米醋拌微炒晒乾用 忌蒜醋胡椒</p>	<p>醬 又有肉醬魚醬皆呼為醢不入藥用</p>	<p>醋 藥多用之 服茯苓丹參不可食醋</p>	<p>綠豆 生研絞汁或煮食用之宜連皮去皮則令人缺壅氣當是皮寒肉平故也圓小綠者佳反榷子殼 忌鯉魚酢 解金石砒霜一 切草木諸毒連皮生研水服</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>紅麴 亦出江西陳久者 良吹淨炒研用</p>	<p>淡豆豉 能升能散得葱則發汗得鹽則能吐得酒則治風得薤則治痢得蒜則止血炒熟則又能止汗</p>	<p>菡豆 紫花者良炒去殼打碎及煮汁飲 豚魚一切草木毒生嚼及煮汁飲</p>	<p>神麴 故名神麴如過此日造者非也法用白虎白麴一 升青龍青蒿自然汁三升武杏仁四升泡去皮 尖搗爛入麴朱雀赤小豆三升煮熟去皮搗爛 和麴一處勻一如造酒麴法以麻葉或楮葉包罾 如造醬黃法待生黃衣晒收之凡 用須火炒黃以助土氣陳久者良</p>
---	--	-----------------------------	---------------------------------	---	--------------------------	----------------------------------	---	---	---





<p><b>白冬瓜</b> 此物經霜後皮上白如粉塗故云白冬瓜也被 霜後取置經年破取核水洗燥去殼搗仁用一 絞用皮肉搗 絞汁服</p>	<p><b>白芥子</b> 研用</p>	<p><b>萊菔</b> 生食熟食俱可治久脾泄百藥不効 不効者但不可與地黃同食多食動氣惟生薑能 制其毒 伏礪砂</p>	<p><b>萊菔子</b> 炒研能消食性峻利 傷人真氣勿久服</p>	<p><b>黃蜀葵花</b> 瘡家要藥作末 及浸油俱可</p>	<p><b>葱頭</b> 取根白一二寸遠鬚用 洗淨忌蜜及常山</p>	<p><b>欽定四庫全書</b> 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>韭</b> 絞生汁飲其子入藥揀淨蒸熟暴乾簸去黑皮 炒黃研用忌蜜及牛肉伏石鍾乳乳香</p>	<p><b>荊芥</b> 陳者良去梗取穗 若用止血須炒黑</p>	<p><b>蘇子</b> 自收方真市者俱偽畧妙研極 細煎成藥投入二三沸即傾</p>	<p><b>紫蘇</b> 兩面俱紫 自種者真</p>	<p><b>薄荷</b> 產蘇州龍 腦者良</p>	<p><b>苦匏</b> 即苦壺盧也凡用須細理瑩 淨無麤翳者乃佳不爾有毒</p>	<p><b>馬齒莧</b> 凡使勿用葉大者不是馬齒莧亦無水銀忌 與鼈同食食之俱變成鼈噉人腹至不可治</p>	<p><b>蕺菜</b> 治肺癰俗名魚 腥草生陰處</p>
---	--------------------------	---	--	---	--	---------------------------------	--	--	---	------------------------------------	-----------------------------------	--	---	---------------------------------------



<p><b>木耳</b> 桑槐樹生者良。羹羹食有用。礮盛大火內煨去烟存性為末入藥。</p>	<p><b>髮髮</b> 凡使是男子年可二十已來無疾患顏貌紅白於頂心剪下者髮是凡於丸散膏中先用苦參水浸一宿漉出入瓶子以火煨之令通赤放冷研用。</p>	<p><b>人乳汁</b> 白而不腥者良。</p>	<p><b>人牙齒</b> 入藥燒用。</p>	<p><b>人糞</b> 宜用絕乾者搗末沸湯沃服之。一名金汁埋地中年久者良。</p>	<p><b>人溺</b> 肥白無病童子味不鹹雪白者良。</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>人中白</b> 溺器中者良。火煨研。</p>	<p><b>禪襦</b> 取中裊近隱處男用。女用或取汁或燒灰服。</p>	<p><b>天靈蓋</b> 凡使彌腐爛者佳。有一片如三指濶者取得用。煨灰火罨一夜待腥穢氣盡却用童便於甕鍋中煮一伏時。漉出於屋下握得一坑深一尺置骨於中一伏時。其藥魂歸神妙。陽人使陰陰人使陽。男骨色不赤。女骨色赤。以此別之。一法同檀香湯洗過。酥炙用。或燒存性用。</p>	<p><b>紫河車</b> 置酒內覆者。胎也。首胎重十五兩以上。將酒洗數次。血水方盡。用銀簪脚剔去筋膜。封固。銀鍋內加酒重湯煮一晝夜。或文武火焙乾。一法米泔浸淨入猪肚中蒸爛。搗膏入藥。忌犯鐵。</p>	<p><b>獸部</b></p>
---	--	---------------------------	-------------------------	--	---------------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---	--	------------------



<p><b>象牙</b> 細刮取屑 龍膽地黃常山蜚蠊 畏牛膝乾漆 惡龍骨</p>	<p>之使 得壯丹葛蒲利耳 目 取用之 人參為</p>	<p>去水三四尺已來一宿至明方取用之 細研如塵却絹裏安於井面上 自有肝黃其牛身上光如血色多玩弄好照水 需水復便如碎蒺藜子許如豆者硬如帝珠子次</p>	<p><b>牛黃</b> 是取之者又有心中如濃黃醬汁採得便投於水中黃 凡使有四件第一件是生神黃賺得者次有角黃 用之也當門子良凡用另研之方用細研篩</p>	<p>諸羣中遂亂投水被人收得擘破見心流在脾結 作一箇乾血塊可隔山澗早聞之香是香中之次 也凡使麝香並用子日開之方用細研篩</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>麝香</b> 其香有三等一者名遺香是麝子臍閉滿其麝自 於石上用蹄尖彈臍落處一里草木不生並焦黃 人若收得此香價與明珠同也二名膝香採得甚 堪用三名心結香被犬獸驚心破了因茲狂走裸</p>	<p><b>龍齒</b> 搗碎入丸煨研 得畏忌同龍骨</p>	<p>畏石膏鐵 人參牛黃黑豆良 一伏時晒乾用否則着人腸胃晚年作熱也 乾或云凡入藥須水飛三度用如急用以酒煑焙 浸一宿焙乾研粉水飛三度用如急用以酒煑焙 骨氣入腎臟中也雷公所云生用法也一法用酒 其効始神但是丈夫服空益腎藥中安置圖龍</p>	<p><b>龍骨</b> 骨細文廣者是雌骨麓文狹者是雄骨五色者上 白色者中黑色者次黃色者稍得經絡不淨之處 并婦人採得者不用洗淨搏研如粉極細方入藥 其効始神但是丈夫服空益腎藥中安置圖龍</p>
--	---	--	--	---	--------------------------	--	--	--	---



<p><b>鹿角膠</b> 自煎者良酒化服為上或用麥門冬橘紅砂仁煎湯化服入丸用酒或水頓化和蜜或炒成珠</p> <p>亦得得火</p> <p>良畏大黃</p>	<p><b>阿膠</b> 油綠色光明可鑑者真凡使先於豬脂內浸一宿至明出於柳木火上炙待炮了可研用只以蛤粉炒成珠用為便 薯蕷為之使 得火良 畏大黃</p>	<p><b>白馬莖</b> 凡收當取銀色無病白馬春月遊北時力勢正強者生取陰乾百日用一法以銅刀破作七片</p> <p>將生羊血拌蒸半日晒乾以粗布去毛及乾血挫碎用</p>	<p><b>鹿茸</b> 須茹茸如琥珀紅潤者良凡使先以天靈蓋作末然後鋸解鹿茸作片子以好羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外黃脆了如褐色用鹿皮一片裹之安室上一宿其藥魂歸也至明則以</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p> <p>慢火焙之令脆方搗作末用之每五兩鹿茸用羊脂三兩炙盡為度茸中有小白蟲視之不見入人鼻必為類盡藥不及也切不可以鼻嗅 麻勃為之使</p>	<p><b>牛膽</b> 臘月黃牛青牛者良</p>	<p><b>牡狗陰莖</b> 六月上伏日取陰乾百日切片酥拌炒</p>	<p><b>羚羊角</b> 帶黃色者角彎中深銳紫小有掛痕者真耳邊聽之集集鳴者良凡修事勿令單用不復有驗須妥不折原對以繩縛之將鐵錯子錯之旋旋取用勿令犯風錯末盡處須二重紙裹恐力散也錯得了即單搗搗盡背風頭重篩過然後入藥中用免刮人腸也一說密裏藏懷中取出搗易碎</p>	<p><b>犀角</b> 凡使以黑如漆黃如栗上下相透雲頭雨脚分明者為上次用為黑肌麤皺折裂光潤者良近人多</p>
--	---	---	--	--	---------------------------	------------------------------------	--	---



<p>巧偽藥染湯煑無所不至須辨之凡修治錯其屑入白中搗令細再入鉢中研萬匝方入藥中用之</p> <p>一說入人懷內一宿易碎或磨汁入藥用忌松脂</p> <p>升麻為之使惡雷丸萆薢烏頭烏喙忌鹽姪</p> <p>婦勿服能</p> <p>消胎氣</p> <p>虎骨 經骨良頭頸骨俱可用色黃者佳雄虎者勝藥箭射殺者不可入藥其毒浸漬骨血間能傷人也製法並搥碎去髓塗酥或酒或醋各隨方法炭火炙黃入藥</p>	<p>猪懸蹄 古方有用左蹄甲者有後蹄甲者酒浸半日炙焦用</p>	<p>猪四足 者母猪者良</p>	<p>猪膽 陰乾汁亦可和藥</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>猪肚 豬水畜而胃屬土故方藥用之補虛以胃治胃也</p>	<p>糜角 煎膠與鹿角膠同法取霜用角水浸七日刮去皮錯屑以銀瓶盛牛乳浸一日乳耗再加至不耗乃止用油紙密封瓶口別用大參銷鍋中三寸上安置再以麥四周填滿入水浸一伏時水耗旋加待屑乾如麪取出焙研成霜用</p>	<p>狐陰莖 炙為末酒服</p>	<p>獺肝 炙脆研諸畜肝葉皆有定數惟獺肝一月一葉十二月十二葉其間又有退葉用之須見形乃可</p>	<p>獐肉 多驗不爾 膏油入膏藥中拔濕如神趙府膏藥中用之</p>
---	-------------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------------------	---	----------------------	---	--



<p><b>膾肭臍</b> 此物多偽海中獸號曰水鳥龍海人採得殺之取腎藥中修合恐有誤其物自殊有一對其</p> <p>有兩重薄皮裏丸氣肉核皮上自有肉黃毛三莖其一穴年年陰濕常如新兼將於睡着犬躡足置於犬頭其驚驚如狂即是真也</p> <p>用酒浸一宿後以布裏微微火上炙令青細剉單搗用也</p> <p>以漢椒樟腦同收</p> <p>則不壞</p>	<p><b>禽部</b></p> <p><b>雄雀屎</b> 凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經淫者糞名雀蘇不入藥雄屎兩頭尖圓者是凡採得先去兩畔有附子生者勿用鉢中研如粉煎甘草湯浸一宿頭上清甘草水盡焙乾任用日華子云凡鳥左翼掩右者是雄其屎頭尖挺直</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>先醒齋廣筆記</p>	<p><b>伏翼</b> 凡使要重一斤者先拭去肉上毛及去爪腸留肉翅并嘴脚以好酒浸一宿取出以黃精自然汁五兩塗炙至盡炙乾用一法止煨存性近世用者多煨存性耳</p> <p>覓雲寶為之使</p>	<p><b>天鼠屎</b> 即伏翼糞方言名天鼠爾一名夜明砂凡採得即伏翼糞方名天鼠爾一名夜明砂凡採得</p> <p>以水淘去灰土惡氣取細砂晒乾焙用其砂乃</p>	<p>蚊納眼也</p> <p>惡白歛白微</p>	<p><b>蟲魚部</b></p>	<p><b>石蜜</b> 凡煉蜜只得十二兩半是數若火少火過並用不得凡煉蜜每斤入水四兩銀石器內以桑柴火慢煉掠去浮沫至滴水成珠不散乃用謂之水火煉法又法以器盛置重湯中煮一日候滴水不取</p>	<p>傷用火</p> <p>用更不</p>
---	--	-----------------------------	--	---	--------------------------	-------------------	--	-----------------------



<p><b>蜜蠟</b> 蠟乃蜜脾底也取蜜後煉過濾入水中候凝取之 色黃者名黃蠟煎煉極淨色白者名白蠟一說新 則白久則黃非也與今時所用 造白蠟不同 惡芫花齊蛤</p>	<p><b>牡蠣</b> 左顧者良東流水入鹽一兩煮一伏時後入火中 燒令通赤然後入鉢中研如粉用也一法火煨醋 滓七次研極細如飛麪 貝母為之使 得甘草 牛膝遠志蛇床子良 惡麻黃辛夷吳茱萸 伏</p>	<p><b>真珠</b> 於白中搗令細以絹羅重重篩過却使研二萬下 了用不細則傷臟腑凡使要不傷破及鑽透者可 用也一法入豆腐內蒸易碎入 目生用不用蒸依上法為是</p>	<p><b>瑇瑁</b> 入藥生用以其性味全也既經陽 火即不堪用與生熟犀角義同</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>桑螵蛸</b> 凡使勿用諸襍樹上生者不入藥中用須桑樹 畔枝上者採得去核了用沸漿水浸淘七遍令 水過沸於籠鍋中熬令乾用勿亂別修事却 無効也 得龍骨止精 畏旋覆花戴椹</p>	<p><b>石決明</b> 即真珠母也七九孔者良先去上竈皮用鹽并 東流水於大籠器中煮一伏時了漉出拭乾搗 為末研如粉更用東流水於籠器中如此淘之三 度待乾再研一萬匝方入藥中用凡修事五兩以 鹽半分則取服之十兩 永不得食山桃令人喪目也</p>	<p><b>海蛤</b> 此即鮮蛤子雁食後糞中出有文彩者為文蛤無 文彩者為海蛤鄉人多將海岸邊爛蛤殼被風濤 打磨瑩滑者偽作之凡修事一兩於漿水中煮一伏 時後却以地骨皮柘葉各二兩又煮一伏時後於 東流水中淘三遍拭乾細搗研如粉 用 蜀漆為之使 畏狗膽甘遂芫花</p>
---	--	---	---	--------------------------	--	---	--



<p><b>蛞蝓</b> 即畏鹽也</p>	<p>蘇荇神草 粉用也 乾以布淨拭蠶上黃肉毛并黑口甲了單搗篩如</p>	<p><b>白殭蠶</b> 凡使除絲綿并子盡以糯米泔浸一宿待蠶桑</p>	<p>微炒 用之當</p>	<p><b>蠶退</b> 近世醫家多用蠶退紙而東方諸醫用蠶欲老眠</p>	<p><b>原蠶蛾</b> 炒去翅 足用</p>	<p>明取出用之其効倍多 惡白及白欵附子</p>	<p>賊魚骨多少先燒坑子去炭灰了盛藥一宿至</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>烏賊魚骨</b> 凡使要上文順渾用血鹵作水浸并煮一伏</p>	<p><b>蟬蛻</b> 用沸湯洗淨泥土去 頭足翅用攻毒全用</p>	<p><b>露蜂房</b> 治腫腫醋水調塗治瘡煎洗入藥灸 用惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣</p>	<p><b>蝟皮</b> 作猪蹄者妙鼠脚 者次炙脆研用</p>	<p>食門冬 食害人</p>	<p><b>鯽魚</b> 子不宜與猪肉同食同沙糖食生疳蟲同芥菜食 成腫疾同猪肝雞肉雉肉鹿肉猴肉食生癰疽同</p>	<p><b>蠹魚</b> 俗名烏魚亦名黑魚諸 魚中惟此膽甘可食</p>	<p><b>文蛤</b> 修寧法 同海蛤</p>
---------------------------	---	--	-------------------	--	----------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	--	---	---	--------------------	--	---	----------------------------------





<p><b>蠍</b> 形緊小者良酒 洗淨炙乾研</p>	<p><b>蟾酥</b> 端午日取蝦蟇眉脂其法取大蝦蟇用蛤蚧殼未 離帶者合蝦蟇眉上用力一捻則蘇出於殼內收 在油明紙上乾收貯用蝦 蒸放去而蘇復生仍活</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p><b>鼠糞</b> 牡鼠者良其 糞兩頭尖</p>	<p><b>蚺蛇膽</b> 人多以猪膽虎膽偽為之試法別取粟許着淨水 中浮游水上回旋行走者為真偽者亦走但遲 耳其徑沉者諸膽血也 勿多着亦沉散也</p>	<p><b>蛇蛻</b> 凡使勿用青黃蒼色者要用白如銀色者凡欲使 先於屋下以地掘一坑可深一尺二寸安蛇皮於 中一宿至卯時出用醋浸一時於火 上炙乾用之得火良畏慈石及酒</p>	<p><b>白頸蚯蚓</b> 凡使收得後用糯米水浸一宿至明漉出以無 灰酒浸一日至夜漉出晒令乾後細切取蜀 椒并糯米及切了蚯蚓三件同熬之待糯米熟去 米椒了換淨用之凡修事二兩糯米一分椒一分 為準 畏葱鹽</p>	<p><b>蝸牛</b> 此即負殼蝸蚶也生研 服入藥炒用畏鹽</p>	<p><b>塵蟲</b> 即俗名地蠶也生人家墻壁下土中濕處治傷寒 損續絕及消瘰母為必須之藥也能行瘀血畏 皂莢莖 蒲屋遊</p>	<p><b>青魚膽</b> 鮮者可煮服乾者 用醋及水磨用</p>	<p><b>鼈甲</b> 七九肋者良醋炙透焦研細再拌醋瓦 上焙乾再研如飛麪惡礬石理石</p>
--------------------------------------	---	--------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--	---	--	--



<p>人過肉尾 毒密四各 與封兩去 生藏而三 者藏之已寸 同十年久亦有 也亦留單用 凡酒不壞蛭頭 浸春也其湯者 秋三骨刺浸大 宿須皮蛇一 夏一遠骨條 一宿遠取只 宿冬棄肉得 五傷之傷肉淨</p>	<p><b>白花蛇</b> 一云去頭尾各一尺有大毒不可用只用中段 一云黔蛇長大故頭尾可去一尺蕝蛇止可頭</p>	<p>之 芫青亭長地騰之毒 惡膚青甘草豆花 斑貓</p>	<p><b>斑蝥</b> 入藥除翼足以糯米拌炒米黃黑色去米取用生 用吐瀉人一法用麩炒過醋煮用馬刀為之使</p>	<p>以冬浸一豬脂煎令焦黃然後用 畏石灰食鹽</p>	<p><b>水蛭</b> 入腹生子為害一法采得以篋竹筒盛待乾用米 泔浸一夜曝乾展其身看腹中有子皆去之</p>	<p>極難修制須細剉後用微火炒令色黃乃熟不爾 先醒齋廣筆記</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>步不喘者真 含少許急奔百</p>	<p>乾焦透後去紙取蛤蚧於甕器中盛於東合角畔 懸一宿取用力可十倍勿傷尾効在尾也一云只</p>	<p>浸方乾用紙兩重於火上緩隔紙焙炙待兩重紙 其毒在眼須去眼及去甲上尾上腹上肉毛以酒</p>	<p><b>蛤蚧</b> 為蚧口尖身大尾粗男服雌女服雄凡修事服之 凡使須認雄雌若雄為蛤皮麓口大身小尾粗雌</p>	<p>皮白 以薄荷葉火煨用之 畏蛞蝓蜘蛛白鹽鷄屎桑</p>	<p>焦黑後去木末了用竹刀刮去足甲了用蜈蚣木末 知是何木也今人惟以火炙去頭足用或去尾足</p>	<p><b>蜈蚣</b> 凡使勿用千足蟲真似只是頭上有白肉面并嘴 尖若誤用并聞着腥臭氣入頂致死凡治蜈蚣先</p>
---	---	--	---	--------------------------------	--	---------------------------------------	---------------	-------------------------	--	--	--	---------------------------------------	---	--



<p>宿取出炭火焙乾如此三次以砂 瓶盛埋地中一宿出得酒良</p>	<p>烏蛇 製同 上法</p>	<p>蟻螂 五月五日取蒸藏之臨用 當炙勿置水中令人吐</p>	<p>五靈脂 此是寒號蟲糞也此物多夾砂石絕難修治凡 用研為細末以酒淘飛澄去砂脚日乾醋拌炒</p>	<p>人參 惡</p>	<p>穿山甲 正名鱧鯉或炮或燒或蘇炙酥炙童便炙或油 煎土炒蛤粉炒當各隨本方未有生用者仍以</p>	<p>尾甲乃 力勝</p>	<p>予見今之時師童而習之俱藥性隳括駢語守為</p>	<p>欽定四庫全書 先醒齋廣筆記</p>	<p>家珍而於神農本草及先賢炮炙法一切高文大</p>	<p>牘竟未嘗夢見臨證用藥方產之真贋莫別修事</p>	<p>之軌則全乖欲以攻病譬如克敵致勝責効於不</p>	<p>練之卒至病者甘以七尺之軀徃徃聽其嘗試良</p>	<p>可憫也先生曰子言誠然因檢目前嘗用諸藥品</p>	<p>悉按雷公炮炙去其迂濶難遵者而裁以已法其</p>	<p>無雷公者則自為闡發以益前人所未逮凡諸使</p>	<p>制解伏并反忌惡畏等附系其下庶病家攷用一</p>
--------------------------------------	---------------------	------------------------------------	--	-------------	--	-------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



覽瞭然兼可質醫師之誤其所裨益功豈尠哉舊  
筆記所刻止九十餘種今廣至四百三十九種一  
一皆先生口授而予手錄之其間刪繁舉要補闕  
拾遺句字之出入必嚴點畫之幾微必審稿凡四  
易始付殺青予竊有微勞焉

用藥凡例

藥劑丸散湯膏各有所宜不得違製

藥有宜丸宜散者宜水煎者宜酒漬者宜煎膏者亦有

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

一物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥性不可過越  
湯者盪也煎成膏汁是也去大病用之散者散也研成  
細末是也去急病用之膏者熬成稠膏也液者搗鮮藥  
而絞自然真汁是也丸者緩也作成圓粒也不能速去  
病舒緩而治之也漬酒者以酒浸藥也有宜酒浸以助  
其力如當歸地黃黃栢知母陰寒之氣味假酒力而行  
氣血也有用藥細剉如法煮酒密封早晚頻飲以行經  
絡或補或攻漸以取效是也



凡諸湯用酒臨熟加之

細末者不循經絡止去胃中及臟腑之積及治肺疾咳嗽為宜氣味厚者白湯調氣味薄者煎之和查服丸藥去下部之病者極大而光且圓治中焦者次之治上焦者極小麵糊丸取其遲化直至下焦或酒或醋取其收斂如半夏南星欲去濕者以生薑汁稀糊丸取其易化也湯泡蒸餅又易化滴水尤易化煉蜜丸者取其遲化而氣循經絡也蠟丸者取其難化而遲取效也

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

凡修丸藥用蜜祇用蜜用錫祇用錫勿交雜用且如丸藥用蠟取其能固護藥之氣味勢力全備以過關膈而作効也今若投蜜相和雖易為丸然下咽亦易散化如何得到臟中若其更有毒藥則便與人作病豈徒無益而又害之全非用蠟之本意

凡煉蜜皆先掠去末令熬色微黃試水不散再熬二三沸每用蜜一斤加清水一酒杯又熬一二沸作丸則收潮氣而不粘成塊也



冬月煉蜜成時要加二杯水為妙衍義云每蜜一斤祇煉得十二兩是其度數也和藥末要乘極滾蜜和之白內用搗千百杵自然軟熟容易作條好丸也  
凡丸散藥亦先細切暴燥乃搗之有各搗者有合搗者其潤濕之藥如天門冬地黃輩皆先切曝之獨搗或以新瓦慢火炕燥退冷搗之則為細末若入衆藥隨以和之少停回潤則和之不均也又濕藥燥皆大蝕耗當先增分兩待燥稱之乃准其湯酒中不須如此

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

凡合丸藥用蜜絹令細若篩散藥尤宜精細若搗丸必于白中搗數百過色理和同為佳

凡藥浸酒皆須切細生絹袋盛乃入酒密封隨寒暑目數視其濃烈便可漉出不須待酒盡也查則暴燥微搗更漬飲之亦可散服之

凡合膏或以醋或酒或水或油須令淹浸密覆至煮膏時當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使匝匝沸下之要沸靜良久乃上之如有韭白在中者以兩段漸



焦黃為度如有白芷附子者亦令小黃為度絞膏要以新布若是可服之膏滓亦可以酒煮飲之可磨之膏查亦宜以傳患處此蓋欲兼盡其藥力也

凡湯酒膏中用諸石藥皆細搗之以新絹裹之內中衍義云石藥入散如鍾乳粉之屬用水研乳極細必要二三日乃已以水漂澄極細方可服耳豈但搗細以絹裹之為例耶

凡煎膏中有脂先須揭去革膜子方可用之如猪脂勿

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

令經水臘月者尤佳

凡膏中有雄黃硃砂輩皆當令研如麵俟膏畢乃投入以物杖攪之不爾沉聚在下不勻也

凡草藥燒灰為末如荷葉栢茅根薊根十灰散之類必燒焦枯用器蓋覆以存性若如燒燃柴薪煨成死灰性亦不存而罔效矣

凡諸膏膩藥如桃仁麻仁輩皆另搗如膏乃以內成散中旋次下白合研令消散



煎藥則例

凡煎湯劑必先以主治之為君藥先煮數沸然後下餘藥文火緩緩熬之得所勿揭蓋連確取起坐涼水中候溫熱服之庶氣味不泄若據乘熱揭封傾出則氣出而性不全矣煎時不宜烈火其湯漆沸耗蝕而速涸藥性未盡出而氣味不純人家多有此病而反責藥不效咎將誰歸

發汗藥先煎麻黃二三沸後入餘藥同煎

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

止汗藥先煎桂枝二三沸後下衆藥同煎

和解藥先煎柴胡後下衆藥至于溫藥先煎乾薑行血

藥先煎桃仁利水藥先煎猪苓止瀉藥先煎白朮茯苓

止渴藥先煎天化粉乾葛去濕藥先煎蒼朮防己去黃

藥先煎茵陳嘔吐藥先煎半夏生薑風藥先煎防風羌

活暑藥先煎香薷熱藥先煎黃連凡諸治劑必有主治

為君之藥俱宜先煎則效自奏也

凡湯中用麻黃先另煮二三沸掠去上沫更益水如本





數乃內餘劑不爾令人煩

凡用大黃不須細剉先以酒浸令淹浹密覆一宿明旦  
煮湯臨熟乃內湯中煮二三沸便起則勢力猛易得快  
利丸藥中微蒸之恐寒傷胃也

凡湯中用阿膠飴糖芒硝皆須待湯熟起去渣只內淨汁  
中煮二三沸鎔化盡仍傾蓋內服

凡湯中用完物如乾棗蓮子烏梅仁決明子青箱蔓荊  
蘿蔔芥蘇韭等子皆劈破研碎入煎方得味出若不碎

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

如米之在穀雖煮之終日米豈能出哉至若桃杏等仁  
皆用湯泡去皮尖及雙仁者或搗如泥或炒黃色用或  
生用俱可

凡用砂仁豆蔻丁香之類皆須打碎遲後入藥煎數沸  
即起不爾久久煎之其香氣消散也是以効少

凡湯中用犀角羚羊角一槩末如粉臨服內湯中後入  
藥一法生磨汁入藥亦通

凡用沉香木香乳沒一切香末藥味須研極細待湯熟



先傾汁小盞調香末服訖然後盡飲湯藥

凡煎湯藥初欲微火令小沸其水數依方多少大畧藥  
二十兩用水一斗煮四升以此為準然利湯欲生少水

而多取汁補湯欲熟多水而少取汁服湯宜小沸熱則  
易下冷則嘔涌

凡湯液一切宜用山泉之甘冽者次則長流河水井水  
不用

### 服藥序次

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

病在胸膈已上者先食後服藥病在心腹已下者先服  
藥而後食病在四肢血脉及下部者宜空腹而在旦病  
在頭目骨髓者宜飽滿而在夜雖食前食後亦停少頃  
然後服藥食不宜與藥並行則藥力稍為混滯故也湯  
液云藥氣與食氣不欲相逢食氣稍消則服藥藥氣稍  
消則進食所謂食先食後蓋有義在其中也又有酒服  
者飲服者冷服者煖服者服湯有疎有數者煮湯有生  
有熟者各有次第並宜詳審而勿略焉



清熱湯宜涼服如三黃湯之類消暑藥宜冷服如香薷  
 飲之類散寒藥宜熱服如麻黃湯之類溫中藥宜熱而  
 熱補中藥皆然利下藥宜生而溫如承氣湯之類  
 病在上者不厭頻而少病在下者不厭頓而多少服則  
 滋榮於上多服則峻補於下

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強弱羸  
 瘦病之輕重為之進退增減不必局于方說則活潑潑  
 地也又云晬時周時也從今旦至明旦亦有止一宿者

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

服藥禁忌

服柴胡忌牛肉

服茯苓忌醋

服黃連桔梗忌猪肉

服乳石忌參朮犯者死

服丹石不食蛤蜊腹中結痛

服大黃巴豆同劑反不瀉人

服皂礬忌蕎麥麵

服天門冬忌鯉魚

服牡丹皮忌胡荽

服常山忌葱

服半夏菖蒲忌飴糖羊肉



服白朮蒼朮忌雀蛤肉青魚鮓胡荽大蒜桃李	服商陸忌犬肉 服地黄忌蘿蔔	服細辛忌生菜 服甘草忌菘菜	服粟殼忌醋 服芫花甘遂忌鹽忌甘草	服荊芥忌驢馬肉黃頰魚	服柿蒂忌蠓犯者木香湯能解	服巴豆忌蘆筍 服牛膝忌牛肉牛乳	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	服蜜及蜜煎菓食忌魚鮓	服藜蘆忌狐狸肉	若瘡毒未愈不可食生薑雞子犯之則肉長突出作塊 而白	凡服藥不可襍食肥猪犬肉油膩羹膾腥臊陳臭諸物	凡服藥不可多食生蒜胡荽生葱諸果諸滑滯之物	凡服藥不可見死尸產婦淹穢等事	妊娠服禁
--------------------	------------------	------------------	---------------------	------------	--------------	--------------------	------------------	------------	---------	-----------------------------	-----------------------	----------------------	----------------	------



入用方知功效良	枳殼陳皮并半夏茱萸狼毒及麻黃六般之藥宜陳久	小蒜 雀肉 馬刀	羊躑躅 葛上亭長 鮒 鱒 龜 鼈 生薑	兔肉 犬肉 馬肉 驢肉 羊肝 鯉魚 蝦蟇	飛生 虻蟲 樗鷄 蚱蟬 蟻螬 蝟皮 牛黃	石蠶 芫青 班蝥 蜘蛛 螻蛄 衣魚 蜥蜴	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	麥孽 葵子 常山 錫粉 礪砂 砒石 硫黃	蘭茹 茜根 赤箭 □草 鬼箭 紅花 蘇木	烏喙 側子 藜蘆 薇蘂 厚朴 槐實 欖根	瞿麥乾薑桃仁通礪砂乾漆蟹甲瓜地膽茅根都不中	牙硝芒硝牡丹桂槐花牽牛皂角同半夏南星與通草	牛膝薏苡與蜈蚣三稜代赭芫花射大戟蛇蛻黃雌雄	蜆班水蛭及蠶虫烏頭附子配天雄葛根水銀并巴豆	娠娠禁忌前歌所列藥品未盡特為拈附



十八反

本草明言十八反逐一從頭說與君人參芍藥與沙參  
細辛玄參與紫參苦參丹參并前藥一見藜蘆便殺人  
白芨白斂并半夏瓜蒌貝母五般真莫見烏頭與烏喙  
逢之一反疾如神大戟芫花并海藻甘遂已上反甘草  
若還吐盡用翻腸尋常犯之都不好蜜蠟莫與葱相覩  
石決明休見雲母藜蘆莫使酒來浸人若犯之都是苦  
當禁不禁犯禁必死

欽定四庫全書

先醒齋廣筆記

張子和云病腫脹既平當節飲食忌鹽血房室犯禁者  
病再作乃死不救

病癆嗽忌房室膏粱犯者死

傷寒之後忌葷肉房事犯之者不救

水腫之後忌油鹽

病脾胃傷者節飲食

滑瀉之後忌油膩此數者決不可輕犯也

時病新差食蒜鱠者病發必致大困



時病新愈食犬羊肉者必作骨蒸熱	時病新愈食新棗及羊肉必作鬲上熱蒸	時病新愈食生菜令人顏色終身不平復	病人新愈飲酒食韭病必復作	不必忌而忌之過	張子和曰臟毒酒毒下血嘔血等症如婦人三十已下血閉及六七月間血痢婦初得孕擇食者已上皆不禁口	欽定四庫全書 先醒齋廣筆記	凡久病之人胃氣虛弱者忽思葷茹亦當少少與之圖引漿水穀氣入胃此權變之道也若專以淡粥責之則病不悅而食減不進胃氣所以難復病所以難痊此忌之之過也智者通之	先醒齋廣筆記卷四
----------------	------------------	------------------	--------------	---------	---	------------------	---	----------

