

欽定四庫全書

子部
宣明方論卷二

詳校官太醫院醫士_臣趙正池

編修_臣倉聖脈覆勛

總校官編修_臣王燕緒

校對官編修_臣沈清藻

謄錄監生_臣吳敬時



欽定四庫全書		子部五	
宣明方論		醫家類	
提要			
臣			
等謹案宣明方論十五卷金劉完素撰是			
書皆對病處方之法首諸證門自煎厥薄厥			
餐洩膜脹以及諸痺心疝凡六十一證皆采			
用內經諸篇每證各有主治之方一宗仲景			
次諸風次熱次傷寒次積聚次水濕次痰飲			
欽定四庫全書		宣明方論	
次勞次洩痢次婦人次補養次諸痛次痔瘻			
次眼目次小兒次襍病共十七門每門各有			
總論亦發明運氣之理兼及諸家方論於軒			
岐奧旨實有所闡發而多用涼劑偏主其說			
者不無流弊在善用者消息之耳攷原病式			
自序云作醫方精要宣明論一部三卷十萬			
餘言今刊入河間六書者乃有十五卷其二			
卷之菊葉法薄荷白檀湯四卷之妙功藏用			



欽定四庫全書									
宣明方論									
總纂官 臣 紀昀 臣 陸錫熊 臣 孫士毅									
上									
增於舊殆以是歟乾隆四十六年十月恭校									
以後之方則竄入而不注者不知其幾矣卷									
傳併有偈呪金時安有灌頂法王顯為元明									
新增字者據其方下小序稱灌頂法王子所									
注新增字而七卷之信香十方青金膏不注									
丸十二卷之華澄茄丸補中丸楮實子丸皆									
總校官 臣 陸 費 墀									



欽定四庫全書

宣明方論卷一

金 劉完素 撰

諸證門

諸證總論

黃帝曰善言天者必驗於人善言古者必合於今善言人者必厭於己如道不惑所謂明也余問夫子言而可知視而可見捫而可得今驗於發蒙解惑可得聞乎

欽定四庫全書

宣明方論

岐伯稽首對曰何道之問也天覆地載萬物悉備莫貴於人人以天地之氣生四時之法成君王宰職黎庶盡欲全形貴賤雖殊寶命一矣好生惡死者是世人之常也若人有患如救水火莫待留淫日深著於骨髓所以難矣

素問諸證畧備具題

煎厥之狀陽氣煩勞精絕辟積於夏致目盲不可視耳閉不可聽薄厥之狀陽氣大怒形氣絕而血菀於上腠



欽定四庫全書

宣明方論

脹飧泄寒熱不散升降上下顛心掣寒多下墜以為
諸疝心熱內掣陰陽之結四肢浮腫便血不已蠱癰之
病腎氣不足冤熱觔急白液出跳掣也膀胱不利致三
焦約而遺溺腎精不足強上冥視唾之若涕惡風振寒
為之勞風雖近衣絮榮虛衛實名曰肉苛心移寒於肺
則肺消肺移寒於腎為湧水心移熱於肺為膈消膽移
熱於腦為肺淵膀胱移熱於小腸為口糜大腸移熱於
胃為食飧熱盛則陽絡溢陽絡溢為衄蟻醉以入房氣
竭傷肝大脫其血月事衰少名曰血枯蘊熱怫鬱生於
諸風寒濕風之三氣雜合而為諸痺宗觔縱發為白淫
熱聚胃口而不散行故胃脘為癰面色白黑所謂瘵觔
口苦積熱名之膽痺腎虛內奪則為瘖痺血氣竭少令
人解飧腹滿不食寒中腸泄斯病驚澹腰股痛發附腫
不便寒生濡泄聊敘此證不能備舉

煎厥證 主熱

陽氣煩勞積於夏令熱厥目盲不可視耳閉不可聽



人參散 主之治煎厥氣逆頭目昏憤聽不聞目不明 七氣善怒	人參 遠志 _{去心} 赤茯苓 _{去皮} 防風 _{去苗以上各二兩} 芍藥	麥門冬 _{去心} 陳皮 _{去白} 白朮 _{以上各一兩}	右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候日再服	薄厥證 主肝	陽氣大怒則形氣絕而血脈菀於上令人薄厥於胸中	欽定四庫全書 宣明方論	赤茯苓湯 主之治薄厥恭怒則傷肝氣逆胸中不和甚則嘔血衄衄也	赤茯苓 _{去皮} 人參 桔梗 陳皮 _{各一兩} 芍藥 麥門	冬心 _{去心} 檳榔 _{各半兩}	右為末每服三錢水一盞生薑五片同煎至八分去滓溫服不計時候	飧洩證 主冷	清氣在下則生飧洩清濁交錯食不化而清穀出矣
-------------------------------	--	--	----------------------------	--------	-----------------------	----------------	------------------------------	---	------------------------------------	-----------------------------	--------	----------------------



白朮湯 主之治殭洩風冷入中洩痢不止脈虛而細 日夜數行口乾腹痛不已	白朮 厚朴 生薑製 當歸 去苗 龍骨 各一兩 艾葉 半兩熟炒	右為末每服三錢水一盞生薑三片同煎至八分去	滓空心溫服	臍脹證 主心腹	濁氣在上則生臍脹此陰陽返則氣結不散脹滿常如	飽	欽定四庫全書 宣明方論	吳茱萸湯 主之治臍脹陰盛生寒腹滿臍脹且常常	如飽不欲飲食進之無味	吳茱萸 湯淘炒 厚朴 生薑製 官桂 去皮 乾薑 炮各二兩 白朮	陳皮 去白 蜀椒 出子各半兩	右為末每服三錢水一大盞生薑三片同煎至八分	空心去滓溫服	風消證 主心脾	二陽之病心脾不得隱曲女人月水病血不流脾病食
-------------------------------------	--	----------------------	-------	---------	-----------------------	---	----------------	-----------------------	------------	---	--	----------------------	--------	---------	-----------------------



不化風勝真氣消	黃耆羌活散 主之治心脾受病精血虛少氣力衰乏	日溢消矣	黃耆 一兩半 羌活 石斛 防風 枳殼 火炒去穢人	參 生地黃 牡蠣 燒 黑附子 炮 茯苓 去皮 五味子	牛膝 酒浸各一兩 續斷 半兩 地骨皮 三分	右為末每服三錢水一大盞煎至八分去滓溫服不	計時候日進	欽定四庫全書 宣明方論	心掣證 主心	一陽發病少氣嗽洩三焦不利上咳下洩心煩不寧其	動若掣	調中散 主之治心掣不定胸中刺氣痞壅上若咳嗽	下若洩利	白朮 乾薑 炮 當歸 人參 五味子 赤茯苓	去皮 甘草 炙各一兩 官桂 半兩	右為末每服三錢水一盞煎至八分溫服去滓稍熱
---------	-----------------------	------	--	---	--	----------------------	-------	----------------	--------	-----------------------	-----	-----------------------	------	--------------------------------------	---	----------------------



日二服臨卧	風厥證 主脾胃	一陽一陰病發驚駭背痛噫欠名風厥蓋胃土肝木為	木尅土風勝濕不製腎水故令上逆	遠志散 主之治風厥多驚背痛善噫善欠志意不樂	身背皆痛	遠志 去心 人參 細辛 去苗 白茯苓 去皮 黃耆 去頭 官桂	各一兩半 菖蒲 熟乾地黄 焙 白朮 各半兩 防風 兩	欽定四庫全書 宣明方論	右末每服一錢至二錢溫酒調下空心食前日三服	結陽證 主四肢	四肢腫四肢熱勝則腫四肢者謂諸陽之本陽結者故	不行於陰脈陽脈不行故留結也	犀角湯 主之治結陽四肢腫滿熱苑不散或毒攻注	大便悶澀	犀角 屑 玄參 連翹 柴胡 去苗各半兩 升麻 木通	各三錢 沉香 剉 射干 去毛 甘草 炙一兩 芒硝 麥門冬 去心
-------	---------	-----------------------	----------------	-----------------------	------	--	--	----------------	----------------------	---------	-----------------------	---------------	-----------------------	------	---	--



一 兩	右為末每服三錢水一大盞同煎至八分食前去滓溫服	厥疝證 主腹痛	脈至太虛積氣腹中隱而難見陰沉使脾弱寒於肢膜氣厥逆也	吳茱萸加減湯 主之治厥疝腹中冷痛積氣上逆致令陰冷於肢膜	欽定四庫全書 宣明方論	吳茱萸 二兩湯 燒炒 川烏頭 去皮 炮 細辛 去苗各 三兩 良薑	當歸 乾薑 炮 官桂 各一 兩	右為末每服二錢水一盞同煎至七分去滓溫服日進二服	結陰 主便血	結陰便血一升再結二升三結三升以陰氣內結故不得通行血氣無宗滲入陽下致使漸多	地榆湯 主之治陰結下血不止漸漸極多腹痛不已
--------	------------------------	---------	---------------------------	-----------------------------	----------------	---	---	-------------------------	--------	--------------------------------------	-----------------------



地榆四兩 甘草三兩半 縮砂仁七枚每服可加為炒	右為末每服五錢水三盞縮砂同煎至一半去滓溫服	解僣證 主腎實	冬脈太過緩而澁腎實精不運解者緩僣疑寒熱類也	利腎湯 主之治解僣春脈動氣痛氣乏不欲言此為	腎元有餘矣	澤瀉 生地黄 赤茯苓去皮各一兩半 檳榔 麥門冬	欽定四庫全書 宣明方論	去心柴胡 枳殼麸炒去穢 牛膝去苗酒浸 黃芩去朽一兩	右為末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服不	計時候	胃疽證 主胃熱	食已如飢胃熱能消穀陽明脈終心火上行心憎煩身	黃小便赤澁也	茯苓加減湯 主之治胃疽積熱食已輒飢面黃瘦胸	滿脇脹小便悶赤
--	------------------------------	----------------	------------------------------	------------------------------	--------------	---	------------------------	--	-----------------------------	------------	----------------	------------------------------	---------------	------------------------------	----------------



赤茯苓 陳皮去白 澤瀉 桑白皮剉各三兩 赤芍藥	白朮各四兩 人參 官桂各二兩 石膏八兩 半夏六兩湯洗生薑	焙製	右為末每服三錢水一盞生薑十斤同煎至八分去滓不計時候如病甚者加大黃朴硝各二兩	蠱病證 主脾風	脾風傳腎一名疝氣小腹痛出白液名曰蠱左傳云以喪志名為蠱病乃真精不守也	欽定四庫全書	宣明方論	大建中湯 主之治蠱病小腹痛急痛便溺失精洩而出白液	黃耆 遠志去心 當歸 澤瀉各三兩 芍藥 人參	龍骨 甘草炙各二兩	右為末每服三錢水一盞生薑五片煎至八分去滓溫服不計時候	瘕病證 主飭急	蠱腹痛腎傳心飭脈相引而急精液少飭脈不榮灌而
--	---	-----------	---	----------------	--	---------------	-------------	---------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------------------



引急	建中加減湯 主之治瘕舛病相引而急及五勞七傷	小便數腹痛難立	人參 甘草 炙 官桂 白茯苓 去皮 當歸 附子 炮	厚朴 生薑製 龍骨 黃耆 剉 麥門冬 白芍藥	生地黄 各一兩 各四兩	右為末每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚錫少	許煎至一盞溫服去滓	欽定四庫全書 宣明方論	勞風證 主諸風	發在肺下病強上冥視唾涕惡風腎肺入肺中振慄故	俛仰成勞風	芎朮丸 主之治勞風強上冥視肺熱上壅唾稠喉中	不利頭目昏眩	川芎 枳殼 麸炒去穢 各等分	右煉蜜為丸如桐子大每服十丸溫水送下食後日	三服
----	-----------------------	---------	--	--	----------------------------	----------------------	-----------	----------------	---------	-----------------------	-------	-----------------------	--------	-------------------------------	----------------------	----



痺氣證 主陽虛陰實		身非衣寒中非受寒氣痺者氣血不行如從水中出不 必寒傷而作也		附子丸 主之治痺氣中寒陽虛陰盛一身如從水中 出		附子 炮 川烏頭 炮二味通剉碎 官桂 川椒 葛		蒲 甘草 各四兩 骨碎補 炒 天麻 白朮 各二兩		右為末煉蜜為丸如桐子大每服三十九丸溫酒下空		欽定四庫全書		宣明方論		心食前日三服		骨痺證 主腎弱		身寒大衣不能熱腎脂枯涸不行髓少筋弱凍慄故攣 急		附子湯 主之治腎藏風寒濕骨痺腰脊疼不得俛仰 兩脚冷受熱不遂頭昏耳聾音渾		附子 炮 獨活 防風 去苗 川芎 丹參 草薢 葛		蒲 天麻 官桂 當歸 各一兩 黃耆 細辛 去苗 山	
-----------	--	---------------------------------	--	----------------------------	--	---	--	---	--	-----------------------	--	--------	--	------	--	--------	--	---------	--	----------------------------	--	--	--	--	--	---	--



茱萸 白朮 甘菊花 牛膝酒浸 甘草炙 枳殼炒 去穰各半兩	右為末每服三錢水一大盞生薑五片煎至七分去滓溫服不計時候日進三服	肉苛證 主榮虛胃寒	近衣絮肉苛也榮氣虛則不仁其證瘡重為苛也	前胡散 主之治榮虛衛實肌肉不仁致令瘡重名曰	肉苛虛其氣	欽定四庫全書 宣明方論	前胡去苗 白芷剉 細辛去苗 官桂 白朮 川芎各三兩	川椒去目閉口者生用二錢 吳茱萸湯洗炒 附子炮 當歸去苗各二兩	兩	右剉搗以茶酒三升勻拌同窹一宿以煉成猪脂膏五斤入藥微煎候白芷黃紫色漉出滓成膏病在處摩之病以熱調此藥櫻桃大癰瘻瘡瘻皆治并去諸風瘡痒疼痛傷折墜損故摩內皆可用之	肺消證 主心肺
--	--	------------------	----------------------------	------------------------------	--------------	------------------------	--	---	----------	---	----------------



心移寒於肺肺消飲少洩多當補肺平心死而可治乃心肺為賊也	黃耆湯 主之治消肺飲少洩多補肺平心移寒在肺痿劣	黃耆 ^三 五味子 人參 桑白皮 ^{劉各} 麥門冬 ^去 ^兩 枸杞子 熟地黄 ^{各一} ^兩	右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服無時 涌水證 主水病	欽定四庫全書 宣明方論	肺移寒於腎名曰涌水其證如溢囊裏裹將或徧身腫滿按腹不堅疾行則濯濯有聲或咳喘不定	葶藶丸 主之治涌水腹滿不堅溢如囊裏裹漿疾行則濯濯有聲	葶藶 ^紙 炒澤瀉 椒目 桑白皮 ^劉 杏仁 ^{去皮} 木猪苓 ^{去黑皮} ^{各半兩}	右為細末煉蜜和丸如桐子大每服二十九葱白湯下不計時候以利為度
----------------------------	-------------------------	---	---------------------------------	----------------	--	----------------------------	---	-------------------------------



膈消證 主肺門	心移熱於肺名曰膈消二者心膈有熱久則引飲為消渴耳	麥門冬飲子 主之治膈消胸滿煩心津液燥少短氣久為消渴	麥門冬 二兩 去心 括樓實 知母 甘草 炙 生地黄 人參 葛根 茯苓 各一兩	右為末每服五錢水二盞竹葉數片同煎至一盞去 欽定四庫全書 宣明方論	滓溫服食後	口糜證 主口	膀胱移熱於小腸膈腸不便上為口糜心胃壅熱水穀不化轉下小腸	柴胡地骨皮湯 主之治口糜生瘡損爛小腸有熱脹滿不便宜服之	柴胡 去苗 地骨皮 各等分	右為末每服三錢水一大盞煎至八分去滓食後如
----------------	--------------------------------	----------------------------------	---	---	--------------	---------------	------------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------------



有病人大段實者加大黃朴硝可瀉熱甚	虛癥證 主女病	大腸小腸移熱名虛癥津液耗散不能滑利菀結而大	腸悶澀	檳榔圓 主之治大腸有遺熱津液壅滯腹痛悶澀名	曰虛癥證	檳榔 大黃 剉炒 枳殼 麵炒去穰 木香 桃仁 去皮尖炒	大麻仁 另研各一兩	欽定四庫全書 宣明方論	右為末煉蜜和圓如桐子大每服十圓至十五圓溫酒下不計時候湯亦得	食亦證 主胃病	大腸移熱於胃善食而瘦或胃熱遺於膽能食善飲大	勝土也	參苓圓 主之治食亦胃中結熱消穀善食不生肌肉	此名食併	人參 菖蒲 遠志 赤茯苓 地骨皮 牛膝
------------------	---------	-----------------------	-----	-----------------------	------	--	--------------------------	----------------	-------------------------------	---------	-----------------------	-----	-----------------------	------	---------------------



酒浸各 一兩	右為末煉蜜為圓如桐子大每服十圓至十五圓米 飲下不計時候	鼻淵證 主鼻門	膽移熱於腦則辛頻鼻淵濁涕不止如涌泉不滲而不 久不已衄血為患	防風湯 主之治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已 必成衄血之疾	欽定四庫全書 宣明方論	黃芩 人參 甘草 麥門冬 川芎 防 風 去蘆一 兩半	右為末每服二錢沸湯點之食後服日三服	衄蟻證 主失血	膽受胃熱循脈而上於腦陽絡溢血妄行在鼻空蟻目 瞑者	定命散 治膽受熱血妄行鼻中衄蟻并血汗不止	朱砂 水銀 麝香 各等分
-----------	--------------------------------	---------	----------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------------------------	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------	-----------------



右為末每服半錢新汲水調下不計時候如用藥看 老幼虛實加減	鼓脹證 主胃病氣逆	病有心腹脹滿旦食不能暮食致令胃逆不散太陽不	傳逆滿	雞屎醴散 治鼓脹旦食不能暮食痞滿古法用此可	擇焉	大黃 桃仁 雞屎醴 乾者各等分	欽定四庫全書 宣明方論	右為末每服一錢水一盞生薑三片煎湯調下食後	臨卧服	血枯證 主婦人經病	年少醉入房室氣竭肝傷故經衰少不來肝傷則血涸	脾胃相傳大脫其血目眩心煩故月事不來也	烏魚骨圓 主之治血涸胸脇交滿妨飲食變則聞腥	臊之氣唾血出清液前後洩血	蘭茹 烏賊魚骨 各一兩
--	------------------	------------------------------	------------	------------------------------	-----------	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------	------------	------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------------------



宣明方論卷一										欽定四庫全書										宣明方論										右為末雀卵不拘數和成劑圓如小豆大每服五圓至十圓煎飽魚湯下食後此日三服食壓之妙矣									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

欽定四庫全書									
宣明方論卷二									
金 劉完素 撰									
諸證門									
伏梁證 主心積									
若梁之伏隱也居臍上逆臍下順不可移動為水溺故									
有二等									
鼈甲湯 主之治伏梁積氣心下如臂痞痛不消小便									
欽定四庫全書					宣明方論				
不利									
鼈甲 去裙襴醋炙黃色 京三稜 大腹子皮 芍藥 當									
歸 去苗 柴胡 去苗 生地黄 各一兩 官桂 生薑 各三分切作片子焙乾									
右為末每服三錢水一大盞入生薑木香半錢同煎									
至八分去滓空心溫服									
瘡俳證 主腎虛									
內奪而厥舌瘡不能言二足廢不為用腎脈虛弱其氣									



厥不至舌不仁經云瘡痺足不履用音聲不出者 黃飲子 主之治瘡痺腎虛弱厥逆語聲不出足軟不	用	熟乾地黄 巴戟 去心 山茱萸 石斛 肉蓯蓉 酒浸	焙 附子 炮 五味子 官桂 白茯苓 麥門冬 去心	菖蒲 遠志 去心 等分	右為末每服三錢水一盞半生薑五片棗一枚薄荷	同煎至八分不計時候	欽定四庫全書	宣明方論	厥逆證 主心痛	膺腫頸痛胸滿腹脹上實下虛氣厥而逆陽氣有餘鬱	於胸也不可鍼灸宜服順氣湯	小茯苓湯 主之治厥逆病三焦不調升降胸膈膺腫	胸滿腹脹冷氣衝注刺痛	赤茯苓 人參 陳皮 去白 桔梗 剉炒各等分	右為末每服三錢水一盞半生薑五片同煎至八分 去滓不計時候
--	---	--	---	--	----------------------	-----------	--------	------	---------	-----------------------	--------------	-----------------------	------------	---	--------------------------------



風成寒熱證 主風	因於露風寒熱之始腠理次入胃食不化熱則消中寒慄振動也	解風散 主之治風成寒熱頭目昏眩支體疼痛手足	麻痺上膈壅滯	人參 川芎 獨活 麻黃 去節湯洗 焙各一兩 甘草一兩細	辛 去苗 半兩	右為末每服三錢水一盞半生薑五片薄荷葉少許	欽定四庫全書 宣明方論	同煎至八分不計時候	風成寒中證 主風	風氣與陽明入胃循脈而上至目皆津液所生為泣也	當歸湯 主之治風邪所傷寒中目泣自出肌瘦洩汗	不止	當歸 人參 官桂 各三錢 乾薑 炮 白朮 白茯苓	甘草 川芎 白芍藥 各半兩 細辛 去苗 半兩 陳皮 一兩	白 去
----------	---------------------------	-----------------------	--------	---	------------------------	----------------------	----------------	-----------	----------	-----------------------	-----------------------	----	--	---	--------------------



右為末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚同煎至八分去滓熱服不許時候併三服	風成熱中證 主風	風氣與陽明入胃循脈而上目眦肥人氣不外洩為熱	中目黃之病也	青龍散 主之治風氣邪傳化腹內瘀結而目黃風氣	不得泄為熱中煩渴引飲	地黄 仙靈脾 何首烏 去黑皮泔浸一宿竹刀子切焙各一分 防	欽定四庫全書 宣明方論	風 去苗 荊芥穗 一兩	右為末每服一錢沸湯點調下食後每日三服	腦風證 主風氣	氣循風府而上則為腦風頂背怯寒腦戶極冷以此為	病	神聖散 主之治腦風邪氣留飲不散頂背怯寒頭疼	不可忍者	麻黃 去節 細辛 去苗 乾蝎 一半生炒 藿香葉 各等分
---	-----------------	------------------------------	---------------	------------------------------	-------------------	--	------------------------	--	---------------------------	----------------	------------------------------	----------	------------------------------	-------------	--



右為末每服二錢煑荊芥薄荷酒調下茶亦得并血風	又方 治腦風邪氣留飲頭疼不可忍者用遠志末不以多少於鼻中嚙與痛處柔之相兼前藥可用也	首風證 主新沐中風	中風為首風頭面多汗惡風當先一日甚至其風日則少愈	大川芎丸 主之治首風旋暈眩急外合陽氣風寒相	欽定四庫全書 宣明方論	搏胃膈痰飲偏正頭疼身拘倦	川芎 一斤 天麻 四兩 用 鄆州者	右為末煉蜜為丸每兩作十丸每服一九細嚼茶酒下食後	秘方茶酒調散 治一切諸風痰壅目澁昏眩頭疼心憤煩熱皮膚痛痒并風毒壅滯清爽神志通開關竅消惡汗	石膏 另為 細末 菊花 細辛 去 苗 香附子 去 各等分 須炒
------------------------------	---	------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------------	--------------------------------	---	--



右為末每服二錢溫茶酒調下食後每日三服

目風眼寒證 主眼門

風入系頭則血脈凝滯不能上下通流於目令風寒客之風眼寒也

石膏散 主之治目風眼寒及偏正頭疼夾腦風鼻出

清涕目淚疼痛不已

石膏 二兩炭火燒研細末 川芎 一兩 甘草 半兩炙

右為末每服一錢蔥白好茶同煎湯調下食後日二

欽定四庫全書

宣明方論

服

漏風證 主酒風

飲酒中風或汗多不可單衣食則汗出多如液漏久不

治為消渴疾

白朮散 主之治漏不久虛風多汗食之汗出如洗少

者痿劣

牡蠣 二錢焙赤 白朮 一兩一分 防風 二兩半

右為末每服一錢溫水調下不計時如惡風倍防風



白朮如汗多面腫倍牡蠣	胃風證 主風	因於失衣風感之頸汗多惡風膈塞不通寒則胃拽腹滿氣不通	大豆蔻丸胃風湯 主之治胃風頸多汗惡風飲食不下小腹善滿失衣則腹脹食寒則瀉形瘦	肉豆蔻 草豆蔻 陳皮 獨活 薏苡仁 人	參 川芎 各半兩 羌活 防風 桔梗 甘草 炙 木	欽定四庫全書 宣明方論	香 各分	右為末煉蜜為丸如桐子大每服四十丸米飲下不計時候日進三服	胃風湯 治風冷乘虛入客腸胃水穀不化腸脇虛滿疔痛及腸胃泄毒或下瘀血	人參 白茯苓 去皮 芎藭 官桂 當歸 去苗 白芍藥	白朮 各等分	右為末每服二錢水一大盞入粟米百餘粒同煎至
------------	--------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------	--	----------------	---------------------	-----------------------------	----------------------------------	---	-----------------------	----------------------



七分去滓熱服空心食前 此藥與豆蔻丸為表裏也	行痺證 主痺	風寒濕三氣合而為痺風氣勝者行痺上下左右無留	隨所至作	防風湯 主之治行痺行走無定	防風 甘草 當歸 赤茯苓 去皮 杏仁 去皮炒熟 桂 各一	兩 黃芩 秦艽 葛根 各三錢 麻黃 半兩去節	右為末每服五錢酒水合二盞棗三枚薑五片煎至	欽定四庫全書 宣明方論	一盞去滓溫服	痛痺證 主痺	寒勝者為痛痺大宜宣通陰寒為痛宜通氣溫經而愈	茯苓湯 加減治痛痺四肢疼痛拘倦浮腫	赤茯苓 去皮 桑白皮 各二兩 防風 官桂 川芎 芍	藥 麻黃 去節各一半半	右為末每服五錢水一盞棗一枚煎至八分去滓溫	服以薑粥投之汗泄為度效矣
---	--------	-----------------------	------	---------------	---	---	----------------------	----------------	--------	--------	-----------------------	-------------------	---	----------------------------	----------------------	--------------



著痺證 主痺	濕氣勝者為著痺濕地水氣甚重著而不去多汗而濡者	茯苓川芎湯 主之治著痺留注不去四肢麻拘攣浮	腫	赤茯苓 桑白皮 防風 官桂 川芎 麻黃	芍藥 當歸 甘草 炙各等分	右為末每服二錢水二盞棗三枚同煎至一盞去滓	欽定四庫全書 宣明方論	空心溫服如欲出汗以粥投之	周痺證 主痺	黃帝鍼經云在血脈之中隨上下本痺不痛今能上下	周身故以名之	大豆蘽散 主之治周痺注五臟留滯胃中結聚益氣	出毒潤皮毛補腎氣	人豆蘽 一斤炒香熟	右為末每服半錢溫酒調下空心加至一錢日三服
---------------	-------------------------------	------------------------------	----------	----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------	---------------	------------------------------	---------------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------------------



胞痺證 主膀胱	小腹膀胱按之內痛若沃以湯澁於小便上為清涕太	陽直行從巔入循於腦氣下灌於鼻時出清涕不止	腎著湯 主之治胞痺小便不利鼻出清涕者	赤茯苓 皮去 白朮 各四兩 甘草 三兩 乾薑 二兩	右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服日三	服	腸痺證 主痺	欽定四庫全書 宣明方論	雖多飲不得洩不成大使使糟粕不化故氣喘急而殮	洩	木香丸 主之治腸痺腹疴痛時發殮洩氣不消化小	便秘澁	木香 白朮 官桂 蕪荑 良薑 訶子皮 各一兩	附子 炮去皮 厚朴 生薑製 肉豆蔻 各二兩 乾薑 三兩 甘草 一分	兩半	右為末麴麪糊為丸如桐子大每服二十九薑湯下
---------	-----------------------	----------------------	--------------------	---	----------------------	---	--------	----------------	-----------------------	---	-----------------------	-----	---------------------------------------	--	----	----------------------



空心	熱痺證 主痺	陽氣多陰氣少陽熱其陰寒故痺藏府熱熿然而悶也	升麻湯 主之治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反	縱皮色變兼諸風皆治	升麻 三兩 茯神 去皮 人參 防風 犀角 鎊 羚羊角 鎊	羌活 各一兩 官桂 半兩	右為末每服四錢水二盞生薑二塊碎竹瀝少許同	煎至一盞溫服不計時候	白淫證 主虛勞	思想無窮所願不得意淫於外入房太甚筋縱發為筋痿及為白淫大過者白物為淫隨洩而下故為勞弱	秘真丸 主之治白淫小便不止精氣不固及有餘瀝	或夢寢陰人通洩耳	龍骨 一兩 訶子皮 大者五個 縮砂仁 半兩 朱砂 一兩	為衣 一分
----	--------	-----------------------	-----------------------	-----------	--	--	----------------------	------------	---------	---	-----------------------	----------	---	----------------------



右為末麪糊為丸如菉豆大每服一丸空心溫酒下 冷水亦得不可多服大秘葱白湯茶下	胃脘癰證 主癰門	胃脈沉細陽氣不得下通寒癰陽熱聚胃口腐壞成膿 射干湯 主之治胃脘癰人迎脈逆而甚嗽濃血榮衛 不流熱聚胃口成癰	射干去毛 梔子仁 赤茯苓去皮 升麻各一兩 赤芍藥一兩	半 白朮半兩	欽定四庫全書 宣明方論	右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓入地黃汁 一合蜜半合再煎溫服不計時候	陽厥證 主諸氣	怒狂者生於陽也陽勝則氣逆狂怒上氣奪食即已食 入於陰養於陽則平其氣若陽勝氣逆多怒	羚羊角湯 主之治陽厥氣逆多怒而頸脈腹効已食	陰養於陽平其氣	羚羊角 人參各三兩 赤茯苓二兩去 志去心 大黃炒各
--	-----------------	---	---	----------------------------------	------------------------	--	----------------	---	------------------------------	----------------	--



半 兩 甘草 一分	右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不計時候	新補又方 治陽厥若除煩下氣鐵洛為飲鐵漿湯飲之食後併服	息積證 主腹心	病脇下滿逆氣不已氣聚脇下息而不消積而不散氣元在胃妨飲食不可鍼灸宜導引服藥爾	欽定四庫全書 宣明方論	白朮丸 治息積脇下氣逆妨悶喘息不便呼吸引痛不已	白朮 枳實 官桂 各一兩 人參 二兩 陳皮 桔梗 炒醋	甘草 各一錢	右為末煉蜜為丸如桐子大每服二十九溫酒下日三服	疝勑證 主肝	人有尺脈數甚勑急而見腹必急數亦為虛勑見以名
----------------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------	--	------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------	-------------------------------	---------------	------------------------------



耳	栢子仁散 主之治療筋肝虛生寒脈寒數筋急腹脇		痞悶筋見於外 聖惠方中十五味 栢子仁丸亦治		栢子仁 茯苓 防風 細辛 白朮 官桂		枳殼 川芎 各三兩 附子 當歸 檳榔 各半兩		右為末每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚同煎至八分去滓溫服不計時候		厥逆頭疼證 主胃		欽定四庫全書 宣明方論		腎虛犯大寒頭疼齒亦痛痛之甚數不已者是也		天南星丸 主之治厥頭痛齒痛骨寒胃脈同腎脈厥		逆頭痛不可忍之		天南星 炮 硫黃 研 石膏 研 消石 研各等分		右為末麪糊為丸如桐子大却每服二十九丸溫酒下		空心日午臨卧三時服		膽痺證 主肝		謀慮不決膽虛氣上衝口中上溢則口苦是清淨之府	
---	-----------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--	---------------------------------	--	----------	--	-------------	--	---------------------	--	-----------------------	--	---------	--	---	--	-----------------------	--	-----------	--	--------	--	-----------------------	--



濁擾之氣上溢	益膽湯 主之治膽痺肝虛熱氣上衝口中常苦洩熱		不已藏府固虛致然	黃芩 去 甘草 炙 人參 各二 官桂 一 苦參 各 茯神 各		半	右為末每服三錢水一盞煎至八分去滓溫服不計		計時候	濡洩證 主利	欽定四庫全書	宣明方論	內經云濕勝則濡甲乙經云寒客生濡胃洩如隨氣而		下利		豆蔻散 主之治濡洩不止寒客於脾胃故傷濕而腹		痛滑利不止		肉豆蔻 五 甘草 炙 厚朴 各等		右為末每服二錢米飲一盞調下食前白湯亦得		驚澹證 主利		脾虛風冷陰盛糟粕不化大便黃黑如驚澹或大腸有	
--------	-----------------------	--	----------	--	--	---	----------------------	--	-----	--------	--------	------	-----------------------	--	----	--	-----------------------	--	-------	--	---	--	---------------------	--	--------	--	-----------------------	--



寒也	吳茱萸丸 治驚澹洩瀉不止脾虛胃弱大腸有寒大	便青黑或黃利下	吳茱萸 湯洗 乾薑 赤石脂 陳麴 炒 當歸 焙 厚	朴 各三錢	右為末煉蜜為丸如桐子大每服三十丸溫米飲下	空心服	三焦約證 主大小腸	欽定四庫全書 宣明方論	小腹痛不得大小便邪氣入客約而不行故穀氣不得通也	枳殼丸 主之治三焦約調順三焦氣脈消痞滯利胸	膈治風通大小便	陳皮 一兩 檳榔 半兩 牽牛 四兩 取頭末一兩半生一半熟搗	分一枳殼二兩	右為末煉蜜為丸如桐子大每服十五丸生薑湯下	食後日三服
----	-----------------------	---------	--	----------------------	----------------------	-----	-----------	----------------	-------------------------	-----------------------	---------	--	-----------------------	----------------------	-------



胃寒腸熱證 主胃	胃寒主收水穀不化洩瀉寒之氣在上腸熱之氣在下故脹而洩	妙應丸 主之治胃寒腸熱水穀不化腹脹痞滿洩利	不已	川烏頭 去尖半兩 梔子仁 乾薑 生各一分	右為末生薑汁麪糊為丸如桐子大每服五丸溫酒	下食前日進二服	欽定四庫全書 宣明方論	胃熱腸寒證 主胃	胃熱則消穀善食而飢奈腸寒則血凝脈重小便痛痛	而脹	青橘皮丸 又云前胡水香散亦治 治胃熱腸寒善食而飢便溺小	腹而脹痛大便或澁	青皮 京三稜 黃連 蓬莪茂 炮各一兩 苞荳霜 一分	右為末麪糊為丸如菉豆大每服三丸至五丸茶酒	下食後 少與之不
----------	---------------------------	-----------------------	----	--	----------------------	---------	----------------	----------	-----------------------	----	--	----------	---	----------------------	-------------------------



控羣證 主小腸	甲乙經云小腸病結於腰上而不下痛衝心肺邪所系	茴香棟實丸 主之治小腸病結上而不下痛衝心肺	茴香炒 練石鉄炒 石茱萸 馬棟花醋炒各 陳皮	一兩 芫花醋炒	右為末醋麪糊為丸如桐子大每服十丸至二十丸	溫酒下空心食前	陰疝證 主男病	欽定四庫全書 宣明方論	足厥陰之脈環器底小腹腫或痛腎虛寒水涸渴瀉邪	補脈為治	蒺藜湯 主之治陰疝牽引小腹痛諸厥疝即陰疝也	嘻慾勞痛不可忍之	蒺藜去角炒 附子炮去皮臍 梔各等分	右為末每服三錢水一盞半煎至六分去滓食前溫	服控羣證茴香練實丸亦治此證	諸痺證 主風
----------------	------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------	----------------	----------------	------------------------	------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------	---	-----------------------------	-------------------------------------	---------------



痺遇風寒濕三氣相合而為痺風者百疾之長善行數 變當汗惡風目潤脇痛或走注四肢皮膚不仁屈伸不 便
升麻前胡湯 主之治肝風虛所中頭痛目眩胸膈壅
滯心煩痛昏悶屈伸不便
升麻 前胡 一兩半 玄參 地骨皮 各一兩 羚羊角
葛根 各二兩 酸棗仁 一錢
右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓再煎三
欽定四庫全書 宣明方論
五沸食後溫服如行五六里更進一服
心疝證 主心痛
心脈急小腹有形心不受邪必傳於腑故小腹有形心
氣逆不順當痛不已當兼心氣治不止為有寒邪所中
木香散 主之治心疝小腹痛悶絕不已者
木香 陳皮 各一兩 良薑 乾薑 訶皮子 赤芍
藥 枳實 各半兩 草豆蔻 黑牽牛 各三兩 川芎 三兩
右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服



四聖散 治腎臟風并一切癰	白附子 白蒺藜 黃耆 羌活 各等分 生用	右為末每服二錢鹽湯調下空心一日三服久癰不	差十日大愈	赴筵散 治口瘡不已者	蜜陀僧 黃蘗 青黛 各等分	右同研為細末每用乾糝於瘡上不過三二日即便	愈	欽定四庫全書 宣明方論	訶子湯 治失音不能言語者	訶子 四箇半 炮半生 桔梗 一兩半 炙半生 甘草 二寸半 炙半生	右為細末每服二錢用童子小便一盞同水一盞煎	至五七沸溫服甚者不過三服即愈				宣明方論卷二
--------------	--	----------------------	-------	------------	---------------------------------	----------------------	---	----------------	--------------	---	----------------------	----------------	--	--	--	--------



欽定四庫全書

子部

宣明方論卷八

三至

詳校官太醫院醫士趙正范

編修臣倉聖脈覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣吳敬時



欽定四庫全書

宣明方論卷三

金 劉完素 撰

風論

素問云諸風掉眩強直支痛緩戾裏急筋縮皆足厥陰

風木之位肝膽之氣也

風者動也動者搖也所謂風氣甚而主目眩運由風木王則是

金衰不能制木而木能生火故風火多為熱化皆陽熱多也

風為病者或為寒熱或

為熱中或為寒中或為厲風或為偏枯或為腰脊強痛

欽定四庫全書

宣明方論

或為耳鳴鼻塞諸證皆不仁其病各異其名不同 經

云風者善行數變腠理開則灑然寒閉則熱而風風氣

俱入行於諸脈分肉之間與衛氣相干其道不利致使

肌肉憤膜而有瘍也 衛氣所凝而不行故其肉有不

仁也分肉之間衛氣行處風與衛氣相薄俱行肉分故

氣道澁而不利氣道不利風熱內鬱衛氣相持肉憤膜

而瘡出衛氣被風鬱不得傳徧昇凝而不行則肉不仁

也謂皮肉癢而不知寒熱痛痒如木石也 經曰風者



百病之首也其變乃乃為他病無常皆風氣所發也
以四時五運六氣千變萬化衝盪推擊無窮安得失時
而絕也故春甲乙傷於風者為肝風夏丙子傷於風者
為心風季夏戊巳傷於風者為脾風秋庚辛傷於風者
為肺風冬壬癸傷於風者為腎風

風中五臟六腑自俞而入為藏府之風肺風之狀多汗

惡風色白時嗽短氣晝則微暮則甚心風之狀

同上善怒

色赤病甚則言不可快肝風善悲色微蒼噤乾善怒時

欽定四庫全書

宣明方論

憎女子脾風身體怠惰四肢不收色薄微黃不嗜飲食

腎風面龐而浮腫脊痛不能正立其色如隱曲不利又

曰風寒熱諸疾之始生也人之藏府皆風之起謂火熱

陽之本也謂曲直動搖風之用也眩運嘔吐謂風熱之

甚也夫風熱拂鬱風大生於熱以熱為本而風為標風

言風者即風熱病也氣壅滯筋脈拘倦肢體焦痿頭目

昏眩腰脊強痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽嗑不利胸膈痞

悶咳嘔喘滿涕唾稠粘腸胃燥熱結便溺淋閉或夜卧



寢汗咬牙睡語舐惕驚悸或腸胃拂鬱結水夜不能浸
潤於周身而但為小便多出者或濕熱內鬱而時有汗
洩者或因亡液而成燥淋閉者或因腸胃燥鬱水液不
能宣行於外反以停濕而泄或燥濕往來而時結時泄
者或表之陽如正氣衛氣是也與邪熱相合并入於裏陽極
似陰而戰煩渴者熱間寒故戰或虛氣久不已者經言邪熱
與衛氣并入於裏則寒戰也并出之或風熱走注疼痛
麻痺者或腎水真陰衰虛心火邪熱暴甚而僵仆或卒
中久不語或一切暴瘖而不語語不出聲或暗風癇者
或洗頭風或破傷或中風諸潮搐并小兒諸瘖積熱或
驚風積熱傷寒疫癘而能辨者或熱甚怫結而反出不
快者或熱黑陷將死或大人小兒風熱瘡疥及久不愈
者或頭生屑徧身黑黧紫白斑駁或面鼻生紫赤風刺
癰疹俗呼為肺風者或成風癘世傳為大風疾者或腸
風痔漏并解酒過熱毒兼解利諸邪所傷及調理傷寒
未發汗頭項身體疼痛者并兩感諸證兼治產後血液

欽定四庫全書

宣明方論



損虛以致陰氣衰殘陽氣鬱甚為諸熱證腹滿澁痛煩									
渴喘悶譫妄驚狂或熱極生風而熱燥鬱舌強口噤觔									
惕肉瞤一切風熱燥證鬱而惡物不下腹滿楨痛而昏									
者 惡物過多而不吐者不宜服之 兼消除大小瘡及惡毒兼治墮馬打									
撲傷損痛疼或因而熱結大小便澁滯不通或腰腹急									
痛腹滿喘悶者									
防風通聖散									
防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 薄荷葉									
欽定四庫全書 宣明方論									
麻黃 連翹 芒硝 已上各半兩 石膏 黃芩									
桔梗 各一兩 滑石 三兩 甘草 二兩 荆芥 白朮 梔子 各一									
分									
右為末每服二錢水一大盞生薑三片煎至六分溫									
服涎嗽加半夏 半兩 薑製									
賈同知通聖散									
防風 芍藥 各二錢 甘草 三兩 荆芥 三錢 薄荷 一兩 黃芩									
一兩 白朮 一分 石膏 一兩 川芎 半兩 滑石 三兩 當歸 半兩 大黃 半兩									



麻黃 _{兩半} 山梔子 _{分一} 連翹 _{兩半} 桔梗 _{兩一} 無芒硝 無縮	砂	崔宣武通聖散	防風 芍藥 荊芥 當歸 白朮 山梔子 _{各一}	分 川芎 大黃 薄荷 連翹 黃芩 桔梗	縮砂 _{兩各半} 甘草 石膏 _{兩各一} 滑石 _{兩三}	劉庭瑞通聖散	此方有縮砂無芒硝其餘皆同緣庭瑞於河間守真先	欽定四庫全書 宣明方論	生札師傳之隨從二年始受於方斯且取為端而可准	憑以用之兼庭瑞以用治病百發百中何以疑之因錄	但庭瑞臨時以意加減一依前法嗽加半夏半兩生薑	製	防風天麻散 治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯強	暴音不語內外風熱壅滯解昏眩	防風 川芎 天麻 羌活 香白芷 草烏頭	白附子 荊芥穗 當歸 _焙 甘草 _{兩各半} 滑石 _{兩二}
---	---	--------	----------------------------------	------------------------	---	--------	-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	---------------	---------------------	--



右為末熱酒化蜜少許調半錢加至一錢覺藥力運 行微麻為度或煉蜜為丸如彈子大熱酒化下一丸 或半丸細嚼白湯化下亦得散鬱結宜通氣如其者史服防風通聖散 犀角丸 治風癰日發作有時揚手擲足口吐痰涎不 省人事暗倒屈伸	犀角末半兩 赤石脂三兩 朴硝二兩 白僵蠶一兩 薄荷葉一兩 右為末麪糊為丸如桐子大每服二十九丸至三十丸 溫水下日三服不計時候如覺痰多即減丸數忌油	欽定四庫全書 宣明方論	膩物風瘧病目直卒中口禁背強如弓卧搖動手足 搐搦無汗名剛為陽瘧有汗名柔為陰瘧通三一承氣下妙	搜風丸 治邪氣上逆以致上實下虛風熱上攻眼目	昏耳鳴鼻塞頭痛眩運躁熱上壅痰逆涎嗽心腹痞痛	大小便結滯清利頭面鼻聰耳鳴宣通血氣 人參 茯苓 天南星半兩 乾生薑 藿香葉一分 白 礬生各一兩 蛤粉二兩 寒水石一兩 大黃 黃芩一兩 牽牛四兩 薄荷葉半兩 滑石四兩 半夏一兩
--	---	---------------------------	---	------------------------------	------------------------------	---



右為末滴水為丸如小豆大每服十丸生薑湯下加至二十九日三服	川芎石膏湯 治風熱上攻頭面目昏眩痛悶風痰喘嗽鼻塞口瘡煩渴淋瀝眼生翳膜清神利頭宣通氣血	中風偏枯解中外諸邪調理諸病勞復傳染	川芎 芍藥 當歸 山梔子 黃芩 大黃	菊花 荊芥穗 人參 白朮 各半兩 滑石 四兩 寒水	石 二兩 甘草 三兩 桔梗 二兩 縮砂仁 一分 石膏 防風 連	欽定四庫全書 宣明方論	翹 薄荷葉 各一兩	右為末每服二錢水一盞煎至六分去滓食後水調亦得忌薑醋發熱物	川芎神功散 治風熱上攻偏正頭痛無問微甚久新	頭面昏眩清神	川芎 四錢 甘草 一分 川烏頭 吳白芷 天南星 麻	黃 各半兩	右為末每服二錢水一盞生薑三片煎至半盞投清
------------------------------------	---	--------------------------	---------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------	--	-----------------------------	-----------------------------



酒半盞避風	換骨丹 治癱瘓中風口眼喎斜半身不遂并一切風	癰暗風並宜服之頌曰	我有換骨丹 傳之極幽秘 疎開病者心	扶起衰翁臂 氣壯即延年 神清自不睡	南山張仙翁 三百八十歲 槐皮芎朮芷	仙人防首蔓 十件各停勻 苦味香減半	龍麝即少許 朱砂作衣纏 勿令陰人見	欽定四庫全書 宣明方論	夜卧服一粒 遍身汗津滿 萬病自消除	神仙為侶伴	麻黃 煎膏 仙朮 香白芷 槐角子 取子 川芎 人參	防風 桑白皮 苦參 威靈仙 何首烏	蔓荊子 木香 龍腦 研 朱砂 研 麝香 研 五味子	右為末桑白單搗細秤以麻黃膏和就杵一萬五千 下每兩分作十丸每服一丸以硬物擊碎溫酒半盞 浸以物蓋不可透氣食後臨卧一呷嚥之衣蓋覆當
-------	-----------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------	---	-------------------	--	--



自出汗即瘥以和胃湯及避風寒茶下半	鉛紅散 治風熱上攻陽明經絡面鼻紫色刺癢瘡呼 為肺風者以肺主鼻而又淺在皮膚之內皮膚屬於肺	舶上硫黃 白礬灰兩半	右為末少許入黃丹染與病人面色同每上半錢津	液塗之洗嗽罷臨卧再服防風通聖散効速	神芎散 治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻并牙齒悶痛	川芎 鬱金各二錢 荊芥穗 薄荷葉 紅豆各一分	欽定四庫全書 宣明方論	右為末入盆硝二錢研勻鼻內嚙三二剎耳許力慢	加藥病甚兼夜嚙	萬靈丸 治腎藏一切耳鳴腰疼筋骨痛	赤芍藥 五靈脂 防風 草烏頭二兩 黃耆	細辛 海桐皮 山茵陳 骨碎補 地龍各八錢	黑狗脊二兩 牛膝 何首烏 蔓荊子 白附子	川烏頭 巨勝子各八錢 仙朮一兩 芫花三錢 黑牽牛	兩半 青皮二錢 御米子二錢
--	---	----------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------	---	------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------------	---	--	--	--	--



欽定四庫全書		宣明方論		祛風丸 治中風偏枯手足戰掉語言蹇澁筋骨痛		右為末酒麪糊為丸如彈子空心每服溫酒化下一丸		地骨皮 威靈仙 羌活 各等分		當歸 北漏盧 安息香 用胡桃穰研		伊祁 全頭尾者 桃仁 生 白附子 阿魏 桂心 白芷		伊祁丸 治腰脚拳彎鶴膝風筋縮		溫酒下空心食前服		右為末酒麪糊為丸如桐子大每服十丸至二十丸	
菜豆粉 川烏頭 炮 草烏頭 炮 天南星 半夏 各一		甘草 兩 川芎 藿香葉 苓 苓香 地龍 蝎		稍 各三錢 白殭蠶 淘米泔浸去絲 川薑 炮 半兩		右為末一兩用菜豆粉一兩 又一法 用藥一兩以白麪		二兩滴水為丸如桐子大量人虛實加減細嚼茶酒		下五丸至七丸食後初服三丸漸加		舒筋散 治婦人血氣并產後風熱搐搦舒筋 俗雞爪風		人參 川芎 官桂 丁香 各半 木香 天麻 浸酒					



焙各 一兩井泉石四兩別為末	右為末每服三錢井泉末三錢大豆半升淨淘好酒一大升煮豆軟去豆用豆汁酒調下後以酒送下蓋覆汗出為效	勝金丸 治風熱驚駭不時旋運潮搐口吐痰沫忽然倒地不省人事名曰癇病	白僵蠶 細辛 天南星 皂角炙 川烏頭生 烏	蛇真者好酒浸去骨 白礬枯 桔梗 葳靈仙 何首烏	欽定四庫全書 宣明方論	草烏頭各 荊芥穗 川芎各二兩	右為末酒麪糊為丸如桐子大每服十丸食後溫酒下	比金散 治傷寒胃風頭目痛四肢拘倦鼻塞	麻黃 白芷 細辛 荊芥穗 菊花 防風	石膏 何首烏 川芎 薄荷 乾蝎 草頭烏	各等分	右為末每服一錢水一盞煎溫服酒茶亦得
---	--	--	--	---	------------------------	---	------------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	------------	--------------------------



神白丹 治傷寒積熱及風生驚搐或如狂病諸藥不効此方不可盡述	鉛白霜 分一輕粉半 粉霜 一兩用白麪六錢和	右為末滴水為丸桐子大每服十丸至十五丸米飲	下量虛實加減	桃仁丸 治一切風毒偏身疼痛四肢拘急	草烏頭 生用 五靈脂 三兩 桃仁 取霜一兩	右為末酒煮麪糊丸如桐子大以青黛為衣嚼胡桃	欽定四庫全書 宣明方論	仁以溫酒下五丸食後加減	瓜蒂神妙丹 治頭目昏眩偏正頭痛等	焰硝 雄黃 川芎 薄荷葉 道人頭 梨蘆	各一 天竺黃 一錢半如無以麝金代之	右為末研細含水鼻中嚙壹字神驗	清風散 治頭目昏眩咽膈不利痰涎壅塞	石碌 一錢 朱砂 牙硝 雄黃 各三 龍腦 一 瓜蒂 二	滑石 赤小豆 半 阜角 一字去皮 炙黃 取末
------------------------------	---	----------------------	--------	-------------------	--	----------------------	----------------	-------------	------------------	---------------------	---	----------------	-------------------	---	---



右為極細末每服半錢新汲水調下如噤不省人事 滴水鼻中或健者可治為驗	靈砂丹 治破傷風一切諸風等	葳靈仙 黑牽牛 何首烏 蒼朮_{半兩} 香附子_{六兩}	川烏豆_{去尖} 朱砂 沒藥 乳香_{各三錢} 陳阜角_{四錢}	皮_去	右為末把阜角打破用酒二升半春夏三日秋冬七	日取汁打麵糊為丸如桐子大每服五丸如破傷風	欽定四庫全書 宣明方論	煎鰾酒下如牙疼赤眼搥碎研三五丸鼻嚔之	天麻散 治頭頂痛頭面腫拘急風傷榮衛發燥熱	川芎 細辛 苦參 地骨皮 菖蒲 何首烏	蔓荊子 薄荷葉 杜錢黎 牛旁子 荊芥	穗 蛇蛻草 葳靈仙 防風 天麻_{一兩} 甘草_{二兩}	炙	右為末每服二三錢研蜜水調下茶水任不計時	薄荷白檀湯_{新補} 治風壅頭目眩鼻塞煩悶精神不爽消
--	----------------------	---	---	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------	----------------------------	---



風化痰清頭目	白檀 一兩 荆芥穗 二兩 薄荷葉 四兩 苾蓐根 二兩 甘草 四兩	白芷 二兩 鹽 四兩 縮砂仁 半兩	右為末每服一錢百沸湯點食後臨卧稍熱溫服	菊葉湯 治一切風頭目昏眩嘔吐面目浮腫者	菊花 去梗 羌活 獨活 旋覆花 牛旁子 甘草	各等分	右為末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分去	欽定四庫全書 宣明方論	滓溫服食後	宣明方論卷三
--------	---	--	---------------------	---------------------	---------------------------------------	-----	----------------------	----------------	-------	--------



欽定四庫全書

宣明方論卷四

金 劉完素 撰

風論

黃帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多
食則遺此其禁也因熱少愈猶未盡除不戒飲食勞動
情慾擾亂柰脾胃氣虛未能消化堅食故熱復生五臟
者皆熱

欽定四庫全書

宣明方論

夫熱病者傷寒之類也人之傷於寒則為病熱寒毒藏
於肌膚陽氣不行散發而內為怫結故傷寒者反病為
熱熱雖甚不死柰巨陽為首巨陽者諸陽之屬也
諸陽為熱以氣諸陰為寒以血熱病已愈其有復作謂
病已衰而熱有作所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有
所遺緣熱也雖邪氣而不盡遺熱在故當復作
五藏俱熱者皆視之肝熱左頰先赤心熱顏先赤脾熱
鼻先赤肺熱右頰先赤腎熱頤先赤肝熱者小便黃腹



欽定四庫全書

宣明方論

死皆是怫鬱結不能解散以致危殆

素問諸熱瞋瘵暴瘡胃昧躁擾狂言罵詈驚駭肘腫疼
痠氣逆皆手少陽相火心胞絡三焦之氣也

夫腎水真陰本虛心火狂陽積熱以甚以致風熱壅滯
頭面昏眩肢體麻痺皮膚瘙癢筋脉拘倦胸膈痞滿時
或痛悶或鼻塞鼽衄口舌生瘡咽喉不利牙齒疳蝕或
徧身生瘡癬疥或睡語咬牙驚惕虛汗或健妄心忪煩
燥多睡或大小便澁滯或煩熱腹滿或酒過積毒勞役



過度中外一切勞損神狂氣心志不寧口苦咽乾飲食
減少變生風熱諸病虛羸困倦或酒病瘦悴及老弱虛
人或脾腎經虛風熱燥鬱色黑齒宣身瘦焦痿或熱中
煩滿飢不飲食或瘴或消中善食而瘦或消渴多虛頭
面腫小便數或服甘辛熱藥過度變成三消上則消渴
中則消中下則消腎小便白膏也

神芎丸 治一切熱證常服保養除痰飲消酒食清頭
目利咽膈能令徧身結滯宣通氣利而神強體健耐

欽定四庫全書

宣明方論

傷省病并婦人經病及產後血滯腰脚重痛小兒積熱
驚風潮搐藏用丸亦曰顯仁丸加黃連薄荷川芎各半
兩名曰神芎丸

大黃 黃芩 各二兩 牽牛 滑石 各四兩

右為細末滴水為丸如小豆大溫水下十丸至十五
丸每服加十丸日三服冷水下亦得或煉蜜丸愈佳
或久病熱鬱無問瘦悴老弱并一切證可下者始自
十丸每服加十丸以利為度如常服此藥但除腸垢



積滯不傷和氣推陳致新得利便快並無藥燥搔擾
亦不困倦虛損頗遂病人心意或熱甚必須急下者
便服四五十九丸未利再服以意消息三五歲孩兒丸
如麻子大凡此一法此藥至善常服二三十丸不利
藏府但有益無損或婦人血下惡物加桂枝半兩病
微者常服病重者亦取利因而結滯開通惡物自下
也此方除藏府滑泄者或重寒脉遲者或婦人經病
產後血下不止者及孕婦等則不宜服除此以外一

欽定四庫全書

宣明方論

切風熱雜病悶壅塞神氣不和或平人保養常服自
顯其功若以効驗觀其藥味則非明本草造化之理
者不可得而知其然也猶孔子讚易道明顯應化萬
仁之善而不見其大道之功用故曰顯諸仁藏諸用
因以云藏用丸亦其義也兼以世訛之久矣而反不
喜此等妙方不肯服之每有久獲大効而誠懇求其
方不得已而授之既見其方反生疑懼不復用焉亦
有効而志信求其方務以廣傳救病因而衆議百端



擬疑妄生謗說使致俗醫皆畏之致道不能神但有		妨病者後之君子但行其藥明顯諸人勿示其方而		密藏諸用耳或以一法加黃連川芎薄荷等各半兩		治一切頭目昏眩者愈佳	
柴胡飲子		治解一切肌骨蒸積熱作發寒熱往來		裏和則發寒裏熱表和則發熱邪熱半在表半在裏出入進退無和即寒熱往來陰陽相勝也		戰	
表之陽和正氣與邪熱并富於裏脉道		不行故身冷脉絕寒戰而反煩渴也		及傷寒發汗		不解或中外諸邪熱口乾煩渴或下後熱未愈汗後勞	
欽定四庫全書		宣明方論		復或骨蒸肺痿喘嗽婦人餘疾產後經病		柴胡	
人參		黃芩		甘草		大黃	
當歸		芍		藥		右為末每服抄三錢水一盞生姜三片煎至七分溫	
服日三服病熱甚者加減之		崔宣武柴胡飲子		加半夏		五味子	
桔梗		庭瑞柴胡飲子		與前分用不		同故以錄之	
柴胡		甘草		黃芩		當歸	
芍藥		大黃		錢各三		劉	



人參 兩半 半夏 兩半		右為大勞熱病五七錢以利為度未利更加使病不 再發也		木香萬安丸 治一切風熱怫鬱氣血壅滯頭目昏眩 鼻塞耳鳴筋脉拘倦肢體焦痿咽嗑不利胸膈痞塞腹 脇痛悶腸胃燥澁淋瀝不通腰脚重痛疝瘕急結瘕癖 堅積腸滯胃滿久不了絕走注疼痛瘡風癰病濕病腹 脹水腫		欽定四庫全書		宣明方論	
木香 揀桂 甘遂 各一分 牽牛 二兩 大戟 兩半 大黃		紅皮 檳榔 各一兩 皂角 二兩要得肥好者洗淨水 三盞煮三二沸取出槌碎		揉取汁再煮成稠膏 下蜜熬二沸便取出		右膏丸小豆大每服十丸至十五丸生姜湯下小兒		丸如麻子大水腫癰病諸積快利為度	
玉芝徐老丸 治一切風壅消痰利膈胸脇痞悶美飲		食調五味 徐老緩 慢遲老		天南星 乾薑 各半兩 黃栢 半兩 牽牛 四兩 半夏 白					



礬 大黃 各一兩 蛤粉 二兩	右為末滴水丸如小豆大每服十丸至二十丸溫	水下食後日三服常服順氣調血令人徐老或已衰	大便結者除腸垢積物可漸加至三五十丸孕婦滑	泄病忌服滑泄為牽牛大黃孕婦為南星半夏	消痞丸 治積濕熱毒甚者身體面目黃心脇腹滿嘔	吐不能飲食痿弱難以運動咽嗝不利肢體焦𦣻眩悸	膈熱坐卧不寧心火有餘而妄行上為咳血衄血下為	欽定四庫全書 宣明方論	大小便血腸風痔瘻三焦壅滯悶瘴熱中消渴傳化失常	小兒疳積熱	黃連 乾葛 各一兩 黃芩 大黃 黃蘗 梔子	薄荷 藿香 厚朴 茴香 炒各半兩 木香 辣桂 各一	分 青黛 一兩 牽牛 二兩	右為細末滴水丸如小豆大每服十丸新水下溫水	亦得小兒丸如麻子大病本濕熱內甚本自利者去	大黃牽牛忌發熱諸物
---	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------	---	--	---	-----------------------------	-----------------------------	------------------



和中丸 治口燥舌乾咽嗑不利胸脇痞滿心腹痛悶	小便赤澀大便結滯風氣怫鬱頭目昏眩筋脉拘急肢	體疼痛倦一切風壅常服寬膈美食消痰止逆	牽牛 一兩 官桂 一分 大黃 紅皮 黃芩 茴香 各半兩	木香 一分 滑石 二兩	右為末滴水丸如小豆大每服二十丸煎生薑湯下	溫水亦得日三服	崔宣武和中丸 大黃 一兩 茴香 炒 外七味同	欽定四庫全書 宣明方論	龍腦丸 治大小人一切蘊積熱毒氣不散及失瘡癰 疔	龍腦 朱砂 鵬砂 牛黃 各等分	右為末鎔黃蠟為丸如米粒大每服三五丸以甘草	人參湯下不計時候	大金花丸 治中外諸熱寢汗咬牙睡語驚悸溺血淋	悶咳衄血瘦弱頭痛并骨蒸肺痿喘	金花丸 又名既濟解毒丸
-----------------------	-----------------------	--------------------	--	---	----------------------	---------	--	----------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------	----------	-----------------------	----------------	-------------



黃連 黃蘗 黃芩 大黃 各半兩	右為末滴水丸如小豆大每服三二十丸新汲水下 自利去大黃加梔子小兒丸如麻子大三五丸	當歸龍膽丸 治腎水陰虛風熱蘊積時發驚悸筋惕 搐搦神志不寧榮衛壅滯頭目昏眩肌肉瞤癢胸膈痞	寒咽嗌不利腸胃燥澀小便溺閼筋脉拘奇 奇猶急也重也肢	體痿弱暗風癰病小兒急慢驚風常服宣通血氣調順 陰陽病無再作	欽定四庫全書 宣明方論	當歸 焙 龍膽草 大梔子 黃連 黃蘗 黃芩 各一兩 大黃 蘆會 青黛 各半兩 木香 一分 麝香 半錢別研	右為末煉蜜和丸如小豆大小兒如麻子大生薑湯 下每服二十九忌發熱諸物兼服防風通聖散	軟金丸 治一切熱疾常服潤飢膚柰老諸熱證皆可 服	大黃 牽牛 皂角 各二兩 朴硝 半兩 右為末滴水丸如桐子大每服三十九白湯下自
---------------------------------------	---	---	---	--	---	---	---	---	--



十九服至三十丸食後服	妙香丸 治一切久遠沉積傷寒結胸太陽厥證燥鬱	攻不開者皆可服此藥亦名大聖丸	芭豆 出油皮不 膩粉 礪砂 龍腦 麝香 牛黃	少許 朱砂 各分水銀各一錢錫	右為末煉蜜和丸又一方用蠟丸如皂子大用藥時	急要動一丸分作三丸割作眼子冷水浸煎大黃湯	下然後服熱茶一盃便行也局方內無礪砂加金薄	欽定四庫全書 宣明方論	妙功藏用丸 新補 亦名顯仁丸又名神芎丸治嘔噦不食	痿弱難運血溢血洩淋瀝不通或泄利三焦壅滯傳化	失常功不可速並宜服之	大黃 黃芩 黃連 各半兩 黑牽牛 一兩 滑石 二分 荊芥	穗 二兩 防風 一分 川芎 一兩 木香 二分 官桂 三分 去皮	右為末滴水為丸如小豆大每服二十九丸三十丸生	薑湯下日三服溫水亦得	宣明方論卷四
------------	-----------------------	----------------	---------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------	---	-----------------------	------------	---	--	-----------------------	------------	--------



欽定四庫全書

宣明方論卷五

金 劉完素 撰

傷寒門

主療說

傷寒表證當汗而不可下裏證當下而不可汗半在表
半裏則當和解不可發汗吐下在上則通之在下則泄
之傷寒無汗表病裏和則麻黃湯汗之或天水散之類

欽定四庫全書

宣明方論

亦佳表不解半入於裏半尚在表者小柴胡湯和解之
或天水涼膈散甚良表裏熱勢俱甚者大柴胡湯微下
之更甚者大承氣湯下之表熱多裏熱少者天水一涼
膈半和解之裏熱多表熱少未可下之者涼膈天水一
半調之勢更甚者小承氣湯下之凡此諸可下者通宜
大承氣湯下之凡此諸可下者通宜三一承氣湯下之
發汗不解下後前後別無異證者通宜涼膈散調之以
退其熱兩感倣此而已傷風自汗表病裏和者桂枝湯



解肌半在表半在裏白虎湯和解之病在裏者大承氣湯下之 一法無問風寒暑濕有汗無汗內外諸邪所傷但有可下諸證或表裏兩證俱不見而日深但目睛不了了睛不和者或腹滿實痛者或煩渴或譫妄或狂躁滿者或畜熱極而將死者通宜大承氣湯下之或三一承氣湯尤良傷寒大發汗汗出不解反無汗脈尚浮者蒼朮白虎湯再解之 或中暑自汗大出脈虛弱頭痛口乾倦怠煩躁或時惡寒或畏日氣無問表裏通宜白虎或裏熱勢甚腹滿而脈沉可下者宜大承氣湯或三一承氣湯傷寒表熱極甚身疼頭痛不可忍或眩或嘔裏有微熱不可發汗吐下擬以小柴胡天水涼膈之類和解恐不能退其熱勢之甚或大下後再三下後熱勢尚甚不能退本氣虛損而脈不能實擬更下之恐下脫而立死不下亦熱極而死寒涼之藥不能退甚熱勢之甚者或熱濕內餘下利不止熱不退者或因大下後熱退利不止熱不退脈弱氣虛不可更下者或諸濕熱

欽定四庫全書

宣明方論



內餘小便赤澁大便澹泄頻併少而急痛者必欲作利也須宜黃連解毒湯 或裏熱極甚而恐陰氣不能退者或已下後熱不退者或畜熱內甚陽厥極深以至陽氣沉細而不能營運於身陰欲絕而以致徧身青冷痛甚不堪項背拘急目赤睛疼昏眩恍惚咽乾或痛躁渴虛汗嘔吐下利腹滿實痛煩痞悶亂喘息急聲脈雖疾數以其畜熱極深而脈道不利以致脈沉細而欲絕俗未明其造化之理而反傷熱寒極陰毒者或始得之陽

欽定四庫全書

宣明方論

熱暴甚而便有此證者 或兩感勢甚者通宜解毒湯加大承氣湯下之熱不退者再下之然雖古人皆云三下熱不退即死矣亦有按法以下四五次利一二十行熱方退而救活者免致不下退其熱而必死也下後熱稍退而未愈者黃連解毒湯調之或微熱未除者涼膈散調之或失下熱極以至身冷脈微而昏冒將死者若急下之則殘陰暴絕陽氣後竭而立死不下亦死當以涼膈散或者黃連解毒湯養陰退陽畜熱漸以消散則



心胸腹暖脈漸以生至陽脈復有力者方可以三一承
氣湯微下之或解毒加大承氣湯尤良或下後微熱不
解者涼膈散調之愈後但宜退熱之藥忌發熱諸物陽
熱易為再作也

論風熱濕燥寒

諸風

風本生熱以熱為本風為標言風者即風熱病也

諸熱

欽定四庫全書

宣明方論

熱甚而生風或熱微風甚即兼治風熱或風微熱甚但
治其熱即風自消也

諸濕

濕本土氣火熱能生土濕故夏熱則萬物濕潤秋涼則
濕復燥乾也濕病本不自生因於火熱怫鬱水液不能
宣行即停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣
尚多以為兼證當云濕熱亦猶風熱義同雖病水寒不
得宣行亦能為濕雖有此異亦以鮮矣或跗腫體寒而



有水者以為畜熱入裏極深本非病寒也及夫寒熱吐瀉因得濕而成也

諸燥

燥乾者金肺之本肺藏氣以血液內損氣虛或風則皴揭風能勝濕熱能耗液皆能成燥故經云風熱火兼為陽寒濕燥同為陰又燥濕亦異也然燥金雖屬秋陰而其性異於寒濕燥陰盛於風熱火也故風熱甚而寒濕同於燥也然中寒吐瀉亡液而成燥者亦以此矣故經

欽定四庫全書

宣明方論

云諸澁枯涸乾勁皴揭皆屬於燥也

諸寒

寒者上下所生水液澄徹清冷穀不化小便清白不澁身涼不渴本末不經有見陽熱證其脈遲者是也此因飲食冷物過多陰勝陽衰而為中寒也或冷熱相併而反陽氣怫鬱不能宣散怫熱內作以成熱證者不可亦言為冷當以成證辨之夫濕熱吐瀉當見陽脈若亡液氣虛亦能反見諸陰脈也當以標本明之不可妄治或



熱證誤服白朮調中湯溫藥亦能開發陽氣宣通而愈
別無加害也

傷寒表證

夫傷寒之候頭項痛腰脊強身體拘急表熱惡寒不煩
躁無自汗或頭而痛肌熱鼻乾或胸滿而喘手足指末
厥脈浮數而緊者邪熱在表皆麻黃湯發汗之證也或
天水散之類甚佳

傷寒表裏證

欽定四庫全書

宣明方論

傷寒身熱為熱在表引飲或小便黃赤熱在裏身熱渴
或小便黃赤為表裏俱有熱涼不渴小便清白為表裏
俱無熱身疼拘急表熱惡寒而脈浮者皆為熱在表也
引飲譫妄腹滿實痛發熱而脈沉者皆為熱在裏也胸
脇痞痛或嘔而實熱往來脈在肌肉者邪半在表半在
裏也

內外傷

始得病脈便沉而裏病表和者內傷也脈浮而表病裏



和者外傷也病在身體頭面四肢為表病在胸腹之內
為裏病也

傷寒論

夫風寒者百病之始也是四時八節不正疫癘之氣故
云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰冷乃四時之
正氣冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒
之者乃傷耳春應煖而反寒夏應熱而反冷秋應涼而
反熱冬應寒而反溫非時而邪氣是以辛苦之人一歲

欽定四庫全書

宣明方論

之中病無少長始自一日巨陽膀胱受之巨陽者三陽
之首故先受之二日陽明胃受之三日少陽膽受之未
入其藏可汗之四日太陰脾受之五日少陰腎受之六
日厥陰肝受之其入藏可泄之經云其未滿三日汗之
而已其滿三日泄之而已故聖人論汗下大槩言之以
脈分別三四日脈沉伏亦當下六七日脈浮滑亦可汗
故傷寒傳足經不傳手經未詳耳且自人身十二經絡
分布上下手足各有三陰三陽稟天地之氣天樞之上



同天之陽天樞之下同地之陰至真大論云身半以上	其氣三矣天之分也天氣主之身半以下其氣三矣地	之分也地氣主之 注云 當陰之分冷病歸之當陽之分	熱病歸之有八節邪氣所中於人陽邪為病傳手經陰	邪為病傳足經其邪自何而入自風池而入為脊骨兩	傍一寸五分是十二經之俞穴春夏應陽秋冬應陰至	真大論云寒暑溫涼盛衰之用其在四唯故陽之動始	於溫盛於暑陰之動始於涼盛於寒春夏秋冬各差其	欽定四庫全書 宣明方論	分易云水流濕火就燥熱論云熱病者皆傷寒之類也	人之傷於寒則為病熱熱雖甚不死太陰陽明論云陽受	風氣陰受濕氣 注云 同氣相求耳又曰傷於風者上先	受之傷於濕者下先受之 注云 陽氣炎上故受風陰氣	潤下故受濕蓋同氣相合耳故風熱火為陽寒濕燥為	陰 刺熱論云 五臟俱有熱病肝熱病左頰先赤心熱病	顏先赤脾熱病鼻先赤肺熱病右頰先赤腎熱病頤先	赤 甲乙熱論云 有手足太陰熱病有手足少陰熱病有
-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	------------------------	--	--	-----------------------	--	-----------------------	--



手足厥陰熱病熱論其三陰三陽五臟六府皆受病榮 衛不行五臟不通則死矣未嘗則傳足經不傳手經		麻黃湯 治傷寒頭痛發熱體痛惡風無汗喘滿	又治太陽病脈浮緊無汗發熱身疼八九日不解表證 在此當發其汗其人發煩目瞑必衄衄者陽氣重也		麻黃 一兩半 桂枝 一兩 甘草 半兩 杏仁 二十枚湯 去節 去皮 炙剉 浸去皮尖 或濕病身煩痛小便自利 者加白朮四分微汗之	右為末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不	欽定四庫全書	宣明方論	計時候衣覆以取汗	桂枝湯 治傷寒發熱惡寒乾嘔頭痛太陽中風陽浮 陰弱解肌脈浮緊鼻鳴者	桂枝 三分 芍藥 三分 甘草 三分 去皮 分 分	右剉如麻豆大每服五錢水一盞半生薑三片棗三 箇煎至七分不計時候	小青龍湯 治傷寒表未罷心下有水氣乾嘔發熱而 咳或渴利小便不利小腹滿喘
---	--	---------------------	---	--	--	----------------------	--------	------	----------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------



麻黃

去節湯炮去黃汗焙乾三錢利者去麻黃加芫花彈子大噎者去麻黃加附子

右剉如麻豆大每服五錢水一大盞煎至半盞生薑

棗同煎不計時候溫服

瓜蒂散 治傷寒表證罷邪熱入裏結於胸中項滿而

飢不能食四肢微厥而脈乍緊者宜以吐之經云在上

吐之在下洩之

瓜蒂 赤小豆

等分

右為末香豉半合

豆豉是也

水一盞半煮取汁半盞調下

欽定四庫全書

宣明方論

錢七不吐加服

五苓湯

五苓散是也

治傷寒中暑大汗後胃中乾煩躁不得

眠脈浮小便不利微熱煩渴及表裏俱熱飲水反吐

名曰

水逆或攻表不解當汗而反下之利不止脈浮表不解自

利或一切留飲不散水停心下并兩感中濕而昏躁霍

亂吐瀉驚風

猪苓

去皮

茯苓

去皮

白朮

各半兩

桂

一分去皮

澤瀉

一兩

右為末每服二錢熱湯調下愈妙加滑石二兩甚佳



宣明方論卷五										欽定四庫全書		宣明方論										喘嗽煩心不得眠者加阿膠半兩枯夏月大暑新水調服立愈	
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--



欽定四庫全書

宣明方論卷六

金 劉完素 撰

傷寒方

抵當湯 治傷寒日深表證乃甚畜熱下焦脉微沈不
 結胸發狂者小腹脹而硬小便自和者瘀血證也小便
 不和無血也或陽明畜熱內甚而喜忘或狂大便雖硬
 而反易其色黑者有畜血也無表裏證但發熱日深脉
 雖浮者亦可下之或已下後脉數胃熱消穀善飢數日
 不大便有瘀血也

欽定四庫全書

宣明方論

桃仁 七個 大黃 一分 水蛭 炒 蜜蟲 各十個去翅足炒

右剉如麻豆大分作二服水一盞煮半盞絞去滓溫
 服未下再服

抵當丸 治傷寒有熱小腹滿小便不利者為有血也
 當下之不可餘藥

桃仁 八分 大黃 一分 水蛭 炒 蜜蟲 各七依前炒



右為末蜜和作二丸用水一小盞煮一九至六分溫服
服時血未下再服

大承氣湯 治表裏俱熱病勢更甚者陽明脉遲汗出不惡寒身裏煩燥時或作譫語如見鬼狀劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微喘直視陽明裏熱極甚或吐下後不解大便五六日至十餘日日晡潮熱心胃燥熱而懊懷復如瘧狀脉沈實或小便不利大便乍難乍易喘冒不能卧或腹滿實痛煩渴譫妄脉實數而沈裏

欽定四庫全書

宣明方論

熱燥甚腸胃怫鬱留飲不散胸腹高起痛不可忍但嘔冷夜大渴反不能飲強飲不能止喘急悶者

大黃_{兩半}芒硝_{兩半}厚朴_{兩半}枳實_{兩半}

右剉如麻豆大分半水一盞半生薑三片煎至六分

內_音硝煎去滓服

小承氣湯 治傷寒日深恐有燥屎腹中轉失乃可攻之不轉失者必初硬後溏未可攻之攻之則腹滿不能食飲水而噦其後發熱大便復硬若腹大滿不通或陽



明多汗津液外出腸胃躁熱大便必硬而譫語脉滑吐
下微煩小便數大便結或下利譫語脉滑病二三日脉
弱無太陽證柴胡證煩心心下結至四五日雖能食少
少與承氣湯和之令小安

大黃 半兩 厚朴 三錢 枳實 三錢
去皮

右剉如麻豆大分作二服水一盞生薑三片煎至半
盞絞汁服未利再服

調胃承氣湯 治諸發汗和解不惡寒但發熱蒸蒸然

欽定四庫全書

宣明方論

者或日深心下溫溫欲吐胸中痛大便澹腹滿鬱鬱微
煩先此時吐下者或日深裏熱譫語法當下之以銀粉
巴豆燥熱大毒丸藥下之致真陰損虛邪熱轉甚因而
協熱下利不止及表裏熱下之太早乘虛而入不成結
胸但為熱利不止滿鞭或痛煩渴咽乾脉滑數而實諸
腹滿實痛者煩渴譫妄小便赤大便鞭脉滑實緊

大黃 芒硝 甘草
各等分

右剉如麻豆大分一半水一大盞煎至半盞絞去滓



內硝煎不利再煎服

三一承氣湯 治傷寒雜病內外所傷日數遠近腹滿
煩亂魘噤譫妄心下按之硬痛小便赤澁大便沉滯肺
痿痞或積久而為滑泄熱甚喘咳悶亂驚悸狂噪反覆
甚至舌腫喉痺癰瘍陽明胃熱發斑脉沈可下者小兒
惡風驚涎痰須喘昏寒并斑疹黑色胸膈心腹刺痛欲
死或斑疹後熱不退久不作痂或作斑紋瘡癰久不已
者怫熱內成疹癰堅積黃瘦痛疾久新卒暴心痛風痰

欽定四庫全書

宣明方論

酒膈腸垢積滯久壅風熱暴傷酒食煩心悶亂脉數沈
實或腎水陰虛陽熱獨甚而僵仆卒中一切暴音不語
一名失音 畜熱內甚陽厥極深脉反沈細欲絕或表之冲和

正虛寒邪熱并之於裏則裏熱亢極陽極似陰反為寒
戰脉微而絕或風熱燥甚客於下焦而大小便澁滯不
通者或產婦死胎不下及兩感表裏熱甚須可下者

大黃 半兩 去皮 芒硝 半兩 厚朴 半兩 去皮 枳實 半兩 甘草 一兩

右剉如麻豆大水一盞半生薑三片煎至七分內硝



煎二服去滓服									
十棗湯 治太陽中風下利嘔逆短氣不惡寒熱汗出發作有時頭痛心下痞硬引下痛兼下水腫腹脹并酒食積脹垢積滯痰癖堅積畜熱暴痛瘧氣久不已或表之正氣與邪熱并甚於裏熱極似陰反寒戰表氣入裏陽厥極深脉微而絕并風熱燥甚結於下焦大小便不通實熱腰痛及小兒熱結乳癖積熱作發驚風潮搐斑疹熱毒不能了絕者									
欽定四庫全書									
宣明方論									
大戟 芫花 慢火炒變色仲景鄉俗異語云炒作焚下凡言焚者皆乾炒也 甘遂									
各等分									
右為末水一大盞棗十枚切開煮取汁半盞調半錢已實人每一錢									
茵陳湯 治陽明裏熱極甚煩渴熱鬱留飲不散以致濕熱相搏而身發黃疸但頭汗出身無汗小便不利渴引水漿身心發黃									
宜茵陳湯謂下桂苓散 黃利大小便									
茵陳蒿 一名茵陳 一兩去萵 大黃 兩半 大梔子 七箇色深堅實好者稍小者用									



十 箇

右剉如麻豆大水二盞半慢火煮至一盞絞汁溫服

以利為度甚者再作當下如爛魚肚及膿血膠膜等

物及小便多出金色如皂莢汁或見證將發黃此一

劑分作四服調五苓散三錢凡治發黃者無越此法

妙

桂苓甘露散

一名桂苓白朮散
一方甘草一兩半

治傷寒中暑胃風飲食

中外一切所傷傳受濕熱內甚頭痛口乾吐瀉煩渴不

欽定四庫全書

宣明方論

利間小便赤澁大便急痛濕熱霍亂吐下腹滿痛悶及

小兒吐瀉驚風

茯苓

一兩
去皮甘草 二兩
炙

白朮

兩半
澤瀉 兩一
桂 兩半
去皮石膏

二兩

寒水石

二兩

滑石

四兩

猪苓

兩半

右為末每服三錢溫湯調下新水亦得生薑湯尤良

小兒每服一錢同上法

此藥下神金丸止瀉痢無不
驗也并解內外諸邪所傷濕

熱又一方却不用猪苓
或曰三服不計時候

梔子蘘皮湯

治頭微汗小便利而微發黃者濕熱相



搏微者宜服	黃蘗 半兩 甘草 一分 大梔子 十五箇	右剉如麻豆大水三盞煎至一盞絞汁分次作一日	溫服之	梔子湯 治懊懷煩心反傷不得眠燥熱怫鬱於內而	氣不宣通胸滿痛頭微汗虛煩	大梔子 七箇 剉碎豆豉 半合 俗言鹽豉少氣者加甘草 一分 嘔者誤以丸藥下之者加	生薑半兩或用溫湯濯手足使心胸結熱宣通而已	欽定四庫全書 宣明方論	右剉如麻豆大或先以水二盞煮梔子至一盞半內	豉煮至半盞絞汁溫服 凡加者皆用梔子先煮或吐止後服凡用梔子湯皆非吐	人之藥以其燥熱鬱結之甚而藥頓攻之不能開通則發熱而又吐發開鬱結則氣通津液宣行而已故	不須再服也	大陷胸湯 治汗下之後不大便五六日舌乾而渴日	晡潮熱從心至小腹脹滿而痛不可近脉當沈緊滑數	或但胸結則無大段熱頭微汗出脉沈瀦者水結也	大黃 三錢 芒硝 三錢 甘遂末 三
-------	--	----------------------	-----	-----------------------	--------------	--	----------------------	----------------	----------------------	---	---	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--



右剉如麻豆大分作二服每服水一盞煎大黃至六	分內硝一二沸絞汁調甘遂一字七半溫服末快利	再服勢惡不能利以意加服	小陷胸湯 治小結胸心下按之痛脉浮而滑無大段	熱表未罷不可下之下之即死小結胸宜服	半夏 四錢湯洗全用不剉 生薑 二錢切 黃連 二錢剉 栝樓實 大者半兩	惟剉其殼子則不剉若剉其中子者非也	右以水三盞煮栝樓汁一盞半內藥至一盞絞汁兩	欽定四庫全書 宣明方論	次溫服以効	大陷胸丸 治發熱而下之太早熱入因作結胸者項	亦強如柔瘕狀下之則和也	大黃 半兩 芒硝 一分 杏仁 十二箇去皮尖雙仁草灰炒變色 葶藶 三錢微炒	右大黃為末下葶藶杵羅研杏仁硝如泥和彈子大	每服一丸入甘遂末三字白密半匙水一盞煮至半	盞溫服當一宿許乃下未利再服	梔子厚朴湯 治傷寒下後心煩腹滿坐卧不安者
----------------------	----------------------	-------------	-----------------------	-------------------	--	---------------------------------	----------------------	----------------	-------	-----------------------	-------------	--	----------------------	----------------------	---------------	----------------------



大梔子七箇枳實二錢厚朴半兩去皮炙	右剉如麻豆大以水一盞半煮絞汁半盞溫服	檳榔散 治傷寒陰痛下之太早成痞心下痞滿而不	痛按之軟虛也	檳榔 枳殼等分	右為末每服三錢煎黃連湯調下不計時候溫服	大黃黃連瀉心湯 治傷寒成病痞不已心腹亦實熱	煩滿或譫妄而脉沈無他證者	欽定四庫全書 宣明方論	大黃 黃連 黃芩各一分又一法加生薑一分甚良	右剉如麻豆大水二盞煎至一盞絞汁分三次溫服	黃連解毒湯 治傷寒雜病躁熱毒煩悶乾嘔口燥吟	呻喘滿陽厥極深畜熱內甚俗妄傳為陰毒者及汗下	吐後寒涼諸藥不能退熱勢兩感證同法	黃連去鬚黃蘗 黃芩 大梔子各半兩	右剉如麻豆大每服秤半兩水一茶盞煎至四分絞	去滓溫服或腹滿嘔吐或欲作利者每服加半夏三箇
--	---------------------------	------------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------	---	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	---	-----------------------------	---



生全 用 厚朴 二錢 茯苓 二錢 去 用水一盞半生薑三片	煎至半盞絞汁溫服名半夏黃連解毒湯	白虎湯 加減白虎湯隨證用 治傷風自汗桂枝證表未解半斑於	裏中暑自汗脉虛弱傷寒自汗脉滑數而實表裏俱熱	三陽合病腹滿身重口燥面垢譫語發黃厥逆自汗和	解兩感解頭痛止自汗雜病時疫未瀉發斑兼豆疤瘡	疹伏熱	知母 半 一兩 甘草 炙 一兩 粳米 合 一 石膏 兩 四兩 末	欽定四庫全書 宣明方論	右剉如麻豆大抄五錢水一盞煎至六分去滓溫服	無時候日三四服或眩欬嘔者加半夏半兩紅皮半	兩每服生薑三片煎服傷寒發汗不解脉浮者加蒼	朮白虎湯 汗吐下後煩渴口乾脉洪大加人參半	兩名人參白虎湯	賈同知已効方	石膏 兩 四 知母 兩 一 甘草 兩 一	劉庭瑞已効方
---	-------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------	---	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	---------------	-------------------------------------	---------------



知母 一兩半 石膏 四兩 粳米 一合	崔宣武已効方	知母 一兩 石膏 三兩 甘草 一兩半	右為末每服三錢水一盞入粳米二十五粒煎至六	分未曾下胃熱發斑兼豆疤如液虛瘦加人參半兩	白朮半兩頭疼加川芎荊芥各三錢咳嗽加半夏三	錢桔梗一兩恍惚加人參三錢茯苓半兩	涼膈散 一名連翹飲子 治傷寒表不解半入於裏下證	欽定四庫全書 宣明方論	未全下後燥熱怫結於內煩心懊懷不得眠藏府積熱	煩渴頭昏唇焦咽燥喉閉目赤煩渴口舌生瘡欬唾稠	粘澹語狂妄腸胃燥澁便溺悶結風熱壅滯瘡癰發斑	驚風熱極黑陷將死	連翹 一兩 山梔子 半兩 大黃 半兩 薄荷葉 半兩 黃芩 半兩 甘草	一兩半 朴硝 一分	右為末每服二錢水一盞密少許同煎至七分去滓	溫服虛實加減咽喉痛涎嗽加桔梗 一兩 荊芥穗 半兩 嗽
--	---------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	---	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	--	--	-----------------------------	---



而嘔者加半夏半兩每服生薑三片同煎血衄嘔血加當歸半兩芍藥兩半生地黄兩一淋者加滑石兩四茯苓去皮兩風眩加芎兩半石膏兩三防風兩半酒毒加葛根兩一荊芥穗兩半赤芍藥兩半芎兩半防風兩半桔梗半兩三歲兒可服七八錢或無而將死者此一服更加大防風湯約以下之得和者立効凡言加者皆自本方加也以上之減退表裏熱加益元散効速	人參石膏湯 治傷寒咳嗽不已心煩及風熱頭痛精神不利惛憤宜服	欽定四庫全書 宣明方論	人參錢一石膏兩三芎兩半半夏去二錢白朮兩半茯苓兩半甘草兩半草炙一兩大梔子錢三知母半一兩苓錢三	右為末每服一錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服	崔宣武人參石膏湯 治傷寒頭痛心煩悶風熱并汗後餘熱自汗多清頭目定喘嗽	人參半二錢石膏兩一芎兩一黃芩錢二茯苓錢三甘草兩半防	風錢三
---	-------------------------------------	------------------------	---	-------------------------------	--	--	---------------------------



右為細末每服五錢水一盞半煎至六分去滓溫服 不計時候	雙解散 治風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪所傷無問 自汗汗後雜病但覺不快便可通解得愈小兒生瘡疹	使利出快亦能氣通宣而愈	益元散 兩七 防風通聖散 兩七	右二藥一處相和名為雙解散益元散方在痢門通	聖散方在風門各七兩攪勻每服三錢水一盞半入	欽定四庫全書 宣明方論	葱白五寸鹽豉五十粒生薑三片煎至一盞溫服	白朮散 治傷寒雜病一切瀉煩渴霍亂虛損氣弱保	養衰老及治酒積嘔噦	白朮 去 茯苓 各半 甘草 一兩 木香 一分 藿香	半 葛根 一兩	右為末白湯調下二錢煩渴者加滑石二兩甚者加	薑汗續續飲之	四逆湯 治傷寒表熱未入裏誤以寒藥下之太早表
---	---	--------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	---	----------------------------	------------------------------	------------------	--	--	-----------------------------	---------------	------------------------------



熱不已入裏寒下利不止因表熱裏寒自利急以溫裏	利止又治少陰病脉沈下利厥逆煩渴嘔吐	甘草 一錢 乾薑 一分 附子 半箇生去皮臍附子以半	惡非古方之宜也不但以美其大者要知古人之有則也	右剉如麻豆大水二盞煎至一盞絞汁溫服或畜熱	深極而手足厥冷者不宜此方當以下之	茯苓半夏湯 治傷寒雜病一切嘔吐或喘咳疼痛痞	滿頭痛者	欽定四庫全書 宣明方論	茯苓 一分 半夏 一分 生薑 一分 去皮 錢 取汁	一方治風痰加 黃芩 一分 甘草 一分 紅皮 一分 去腐 去穰	右剉如麻豆大水一盞煎至四分空心下生薑汁溫	服不計時候		宣明方論卷六
-----------------------	-------------------	--	---------------------------------------	----------------------	------------------	-----------------------	------	----------------	--	---	----------------------	-------	--	--------



欽定四庫全書

宣明方論卷七

金 劉完素 撰

積聚論

素問曰積聚留飲痞隔中滿濕積霍亂吐下瘕瘕堅硬

腹滿皆太陰濕土乃脾胃之氣積聚之根也

積者不散聚者不化

留者不行飲者停滯痞者不通隔者阻也中滿者濕為積霍亂吐下為留停瘕瘕者瘕也瘕假也斯疾

迺五藏六腑陰陽變化興衰之制也亢則害承迺制極

欽定四庫全書

宣明方論

則反矣

謂水得燥則消散而得濕則不消乃為積飲也謂人形

精神與榮衛血氣津液出入流通謂夫腠理閉密乃為

痞也謂腸胃隔絕傳化失常而乃滯也土主形體腹滿

於中央乃曰中滿以傳化失度故甚則霍亂吐瀉也瘕

者腹中主硬按之應手然水體柔順而今乃堅硬如此

者亢則害承乃制也瘕者中雖硬而忽聚忽散無其常

故其病未及瘕也 經曰血不流而滯故血內凝而乃



瘕也

小腸移熱於大腸乃為瘕瘕大腸移熱於小腸謂血熱相搏則血溢而為伏瘕血澁不利月事沈滯而不行故行為瘕瘕為瘕與伏同瘕與疝同為傳寫誤也世傳冷病然瘕病亦有熱或陽氣鬱結怫熱壅滯而堅硬不消者世傳為寒瘕瘕也或堅痞腹滿急痛寒主筋縮故急主痛寒極血凝泣而反兼土化制之故堅痞之腹滿或熱鬱於內而腹滿堅結痛不可忍者皆可為寒誤矣誤矣

欽定四庫全書

宣明方論

何不以脉證辨之凡諸疾病皆有陰陽寒熱宜推詳之五藏六腑四季皆有積聚心之積名曰伏梁在於臍上大如臂上至於心橫於心上如屋梁故曰伏梁肝之積名曰賁奔音氣在左脇下覆如杯有頭足久不愈令人瘕瘕脾之積名曰痞氣在胃腕覆大如杯久不愈令人四肢不收發黃疸食不為膚肌肺之積名曰息賁結在右脇下覆大如杯久不愈令人灑淅寒熱喘咳發為肺癰腎之積名曰賁奔音狫在於小腹上至心下如狫賁走往



欽定四庫全書		宣明方論		酸水嘔逆惡心飲食不化肋脇疼痛無問久新		而微者是也		虛而內外諸邪所侵故留稽不行遂成積聚其脉沈細		脾脾病傳腎腎病傳心心病傳肺皆傳所勝五藏之氣		傳其所勝者死傳不勝者可治假令肺病傳肝肝病傳		藏之積也嘗究斯義未可悉也		來無定久不愈令人喘逆發為骨痿少氣乏力此為五	
木香三稜丸		治一切氣悶胸膈痞滿榮衛不和口吐		青木香		破故紙		茴香		黑牽牛		甘遂		芫		花	
大戟		荆三稜		蓬莪茂		川棟子		葫蘆		巴		巴戟		已上各		巴豆	
油二分		陳米		豆三合將芭		黑縮砂仁		半一兩		炒		黑縮砂仁		半一兩		右件一十五味用好醋二升除縮砂木香餘藥入醋	
中浸一宿入鍋煮盡為度乾為細末醋麪糊和丸如		菴豆大每服五七丸食後加減看虛實隨湯水下		導氣枳殼丸		治氣結不散心胸痞痛逆氣上攻分氣											



逐風功不可述		枳殼去穢炒木通剉青皮去陳皮白桑白皮剉蘿蔔	子微炒白牽牛炒黑牽牛炒莢煨茴香炒荊三稜	等分	右為末生薑汁打麪糊為丸如桐子大每服二十九煎橘皮湯下不計時候	透膈寬腸散 治腸上壅實膈熱難行者	白牽牛一兩芒硝三兩川大黃二兩甘遂半兩	欽定四庫全書 宣明方論	右為細末食後溫蜜水調下一錢虛實加減疎動止	密補固真丹 治皮腎真元損虛泄痢痰嗽噤痞水穀	酸臭飲食無味臍腹冷痛肢體麻痺下虛痰厥上實壅	滯腎虛耳鳴脾虛困憊耳焦齒稿面鰲身悴唇黃口燥	髮墮爪退風虛偏枯中滿膈氣一切脾胃虛證常服補	養宜通氣血	天南星半兩半夏製神麵麥蘖茴香炒荊三稜	炮各一兩白附子乾生薑川烏頭生各一兩巴豆七牽
---------------	--	--	---	-----------	--------------------------------------	-------------------------	---	------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------	--	--



牛三代赭石二官桂一	右為末水和丸小豆大每服十九加至五十丸溫水下除泄瀉外並加大黃一兩	木香丸 治和脾胃膈消痰逆止嘔吐進益美飲食	官桂 乾薑各半木香一分大黃 蓬莪茂 芫花	醋拌濕枳殼去穢陳皮各半半夏二牽牛半斤取末四兩茴	香一兩巴豆四	右為末滴水為丸如小豆大每服二三十九溫水下	欽定四庫全書 宣明方論	散金丸 治心胸腰腹急痛或淋悶升產後經病血刺痛	當歸半破故紙 黑牽牛各五錢輕粉 硃砂	粉霜各一蓬莪茂二錢	右同研勻棗同為膏蜜丸梧子大新水下一丸病甚者加得利後復	泥金丸 治心腹急痛取久效能消積滯推陳致新	黃蘗 大黃 巴豆 五靈脂各半猪牙皂角一分
---	--	-----------------------------	---	---	---	-----------------------------	------------------------	-------------------------------	---	--	-----------------------------------	-----------------------------	---



輕粉 鉛霜 礪砂 各一分	右研勻煉密拌得所杵千下丸菴豆大新水下一丸未利更加服	狀元丸 治膈氣酒膈酒積涎嗽腹痛吐逆痞滿	巴豆 五十各取霜 神麴 半兩末 半夏 一兩洗 雄黃 白麴 一兩	炒	右研勻酒水丸小豆大細米糠炒變赤色食後溫水	下童子二丸三四歲一丸歲半半丸止嗽溫瀝汁下	欽定四庫全書 宣明方論	止嘔吐生薑湯下	玄胡丸 治積聚癥瘕解中外諸邪所傷	玄胡索 青皮 去白 陳皮 去白 當歸 木香 雄黃 別研	荆三稜 生薑 各一兩	右為末酒麪糊為丸如小豆大每服五七丸生薑湯下	又一方 無陳皮 生薑 有廣茂 一兩 檳榔 分兩同	大延胡索散 治婦人經病產後腹痛腹滿喘悶癥瘕
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---	---	----------------------	----------------------	----------------	---------	------------------	--	---------------------------	-----------------------	--	-----------------------



癖塊及一切心腹暴痛	延胡索 當歸 芍藥 京三稜 川苦棟 蓬	莪茂 官桂 厚朴 木香 川芎 桔梗	黃芩 大黃 甘草 檳榔	右為麤末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服食	前如惡物過多去大黃官桂加黃藥子染槐子龍骨	各半兩如前法煎服平人心急痛加本方得利尤良	後常服	欽定四庫全書 宣明方論	三稜湯 治癥瘕痞積聚不散堅滿痞膈食不下腹	脹	荆三稜 白朮 蓬莪茂 當歸 檳榔 木	香 錢 三	右為末每服三錢沸湯點服食後每日三服	消飲丸 治一切積聚痞氣塊及大小結胸痛不能	仰按	天南星 半夏 芫花 自然銅 生等分
-----------	---------------------	-------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----	----------------	----------------------	---	--------------------	-------	-------------------	----------------------	----	-------------------



右為末醋煮麪糊為丸如桐子大每服五七丸食前 溫水下良久葱粥投之相虛實加減	除濕丹 治諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫筋脉緊急 津液凝澁便溺不利赤癰疥疽癰發背疥癬走注脚氣	無首尾瘡癰功效不可盡述	檳榔 甘遂 葳靈仙 赤芍藥 澤瀉 葶歷	已上各 乳香 沒藥 黑牽牛 大戟 陳 二兩 一兩 半兩 二兩	皮 去白	欽定四庫全書 宣明方論	右為末麪糊為丸如桐子大每服五十丸至七八十 丸溫水下後食如服藥前後忌酒一日藥後忌濕麪	食溫粥補暖	保安丸 治癥積心腹內結如拳漸上不止搶心疼痛	及遶臍腹痛不可忍者	川大黃 三兩新水浸一宿 乾薑 一兩 蒸熟切片子焙 大附子 半兩 去皮	臍 驚甲 一兩半	右為末取三年米醋一大升先煎四五合然後和藥
---	---	--------------------	----------------------------	---	-------------	-------------------------------------	---	--------------	------------------------------	------------------	---	-----------------	-----------------------------



氣上逆上實下虛脚膝疲軟不通氣血									
筋脉拘攣肢體麻痺走注疼酸兩目昏眩中風偏枯邪									
瘦眼澁昏暗一切所傷心腹暴痛神思煩鬱偏正頭疼									
得眠咳嗽噦逆不能食或風濕內攻肢體麻痺腫脹黃									
疼痛脹悶作發有時三焦壅滯二腸滑泄逆氣煩心不									
開結妙功丸 治怫熱內盛瘕癖堅積腸腹癥瘕結聚									
下後取積如魚腸膿血爛肉汁青水當下									
丸如桐子大每服十丸至二十丸空心服或酒米飲									
如覆杯狀									
木香分氣丸 治積滯癖塊不消心腹痞結疼痛搶刺									
快利三五行以意消息病去為度									
水亦得或心胃間稍覺藥力煖性却涼尤數以加至									
右為末膏丸小豆大生薑湯下十丸十五丸溫水冷									
積用 半夏 兩 桂 二 牽牛 二 錢									
黃 各一兩好醋半升熬成稠膏 乾薑 巴豆 二筒 破堅									
荆三稜 炮 茴香 各一兩炒 川烏頭 兩 神麴 麥芽 大									
欽定四庫全書 宣明方論									



陳皮去白 檳榔各一兩 破故紙二兩 木香一兩 黑牽牛二十	兩炒香熟取末 五兩半餘不用	右為末滴水為丸如桐子大每服二三十九生薑湯	下食後臨卧服	開胃生薑丸 治中焦不和胃口氣寒水穀不化噫氣	不通噎塞痞滿口淡吞嗽食時膨脹噦逆惡心嘔吐痰	水宿食不消中滿膈氣刺痛寬中開胃導飲食	桂心一兩 陳皮去白 甘草炙各二兩 砂仁四十 廣茂 當歸各半兩	欽定四庫全書 宣明方論	右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸食前細嚼沸	湯化下	導滯定功丸 治一切心腹卒暴疼痛及胸中不利消	食止逆定疼痛	大椒 木香各一錢 蝎梢三錢 巴豆八箇出油為度	右為末後入芭豆霜研勻醋麪糊和丸如菉豆大朱	砂為衣每服五丸至十丸淡醋湯下	積氣丹 治一切新久沈積氣塊面黃黑瘦諸氣無力
---	--------------------------	-----------------------------	---------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	--	------------------------	-----------------------------	------------	------------------------------	---------------	--	-----------------------------	-----------------------	------------------------------



癥瘕積聚口吐酸水		檳榔 _二 芫花 _一 礪砂 _二 芭豆 _二 青皮 _去 陳皮 _各
蓬莪茂 雞爪黃連 京三稜 章柳根 牛		錢
膝 _{各一} 肉豆蔻 _三 大戟 川大黃 甘遂 白牽		兩
牛 乾薑 青礞石 乾漆 _{各半} 木香 _二 石菖蒲		錢 三
右為末醋麪和為丸如桐子大每服一九臨卧燒棗湯下每夜一九或二丸候肚內作聲病退為度		
欽定四庫全書		宣明方論
金露紫菀丸 治一切脾積兩肋虛脹臍疼痛		
草烏頭 _{去尖} 黃連 _半 官桂 桔梗 乾地黃 乾		
生薑 川椒 蕪荑 紫菀 _去 柴胡 防風 厚		
朴 甘草 人參 川芎 鼈甲 _{酒浸} 貝母 枳殼		
甘遂 _{各一} 巴豆 _{三兩醋煮} 入礪砂		兩
右為末水煮麪糊為丸如桐子大每服五丸空心臨卧米飲湯下或微疎動詳虛實加減		
信香十方青金膏 灌頂法王子所傳十二上願云藥		



師瑠璃光如來應當供養正徧知明行足善遊世間解
 無上士調御丈夫天人師

佛世尊方境授治周身中外陰陽不調氣血壅滯變生

百病乃至虛羸困倦偏攻酒食內傷心腹滿塞急痛或

酒積食積癥瘕積聚痞堅積中滿膈氣食臭酸醋嘔

吐翻胃或膈痺消中善食而瘦或消渴多飲而數色角切頻

也小便或腸風下血痔瘻痒痛或胃癰瘰或偏身癰疽

惡瘡或瘡毒已入於裏腹滿嘔吐或成瀉痢或出惡瘡

欽定四庫全書

宣明方論

瘰肉或下痢腹痛或一切風氣肢體疼痛及中風偏枯

或痰逆生風痰涎嗽兼產後腹痛及小兒疳疾諸風潮

搐但平人常服補養宣行榮衛調飲食

信砒 乳香 輕粉 粉霜 芭豆 已上各一兩同研 龍

腦 半 麝香 半 青黛 二錢 同研 黃蠟 三錢

右研細末鎔蠟入蜜半錢就搓勻旋丸菴豆至小豆

大先服小丸病在上食後在下食前在中不計時候

面東頂禮一九淨器盛水送下如合藥即淨處面東



每一丸密念呪三遍或病人不能呪請人呪	或師氏呪過 呪曰	信香十方青金膏 藥師圓成蜜遍拋	普濟有緣除百病 仰吞一粒體堅牢	密呪曰	但言八金剛 莫說十方佛	五蘊六根俱不道 十二上願自然成	金黃丸 治酒積食積諸積面黃疸積硬塊	欽定四庫全書 宣明方論	荆三稜 香附子 澤瀉 巴豆 黍米	粉 牽牛 二錢	右為末用梔子煎湯和丸如菴豆大每服三丸至五	丸如心痛艾醋湯下七丸	逆氣丸 治心胸滿悶脇肋刺痛不思飲食常服寬膈	進美飲食	薑黃 香附子 縮砂 甘草 廣茂 丁皮	甘松 木香 荆三稜 白檀 藿香葉
-------------------	-------------	--------------------	--------------------	-----	----------------	--------------------	----------------------	----------------	------------------------------	---------------	----------------------	------------	--------------------------	------	-----------------------------------	------------------------------



右為末入菜豆粉二兩用湯浸蒸餅為丸如桐子大
每服三二十丸細嚼曰湯下食後日進三服

丁香散 治痲痺氣脇下痞滿息而不消積而不散元
氣在胃不妨食者

好丁香 二十
五箇 白丁香 七十
箇 蜜陀僧 舶上硫黃

黃鶯調 各五
分

右為細末每服一字皂子煎湯調下不計時候治肚
內生硬物黑瘦如柴嘔吐積滯日三服食後

欽定四庫全書

宣明方論

聖餅子 治一切沉積氣脹兩脇氣滿無問久新者

大黃 三
兩 黑牽牛頭末 一
兩 礪砂 三
錢 山梔子 半
兩 輕粉 二
錢

右為末煉蜜和丸捻作餅子如小錢大厚樣食後每
服三餅子細嚼溫酒下臨卧如行粥補之虛實加減

無憂散 一名萬
病散 治風疾瘡腫疥癬或臟腑積冷壅滯氣

結風勞膀胱宿冷臟腑虛衰面色痿黃內有癥癖氣并
當有疳蟲蛇蟲攻心腹俱痛忽中傷寒頭痛不忍狀若
山嵐時氣瘟疫之疾並宜急服此藥宣通三五行立瘥



或中風口喎語多蹇澁睡後口中涎出不限時節不問 男子女人但五日一服不過三服永瘥人患腰膝疼痛 脚氣腫滿運動艱難飲食無味并小兒疳痢脫肛者量 大小與服利三五行自瘥大人以泄氣痢狀若休息痢 止有時俱一服取下冷膿一二升當日見効藥無四時冷 熱老幼衰弱病患悉皆除之任服他藥無妨若服常時 蓋緣搜出藏府中積滯蟲膿故也無孕婦人以患血虛 氣弱痿黃無力者亦可依方服宣通氣候殊不困倦無
欽定四庫全書
宣明方論
妨此藥凡有百病並皆治之其功不可具載有孕婦人 或遇陰晦時即不可服天道清明可進若雖復疾而未 愈者再可服
黃耆 木通 桑白皮 陳皮 胡椒 白木
木香 白牽牛
各半兩 四兩炒別
取頭末
右七味為細末每服二錢牽牛末二錢生薑二錢切 作片子煎生薑湯一大盞調藥須臾又用生薑湯或 溫湯送下平明可行三五次快利無妨如病瘥後



宣明方論卷七									
欽定四庫全書									
宣明方論									
以白粥補之痊矣									
五積丹 治心腹痞滿嘔吐不止破積聚者									
皂莢一鈹一尺二寸火燒留性淨盆合 麵一兩五錢同 炒令黃色為度 巴豆十二箇白									
右為末醋麵糊為丸菴豆大每服十丸鹽湯下食後									
加減									



欽定四庫全書

宣明方論卷八

金 劉完素 撰

木濕門

夫諸濕者濕為土氣火熱能生土濕也故夏熱則萬物
濕潤秋涼則濕物燥乾也濕病本不自生因於大熱怫
鬱水液不能宣通即停滯而生水濕也凡病濕者多自
熱生而熱氣尚多以為兼證云濕熱亦猶風熱義同雖

欽定四庫全書

宣明方論

病水寒不得宣行亦能為濕雖有此異亦以鮮矣或跗
腫體寒而有水者以畜熱入裏極深本非病寒也

三花神祐丸 治中滿腹脹喘嗽淋瀝一切水濕腫滿

濕熱腸垢沉積變生疾病久病不已黃瘦困倦氣血壅
滯不得宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛風痰涎
嗽頭目旋運瘧疾不已癥瘕積聚堅滿痞悶酒積食積
一切痰飲嘔逆及婦人經病不快帶下淋瀝無問赤白
并男子婦人傷寒濕熱腹滿實痛久新瘦弱俗不能別



辨或汎常只為轉動之藥兼瀉久新腰痛并一切下痢 及小兒驚疳積熱乳癖滿並宜服之	甘遂 大戟 芫花 醋拌濕炒 各半兩 牽牛 二兩 大黃 一兩 為細末	輕粉 一錢	右為末滴水為丸如小豆大初服五丸每服加五丸	溫水下每日三服加至快利利後却常服病去為度	設病愈後老弱虛人平人常服保養宣通氣血消進	酒食病癖悶極甚者便多服則頓攻不開轉加痛悶	欽定四庫全書 宣明方論	則初服兩丸每服加兩丸至快利為度以意消息小 兒丸如麻子大隨強弱增損三四歲者三五丸依前 法	崔宣武神祐丸	加黃柏 一兩 牽牛 四兩 大黃 二兩 輕粉 二錢 甘遂 大戟	芫花 各一分 依前法	劉庭瑞神祐丸 用此藥治水氣常得効 賈同知稱 之不已乃神仙奇絕之藥也
--	--	--------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	--	---------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---



葶藶木香散 治濕熱內外甚水腫腹脹小便赤澁大便滑洩	葶藶 茯苓 去皮 猪苓 去皮 白朮 各一分 木香 半錢 澤瀉	木通 甘草 各半兩 辣桂 一分 滑石 三兩	右為末每服三錢白湯調下食前 此藥下水濕消腫脹止洩瀉利小便若小便不得通利而反轉泄者此乃濕熱痞悶極熱而攻之不開是能反為注泄此正氣已衰而多難救也慎不可攻之而無益耳	欽定四庫全書 宣明方論	白朮木香散 治喘嗽腫滿欲變成水病者不能卧不敢食小便澀者	白朮 木猪苓 去皮 赤茯苓 甘草 澤瀉 各半兩 木	香 檳榔 三錢 陳皮 二兩 官桂 二錢 滑石 三兩	右為末每服五錢水一盞生薑三片同煎至六分食後去滓溫服	大橘皮湯 治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑洩	便滑洩
---------------------------------	---	---	---	------------------------	------------------------------------	--	--	----------------------------------	---------------------------------	------------



橘皮一兩 去白木香一分 滑石六兩 檳榔三錢 茯苓一兩 去皮木猪	苓去 澤瀉 白朮 官桂各半 甘草二錢	右為末每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓	溫服大小便秘先服十棗湯 二三日後再服此藥	葶藶膏 治水腫腹腹	牛黃 麝香 龍腦各一分 昆布 海藻上同三分洗 牽	牛 桂心各八分 椒目三分 葶藶六分	右為末別搗葶藶熬成膏丸如桐子大每服十九日	欽定四庫全書 宣明方論	再服稍利小便為度詳虛實加減	茯苓散 治諸般氣腫等疾	芫花醋拌炒 澤瀉 郁李仁 甜葶藶 漢防己各二	錢半 陳皮去白 白檳榔 瞿麥各半 藁本二錢半 滑石三分	大戟炒三分	右為細末每服一錢取桑白皮濃煎湯空心調下取	下碧淥水如爛羊脂即瘥如未盡隔日又服腫消如故不用服忌鹽百日
---	--	-----------------------------	--	------------------	---	---	-----------------------------	--	----------------------	--------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------



調胃散 治胸膈痞悶不思飲食脇肋硬痛消腹脹 半夏製 甘草炙 厚朴去皮 陳皮去白 藿香各等分 右為末每服一錢生薑三片棗二枚水一盞同煎溫服食前	二氣散 治水氣蠱脹滿 白牽牛 黑牽牛各二錢 右為末用大麥麪四兩同一處為燒餅臨卧用茶湯一盞下降氣為驗	雄黃神金散 雄黃 葶藶一兩用糯米和炒半熟米不用 澤瀉二兩 椒目半兩 大戟 巴戟去心 茯苓去黑皮 芫花醋五升浸一日炒 甘遂 桑白皮 已上各一兩 右為末從發時加減一分空心用井花水調下每服一錢加至五錢以利為度忌鹽醋生冷毒物油膩血物 從脚腫根在心加葶藶 從肚腫根在腹加椒目	欽定四庫全書 宣明方論					
--	---	---	---------------------------	--	--	--	--	--



從陰腫根在胸加澤瀉 從膝腫根在肝加芫花 從面腫根在肺加桑白 從心腫根在肋加雄黃 從肢腫根在脾加甘遂 從口腫根在小腸加巴戟 從腰腫根在腎加大戟 從四肢腫根在胃加茯苓 萬勝散 治十種水氣不可愈者	海帶 海藻 海蛤 芫花 醋浸炒 甘遂 大戟	甜葶藶 樟柳根 續隨子 巴戟 各等分去心	右為末每服三錢至五錢溫酒調下臨卧間日再服	欽定四庫全書 宣明方論	牽牛丸 治一切濕熱腫滿等疾	黑牽牛 黃芩 大黃 大椒 滑石 各等分	右為細末酒煮麪糊和丸如桐子大每服五丸至七	丸生薑湯下食後虛實加減	梔子蘘皮湯 治頭微汗小便利而微發黃者濕熱相	搏微者宜服	大梔子 十五箇 黃蘘 半兩 甘草 一分	右剉如麻豆大水三盞煮至一盞緩汁分三次作一
--	---	--	-----------------------------	------------------------	----------------------	---	-----------------------------	--------------------	------------------------------	--------------	---	-----------------------------



日服溫喫不計時候	大戟丸 治十腫水氣腫脹喘滿熱寒咳嗽心胸痞悶	背項拘急膀胱緊腫於小腹小便不通反轉大便澹泄	不能坐卧	大戟 芫花醋炒 甘遂 海帶 海藻 郁李仁	續隨子各半 樟柳根一兩已上八味為末每料抄	礪砂 輕粉各一錢 粉霜各一錢 水銀砂子一皂子大 龍腦	半錢 巴豆二十一箇生用去皮	欽定四庫全書 宣明方論	右八味已下同研勻用棗肉為丸如菉豆大每服五	丸至七丸龍腦臘茶送下食後臨卧虛實加減	粉霜丸 治病水鼓滿不食四肢浮腫大小便悶不進	飲食	粉霜 礪砂 海蛤 寒水石燒粉 玄精石 白丁	香 頭白麪各錢 輕粉三錢 海金砂一錢	右研勻著紙裹數重上使麪裹又紙裹冷酒蘸了桑	柴火燒麪熟為度宿飪餅和丸如桐子大每服三丸
-----------------	------------------------------	------------------------------	-------------	--	---	--	--	------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------	---	--	-----------------------------	-----------------------------



生薑湯下一日三服二日加一九至六日不加即止 以補之妙	苦葶藶丸 治一切水濕氣通身腫滿不可當者	人參 一兩 苦葶藶 四兩 於鍋內紙上炒黃色為度	右二味同為細末用棗肉和丸如桐子大每服十五 丸煎桑白皮湯下日進三服空心食前 此藥恐君 子不信試驗之	肉豆蔻丸 治水濕脹如鼓不食者病可下	欽定四庫全書 宣明方論	肉豆蔻 檳榔 輕粉 各一 黑牽牛 一兩半 取頭末	右為末麪糊為丸如菉豆大每服十九至二十九煎 連翹湯下食後日三服	宣明方論卷八		
------------------------------	---------------------	---	--	-------------------	----------------	--	-----------------------------------	--------	--	--



欽定四庫全書

子部

宣明方論卷
九五

詳校官太醫院醫士臣趙正池

編修臣倉聖脈覆勛

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣吳敬時



欽定四庫全書

宣明方論卷九

金 劉完素 撰

痰飲門

痰飲論

夫嗽者五臟皆有嗽皆因內傷脾胃外感風邪皮毛痺肺風寒隨玄府而入腠理開張內外相合先傳肺而入遂成咳嗽迺肺熱也寒化熱熱則生痰喘滿也經云喉

欽定四庫全書

宣明方論

中介介如梗壯甚則嗽血也胸滿氣喘痰盛稠粘皆肺氣熱也

大人參半夏丸 治化痰墜涎止嗽定喘諸痰不可盡述嘔吐痰逆痰厥頭痛風氣偏正頭疼風壅頭目昏眩耳鳴鼻塞咽膈不利心腹痞滿筋脉拘倦肢體麻痺疼痛中風偏枯咳唾稠粘肺痿勞虛人保養宣通氣血調和臟腑進飲食

人參 茯苓 天南星 薄荷葉 半夏 乾



生薑 白礬^生 寒水石^{各一兩} 蛤粉^{一兩} 藿香葉^{一分}	右為末麪糊為丸如小豆大生薑湯下二三十丸食後溫水亦得一法加黃連半兩黃蘗二兩水丸取効愈妙治酒病調和藏尤宜服之	新添半夏瓜蒌丸 治遠近痰嗽煩喘不止者	半夏^{生薑製} 瓜蒌 杏仁^{去皮尖} 麻黃 白礬^{枯秤} 欵冬	花^{各等分}	右為末生薑汁打麪糊為丸如梧子大每服二十九	欽定四庫全書 宣明方論	煎生薑湯下不計時候	白朮厚朴湯 治痰嘔不散利胸膈除寒熱美飲食	白朮 甘草^炙 葛根^{各一兩} 厚朴^{半兩}	右件為末每服一二錢水一大盞生薑五片煎至六	分去滓食前服顯仁丸仙朮芎散大人參半夏丸	橘皮半夏湯 治痰壅涎嗽久不已者常服養液潤燥	解肌熱止咳嗽	橘皮^{半兩} 半夏^{二錢} 半湯 去皮 洗七次
---	---	---------------------------	---	------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------	-----------------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------	--



右為末分作二服每服水一盞半入生薑十片同煎至七分去滓溫服	知母茯苓湯 治肺痿喘咳不已往來寒熱自汗 茯苓 去皮 甘草 各一兩 知母 五味子 人參 薄荷	半夏 洗七次 柴胡 白朮 欵冬花 桔梗 麥門冬 黃芩 半兩 川芎 三錢 阿膠 三錢炒	右為末每服三錢水一盞半生薑十片同煎至七分去滓稍熱服	欽定四庫全書 宣明方論	人參潤肺湯 治肺氣不足喘急咳嗽不已并傷寒頭疼增寒壯熱四肢疼痛	人參 桔梗 白芷 麻黃 去節 乾葛 白朮 甘草 各一兩 白薑 半兩	右為末每服二錢水一大盞生薑三片葱白二寸煎至八分如出汗連進二服通口溫服	杏仁半夏湯 治肺痿涎喘不定咳嗽不已及甚者往來寒暑
-----------------------------	--	--	---------------------------	----------------	--------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------



杏仁 去皮 桔梗 陳皮 去白 茯苓 去皮 漢防己 白礬	桑白皮 各三錢 薄荷葉 一錢 甘草 二寸 猪牙皂角 一錠	右為末作二服水二盞生薑三片煎至六分去滓食	後溫服	防己丸 治肺不足喘嗽久不已者調順氣血消化痰	涎	防己 二錢 杏仁 三錢 木香 二錢	右為末煉蜜為丸如小豆大每服二十九丸煎桑白皮	欽定四庫全書 宣明方論	湯下如大便閉加葶藶一兩食後服	葶藶散 治肺氣喘滿痰嗽眠卧不安不思飲食	苦葶藶 蛤粉 各三錢 桑白皮 山梔子 人參	荊芥穗 薄荷葉 赤茯苓 去皮 陳皮 桔梗 杏	仁 甘草 各半兩	右為末每服三錢水一大盞入生薑三片煎至六分	去滓溫服食後 保安半夏丸 治久新諸嗽或上逆涎喘短氣痰鳴咽
--	--	----------------------	-----	-----------------------	---	--	-----------------------	----------------	----------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	----------------------	---------------------------------



乾煩渴大小便澀滯肺痿勞劣心腹痞滿急痛中滿膈	氣上實下虛酒食積聚不消補養氣血宣行榮衛	半夏 天南星 各半 牽牛 一兩 大黃 半兩 黃蘗 一兩 蛤	粉 一兩 巴豆 四箇	右為末水為丸如小豆大每服十九十五丸溫水下	食後日三服孕婦不可服又方無芭豆有乾薑一錢	半	人參保肺湯 治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨蒸	欽定四庫全書 宣明方論	潮熱	人參 柴胡 當歸 芍藥 桑白皮 知母	白朮 川芎 黃耆 紫苑 荊芥 地骨皮 各一	分 茯苓 去皮 黃芩 連翹 大黃 薄荷 各半兩 梔子 同	甘草 桔梗 各一兩 石膏 滑石 寒水石 半兩	右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓	溫服泄者去大黃同人參半夏丸服	神應丹 治涎嗽喘滿上攻心腹卒痛及利下血兼婦
-----------------------	---------------------	---	--	----------------------	----------------------	---	-----------------------	----------------	----	--------------------	--------------------------------------	--	--	----------------------	----------------	-----------------------



人帶下病一切肋脇痛滿	薄荷葉 甘草 錢四 巴豆 燈燒存性 盆硝 各二錢 輕粉 二錢 豆	鼓 一兩慢火炒 五靈脂 二錢	右為末煉蜜為丸如桐子大每服一丸溫酒下續	後空嚥津三五次禁飲食少時覺咽喉微煖効心腹	急痛溫酒下二丸未効再服得利尤良帶下以溫酒	下二丸或大便流利再服	人參散 治身熱頭痛積熱黃瘦肌熱惡寒畜熱發戰	欽定四庫全書 宣明方論	膈熱嘔吐煩渴濕熱瀉利或目赤口瘡咽喉腫痛或風	昏眩虛汗肺痿勞嗽不已者	石膏 甘草 各一兩 滑石 四兩 寒水石 二兩 人參 半兩	右為末每服二錢溫水調下早晚食後兼服梔子金	花丸 一名既濟解毒丸	寧神散 治一切痰嗽不已者諸藥無効世傳極驗	御米囊 一觔生 烏梅 四兩	右為末每服二三錢沸湯點常服食後日三服
------------	--	--	---------------------	----------------------	----------------------	------------	-----------------------	----------------	-----------------------	-------------	--	----------------------	------------	----------------------	---	--------------------



賈同知方 御米殼一兩 烏梅肉半兩 依前法服之	康少尹傳 煎烏梅湯尤妙	桂苓白朮丸 治消痰逆止咳嗽散痞滿壅塞開堅結	痛悶推進飲食調和藏無問寒濕濕熱嘔吐瀉痢皆能	開發以令遍身流濕潤燥氣液宣平而愈解酒毒療肺	痿勞嗽水腫腹脹泄瀉不能止者服之利止為度隨證	調之	揀桂 乾生薑各一分 茯苓去皮 半夏一兩 白朮 紅皮	欽定四庫全書 宣明方論	去白澤瀉各半兩	右為末麪糊為丸如小豆大生薑湯下二三十丸日	三服病在膈上食後在下食前在中不計時候或一	法更加黃連半兩 黃蘗二兩 水丸取効愈妙	潤肺散 治小兒膈熱咳嗽痰喘甚者久不瘥者	瓜蒌實一枚去子用穰	右為末以寒食麪和為餅子炙黃為末每服一錢溫	水化乳糖下日三服効乃止
---	--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------	---	------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	--	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------



又方 治寒嗽	麻黃 兩四 官桂 兩一 蠟 錢二	右為末以蠟同煎每服一二錢溫服	寧肺散 治一切寒熱痰盛久新咳嗽不止者	御米殼 兩四 木瓜 三兩 御米殼 一處 用蜜 二兩 五味子 兩一	人參 兩一 皂角 兩二	右為末每服二錢烏梅同煎臨卧食服大効	蟹甲丸 治吐血咳嗽神効	欽定四庫全書	宣明方論	蟹甲 一箇 九肋 一兩 酒 一宿 杏仁 一兩 童子 小便 浸炒 甘遂 一兩	炙 一兩 人參 兩半	右為末煉蜜為丸如桐子大每服十丸至十五丸煎	生薑湯下	又方 用厚朴 一兩 生薑 一兩 製	石膏散 治熱嗽喘甚者	石膏 兩一 甘草 兩半	右為末每服三錢新汲水下又生薑汁蜜調下
--------	---	----------------	--------------------	---	---	-------------------	-------------	--------	------	---	--	----------------------	------	---	------------	---	--------------------



人參半夏丸 治一切痰飲喘嗽不已	白礬 天南星 半夏 各半兩 甘草 二錢 人參 二錢 赤	小豆 四十粒 杏仁 四十粒 猪牙皂角 一錠	右為末用多年小米一升熬粥和丸如桐子大每服	十五丸炒蘿蔔子湯臨卧下	仙人肢丸 治遠年勞嗽不問寒熱痰涎喘滿先服松	花膏下過多服此藥無不効	人參 沙參 玄參 紫團參 丹參 白朮	欽定四庫全書 宣明方論	牡蠣 知母 甘草 各二兩 蛤蚧 一對 頭尾全用河	色 炙黃	右為末用麻黃十五斤去根枸杞子三斤熬成膏丸	如彈子大磁合子內盛臨卧煎生薑自然汁化下一	丸小兒量數加減	松花膏 治三二十年勞嗽預九月間宣利一切痰涎	肺積喘嗽不利	防風 乾生薑 野菊花 芫花 枸杞子 甘
-----------------	--	--	----------------------	-------------	-----------------------	-------------	--------------------	----------------	--	------	----------------------	----------------------	---------	-----------------------	--------	---------------------



草 蒼朮 黃精	右為末取黃精根熬成膏子和藥末丸如彈子大每服細嚼一丸冷水化下臨卧不喫夜飯服藥一粒	辰砂半夏丸 治小兒肺壅痰實咳嗽喘急胸膈痞滿	公忪煩悶痰涎不利呀呷有聲	半夏半兩洗 葶藶水研 杏仁各半兩炒 朱砂 五靈脂各一兩微炒	右為末更研勻生薑汁煮麪糊為丸如桐子大每服十五丸生薑湯下	欽定四庫全書 宣明方論	大百勞散 治一切勞疾肌劣喘息不卧痰涎不食	蛤蚧一對蜜炙 元州鱉甲一箇去裙醋炙 附子兩 人參 柴胡	川乾薑 白茯苓去皮 白朮 茴香 青皮去白 杏仁	尖知母 貝母 陳皮去白 官桂 甘草炙 半夏	生薑製 蒼朮湯浸各一兩蘇木龍膽各半兩	右為末每服二錢水一盞用生薑三片棗二枚烏梅二枚同煎空心稍熱服有汗加小麥二十粒不用鐵
----------------	--	------------------------------	---------------------	--	------------------------------------	------------------------	-----------------------------	---	--	---	---	---



煎	小百勞散 治勞喘嗽不已自汗者	御米殼 不拘多 少炒	右為末每服二錢入烏梅同煎水一盞溫服食後有	汗加小麥三十粒同煎溫服	五味子湯 治胸膈痞滿心腹刺痛短氣噎悶咳嗽痰	唾嘔逆惡心不思飲食溫中益氣	五味子 九兩 良薑 一兩半 紅皮白茴香 去炒各一兩 乾薑 兩半 甘	欽定四庫全書 宣明方論	草 七兩 鹽 一斤	右為末每服一錢百沸湯點空心食前甚者日進三	服	安神散 治遠年近日喘嗽不已	御米殼 蜜炒一兩 人參 陳皮 去白 甘草 炙一兩	右為末每服一錢煎烏梅湯調下臨卧服	勞門	白朮黃耆散 治五心煩自汗四肢痿劣飲食減少肌
---	----------------	-------------------------------	----------------------	-------------	-----------------------	---------------	---	----------------	---	----------------------	---	---------------	---	------------------	----	-----------------------



瘦昏昧	白朮 黃耆 當歸 黃芩 去皮 芍藥 各半 石膏	甘草 各二兩 茯苓 寒水石 各一兩 官桂 一分 人參 川芎 各三分	右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前	一日三服	人參白朮湯方 在消渴門第一方是也 此乃為同不復錄耳	黃連丸 治濕熱流運氣血不通壅滯不散清爽頭目	欽定四庫全書 宣明方論	黃連 好者不拘多少	右為末酒麪糊為丸如小豆大每服二十丸溫水下	不計時候日三服	必効散 治五勞七傷勞役肌瘦不思飲食喘嗽不已	川烏頭 一兩生 天南星 半兩生	右為末每服二錢蘿菔八塊如母指大以水煮熟去	滓食後服嚼	當歸地黃湯 治嗽血衄血大小便血或婦人經候不
-----	---	---	----------------------	------	--	-----------------------	----------------	--------------------------	----------------------	---------	-----------------------	---	----------------------	-------	-----------------------



調月水過多喘嗽者	當歸 芍藥 川芎 白朮 染槐子 黃藥子
各半 兩 生地黃 甘草 茯苓 皮去黃芩 白龍骨 各一兩	兩
右為末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服食前	紫菀散 治勞體熱心寒脉滑短咳嗽婦人多有此疾
口乾眼澁骨痿短氣皆因腸胃燥滯榮衛不能開發玄	府閉塞熱鬱內餘可以開發陰陽宣通澁滯和榮衛順
欽定四庫全書	宣明方論
三焦兼服人參白朮湯	紫菀 桑白皮 桔梗 續斷 甘草 五味子
各一兩 赤小豆 合一	右為末水一大盞藥末五錢青竹茹彈子大同煎至
七分溫服去滓	枳實飲子 治婦人手足煩熱夜卧多汗肌肉黃瘁經
候不調四肢煩倦心腹滿悶狀似勞氣	枳殼 一兩 吳半夏 一兩 湯洗七次以生薑汁浸三日火炒黃色用半夏 紅芍藥



柴胡 各一兩 黃芩 一兩半	右為末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚同煎至八分去滓溫服及治五心煩熱及身體壯熱潮熱續服桃仁煎丸又治月經不調阻滯不通	桃仁 二兩湯洗火炒 川大黃 川朴硝 各二兩 蟲蟲 一兩去翅頭足	右為末用醋五升入金銀鐺內以慢火熬成膏可丸如桐子大當日晚不食夜飯溫酒下一丸不嚼破午際取下赤小豆汁似雞肝小蝦蟇衣未再服候鮮紅	欽定四庫全書 宣明方論	即住服	盧同散 治男子婦人一切咳嗽喘急	款冬花 井泉石 鵝管石 鍾乳石 官桂	甘草 白礬 佛耳草 各等分	右為末每服一錢竹筒子吸喫日三服立效	焚香透膈散 治一切勞咳嗽壅滯胸膈痞滿	雄黃 佛耳草 鵝管石 款冬花 各等分	右為末每服用藥一錢安在香爐子上焚著以開口
---	--	---	---	---	------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------	--	-----------------------------



吸烟在喉中立効	鴛粟神聖散 治男子婦人久新日夜咳嗽不止者	御米殼 一兩用蜜炒 烏梅肉 揀人參 呵子肉 葶	蘼 桑白皮 各半兩	右為細末每服二三錢百沸湯潑臨卧調下	新添三黃丸 治五勞七傷流濕潤燥消渴煩熱甚者	大黃 黃芩 黃連 各等分	右為末煉蜜為丸如桐子大每服二三十丸加至五	欽定四庫全書 宣明方論	十丸生薑湯下不計時候日三服妙	當歸木香湯 治婦人血氣虛勞令人頭目昏眩譫語	聲沉重舌根強硬言語蹇澁口苦不思飲食白日間睡	夜發虛汗神思恍惚夢寐狂言面色痿黃頻發喘咳遍	身疼痛骨節氣走注四肢沉重背脾拘急發寒熱五心	煩燥唇乾多渴胸膈不利喉咽噎塞脰羸瘦弱經曰脉	大為勞宜服此藥	青皮 五加皮 海桐皮 桑白皮 陳皮 地
---------	----------------------	--	--------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------	----------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------	---------------------



宣明方論卷九									
欽定四庫全書									
宣明方論									
骨皮 丁香皮 牡丹皮 棕蘆皮									
已上諸藥全燒為灰末用									
錢 十大 當歸 一 木香 紅芍藥 半									
右為細末每服一錢水一盞入小油二點錢一文同煎至七分溫服如婦人血臟臍下冷痛似刀攪遍身腫滿室女經脉不通用斑猫一兩大黃一兩炒剉二味為末用黃狗膽汁以溫酒送下一錢如臍下痛止心間痰未止不服二味									



欽定四庫全書

宣明方論卷十

金 劉完素 撰

燥門

燥乾者今肺之本燥金受熱化以成燥澁也兼火熱致
金衰耗液而損血鬱而成燥者由風能勝濕熱能耗液
故經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也又燥濕小異也
金燥雖屬秋陰而其性異於寒濕而反同於風熱火也

欽定四庫全書

宣明方論

又加大便乾澁乃大腸受熱化成燥澁經云諸澁枯渴
又如癰瘰中風皆因火熱耗損血液玄腑閉塞不能浸
潤金受火鬱不能發聲

經云肺主聲

肢痛痠戾者風熱濕相

致而遂以偏枯語音澁手足不隨也然中寒吐瀉亡液

而成燥亦以鮮矣亦有寒濕相鬱榮衛不能開發貫注

多成偏枯經曰諸澁枯涸乾勁皴揭屬於燥也 又如

胃膈瘴熱煩滿饑不欲食或瘴成消中善食而瘦或燥

熱鬱甚而成消渴多飲而數小便

或因熱病或恣酒欲誤服熱藥以致脾胃



真陰陽損虛 肝心衰弱也 狂陽火燥其三焦腸胃燥熱怫鬱而水液	不能宣行也周身不得潤澤故瘦悴黃黑也而燥熱消	渴日夜狂飲亦其水液不能浸潤於腸胃之外湯不能	止渴徒注為小便多出俗未明妄為下焦虛冷誤人多	矣 又如周身熱燥鬱故變為雀目或內障癰疽瘡瘍	上為咳嗽喘下為痔痢或停積而濕熱內甚不能傳化	者變為水腫濕脹也世傳消渴病及消瘦弱或小便有	脂液者為消腎也此為三消病也消渴消中消腎經意	欽定四庫全書 宣明方論	但皆熱之所致也	人參白朮湯 治胃膈痺熱煩滿饑不欲食痺成為消	中善食而瘦燥熱鬱甚而成消渴多飲而數小便兼療	一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩風中偏枯酒過積	毒一切腸胃燥澁倦悶壅塞瘡疥痿痺并傷寒雜病產	後煩渴氣液不得宣通	人參 白朮 當歸 芍藥 大黃 山梔子	荊芥穗 薄荷 桔梗 知母 澤瀉 茯苓 各半兩
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	---------------------------	---



皮連翹 瓜蒌根 乾葛 甘草 藿香葉	青木香 官桂 石膏 寒水石 滑石	右為細末每服抄五錢水一茶盞入盆硝半兩生薑	三片煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至十餘錢	得臟腑流利取効如常服以意加減兼服	結滯濕熱內其自利者去了大黃芒硝	絳雪散 治消渴飲水無度小便數者大有神効	黃芩 黃丹 漢防己 括萎實	欽定四庫全書 宣明方論	右為細末每服二錢湯漿水調下臨卧時併進三二服即止	人參散 治消腎善飲而食後數小便溺者	人參 白朮 澤瀉 瓜蒌 桔梗 梔子 連翹 葛根 黃芩 大黃 薄荷 白茯苓	甘草 石膏 滑石 寒水石	右為末入宿砂仁三錢每服五錢水一盞煎至七分	入蜜少許再煎三二沸去滓食前食後服消痞丸
--------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------	---	---------------------	-----------------------------	----------------------------



大黃甘草飲子 治男子婦人一切消渴不能止者	大豆五升 先煮三沸出 大黃 一兩 甘草 大倉者四兩長四指	碎打	右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠糲水	少候大豆軟盛大盆中故冷令病人食豆渴食豆湯	無時停止腑臟自然清潤如渴尚不止再服前藥不	三五日自愈	痢門	欽定四庫全書 宣明方論	總論	夫痢者五臟窘毒結而不散或生冷物或冒寒暑失饑不能開發又傷冷熱等食更或服暖藥過鬱化成利自古人三口白利為寒赤利乃熱其三口悞也今人瘡癰初發刺開乃血多日成膿何為先熱而後寒也叔和云濕多成五泄腸走若雷奔愚醫不悟三口黃者乃熱青利是寒太素曰五泄有澹泄驚泄飡泄濡泄滑泄也此乃五泄五泄者青是感肝木之象其色青赤者
-----------------------------	--	-----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	-----------	------------------------	-----------	---



受心火之氣其色赤白者得西方金肺之氣色白黃者
脾土之色蒼者土氣之下與水隨之其色蒼也三口蒼
曰寒黃赤熱其三口非也若下利熱極頻并窘痛或久
不愈諸藥不能止者須下之以開除濕熱痞閉積滯而
使氣液宣行者宜以逐之兼宣利積熱也

益元散 治身熱吐痢泄瀉腸癖下痢赤白癰閉淋痛

利小便偏主石淋

乃服金石熱藥多待為
砂石從小便淋出者也

腸胃中積聚

寒熱宣積氣通九竅六府生津液去留結消畜水止渴

欽定四庫全書

宣明方論

寬中除煩熱心躁腹脹痛悶補益五藏大養脾胃之氣

此腎水之藏非
為王之府也

理內傷陰痿安魂定魄補五勞七傷一

切虛損主癰瘡驚悸

其幸切
驚動貌

健忘止煩滿短氣藏傷咳

嗽飲食不下肌肉疼痛并口瘡牙齒疳蝕明耳目壯筋

骨通經脉和血氣消水穀保元真解百藥酒食邪毒耐

勞役饑渴宣熱辟中外諸邪所傷久服強志輕身注顏

延壽及解中暑傷寒疫癘饑飽勞損憂愁思慮恚怒驚

恐傳染并汗後遺熱勞復諸疾并解兩感傷寒能令遍



身結滯宣通氣和而愈及婦人下乳催生產後損益血
 衰陰虛熱甚一切熱證兼吹妳乳癰此神驗之仙藥也
 惟孕婦不宜服滑胎也

桂府膩白滑石 六兩 甘草 一兩

右為末每服三錢 蜜少 溫水調下 無蜜 亦得 日三服欲冷

飲者新汲水調下解利傷寒發汗煎葱豆湯調下四

錢 每服水一盞葱白五十箇豉 併合服効為度此藥

是寒涼解散鬱熱苦澀甚不解多服此藥無害但有

欽定四庫全書

宣明方論

益而無損俗惡性寒兼喜得之賤物而不明素問造
 化之理故不能體會神驗之言而多不用焉若以隨

證用之知此方之仙藥也不可闕之 傷寒邪熱太甚

可減省往往投以此藥則汗出自愈裏熱便得宣通

而愈若半在裏半在表可和解而不可發汗吐下者

頓服少許多愈亦獲小效是 涼膈散 和解為主故男

解散拂鬱邪熱甚者小加減 滑石麻黃桂枝 發要

加 蒼朮末 二分同葱豉煎湯調服 汗當 甘草 一兩 蒼朮 二兩 同為末每服二 葱白 五 豆豉 五十枚 同煎至六分去滓 逼毒散 非孕婦 太白散 入



麻黃 二兩去節如神白散或通毒 法煎服世云 神白散 或通毒 散與加 麻黃蒼朮 各等分	濟衆云青龍散 或青龍散 欲更加入 滑石與蒼朮 二倍 最為發汗	之妙藥也 唯正可汗者即用此服 之則轉加利也名為 大通毒散 或解利	煎更兼 涼膈散 調下益元散 酒之類調下四錢不計時侯	肉三服宜食 催產 以產為度或死胎不下者煎 三	一承氣湯 前一服調下五錢須臾更頻用溫油漿調服 不下皆由風熱燥澀緊欬結滯不能舒緩是故產戶	不得自然閉也其藥力至則熱結頓閉而產矣慎不 可溫補而反生燥熱也俗未知產後日夜損血疼痛 怖懼以致神狂氣亂則陰氣損虛邪熱太甚而為諸	欽定四庫全書 宣明方論	證由不明素問造化故不識證候陰陽反以妄為產 後諸虛百損便為虛冷而無熱也誤以熱藥溫補或 見渴甚者不少飲水本為善心為害多矣豈知治病 之道俱在臨時審其藏府六氣虛實明其標本如法 治之而已矣此藥之常多用雖為効至 今以加黃丹 大俗以病異藥同將為妄行反招侮慢	令桃仁色 紅玉散 若青黛 碧色名 碧玉散 若薄荷葉	末一分 雞蘇散 主療並同但以遭 同研名 雞蘇散 愚俗之妄侮慢耳	玄青丸 治下痢勢惡頻并窘痛或久不愈諸方不能 止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣得宣行者 宜以逐之兼宣利積熱酒食積黃瘦中虛水腫腹脹兼
---	---	---	---	--	---	---	--	---	--	--	--



療小兒驚疳積熱乳癖諸證唯泄瀉者勿服									
兩黃連黃蘗大黃甘遂芫花醋炒大戟各半									
兩牽牛四兩取末二兩已上同細末輕粉三分青黛一兩									
右為末勻水丸小豆大初服十九每服加十九丸空腹									
日午臨卧三服以快利為度後常服十五二十丸數									
日後得食久病未痊除者再加取利利後却常服以									
意消息病去為度後隨證止之小兒丸如黍米或麻									
子大退驚疳熱積不下者須常服十丸									
欽定四庫全書 宣明方論									
阿膠梅連丸 治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸證									
金井阿膠									
淨草灰炒透明白別									
烏梅肉									
去核									
黃蘗									
劉									
黃連									
當歸									
焙									
赤芍藥									
乾薑									
炮									
赤茯苓									
半兩									
各等									
分									
右為末入阿膠研勻水丸桐子大溫米飲下十九食									
前兼夜五六服小兒丸如菉豆忌油膩脂肥諸物也									
牛黃神金丸 治大人小兒嘔吐瀉痢無問久新赤白									
諸色或渴或不渴小便澁或不澁并小兒驚疳積熱瘰									



癖堅積腹滿硬痛作發往來亦能寬膈消食	輕粉 粉霜 硃砂 雄黃 信砂
巴豆 黃丹 蠟	右先研粉霜次旋入硃砂研細下雄黃朱砂信砂再
研下丹粉研勻別研芭豆爛為油與前藥研勻近火	上炙控熱別研蠟軟入藥勻搓作劑旋丸小豆大新
水下一丸小兒黍米麻子大或止吐瀉痢疾調甘露	散 是桂苓 甘露飲 或益元散亦得
欽定四庫全書	宣明方論
芍藥藥皮丸 治一切濕熱惡痢頻年窘痛無問膿血	並宜服之
芍藥 黃蘗 當歸 黃連	右為末水丸如小豆大溫水下三四十丸每日兼夜
五六服忌油膩脂肥發熱等物	二勝丸 治瀉痢虛損問久新者加減服之
淡豉 白朮 甘草	右同杵為膏丸如桐子大每服三丸或四丸以米飲湯



下如未愈及赤白痢腹滿脇痛者加一二丸	杏仁丸 治一切赤白瀉痢腹痛裏急後重諸證	杏仁 四十 九箇 芭豆 四十 九箇 去皮	右以藥同燒存性研細如泥用蠟鎔和為丸如桐子	大每服一二丸煎大黃湯間日下之	白朮聖散子 治一切瀉痢久不瘥并滯積疼腫者亦	治	御米殼 二兩 蜜炒 當歸 肉豆蔻 縮砂 石榴皮	欽定四庫全書 宣明方論	訶子 乾薑 炮 陳皮 白朮 甘草 芍藥 各等 分	右為細末每服二錢水一大盞入乳汁少許去滓服	勝金膏 治一切泄瀉痢不已胃脉浮滑赤白疼痛不	已者微小者立止	芭豆皮 楮實葉 同燒存 性等分	右為末鎔蠟丸如菉豆大每服三四丸米飲湯下	大聖金真散 治一切寒熱赤白瀉痢諸證	御米殼 半斤 炒 甘草 一兩 炙 乾薑 當歸 各三 錢 醋石榴
-------------------	---------------------	--	----------------------	----------------	-----------------------	---	--	----------------	--	----------------------	-----------------------	---------	------------------------------------	---------------------	-------------------	--



皮一兩 陳皮去白 茯苓各五錢	右為末每服二錢水一盞小兒半盞每一盞煎至七分食前忌油膩生冷毒物等	車前子散一名斷痢散 治一切痢不止者	車前子不以多少炒香	右為末每服二錢米飲調下食前空心服	象骨散 治脾胃虛弱心腹脹滿水穀不消黃瘦疼酸	食輒嘔吐霍亂泄瀉膿血四肢沉重一切後重裏急夜	欽定四庫全書 宣明方論	起頻併不思飲食皆可治之	象骨四兩 訶子取肉二兩 肉豆蔻一兩 枳殼一兩 乾薑半兩	右為末每服三錢水一盞半煎至八分微冷溫服食	前日三服	海蛤玉粉散 治血痢解藏中積毒熱	海蛤二十箇炒焦研末	右為末每服二錢入蜜少許冷水調服不拘時候	宣明方論卷十
--	--	---	---------------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------	---	-----------------------------	-------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------



欽定四庫全書

宣明方論卷十一

金 劉完素 撰

婦入門

總論

素問曰目得血而能視耳得血而能聽指得血而能攝
掌得血而能握足得血而能步藏得血而能液腑得血
而能氣然血所通流則氣亦然也氣血宣行其中神自

欽定四庫全書

宣明方論

清利而應機能用矣

素問氣血人之神也不可不謹調護然婦人以血藏為
基本也夫婦人之病手太陽足少陰小腸心之經絡為
裏表起自任衝之脉於經脉之下以上毛際循腹裏關
元上至咽喉頤循面目過帶脉貫臍而止以婦人月水
一月一來如期謂之月信其不來則風熱傷於經血故
血在內不通或內受邪熱脾胃虛損不能飲食食既不
克榮衛凝滯肌膚黃燥面不光澤或大腸虛變為下痢



欽定四庫全書

宣明方論

流入關元致絕子嗣為子藏冷虛勞損而病帶下起於胞內則夫帶下之造化但分經絡標本殊異為病之本氣也其病所發正在過帶脉之分而淋瀝以下故曰帶下也赤白之說者無定也法曰頭目昏眩口苦舌乾咽喉不利小便赤色大小便秘澀滯脉實而數者皆熱證也凡白帶下者亦多有之為病寒豈能然素問亢則害承廼制謂亢過極而反兼勝已之化制其甚也則如火煉金熱極則反化為水及六月熱極則物反出液而濕潤林木流津故肝熱則出泣心熱則出汗脾熱則出涎肺熱則出涕腎熱甚則唾大凡俗論已煎熱湯煮極則沸溢及熱氣重蒸於物而生津液也故下部任脉濕熱甚者津液涌而溢已為帶下見俗醫白帶下者但依方論而用辛熱之藥雖有誤中致令鬱結熱聚不能宣通舊病轉加世傳誤之久矣

人參白朮散 治徧身燥濕相搏玄府緻密遂令公悸發渴飲食減少不為肌膚



人參三錢 白朮七錢 薄荷半兩 縮砂仁三錢 生地黄 茯苓 去甘草各半兩 黃芩一錢 滑石三兩 藿香半錢 石膏一兩	右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服食前日進二三服	白朮湯 治妊娠血液虛衰痿弱難以運動氣滯痺麻榮衛不能通宣常服養液潤燥開通結滯令血昌盛	白朮三 寒水石 當歸 黃芩 芍藥 人參	石膏 乾葛 防風 乾薑 藿香 甘草 茯苓	欽定四庫全書 宣明方論	苓一兩 木香	崔宣武方用白朮一兩	右為末每服三錢水一盞生薑三片同煎至五分去滓溫服食前日三服	二氣湯 治月水不調斷絕不產面黃肌瘦恒不思美食有燥熱以柴胡飲子相參服之	大黃四兩別為末醋一升慢火熬成膏子 當歸二兩 白芍藥二兩	右為末以膏子和丸如桐子大每服二十九淡醋湯
---	----------------------------------	--	---	-----------------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---	---	-----------------------------



下食前日進三服如月水不通加入乾漆三錢炒焦用沒藥半兩砂研三錢官桂二錢斑猫三錢去頭足炒熟用本草云此用熬不可生用則吐瀉	當歸龍骨丸 治月事失常經水過多及帶下淋瀝無問久新赤白諸證并產後惡物不止或孕婦惡露胎痛	動不安及大小兒痢瀉並宜服之	當歸 芍藥 黃連 染槐子 艾葉炒各半兩龍骨 黃蘗各一兩茯苓半兩木香一分	右末滴水為丸如小豆大溫米飲下三四十九食前	欽定四庫全書 宣明方論	日三四服	當歸人參散 治產後虛損痿弱難以運動疼痛胸滿不思飲食	當歸 白朮 黃芩 芍藥 大黃 茯苓去皮陳皮各半兩人參 黃耆剉川芎 厚朴去皮薑製官桂肉	錢各三甘草一兩枳殼四錢去穢炒	右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至六分去滓不計時候溫服如大便悶以此散下和中丸
---	---	----------------------	--	-----------------------------	------------------------	-------------	----------------------------------	---	--	--



三聖散 治產後下血痢不止	烏魚骨 炒 燒綿灰 血餘灰 汗脂者各等分	右為細末每服煎石榴皮湯調下熱服一錢	沒藥丹 治產後惡血不下月候不行血刺腰腹急痛	或一切腸垢沉積堅滿痞痛作發往來或燥熱煩渴喘	急悶亂肢體疼倦大小人心腹暴痛孕婦自利惡物過	多不宜服燥熱極甚血液衰竭不可强行宜調氣養血	細詳證用	欽定四庫全書 宣明方論	沒藥 一錢 當歸 一錢 大黃 一兩 牽牛 二兩 輕粉 一錢 官桂 一分	同研 硃砂 一錢 同研	右研勻醋麪糊為丸如小豆大每服五丸至十丸溫	水下以快利取積病下為度雖利後病未痊者後再	加取利止心腹急痛煎乳香下未止取大便利	黃藥子散 治月事不止煩渴悶亂心腹急痛肢體困	倦不美飲食	黃藥子 當歸 芍藥 生地黃 黃芩 人參
--------------	--	-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------	----------------	---	----------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-------	---------------------



白朮 知母 石膏 各一兩 川芎 桔梗 各一分 甘草	一兩紫菀 槐花子 柴胡 各一分 右為麤末抄三錢水一盞煎至七分濾汁溫服食前 但一服	大延胡索散 治婦人經病并產後腹痛或腹滿喘悶 或癥瘕癖塊及一切心腹暴痛	延胡索 當歸 赤芍藥 京三稜 川棟子 蓬莪茂 官桂 厚朴 木香 川芎 各一分 桔梗	欽定四庫全書 宣明方論 黃芩 大黃 各半兩 甘草 一兩 檳榔 一錢	右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓熱服食前 日三服惡物過多去大黃官桂加入黃藥子染槐子	龍骨各半兩如前法或平人心胃急痛如本方煎服 得利尤好	枳實檳榔丸 治安養胎氣調和經候癥瘕痞塊有似 妊孕可以久服血氣通和兼寬膈美食	枳實 檳榔 黃連 黃蘗 黃芩 當歸 阿
---	---	---------------------------------------	---	--	--	------------------------------	--	---------------------



膠灰炒木香各半	右為末水和丸如小豆大溫米飲下三十丸不計時 候日進三服	軟金花丸 治心胸腰腹急痛或淋病并產前後經病 刺痛乾嘔氣勞往來寒熱四肢困倦夜多盜汗者兼治	血積食積	當歸半兩乾漆二錢輕粉 斑猫生全用硃砂	粉霜各一錢芭豆二錢去油	欽定四庫全書 宣明方論	右為末同研細棗肉為膏旋丸如菉豆大每服一九 新水下病甚者加服看虛實	大紅花丸 治婦人血積聚癥瘕經絡注滯	川大黃 紅花各二兩蟲蟲十箇去翅足	右取大黃七錢醋熬成膏和藥丸如桐子大每服五 七丸溫酒下食後日三服	黃芩湯 治婦人孕胎不安	白朮 黃芩各等分
--	---------------------------------------	--	-------------	--	--	------------------------	---	--------------------------	---	--	--------------------	--------------------------------



右為末每服三錢水二盞當歸一根同煎至一盞稍溫服	海蛤丸 治婦人小便濁敗赤白帶下五淋臍腹疼痛寒熱口乾舌澀不思飲食	海蛤 半夏 芫花醋炒 紅娘子去翅 訶子炒 玄胡	索 川棟子麩裏煨 茴香炒各一兩 乳香三錢 硃砂半兩	砂半入藥 沒藥各一兩 當歸一兩	右為末醋煮麪糊為丸如小豆大每服五丸至十丸	欽定四庫全書 宣明方論	醋湯下量人病虛實加減	烏金散 治婦人諸疾寒熱頭痛一切等疾	烏金子 肉桂 蒲黃 當歸 蝨蟲 血餘灰	水蛭 鯉魚灰 木香 青皮 皂角大者炙各半兩 芍	藥半兩 芫花三兩 芭豆一錢 硃砂少許 棕皮灰 紅花	一兩 川烏頭半兩	右為末每服半錢加至一錢煎生薑湯調下空心食前忌油膩物
-------------------------------	--	---	--	---	-----------------------------	------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------------	---	--	--------------------------------	----------------------------------



伏龍肝散 治婦人血崩不止或結作片者	芎藭 兩一 生地黃 分一 阿膠 錢八 當歸 兩一 續斷 分一 地榆	刺薊根 兩一 伏龍肝 錢七 青竹茹 錢八	右為末每服三錢水一盞半煎至一盞溫服日五服	不計時候後服補藥	阿膠丸	阿膠 鱉甲 分六 續斷 分五 龍骨 半一兩 芎藭 分六 地膽 分四	鹿茸 分五 烏魚骨 錢八 丹參 錢六 龜甲 錢一	欽定四庫全書 宣明方論	右為末醋麪糊為丸如桐子大每服三十丸艾湯下	日進三四服	麝香杏仁散 治婦人陰瘡	麝香 許少 杏仁 不以多少 燒存性	右為細末如瘡口深用小布袋子二箇盛藥滿繫口	臨上藥灸熱安在陰內立愈	硃砂斑猫丸 治婦人產後喫硬食變作血氣食塊無	問久新
-------------------	--	---	----------------------	----------	-----	--	--	----------------	----------------------	-------	-------------	---	----------------------	-------------	-----------------------	-----



宣明方論卷十一									
欽定四庫全書									
宣明方論									
之或大便或小便不多出也									
丸溫酒下初更喫平明取下血化水十年之病皆治									
右為細末蜜和丸分作十五丸每服一丸至二丸三									
斑猫 全 紅娘子 錢二 水蛭 錢一									
皂角末 錢二 芭豆 錢一 硃砂 錢一 礞砂 錢一 乾蝎 錢一									



欽定四庫全書

宣明方論卷十二

金 劉完素 撰

補養門

補養寒論

素問云諸寒收引皆屬於腎腎者少陰也少陰者至陰也至者為極也少陰者冬脉所旺居北而屬水為寒為歸藏為周密寒中收引拘縮寒之用也其病上下所生

欽定四庫全書

宣明方論

水澄徹冷清者不濁其氣寒冷水穀不消化吐利清冷為病則如天氣寒而水自清也

素問云太陽受寒血凝為痙太陰受寒氣聚為疝但脉急而寒之象也急主於痛故緊急也又內經云數則為熱遲則為寒諸陽為熱諸陰為寒脉當遲緩寒毒內鬱洪數為熱所養心之脉也寒氣生清水清就於濕故以下利清白此乃腸胃寒化物失常熱則壅澀不通寒勝則火衰火衰金旺吐利腥穢腥者金肺之屬也熱則喜



酸寒則水腥只如四肢逆冷堅痞腹滿屈伸不便禁固
戰慄謂陰水主之舒倦不便診其脉沉伏而遲病之證
也若身涼不渴而寒蹇足而卧惡聞人聲不欲言皆陰
證也陰陽停則和偏則病如陽氣暴絕陰氣獨勝則為
寒證陰氣暴絕陽氣獨勝則為熱證

經曰陽盛陰虛汗之而死陰勝陽虛下之而死若陽實
外熱陰虛內寒陰實內熱陽虛外寒陽實伐其陽當涼
膈散承氣湯主之陰實伐其陰當白朮散四逆湯主之

欽定四庫全書

宣明方論

論曰

大凡治病必求標本受先者為本次者為標此為兼證
故知逆與從正行無間知標本者萬舉萬當不知標本
者是謂妄行也本病相傳先以治其急六氣為本三陰
三陽為標故病氣為本受病經絡藏府謂之標也

補養類

防風當歸飲子 治脾腎真陰損虛肝心風熱鬱甚陽
陰虛內寒陰實內熱上實下虛怯弱不耐或表熱而身



熱惡寒或裏熱而躁熱煩渴或邪熱半在表半在裏進
退出入不已而為寒熱往來或表多則惡寒裏多則發
熱或表之陽分陽和正氣與邪相助并甚於裏畜熱極
深而外無陽氣裏熱極甚陽極似陰而寒戰腹滿煩渴
者或裏之陰分正氣反助邪氣并甚於表則躁熱煩渴
而汗出也或邪熱壅塞者或煩熱痛者或熱結極甚陽
氣不通而反覺冷痛或中外熱鬱煩躁甚喜涼畏熱者
或熱極闕寒不得宣通陽極似陰中外喜熱而反畏寒

欽定四庫全書

宣明方論

者或躁熱煩渴者或濕熱極甚而腹滿不渴者或一切
風熱壅滯頭目昏眩暗風眼黑偏正頭疼口乾鼻塞耳
鳴及聾咽嗑不利或目赤腫痛口瘡舌痺或上氣痰嗽
心脇鬱痞腸胃燥澀小便溺淋悶或是皮膚瘙癢手足
麻痺又或筋脉拘急肢體倦怠或渾身肌肉跳動心忪
驚悸或口眼喎斜語言蹇澀或狂妄昏惑健忘失志及
或腸胃燥熱怫鬱而飢不欲食或濕熱內餘而消穀善
飢然能食而反瘦弱或誤服燥熱毒藥及妄食熱物過



多而耗損脾腎則風熱鬱甚而多有如此不必全見也
 無問自病及中燥熱毒藥所使者並宜宣通氣血調順
 飲食久服之舊病除去新病不生設虛人常服補益功
 驗自可知矣

當歸 大黃 柴胡 人參 黃芩 甘草 芍

藥 各一 滑石 六

右停每服三錢至五錢水一大盞生薑三片同煎至

七分去渣溫服下補校 此方未為至當恐當時傳寫之誤

欽定四庫全書

宣明方論

雙芝丸 治補精氣填骨髓壯筋骨助五臟調六腑久

服注顏不老

熟乾地黄 焙取末 石斛 去根 五味子 焙 黃耆 剉 肉蓯

蓉 酒浸 牛膝 酒浸 杜仲 蜜水 兔絲子 酒浸三 麋鹿角霜

半斤沉香 三錢 麝香 二錢 人參 白茯苓 去皮 覆盆子

乾山藥 木瓜 天麻 酒浸 秦芫 已上一兩 薏苡仁 二兩

炒

右為末煉蜜為丸如桐子大每服二十九至三四十



丸溫酒下鹽湯米飲亦可凡年五十歲已上加入黑附子以青鹽湯 鹿角一大對去頂三指硫黃半斤以上用些油釜中以水	同煮令微沸勿太急甚水耗只旋添溫水須用水以	備添也煉令角膠汁出盡其角如霜以手捻如膩粉	乃盛之取用勿令穢汚也	內固丹 治諸補養腎氣調和脾臟壽高者常服筋骨	勁健渾如壯士	肉蓯蓉酒浸茴香炒一兩破故紙 胡蘆巴炒巴戟去心	欽定四庫全書 宣明方論	黑附子炮川棟子 胡桃仁各四兩 麝香少	右為末研桃仁為膏餘藥末和勻酒麪糊為丸如桐	子大每服十丸至三十丸溫酒鹽湯下食前虛者加	至五七十丸此藥明目補腎烏鬚進美食空心	大補丸 治男子脾腎不足不問久新者	陳莖子 陳蘿蔔已上蕤仁去皮各半兩川山甲七片	右為細末用蜜和丸如櫻桃大每服一九溫酒送下
---	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	------------------------------	---------------	---	--------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------	---	-----------------------------



食前空心	蛤蚧散 治脾胃氣攻心刺痛者	蛤蚧 一對 酒炙乳香 木香 白茯苓 丁香 茴香	各一錢 川山甲 二錢	右為細末每服一錢好溫酒調下空心食前	金鑠丹 治男子本藏虛冷夜夢鬼交者	龍骨 水飛 兔絲子 一兩 破故紙 菹子 澤瀉 牡蠣	各半兩 麝香 少許	欽定四庫全書 宣明方論	右為末酒麪糊為丸如桐子大每服三十丸溫酒下	空心食前日三服	調中丸 治脾胃虛止嘔吐寬利胸膈	青皮 紅皮 各一兩 大黃 一兩 牽牛 三兩	右為細末滴水 和丸 如桐子大每服三二十丸溫水	下空心食前	水中金丹 治元藏氣虛不足夢寐陰人走失精氣	陽起石 研 木香 乳香 研 青鹽 各一分 茴香 炒 骨碎
------	---------------	--	--	-------------------	------------------	---	---	----------------	----------------------	---------	-----------------	--	---------------------------------------	-------	----------------------	--



補炒杜仲各半兩去皮白龍骨一兩緊者槌碎絹袋盛大豆蒸熟取 出焙黃戍腎一對酒一升煮入白茯苓一兩與 乾研熟切作片子焙	右為細末酒麪糊和丸如皂子大每服二丸溫酒下	空心忌房室	和氣地黃湯 治沉積氣結不散調養榮衛補順陰陽	常服以代湯茶酒果	木香一揀桂皮去茯苓去白芥子各一錢白朮乾	山藥 川芎 當歸各一桂花各半縮砂仁各半甘	欽定四庫全書 宣明方論	草半兩	右為細末入麝香少許研勻用數重油紙或甕器內	密封起每用蜜二斤錫飴一斤溫好甜水五升化勻	開抄前藥并杏仁十枚去皮尖洗淨炒香燂槌碎濕	地黃根計切長寸約取汁半盞溫服	白朮調中湯 治中寒痞悶急痛寒濕相搏吐瀉腹痛	上不所出水液澄徹清冷穀不化小便清白不澁身涼 不渴本末不經有見陽熱證其脉遲者是也此因飲食 冷物過多陰勝陽衰而為中寒也或冷熱相擊而反陽 氣拂鬱不能宣散拂熱內作以成熟證者不可亦言為
---	-----------------------------	--------------	------------------------------	-----------------	--	--	--------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------------	---



欽定四庫全書		宣明方論		人參白朮散 此方證同調中湯治法		右為末白湯化蜜少許調下二錢每日三服煉蜜和就每兩作十九名白朮調中丸小兒一服分三服		白朮 茯苓 皮去紅皮 白澤瀉 各半 乾薑 炮 官桂 皮去		縮砂仁 藿香 各一分 甘草 兩一		右為末白湯化蜜少許調下二錢每日三服煉蜜和就每兩作十九名白朮調中丸小兒一服分三服		人參白朮散 此方證同調中湯治法		欽定四庫全書		宣明方論		人參白朮 茯苓 甘草 橘皮 葛根 澤瀉 滑石 藿香 各半		右為末每服三錢水一盞煎至六分溫服妊婦加蒼朮三五片熱服		白朮散 治傷寒下後餘熱以藥下之大過胃中虛熱飲水無力也當生胃中津液多服此藥		人參 白朮 木香 白茯苓 甘草 炙 藿香葉		乾葛 二兩 劉各	
--------	--	------	--	-----------------	--	---	--	------------------------------	--	------------------	--	---	--	-----------------	--	--------	--	------	--	------------------------------	--	----------------------------	--	--------------------------------------	--	-----------------------	--	----------	--



右為末每服一錢至二錢水一盞煎至五分溫服如 飲水者多煎與之無時也	丁香附子散 治脾胃虛弱胸膈痞結吐逆不止	附子一兩母丁香四十生薑半斤取自 然汁半碗	右用附子鑽孔四十九以丁香刺上面填內將生薑	汁用文武火熬盡又用大蘿蔔一箇取一穴子入附	子又填內將蘿蔔蓋之又用文武桑柴火燒香熟為	度取出切附子作片子焙乾搗為細末每服一錢米	欽定四庫全書 宣明方論	湯一盞調下日進三服	何首烏丸 治男子元藏虛損髮白再黑填精	何首烏半斤肉蓯蓉六兩牛膝四兩	右將何首烏半斤用棗一層何首烏甑內蒸棗軟用	切焙同為末棗肉和丸如桐子大每服五七丸嚼馬	練子服酒送食前一服加一丸日三服至四十九即	止却減至數効如神妙	煨腎丸 治男子腰膝疼夜多小便者
---	----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	------------------	---------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------



川楝子 馬楝花 破故紙 胡蘆巴 茴香 各炒	等分 右除茴香外四味酒浸同為末煮麪糊為丸如桐子 大每服十丸至二十丸溫酒下空心食前	神仙楮實丸 治積冷氣衝心胸及背有虵蟲疼痛痔 瘻瘰癧氣塊心腹脹滿兩肋氣急食不消化上逆氣奔 於心并疝氣下墜飲食不得吐水嘔逆上氣咳嗽眼	花少力心虛健忘冷風偏風等疾坐則思睡起則頭眩	欽定四庫全書 宣明方論	男子冷氣腰疼膝痛冷痺風頑陰汗盜汗夜多小便洩 利陽道衰弱婦人月水不通小便冷痛赤白帶下一切 冷疾無問大小能明目益力輕身補髓益精	楮實子 一升淘去泥微炒 官桂 四兩去皮 牛膝 半斤酒浸三日 乾薑 三兩	炮 右為末酒麪糊為丸如桐子大每服二十丸溫酒空 心食前鹽湯亦得	補中丸 治一切氣疾心腹疔痛嘔吐氣逆不思美食
--	---	---	------------------------------	---	--	--	---	------------------------------



厚朴生薑製香乾薑炮陳皮去白茯苓去皮甘草炙紫各等分 右為末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸空心白湯化下細嚼亦得 華澄茄丸 治中焦痞塞氣逆上攻心腹疔痛吐逆下痢美飲食	華澄茄半兩良薑二兩神麴炒青皮去白官桂去皮各一兩阿 魏裏煨熟	右為末醋麪糊為丸如桐子大每服二十丸生薑湯下不計時候 欽定四庫全書 宣明方論	宣明方論卷十二
--	---	--	----------------



欽定四庫全書

宣明方論卷十三

金 劉完素 撰

諸痛門

總論

夫痛者經脉流行不止環周不休寒氣入經而稽遲血
泣凝而不行客於脉外血少客脉中氣不通故卒然而
痛其痛者卒然而止或痛甚而不休或痛甚而可按或

欽定四庫全書

宣明方論

按之而痛止或按之而無益或喘痛動應手或與心背
相引而痛或脇肋與少腹相引而痛或腹痛或引陰股
宿昔而成積或卒然而痛死不知人而少間復生或痛
而閉不通者諸痛各不同形經日寒氣客於脉外則脉
寒脉寒則蹇縮蹇縮則脉絀音督脉絀急則外引小腹衛
氣不得通流故卒然而痛得炅則痛止寒氣客於經脉
之中相薄則脉滿滿則血氣亂故痛而不可按寒氣客
於腸胃之間膜原之下血不得散小腹急引故痛按之



血氣散痛乃止也脇肋痛者寒氣客於厥陰之絡脉也									
背與心相引痛者寒氣客於背俞之脉注於心相引痛									
寒氣客於陰股血泣在小腹相引痛卒然而痛死者寒									
氣客於五臟厥逆上壅陰氣竭陽氣未入故卒然痛死									
氣復反則生矣視其五色黃赤為熱白青則為寒青黑									
為痛經日感虛乃陷下其留於筋骨之間寒多則筋彎									
骨痛熱則骨弛肉消但痛痒瘡瘍癰痛腫血聚者皆屬									
心火熱也不可一例傷寒凡治痛者先察本次明經絡									
欽定四庫全書									
宣明方論									
皮部虛實用藥無悞矣									
神砂一粒丹 治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者									
附子 一兩 鬱金 橘紅 等附子停用									
右為末醋麪糊為丸如酸棗大以朱砂為衣每服一									
丸男子酒下婦人醋湯下服罷又服散子									
神聖代鍼散									
乳香 沒藥 當歸 香白芷 川芎 各半									
一兩去 芫青									
足翹									



右為細末更研每服一字病甚者半錢先點好茶一盞次摻藥末在茶上不得吹攪立地細細急呷之心驚欲死者小腸氣搐得如角弓膀胱腫硬一切氣刺虛痛并婦人血癖血迷血暈血刺血衝心胎衣不下難產但一切痛疾服之大有神効只是要詳疾證用藥	茴香丸 治男子婦人臍腹疼痛刺胸膈不止者	茴香炒 良薑 官桂各半 蒼朮一兩 兩 汁浸	欽定四庫全書 宣明方論	右為末酒煮麪糊和丸如桐子大每服十丸生薑湯止痛溫酒下空心食後	趁痛丸 治一切走注疼痛婦人經脉住滯水腫腹脹	甘遂 大戟 芫花 黑牽牛各等分	右為末以蕎麥同末和作餅子扞切為棋子煮熟服之得利為度每服一錢加減相虛實	六合散 治一切燥結汗後餘熱宣轉不通亦名金鑰	匙散并治小腸氣結心腹滿胸中結痞走注疼痛
--	----------------------------	---	--	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	----------------------------



大黃 一兩 紙 生 輕粉 一錢 生 白牽牛 半兩 生 黑牽牛 微 炒 甘遂 各半 兩 檳	右為細末每服一錢密水調下服量虛實加減	定痛丸 治打撲損傷筋骨疼痛等如打撲骨損者先	整骨定用竹夾然後先用好酒下麻黃三錢然後服藥	大効	乳香 一分 川椒 當歸 沒藥 赤芍藥 川芎	自然銅	欽定四庫全書 宣明方論	右為末鎔蠟為丸如彈子大細嚼酒下一丸骨碎者 先用竹夾夾定三五日依舊小可與服	香殼散 治小腸氣臍腹攪痛急陰股中疼悶不省人	事	舶上茴香 用鹽炒 枳殼 各一兩 沒藥 半兩	右為末每服一錢溫熱酒下不計時候併二三服	金鍼丸 亦名陸神丸 治陽絕痞氣心腹不忍者	丁香 木香 乳香 阿魏 輕粉 骨碎補 去毛
--	---------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------	---	------------	------------------------	--	------------------------------	----------	---	----------------------------	--	---



檳榔 官桂 桂心 芭豆 去皮 杏仁 去皮 不灰木	肉豆蔻 陽起石 硃砂 各等分	右為細末水麪糊為丸如小豆大每服一丸針穿作	孔子小油內裹過燈焰內燎遍於油中蘸死嚼生薑	下不計時候日三服虛實加減	一粒金丹 治腰膝走注疼痛如虎噬	草烏頭 五靈脂 各一觔 木鼈子 四兩 白膠香 半觔 地龍	四兩去土炒 細墨 一兩 乳香 一兩 當歸 二兩 沒藥 二兩 麝香 一錢	欽定四庫全書 宣明方論	右為末再研一千下糯米麪糊和丸如桐子大每服	一九至二丸溫酒下喫藥罷遍身微汗立驗	沒藥散 治一切心肚疼痛不可忍者	沒藥 乳香 別研 各三錢 川山甲 五錢 木鼈子 四錢	右為細末每服半錢一錢酒大半盞同煎溫服不計	時候	痔門	痔瘻總論
--	-------------------------------	----------------------	----------------------	--------------	-----------------	---	---	----------------	----------------------	-------------------	-----------------	--	----------------------	----	----	------



夫腸風痔病者所發手太陰手陽明經以應動脈謂肺與大腸為表裏主為傳道以行糟粕腸風痔病有五種其證亦異蓋因陽氣虛而玄腑踈風邪乘而熱自生風濕邪熱攻於腸中致使大便澁而燥熱鬱血熱散而流溢衝浸浚腸裏故以先血後便熱在下先便後血熱在上血後便久而不愈乃作痔	素問云因而飽食舐脉橫解房室勞傷腸癖為痔風熱不散穀氣流溢傳於下部故令肛門腫滿結如梅李核	欽定四庫全書 宣明方論	甚者而變成瘻也五臟切宜保養勿令受邪	香殼丸 治濕熱內甚因而飽食腸癖成痔以而成瘻	速服悉愈之	木香 黃蘗 各三錢 枳殼 去穢炒 厚朴 各半兩 黃連 一兩 蝟	皮 一箇 當歸 四錢 荊芥穗 三錢	右為末麪糊為丸如桐子大每服二三十丸溫水食	前日三服	槿藤子丸 治腸風瀉血濕熱內甚因為諸痔以而不
---	---	------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------	--	--------------------------	-----------------------------	-------------	------------------------------



治乃變成癭	黃耆 枳實 槐花 荊芥穗 鳳眼草 已上各二兩	槁藤子 一對 皂子 三百箇	右為細末麪糊為丸如桐子大每服二三十丸空心	酒下米飲亦得忌油膩冷猪魚臭血物等	烏荊丸 治腸風痔疾大腸闕澁	川烏頭 二兩 荊芥穗 四兩	右為末醋麪糊為丸每服二三十丸如桐子大溫水	欽定四庫全書 宣明方論	下日三服	黃耆葛花丸 治腸中久積熱痔瘻下血疼痛	黃耆 葛花 黃赤小豆花 各一兩 白芍 赤芍藥	黃芩 當歸 各三分 丹皮 一箇 檳榔 白蒺梨 皂	角子仁 炒各半兩 生地黃 焙一兩	右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十丸至三十丸	煎桑白皮湯下食前槐子煎湯下亦得	黃連散 治腸風下血疼痛不止
-------	---------------------------------------	---	----------------------	------------------	---------------	---	----------------------	----------------	------	--------------------	---------------------------------------	--	--	----------------------	-----------------	---------------



雞冠花 黃連 貫衆 川大黃 烏梅 各一 草 三分 甘	右為末每服二錢用溫米飲調下日三服不計時候	乳香沒藥散 治五種腸風痔瘻無問久新	宣黃連 白礬 各一 兩 各一 穀精草 兩 半 石榴 一箇用刀子 面取子三停一停次將黃連白礬 碎內入石榴內用元蓋子合用	右以濕紙一張裹了後用膠泥拍作餅子裹石榴以 炭火燒通赤為度取出去泥紙次將穀精草於銚子	欽定四庫全書 宣明方論	內炒焦黃為度與石榴研細後入麝香一錢乳香二 錢沒藥一錢研細拌勻每服一錢熱酒小半盞調下 日三服	木香厚朴湯 治痔瘻脫肛腸胃間冷腹脇虛脹不思 飲食	木香 桂心 桃仁 陳皮 厚朴 各一 兩 各一 肉豆蔻 赤石脂 各半 皂角子 三兩去皮 大附 三分 兩 各半 子醋炙黃 炮	右為末每服二錢溫粥飲調下食前
---	-----------------------------	--------------------------	---	---	-------------------------------------	--	--	--	-----------------------



瘧門

瘧疾總論

素問云瘧瘧皆生於風其蓄作有時何氣使然夫陰陽
上下交爭虛實相移也陽併於陰陰實陽虛寒慄鼓頷
此皆夏傷於暑熱氣藏於皮膚之內腸胃之外腠理開
得秋氣汗出遇風得之與衛氣併衛氣晝行陽夜行陰
氣得陽外出得陰內薄外內相薄是以日作也 其有
間日者氣深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭

欽定四庫全書

宣明方論

不得出是以間日作也其作晏與早者邪氣客於風府
循膂而下衛氣一日一夜大會於風府其日下一節先
客於脊背每至風府則腠理開腠理開邪氣入邪氣入
則病作晏也

大寒者陰氣也風者陽氣也先傷寒而後傷風故曰先
寒而後熱名曰寒瘧先傷於風後傷寒故曰先熱而後
寒名曰溫瘧其熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨勝少氣
煩冤手足熱欲吐名曰苦瘧有餘則瀉不足則補熱為有



餘寒為不足已得火不能溫熱已冰水不涼氣陰勝併於陽陽勝併於陰陰勝則寒陽勝則熱故瘧者陰陽風寒虛實邪氣不常之所作也 辟邪丹 治嵐瘴鬼瘧食瘧併月頻日者 菴豆 雄黑豆 各四十粒 信砒 半錢 黃丹 一錢 硃砂 二粒 右為末同入乳鉢內滴水為丸分作三十粒每服一粒已用東南桃心取七枝研汁將井花水早晨日欲	欽定四庫全書 宣明方論 出不出向日吞之醋湯亦得已發日服	斬邪丹 治諸般瘧疾無時不止者 菴豆 小豆 三十粒口 硃砂 信砒 各一錢	右為末同研細滴水丸勻分作十丸每服一丸已早晨服夜間於北斗下香水獻至早晨用新倒流水送下	斷魔如聖丹 信砒 一錢 蜘蛛 大者 雄黑豆 四十粒
--	--	---	--	---



右為末滴水丸如豌豆大如來日發於今晚夜北 斗下獻於早晨已紙裹於耳內扎一丸立見愈神聖 一粒可醫三人	辰砂丸 治一切脾胃虛癰邪熱毒者	信砒 甘草 各一錢 硃砂 二錢 大豆 四十粒	右為末滴水和丸勻分作四十九服發日早晨日欲 出煎桃心湯下忌熱物	癰神丹 治諸般癰疾	欽定四庫全書 宣明方論	信砒 雄黃 各一錢	右以於五月重五日用□子尖拌勻研三千下日未 出不令鷄犬婦人見丸如桐子大未發前一日面東 冷水下一丸	趁鬼丹 治一切癰疾神効	信砒 大豆 雄黃 輕粉 荷葉 甘草 各半錢	右為末滴水為丸如小豆大重午日未出不見鷄犬 婦人修合每服一丸無根水下平日夜視北斗來日
--	------------------------	-------------------------------	--	------------------	---	------------------	--	--------------------	------------------------------	---



服忌熱物



欽定四庫全書	宣明方論卷十四	金 劉完素 撰	眼目門	眼科總論	素問云目得血而能視手得血而能握其證足厥陰之經絡所主肝臟受虛而即補腎實而即瀉心 夫人之眼目者似天地之日月也若人無雙目豈能別辯賢愚	欽定四庫全書 宣明方論	天無日月萬物安能照耀是以眼通五臟氣貫五輪外應肝候肝臟虛而風邪鬱風邪鬱而熱蘊衝火炎上行故攻目昏滲澁疼痛赤絲皆發榮衛實則能視榮衛虛則昏暗凡人多食熱物或嗜五辛坐濕當風凌寒冒暑將息失度皆喪目之源也	黃連膏 治一切眼目瘵肉攀睛風痒淚落不止	朴硝 一斗以水半斗淘淨去土陰乾用 黃連 半 白丁香 五升以水一斗淘淨	去土攪 細用
--------	---------	---------	-----	------	---	----------------	--	---------------------	------------------------------------	-----------



豆 一錢已上為細末後入盆硝	川芎 鬱金 各二錢 荊芥穗 一分 薄荷葉 一分 盆硝 二錢 紅	齒悶痛	神芎散 治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻塞眼昏并牙	右為細末每服少許紙撚子蘸藥任之鼻嚏神效	頭 當歸 乳香 別研各等分	赤芍藥 川芎 黃連 黃芩 玄胡索 草烏	通天散 治偏正頭疼并夾腦風通一切壅滯明目	欽定四庫全書 宣明方論	散嚏鼻	更入沒藥末同熬數沸濾去滓洗甚妙後更用通天	右入蜜同熬黑煎黃連成稠汁入二味藥內煎熬稠	好崖蜜 一兩 黃連 一兩 沒藥 半兩 黃丹 一兩 炒 紫色	滌昏膏 治一切風眼疼痛不可忍者洗之妙矣	細末熬清汁曬乾硝用猪羊膽和加蜜妙點之效矣	牙者取出挖乾以紙袋子盛風中懸至風化將黃連	右取水入硝香釜內熬至七分淘出令經宿水面浮
--	--	------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



右研勻鼻內嚙三兩刺耳力慢加藥病甚者兼夜嚙之凡熱多風少隨證選用諸藥	金絲膏 治一切目疾昏暗如紗羅所遮或疼或痛	宣黃連 半兩剉碎水一盞浸一宿取汁再添水半盞浸滓經半日許取汁與前汁放別用水	半兩 蜜兩 白礬字一井鹽一分如無以山梔子二錢好	與黃連滓同煮五十沸取盡力子 濾去滓與前黃連汁一處入篩藥	右用銀釐器內同熬十餘沸用生絹上細紙數重再濾過用時常點	欽定四庫全書 宣明方論	白藥子散 治一切疳眼赤爛目生翳膜內外瘡疾并小兒吐痢	白藥子一兩 甘草半兩	右為末用猪肝一葉批開糝藥五錢水一大盞煮熟食後服	胡黃連散 治一切久新赤目疼痛不能坐卧并大小人口瘡	胡黃連 檳榔各半兩 麝香少許
---	-----------------------------	--	---	--	-----------------------------------	--	----------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------------	---



欽定四庫全書		宣明方論		菩薩散 治遠年近日一切眼疾		之立效		右為末滴水丸如桐子大每服一丸新水化開點		口瘡大小貼之忌食魚猪油膩物		碧霞丹 點一切惡眼風赤者		龍腦 麝香 礪砂 錢各二		銅青 錢各一 鵬砂 錢三		右為末滴水和丸如桐子大每服一丸新水化開點		之立效		菩薩散 治遠年近日一切眼疾		欽定四庫全書		宣明方論		菩薩石 金精石 銀精石 太陰石 太陽石		雨餘石 河洛石 礬礦石 雲母石 盧甘		石 井泉石 白滑石 紫英石 寒水石 陽		起石 猪牙石 代赭石 碧霞石 烏魚石		青鹽 兩各一 礪砂 兩半 蜜陀僧 兩一 銅青 兩一 黃丹 兩四 麝香		腦子 錢一 輕粉 半一錢 鵬砂 錢三 乳香 錢二 雄膽 一 白砂		蜜 二		右為細末以井花水九大碗熬就作四碗點水內落	
--------	--	------	--	---------------	--	-----	--	---------------------	--	---------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	----------------------	--	-----	--	---------------	--	--------	--	------	--	---------------------	--	--------------------	--	---------------------	--	--------------------	--	------------------------------------	--	----------------------------------	--	-----	--	----------------------	--



下錢許大不散可如散者再熬濾滓過露旋點	石膏羌活散 治久患雙目不覩光明遠年近日內外	氣障風昏暗拳毛倒睫一切眼疾	羌活 治腦熱 蜜蒙花 治羞明 木賊 退翳 香白芷 清利	頭目細辛 乾菜子 倒睫 二味起 蘇子 起拳 川芎 治頭風 蒼	木 明目暖 甘菊花 荊芥穗 治目中 黃芩 洗心 石	膏 二味 藁本 治偏正 甘草 解諸藥毒 各等分	右為末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜水一盞調	欽定四庫全書 宣明方論	下或茶清或淘米第二遍泔亦得日進三服至十日	漸明服至二十日大驗此方醫數十餘人矣	重明散 治一切風熱內外障氣眼疾	川獨活 川羌活 川芎 吳射干 仙苓脾	防風 甘草 井泉石 蒼朮 各半 丹參 白朮	石決明 草決明 各三分	右為末每服二錢水一盞半煎至一盞溫服日進三	服食後
--------------------	-----------------------	---------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------------	-----------------	--------------------	-----------------------	-------------	----------------------	-----



雷巖丸 治男子婦人肝經不足風邪內乘上攻眼暗淚出差明怕日多見黑花生障翳膜遮睛臉生風粟或痒或痛隱澁難開兼以患偏正頭疼牽引兩目漸覺細小視物不明皆因腎水不能溉濟於肝水此藥以服大補腎藏添目力									
肉蓯蓉兩一牛膝兩一芭豆一兩浸一宿菊花兩二黑附兩二									
子青鹽二錢以河水三升同煮為度去皮臍一兩枸杞子兩二川椒三兩去目									
右為末元浸藥酒煮麪糊為丸如桐子大每服十丸									
欽定四庫全書 宣明方論									
空心酒下世人服藥不知多少根源徃徃不效耳									
丁香復光丸 治一切遠近目疾									
丁香錢二巴豆一錢去半夏兩二烏梅半兩南鵬砂錢三									
腦子百二盆硝兩半縮砂仁半二錢甘草兩半荊芥穗錢二									
右為末醋煮麪糊為丸如菉豆大每服十丸至十五丸米泔下食後日三服									
已上諸方係先生親驗可錄									
小兒門									



小兒科論

素問云身熱惡寒戰慄驚惑皆屬熱證為少陰君火暴強直支綆戾裏急筋縮也皆屬風證為厥陰風木大小兒六歲之上為小兒十八歲已上為少年其六歲已下者諸經不載是以乳下嬰兒有病難治無可定也然小兒與大人不可一例各異治之雖小兒誕生襁褓之後骨肉脆軟腸胃細微可以乳食調和臟府廼得平安肌膚滋潤筋骨輕嫩以綿衣之故生壅滯內有積熱熱乘

欽定四庫全書

宣明方論

於心心受邪熱乃發為驚驚不止返為潮搐則為病也大槩小兒病者純陽熱多冷少故引 素問少陰厥陰證以小兒病驚風熱多矣小兒驚風者皆由心火暴甚而制金不能平木故風火相搏而昏冒驚悸潮熱此證皆謂熱甚而風生 素問驚駭驚愕少陰君火也小兒脾疳痢瀉者皆熱甚急驚瀉痢色多青為熱證明矣痢色黃者何為火甚則水衰而脾土旺故痢色黃也痢色紅赤者為心火熱甚深也痢色黑者為火熱過極



則反兼水化制之故色黑也	五臟皆言熱證無寒冷證亦有謂瀉痢小便青白不澁	為寒水穀不化而色不變吐痢腥穢澄澈清冷白不澁	身涼不渴脉遲細而微者寒證也	穀雖不化而色變非白煩渴小便赤黃而澁者為之熱	證世傳大人小兒吐痢霍亂食乳未及消化而痢尚白	便言論為寒證誤矣 向不脉候別之 仲景邪熱不化穀豈為寒	也 大人亦同	欽定四庫全書	宣明方論	小兒方類	龍腦地黃膏 治小兒急慢驚風涎痰上潮心胸天吊	驚纏喉風小兒胸膈不利一切熱毒大有神效如病不	已與分肢散一二服吐利得快常服此藥	川大黃 別搗 甘草 橫文者別搗 麝香 一錢別研 雄黃 水窟者一別研	生腦子 一錢別研	右五味各修製了再入乳鉢內同研細煉蜜為膏油	單裹如有前病煎薄荷湯下旋丸如皂子大化下如
-------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	--------	------	------	-----------------------	-----------------------	------------------	---	-------------------------	----------------------	----------------------



小兒大人睡驚及心神恍惚煎金銀湯下一丸常服 新汲水下大解暑毒如孕婦人常服新生男女永無 疾病如有大人陽毒傷寒加輕粉二匣龍腦少水化 下一丸杏核大小兒看年紀大小加減服立效	分肢散 治小兒卒風大人口眼喎斜風涎裏心驚癇 天弔走馬喉閉急驚一切風熱等疾	巴豆半兩不川大黃一兩半朴硝半 出油	右大黃為末後入芭豆霜朴硝一處細研用油貼起	欽定四庫全書 宣明方論	如有前患每服半錢熟茶下吐下頑涎立愈如小兒 胃喉驚弔等先服龍腦地黃膏一服次服此藥一字 茶下時上吐下瀉以吐利得快為效大人半錢小兒 一字看虛實加減只是一兩服見效不宜頻服如吐 瀉不定以葱白湯立止	珍珠丸 治小兒虛中積熱驚癇等疾	巴豆霜 膩粉二錢滑石二錢天南星一錢蝎稍二錢 四筒	續隨子二十四筒去皮粉霜一錢半
---	--	---	-----------------------------	---	--	------------------------	---	---



右為末研令極細以糯米粥為丸如黃米大小兒二歲已下每服三丸至一丸十五歲每服五丸至十丸點茶湯下荊芥湯亦得虛實加減	牛黃散 治小兒上焦壅熱諸眼疾	肉桂 鬱金 各一兩 馬牙硝 四兩 甘草 半兩並生	右為末如患眼三五年喫三五兩便瘥每服一錢新汲水調下垂枕卧片時若是小兒十歲服半錢五歲已下服一字永無驚疳癰風患服之立效	欽定四庫全書 宣明方論	硃砂丸 治小兒急慢驚風及風熱生涎咽喉不利取驚積	硃砂 天南星 巴豆霜 各一錢	右為末麪糊和丸如黍粒大看病虛實大小每服二丸或天弔戴上眼每服四五丸薄荷水下立愈	鬱金散 治小兒急慢驚風等疾	鬱金 一枚 巴豆 七箇去皮	右研為細末每服一字煎竹葉湯放溫下把藥抄盞
--	-----------------------	--	---	------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------	--	-----------------------------



唇上放以湯充下喉咽為妙	澤瀉散 治小兒齁齕膈上壅熱涎潮	澤瀉 一錢 蟬殼 全者二錢 黃明膠 手掌大一錢	右為細末每服一大錢溫米湯調下日進二服未愈	再服	鎮庭散 治小兒一切驚喘肚脹咳嗽	鬱金 各半 大黃 兩 甘草 三錢 輕粉 一錢	右為末每服半錢用薄荷汁硃砂細研冷水以木匙	欽定四庫全書 宣明方論	瀝下	定命散 治小兒天吊驚風不能哭泣	梨蘆 川芎 蔚金 各等分	右研為細末鼻中嚙之如哭可醫	金肺散 治小兒諸般喘嗽急驚風神效	錫灰 一錢 漢防己 二錢 鬱金 一錢 砒黃 二錢 半夏 一錢 湯洗七	次	右為細末每服半錢加一錢小兒加減煎猪肉湯下
-------------	-----------------	--	----------------------	----	-----------------	--	----------------------	----------------	----	-----------------	-----------------------------	---------------	------------------	---	---	----------------------



日進二服食後	厚朴散 治小兒虛滑瀉痢不止	厚朴 呵子皮 半兩 史君子 一箇 揀丁香 十箇 茯苓 吳	白朮 青皮 各二錢 甘草 一寸	右為末每服一字一歲加減用清米湯下	人參散 治小兒虛熱煩渴因吐瀉煩渴不止及踈轉	後服之	人參 半兩 茯苓 二兩 牛犀 二錢 甘草 半兩 乾葛 半兩 桔梗	欽定四庫全書 宣明方論	半 二錢	右為末每服二錢水一大盞入燈心五莖同煎至六	分放溫不計時候煩渴者以新竹湯下量年紀加減	碧雲散 治小兒驚風有涎	膽礬 半兩 銅青 一分 粉霜 輕粉 各一錢	右為細末每服一字薄荷湯下中風將水下如吐多	不定煎葱白湯投之立止效	桃符丸 治小兒風熱
--------	---------------	---	---	------------------	-----------------------	-----	---	----------------	------	----------------------	----------------------	-------------	--	----------------------	-------------	-----------



右為細末滴水為丸如菉豆大以硃砂為衣每服二丸用桃符煎湯下看大人小兒加減



欽定四庫全書

宣明方論卷十五

金 劉完素 撰

雜病門

雜論

素問云痛痒瘡瘍癰疽痘疹瘤氣結核怫鬱甚者皆熱
五臟不和九竅不通六府不和留結為癰近於火氣微
熱則痒熱甚則痛附近則灼而為瘡皆火之用也

欽定四庫全書

宣明方論

人之瘡腫因內熱外虛所生也為風濕之所乘則生瘡
腫然肺主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開為風
濕所乘脾氣溫而內熱即生瘡也腫者皆由寒熱毒氣
客於經絡使血澁而不通壅結成腫風邪內作即無頭
無根氣血相搏作者即有頭有根結壅盛則為膿赤核
腫則風氣流潰也瘡以痛痒痛則為實痒則為虛非謂
虛為寒也正謂熱之微甚也痒者美疾也故火旺於夏
而萬物蕃鮮榮美也灸之以火潰之以湯而其痒轉甚



者微熱之所使也痒去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通									
陽氣得泄熱散而去或夏熱皮膚痒而以冷水沃之其									
痒不去謂寒收斂腠理閉密陽氣鬱結不能散越怫熱									
內作故也瘡痒皆為火熱而反腐出膿水者猶穀肉果									
菜熱極則腐爛而潰為污水也潰而腐爛者水之化也									
癰淺而大疽深而惡熱勝血則為癰膿也瘍有頭小瘡									
也疹浮而小癰疹也瘤氣赤瘤丹燦熱勝氣火之色也									
如意散 治疥癬無時痛痒愈發有時不問以新者									
欽定四庫全書									
宣明方論									
吳茱萸 牛蒡子 荊芥 各一 牡蠣 半 輕粉 半 信									
砒 二 錢									
右為細末研勻每臨卧抄一錢油調徧身搓摩上一									
半如後有痒不止更少許塗之股髀之間聞香悉愈									
信效散 治風熱上客陽明之經牙齒疳蝕斷宣腐臭									
血出色黃氣腐注悶動搖疼痛作發有時兼解中金石									
一切毒藥									
信砒 一 錢 黃丹 二 錢 千古石灰 如無但以陳久									
者炒細研四錢									



欽定四庫全書									
宣明方論									
而血衰不能榮養藏府故早蒼黃而班白也此藥能使陽明氣血宣通故效能然也 又方使龍骨不用石灰									
神聖餅子 治一切打撲傷損金石刀刃血出不止者									
立效此藥上無膿退痂便愈									
烏魚骨 一兩五月五日 前准備下 萬荳菜 一握 荳菜 一握 青薊草 一握									
一握約一虎口人 手取團圓是也 石灰 兩									
右以五月五日未出本人不語將取三味同杵爛									
右研細末入青鹽一分麝香少許如無此二味亦得每上抄三兩大豆許先洗漱淨以手指蘸藥捺上下牙齒斷瀝涎勿嚥之須臾漱淨或有蝕處再上少許日三四次常用如意一上以頻為妙或服金石藥致病便一日三四上更不上牙齒如神或已上牙齒者傳之即愈或平人常用頗能清利頭目寬膈美食使髭鬚遲白以用亦能固牙齒便遲老人氣於面而手足陽明經絡貫注憂思則氣結而血液不行燥怫鬱									



次後下餘藥味杵得所搏作餅子曬乾用時旋刮敷之	芙蓉膏 治徧滿頭面大小諸靨子或身體者	料炭灰 桑柴灰 蕎麥蘖灰 各半升	右灰用熱湯淋取 升熬至五分又用	獨角仙 一箇不用角 紅娘子 半錢不去翅足 糯米 四十粒 石灰 一兩	風化者	右為末將前項灰汁調如麪糊相似在甕合子內於土底埋五七日取出使用取□痕靨內刺破用細竹簽子點之放藥用濕紙揩藥再點至三上見□痕時冷水淋洗忌薑醋魚馬肉	鉛白霜散 治大小人口瘡牙齒腐蝕氣臭血出者	鉛白霜 二錢 銅錄 二錢 白礬 一塊大許	右為末以翎羽掃上瘡以溫漿水漱之	麝香散 治大小人口齒腐蝕出血斷根宣爛者	上好鹹土 不以多少 麝香 真好者少許
------------------------------	---------------------------	--	------------------------	--	---------------------------	---	-----------------------------	--	------------------------	----------------------------	---



右熱湯淋取汁去滓用清汁銀石器中熬乾刮下再與麝香同研勻摻於瘡上以紙貼神效	乳香散 治一切瘰癧瘡新久遠近不已者	乳香 一錢 砒霜 一錢 硃砂 半錢 紅娘子 一十四箇 黃丹 錢半	右為末糯米粥和作餅子如折三錢厚小銅錢裏捲大破瘡上白麪糊如不破者炙柴炷大者不過一月其瘰癧核自下	欽定四庫全書 宣明方論	後欽瘡生肌藥 黃蘗 不以多少	為細末麪糊塗患處甚妙	五香丸 治一切惡瘡瘰癧結核無首尾及諸瘡腫	沉香 木香 鷄舌香 各一兩 薰陸香 麝香 各三錢	連翹 一兩半	右研為細末每服二錢水一盞煎至六分不拘時	紫參丸 治熱毒瘰癧腫痛已內消瘡已破出膿水服此藥
--	--------------------------	---	---	------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------	---------------------------------	---------------	----------------------------	--------------------------------



紫參 苦參 各一錢 別研 滑石 二兩 連翹 二兩 丹參 半兩 膩粉 三錢 麝香	右為末別用玄參一觔搗碎以酒三碗浸三日採取汁去滓用皂角子三伯枚煨熟搗為末用玄參酒熬皂子未成膏和前藥如桐子大每服一丸以黃耆湯下一日加一丸至患人歲數即止如四十則二十每日却減一丸瘡自乾有結內消	麝香雄黃散 治十七般惡蟲咬傷人及瘡腫者	欽定四庫全書 宣明方論	麝香 雄黃 乳香 硃砂 各二錢 土蜂窩 露蜂窩 燒灰	右研為細末以醋調少許塗咬着處或不辯認得多凝是惡瘡三五日不療即毒入心難瘥忌鷄魚油膩物	硃砂散 治一切疔瘡	硃砂 雄黃 天南星 砒霜 各等分 麝香 少許	右研為細末用竹針針開用藥到黃水出瘡已
---	---	----------------------------	--------------------	-----------------------------------	--	------------------	-------------------------------	---------------------------



聖力散 治諸疔瘡腫	草烏頭 白及 白欬 木鼈子 去皮 地龍 金毛	狗脊 各二錢半 麝香 三錢 黃丹 少許	右研為細末用針針到生肉痛者用藥黃水出為度	川山甲散 治一切通氣破瘡腫行膿血如神效	川山甲 木鼈子 烏龍角 各等分都燒存性	右為末每服一錢半空心熱酒調下至中午瘡破膿	血便行	欽定四庫全書 宣明方論	守瘻丸 治瘻瘤結硬	通草 二兩 杏仁 一大合去皮尖研 牛蒡子 一合出油 吳射干 昆	布 去鹹 呵梨勒 海藻 各四兩去鹹	右為末煉蜜為丸如彈子大含化咽津下日進三服	鬼代丹 治打着不痛	無名異 研 沒藥 研 乳香 研 自然銅 醋淬研 地龍 去木	鼈子 去殼各等分	右為末煉蜜為丸如彈子大溫酒下一丸打不痛
-----------	---------------------------------------	--	----------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------	-----	----------------	-----------	--	---	----------------------	-----------	--	-------------------------	---------------------



龍腦潤肌散 治杖瘡熱毒疼痛	黃丹 一兩 蜜陀僧 半兩 輕粉 一錢 麝香 半兩 龍腦 一字	右為細末摻藥在瘡上用青白子塗之內留一眼子	香藥丸 治癰瘡	硃砂 乳香 沒藥 半夏 輕粉 赤石脂 各等分	右為末糯米粉為丸如桐子大每服十丸加至二十	丸皂角子臨卧	欽定四庫全書 宣明方論	紅玉挺子 治一切牙疳	砒霜 一塊皂角子大 黃丹 煨過 魯土	右為細末餬餅和作劑子任牙	桃花散 治一切瘡生肌藥	白及 白欵 黃栢 黃連 乳香 別研 麝香 別研 黃	丹 各等分	右為細末摻於瘡上三二日生肌肉滿	追毒散 治生瘡發悶吐逆霍亂
---------------	---	----------------------	---------	---------------------------------------	----------------------	--------	----------------	------------	--	--------------	-------------	---	----------------------	-----------------	---------------



螺兒青 揀甘草各一兩 白礬二錢半	右為細末每服一錢新汲水調下立止	膽礬丸 治男子年少而鬢髮班白	土馬駝性燒存 石馬駝性燒存 半夏各一兩 生薑二兩 胡桃	真膽礬十兩半 川五倍子一兩	右為末和作一塊絹袋子盛如彈子大熱酒水各少	許浸下藥汁淋洗頭髮一月神效	伏神散 治膽熱多睡神思不安昏悶	欽定四庫全書 宣明方論	伏神去皮 麥門冬 地骨皮 茯苓各一兩 白蘚皮	酸棗仁 沙參 甘草炙半兩	右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後服	鐵脚丸 治大小便不通	皂角炙去皮不以多少去却子	右為末酒麪糊為丸如桐子大每服三十丸酒服	全聖散 治小腸膀胱氣痛不忍者	地膽半兩去足翅微炒 滑石一兩 硃砂半錢
---	------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------------	----------------------	------------------------	------------------------	---	------------------------------------	----------------------------	-------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------------	---



右為末每服二錢用苦杖酒調下食前服	琥珀散 治五淋	滑石 二兩 木通 當歸 木香 尉金 扁竹 各一兩	琥珀 二兩	右為末每服三五錢用蘆葦葉同煎食後日三服	葵子散 治小便不通	葵子 茯苓 去黑皮各等分	右為末每服四錢水一盞煎三沸食前	欽定四庫全書 宣明方論	倒換散 治無問久新癰悶不通小腹急痛肛門腫疼	大黃 小便不通減半 荊芥穗 大便不通減半 各等分	右件藥味各別為末每服一二錢溫水調下臨時加	減服	敗毒散 治男子往來寒熱婦人產後骨蒸血運	大黃 黃藥子 紫河車 赤芍藥 甘草 各等分	右為末每服一錢如發熱冷水下如發寒煎生薑菰	萎湯同調下此藥偏治婦人
------------------	---------	--	----------------------	---------------------	-----------	-----------------------------	-----------------	----------------	-----------------------	--	----------------------	----	---------------------	--------------------------------------	----------------------	-------------



補真丹 治男子元藏虛冷與陽固腎不虛	黑附子 一兩 陽起石 火燒酒淬三錢 海馬 二錢 乳香 雄黃	為衣 血竭 各三錢 石蓮子 去殼皮心 黑錫 炒去砂 石驚子 燒以	醋 麝香 一分	右為細末麪糊為丸每服二十九用五香湯空心下	五香湯	沉香 箋香 乳香 麝香 檀香	右為細末每服半錢煎湯下	欽定四庫全書 宣明方論	新添 一醉烏法治頭鬚白再黑方	訶藟勒 十箇不 醋石榴 三箇大 碌礬 五分 生地黃汁	一 礪砂 研 硫黃 研各一錢	右藥同入甕瓶內用二味汁浸密封勿令透氣至四	十九日後取出其訶子狀若黑梅至夜臨卧含一枚	嚙津到曉爛嚼以酒一盞下之三二日後再服忌葱	大蒜蘿蔔	宣明方論卷十五
-------------------	--	---	---------------------------------------	----------------------	-----	----------------	-------------	----------------	----------------	---	---	----------------------	----------------------	----------------------	------	---------

