

東  
晉  
寶  
鑑

臺  
貴  
7608  
—  
4

奎章閣圖書	
部別	分類記號
	圖書番號 貢 1933
	一部冊數 24
	內別番號 4
서울大學校	


東  
晉  
寶  
鑑

760124

中華書局印

1933

中華書局印



內景篇二

血

夢

聲音

言語

津液

痰飲

東醫寶鑑內景篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

印

書

印

陰血生於水穀

靈樞

曰中焦受氣變化而赤是謂血又

榮出於中焦又曰穀入於胃脉道乃

行水入於經

其血乃成○內經曰榮者水穀之精

氣也和調於五臟灑陳於六府乃能入於脉也○劉宗

循脈上下貫五

藏絡六府也

血爲榮

內經曰血爲榮於內

目得血榮於內目得血而能握指得血而能視足得血

厚目榮者步掌得血而能握指得血而能視足得血

於肝宣布於水穀之精也

生化於脾總統於心藏受於腎灌溉於一身目得之而能握

足視耳得之而能步能藏得之而能液府得之而能傳注

於肺施泄於腎

藏得之而能液府得之而能傳注

之於脉少則澁充則實常以飲食日滋故能盛形盛陽生

於長取汁

變化而赤爲血常也是故血日滋故能盛形盛陽生

東醫寶鑑內景篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇様大夫陽平君臣許浚奉教撰

印血

陰血生於水穀

靈樞曰中焦受氣變化而赤是謂血又

行水入於經其血乃成○內經曰榮者水穀之精氣也和調於五藏灑陳於六府乃能入於脉也故

五

循藏絡六府也

血爲榮

內經曰血爲榮榮於內目得血而能視足得血而能攝○劉宗厚曰榮者步掌得血而能握指得血而能攝施泄於腎灌溉於脾總統於心藏受

於肝宣佈於肺

施泄於腎灌溉於脾總統於心藏受

視足得之而能步藏得之而能液府得之而能傳注

手得之而能潤掌得之而能握注

耳得之而能步藏得之而能液府得之而能傳注

足得之而能步藏得之而能液府得之而能傳注

之於脉少則澁充則實常以飲食日滋故能形盛陽生

陰長取汁變化而赤爲血常也是故血盛則形盛血生

弱則衰矣

一

血爲氣配

夫血譬則水也氣譬則風也風行水上行氣

者血之帥也氣行則血溢氣有一息之

止則

血止氣溫則血滑氣寒則血溢氣

出於血溢氣猶可

以導達

病原於氣區區調血何加焉故人之一

身調氣爲上調血次之是亦先陽後陰之義也

脉法

脉經曰脉得諸溢濡弱爲亡血○脉訣曰諸證失

見芤脉脉貴沉細浮大難治○正傳曰芤爲發

失血溢爲少血又曰吐血之脉必大而芤大爲發

熱芤爲失血○靈樞曰衄而不止脉大者逆○內

經曰脉至而搏血衄身熱者死○難經曰病若吐衄血脉當沉細反

大時絕者死○仲景曰脫血而脉實者難治○

浮大而牢者死○脉滑數者難治○吐唾血脉小弱○

丹溪曰吐衄血脉當沉細反

者生實大者死○請失

血證脉大且數者死○請失

熱能傷血

心火甚則能傷血熱出於心洗

散皆出於心熱甚則能傷血熱出於心洗

熱所生實大者死○請失

熱甚則能傷血熱出於心洗

散皆出於心熱甚則能傷血熱出於心洗

熱能傷血熱出於心洗

謂火方觀其要者一言而終。丹溪曰諸見血皆熟則行見

寒則凝亢口鼻出血皆係陽盛陰虛有升無降血隨氣上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經

也。亢血得熱則淖溢故鮮得寒則凝

## 七情動血

絕而血逆於上者皆屬於心又曰怒則氣逆形甚

則區血溢鼻口。但怒氣逆甚區血暴瘡內逆肝肺相搏則

陰者是也否則地黃散助火動甚火動血上錯經妄

行宜用保命生地黃散助火動甚火動血上錯經妄

喜動心不能生血暴怒傷肝不能動血不能藏血積憂傷肺

過思傷脾失志傷腎皆能動血又能曰五志火動失

血熱者解鬱湯虛者保命散助火散附青黛柴胡甘草平厥

此怒傷肝而嘔血以黃連香附青黛柴胡甘草平厥

其肝則自愈矣。入暴喜傷心則氣逆而肝不納血不出

血無所歸又房勞過度以致陰火

沸騰血從火起故錯經而妄行

# 內傷失血

靈樞

曰卒然多食飲則脹陽絡脉傷則血溢外溢血外

○溢氣血出上

七竅爲血溢大小便便血爲血泄

# 失血諸證

失血諸證妄行於上則便紅積熱膀胱則癃閉尿血

○瘀滲透腸間則爲腸風陰虛陽搏則爲崩中濕蒸熟

則爲滯下熱極腐化則爲膿血火極似水則血

色紫黑熱勝於陰則發爲冷癰蓄之在上其人喜忘蓄

則爲瘡瘍滯於血則發爲血

之在下其人喜狂喜者曰嘔吐血者

溢于口者曰嘔血者出于肺也其痰帶血

血者出于腎也咳血嗽血者

或從腎或從肺來也其出于肺也其痰帶血

經出者或從腎或從肺

來也其出于肺也其痰帶血

汗空出謂之肌衄

從大便者曰腸風曰血痔癥○從

之舌齦皆出謂之九竅

從委中出謂之膾血從

# 辨血色新舊

新血鮮紅舊血瘀黑色如烟煤屋漏水門入證

○陽證溢出鮮血陰證下如豚肝網。初便褐色變者以火燥也如羊血在日色中須臾變褐色久則漸變而爲黑色即此意也。

### 蓄血證

○蓄血蓄血即瘀血積蓄也○傷寒熱病身黃屎黑如狂喜忘者爲蓄血也。

○黃屎

○外證瘀疾已甚也但小腹滿○海藏曰喜忘發狂身如

○下咽

○亢病日輕夜重便是瘀血又常喜漱水漱口○擗

○上焦

○則善忘宜犀角地黃湯方見血蓄中焦胃滿

○身黃

○水不欲耽宜桃仁承氣湯○傷觀血蓄下焦

○刻發

○狂瘀黑小腹硬痛宜抵當湯丸須取盡黑物○

○白瘡

○血燥結宜用地黃湯通治三焦蓄血○

○五靈脂

○生地黃大黃甘草利而逐之擗○

○木水蛭

○生蠶五靈脂留尖桃仁皆破瘀血○

○韭菜汁

○善治胃膈間瘀血甚效

# 生地黃湯

治大蓄血證。脈沉細，便自利，老幼氣弱者尤宜。

生地黃半兩，生藕汁一升，無則用生乾地黃二兩，乾漆炒藍藥十箇，炒剉無則用乾末半升，蜜蟲二十箇，炒薊汁一升，乾漆炒藍藥半兩，右水三升，同熬。

至二升，放冷分二服，先服至半日許，血未下再服。此藥比抵當湯丸甚輕，恐抵當丸下血不止，故

以此湯

# 血病吉凶

九血逆者重，潮盛脉大者死，又曰九竅出血，輕有潮

不得卧者即死，又曰九血證陽盛則身熱多渴，陰也身涼者易愈，又曰如心陰

肺脉破形身熱色夭然，白及後下血，血瘀篤重，

是爲逆，又曰劖而止脉小勁，是爲逆，又曰嘔，胃滿引背脉

小而疾，是爲逆，又曰腹脹便血，其脉大時絕，是爲逆，又曰咳，漫血，形肉脫肉，又曰腹脹，搏是爲逆。

東垣曰：諸爲

見血身熱脉大者難治難治者邪勝也身涼脉靜者易治易治者正氣復也又曰血溢上行或睡或爲嘔或吐皆肉也若變而下行爲惡痢者順也上行逆其治難下行爲順其治最故仲景云蓄血證進下血者當自愈若無病之人忽然下血利者其病去是知吉也仲景曰吐血或逆上氣脈數而有熟不得卧者死○無故忽然鴻下惡血名曰心絕爲難治○傷寒太陽證衄血者病欲愈熱結膀胱而血自下者亦欲愈以此觀之則他病伏熱之入上焦瘀熱而作吐者亦其病之有瘳也雖然血既吐而自止則可矣

### 亡血脫血證

靈樞曰鼻頭色白者亡血也又曰衝脈爲血之海血海不足則身少血色面無精光爲

又曰六脉弦細而通按之空虛其色必白而臂多青脉曰脫血又曰安卧脉盛謂之脫血○東垣曰六脉弦細而通按之空虛其色必白而天不澤者脫血也用四物湯防見三才丸

補血虛天門冬熟地黃人參各半分右爲末蜜丸梧子大安服百丸酒飲任下綱

衄血

鼻通於腦，血上溢於腦，所以從鼻而出。無以陽明熱鬱，則口鼻俱出也。又曰：衄血出於肺，宜莎芎散。

黃三

黃散

補血湯

瀉雞蘇散

陶氏

生地芩連湯

丹溪

曰：衄血以涼地

東垣

行血

爲主

犀角地黃湯

入麝金

加片芩升麻

梔子黃芩芍升麻

芊紫

紫菀丹參

阿膠

之類主

之

內經曰：脾移熱於

肝則爲驚

阿膠又曰春善病

驚

又曰少陰所至爲

傷寒

以麝香散及諸藥

塞鼻

不衄

止以麝香散及諸藥

塞鼻

又用止血方

法

○衄

傷寒

當汗不汗

熱盛

迫血

必爲

衄宜麻黃升麻

梔子黃芩芍升麻

湯

門八湯

莎芎散

治衄血

香附子

四兩川芎

兩右爲末

每二

香附

通肝使開

鬱行氣

於肝藏血

歸火散

於經絡

川芎和血

立止

門八

三黃補血湯

治六脉虛

地黃一錢

熟地黃

當歸

川芎升麻

白芍藥各

七分半

藥各

生地黃柴胡一貼水煎服各分右剉作

雞蘇散治血不正乃肺金受相火所制然也雞蘇葉黃芪生地黃阿膠珠白茅根各一錢麥門冬苦蔓蒲黃炒貝母炒桑白皮甘草灸各五分右

剉作一貼薑三片水煎服氣以黃丹吹入鼻癟

陶氏生地芩連湯治鼻衄成流不止失血過多諳語

失神閉目撮空不省人事生地黃草各一錢右剉作一貼赤芍藥柴胡苦黃犀角銙甘草各一錢右剉作一貼大棗一枚同煎臨服以藕

汁磨墨汁

調服入

清血湯治血當歸赤芍藥生地黃香附子黃芩柏子側柏葉各一錢黃連七分赤芍芩苦黃各

剉作一生甘草三分藕節五箇右

水煎入童便調服

解鬱湯治血黃熟地黃白芍藥各一錢右剉水煎服

犀角地黃湯治血吐血不止及上焦瘀血面黃大便黑能消化瘀血生地黃三錢赤芍藥二錢

錢犀角鎔牡丹皮各一錢右剉作一貼水煎服。○回春加當歸黃芩黃連各一錢尤佳。

### 麻黃升麻湯

治傷寒表未解熱鬱作衄俗呼謂紅汗。黃升麻赤芍藥黃芩石膏赤芍芩甘。

草各一錢右剉作一貼。薑片水煎熱服微汗入門。

### 麻黃桂枝湯

治傷寒不得汗作衄又治感寒衄吐血。麻黃白芍藥黃芪甘草各一錢桂枝。

當歸各五分麥門冬人參各三分五味子五粒右剉作一貼水煎服。

### 麝香散

治衄血不止白藜枯白龍骨各三錢麝香一。內然後吹入鼻中或以濕紙蘸藥塞鼻尤妙。

百草霜細末二錢水調服名曰黑神散。又吹入鼻中。

中○衄不正蒲黃炒或血竭末或油髮灰末或人中白末並吹入鼻中。

### 滑石丸

治傷寒不得汗以致鼻衄纔見血急用此止。滑石末飯丸梧子大每十九微嚼破新水。

止瀉下立

# 止衄法

治鼻衄

張或二張作十數摺冷水浸濕置頂中以大白紙

藥熨

不斗熨之至一二重紙乾則血立止

○

治衄百

手中指

右鼻出血扎手中指中節如左鼻出

○

治衄百

俱扎之

一方用色線繩

○

治衄不

止

白芨爲末冷

水調

塗山根上臙也立止仍以冷水調三錢服之

尤妙又方

大蒜一枚細研作餅子如錢大左鼻出

○

治衄不

止

白芨爲末冷

# 嘔血吐血

成穢有聲者爲嘔成盆無聲者爲吐

湯

鰐羸加黃連主之○千金曰吐血有三種有

內衄

有肺疽有傷胃內衄者出血如鼻衄但不從

鼻孔出是近從心肺間流

入胃中或如豆羹汁或

石或

如切燄停胃中因滿悶便吐或數斗至一升或

半升酒

之後毒熱滿悶吐之時血從吐後出或一合

得之於勞倦飲食過傷也肺疽者或飲酒

是也

一升是也。傷胃者因飲食大飽之後，胃冷不能消化，便煩悶，強嘔吐使所食之物與氣共上衝，則能因傷裂胃。口吐血鮮赤，腹亦絞痛，自汗其脉緊而數者爲難治。○傷胃吐血宜葛根湯，內附芩補心湯，人參救肺散。○仲景曰：酒客或致吐血，此因極飲過度所致，即肺疽之屬也。○暴吐紫黑血成塊者，此因熱傷血瘀於中，吐出爲好。四物湯合黃連解毒湯，下之又曰：吐血覺脅中氣塞，桃仁承氣湯，或四物湯加山梔子，或吐血加火病也。雖挾痰只治火，則血止。門汗乃心液，熱則變，從口而逆出，多屬陽明，凡見目紅，骨熱，神昏，狂謠，子茅根藕節重者，犀角地黃湯加黃芩，梔子茅根，急湍皆血證也。輕者，犀角地黃湯加黃芩，梔子茅根，藕宜大薊飲子，蓮心散，當歸湯丸，方艸薢門散，天門冬湯，口吐鼻血。

俱生宜清熱解毒湯，花藥石散，黑神散，側柏散，五神湯，狗膽汁散，九散。

# 葛黃丸

死者名葛連丸治飲酒多積熱以致吐衄血垂

葛花二兩無則葛根代之右

葛連丸治飲酒多積熱以葛根代之右

葛根二兩無則葛根代之右

葛根二兩無則葛根代之右

丸梧子大溫水下百丸細爲末用大黃末水熬成膏和

# 三黃鴻心湯

黃連治吐血大作此乃熱生地黃二錢右剉

何也一貼水煎服艸仲○心氣不足則不當吐衄血用鴻心湯  
不足以苦補其心故爲吐衄以寒泄其熱因

# 菝苓補心湯

治勞心吐血白芍藥二錢熟地黃一錢當歸一錢三分川芎白芍芩入參前

胡半夏各七分陳皮枳殼苦梗乾葛紫蘇葉甘草各五分右剉作一貼薑五片棗二枚煎服取

# 人參救肺散

一名救肺散治虛勞吐血人參黃芪白芍藥熟地黃當歸梢各一錢升麻柴胡

蒼朮陳皮蘇木甘草炙各五分右剉作一貼水煎服取

# 大薊飲子

一名大薊散治辛熱物傷肺胃嘔吐血名大薊根桑白皮犀角升麻蒲黃炒

杏仁一錢  
苦黃各一貼水煎服

冊

蓮心散

治勞心吐血  
米五粒右爲蓮子心五分煎服

是齋白朮散

治飲食過度負重用力傷胃  
二錢人參白朮芩各一錢山藥百

合各七分半甘草五分前胡柴胡各二分

半右剉作一貼薑三片棗二枝水煎服

天門冬湯

治思慮傷心血天門冬遠志白芍藥  
藕節麥門冬黃芪阿膠珠沒藥當歸生地

剉黃各七分入參甘草各三分

剉作一貼薑三片水煎服

四生丸

治吐衄血陽乘於陰血熟妄行生荷葉生艾  
葉生側柏葉生地黃葉各等分右爛搗取如

湯雞子大每心丹一丸水一盞煎服或益

湯化服心丹一方無荷葉有生薄荷

蚌霜散

治頭揜損血吐血及酒食醉飽後低

黑神散

治傷瘡末安大吐血口鼻俱出深村鍋底百草霜  
右治傷瘡末安大吐血口鼻俱出深村鍋底百草霜

調冷水

側柏散治內損心肺吐血下血

其出如涌泉口鼻皆此即安側柏葉蒸乾二

錢兩半荆芥穗燒灰人參各一兩右爲末每三  
錢入白麴二錢新汲水調如稀糊啜服

藕汁散

治吐血不止生藕汁生地黃汁大薑汁各  
三合生蜜半匙右件調和每服一小鐘

七生湯

治血出口鼻如泉涌諸藥不效生地黃生荷  
葉生藕節生韭菜生茅根各一兩生薑五錢

濃磨俱擣取自然汁同服

一錢

清熱解毒湯

治吐血升麻二錢生地黃一錢半黃  
柏赤芍藥牡丹皮各七分乾葛黃連黃

芩苦梗梔子連翹甘草各五分  
右剉作一貼薑三片水煎服

花藥石散

治虛火燬研如粉右取童尿一鍾煎溫調  
火燬研如粉右取童尿一鍾煎溫調

錢或五錢服之如男用酒一半女用醋一半與  
童尿和服使瘀血化爲黃水繼以他藥調治

與

**五神湯** 治婦人吐血 生  
薺汁 刺薊汁 生地黃汁 白蜜  
各一盞 生薺汁半盞 右同煎三兩沸每取一

小盞 調炒白  
麯 一錢服

**狗膽丸** 治連日吐血不止 五靈脂爲末狗膽汁和丸  
芡實大毒一丸薺酒化下不得漱口急進白

粥太多不可

**一方** 治吐血不止 將本人血取來用磁鍋焙乾爲末每

服一錢或一錢二分以麥門冬煎湯調下血即止

**薄厥證** 入門日一人素無病忽吐血半斗脈弦急陳景魁示之曰薄厥證也得於大怒氣逆陰陽

奔并用六君子湯而得愈

**咳血嗽血唾血咯血**

蘇丸者咳嗽甚出血本於肺龍腦雞散上見玄霜膏○嗽血

者痰嗽帶血本於脾六君子湯加桑白皮片芩根  
五味子有火者加味逍遙散於膈麝鰐○唾血根

者鮮血隨唾而出本於腎滋陰降火湯火燭中  
而不不出甚咯則出或帶紅絲細如線此精血竭也  
而物湯加竹瀝薑汁童便青黛或滋陰降火湯保  
命生地黃散防<sub>見聖餅子門</sub>○先見紅後見痰多  
是陰虛火動痰不下降四物湯加貝母天花粉以  
化痰山梔仁麥門冬牡丹皮以降火先痰嗽後見  
紅多是痰火積熱降痰火爲急宜山梔地黃湯先  
痰嗽涎帶血出此胃口熱血蒸而出重者山梔輕  
者藍實<sub>心</sub>○先吐痰後見血是積熱宜清肺湯先  
吐血後見痰是陰虛宜滋陰降火湯<sub>細</sub>○咳嗽唾  
咯血宜龍腦雞蘇丸河間生地黃散清火滋陰湯  
膏防<sub>見玄霜雪梨膏恩袍散</sub>  
清咳<sub>湯清</sub>咯湯清垂湯坎离

## 龍腦雞蘇丸

蒲治

咳嗽垂咯血

薄荷

一斤

麥門冬

四兩

黃阿膠各二兩

甘草一兩

半人參黃

半搗浸二宿

取汁用蜜二斤

煉一二沸入

生乾地

黃末六兩攬合入柴胡木通汁慢火熬成膏然後

將前藥末同搜和爲丸

豌豆大熟水下二十丸

搗後

玄霜膏

治咯血  
白砂糖  
吐血虛  
蜜蘿蔴  
勞嗽神效  
烏梅汁  
各四兩  
生薑汁一  
計柿霜

二枝芩末八  
兩共八

砂鍋內熬  
用乳汁浸晒  
成膏丸如彈  
子大丸一丸臨

臘下門化

加味逍遙散

治癆中見血  
歸赤芍藥桃仁  
牡丹皮白朮各一  
錢山梔黃芩

各八分苦  
草三分右剉作一  
錢七分青皮五分甘

聖餅子

治咯血杏仁四  
錢捏作二十粒去  
皮尖研細同黃蠟炒

開以餅置其中合  
包糧研爛米飲調服

濕紙

山梔地黃湯

治先吐痰後見血  
宜以降痰火爲急山  
梔仁一錢天花粉

母瓜蔓各五分右  
剉作一錢

貼水煎服

清肺湯

治先痰後血是積熱  
也赤茯苓陳皮當歸生  
地黃芩梔子紫菀阿魏

膠珠桑白皮各七分甘草三分右剉  
作一貼棗二枚烏梅一箇水煎服

河間生地黃散治鬱熱血吐咯唾血拘杞子柴胡黃

分生地黃熟地黃甘草各七分右剉  
作一貼水煎服

清火滋陰湯治嘔吐咳嗽唾喀血天門冬麥門冬生

山茱萸澤鴻赤芍芩甘草各七分右剉  
作一貼水煎入童便服

清咳湯治咳嗽血當歸白芍藥桃仁貝母炒各一錢白

山茱萸澤鴻丹皮黃芩梔子炒黑各八分青皮苦梗

清咯湯治咯血陳皮半夏茯苓知母貝母生地黃各

五分右剉白皮一錢半甘草五分薄桂  
二分右剉作一貼薑三片水煎服

清唾湯治唾血知母貝母苦梗黃柏鹽水炒  
地黃玄參遠志天門冬麥門冬各一錢褶色熟

一炒黑五分右剉作  
貼水煎服

玄霜雪梨膏

治咳唾咯吐血除勞心動火勞嗽久不愈雪梨六十箇去心皮取汁二十鍾

酸者不用生蘿蔔汁十鍾生地黃汁十鍾麥門冬煎

取汁五鍾生蘿蔔汁五鍾白茅根汁十鍾右汁合

和重瀝去渣火上煎

霜八兩薑汁半酒盞火上再熬如稀糊則成膏矣

每服三五匙日

三服不拘時醫

恩袍散

治咯血唾血吐血真生蒲薑薄荷各一

尿血

內經曰胞移熱於膀胱則癃尿血作痛或雜尿而在

下焦則尿血○亢小便血則癃尿血○仲景曰熟

出者從膀胱中來也○如血出不痛乃不痛者爲尿而在

腸從精竅中出也○小便出不痛而痛者爲尿而在

物湯加山梔石牛膝芩連或辰砂散琥珀散入四門

血非淋也是血從精竅中來乃心移熱於小腸因

麥門冬便出血是滑石牛膝芩連或辰砂散琥珀散入四門

○心伏熱宜在清腸湯清熱滋陰散怕陰湯小加

**薑**飲子  
尿血  
茯苓蜜湯或四物湯合五苓散  
漏煎服酒

**兒**動立觀效老人六味地黃丸  
歸承氣湯下之方見

**髮灰散**治少許調服或以井華水亦得綱○髮灰丸合

**和九**治同髮灰丸梧子大白湯吞下五十丸  
**琥珀散**治尿血琥珀爲細末

**琥珀散**治尿血琥珀煎湯調二錢服之

**清腸湯**治尿血當歸生地黃梔子炒黃連赤芍藥黃柏瞿麥赤芍木通萹蓄知母麥門冬各七分

**心一團烏梅一箇**水煎服

**清熱滋陰湯**治尿血及便血生地黃麥門冬梔子炒黃柏玄參牡丹皮各八分當歸川芎各三分

**陳皮甘草各三**分知母黃柏並酒炒白术

**小薑飲子**治下焦結熱尿血藕節二錢當歸一錢山梔仁八分小薑生地黃滑石通草蒲黃各

五分甘草三分为丸右剉作一  
貼竹葉七片同煎服

薑蜜湯治小便出血生薑七片蜜  
盃白茅根水煎服

茯苓調血湯治酒麴過度房勞後小便出  
苓一錢酒麴半赤芍藥川芎半夏麴各七分  
心打糊作一貼

草名前胡柴胡青皮枳殼苦梗桑白皮白茅根  
草名五分右剉作一貼薑五片蜜二匙水煎服

鹿角膠丸治勞傷小便出血鹿角膠一兩炒作  
珠後室勞傷小便出血鹿角膠一兩炒作

心汁打糊和丸梧子大空心打糊作一貼

當歸散治婦人尿血生地黃二錢半小薊葉二錢當  
歸身羊角屑赤芍藥各一錢半右剉作一貼

水煎服

立效散治小兒尿血蒲黃生地黃赤茯苓甘草各一  
錢右剉水煎服

元散服之

**便血**

曰內經曰結陰之病陰氣內結不得外行血無所稟滲入

下腸間

故便血也其脉虛溢者是也

○因血結

曰靈樞曰邪犯五

藏

則陰脈絡不和陰

脉不和則血留之蓋邪犯五

○

五藏

則陰脈絡不和陰

脉絡不和而結

則血因停留溢則滲入

黃土

間而爲便血門

○仲景曰先便後血者遠血也

便者近血也

赤小豆當歸散

清藏湯

砂湯地榆

散有實熱者當歸承

氣湯

元氣下陷者厚朴煎補中益氣湯

散連

之○便血宜胃風湯

○大方

槐花

散

清藏湯

砂湯地榆

散有實熱者當歸承

氣湯

日久便血宜胃風湯

○仲景曰先便後血者遠血也

便者近血也

赤小豆當歸散

清藏湯

砂湯地榆

散有實熱者當歸承

酒蒸

黃連丸諸

○

**平胃地榆湯**

治結陰便血

○

各五分

乾薑當歸神

七分葛根

白芍藥

白朮升麻附子炮

○

草灸各三

分右剉作一貼

薑三棗二水煎服

○

甘草

智仁入參

○

威靈仙

黃芪陳皮椿根白

○

**結陰丹**

治結陰便血

○

烏前芥穗各五錢

右爲末酒糊和丸白

梧子大每服五七十丸  
陳米飲入醋吞下鑊

黃土湯

治先大便後下血竈中黃土三錢熟地黃芩甘草炙各一錢右剉

作煎服一貼水

赤小豆當歸散

治先下血後大便赤小豆五兩浸令芽出曝乾當歸一兩右搗爲末繫水

調服二錢

日三服

清臟湯

治大便下血生地黃一錢當歸酒洗地榆各分黃芩梔子炒黑黃柏炒各七分白芍藥

黃連側柏葉阿膠珠各六分川芎槐角炒各五分右剉

作一貼水煎服

榆砂湯

治結陰便血地榆四兩縮砂七枚研生甘草一錢半灸

治遠年下血地榆卷柏各五錢

砂餅煮十餘沸溫服

地榆散

治內傷下血用此以解絡脉之結黃連枳殼各二兩剉以槐花四兩同炒棗去槐花右枳殼爲

治內傷下血用此以解絡脉之結黃連枳殼各二兩剉以槐花四兩同炒棗去槐花右枳殼爲

末蒸餅和丸梧子大白湯下五七十丸  
門○正傳枳殼湯同但剉五錢水煎服

### 加減四物湯

治便血亦治腸風側柏葉生地黃當歸  
川芎各一錢枳殼荊芥梔花炒甘草灸

各五分右剉作一箇煎服蠶

### 槐花散

治腸胃有濕脹滿下血槐花炒二錢蒼朮厚  
陳皮當歸枳殼各一錢烏梅肉甘草灸各

貼五分右剉作一

### 當歸承氣湯

治實熱便血當歸二錢厚朴枳殼實大  
黃各八分芒硝七分右剉水煎服

### 厚朴煎

治便血及諸下血厚朴生薑各五兩同搗爛  
炒黃白术神麴麥芽五味子各一兩同炒黃

右爲末水糊和丸梧子大米飲下百丸蓋脾胃本  
無血緣氣虛腸薄自榮衛滲入而下用厚朴厚腸

胃麥芽消食白术導水  
血自不作多有奇效

### 酒蒸黃連丸

治酒毒積熱便血肛門作熱黃連四兩  
一宿日乾右爲末粟米糊和丸

悟子大熱水下  
三十五十九

## 腸澼證

後陰詳見

齒衄

入門曰血從齒齦出謂之齒衄又曰牙床屬胃牙

齒屬腎如陽明傳入少陰二經相併血出於牙縫

如吐者人多不覺其爲牙血以涼水漱口則血止

少頃又來者是外用綠袍散內服解毒湯飭親合

犀角地黃湯或生地芩連湯防見

○齒衄宜荊梔散鬱金散小薑散

綠袍散

治齒縫出血不止黃柏薄荷芒硝青黛各

等分右爲末入龍腦少許糁牙床即止

荊梔散

治牙宣出血荆芥穗槐花炒各

等分右爲末常擦牙或點服

鬱金散

治齒齦出血鬱金白芷細辛各等分右爲末

常擦牙仍以竹葉竹茹入鹽煎水含漱

小薑散

治牙宣出血百草霜小薑香附子蒲黃

各五錢右爲末常揩牙齒上立止

又方

○齒縫多出血以盐湯常漱之

青竹茹醋浸一宿含漱又竹葉濃煎入鹽含

漱又濃煎茗湯含漱皆妙。○治牙疼牙宣出血  
香附子末薑汁浸一宿漱口後揩齒齦。○滿口齒

湯先漱後嗽。○

### 舌衄

入門曰血從舌出謂之舌衄宜黃炒爲末。○

方豆一升搗碎禾水取汁服之。○

又

### 蛤散

牡蠣粉治舌上出血等分爲末。○

又

### 血汗

內經曰膽受熱血妄行爲衄。○

因曰無病者汗出喜則氣散甚如胚染名曰汗。○

紅汗由大喜傷心出污衣隨氣行也。○

建中湯勸觀薰服妙香散。○

麥門冬煎湯調下又產婦血汗宜葎草汁。○

### 定命散

治衄等分爲末每半錢新水調下。○

和之空腹飲一盞或濃取。○

### 葎草汁方

治產婦因大喜汗出污衣赤色葎草擣取。○

煮服亦可。皮燒灰末飲調服。肉煮食之。汗

### 九竅出血

人卒大驚則九竅血皆溢出。謂之九竅出血。其汗則伏。

九竅逼血從九竅而出。名爲下厥上竭。不治。詳觀。

九竅出血從九竅而出。宜側柏散。見又百草霜油。緩灰龍骨。

屠未或吹入或繆之門。卒驚悸九竅血皆溢出。

屠猪羊血熱飲二升即止。又入有九竅四肢指歧

水間出血乃暴驚所爲。取新生犢子臍中屎燒和

水服日三四次。又小薊搗取汁一盞酒半盞調和

頸眼乾者爲末。冷水調服。幹。又法井華水卒噀

其面勿令病人先知之。幹。指縫瘻。成瘡。有竅

出血不止。多年糞桶罐燒灰傳之。即止。燙以手

### 傷損失血

詳見傷

### 失血眩暈

崩中去血。一切去血過多。則必致眩暈。去血多。金瘡。去血多。產丸。

後去血多皆有此證宜大劑芎歸湯  
燒人煎服將醋救之○吐衄太甚不止當防其血暈茅根燒烟  
使灑之令鼻喚氣以遏其勢或蓦然以冷水噀其面  
救之又全生活血湯胞門亦佳○血暈者皆因  
去血過多虛而成暈脉微瀧也急用芎歸湯救之  
繼用加味四物湯翻○吐衄血過多昏迷不省生  
地黃三五斤取汁連飲不暇取汁則生吃呷汁以  
津漸塞鼻神效又好墨濃磨  
汁飲之仍黑入鼻中  
**生地芩連湯**治婦人因崩漏大脫血或男子去血過  
生地黃一錢半赤芍藥山梔子黃芩黃連各七分防風  
各一錢半赤芍藥山梔子黃芩黃連各七分防風  
揚寺撒延錯譜失神鼻乾氣龐生地黃川芎當歸  
此危證也以此救之  
**加味四物湯**治血虛眩暈率倒不可艾灸驚哭叫動  
動則垂虛而死矣當歸川芎白芍藥生  
地黃熟地黃黃芪人參白朮陳皮白芍芩荊芥  
穗甘草各七分右剉棗二枚寫糊一箇煎服  
地黃熟地黃黃芪人參白朮陳皮白芍芩荊芥

# 黑藥止血

綱目曰燒灰諸黑藥皆能止血經白止方黑者由腎水能制心火故也。

止血宜五灰散止血即止

散者由腎水能制心火故也。止血宜五灰散止血即止

灰梔子乾柿荊芥蓮房鰣皮牛角膠之類皆可燒灰單服

# 五灰散

治一切失血及血崩蓮蓬殼黃綃亂髮百草霜棕櫚皮右各燒存性等分加梔子炒黑蒲

黃炒松烟墨血竭共爲細末安三錢以生藕汁生

蘿蔴當調服之或蜜丸米飲下五十丸亦可

# 十灰丸

治嘔吐咯嗽血及虛勞大吐血大薑小薑柏

各等分右燒存性出火毒研爲極細末用生藕汁或蘿蔴當汁磨松墨半椀調服五錢即止

十灰丸治血崩及一切失血黃絹灰馬尾灰藕節灰

艾葉灰蒲黃灰蓮蓬灰油煅灰棕櫚灰赤松

繡米糊和左梧子大米飲下百丸

皮灰新綿和左梧子大米飲下百丸

# 禁忌

內經曰酸走血病無多食酸又曰久視傷血

九血少血之人針刺出血過多皆爲禁忌

# 治血藥法

丹溪曰凡用血藥不可單行單止又不可純涼藥必加辛溫升藥如用涼藥用酒煮

酒炒之類乃寒因熱用也又曰久患血證血不歸元久服藥而無效者以川芎爲君則效○大亢血

見熱則行見寒則凝見黑灰作則止○大亢區血若出未多必有瘀於胷膈者當先消瘀○亢嘔吐

止之消瘀宜犀角地黃湯涼血宜陶氏生地芩連湯止澁宜側柏散狗膽丸門○桃仁紅花蘇木血

竭壯丹皮者血滯所宜蒲黃阿膠地榆百草霜棕櫚灰者血崩所宜乳香沒藥五靈脂凌霄花者血

痛所宜蕊鍊陽牛膝拘杞子益母草夏枯草敗鵝板者血虛所宜乳酪血滾之物血燥所宜乾薑

肉桂之屬血寒所宜生地黃苦參之屬血熱取宜丹○治血防風爲上使連翹黃連爲中使地榆爲下使不使不可不知丹○丸血結之證皆用醋湯和失

爲妙韻○灸甘草炮乾薑每三錢煎服治男女失血不能引氣歸元甚妙丹○血不足須用甘草血

色瘀黑用熟地黃血色鮮紅用生地黃若脉洪實

血痛甚用酒大黃和歸陳

通治血病藥餌

一切失血諸病通用四物湯補榮湯保

地黃散清熱滋陰湯上坊見坎離膏

側柏固榮散血童子尿散

四物湯

三分治血病熟地黃白芍藥川芎當歸各一錢半右剉作一貼水煎服竭○一方春倍

川芎夏倍芍藥秋倍地黃冬倍當歸

夏加黃芩秋加天門冬加桂枝○當歸和防風

血歸經芍藥涼血補腎生地黃生血寧心熟地黃補

血歸經芍藥涼血補腎生地黃生血寧心熟地黃補

藥其四味辛散能行血滯於氣也地黃血中氣藥也通肝

藥其四味辛散能行血滯於氣也地黃血中氣藥也通肝

經性味甘寒能生真陰之虛者也當歸分三治血

藥其四味辛溫全用能活血各歸其

中主藥也通肝經性味辛溫全用能活血各歸其

藥其四味辛溫全用能活血各歸其

經也芍藥陰分藥也通

治血虛腹痛若求陰藥之屬必於此而取則焉

治血虛腹痛若求陰藥之屬必於此而取則焉

治血虛腹痛若求陰藥之屬必於此而取則焉

補榮湯

通治諸失血

當歸子仁麥門冬陳皮各一錢人參甘草赤

枝烏梅各五分右剉作一貼棗二

煎服

# 保命生地黃散

治地黃熟爛吐便尿諸失血無寒證者  
地黃熟地黃拘杞子地骨皮天門

五分冬白芍藥黃芪

右剉作一貼水煎服

脉微身涼加桂皮

各一錢黃芩黃連甘草各

# 坎窩膏

治陰虛火動致衄吐咳嗽咯唾血黃柏知母

將黃杏仁七錢胡桃仁去皮

知母剉入童便三椀淨四兩白蜜四兩

右先煎至四

天門冬麥門冬各二

前計內熬成膏

杏仁搗爛如泥另用

水一添水二

柏葉一把握

煎至二

椀熬入蜜入

前計內熬成膏

杏仁搗爛收貯

口沉水中一日去火

毒每服三五匙柏葉湯調

空心服終始忌銅鐵器

白芷吐血真蒲黃地榆各一

# 固榮散

治一切失血真蒲黃地榆各一

半右爲末每服四錢溫

酒丹調服

# 血餘散

治角水爭洗晒乾燒灰爲末

失血爲末每二錢白茅根煎

薰治內崩亂緩以皂

火煎

湯調下或醋湯調下丹

側柏

湯

乾煎吐血崩

代茶吃

止血

一切失血之疾

抹葉

一

名柏

湯一名柏

晒

同茶皆

童子尿

速

虛

吐血

藥中

每入童便

一合其效甚

入童便

一合其效甚

入童便

一合其效甚

入童便

一合其效甚

滋陰

又

能消瘀血

止吐血

諸血

先賢有言

凡諸失

血

先賢有言

凡諸失

血

先賢有言

凡諸失

信矣

用童便

一日

鍾入薑

汁二三

次爲佳

醫

攬

單方

九二種

百草霜

深村鍋底者

佳刮取細末

用之

凡血

見黑則

散冷水

調服

背佳

或

井華水

治九

竅出血

及衄血

勿令

病人先知

之

以水

**生地黃**

治

吐血

便尿

一切失血

取計

飲半升

日

或和薄荷汁

或和生薑汁

皆效

丹

日

心

日

日

日

**車前草葉及根**

止血

破血

即生用

補血

取

**蒲黃**

止

炒

用

公水

調

二三錢

服

補血

**芎窮**

能

行血

治吐

血

煎

服

末

服

並佳

鞣

便尿

一切

血

養血

芎窮

藥第一

綱

**當歸**

當歸治一

切合

爲芎能和血

行血

煎湯

爲血

藥第一

芎窮

中藥

水

崩

中藥

水

煎

中藥

水

煎

**白茅根**

能

止血

治吐

血

煎

服

之

茅花

便尿

一切

失血

**艾葉**

治

吐血

飲

乾

尿

偏尿

一

煮

服

主

結

陰

**地榆**

止

血

水

煮

血

服

之

**大小箭**

俱治

一切

血

病

能

破血

止血

生

擣

欝金

止吐衄血破惡血爲末以童便薑汁好酒相調服又治痰血取末和韭汁童便服之其血自

心丹消

白芨

治衄亦可吐咳唾咯血冷水調末三錢服神妙米飲

一死後凌遲

囚拷掠遍身吐衄並流血常服白芨末輒止

槐花

涼血錢調服能止咯唾血及下血炒爲末熱酒取末二

可

側柏葉

治吐衄便尿一切失血之證止血滋陰爲末

松烟墨

能止一切失血以生地黃丸服之

生藕汁

消瘀血或合地黃汁熟酒童便服並得轉

韭汁

止吐衄四盞必胃中煩燥不寧後自愈心丹取汁

# 亂髮灰

止一切失血吐衄便尿九竅出血皆治之取末醋湯或井華水調二錢服作丸服亦可

# 諸血

補入身血不足面無血色者並生飲之六畜及獐鹿之血皆可幹○虛勞吐血飲黑狗血神效

鱗

# 蘿蔔汁

治衄或和好酒飲之即止蓋氣降則血許服之

# 鍼灸法

衄吐血下血取隱白大陵神門大谿○衄宜灸大顙門即止○衄血

衄不

止以三稜針於氣衝出谷內庭三里照海取

上星

府瘡○中上脘中脘氣海關元三里照海

風府

大陵○上脘氣海關元三里照海○吐血

灸大陵

○嘔血取上脘大陵郄門神門○吐血

關脉

○大便出血數斗者以膈俞傷故也宜灸膈俞○吐血

灸七壯

即止生資

夢

長生金匱 卷之二

魂魄爲夢

凡夢皆緣類

魂魄役物又曰形接而爲事相遇

神存故也

則魂魄飛揚紛紜

心實則夢可憂可驚可怪之事虛

心邪客使

魂魄不安者血氣少也

多夢宜別離散益氣安神湯門

爲離散

陽氣衰者

妄行陰氣衰者

爲狂

別離散

治心風

爲病男夢見女女夢見男

宜此去邪

桂乾薑

菖蒲各二錢

右爲末每二錢

空心白湯調下熟者

三錢當歸地黃各五錢

附桂加知母黃柏各

益氣安神湯

治七情六淫

相感而心虛夜多夢寐

不寧恍惚驚悸當歸葵神各一錢生

地黃麥門冬酸棗仁炒遠志人參黃芪蜜炒牛膽

南星竹葉各八分小草黃連各四分右剉作一貼

薑三片棗二  
枚水煎服

淫邪發夢黃帝問曰淫邪詳行柰何歧伯對曰正邪從外襲內而未有定舍反淫于藏不得定處與榮衛俱行與魂魄飛揚使入卧不安而喜夢是以陰氣盛則夢涉大水而恐懼陽氣盛則夢大火而墮燔灼陰陽俱盛則夢相殺上盛則夢飛下盛則夢甚飢則夢取甚飽則夢與肝氣盛則夢怒肺氣盛則夢善笑恐畏脾氣盛則夢歌樂身體重不舉腎氣盛則夢腰脊兩解不屬○又曰厥氣容于心則夢見丘山烟火容于肺則夢飛揚見金鐵之奇物客于肝則夢山林樹木客于脾則夢居水中客于膀胱則夢遊行客于胃則夢飲食客于膽則夢鬪訟自刺客于陰器則夢接內客于項則夢于大腸則夢田野客于小腸則夢聚邑街衢客于胷則夢行走而不能前及居深地竈苑中客于股肱則夢禮節拜起客于胞殖則夢則夢便櫨○一婦人常夢與鬼神交驚怕異常及見神臺陰司舟楫梁如此十五年竟無姪娘請治

無效戴人曰陽火盛于上陰水盛于下見鬼神者

陰之靈神

堂者陰之所居

楫橋梁水之用也

診之

兩

手寸脉皆沉而伏知其腎

中

有痰實也亢三

涌三泄三汗不旬日而無夢

一月而有娠

則夢見菌香生草實則夢救火陽物實則

夢則夢食不足實則夢等垣蓋屋

肺氣虛則夢見白物見人斬血藉藉實則夢見兵

## 五藏虛實爲夢

肝氣虛則夢見菌香生草實則夢救火陽物實則

夢則夢食不足實則夢等垣蓋屋

脾氣虛則夢見白物見人斬血藉藉實則夢見兵

肺氣虛則夢見白物見人斬血藉藉實則夢見兵

夢燔灼脾氣虛則夢見白物見人斬血藉藉實則夢等垣蓋屋

夢見舟船溺人

夢見舟船溺人

夢見舟船溺人

夢見舟船溺人

## 陽氣之出入爲寤寐

張靈樞曰衛氣之行晝行於陽則目

夜行於陰則目瞑而寐。

鄭康成曰口鼻之呼吸爲魂

耳目之聰明爲魄

口鼻對言則口鼻爲陽耳目爲陰以耳目

爲陽耳目爲陰以耳目

爲陽耳目爲陰故

口鼻與藏府對言則

耳目口鼻爲陽藏府爲陰故

陽氣行陽分二十五度於身體之外則耳目口鼻

爲陽藏府爲陰故

皆受陽氣所以能知覺視聽

運動作而寤矣陽氣行

陰分二十五度於藏府之內則耳目口鼻無陽氣行

運動所以不能知覺而寐矣

陽氣爲之乎寐矣

# 昏沉多睡

名靈樞

曰足太陽有通項入于腦者正屬目本

項中兩筋間入腦乃別陰蹻陽

當

蹻目

陽蹻陰氣盛則瞋目陰氣盛則瞑目

衛氣滿則陽蹻盛於

不得常留於陽故自不瞑又曰衛氣滿則陽氣留於陰不得行

於陰則陰蹻滿不得入

於陽故留於陰則陰氣盛則陰蹻滿不得入

於陽則多眠昏而

證閉目者陰主闔也默默不欲言者陰主靜也太陽

而

蓋寤則行陽寐則行陰必從足少陰始故少陰而

微細但欲

寐但欲寐宜焚艾四逆湯少陽少陰以益陰回

陽或熟

病得汗後脉沉細身冷喜卧昏沉不省亦急與四

下後醒

多眠者爲正氣已復不必藥也門○風溫多眠狐惑

多眠

# 虛煩不睡

靈樞

曰黃帝問曰人之目不瞑不卧者何氣使然伯高對曰衛氣晝日行於陽夜行於陰

常從足少陰之分間行於五藏六府今厥氣客於藏府則衛氣獨衛其外不得入於陰行於陽則陽氣盛陽氣盛則陽躋滯不得入於陰氣虛故目不瞑飲以半夏湯一劑陰陽已通其卧立至其方以水千里外者八升揚之萬遍取其清五升煮之以火以葦薪火沸置秫米一升治半夏五合徐炊令竭爲一度其病新發者覆盃則卧汗出一小盃日三稍益以知爲度其病新發者覆盃則卧汗出則已矣久者三飲而已○身不覺熱頭目昏疼口乾咽燥而不渴清而清不寐皆虛煩也因之○大病後虛煩不寐溫膽湯主之甚者益元散鬱門加朱砂牛黃服之○但獨熟者虛煩也起卧不安睡不穩謂之煩門宜竹葉石膏湯鬱門加朱砂牛黃服之○大病後虛弱及年高人陽衰不寐者六君子湯貼之○但酸棗仁炒鬱門加朱砂牛黃服之○酸棗仁炒鬱門加南星酸棗仁在膽經神不歸舍而不寐者加炒酸棗仁黃芪如瘧是陰虛生內熱所致是故傷寒吐下後及霍亂煩吐是陰虛擾而不寧也內經曰陰虛則內熱今之虛多是陰虛而內熱所致是故傷寒吐下後及霍亂煩吐寧志後津液枯竭多有虛煩之憂散真珠○虛煩元獨不睡宜鴻志膏仁湯高枕無煩之證真珠○虛煩元獨不睡宜

○勞心膽冷夜卧不睡定志元  
柏子仁炒朱砂乳香爲衣棗湯下五十丸加酸棗仁炒  
不睡傷寒不睡誠○癲狂

### 酸棗仁湯

治虛煩

半錢

酸棗仁

炒入

參各一錢

半錢

不知毋

石

### 赤茯苓

甘草各一錢

桂枝

### 溫膽湯

治心膽虛怯觸事

易驚夢寐不祥

虛煩不得

半夏陳皮白茯苓枳實各二錢青竹茹一錢

桂枝

### 主氣之藥

鑑

鑑

鑑

鑑

鑑

鑑

鑑

鑑

鑑

鑑

鑑

鑑

鑑

鑑

鑑

鑑

鑑

鑑

鑑

### 加味溫膽湯

治法同上

半夏三錢

陳皮二錢

遠志二分

桂枝

五味子人參熟地黃白芍芩甘草各一錢右剉分作

桂枝

# 寧志膏

仁治虛煩不得睡或夢涉危險睡卧不寧酸棗炒二兩人參一兩朱砂五錢乳香二錢半

右爲末煉蜜和丸彈子大每丸溫酒化下大棗湯亦可竭○婦人失血過多心神不安不得睡卧

朱砂二錢右爲末每丸炒人參白茯苓神琥珀各七錢半乳香

酸棗仁湯治不睡及多睡酸棗仁微炒入參白茯苓煎湯調下丸全方

高枕無憂散治心膽虛怯晝夜不睡百方不效服此  
不如今要睡即熱服如

高枕無憂散治心膽虛怯晝夜不睡百方不效服此  
不如今要睡即熱服如

茯苓枳實竹茹麥門冬龍眼肉甘草各一錢半夏白  
半酸棗仁炒一錢右剉分作二貼水煎服

真珠母丸治神魂不寧驚悸不得睡真珠母七錢炒柏

熟地黃當歸各一兩半人參酸棗仁炒柏

子仁犀角白茯苓神各一兩沉香龍齒各五錢右爲  
末蜜丸梧子大朱砂爲衣每四十五丸薄荷湯下爲

日二服此方真珠母爲君龍齒佐之真珠母入肝

經爲第一龍齒與肝同類也龍齒虎睛人皆以入肝

鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄龍能變化故  
魂遊而不定虎能專靜故魄止而有守若魄不寧

者宜用虎睛魂飛揚者宜用龍齒驥

### 獨活湯

治同上獨活羌活人參前胡細辛半夏沙參

荳蔻酸棗仁炒甘草各七分右沙參

梅作一箇水煎服

熟

### 魂離不睡

四明董生患神氣不寧每卧則魄飛揚

體驚悸多魘通久無揚

寐更醫不效許學士診之曰以脉言之肝藏受邪

非心病也平人肝不受邪卧則魄歸於肝神靜而

得寐今肝氣因虛邪氣襲之肝藏魂者也肝有邪

則魂不得歸是以卧則魄飛揚若離體也肝主怒邪

故小怒則劇遂處以真珠母丸獨活湯

一方以贈服一月而病悉除本軒規上

### 思結不睡

一婦人因思慮過傷二年不得寐戴人曰

其夫議以怒激之多取財飲酒數日不處一方而去其婦大怒汗出是夜困卧如此者八九日不寤

# 老少之睡不同

黃帝問

曰老人之不夜瞑者何氣使然

岐伯答

曰壯者之氣血精

而夜瞑其肉滑氣道通榮衛之行不失其常故晝精

而夜瞑其肌肉滑氣道通榮衛之行不失其常故晝精

而夜瞑者之氣血衰其肌肉枯氣道澁五藏之精

而夜瞑者之氣血衰其肌肉枯氣道澁五藏之精

而夜瞑者之氣血衰其肌肉枯氣道澁五藏之精

而夜瞑者之氣血衰其肌肉枯氣道澁五藏之精

而夜瞑者之氣血衰其肌肉枯氣道澁五藏之精

# 睡辨陰陽虛實

傷寒及雜病多睡者

陽虛陰盛也喜明者屬陽元氣實也無睡

陽虛陰盛也喜明者屬陽元氣實也無睡

陽虛陰盛也喜明者屬陽元氣實也無睡

陽虛陰盛也喜明者屬陽元氣實也無睡

# 卧不安

人卧則血歸於肝今血不靜卧不歸

○黃帝問曰人有卧而有而不

能知其病則卧不安

藏有所傷及精有所倚人不

能知其病則卧不安

藏有所傷及精有所倚人不

安者何也岐伯對曰藏有所傷及精有所倚人不

能知其病則卧不安

藏有所傷及精有所倚人不

能知其病則卧不安

藏有所傷及精有所倚人不

能知其病則卧不安

虛伯曰肺者藏之蓋也

○帝曰人之不得偃卧者何也

○肺氣盛則肺大肺大則不

能偃卧

肺者下行陽明者胃脉也

能偃卧

其氣亦下行陽明者胃脉也

○足三陽者下行陽明者胃脉也

○不得從其道故不得卧也

○不得從其道故不得卧也

○不得從其道故不得卧也

○不得從其道故不得卧也

經曰胃不和則卧不安夫不得

而喘者是水氣之客也

齶

## 身重嗜卧

黃帝

曰人之多卧者何氣使然

岐伯

曰此人

氣留

於陽

夜行

於陰

故陽氣

盡則寐

陰氣盡則寤

故晝分肉

不解則行

遲

夫衛氣者

晝行遲

則其行遲

則其行遲

腸胃大

則衛氣

行留久

皮膚濕

而分肉

不分解

其行遲

則其行遲

則其行遲

則其行遲

則其行遲

則其行遲

則其行遲

則其行遲

留於陰

也久其氣

不精則目

瞑故多

卧矣

目瞑故多

卧矣

目瞑故多

卧矣

目瞑故多

卧矣

目瞑故多

卧矣

目瞑故多

留於陽

也久其氣

不精則目

瞑故多

卧矣

目瞑故多

卧矣

目瞑故多

卧矣

目瞑故多

卧矣

目瞑故多

卧矣

目瞑故多

## 惡人欲獨處

內經

曰足太陰之脉

病身重

而體重

筋骨痺

而體重

筋骨痺

而體重

筋骨痺

而體重

筋骨痺

而體重

筋骨痺

則惡入

而處又

曰陽明厥

則喘而

煩惱也

則惡入

而處又

曰陽明厥

則喘而

煩惱也

則惡入

而處又

曰陽明厥

則喘而

## 寢睡法

臥宜側

身屈膝益入

心氣覺宜舒

展則精

是數

散蓋舒

卧則招魔引魅

孔子寢不戶蓋謂是數

人○不得晝眠令入失氣

且邪惡從口入成病

又曰暮卧常習閉口

口啞

開即失氣

且邪惡從口入成病

又曰暮卧常習閉口

覺不厭。力勝正復仰。按孔子不戶卧。故曰睡。不厭。一  
夜常作五度。反覆逐更轉。○夜不安寢。衾之厚熟。  
壅故也。當急去之。仍拭汗孔。或薄而寒。即加之。睡  
自穩也。飢而睡不安。則宜少食飽。而睡不安。則宜  
啜茶。少行坐。○睡留燈燭。令人神不安。○人  
几人常卧。不宜仰卧。以手覆心。上則必覺。不得寤。  
若暗中着覽。不得以火照之。亦不得近前急呼。但  
焚末。或半夏末。吹入鼻中。即醒針。

## 辟惡夢

夜夢惡不湏。說且以水面東持刀噀之。呪曰惡  
夢着草木好夢成珠。王即無咎矣。又夢之呪曰惡  
並勿說。爲吉。○麝香久服。不夢寤。○麝又將真  
麝一劑。安枕合中。枕之中。除邪辟惡夢。○蘇合香  
令人無夢。○服或帶之。○犀角除麝寐。○虎頭爲枕之辟  
惡夢。除麝寐。○服或帶之。○

鴉羊角安心氣。不令

魔寐。除邪氣驚夢。○

## 用藥法

虛而多夢。紛紛人參龍骨。加而用之。○

酸棗仁炒末。竹葉煎湯調服。○

實多虛。

○人因恐得病如人將捕睡卧不安飲食不服  
○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服  
○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服  
○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服  
○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服  
○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服  
○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服  
○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服  
○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服

單方八種

○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服  
○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服  
○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服  
○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服  
○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服  
○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服  
○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服  
○人因恐得病如人將捕睡臘茶煎湯調服

鹿頭肉

治煩悶多夢及夜夢見鬼物煮汁飲食其肉

安息香

治婦人夜夢鬼交爲丸燒熏丹穴末斷

苦竹葉

治虛煩不睡

小麥

治煩熱少睡

酸棗仁

治多則生用不得熟用之

榆白皮

治不睡嵇公云榆令人瞑是也初生仁以作糜羹服之令人多睡

林檎

治不睡多食則  
令人好睡  
煮人作飲服之  
令人得睡  
鞣

木槿

煮人作飲服之  
令人得睡  
鞣

蔽

常食之  
多睡  
鞣

蓴

常食之  
多睡  
鞣

沙參

治多睡常欲眠  
服或作蘿  
煮人作飲服之  
鞣

通草

療脾疽常欲  
服  
煮人作飲服之  
鞣

烏梅

治不睡  
飲人少  
好睡  
鞣

茶

除人少  
睡溫  
鞣

苦菜及苦苣

皆令不睡  
食之少  
鞣

伏翼

取血  
不睡  
鞣

**馬頭骨** 主喜睡人

**草決明子** 久服令人不睡

**鍼灸法**

膽寒二節

不得睡取之灸一壯。沉困多無名指第

陰交不刺

不得卧

## 聲音

**聲音出於腎**

心爲根

風寒暑濕

氣血痰熱

邪氣散則天籟鳴矣

肺爲聲音之門

腎爲聲音之門

有干於心

有干於心

有干於心

肺者病在上

腕隨證解之

不能納諸氣

以歸元故氣逆而上咳嗽

肺爲聲音之門

腎爲聲音之門

有干於心

有干於心

有干於心

有干於心

腎虛爲病

或喘或脹

或脹脅腹百骸俱爲之牽制其聲愈乾矣

○一小兒吐瀉

錢氏用益黃散使君子丸果

又不大小便他醫以藥利

與瓜萎湯

利之變身冷

不飲食錢氏用益黃散使君子丸果

又不大小便他醫以藥利

身溫而能飲食

其兒又不語

脾已實

腎尚虛

因涼藥利

利小便致脾腎俱虛今

脾已實

腎尚虛

因涼藥利

利小便致脾腎俱虛今



元參平

動

覩

一月而痊

鐵

失音宜服

人

腎聲不出宜服

腎氣丸

觀

虛聲不出宜服

人

# 人參平補湯

治腎虛聲不出

人參川芎當歸熟地黃

戟摘紅半夏麴各六分

牛膝白芍破故紙胡蘆巴

菖蒲二分右剉作一貼薑

三片棗二枝水煎於五更初

腎氣開時不許咳

回春名滋腎湯與此同咳

# 聽聲音辨病證

中經曰視喘息聽音

恐者聲如從室中言

是中氣之濕也○靈樞曰病

人語聲寂寂然善驚

不徹者心膈間病語

呼者骨節間病語

聲喑喑然

又曰聞而知之謂

之聖○難經曰聞而長者頭中病

聞其五音以別其病

謂

聲也假如肝病則聲悲

肺病則聲促

心病則聲長小腸病則聲雄

病則聲慢腎病則聲沉

大腸病則聲促

脾病則聲長小腸病則聲微

聲短胃病則聲速

膽病則聲沉

肺病則聲促

脾病則聲微

○內經曰聲合五音入門曰金聲響土聲濁木聲韻

清膀胱病則聲濁

木聲微

長水聲清火聲如從瓮中出

若中水也

言又

卒然無音

黃帝問曰

人之卒然憂恚而無音者何道也

荅曰

喉

塞

何氣

出行

使音

不彰

願聞其方

少師

答

者氣

之所以上

下者

聲音

之扇也

舌者

聲也

會音

之泄

者機

也橫

骨者

懸雍垂者

聲音

之主

發舌者

頑頬

不開

分氣

失也

是故厭

人之鼻

洞薄

則開

闔難

其氣

出遲

故重言

利其出

氣易

其厭

大而厚

則小而

於厭

則其氣

出遲

故重言

能發

不能發

人卒然

無音者

寒氣

蘇含

音半

熬桂

心參

荆芥

散當

風使

人失音

○人患

卒瘞

取杏仁

宜刑七

錢含

半錢

桂心

末二

錢半

和桂

○又方

搗如泥

取李核

大綿裹

皮穗各

濃煎

頻服

○桂心

日五夜三

錢半

和桂

○又方

苦竹葉

濃煎

服又橘

荊蘇湯

治感風寒

卒瘞及失音

通用荊芥穗

紫蘇葉

各一錢

右剉

作

煎服

水

人參荊芥散

治感冒風寒言語不出咽乾鼻涕人參  
荊芥穗陳皮苦萸半夏細辛杏仁通草

射干湯

治天行暑寒熱伏於內咳嗽不得息喉嚨中如梗半夏二錢杏仁陳皮

桂心枳實各一錢

射干當歸獨活麻黃紫菀

因難病失音

中風人飲食坐卧如常但失音不語俗呼

錢或訶子清音湯亦可飴

下○因咳嗽失音

人參清肺散杏仁煎蛤丸

去附子加石膏菖蒲

芍藥散○虛損憔悴氣血不足失聲音久瘡宜

下○因瘡失音

失音宜響聲破笛丸

○痘瘡後失音宜喉痛生瘡聲療宜

人參清肺散

治瘧疾咽喉乾聲不出入參陳皮貝母炒

枳皮甘草各五分  
桔梗杏仁黃連各一錢  
桔梗杏仁黃連各一錢  
桔梗杏仁黃連各一錢  
桔梗杏仁黃連各一錢

服薑三片

水煎服

### 杏仁煎

治咳失音聲不出

杏仁泥白蜜砂糖屑生  
薑汁各一盞桑白皮木通貝母炒各一兩半

紫菀五升煎至半升各一兩

石菖蒲五錢右六味剉以水

升子各一兩去滓入杏蜜糖薑再煎成稀膏每

加蜜酒一匙含化無效作

### 蛤蚧丸

治肺間積血作痛失

音及久嗽失音蛤蚧一  
對醋灸阿膠丸

甘草各五錢右爲末蜜丸

阿膠丸

### 玉粉丸

治冬月寒痰結塞

音語不出半夏洗薑製五

甘草大每一丸含化

烏熟炒桂心各二分半右爲末薑汁浸

### 芎辛散

治熱痰壅盛失音聲

不出是燥熱所致用此

苦蔓白芷羌活桑白皮

即效

川芎細辛防風苦蔓白芷羌活桑白皮

蒸餅和丸夜含化年久者亦效

# 響聲破笛丸

草治

各一錢甘草二片薄荷三分右因謳歌失音薄荷四兩連翹苦梗甘

各二兩半百藥煎二兩川芎一兩半

大黃酒炒各一兩右爲末雞子

# 厥氣為瘡

厥氣走喉而不能言手足清大便不利取足

少陰上繫於舌絡於橫骨終於會厭兩鴟其血

又曰人卒然無音刺之柰何歧伯曰足

之脉

厥氣乃發癰

遂厥氣走喉。一男子久病瘡

灸豐隆二穴各三壯照海二

穴各一壯其聲立出仍用黃芩降火爲君杏仁陳

皮苦蔓鴟厥氣爲臣訶

立出仍用黃芩降火爲君杏仁陳

良佐服之

之良藥

失音

# 瘡瘻有二

瘡者邪入陰分也內經曰邪搏陰則爲瘡又

乃中風舌不轉運之類是也

蓋舌瘡但舌本不

能轉運言語而喉失

音之類是也

蓋舌瘡但舌本不

能轉運言語而喉失

音之類是也

蓋舌瘡但舌本不

能轉運言語而喉失

音之類是也

嘶咽音而舌本則如故也喉瘡但喉中聲

聲嘶

○五藏久咳則聲嘶者喉破也非咽喉門病  
嘶者血虛受熱也用青黛蛤粉蜜調作丸含

化

心冊

○聲嘶宜柴胡升麻湯潤肺丸蜜脂煎

柴胡升麻湯

治傷寒咳嗽聲嘶或咽痛柴胡黃芩半夏升麻乾葛枳實苦梗知母貝母玄參

桑白皮甘草各七分

○作一貼薑三片水煎服

○繕

潤肺丸

治久嗽聲嘶語音不出訶子皮五倍子五味子片芩甘草各等分右爲末蜜丸櫻桃大棗

桑白皮甘草各七分

○作一丸噙化

蜜脂煎

治久失音聲嘶常服潤肺豬脂二斤熬去渣入磁器內俟成

膏不拘時挑

○門

腎怯與失音相似

又病吐瀉及大病後雖有聲而不能言進藥此非失音乃腎怯不能上

接於陽故也當補腎地黃元  
主之失音乃感風寒卒病耳

陽虧觀仲

### 息有音

不得卧而食有音者是陽明之逆也足三陽者  
下行今逆而上行故息有音也陽明者胃脉也  
陽明逆不得後其道故不得卧也夫起居如故而  
息有音者此肺之絡脉逆也絡脉之病人也微故而  
起居如故而

息有音也

繫

### 不治證

內傷虛損咽瘡失音者無治法門○病人五藏  
已奪神明不守聲嘶者死髓○病人陰陽俱絕  
失音不能言者

三日半死

### 傷寒狐惑聲症

### 小兒疳痢聲症

並見本門

### 通治聲音藥

尋常聲音不清宜加味固本丸加味上清丸  
喉嚨丸發聲散訶子散訶子清音湯出

方聲音

### 加味固本丸

治男女聲音不清或失音生乾地黃熟地黃當歸黃柏蜜灸白茯苓各一兩天

門冬參三錢炒麥門冬益炒知母訶子牛乳阿膠珠各五錢  
人參湯右爲末和勻蜜丸黃豆大以訶子湯或蘿  
薑湯下八十九或百丸門○醫鑑名鐵笛丸

加味上清丸清聲潤肺止咳嗽爽氣寧神白砂糖八  
兩薄荷葉四兩柿霜四兩玄明粉鵬砂石  
水(寒)水(熱)成膏烏梅肉各五錢片腦五分右爲末甘草  
和丸大如實大每丸噙化茶湯下

噙兒丸椿芽爲末四兩代香之  
治久失音聲症香椿芽汁四兩如無用淡香  
或每三錢水煎下

發聲散治語聲不出黃瓜蔓一箇剉焙苦  
生半炒白殼炒五錢甘草炒二錢右爲末  
生半炒甘草二錢半生半炒木通

訶子散治咳嗽聲音不出訶子炭三錢半  
生地黃湯調下

八三生錢右地黃汁分一小盞每一貼臨卧  
或每三錢水煎去滓

清音散

治聲音不清與上喉  
苦蔓生用木通半生

半炒  
醫

訶子清音湯

治諸風失音不語  
去鐵半生半灸右爲龜末  
漳八童尿一盞調服

不過三服愈  
水煎

醫

一方

治人患乾咳聲瘡

各七分甘草青皮各三分作一味子二貼入童便竹瀝

骨皮瓜萎仁苦蔓各五分

白芨子二十粒知母煎服

并炒黃柏五分仍與四物湯入童便竹瀝

薑三片煎服

單方

凡十種

石菖蒲

出音聲煎服或

燕覆子

續五藏斷絕氣使語

通草

服出音聲可煎

**杏仁**

可和酪作湯益潤聲氣○欲好聲杏仁一升去皮尖熬酥一兩蜜少許和丸梧子大半飲下十

十五丸或二

**桂心**

音治感寒失音取細末含之薰汁○咽喉痛失語桂心杏仁各一兩為末蜜丸櫻桃大綿

薰裹含化

**苦竹葉**

治卒失聲聲噎不出濃煎飲之薰

**橘皮**

皮濃煮取汁頻服薰失聲聲不出橘

**梨**

主中風失音不語生搗取汁每服一合日再薰

**乾柿**

漬潤聲喉可水常服之薰

**胡麻油**

竹瀝薑汁童便茅服之薰

**童子尿**

主久嗽失音由其能降火故也又云人尿益聲可溫服之

雞子

多食令人有聲以水煮兩沸合水服之

鍼灸法

卒然無音取天突靈樞○喉痺卒瘡取豐隆○厥氣走喉不能言取照

突

廉泉○暴瘡失音取神門涌泉○暴瘡

合谷

陽交○暴瘡失音取神門涌泉○暴瘡

通谷

天鼎期門支溝○暴瘡失音取神門涌泉○暴瘡

## 言語

肺主聲爲言

難經曰肺主聲入肝爲呼入心爲言入脾

心爲言妄語

言語譖妄

自言曰言答人曰語○譖者妄也或自言平生常事或開目言

人所狂言未見事或獨語或睡中呢喃或呻吟不已甚

則罵詈俱謂之譖語皆因胃熱乘心故也詳

嘯○問曰傷寒始自皮毛入是從肺中來肺主聲入于心

明乎○陽明入于心

則爲言也又曰合目自言言明日用常見常行之

事即譖語也大開目與人語言所未嘗見常行之

爲狂言也。○譖語者口出無倫邪氣勝也。翻也。  
衣被不斂言語善惡不避親疎者此神明之亂也。  
言語譖妄此乃悲泣呻吟。

## 瘡不得語

內經詳說曰

邪入於陰搏則爲瘡有舌瘡候瘡之

一端有舌強不語神

非止一端有舌強不語神

瘡有舌強不語神

昏不語

口噤觀

不語舌縱語

治法治之

其間治瘡

其間治瘡

## 痰塞亡血亦爲瘡

足少陰之脉挾舌本足太陰之脉連

手少陰之別脉繫舌本故此三

門其脉道而舌不能轉運

言此三脉風下

脉虛

則痰涎乘虛閉塞

亡血則舌無血榮養而瘡內經曰

難以言又云刺舌

經曰

此三脉風

刺足少陰

脉重而出不

止爲瘡治當補血又

此三脉風

難以言又云刺舌

經曰

熱中之

則舌脈弛縱而瘡

風寒客之則舌脉縮急

而瘡隨證治之

○瘡塞不語宜導痰湯

加瀉肺湯

菖蒲竹茹

人參或芩連

陳皮甘草菖蒲遠志

血不語宜四物湯

門

加瀉肺湯

菖蒲

加人參白朮

或芩連陳皮甘草

菖蒲遠志

血不語宜四物湯

門

一方

一治之以人參三錢黃芪白朮當歸陳皮各一錢

煎湯入竹瀝薑汁

舌轉運能言語熟除而瘞

川芎血後舌不能語但渴飲水脉畧數白朮人參各二錢陳皮一錢半

甘草五分水煎入竹瀝童便薑汁

脉法

寸口不足其息微而澀貼能言也

語謬誤纏○心脉濶甚爲瘡又曰手少陰之別脉名曰通里

○心脉短而澀微則燥則血不足其形逆榮氣無餘衛

別舌本虛則不行於心中繫

○心脉搏堅而長富病舌卷不能言也

鄭聲

正者重也言語重復不已

○鄭聲者音模糊有如鄭衛門

也出于喉○鄭即鄭聲者聲戰皆大病後有之

○鄭聲者語不接續精氣脫不

言微

內經曰言而微終日乃復言者奪氣也○靈樞曰

中爲氣之海不足則少氣力不多言○易老曰

真氣虛弱脉微懶語宜人參  
黃芪湯及益氣丸煎服

呼內經曰肝在聲爲呼○爪甲青惡罵不休爲膽絕夫呼罵者怒之聲狂病不在此例汗金○手足甲青呼

目多難過九脉九

笑靈樞曰心氣虛則悲實則笑不休○難經曰心外證面赤口乾善笑○皇甫士安曰心在聲爲笑又曰喜與笑皆屬心火○內經曰心實則笑笑則喜○何笑

間曰喜爲心火之志也喜極而笑者猶燔灼太甚而嗚笑之象也故病笑者心火之盛也

## 治法

此婦人病喜笑不已已半年衆治無效戴人曰

研細河水上大核同煎溫服三次以釵股探喉吐

出熟痰四五升次服黃連解毒湯不數日而笑定

而焰故笑之象也五行之中惟火有笑嘗治一老風

人笑不休口流涎以黃連解毒湯點服之笑止矣稱

半夏竹葉竹瀝量汁服之笑止矣稱



歌內經曰脾在聲爲歌。靈樞曰足陽明之脉病甚則高而歌。癲狂耶崇之病皆或歌或哭。脾

其好音樂是也謳

哭外證面白善嚏悲愁不樂欲哭。婦人藏燥悲傷欲

婦哭詳見入門

呻內經曰腎在聲爲呻○脈訣曰呻呻者困重形於外也○腎病好呻呻者痛聲也

欠帝問曰人之欠者何氣使然。歧伯對曰衛氣晝行于黃

下故陰氣積于下陽氣未盡陽引而上陰引而下

櫟陰陽相引故數欠又曰足陽明之脉病善伸數次

○瘧之始作也善伸數欠又曰二陽也一陰包

發生病善噫善欠註云氣鬱於胃故

○氣乏故欠伸引之門故

嚏黃帝曰人之嚏者何氣使然歧伯曰太陽之氣陽外證氣

面白善嚏。嚏者鼻中因痒而氣噴作于聲也。鼻爲肺竅。竅痒爲火化是火乘金爲病也。肺爲病也。肺爲病也。肺理不密。噴嚏不已。瞤○欠。

爲氣乏。嚏爲氣通瞤。

**噫**與嗳氣同。吐出飽氣也。

氣

詳見內傷。

飽

**太息**

黃帝問曰人之太息者何氣使然歧伯對曰人憂愁則心系急心系急則氣道約約則不利故太息

以出足少陽之經。病口苦善太息。又曰

**大驚**

不能言宜密陀僧散。遠志丸。茯神散。治驚入心則敗血頑痰填塞心竅。故瘡

**密陀僧散**

治驚氣入心瘡不能言密陀僧研極細末。每錢茶清調下。一方以熟酒調下。有熟

者麝香。湯調下。普有人爲虎魄所驚久瘡服此即愈。

**遠志丸**

治因驚言語顛錯遠志。薑製南星牛膽製人參白芍神酴棗仁炒各五錢朱砂製人

錢水飛麝香一錢金箔五片右爲末蜜丸梧子大朱砂爲衣薄荷湯下三十丸日再服

大朱砂

飛麝香

薄荷湯

金箔五片

右爲末蜜丸梧

朱砂

製人

疾神散

蔓治

白同上

茯苓

遠志

生地

黃白

芍藥

川芎

當歸

苦杏仁

年燈

心七

十四錢

大棗

二枚

同煎

至七分

服之

有大婦

亂爲驚

疾服

年七

十四歲

因我亂

爲驚

疾服

二方得

效驗

風不語

詳見

語澁

皆屬風

宜考

婦人產前不語產後不語

並見

小兒語遲

詳見

言語法

少言

養內氣

初言語

少言語

過多成咳

嗽或失音

語初

入後勿

言語

誦讀常想

聲在氣海中

禁勿

語過多

成咳嗽

或失音

故而食者

常患脅痛

古人食不言

言以

此故也

不得言語

者言五藏

如鍾磬然

不用懸卧

多言笑

發行聲

語則令

人失氣

則不得語

若欲語

須住脚

乃得

不治證

絕掣

掣人循衣

擐衣縫

語者妄言

者死不可

治憚人

病入陰陽俱

及俱

錯亂

不能語者不在此例

醫病

## 鍼灸法

溝

綱

乙

足

太陰

之

脉

病

舌本

強

不

能

言

取

合谷

涌泉

陽交

谷天

鼎期

門支

少陰之別

脉名

曰通里

虛則不

能

言

取

症門

舌下腫難

言

取

廉泉

生竇

## 津液

### 身中津液

靈樞

腠理

關汗

大泄

○穀入

氣滿

津澤

注於骨

骨屬

屈伸

洩澤

補益

腦髓

皮膚潤澤

是謂津

津

脫者

屬屈伸

洩澤

補益

腦髓

皮膚潤澤

是謂津

津

入于口

輸于腸胃

其液別爲

五天寒衣

薄則爲

悲衰氣并則爲泣

中熱

○氣內逆則氣爲之閉塞而不行不

行則爲水脹

○腠理發泄

汗出

津液

是謂津

津

主於孔竅留而不行者爲液

○大腸主津

之滲

於孔竅

而不行者爲液

訣經

○大腸主津

上焦灌溉

皮毛充實

腠理若飲食不節

胃氣

受故津液涸竭焉

燥

受

故津液涸竭焉

燥

受

# 腎主液

難經曰腎主五液分化五藏入肝爲疾入心爲

汗入脾爲液心爲涎腎爲汗肺爲涕自入爲唾○靈樞曰五

# 脉法

內經曰尺濫脉謂之多汗釋曰尺膚而濡也○脉大而虛而浮而

濡者汗無餘○脉訣曰汗脉浮虛或濡或澁或濡軟散洪

大渴飲無餘○肝脉浮虛或濡或澁自汗在寸盜

汗在尺○脉經曰男子平人脉虛弱微細者喜

盜汗出也○寸口脉微尺脉緊其人虛損多汗知

陰常在絕不見陽也○傷寒脉浮而遲面赤

而戰惕者當汗出解也○脉遲者爲無陽不能作汗

其身必痒○

# 汗因濕熱

內經曰心爲汗又曰陽加於陰謂之汗釋曰氣上薄陰能固之則蒸而爲汗又曰陽之

汗者天地之液名之○難經曰腎邪入心爲君火○脾胃屬土此濕熱相薄爲汗明矣又如甑中燒酒若非湯火熏蒸則不能成汗液也○

食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心持重遠行  
汗出於腎疾走恐懼汗出於肝搖體勞苦汗出於  
脾○衛氣虛則汗多榮血虛則無汗○風病多  
汗風散氣故也詳觀火氣上蒸胃中之濕  
亦能作癥觀火氣散火門主之濕  
自汗自所以肥腠理司開闔者衛氣虛則陽虛胃氣  
之所以汗多矣○內經曰汗出偏沮使人偏枯○多  
司而汗身軟者濕也心主熱脾主濕濕熱相薄如地之  
蒸氣爲雲雨霧露宜調衛湯玉屏風散胃熱者  
甘湯門○自汗屬氣虛屬濕與痰氣虛用人參黃  
芪少加桂枝真陽虛則少用附子童便煮瀉○凡  
氣傷及一切虛損之證自汗不止者總用補中益  
氣湯防觀少加附子麻黃根浮小麥其效如神但  
升柴俱用蜜水製炒以殺其升發勇悍之性又欲  
引其參芪等藥至肌表也○仲景桂枝湯治外感  
風邪自汗之神劑也○補中益氣藥也黃芪建中湯治  
自汗之神劑也○補中益氣虛自汗氣虛

妙方也。○傷寒自汗有九證。歸腰子壯蠣散小建  
黃芪湯。黃芪六錢。一湯消渴。參附湯。歸腰子壯蠣散小建  
湯。中湯。歸腰子壯蠣散小建。

調衛湯。生甘草。當歸。麻黃根。黃芪各一錢。羌活七分。  
桂枝。白芍。生黃芩半夏。各五分。麥門冬。各一分。

生地黃。各三分。豬苓二錢。蘇木。紅花各一錢。桂枝。白芍。生黃芩半夏。各五分。麥門冬。各一分。

玉屏風散。治表虛自汗。白朮。二錢。防風。黃芪各一錢。桂枝。白芍。生黃芩半夏。各五分。麥門冬。各一分。

生地黃。各三分。豬苓二錢。蘇木。紅花各一錢。桂枝。白芍。生黃芩半夏。各五分。麥門冬。各一分。

二甘湯。治胃熱食後汗出如雨。生甘草。炙甘草。五味子。烏梅肉。各等分。右剉每五錢。薑二片。棗二枚。水煎服。

救心丹。所以有效。內服。水煎服。

黃芪湯。治陰陽偏虛自汗或盜汗。黃芪蜜炒二錢。二  
分。生乾地黃。天門冬。白芍。炙甘草。五味子。麻黃根。各一錢。二

五分。當歸。一錢。二分。麥門冬。白芍。炙甘草。五味子。浮小麥。各七分。防風。五分。右剉作一錢。五味子。浮小麥。○

一 級 氏 黃 茂 湯 同 但 無 龍 骨

一味

地 黃

去熟

用 生

耳

龍 骨

### 參 歸 腰 子

歸 劍

各 五

錢

猪 心

一 箇

破 作 數 片

并 心 內

前 血 以

至 八 分

取 清

汁

吃 猪 心

以 计 送

下 令

盡

### 牡 蠣 散

治 諸 虛 不 足

體 常 自

汗 夜 卧

則 甚 久 不

至 痿

驚 惕 牡 蠣

煅 麻 黃 根

黃 茂 知 母

亦 可 煥

○ 丹 溪 治

小 麥 煎 湯

調 二 錢

服 劍 之

前 服

牡 蠣 粉

麻 黃 根

各 等

分 劍

水 煎 服

之 亦 佳

### 小 建 中 湯

治 表 虛 自 汗

黃 茂 也

治 虛

勞 自 汗

○ 黃 茂 建 中 湯 乃 本 方

本 方 加

當 歸

一 兩 也

治 血

虛 自 汗

○ 桂 枝 附 子 湯

乃 本 方 加

桂 枝 五 錢

炮 附 子 半 箇

也 治 自 汗

漏 不

止 漏 服

七 錢 薑

七 片

水 煎 服

之

亦 佳

### 參 茂 湯

治 自 汗

黃 茂 蜜

炒 人 參 白 术 白 茗 茶

酒 炒 酸 蔗 仁 炒 牡 蠣 粉

各 一 錢

當 歸 熟

陳皮七分甘草二分右剉作一貼  
枝浮小麦一分撮烏梅一箇同煎服

木芩湯治虛汗黃芪防風白芍芩白  
甘草灸二錢半右剉每服七錢浮小麥百

粒同煎

鎮液丹治自汗黃芪蜜炒二兩半大附子二兩  
皮膚童便浸炒防風炒白芍藥酒炒去

中桂各一兩右爲末酒糊和丸梧子大  
空心溫酒下五十丸加酸棗仁尤妙

參附湯治陽虛自汗人參五

參附湯治氣虛自汗黃芪蜜炒附子炮各一  
右剉作三貼薑三片水煎服

芪附湯治自汗漏不止桂枝附子炮

錢半右剉如前法服炮

桂附湯各二錢

桂附湯各二錢半右剉如前法服炮

盜汗內經曰腎病者寐汗出者盜汗也

成無己曰盜汗者寐汗出者盜汗也

宜寐中通降身如浴覺來方知屬陰虛血

火虛汗乃陰虛血之所主也當歸

六黃湯甚妙又四物湯血方  
加參术黃芪○盜汗腎火動甚宜正氣湯脾濕  
盛者宜四制白术散肝熱者宜龍膽散欲眠目合  
則汗出者膽有熱也宜小柴胡湯寒門通用當歸

散地黃湯牡蠣

### 當歸六黃湯

治盜汗之聖藥也黃芪二錢生地黃熟

黃芩黃連黃柏各一錢

七

### 正氣湯

治盜汗之聖藥也黃芪二錢生地黃熟  
分右剉作一貼水煎服。黃芪實表氣當歸生  
熟地黃補陰血芩連黃柏知母各一錢半炒

### 四製白术散

治盜汗之聖藥也黃芪二錢生地黃熟  
斛牡蠣小麥各一兩炒白术爲黃芪石

斛牡蠣小麥各一兩炒白术爲黃芪石

石

粟色只取白术爲末每三錢

米飲調下盡服爲妙

瀉草防風各等分右

### 龍膽散

治肝熱盜汗龍膽草防風各等分右

### 當歸地黃湯

治盜汗氣血兩虛者當歸熟地黃生炒白术爲末每錢米飲調下臨卧時搗

地

各一分  
甘草三分右剉作一貼棗一枚浮小麥一人撮五分  
水煎

牡蠣散

治盜汗及自汗  
右剉每五錢浮小麥百粒同煎服各等分  
牡蠣散治盜汗牡蠣粉白朮防風各等分  
等分爲末酒調服二錢汗即止

參芪湯

治虛人盜汗  
山藥陳皮乾葛半夏麴甘草各一錢右剉作一貼水煎服

童子盜汗

一童子自嬰至童盜汗七年諸藥不效用涼膈散三黃元火退視三日病已蓋腎主五

液化爲五濕相火逼腎腎水上行乘心之虛而入手少陰心火炎上而入肺欺其不勝己也皮毛以火次而開玄府不閉而爲汗先以涼膈散瀉胃中相

矣  
自止

**頭汗**

頭者理

諸陽之會邪搏諸陽津液上湊則汗見於頭

有汗也

脉

○頭者三陽之會蓋三陰之脉至脅而還兌

蓋首者六陽之所會故熱氣熏蒸而汗出也以部

分言之則順屬腎額屬心三焦之火涸其腎水溝

渠之餘迫而上入於心之分故發爲頭汗而額上偏多也

門治法

○瓣觀寒○濕家頭額出汗

明胃實亦頭汗出

詳寒門

○

**心汗**

別處

無汗獨心孔一處有汗思慮多則汗亦多病

汗出宜陳艾湯

瓣

○思慮過度以致心孔獨有汗

汗爲末每二錢空心米飲調下

青桑第

○又止盜汗門亢乾

因驚得之有人患心腋盜汗久不止用參歸腰子

第二番葉帶露採陰乾

○小兒

上方見以收斂心汗宜茯苓補心湯

瓣

○心汗亦治心腋盜汗

**陳艾湯**

治汗自心頭出者名曰心汗亦治心腋盜汗

瓣

○心汗亦治心腋盜汗

調下

茯苓補心湯

治心汗者心孔有汗別處無也因  
心鬱結而成白茯苓人參白朮當歸

生地黃酸棗仁炒白芍藥

麥門冬陳皮黃連各一錢甘草三分朱砂五分別爲末右剉作一貼棗二枚

同煎烏梅一箇浮小麥

砂末服之

手足汗

手足汗者津液自胃府傍達於外則手足自汗

胡湯颗粒下之

半夏茯苓用半夏連柏并補劑皆不效後以八物湯加半夏茯苓爲君白附子川烏

各五錢爲末水三碗煎十數沸逐日洗而纏之乾葛

五日自止

兩脚心汗久不愈者宜用

丹治兩腋汗

陰汗

宜小安腎元

虛陽衰也宜安腎元動觀以乾薑醬煎湯入鹽少許吞下

大蒜水淋洗患處亦可○又方蛇床子酒浸炒白藜陳醬煎

和水淋洗患處亦可○治陰汗密陀僧爲末極細

蛤粉撲傅汗處。○陰汗宜爐甘石二錢半蚌粉黃連五倍子各一錢二分半右爲末先以露蜂房洗大腹皮之搘湯

**大蒜元**治陰汗濕痒大蒜不拘多少煨熟去皮研同淡豆豉末和丸梧子大朱砂爲衣棗子燈心下心煎湯空心吞三十丸

**血汗**

詳見血門

**黃汗**

詳見黃門

**漏風證**

黃帝問此爲何病岐伯對曰病名酒風一名漏風漏風少氣

之狀或多汗常不可單衣食則汗出甚則身熱喘息衣常濡口乾善渴不能勞事卽白朮散主之

**白朮散**

治飲酒中風汗多不可單衣食則汗出如二洗久不治必爲消渴防風二兩半白朮一兩如洗

每錢牡蠣殼三錢

水調下藥右爲末

## 亡陽證

九汗多不止謂之亡陽如心痞煩面青膚瞶者難治色黃手足溫

者可治其身必冷多成漏寒矣○真陽脫失故謂之亡陽

虛不固汗出多則津液亡而小便難四肢拘急桂枝附子湯主之門八○發汗過多則陽之本液脫者骨屬屈伸不利是以四肢拘急桂枝

## 桂枝附子湯

治傷寒發汗過多遂漏不止四肢拘急

難以屈伸桂枝附子炮各三錢白芍藥二錢甘草灸一枚水煎服作一貼

## 止汗法

獨勝散填臍○或牡蠣麥麩麻黃根葉本糯米

防風白芷等分爲末周身撲傅門八○誤用麻黃令入汗出不止將病人頭髮水浸外用糯米粉

并龍骨牡蠣末撲傅之門八

## 溫粉

止自汗白朮藁本川芎白芷各等分右爲末兩八粟米粉一兩和勻綿裹撲身

紅粉

治同上。麻黃根、牡蠣粉各一兩，赤石脂。

獨勝散

治自汗盜汗。五倍子白礬枯等分爲末，以帛縛定立效。又方何鑿。

調封臍中妙丹

心丹

無汗

汗者血之異名，故靈樞曰：奪血者無汗，汗者無

陽

實三陰食無汗爲表實者無汗。○三

真氣已虧

胃中火盛則汗出不休。胃中真氣已竭。

若陰火已衰

則無汗。反燥乃陰陽俱衰。四時無汗

其形不久

○傷寒陰氣有餘，皆無汗。○陽氣有

餘爲身熱無汗

○身寒陰陽有餘，則無汗而寒慟。

謂出汗如珠

○不流復旋乾也。訥經六陽氣

俱絕，則絕汗乃出。

○朝占夕死，夕占朝死。

柔汗

仲景傷寒論曰：柔汗發黃爲脾絕。繹目柔汗即冷汗也。○云油汗即粘汗也。

汗出凶證

○傷寒熱病汗出，凝如珠，三不治也。○治也。汗出如油，二

頭汗如珠不流者陽脫即死○傷寒脉浮洪汗出如油燄潤喘不休爲命絕○傷寒陽病自汗有九證皆有治法陰病不得有汗惟陰毒則額上手背有冷汗甚者如水洗此是陽虛陰盛亡陽而將脫也其死必歸矣

禁忌

冬月天地閉血氣藏縱有病亦不宜多出汗人活自汗亢辛○

屬並忌食五辛之

積氣生液

古聖曰陽中生陰陰中生陽氣中生液液中

曰陽變陰

又曰積液生氣積氣生液畫落○朱子

尚虛其形

猶未定次生木火氣也流動閃爍其體

火初是自生也○程子曰坎水也一始於中

之最先者也魯齋鮑氏曰物之初生其形皆水水

者萬物之一原也或問曰天一生水亦有可驗乎

曰人之一身可驗矣貪心動則津生衰心動則淚乎

生愧心時則動則汗生懲心動則精生方人寂然不動之時則太極也此心之動則太極動而生陽

以心一動而水生即可以爲天一生水之證也。夫水生於陽而水生即可以爲天一生水之證也。則成水觀呵氣可見蓋神爲氣主神

動則氣隨

觀呵氣爲水母氣聚則水生

理

泣

難經

者何氣使然歧伯曰心者五藏六府之主也目者

宗脉之所聚也上液之道也口鼻者氣之門戶也

故悲衰愁憂則心動心動則五藏六府皆搖

則液道開液道開則泣涕出焉液道開則泣涕出焉

宗脉感宗脉感

者脉所感精濡空竅者也故上液之道開則泣涕出焉

液道開則液道開則泣涕出焉液道開則泣涕出焉

以灌精濡空竅者也故上液之道開則泣涕出焉液道開則泣涕出焉

不<sup>止</sup>則液竭口又曰五藏六府之津液盡上滲

矣命曰奪精竭口又曰五藏六府之津液盡上滲

于目

心悲氣并則心系急心系急則肺舉肺舉則

液上溢夫心系與肺不能常舉乍上乍下故咳而

于上溢夫心系急心系急則肺舉肺舉則

液上溢夫心系急心系急則肺舉肺舉則

液上溢夫心系急心系急則肺舉肺舉則

液上溢夫心系急心系急則肺舉肺舉則

泣出矣

火盛水虧也故膽汁慳者亦流淚門笑則

有淚出矣火盛水虧也故膽汁慳者亦流淚門笑則

有淚出矣火盛水虧也故膽汁慳者亦流淚門笑則

有淚出矣火盛水虧也故膽汁慳者亦流淚門笑則

有淚出矣火盛水虧也故膽汁慳者亦流淚門笑則

有淚出矣火盛水虧也故膽汁慳者亦流淚門笑則

涕

內經

曰泣涕者腦也腦者陰也腦滲爲涕。

曰涕者肺也肺者陰也肺滲爲涕。

曰涕者腎也腎者陰也腎滲爲涕。

曰涕者心也心者陰也心滲爲涕。

曰涕者肝也肝者陰也肝滲爲涕。

曰涕者脾也脾者陰也脾滲爲涕。

辛額鼻淵鼻淵者濁下不止也。口角流涕出黃濁如膿狀大如彈丸從鼻中出不詳。  
鼻流濁涕者屬風熱也。傷風則鼻流清涕者屬肺冷也。鼻流濁者則死也。  
**涎** 口角流涕出黃帝曰人之涎下者何氣使然。歧伯曰口角流涎者脾之液也。鼻流濁者屬風熱也。鼻流清涕者屬肺冷也。  
則涎出訥經○黃帝曰入於胃中○有熱則蟲動○一人口流涎不正○  
日飲食者皆入於胃中○故涎下○一○人○口○流○涎○不○止○  
緩胃緩則廉泉○開故涎下○一○人○口○流○涎○不○止○  
喜笑舌瘡脉洪大用芩連柏蒼白半夏竹瀝○  
薑汁服之五日涎止笑息○口角流涎不止口  
眼渴而愈○天愈風湯煎水吞下清心導痰丸五  
十粒○時常吐清水冷涎自下涌上者脾  
芩連柏子陳湯麥芽乾生薑或丸或煎服  
熟所致二神麌白术白芍藥升麻土炒  
通天愈風湯母炒薑各一錢威靈仙連翹防風荆芥炮貝  
甘草各五分瓜萎仁一錢威靈仙連翹防風荆芥炮貝  
薑三片水煎調荊瀝一呷薑汁少許溫服  
**清心導痰丸** 天花粉各一兩並薑汁製各二兩白附子半夏並  
天南星半夏並黃連炒鬚金各七錢附子半夏並

白殼桑葉末麻羌活各五錢川烏藥製  
二錢右爲末薑汁糊和丸梧子大圓

唾

則多

者腎之液也

內經曰腎爲唾生於牙齒。

○水之在口曰華池亦曰玉泉

○黃庭經曰玉泉清水灌靈根審能修之可長存靈

根者舌也

○大病差後喜唾者胃上有寒宜

人○大病新愈喜唾不休或唾白沫

○理中丸溫之上停寒也理中丸黠門加益智仁陳○蟲

○口中津液是金漿玉醴

迴津法

真人曰

常習不唾地

蓋口中津液是金漿玉醴

能終日不唾常含而嚥之

令人口精氣常留面目

有光蓋人身以津液爲本在皮爲汗在肉爲血在

腎爲精在口爲津伏脾爲痰在眼爲淚

曰汗曰血

則皆不可迴惟津唾則獨可迴

至

則生

精已出

意又續矣

有人喜唾液乾而體枯遇

則皆不可迴惟津唾則獨可迴

久

通治藥

自汗盜汗諸汗通用黃芪湯牡蠣散

見汗益氣湯

補中益氣湯

防風觀雙和湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

桂枝湯

單方

九種

二十

石膏

細解

碎肌

水出

煎毒

汗宜

葛根

解腠理

發水

煎表

出服

之汗

麻黃

去腠能

實理

則發

表出

汗根

與節

生薑及乾薑

皆出

汗水

煎表

開腠

理

浮萍

發風門

最捷

詳見

丹下

荊芥

發水煎

表出

汗

薄荷

頭發水

目煎

汗解

勞乏

清

葱白

連風

鬚用

解水

煎表

出

紫蘇葉

散同表

青氣

皮出

煮服

之即

久出

汗不

**忍冬藤**

散能出久積陳鬱之氣

汗煮飲良

之氣

**細辛**

散可爲末風出汗水煎飲

令人氣塞不

**杏仁**

解肌發水煎服

**豆豉**

發升滿汗久盜汗冷煖任取一升

微炒漬酒

三錢作

**白术**

止浮麥三日冷盜汗冷煖任取一升

微炒漬酒

三錢作

不

用研爲細末每服二錢別煎浮麥湯調服

水一斗同煮乾取出切片焙乾去麥

白术不拘多少剉成小塊

**桂枝**

止汗表虛自汗秋與冬則用桂枝煎服

中汗出酸棗仁炒入參白朮

**酸棗仁**

止汗治睡中汗出酸棗仁炒入參白朮

末每二錢米飲調服

**桑葉**

最止盜汗青桑葉第二番葉帶露採陰乾焙爲末米飲調服

門

**牡蠣粉**

止汗和杜仲沖服止盜汗

黃根爲末粉身止盜汗

又和

浮小麥

實表止自汗。凡自汗多，與麪食則安。可服。

防風

煎服止汗。又止盜汗水。

黃芪

許實表虛止自汗。蜜水炒黃芪入灸甘草少。

麻黃根

止盜汗。常服。又止自汗及盜汗水煎服之。

椒目

止盜汗。最妙。微炒爲極細末。取半錢以生

烏梅

止好唾。作茶飲之。幹者，止自汗盜汗。取爲末。以烏梅陳艾煎湯調下。二錢。

鍼灸法

盜汗不止。取陰都五里間。使中絰極氣海。不出取曲差乙。傷寒大妙。汗出。取合谷復溜。俱鴻之。大妙。

痰飲

# 痰涎飲三者不同

痰者津液之異名人之所時以潤體者也曰痰曰涎曰飲又有理一者分殊之別伏於包絡隨氣上浮客肺壅嗽而發動此涎也惟飲生於胃府爲區爲吐

# 痰飲分清濁

濁者津液爲痰也熟而成熱則津液熏蒸而稠於心下或惟脾土有虧故水滯不能傳化或停於脣間或注於經絡或溢於膀胱往往痰者因此而致病矣。飲者因飲水不散而爲病故痰形稠濁飲色清痰

謂古方謂之痰其實今人

# 王隱君痰論

證古今未詳方書雖有懸飲留飲支飲諸飲之異而莫知其爲病之源或頭

風眩暉目昏耳鳴或口眼瞤動眉稜耳輪瘻痒或四肢逆風腫硬似痛非痛或爲齒頰庠痛牙床浮浮利咯之不出一或噫氣吞酸嘈雜嘔噦或咽嗌不利腫而痛痒不出之不下色如煤炁形如敗絮桃膠不

覲肉之類或心下如停冰雪心頭冷痛時作或夢寐奇怪鬼魅之狀或足腕痠軟腰背卒痛或四肢骨節煩疼並無常所乃至手麻臂痛狀若挫閃或脊中每有一掌如冰凍之寒痛者或渾身習習如蟲行者或眼眶澀痒口糜舌爛甚爲喉閉等證又或癢項結核似癰非癰或脅腹間如有二氣交紐噎塞煩悶有如烟氣上衝頭面烘熱或爲失志癲狂或爲中風癱瘓或爲勞瘵華之疾或爲風癆及脚氣之候或嘔冷涎綠水黑汁甚爲肺癰陽毒便滯擗其爲内外疾病非止百端皆痰之所致也蓋津液旣凝爲痰爲飲而洩涌上焦故口燥咽乾流而之下則大小便閉塞面如枯骨毛髮焦乾婦人則經閉不通小兒則驚癇搐搦治法宜先逐去敗瘻然後看虛實調理故製沉香滾痰丸方見仲景治三焦痰飲之劑也○劉宗厚曰痰之爲病仲景論治斯疾固爲簡便較之仲景三因有表裏內外而深識痰之情狀而得其奧者矣製滚痰丸一方總治人之諸疾悉出於痰此發前人所未發可謂四飲六證無擇叙三因内外俱爲切當惟王隱君論四

又分汗下溫利之法則踈闊矣况

# 飲病有八

有虛寒熱之證不同者哉

# 留飲

留飲者水停心下氣而渴如手掌大或短氣而

渴四肢歷節疼痛脇痛氣短脉沉久則令人骨節蹉

跌恐爲癲癇宜導痰湯加

# 癥飲

水在兩脇下動搖有聲宜十

# 痰飲

其人素盛今瘦水走腸間瀝有聲謂之痰飲宜

○人痰飲者水停腸胃瀝瀝有聲

# 苓桂朮甘湯

治痰飲半甘草一錢桂枝白朮各一錢

# 神术丸

治痰飲成窠囊瀝瀝有聲或嘔吐酸水蒼朮

以二盞研濾取汁大棗三十枚爛煮研去皮核取肉時每日空心微燥溫水下百丸至二百丸初服

### 山梔子散

梔子一錢乾之爲末沸湯點一錢服

### 溢飲

謂之溢飲小青龍湯黠門主之。溢飲者水在四肢身體重痛歸於四肢當汗出而不汗出身體重痛

### 懸飲

飲後水流在脇下咳嗽引痛謂之懸飲十棗湯貽門有聲喝○懸飲者水流在脇間動搖瀉瀉

○懸思水三花神佑丸主之見下門

○水流在脇下咳嗽引痛

### 支飲

龍湯黠門主之又曰其脉數必苦冒眩其人本有短氣不得卧其形如腫謂之支飲小青

○咳逆倚息喘而不能卧加短氣子湯亦主之

○支飲水

停膈上氣咳逆

○支飲亦喘在胃中故也茯苓五味子湯亦主之

# 茯苓五味子湯

治支飲手足冷痺多睡小腹氣上衝  
胷咽面熱如醉時復眩冒赤茯苓二兩

錢桂心甘草各一錢半五味子一錢二分半右剉作一貼水煎服支飲法當冒冒者必嘔嘔者復滿

加半夏以去其飲

# 伏飲

膈上痰滿喘咳或吐發則寒熱背痛腰痛目淚自出其入振身觸必有伏飲脉○伏飲者水停

身惕滿區吐喘咳嗽發熱惡寒腰背痛目淚出或身惕滿區吐喘咳嗽發熱惡寒腰背痛目淚出或

# 痰病有十

有風痰寒濕熱痰欬痰氣痰食痰酒痰驚癲瘍之源不一有因熱而生者有因氣而

生者有因風而生者有因驚而生者有因飲而生者有因食而生者有因暑而生者有傷冷而成者

有脾虛而成者有因酒而生者

# 風痰

多癱瘓奇證頭風眩暈風悶亂或搐搦瞞動宜青州白圓子導痰湯或

# 青州白圓子

治風痰壅盛嘔吐眩暈及癱瘓風半夏七兩天南星三兩白附子二兩川烏半夏

錢右生爲細末清水浸春五夏三秋七冬十日朝夕換水候日數足乃取納生絹袋中瀝過其滓再

研末糊過以盡爲度澄清去水晒乾又爲末以糯米糊清和丸菉豆大薑湯吞下三五十丸竭

導痰湯治風痰半夏薑製二錢南星炮橘紅枳殼赤芍甘草各一錢剉作一貼薑五片水煎服

得服

寒痰

寒痰即苓痰也肾痺四肢不舉氣刺痛無煩熱痰凝清芩宜溫中化痰丸溫胃化痰丸新法半夏湯

丹

溫中化痰丸

治苓痰嘔噦惡心青皮陳皮良薑乾薑各等分右爲末醋糊和丸糖子大米飲

丸  
丹  
下五十

溫胃化痰丸

治膈間有寒飲冷痰半夏製三兩乾薑炮白术焙陳皮各二兩右爲末薑汁糊

和丸梧子大薑湯  
吞下二三十丸

# 新法半夏湯

治脾胃有冷痰，嘔逆惡心，不思飲食，大半夏四兩切片，以白礬末一兩和湯浸

一日甘草、白豆蔻各一錢，以薑鹽湯點服，竭每五錢，右爲細末。

一錢加神砂、炒山藥各一兩，丁香、白芍各一錢，煎令汁盡，焙爲末，用

# 濕痰

身重而軟倦，或二陳湯加蒼朮九分，宜神術。

# 山精丸

健脾清火燥濕，痰蒼术去皮陰乾，或二陳湯加蒼朮九分，宜神術。

# 三仙丸

治濕痰半夏南星各一斤，右爲末，蜜丸梧子大，每百丸，溫湯吞下，秘用。

浸汁一斤，右爲末，蜜丸梧子大，每百丸，溫湯吞下，秘用。

收之須五六月間做，糊和丸梧子大，每丸四兩，香附末。

二收之須五六月間做，糊和丸梧子大，每丸四兩，香附末。

# 熱痰

喉閉癩即火痰也，多煩躁，心忪，舌苔結頭面烘熱，或爲眼爛。

下痰湯，小調中湯，大調中湯，丹。

○熟痰黃芩，利膈丸，理中豁。

# 清氣化痰丸

治熱痰半夏製二兩陳皮赤茯苓各一兩

# 加味潤下丸

善降痰火橘紅八兩半夏剉二兩以鹽

黃芩湯下五十丸

此方乃二陳湯合涼膈散也

# 小調中湯

治一切痰火及百般怪病善調脾胃神效

黃連甘草各一兩右爲末

黃連煎水浸甘草甘草煎水浸黃連瓜萎

# 大調中湯

治虛而有痰火最佳即前方加入參白朮

# 黃芩利膈丸

除胸中熱利膈上痰生地黃白芍藥也

枳殼陳皮各三錢白朮二錢白朮

右爲末蒸餅和丸梧子大白朮

湯下五  
丸

理中豁痰湯

治膈

上錢人參白茯苓半夏製瓜薑仁陳皮各

黃連薑汁炒苦薑各五分

枳實甘草各三分右剉炒

作一貼水煎去滓

八薑汁

清熱導痰湯

治宿寒

壯頭目沉氣上喘急口出

不守舍神出則舍空

則痰自生也黃連黃芩

瓜姜仁南星炮半夏製陳皮

赤苓苦薑白术人

鬱痰

與老痰燥痰同即火痰

鬱於心肺之間久則凝滯

咳嗽喘促

宜節齋化痰丸加減二陳湯瓜萎枳實湯丹霞天膏

節齋化痰丸

專治鬱痰老痰膠固稠粘難於咯唾一天

一兩芒硝香附子益水炒苦梗連翹各五錢青黛二錢右爲末煉蜜入薑汁少許和丸櫻桃大細嚼

丸清湯送下或如黍米大

抑痰丸治燥痰乾嗽瓜萎仁一兩貝母炒五錢夏製二錢右爲末蒸餅和丸菉豆大薑湯

丸下百

霞天膏治虛痰老痰稠粘膠固於胷臆依附盤泊於腸胃當用此膏吐瀉不致虛損如癩癆鼓噎

於補虛藥中加之以去痰積可收萬全服此比之  
例倉更隱丸治實痰新痰用南星半夏燥之橘紅

枳殼散之猪苓粉之竹瀝瓜萎潤下之雞屎規

清火豁痰丸治上焦鬱火痰涎壅盛胷膈不利咽喉燥噎塞如有所硬吐不出嚥不利咽喉

黃酒拌九蒸九晒二兩黃芩酒炒黃連酒炒枳實麸炒陳皮

鹽水炒各二兩黃芩角生薑各一兩浸七日各一  
半夏二味以白朮炒一兩三錢連翹天花粉白芍芩神麴一  
兩半貝母炒一兩

炒白芥子炒各一兩

玄明粉七錢

青礞石以硝右

爲末同煅如金色

青黛甘草各五錢

沉香二錢

右硝

茶清下竹瀝和丸梧子大

錢鑑

### 加減二陳湯

錢二分枳

實黃芩炒各一錢水浸焙

白术貝母一錢水煎服

必服

炒便香附各九分

白芍草三分右作一貼

鹽水炒各七分

必服

### 瓜萎枳實湯

治癆結咯吐不出

胃膈作痛不能轉側

或痰迷心竅不能言

必服

瓜萎仁枳實苦姜赤芍

芩貝母炒陳皮片芩梔子

木香各五分甘草三分右

必服

各半坐匙薑汁當歸六分縮砂

水煎入竹瀝

和服

必服

### 氣痰

七情鬱結痰滯咽喉形如敗絮或如梅核咯不

火豁痰丸玉粉丸加味四

必服

必服

七湯潤下丸二陳湯散前胡

半夏湯加味二陳湯散前胡

必服

### 玉粉丸

治氣痰以三仙丸

兩也散去

# 加味四七湯

治痰氣鬱結，窒碍於咽喉之間，咯之不下。謂之梅核氣者，半夏、陳皮。

赤茯苓各一錢，神麴炒砂各五分；南星炮縮橘梗各七分；青皮各三分。

厚朴紫蘇葉各一錢，白蔻仁各五分；白豆蔻益智仁各三分。

蜜丸，右剉作一貼，入薑五片水煎服。

# 潤下丸

治痰積氣滯及痰嗽，降痰甚妙。陳皮一斤去白鹽二兩以水化同煮，爛熳燥甘草二兩炙。

右爲末，湯浸蒸餅和丸梧子大，白湯下三十丸。

# 二賢散

清肺消痰，下氣解酒毒。橘紅一斤，甘草四兩，鹽半兩，水浸過一指許，鍋內煮乾，焙爲末，每

日早晚各二匙，淡薑湯或白湯調下。

○回春一名滌痰散，○一名二賢湯。

# 前胡半夏湯

治氣痰壅盛，前胡半夏赤茯苓各一錢，陳皮紫蘇葉各七分，木香甘草各一分。

五分，右剉作一貼，薑五片，烏梅一箇水煎服。

# 加味二陳湯

治氣痰窒碍，咽喉成梅核氣，半夏、陳皮、赤茯苓枳殼苦棗各一錢，片芩、梔子炒

各七分右剉作一貼薑三片同煎服

醫書鑑

各五

食痰

即食積痰也。因飲食不消或挾瘀血遂成窠囊。多爲癰塊痞滿宜青礞石丸黃瓜蔓丸正傳加味二

陳湯

醫書鑑

青礞石丸

治濕熱痰去食積痰青礞石二兩同煅硝

取天南星二兩白礬末五錢和水浸二日半夏

皂角水浸二日半夏水炒赤茯苓枳實麩炒各

三兩風化硝用蘿蔔同煮硝化去蘿蔔濾淨入牛

膽內風乾取五錢右爲末薑汁煮神麴爲糊和丸

梧子大白湯下三十五粒

丸此藥重在風化硝

黃瓜蔓丸

治食積痰瓜蔓仁半夏山楂肉神麴炒

各等分右爲末瓜蔓計和丸梧子大以薑

湯竹瀝下三十五丸

正傳加味二陳湯

治食積痰導瘀補脾消食行氣山楂肉一錢半香附子半夏各一錢

川芎白术蒼术各八分橘紅茯苓神曲炒各七分縮砂研麥芽炒各五分甘草炙三分右剉作一貼分

散水煎服

劑

### 酒痰

因飲酒不消或酒後多飲茶水但得酒次日又吐食加姜水宜瑞竹堂化痰丸香附瓜蔓

青黛丸小調中湯滌痰散又對金飲

### 瑞竹堂化痰丸

治酒痰消食快脾順氣半夏南星生薑白朮各四兩同入砂鍋內水

煮以南星無白點爲度去皂角不用入青皮陳皮乾葛蘇子神麴麥芽山楂肉蘿蔔子香附子杏仁各一兩右爲末薑汁浸蒸餅和丸梧子大

每五十丸食後臨卧茶酒任意下門

### 香附瓜萎青黛丸

治燥痰鬱痰酒痰上三味爲末蜜丸芡實大丸食後及臨卧時

噙化散下丸積痰非

門

### 驚痰

因驚痰結成塊在脅腹發則跳動痛不可忍或成癩瘡婦人多有之宜妙應丹滾痰丸

# 妙應丹

治一毒或一爲癰瘍引隱痛不可忍走易不定或疑其疾

皆非也乃痰涎伏在風

# 脉法

喘脉

短氣

者

寒飲也

偏弦

者

懸飲內痛

○肺

飲不

○脈

浮而

○細

滑骨苦

○筋

短氣

惡水

少氣

身不

其。

中者

傷節

○飲

○脈

沉而

○偏弦

為飲或沉

○弦

滑或

○結

或

○伏

○痰

○飲

○脈

沉弦

○微

○病

也

心丹證

○皆弦

○醫金

○沉

○久

○得

○清

○脉

○沉

○弦

○滑

○大

○小

○蓋

○痰

○不

○自

○皆痰

○固

○脉

# 痰飲外證

靈樞

曰

尺膚龜如枯魚之鱗者水溢飲也

○曰

大心下堅築短氣惡水

○曰

心下有留飲

○脈

大心下

○水

○水

○水

○水

○水

○水

○水

○水

○其。

人背寒

○水

○在肺

○吐

○延沫

○欲飲

○水

○在心

○心

○下

○堅

○築

○短

○氣

○惡

○水

○身

○不

○重

○水

○在肝

○脇下

○支

○皮

○及

○眼

○下

○痰

○冷

○如冰

○水

○在肺

○吐

○延沫

○欲飲

○水

○在心

○眼

○胞

○及

○上

○脈

○伏

○如灰

○烟

○熏

○黑

○色

○心

○下

○悸

○○

○○

○○

○○

○藥

一切水證痰證食少肌色如故一

門

痰飲諸病痰之爲患新而輕者形色清白稀薄氣漸成也  
惡味酸辣腥臊粘結咯之難出漸成也  
頭痛發熱類外感表證久則潮咳夜重類內傷陰陽初起也  
火又痰飲流注肢節疼痠滑不勻不適爲異耳門○痰之作也  
急爲喘爲嗽爲吐爲嘔爲眩暉或腫滿食也  
忪悸或呑酸或短氣或痞滿爲狂迷作也  
痛痰實主之攢○俗云十病九疾誠哉斯言也  
凡人手臂或動不得或骨節遍身痛坐卧此門入  
骨痰入骨也又曰眼黑而行步呻吟舉動難者入也  
骨瘦也其證遍身骨節疼痛○眼黑而面帶土色入也  
四肢痠痺屈伸不便者風濕痰也○眼黑而氣短促者驚風痰也○眼黑而頰赤或面黃色者熱痰也  
下痛作○咯痰不出者是痰結也又曰脇心丹老痰白火痰也

## 辨痰色

寒痰清黃老痰白火痰

熱痰黑老痰

# 痰飲流注證

凡人忽患肩背手腳腰膝隱痛不可忍連筋骨牽引鈞痛坐卧不寧時時走易不定

臂背手腳腰膝

不可忍連筋骨牽引鈞痛坐卧不寧時時走易不定

臂背手腳腰膝

皆無益又

此乃痰

俗

醫

不曉

謂之走注便用風藥及針灸

亦非也

此乃痰

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

# 控涎丹

白芥子各等分研末加蜜水下七丸主之。行攻臂脣之病不能舉。

爲末

加蜜水下七丸主之。行攻臂脣之病不能舉。

加蜜水下七丸主之。行攻臂脣之病不能舉。

中

心

爲

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

驚

癥

成

塊

加

蓬

木

附

山

甲

丸

丸

丸

丸

丸

丸

丸

# 痰病有似邪祟

血氣者人之神也

或有之若夫血氣兩虛

或失其職視聽言

則入

碍

升

降

不得

運用以致

其人必死

○先宜多飲

薑  
多灌湯探吐之或竹瀝香油

陶氏導痰湯

治痰迷心竅或似鬼祟半夏一錢赤芍天南星枳實各八分陳皮黃芩黃連

白术瓜萎仁各五分苦薑四分人參三分甘草二分

薑三片棗二枚水煎臨卧入竹

瀝薑汁調服先吐去痰次服此藥門

痰厥

痰厥者皆因內虛受寒痰氣阻塞手足厥冷麻痺

丹小兒方奪沉細宜服加味二陳湯清火化痰湯鶴頂

命散亦可門

加味二陳湯

治痰厥半夏一錢陳皮白茯苓當歸枳實苦杏仁各五分

作香桂皮甘草各三分右剉

清火化痰湯

治熱痰結在胷膈喀吐不出滿悶作痛名痰結半夏製陳皮赤茯苓各一錢苦杏仁各七分

桑白皮枳殼瓜萎仁各五分黃連黃芩梔子貝母蘇子各五分木香甘草各三分右剉

鶴頂丹明白  
一貼薑三片同煎至半納芒硝  
化去滓又入竹瀝薑汁調服

以薄荷煎湯化下門○直指方控癰良方白欒黃丹各一兩火煅爲末麪糊和丸麻子大治諸頑痰迷塞關竅不通聲音不出取三十丸研末入全蝎

少許薑湯調灌

癰塊

人身上中下有塊如腫毒多在皮裏膜外此因痰流注作核不散問其平日好食何物用藥吐下瀝

後方用消痰散核之藥二陳湯加大黃連翹

苦蘿白芥子黃連薑汁炒煎水入竹瀝多服自消

腫硬或痛或不痛按之無血潮雖或有微紅亦聚結

薄紫汁又有壞肉如敗絮或如瘻瘍在皮肉之間或如

雞卵可移動軟活不硬惟覺咽喉痰結作寒多作

是熟

之吐痰立愈

痰注宜加味小胃丹竹瀝達痰丸○  
氣消痰湯又天南星草烏等分爲末薑汁調如膏  
敷核上立消○醫鑑○治痰核商陸根生南星合搏令  
爛塗付立○醫鑑○渾身有腫塊或骨體串痛都是  
濕痰流注經絡也通

加味小胃丹

治風痰痞積眩喉痺不語腹中

星半夏並用白礬水泡半日炒二兩  
半蒼朮用米泔水泡半日炒二兩桃仁  
杏仁並以白礬皂角水泡去尖紅花酒蒸陳皮枳  
實並用白礬水泡半日炒白朮白芥子炒各一兩  
右爲末薑汁竹瀝煮神麴爲糊和丸菉豆大麥服  
二三十丸薑湯下門○醫鑑一名導痰小胃丹○

回春一名竹

瀝化痰丸

竹瀝達痰丸

能運痰從大便出不損元氣妙丹溪曰  
痰在四肢非竹瀝不開此藥是也半夏

薑黃製陳皮去白自米微炒白茯苓大黃酒浸蒸晒

乾黃芩酒炒各二兩入參甘草炙各一兩半青礞石

石碎一兩  
爲末以竹瀝一大碗半薑汁三匙拌勻晒乾如此時以米飲或薑湯吞下。○一名竹瀝丸。小豆大每百丸臨卧

### 開氣消痰湯

治胃中胃脘至咽門窄狹如線疼痛及手足俱有核如胡桃者苦黃便香附子

白殼

桑炒

各一錢陳皮片

芩枳殼

各七分前胡半

橘梗射干威靈仙各五分木香

各七分後胡半

病後多加益智仁

砂子

甘草各三

分右剉作一

貼

薑

三片水煎服

鑿

### 喜唾痰

胃中有寒則喜

唾而咳者宜照

八味元飭

又云八味

元飭

又云八味

元飭

又云八味

元飭

味元治脾腎兩虛多

唾痰而咳

也宜理中湯

或觀心丹

門

○大病後多

加丁香縮砂子

喜唾

唾痰者此胃冷

上停寒也

加益智仁

心丹

門

○病後多

加丁香縮砂子

喜唾

### 半夏溫肺湯

治中脘有痰水

心下注溼嘈雜

多唾吐

遲半夏

陳皮旋覆花

人參細辛桂心

苦黃白芍藥

各一錢右剉作

一貼

薑五片煎服

# 痰結

喉中有物咯不出，是老痰結也。

醫鑑

輕者用瓜

帶中燥散，見氣實者必用荊瀝丹。痰結核在咽喉化

痰丸最妙，見此等老痰飲酒之人多有之。酒熟升鬱于肺胃而成此痰，天門冬片芩泄肺火也。

海粉芒硝，以堅也。瓜萎仁潤肺降痰，香附子開鬱降氣，連翹苦梗開結降火，青黛解鬱火，皆不

用半夏南星辛燥之劑。

# 痰病不卒死

所致何以然者，蓋胃氣亦賴痰積所養，飲食少，胃氣卒

# 痰病難治證

氣實者難治，又曰氣實痰熱結者難治，心口濶出爲效，若咯痰不出者難治，又曰服藥後咯吐痰出，爲有效，急咯痰不出者難治，又曰服膏肓等病，不一而足，惟勞瘵有痰爲難治，又曰服膏肓四花穴，詳觀針灸，肺胃經虛則生痰，宜早灸。

時復瘧。胃所出也。痰涎凝聚滯在於咽喉如牽锯之聲爲變成癲癇。或因吐瀉所致脾虛肺亦虛痰涎溢者。

## 痰飲吐法

宜痰在膈上必用吐法。○膠固調濁者必用吐。○痰在經絡浮中者。

凡用吐不可可吐中就有發散之意不必在出痰也。

黃芽茶生薑薑汁之類或以

二陳湯探吐或用瓜蒂散

## 痰飲治法

實脾胃燥脾濕是治其本。○虛人中焦有

心丹生而多法當補脾胃清中氣則痰自然運下痰乃治

心丹生而多法當補脾胃清中氣過多致脾氣下虛則痰反易

火因氣動者曰痰氣宜順氣爲先分導次之然氣升

本之法也。○治痰順氣爲先分導次之然氣升

火因氣動者曰痰氣宜順氣導痰湯因火動者

曰痰火宜清熱導痰湯上方見因濕動者曰濕痰

痰湯通用二陳湯門。○陽虛腎寒苓痰溢上或昏

暈夜喘上氣者八味丸。○君子湯加竹瀝薑汁墜之

門。○脾虛不能運化者六君子湯加竹瀝薑汁墜之

補中益氣湯加半夏竹瀝薑汁。張子和曰飲無補法必當去水故用汗吐下三法治人常愈然亦有挾寒挾虛之證又有血氣虧乏之人理宜遵去痰滯又當補接氣行又有難拘於子和之人三法也。

呻○痰生於脾胃治法宜實脾燥濕又隨氣而升火。醫鑑○難經曰腎主五液化爲五濕能生痰者因咳而動脾之濕也半夏能泄痰濕能生痰。

宜順氣爲先分導次之又氣升屬火順氣在於降者。

痰之本泄本者泄腎也十棗。

湯三花神佑丸是也確覩。

熱痰則清之用石膏青黛梔子黃芩黃連。

寒痰則溫之用半夏乾薑附子肉桂。

燥痰則潤之用瓜萎仁杏仁五味子天花粉。

濕痰則燥之用蒼朮白朮厚朴茯苓。

風痰則散之用南星白角白附子竹瀝。

老痰則軟之用海石芒硝瓜萎仁枳殼便香附。

食積痰則消之用山楂子神曲麥芽。

大要人參甘草以補脾白朮半夏以燥濕陳皮青澤瀉以利氣茯苓。

# 順氣導痰湯

半夏 南星 茯苓 枳實 陳皮 香附 烏藥  
各一錢 木香 沉香 甘草 各五分 右剉作

一片 貼薑煎服

# 六君子湯

治氣虛痰盛 半夏 白朮 各一錢 半陳皮 白

甘草 炙

五分

右剉

作一

貼薑

三片

棗二枚

前煎服

一錢

半分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

# 痰飲通治藥

通用

二陳湯

茯苓

半夏

湯

芎夏湯

橘紅湯

枳實湯

橘紅湯

橘紅湯

橘紅湯

橘紅湯

橘紅湯

橘紅湯

橘紅湯

橘紅湯

橘紅湯

證宜五味各一錢

半夏丸

千金指迷丸

礞石丸

飲宜竹瀝枳术

九霞膏

天瀝枳术

# 二陳湯

通治痰飲

諸疾或嘔吐

心惡心

或頭眩心

或嘔吐

半夏製衣

二錢橘皮

赤朮

茶

各一錢

甘草

炙五分

右剉

作一貼

薑三片

水煎

茶各一錢

甘草

炙五分

右剉

作一貼

薑三片

水煎

茶降氣滲濕

甘草補脾和中

益氣則不生痰

利氣則痰消解

可謂體用

薰該標本兩盡之藥  
用者隨證加減明

茯苓半夏湯

通治停痰留飲發爲諸病半夏製三錢  
赤茯苓二錢右剉作一貼薑七片煎服

半夏○直指方小  
茯苓湯同

大半夏湯

治同上半夏製陳皮赤茯苓各二錢  
半右剉作一貼薑五片水煎服

亨夏湯

逐水利飲通用川芎半夏製赤茯苓各一錢  
陳皮青皮枳殼各五分白朮甘草灸各二分

半片右剉作一貼薑

蠲飲枳實丸

逐飲消癰導氣清膈黑牽牛子取頭末  
三兩枳實麩炒半夏製橘紅各一兩右

爲末取五錢糊和丸梧子大

千金指迷丸

治一切癰飲爲患半夏麩二兩白茯苓  
剉虛人乳汁拌蒸瘦人縮砂同酒浸蒸

去縮砂又生地黃汁浸蒸枳殼用麥麩醋水炒各

硝二錢半右剉爲末薑汁糊和丸梧子大

每服三十丸。薑湯下。旬日以徃。大便溏滑。是潛消痰積之驗也。

○脾胃痰神麴糊和丸。○血分

痰酒糊丸。○氣分上焦痰蒸餅糊和丸。○骨節四肢

可痰病深痼。牛膏和丸多服。以汗吐下。如倒倉法。門

### 敵痰丸

治痰飲。通用黑牽牛子取頭末三兩。皂角酥炙一兩。夏麴陳皮去白各一兩。右各五錢。

### 神仙墜痰丸

通治痰飲。諸病黑牽牛子取頭末三兩。白礬生一兩。右各六錢。

下末水丸。梧子大

下水丸。梧子大

瑞

酒

### 小胃丹

取膈上濕痰。熟積上可取。胷膈之痰。下可利腸。

熟痰濕食積痰。芫花醋浸一宿炒黑。甘遂麴果裹水浸半日晒乾。大戟長流水煮酒乾。各五錢。大黃濕紙裹。再用酒浸炒熟。一兩黃柏炒二兩。右爲末粥。丸麻子大。每十丸。臨周津嚥。下丹。

方白术  
津液  
下二  
膏和丸  
蘿薈  
下三  
子大  
送下  
膏和丸  
蘿薈  
下十  
子大  
送下卧

五飲湯治溢飲五飲一曰流飲旋覆花人參陳皮枳實白朮  
草芩厚朴半夏澤瀉猪苓前胡桂心白芍藥甘草  
各七分右剉作一貼薑根  
破瘀消飲元治一切瘀飲青皮陳皮三稜炮朮炮  
水薑湯糊下和丸梧子大陰

滾痰丸治濕熱痰積變生百病大黃酒蒸黃芩去朽  
定鹽泥固濟沉香五錢右爲末滴水和丸梧子大茶清

色爲度沉香五錢右爲末滴水和丸梧子大茶清  
便水任下四藥在咽嚥之間徐徐而下漸逐至咽即

溫仰卧令藥在咽嚥之間徐徐而下漸逐至咽即  
腹入腸方能見效○丸襄心失志癲狂毒服百丸

骨中風癱瘓盛便秘常服三五十九○遍身筋脈  
氣痛未能明塞嘔吐涎飲每服七八十九○發氣吞心  
中風癱瘓盛便秘常服三五十九○遍身筋脈  
骨中氣痛未能明塞嘔吐涎飲每服七八十九○發氣吞心  
下酸筋脈

症仲忡陰陽關格變生怪證每服七十八十九○。頤額腫硬達項結核或

口糜舌爛中絞痛上攻頭面腫硬遍身四肢等處或散入腹中絞痛上攻頭面腫硬遍身四肢等處

或散入腹中絞痛上攻頭面腫硬遍身四肢等處或散入腹中絞痛上攻頭面腫硬遍身四肢等處

或散入腹中絞痛上攻頭面腫硬遍身四肢等處或散入腹中絞痛上攻頭面腫硬遍身四肢等處

或散入腹中絞痛上攻頭面腫硬遍身四肢等處或散入腹中絞痛上攻頭面腫硬遍身四肢等處

或散入腹中絞痛上攻頭面腫硬遍身四肢等處或散入腹中絞痛上攻頭面腫硬遍身四肢等處

木香和中丸化痰涎除濕利胃膈和脾胃黑牽牛

二錢木香黃芩青礞石枳殼檳榔青皮陳皮各五

錢沉香二錢右爲末水丸梧子大薑湯或茶清下

五十丸治濕熱痰盛胃膈煩滿一方又名沉香和

清氣化痰丸

治一切痰飲及食積酒積成痰壅盛南星半夏以白朮皂角生薑各二兩同水

浸一宿並剉作片同煮至南星無白點晒乾各二  
兩神麴炒麥芽炒各一兩半陳皮枳實白术白茯  
苓蘇子蘿蔔子炒瓜萎仁香附米山楂肉白豆蔻  
各一兩青皮乾葛黃連各五錢黃芩八錢海粉七  
錢右爲末以竹瀝薑汁泡蒸餅和九

醫鑑

### 竹瀝枳术丸

治老人虛人痰盛不思飲食健脾消食化痰清火去眩暉半夏南星以白藥消食

角生薑同煮半日去薑焙乾枳實條芩陳皮蒼  
朮泔浸薑水炒山楂肉白芩子炒白芍芩各一兩  
黃連薑汁炒當歸酒洗各五錢右爲末神麴六兩  
作末以薑汁竹瀝各一盞煮糊和丸梧子大淡薑  
湯或白湯下百丸門

### 單方凡二十種

#### 白礬

吐去胃中痰飲取一兩水二升煮取一升入蜜  
半合頓服須臾即吐未吐則當飲少熱湯

#### 蒼术

消痰水能治痰飲成窠囊極效即上神水丸也性燥能勝濕

**貝母**

消痰便浸治胃膈痰氣最妙。貝母丸取貝母童便浸三日洗晒爲末糖霜調和不時服。

**前胡**

治熱痰又治熱痰又治熱滿胃。前胡治熱痰又治熱滿胃。前胡治熱痰又治熱滿胃。前胡治熱痰又治熱滿胃。

**乾薑**

丸治寒痰又消痰下氣。丸治寒痰又消痰下氣。

**生薑**

去痰下氣又去冷痰。去痰下氣又去冷痰。

**半夏**

治寒痰能勝脾胃之濕所化痰滿。○能消痰。○半夏治寒痰能勝脾胃之濕所化痰滿。○能消痰。

去胃中痰滿。○半夏丸治痰喘心痛半夏香油炒爲末。○半夏丸治痰喘心痛半夏香油炒爲末。

錢附子生二錢調胃氣。○半夏大治濕痰。○半夏丸治痰喘心痛半夏香油炒爲末。

半夏丸治痰喘心痛半夏香油炒爲末。

**半夏麴**

癥分之病半夏爲主。○半夏爲主。○半夏爲主。

痽者自能使腐敗隨大小便出或散而爲瘡此半夏麴之妙也。○佐以南星治風痰。○佐以薑汁酒沉。

浸炒芥連及瓜萎仁香油拌麴畧炒治火痰。○佐以佐

以佐

蒼白術俱米泔薰計浸炒甚至乾薑  
烏頭皆治濕痰○製法詳見雜方

呻吟

## 法製半夏

大半夏攬晾澄清去滓將半夏浸之水七日攬入盆內

水露三七日攬出井華水洗淨三日換

水三次攬起控乾用白葵八兩皮硝一日晒夜露取甘水七

水八九次攬入盆內攬晾浸半夏七日換

水八次攬起控乾用白葵八兩皮硝一日晒夜露取甘水七

草薄荷各四兩丁香枳實木香陳皮青皮枳

殼五味子縮砂各五錢白豆蔻肉桂各三錢沉香

泡一錢右切片滾水十五椀

泡二錢右切片滾水十五椀

白布包住放在熟炕用器皿覆住三炷香時藥與

半夏分胎半夏乾收用有痰火者服之一日大便

白布包住放在熟炕用器皿覆住三炷香時藥與

半夏分胎半夏乾收用有痰火者服之一日大便

白布包住放在熟炕用器皿覆住三炷香時藥與

半夏分胎半夏乾收用有痰火者服之一日大便

## 瓜蔞仁

治熱痰酒中瘧老痰作燥痰潤肺化痰降氣

洗滌胷膈中瘧

中瘧

膩痰

燥痰

或煎服皆佳

呻吟

葶苈子

之除水腎末服中痰能

逐肺經

旋覆花

消腎上痰結煎服能

逐肺經

枳實

除之。煎服能

逐肺經

枳殼

消痰散水煎服能

逐肺經

天南星

水治風痰散水煎服能

逐肺經

青礞石

從大便積食或炮黃色入丸服薑七片

逐肺經

木瓜

消痰止咳研唾藥去滓量入蜜薑汁竹瀝攬和

逐肺經

嚼下。煎服可

烏梅

去痰止渴。大匙可

白芥子

主腎上痰冷。煎服可

瓜蒂用吐痰。痰塞心胷令人悶絕。

吐痰。

瓜蒂散

散

吐之

即

甦

訪

湖

海粉

不熟

可入

湯能

降濕

痰能

燥結

痰能

軟

頑痰能

消

蛤粉

能墜

痰也

軟堅

即固

濟火煅海

蜋殼

燒爲

白灰

飲

調

服

針灸法

諸

痰飲病

取

豐隆

中脘

○

溢飲

取

中脘

○

飲

吐逆

不食

水氣攻

不食

取維道

中封

胃俞

腎俞

○

摩

○

溢飲

取

中脘

○

吐

停

疾不一

而足惟勞瘵

有痰爲難

治最宜早

灸膏肓

○

痰涎等

○

痰涎等

○

痰涎等

○

痰涎等

○

膏肓