

東醫寶鑑


奎貴
7608
1
5

奎章閣圖書	
部別	分類記號
	圖書番號 奎 1933
	一部冊數 24
	內別番號 5
서울대학교	

東醫寶鑑

貴
7608

國立中央圖書館
1933
數學
中央
國立中央大學校



內景篇三

五臟六腑

肝臟

心臟

脾臟

肺臟

腎臟 膽腑

胃腑

小腸腑

大腸腑

膀胱腑

三焦腑

胞

蟲



東醫寶鑑內景篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

五臟六腑

醫當識五臟六腑

先儒嘆世人身務窮天地萬物之理不

所存况醫者乎門

臟腑陰陽

內經曰言人身之藏府中陰陽則藏者為陰府者為陽肝心脾肺腎五藏皆為陰膽胃大

腸小腸膀胱三焦六府皆為陽

臟腑異用

靈樞曰五藏者所以藏精氣神血氣魂魄者也。內經

曰五藏者藏精氣而不瀉也故滿而不實六府者傳化物而不藏故實而不滿所以然者水穀入口

則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛。脾胃大腸小腸三焦膀胱者倉廩之本營之居也名曰器能

醫寶鑑內景篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

五臟六腑

醫當識五臟六腑先儒嘆世人身務窮天地萬物之理不

所存况醫者乎門

臟腑陰陽府內經曰言人身之藏府中陰陽則藏者為陰

焦六府皆為陽

臟腑異用靈樞曰五藏者所以藏精神血氣魂魄者也

傳曰五藏者藏精氣而不瀉也故滿而不實六府者

則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛也脾胃大腸



化糟粕轉味而出入者也

臟腑有合

靈樞曰肺合大腸大腸者傳道之府中正之府小腸合胃胃者五穀之府腎合膀胱膀胱者津液之府也少陰屬腎腎上連肺故將兩藏三焦者中瀆

之府也是六府之府也水出焉屬膀胱是孤之府也是六府之所與合者也

五臟通七竅

靈樞曰五臟常內閱于上七竅也故肺氣通於鼻肺和則鼻能知香臭矣心氣通於舌心和則舌能知五味矣肝氣通於目肝和則目能辨五色矣脾氣通於口脾和則口能知五穀矣

腎氣通於耳腎和則耳能聞五音矣五藏不和則七竅不

五臟有官

靈樞曰鼻者肺之官也肺病者皆青口唇者脾之官也脾病者唇黃舌者心之官也心病者舌卷短

脾病者唇黃舌者心之官也心病者舌卷短赤耳者腎之官也腎病者顴與顏黑耳焦枯

五臟有大小

靈樞曰五藏皆小者苦焦心多愁憂五藏皆大者緩于事難使以憂五藏皆高者好

高舉措五藏皆不離于病五藏皆端正者和利得無病
五藏皆脆者不離于病五藏皆端正者和利得無病
心五藏皆偏傾者邪心而善盜
不可以為人平反覆言語也

臟又有九
內經曰神藏五形藏四合為九藏肝藏魂心

一頭角二耳目三口齒四胃中以藏其如器
外張虛而不屈以藏於物故曰形藏四也

腑又有六
內經曰腦髓骨脉膽女子胞此六者地氣之

腸胃之長水穀之數
靈樞曰腸胃之長九五丈八尺四

半此腸胃所受水穀之數也

五臟中邪
黃帝問曰邪之中人藏奈何岐伯對曰愁憂

其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上積于脇下則
惡血留內若有所大怒氣上而不下積于脇下則
傷肝有所擊什若醉入房汗出當風則傷脾有
所用力舉重若入房過度汗出浴水則傷腎

五臟正經自病

難經曰正經自病者憂愁思慮則傷心

則傷肝飲食勞倦則傷脾久坐濕地

脉辨臟腑

難經曰何以知藏府之病也然數者府也遲

為寒故知藏府之病也

臟腑異證

難經曰病有欲得溫者有欲得寒者有欲得

何藏府然病欲得寒而欲得見人者病在藏也何以言之府

者陽病欲得寒又欲見人聲故以別知藏府之病也

又欲閉戶獨處惡聞人聲故以別知藏府之病也

臟腑病治有難易

難經曰藏病以難治者傳其勝也府病

易治者傳其子也藏病傳其勝者假令心傳

肺傳肝肝傳脾脾傳腎腎傳心一藏不再傳故

言次傳者死府病傳其子者假令心病傳脾脾傳肺肺傳腎腎傳肝肝傳心是子母相傳周而復始故言生也。內經曰邪風之至疾如風雨故善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脉其次治六府其次治五藏半死半生也

臟腑相關

內經曰五藏不平六府閉塞之所生也。五藏穿鑿論曰心與膽相通心與脾相通心與肝相通心與肺相通心與腎相通

為主膽病戰慄癲狂宜補心為主肝與脾相通脾病宜瀉小腸火小腸病宜清利膀胱水膀胱病宜清肺與膀胱相通肺病宜清利膀胱水膀胱病宜清肺氣為主腎與三焦相通腎病宜清利膀胱水膀胱病宜清肺氣為主三焦病宜補腎為主此合一之妙也門八

五臟病間甚

內經曰夫邪氣之客於身也以至勝相加至其內經曰夫邪氣之客於身也以至勝相加至

而持時死生之位而起必先定五藏之脉乃可言間甚之極準錢仲陽深得其理學者宜究心焉綱目占病愈日如肝病愈於夏甚於秋持於冬起於春餘倣此

五臟死期

內經曰五藏受氣於其所生傳之於其所勝舍於其所死於其所勝必

先傳行至其所不勝病乃死此言氣之逆行也故

肝之至至腎而而死脾之受受氣於於肺傳之之於腎氣舍於於心至至

死肝而受氣於肝傳之於心氣舍於肺至於脾而死此

此皆逆死也一日一夜五分之

臟腑氣絕候

詳見氣門

單方

三九二
種十

粳米

平
和
五
藏
煮
白
粥
早
晨
常
服
暢
胃
氣
生
津
液
鞏

小麥麵

常和
食五
之藏
軀可

大麥

實作五藏皆作佳飯韃作

實作五藏皆作佳飯韃作

蕎麥

麩能鍊五藏滓穢作

黑豆

散五藏結積。水漬生芽名大豆

胡麻

潤五藏作飯作麪常服

人乳

補五藏可

牛肚

補五藏醋和

牛髓

安五藏以酒

鹿肉

強五藏爛煮食之獐肉

狗肉

安五藏和五味爛煮空

黃雌

佳補益五味藏爛煮

雀肉

續五藏不足氣

蜜

安五藏補不足氣和
粥和藥長服佳

牛乳

即酪也補五藏
作粥常服佳

鯽魚

益五藏或煮或煎
或蒸常食佳

蓮子

主五藏不足氣為末作粥常服
其根曰藕蒸食甚補五藏

海松子

肥潤五藏作粥
常服甚佳

大棗

補五藏煎湯
飲之佳

葵菜

通五藏壅氣每月一食葵通
利藏府又是菜之主也

生薑

開藏府常食
不可闕也

葱白

調和藏府煮
食之佳

芥子

通利五藏微熬研作醬食之
其嫩莖煮為茹食之亦佳

五臟

肝臟

肝臟圖



肝形象

肝有二布葉一小葉如木甲拊之象各有支絡
 肝居中以宣發陽和之氣魂之宮也
 納經○肝

有二大葉一小葉左三葉右四葉分兩如木甲拊
 之多葉也門入○肝重四斤四兩左三葉右四葉九

七葉主
 藏魂

肝部位

肝生於左納○肝之系著膈下着左脇肋上
 貫膈入肺中與膈膜相連也門入○期門二穴肝

之募也在兩乳直下一寸半在背則肝俞在九頤下是肝之分也

肝主時日

肝主春足厥陰少陽主治其日甲乙○東方

少陽通於春氣納

肝屬物類

色在天為蒼在音為角在聲為呼在變動為握在

竅為目在味為酸在志為怒其液為淚其榮為爪其臭為臊其卦為震其象為龍其穀為麻一作其畜

為犬一作其蟲為毛其數為八其果為李其菜為韭納其脉為足厥陰納

肝臟大小

肝者主為將使之候外欲知堅固視目大小

者肝高合脇免駁者肝下胃脇好者肝堅脇骨弱者肝脆膺背好相得者肝端正脇骨偏舉者肝偏

傾也○肝小則藏安無脇下之病肝大則逼胃迫咽苦膈中且脇下痛肝高則上支貫切脇挽為息

貴肝則善病消羣易傷肝端正則和利難傷肝偏

傾則脇下痛也

肝傷證

有兩脇墜惡血留內有所大怒氣逆則傷肝。又曰大怒氣逆則傷肝。下積於

氣逆上而不下

肝病證

邪在兩脇則兩脇中痛寒中惡血在內。肝傳之肝病

名曰肝痺。一名曰厥。脇痛出食。肝熱者色蒼而

爪枯。納。外證善繁面青善怒。內證臍左有動氣

按之牢若痛其病四肢滿閉淋澀便難轉筋有是

者肝也。無是者非也。肝中不便肩項身熱破脰脫肉不

肝病虛實

則肝藏血。血舍魂。肝氣虛則恐實則怒。肝實

見耳無所聞善恐如人將捕之。肝藏血。血有

主血歸於肝藏肝

肝病間甚

冬起於肝愈於夏夏不愈甚於秋秋不死持於

於庚辛庚辛不死持於壬癸起於甲乙

肝病治法

肝苦急急食甘以緩之甘草宜食粳米牛肉

食辛以散之川芎肝虛以生薑陳皮之類補之納

也納肝病宜食甘粳米牛肉棗葵取其甘能緩急

宜瀉青丸肝虛宜四物湯方肉李韭皆酸取本味也實

清肝湯

治肝經血虛有怒火白芍藥一錢半川芎當

煎服水

補肝丸

治肝虛即四物湯加

瀉青丸

治肝實當歸草龍膽川芎梔子大黃煨羌活
防風各等分右為末蜜丸芡實大每一丸竹

葉湯同砂糖溫水化
下○一名砂糖肝丸

洗肝散

治肝實羌活當歸薄荷防風大黃川芎梔子
炒甘草炙各一錢右剉水煎服加草龍膽一

錢尤
妙

當歸龍薈丸

治肝藏實熱脇痛當歸草龍膽山梔子
黃連黃栢黃芩各一兩大黃蘆薈青黛

各五錢木香二錢半麝香半錢右為
末蜜丸小豆大薑湯下二三十九

肝絕候

合足厥陰氣絕則筋絕厥陰者肝脉也故脉不榮
也筋者聚于陰器而絡于舌本也故脉不榮

則筋急筋急則引舌與卵故唇青舌卷卵縮則筋
先死庚日篤辛日死○厥陰終者中熱嗑乾善尿

心煩甚則舌卷卵上縮而終矣○唇反青四
肢痠習艸縮汗出者此為肝絕也

死何以知之面青但欲伏眠目示而
不見人汗出如水不止以脉三

肝臟修養法

常以正月二月三月朔旦東面平坐叩齒三通吸震宮青氣入口九吞之閉氣九十

息蟠書

肝臟導引法

可正坐以兩手相重按胫下徐緩身左右各三五度又可正坐兩手拽相又翻覆向

家積三五度此能去肝邪毒氣

單方

凡二十種

草龍膽

服益肝膽氣。煎治肝藏濕熱。

空青

益肝氣。法木故色青而入藥服。乾。

黃連

鎮肝去熱毒。末服煎服皆可。

細辛

益肝膽。煎服末服皆佳。

決明子

除肝家熱。助肝氣。又治肝毒熱。為末服。又取嫩莖葉作菜食。

車前子養肝為末服或炒煎服又取嫩葉作羹茹佳

薺子即薺莫子也主肝壅明目為末服又取嫩根和米煮粥服能引血歸肝門

覆盆子補肝明目為末服生食之亦可

青箱子鎮肝主肝之藏熱毒為末服之

酸棗仁益肝氣末服煮服皆佳

山茱萸溫肝末服煮服佳

沙參養肝氣煮服或作茹常食之

蒼耳子主肝家熱明目煮末服並佳

芍藥補肝緩中損其肝者緩其中即此也末服煮服皆可

苦參養肝膽氣煮服之

青皮

以疎肝氣肝氣不達用青皮
心丹

木瓜

入肝故益筋與
血煮服之

小麥

養肝氣煮
飲服之

葱白

除肝邪氣煮湯
飲或取汁


韭

能充肝氣作
蔬常食佳

李

肝病宜
食之

心
臟



心 臟 圖

心形象

心形如未敷蓮花○心中有九空以導引天真之氣

盛精汁三合主藏神○上智人心有三竅一毛常

中智人心有五竅二毛○下智人心有三竅一毛常

人心中有二竅無毛○愚人心有一竅○心有七孔三毛

竅甚小無竅則神無出入之門○心有七孔三毛

七孔以應北斗七星○三毛以應三智故心至誠則

天無不應也○心包絡實乃累心之膜包于誠心

外故曰心包絡也○心包絡實乃累心之膜包于誠心

開蓮花上大小下銳倒懸着肺懸如未

心部位○心居肺下肝上○五藏之系相連故五藏有病先干

於心其系上系於肺其別者自肺兩葉之中向後

心主時日

心主夏○手少陰太陽主其日○丙丁○南方

也○神之變也○為陽中

心屬物類

在天為熱在地為火在卦為離在體為脉在

動為憂在竅為舌在味為苦在志為喜其液為汗

其榮為色其臭為焦其數為七其穀為麥黍作其

心臟大小

以五藏六府心為之主缺盆為之道骷骨有餘

小龍理者心大無髑髑髑者心高髑髑小短舉者心

下不舉者心端正髑髑髑弱小以薄者心脆髑髑直

小則易傷以憂心大則憂不能傷心高則滿於肺

中悅而善忘則難開以言心脆則善病消痺熱中

心傷證

憂愁思慮則傷心。邪客使魂魄不安者血

合目欲眠夢遠行而精神離散魂魄妄行陰氣衰

者為癰陽氣衰者為狂。心傷者其人勞倦則頭

面赤而下重心中痛而自煩發熱

心病證

邪在心則病心痛喜悲時眩仆心熱者色赤而

絡脉溢也納。外證面赤口乾善笑中熱而腕上有

動氣按之牢若痛其病煩心心痛掌中熱而腕下有

是者心也無是者非也。引肩項期一月死真藏

見乃與之期日註曰此心之藏也。期後三十日內

心病虛實

心實則脉脉中痛脇支滿脇下痛膺背肩胛間

痛兩臂內痛心神虛則胃腹大脇下與腰背相引而

心病間甚

持病在春起於夏。夏長夏不愈甚於冬。冬不死

愈。加於壬癸壬癸不死持於甲乙起於丙





手少陰無輸

黃帝曰手少陰之脉獨無輸何也岐伯曰

為帝王精神之所舍其藏堅固邪不能容容之則傷心心傷則神去神去則死矣故諸邪在於心者皆在心之包絡包絡者心主之脉也故少陰無輸也帝曰少陰無輸心不病乎岐伯曰其外經病而後銳骨之端獨取其經於掌

心病治法

虛也心苦緩急食酸以收之註曰心苦緩是心氣

甘瀉之納宜芒硝補之宜五味子又心虛以炒益補之

○心病宜食酸小豆犬肉李韭皆酸取其能收也

○心湯導赤散十味導赤散○心醒病禁溫食

熱衣

錢氏安神丸

補心虛朱砂水飛一兩麥門冬馬牙硝
白茯苓山藥寒水石甘草各五錢龍腦

二分半右為末蜜和一兩作三

醒心散

治心虛熱人參麥門冬五味子遠志茯苓

瀉心湯

治心熱黃連石菖蒲各等分右剉水煎服

導赤散

治心熱實小腸

十味導赤散

治心藏實熱口舌生瘡驚悸煩渴黃連

木通生地黃甘草各五分右剉

一方

黃連生用為君佐官桂少許煎百沸湯

心絕候

手少陰氣絕則脉不通脉不通則血不流血不

篤癸日死○形體如烟煤直視搖頭者此為心

死云二日

心臟修養法

常以四月五月朔望清旦面南端坐叩金梁九漱玄泉三靜思注想吸鼻宮赤色氣

氣三口三吞之閉
氣三十息齋生

心臟導引法

可正坐以兩手作拳用力左右互相等各六度又可正坐以一手按腕上一手向下

拓空如重石又以兩手拈叉以脚踏手中各五六度能去心胃間風邪諸疾閉氣為之良久閉目三

嚥津三叩齒而巳
齒而巳三嚥

單方

凡二十種

朱砂

法火故色赤而八心能鎮養心神
心熟非此不除水飛入藥或點服

赤石脂

養心氣火煨水飛
入藥或末服之

金箔銀箔

皆鎮心入
藥服之

黃丹

鎮心安神水飛
入藥用之

石菖蒲或開心末服或益心智令聰明

麥門冬清心煎熟補心氣不足

遠志定心煎服並佳

生地黃取汁服或煎服

黃連煎服或熟能去心惡血或

茯神開心末服煎

龜甲補心甚驗作末點服良

蓮子助心安心能通心氣末服煎服皆佳一方蓮子

則去之甘草微炒一兩為末每取二錢沸鹽湯點服之大能補心虛益氣

杏食心病宜

小麥養心氣 病宜食 鉢

犀角鎮心神 或水磨取汁服 鉢

雞子鎮心又白除心下 伏熱生吞一枚 鉢

苦菜安心神 常食之 鉢

赤小豆開心孔 煮粥服 或煮汁飲之 鉢

竹葉涼心除心煩 煎湯飲之 鉢


薄荷汁去心熱 飲之 鉢

連翹除心家客熱 煮湯飲之 鉢

梔子去心煩躁 可煮湯飲之 鉢

脾臟

脾臟圖



脾形象

脾形象馬蹄內包胃腕象土形也經絡之氣交歸于中以營運真靈之氣意之舍也納經。脾

形扁似馬蹄又中刀鑷。脾重二斤三兩扁廣三寸長五寸有散膏半斤主裹血溫五藏主藏意

化。脾者俾也。在胃下俾助胃氣主。水穀也。胃主受納脾主消磨。主

脾部位

脾長一尺掩太倉太倉者胃之上口即中腕穴也。脾居腕一寸二寸五分去心三寸六分

下。去腎三寸六分中腕一寸二寸五分。名曰黃庭。在天

為太陽在地為太陰在人為中黃祖氣道。家以脾為黃庭黃者中央之色庭者四方之中也。脾居一

○章門穴乃脾之募也直臍傍季肋端在背則脾俞在十一顛下是脾之部位也

脾主時日

脾主長夏足太陰陽明主其日戊己。脾屬土主長夏及四季納

脾屬物類

在天為濕在地為土在卦為坤在體為肉在藏為脾在色為黃在音為宮在聲為歌在變

動為噦在竅為口在味為甘在志為思其液為涎其榮為唇其臭為香其數為五其穀為稷其畜為牛其蟲為倮其果為棗其菜為葵納其脉為足太陰納其菜

脾臟大小

脾者主為衛使之迎糧視唇舌好惡以知吉

脾高唇上下縱者脾下唇堅者脾小唇堅者脾大而不堅者脾脆唇上下好者脾端正唇偏舉者脾偏傾也○

脾小則藏安難傷于邪脾大則苦湊眇而痛不能疾行脾高則眇引季脇而痛脾下則加于大腸

藏苦受邪脾堅則藏安難傷脾偏傾則善滿善脹也

脾端正則和利難傷脾偏傾則善滿善脹也

脾傷證

飲有所擊什若醉飽入房汗出當風則傷脾脾經。脾為諫議大夫蓋飲食

人之大慾心所不欲食而脾不能化則不敢食故名為諫議也

脾病證

邪在脾胃則病肌肉痛陽氣不足陰氣有餘則寒中腸鳴腹

痛脾經。外證面黃善噫善思善味內證當臍痛有動

氣按之牢若痛其病腹脹滿食不消體重節痛怠

惰嗜卧四肢不收有是者脾也無是者非也脾經。大骨枯槁大肉陷下胃中氣滿喘息不便內痛引

肩項身熱脫肉破胭真藏見。十月之內死脾經。此

脾之藏也期後三百日內死。肝傳之脾病名曰此

脾風發瘧腹中熱煩心出黃。脾熱者色黃而肉蠕動

脾病虛實安脾藏營營舍意脾氣虛則四肢不用五藏不

便也。脾實則腹脹滿腸鳴飧泄食不化。脾有餘則

腹脹溼瘦不利不。足則四肢不用

脾病間甚

夏病在脾愈在秋秋不愈甚在庚春春不死持於

已加於脾甲乙甲乙不死持於丙丁起於戊

脾病治法

脾苦濕急食苦是以燥之脾欲緩急食甘以緩

以甘草甘草大棗以甘補之人參以苦瀉之黃連○脾虛

湯宜用益黃散○補脾湯脾實宜用瀉黃散調胃承氣

湯宜用益黃散○補脾湯脾實宜用瀉黃散調胃承氣

益黃散

治脾藏虛冷腹痛泄利陳皮一兩青皮訶子

或三錢水煎服或剉五錢作

補脾湯

治脾藏虛冷嘔吐泄瀉飲食不消麥芽炒甘

一兩厚朴陳皮白朮各七錢

半兩剉五錢水煎服方

瀉黃散

藿香甘草各一錢石膏末八分防風六分

剉作一貼蜜酒拌

脾絕候

也足太陰氣絕則肌肉軟肌肉不榮肌肉唇舌者肌肉之中滿人

中滿則唇反唇反者肉先死甲日篤乙日死○大

陰終者腹脹閉不得息善噦善嘔嘔則逆逆則而

赤不逆則上下不通上下不通則何知之以口冷足

脾臟修養法

常以季夏之月朔旦并四季之末十八日

環口鰲黑柔汗發黃者此為脾絕○

脾臟導引法

可大坐伸一脚屈一脚以兩手拒地回顧用

力虎視各三五度能去



單方九種二十

雄黃益脾。雄黃法土故色。

蒼朮健脾燥濕。米泔浸一宿，剉乾末，服煎服，皆佳。乾。

白朮補脾。服法。

升麻脾痺非此不除。

縮砂溫脾。並佳。乾。

藿香助脾。溫脾。煎服。

丁香溫脾。治脾冷氣不和。

通草療脾疸。常欲。

厚朴溫脾。行脾氣。

橘皮主脾不能消穀煎服末服並佳

大棗養脾安中煮湯飲之又煮棗取肉和脾胃丸藥尤佳

乾柿健脾虛脾氣和酥蜜煎食主脾虛薄食不消化

飴糖健脾即黑糖也

稷米脾之穀也

粟米益脾作粥飯常食佳諸梁亦同

陳倉米煖脾宜作湯飲之

糯米味甘脾之穀脾病宜食作湯飲之

大麥芽補脾消食煮服未服皆佳

神麴健脾消食末服煮服皆佳

蜜養脾氣和粥飲可常服之最佳

牛肉養脾氣煮爛宜常食之尤佳


鯽魚補脾之功作羹作蒸故有補脾養胃

鮎魚補脾此魚亦食故與鯽魚同功泥

葵能充脾氣作菹食之佳

肺臟

肺臟圖



肺形象

肺之形似人肩二布葉數小葉中有二
行列以分布諸藏清濁之氣主藏魄
經

重三斤三兩六葉兩耳共八葉
人肩又如磬懸於五藏之上而為華蓋
門

肺部位

肺藏於右通一系自心入於肺兩
與心相通一系自心入於肺兩
大葉之間曲

折向後門中府第二穴肺之募也
間在背則肺俞在第三頤下是肺之
部位也

肺主時日

肺主秋生燥燥生金金生辛辛生肺
日庚辛○肺為陽中之

太陰通於
秋氣納

肺屬物類

肺在天為燥在地為金在卦為兌在
毛在藏為肺在色為白在音為商在
聲為哭

在變動為咳在竅為鼻在味為辛在
志為憂其味
為手太陰其液為涕其榮為毛其臭為腥其數為

九其叢為梳其畜為雞一作其蟲為介其
果為李其菜為韭其經為手太陰納

肺臟大小

五藏六府肺為之蓋○白色小理者肺
理者肺大巨肩反膺陷喉者肺高合
腋張脇



者肺下好肩背厚者肺堅肩背薄者肺脆背膺厚者肺端正脇偏踈者肺偏傾也○肺小則少飲不

病喘喝肺大則多飲善病胃痺痿逆氣肺高則上氣肩息咳肺下則氣貫迫肺善脇下痛肺堅則

不病咳上氣肺脆則苦病消瘴易傷肺端正則和利難傷肺偏傾則胃偏痛也

肺傷證形寒飲冷則傷肺○浮數皆吐肺傷者其人勞倦則咳唾血其脉細緊○熟在上焦因咳為肺痿也

之肺傷氣壅所致○熟在上焦因咳為肺痿也人咳口中反有濁唾涎沫寸口脉數此為肺痿也

若口中辟辟燥咳則肺中隱隱痛脉反滑數此為肺癰也

肺病證邪在肺則病皮膚痛寒熱上氣喘汗出咳動肩背攣○風寒入舍於肺名曰肺痺發咳上氣○

肺病者喘咳逆氣肩背痛汗出尻陰股膝髀臑肱足皆痛虛則少氣不能報息耳聾嗌乾○肺熱者

色白而毛敗○外證面白善噎悲愁不樂欲失內證臍右有動氣按之牢若痛其病喘咳洒淅寒

熱難○大骨枯槁大肉陷下胃中氣滿喘息不便其氣動形期六月死真藏脉見乃予之期日此肺

之藏也一百八十日內死

肺病虛實

肺氣虛則鼻息不利少氣實則喘喝胃憑仰

則息利少氣。肺藏氣，氣有餘則喘咳，上氣氣不足，則息利少氣。肺實則令人逆氣，而背痛，聞病音。

納

肺病間甚

長夏在肺，愈在冬。冬不愈，甚於夏。夏不愈，持於

加於丙丁丙丁不慧日中甚夜半靜。納

肺病治法

肺苦氣上逆，急食苦以泄之。註曰：肺氣上逆，

補之辛瀉之。納。肺苦氣上逆，急食苦以泄之。註曰：肺氣上逆，

桑白皮。肺病宜食麥、羊、肉、杏、雞、肉、桃、蔥、取本味也。肺

病禁寒飲，食寒衣，納。肺虛宜補肺散獨





補肺散

一名阿膠散治肺虛阿膠珠二錢鼠粘子糯

一分杏仁麩炒九箇右剉作

瀉白散

一名瀉肺散治肺實桑白皮地骨皮各二錢

母苦蕒子麥門冬生地黃亦可

人參瀉肺湯

治肺實熱黃芩梔子枳殼薄荷連翹杏

右剉作一貼水煎服

肺絕候

者也太陰氣絕則皮毛焦太陰者行氣溫于皮毛

節傷皮節傷則爪枯毛折毛折者則毛先死丙日

篤丁日死○肺絕三日死何以知之口張鼻齟

肺臟修養法

天常以七月八月九月朔望旭旦西面坐鳴

閉白氣入口七舌之

肺臟導引法

可正坐以兩手據地縮身曲脊向上五舉

各三五度此法去胃臆間風毒閉氣

單方

二九二十

雲母

補肺而入肺。雲母法金故色白

人參

補肺絕之。候人參膏獨參湯或作末日五六服。將

天門冬

末服酒浸服皆佳。乾

麥門冬

治肺熱。麥門冬人參五味子為

五味子

收肺氣作茶

沙參

益肺氣能補肺中陰氣

片黃芩

治肺熱丸服煮
服末服皆佳

紫菀

益肺清肺
服之佳

貝母

潤肺作末和砂糖作丸
含化或煮服之並佳

苦蕒

理肺氣又治肺熱氣
促末服者服並佳

馬兜鈴

補肺去熱
急煮服之熟治喘

桑白皮

瀉肺去肺中水
氣煮服之

葶藶子

治肺壅喘急取子炒五
錢大棗五枚同煎服

橘皮

利肺氣治氣逆上
或煮服或末服

枳殼


泄肺氣或煮
或末服

胡桃

斂肺止喘
常服之

腎臟圖

腎臟



烏梅

收肺氣作
茶飲之湯

杏仁

治肺潤燥散結
作粥服甚佳

桃

肺病宜
食鞣

黍米

肺病宜食
作飯食鞣

牛乳

潤肺養肺作酪
粥常食之佳

雞子白

潤肺清熱
生吞之鞣

腎形象

腎藏有二形如紅豆相並而曲附於脊筋外有脂裹裏白表黑主藏精納○腎有兩枚重各九

兩共一斤二兩左屬水而右屬火男以左腎為主女以右腎為主○腎形如紅豆相並如環曲貼脊

脊膜中裏白外紫兩腎二系相通下行其上也則與心系通而為一所謂坎北離南水火相感者也

腎臟有二

腎也其左為腎獨有兩者何也然腎兩者非皆

所舍元氣之所係也男子以藏精女子以繫胞故知腎有一也難○命門非正藏三焦非正府也

腎部位

腎與臍相對與腰相應○腰者腎之外候○腎為列女在後宮有兩枚顙○腰者腎之外候○腎

也在腰中挾脊季肋下一寸八分在背則與腎俞在脊十四顙下兩傍命門穴在脊十四顙下與臍相

對乃腎之部位也銅○命門之系即心包絡其經手厥陰其府三焦其部○分在心下橫膈膜之上豎

斜膈膜之下與橫膜相粘其處黃脂漫包者此心也其漫脂之外有細筋膜如絲與心肺相連者此包

絡也

門

腎主時日

腎主冬足少陰太陽主治其日壬癸。北方

少陰通於冬氣納。腎主受水穀之精而至靜惟子時濁氣一動而已。

腎屬物類

腎在天為寒在地為水在卦為坎在體為骨

變動為慄在竅為耳在味為鹹在志為恐其脈為足少陰其液為唾其榮為髮其臭為腐其數為六其穀為豆其畜為彘其蟲為鱗其果為栗其菜為藿其經足少陰

腎臟大小

腎者主為外使之遠聽視耳好惡以知其性

高耳後陷者腎下耳堅者腎小麗理者腎大耳高者腎脆耳好前後居牙車者腎端正耳偏高者腎偏傾也。

腎小則藏安難傷腎大則善病腰痛易傷於邪腎高則苦背脊痛不可以俛仰腎下則腰尻痛或為

狐疝腎堅則不病腰背痛腎脆則善病消瘵腎端正則和利難傷腎偏傾則苦腰痛也。

腎傷證

有所用力舉重若入房過度汗出浴水則傷腎。經難

久坐濕地強力入水則傷腎

腎病證

邪在腎則病骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰痛大便難肩背頸項痛時眩暈。脾傳之

腎病名曰疝瘕少腹冤熱而痛出白一名曰蠱註曰出白謂洩出白液也。腎熱者色黑而齒枯。

大骨枯槁大肉陷下肩髓內消動作益衰真藏來見期一歲死見其真藏乃予之期日註曰此腎之

藏也期後三百六十日內死。納。外證面黑善恐數欠內證臍下有動氣按之牢若痛其病逆氣

小腹急痛泄如下重足脛寒而逆難

腎病虛實

腎氣虛則厥實則脹。腎實則腹大脛腫喘咳身重寢汗出憎風虛則胷中痛大腹小腹

痛清厥意不樂。虛則心懸如飢善恐。腎

腎病間甚

持病在腎愈在春春不愈甚於長夏長夏不死持病在秋起於冬。腎病者愈在甲乙甲乙不死

愈甚於戊己戊己不死持病於庚辛起於壬癸。腎病者夜半慧四季甚下晡靜。納。

腎病治法

腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣也腎欲堅急食苦以堅之用苦補之鹹瀉之

納○腎苦燥宜知母黃柏腎欲堅宜知母補以黃
柏瀉以澤瀉又曰腎虛宜熟地黃○知母補以黃
辛黃黍雞肉桃葱取其辛潤也○腎病禁犯焮煖熱
豆豉肉栗藿取本味也○腎病禁犯焮煖熱
食溫炙衣○腎本無實不可瀉錢氏只有補腎
地黃元無瀉腎之藥○左腎屬水水不足則陰
虛宜補腎丸六味地黃丸加滋陰降火湯右腎屬火
火不足則湯虛宜八味地黃丸加減八味丸溫腎散
補腎丸並酒浸炒各三兩乾薑一兩右為末粥丸梧
子大空心鹽湯下五七十丸○

六味地黃丸

治同上熟地黃八兩山藥三兩茱萸各四兩
澤瀉牡丹皮白茯苓各三兩右為末

蜜丸梧子大溫酒鹽湯空心吞下五七十丸○
血虛陰衰熟地黃為君精滑山茱萸為君小便或
多或少或赤或白茯苓為君小便淋瀝澤瀉為君
心氣不足壯丹皮為君皮膚乾澀山藥為君
滋陰降火湯分治腎水不足陰虛火動白芍藥一錢三

冬白朮各一錢生地黃八分陳皮七分知母黃柏並蜜水炒甘草炙各五分右剉作一貼薑三片棗

煎服

八味丸

治命門火不足陽虛熟地黃八兩山藥山茱萸各四兩牡丹皮白茯苓澤瀉各三兩肉桂

附子炮各一兩右為末蜜丸梧子大空心溫酒或鹽湯下五七十丸若加五味子名曰腎氣丸

又治老年水火俱虧腎氣虛乏下元冷倦腰痛脚軟夜多漩尿面黑口乾耳焦枯門

加減八味丸

專補腎水無補命門火熟地黃二兩山藥微炒山茱萸各一兩澤瀉酒蒸牡丹

皮白茯苓各八錢五味子畧炒一兩半肉桂五錢右為末蜜丸梧子大五更初未言語時鹽湯或溫

酒下五七十丸又晚間空腹再服

溫腎散

治腎與命門虛寒腰脊重痛熟地黃一錢半牛膝肉苁蓉五味子巴戟麥門冬甘草炙各

八分茯苓神乾薑杜仲炒各五分右剉作一貼水煎服或為末溫酒調二錢服

兩臟同一腑脉小便清利脉沉遲是冷氣歸腎小便赤澀

者謂其所受之病同歸於膀胱一府也

腎絕候而少陰終者面黑齒長而垢腹脹閉塞上下不通

也伏行而濡骨髓者也故骨不濡則肉不能着也骨肉不相親則肉軟却肉軟却故齒長而垢髮無

澤髮無澤者骨先死戊日篤己日死浮而洪身汗失狂言目反直視者此為腎絕也

如油喘不休水漿不下形體不仁乍靜乍亂者此為命門絕也

枯面為正黑目中黃色腰中欲折自汗如流水一云人中平十日死

腎臟修養法平常以十月十一月十二月朔望旭旦北面

入口五吞之閉氣六十息養性

腎臟導引法可以正坐以兩手上從耳左右引脇三五度亦可以手着胷拋射左右同緩身三五度

亦可以前後踰左右各十數度能去腰腎膀胱間風邪積聚仙耀○擦腎俞穴法臨卧時坐於床垂足解衣閉氣舌挂上腭目示頂仍提縮穀道以手摩擦兩腎俞穴各一百二十次以多為妙畢叩齒卧專治腎元虛冷小便滑數齏老

單方九種二十

磁石

法養益腎氣腎虛耳聾目昏皆用之○磁石

陽起石

補腎氣治腎氣虛冷為末水飛入藥用韃

鹽

接藥入腎和鹽炒入鹽服之皆此意也韃

兔絲子

補腎中陽氣治腎冷酒浸為末和酒服或入藥用韃

肉苁蓉

命門相火不足以此補之酒浸蒸入藥湯

五味子

暖水藏補腎述類象形者也或丸服或煮服韃

熟地黃假火以此為君天一所生之源也味

知母補腎陰不足治腎熱鹽

栢子仁潤澤腎藏治腎冷或

杜冲治腎冷又治腎勞腰脚冷

沉香補命門火不足為末入

山茱萸補腎添精煖水藏滋精

牡蠣補腎煖為粉入丸藥

桑螵蛸主腎衰漏精洗

覆盆子益腎藏又煖腎酒浸焙

破故紙溫補腎藏能引氣歸腎



鹿茸

補腎虛治腰腎虛冷酥灸
為末入丸藥或作末服

鹿角膠

主腎藏氣衰虛損
炒為珠作末服

溫脾

益腎主腎精衰損多色成勞瘁能煖腎
酒浸炙令香為末服或入丸藥用之

狗陰莖

補腎主陰痿不起令強熱
大灸為末服或入丸藥

牛腎

補腎可常
食之

栗

補腎病宜食
宜煨常食之

黑豆

入鹽煮能補腎
宜常食之

膽腑

膽形象

其色玄其形如懸瓠附肝之短葉間重二兩作
三銖盛精汁三合無出入竅門○肝之餘氣

溢入於膽聚而成精由是內藏精而不泄
視物而得明為清淨之府能通於眼目

膽部位

之膽主腋兩腋缺盆皆膽之路。日月二穴膽俞

在脊第十頤下兩傍此膽之部位也。

膽主決斷

人稟剛正果斷直而無疑無私者膽之氣正

也

膽外候

目下累大其膽乃橫。肝應爪爪厚色黃者膽

赤者膽緩爪直色白無約者膽直爪惡色黑多紋者膽結也。

膽傷證

○膽者敢也驚怕則膽傷矣。

膽病證

人將捕之嗌中吟吟然數唾。心中澹澹恐如

助之中血瘀生癭馬刀又膽候咽門故熱壅則生瘡腫痛。

膽病虛實

怒而勇敢膽虛則不能獨卧。膽實則怒。○膽虛則

不眠膽實則多睡

膽病治法

膽虛宜仁熟散膽實宜半夏湯○小柴胡湯治寒熱往來乃少陽經主藥也

清溫服則能入膽

仁熟散

治膽虛恐畏不能獨卧栢子仁熟地黃各一錢人參枳殼五味子桂心山茱萸甘菊茯苓

枸杞子各七分半右剉作一貼水煎服或為末溫酒調二錢服之

半夏湯

治膽實熱煩悶生地黃酸棗仁炒各五錢半夏生薑各三錢遠志赤茯苓各二錢黃芩一

錢黍米一合右剉每一兩長流水煎澄清服

膽絕候

膽為足少陽其終者耳聾百節皆縱目累瞤輕繖驚絕系絕系者一日半死矣其死也色先青

白乃死矣○膽絕七日死何以知之眉為之傾

膽腑導引法

可平坐合兩腳掌仰頭以兩手挽腳腕起搖動為之三度亦可大坐以兩手拓地

舉身勞腰脊三五度能
去膽家風毒邪氣礪

單方九五種

柴胡治膽痺非此寒熱足少陽經主藥也又曰

乾地黃助心膽氣或煎服或丸服之

黃連益膽或煎服或丸服或末服

細辛添膽氣水煎服之

白百合定膽水煎服之

胃腑

胃形象胃長一尺五寸徑六寸胃紆曲屈伸之長二尺六寸大

常留二斗水一斗五升靈○胃重二斤十四兩
○胃為之市註曰水穀所歸五味皆入如市雜故

為市也。納。胃。號。太倉。俗呼為肚。受水穀。三斗五升。平人。日再。圓一行。二升。半一日。五升。七日。則三

斗五升。而水穀盡矣。故平人不餓。食七日而死者。胃中水穀津液俱盡也。門入。

胃部

部位。咽門至胃。長一尺六寸。胃居心蔽骨與臍之中。上。下。各四寸。縱。中。腕一穴。胃之募也。在。心。蔽。

骨與臍之中。上下各四寸。在背則胃俞。在脊第十二。顛下兩傍。胃之部位也。人銅。

胃為水穀之海

胃人者。水穀受氣者。穀也。穀之所注者。胃也。胃者。水穀氣血之海也。海之所行。雲氣。

者。天下也。胃之所出。氣血者。經隧也。經隧者。五藏六府之大絡也。胃者。五藏六府之海也。水穀皆

入於胃。藏府皆稟氣於胃。五味各走其府。喜酸。先走肝。苦先走心。甘先走脾。辛先走肺。鹹先走腎。穀

氣津液已行。榮衛大通。乃化糟粕。以次傳下。糲。胃為水穀之海。脾為消化之器。水入於經。其血乃

成。穀入於胃。脉道乃行。血不可不養。衛不可不溫。血溫。衛和。得盡。天年。飲。食。入。胃。則。胃。實。而。腸。

虛。食。下。則。腸。實。而。胃。虛。胃。滿。則。腸。虛。腸。滿。則。胃。虛。更。虛。更。實。故。氣。得。上。下。而。無。病。矣。糲。

胃腑大小過則胃以下至天樞長八寸

胃外候肉胃為之海廣骸大頸張胃五穀乃容○脾應肉

者胃不堅肉不堅者胃緩身者胃下胃下者胃急肉

利也肉不堅者胃結胃結者上

胃傷證胃飲食自倍腸胃乃傷納○胃傷之證不思飲食

嗜卧常多

胃病證胃病者腹脹胃腕當心而痛上支兩脇瞞噎

腕也○胃中寒則手魚際之絡脉多赤○面熱者足陽明病兩跗之

上脉堅者足陽

胃病虛實胃脉實則脹虛則泄納○胃中元氣盛則能

肥脾胃俱虛則不能食而瘦或少食而肥雖肥而四肢不舉

胃病治法

人之無根本也水食為命蓋脾胃屬土主納水穀

容以待真氣治法調其飲食適其寒溫澄心息慮從

宜異功散補中益氣湯防範不進飲食宜養胃進食湯

平胃散

治脾胃不和不思飲食心腹脹痛嘔噦惡心

發霍亂及五噎八痞膈氣反胃等證蒼朮二錢陳

皮一錢四分厚朴一錢甘草六分右剉作一貼薑

三片棗二枚水煎服或為末取二錢薑棗湯點服

異功散

治脾胃虛弱不思飲食腹痛自利人參白朮

片棗二枚同煎服

養胃進食湯

治脾胃虛弱飲食不進面黃肌瘦胃滿

人參白朮各一錢陳皮厚朴白茯苓甘草炙各七分神麴炒麥芽炒各五分剉作一貼薑三片棗

二枚同煎服或為末蜜和作丸梧子大毒二錢米飲下服

胃絕候

其胃為足陽明其終者口目動作善驚妄言色黃

以知之脊痛腰中重不可反覆

單方

九二十種

石膏

除胃熱專瀉胃中之火研水煎一兩服或水飛二錢和水服

葛根

開胃下食解酒毒水煎服或水飛澄取粉和水服

人參

補胃氣能開胃消食煎服末服皆佳

白豆蔻

主胃冷能消磨水穀研水煎服或末服皆佳



蒼朮

強胃去胃中濕或煎或丸或末服皆佳

白朮

補胃服如上述法

大豆

除胃中熱痺。大豆黃卷理胃氣或煮或末和水服二錢

丁香

治胃寒能溫胃或煮或末服

縮砂

溫胃消化水穀煎服末服皆佳

乾薑

開胃溫胃煎服末服九服並佳

生薑

開胃煎湯服之

大麥

平胃氣開胃作飯作粥皆可常食。大麥芽開胃消食

粳米

補胃氣作白粥可常服

稷米

利胃作飯作粥並佳

青梁米主胃痺作飲

牛肚補胃中熱可常服之○酪粥

羊肉亦可○煮爛食之

黃狗肉補胃厚腸胃煮爛

黃雌雞補胃煮爛

鯽魚平胃氣補胃作羹

鮠魚開胃作羹

石首魚開胃可

芋開胃又寬腸胃

橘皮開胃作茶飲之或

大棗

胃平胃氣厚腸胃可常食

乾柿

開胃厚腸胃可常食之

韭

除胃中熱可常食

小腸腑

小腸形象

小腸長三丈二尺廣二寸半徑八分少

穀二斗四升水六升三合合之太半

小腸部位

小腸後附脊當臍左環迴周葉積而下

水分穴即小腸下口也小腸俞在脊十八

傍此小腸部位也

小腸傳受

於小腸中腐熟水穀其滓穢自胃之下口傳入

膀胱上口渫穢入大腸上口難經曰小腸大腸會謂之闌門言由關闌分隔也

小腸外候

唇厚人中長以候小腸。心應脉皮厚者脉

薄皮緩者脉厚者小腸厚皮薄者脉薄脉薄者小腸薄者小腸小而短諸陽經脉皆多紆屈者小腸結

也

小腸病證

中氣不足腸為之苦鳴。小腸病者小腹痛腰脊控引腰脊上衝心邪在小腸也

小腸控引腰脊上衝心邪在小腸也。小腸有血則小便為泄納。小腸有氣則小腹痛小腸有熱則莖中痛。

小腸病治法

小腸者心之府也。有病宜通利。用導赤散赤茯苓湯。

導赤散

治小腸熱小便不利生地黄木通甘草各一錢左坐入青竹葉七片同煎服。

赤茯苓湯

治小腸熱面赤多汗小便不利木通赤茯苓檳榔生地黃黃芩赤芍藥麥門冬甘草。

各一錢右剉作一貼入
生薑五片同煎服秘用

小腸絕候如小腸絕六日死何以知之
髮直

單方九種

澤瀉通小腸利小便

木通通小腸下水

瞿麥通心經利小腸為最要水煎服之

連翹通小腸水煎服之

茯苓治小腸不利水煎服或末服

黑豆煮汁飲除腸中淋露又治腸痛熬浸酒飲之

梔子療小腸熱水煎服之

冬瓜汁利小腸可飲之

煮葵汁滑小腸作羹茹食之

大腸腑

大腸形象大腸一名迴腸又名廣腸長二丈一尺二兩

迴疊積十六曲盛穀二斗水七分迴曲環反三十二

所八至所出長六丈四寸四分迴曲環反三十二

大腸部位大腸後附脊以受小腸滓穢當臍右迴疊積

穴在大腸之募也在臍傍各三寸在背則大腸俞在脊第十六顛下兩傍此大腸部位也

大小腸連系大小腸之系自臍下與脊脊連心腎膀胱

絡大小腸與膀胱其細脉之中乃氣血津液行走之道也

大腸外候

厚皮薄者大腸薄皮緩腹累大者大腸大而

長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相

離者大腸結○天樞以下至橫骨長六寸半過則

大腸病證

寒大腸病者腸中切痛而鳴濯濯○腹冬日重感于

上衝胃喘不能久立邪在大腸也○大腸中寒則腸

鳴飧泄腸中熱則出黃如糜○大腸小腸為泄

○大腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄納

大腸病治法

黃帝問曰胃惡熱而喜清冷大腸惡清冷

此者飲食衣服亦欲適寒溫寒無婁倉暑無出汗

飲食熟無灼灼寒無倉倉寒溫中適故氣將持乃

不致邪僻也○大腸寒宜實大腸熱宜

瀉白湯大腸寒宜實大腸散

瀉白湯

治大腸實熱臍腹痛腹脹不通生地黃二錢
赤茯苓芒硝各一錢陳皮竹茹黃芩梔子黃

栝各五分右剉作一貼薑
三片棗二枚水煎服

實腸散

治大腸虛寒腹痛泄瀉厚朴肉豆蔻煨訶子
皮縮砂研陳皮蒼朮赤茯苓各一錢木香甘

草灸各五分右剉作一貼
薑三片棗二枚水煎服

大腸絕候

大腸利無度不治何以知之
泄利無度利絕則死

單方

九種二十

訶子皮

治腸止泄或
煎或末服

黃狗頭骨

止泄痢能固大腸滑脫灸黃
為末飲調服或作丸服

五倍子

治腸虛泄利能澀腸固脫
為末和水服或丸服

石榴殼

治腸止泄或煎
服或末服之

陳倉米澁腸胃又調胃作飯作粥作飲服

粟米粳實大腸和

烏梅澁腸作茶

橡實厚腸胃澁腸為末和米飲服之或丸服皆佳

牡蠣粉澁大小腸取末和

郁李仁治腸中結氣為末和水服

大黃利大小腸煎服

續隨子利大小腸為末和水服或丸服之

桑白皮煎飲之

梔子療大小腸大熱水煎服或為末點服之

桃花利大和麵作燒餅食之良時拾取

胎麻油即香油也通大小腸單服

麻仁治大腸風熱作粥服結澁

水芹利大小腸取莖葉搗絞汁

絲蓴補大腸虛氣作羹飲

葱白通大小腸取汁飲

冬瓜利大小腸作羹食之羹

菰菜通利腸胃作羹食羹

牛乳利大腸作粥常服

童尿利大腸和薑汁或和



膀胱腑

膀胱形象

膀胱以虛受水為津液之府有上口而無下口得氣以虛受水為津液之府有上口而無下

不足則秘澀不通○上口廣二寸半中廣九寸盛尿九升九合重九兩二銖

膀胱部位

膀胱在小腹之內○中極二穴膀胱之募在臍下四寸在背則膀胱俞在脊第十九

下兩傍此膀胱部位也

膀胱傳受

水液自小便泌別汁滲入膀胱之中胞氣化之而為尿以泄出也○膀胱雖為津液之

府至於受盛津液則又有胞而居膀胱之中類纂曰膀胱者胞之室也

膀胱外候

鼻孔在外膀胱厚○腎應骨密理厚皮者三焦膀胱薄疎

腠理者三焦膀胱緩皮急而無毫毛者三焦膀胱急毫毛者三焦膀胱

也

膀胱絕候

遺尿狂言目反直視此為膀胱絕也。膀胱

白絕汗乃出絕
汗出則死矣

單方

七種

澤瀉

利膀胱熱宣通
水道水煎服

茴香

溫膀胱去冷氣或炒
為末點服或煎服

防己

去膀胱熱坐
水煎服之

石韋

治膀胱熱滿
水煎服之

地膚子

主膀胱熱利小便或
水煎服或為末服

瞿麥

逐膀胱邪逆通小
便水煎服之

栝子仁

去膀胱冷膿宿水或
末服或凡服皆佳

威靈仙或去膀胱宿膿惡水

郁李仁治膀胱急痛為

青橘皮除膀胱留熱停水

黃栢或煎服或丸服之熟利下竅

烏藥煎服或為末點服或

椒目主膀胱急或末

猪腎通利膀胱又補膀胱水

吳茱萸能煖膀胱水

昆布療膀胱急妨下水氣切四兩入葱白

魚膾除膀胱水以薑

三焦腑

三焦形象

上焦如霧，中焦如沤，下焦如瀆。
靈樞經
 上焦主出陽氣，溫於皮膚，分肉之間，若霧露之漑焉。

故曰上焦如霧。中焦主變化以水穀之味其精微上注於肺化而爲血行於經隧以榮五藏周身故

不納通秘塞○故下焦主通利瀆便○以三焦指腔子而

而言包含乎腸胃之總司也胃中育膜之上曰上焦育膜之下曰中焦總名

魚曰鮓

三焦部位

其治在膻中玉堂欲下一寸六分直兩乳間

水穀者。是○中焦者。在胃中脘。欲不上。不下。主腐熟。水穀。其治在臍傍。○下焦者。在臍下。當膀胱上口。

主分。別清濁。主出而不納。以傳導也。其治在臍下。
一寸。辨頭至心爲上焦。心至臍爲中焦。臍至足。

爲下焦○三焦之府在氣衝○氣衝乃陰陽道
路足陽明之脈發主腐熟水穀之氣三焦發用貫

爲下焦○三焦之府在氣衝○氣衝乃陰陽道
路足陽明之脈發主腐熟水穀之氣三焦發用貫

爲下焦○三焦之府在氣衝○氣衝乃陰陽道
路足陽明之脈發主腐熟水穀之氣三焦發用貫

爲下焦○三焦之府在氣衝○氣衝乃陰陽道
路足陽明之脈發主腐熟水穀之氣三焦發用貫

通十二經絡往來上下營運氣血是知氣衝為三焦行氣之府也。上中下三焦通為一氣衛於身也。三焦非正府也。無形而有用。壅。

三焦傳受

走上焦出於胃上口並咽以上貫膈而布胃中走中焦出於胃中上焦之後此所受氣者泌糟粕蒸津液化其精微上注於肺脉乃化而為血以

足陽明常與榮俱行於陽二十五度行於陰亦二十度為一周而復大會於手太陰命曰衛氣也。

○中焦亦並胃中出上焦之後此所受氣者泌糟粕蒸津液化其精微上注於肺脉乃化而為血以

奉生身莫貴於此故獨得行於經隧命曰榮氣。下焦者別迴腸注於膀胱而滲入焉故水穀者常

並居於胃中成糟粕而俱下於大腸而成為下焦。而俱下濟泌別汁循下焦而滲入膀胱焉。○上

焦如霧者氣下焦如瀆者血也。中焦者氣血之分也。燔。○心肺若無上焦何以宗主榮衛脾胃若無

中焦何以腐熟水穀肝腎若無下焦何以道決津液無形而有用主持諸氣三焦者水穀之道路氣

之所終始也。門入



三焦外候。鼻柱中央起三焦乃約。靈

三焦病證。三焦病者腹氣滿。小腹尤堅。不得小便。窘急。

在三焦約也。靈。上焦如霧。霧不散則為留。留飲不

出而不納也。中焦如漚。漚不利則為留。留飲不

散久為中滿。此上不能納。下不能出也。下焦如瀆。

三焦病治法。內經曰。三焦者決瀆之官。水道出焉。蓋三

小便。宜用枳殼丸。和散。枳殼丸。木

枳殼丸。治三焦。五錢。木香。二錢。不通。枳殼。二兩。陳皮。一兩。

生用。一半。炒熟。搗取頭末。一兩。半。餘不用。

木香。檳榔丸。去陳導三焦。快氣。潤腸。半。夏。麴。皂。角。酥。炙。

香櫚榔枳殼杏仁青皮各一兩右爲末別以皂角四兩浸漿水搓揉熬膏去滓入蜜少許和丸梧子大空心薑湯下
五七十丸

單方

三種

黃芪

補三焦實衛氣是上中下內
外三焦之藥也水煎服之

燕覆子

除三焦客熱取
熟者食之

牛髓

平三焦以
酒和服

益智仁

安三焦末服
丸服並佳

胎麻油

下三焦熱毒氣
單取飲之

甜瓜

通三焦間壅塞
氣熟者食之

人參

補上焦元氣煎服
末服九服並佳

黃狗肉

實下焦煮爛和五味食之

鵝肉

同酥煎食偏令

青橘

治下焦冷氣煎服末服並佳

藕

蓮根也蒸食實下焦

猪腸

補下焦虛竭煮爛食或作羹食之

絲蓴

安下焦作羹食之

胞

胞形象

胞者一名赤宮一名丹田一名命門男子藏精施化婦人繫胞有孕俱為生化之源非五行也

非水亦非火此天地之異名也象坤土之生萬物也
○此府註曰奇異於恒常之六府也
○此胞非膀胱中盛尿之胞也

胞部位

婦人胎之所居名曰子宮亦曰胞門。竅四寸。着

脊梁兩腎間中央赤是也。左青右白上黃下黑三

寸法三光四寸法四時五色法五行兩腎間名大

胞為血室

海衝脉任脉皆起於胞中。上循腹裏為經絡之

衝脉盛月事以時下故有子。註曰癸至任脉通。北

水干名也。任脉衝脉皆奇經脉也。衝任流通。經血

漸盈應時而下。任主真之氣。降與之。從故事。故云天癸

也。然衝為血海。任主胎氣。二者相資。故能有子。所

以謂之月事者。平和之氣。常以三旬而一見也。故

愆期者。謂之有病。○血室者。血之所居也。榮衛

停止之所。經脉流會之處。衝脉是矣。○衝脉為血

海。諸經朝會。男子則運而行之。女子則停而止之。

男既運。行故無積。而信即月既水也。以故有積。盈而

滿者。以時而溢。謂之不滿。女既水也。以故有積。盈而

滿也。

脉法

者此為居經三月一少者亡血也。乳子下利為可。否

精遲則陰中寒。澀則血不來。此為居經三月一來。

者生。婦人漏下赤白。日下血數升。脉急疾者死。遲

實數者死。婦人漏下赤白。調如故。而尺脉絕不至者。月

水不利。尺脉來而斷絕者。月水不利。婦人經脉不利。沉

主月水不利。尺脉來而斷絕者。月水不利。婦人經脉不利。沉

孔。脉來至狀如琴絃。若小腹痛。主月水不利。沉

經行有異。巧婦人年二七天。癸至七七。天癸竭。行早性機

行年十四歲。當時二十歲。不行。命如風燭。有病發

則死。間有不死。百中無一。亦令一生多病。未嘗一

日安裕。然有四季行。亦可。又有一年一次。者亦不

甚佳。或一生不循正道而行者。晚年有僻疾。則難

治。得。

月候形色。經水者。陰血也。陰必從陽。故稟火色也。血為

氣之配。氣熱則熱。氣寒則寒。氣升則升。氣降

氣經水者。陰血也。陰必從陽。故稟火色也。血為

氣之配。氣熱則熱。氣寒則寒。氣升則升。氣降

氣經水者。陰血也。陰必從陽。故稟火色也。血為

氣之配。氣熱則熱。氣寒則寒。氣升則升。氣降

則降氣凝則凝氣滯則滯氣清則清氣濁則濁往見有成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滯也

行後作痛者氣血俱虛也色淡者亦虛也而有水

和血治法

雖不對期而色正者易調月候

者率指為風冷而行人但見其紫者黑者作痛者成塊

心主血故以色紅為正月

物湯加黃芩黃連香附子○淡白者虛也芎歸湯

婦規加人參黃芪白芍藥香附子○淡白者虛也芎歸湯

琥珀調經丸

治胞冷無子能令經正香附米一升分

艾四兩拌勻再加醋五掬入砂鍋內同煮乾為度
入川芎當歸白芍藥熟地黃生乾地黃沒藥各二

兩琥珀一兩右為末醋糊和丸梧
子大每百九空心艾醋湯下

月候不調若汗出小便不利亡其津液故令經水反少也利

談經下多於前者有所苦困當言恐大便難身復
無汗也繇○月候不調之由或前或後或多或少

凡行後作痛者虛也小而不散者滯也紫黑色者氣虛
也其將行作痛及凝塊不散者滯也

而挾熱也○月候不調之中有無疼痛者則有無
發熱者其不調之中有趨前者有退後者則趨前

為熱退後為虛也疼痛之中有常時作痛者為血積經
前經後作痛者則常時與經前作痛者為血積經

後為血虛也發熱之中有積經行為發熱者有經行發
熱者則常時為血虛有積經行為血虛有熱

調血治法治經水或前或後或多或少或逾月不至或
一月再至皆不調之故宜調經散一云經候

不調當以四物湯為主治○臨經行腹痛此血
澁故也宜清熱調血湯又四物湯加玄胡索苦練

根蓬朮香附子桃仁紅花黃連。經行後腹痛乃
虛中有熱八物湯加減服。先期而來乃氣
血俱熱宜清經四物湯又四物湯加柴胡黃芩黃
連。過期不來是血虛宜通經四物湯又四物湯
加黃芪陳皮升麻人參。月候不調通用煮
附丸墨附丸四製香附丸七製香附丸。

調經散

一名溫經湯治月候不調麥門冬二錢當歸
一錢阿膠珠甘草炙各七分半吳茱萸肉桂各五

分右剉作一帖薑三片水煎服。千金調經湯

治同上當歸川芎白芍藥各一錢麥門冬半夏各
七分人參阿膠珠牡丹皮吳茱萸肉桂各五分甘

草三分右剉
服如上法

清熱調血湯

治經水將來腹中陣痛乃氣血俱實也
當歸川芎白芍藥生乾地黃黃連香附

子桃仁紅花蓬朮玄胡索牡丹皮
各七分右剉作一貼水煎服

清經四物湯

治經水不及期而來乃血虛有熱當歸
一錢半生乾地黃條芩香附子各一錢

白芍藥黃連薑汁炒各八分川芎阿膠珠黃栢知
母各五分艾葉甘草各三分右剉作一貼煎服

通經四物湯治經水過期不行乃血虛有寒當歸一

各一錢木通八分川芎肉桂甘草各五分紅花
三分桃仁二十箇右剉作一貼空心水煎服

煮附丸治經候不調臍腹疼痛面色萎黃飲食減少

為末醋糊和丸梧子大米飲下五七十九丸
名香附丸又名醋附丸治婢妾氣鬱經多不調

墨附丸治婦人經水不調久無子四製香附子一

爛捏作餅子於新瓦上焙乾入白茯苓當歸人參
川芎熟地黃京墨火煨紅醋淬各一兩木香五錢

右為末醋糊和丸梧子大
溫酒吞下七八十丸

四製香附丸治月候不調能調和經脉香附米一

炒主降痰○一用米醋浸煮畧炒主補血○一用
山梔仁四兩同炒去梔主散鬱○一用童便洗過

不炒主降火。右為末，入五、七、十、當歸各二兩，同為末，酒麴糊和丸。梧子大，每服五、七、十丸，隨證作湯使。

吞下。鹽水各浸七日，入門香附末一升，分四包，用酒醋童便。

七製香附丸

治月候不調，結成癥瘕，或骨蒸發熱，香附末一升，分四包，同當歸二

兩，酒浸。艾葉各一包，同蓬朮二兩，童便浸。烏藥二兩，同牡

丹皮、艾葉各一包，同川芎、玄胡、索各一兩，紅花、烏梅各

同三稜、柴胡各一兩，醋浸。五、七、三、秋、七、冬、十、日、晒

乾，只取香附為末，以浸藥水打糊和丸。梧子大，臨

血閉

今月事不來者，胞脉閉也。胞脉者，屬心而終於胞中。

小腸移熱於大腸，為伏癥，為沉，註曰：血滯不利，則

有不得隱曲，女子不月，蓋衝任為經絡之海，與手

下若憂思傷心則不能生血脾者心之子脾失所
養則食少絕生化之源經閉不調矣須知心為氣
血之主脾胃為氣血之本也。經閉不行有三
一者胃弱脾形瘦為氣血衰津液不生而致經水斷絕
名曰血枯經絕此中焦胃熱結也。二者心包脉
洪數時見躁作大小便不利而經水閉絕。血海
乾枯此下焦胞脉熱結也。三者或因勞心火
上行月事不來者胞脉閉也。此上焦心肝肺熱結
也。婦人。世有室女童男積想在心思慮過度致
勞損男子則神色先散女子則月水先閉蓋憂愁
心思慮則傷心而血逆竭故脾虛則金虧故發嗽矣
娘心病不能養脾故不嗜食脾虛則金虧故發嗽矣

通血治法

胞脉閉月事不來先服降心火之劑宜三和
湯王燭散次服五補元虧後以衛生湯補

脾養血。二陽之病月事不來先瀉心火自下
亦用上藥。二陽之病月事不來先瀉心火自下

則心氣下通而月事來宜通經湯。心丹。先賢治血
閉之法皆主於補血瀉火補血者四物湯瀉火者

補中益氣湯即王燭散也。生地黃。胃弱血枯經斷宜。

產後失血多經閉者導痰湯十全大補湯。方。黃連。不。

可服。地黃。氣血。盛。實。經。血。過。閉。者。宜。萬。痛。九。血。極。膏。

湯。導。血。海。疼。痛。宜。烏。藥。湯。疎。血。閉。通。用。增。味。四。

通宜歸脾湯。加。規。肝。脾。鬱。怒。

三和湯。治。熱。結。血。閉。生。乾。地。黃。白。芍。藥。川。芎。當。歸。右。

物。湯。調。胃。承。氣。湯。涼。膈。散。此。方。乃。集。四。

玉燭散。治。月。候。凝。滯。不。通。漸。成。癥。瘕。當。歸。白。芍。藥。川。

貼水煎服。大便。

衛生湯。補。脾。養。血。黃。芪。二。錢。當。歸。白。芍。藥。甘。

通經湯

治月閉當歸川芎白芍藥生乾地黃大黃官桂厚朴枳殼枳實黃芩蘇木紅花各七分右

剉作一貼入烏梅一箇薑三片棗二枚水煎服之

○心氣不得下通故月事不來宜用黃連厚朴之類導痰降火則月事來矣

栢子仁丸

治勞心月閉澤蘭二兩栢子仁炒另研牛膝酒焙卷栢各一兩右為末蜜丸梧子大

空七十九粒下

澤蘭湯

治同上澤蘭葉二錢當歸白芍藥炒甘草各一錢右剉作一貼水煎服

萬痛丸

治月經瘀閉臍腹疼痛乾漆碎炒令炆盡牛膝酒浸一宿焙乾各一兩右為末入生地黃

汁二升盛銀器內慢火熬成膏丸如梧子大每服二三十九粒空心米飲下

血極膏

治月閉不通大黃為末醋熬成膏丸如雞頭子乾燐每下一丸熟酒和開臨卧溫服大

利一頭一名單大黃膏臍○一是一方治月閉不通服補藥

無效危篤者大黃酒蒸九炒晒四兩血竭沒藥各五錢右末水丸以四物湯煎水服下七八十丸

烏藥湯

治婦人血海疼痛香附子二錢烏藥一錢半當歸一錢

導經丸

治經閉不通腰腹痛大黃二兩當歸二錢半白芍藥官桂桃仁甘草各一兩血竭二錢半

紅花一錢斑貓糯米同炒二十箇右末蜜丸梧子大酒下三十丸

瑞金散

治月經不行血氣撮痛薑黃一錢半牡丹皮蓬朮紅花當歸赤芍藥川芎玄胡索官桂各

七分右剉作一貼水一盞酒半盞煎服

六合湯

治月經不行結塊疼痛四物湯加蓬朮官桂各等分剉煎服

加味歸脾湯

治肝脾怒鬱一月經不通即歸脾湯加柴胡山梔仁各一錢右剉水煎服

室女月經不行

女子十歲衝任脉盛而血自下若過期不通則宜紅花當歸散血極膏上方見

三神丸牡丹皮湯通經九或四物湯焙三蓬朮桃仁牡丹皮玄胡索紅花酒焙

紅花當歸散治室女月經不通或積瘀血腰腹痛

當歸尾牛膝蘇木甘草各五錢白芷桂心紅花各三錢半右為末酒調二錢服紅花酒下尤佳

三神丸治室女經候不調腹痛橘紅二兩玄胡索醋製當歸酒炒各一兩右為末酒糊和丸梧子

大艾醋湯下百丸

牡丹皮湯治室女經閉咳嗽發熱當歸牡丹皮各一錢半白芍藥生乾地黃陳皮白朮香附子

各一錢川芎柴胡黃芩各七分甘草四分右剉作一貼水煎服之

通經丸治室女月候不通或成血瘀桂心青皮大黃乾薑川椒蓬朮乾漆炒當歸桃仁紅花各五錢

右為細末先取二兩醋和醋湯下五七十九餘末和勻作丸梧子大

血結成瘕衝脉任脉皆起於胞中為血之海血澁不行則成瘕作痛

為瘕聚難。月事不行血結成瘕宜歸朮破瘕湯增味四物湯四物調經湯立效散地黃通經元無

極丸桃
仁煎

歸朮破癥湯

治月經不通腹中有積塊疼痛香附子
醋炒一錢半三稜蓬朮並醋煮赤芍藥

白芍藥當歸尾青皮各一錢烏藥七分紅花蘇木
官桂各五分右剉作一貼入酒少許水煎服

增味四物湯

治血癥疼痛四物湯料八錢右剉煎服
醋炒乾漆炒官桂各一錢

四物調經湯

治經閉有積塊動痛香附醋炒一錢當
歸川芎白芍藥酒炒柴胡黃芩枳殼各

七分熟地黃陳皮白朮三稜蓬朮並醋炒白芷苗
香鹽水炒玄胡索各五分青皮縮砂紅花甘草各

三分右剉作一貼入生薑
三片葱白三莖水煎服

立效散

治經年積血腹中常痛青皮陳皮烏藥乾薑
香附子蓬朮三稜各等分右剉醋煮焙乾為

末空心陳皮煎
湯調下二錢

地黃通經丸

治血癥瘕如盃在臍下作痛熟地黃二兩
蜜蟲炒水蛭糯米同炒去米桃仁各五

十箇右為末蜜丸梧子大
空心溫酒下七八十丸

無極丸

治經閉有血塊苦痛錦紋大黃四兩一兩酒
煮一兩醋煮一兩童便煮一兩鹽水煮各七
次右合一處又七蒸七晒為末用當歸熟地黃各
一兩半濃煎汁煮糊和丸梧子大紅花湯下三十

九

千金桃仁煎

治血瘀血積經候不通桃仁大黃朴硝
各二兩蜜蟲五錢右為末好醋二升半
銀石器中慢火煎取一升半下桃仁大黃蜜蟲攪
千下次下朴硝更熟攪良久出之丸如梧子大前

一日不吃晚飯五更初溫酒吞下五丸
取下惡物未下再服見鮮血即止藥娘

血枯

黃帝曰有病胃脇支滿者妨於食病至則先聞腥
臊臭出清液先唾血四肢清目眩時前後血病
名為何何以得之歧伯曰病名血枯此得之年少
時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰
少不來也治之以烏賊丸納○治血
枯宜烏賊骨丸八物湯方親○

烏賊骨丸
烏賊魚骨
藺茹各等分
右爲末
雀卵不拘
數和丸小豆大
每十丸煎鮑魚湯吞下
日

烏賊魚骨藺茹各等分右爲末雀卵不招
數和丸小豆大每十丸煎鮑魚湯吞下日

三服壓以善饍
四物湯鱉血
門加桃仁○紅
花枯經閉

以善饈
加
桃
仁
紅
花
心
閉

血崩血漏

內經曰陰虛陽搏謂之崩註曰陰脈太甚則

也胞絡○絕胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數溲血

胞絡絕則陽氣內動發則心下崩數澁血
蓋悲哀則心系急肺布葉舉而上焦不通

則榮衛下不崩散數熱氣血在中故胞絡絕而陽氣內鼓動發

散熱氣血在中故下胞崩絡絕而陽氣內鼓動血

也。非時血下淋瀝不止，謂之漏。有三部一然者，暴下。

然非時血崩下淋瀝不止謂之漏下三忽一者脾

胃虛損下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不止其色紫黑如夏月腐肉之臭中有白帶脉沉細

下陷於腎與相火相合濕熱下迫經漏不
紫黑如夏月腐肉之臭中有白帶脉沉細

疾數或沉弦洪大其熱明矣或腰痛或臍下痛宜
大補脾胃而升舉血氣○二者或故貴奪勢或先

胃沉而弦升舉血氣。明二矣。或腰
痛。或臍下痛。官

富後貧心氣不足其火大熾心旺於血脈之中又飲食失節其容顏似不病者此心病者不行於診其

心氣不足其火大熾心旺於血脈之中不
其容顏不似不病者此心病者不行於診其

經水不時而下或適以來適斷或暴下不止當先說惡死之言令心不動以大補氣血之藥舉養脾胃

時而心不動以來大補氣血之藥舉養脾胃

○微加鎮墜心火之藥補陰瀉陽經自止矣
○三者悲哀太甚則胞絡絕云云見上壅

崩漏治法

血崩乃經血錯亂淖溢妄行遽止則便有積

脂末徭散獨一錢溫酒調下其性能行血止血然後

再用五積散散一錢加防風荊芥入醋煎服一二貼後

再服五靈脂散去故生新如更不止乃用五灰十

灰丸散五靈脂散○悲哀太甚而崩漏宜備金散四製

香附丸散方見○經行犯房損傷衝任經血暴下宜

溫經湯方見○濕熱下迫而為崩漏其色紫黑腐

臭宜解毒四物湯涼血地黃湯固經丸○憂鬱及

先富後貧而為崩漏宜開鬱四物湯○胃氣下陷

經水暴下宜升陽湯調經湯益胃升陽湯方觀升陽

除濕湯柴胡調經湯入肚○血崩急則治其標白

芷湯調百草霜末服甚者棕櫚灰或狗頭骨灰或

五靈脂半生半炒末俱以酒調服後用四物湯加

芩連參芪香附乾薑調理○婦人四十以上悲

哀太甚血走而崩慎不可燥熱之藥先用黃連解

毒湯黥隤後以三和湯坊見調治○室女思男

以致血崩成勞十分難治宜四物湯加柴胡黃芩

或加味道遙散有方見人。凡崩漏有寒伏龍肝散丁香膠艾湯有熱涼血地黃湯解毒四物湯通

用當歸芍藥湯奇效四物湯煮附丸。上方見四物湯加荊芥條芩止血神效。黑藥能止血。宜五

灰散十灰丸。鱗如聖散立效散。崩漏過多昏暈宜生地芩連湯。附子。全生活血湯。過

備金散。二錢。血崩不止。香附子。炒黑。四兩。當歸尾。一兩。空。心。服。一。名。備金散。入。網。一。名。

解毒四物湯。生乾地黃。當歸。白芍。藥。川。芎。各。一。錢。右

剉作一貼。水煎服。此方乃黃連解毒湯與四物湯合劑也。乃

涼血地黃湯。治血崩。是腎水陰虛。不能鎮守。色絡相

生地黃。當歸。各五分。知母。黃柏。荊芥。細辛。蔓荊子。黃芩。川芎。藁本。黃連。升麻。甘草。各三分。紅花。一分。

右剉作一貼。水煎服。之。水煎服。之。

水煎服。之。

固經丸

治經水過多黃芩白朮龜板各一兩椿根白皮七錢黃柏炒三錢香附子童便浸焙二錢半右為末酒糊和丸梧子

大白湯下五七十丸

開鬱四物湯

治崩漏多因心氣所使而下故貴奪勢先富後貧皆是也香附米炒當歸身白芍藥酒炒熟地黃白朮各一錢川芎黃芪蒲黃炒

地榆人參各五錢升麻三分右剉作一貼煎服

升陽調經湯

治內傷中氣下陷暴崩不止柴胡羌活蒼朮黃芪各一錢當歸防風升麻葉本

甘草各七分蔓荊子五分獨活三分右剉作一貼水煎服以飯壓之

益胃升陽湯

治血塊暴下并水泄俱作是前後二陰有形血脫竭於下也血脫益氣古聖人

之法此陽生陰長之義也

升陽除濕湯

治崩漏不止因脾胃虛弱心包乘之故血漏而下黃芪蒼朮羌活各一錢柴胡

升麻防風葉本甘草炙各七分蔓荊子五分獨活當歸各三分右剉作一貼水煎服

柴胡調經湯

治同上蒼術一錢半柴胡一錢羌活獨

五分紅花二分右剉作一貼水煎服不

方皆升舉之劑先服益胃升陽湯不止却服後二

伏龍肝散

治衝任經虛崩漏不止臍腹冷痛川芎艾

各七分當歸乾薑熟地黃肉桂甘草各五分右坐

丁香膠艾湯

治崩漏不止間有如茅屋漏水或下白

二分阿膠珠七分川芎丁香各五分熟地

當歸芍藥湯

治經漏不止氣弱因倦此中氣虛弱下

半黃芪一錢陳皮熟地黃各五分炙甘草生地

奇效四物湯

治血崩神效四物湯加阿膠珠艾葉黃

如聖散

止血崩棕櫚烏梅各一兩乾薑一兩半右並燒存性為末每二錢烏梅湯酒調下空心

立效散

治血崩當歸蓮花藥白綿子紅花茅花各一兩右剉紙包鹽泥固濟火煨存性為末入麝香少許每二錢溫酒調下空心

全生活血湯

治崩漏太多昏冒不省瞑目無所養暴換氣血豈能久活今當補而升舉之助其陽則目張神不昏迷矣今立一方補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足白芍藥升麻各一錢防風羌活獨活柴胡當歸身葛根甘草各七分藥本川芎各五分生地黃熟地黃各四分蔓荊子細辛各三分紅花一分右剉作一貼水煎服

赤白帶下

脾傳之腎病名曰疝瘕小腹寬熱而痛出白帶一名曰蠱註曰出白者澁出白液也蓋白帶

白濁之類也納○任脈為病女子帶下瘕聚註曰任脈自胞上過帶脈貫於臍上故為帶下帶脉起于季肋章門欲似東帶狀今濕熱不結不散故為病也寬者結也屈也屈滯而病熱不散也○赤者

歸丸。固真丸。桂附湯。朱砂丸。帶下宜芩朮樗皮

味

蒼柏樗皮丸

治肥人白帶。是濕痰。蒼朮。黃柏。樗根。白

薑各等分。右為末。醋糊和。丸。梧子。大白。湯下。五十七。九。夏。月。去。乾。薑。代。滑。石。丸。

苦練丸

治熱入大小腸。為赤白帶下。最妙。苦練子。碎

酒浸。茴香。炒。當歸。各等分。右為末。酒糊和。丸。梧子。大。每取三五十。九。空心。溫酒下。解。

白芍藥散

治赤白帶久不止。白芍藥。二兩。乾薑。五錢。

芩柏樗皮丸

治瘦人帶下。是熱。黃芩。樗根。白皮。

分。右為末。醋糊和。丸。梧子。大白。湯下。五十七。九。丸。

補經固真湯

治白帶。脉訣曰。崩中。日久。為白帶。漏下。多時。骨木枯。言始病。血崩。久則血少。復

亡其陽故白滑之物下流不止血海將枯也乾薑
細末人參各二錢郁李仁泥柴胡甘草炙陳皮不
去白黃芩生各一錢白葵花七朶右剉除黃芩以
水二盞先煎藥至一盞七分再入黃芩煎至一盞

空
心
熟
服
以
羹
饌
壓
之
煉

白鯁元

二治衝任虛寒帶下純白鹿茸燎去毛醋蒸焙
二兩白鯁金毛狗脊各一兩右為末艾煎醋

湯打糯米糊和九梧子大
空
心
溫
酒
下
五
七
十
九
罈

補宮丸

治白帶及白淫鹿角霜白茯苓白芷白朮烏
賊魚骨白薇白芍藥牡蠣粉山藥各等分右

為末糊丸梧子大
來
飲
下
五
十
九
罈

四神丸

二治白帶香附米八兩以酒醋鹽水童便各浸
兩過三日乃出炒蒼朮四兩米泔浸牡蠣

粉炒縮砂炒檳榔根白皮蜜水炒各二兩右為末以
黃米煮飯和丸梧子大空心酒下五七十丸

清白散

治白帶當歸川芎白芍藥生地黃酒洗黃柏
鹽水炒貝母檳榔根白皮酒炒各一錢乾薑炒

黑甘草各五分右剉作一貼薑三片水煎服

酒煮當歸丸

治白帶長流不止腰以下如在冰雪中面白血肌肉消瘦此上中下三陽真

氣俱虛也當歸一兩良薑附子炮各七錢苗香五錢右剉以好酒一盞半同煮至酒盡焙乾乃入炒

黃鹽全蠋各三錢柴胡二錢炙甘草川練子丁香木香升麻各一錢玄胡索四錢右同為細末酒麵

糊和丸梧子大空心淡醋湯下五七十丸

固真丸

治白帶久不止臍腹冷痛乾薑四兩龍骨當歸各二兩柴胡白石脂各一兩黃栢白芍藥

各五錢右為末麪糊和丸梧子大白湯下二三十丸以飯壓下

桂附湯

治白帶腥臭多悲不樂大寒之證附子炮三錢肉桂一錢黃栢知母各五分右剉作一貼

水煎服

芩朮樗皮丸

治孕婦白帶黃芩白朮各三錢樗根白皮白芍藥山茱萸各二錢半白芷黃連

各二錢黃栢一錢右為末酒糊和九梧子大
白湯下五十丸孕婦帶下專是濕熱也門入大

琥珀朱砂丸 治室女經水止而即患帶下驚悸或感風冷
歸後藥各四錢乳香一錢麝香朱砂各二分
半右為末水丸芡實大每丸一丸溫酒磨服

吐下療白帶 戴一婦人曰此帶濁水如本熱垂大陽經其寒
水乃以瓜蒂散散滯也夫水自高趨下宜先絕其上
源

水十餘行三遍汗出周身至明朝病人云汚已
大下矣次用寒涼之藥服及半載生一男
一方名曰白芷丸治帶下腸有敗膿淋露不已腥穢

以此排膿單葉紅蜀葵根二兩白芷一兩白芍藥
白礬枯各五錢右為末蠟丸梧子大空心米飲下
十五丸

如無葵根以蘇木節代之藥補之

五色帶下 五崩何等類師曰白崩者形如涕赤崩者形
如絳黃崩者形如爛瓜青崩者形如藍色黑

崩者形如血也。赤如紅，津傷肺則白，如鼻涼傷脾則

黃如爛瓜，傷腎則黑如血。下是皆血之為病也。應

五色帶下，宜胃風湯。方見溫清飲。地榆散香附散

溫清飲 治崩漏不止，一名解毒四物湯。方見

地榆散 治漏下五色，黃瘦虛竭，地榆三兩，到

香附散 治五色崩漏，香附子去毛，搗碎，醋煮半日

寒入血室 客月經不通，連臍寒疝，痛其作，痛宜桂枝桃仁

湯

桂枝桃仁湯 桂枝赤芍藥生乾地黃酒洗各二錢，甘

生薑三片，棗二枚，水煎服。○瑞筆散亦良。方見

熱入血室則婦人傷寒發熱經水適來適斷晝日明了夜

破瘀湯或調經湯

柴胡破瘀湯治熱入血室及蓄血證柴胡二錢黃芩

五靈脂甘草各五分右坐作一貼水煎服

調經湯治熱入血室柴胡半生地黃各一錢半赤芍藥

分右坐作一貼入薑三片棗二枚水煎服

經斷復行過婦人四十九歲已後天癸當住每月却行或

藥物湯

芩心丸治婦人天癸過後復行或漏下不止條芩七

次為末醋糊和九梧子大每七

子苓丸

治同上條黃芩四兩剉醋浸透紙裹煨七次
當歸酒洗香附米醋炒各二兩右為末醋糊

和丸梧子大空心
酒下五七十丸

當歸散

治婦人天癸已過期經脉不勻或三四月不
行或一月再至腰腹疼痛內經云七損八益

謂女子七數盡而經不依時者血有餘也不可止
之但令得依時不腰痛為善當歸川芎白芍藥炒

條黃芩炒各一兩白朮五錢右為末每服二錢
空心酒調下日二轉○良方有山茱萸一兩半

加味四物湯

治經斷後多年忽然再行遂成崩漏腹
痛寒熱四物湯四錢加入參吳茱萸各

一錢右剉作一貼入薑
三片棗二枚水煎服

單方

凡四十種

伏龍肝

即竈心土也主婦人崩中帶下為止血之聖
藥蓋燥可去濕也○治血露蚕沙阿膠各

一兩伏龍肝半兩同為
末溫酒調下二錢

百草霜

治血崩。分作兩服。以當歸酒調下。乾汁。

芒硝朴硝

並治月候不通。血閉。癥瘕。乾。

乾地黄

治胎漏下血。或煎。

益母草

治赤白帶下。花開時採。搗為末。空心酒調。二錢。日三服。乾。

蒲黃

止崩漏。及赤白帶下。炒取。

當歸

主崩漏。及月水不利。煎服。末服。並佳。乾。○血積。

黃芩

下血。閉。治淋露。下血。乾。○血崩。黃芩為末。二錢。以燒稱。銕。淬酒調。下。空心。娘。

芍藥

治血閉。不通。煎服。末服。並佳。乾。

白芷

治崩漏。及赤白帶下。煎服。末服。皆佳。乾。○赤白。

為末。空心酒。下。二錢。娘。

酸漿草

治赤白帶下陰乾爲末空心酒下二錢

地榆

主帶下十二病一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏堅六曰子門僻七曰

合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏不定又治崩

漏不止煎服末服並佳乾○赤白帶骨立者地榆一升剉水熬成膏空心服二合日二服

芎藭

治崩漏煎服末服並佳乾○治血崩取一兩剉酒五盞煎至一盞去滓下生地黄汁一盞再煎

二三服

艾葉

主崩漏及帶下煎服之○血崩熟艾雞子大阿膠珠五錢乾薑炮黑一錢同煎服

大薊小薊

並主崩漏及赤白帶擣取汁服乾○血崩取根五兩茅根三兩酒煮服

牡丹皮

主月經不通煎服末服並佳

三稜

通月經破血瘀煎服末服並佳

玄胡索主月經不調崩中淋露

大黃主血閉脹及諸老血留結

桑木耳主月水不調崩中帶下月閉血凝酒煎服

蕎麥麵治赤白帶下不拘多少以雞子清和

樗根白皮治崩漏及赤白帶取白根切一大握水

橡實殼主崩中帶下燒灰和米飲服○取殼與蒼耳

棕櫚皮治崩漏帶下燒灰與白礬枯為末酒服二

牡蠣治崩漏及赤白帶下取粉醋調作丸再煨研細

鱉甲治漏下五色羸瘦灸黃為末酒下

蚕退紙主崩漏帶下燒為

烏賊魚骨

治血枯又通月經療血崩血漏為末九服或末服皆佳

鰻鱺魚

療婦人帶下百病作羹食或燒食皆佳

牡鼠屎

治室女月水不通燒灰為末酒下一錢神效勿令知

蜚蠊蟲

主室女月水不通逐瘀血散積血破血閉去翹足炒為末醋湯調下或九服之

水蛭

再治同上破血最良須切斷同石灰再炒為末或末服或九服

五靈脂

半行經血有功治血崩不止及赤白帶下生半炒為末酒下一錢或九服之

荊芥穗

治崩漏不止燒存性為末每二錢童尿調下

蜀葵花

赤花治赤帶白花治白帶為末溫酒下二錢單葉紅蜀葵根治帶下排膿血極驗

水芹

療崩漏帶下作壅莖或煮或生食並佳

鹿角膠

主崩漏赤白帶下炒為末酒下二錢或九服或煮服良

鹿茸

治崩漏赤白帶下。鹿角燒灰服亦佳。一錢。

雀肉

治血崩帶下。或燒食。或煎食之。乾。

牛角鰓

止血崩。下二錢。或赤白帶下。燒灰。酒下。二錢。或赤白帶下。燒灰。酒下。二錢。

黃狗頭骨

主崩漏。及赤白帶下。燒為末。酒下。十二錢。或作丸服之。○陰莖及陰卵主帶下。十二錢。或

燒作末。酒服。一錢。或丸服之。○

鍼灸法

月經不調。取陰獨中。極三。陰交。腎俞。合谷。四滿。三里。月經斷絕。取中。極三。陰交。腎俞。合谷。四滿。三里。

崩漏不止。取血海。陰谷。三陰交。行間。大衝。中。極。○赤白帶。取中。極。腎俞。氣海。三陰交。行間。大衝。中。極。○

問。○赤白帶。帶。我。我。即。去。俄。而。即。差。續。○此。此。穴。鬼。附。身。云。灸。着。我。我。即。去。俄。而。即。差。續。○此。此。穴。

花穴。治帶。下。如。神。○赤帶。取中。極。氣海。委中。○白帶。取曲。骨。承。陰。中。極。○經斷。久。忽。大。崩。下。取。

豐隆。石門。天樞。中脘。氣海。○

蟲

三尸蟲

中黃經曰一者上虫居腹胃名曰彭琚彭實彭矯也惡人

進道喜人退志上田乃元神所居之宮惟人不能

開此關被尸虫居之故生死輪迴無有了期若能

握元神棲于本宮則尸虫自滅真息自定所謂一

去三尸蟲元

漆生地黃三斗東向竈葦火煎一尺納黃丹

三兩復移一尺內瓜子汁三升復移一尺納大黃

末三兩微火煎勿令焦丸如梧子大空心下一丸

又方

生漆二升蕪菁子三升為末大黃六兩為末酒

心下五十九日身光澤血下鼻中三十日虫皆

爛下五十九日身光澤血下鼻中三十日虫皆

九蟲

成諸蟲皆因飲食不節或過食腥膻生冷以致積久

為諸般奇怪之長蟲其形其名有九○一曰伏蟲長四寸許

亦能殺三人曰白蟲長一寸母子相生其形轉大而長

悶五曰肺蟲其狀如蚕令人咳嗽六曰胃蟲狀如

椒等物七曰弱蟲又名腸蟲狀如瓜瓣令人多唾

八曰赤蟲狀如生肉令人腸鳴九曰蟻蟲狀如菜

貫衆丸

去三尸九雷丸一兩半殺赤蟲貫衆一兩

各一兩白藟蘆殺尸蟲乾漆殺白蟲厚朴殺肺

至水下一五九三服後漸加至十丸

五臟蟲

腎蟲如方截絲縷肝蟲如爛杏肺蟲如蚕皆能

殺人惟肺虫為急肺虫居肺葉內蝕肺系故成癆疾咯血聲嘶藥所不到為難治也針○宜服獺爪散助

濕熱生虫

濕熱鬱積則生虫俗驗禾苗雨洒日照禾節生

虫此說明矣人患虫積者或飢餓失攝或腥膾白酒或炙食牛羊或啖鳧鰾中皖氣弱濕熱少運故

生寸白虫蠅諸虫形如蚯蚓又相似團魚曰血鱉小兒最多

脉法

關上脉微浮積熱在胃中嘔吐虫而滑者寸白虫

諸虫脉沉實者生虛大者死○尺脉沉而滑者為寸白虫

甚也○勞瘵脉數或瀉細如潮汗咳血肉脫者蛆○蠅蝕陰肛脉虛小者生勁急者死

蟲外候

熱則虫動虫動以下三四寸熱者腸中有虫○胃中有

聚○凡虫痛之證腹中有塊起以手按之不見鍾聚往來痛無休止五更心嘈牙關強硬嘔吐涎沫

或吐清水夢中啗齒面色青黃飲食雖多不生肌
膚○九虫證眼眶鼻下青黑面色萎黃臉上
幾條血絲如蟹爪分明○面上白斑唇紅能食心
嘈顏色不常臉上有蟹爪路者便有虫也○虫
痛之證時作時止痛則交口吐清水人中鼻唇
一時青黑者是也○腹痛肚大青筋者虫痛也
也○小兒腹痛口中出清水者虫痛
也○三虫之證皆口流涎也○

諸物變蟲

山澗中蛇虺水蛭遺精誤飲其水或果菰蔬
菜虫聚其下人誤食之則心腹刺痛時作時

止諸藥不效宜雄砂丸○夜間飲水誤吞水蛭
而入腹能食人肝血腹痛不可忍面目黃瘦全不
進食不治則死取田中乾泥一小塊小死魚三四
箇去殼巴豆十粒同研爛將猪脂熔化和丸菰豆
大以田中冷水吞下十九須臾大小蛭皆瀉出却
以四物湯魴鯢加黃芪煎服調補○李道念有
疾諸澄診之曰非冷非熱當是食白淪雞子過多
所致取蒜一升煮食之吐一物大如升涎累之開
看則是雞雛羽翅爪足皆具既而病差韡○一
患腰痛牽心每至輒氣欲絕徐文伯視之曰此

癢也以油投之即吐物如髮稍引之長三尺頭已
成蛇能動掛門下滴盡惟一髮而已。一道入心
腹煩滿彌二歲甄立言診曰腹有蟲誤食髮而然
令餌雄黃一劑少頃吐一蛇無目燒之有髮氣乃
愈。○春秋二時蛟龍帶精入芹菜中人偶食之
得病發則似癰手足青腹滿痛不可忍取寒食餚
差。○誤飲蛇交水成癰腹滿痛雄黃服之。○
通防見萬應丸

雄砂丸

善殺諸虫貫衆酸石榴皮各五錢鶴虱蕪荑
乾漆白殭蚕各三錢朱砂雄黃雷丸甘遂各

一錢半右為末米粉煮糊和丸麻子大每
十九五更時粥飲下加麝香少許尤佳

萬應丸

善下諸虫大黃八兩檳榔五兩黑牽牛頭末
四兩並為末以皂角十錢苦楝皮一升同

煎汁熬膏和虎骨香末大先用沉香末為衣次用雷
丸末為衣又用木香末為衣五更時以砂糖水吞

下三
九門

蛔厥吐蟲心蟲為靜而復煩更復止得食而嘔又煩吐

時煩此為藏寒蛔上入膈故煩須更復止得食而嘔又煩此者蛔聞食臭出其入當自吐蛔烏梅丸主

之。病入有寒復發汗胃中冷必吐蛔先用理中湯。方。入烏梅三箇煎服次服烏梅丸。○蛔厥

者胃寒肝生經曰蛔者長也胃中冷則吐蛔不可用冷藥。宜理中湯加炒川椒檳榔煎水吞下烏

梅丸。最效。○經云。蟲貫心。則殺人。欲驗之。心腹大痛。不可忍。或吐青汁。黃綠水。出涎沫。或吐蟲。出

發有休止。宜蕪荑散。化。○蛔厥心痛。宜安蟲散。化。○小兒蟲痛。欲絕。宜靈礬散。○蛔厥心痛。宜安蟲散。化。○小兒蟲痛。欲絕。

取積散。蟲不療。則子母相生。無有治。○止。○小兒口鼻中出黑色。蟲不治。○

烏梅丸治川椒細辛腹痛烏梅十五箇黃連七錢半當歸

右為末。醋浸烏梅。取肉。和藥。末。搗。極。令。勻。丸。如。梧。子。米。飲。下。一。二。十。九。丸。

蕪荑散治一錢右為末溫水調二錢服小兒乾漆炒烟盡

化蟲丸

治蛔厥心腹痛胡粉炒白礬半生半枯檀榔

梧子大大人二十丸小兒五丸以淡米飲入香油

化蟲散

治蛔厥心腹痛口流涎雷丸二箇檀榔二箇

字分作兩服當晚取猪肉一兩切片以皂角汁浸

至午間虫自下

靈礬散

治小兒蛔厥心痛五靈脂二錢枯白礬五

安蟲散

治虫痛右末每錢以化虫丸材為

追蟲取積散

治牛虫積熱黃雷丸錫灰使君子檳榔黑

為末蜜丸麻子大茶清下二三服或

溫胃安蟲

一文患惡心吐虫累治不差每用殺虫藥

藥也乃藏寒而虫不安因吐而復用殺虫藥虫為

各一兩為末米糊和九麻子大米

酒蟲心痛楊仲臣病心痛此人常好飲酒初飲二三

能復席飲至前量一醉必五七次至明嘔青黃水

數日後變魚腥臭六七日止安戴人曰酒虫也宜

寸白虫寸白虫色白形扁居腸胃中時或自

碧金散治寸白虫苦練根一兩鶴虱檳榔使君子肉

小兒半錢空心以

一方療寸白虫錫灰蕪荑檳榔為末每二錢空心取

漫服此藥翌日下寸白一累中長虫

又方

下寸白虫當晚勿食飯五更空心時取東引石

肉一塊細嚼汁去肉却取藥頓服午間虫盡下

應聲虫

昔人每言語時喉中有物作聲相應名曰應聲虫

丸則無聲遂服數枚而愈○腹中有物作聲隨人言語名曰應聲虫用板藍汁一盞分三次服之

即愈

狐惑虫

見傷寒門

消渴有虫

見消渴門

痔瘻有虫

見陰後門

諸瘡有虫

見諸門

齒痛有虫

見齒門

勞瘵蟲

傳勞瘵尸亦名傳尸病人死後復易家親一人相似故曰

至滅門是也傳服食傳之異死後又注易傍人乃

有足無頭或似蝦蟆或似刺蟬或似鼠形或如爛額或

狀如○形狀實難辨之多有少年時血氣未定人酒色傷

損其熱毒鬱積生異物惡虫蝕人藏府精血變生

諸般奇怪之物其侍奉之人熏陶日久受其惡氣

多遭傳染是以氣虛腹餒最不可入勞瘵之門

驗瘵法

之勞瘵傳尸皆有虫先燒安息香令烟出病尸也吸

宜服太乙明月丹防見○又法用乳香燒熏病人

長寸許白而黃者可治紅者稍難青黑者死

勞瘵病證

輕者有六證潮熱盜汗咯血痰嗽遺精泄瀉也





則為潮熱咯血火動於下則為遺精泄瀉名曰肺痿
病初得半卧半起號為殭殭氣急痰嗽名曰肺痿
骨髓中熱稱為骨蒸內傳五藏名為復連因虛損
而得名為勞極男子自腎傳心心傳肺肺傳肝肝
傳脾脾傳心心傳肺肺傳脾脾傳腎腎傳肝肝
則死脾女人自心傳肺肺傳肝肝傳脾脾傳腎腎
精白濁髮乾而聾或腹中有塊或腦後兩邊有小
結核心胃滿悶肩背疼痛兩目不明四肢無力膝
股痠疼多卧不起狀如佯病每至平旦精神尚好
日午向後四肢微熱面無顏色喜見人過常懷忿
怒行立脚弱睡卧不安夢見先亡或多驚悸有時
咳嗽痰涎稠粘或咯膿血如肺痿狀或時下痢羸
瘁困乏口燥鼻乾臉紅唇赤雖思飲食不能多食
死在須臾精神尚好猶若酒魚不覺死矣○勞
瘵主陰虛蓋自子至巳屬陽自午至亥屬陰陰虛
則熱在午後子前寤屬陽寐屬陰陰虛則汗從寐
時盜出也升屬陽降屬陰陰虛
則痰涎上逆而連綿吐出也○

瘵不治證

瘵身瘦屬火因火燒爍也肉脫盡者難治○
瘵疾至於骨痛骨痿聲沉聲啞色枯面鰲斷○

不可治。○勞瘵咽瘡失音者死。虛勞泄不止者亦死。入

殺諸蟲服藥法

道藏經中載諸重頭上皆下行藥多取

下月
半腦
月以
虫前
頭蓋
向爲
下此
難也
治_{目綱}
先○
以_上
肉半
汁月
及虫
糖頭
蜜向
食_上
下易
引_下

物求不得與病人知之
 虫頭向上然後用藥打
 出
 效得
 三尸
 九虫
 種異
 種靈異

蓋此虫性已通靈務人在精審勿令有悟可也

凡服取虫藥前一日勿食晚飯明早極飽
時先嚼燒肥肉一片嚥汁後乃服藥用紙包
藥則虫更

治諸蟲藥

下凡驗取虫作藥之禁聲勿謂造作藥則立作
○諸虫在人腹中子母相生漸至滋

散盛
上方堂
見破
妙積
應殺
九虫
七宜
轉木
靈香
應三
丹稜
萬散
應下
九虫
上方散
見追
遇虫
仙耳
丹積

追殺其虫以絕其根虫九萬病解毒升觥五補其虛以復其真仙丸〇治療之治元

若病勢已劇元氣已脫雖依法取重亦無一主陰虛痰與血病

四物湯血方觀加炒黃柏竹瀝童便薑汁心丹○勞瘵傳尸寒熱交攻久嗽咯血日漸羸瘦先服三物湯

乙癸明次與蓮心散萬不失一○勞瘵殺虫宜太

勞瘵補虛宜瓊玉膏紫河車九疑神飲子門入○古

或入山林或居靜室清心靜坐叩齒焚香節食斷

效門入○勞瘵傳尸之疾熏治之藥非一而鮮有驗者惟取末後死者焚之可以無傳矣○

木香三稜散治腹中有虫面色萎黃黑牽牛子半生

柳雷丸錫灰醋炒三稜煨蓬朮煨木香各二錢右

下蟲散治腹內諸虫使君子肉攢柳各一錢大

妙應丸治虫積攢柳一兩二錢黑牽牛頭末三錢大

末用葱白煎湯露一宿和丸粟米大每四錢五更葱湯吞下取寸白虫以石榴根皮煎湯下小兒服

一錢或五分天明取下虫物此藥不動真氣有虫
即下虫有積即下積有氣即消了一服見效門入

七轉靈應丹

治諸般虫積即妙應丸除使

遇仙丹

治虫積黑牽牛子半生半炒取頭末四兩三
稜蓬术茵陳檳榔俱生用各五錢右為末每

藥末四兩白麩一兩皂角五錢浸揉汁煮糊和丸
梧子大每三錢五更茶清送下病淺者一服見效

病深者再服必候惡物下盡為度所下之虫曰穿
心虫曰血蠶虫曰傳尸虫曰肺虫曰疾心虫曰馬

尾虫曰積血虫曰細虫長虫寸白虫其狀不一或
作五色或如魚凍此乃王經略赴廣東得沾山嵐

瘴氣肚腹脹滿百藥無效偶得一道人付此藥
服之下虫一條狀如蛇長三寸餘病乃愈

追蟲丸

下虫積黑牽牛子頭末一兩大黃三錢使君
子肉二錢木香檳榔蕪荑錫灰各一錢二分

右為末先將皂角與苦練根皮濃煎二大碗熬成
膏和丸梧子大將沉香末為衣又以雷丸末為衣

每五十丸空心砂糖
水下下虫乃愈

五仙丸

治諸虫如神大黃四兩皂角雷丸苦練根各一兩木香二錢右為末酒糊和丸梧子大茶

清下三四十九丸

蓮心散

治勞瘵當歸黃芪甘草驚甲醋灸前胡柴胡獨活羌活防風防已茯苓半夏黃芩陳皮阿膠

川芎枳殼各五分荒花醋炒黑節杏仁撮右剉作一貼薑三片棗二枚水煎服須待吐有異物荒花漸減少蓋荒花反甘草所以殺虫炒之所以斷熱去

寒妙在此處心冊

太乙明月丹

治傳尸勞瘵免尿二兩天靈蓋酥炙驚甲酥炙各一兩雄黃木香各五錢輕粉

二錢半右為末以好酒一升大黃末半兩熬膏和丸彈子大朱砂為衣五更初童便和酒化一丸服

勿令人知必吐虫物未效次日再服

紫金錠子

治傳尸勞瘵。一女子久患勞瘵為尸虫所嚙磨一錢服之一時吐下小虫十餘條後

服蘇合香元半月如常此藥廣施瘵病無不驗方

○一家兄弟五入並患傳尸勞已死者三人有狀一教令服紫金鉞還各服一鉞一人下惡物如膿

天靈蓋散

下瘵虫天靈蓋兩指大以檀香湯洗過二

錢朱砂一錢右為末每服三錢別以薤白葱白各

十四莖青蒿二握甘草桃枝柳枝梅枝俱東引者

磁器內文武火煎至一升分作三服每取一服調

前藥末五更初服男患女煎女患男煎服藥後如

欲吐用白梅含之五更末須下勞虫或惡物黃水

黑糞如未下又進一服三天明更進一服白粥補之

用龍骨黃連等分為末三錢白水調服白粥補之

五枝散

取取下傳尸勞虫桃枝李枝梅枝桑枝石榴枝



苦練根七寸生藍青七葉葱白連根洗七箇切右

以童尿二升半煎取其半去滓入安息香蘇合香

阿魏各一錢煎至一盞濾清入朱砂雄黃雷九枯

白礬硫黃各半錢為末檳榔末一錢麝香二分半

調和分作二服月初旬五更空心一大虫急用鐵鉗

朝再服或吐或下虫物惡積如出大虫急用鐵鉗

取烈火焚之收入磁瓶中埋深山中

病人衣服床席並皆火燒埋僻處

神授散殺傳尸瘵虫紅椒二斤去子及合口者炒出

汗右為末每服一錢二錢空米湯調下如暈

瓊玉膏

治勞瘵滋血補氣固元氣之聖藥本方云

紫河車丸

治傳尸勞瘵兩月皆可愈其餘勞怯一月

黃連大黃苦參黃柏知母貝母敗鼓皮心人

中白各二錢半草龍膽甘草各二錢犀角蓬朮芒

硝各一錢半辰砂為衣溫酒下二一兩水飛右為末蜜丸梧子大

後服

凝神飲子

治勞瘵寒熱自汗咯血瘦劇人參當歸白芍藥白茯苓神白茯苓黃芪白朮半夏麴五

味子熟地黃蓮肉麥門冬苦黃甘草各七分

辨瘵蟲形色

取府脂膏故其色白次食血故其色

色黃赤次食精髓故其色紫白色精髓盡故其色

補藥其色黃赤色可六十日服補藥十中可活一紫黑色

一云虫頭赤食人肉其病可治虫頭白色與白色乃

病難治下不可瘵也又云虫紅白色可瘵虫紫黑則已

難治肚下白色者萬不一差



諸蟲畏忌藥

止凡靜作病忌用甘草蓋虫聞甘則起聞酸則

治虫不可用甘草甜物蓋虫得甘則動於上得酸

則靜見苦則安得辛粹則頭伏於下翻○虫聞酸

類酸謂醋烏梅石榴之類苦謂熊膽猪膽黃栢苦

單方凡四十種

黃精

日久服下三尸好五味六十日下尸上好五色三十

爛日下皆

天門冬

末殺三尸服並佳

胡粉

殺三虫療尸虫尤良○治寸白虫取

石硫黃

殺腹藏虫金液丹

黑鈆灰治有積自吐者取鈆炒成灰同檀榔末先

嚼肥肉少許却以砂

白蠟塵子炒白蠟塵酒糊丸散藥中用之○雞

石菖蒲末殺腹內諸虫煎服

薏苡根作下三食之又治細虫心痛取根煮汁

苦參殺惡虫酒

蕪荑去三虫逐寸白虫能殺諸虫取二兩

艾汁殺細虫取一升空

青黛殺惡虫化為水此是以藍

藍青汁殺諸虫皆化為水飲一升良○殺瘵虫化為

降真香末各半錢麝香一分
研和月初五更空心調服搯

貫衆

殺三虫及寸白虫空心
煎服或末服之良

狼牙

殺腹内一切虫
蜜丸麻子一切虫
○殺寸白虫取為末

使君子

殺去皮空心熟水嚼下
煨去皮空心熟水嚼下
虫及蛔虫一升虫即下

篇蓄

殺三虫及蛔虫一升虫即下
濃汁空心服一升虫即下

鶴虱

殺五藏虫取為末蜜丸此為最要又主蛔蟯虫
厥心痛取為末蜜丸此為最要又主蛔蟯虫

○十九虫痛取末二錢空心復生
○大腸虫出不斷斷之復生
○溫醋調下虫當出

生地黄

治虫心痛擣取汁搜麤作餅
忌用盐當利出虫求差
○一女患心冷淘食之

絕作地黃冷淘食之便吐一
物如蝦蟆狀其病頓愈

槐木耳

治蛔虫心痛取槐上木耳燒存性為末
和水服若不止飲熱水一升虫即下

川椒

殺瘰癧及諸虫煎服九服皆佳。○治瘰癧紅椒二分苦練根一分作末九服尸虫盡從大便泄

出煎服亦良

乾漆

殺三虫及傳尸勞虫碎炒令烟盡為末蜜九梧子大温水下十五丸或為末温水調一錢服亦

治心痛

檳榔

殺三虫伏尸及寸白諸虫赤色味苦者殺虫炮為末每二錢空心以葱蜜湯調下即效。○

榧實

去三虫又治寸白虫去殼常食七枚久則其虫自下盡一升乃除根。○

苦練根

殺諸虫及蛔虫寸白二錢。○治五種虫取根白皮為末米飲下二錢。○細切濃煎汁一盞徐徐飲之或以汁煮米作粥服

之。○下寸白虫及諸虫取白皮細切一兩八黑豆

二十粒水煎臨熟入砂糖二錢調服虫即下。○

雷丸

殺三虫及蛔虫寸白虫水浸去皮切焙為末每一錢月初五更調米飲服之。○

鰻鱺魚

殺傳尸勞瘵虫又殺諸虫久病疲瘵人和五
味煮熟常食之或曝乾炙之令香常食亦良

○昔有女子病瘵家人取置棺中流之於江漁人
取視猶活多煮此魚食之病愈遂為漁人之妻

白頸蚯蚓

去三虫伏尸殺長虫
熬作末和米飲服或作汁服

金線蛙

殺尸瘵瘵虫及細虫
或燒或煮常服之

石榴東引根皮

療細虫寸白虫取皮一握
濃煎空心服諸虫盡下

櫻桃東行根

療細虫及寸白虫
濃煎空心服

桃葉

治三虫除尸瘵
取汁一升飲之

胎麻油

殺一切虫取油一合
芒硝一切虫攪勻服之

馬齒莧

殺諸虫及寸白虫生
煮熟和鹽醋空腹食之

野鴨

殺腹中一切虫消十二種
煮熟食肉飲汁良

熊膽

殺大豆許又治蛔心痛取

猫肝

殺瘵五更黑猫生取肝晒乾為末

啄木鳥

殺瘵虫啄木鳥一隻活取朱砂四兩為末精

取禽以益泥固濟火煨一夜來日不見太陽取出

不得打破埋入地中二尺許經一晝夜取出去鹽

泥銀石器內研為細末以好酒入麝香少許作一

童子尿

治勞瘵取飲之極效古入云服涼藥百無一

必以滋補藥中量入少許和服尤佳

獺肝

治傳尸勞瘵沉頓羸瘁急取獺肝一具

獺爪

瘵虫居肺葉內蝕肺系故咯血聲嘶

鍼灸法

無骨蒸傳尸勞瘵宜早灸崔氏四花穴鱗覲晚則

此所謂膏之上育之下針之不到藥之不及宜早

灸膏育肺膈四花穴為佳門○治勞瘵癸亥夜

三更六神皆聚之時解去上體衣服於腰上兩傍

微陷處謂之腰眼直身平立以筆點定然後上床

合面而卧每灼小艾炷灸七壯虫或吐或瀉下

即安名曰遇仙灸○先一日點定腰眼穴至半

夜子時交癸亥日期便灸七壯或九壯或十一壯

尤妙其虫從大便出即焚之鑿○骨蒸勞熱灸膏

育三里○勞瘵骨蒸或板齒乾燥大頰鳩尾各灸

二七壯又膏育肺膈四花大頰等穴若灸之早百

發百中○傳尸勞瘵涌泉鍼入一寸瀉十吸丹田治

治無血必危豐隆治痰針入一寸瀉十吸丹田治

氣喘鍼入三分

補二呼入肚

東醫寶鑑內景篇卷之三