

東
晉
賓
鑑

奎貴
7608
1
6

奎章閣圖書	
部別	分類記號
	圖書番號
	一部冊數
	內別番號
서 울 大 學 校	

東
路
賓
館

7608

6

中華書局印


中華書局

中華書局

中華書局

中華書局

中華書局



内景篇四

卷之四

小便 大便

東醫寶鑑內景篇卷之四

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

小便

小便原委靈樞曰水穀者常並居胃中成糟粕而俱下焦滲而俱下
計滲入膀胱焉。內經註曰水液自迴腸泌別水則滲灌入於膀胱上口而爲溲便詳此三說則其難經註曰水穀自小腸盛受於闌門以分別小便即泌別之水液滲入膀胱以出者也內經曰肺道下輸膀胱則小便又似水飲精微歸於胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺氣上逼調水道下輸膀胱則然也夫溲尿者水也水之氣者氣之本體固升其性則不能上昇則豈可謂小便獨爲氣雖化上行則能出矣水滯水成其氣藏焉氣化則能出矣且水滯水

東醫寶鑑內景篇卷之四

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉

教撰

小便

小便原委

靈樞

曰水穀者常

並居胃中

成糟粕而俱

下焦滲而俱

下濟泌別汁

循下

計焦滲而俱

入膀胱

膀胱之中

胞氣化之

而爲尿以泄出也

○別

難經註曰水穀自小腸

盛受於闌門

以分別也其

焦滲而俱

計滲而俱

入膀胱

膀胱之中

胞氣化之

而爲尿以泄出也

○別

水則

滲灌

入於膀胱

上口

而爲溲便

詳此三說則

其

小便

即泌別之水液

滲入膀胱

以出

者也

內經曰

曰水穀自小腸

盛受於闌門

以分別也

其

肺氣

通升調水

肺道下輸

膀胱

則小便

又似水飲

精微

之水

本體

固不

能上

升則

然也

飲入於胃

其精

氣雖上

升則

成其

者氣

內經曰

膀胱者津液藏焉

氣行則水

行氣滯則水

滯則水

或運化者謂小便純由別不

由

脬爲尿器

膀胱

而居膀胱之中府至於受盛津液則又有

膀胱

靈樞

曰膀胱之津液之中焉故內經曰脬移熱於膀

室

也

夫脬之居於膀胱以濡類纂曰膀胱者脬之

既盛

於脬無由自出必因乎氣化而後能漸漬浸潤於胞外積於脬下之空處遂爲尿以出於前陰

乎

夫惟積滿脬下無空處則人尿急時至廁安能即出

矣

即

辨尿色

水液

渾濁皆屬於熱○小便黃者小腹中

有盛

則尿色黃○疸證小便如黃柏汁

有五色

惟赤白色者多赤色多因酒得之白色乃

下元虛冷

○小便不禁赤者有熱白者氣虛

傳

○下焦無血小便澀數而黃

脉法

少陰脉滑實爲癰癧婦人則陰

少陰脉滑實爲癰癧婦人則陰

少陰脉滑實爲癰癧婦人則陰

少陰脉滑實爲癰癧婦人則陰

少陰脉滑實爲癰癧婦人則陰

少陰脉滑實爲癰癧婦人則陰

少陰脉滑實爲癰癧婦人則陰

二證之的。○便血則芤數則赤黃實脉瘻閉熱在膀胱。○兩尺脉洪數必便濁遺精。○淋脉盛治。○淋病者生虛細而濁者死。○瘻病脈細數何妨少陰微者氣閉膀胱不

實人見之陰中生瘻。○大

鑿

小便難外候

其鼻准色黃者知其小便必難也。○候

小便不利

陰虛則小便難。○小便澀者出不快也。○經曰陽入陰分則膀胱熱乘之。若小便黃赤者有三

則萬全木通利之。○小便數而不利者有三。若大便泄瀉而津液不能行者。○小便一也宜利而己。若熟搏氣令施化而出。○上盛下虛。○小便氣赤澁不能通調水道。○小便二也必滲瀉乃愈。若脾胃運子散飲。○上盛下虛。○小便氣赤澁不能行者。○小便三也可順胃。

如欲瀲之○腎虛小便數而瀨

萬全木通散

治膀胱有熱小便難而黃滑石二錢木通赤茯苓車前子炒瞿麥各一錢右爲

末水煎服或取末

茯苓琥珀散

治小便澀數宜瀲泄分利之澤瀉一兩滑石七錢赤茯苓白术琥珀猪苓各五錢

錢肉桂甘草灸各三錢右爲末每三錢以

平補元子酒

治小便數而瀨如欲瀲漏或遺尿不禁免絲長流甘爛水一盞調下以姜餽壓之

錢川鍊肉牛膝酒浸各三錢半乳香

茱萸酒浸焙當歸益智仁各五錢

子大棗湯或鹽湯下五十丸

子大棗湯或鹽

一方

治心經蓄熱小便赤澀梔子仁大黃煨連翹甘草各等分右剉五錢水煎服

小便不通

胞移熱於膀胱則癃尿血結○膀胱不利脉爲正散加木香主之○足厥陰之脉爲

其過陰器所生病遺尿閉癃督脈者女子入繫挺孔
陽之別也入絡膀胱約下焦實則癃閉虛則遺尿
癃○閉癃合而言之一病也分而言之有暴久之
殊蓋閉老暴病爲尿點瀉不出俗呼小便不通是
也癃者久病爲尿點瀉黑滴而出一日數十次
或百次名爲淋病是也細○熟在下焦填塞不便
其證小便閉塞而不是也粗○熟在上焦填塞不便
不適宜清肺散如渴而小便不通者熟在下焦
氣血分宜滋腎丸。○小便不通脣下狀如覆椀痛
澗難堪治法有二如氣不能化而不通則陳皮茯
苓湯調木香沉香末二錢空心服無用吐法以提
之如血污於下而不通則用桃仁承氣湯之類貽
門寒以破之○夫熱則不通冷則不禁其熱盛者
小便閉而絕無其熱微者小便難而僅有搐○小
便○小便不通乃血滯致氣不通而竅瀉宜導氣除燥湯
塈宣氣散通關丸猪苓湯
加味五苓散透泉散

八正散

治膀胱熱小便癃閉不通大黃木通瞿麥作萹蓄滑石梔子車前子甘草各一錢右剉作

一貼入燈心一錢

空心水煎服

一錢

清肺散

治渴而小便閉猪苓通草各一錢半赤芍芩澤瀉燈心車前子各一錢萹蓄木通瞿麥各

七分琥珀五分右坐

作

滋腎丸

治不渴而小便閉黃柏知母並酒洗燒肉桂半錢右爲末水丸梧子大空心白湯

下百丸

脚腫雙睛凸出晝夜不眠。一人病小便不通腹脹

脚腫雙睛凸出晝夜不眠。一人病小便不通腹脹

矣小便癃閉是無陰而陽氣不化者也此人奉養

衆醫無效東垣曰膀胱者津液之府氣化則能出

太厚膏梁積熟故膀胱者腎之府久而乾涸小便

不化今內關外格之病悉具死在朝夕但治下焦

須臾自愈遂處此方服之

導氣除燥湯

治小便不通赤茯苓一錢半黃柏一錢滑石知母澤瀉各一錢半黃柏一錢右剉作

空貼

入心

水煎

服一錢

道赤元

一兩

治膀胱

有熱

小便

不通

大黃

一兩

半炒

赤芍藥

赤梔子

蓴芩

散

滑石各

四錢

右爲末

蜜丸梧子

大以

地膚子湯

黃芩

治下焦

熟結

小便

不通

地膚子

一錢

枳實升麻

通草

冬葵子

知母

宣氣散

葵子

治癰瘍

閉急痛

甘草梢

木通各三錢

梔子二錢

火硝

同煎服

最效

媚勞

通關丸

治木通

小便不通

黃柏

桂枝

知母

並酒炒

滑石各

二錢

右爲末

水丸梧子

大二錢

空

心白湯

百丸

鑑

下

猪苓湯

治熱結

小便不通

猪苓

木通澤瀉

萹蓄

滑石枳殼

各幾

七分甘草

三分右剉

一錢空心

水煎服

一貼

加味五苓散

歸枳殼牛膝木通甘草梢亦等分右剉當治虛寒小便不通五苓散料等分加當

入燈心煎服一撮空

透泉散

治小便赤澁不通滑石一兩芒硝甘草各五錢琥珀二錢半右細末每二錢空心以燈心

煎湯調下

老虛人癃閉

年老人小便不通多是氣短血虛四物湯加黃芪煎水吞下滋腎丸空心四物

老人氣虛小便不通四物湯加黃芪人參吞下滋

腎丸○老人虛人小便不通琥珀末以人參赤

茯苓煎湯調空心服

癃閉宜吐

小便不通屬氣虛血虛有實熱有痰氣閉塞皆宜吐之以提其氣氣升則水自降蓋

氣承載其水也氣虛用參术升麻血虛用四物痰多二陳皆先服後探吐之實熱當利之用八正散痰上病也積痰在肺肺爲不適諸藥無效丹溪曰此積痰上病見方○一人病小便不通焦而膀胱爲下焦上

閉則下焦塞比如滴水之器必上竅通而後下竅之水出焉乃以二陳湯先飲大吐之病如失瀨○

痰多阻滯水道不通二陳湯加香附子木香木通煎之先服一盞以餘渣探喉中吐之以提其氣氣調升則水自降○實熱不通砂糖水

癃閉宜瀉

實熱癃閉用八正散蓋大便動則小便自

行其本在腎合用牽牛

澤鴻其末在肺合用蓆桑皮更以木通滑石佐之又能透達雖然大便小便絡相貫人有多日小便不通但用神保元勑門丸大鴻數行小便自通。實熱尿閉宜用導水丸三花祥祐丸隨漏急疾走或飽食忍尿或飽食走馬或忍尿入房使氣上逆氣迫於脬故屈戾而不得舒張也脬落即殂。轉脬證候孕婦多有之患在忍縮小便或醉飽入房使小腸之氣逆而不通大腸之氣與之俱滯外水不得入膀胱內水不得出膀胱似淋瀝急數每欲尿時痛不可言大便亦裏急頻併

下庶可立出小便甚者因

此腹脹浮腫治法用涼藥疎利小腸中熱仍與通泄大腸迨其腹中攬痛大便大下則尿脬隨即歸正。憂悶多者性急躁者食味厚者轉脬之病稟受弱者謂邊利疏導藥鮮有應效因思脬爲胎所墮展在一側水道自行一婦患瀉爲血少氣多弦爲有飲遂以四物湯加參术半夏陳皮甘草生薑空心煎服隨以指探喉中吐出藥汁俟少頃又與一貼次早亦然如是與八貼而安此法恐偶中後歷用數人皆驗辦○轉脬宜二石散加木通車前子等分煎服仍施澣陰陽熨法○轉脬用蒲黃散滑石散葱白湯○老入脬轉困篤欲死六味地黃丸倍澤瀉服之效○勤觀參木飲○孕婦脬○轉宜參木飲○孕婦脬○

二石散 治脬各一
分爲末每二錢雞子清調下
治脬轉不得屎蒲黃渭石各等
蓋永十蓋煎至五蓋空心分二石葵子
治脬轉八九日不得尿渭石寒水二服入子

浦蕷散

治脬各一
分爲末每二錢雞子清調下
治脬轉不得屎蒲黃渭石各等
蓋永十蓋煎至五蓋空心分二石葵子

滑石散

治脬轉不得尿寒水石二兩滑石亂髮灰車前子木通各一兩葵子一合右剉水一斗煮

日取五升次即通溺

葱白湯

治欲死此因驚憂暴怒氣乘膀胱閉而脬絕不正剉陳皮三兩葵子一兩葱白三莖

參术飲

治孕婦轉脬小便不通四物湯料加入參白術飲半夏陳皮甘草各一錢右剉作一貼入生

薑

三方葵子大棗二枚水煎空心服外以葵子梔子炒滑石各五錢水通三錢右剉作

薑

一方田螺肉擣膏或生葱汁調貼臍中立通癟○一孕入

婦

九月轉脬屎閉腳腫形瘁脉左稍和而右澁必飽食氣傷胎系弱不能自舉而下壓膀胱故閉

而四不貼

以人參白术當歸芍藥陳皮半夏甘草煎服次早煎渣頓服探吐小便大通皆黑水瀨

恐加急溝令產婆以香油抹手入產門托起其胎

丹。又法將孕婦倒竪起，尿出如注。

起

關格證邪在六府則陽脉不和陽脉不和則氣留之氣留之則陽脉盛矣邪在五藏則陰脉不和陰脉不和則氣留之氣留之則陰脉盛矣陰氣太盛則陽氣不得相營故曰關格關格者不得小便格則吐

逆關者甚熱之氣格者甚寒之氣無出曰關無入
格寒在胷中遏絕不入熱在下焦壅塞不便穠

○陰陽易位病名關格。寒在胷中水滯不下故曰關嶽。○關者不得小便不通故曰關嶽。

便 **格** 者 吐逆上 下俱病也。細○內經曰人逆脉大於氣口四倍名曰格氣口脉大於人逆脉大於氣口四倍名曰

關是也○兩寸俱盛曰關格其證嘔逆而小便不通者○大抵此證多死寒在上熱在下故也○

小便不通亦謂之陰陽關格乃三焦約者不行之病也凡大便不通內經謂之三焦約者不行也長流

水煎八正散服之。○關格者謂膈中覺有所碍，欲升不升，欲降不降，欲食不食，此爲氣之橫格也。

醫鑑益

○關格宜芒硝湯

大承氣湯

升中虛者

枳縮二陳湯

治降之痰

格者枳縮

二陳湯

治中虛者

補中

升中虛者

枳縮二陳湯

治中虛者

補中

升中虛者

枳縮二陳湯

治中虛者

芒硝湯

治關格不通

右以滑石

硝二兩半滑石

三兩冬葵子

合取五錢水煎

至半入芒硝一錢

再入芒硝一錢

空心服

醫鑑

枳縮二陳湯

治關格上

下不通

此痰隔中焦也

服此

醫鑑

川芎八分縮砂白茯苓

一錢

枳實

一錢

甘草三分

厚朴便香附子各七分木

三分

右除二香坐作一貼薑

水煎

關格宜吐瀉

關格必用

吐以提其氣之

橫格不必在

之

醫鑑

出痰也有痰者

二陳湯

方

齧齧

橫格

而吐之

以升

水

中氣虛而不行

之謂

而不運者

補中益氣湯

加木香

枳實

川芎

厚朴

甘草

附子

七分木

三分

厚朴

甘草

附子

七分木

自行方

關格死

在朝夕

但治下焦

利則小

水

升

水

升

水

升

水

升

水

升

水

亂四肢漸冷

和翌日乃安

此關格之病

極爲難治

得

大承氣湯

一劑

至夜半漸

得

垂死而活只此一人耳。燦之藥門。一小兒小溲不通，號跳旋轉，下滲利小便砂石，大便秘。肛門脫出一二寸，戴入曰此也。不吐不下，則焦何以開？不令飲水，則小溲何塞？以利以調胃，承氣湯一兩加牽牛子頭末三錢，河水上煎服。又用武帶末糊丸，芥子許六十丸，吞下。

吐下瀉，一時齊出，有膿有血，漏泄既定，令飲新水二三十次，每次飲一盞，其病如失。初以冷物熨之，自通門入。治脬轉小便不通，生薑數又以冷物熨之，自通門入。治脬轉小便不通，生薑白紫蘇葉各一握，煎湯密室內熏洗，小腹外腎其氣，次用赤芍藥白芍藥各五錢，蜀葵子二錢，半右剉一兩煎水，調蘇合香元飴，細剉，即效。小便難，小腹脹，並青鹽末，半錢空心溫服。即效。又炒鹽半斤，以帕子包分兩裹，更替熨臍下，即通。此由產時尿脬運動不順，不通，腹脹如鼓悶亂，不省。

臍下亦通。入葱白三斤，細剉，炒熟，盛臍中，葱白亂不

掩臍法

餘根細切厚鋪鹽上用大艾炷灸之
覺熱氣直入於腹內即通神驗

調敷臍下內以甘草節煎湯飲之及藥汁至水
良方二藥相反脬自轉矣小水來如泉涌此救急之
臍二藥須兩入各買各處劑之不可一處

同置爲妙。○治小便不通麝香半夏末填臍中用葱

通臍○治小便不通大田螺生擣細封臍上即

白田螺二味擣成餅封臍上用布線縛定下用皂

角烟入陰中自通女人用皂角煎湯洗陰戶內

紙七重密封瓶口於患人臍內用鹽盛水以有字

○治小便壅在臍上偃卧如覺冷小便即通

置瓶口覆在臍上通宜貼臍膏方觀通關散

○治小便壅在臍上滴冷水藥上即通關散

通關散以紙圈圍臍抄藥在內滴冷水藥上即通關散

○治小便不通白礬生鹽各二錢半右研勻
○老人口滿鼓脹病小小氣虛症作小小

難治不治證嘔而小便不通者難治○老人氣虛症作小小

○頭汗格不通不得格

○便不通爲下焦血氣乾者死○頭汗者可治有汗者死

○便不通爲下焦血氣乾者死○頭汗者可治有汗者死

小便不通此爲陽脫不治死門○傷寒熱病及風溫狂言直視遺尿者死入

小便不禁

遺

尿

納

水

泉

者

前

陰

之

流

注

也

內

腎

與

膀胱

俱

虛

內

氣

水泉者

前陰

之

流

注

也

內

腎

與

膀胱

俱

虛

內

氣

水泉者

前陰

之

流

注

也

內

腎

與

膀胱

俱

虛

內

氣

水泉者

前陰

之

流

注

也

內

腎

與

膀胱

俱

虛

內

氣

水泉者

前陰

之

流

注

也

內

腎

與

膀胱

俱

虛

內

氣

水泉者

前陰

之

流

注

也

內

腎

與

膀胱

俱

虛

內

氣

水泉者

前陰

之

流

注

也

內

腎

與

膀胱

俱

虛

內

氣

水泉者

前陰

之

流

注

也

內

腎

與

膀胱

俱

虛

內

氣

水泉者

前陰

之

流

注

也

內

腎

與

膀胱

俱

虛

內

氣

水泉者

前陰

之

流

注

也

內

腎

與

膀胱

俱

虛

內

氣

水泉者

前陰

之

流

注

也

內

子心丹○下虛內損而不禁宜補膀胱陰血瀉火邪爲主加減八味丸六味地黃元加知母黃柏五味

子元補陰丸最妙効觀人虛冷不禁遇夜愈多宜縮泉元秘元丹老入虛人宜五子元家韭子元參芪

湯產後遺尿宜補脬飲豬脬湯小兒遺尿宜雞腸散雞肫通用大兔絲子元茸香元旣濟丸○

傷寒遺尿謹覲

中

暑遺尿謹覲

中

縮泉元

治脬氣不足小便頻數一日百餘次烏藥益智仁等分爲末酒煮山藥糊和丸梧子大臨

卧十丸

門下

秘元丹

治虛損小便危急者勸覲

五子元

治小便不禁遇夜愈多頭眩脚弱老人虛人多有此證大能耗人精液令人卒死兔絲子入虛人

酒製韭菜子畧炒益智仁茴香炒蛇床子炒各等分

右爲末酒糊和丸梧子大糯米飲下五十丸

家韭子元

治腎陽衰敗脬冷遺尿不禁家韭子畧炒兩鹿茸燉酒浸牛膝炒兩肉

酒浸熟地黃當歸酒洗各二兩
各一兩半杜仲炒石斛酒洗乾薑炮桂心各一
右爲末酒糊和丸梧子大空心溫酒或鹽湯下百丸
心溫酒或鹽湯下百丸大空心溫酒或鹽湯下百丸

參芪湯 治氣虛遺尿人參黃芪蜜炒白茯苓當歸熟地黃白朮陳皮各一錢益智仁研八分升麻

肉桂各五分甘草三分右剉作一貼子畫三副水煎空心服老人加炮附子翻

補脬飲 治婦人因產傷脬，小便不利，黃絲綃生者。一尺剪碎白牡丹根。

皮末二錢，
如鈎心，白芨末一錢，右水一撮同煎至
頓服，服時不得作聲，作聲無效。

猪脬湯 治婦人因產脬破小便不禁人參白朮各二錢桃仁陳皮黃芪白茯苓川芎當歸各一錢

婦右剝人難產作一貼入猪脬或羊脬同煎空心服得小便

補淋瀝病遂爲廢人予思之肌肉破傷在外者尚可
完脬雖在腹恐亦可治診其脉虛甚試與峻補

以此方煎以猪羊脬湯極飢時飲之一月而安。蓋是血氣驟長其脬自完恐稍遲亦難成功也。翻

雞腸散

治小兒遺尿不禁多因脬寒或稟受陽氣不足故也

熟地黃各五錢黃柏知母並鹽水炒牡蠣粉山茱萸肉酒蒸各三錢

梧子大空心益智湯下百丸

醫

諸淋證○淋之爲病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中
蓄在下焦故膀胱裏急膏血砂石從小便道出焉
於是有所欲出不出淋瀝不斷之狀甚者窒塞其間
則令人悶絕矣○大凡小腸有氣則小便脹小
腸有血則小便澁○小腸有熱則小便痛痛者爲血
金石結者爲尿血敗精結者爲砂精結散者爲膏
血得補而愈澁熱得補而愈盛水道不行加之
敷道閉遏未見其能生者也○淋者小便淋瀝
澁冷痛欲去不去去而又來○淋不利或忿怒旁勞
有澁冷者由心腎氣鬱小腸膀胱不利或忿怒旁勞
忍尿酒肉濕熱下流干於肝經挺孔鬱結初則熱
門利○腎虛極而五淋者當補腎精而利小便不可
用利水藥而五淋者當補腎精而利小便不可獨

腹滿甚者宜瀉腎湯○諸淋皆屬於熱雖有冷淋蓋千百之一也○腑門○淋雖有五皆屬於熱取腎丸○以四物湯加甘草梢虎杖根木通桃仁滑石木香煎湯吞下兼灸三陰交欲累試累效○丹汗發汗則便血○

淋病有五

一曰勞淋二曰血淋三曰熱淋四曰氣淋五曰石淋六曰脾淋

勞琳

勞倦虛損小便不出小腹急痛傳草○勞淋者遇房勞傷靈損則

發宜四物湯。飭加知母黃柏滑石琥珀門門。
慾過傷膀胱之氣虛，損滯而成淋，宜補中益氣湯。酒

內防滯，外觀精，升補真氣，醫淋宜緩急，強留不泄。○從急，固元，湯溫，醫不泄。

益元固真湯

治縱慾強留澤鴻濫精一各澤鴻濫精一各

芩蓮藥巴戟升麻益智仁黃柏酒各一錢右剉作一貼水煎空心服

血淋

小便不出時下血疼滿急草本
尿血熱結壅痛宜四物湯加知

母○黃遇柏熟澤則鴻發赤葵

草芩門入○色鮮者心與小腸虛熱導赤散防見子○血淋宜增味薊散加黃芩色如黑豆汁者腎與膀胱火也宜五淋飲見子○死血作淋牛膝膏最妙防見

增味導赤散治血淋澁痛生乾地黃木通黃芩車前子梔子仁川芎赤芍藥甘草各一錢右

剉作一片空心水煎服

葉

金黃湯治下焦結熱尿血淋痛黃芩金瞿麥生乾地黃車前子渭石芒硝各五錢右爲籠末每取五

煎錢空心水

小薊飲子

治下焦結熱尿血淋痛生地黃二錢小薊根滑石通草蒲黃炒藕節竹葉當歸山梔

作仁甘草灸各七分右剉一貼空心水煎服

熱淋

小便熱淋赤色淋澁不快臍下急痛鞚○暴淋痛甚尿赤瀝宜八正散見坊道赤元坊見滋腎丸

元散見百丸以加梔子導赤散煎水吞下空心一錢爲末益坊散見元散見百丸以加梔子導赤散煎水吞下空心一錢爲末益

點心服白湯

氣淋

小便澀滯常有餘瀝不盡小腹脹滿宜沉香散通

秘散或益元散加木香檀

柏茴香爲末如上法點

服黃芪

門○氣虛而淋八物湯煎服

加

沉香散

香檼氣淋韋石謂石小腹脹滿葵子赤芍藥各七錢陳皮青沉

皮大麥

木香甘草各二錢半右爲末每二錢空心以

通秘散

背脊各等分右剉五錢空心水煎服

石淋

壅中痛尿不能出內引小腹脹急痛尿下利

令人口悶絕

驥○壅中痛努力出利石癭○炒沙淋散

脂而易散

水吞來復丹丸爲妙久服則關絡開

榔散

石淋結塊而難消攻療石淋以枳殼散

通忽爾

大便通泄石塊自小便出榔○益元散

偏主石淋

○石淋宜石燕丸滑石散鵬砂散

石燕丸

治石淋石韋瞿麥穗各一兩右爲末糊丸梧子乾

魚石散 治沙石淋。莖中作痛。石首魚頭中骨五對火煅爲末。滑石五錢。右爲末。分二服。木通湯調。

乃安。癟。下砂出盡。

苦杖散 治沙石淋。每尿時器中剥剝有聲。痛楚不堪。杜牛膝。櫟細剝。每一合。兩即一水。五盞煎耗。

其四留其一去滓。以麝香。乳香各少許研調服之。

琥珀散 治沙石淋。琥珀金屑各一錢。右爲末。每三錢。當歸木通。歸蘆葉各二錢。木通當歸木香。

煎湯空心調下。無葷葉則代竹葉。

冷淋 必先寒慄。小便澀。數竅中腫痛。○亦有挾冷而淋者。其證先寒戰而得溲便。蓋冷氣與正氣交爭。

○冷氣勝則寒戰。成淋。正氣勝則寒戰解而得便。○冷淋宜八味丸。勸觀生附湯。木香湯。○冷氣勝則寒戰。解而得便。○冷氣勝則寒戰。解而得便。○冷氣勝則寒戰。解而得便。

生附湯

治冷淋。小便澀。痛增。

夏製瞿麥各一錢。二分。右剝作。

一貼。半匙。八生薑。七片。燈心。水煎服。

二十

木香湯

治冷汗淋小便淋澁身體清冷木通木香檀榔榔澤鴻陳皮甘草各七

分肉桂三分右剉入薑五片空心水煎服一貼

諸淋通治

酒淋證所感不一或因房勞者陰虛火動也忿怒者

氣熱結生火也

醇酒厚味者釀成濕熱也積熱既久則煎

蒸水液稠濁如膏如砂如石也

夫散熱利小便只其膏淋沙淋石淋必須開鬱也

青皮木香行氣也

蒲黃牛膝破血也黃柏生地黃

青皮木香行氣也

蒲黃牛膝破血也黃柏生地黃

青皮木香行氣也

蒲黃牛膝破血也黃柏生地黃

白茅散湯小兒藥毒成淋

散用瀉腎湯金散方見二神散

瀉腎湯

諸淋小腹脹急甚者宜用此大黃二錢生剉密

黃各一錢玄參細辛各八分甘草四分右剉水二盞煎藥至一盞半入大黃芩黃芩各六分甘草四分右剉水二盞煎藥至一盞半入大芒硝燒至七分去滓下

麝金黃連丸

治小腸膀胱積熱或癰閉不通或如瘻如膿或遺尿不禁或白濁如泔或膏淋如膏糊但熱證也悉主之

子水或如沙石米粒或如粉糊末三兩黃芩大黃滑石白茯苓各四兩黑牽牛頭末三兩黃芩大黃琥珀各二兩麝金黃連各一兩右爲

三因琥珀散

治五淋澀痛小便出血膿血琥珀海金沙後藥蒲黃各等分右爲細末每三錢空心

二煎心以萱草根

治五淋澀痛小便出血膿血琥珀海金沙後藥蒲黃各等分右爲細末每三錢空心

石韋散

治諸淋滑石二錢白朮瞿麥赤芍藥冬葵子韋木通各一錢當歸王不留行甘草各五

分右爲末每二錢空心以小麥煎湯

五淋散

治五淋赤芍藥山梔仁各二錢當歸赤芍藥各五分右剉作一服

分右爲末每二錢當歸赤芍藥各五分右剉作一服亦可

心水煎

醫

通草湯治五淋通草葵子茅根桃膠瞿麥當歸蒲黃

滑石王不留行各一錢甘草五分右剉作一

心貼入薑五片空

必效散

治一切淋當歸生地黃赤芍芩滑石牛膝山

梔仁麥門冬枳殼篇蓄木通

知母黃柏酒

甘草五分右剉作一

各七分

入燈心一團空心水煎服

甘草五分右剉作一

歸心水煎服

當歸酒洗大黃酒浸牛

膝山梔仁麥門冬枳殼篇蓄木通

知母黃柏酒

當歸酒洗大黃酒浸牛

海金沙沙散

治五淋酒洗木香雄黃海金沙各五錢右剉作一

梔仁麥門冬枳殼篇蓄木通

知母黃柏酒

當歸酒洗大黃酒浸牛

每二錢

好酒調下

鑑

澹寮五淋散

治五淋梔子仁一錢半赤芍芩赤芍藥

木通滑石甘草各八分竹葉茜草

各五分右剉作一

貼空心水煎服

鑑

一方治諸淋四芩散

一錢益元散二錢梔子

作一貼水煎空心服

鑑

白茅湯

治婦人產後諸淋無問膏石冷熱皆治之白茅根五錢瞿麥白蒺藜各二錢半蒲黃桃膠滑石各七分甘草五分

各一錢

二箇煅石首魚頭中骨四箇煅右剉分二貼

入薑三片燈心二十莖空心水煎服

或爲末每二錢木通湯調下

小兒藥毒成淋

一年少自初生七箇月患淋病五日必一發其發也大痛捫地叫天

水道方行狀如漆

如粟者約一盞然後定診其脉

輕則濁重則弦視其形瘦而稍長其色青而蒼

其父必因多服下部藥遺熱在胎留於子之命門

而然遂以紫雪和黃柏細末丸梧子大晒十分乾

率以與二百丸作一服經二時又經半日痛大作連腰

腹水道乃行下以食物壓之又經半日

痛大作連腰

分之八後以陳皮一兩苦棗木通各半兩作一大碗許其病減十

與之又下漆粟者一合許遂安

濕者

赤白濁

小便出赤濁或白濁其狀漩面如油光彩不空旋脚澄下疑如膏糊或如米泔或如粉糊或如蜜

赤濁之病濕熱明矣。○先賢有言夏則土燥而水渾濁，冬則土堅而水清此其理也。水火既濟則土自堅其流清矣。小便白濁蓋脾有虛熱而腎不足，土自濁邪之證因脾胃之濕熱下流滲入膀胱故使溲便或白心與小腸主病屬火故也。氣虛而熱甚者則爲赤濁。此心與小腸主病屬火故也。氣虛而熱微者則爲白濁。肺與大腸主病屬金故也。赤白濁皆因脾胃濕熱中焦不淸濁氣滲入膀胱爲濁。○赤者心虛有熱，由思慮而得之。白者腎虛有寒，因嗜慾而致也。○小便濁主濕熱有痰有虛赤屬血痰二陳湯加蒼朮白朮升麻柴胡或星半蛤粉。○白屬氣與痢疾帶下同治。丹門。○赤白濁肥人多濕痰人是虛火四物湯加知母黃柏或珍珠粉丸。○金蓮丸不斂成漏濁宜萆薢分清飲小兒砂妙香散。○金瘡精丸房勞傷腎者草薢分清飲小兒砂妙香散。○金瘡元服加減珍珠粉丸。○治法氣湯內燥。○治法益氣湯內濕。○治法宜燥。○治法宜濕。亢便濁必兼服加減珍珠粉丸。



升舉之二陳湯加二术升麻柴胡白芍藥丹
濁宣四君子湯飴覶合五苓散勸覶煎服揩又秘
清心元固因本元半芩丸導赤湯皆宜○赤濁宜加味
鯉散○赤白濁小腹疼香散肺觀水火分清飲桑螵
蛸散○赤白濁小腹疼香散肺觀水火分清飲桑螵
酒煮當歸丸最妙方現歸人

星半蛤粉丸

治濕熱白濁粉二兩南星半夏並薑
製蒼朮各一兩右爲末薑汁煮神

樗柏丸

治濕熱痰火小便濁黃柏殼三兩
柏子大空心各五錢右爲末神麴糊和

心麴

薑作糊

下五

七丸

大空

心

薑湯

下五

七丸

大空

心

薑

下五

七丸

大空

心

薑

下五

七丸

大空

金蓮丸

治思慮

門冬

麥門冬

柏子仁

當歸

酸棗仁

茯苓

龍骨

朱砂

遠志乳

衣香

空龍齒

心溫酒

或棗湯

下七

十丸

梧子大

朱砂

遠志

乳

衣香

空龍齒

心溫酒

或棗湯

下七

十丸

梧子大

草薢分清飲

治小便白濁

智仁草薢白茯苓各一錢

甘草五分

右石菖蒲烏藥益

如糊

石菖蒲烏藥益

甘草五分

右

剉

作一

捲水

貼空

心入

蒼术難名丹

治脾力乏腰精不

禁小便漏濁淋瀝

不

止手足

背痠疼

盍用蒼术等劑以斂脾

精斂脾謂何精生於穀也

蒼术製四兩茴香炒川

練子肉各七錢半川烏炮破故紙炒白

茯苓龍骨

各一兩右爲末酒麵糊和丸梧子大

朱砂爲衣空心米飲下五七十丸

大

四炒固真丹

治元崩帶等證

蒼术遺精白濁

五淋七疝婦人

茴香青鹽各一兩同炒一分以川椒破故紙各一

分以烏藥川練子各一

分以烏藥川練子各一

分以烏藥川練子各一

酒醋打糊和丸梧子大空心每取三五十丸男子

度只取半爲末以煮藥

酒下婦人醋湯下門。醉飽後色慾不節傷脾損

腎脾來剋腎土剋水也小便黃濁其脉脾部洪數

腳或如血澁其證尿下如梔子汁澄下桶底如石灰

腎部微澁其證尿下如梔子汁澄下桶底如石灰

蠶苓元

一名威喜元

治腎有耶濕精氣不固小便白等

蠶器證

雪中用

白茯苓四兩

水煮二十餘剉

以猪苓剉

二錢半同放於磁

器中用

去猪苓取

出焙爲末

將黃芩

加減珍珠粉丸

治

赤白濁

及白淫

通用黃

柏根

白皮一兩

蛤蜊

青黛

乾薑

炒大空心

色各五錢

右爲末

炒神曲

打糊和

滑石

利膈根

白皮大

火燥

除濕熱

青黛解鬱

降火乾薑

酸補腎

滑石

利膈根

白皮大

鹽製

炒微

細嚼以

秘精元

治下虛

脬寒小便

白濁牡蠣

煅免絲子酒

製

螺蛸

酒炙各等分

右爲紐末

酒糊和勻丸

一名固精丸

如梧

固本元

治小便濁

甘草炙

三兩

猪苓

二兩

白茯苓

縮砂益智仁

半兩半夏

蓮花蜜製

黃柏炒各一兩右爲末湯浸蒸餅和丸梧子大空心溫酒下五十丸正當白朮即清門

半
卷

黃柏炒各一兩右爲
丸梧子大空心溫酒酒
當白朮即清門

下末湯浸蒸餅和
五七十九
十一
十七
十九

卷之二

道赤湯

治尿如
赤茯苓

宋浦色

不遇二服愈木通渭石
梔子仁甘草梢各一錢枳殼

白术各五分煎水坐服

THE JOURNAL OF CLIMATE

加味清心飲

仁小熟智益心治半

便麥赤澤蓮肉白袂茶名一金鑑

舊蒲車前示白未澤
你一貼入燈心二十

甘草各五分，水煎服，得不坐。

妙應丸

治赤白瀆兔
錢牡礪燬絳

子酒
三錢
龍骨
辰砂
石菖蒲
白茯苓

苓 桂 益 智 仁 蓮 肉 縮 石 參

名二鐵半石未計樂米利臨卧穉

十九湯
心卅下五

卷之三

雞清元

梧子大便大通以乾稍大

半夏生爲末以雞子清和丸
猪苓夾和慢火同炒丸子裂

爲度留猪苓末養藥收器中以
白茯苓煎湯空心下三五十九
蘸

水火分清飲

治赤白濁。赤茯苓一錢益智仁單薜石菖蒲猪苓車前子澤鴻白术陳皮枳殼各七分甘草五分右剉作

桑螵蛸散

小便白如稠米泔日數十次心神恍惚瘦

日敷

桑螵蛸

益水

拌蒸遠

酒洗

志薑

石菖蒲

炒鹽

龍骨

入參白

神當歸酒

半錢

右爲末

每二錢

洗

臨臥以人參

茯苓桑白皮

接螺旋

歸腎經

煎湯調下

蓋

蠱病白滌

內經目

脾傳之

腎病名曰

蠱

註曰

疝

小腹

寬熱

而膀胱

肉故小腹冤熱

日內摸搜出

白液也

冤熱內結消餌

云交接漸微也。

夫冤熱

故其證

小腹冤

而膀胱

守

而脾受風邪傳於腎經

曰蠱熱內燬故其證

小腹冤

而膀胱

守

故其證

小腹冤

而膀胱

守

而膀胱

白滌謂白物淋滛如精之狀也宜半芩丸上方見○
戴人曰遺尿閑瘻陰痿膀痺精滑白滌皆男子之
塊或定或移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也

但女子不謂之病而謂之癆也

旋蓉丸治蠱病肉旋蓉白茯苓黃芪澤牡蠣粉

子龍骨當歸各一兩右爲末蜜丸梧

脬痺證證內經曰脬痺者小腹膀胱按之内痛若沃以湯
下三十九丸心酒

于小便上爲清涕○夫膀胱者津液之府氣
化則能出今風寒濕邪氣客于脬中則氣不能化
出故脬滿而水道不通也足太陽之經從巔入絡
腦氣下灌出於鼻爲涕也○脬痺即寒

淋之類也屬風寒濕宜巴戟丸溫腎湯門

巴戟丸治脬痺小便澀而不通巴戟一兩半桑螵蛸
炒遠志薑製生乾地黃酒洗山藥附子炮

續斷肉旋蓉酒浸各一兩杜仲炒石斛鹿茸龍骨
免絲子煮五味子山茱萸官桂各三錢右爲末

蜜丸梧子大空心酒下五七十丸調

溫腎湯

治脬痺小便不利各一錢二分半右剉作一貼

赤茯苓白朮澤瀉乾薑炮

莖中痙痙

童兒精未盛而御女老人陰痿而思色以降其精則精不出而內敗

莖中痛澁而爲淋

八味丸料加車前子牛膝煎服

門入○若精已竭而愈欲大小便愈

復耗之則大小便道牽疼愈疼則愈

倍附子散之凡此當滋化

便則愈疼八味丸功觀倍附子散之凡此當滋化

源不可誤用知柏淡滲之劑既鴻真陽復損真陰

門入○肝經氣滯有熱玉莖引腸刺痛宜參苓琥珀

湯門○病淋而莖中痛不可忍六君子湯瘀觀加柏

知母黃柏滑石石韋琥珀煎服丹○

津小便閉時作痒小柴胡湯觀加柏子澤瀉黃

連炒木通龍膽草赤茯苓煎服薰服六味地黃丸

功觀爲妙春小便淋澁莖中作痛屬肝經濕熱

用龍膽瀉肝湯○精竭不痛莖痒者八

味丸熟盛莖中澁痛導赤散○精竭不痛莖痒者八

以致莖中痙痙出白津多因土不足不能滋生金水

火燥宜補中益氣湯與清心蓮子水

飲間服蓋脾胃爲肝腎之源心實主之門。○陰莖痛乃厥陰經氣滯無熱用甘草梢蓋欲緩其氣耳。

癥

參芩琥珀湯

治淋澀莖中

一錢玄胡索

不可忍川練肉

甘草梢

四分琥珀澤瀉

柴胡當歸尾青皮黃柏各三

分人參五分赤芍芩

水煎服

門八

一方

治淋澀各

一錢右剉作

一木通各二錢

青皮黃柏

心丹

交腸證

婦人小便中出

大便名交腸證

服五苓散

如也

檳榔

木通桃仁

積久服之而

愈熬此人酒多

氣升不降陽

虛

通桃仁

活者以其熟

形實酒中

翻然

小便多寡

老人與壯年飲水無異多寡壯年小便甚小而老者小便甚多何也曰壯者如春夏之氣

升者多而降者少

降者多而升者少故不如秋冬之氣

飲後即小便

內經曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾

下便

欲散精上歸於肺病入飲入胃遽覺至脣

上攻使口

燥咽乾宜補中益氣湯○靈樞曰人

焉

飲酒入胃穀未熟而小便獨先下何也蓋酒者

單方

丸四十五八種有

滑石

能利竅以通水道爲至燥之劑湯○利小便

硝石

治淋子及小便不通

下血淋熟並冷水調研末二錢木通勞

湯下石

淋陽紙炒溫水調下

並空心服名曰透膈散諸藥無效服此立愈

韓湯

海金沙

通利小腸治沙淋尿閉每取一兩入臘茶末五錢和勻以生薑甘草煎湯調三錢服

浮石

錢治砂心淋以甘草湯調末取二

淋石

患之當得碎石隨尿出小石也主石淋水磨服

甘草梢

味淡者主莖中刺痛同木通空心煎服

單薢

煎治夜尿或爲末酒糊治丸尿數日夜無度

牛膝

療老入遺尿○牛膝膏治死丸便血空心鹽湯下七十丸坐水

車前草

水五盞煎至一盞治入聖麝香血澁作莖中痛欲死酒煎空心

車前草

水五盞煎至一盞治入聖麝香血澁作莖中痛欲死酒煎空心

車前草

水五盞煎至一盞治入聖麝香血澁作莖中痛欲死酒煎空心

澤瀉

治五味淋止能泄伏水○去脬中久陳積物也煎服淋

澤瀉

治五味淋止能泄伏水○去脬中久陳積物也煎服淋

佳末服並
瀉陽

地膚草

利小便又主子與莖葉同功水煎服即通有廻生

木通

主治五淋開關格又主小便數急

瞿麥

主治五淋煎空心服○通草同功

黃芩

主治血淋水煎服

益智仁

主治小便頻數不禁又止渭數

酸漿草

主治諸淋酒澆利水道擣取汁一

石韋

主治五淋利水道通及脬囊結熱

牽牛子

二錢以木通梔子煎利水道取頭末

燈心草

主治五淋能利水道

篇蓄 治五淋及小便不通生水邊開紫花
篇蓄根搗取汁一盞空心服即通

葎草 取汁五淋利小便搗汁服或水煎服膏淋
主二升和醋二合空心服一盞即愈

萱草根 取治小便澁痛下沙石淋
根搗汁灌心服

榆白皮 治五淋又主石淋能利竅也水
水道煎服末服並佳

茯苓 治五淋主小便並不通利
水道煎服末服並佳

琥珀 通五淋又治諸般沙石淋能利小便爲末
二錢空心以葱白煎湯調下一服立效

虎杖根 通五淋利小便剉取一兩水煎入麝香乳
末各少許調服空心即效俗名柱牛膝散

梔子 通五淋利小便又治血滯小便不利熟淋血
尤效○梔子實非利小便乃清肺也肺氣清而淋

猪苓 膀胱得此氣能化而出尿也
利小便通水道煎服之

猪苓 有利小便通水道諸湯劑無若此
芩能利水道諸湯劑無若此

馬散

山茱萸止小便滑數又療老人尿不節煎服丸服並佳幹

桑螵蛸止小便滑數療遺尿酒蒸爲末薑湯下二錢妙治白濁

牡蠣粉止小便滑丸服或末服利或幹

石首魚頭中骨主不淋火燬爲末空心和水服一錢幹

石龍子主五淋利水道下石淋取一枝火灸爲末空心和水服幹

蟻鰥汁下石淋下水道取七枝鹽二兩新瓦上拌焙爲末溫酒調一錢服即愈幹○治小便不通諸藥爲

蟻鰥下石淋取活者一枚生研入麝香少許新汲水調下空心立通

桃膠破石淋取如棗子許夏石當冷水冬心和服日三

獮猴桃下石淋取熟者食之○藤中汁至滑水少許服之幹

冬葵子 治五淋利小便。根亦療淋。

利小便並水煮空心服之。韎。

冬瓜

治五淋利小便。

一盞韎。

紅蜀葵根莖

治淋利小便。花與子同功。

亂髮灰

主五淋又療轉脬小便不通。取髮灰末二錢醋湯調服。

前草煎湯。

甲治轉脬尿閉自取。

人爪甲

燒灰和水服。韎。

豬膽

主小便不通。取膽納熱酒中調服。韎。

計滴入陰戶。

中必通。

豬脬

治遺尿洗灸熟空心溫酒嚼下。

羊肚

主小便數取肥肚作囊食之。韎。

糸盛水滿線縛兩頭煮熟取中水頓服。

羊肚。

牛尿 利小便 取熟雄牛尿飲之

雞腸

主遺尿 小便不不禁取烏雞腸治如食法作

雄雞肫

主遺尿及小便滑數 不禁取燒灰溫酒調服一錢妙

雞肫黃皮

每二錢溫酒調下男用雌女用雄

并良韓

服

鍼灸法

瘻閉取陰蹻 燒大敦委陽大鍾行間委中陰

陵泉石門

○小便淋閉關元分三陰交趾

陰谷

○血淋取氣海關元鍼○石淋取關元氣

大敦

○小便滑數中極灸腎俞陰陵泉氣海

陰谷

○遺尿不禁取陰陵泉陽陵泉氣海

大敦

○白濁腎俞又取章門曲泉關元

陰交

○婦人陰中轉脬不得尿取陰陵泉取曲骨關元

大便

大便原委

難

經

曰大腸小腸會爲闌門蓋胃中水穀府

胃下口傳入於小腸上口自小腸下口

便

泌

別清濁水流入膀胱爲溲尿滌穢入大腸爲大

便

由

闌門而分別關闌分鬲

故名爲闌門也

目綱

物內

經出

焉

註曰大腸者

傳導之官化

大便病因

犯

者

陰受之陽受之則

食飲不節起居不時

藏入六府則身熱不時卧上爲喘呼入五藏則瞋

溝閉

塞下爲飧泄久爲腸澼

○春傷於風邪氣留連乃爲洞泄

○春傷於風邪氣留連乃爲洞泄

○春傷於風邪氣留連乃爲洞泄

○春傷於風邪氣留連乃爲洞泄

○春傷於風邪氣留連乃爲洞泄

○春傷於風邪氣留連乃爲洞泄

藏入

六府則

身熱不時

卧上爲喘

呼入

五藏則

瞋

○春傷於風邪氣留連乃爲洞泄

風夏必

發泄

○春傷於風邪氣留連乃爲洞泄

濕則

水穀不分

故大腸傳導而注瀉也

○春傷於風邪氣留連乃爲洞泄

不藏者

是門戶

不

要也

○春傷於風邪氣留連乃爲洞泄

○腸垢者

腸間積

計垢

○春傷於風邪氣留連乃爲洞泄

渴恣食生冷

二

者夜

熟

熱

與濕合

傷氣外侵

二

者皆

白痢令



傷血分則成赤痢氣血俱傷則成赤白痢人云無積不成痢皆由暑月多食生冷不能剋化古成飲食積滯而

辨便色

鴻中寒則腸鳴飧泄腸中熱則出黃如糜也或以痢色青

爲寒者誤也傷寒少陰病下痢純青水者熟在裏也小兒急驚利色多青爲熟明矣痢色黃者脾熟者由火熱亢極則反無水化故色黑也癧○血

寒血則凝痢色必紫黑成塊或雜膿血蓋膿爲陳積

熱痢下青水氣痢狀如蟹渤海積痢色黃或如魚腦風

虛症痢色白如鼻涕凍膠

脉法

泄洪脈而大爲逆

多沉緩時小結者生浮大數者死

○泄而脫血脉實者難治○病泄脉

○傷風則浮○傷寒則沉○傷暑則沉

○火熱微傷

虛滑脫暑濕緩弱多在夏月○
沉小留連者生數疾且大有熱者死○
微弱數者爲欲自止雖發熱不死○
者爲未止○下痢日十餘行脉反實者死○
下痢宜微小不宜洪大○
大浮洪無差日謝○無積不痢脉宜滑大浮弦急
者死沉細無害脈○下痢脉微○凡痢身涼脉細者生身熟脉大
死沉細無害脈○下痢脉微○凡痢身涼脉細者生身熟脉大
閉結脉沉數下連於尺爲陽結二尺脉虛或沉
細而遲爲陰結右尺脉浮爲風結○燥結之脉
沉伏勿疑熟結沉數虛結沉遲若是風燥右尺
浮肥翻○老人虛人閉結脉雀啄者不治○
泄有五有胃泄脾泄大腸泄小腸泄大瘕泄○胃
者飲食不化色黃宜胃苓湯○脾泄者腹脹泄
迫大便色白腸鳴切痛宜五苓散○大腸泄者食已窘
者腹滿泄注食則吐逆宜胃苓湯○大腸泄者食已窘
裏急後重數至圊而不能便○中痛宜大黃湯○
皮膚者腹溼而便膿血小腹痛宜芍藥湯○大黃湯
當歸川芎白芍藥桂枝或下皮膚者

胃風湯

治腸

胃濕

毒腹

痛

泄

鴻

下

如

黑豆

汁

或下

皮膚

人參

白朮

赤朮

當歸

川芎

白芍

芍藥

桂枝

皮膚

甘草各一錢右剉作一貼
入粟米一撮水煎服

胃苓湯 治脾胃濕盛泄瀉腹痛水穀不化
蒼朮厚朴
陳皮 猪苓 泽泻 白术 赤茯苓 白芍藥各一錢

泄瀉諸證有濕泄飧泄濡泄風泄寒泄暑泄火泄熱泄虛泄言登渭泄泄瘧泄食積泄脾泄腎泄脾腎泄中焦滯泄暴泄洞泄久泄○凡泄皆無濕初宜分利藥止之○下焦久則升舉必滑脫不禁然後用瀉生濕清熱亦可太苦則傷脾惟淡劑利竅爲妙散熱次則理正中焦理中湯治中湯竅湯調理中治不效然後方可斷下固腸丸是也○治鴻須先中焦理中湯丸是也○次分利水穀五苓散理中治不效然後方可斷下固腸丸是也○治是也○治泄鴻諸藥多作丸子服之○几泄鴻小便○治泄白不瀉爲寒赤瀉爲熱證據○大便完穀不化而色不變吐利手足溫爲熱證據○大便完穀不化而色不變吐利手足溫爲熱證據○

腥穢小便清白不澁身冷不渴脉微細而遲者皆
寒證也。凡穀肉消化無問色及他證便斷爲熱夫
化失常完穀消化者未之有也。癲○或火性急速信
熟不穀穀然熱得濕則爲癲泄也。癲○暴瀉非陽
久瀉非陰癲○通治用三白湯燥濕湯益元散敗財

瀉

固腸丸治泄痢日久滑數瘦弱以此澁之龍骨附子
炮枯白朮各一兩。丁香良薑赤石脂各一錢右爲末。
白豆蔻縮砂各五錢木香三錢右爲末。
醋糊和丸梧子大栗米飲下三十丸。

三白湯甘草一錢治一切泄瀉。白朮一錢半。白芍藥各一錢半。
白朮二錢甘草灸五分。右剉作一袋。白芍藥各一錢半。
白朮二錢白芍藥各一錢半。白朮二錢白芍藥各一錢半。
白朮二錢白芍藥各一錢半。白朮二錢白芍藥各一錢半。

瀉之要
藥也門

燥濕湯治諸泄瀉。白朮二錢白朮各一錢半。
陳皮一錢甘草灸五分。右剉作一袋。白芍藥各一錢半。
煎服。○此名芩芍藥湯皮。○一名芩芍藥湯皮。
煎服。○此名芩芍藥湯皮。

濕泄

即濡泄也亦名洞泄其證如水傾下腸鳴身重腹不痛也○左傳曰雨滛腹疾是也○寒濕傷於脾胃

胃不能腐熟水穀故洞泄如水謂之濡泄○濡泄加草豆蔻主之○濡瀉身痛五苓散加羌活蒼朮得水穀不能化清濁不分是濕泄也○濡瀉也○濡瀉

水穀一時併下宜五苓散○大渴引飲因致水穀一時併下宜五苓散○洞泄宜瀉濕湯衛生湯萬病五苓散○洞

麥芽丸治風濕滑泄神麥芽白朮附子炮各等分

麥芽

右爲末麴糊和丸梧子大空心來飲下三五

十丸○左傳云麥芽能除濕若脾濕而泄者萬無不中亦治飧泄

瀉濕湯

治洞泄白朮炒三錢白芍藥炒二錢陳皮炒

錢半升麻五分右剉作一貼水煎服之○此劉草齋

煎服之○此劉草齋治洞瀉各一錢黃連甘草各五分右剉作一貼

寄生湯

治洞瀉各入參白朮白茯苓山藥陳皮薏苡仁空心水入

萬病五苓散

治濕泄瀉鴻水多而腹不痛腹響雷鳴脉
細赤淡黃白朮豬苓澤鴻山藥陳皮蒼

五味縮砂炒肉豆蔻一貼入薑二片梅一箇燈心一團空訶子煨各八分桂皮甘草各

心服之水前春

風泄

惡風自汗或帶清血由春傷風夏感濕而發動故其濶暴隙○風邪入於腸胃故大便不聚而濶搐

內縮瀉宜桂枝麻黃湯汗之。昉纓瞼門風。

門風邪

寒池

惡寒身重腹脹切痛雷鳴澀清冷完穀不化宜中湯加赤茯苓厚朴或治中湯黠門加縮砂門

○協寒自利不渴曰鷗。鷗一名鷁。塘亦曰鷁。漚下謂白如

溫中散寒。或平胃散。五坊散。○寒泄須早晩服藥。蓋平朝服緩藥。觀合理中湯。門。○寒泄宜因。

所以夜樂力已盡無以敵一也。明氣

附子溫中湯

薑炮各一錢半入參白朮白芍芩白芍泄瀉水穀不化附子炮乾

藥甘草灸各一分右剉作一錢厚朴草豆蔻煅陳皮

各六分右剉作一貼水煎空心服

附子炮各一錢二分半右

冷痛大便滑泄耳鳴頭暉

心腹各一便滑泄耳鳴頭暉

目瞓皮

四柱散

治元藏虛苓人參

附子炮各一錢二分半右

冷痛大便滑泄耳鳴頭暉

心腹各一便滑泄耳鳴頭暉

目瞓皮

鹽剉少許水煎入薑三片棗二枚

空心溫服

渴

渴

渴

六柱散

治元藏虛苓人參

附子炮各一錢二分半右

冷痛大便滑泄耳鳴頭暉

心腹各一便滑泄耳鳴頭暉

目瞓皮

暑泄

煩渴尿赤暴瀉如水宜薷苓湯加白芍藥車前子

渴自汗香薷散

渴自汗香薷散

渴自汗香薷散

渴自汗香薷散

前子八陳米炒百粒烏梅一箇燈心一團同煎服

渴自汗香薷散

渴自汗香薷散

渴自汗香薷散

渴自汗香薷散

○暑泄宜芩白术清暑益氣湯

○暑泄宜芩白术清暑益氣湯

○暑泄宜芩白术清暑益氣湯

○暑泄宜芩白术清暑益氣湯

○暑泄宜芩白术清暑益氣湯

薷苓湯

治夏月泄瀉欲成痢澤瀉一錢二分猪苓赤

苓白术香薷黃連薑汁炒白萹豆厚朴製

苓白术香薷黃連薑汁炒白萹豆厚朴製

苓白术香薷黃連薑汁炒白萹豆厚朴製

苓白术香薷黃連薑汁炒白萹豆厚朴製

各一錢甘草三分右

各一錢甘草三分右

各一錢甘草三分右

各一錢甘草三分右

各一錢甘草三分右

桂苓甘露飲

治傷暑煩渴泄瀉石膏或霍亂吐瀉滑石

桂苓甘露飲治傷暑煩渴泄瀉石膏或霍亂吐瀉滑石

桂苓甘露飲治傷暑煩渴泄瀉石膏或霍亂吐瀉滑石

桂苓甘露飲治傷暑煩渴泄瀉石膏或霍亂吐瀉滑石

兩白術肉桂猪苓各五錢右爲細末每二錢
熟湯冷水任下入蜜少許尤好薑湯尤妙冊

麴术元

治

傷暑暴瀉神麴炒蒼术製各等分右爲末糊和丸梧子大空心米飲下三十五十九丸

清六丸

治

濕熱泄瀉益元散和九丸梧子大空心白湯半兩
右爲末陳米飯和九丸梧子大空心白湯半兩

丸五

丹

十

通芩散

治

暑濕泄瀉芩木通茵陳解煩熱澤瀉白术猪苓
茶前子各一錢右燒

門冬

作一貼

入燈心一團麥

火泄

即熟泄

也口乾喜冷痛一陣瀉一陣其來暴速猪苓
黃連香薷散解渴一陣瀉一陣加白芍藥梔子

炒門下

赤色小便赤澁煩渴脉數宜萬病四苓散重如
滯瀉○腹痛瀉水腸鳴痛一陣瀉一陣者

是火四苓散

加木通滑石黃芩梔子

萬病四苓散

治

山藥熟瀉赤茯苓白芍藥炒梔子陳皮各一錢甘
草

草一錢五分右剉作一貼入烏梅一箇燈心一團同煎服

四苓散即五苓散去肉桂也

虛泄

因倦無力遇飲食即渴或腹不痛四君子湯加木香縮砂蓮肉陳糯米爲末砂糖湯調下空心

升陽

○飲食入胃即下注或完穀不化者是虛泄宜

升陽

○飲食入胃即渴水穀不化脉微

術弱

○宜參苓蓮术散春

君子湯

○氣虛泄四君子湯倍白

升陽除濕湯

○治氣虛泄鴻不思飲食困弱無力蒼朮

猪苓各七分

○陳皮麥芽炒甘草炙各

分右剉作一貼空心水煎服

參苓蓮术散

○治氣虛泄鴻人參白朮白茯苓山藥蓮

子陳皮各一錢縮砂蜜香訶子肉豆蔻

各

八乾薑炮甘草灸各

一箇燈心一分右剉作一貼

養元散

治泄瀉。鴻少食糯米一升水浸一夜宿瀉乾慢火炒極熟爲細末入山藥末一兩胡椒末少許。

其和味

旬每日侵晨用半盞再入砂糖二匙滾湯調服極佳大有滋補或加蓮肉芡仁尤好醫。

加味四君子湯

治氣虛泄。鴻四君子湯加肉豆蔻煨子炮各一錢右坐作一貼入薑三片。

滑泄

謂泄不不禁。鴻久不止大孔如竹筒直出無禁氣陷下者補中益氣湯防觀力白芍藥訶子肉豆蔻門。

八柱散

治滑泄宜固腸丸。防見禹餘糧丸木香散實腸散。

禹餘糧丸

治虛寒滑泄不禁。禹餘糧煅赤石脂煅龍骨草搗水煎服。

剉心作

一圓空心水煎服。

八柱散

治滑泄不禁。人參白朮肉豆蔻煅乾薑炒甘草炙各一錢右。

治虛寒滑泄不禁。禹餘糧煅赤石脂煅龍骨草搗水煎服。

禹餘糧丸

各等分右爲末醋糊和丸梧子大空心米飲下七十丸

冊

木香散

治藏寒滑泄米穀不化上熱下冷口瘡瘦瘁

砂厚朴各七錢半赤芍藥陳皮肉桂白术各一兩良薑縮豆蔻煨四箇檀榔一箇右爲末每三

各錢二錢半赤芍藥陳皮肉桂白术各五錢吳茱萸胡椒

猪肝四兩批開重重繆藥漿水一甕入醋少許

薑覆煮熟入鹽葱白三莖生薑殼子大同煮水欲

盡泄空心作一服冷食之夜微渴則飲粥湯

欲

微經年

滑泄與冷痢只一服效渴則飲粥湯

欲

微經年

實腸散

治虛冷泄瀉厚朴薑

研陳皮蒼朮赤茯苓各一錢半肉豆蔻

甘草各五分右坐一貼

火炮縮砂研陳皮蒼朮赤茯苓各一錢木香

水煎服

萬全丸

治久痢及泄瀉寒滑不禁赤石脂乾薑炮各

水煎服

甘草三片棗二枚水煎服

火炮縮砂研陳皮蒼朮赤茯苓各一錢木香

水煎服

飧泄

飧泄者米穀不化而吐出也○又食謂之飧以

食之糞化者尤重於之故食不化吐出者謂之飧以

心七九門

久痢及泄瀉寒滑不禁赤石脂乾薑炮各

水煎服

水煎服

水煎服

加減木香散

治癆泄水穀痢木香良薑升麻欖榔人參白术各二錢半神麴炒二錢肉豆蔻

八仙糕

治脾虛損泄渴不止
炒白朮土炒山藥各

最益老人小孩
四兩山楂肉三兩白

卷之三

二

蒸熟焙乾取食之
以湯漱口送下
芩陳皮炒蓮肉各二兩人參一兩右爲末粳米五升
糯米一升半打粉蜜三斤入藥末和勻八
錢

防風芍藥湯

治飧泄身熱脈弦腹痛而渴
藥各二錢黃芩一錢右剉水煎服

蒼朮防風湯

治久風爲飧泄不飲水而穀完出
六錢麻黃二錢防風一錢右剉作一貼

入薑七片
水煎服

痰泄

或瀉或多或少二陳湯方加乾葛白朮
神麴實者海青丸虛者六君子湯方加陳皮

泄脉沉滑宜萬病二陳湯

海青丸

治痰積泄瀉海粉一兩青黛三錢黃芩二錢
神麴五錢右爲末別以神麴作糊和丸梧子錢

大空心丸湯下
二十九門

萬病二陳湯治痰濕泄一錢縮砂厚朴木通車前子
木山藥各一錢半夏陳皮赤茯苓白朮蒼朮

食積泄

三炒甘草灸各五分右割作一片烏梅一箇燈心一團水煎服入薑

酸平胃散

煎而腹痛甚鴻後痛減臭如抱壞鷄子噫氣作服門○腹痛甚鴻後加香附縮砂草果山楂子麥芽

砂平胃散

砂散內觀去枳實加白术白茯苓○傷食

數麥芽山楂

數日乃瀉名曰攘泄宜枳术丸○有停飲食

年飲食過傷遂成酒泄骨立不能食但飲一二盃經

散加丁香縮砂乾葛麥芽神麪爲末空心米飯調

下散加丁香縮砂乾葛麥芽神麪爲末空心米飯調

血膩空心吞下二錢爲妙心得丸○傷酒晨起必通宜理中湯加生

血膩空心吞下二錢爲妙心得丸○傷酒晨起必通宜理中湯加生

散加丁香縮砂乾葛麥芽神麪爲末空心米飯調

調

香茸丸

裹和丸治酒泄乳香三錢鹿茸燎去毛酥灸黃五錢
肉蔻一兩每箇切作兩片入乳香在內麪另研右爲末陳米飯下五十丸米

脾泄

脾泄

宜泄者肢體重着中脫有妨面赤黃腹肚微滿

用蒼白朮厚朴木香乾薑生肉豆蔻葷楂。脾

泄

者食後倒飽瀉去即寬脉細宜香砂六君子湯

○脾泄多老人腎虛謂之水土同化宜吳茱萸湯

湯瀉

○脾泄久傳腎爲腸澼經年不愈者宜調中健脾丸門

○脾泄已久大腸不禁此脾氣已脫宜

急澁

○脾泄久固中丸門

○老人奉養太過飲食傷脾常泄宜

鴻

亦是脾泄宜用山楂麴丸門

○老人奉養太過飲食傷脾常泄宜

香砂六君子湯

治脾泄香附子縮砂研厚朴陳皮人參白芍藥炒蒼朮炒山藥炒各

吳茱萸湯

治脾泄吳茱萸揀爭每五錢白水煮去滓入鹽少許通口服蓋茱萸能緩膀胱水道

一錢甘草炙五分右剉作一箇水煎服

○既不能大腸自固餘藥雖

調中健脾丸

治脾泄白朮破故紙炒豆蔻煨各一兩赤茯苓陳皮炮肉早塘

子炮肉晚塘赤茯苓陳皮

各八錢黃連以吳茱萸煎水炒過七錢神麴六錢
水香厚朴茴香炒縮砂山藥蓮子各五錢右爲末

子粥丸梧

湯下七十丸

門入

蓮

固中丸

治脾久泄

梧子大空心

米飲下五

十九丸

加破

米豆蔻

火各一兩

右爲末

粥丸

梧子大空心

米飲下五

十九丸

加破

下故紙

治腎久泄

梧子大空心

米飲下五

十九丸

加破

米豆蔻

火各一兩

右爲末

粥丸

梧子大空心

米飲下五

十九丸

加破

山查麥术丸

治老人

奉養太過

飲食傷脾

常常泄

漏

半黃芩

炒白芍

藥裹燒飯

和丸梧子

大白湯

下五十丸

右爲末

炒山查肉

炒半夏

薑裹各五錢

右爲末

炒山查肉

炒半夏

右爲末

腎泄

一名晨泄

宜五味子散

每五更

塘泄

一次此腎虛感

他藥無效

此名

脾腎泄

宜二神

丸

門入

○腎虛色慾

所傷多足

宜冷矢則肉

前五鼓

神丸五味子散

門下絞痛

或只微響

○腎泄者

腹痛無次

當處似破

骨弱面黧

脚下時冷尺脉

虛弱者

是也

○脾

脾腎虛晨泄宜三神丸調中健

五味子散

治腎泄

於五更天明洞泄

一吹謂之晨

散木香爲

細米末每二錢空

心飲調下

轉

二神丸

治脾腎虛泄

破故紙炒四兩肉豆蔻生二兩

力枝生薑四兩切片同煮

同治四十丸

心去薑取棗肉八藥末和勻丸如梧子大

一方豆蔻煨

四神丸

治脾腎虛泄

又治晨泄

經年者破故紙酒

四兩右爲末

生薑切八兩大棗百枚

同治四兩右爲末

生薑切八兩大棗百枚

同治四兩右爲末

生薑切八兩大棗百枚

猪臍丸

治老人脾腎虛

浸透獐猪藏頭一截去

同治浸透獐猪藏頭一截去

同治浸透獐猪藏頭一截去

同治浸透獐猪藏頭一截去

同治浸透獐猪藏頭一截去

同治浸透獐猪藏頭一截去

同治浸透獐猪藏頭一截去

同治浸透獐猪藏頭一截去

三神丸

治脾腎虛泄

同本方

治脾腎虛泄

同本方

同本方

同本方

同本方

同本方

同本方

補脾許學士云補脾不能上蒸脾土脾胃虛寒則遲於運化飲食不進或虛脹或嘔吐或泄瀉譬如今釜鼎之中盛諸米穀若無火力雖終日不熟其何能化乎用破故紙則補腎用肉豆蔻則補脾二藥雖薰補脾腎但無斡旋若加木香以順其氣使之斡旋空虛則受

物累用見效錄

六神湯

治脾腎俱虛泄肉豆蔻火燭故紙炒白朮水煎服一錢入薑三片棗二枚空心

香薑散

治晨泄生薑四兩切如豆大黃連二兩剉右同淹一宿慢火炒薑紫色去薑不用將黃連

木香散

治脾腎泄肉豆蔻破故紙白朮白茯苓各一
愈若欲速效一料分作四服

東籬水

煎服

縮於內宜麻黃升麻湯以發之散邪於四肢布於經絡外無其邪則藏氣安矣○虛滑久不愈多傳變爲痢宜厚朴枳實湯保○久泄洞泄屬於肝經木紙肉豆蔻山藥則止丹○久泄不正用破故

泄刺宜土而成為亦是腸澼者腸中有積水也糴○久飲食不下節起居不時損其胃氣則上升精微之氣反降泄久則太陰傳少陰而爲腸澼陳○久泄

麻黃升麻湯

治風邪內

虛久泄不

厚朴枳實湯

虛滑久不愈多

傳變爲太陰傳少陰

訶子皮半生半熟枳實炒各二錢木香一錢大黃六分黃連甘草灸各四分右剉作一貼煎服保製

參术健脾丸

治久年泄

漏臍腹冷痛以此溫補脾腎

兩醋浸二兩葱白炒人參白术白茯苓山藥炒破故紙酒炒柏子仁絲子酒製蓮肉各二兩川練肉五味子牛膝各一兩半川椒炒茴香鹽炒陳皮木香遠志各五錢右爲末酒糊和丸梧子大空心

百丸 韻

湯下

除濕健脾湯

治久瀉色蒼而齒
蒼而痺倦怠食減
半蒼术炒白芍
芩白芍藥炒各一
錢

當歸陳皮各八分
升麻柴胡各五分
甘草四分右剉作一
錢

薑空心三片棗二枚
水煎服

溫脾散

治久瀉米穀不化
水穀入口即時直下
虛冷滑脫黃芪蜜炒
人參白朮土炒白芍
芩

山藥炒乾薑炮桂附
子炮黃連薑汁炒縮砂
果丁香肉桂附子炮肉豆蔻煨粟殼蜜炒草

甘草各五分右剉作一貼入

訶子散

治久泄不止訶子皮一
兩半生半熟木香五
錢黃連三錢甘草二
錢右爲末每取二錢以

白朮白芍藥
煎湯調下

泄瀉宜用升陽之藥

成暑月霖雨時人多病泄瀉乃濕多
泄故也內經曰在下者引而

竭之又曰治濕不利小便非其治也法當以淡滲
之劑利之然客邪寒濕之勝自外入裏而甚暴若
用利小便之藥則是降之又降復益其陰而重竭
其陽也茲以升陽之藥是為宜耳羌活獨活升麻
各一錢半防風甘草灸各一錢右剉水煎服即愈
大法曰寒濕之勝助風以平之又曰下者舉之正
謂此也

鴻與痢不同

泄鴻之證水穀或化或不化並無努責惟
覺困倦若滯下則不然或膿或血或膿血
相雜或腸垢或無糟粕或糟粕相雜雖有痛不痛
之異而皆裏急後重逼迫惱人赤白交下為異心丹
久泄成痢太陰經受濕而為水泄虛滑身重微滿不知
穀味久則傳變而為膿血○夫痢者皆知
由榮衛不和腸胃虛弱冷熱之氣乘虛客於腸胃
之間泄而為痢也○飲食不節起居不時損其
飧泄久則太陰傳少陰而為腸澼○夫
胃氣則上乘精微之氣反下降是為○夫
痢疾諸證古方則有清腰血所載有血溢血泄並呼為痢疾

其實一也。○痢有赤痢白痢赤白痢水穀痢膿
血痢噤口痢休息痢風寒痢濕痢熱痢氣痢虛
痢滑痢積痢久痢疫

赤痢

下痢赤痢自小腸來濕熱爲本

益元散方心丹加木通芍藥炒陳皮。

白术煎湯吞下保和丸

散地榆散門門加赤痢宜導赤地

固腸丸清六丸上方見

導赤地榆湯

治赤痢及血痢地榆當歸身酒洗各一

花炒各一錢阿膠珠

荊芥穗各八分甘

草

灸五分右剗作一貼空心水煎服

驥

加減平胃散

治血痢赤痢夫脾胃虛則血不流於四肢却入於胃而爲血痢白朮厚朴陳皮

各一錢二分桃仁人參黃連阿膠珠赤芍芩各七

分甘草九分木香檀榔各五分右剗作一貼入薑

三片棗二枚空心水煎服

地榆散

治血痢赤痢地榆赤芍藥黃連青皮各等

心丹

固腸丸

治血

痢赤痢去腸胃陳積之後用此以燥下

根

白皮焙乾爲末

粥丸梧子大空心米

後用

此以

燥下

一飲下二三十丸

此藥性涼而燥須炒用

丸瀉

未粥

丸瀉

白痢

於腸

屬氣目

大腸來

濕熱爲本

心丹

以痢爲濕熱甚寒

誤也如熱生瘡癧而成其病皆熱證也

俗以痢爲濕熱甚寒

亦多有之爲病乎况下迫窘痛小便赤澁俱甚於腸胃

心丹

以爲寒乎若以

白爲寒赤爲熱則氣赤白者乃寒熱俱甚於腸胃

點滴而下爲之爲熱明矣

九泄痢無已變作白膿者

腎蓋腎主骨髓

骨力羸弱

的見腎虛當用破

散

紙當歸木香

乾薑

肉桂之屬

白安

根白皮兩滑石

兩兩爲末

大空心米

後用此以燥下

溫六丸

治白痢

根梧子

元散一劑加乾薑

一兩

右爲

水煮木香元

治白痢及淡紅

糞

當歸白芍藥各二錢

散一

半

木香青皮陳皮甘草各一錢半右爲
末蜜丸彈子大熟水化下一丸燉

瀉白安胃飲治白痢蒼术炒白芍藥酒炒蓮肉各一
錢白术七分半人參陳皮白茯苓黃芪各一

灸各三分右剉作一貼空心水煎服
蜜炒當歸酒洗各五分木香乾薑炮甘草

赤白痢冷熱不調赤白各半宜薑墨丸乍冷不調似痢
灸各三分右剉作一貼空心水煎服

駐車元固腸湯真入養藏湯茱連丸
元固腸湯門入○赤白痢及薑疽痢乾薑炒松烟墨
糊和丸梧子大空心米飲下等

薑墨丸治赤白痢及薑疽痢乾薑炒松烟墨
糊和丸梧子大空心米飲下等

三服門
日三服丸

茱連丸治赤白痢吳茱萸黃連各二兩右以好酒同
浸三日乃各揀取焙乾爲末醋糊和丸梧子

大赤痢則黃連丸三十粒以甘草湯吞下赤白痢則各取三
茱萸丸三十粒以乾薑湯吞下赤白痢則各取三

十粒以甘草乾薑連丸
丹心一名蕡連丸

小駐車元

治赤白痢黃連三兩乾薑五錢右爲末醋糊和丸梧子大

三空心米飲下

黃連阿膠元

治赤白痢及熱痢黃連三兩赤芍芩二兩右爲末水調阿膠炒末一兩和丸梧子大

下子大空心米飲

固腸湯

治赤白痢鶯粟殼醋炒二錢白芍藥一錢半當歸甘草炙各七分半陳皮荊子乾薑各五分

分人參木香各三分右剉

真人養臟湯

治赤白痢及諸痢鶯粟殼一錢甘草九分當歸白芍藥八分木香七分荊子六分肉桂

桂剉人參當歸白芍藥肉豆蔻各三分

水穀痢

爲脾胃虛則不能消化水穀糟粕不聚變而水穀痢宜參看

膿血痢

如煩燥或先便膿後見血非黃連不止此上部也○如惡寒脉沉或腰痛臍下痛非黃芩不部

除此中部位血也。○如惡寒脉沉先見血後便膿非地榆不除。此下部血也。○膿血稠粘裏急後重皆屬於火內經曰溲澁而便膿血者言病因也氣行而血止者也。蓋溲澁而便膿血知氣行而血止者皆屬於火內經曰溲澁而便膿血者言病因也氣行而血止者也。○膿法也故曰行血則便膿自愈調氣則後重自除。芍藥湯主之。○溲澁而便膿血宜大黃湯下血稠謂重劑黃芩芍藥湯和之是謂輕劑。○膿泄亡津液而火就燥腎惡燥居下焦血分其受邪者故便膿血所謂鴻屬脾而痢屬腎也是先門紫黑色者瘀血也腹痛後重異常桃仁承氣湯防下之要知諸痢皆血瘀惟黑爲瘀甚耳門○膿血瀉宜桃花湯。○導氣湯黃連阿膠湯導滯湯地榆散解毒金花散芍藥柏皮丸赤石脂丸入參散桂條芩當歸尾各一分右剉作一貼水煎服。○

芍藥湯

治痢溲澁

而便膿血

令行血則便膿自愈調

桂條芩當歸尾各五分右剉作一貼水煎服。

此藥是也。白芍藥二錢黃連

此藥則後重自除。此藥是也。白芍藥二錢黃連

甘草各五分右剉作一貼水煎服。

此藥是也。白芍藥二錢黃連

桂條芩當歸尾各五分右剉作一貼水煎服。

此藥是也。白芍藥二錢黃連

大黃湯

治熱痢 腸血調粘 裏急後重 日夜無度 大黃

兩剉好酒二盞浸半日煎至一盞半去渣

分二次頓服以利爲度 又服芍藥湯以和之

此滌

蕩邪 熟之齊也 酒煎者欲上至頭頂外徹皮毛也

翳

黃芩芍藥湯

治下痢 腸血身熱腹痛脉洪 黃芩白芍藥各二錢甘草一錢右剉作敷黃芩白

道氣湯

治下痢 腸血裏急後重當歸黃連木香檀榔各五分

煎坐作一貼

黃連阿膠湯

治熱毒下痢 腸血或如爛肉汁黃連阿膠珠黃柏梔子各一錢二分半右剉作

煎服

導滯湯

治下痢 腸血裏急後重腹痛作渴日夜無度 白芍藥二錢當歸黃芩黃連各一錢大黃七

分桂心木香檳榔甘草各三錢
右剉作一貼空心水煎服

地榆散治熱毒下痢膿血
芩各一錢梔子五分右剉作一貼炒葛根黃芩根白芍各三錢

服莖同煎

解毒金花散治熟毒膿血
黃芩赤芍各一錢

治濕熱惡痢下膿血白芍藥黃連黃柏各二錢白朮

黃芩連黃柏各二錢

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

眼貼水煎

芍藥柏皮丸治濕熱惡痢下膿血白芍藥黃連黃柏各二錢白朮

白朮

豆蔻溫水下

赤石脂丸治下痢膿血腹痛
連當歸各二兩

赤石脂乾薑各一兩

丸下空心門入

人參散治酒毒拔熱下痢膿血腹痛久不差

人參散效

罨臍法

引熱令下行。田螺二箇入麝香少許搗爛罨臍中以帛包之。

倉廩湯

治噤口痢心煩手足熱頭痛此乃毒散黽悞加上衝心肺所以嘔而不食人參敗毒散。

連薑

一錢石蓮肉七枚陳倉米三百粒。

開噤湯

治噤口痢砂糖七錢細茶五錢研一錢。

北溫

服○外用木鱉子去殼三錢剉作一貼水煎露一宿次早面。

石蓮散

治噤口痢石蓮子搗去殼留心併肉研爲末。

借此以通心氣便覺思食仍以東壁土

炒橘皮爲末入薑棗畧煎服佐之。

解噤丸

治噤口痢黃連八兩剉生薑四兩切同炒令焦去薑只取黃連爲末陳米飯和丸梧子大

每服七十八丸赤痢陳米橘皮湯下。

橘皮湯下赤白痢陳米橘皮湯下。

納臍膏

治噤口痢危重者用之立愈王瓜藤連莖葉經霜者晒乾燒灰香油調納臍中即效。

鑑醫

休息痢丸

痢乍發乍止者名休息痢。休息痢經年不差以致氣血虛而不能斂。

八物湯動觀加陳皮阿膠珠黃連黃芩各少許脾胃虛者補中益氣湯參芩白朮散噬覲門傷○休息痢宜加味養藏湯

三根飲訶丸
勒丸神效丸

加味養藏湯

治休息痢真入養藏湯防見加附子青皮烏藥茯苓右剉薑三片棗二枚煎服

三根飲

治休息久痢如神五倍木根蒼耳草根臭櫟木根刮取白皮各等分右剉每服七錢入生

薑三片大棗二枚黑豆三十粒
糯米四十九粒空心同煎服

訶黎勒丸

治休息痢百藥不效檸檬根白皮二兩訶子肉五錢母丁香三十粒右爲末醋糊和丸

梧子大陳米飲入醋少許梧子下五十丸日三轉

神效丸

治休息痢膿血不止疼痛困弱當歸烏梅肉黃連阿膠珠各等分右爲末蜜丸梧子大空

心丸 厚朴湯 下三十五十

門

風痢

風 湿惡風鼻塞身重色青或純下清水宜蒼朮防

門上○風痢所下似痢非痢似血非血宜

宜倉廩湯 方觀效○風痢

宜胃風湯

方觀效○風痢

露宿湯

治風痢純下清血杏仁去皮尖七箇苦木瘡

皮根烏梅一箇草果一箇酸石榴

大卿皮

二箇甘草一寸右剉作一

掌大卿皮

三箇甘草一寸右剉作一

箇甘草一寸右剉作一

箇甘草一寸右剉作一

寒痢

寒痢白如鴨塘腸鳴痛墜不甚宜理中湯加

薑子肉豆蔻日久者黃連補腸湯

星一宿次早空心服

寒痢宜赤石脂散

黃連補腸湯

治大腸虛冷痢下青白黃連四錢赤芍

芩川芎各三錢酸石榴皮五片地榆五

錢右剉八錢

伏龍肝二錢

空心水煎服

門

赤石脂散

治赤石脂散赤白腸滑肉豆蔻煨一兩縮砂五

錢半右為末每二

錢

錢

錢

錢

赤石脂散

治赤石脂散赤白腸滑肉豆蔻煨一兩縮砂五

錢半右為末每二

錢

錢

錢

錢

錢

錢粟米
調下
得
飲

濕痢

濕痢宜當歸散。如黑豆汁或赤黑豆汁，或黑澤湯。下痢如黑豆汁，或赤黑澤湯。此危證。
藏故有五色之相雜，當先通利此逆而奪之之義。

心丹也

加味除濕湯

治傷濕下痢如黑豆汁。夏厚朴蒼朮各一分，香陳皮赤茯苓各七分。

戊己丸

治濕痢黃連吳茱萸白芍藥各等分，右爲末。

熱痢

熱痢寒面垢或面如塗油齒乾煩寃燥渴引飲皆暑證。

○其冷熱蘊積腸胃間滑泄垢膩者名腸垢即

熟痢也。○偏熱純赤見暑證輕者黃芩芍藥湯。

重者導滯湯日久者黃連阿膠湯門。○挾熟下痢湯。

○者身熱口渴小便澁少大便急痛所下黃赤色門
○熟痢黃芩芍藥湯最妙門○下痢壯熱須用倉
○下痢欲飲水有熱故宜白頭翁湯助
○熟痢宜烏梅丸寧胃散加當歸防見

烏梅丸 治熱積癆腹痛下純血黃連一兩半烏梅肉當歸枳殼各一兩右末醋糊和丸米飲下七十

心丸
心丹空

寧胃散 治赤白熱痢
殼各一錢半 陳皮一錢 甘草炙五分 右剉作
藥二錢 黃芩黃連木香枳

一貼水煎服
藥湯 膜一名

氣痢 氣痢狀如連丸，坊見蟹潮，拘急獨甚，宜牛乳湯。

氣痢丸 治氣痢狀如蟹湯
右爲末蜜丸梧子大空心米飲下三十丸入門
牛乳湯 治氣痢草根搗二錢剉牛乳半升右同煎減半
空心服之○唐太宗苦氣痢半升有齧

之士即進愈此說曾方明

虛痢

(氣弱困倦，穀食難化，腹微痛或大痛並無努責，入

○滑痢與虛痢同，虛滑不禁甚。

則氣血俱脫，血虛

湯四物湯

○加人參白朮地榆，白皮氣虛，真人養藏

桂枝厚朴

○赤芍苓門，如力倦自覺氣少惡食，此爲

挾虛證

宜用補氣血之藥，虛廻而痢自止。

○痢

○方疾日久氣血虛弱，宜用八物湯

○瘀澀中益氣湯

○氣虛加味香連丸

○擇用之，虛者脉細，皮寒氣小泄利，前後

○飲食不入是也，如

○漿粥八胃泄注止，則虛證危困

○調中理氣湯

○治虛痢氣弱困倦，白朮枳殼白芍藥，七分

木香五分

○右剉作一貼水煎

服此治痢調理之劑也。

加味香連丸

○治虛痢及久痢，一切諸痢，黃連四兩以

○錢右爲末，陳米糊和丸，菉豆大每二三十丸。

○以蓮肉煎湯吞下，被蓋就睡，奏效神矣。

大斷下丸

治久痢 滑數消瘦 困弱 龍骨附子 炮白藜各
枯肉豆蔻煨牡礪煅 詞子皮酸石榴皮各

一兩良薑乾薑赤石脂各七錢半細辛三錢七分
半右爲末醋糊和丸梧子大粟米飲下三十丸

訶子皮散

治虛寒 赤白痢脫肛御米殼蜜炒橘皮各
乾薑炮六分訶子皮七分右爲末作

一心和貼水煎空心和渣服陳

積痢

積成痢色黃或如魚腦漿腹脹痛惡食門無積不
欲出氣滯○痢出於積滯積物積也滯氣滯也物積不

日夜冗百餘度人有此證不出所以下墜裏急乍起乍止

小一皆以通利行之○飲食傷飽者注下酸臭

諸有一積者以肚熱纏痛推之○傷積滯則糞白

有功效○食積痢宜保和丸

附方

感應元

治積痢久痢赤白膿血相雜肉豆蔻煨曰薑

百草霜各二兩木香一兩半革澄茄三稜仁炮丁香各一兩巴豆百粒去皮尖瓣仁炒另研酒煮藥四兩清油

令一兩右七味爲細末入巴豆杏仁末先將油前蠟化拌和藥末成劑每一分作十錢每一錢
大來飲調服或作丸叢豆白湯吞下十丸蠟

蘇感元

治積痢腹內緊痛麝香蘇合元勦四分感應元六分研勦九叢豆大米飲下三十丸蠟

生熟飲子

治大人諸痢及小兒虛積痢日夜無度
粟粃大人者四箇去瓢帶半灸半生陳皮二

片半生半炒甘草二寸半生半灸烏梅二箇半生

半片半生半炒甘草二寸半生半灸烏梅二箇半生

半片半生半炒甘草二寸半生半灸烏梅二箇半生

半片半生半炒甘草二寸半生半灸烏梅二箇半生

半片半生半炒甘草二寸半生半灸烏梅二箇半生

半片半生半炒甘草二寸半生半灸烏梅二箇半生

久痢

瘧藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯下固腸丸三十粒然此丸性燥若滯氣未盡不可遽用冊○久痢體虛氣弱滑泄不止當以荳蔻肉豆蔻白朮半夏

等藥澁之甚者添牡蠣須以陳皮爲佐恐太澁亦能作疼也○久痢不止服理中湯益甚此痢在下焦赤石脂禹餘糧湯主之坊見理中者理中焦用此以固其下焦故也主仲○久痢宜大斷下元萬全丸見坊眞人養藏湯木香散

木香散

錢治久痢

及血痢炒鶯粟殼生薑各五錢

木香黃連各五錢

同炒右爲末

木香黃連各五錢

同炒右爲末

木香黃連各五錢

實腸散

加減益氣湯

少許空心米

木香散

全麝香少許

木香散

全麝香少許

木香散

全麝香少許

木香散

加減益氣湯

治久痢

波弱甚不能起床

白朮白芍藥當歸七分

甘草白朮各一分

砂地榆各五分

麻木香白豆蔻

御米穀人參澤鴻

鴻鴻當歸七分

白朮白芍藥當歸七分

樗白皮散

治久痢

諸藥不效

擗根白皮一握

甘草一寸

豉米一合

豉米一合

豉米一升

實腸散

治久痢

不分成赤白

用此藥換出

黃糞來山藥

實腸散

炒一兩

炒黃米一合

右爲末用砂糖調

熟湯

頓煮

取半升

得

和勻藥末適稀稠漸漸服

清米湯漱口

最效調

疫痢

當察運氣之相勝以治之

一方長幼相似是疫毒痢也

曰疫痢人參敗毒散

薑茶湯以加陳皮

門加陳皮

薑茶湯

治痢疾腹痛老生薑春茶葉等分煎服

同煎服

解之不問赤白冷熱疫痢去薑皮

腹痛通用

鹽症痢

久痢不已毒氣餌於藏府下血如雞肝雜膿

鹽發

者名曰鹽症痢癲

○鹽症痢下黑血如雞肝發

鹽發

渴五內切痛此因服五石湯丸所致

其血自百脉

經絡而來以薑根丸救之

元薑墨丸

茜根丸

治鹽症痢薑根犀角升麻地榆當歸黃連枳殼白芍藥各等分右爲末醋糊和丸梧子大

七米十丸

飲下五

羚羊角元

治蠱症 痢黃連二兩 黃柏一錢 羊角鏘各一
兩半白茯苓一兩 右為末蜜丸梧子大茶

清下五七丸

五色痢

痢疾 五色俱下乃脾胃食積及四氣相併以榮
連丸救之門○脾胃爲水穀之海無物不受常

無四藏故痢有五色之相雜

當先通利心丹○濕毒

甚盛下痢腹痛大便如膿血或如爛肉汁宜地榆

秘方養臟湯

治五色痢 阿膠湯絲瓜散活人丹○五色痢宣

服黃連阿膠湯

養藏湯絲瓜散

神效參香散

立效

絲瓜散

治五色痢及酒痢便血腹痛乾絲瓜

驗一皮燒灰爲末酒調二錢空心服

神效參香散

治下痢五色交繚口渴鹽時疫諸痢
鶯粟殼各一兩二錢肉豆蔻赤茯苓陳

各四錢白扁豆人參木香各二錢
右爲末每三錢空心米飲調下

八痢危證

一曰食積赤二曰冷白三曰冷熱相加赤白四

時行有血五曰驚青六曰脾虛不化七曰

曰熱不調積下赤白四曰疳痢白積二

曰

曰熟瀉赤積三曰疳即攘瀉

一曰冷熱不調積下赤白四曰疳痢白積二

曰黃白積或見五色五曰驚瀉青積不臭六曰休息

曰驚瀉青積不臭六曰休息

曰小駐車丸真人養藏湯門○防漏用

上

痢疾腹痛

下痢腹痛者肺經之氣鬱在大腸之間實者

用參芪心丹○下痢腹痛不可

白朮為佐惡寒者加桂惡熱者加黃柏心丹○或食

粥及肉稍多作痛宜以白朮陳皮煎湯服之且宜

奪食奪食者減其粥食絕其肉味也心丹○下痢膿

血腹痛不止調胃承氣湯加薑棗煎服

以五苓散煎水益元散調下○痢疾腹痛宜香連

丸薑茶湯方

神效越桃散

香連丸

治赤白膿血下痢腹痛及一切諸痢黃連一兩吳茱萸五錢水浸一宿同炒去茱萸木香

二錢半右爲末，空心米飯下二三十九丸梧子。治下痢腹中滿痛，不可忍。此名陰陽反錯，不和之甚。大梔子仁良薑各三錢，右

下爲末，米飲調。

痢疾裏急後重，裏急窘迫急痛是也。後重者，大腸墜重而急，速而不宣，通也。有因積滯壅盛者，是也。有因氣滯者，此大腸氣降而不能升也。有血虛者，謂虛坐努責是也。治法火熟者清之，氣滯者調之，積滯者去之。氣虛者升之，血虛者補之。○後重者本因邪壓，大腸而墜下，故大腸不能上升。而重用大黃、檳榔、輩瀉其所壓之邪。今邪既瀉而其重因在者，知大腸虛滑不能自收，而重用御米殼等瀉劑。固其滑收其氣，亦愈也。○下墜異常，積中有紫黑血，而又痛甚，此爲死血。用桃仁泥滑石行之。○後重窘迫當和氣，宜木香、檳榔、○自古治裏急，後重，但用木香、檳榔、○自古治

溪始用桃仁滑石活血其效如鼓應桴。行血和積少但虛坐努責此爲止血證倍用當歸身尾却以生地黃生芍藥生桃仁佐之陳皮和之者腹中不寬快也虛坐而大便不行虛也後重者虛氣墜下也。

痢疾大孔痛

連加炒乾薑煎服。○下痢大孔痛因熱流于下用木香檀榔。

病緩之身冷脉沉小宜溫之如暴病溫之一曰清之如久孔開如空洞用葱椒末燭之。○下痢大便不禁大固腸之劑如御米殼訶子皮之類收之。○下痢飲中急取令乾紙裹安痛處以入參當歸陳皮濃煎訶子燒烟。

痢疾宜下

因通用之法用大承氣湯或調胃承氣湯此下通

後看氣血調理五日後不可下脾胃虛故也。此亦大槩言之氣血弱者雖一二日不可下實者。十餘日後亦可下之。○下痢腹滿爲實當下之。○下痢脉反滑者當有所去下之乃愈。○下痢已差至其年月日時復發者以病不盡故也。當下之宜大承氣湯。○仲景治痢可下者悉用承氣之溫等湯加減。○大黃之寒其性善走佐以厚朴爲佐用之於下痢清白者猶可其裏急後重經所謂以下迫者皆屬火熱所爲。○加以下瀉熱非殺之而何。○瀉

治療要訣

行血則便。○膿自愈。○調氣則後重自除。○下痢治法曰後重者宜下木香檳榔。○又木香檳榔。○鷄矢丸。○腹痛者宜和芍藥陳皮。○又芍藥甘草湯。○肚腹覬。○身重者除濕。○芩澤瀉。○又五苓散。○腹冷。○膾血。○脈弦者去風。○秦艽防風。○又敗毒散。○腹冷。○膾血。○自汗者以熟藥溫之。○附子乾薑。○又漿水散。○葛根。○又麻黃升麻散。○風邪。

脘門○鴆○鷺塘爲痢者宜溫之肉桂木香又水煮木香
 利涌之○在下者竭之身表熱者內疎之小便澁者分
 淋○治痢藥法色黑色黃色紫色紅黃芩色淡
 生薑○治痢藥法色黑色黃山楂水泄粟殼痛甚木香梔子
 氣湯○凡痢之初宜立效散一服即愈或用木香導
 用勝熱告以藥濕微加辛熱佐之以爲發散開通之
 固無不效矣○痢疾宜以阿膠珠當歸青皮
 獥亦焚岑黃連作劑入烏梅澤蜜同煎最能蕩滌惡
 行滯氣○開胃脘爲先不可遽用豆蔻荳子白术輩
 積滯既去則遍數自疎矣○大要以散風邪
 以補住邪氣及栗殼龍骨牡蠣輩以閉滌腸胃必
 為日久淹延之疾待其腹痛後
 重皆除然後乃用鬱下之藥

立效散
 治赤白膿血痢腹痛裏急後重一服立止黃
 粢麩炒二兩右爲末每三錢空心黃酒送下
 此治熱積氣滯之痢黃連清熱枳殼破氣醫

木香道氣湯

治痢初起腹痛裏急後重赤白相雜發熱口大黃一錢半白芍藥朴硝黃連

各一錢二分厚朴檳榔各一錢當歸尾
赤茯苓各八分右剉作一貼水煎服

痢疾通治藥

或下痢疾諸證臍腹病痛或下鮮血或下瘀血

黑豆汁或如魚腦或如茅屋漏水皆裏急後重

欲登廁日夜無度通用水煮木香膏六神丸香連

丸方見加味香連丸白朮安胃散百中散和中飲

湯簡斷下湯寧胃散助以救命延年丸○瘧後痢

黃連木香湯

水煮木香膏

治一切諸痢鶯粟殼蜜炒三兩縮砂肉豆蔻煨乳香各七錢半木香丁香調子

藿香當歸黃連厚朴陳皮青皮白芍藥甘草灸各五錢枳實乾薑炮各二錢半右爲末蜜丸彈子大

水一分盛去棗和滓服

細至同煎

六神丸

治諸痢要藥黃連

麥芽炒各等分

右爲末神曲根赤茯苓神曲子大炒

每五七十九丸赤痢甘草湯下白痢乾薑甘草湯下入門

加味香連丸

治諸痢之總司也黃連炒二兩吳茱萸

肉加乳香

丸梧子大每三十丸

泡藥各一錢右爲末

烏梅水

炒一兩木香一錢白豆蔻

燂一錢黃連炒二兩吳茱萸

加黃連炒二兩吳茱萸

白术安胃散

錢治一切鴻瘱無問

赤茯苓白术

前子各一錢

蜜炒二錢

蜜炒二錢

烏梅肉各五分

右剉

作一貼水煎服

心

三服便愈

蜜

百中散

治一切痢無問

赤色厚朴薑

製各二兩半右爲末

每二三分

錢空心米飲

調下

和中飲

治痢無問

赤白久近無不效

但發熱噤口者

炒一錢半陳皮白术

赤茯苓

芩赤芍藥各一錢

砂糖三錢烏梅一箇右剉

作一貼薑三片

陳倉米二錢草果仁七分甘草

桑白皮一錢

煎二服

水

易簡斷下湯

治一切痢，尤治虛滑，痢，鶯粟殼十四枚，去筋膜，帶夢，剝醋淹炒，搗爲末，白术。

赤茯苓各一錢

甘草灸五分，草果一分，一箇連至一皮剝右

作一貼水一椀

甘草七片，棗七箇煎至一盞分

薦

服

黃連木香湯

治瘧後痢疾，白芍藥炒二錢，白术一錢，半黃連炒木香縮砂研黃芩炒陳皮當歸

救命延年丸

治男女人一切重病，黃連乾薑當歸阿膠

歸酒洗各一貼

甘草五分，右薑三片水煎服，橘子大每三

消化和凡梧子大每三

五分，右薑三味爲末以醋煮阿膠令膠

泄痢易治難治辨

太陰脾經受濕而爲水泄，少則傳變而爲膿血痢，是脾傳腎謂之賊邪，故傳變

難愈若先痢而後渴是腎傳脾謂之微邪，故易

易愈○下泄脉大手足寒難已，脉小手足溫易已，繩愈

○下痢有微熱而渴脉弱者自愈○下痢脉數有

微熱汗出，今自愈繩止

泄痢吉凶證

下痢手足溫易治。手足寒者難治。下
嘔發呃煩躁身熱者難治。

醫鑑

下痢半生半死。○下痢如魚腦髓者半生半死。○身熱脉大
筒者死。○唇如朱紅者死。○下如茅屋漏水者死。○大孔開如竹
筒純血者死。○下痢如塵腐色者死。○下
生此是熱則死。○身寒則生。○內經云身熱則死寒則
不寒死者乎乎。○大槩言之必無證詳之方可。豈無熟生寒而
不溫若脉不還反微喘者死。○下痢手足厥冷無脉者灸之。
厥冷而滿時脉還手足溫者生。脉不還者死。○下痢脉絕手足
一死。○腹大而脹四肢清而泄其脉大是逆也。不過十五日腹
無體熱多汗渴甚小便不利或手足厥冷灸之不及
不得眠。○泄瀉不止無脉及自利不禁身熱脉實者皆
死。○泄瀉久不止手足寒脉虛脫煩躁發呃氣急者皆
短脉大視目直身熱冒不識人皆死證也。○發渴咳逆。○痢不治五色證



噤口○紅水○唇紅○手足冷○氣喘○○下痢後煩渴欲飲爲心絕○小便絕不通爲胃絕○○下痢小便不通或絕無者此毒氣併歸一藏胃乾者死○○小兒之痢重傷胃氣全不飲食名曰噤口○肛門寬大深黑可畏腹肚疼痛裏急後重鮮血點滴名曰刮腸日夜頻併飲食直過名曰滑腸皆爲惡候繙不治○○小兒痢穀道不閉黃汁長流者死編

飯後隨即大便飯後隨即大便者蓋脾腎交濟所以有食下咽而大府爲之飧泄也治法取二神丸空心鹽湯送下使脾腎之氣交通則水穀自然剋化此所謂妙合而所疑者也

大便祕結腎主五液津液潤則大便如常若飢飽勞役少故大便結燥又有年老氣虛津液不足而結者經日腎惡燥急食辛以潤之者是也○脉有陽結實名曰陽結也以別之日脉浮而數能食不大便此爲陰結者何期十七日當剗脉沉而遲不能

食

身熱體重

燥風燥陽

結陰結經

曰結期

十四日當

劇陽

當

劇

景仲

宜結者

散之散

疏丸丸

燥結者

溫之陽結

便祕

宜大黃牽牛

散

陰

結

陰津液

不足以辛潤

可一槩論

有實秘有虛秘

實而秘者能飲

小便有虛

有糞以苦泄

少

之門入藏府

之秘不可

見者宣丸主

之胃實而秘者能飲

小便有虛

有糞以苦泄

少

食小便清利厚

朴湯主之

腸胃開結

軟堅如大黃芒硝枳實

之證有虛

有糞以苦泄

少

燥散結

氣湯之類是

也當歸地黃

桃仁麻仁條

養陰血潤

之類

當以氣血潤

少

是也

則便難

行陽氣也

宜用杏仁俱治

大便秘當以氣

血分之畫

陰血也

當用桃仁

老虛人大便

燥秘脉浮在氣

杏仁仁陳皮

俱用陳皮者

以手陽明

脉沉在血桃仁

陳皮

與手太陰俱爲表裏也

通之氣燥以杏仁枳實

通之風燥以桃子仁酒加大黃

之藥以郁李仁皂角仁潤

丸

活血潤燥丸潤之血

之藥

大黃

黃利之氣澀

宜疎風潤腸丸

活血潤燥丸潤之血

之藥

大黃

通之氣澀以杏仁枳實

通之風燥以桃子仁酒加大黃

之藥以郁李仁皂角仁潤

丸潤之血

○燥湯宜潤腸丸潤腸湯當歸沉沉丸五仁丸小麻仁丸通風潤腸丸三和湯四磨湯六磨湯○氣滯參仁丸搜婦人秘結宜通神散大磨仁丸

大黃牽牛散

治相火遊走藏府大便祕結大黃一兩黑牽牛子頭末五錢右爲末每三錢手足

半硫丸

研極細以柳木槌搗過右等分薑汁浸蒸餅大便祕溢半夏薑製爲末硫黃

七宣丸

治熱留腸胃大使祕結大黃一兩
子皮各五錢桃仁十二箇右爲末蜜丸梧

守夫溫水下

五十丸

厚朴湯

治大便虛秘白朮二錢厚朴一錢三分陳皮草各一錢半夏麴九分枳實八分右剉作

二枝貼水煎服

薑三片

棗

當歸潤燥湯

一名潤燥湯 黃熟地 桃仁 治血燥大便秘

地黃升麻各七分 紅花二分 左剉先取七味作一貼煎至半空心服

疎風潤腸丸

治風熱鬱滯大便閉澀乾燥須潤燥和

仁二兩 皂角燒存性一兩 三錢 右爲末蜜丸梧子大白湯下五兩

丸七十粒

皂角元

專治風入大便秘 澄羌活 防風猪牙皂角枳殼桑白皮 檳榔 杏仁 麻仁 白芷 陳皮各等分

右爲末蜜丸梧子大溫湯下

活血潤燥丸

治風秘血秘 大便常常燥結此與上潤腸丸同但皂角用仁

潤腸丸

治大便秘 澄杏仁枳殼麻仁陳皮各五錢阿膠珠防風各二錢半 右爲末蜜丸梧子大每阿

五十丸老人蘇子湯 下

五十丸老人蘇子湯 下

潤麻丸

當歸根各一兩，右爲末，蜜丸梧子大白湯。

正傳名潤體丸。

蕤沉丸

一名蕤蓉二兩沉香一兩，右爲末，用麻仁汁打糊。

丸和空心梧子大吞下。

五仁丸

一名滋腸丸治津液枯竭大便祕結婦人產後便祕尤宜橘紅四兩另爲末，桃仁炒杏仁各一兩，柏子仁五錢郁李仁炒二錢松子仁一錢二分半右各另研爲末，蜜丸梧子大空心米飲。

下丸得七

小麻仁丸

治血燥大便祕，結與上潤麻丸同服。

通幽湯

泥當歸身各一大錢，難宜以辛潤之升麻桃仁半生地黃熟地黃各七分。

灸甘草紅花各三分，右剉作一貼水煎去滓調檳榔細末半錢服。

和血潤腸湯

治大便燥結不通升麻桃仁麻仁各一錢半大黃熟地黃當歸梢各七分生地

參仁丸

治氣壅大便秘麻子仁大黃各三兩人參七錢半右爲末蜜丸梧子大空歸心

搜風潤腸丸

治三焦不和氣不升降胃腹痞滿大便祕瀉郁李仁一兩木香檀榔青皮陳皮

三和湯

治氣滯大便祕散也

四磨湯

治氣滯大便祕瀉大檳榔沉香木香烏藥右

心溫服空

六磨湯

治大便秘滯有熱者大黃枳殼如上法濃磨汁服

通神散

治婦人大便不通
一兩木香五錢右爲末每二錢米飲調下

大黃

芒硝

桃仁

郁李仁

各

大黃

巴豆

硝

桃仁

大麻仁丸

治婦人風秘木香檳榔枳殼各一兩

大黃炒各三錢

右爲末蜜丸

梧子大空心

大黃

芒硝

桃仁

郁李仁

各

老人秘結

老人藏府秘結不可以用大黃以瀉之津液皆去定須

大黃

以瀉

之津液

老人

藏府

之藥

更用槐花煎

湯淋洗肛門亦效

得

再秘甚於前只可服滋潤大腸之藥

更用槐花煎

湯

淋洗

肛門

亦效

得

踈風順氣丸

治腸胃積熱二便燥澀諸風秘氣

大黃酒蒸晒七次

黃芪湯膠蜜湯蘇

血蛤脂麻汁爲妙

老人秘結尤宜

大黃酒蒸晒

山藥山茱萸各二兩

枳殼

麻子仁

大黃酒蒸晒

五兩車前子炒二兩半郁李仁檳榔

大黃酒蒸晒

山藥山茱萸各二兩

枳殼

麻子仁

大黃酒蒸晒

山藥山茱萸各二兩

枳殼

麻子仁

免絲子酒製牛膝酒洗山藥山茱萸各二兩

枳殼

麻子仁

大黃酒蒸晒

山藥山茱萸各二兩

枳殼

麻子仁

大黃酒蒸晒

山藥山茱萸各二兩

枳殼

五兩茶酒米飲任下此藥專治大便秘澁真

良方也

久服精神康健

得

良方也

久服精神康健

得

良方也

久服精神康健

得

百病方生尤宜老人

康健

得

小自角元

治風秘尊年入宜服皂角灸枳殼各等分
爲末蜜丸梧子大朱飲下七十丸燙得

二仁元

治老人虛人風秘梧子大溫水下五十丸燙得
等分右爲末蜜丸梧子大溫水下五十丸燙得
杏仁麻仁枳殼阿子肉各

橘杏丸

治老人虛人氣秘服之大便自無澁滯橘皮
杏仁各等分右爲末蜜丸梧子大朱飲下七十丸燙得

便丸。此治晝便難若夜

黃芪湯

治老人大便秘黃芪陳皮去白各五錢右
爲末另取麻子仁計一盞於銀石器煎候有

乳心起即服之不過兩服效

一大匙再煎令沸調前藥末三錢常服即無秘
之患

膠蜜湯

治老人虛人大便秘連根大葱白三莖新
水一盞煎葱爛熟去之入明阿膠珠二錢蜜

二匙攬令燙

蘇麻粥

順氣滑大便治老人虛人風秘血秘大便難
濕人產後便秘皆宜服之蘇子麻子不拘

多少等分同擣爛和水濾取汁粳米末少許同煮
作粥食之久服尤佳

○一老婦忽爾腹痛頭痛煮

惡心不食正 是老人風秘藏府壅滯氣聚脅中則
腹脹惡心不欲食上至於巔則頭痛神不清服此

熬粥兩啜而氣泄下結糞十餘枚

三仁粥 治大便秘結老人虛人皆可服桃仁海松子
仁各一錢右同擣爛和水瀝取

煮粥入碎梗米少許

脾約證 傷寒陽明病自汗出小便數則津液內竭大便
必難其脾爲約脾約丸主之方下脾之結燥丹溪曰
曰胃強脾弱約東津液不得四布但輸膀胱故小便
數而大便難制脾約丸以下脾之結燥丹溪曰
既云脾弱則土虧肺金受火之剋肺耗則津液
竭脾失轉輸之令肺失傳送之職宜大便秘而難
小便數而無藏蓄也理宜滋養陰血使陽火不
則肺金行清化脾土清健而運行津液則腸潤而
自通矣今此丸用之於熟甚而氣實與西北人
實者無有不安若用於東南人與熟雖盛而氣
不實者將見脾愈弱而腸愈燥矣須知在
西北以開結爲主在東南以潤燥爲功

脾約丸

一名麻仁丸治小便數大便難爲脾約證

蜜丸

一兩半
梧子大空心

溫湯二錢半

右爲末

大便不通

枳實厚朴赤芍藥各二兩麻子

大便不通

者累日不得通者常關塞而難下也。大便祕結者常乾燥而難放也。大便祕者常乾燥而難放也。大便祕者常乾燥而難放也。

胃有燥糞

三焦伏熱則

血脈枯槁

老人腸寒此風氣燭也。若氣不留

然也虛人藏冷

而伏熱則

血脈枯槁

老人腸寒此風氣燭也。若氣不留

滯大腸之

腋冷然也腹熱

腹熱則津液

老人大便不通者常關塞而難放也。

胃有燥糞

三焦伏熱則

血脈枯槁

老人腸寒此風氣燭也。若氣不留

火降而穀道

難噫逆也。腹熱

腹熱則津液

老人大便不通者常關塞而難放也。

火降而穀道

難噫逆也。腹熱

腹熱則津液

老人大便不通者常關塞而難放也。

火降而穀道

難噫逆也。腹熱

腹熱則津液

老人大便不通者常關塞而難放也。

之用津液走氣血耗雖暫通而即復秘或更生他病矣。阿膠等是也若妄以峻劑逐之則心丹○大便不通宜靈寶丹蘇感元方見潤腸湯大黃飲子老人虛人宜潤腸丸潤腸湯婦人宜通神散治宜宣積丸提盆散

脾積元

治飲食停積腹脹吞酸大便秘結蓬术一兩半三錢一兩青皮五錢良薑以醋煮切片焙

靈寶丹

治大便不通推下積滯木香沉香乳香各半錢巴豆去皮心油二錢右爲末大棗三枚蒸

依欲數喫水

如取肉和勻擣作丸如菉豆大蜜服一丸冷水送下先喫涼水三口然後用冷水送下如下

潤腸湯

治大便秘滯久不通麻子仁一盞半細研水浸絃細研水

潤腸湯治大便秘滯久不通麻子仁一盞半細研水浸絃細研水入桃仁一兩研爲泥荆芥穗一兩擣爲末和合同煎代茶飲之以大便通利爲度

大黃飲子

治熱燥大便不通
仁梔子升麻枳殼各一錢人參黃芩甘草

各五分右剉作一貼入薑五片豉
二十一粒烏梅一箇同煎服

潤腸丸

治老人血少腸胃乾燥大便閉結甚至七八天難下色如豬糞少如羊糞者當歸生地黃

枳子殼桃仁麻仁各等分右爲末蜜丸

潤腸湯

治老人虛人大便閉結蟬蜜一兩香油五錢朴硝一撮右合水一鍾煎數沸溫服

調導飲

治婦人產前後大便不通當歸川芎防風枳殼各一錢二分半甘草三分右剉作一貼入

薑三片棗二枚空心水煎服

宣積丸

治大便閉塞巴豆去皮乾薑韭子良薑硫黃遂白榔榔等分右爲末飯丸如雞子黃大

早朝先以椒湯洗手麻油塗手掌握藥粒移時便瀉欲止則以水洗手

提盆散

治大便不通草烏爲極細末葱白一枚切去根其頭上有汁濕蘸草烏末納肛門中即通

大○即霧靈箭能治小便不通呻吟

大小便不通丸太小便不通肉經謂之三焦約者不

焦約病也又曰大小便不通者陰陽關格乃三

焦約大便不通宜枳殼丸

推氣丸

治氣不升降大便通治宜迴生神膏丁香散掩臍法導便法

推氣丸

治氣不升降大便通治宜迴生神膏丁香散掩臍法導便法

薑汁煮糊和丸梧子大

淡薑湯下三十丸

三一承氣湯

滿痛熱觀○芒硝以大黃引之直入大

腸潤燥軟堅瀉熱以在下言之便尿俱陰以前後

言之則前氣後血以腎言之主大小便難夫尿

泄便秘俱爲水少經曰熟滌于內治以鹽

寒佐以苦故用芒硝大黃相須爲使也

車狗散

治大小便久不通煩滿欲死推車客七箇土

箇土如男子病推車用頭土推狗用身女子

病土狗用頭推車用身右二物新瓦上焙乾爲末以虎目樹皮向東南者濃煎湯調服即通如神藥

○樹一推車即輶轎也土狗即驥駄也虎目云虎杖恐檣木爲正

甘遂散治大便不通赤皮甘遂二兩煉蜜二合和

鐵脚丸酒治大小便不通大皂角燒存性爲末

真倒散治大小便不通或小便不通或大便不通皆

石加三錢如大便不通大黃加三錢如小便不通滑石各加三錢如六小便俱

不通道大黃滑石各加三錢如六小便俱

鑒醫

溫酒調

下

貼臍膏治大小便不通甘遂爲末麵調作糊貼臍中及臍下硬處別煎甘草湯服之以通爲度驥

倒換散治大小便不通如大便不通大黃三錢杏仁一兩右剉

水

分二服

藥

煎

蟻娘散

一名二妙散 治大小便不通 六七月間尋牛馬糞中蟻娘 不以多少用線串起陰乾收貯

以刀從腰切斷如大便閉用上半截小便閉用下

半新汲水調服即通

迴生神膏

急勿治陰證大小便不通數日危急者用之非
治陰證大便不通數日危急者用之非

末男病用牡蠣陳粉乾薑炮各一兩右爲細
出愈女病用女人唾調手內擦熱緊掩二卵上得汗

汗出愈蓋卵與乳乃男女之根帶坎離之分屬也

丁香散

治大小便不通如神苦丁香五錢川烏炮草
烏炮白芷猪牙皂角炮細辛各三錢胡椒一

錢麝香少許右爲細末用竹筒將藥吹入肛門內即通

鼈臍法

治大小便不通以白礬末一匙安臍中冷水滴
令冷透腹內即通

匙葱一二莖帶土生薑一塊淡豆豉二十粒鹽二
研作餅烘熟掩臍中以帛繫定良久氣透自

人通不^大通再換一

田螺一

二餅澣

○治大便閉結至極昏不省

人臍

○和藥生搏置病入臍

○治大便閉結至極昏不省

人臍

蕊下擣

欄寸三分用帛包繫

即大通

○按立通門

○治田螺連

○治牛膏

○治大便

○治不^大通

○治牛膏掩臍

○治大便

火灸上

大小便不通

○巴豆肉杏仁皂角

右爲末作餅掩臍

○治牛膏

○治大便

○治不^大通

○治牛膏掩臍

○治大便

枝連

○鴟搣爲泥加麝香少許貼臍中以手

○鴟牛膏治大便

○鴟膏治大便

○鴟膏治大便

○鴟膏治大便

○鴟膏治大便

○鴟膏治大便

○鴟膏治大便

導便法

諸大便不通

○老人虛人不可用藥者用蜜熬入

○蜜熬入

○蜜熬入

○蜜熬入

○蜜熬入

○蜜熬入

○蜜熬入

○蜜熬入

穀道

○取蜜七合微火煎

○如餡子納肛門即通

○蜜熬入

○蜜熬入

○蜜熬入

○蜜熬入

○蜜熬入

○蜜熬入

○蜜熬入

通取

○大便自通

○大便時去之

○蜜充法

○和醋少許灌入穀道中須

○蜜充法

○和醋少許灌入穀道中須

○蜜充法

○和醋少許灌入穀道中須

○蜜充法

通取

○大便自通

○大便時去之

○蜜充法

○和醋少許灌入穀道中須

○蜜充法

○和醋少許灌入穀道中須

○蜜充法

○和醋少許灌入穀道中須

○蜜充法

燒置

○薄荷末亦佳

○熏方治大便不通

○蜜導法火煉蜜稠厚

黃色傾

○冷水中急捻如指

○指大隨用皂角末麝香

○蜜導法火煉蜜稠厚

○蜜導法火煉蜜稠厚

○蜜導法火煉蜜稠厚

○蜜導法火煉蜜稠厚

○蜜導法火煉蜜稠厚

○蜜導法火煉蜜稠厚

○蜜導法火煉蜜稠厚

單方十九種

- 硫黃治冷鴟暴鴟等分爲末溫水調下如水硫黃滑石
焰硝治關格大小便不通蜜一鍾即通
好黃土煮三五沸去滓煖服二升
百草霜治久渴不不止取細末二錢米飲調下
草霜末二錢米飲調下
白湯吞下

○猪膽汁導法猪膽一箇傾去汁少許入用竹管相接套入穀道中以手揩之令膽汁在內射入大腸內少時即通。○香油導法用竹管蘸葱脣汁入內撚入大便不_通多日百方不效令人口含香油以小竹筒一箇套入肛門吹油入肛內病者自覺其油如蚯蚓漸漸上行片時下黑糞而安癒。○俗方以清醬油拌入肛內亦通。○蜜導非皂角則不通。○蜜或以生姜浸油。

蒼术

治傷濕泄瀉或合茯苓或合芍藥每五錢水煎服之

白术

治一切泄瀉鴻前服末服丸服並佳或合芍藥白茯苓同煎服止泄尤佳湯或合

車前草

治熱瀉取莖葉搗取汁一盞入蜜一合溫分二服鞞

車前子

治采一飲調下最妙或水煎服亦良

木香

治諸泄瀉鴻瘡皆佳煎服末服並錢或合黃連爲丸治赤白諸痢其佳

白芍藥

治酸收甘緩下痢必用之華之藥皆佳

黃連

治爲末雞子白和丸服並佳黃連三錢酒煮服或

之義岩熱痢血痢則佳冷痢則不可用

乾薑

主冷泄冷痢煎服末服並佳若血痢則燒存性爲末每一錢米飲調下鞞

土瓜根

治大便不通擣取汁以竹管吹入肚內即通

馬蘭子

治水痢熬黃爲末同白
藥等分米飲下二錢
大便不通取一握同生

萱草根

薑搗取汁服之立通
大便擣取汁服之立通
二錢
鞶

黃芩

主腸澼赤白痢及腹痛身熟與芍
藥同用煎服丸服末服並佳
醋煎空心服之鞶

艾葉

主赤白痢及腹血痢
燒末服之鞶

地榆

治痢性沉寒入下焦赤白痢及腹血痢
煎空心服三合如水瀉及白痢不可用
水瀉如暴水瀉不止取三箇麪墨煨爲末

肉豆蔻

主泄瀉如暴水瀉不止取三箇麪墨煨爲末
作一服米飲調下神效若冷痢腹痛不能食

取
米

飲
末

下

細

縮砂

治冷泄及休息痢
一錢空心米飲調下
末

大黃

通利大小便水煎服熟痢酒煎服之
欲

黑牽牛子

通利大小便如大便不通半生半炒爲末
每二錢薑湯調下如未通再以熟茶清調

下○風秘結澁微炒爲末一兩麸炒桃仁
末五錢蜜丸梧子大溫水下三十丸
草本

萹蓄

主

根擣取汁一盞服之得通即止
水邊生者爲佳

榆白皮

主

水煎空心服
草本

檳榔

通利

細末二錢空心蜜水下
又治大便不通

五倍子

治腸虛

泄調二錢服立止
以爲末
草本

訶子皮

主泄

湯調二錢服立止
爲末
草本

訶子

生用

鴻及赤白諸瀆
同爲末
水和服
草本

樗根白皮

主赤白痢

及久痢腸滑不禁取皮一握
一合
草本

欒實

空心

作丸服血痢尤神效
水煎服
草本

欒實

澁

腸止泄常服
水煎服
草本

槿花 主赤白痢作末和米飲服

或和麪作煎餅食之

蜜 治痢爲最蜜與薑汁各一合溫水和頓服

蠟 上下燒熏落水碗內如拘多用銀篦挑於香油燈上燒熏落水碗內如拘多用銀篦挑於香油燈

三十丸白烏梅湯甘草湯

下細

牡蠣粉 止大小便治遺尿不覺

牡蠣粉 白礬桔

鱉 治痢後脫肛。一人患痢月餘糟粕不實晝夜五

次又脫肛取鱉一箇治如食法用生薑米糊作

羹八砂糖一小塊不用鹽醬熟煮喫一二碗三日而愈

蓋鱉乃介蟲屬金而補肺與大腸故有效焉

傳

鮓魚膾

主久赤白痢腸澼和醋醬蒜食之。血

下或和鹽入白礬蒸熟即效

露蜂房

療赤白痢亦治大小便不通取房帶爲末

糞蛆

治噤口痢甚效取蛆焙爲末清米飲調一錢服之即效

蓮子肉

止痢又治噤口痢去皮留心爲末米飲下二錢

烏梅

溫酒調一錢服之即效治噤口痢及久痢烏梅水煎和

蜜

沃腹服或作丸服之大驗

桃花

利大便不通擣取研末水調服

桃葉

主大便不通擣取研末水調服

桃仁

治大便不通研取汁作粥服之

酸石榴殼

止赤白痢燒赤爲末來飲下二錢亦治暴瀉

榴

即斷合殼取殼取飯汁每取一合數

大麻仁

粥治大小便不通及風秘。熱秘研取汁作食之。或與蘇子取計作粥。名蘇麻粥。

生脂麻油

治熱秘。大便不通者。服一合取利爲度。

赤小豆

止泄痢。作粥和蠶食之。○赤白痢。

糯米

煮粥食甚效。○醫鑑。

神麴

時暴泄痢。熬爲末。粟米飲調下。一錢日三。

子大

丸名。大麴。術丸。細。

十

鷺粟殼

主一切痢。若日久腹中無痛。當虛腸。則去穀。炒爲末。米飲調一錢服。○此物治痢。

如目綱。

○久痢虛滑。一日百行。多令人嘔逆。或成噤口痢。乾。

爲末。即效。

名二錢米飲調下。即效。

冬葵子

治大便不通。腹滿欲死。取二升水。四升煮取一小便。八猪脂一合。調服即通。

雞腸草

主 小兒赤白痢取
一 合和蜜服之良

齊菜

爲末和米飲服極效

葱白

○赤白痢葱白一握搗爛和醋封小腹上即治大中小腸不通取白搗細切和米煮粥食之

韭菜

○治諸痢作羹如赤痢炒任食之白痢則煮食之

薤白

止久痢冷瀉常煮食之○赤白痢取白瀉和米作粥食之

獨頭蒜

○利大小便不通取一部冷則易即通

馬齒莧

○擣取汁三合和雞子白一枚和蜜一匙服

即愈或取莧煮熟入鹽醬薑醋拌勻食之

○小兒血痢取汁一合和蜜一匙服

白蘿蔔

○鍾煎取汁一鍾蜜一

亂髮

○主大中小便不通燒爲灰取一錢調溫水

日三服

○赤白痢服如上法或作丸服

一

黃雌雞

○治赤白久痢取一隻治如食法作羹常食之

或取一隻治如食法火灸鹽醋刷

食之又灸令燥空腹

雞子

○治久赤白痢用蠟一錢熔化拌勻炒食之

心食之或取黃和胡粉燒

成末酒服

烏骨雞

○治小兒噤口痢取清汁頻與服之

一隻治如食法止胃開繩

家鴨

○治久痢止食肉或作羹食之

燶飲

雉

○治久痢腸滑不下食

如食法調和作餛飩食之

牛肝

○治久痢食之

醋煮

牛角觴

○治赤白痢及冷痢

瀉血燒存性爲末

溫酒

黃雄狗頭骨

○治久痢調二錢服

息痢取腦骨灸黃爲末

狗肝

一治下痢臍腹痛

和煮粥着葱肝

一具細切米

鹽醬裹之幹

豬肝

主微火灸盡末

泄濕泄滑泄

取肝薄切搣塗

米飲送下幹○暴

豬膽

通治大便不

詳觀辨

升煮熟食之

乾空心食甚妙門

鍼灸法

藥當灸多爲滑

泄水入即泄而復飲此無

年不愈灸百會五

壯七壯○泄瀉即愈

止泄○泄瀉久泄

○灸神闕七壯

○灸天樞三壯云元

○灸中宮三壯次之生資

泄痢○灸脾俞隨年壯

○灸中宮二十一壯

○灸陰交一百壯

○灸巨虛上廉大衝

○泄瀉○灸胃俞隨年壯

○灸陰陵泉然谷三壯

○灸足少陰經脈絕

○灸腹痛漸短氣

○灸小腸俞天樞腹哀

○灸下痢腹痛便

○灸冷痢關元窮谷各灸五十

壯○裏陰急後重取合谷

○外關鍼○痢不止取合

○諸

下痢皆可灸大都五壯商丘陰陵泉各三壯
大便秘澁取照海鐵鍼五點吸太陽通支溝鐵鍼半壯吸太陽
里白涌泉環跳海章門氣海三間承山太白太鍾三壯吸太陽
大海天樞各三七壯吐止然後用益元散以利小便不
氣海○婦人產後腹脹大便不通取三間承山太白太鍾三壯吸太陽
便取氣海足三里關元三陰交陰谷三間承山太白太鍾三壯吸太陽

東醫寶鑑 内景篇卷之四