



# 東醫寶鑑

奎 貴  
7608  
I  
10

奎章閣圖書	
部別	分類記號
圖書番號	奎 1933
一部冊數	24
內別番號	10
서울대학교	

# 東醫寶鑑






外形篇四



手 足 毛髮 前陰 後陰



東醫寶鑑外形篇卷之四

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

手

手部度數肩至肘長一尺七寸肘至腕長一尺二寸半  
腕至中指本節長四寸本節至其末長四寸

半靈樞

手領肩臑肘臂腕項傍缺盆之上曰肩。肩下臂上通  
名曰臑。臑下臂上接處曰肘。肘即

臂節也。肘下掌上手名曰臂。臂有二骨。臂下掌  
上節處曰腕。又曰掌後曰腕。腕者人之管

以趨上者也。靈樞

手五指有名一指曰大指二指曰鹽指三指曰長  
指四指曰無名指五指曰小指

四肢為諸陽之本內經曰四肢者諸陽受氣於四肢也。陽盛則  
四肢實。又曰諸陽受氣於四肢也。

東醫寶鑑外形篇卷之四

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

手

手部度數

肩至肘長一尺七寸肘至腕長一尺二寸半腕至中指本節長四寸本節至其末長四寸

半

手領肩臑肘臂腕

項傍缺盆之上曰肩。肩下臂上通名曰臑。臑下臂上接處曰肘。肘即

臂節也。○肘下掌上名曰臂。臂有二骨。○臂下掌上節處曰腕。又曰掌後曰腕。○腕者人之管

以趨上者也

手五指有名

一指曰大指二指曰中指三指曰小指四指曰無名指五指曰小指

四肢為諸陽之本

內經曰四肢者諸陽受氣於本也陽盛則四肢實又曰諸陽受氣於四肢也



手掌以候胃

靈樞曰掌中熱者腹中熱掌中寒者腹中寒。魚上白肉有青血脉者胃中有寒。魚際

之。胃中寒則手魚際之絡多青。胃中有熱則魚際

寒熱氣也。靈樞曰大指本節後白肉際名曰魚。以

形似魚也。有穴名魚際。靈樞曰後白肉際名曰魚。以

四肢熱

黃帝曰人有四肢熱逢風寒如炙於火者何也

陽相得而陰氣虛少水不能滅盛火而陽獨治者不能生長也。獨勝而止耳。逢風而如炙於

火者是人當肉爍也。納

四肢不用

黃帝曰脾病而四肢不用何也。岐伯對曰四

稟也。今脾病不能為胃行其津液。四肢不得稟水

穀氣。氣日以衰。脉道不利。筋骨肌肉皆無氣以生

故不用焉。納。○四肢解墮者脾精之不實也。諸脉

帝曰人之驛者何。氣使然。岐伯曰胃不實則諸脉

虛諸脉虛則筋脉解墮筋脉解墮則行陰用力氣不能復故為痺痺謂手足痺曳也○帝曰脾與胃以膜相連而能為之行其津液何也岐伯曰足大陰者脾也為之行氣於三陰陽明者胃也亦為之行氣於三陽藏府各因其經而受氣於陽明故為胃行其津液也○脾實則四肢不舉內經曰脾太過則令人四肢不舉是也此謂膏粱之疾其治宜瀉三化湯○脾虛則四肢不用蓋脾病不能與胃行其津液其治宜補十全大補湯○脾病不能與胃行其津

# 肩臂病因

不靈樞口肺心有邪其氣流于兩肘○手屈而伸者其病在筋伸而不屈者其病在骨在

骨守骨在筋守筋○酒家之癖多為項腫臂痛蓋熱在上焦不能清利故醞釀日久生痰涎聚飲氣流走於項臂之間不腫則痛耳○臂為風寒濕所搏或睡後手在彼外為寒邪所襲遂令臂痛或乳婦以臂枕兒傷於風寒亦致臂痛寒痛宜五積散○風濕臂痛宜烏藥順氣散○濕痛宜蠲痺湯○風加蒼朮酒防己○氣血凝滯臂痛宜薑黃散舒經湯○風濕臂痛宜活絡湯○七情臂痛宜白



○芥子散○臂胛痛宜五靈脂散  
○折傷後手足痛宜應痛元散

薑黃散

水煎服之

治臂痛非風非痰蓋氣血滯也薑黃三錢白  
朮一錢半羌活甘草各二分半右剉作一貼

舒經湯

治氣血凝滯于經絡臂痛不舉薑黃二錢當  
歸海東皮白朮赤芍藥各一錢羌活甘草各

五分右剉作一貼薑黃三片同煎入沉香磨汁少許  
服之○一名通氣飲子有人常患左臂痛不能

舉或以為風以為痰以為濕諸藥鍼灸皆不效  
得此方而愈蓋氣血凝滯經絡不行所致

活絡湯

治風濕臂痛羌活獨活川芎當歸甘草各一  
錢白朮二錢右剉作一貼薑黃五片煎服

白芥子散

治七情鬱結榮衛凝滯肩臂背胛牽引作  
痛時發時止白芥子木鱉子各一兩浸藥

木香桂心各二錢半右為末每取一錢溫酒調下

五靈脂散

治風寒濕氣血壅滯臂胛疼痛五靈脂荊  
芥穗防風羌活獨活穿山甲骨碎補草烏

製甘草節各五錢麝香半錢右為末每二錢溫酒調臨睡服

### 應痛元

破治折傷後為風寒濕所侵手足疼痛生蒼術

珠生草烏各二兩茴香一兩半右將草烏剉如麥

末酒糊和丸梧子大溫酒下五十丸少麻無妨

### 痰飲多為臂痛

凡連筋骨忽患臂背手腳腰膝隱痛不可忍

不定意謂是風證或疑是癰疽皆非也此乃痰涎

伏在心膈上下變為此疾難治臂痛不能舉或

左右時復轉移由伏痰在中腕停滯脾氣不得流

行上與氣搏四肢屬脾滯而氣不升故上行攻臂

其脉沉細者是也氣實者控涎丹最效宜用

### 半硝丸

治痰飲流注疼痛半夏二兩風化硝一兩右

# 消痰茯苓丸

治痰飲流注臂痛不能舉時復轉移脉沉細半夏二兩赤茯苓一兩枳殼五錢

朴硝二錢半右為末薑汁糊和丸梧子大薑湯下三五十九丸無朴硝則以焰硝代之○有人為痰飲

所苦兩手戰掉痛不能舉服此即愈

# 加減茯苓丸

治濕痰壅滯經絡不通兩臂作痛不能梳洗半夏三兩以白礬皂角生薑各一

兩煎湯浸七日取用陳皮鹽水炒白芍藥酒炒黃芪鹽水炒各二兩白茯苓一兩半朴硝一兩三錢

海桐皮酒洗薑黃木瓜各一兩薄桂甘草各五錢右為末薑汁竹瀝糊和丸梧子大湯下百丸

# 芎活湯

治水飲停注經絡發為臂痛川芎半夏赤茯苓獨活陳皮枳殼各一錢白朮甘草各五分

右剉作一貼薑五片水煎服

# 半夏苓朮湯

治痰飲臂痛不能舉半夏蒼朮各一錢半片苓酒炒白朮南星炮香附子各七

分陳皮赤茯苓各五分威靈仙甘草各三分右剉作一貼薑五片水煎服

臂痛有六道經絡居當以兩手伸直其臂貼身垂下大指

前廉痛屬陽明經後廉痛屬太陽經外廉痛屬少

陽經內廉痛屬厥陰經內前廉痛屬太陰經內後

廉痛屬少陰經而用鍼藥治之也

風淫末疾詳見風門

結陽證詳見浮腫

十指麻木詳見皮部

肩臂骨脫臼兩肩頭冷疼尤不可忽屢見將中風人臂

之纔覺肩上冷疼必先灸肩髃等穴毋使至於此

極可也蠶○留飲之證四肢歷節痛氣短脉沉久

則令人骨節蹉跌宜導痰湯方觀加減用之

手循衣撮空摸床傷寒熱病之極手循衣撮空摸床者

凶產後血脫亦有此證

鼻衣領及亂捻物者肝熱也手插眉目鼻面者肺熱也

風淫末疾此論雖然莫若斷之為肺熱似為愈矣其人必謔言妄語經曰肺邪入心為謔語無上焦

有疾肺必主之經者上焦也此肺之體肝之用肝主血血者陰物也陰不能自動蓋肺主氣為氣

所鼓舞故靜者得動一者說肝之用一者說肺之體此天地互為體用也

心虛手振酒客手振見內傷門

手爪占病蒼而爪枯納○合筋也其榮爪也○肝熱者色

爪甲青者死○病人手足爪甲下肉黑者八日死○病人手掌腫無文者死

代指潰破甚者指頭先腫焮熱掣痛然後於爪甲邊結膿

指浸其中一宿次早更以蜈蚣燒烟熏病指一二

好醋濃煎浸洗即愈○蒲公英與蒼耳草等分為末



服之淳會患處累效。○手指忽腫痛名為代指，焔焔煎湯淋漬之，又取烏梅核中仁為末，醋調成膏，入指漬之，自愈。○又猪脂和蚯蚓，搗爛付之，又田螺生搗碎付之，○生雞卵開一孔，將差入之三箇，即愈。○手足觸木惡刺及狐尿刺，腫痛，蒲公英英摘取，白汁多塗，立差。

### 手足皸裂

○冬月手足皸裂，作痛宜用黃蠟膏，臘享膏，脂同研爛，炒熱，擦入皸內，一時雖痛，少頃即安。○

冬月冒涉，凌凍，面目手足皸裂，血出，作痛，猪腦髓，着熱酒中，以洗之，差。○又兔腦髓生塗之，雀腦髓亦可。○又百沸湯洗，後油髮灰付之，即安。白芨末水調塗之，亦效。

### 黃蠟膏

治冬月手足皸裂，作痛，清油五錢，慢火煎沸，入黃蠟一塊，再煎，候熔，入胡粉五倍，子末各

少許，熬令紫色，為度，先以熱湯洗患處，火上烘乾，用藥付上，以紙貼之，其痛立止，入水亦不落。

### 單方

凡十種



羌活治湯服之節痛煎

防風治湯服或丸服拘攣煎

細辛治手或末服拘攣急或煎

蒼耳子水主一升半煎至半去滓拘攣痛取三兩炒搗末

天麻主蒸熟食或生食並佳煎服或

淫羊藿治或浸酒服不仁水煎服

地膚草主煮服日三煩疼水

桑枝茶療臂痛百藥可常飲之有人療兩

五倍子治牛腦髓填封即愈末調

松脂療以籠指入蠟熔化候

醬清治手指掣痛和蜜

鹿髓脂主四肢不隨和

馬糞治毒熱攻手足腫痛欲脫

虎骨酒治臂脛痛不計深淺皆效虎脛骨熬黃搗末

酒五升浸之春夏七日秋冬倍之每日空腹飲一

鍼灸法靈樞曰手太陽明之脉病肩前臑痛大指次指少

陽之脉病肩臑肘臂外皆痛小指次指不用○手

厥陰之脉病手心熱肝臂攣急腋腫○手太陰之

脉病臑臂內後廉痛厥掌中熱○手少陰之脉病

臑臂內後廉痛厥掌中熱○手少陰之脉病

麻痺取肩髃手三里外關肩井曲池手上廉合谷  
○肘痛不可屈伸取天井尺澤○肘臂腕痛  
取前谷後谷液門中渚○腕痛取陽谿曲池腕骨  
前谷後谷液門中渚○腕痛取陽谿曲池腕骨  
痛取肩井  
支溝

足

足部度數

尺八寸曰橫骨上廉以下至內輔之上廉長一

內輔下廉下至內踝長一尺三寸內踝以下至地

長三寸膝髌以下至附屬長一尺六寸跗以下至地

至地長三寸○髌以下至附屬長一尺六寸跗以下至地

以下至外踝長一尺六寸外踝以下至京骨長三寸

寸京骨以下至地長一尺二寸○兩髌之間

足領髌股膝臑脛腕

與膝上曰髌膝上骨曰髌骨髌骨

曰股髌外曰脛一名曰胫膝上接處曰膝膝之蓋骨曰

臑膝下曰脛一名曰胫膝上接處曰膝膝之蓋骨曰

外骨曰輔骨脛之後魚腹曰腓一云足肚曰腓脛  
下跗上接處曰腕腕骨曰踝人通謂之脚脚

者却在後也其坐

# 脉法

脚氣之脉其狀有四浮弦為風濡弱濕氣遲瀦因  
寒洪數熱鬱○微滑者虛牢堅者實○脚氣

之脉浮為風緊為寒緩細為濕洪數為熱又曰沉  
而弦者為風沉而緊者為寒沉細為濕沉數為熱

○脾脉緩其為痿脈○尺脉虛弱緩瀦而緊  
病為足痛或是痿病○痿脈多浮而大○診

人痿躄其脉虛者  
生緊急疾者死

# 厥有寒熱

經曰太僕云厥者手足寒也熱厥者手足熱也蓋

陽衰於下則為寒厥陰衰於下則為熱厥陰陽之  
氣不相接續則為厥○厥證多以不勝乘其所

勝如腎移寒於脾則為寒厥○心移熱於腎則為熱  
厥○厥論寒熱皆由腎之精心移熱於腎則為熱

# 寒厥

黃帝曰岐伯對曰陰氣起於五指之裏集於膝下



而聚於膝上故陰氣勝則從五指至膝上寒其寒也  
不從外皆從內也納○帝曰寒厥何為而然也  
岐伯曰前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合也  
春夏則陽氣多而陰氣少秋冬則陰氣盛而陽氣  
衰此入者以秋冬奪於所用下氣上爭不能復精  
氣溢下邪氣因從而上之也氣因於中陽氣衰不  
能滲營其經絡陽氣日損陰氣獨作故手足為之  
寒也納○內經曰腎虛則清厥意不樂又曰下虛  
則厥○寒厥脈沉數有力用滋腎丸妨鯉再服而愈又  
腎皆冷脈沉數有力用滋腎丸妨鯉再服而愈又  
治一人上熱下寒用既濟解毒湯良愈則寒厥用  
藥不可不審○寒厥宜十全大補湯酌加附  
子或當歸門四逆  
湯方

### 熱厥

黃帝曰陽氣起於足五指之表起於足下者何也  
岐伯曰陽氣起於足五指之表起於足下者何也

而聚於足心故陽氣勝則足下熱也納○帝曰熱  
厥何如而然也岐伯曰酒入於胃則絡脈滿而經  
脈虛脾主為胃行其津液者也陰氣竭精氣竭陽氣  
入則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則陽氣入

營其四肢也此人必數醉若飽以入房氣聚於脾中不得散酒氣與穀氣相搏熱盛於中故熱遍於身內熱而尿赤也夫酒氣盛而慄悍腎氣日衰陽氣獨勝故手足為之熱也○熱厥宜升陽散火

湯火鬱湯材難見○厥論寒熱皆由腎之精氣內竭而成也

### 脚氣異名

脚氣也古謂之緩風又謂之厥者名濕脚氣不腫

者名乾脚氣漸而至於足脛腫大如瓜瓠者有之

### 脚氣病因

脚氣之疾實水濕之所為也其為病有證無名脚氣之稱自蘇敬始關中河朔無有也惟

南方地下水寒其清濕之氣中於人必自足始故經曰清濕襲虛則病起於下是也○南方者其

地下水土弱霧露之行聚也江東嶺南春夏之交山林蒸鬱風濕毒氣為甚足或感之遂成瘴毒脚

氣腫○水性潤下氣不能啣故下症於足脛積久而作腫痛此飲食下流之所致也內經曰太陰之

勝火氣內鬱流散於外足脛胫腫飲發於中胫腫於下加之房事不節陰盛陽虛遂成痼疾孫真人



云古人少有此疾自永嘉南渡衣冠士人多有之亦此意也。○九脚氣之病始起甚微多不令人識也。食飲嗜臠氣力如故惟卒起脚屈伸不能動為異耳。針○內經曰傷於濕者下先受之蓋足居于下而多受其濕濕鬱生熱濕熱相搏其病乃作東南卑濕之地比比皆是西北高燥之地鮮有之。古方名為緩風宋元以來呼為脚氣雖有外感內傷之殊其濕熱之患則一也。○

### 脚氣病證

其靈樞曰脾有邪其氣流于兩胠○其氣流于兩股解作腎有邪

脚氣外證全類傷寒但初起脚膝軟弱頑痺轉筋赤腫為異耳。○脚氣為病雖起於足實周乎身或壯熱頭痛或百節拘攣或十指走注或轉筋急痛或小腹不仁以至胷滿喘息煩悶怔忡昏憤羞秘腹瀉自腿至膝自脛及踝屈弱頑痺攣急痠疼或傷寒類但卒然脚痛為異耳。○人黑瘦者易炊不炊或腫不腫皆其候也。其傳足六經外證與傷寒類類但卒然脚痛為異耳。○人黑瘦者易治肥人大肉厚赤白者難愈黑人耐風濕赤白者不耐風濕瘦人肉硬肥人肉軟肉軟則受病難愈。○

脚氣治法

脚氣是為壅疾治以宣通之劑使氣不能成

蓄則腫熱砭射之後以藥治之○脚氣之疾自

傷脾胃又不可不及不及則使壅氣不能消散

虛而殂故其病皆不得大補亦不可大瀉縱其虛

踈導大便使毒氣得泄而後愈其補湯林洗皆醫

家之大戒也○脚痛患在風濕風則用烏藥順

氣散○治法用蒼朮白朮以治濕黃芩黃柏知

母羌活獨活以歸為藥地黃以散風濕無木瓜通防己調

牛膝○濕熱在下此為治之秘法清熱瀉濕湯亦

宜麻黃左經湯或少陽則宜神祕左經湯在太陽則

則宜大黃左經湯或加味敗毒散通宜檳榔蘇散

○濕熱在三陰則宜羌活導帶湯除濕丹○

花神祕丸以搜風丸枳實大黃湯開結導引丸

乙

當歸拈痛湯○氣血虛者宜獨活寄生湯羌活  
續斷湯○寒濕盛則宜勝駿丸捉虎丹○病久

者宜卷栢散腫甚熱甚者宜勝濕餅子桑白皮散加

清熱瀉濕湯治濕熱脚氣腫痛諸證蒼朮黃栢鹽酒

通防己檳榔枳殼香附子羌活甘草各七分右坐

作一貼水煎服痛加木香腫加大腹皮熱加黃連

神秘左經湯治風寒暑濕流注足三陽經脚膝拘攣

半夏羌活防風厚朴白薑細辛甘草葉各五分右剉作一貼薑三棗二煎服葛

麻黃左經湯治四氣流注足太陽經腰脚攣痺重痛

羌活一錢麻黃乾葛白朮心防風甘草各七分右剉作一貼煎法同上桂

半夏左經湯治足少陽經為四氣流注發熱腫痛腰



白米細辛麥門冬桂心防風白薑黃芩小  
草甘草各五分右剉作一貼煎法同上

**大黃左經湯** 治四氣流注足陽明經腰脚赤腫痛不  
可行大小便秘澀大黃一錢羌活茯苓

細辛前胡枳殼厚朴黃芩杏仁甘草  
各七分右剉作一貼煎法同上

**加味敗毒散** 治三陽經脚氣流注脚蹠熱赤腫寒  
熱自汗即入參敗毒散

黃蒼朮各一錢右剉作一貼入  
薑三片薄荷七葉同煎服

**檳蘇散** 治風濕脚氣腫痛拘攣用此疎通氣道蒼朮  
二錢香附子紫蘇葉陳皮木瓜檳榔羌活牛

膝各一錢甘草五分右剉作一貼  
入薑三片葱白三莖同煎服

**羌活導滯湯** 治脚氣初發一身盡痛或肢節腫痛便  
尿阻隔先以此導之後用當歸拈痛湯

除之大黃酒煨二錢四分羌活獨活各一錢二分  
防己當歸尾各七分枳實五分右剉作一貼水煎

服微利  
即止

當歸拈痛湯

治濕熱脚氣腫痛羌活茵陳酒炒黃芩

猪苓白朮防己各六分人參苦參升麻乾葛當歸

蒼朮各四分右剉作一貼水二盞浸藥少時煎至

一盞空心臨卧各一服鑢○一相公領兵至南方

忽得脚氣遍身微腫其痛手不可近足脛尤甚內

經云飲發於中肘腫於下又云諸痛為實血實宜

决之以三稜鍼數刺腫上血突出高二尺餘漸漸

如線其色黑紫頃時腫消痛減以當歸拈

痛湯服之是夜得睡明日再服而愈鑢拈

搜風丸

治脚氣腫痛黑牽牛子生取頭末二兩大黃

下三五丸

枳實大黃湯

治濕熱脚氣腫痛大黃酒煨三錢羌活

水煎空心服鑢○廉平章體肥得脚氣微腫皆赤

色足脛腫痛不可忍手不敢近投以當歸拈痛湯

一貼其痛減半再服腫全去數日因食麪復痛再以

甲端多出黑血赤腫全去數日因食麪復痛再以

枳實大黃湯治之

### 開結導引丸

治脚氣因食積流注心下痞悶陳皮白

兩枳實青皮乾薑各五錢巴豆霜一錢半右為末  
蒸餅和丸梧子大溫水下五七十九錢半一名開

鬱導引丸

### 獨活寄生湯

治肝腎虛弱筋攣骨痛脚膝偏枯緩弱

熟地黃川芎人參白茯苓牛膝杜仲秦艽細辛防  
風肉桂各五分甘草三分右剉作一貼薑三片水

煎空心服

### 羌活續斷湯

治脚氣肝腎虛弱筋攣骨痛羌活防風

當歸人參白芍藥赤茯苓桂心川芎各五分右剉  
作一貼薑三片水煎服○獨活寄生湯桑寄生無

真者世以他寄生代之為害不少故今去寄  
生代續斷又以羌活代獨活功效殊勝疑

勝駿丸

治脚氣拘攣疼痛行步不隨去一切足弱病

附子一炒熟地黃酒浸防風各二兩全蝎去毒一兩

五錢麝香二錢右為末生地黃二斤洗淨杵爛如

泥好酒四升同煮如膏和前藥搗令堅每兩作

五十九丸每取一丸臨睡細嚼酒下或丸如梧子酒下

捉虎丹

治脚氣走注疼痛不可忍五靈脂白膠香草

香沒藥當歸各七錢半麝香松烟墨煨各二錢半

右為末糯米糊和丸芡實大每丸空溫酒化

卷栢散

治遠年脚氣難治此方特效卷栢東向者佳

率牛子頭末一錢甘遂檳榔右各為末不得相雜每服

每件各取一錢惟損榔二錢五更初濃煎葱白湯

調下至辰巳時取下惡物如魚凍虛人減半服  
隨喫淡粥更服湯藥如清熱瀉濕湯調之

### 二炒蒼栢散

治濕熱脚氣令足膝痛或赤腫脚骨間  
作熱痛雖一點能令步履艱苦令人痿

壁百用百效蒼栢木汁浸一日夜鹽炒黃栢酒浸一  
日夜焦炒各四兩右剉五錢水煎服或水和丸服

亦可作丸一名蒼栢散  
○作丸名二妙丸

### 加味蒼栢散

治濕熱脚氣痿壁蒼栢木一錢白朮八分  
知母黃栢黃芩各六分當歸芍藥生地

黃各四分木瓜攪御羌活獨活木通防已牛膝各  
三分甘草一分右剉作一貼薑三片水煎服

### 勝濕餅子

治遠年脚氣足脛腫如瓜瓠者黑丑二兩  
取頭末五錢白丑二兩取頭末五錢甘遂

五錢右為極細末用蕎麥麪一兩半調水和藥捏  
為餅子如折三錢大放飯上蒸熟每一餅空心茶

清嚼下以利為度

### 桑白皮散

治脚氣浮腫尿澁氣急腹滿赤茯苓二錢  
木香防已大腹子各一錢二分桑白皮

李仁各一錢蘇葉木通檳榔青皮各七分右剉作一貼薑三片煎服

# 脚氣危證

凡脚氣覺病候有異即須急治之稍緩則氣上肩息胃脇逆滿急者死不旋踵寬者數日

必死或不可不急治也但見心下急氣喘不止者或自汗出或作熱作寒其脉促短而數嘔吐不止者死

針○上氣脉數不得卧者亦死針○脚氣之病其小腹煩痺不仁者多不腫小腹煩後不遇三五日

即令人嘔吐名曰脚氣入心死在朝夕針○脚氣脉浮大而緊欬此最惡脉也若細而駛同是惡脉

針○脚氣入心則恍惚謔妄嘔吐不食左寸脉大作小作有作無者死宜杉節湯三碗散或三和

散鍼腧加烏藥救之與額皆黑○入腎則腰脚腫小便不通氣上喘急目與額皆黑左尺脉絕者死宜八味

元去山藥救之蓋少陰腎經脚氣入腹上氣喘急此證最急以腎乘心水尅火死不旋踵此藥救之

又四物湯加炒黃柏煎服外以附子末津唾調付涌泉穴以艾火之引熱下行○脚氣入腹喘急

欲死宜木萸湯移節湯三將軍元烏藥平氣湯救之



杉節湯

治脚氣入腹衝心危急欲絕以此救之杉木節四兩大腹皮一兩檳榔七箇青橘葉四十

九片無則用皮右剉作一貼以順流水煎服大如○

柳子厚謫南方得脚氣衝心痞絕脇下有塊大如石不省人有人傳此方服之半食頃大下三次氣通塊散而甦其法童便三升煮取一升分二服

三腕散

治脚氣衝心痞悶便尿澀滯獨活白朮木瓜大腹皮紫蘇葉各一錢檳榔麩裹煨龜末陳

皮沉香木香川芎各七分甘草炙五分右麤末每三錢水煎服取利為效

木萸湯

治脚氣入腹喘悶欲死木瓜檳榔各二錢半吳茱萸一錢半右剉作一貼水煎服

三將軍元

治脚氣衝心大便秘不通吳茱萸木瓜大黃各等分右末米糊和丸梧子大枳殼湯下

五七十丸

烏藥平氣湯

治脚氣上攻昏眩喘促烏藥一錢茯苓

紫蘇葉各七分甘草三分右剉作一貼薑五片棗二枚煎服

# 脚氣禁忌法

第一忌嗔嗔則心煩脚氣發第二禁大語

水以冷水洗脚雖夏月常須着綿棍至冬寒倍令

兩脛溫暖得微汗為佳常令按摩數勞動關節令

氣血通暢此養生之要拒風濕之法也○每至

丑寅日割手足甲割小侵肉去氣○凡飲食之

後宜緩行二三百步疲倦即止如此則不能成壅

也○每朝早飯任意飽食午飯少食晚飯不食

酒佳夜食則血氣壅滯而愈增腫痛矣○凡飲

嗜慾多則脚氣亦發○脚氣之病極忌房室勿

食牛羊肉葱蒜韭菰菜酒麪酥油猪雞鴨惟

# 脚氣按摩法

常以兩足赤肉更次用一手握指一手摩

擦數目多時覺足心熱即將脚指略略動轉倦則

少歇或令人擦之亦得終不若自擦為佳脚力強

建無痿弱痠痛之疾矣

痿病之因

內經曰肺者藏之長也為心之蓋也有所失亡所求不得則發肺鳴鳴則肺熱葉焦故曰

五藏因肺熱肺焦發為痿躄此之謂也○陽明者五藏六府之海主潤宗筋宗筋主束骨而利機關

也陽明虛則宗筋縱帶脉不引故足痿不用也○心氣熱為脉痿則經縱而不任地肝氣熱為筋

痿則筋急而攣脾氣熱為肉痿則胃乾而渴肌肉不仁腎氣熱為骨痿則腰脊不舉骨枯而髓減納

○痿謂手足痿弱無力以運動也○由肺金本燥燥之為病血衰不能榮養百骸故手足痿弱不能運

動猶秋金旺則草木萎落病之象也痿猶萎也○痿之作也皆五月六月七月之時午者少陰君

火之位未者濕土庚金伏火之地申者少陽相火之分故病痿之人其脉浮大綽

痿病治法

肺金體燥而居上主氣畏火者也脾土性濕而肺金體燥而居下主四支畏木者也火性炎上若嗜慾

無節則水失所養火寡于畏而侮肝勝肺得火邪而熱矣木性剛急肺受熱則金失所養木寡于畏

而侮肝勝脾得木邪而傷矣肺熱則不能管攝一身脾傷則四肢不能為用而諸痿之病作矣○

方則肺金清而東方不實何脾傷之有故陽明實則宗  
心火降而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗  
筋潤能束骨而利機關矣治痿之法無出於此  
○東垣取黃柏為君黃芪等輔佐以治諸痿無一  
定之方有無痰積者有濕多者有熱多者有濕熱  
相半者有挾氣者臨病製方其善於治痿者乎雖  
然若將理失宜醫所不治天產作陽厚味發熱患  
痿之人若不淡薄食味吾知其必不能安全也  
○痿病切不可作風治用風藥○痿弱宜加味四  
斤元五獸三匱丸鹿角膠丸養血壯筋健步丸  
濕熱痿弱宜神龜滋陰丸三妙丸加味二妙丸  
味四物湯滋血養筋湯○長夏濕熱成痿宜健步  
丸四製蒼朮丸二炒蒼朮散坊見清燥湯○無濕  
痿二陳湯方加蒼朮黃柏黃芩白朮竹瀝薑  
汁血虛四物湯加蒼朮氣虛四君子湯加蒼朮  
加味四斤元濕治肝腎俱虛脚膝痠痿弱或受風寒  
虎脰骨肉從蓉各一兩乳香沒藥各五錢木瓜一  
箇蒸熟右為末入木瓜膏和酒糊丸如梧子溫酒

或鹽湯下  
七十九丸

### 五獸三匱丸

治肝腎不足兩脚痿軟鹿茸酥炙血竭

毛各一兩為末即五獸也另用附子一箇去皮剉去中心入辰砂細末一兩填滿又用木瓜一枚去

皮剉去中心入附子於內以附子末蓋口即三匱也却以三匱正坐於磁缸內重湯蒸至極爛取出

和五獸末搗丸芡實大木瓜酒化下血竭一名麒麟竭

### 鹿角膠丸

治兩足痿軟久卧不起神效鹿角膠一斤

白茯苓兔絲子人參白朮杜仲各二兩虎脰骨龜板並酥炙各一兩右為末將鹿角膠入酒烱化和

丸梧子大薑鹽湯吞下百丸

### 養血壯筋健步丸

治氣血兩虛兩脚痿軟不能行動

炒當歸酒洗蒼朮黃柏鹽水炒山藥五味子破故紙鹽水炒一兩半黃芪鹽水炒

炒人參枸杞子兔絲子白朮炒虎脛骨龜板並酥  
灸各一兩防風六錢防己酒洗五錢羌活酒洗三  
錢右為末猪脊髓七條入煉蜜  
和丸梧子大鹽湯下百丸鑿

### 神龜滋陰丸

治膏梁之人濕熱傷腎脚膝痿弱無力  
龜板酥炙四兩黃栢知母並鹽水炒各

二兩枸杞子五味子瑣陽各一兩乾薑五錢  
右為末酒糊和丸梧子大鹽湯下七十丸

### 三妙丸

治濕熱下流兩脚麻木痿弱或如火烙之熱  
蒼朮酒浸六兩黃栢酒炒四兩牛膝二兩右

為末麩糊和丸梧子大  
薑鹽湯下五十丸

### 加味二妙丸

治兩足如火燎從足跗熱起漸至腰膝  
麻痺痿軟皆是濕熱為病蒼朮酒浸四

兩黃栢酒浸二兩牛膝當歸尾酒洗單解防己龜  
板酥炙各一兩右為末酒麩糊和丸梧子大空心

薑鹽湯下  
百丸

### 加味四物湯

治濕熱兩脚痿軟無力熟地黃二錢當  
歸身麥門冬黃栢蒼朮各一錢白芍藥



川芎杜仲各七分人參黃連各五分知母牛膝各三分五味子九粒右剉作一貼水煎空心服

### 滋血養筋湯

治氣血兩虛兩足痿軟不能行動熟地黃一錢半白芍藥當歸麥門冬黃柏酒

炒牛膝酒浸杜仲酒炒蒼朮薏苡仁各八分人參川芎防風知母各五分羌活甘草各三分五味子

九粒右剉作一貼入薑三棗二水煎服

### 健步丸

治濕熱盛脚膝無力不能屈伸腰腿沉重行步艱難防己一兩羌活柴胡滑石瓜蒌根酒

洗甘草草灸各五錢澤瀉防風各三錢苦參川烏各一錢肉桂五分右為末酒糊和九梧子大以葱白

荊芥煎湯下七十丸

### 四製蒼朮丸

治濕熱盛脚膝痿弱能滋陰降火黃柏二斤以乳汁童便米泔各浸八兩酥灸

八兩浸灸各宜十三次蒼朮八兩用川椒破故紙五味子川芎各炒二兩棟去炒藥只取朮為末

蜜丸梧子大早酒午茶晚白湯吞下三五十九丸



# 清燥湯

治長夏濕熱盛兩脚痿厥癱瘓痿黃芪白朮各一錢半蒼朮一錢陳皮澤瀉各七分赤茯苓

人參升麻各五分生地黃當歸猪苓麥門冬神麴甘草各三分黃連黃柏柴胡各二分五味子九粒

右剉作一貼水煎服

# 熱厥成痿

一人自踝以下常覺熱冬不可加綿於上常自言曰我稟質壯不怕冷予曰足三陰虛宜

斷慾事以補養陰血庶乎可免彼笑而不荅年近五十患痿半年而死

兄陰皆冷精滑不固服鹿茸丸不減東垣診其脉沉數而有力告曰飲醇酒食膏粱滋火于內逼陰

於外醫不知此投以熱劑反瀉其陰而補其陽真所謂實實虛虛也遂處以滋腎丸再服而愈或問

其故荅曰是病相火而復真陰陰既復其位則皮裏之劑以瀉相火而復真陰

寒自消矣

# 鶴膝風

患痢後脚痛痿弱不能行履名曰痢風或兩膝腫大痛解脛枯腊但存皮骨如鶴膝之節拘攣

三陰虛損風邪乘之痛者五積散麝加松節久

痢後或手足腫者或歷節痛者乃餘痰不散宜大

防風湯或獨活寄生湯上方見脚細者蒼龜丸

### 大防風湯

治鶴膝風熟地黃一錢半白朮防風當歸

羌活人參甘草各五分右剉作一貼薑五片

### 蒼龜丸

治痢後脚弱漸細蒼朮龜板白芍藥各二兩

四物湯加陳皮甘草煎下五十七丸

### 經驗二防飲

治痢後脚痛如刀刺虎咬之狀膝臃腫

各一錢白朮黃芪當歸川芎白芍藥杜冲草薛各

七分防風防己羌活牛膝甘草各五分附子童便

浸三日炮七分冬則一錢右剉

作一貼薑三棗二水煎服

脚病凶證

脚氣衝心恍惚氣急脉乍大乍小者死。病人足跗上腫。

膝大如斗者十日死。

甲疽瘡

一名嵌甲。或因割甲傷肌，遂成瘡腫，復緣窄靴，

漸引上脚，跌綠礬末五錢，火煨候冷，研為末，先以鹽湯洗瘡，拭乾，付礬末軟帛裹，定一日一易，自然差。

笑靴。一方枯礬五錢，蘆膏一錢，半麝香少許，和用如上方。妙。又方：陳皮、濃煎湯浸良久，甲

肉自相離，開輕手剪去肉中爪甲，外用蛇退燒灰，雄黃一錢，為末，乾搽，或香油調付。脚指間濕

爛，或指甲角五分，入肉，便刺作瘡，不可着履，靴枯白礬三錢，黃丹五分，為末，搽之，食惡肉，生好肉，細細割

去，甲角便差。又細茶嚼爛，付之。又

肉刺

生指間，碍痛，不得着履，靴此因穿窄靴而生，黑虱

多取，搗付之，痛即根出。又法：取蒼若根，繫襪帶，上感應，永不痛。又法：撐黨實爛，搗貼之，即脫去，永不痛。又大棗去核，付貼候爛，剔去。

單方三種

牛膝

治脚膝痛痿弱不可屈伸煎服九服或

石斛

治脚膝疼冷弱煎服九服並佳

薏苡仁

去乾濕脚氣大驗和郁李仁作粥常服良

威靈仙

藥一人足病不能行數十年一僧教服此藥為末每二錢酒調服數日能步履

何首烏

治骨軟風腰膝痛何首烏一斤牛膝半斤黑豆三升煮取汁拌蒸三次共搗成泥晒乾為

末素肉和丸梧子大酒下五七十九丸

革麻葉

主脚氣腫痛取葉蒸累日三易即差

牽牛子

治脚氣腫滿取頭末蜜九小豆大每五九薑湯下小便利即止

松節

主脚弱痺痛煮取汁釀酒取清飲之良



五加皮

療痿痺脚弱釀酒服  
或水煎如茶飲之

桑枝茶

治脚氣久  
服之佳

川椒

治寒濕脚氣川椒盛踈布袋中置微  
火上跣足踏椒囊寒濕散去即效

檳榔

治脚氣衝心氣急雞心檳榔末二錢  
以童便薑汁溫酒各半盞調服

蠶魚及鰻鱺魚

並上脚氣作膾常  
食鰻魚膾亦佳

田螺

主脚氣上衝取螺煮  
食之蜆肉亦佳

生栗

治脚氣及脚弱無力  
乾每日常空食十餘枚

木瓜

治脚氣及脚氣上衝  
一顆濃煎湯飲之

黑豆

治脚氣衝心取豆濃煎汁  
飲之

赤小豆

甚治脚氣水腫和  
鯉魚煮食甚佳



紫蘇

治脚氣取葉煮湯如茶飲之又取子二兩研取汁入粳米葱醬椒薑煮粥食之

鹿蹄皮

治脚膝痠痛不得踐地取蹄四隻治如食法着五味煮熟食之

犬肝猪肝

並主脚氣上衝作膈以薑醋進之當泄若先泄勿服

烏牛尿

治小便氣水利則漸消黃牛新尿亦可飲一

人尿

治脚氣痛不可忍取自己尿或童子尿令煖盛桶浸兩脚以物蓋覆勿泄氣

鍼灸法

取環跳穴係陽陵泉曲泉崑崙○腿膝痠痛或枯黑

市中瀆

陽關懸鍾○腰脚痛取委中崑崙入中

髀痛

取陽陵泉絕骨中封臨注足三里陽輔

取俠谿

陽關陽陵泉○足腕痛取崑崙大谿申

涌泉

然谷○脚氣初發先灸風市次伏兔次犢鼻次三里

次上廉次下廉次絕骨日日報灸以百壯爲率蠶  
○濕熱脚氣紅腫生瘡取中封陽輔風市絕骨蠶  
○脚氣取足十指端名曰氣端去指竒一分日灸  
三壯神效蠶○膝中痛鍼犢鼻髀○膝腫以火鍼  
刺三里其腫如失又取行間蠶○脚氣速灸風市  
三里以瀉毒氣蠶○脚弱瘦削取三里絕骨絕骨  
治脚疾神效蠶

毛髮

髮屬腎

內經曰腎主髮又曰腎  
之合骨也其榮髮也

髮者血之餘

血盛則髮黃血潤則髮白門入血衰則髮落

十二經毛髮多少

靈樞曰美眉者太陽多血通髯極鬚者少陽多血美鬚者陽明多血○足

陽明之上血氣盛則髯義長血氣少則無髯兩吻  
多畫○足陽明之下血氣盛則下毛義長至胷血  
氣皆少則無毛雖有則稀枯瘁○足少陽之上血  
氣盛則通髯義長血氣皆少則無髯○足少陽之

下血氣盛則脛毛美長血氣皆少則脛無毛○足  
太陽之上血氣盛則美眉眉有毫毛毳毼血多

氣少則惡眉○手陽明之上血氣盛則鬚美血氣  
皆少則無鬚○手陽明之下血氣盛則腋下毛美

○手少陽之上血氣盛則額多鬚以長  
○手太陽之上血氣盛則額多鬚

### 髮眉鬚髥各異

在在頭曰髮髮者拔也拔擢而出也○  
在在目曰眉眉者媚也媚媚也○

下曰鬚鬚者秀也物成乃秀人成而鬚生也○在  
頰曰髥隨口動搖髥髥然也○口上曰髥髥者安

也為姿容  
之義也

### 髮眉鬚各有所屬

髮屬心故上生稟火氣也眉屬肝故  
橫生稟木氣也鬚屬腎故下生稟水

氣也鬚○人之髮眉鬚雖皆毛類而所主五藏各  
異故有老而鬚白眉髮不白者或髮白而眉鬚不

白者藏氣有所偏故也男子腎氣外行上為鬚下  
為勢故女子宦人無勢則亦無鬚而眉髮無異於

男子則知不屬  
腎也明矣

婦人無鬚

黃帝曰婦人無鬚者無血氣乎岐伯對曰衝

其浮而外者循腹右上行會於咽喉別而絡唇口

血氣盛則充膚熱肉血獨盛則澹滲皮膚生毫毛

官官無鬚

黃帝曰士人有傷於陰陰氣絕而不起陰不

曰宦者去其宗筋傷其衝脉血寫不復皮膚內結

唇口不榮故鬚不生焉帝曰其有先天宦者未嘗被

傷不脫於血然其鬚不盛宗筋不成有氣無血唇口不

榮故鬚不生也

經曰女子七歲齒更髮長五七面始焦髮

八髮墮齒枯六七八面焦髮白丈夫八歲齒更髮長五

所絡陽精盛注於外則鬚髮榮盛面體光潤門脈

以膽榮在鬚腎華在髮精氣上升秋冬行金則鬚潤而黑六八

以後精華不能上升秋冬行金則鬚潤而黑六八

髮焦槁如灰白色養生者宜預服補精血變白髮宜張天

師草還丹延年益壽不老丹舁視四物坎離丸秤

金丹還元秋石丸神仙烏雲丹却老烏鬚健陽丹

### 張天師草還丹

此藥久服則身輕隨風而去如列子

者永不白有不信者將藥拌飯與白猫吃一月即  
黑地骨皮生地黃石菖蒲牛膝遠志兔絲子酒煮  
右等分為細末蜜丸梧子大每三五十九空溫  
酒或鹽湯送下修製忌鐵器及婦人雞犬見齏

### 四物坎離丸

善烏鬚髮熟地黃三兩生地黃一兩半  
同酒炒知母一兩黃柏二兩同鹽酒浸炒側柏葉

同酒炒各一兩同炒連翹六錢右為末蜜丸梧子大  
盛磁盒內放地上七日晒乾收之

每五六十丸或溫酒或白湯下

### 秤金丹

又名一秤金久服鬚髮黑返老還童熟地黃  
二兩地骨皮蓮花益槐角子俱用酒浸夏一

日春秋三日冬六日取出晒乾薄荷各三兩沒石子一兩人參木香各五錢右為末蜜丸芡實大每送下九日三服

### 還元秋石丸

治因房室損精髮早白秋石一介白茯苓一介天門冬麥門冬生地黃熟地

黃人參地骨皮人乳粉各四兩右為末蜜丸梧子大白湯或酒下三五十九

### 神仙烏雲丹

烏髮黑髮返老還童神效無比何首烏八兩八砂鍋內黑豆同蒸半日去豆用

好酒浸七日晒乾如此蒸七次破故紙四兩酒洗砂鍋內炒黃早蓮汁二兩槐角二兩為末胡桐淚

一兩為末右細末棗肉二斤切桃仁半斤擣為丸梧子大空心鹽湯下五七十九服三月勿輟

### 却老烏鬚健陽丹

能變白鬚髮令黑赤何首烏白何首烏各一斤牛膝八兩以黑豆汁

拌蒸二次赤茯苓用牛乳五升白茯苓人乳汁五升各以文武火煮乾各一斤兔絲子破故紙各八

兩右為末蜜丸彈子大每服一斤加入九溫酒化下日二次或生地黃熟地黃各一斤加入九溫酒化下日



七仙丹

補心腎駐容顏黑鬚髮之聖藥何首烏九蒸

冬天門冬白茯苓苗香炒各二兩右為末蜜丸彈

子每五七十丸空心酒下

加味蒼朮膏

久服精滿氣盛髮白變黑齒落更生蒼

文武火煮至十餘碗絹濾取汁入磁罐內以人參

破故紙當歸薑汁各四兩青鹽二兩朱砂一兩早

蓮草汁二碗白蜜二斤各藥為末入木膏內封固

一醉不老丹

專養血烏鬚黑髮蓮花益生地黃槐角

石臼搗碎以生絹袋盛藥同好清酒十斤入淨罈

內春冬浸一月秋二十日夏十日緊封罈口浸滿

而數任意飲之以醉為度須連日服之令盡酒盡



# 中山還童酒

歌曰中山還童酒人間處處有善緣得遇者便是蓬萊叟○馬蘭子一升埋土

三日取出馬蘭根洗切片一升用黃米二斗水煮成煤陳麴二塊為末酒醇子二碗并前馬蘭子共和一處做酒待熟另用馬蘭子并根一升用水煮十沸入酒內三日每日攪勻去渣隨量飲醉其酒飲盡鬚髮盡黑其酒之色如漆之黑麴

# 經驗烏鬚酒

能變白為黑身輕體健功不可述每年冬十月壬癸日面東採摘紅肥大枸杞

子二升擣破同好無灰酒二斗同盛於磁器內浸二十一日足開封添生地黃汁三升攪勻各以紙三層封其口俱至立春後髭鬚都黑勿食三白麴煖飲一盃至立春後髭鬚都黑勿食三白麴

# 烏鬚酒

能變白髮方見身形

# 鬚髮黃落

虛損之疾一損損於肺皮聚而毛落宜八建湯方觀麴○脈弦氣弱皮毛枯槁黃芪建

中湯勵觀四物湯亦主之○老來髮落鬚長常也少壯有髮落或鬚亦落者火炎血燥故也宜服

地黃酒天門冬膏見○髮燥者膽有怒火也

膽合膽上榮毛髮風氣盛則焦燥汁竭則枯也

門○初生兒胎髮或童男或女髮洗淨鹽泥固濟火

煨為末空酒下二三分或入補藥服尤妙

髮黃落宜滋榮散三聖膏菊花散

生禿烏雲油金主綠雲油○一男年少頭髮盡脫

用六年少髮盡脫不留一莖髮寸許兩月復舊○

婦年六味地黃丸久髮生寸許兩月復舊○

成熱濕痰在膈上而熏蒸髮根之血漸枯而脫用

防風通聖散去芒硝惟大黃三度酒炒無以四物

湯酒製合和作小劑煎以服兩月濕熱

### 滋榮散

長毛髮落最宜生薑焙乾人參各一兩右

### 三聖膏

治各五錢右為末烏雞脂和勻擣乾置瓦合內

封固百日取出塗落處

### 菊花散

治髮髮黃燥能令黑潤甘菊蔓荊子側柏葉



兩右劉每二兩漿水三椀煎至二椀去滓洗鬚髮

### 巫雲散

治鬚髮黃白不澤膽礬五倍子百藥煎青胡桃皮酸石榴皮訶子皮木瓜皮猪牙皂角何

首烏細辛各等分右為末蜜和如錢大常於木炭內培養勿令離炭用時以熱酒化開塗之

### 二仙丸

治鬚髮脫落神效側柏葉焙乾八兩當歸全血四兩右不犯鐵為末水糊和丸梧子大酒或

鹽湯下五七  
十九日再鑿

### 生禿烏雲油

能生鬚髮川椒白芷川芎各一兩蔓荊子零陵香附子各五錢右麤末入絹袋

浸香油一斤中過二十一日取油擦頭上即生新髮

### 金珠綠雲油

能生鬚髮蔓荊子沒石子躑躅花訶子皮白芷沉香附子防風覆盆子生地黃零

陵香芒硝旱蓮草丁香各一錢半卷栢三錢右剉袋盛浸清油八兩中封過七日取擦頭上日三

### 染白烏鬚髮

宜秘傳烏鬚髮方染鬚髮方早蓮膏烏雲膏烏鬚髮方早蓮膏

秘傳烏鬚方

五倍子不拘多少槌碎去灰入砂鍋內炒烟盡為度以青布巾打濕扭乾布裏

腳踏成餅為末每用一錢半○烏黑霜即炒黃好細麪四兩當歸尾一兩為末白芨末一兩三味攪

勻每用一分半○紅銅末不拘多少火內燒極紅投入水碗中取出再燒再投取水內自然之末用

水淘淨醋煮數沸至乾隨炒黑色每用一分半○明白礬末一分半青鹽一分二釐沒石子二釐半

詞子肉二釐半二味俱用麪包入砂鍋內將桑炭同拌炒至焦乾右為末用濃茶調勻以酒盞盛貯

塗鐵杓注水煮如糊先將皂角水洗淨鬚髮然後塗藥包裏一夜次早洗去以胡桃油塗之令潤鬚

外染烏雲膏

五倍子一錢半沒石子二箇麪炒黃色右為末濃茶調重湯煮見黑

末濃茶調重湯煮見黑

染鬚方

大烏龜一箇饑一二日將飯與肉骨果子烟火之食飼之三五月後夜間以漆盞盛之用

竹片置盞口令通氣外放燈一盞盞內熟龜自撒尿急則只抹油烟熏鼻亦即尿先用五倍子末炆

醋如膠若龜尿得一以新小鐘入五倍醋半鍾入磁器  
紋一滾角罐收貯以新筆略蘸擦鬚多用面黑門

烏鬚髮方 雄雞血以松烟墨濃磨汁傾入猪尿胞內  
任水蛭吮飽將鍼刺蛭流出血汁塗鬚髮留根二  
分其汁浸漬入肉鬚髮一年茂黑且柔軟極妙

旱蓮膏 烏鬚黑髮如神旱蓮草十六斤六月下  
晒過五日不住手攪午時方加真生薑汁好蜜各  
一斤相和如前晒攪至數日似稀糖成膏磁罐收

一服至二三十日酒一鍾藥一匙調服午後又  
一服至二三十日酒一鍾藥一匙調服午後又  
一服至二三十日酒一鍾藥一匙調服午後又

髮宜多櫛 髮是血之餘一日一梳常以百二十為數  
髮去風故道家晨梳常以百二十為數髮多梳則明

髮占凶證 病善怒者死○病者十五死○病者起者死  
麻善怒者死○病者十五死○病者起者死

單方 八種

鍼砂 染白髮令黑取二錢醋浸七日取晒乾  
炒黑入沒石子一箇為末擦如上法

地黄乾熟二種皆黑鬚髮良藥

牛膝止髮白煎服或釀酒服之佳

旱蓮草長鬚髮令變白為膏每匙酒服

半夏治眉髮落不生先用生薑擦三次後

竹瀝男女粘髮或即解和少鹽尤妙

何首烏黑鬚髮末服九服

芭蕉油治婦人髮落塗

槐實久服令鬚髮不白

黑桑椹變白髮釀酒服之佳又取一升和科斗一升

髮髭黑如漆



母丁香

以生薑汁研拔去白鬚塗孔中即生  
黑髮又白蜜塗孔中亦生黑者

胡桃

外青皮和科斗為泥染白鬚令黑又

胡麻

生取油塗頭生禿髮又烏麻九蒸九暴為末

蔓菁子

壓取油塗頭能變蒜髮

熊脂

主頭痒生白禿瘡髮落常塗之令生髮且長

常塗之

白鴿糞

以治頭上白禿瘡取糞為末

羊糞

治髮落燒灰淋汁沐頭令易生而黑

猪鬚膏

主髮落取臘月者火上烱化

前陰

前陰屬宗筋

內經曰前陰者宗筋之所聚太陰陽明之

脾脉陽明胃脉皆輔近宗筋故云合也。宗筋謂陰毛中橫骨上下之豎筋也納。

前陰諸疾

前陰諸疾皆由足厥陰與督脉經曰足厥陰之脉入毛中過陰器抵小腹是肝脉所過也

又曰督脉者起於小腹以下至篡與女子等是督脉所孔循陰器男子循莖下至篡與女子等是督脉所

過也。足厥陰之脉為丈夫癰疔婦人小腹腫。足厥陰之脉起於下極之俞並於脊裏上至風

府任脉起於中極之下以上毛際循腹裏至咽喉任脉為病男子內結七疝女子帶下瘕聚。陰

腫陰痿陰痒陰挺陰縮木腎陰蝕瘡腎藏風皆前陰之疾也。

疝病之因

疝病之因內經曰寒在小腹腹氣結聚之所為也。納。疝者畢丸連小腹急痛也。燁。有痛在畢丸者有

在五樞穴邊者皆足厥陰之經也。或有形或無形。或有聲如蛙有形成如瓜自素問以下皆以為寒理。固然也。予思之此病始於濕熱在經鬱而久又





有感寒氣外束所以作痛若只作寒論恐為未備人有踢氷涉水終身不病此者無熱故也蓋大怒則火起於肝醉飽則火起于胃房勞則火起于腎火積之久母能生子虛濕氣便盛厥陰屬木係於肝為將軍之官其性急速火性又暴為寒所束宜其痛之太暴也有以烏頭梔子作湯服之其效亦敏

然濕熱又須分多少而治

# 脉法

內經皆以滑脉為病是也心脉搏滑急為心疝

肺滑甚為癰疔心脉微滑為心疝腎肝滑甚為癰

腹痛納○腎脉大甚為陰痿○脉急者曰疝癰小

寒血聚為癰太陰受寒氣聚為疝○腎脉小急為寒

肝脉小急心脉小急不鼓皆為癰○小急為寒

甚不鼓則血不流故血內凝而為癰○小急為寒

急積聚在裏牢急者生弱急者死○寸口脉弦浮澁為癰

寒痛痛甚則伏或細或動○寸口脉弦而數者陰

緊相搏則為寒疝○婦人少陰脉滑而數者陰

中生瘡少陰脉浮而動浮則為虛動則為痛婦人

則陰脫下繇○疝瘕積聚脉弦急者生虛弱小者死繇

# 疝專主肝

疝專主肝經也與腎經絕不相干○疝痛屬

腹痛同一治法○局方多以為小腸氣膀胱氣

腎氣者亦自其標本而言其實主於肝也蓋肝脉

環陰器而上入小腸又肝腎皆屬於下與衝任督

脉相附腎與膀胱為藏府其氣相通運為外腎系

於畢九此三經相連相會然肝主筋畢九雖名外

腎非厥陰環而引之則與王莖無由伸縮在女子

則為纂戶也門靈樞云邪在小腸連畢九屬於腎

貫肝絡肺心系氣盛厥逆上衝腸胃重肝散於育

# 疝病有七

之亦以厥陰取厥陰以下疝之總名也水疝即癰

筋疝罕見之蓋下疝瘡之屬也○疝者寒疝

水疝筋疝血疝氣疝狐疝癰疝是也○疝曰奔豚曰小腸氣曰膀胱氣通謂之腎氣○疝有

中有一木腎者有偏墜者門外陰癰屬肝系宗筋胃陽明養之世多不識謂之門外腎非也

痼一曰厥痼二曰癰痼三曰寒痼四曰氣痼五曰盤痼六曰附痼七曰狼痼八曰鯁痼

屬厥陰一經俗說小腸膀胱腎氣者皆妄言也

寒痼之者坐臥濕地或寒月涉水或值雨雪或坐卧風

冷使內過房宜以溫劑下之久而無子

水痼者腎囊腫痛陰汗出或囊腫狀如水晶或瘰癧

使內也勞汗出而遇風寒濕之氣聚於囊中故如冰冷令人為卒痼宜以逐水之劑下之

筋痼者陰莖腫脹或潰而為膿裏急筋縮或莖中作痛痛極則痒或挺縱不收或出白物如精隨洩

而得之於房室勞傷及邪術所使宜以降心火之劑下之

血痼者狀如黃瓜在小腹兩傍橫骨兩端約紋中俗名便癰得之於重感春夏大燠勞於使內氣血

流溢滲入脬囊留而不去結成癰腫膿少血多或  
值情慾當泄不泄亦成此疾宜以和血之劑下之  
紓

### 氣疝

者其狀上連腎俞下及陰囊多得於號失怒  
氣鬱而脹號失怒罷即氣散者是也有一治法

以鍼出氣而愈然鍼有得失宜以散氣之劑下之  
或小兒亦有此疾俗名偏墜得之於父已年老或

年少多病陰痿精怯強力入房因而有子稟胎  
病也此證難治惟等賓一穴灸之而愈者紓

### 狐疝

者其狀如仰瓦卧則入小腹行立則出此疝入  
囊中如狐晝出穴而尿夜入穴而不尿此疝出

入往來上下正與狐同類也與氣疝大同小異宜  
以逐氣流經之劑下之紓○狐疝卧則入腹立則

出腹偏入囊中者是也狐夜伏而晝見以見疝處  
厥陰之分即人之陰篡隱奧之所晝下而夜上故

以狐名  
焉

### 癰疝

者其狀陰囊大如升斗不痒不痛者是也得之  
於地氣卑濕故江淮之間多有之宜以去濕之





劑下之女子陰戶凸出亦是此類不可溫之補之  
宜以苦藥下之以苦堅之。○瘰癧者畢囊腫大  
如升如斗者是也。○瘰癧小兒生來有此者乃胎中宿疾  
門挺出亦稱瘰癧病。○瘰癧難治氣瘰癧水瘰癧鍼灸  
也。○瘰癧有四种腸瘰癧小腸瘰癧卵瘰癧難治氣瘰癧水瘰癧鍼灸  
易治。○瘰癧即小腸瘰癧氣也。○瘰癧難治氣瘰癧水瘰癧鍼灸  
卵瘰癧王莖腫硬引臍絞痛其則陰縮肢冷囊上生  
瘡二證出水不止者死。○氣瘰癧素有濕熱因怒激  
火昏眩手搖面黑畢丸能左右相過。○水瘰癧外腎  
腫大如升如斗不痛不痒俗呼膀胱氣也。○瘰癧  
下疳痛連腰脊控畢丸而痛者名曰瘰癧之小  
腸氣。○小腹牽囊莖痛者名曰瘰癧之小

疝病證候

從小腹上衝心而痛不得前後為衝疝。○小腹  
有三肝病小腹痛引脇痛小腸病小腹引畢丸腰痛  
痛膀胱病小腹痛腫不得小便或遊走背脊或冷氣搶  
腎小腹作痛或攻刺腰脇或遊走背脊或冷氣搶  
心或手足厥冷有壯熱惡寒者有自汗者有積聚如  
不得大小便者有下泄者有自汗者有積聚如



如臂如桃李如盤大其於陰間則卵有大小而上  
下不常囊有腫脹痛歇無定按冷觸怒則塊物上  
衝心胃心平氣和則  
塊物歸入囊中

# 諸疝治法

疝痛屬濕熱痰積流下作病因寒鬱而發也  
○疝痛之證古方用辛溫之劑以散之是

治其標也丹溪以為痰飲食積死血流注歸於厥  
陰肝經用辛平之藥以豁痰消積破血是治其本  
也夫疝痛有定處是有形之積也非痰飲與食積  
死血相聚而何哉若是無形之氣作痛則走注滿  
腹而流散於遍身矣○治法大要以流行疎利  
為先母曰腎虛得病不敢踈泄蓋腎為邪氣所干  
若不逐去病根何由愈倘或姑息補住使大小  
府秘而不通邪氣入腹衝心危殆必矣○凡疝  
痛走注無形者屬氣也痛有常處而有形乃濕痰  
食積瘀血也○此疾雖因虛而得不可不以虛驟  
補經云邪之所湊其氣必虛留而不去其病即實  
故必先滌去所蓄之邪然後補之諸藥多借巴豆  
氣者蓋為此也○疝有挾虛而發者其脉不甚  
沉緊而豁大無力者是也其痛亦輕惟覺重墜牽



引耳當以參朮為君疎導藥佐之疎導即桃仁山查枳實梔子茱萸川練玄胡索丁香木香之類是

也。○諸病以手按之大痛者為實不痛者為虛。

### 寒疝藥

宜禹功散防風加味五苓散下青木香元蟠葱散當歸四逆湯羊肉湯烏頭桂枝湯三因葱白

散四神丸

### 加味五苓散

治寒疝本方虧視加木香茴香川練子

煎水吞下青木香元蟠

### 青木香元

破治寒疝及膀胱疝氣腫氣果丑頭末三兩

右為末水丸梧子大空心鹽湯下五十丸○一法青木香元二百粒斑貓七箇同炒令微香以磁

器蓋之候冷去貓每五十九苗香酒吞下蓋病屬肝故借貓以治風

### 蟠葱散

治脾胃虛冷心腹攻刺連胃脇膀胱小腸腎氣作痛蒼朮甘草各一錢三稜蓬朮白茯苓

青皮各七分縮砂丁香皮檳榔各五分玄胡索皮桂乾薑各三分右釵末作一貼葱白一莖煎服

### 當歸四逆湯

治寒疝臍下冷痛當歸一錢二錢二分附子

玄胡索川練子茯苓各七分澤瀉五分右剉作一貼水煎空心服

### 羊肉湯

治寒疝臍腹脹痛手不敢近羊肉一斤生薑五兩當歸三兩右水八升煮取三升每服七

合日三服。一婦冬月解產寒入產門臍腹脹痛手不敢近服此湯二服即愈

### 烏頭桂枝湯

治風寒疝氣入腹刺痛陰縮手足逆冷大川烏一箇用蜜一盞同煎減半取出

細切肉桂白芍藥各三錢三分甘草二錢半右剉分二貼入薑三棗二及前煎蜜半合同煎服

去烏頭代附子名爲蜜附湯

### 三因葱白散

治寒冷氣入膀胱作痛川芎當歸熟地黃白芍藥枳殼厚朴蓬朮三稜赤茯苓

肉桂乾薑人參川練肉神麴麥芽青皮茴香木香各五分右剉作一貼葱白二莖鹽一匙煎服



**四神丸** 治冷痢脹痛 吳茱萸 一半 酒浸 一 半 醋浸 焙 乾 萸 澄 茄 青 木 香 各 五 錢 大 香 附 一 兩 右 為

末 糊 九 梧 子 大 鹽 湯 下 七 八 十 九 研

**水疝藥** 宜 禹 功 散 三 花 神 祐 九 疝 疝 見 腰 子 散 秘 傳 茱 萸 內 消 元 外 用 牡 礬 丹 擦 之

**腰子散** 治 水 疝 腫 痛 黑 丑 白 丑 等 分 並 炒 取 頭 末 右 末 三 錢 取 猪 腰 子 一 部 薄 批 入 川 椒 五 十 粒

茴 香 百 粒 以 牽 牛 末 遍 糝 之 濕 紙 包 裹 以 線 扎 定 煨 令 香 熟 取 出 空 心 溫 酒 嚼 下 取 下 惡 物 便 愈 搗

**秘傳茱萸內消元** 水 治 疝 氣 及 陰 癰 偏 大 或 生 瘡 出 黃 水 吳 茱 萸 半 酒 半 醋 浸 一 宿 焙 乾

山 茱 萸 馬 蘭 花 醋 浸 焙 川 練 肉 肉 桂 黑 丑 頭 末 茴 香 鹽 炒 玄 胡 索 炒 陳 皮 青 皮 並 去 白 海 藻 洗 去 鹹

焙 桃 仁 炒 白 蒺 藜 炒 木 香 各 五 錢 右 為 末 酒 糊 和 九 梧 子 大 鹽 湯 或 溫 酒 下 五 七 十 九 搗

**牡礬丹** 治 陰 囊 生 瘡 出 水 其 痒 甚 苦 搔 之 無 足 後 必 自 痛 牡 蠣 粉 黃 丹 各 二 兩 枯 白 礬 四 兩 為 末

遇 夜 用 手 捏 藥 於 痒 處 擦 之 連 擦 三 四 次 自 然 平 復 門

筋疝藥

宜瀉心湯  
功觀加減柴苓湯清

龍膽瀉肝湯

治肝藏濕熱男子陰挺腫脹婦人陰挺  
瘡痒或陰莖濕痒出膿水此因酒得之

龍膽草柴胡澤瀉各一錢木通車前子赤茯苓生  
地黃當歸並酒拌山梔仁黃芩甘草各五分右剉

作一貼水煎  
空心服

加減柴苓湯

治諸疝因濕熱腫痛出水柴胡澤瀉各  
一錢半夏赤茯苓白朮猪苓山查梔子

荔枝核各七分右剉作一貼水  
煎服無荔枝核則代橘核

血疝藥

宜玉燭散  
復元通氣散  
胎前桃仁承氣湯  
麝散

神聖代鍼散

治血積疝痛及諸疝刺痛服之神效  
香沒藥當歸白芷川芎羌青製各一錢

右為末每服一字甚者五分先點好茶一盞次  
糝藥末在茶上不得吹攪立地細細呷之

氣疝藥

宜蕩疝丸  
飲三柴九蟠葱散  
坊見氣

蕩疝丸

治氣疝黑丑頭末破故紙炒茴香炒川練子  
炒各一兩蓬朮木香各四錢青皮陳皮各三

錢右為末酒下五糊和丸梧子  
大空心酒下五七十丸

氣疝飲

治氣疝黃連以吳茱萸煎水浸炒二錢人參  
白朮各一錢白芍藥陳皮各七分甘草三分

右剉作一貼薑  
三片水煎服

三策丸

治氣疝腫痛山茱萸吳茱萸食茱萸各二兩  
破故紙炒一兩七錢川練肉一兩斑菹十四

箇同炒赤去菹黑丑頭末炒一兩青鹽青皮茴香  
炒各三錢右為末醋麪糊和丸梧子大先嚼桃仁

十五粒以溫酒或鹽  
湯下三五丸

聚香飲子

治七情所傷遂成疝氣乳香沉香白檀香  
木香藿香丁香各八分玄胡索薑黃烏藥

桔梗桂心甘草各四分右剉  
作一貼薑三棗二水煎服

狐疝藥

寒濕下注于囊中名為狐疝亦屬痰病二陳湯  
麴加青皮香附蒼朮門○宜服二香丸又丁

香練實丸四炒川練丸苗  
香練實丸皆可選用

### 二香丸

治狐疝上下出入作痛或疝痛作則腹內塊  
痛止疝痛止則腹內塊痛復作木香附子

各三兩山查肉二兩三稜蓬朮並醋煮神麴薑黃  
南星各一兩黃連與吳茱萸同炒蘿菔子桃仁梔

子仁橘核炒各五錢右為末薑汁浸蒸  
餅和丸梧子大白湯下五七十丸

### 疝藥

大抵癰疝屬濕多瞶○癰有四種一曰腸癰一  
名小腸氣宜天台烏藥散救命通心散去鈴九

加味通心飲蠲痛元消疝丸立效散○二曰卵癰  
即水疝之類藥亦同○三曰氣癰即氣疝藥亦同

○四曰水癰即膀胱氣宜青木香元坊見三花神  
祐丸防風神保元治膀胱氣脇下痛最妙

白散四味茴香散柴萸內消元楊氏麝香元金鈴  
散三疝湯○癰疝中有偏墜有木腎別立條○癰

病通用橘核  
丸橘核散

### 天台烏藥散

治小腸氣川練子十箇巴豆十四粒同  
麩炒黑色去豆麩不用烏藥木香茴香



炒良薑青皮各五錢檳榔三錢右細末  
每一錢溫酒調下痛甚炒薑熟酒下

### 救命通心散

治小腸氣痛川烏一兩以青鹽一錢酒一盞浸一宿去皮尖焙乾川練子肉一

兩以巴豆肉二十一粒同炒黑色去頭茴香五錢石燕一對火煨醋淬土狗五枚芥子一錢六分右

為末每三錢入羊石子內濕紙裹煨熟夜半時好酒半升八鹽細碎石子以酒燖下不得作聲小便

大利其病即去

### 去鈴丸

治小腸疝氣茴香一斤以生薑一斤取自然汁浸一宿約薑汁盡入茴香然後入青鹽

二兩同炒赤取出焙燥為末酒糊丸梧子大每三五十九丸溫酒米飲任下此藥全實脾胃且有鹽能

引入下部有薑汁專一發散而無誤導之害服之緊效

### 加味通心飲

治小腸疝氣熱痛小便不通瞿麥木通梔子黃芩連翹枳殼川練子甘草各一

錢右剉作一貼燈心二十莖車前草五葉同煎服

蠲痛元

治小腸勝脫氣痛玄胡索一兩川練肉茴香炒各五錢白丑頭末炒當歸良薑青皮木香

烏藥各二錢半全蝎焙七箇右為末薑汁浸蒸解和丸梧子大燒綿灰調酒送下三五十九粒

消疝丸

治小腸疝氣蒼朮一升甘浸切片葱白一斤切和鹽一兩同炒黃去葱川椒微炒白茯苓

茴香炒各四兩右為末酒糊和丸梧子大空心溫酒下五七十粒

立效散

治小腸氣痛全蝎七箇縮砂三七枚茴香一錢右為末分三貼熱酒調下空心即效

茱萸內消丸

治勝脫腎虛結成寒疝偏墜引痛及小腸奔豚疝瘕等證山茱萸吳茱萸川練

子馬蘭花茴香青皮陳皮山藥肉桂各二兩木香一兩右為末酒糊和丸梧子大酒下五十九粒

楊氏麝香元

此藥尋諸處痛凡勝脫氣痛最難治此藥王之處木香胡椒各一兩全蝎炒巴

豆霜各四錢麝香一錢右為末蒸餅和丸麻子大朱砂為衣熟水下五七九粒

金鈴散

治勝脫小腸氣腫痛大川練子三十枚取肉切片巴豆肉三十粒作片同炒色焦去巴豆



右以茴香炒與川練肉等分并入木香二錢半右為末每二錢水酒各半煎葱白湯調下空心植

### 三疝湯

治膀胱氣腫痛車前子二錢四分茴香一錢六分葱白一錢二分沙參八分右剉作一貼

水煎服

### 橘核丸

治四種癰疔卵核腫脹偏有大小或硬如石或小腹絞痛甚則囊腫潰爛出黃水橘核炒

海藻鹽酒炒各一兩玄胡索炒海帶鹽水洗桃仁麩炒川椒子炒各一兩

木通各五錢右為末酒糊和丸梧子大溫酒或鹽湯下六七十九丸○久不消加醋煮晒砂二錢

### 橘核散

治四種癰疔久者用橘核丸新者用橘核散

炮吳茱萸各五分右各炒為麩末作一貼水煎服○橘核單止痛烏頭散寒鬱山梔除濕熱又引

烏頭速下不令胃中停留用之甚捷

### 三白散

治膀胱氣蘊熱陰囊腫脹大小便不通白丑頭末一兩桑白皮白朮木通陳皮各二錢半

右為末每二錢薑湯  
或葱白湯調下

### 四味茴香散

治囊莖抽痛不可忍俗名小腸氣烏藥酒浸一宿焙良薑茴香青皮各一兩右

為末每二錢發時熱酒調下

### 陰卵偏墜

陰卵一錢邊腫大偏墜牽引或痛古方謂之卵瘻宜金鈴子九茱萸內消元馬蘭花九茴香

安腎湯加減香苓散。偏左多瘀血怒火偏右多濕痰食積

### 金鈴子丸

治疝氣偏墜痛不可忍川練子肉五兩割作五分一用斑貓十箇同炒去貓二用茴香三錢鹽半錢同炒去鹽留茴香三錢

同炒去黑丑四錢用破故紙三錢同炒留故紙五錢

羅菴子一錢同炒去羅菴子右為末酒糊和九梧子大溫酒下三五十九

### 茱萸內消元

治陰癰偏大膚囊腫脹或生瘡瘍時出黃水川練肉一兩半大腹皮五味子玄

胡索海藻各一兩二錢半桔梗青皮山茱萸各一兩木香七錢茴香桂心川烏炮吳茱萸食茱萸桃



仁各五錢右為末酒糊和丸  
梧子大溫酒下三五十九

### 馬蘭花丸

治癰疽偏墜及婦人陰癰小兒偏墜無有  
不效即上摘核丸加馬蘭花一兩擯榔五

錢也服法  
亦同

### 茴香安腎湯

治左邊偏墜丸如雞鴨子大人參白朮  
白茯苓茴香破故紙檳榔烏藥便香附

縮砂荔枝核各八分黃柏澤瀉各六分木香玄胡  
索各四分升麻甘草各二分右剉作一貼煎服

### 加減香苓散

治偏墜氣初起壯熱增寒乃發表分利  
藥也一服而愈枳殼陳皮香附子蒼朮

麻黃猪苓澤瀉木通滑石車前子三稜蓬朮川練  
子玄胡索甘草各七分右剉作一貼入生薑三片

葱白二莖  
水煎服

### 木腎

木腎之證脹大作痛煩痺結硬治法當溫散溫利  
以內消之又有墜墮跌傷驚氣與敗血交攻亦有

木強脹痛之證治法更為之消瘀宜川練散  
木腎者陰莖堅硬煩痺不痛乃心火不降腎水不

溫宜四製柴萸丸四炒川練丸見防敗血攻入者  
當消瘀血門。木腎不痛宜活腎丸見防敗血攻入者。消渴木  
腎一名強中  
無治法辯觀

### 川練散

治外腎脹大麻木痛硬謂之木腎又治奔豚  
疝氣偏墜川練子四十九箇先切七箇取肉

以茴香二錢半同炒併留又切七箇以黑丑二錢半同炒併

留又切七箇以鹽一錢同炒併留又切七箇以巴豆肉十四箇

同炒去巴豆切七箇以蘿菔子二錢半同炒去蘿

菔乃入下藥茴香炒木香各五錢粹桂一錢半右

為末酒麪糊和丸梧子大空心鹽酒下三五十九  
○瘀血木腎以前方加玄明索五錢畧炒劑之以

### 活腎丸

治木腎不痛蒼朮鹽炒一兩黃柏酒洗枳實  
滑石各七錢南星炮半夏製山查肉神麴炒

白芷各五錢昆布吳茱萸各三錢右為末酒糊和  
丸梧子大鹽湯下七十九一方無枳實有枸杞子



門入

# 奔豚疝氣

臍下有動氣名曰腎氣亦曰奔豚衝心最急其人

素有腎積因傷寒之邪衝突下焦致其發動如江豚之奔衝也大抵真氣內虛水結不散氣與之搏

即發奔豚雖有發表攻裏之證汗之下之皆不可也理中湯勦觀加肉桂父赤茯苓去白朮主之蓋

桂能泄奔豚茯苓能伐腎邪故也白朮助土剋水燥腎閉氣是以去之咽口奔豚氣衝心宜奪命丹

一胡蘆巴元  
一捏金散

## 奪命丹

治奔豚疝氣上衝小腹引痛神效吳茱萸一

童便浸並焙乾澤瀉二兩右爲末酒麪糊和丸梧子大空心鹽湯下五七十丸調○入門一名四製

丸  
茱萸

## 胡蘆巴元

治奔豚疝氣上衝痛不可忍茴香炒三兩白芷頭末二兩川烏炮巴戟吳茱萸各一



兩半川練子胡蘆巴各一兩右為末酒糊和丸梧子大空心酒下二三十九

# 一捏金散

治奔豚疝氣上衝及小腸氣臍腹大痛玄胡索川練肉全蝎炒茴香炒右為末每二

錢熱酒調下神驗

# 陰縱陰縮

靈樞曰莖垂者身中之機陰精之候津液之

謂前陰受寒入腹內也經曰足厥陰之筋傷於內則不起傷於寒則陰縮入傷於熱則縱挺不收是也○陰、囊垂縮有寒有熱夫熱在外寒在內則囊垂此九夏之氣也寒在外熱在內則囊縮此三冬之氣也以不病人論之夏暑大熱囊卵累累垂冬天天寒急縮收上蓋冬天陽氣在內陰氣在外故寒在外則皮急皮急則囊縮夏月陰氣在內陽氣在外故熱在外則皮緩皮緩則囊垂此瘕疝之象至於傷寒及熱病熱入厥陰則囊卵縮者熱傷筋急故也九火灼則筋急亦其類也○陰縮在女子則陰戶急痛引小腹疼○男子陰挺腫脹陰莖諸疾通用龍膽瀉肝湯○陰囊縮詳見





傷寒門及霍亂門可參考。○一少年王莖挺長腫而痿皮塌常潤磨股難行兩脇氣逆上手足倦弱先以小柴胡湯麩覷加黃連大劑行其濕熱少加黃栢降其逆上之氣腫漸收外以絲瓜汁調五倍子末付之而愈

脫陽證詳見救急

陰痿陰痿皆耗散過度傷于肝筋所致經云足厥陰之經其病傷于內則不起是也

疾虛勞門參考。○陰痿宜還少丹五精丸上丹

還少丹治下部脉微細陰痿不起熟地黃枸杞子各一兩半山藥牛膝遠志山茱萸巴戟白茯苓

五味子石菖蒲肉苁蓉楮實子杜仲茴香右為末蜜和棗肉為丸梧子大空心溫酒或鹽湯下三五

十丸能起當服黃栢知母清火堅腎之藥

五精丸治腎虛陰痿秋石鹿角霜白茯苓陽起石山藥各等分右為末酒糊和丸梧子大每服五

十丸常近火氣使乾燥  
服之無慮

### 上丹

治勞傷虛損男子絕陽痿事不興五味子八兩

蛇床子兔絲子百部根杜冲白茯苓防風巴戟  
肉蓯蓉山藥遠志枸杞子栢子仁各二兩右為末  
蜜丸梧子大空心溫酒或鹽湯下五七十九丸

### 膻補天丸

治虛損陰痿胡桃肉三兩白朮二兩半  
白芍藥黃芪熟地黃杜冲牛膝破故紙

川練肉遠志各二兩膻肭臍人參白茯苓枸杞子  
當歸川芎茴香各一兩半木香茯苓神甘草蜜炙各

一兩沉香五錢右為末用膻肭臍製酒煮麴糊和  
丸如梧子大空心溫酒或鹽湯下五七十九丸

### 九仙靈應散

治男子陰濕陽痿每逢不舉附子炮蛇  
床子紫梢花遠志石菖蒲海螵蛸丁香

木鱉子各二錢小腦一錢半右龍末每五錢水三  
椀煎至一椀半溫洗濕處并陰囊日二次留水再

溫洗多洗  
尤好翻

### 陰冷

下部陽虛陰冷如冰宜八味丸  
十補丸吳茱萸湯清魂湯回春散助陽散○內固丸

病疝冷氣上貫齒下貫腎繫若繩挽兩畢持腫而  
冷戴人診兩手脉細而弱斷之曰秋脉也此因金  
氣在上下伐肝木木畏金抑而不伸故病如是肝  
氣盤礴不能下榮於畢丸故其寒實非寒也木受  
金制傳之胃土胃為陽明故上貫齒肝木者心火  
之母也母既不伸子亦屈伏故下冷而水化乘之  
經曰木鬱則達之土鬱則泄之令涌泄四次果覺  
氣和畢丸痒而煖戴人曰氣已入畢中矣以茴香  
蓬朮之藥使服  
之一月而愈

### 加減內固丸

治命門火衰腎寒陰痿元陽虛憊巴戟  
肉茯苓山茱萸兔絲子各三兩破故紙

二兩半石斛胡蘆巴各二兩或鹽湯下一兩附子五錢  
右為末蜜丸梧子大溫酒或鹽湯下五錢

### 十補丸

治寒疝陰冷及小腸膀胱奔豚等證附子一  
兩防風一兩剉如豆大鹽四兩黑豆一合同

炒附子裂去諸藥只取附子胡蘆巴木香巴戟川  
練肉肉桂玄胡索葶澄茄茴香炒破故紙炒各一

兩右為末糯米粉酒打糊和丸梧  
子兩大朱砂為衣酒下五七十丸

吳茱萸湯

治厥痼上逆陰分囊寒川烏細辛各七分

分半右剉作一貼水煎服

清魂湯

治外腎冷前陰痿陰囊濕痒柴胡酒黃栢生

活麻黃根防己草龍膽赤茯苓各五分紅花

回春散

治陰冷如神○歌曰一錢白礬八分丹黃

和手內攤○又歌曰男左女右合陰處渾身是汗

助陽散

治急陰冷乾薑牡蠣各一兩右為末以燒

陰腫

橘核散久者宜橘核丸見方○類新發者宜三白散

○陰腫偏大或痛牡蠣煨粉乾薑炮末一兩水調

如糊塗病處即愈○陰腫宜用蟬退散○小兒

薄荷汁調塗葱白汁甘草汁皆可鞣。大人小子

陰腫硬痛地龍不去土為末蚯蚓糞等分以雞子清調付患處綿巾色裹登時縮上即洗去如神

蟬退散治陰囊忽腫犬多因坐地觸風濕或虫蟻吹着蟬蛻五錢水煎洗腫處再三服五苓散

合三疝湯如法

囊癰疽

陰囊濕痒陰囊濕痒謂之腎藏風人之精血不足內為嗜慾所耗外為風冷所乘風濕毒氣從虛而

入囊下濕痒或生瘡皮膚脫下注則兩脚生瘡癰或耳鳴眼昏宜活血驅風散

膏散烏頭丸椒粉散

活血驅風散治腎藏風囊下濕痒脚生瘡癰白蒺藜炒當歸川芎白芷細辛桃仁半錢槐潤

白芍藥五靈脂甘草生各六分蒼朮杜仲桂皮薏苡仁天麻橘紅檳榔厚朴枳殼各三分右創作一

貼薑五棗二水煎入乳香末少許空心服之乳香以佐心氣使心腎相交也

### 疾藜散

治瘡風上攻耳鳴目眩下注陰濕瘡痒草烏水浸三日逐日換水去皮晒乾白疾藜炒各

五錢白芷白附子生蒼朮炒荊芥穗各二錢半右為末米糊和丸梧子大鹽酒下三五十九粒

### 四生散

治腎藏風脚生瘡癰或兩耳鳴痒白疾藜黃芪獨活白附子各等分右為末每二錢薄

荷酒調下。或以猪腰子批開入藥末二錢合定裹煨香熟空心細嚼以鹽酒送下即差

### 乳香龍骨散

治外腎濕痒痿爛如癰龍骨石膏生五倍子各二錢半白芨乳香黃丹各一錢

二分半麝香少許右為末先以苦參大腹皮紫蘇葉煎湯溫洗後糝付

### 烏龍丸

治腎藏風下注生瘡癰川烏草烏各一兩以黑豆半升煮透軟去皮臍切晒乾入白附子

天麻地龍各五錢右為末酒糊和丸梧子大空心鹽湯吞下三五十九粒

### 椒粉散

治陰囊濕痒麻黃根二錢黑狗脊卿也蛇床子各一錢川椒當歸梢猪苓各六分



為末輕粉紅花各少許右

疝痛劫藥

湯寒疝入腹刺痛及小腸膀胱氣痛劇宜推附

水入薑汁調服烏頭為子以降濕熱烏頭以破寒鬱皆

中停留也。又方薑湯下三四十枝炒川烏細切炒右

梔附湯

一箇炮熟右剉取二錢水一盞酒半過大附子

七分去滓入鹽一撮溫服。蓋川烏治外束之

神聖代鍼散

忍服之。神效。不可見。

諸疝通治

治疝通用五苓散。陳湯隨證加減。四氣七情

心與小腸白朮利腰臍間濕與死血茯苓利膀胱

水木得桂則枯。故用以伐肝木。○通治宜胡蘆

巴丸。坊見。又治小腹有形如卵。上下痛不可忍。○

馬蔞花丸。坊見。又治小腹內消元。坊見。復元通氣散。坊見。

臘○通治宜苗香練實丸木香金鈴丸丁香練實  
丸四炒川練丸五炒川練丸烏附通氣湯十味蒼

相散神  
消散

### 苗香練實丸

治男子七疝婦人帶下癰聚痛不可忍  
皆任脉所主治法同馬川練子炒苗香

山茱萸吳茱萸食茱萸青皮陳皮馬藺花荒花各  
一兩右為末醋糊和丸梧子大溫酒下五十丸

### 木香金鈴丸

治諸般疝氣及外腎腫脹痛一服立應  
乳香沒藥木香附子炮苗香鹽炒川練

肉玄胡索全蝎炒人參各等分右為末  
酒糊和丸梧子大空心黃酒下百丸

### 丁香練實丸

治男子七疝女子癰聚帶下當歸附子  
炮川練肉苗香各一兩右剉好酒三升

煮酒盡為度焙作細末每藥末一兩入丁香木香  
各二錢全蝎十三箇玄胡索一兩右並為末與前

藥拌勻酒糊和丸梧子大空心酒下百丸  
帶下皆屬於風全蝎治風之聖藥川練苗香皆入

小腸經當歸玄胡索和血止痛疝氣帶下皆積寒  
邪於小腸之間故以附子佐之丁香木香為引導



也 有人患疝痛三年  
服此三劑良愈

### 四炒川練丸

治一切疝氣腫痛縮小久服斷根  
肉一斤作四分用麩一合斑貓四

十九枚同炒一分用麩一合巴戟一兩同炒一分  
麩一合巴豆四十九枚同炒一分用鹽一兩同炒一分

一合同炒並以麩黃色為度棟去同炒藥只取川  
練肉再加木香破故紙炒各一兩為末酒糊和丸

梧子大每五十丸  
鹽湯下日三服

### 五炒川練丸

治諸疝川練肉五兩將一兩斑貓三箇  
同炒一兩茴香三錢鹽五分同炒一兩

破故紙三錢同炒一兩黑丑三錢同炒一兩  
子一錢同炒揀去同炒藥只留茴香破故紙川練

肉為末酒糊和丸  
大溫酒下五十丸

### 烏附通氣湯

治新久疝病四氣七情疝皆效  
子富歸白芍藥山查肉橘皮各一錢

白朮七分赤茯苓澤瀉各五分猪苓木香  
甘草各三分右剉作一貼水煎空心服

十味蒼栢散

通治濕熱疝痛蒼栢術黃栢香附子各一錢青皮玄胡索益智仁桃仁各七分茴

香炒附子炮甘草各五分右劉作一貼空心水煎服

神消散

治諸般疝氣外腎脹痛山梔仁鹽水炒黑橘核炒茴香鹽水炒各一兩荔枝核八錢益智

仁炒七錢檳榔五錢青皮油炒三錢右為末每二錢燒酒調空心服不飲酒鹽湯服

疝病危證

疝痛之證或因風寒外襲或因怒氣上衝小腹痛作痛上連脇肋甚則搖入反張咬牙戰掉

冷汗交流須臾不救○疝病虛甚上為嘔吐下有遺精者危○惟是逆氣長壅中腕停酸躁悶擾擾甚而至於嘔吐最為惡候蓋脾土不濟腎水上乘必為酸汁或為痰涎遂成暴吐大小二便閉格閉澀而腎汁胃汁皆自其口出也如此者大抵不救矣

疝病禁忌

凡疝病非痛斷房事與厚味不可用藥

陰囊病死候

靈樞曰悲哀動中則傷魂傷則陰縮而陰囊死候。傷寒及熱病肝氣絕則舌卷卵上縮

而終矣蓋肝者筋之合也筋者聚于陰器而脉絡于舌本故如是也。○病人陰囊莖俱腫者死。鰾

### 導引法

坐舒兩脚以兩手捉大拇指使足上頭下極挽五息止引腹中氣遍行身體去邪瘕病類

### 陰蝕瘡下疳瘡

諸詳見

### 婦人陰門諸疾

有陰挺陰瘡陰脫陰腫陰冷

### 陰挺

瘡或花丸在婦人則為陰戶突出名曰陰瘡宜馬蘭花丸方現。○陰中突出如菌如雞冠四

圍腫痛乃肝鬱脾虛下陰先以棉中益氣湯加梔子茯苓車前子青皮清肝火升脾氣更以歸

脾湯加梔子一尺許痛墜尿澀朝服外塗蘼蘆膏。○陰中益氣湯

○晚服龍膽瀉肝湯方見外塗蘼蘆膏。○陰中益氣湯

一物漸大牽引腰腹膨痛此因多服熱藥或犯非

理。○二錢生地黄黃湯調下仍用黑狗脊五倍子白礬水

楊根魚腥草誅黃連各一兩為散分四貼以有紫

瓦罐煎熟以罐甬上貫挺上先熏後洗立效。○

陰挺宜服一撚金元○陰挺突出有熱小柴胡湯合四物湯加龍膽青皮○陰脫小柴

### 一撚金元

治婦人陰挺諸藥不效玄胡索茴香吳茱萸川練子木香各二兩右為末粳米糊和

丸梧子大空心木通湯下三五十九仍用片腦五分鐵孕粉一錢水調刷付陰挺上

### 藜蘆膏

治諸努肉如菌突出藜蘆為末猪脂調和塗之一日一易努肉自入

### 陰腫陰痒陰瘡陰冷交接出血

陰腫痛極便秘欲死枳橘熨之四物湯加柴胡

梔子牡丹皮龍膽草煎服○陰戶腫痛不閉寒熱尿澀宜加味逍遙散婦人見加知母地骨皮車前

子○婦人陰戶生瘡乃七情鬱火損傷肝脾濕熱下注也○陰內下疳瘡因月後便行房致成

湛濁伏流陰道遂生疳瘡與男子妬精瘡略同黃丹枯白礬篇蓄藥本各一兩硫黃蛇床子荊芥各

五錢蛇蛻一條燒灰右為末別以荊芥蛇床子煎湯溫洗拭乾以清油調藥末糝之○婦人陰蝕

倉宜用洗溺湯疳濕散○陰中生濕蠶瘡虫如小蛆乃濕熱鬱滯也宜服硫○鯉丸外用生艾汁調



雄黃末燒烟熏之更用雄黃銑散入臍府即死陰中發  
○陰中生細虫痒不可忍蝕入臍府即死陰中發  
寒熱先以蛇床子煎湯洗爭拭乾銅綠散糝之  
○濕痒出水痛者憂思過傷所致歸脾湯加  
柴胡枳實子牡丹皮赤芍藥煎服潰爛者宜加味逍  
遙散枳實○婦人陰畔生疮以涼血飲婦人加凌霄  
花少許煎空心服○陰冷宜麝香丸回春散助  
陽散坊見○交接出血而作痛乃房室有傷由肝  
火動脾而不能攝血宜用歸脾湯加青皮燒灰為  
湯妨觀外用熟艾綿裹入陰中亂髮青皮燒灰為

未糝之門

枳橘熨法治婦人陰腫如石痛不可忍二便不利欲  
死橘皮枳實各四兩炒令香熟以絹袋盛

分兩包遍身從上至下及陰腫處頻熨之  
冷則換溫者直至喉中有枳實氣即效

洗渴湯療婦人陰蝕瘡龜甲五兩黃芩乾地黄當歸  
芍藥各二兩乾漆甘草各一兩右坐水七升

煮取一半去滓以綿帛蘸湯以濕瘡處日  
二度渴後拭乾取疳濕散糝付瘡上



疳濕散治同上五月五日蝦蟆木香硫黃鐵精

硫鯉丸治陰門內疳瘡生虫下如柿汁臭穢難近大

裹黃泥固濟火煨烟盡為末米糊和丸梧子大空心溫酒下三十丸

銅綠散治男女陰濕瘡虫蝕瘡五倍子五錢白礬一

錢乳香銅綠各五分輕粉二分半右為末先以藥水洗後糝之

麝香丸治婦人陰中久冷無子或下白帶蛇床子龍

骨各五錢吳茱萸枯白礬木香各三錢不灰木白芷各二錢半零陵香藿香各二錢丁香小腦

各一錢半麝香二分半右為末蜜和兩作三十丸每取一丸綿裹納陰中

單方凡三十八種有

白礬治陰生瘡白礬麻仁等分為末槐白皮煎湯洗瘡

脂調付○陰痒白礬蛇床子煎水淋洗

硫黃

治女人陰瘡硫黃白礬煎湯洗之杏仁燒灰油調塗之不可忍

甘爛水

治奔豚殊勝

牛膝

主陰痿煎服或釀酒服之婦人小戶嫁痛牛膝二兩酒煎服之

蛇床子

溫陰汗之主藥煎湯浴男女陰去風冷益陽事去陰汗又為末和米粉綿裹納陰中即溫

地膚子

治跳躍舉重卒得陰癢地膚子二兩半白朮一兩半桂心五錢右為末酒下二錢針

沙參

治諸疔痛欲死為末酒服二錢或剉一兩煎服亦佳

淫羊藿

主陰痿此與陽之劑也取一斤酒浸服之或作丸久服亦佳

海藻

療疔癰核腫常食消男子癰疾入藥服亦佳海帶昆布同功

茴香

治小腸疝痛不省人事茴香鹽炒枳殼各一兩沒藥五錢為末酒下二錢○卒疝痛欲死茴香

莖葉搗取汁一合和熱酒一合服之

玄胡索

治小腸疝痛玄胡索鹽炒五錢全蠲一錢為末酒下一錢或與乾薑等分末服亦佳

狼牙

婦人陰蝕瘡潰爛臭穢狼牙煎取濃汁浸洗患處或綿纏子蘸汁滴入陰戶日四五次

桂皮

寒疝痛四肢逆冷桂心末和酒塗之桂一錢熱酒調下○外腎腫痛桂心末和酒塗之桂能泄奔豚故效

○治偏墜大者桂心乾薑各一兩為末綿包陰三枚同煮晒乾又浸煮又晒水盡為度用綿包陰

亦治汗出數次便愈

槐白皮

主男子陰疝卵腫婦人陰門弄痛及下部濕痒水煮取湯淋浴之

黃栢

治下疳瘡及陰莖上瘡黃栢去熱蛤粉燥濕故也

楮木葉

治木腎取雄楮葉晒乾為末酒糊和丸梧子大空心鹽酒下三十丸楮無實者雄也

枳實

主婦人陰腫痛枳實多取炒令熱布裹熨之冷即易

川椒

凡腎氣痛須用川椒水煎服○奔豚氣及內外腎布裹着囊丸熱氣通即差○

牽痛椒葉和艾及葱白同研爛以醋湯拌罾妙韃秦椒亦可

川練子

治疝氣大小便不通痛不可忍川練子肉四十九箇巴豆肉四十九箇同炒以練子黃色

為度去巴豆只取練子為末每二錢溫酒調下

亂髮灰

治下疳瘡及陰頭瘡先以藥水洗取髮灰付乾則油調付仍以米飲調髮灰空心服

鰲甲

治陰蝕瘡及陰頭癰取甲燒為末雞子白調付之

烏賊魚骨

主陰蝕瘡為末酒服二錢又治小兒

原蚕蛾

壯陽起一錢或九服亦佳

鰻鱺魚

婦人陰蝕瘡取魚和五味煮熟空心食甚補益

地龍糞

治小兒陰囊腫痛取糞甘草湯洗後唾調付

蜘蛛

主大人小兒瘡及狐疝上下一錢為末大人一錢小兒

五分酒下空心或蜜丸服之亦佳

橘核

治膀胱腎氣痛微炒去

覆盆子

主陰痿能令堅長

桃葉

主女人陰瘡如虫咬痒痛生桃葉爛搏綿裹納

婦人陰腫小兒瘡杵桃仁付之

杏仁

治婦人陰蝕瘡痒不可忍燒研

葱白

治奔豚疝氣痛濃煎湯飲之

雀肉

壯陽強陰取肉以蛇床子熬膏和丸服謂之驛

鹿腎

壯陽氣作酒及煮粥服

牡狗陰莖

主陰痿令強熱大生子焙乾為末和酒服



膈肭臍

主陰痿助陽氣治或冷或熱之

牛外腎

治人陰痿痛悶牛肝或猪肝灸熱納陰中

出

貂鼠四足

主卒疝痛燒為灰酒調服

弱陽諸物

水銀不可食近陰令陰消無氣

鍼灸法

主七疝取關元灸三壯大敦灸七壯行間大衝中

封蠡溝關門關元水道三陰交足三里

蠡溝陰縮痛灸人中瘕痛與狐疝取大衝商丘大敦

海中極關又灸獨陰取大衝又灸臍左右各去一

寸半兩穴各七壯立效名曰外陵穴

衝氣欲絕灸獨陰神效

機中極中封交信涌泉。○又法以稗量患人口  
兩角為一摺斷。如此則三摺成。三角如△樣。以一  
角當臍心。兩角在臍之下。兩傍盡處是穴。左偏灸  
右。右偏灸左。左右灸亦無害。灸四十壯。神效。○  
氣衝專主癰。○水癰偏墜。取闌門三陰交。○  
小兒胎疝。卵偏墜。囊縫後十字紋上灸三壯。春灸  
夏差。夏灸冬差。○舉重物得癰。灸關元兩傍相  
去各三寸。青脉上灸七壯。即愈。○木腎大如升  
不痛。取大敦三陰交。木腎紅腫痛。取然谷。闌門。○  
腎藏風濕。痒瘡。取血郄。三陰交。○內經刺癰  
疝。一節即靈樞。所謂鉞。鉞取畢。囊中水液。是也。此  
法。今人亦多能之。囊大如斗者。中藏穢液。必有數  
升。信知此法  
出於古也。○

## 後陰

肛門重數

靈樞曰。肛門重十二兩。大八寸。徑二寸。太半

肛門別名

於肛門者。大腸之下截也。一日廣腸。言其廣闊







藏魄故曰魄門也肝者言其處似車缸形也出而

內經曰魄門亦為五藏使水穀不得久留主出而

# 痔病之因

曰小腸有熱必痔大腸有熱必便血○內經

不節起居不時者陰受之陰受之則八五藏入五

藏則臍滿閉塞下為飧泄久為腸澼○腸澼者大

便下血即腸風藏毒也澼者腸間積水也○蓋

飽食則脾不能運食積停聚大腸脾土一虛肺金

失養則肝木寡畏風邪乘虛下流輕則腸風下血

重則變為痔漏或醉飽入房精氣脫泄熱毒乘虛

下注或淫極入房致傷膀胱與腎肝筋脉蓋膀胱

筋脉抵腰絡腎貫腎走肝環前後二陰故痔乃筋

脉病也○痔非外邪乃藏內濕熱風燥四氣相

合而成其腸頭成塊者濕也腸頭墜腫者濕無熱

也出膿血水者熱勝血也作大痛者火熱也痒者

風熱也大便秘者燥熱也小便澀者肝藏濕熱也

痔

痔者時也內經曰腸澼為痔如大澤中有小山突出皆曰痔不時

一於肛門邊者有鼻痔眼痔牙痔等類其狀不

脉法

沉實者陰其抃虛小者生緊急者難愈○便血則脉

花數則赤黃實脉  
瘰閉熱在膀胱

諸痔名目

四方書有五種一曰氣痔二曰乳痔三曰脉痔

○九痔毒甚者大如雞冠蓮花核桃毒淺者小如

也○十四證○歌曰痔因酒色風氣食五事過度而變成二

久見者膽心寒菱角看形怪蓮花不可觀穿腸并

鼠姦酒色兩相干莫願翻花怨蜂窠亦不寬雌雄

同氣流血子母及腸盤玄珠尤可怪鉤腸痛若鎖核

珊瑚形可惡那更脫肛難內痔紅不出搭腸裏內



命殘用功無半月去病更除根醫鑒○痔之名曰牛

蛇曰鼠蛇曰雞心曰雞冠曰蓮花曰翻花曰蜂窠

痔有內外

屬脉內痔腸痔氣痔血痔酒痔

脉痔

腸口顯顯發癰且痛且痒宜槐角元鈞

腸痔

脫肛內結核寒熱往來登瀦

氣痔

憂恐悲怒加適臨乎前立見腫痛氣

血痔

每遇大便清血隨下而不

酒痔

每遇飲酒輒發腫痛

牡痔

肛邊發露肉珠狀如鼠姦時時滴漬

牝痔

肛邊生瘡腫突出一日數

故膿潰且散治藥同上

浸淫濕爛歲積月累虫生其間  
蝕腸穿穴與下痔漏同治法

治五痔  
治五痔

乳及諸痔猪房瘰左懸蹄退甲  
露蜂瘰治脉蛇治瘰

腸氣  
驚甲  
右各  
燒存  
壯

性爲未和一白每二錢八麝少許空心井水調下  
因○一名五灰散五味各等分

治五痔黃牛角鯢一枚槌碎蛇脫皮一條猪  
牙皂角七箇穿山甲七片猬皮一兩坐右各

細坐入缸內黃泥固濟火煨通紅候冷細研爲末  
臨卧時細嚼胡桃仁一箇如糊用好酒一盞送下

便睡至五更時以溫酒調下藥末三錢至辰時更進一服雖久病不過三服立效

治五痔及諸痔槐角四兩地榆黃芩防風當歸枳殼各二兩右爲末酒糊和丸梧子大空

七心  
十米  
九飲  
竭下  
五

治五痔及諸痔狷皮四兩猪懸蹄二  
五隻牛角鰓三兩亂髮敗棕各二兩槐

右角一兩半苦練根一兩二錢半雷丸脂麻各一兩  
生剉碎盛磁缸內火煨存性爲末入乳香五錢麝

香二錢和勻酒糊和丸梧子大先爵胡桃肉一  
以溫酒吞下三五十九空心晚食前三日除根

### 釣腸丸

治諸痔及久瘻脫肛下膿血黃瓜萋猬皮各  
一箇胡桃肉七箇俱燒存性雞冠花二兩半

白附子天南星半夏並蛛枳殼訶子皮各一兩  
礬白礬並煨附子生各五錢右爲末醋糊和丸梧

子大空心溫酒  
下三五十九

### 逐瘀湯

治諸痔通利大小便取下惡物大黃桃仁各  
一錢川芎白芷生乾地黃赤芍藥枳殼蓬朮

五靈脂阿膠珠赤茯苓神木通生甘草各  
七分右剉作一貼薑五片蜜三匙同煎服

### 加味香蘇散

治氣痔陳皮枳殼川芎槐花各一錢紫  
蘇莖檳榔木香桃仁香附甘草各五分

右剉作一貼薑三片棗二枚  
同煎服

### 乾葛湯

治酒痔乾葛枳殼半夏赤茯苓生地黃杏仁  
各一錢條芩甘草各五分右剉作一貼黑豆

百粒薑三片白梅  
一箇同煎服

加味槐角丸

治諸痔及腸風藏毒通用槐角生乾地黃各二兩當歸黃芪黃連條芩枳殼秦

芩防風連翹地榆升麻各一兩阿膠川芎白芷各五錢右為末酒糊和九梧子大溫酒或米飲下五

七十丸  
空心丹

秦芩蒼朮湯

治濕熱風燥合而為痔其腸頭成塊者濕與熱也作大痛者風也大便秘結者

燥也此藥神效秦芩皂角仁燒存性桃仁泥各一錢蒼朮防風各七分黃柏酒洗五分當歸梢酒洗

澤瀉檳榔末各三分大黃二分右除檳榔桃仁皂角仁外餘藥剉作一貼水三盞煎至一盞二

滓入三味末再煎至一盞空心熱服以羹饌壓之一服即愈

腸風臟毒

即血痔也。如。下。清。血。色。鮮。者。腸。風。也。血。濁。而。毒。也。醫。○。如。下。清。血。色。鮮。者。腸。風。也。血。濁。而。

色黯者藏毒也。其色清也。藏毒者蘊積熱毒久而始見。其色濁也。治腸風以散風行濕治藏毒以清熱涼血。○。腸風下血必在糞前是名近血。色清而鮮。



宜用敗毒散。麝香連丸。方。藏毒下血。必在糞後。是名遠血。

色黯而濁。宜用香連丸。方。藏毒下血。必在糞後。是名遠血。

黃桂之屬。積熱下血。純下鮮血。甚則無痛。宜用三。

究其本末。證狀先清。其表後攻。其裏其血。自止。如。

脉洪大。四物湯。狀先清。其表後攻。其裏其血。自止。如。

○大便後下血。腹中不痛者。謂之熱毒。下血。芍藥黃連湯。主。

湯主之。腹中痛者。謂之熱毒。下血。芍藥黃連湯。主。

之。也。長夏濕熱。太甚。正當客氣。盛而主氣。弱。故腸。

出也。長夏濕熱。太甚。正當客氣。盛而主氣。弱。故腸。

濕和血。湯。宜。涼。下血。黃湯。當。歸。和。血。散。升。陽。除。

升。麻。補。胃。湯。益。智。和。中。湯。○。藏。毒。宜。解。毒。湯。槐。花。散。枳。殼。

黃連湯

治大便下血。腹不痛。黃連當歸各二錢。甘草一錢。右剉作一貼。水煎服。楊。

芍藥黃連湯

治大便下血。腹痛。白芍藥黃連當歸各二錢。甘草一錢。右剉作一貼。水煎服。楊。



分半右剉作一貼水煎服

### 涼血地黃湯

治腸澼射血知母黃柏各一錢半熟地黃當歸槐花炒青皮各七分右剉作一

貼水煎服

### 當歸和血散

治腸風射血及濕毒下血當歸升麻各一錢半槐花炒青皮荊芥白朮熟地黃

各七分川芎五分右為末每二錢空心米飲調下○一名槐花散

### 升陽除濕和血湯

治腸澼射血作派其血唧出有力而遠射四散如篩腹中大痛白芍

藥一錢半黃芪甘草灸各一錢陳皮升麻各七分生地黃牡丹皮生甘草各五分當歸熟地黃蒼朮

秦芫肉桂各三分右剉作一貼水煎服

### 升陽補胃湯

治腸澼下血唧出遠散如篩色紫黑腰腹沉重名曰濕毒腸澼白芍藥一錢半

升麻羌活黃芪各一錢生地黃熟地黃獨活柴胡防風牡丹皮甘草灸各五分當歸葛根各三分肉



桂二分 剉作一貼水煎服

### 益智和中湯

治腸澼下血色紫黑腹痛惡寒右關脉按之無力喜熱物熨之內寒明矣白芍

藥一錢半當歸黃芪升麻灸甘草各一錢牡蛎皮柴胡葛根益智半夏各五分桂枝四分肉桂乾薑

炮各二分 剉作一貼水煎服

### 香殼丸

治因飽食發為腸澼及諸痔瘻黃連一兩枳殼厚朴各五錢當歸四錢荊芥穗木香黃栢

各三錢狷皮一箇燒灰右為末麩糊和丸梧子大溫水下五七十丸日二噉。一名麩糊和丸梧子大

### 香附散

治腸風香附子炒甘草一兩枳殼七錢半當歸川芎各五錢槐花炒

三錢薑三片棗二枚水煎服

### 止血散

治腸風在糞前為近肝腎血也在糞後為遠心脾血也胡桃仁破故紙炒槐花炒各三兩

半皂角刺燒灰二兩右為末米飲或溫酒調下二錢空心

栢葉湯

治腸風側栢葉當歸生乾地黃黃連荊芥穗  
枳殼槐花炒地榆各一錢甘草炙五分右坐

作一貼薑三片烏梅一箇同煎服

斷紅元

治腸風獼皮燒黃連炒秦芫槐角子各一兩  
當歸檳榔皂角仁燒黃栢荊芥穗枳殼各五

錢大黃煨桃仁泥各三錢右為末麩糊和丸梧子  
大白湯下五十九血多加棕櫚蓮房灰各五錢

解毒湯

治藏毒黃連黃芩黃栢梔子連翹槐花炒各  
一錢細辛甘草各五分右坐作一貼水煎服

一名八寶湯

槐花散

治藏毒當歸地榆各一錢槐花炒枳殼阿膠  
珠各八分生地黄黃白芍藥黃芩升麻各七分

防風側栢葉各五分右坐  
作一貼空心水煎服

枳殼散

治藏毒枳殼二兩黃連白芍藥各一兩槐花  
炒地榆各五錢甘草二錢半右剉每一兩空

心水煎服

# 絲瓜散

治腸風藏毒痔漏脫肛絲瓜根經霜一二服次

三錢剉散水煎熟去滓清香油如錢大

# 槐花散

治腸風藏毒槐花炒栢葉焙荊芥枳殼各

# 腸風黑散

半亂風藏毒並治之荊芥穗二兩狷皮一兩

固濟燒存性出一錢空心米飲或溫酒調下炒各一

# 清榮槐花飲

治腸風藏毒當歸白芍藥生地黄槐花

八分枳殼條芩酒炒各七分川芎防風各六分

# 槐黃湯

治腸風藏毒槐花炒生地黄樗根白皮炒各

殼各八分地榆烏梅甘草各五分

# 玉屑丸

治腸風藏毒久不止椿根白皮晒乾四兩槐

根白皮苦練根寒食麩各三兩威靈仙一兩

天南星半夏並生用各五錢右為末滴水和丸梧  
子大每三十丸以水一盞煎丸子令浮以匙抄吞  
送下不嚼  
甚妙

### 剪紅元

治腸風藏毒下血久不止面色萎黃日漸羸  
瘠當歸酒浸一兩側柏葉炒鹿茸去毛醋煮

附子炮續斷酒浸黃芪蜜炒阿膠珠白礬枯各五  
錢右為末醋糊和丸梧子大空心米飲下七八十

丸下血久不愈者後  
用溫劑此方正合其宜

### 芎歸丸

治腸風藏毒久不止川芎當歸黃芪神麴炒  
地榆槐花炒各一兩阿膠荊芥木賊煨灰各

五錢右為末蜜丸梧子大  
空心米飲下五七十九

### 槐黃丸

治腸風藏毒痔漏便血神效槐花炒黃連酒  
炒各四兩右為末入豬大腸一尺內扎住用

韭菜二斤水同煮爛去韭取腸藥爛搗  
丸如梧子大空心米飲下八九十九

### 痔漏

即瘻痔也。痔核已破謂之痔漏。瘻痔亦謂  
之瘻痔。歲月積久。虫蝕其間。疼痛不堪。或肛門間



射血如線乃虫痔也虫痔宜熏千金用猬皮艾者  
佳方視新○痔瘻之源由乎酒色痔久成瘻痔輕  
而瘻重痔實而瘻虛治痔之法不過涼血清熱而  
已治瘻則初宜涼血清熱燥濕久則宜澀殺殺虫  
而無平溫散蓋初作則腸胃氣實為熱久則腸胃  
氣虛而為寒矣○痔瘻先須服補藥生氣血用  
參朮芪芎歸為主大劑服之外用附子灸法防  
駭○痔漏專以涼血為主宜用涼血飲外  
澀藥塞竅○痔漏宜黑玉丹猬皮丸活龜九加  
味槐角丸方見豚胃丸秘傳神應膏蓮花益散  
腸丸方見狐惑亦是虫蝕肛齏親  
孔方○

**涼血飲**治痔漏因風熱燥歸于大腸故涼血為主  
參黃芪黃連生地黃當歸川芎槐角條芩枳

殼升麻各一錢右剉作一  
貼水煎空心服或丸服

**黑玉丹**治痔漏及五痔皆因酒色過度即成此疾人  
多以外治付洗不知病在腸中有虫若不去

根其病不除與上神應黑玉  
丹同門○一名烏玉丸

猬皮丸

治瘻漏槐花艾葉炒黃枳殼地榆當歸川芎黃芪白芍藥白礬枯貫衆各五錢

兩錢灰三錢猪蹄甲十枚灸焦包角一挺醋炙右為末蜜丸梧子大空心米飲下五七十九

活龜丸

治腸風痔漏大烏龜一隻先以柴火燒熱地以罩蓋龜地熱逼出臭屁待屁盡以稗繩都

身包縛外用黃泥固濟灰火中煨熟撈起剝淨取肉研如泥其殼用牛骨髓塗灸五七次心透酥乾

為末又用黃連一兩九蒸九晒當歸尾三錢三分為末和前龜肉擣九梧子大白湯下五七十九

豚胃丸

治痔漏亦治諸瘻槐花二兩黃連壯丹皮各一兩猬皮七錢羌活六錢右剉入猪肚內縫

定煮爛去藥食肚如硬再服以患處軟方止或同藥為丸服亦可

秘傳神應膏

治痔漏如神片腦熊膽血竭牛黃乳香沒藥各五分右為末蝸牛取肉擣成稀

膏每夜洗淨拭乾將此膏搽上患處數遍即愈宜磁罐收貯不要乾了

蓮花藥散

治痔漏二三十年不愈者三服效蓮花益黑丑頭末各一兩半當歸五錢礬紅二錢



右為末先忌食肉六七日空食肉一頓  
取溫酒下藥三錢取下膿血或重是效

### 取漏膿法

治內痔久漏取膿最妙  
兩半右為末用布四寸長三寸闊縫一袋

入藥半袋以砒三分放藥末中間方入全藥  
裝滿縫袋中兩頭安帶子如騎馬繫住

### 取痔蟲方

升痔漏有虫如細絲黑頭取去除根  
升猪牙皂角一寸右為末入猪腰子一隻

內用米泔煮空心食之少頃腹痛上廁虫皆隨出  
作地坑埋之薄粥補之

白皮濃煎湯盛盆中坐其上熏穀道冷則易煖湯  
良久欲大便當有虫出三度愈

味灸貼痔漏上良久虫出即去之  
蟻生擣為丸塞肛門孔中引痔虫出盡永差

○痔漏失洞者挑皮葉杵爛水漬令濃去滓盛盆  
中漬之虫自出

合同煎三兩沸滿口飲之虫立死出即愈或灌肛  
內亦下虫及惡物

銀和勻熬如黍核長三寸許臨卧綿裹  
納肛內明日虫盡出若痛加甘草末



塞漏孔方

痔漏有竅用赤石脂白石脂枯白礬黃丹  
腦子同為末塞之或飯和熬條挿入

○藥塞竅用童便煨爐甘石牡蠣粉龍骨密陀僧  
○秘方用煉蜜半盞入熊膽一分再煉入水成

珠不散將猪鬃綿裹撚成撚子將蜜塗在撚子上  
仍用片腦熊膽各半分研細搽在撚子上挿入漏

眼內底至盡頭則止如眼多醫得一箇又醫一箇  
不可一齊上藥如外皮潰爛用黃蠟黃丹麻油煎

膏貼瘡上縛緊一七日效  
辰砂膏生肌散上品錠子寸金錠子

辰砂膏

痔漏塞竅信砒一錢白礬二錢密陀僧辰砂  
各五錢右先研信砒細鋪鍋底次用礬末鋪

砒上煨烟盡為度次將陀僧辰砂研細白糕和  
勻作尖撚子如小麥大取一粒納漏孔內去敗肉

盡後貼生肌散

生肌散

生肌合瘡口龍骨煨五錢寒水石煨輕粉  
各一錢乾胭脂三分右為末乾糝之

上品錠子

專治十八種痔漏紅礬一兩二錢半信砒  
火煨五錢乳香沒藥朱砂各二錢半牛黃



二分半硃砂五分熟二分生右為末麪糊和勻捻成錠子看瘡大小深淺挿入竅內如肉內黑色勿去盡方肌散直待黑肉去盡方肌散門

### 寸金錠子

牡蠣粉紅藤根乾漆各五錢藤黃雄黃雌黃硫黃輕粉粉霜麝香砒礞枯黃丹各一

錢右為末陳米飯和搗丸如棗核大每一丸納肛內深二寸用新埽毬子二箇炭火燒赤淬醋中綿

裹一箇於肛門熨之令即換下惡物除根棟

### 脫肛

即腸痔也。脫肛者肛門翻出也。肺與大腸為表裏腎主大便。肺腎虛者多有此證。參芪湯升之。難

不得入。先以證氣聚不散也。裏急而不得出。外脹而

經曰病之虛實出者為虛入者為實。肛門之脫非

虛無故。然其有產婦用力過多及小兒叫號努

氣并久痢不止。風邪襲虛亦有此證。搯。脫肛者氣下陷也。肺主魄。門肺熱則肛門縮入。肺寒則肛

門脫出。必須溫肺補胃。補中益氣湯。妨。血熱者。訶子

樗根白皮少許。或猬皮散。釣腸丸。坊。見。血熱者。訶子

物湯加黃栢升麻虛熱者縮砂散治。脫肛宜龍骨散二槐丹獨虎散蚊蛤散浮萍散孩兒散熏鱉

法久脫肛黑色生

### 參芪湯

治肛門虛寒脫出入參黃芪蜜炒當歸白朮生地黃白芍藥酒炒白茯苓各一錢升麻桔

梗陳皮乾薑炒各五分甘草灸三分治。左右坐作一貼水煎服

### 猬皮散

治因泄痢或努力脫肛治。猬皮鱉甲各一箇燒存性磁石煨醋淬七次五錢桂心三錢右為

末每二錢空心米飲下仍用草鞋底灸熱按入忌房事

### 縮砂散

治虛而按熱肛脫紅腫縮砂黃連木賊各等分右為末每二錢米飲調下

### 龍骨散

治大腸虛肛門脫出龍骨訶子各五錢治。龍骨赤石脂各四錢沒石子大者四箇右為末

每二錢空心米飲調下治。名提肛散亦治小兒脫肛

### 二槐丹

治脫肛槐角槐花各等分治。二槐丹成塊晒令乾勿使血熟每二錢黃酒送下

獨虎散

治脫肛五倍子半兩水三碗煎至半入焰硝荊芥各一錢乘熱熏洗用五倍子末糝之

蚊蛤散

治脫肛不收五倍子末入白礬蛇床子煎湯熏洗後以赤石脂末糝芭蕉葉上托入或長

尺餘者以兩床相接中空以器盛藥水滿架起與床平令病者仰卧浸器中逐日如此縮盡為度

浮萍散

治脫肛於秋暮取霜露打過浮萍不拘多少以淨瓦攤開陰乾其丸一日一易不可見日

務要陰乾用紙包起研為細末先以井水洗淨肛門取藥末摻上其肛徐徐即入細椿聖散

孩兒散

治脫肛熱腫熊膽五分孩兒茶二分片腦一分分右為末入乳調肛上熱汁自出而肛收

熏鱉法

治脫肛取鱉一箇放罈內入麝香一二分將滾水傾入罈內泡鱉坐其上熏之良久將水

洗痔後將肉作羹食之將鱉頭作末糝肛上

方

治久痢脫肛黑色生殼者巴豆殼燒灰芭蕉自然汁煮入朴硝少許洗軟用清油點三滴放三

角取白礬煨過龍骨少許為末乾糝肛頭以芭蕉葉托上便卧勿令出入

又方沃醋青布鋪肛以糯米濃煎汁洗肛却取磚燒紅

# 肛門疼痛

練根煎湯熏洗仍以乾艾生薑煎服蠶生艾苦

痔宜黑玉丹坊見秦羌活湯又宜熏法現○肛

食明晨空腹飲之虫即下小兒同法○痔隔夜不

大痛者火也又大便秘澀亦作大痛凡醉飽行

房忍泄前陰之氣歸於大腸木來火熱而侮燥金

以辛溫燥血潤燥疎風止痛是其治也宜秦羌活

## 秦羌活湯

治痔漏成塊下墜不任其痒羌活一錢

麻黃柴胡甘草灸各五分藁本三分細辛紅花各

門入



秦茺白朮丸

治痔大便秘燥硬痛不可忍秦茺桃仁泥

實白朮各五錢地榆三錢右為末麩糊和丸芡實

大令藥丸光滑焙乾白湯下五七十丸羹饌壓下

七聖丸

治肚門痛不可忍脉訣曰積氣生於脾藏傍

半羌活一兩大黃煨八錢檳榔桂心木香川芎各

五錢右為末蜜丸梧子大白湯下三五十九微利

秦茺當歸湯

治痔漏大便秘結燥疼痛大黃煨四錢秦

白朮各五分紅花二分桃仁二十粒為泥右剉作一貼水煎服

當歸郁李仁湯

治痔漏大便秘努出腸頭下血苦痛

秦茺麻仁當歸梢生地黃蒼朮各五分大黃煨澤

瀉各三分右剉作一貼水煎去滓入兩仁和服

寬腸丸

治痔大便秘澁痛用此寬腸黃連枳殼等分

又用藥枯痔後大便堅硬難下大黃煨枳殼當歸酒洗各等分右為末蜜丸梧子大服如上法

血竭散

治痔漏痛不可忍血竭調付或杏仁泥調付

清心丸

治痔痒痛內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火此

赤茯苓各五錢右為末蜜丸梧子大空心米飲下百丸

枯礬散

治五痔痒痛枯白礬一錢片腦五分

一方

治穿醫痔漏極痛魚鰾擣如泥貼之其痛即止

痔兼諸病

痔疾有無下府瘡者有莖中出白津者有無

痔病治法

運而大腸下墜作痛大要以槐花槐角生地

黃涼血川芎當歸桃仁和血生血枳殼行氣寬腸黃芩黃連梔子清熱黃柏防已澤瀉去濕麻仁大

黃潤燥秦茺荊芥疎風門○治法以苦寒瀉火之  
連梔子槐花之類以辛溫和平血當歸川芎桃仁之

類風邪在下秦茺防風升麻之類提之燥熱拂鬱  
大黃枳殼麻仁之類潤之○諸痔皆由房酒過

度久嗜甘肥不慎醉飽以合陰陽勞擾血脈腸癖  
滲漏衝注下部肛邊生瘡變為痔疾初發便服槐

角丸熟實服湯藥疎利藏府及浴洗熏熨以取內  
消若變成痔瘻須用寸金錠子三五次痊愈

痔病通治槐一切痔病通治宜槐膽丸○見丸  
槐角丸秦茺蒼朮湯獨皮丸○見丸

○五痔散神應散○見丸  
○久痔宜用黑地黃丸蓮花散○見丸

水馬散治一切痔夏月三伏內於止水中採取婆子一  
名水馬兒高脚水面跳走者是也採取三十一

箇用三箇紙包每包十箇於背陰處懸掛陰乾每  
包作一服研爛空心溫酒調下良久乃喫飯三日

連服三十日內見效久痔  
膿血者二三十服絕根

黑地黃丸治久痔痔漏下膿血虛者服之神妙治痔  
之聖藥也蒼朮一介甘浸熟地黃一介五



味子八兩乾薑秋冬一兩春七錢夏五錢右為末  
棗肉和丸梧子大空心米飲或溫酒下百丸

### 三神丸

治僧道流因久坐飽食發為諸痔枳殼皂角  
煨五倍子炒各等分右為末蜜丸梧子大空

心溫水下五  
七十丸

### 洗痔法

取內消瘰○服湯丸疎利藏府外用藥水洗浴以

溫湯一洗江河水尤妙○治痔腫瘰癧脫肛紅腫

荊芥穗朴硝泡湯溫洗○枳殼各一兩龕末煎湯先熏後洗冷則易枳實亦

好○洗痔方槐花荊芥枳殼艾葉煎湯入白礬

先熏後洗○無花果葉煮水熏洗亦可○洗

痔瘻方川椒艾葉葱白五倍子焰硝馬齒莧茄子

根右剉水煎先熏後洗○翻花痔荊芥防風煨

硝煎湯熏洗次用木鱉子釐金研末入龍腦少許  
水調塗之○洗痔漏神效隨何柳根上鬚一把  
花椒芥菜子不拘多少煎水先熏後洗其虫頭黑  
身白俱從漏瘻而出立愈○痔痛不可忍木綿  
花煎湯入焰硝熏洗單用硝水極妙○痔瘡取

河水頻洗研蝸牛塗之。脫肛苦參五倍子東  
壁土煎湯熏洗又熱童尿和白礬末熏洗以烘熱  
鞋底探入翻。痔  
濕宜用却毒湯

### 却毒湯

洗痔漏焰硝一兩  
五倍子川椒防風側柏葉枳殼葱白蒼朮各五錢

三錢右水五碗煎至  
三碗熏洗日三次

### 熏痔法

治五痔及痿漏虫蝕下膿血  
黃如棗子大熟艾雞子大右  
燒坐其上熏之取烟氣從口中出為佳三日將息

更熏之三四度永差忌雞豬魚生冷毒物。治五

痔。痔漏鰻鱺魚火燒熏肛門痔虫盡死蠹魚亦佳

以有孔板子覆坑坐板孔  
上熏之瘻虫出盡大效

### 塗痔藥

治諸痔宜塗熊冰膏痔藥膏子  
散田螺膏蜈蚣油枯痔方黑聖散

### 熊冰膏

治五十年久痔及一切諸痔痔漏脫肛腫痛  
絕勝他藥熊膽二分半片腦半分研勻白雄

雞膽三箇取汁調勻以雞羽蘸塗痔上先以藥水洗淨乃止藥神效

土箇  
藥取  
神汁  
效調  
門勻  
○以  
一雞  
方羽  
熊蘸  
膽塗  
片痔  
腦上  
各先  
少以  
許藥  
井水

水研調塗痔上名曰熊膽膏。○又

塗痔雄雞膽片腦研勻塗之○又

痔藥膏子

治外痔及反花痔脫肛腫痛濃水不止柴  
灰淋濃汁兩碗熬至一椀却入草烏片大

黃片各二錢慢火熬至半椀入甘草一錢數沸下  
爭石灰末半匙略沸三五次用絹兩重濾過再熬  
成膏候冷入膽礬五分研極細瓦器盛貯臨用入  
龍腦末少許和勻以銀篋蘸藥塗付日一次重者  
三五次先以藥水洗  
乾乃塗之神效

二錢慢火熬至半椀入甘草一錢數沸下末半匙略沸三五次用絹兩重濾過再熬少許和勻以銀篋蘸藥塗付日一次重者先以藥水洗之神效

蝸牛散

治痔瘡腫脹作熱如火鍋牛一箇入片腦麝香各少許同入瓦器內盛頓半日自化成水

取塗痔上痛止腫消立愈○一名蝸牛膏用法同上  
 同上脫肛不收蝸牛燒○一名猪脂和付之立  
 縮緣桑蝸  
 牛尤妙○

蝸蝓 ○上  
脫痛  
肛止  
不腫  
收消  
蝸立  
牛愈  
燒爛 ○  
爲末 一名蝸  
猪脂 蝸牛膏  
和付 用法  
之立

田螺膏

治痔瘡腫痛坐卧不得諸藥不效惟此極妙  
一點即好大田螺八九箇鍼破頂蓋入白礬

末少許置地上尖底理土中其頂蓋仰天經一宿次日取蓋上水汁以雞羽塗痔上五七次即消

○治痔瘻田螺一箇挑開鑿入片腦少許過一宿先以冬瓜煎湯洗後取藥塗之

### 蜈蚣油

治諸痔端午日取大蜈蚣一條竹簽陰乾臨發剪一寸煨存性麻油調塗輕則不發重則

次年對周日又發再剪一寸煨塗斷根○治痔活蜈蚣一條浸香油內候生微略熬塗痔上累驗

陳久愈妙○枯痔方赤足蜈蚣一條香油煎提乾加乳香沒藥各二錢麝香粉霜各五分人指

瓜甲五錢泥裹煨乾為末以鵝翎管吹上患處如有水即時出盡不疼

### 枯痔方

治諸痔消腫雄黃硫黃明礬各等分右為末用新盞先鋪礬末一半次鋪餘藥又以礬末

蓋上火煨候礬枯為度研為末津唾調付乾落為度後用石膏五倍子為末付收瘡口神效

### 黑聖散

治脫肛疼痛大蜘蛛一箇瓠葉重裹線繫定合子內燒黑色取出細研入黃丹少許研勻

先以白礬葱椒煎湯洗浴拭乾將藥末糝在肛上以手托入妙

痔病禁忌

久痔虛者當服補藥如黑地黃丸上方見腎氣丸虧親以滋化源更節嗜慾謹起居方可斷

根門○治痔忌喫生冷硬物冷藥之類及酒濕麪

五粹辛熟大料物及薑桂之類犯之則服藥無效此東垣格言也綱○痔根本是冷慎冷飲食及房

勞雞肉最毒而房勞為尤甚蕎麥麪亦須忌之綱

茯苓麪

○宜常服門白茯苓麻子去皮為末和勻九蒸九晒入蜜

痔病凶證

成久痔與陰相通者死乙○痔漏

單方

凡三十三種有槐花散猪甲散

生鐵汁

治痔瘻脫肛生鐵三斤水一斗煮取五升日再洗鞞

東壁土

治脫肛取土湯泡先熏後洗亦治小兒脫肛心丹

車前草

治藏毒下血車前草連根一握生薑一小塊新水研碎取汁候血欲下時腰間必覺重便

服一盞血即止甚  
者不過再服

白芷

治痔以白芷煮白苧作線快手緊繫痔  
上微疼不妨其痔自然乾萎而落

艾葉

治痔漏虫蝕肛門熟艾一團雄黃少許  
同燒火以竹筒納下部引烟熏之良

雞冠花

治血痔取花不拘多少  
濃煎湯空心服一盞

木賊

主腸風血痔及脫肛同槐花及桑  
耳水煎脫肛為末糝肛托入

槐花

主五痔及腸風藏毒槐花炒水煎服或同荊芥  
側栢葉為末米飲下二錢名曰槐花散

風槐花炒為末填入猪腸內縛扎兩  
頭醋煮爛研為丸酒下三十丸

槐實

治五痔及腸風藏毒剉搗為末  
米飲下一錢或蜜丸服亦佳

槐木上耳

治諸痔及腸風藏毒取耳  
為末米飲下一錢日三服

桑木耳

治五痔及腸風下血痔漏桑耳二  
兩粳米三合煮粥空心食之

大樹木上寄生

治腸風痔漏如神取葉乾為末水酒

馬蘭根

治痔漏取根研細付上片時看肉平去藥稍

五倍子

主五痔及腸風脫肛五倍子白礬各五錢為末順流水丸如梧子米飲下七九○脫肛

五倍子末三錢白礬一塊同煎湯先熏後洗又取末摻肛托入○

樗根白皮

主血痔腸風藏毒取皮切酒浸蜜炒為末素肉和丸酒下三五十九○又取皮人

參等分為末空心米飲下二錢亦佳

蠡魚

主五痔及腸痔下血作瘡和薑薑食之又和五味作羹食之亦佳

鯽魚

治五痔及血痔作瘡和薑醋芥醬食之又作羹飽食良○痔漏鯽魚一箇去腸入白礬令滿

合之於瓦上燒過為末以雞羽掃藥付之立效

猓皮

主五痔痔漏腸風脫肛一切痔病取皮燒為末米飲下一錢空心○氣痔猓皮穿山甲等分

肉豆蔻減半為末米飲下一錢○痔漏瘡前

四十九日旋取如大麥許入瘡口內追出惡物是驗

露蜂房

主腸痔及痔漏有子蜂房焙乾為末麪糊和丸梧子大空心酒下二三十丸

鰾頭

治脫肛不收灸作末米飲調下一錢又取末油調付肛托入

鰻鱺魚

治五痔瘻瘡取魚治如食法煮熟入椒鹽醬調和食之

蛙

半燒為灰合吹下部令深蛙一技雞骨二錢

蘿蔔

治酒痔下血取二三十枚留葉寸許及根入罐內水煮極爛以薑鹽醋同淹空心食之立止

胡荽子

治五痔水煎取汁冷服半升日二○腸頭

葱白

治腸痔下血多取濃煮作湯盛盆熏之立差

水洗後付痔上其冷如水



冬瓜藤主痔瘻取藤濃煮湯熏洗即愈

啄木鳥主痔漏燒為末納孔中不過二度差乾

牛脾治諸痔臘月牛脾一具熟食之勿與鹽醬未差再喫乾

鼠狼皮治痔瘻取皮三度內燒烟坐其上火熏之

狸肉主五痔甚妙取肉作羹食之空心作脯食亦良

下二錢十服見效

猪懸蹄主五痔蹄甲不以多少燒為末米飲下二錢名曰猪甲散

野猪肉主血痔腸風瀉血取肉二斤切着五味炙熟空食之

米飲下空

鼯鼠主痔漏陰蝕爛瘡燒為灰空心米飲下二錢又取油塗之妙

# 鍼灸法

○痔疾取足太陽即承山穴取督脉即長強穴  
○五痔便血灸脊中百壯又灸回氣百壯  
○治痔平立量脊與臍平處臍上灸七壯或年深更  
於臍骨兩傍各一寸灸七壯除根  
○筋飛揚委中承扶攢竹會陰商丘  
○腸風取脊十四顧下各開一寸灸之  
○脫肛取大腸俞百會長強肩井合谷氣衝  
○脫肛灸臍中隨年壯又灸橫骨百壯又灸脊窮骨  
○上七壯安大蒜片以艾灸之  
○津唾新餅再灸明如錢大安漏上以艾灸令微熱乾  
則易起  
○人行路得痔狀如胡瓜貫於腸頭熱如火僵仆  
不能起  
○灸其上三五壯忽覺一道熱氣入腸  
中因瀉鮮血雖一時暫痛其疾如失  
○

## 東醫寶鑑外形篇卷之四