

東醫寶鑑


奎貴
7608
I
12

奎章閣圖書	
部別	分類記號
圖書番號	奎1933
一部冊數	24
內別番號	12
서울대학교	

東醫寶鑑

7608

全章閣圖書
分類號
1933
冊數
1
大學校



雜病篇二

風

寒上

東醫寶鑑雜病篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈聖功臣宗祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

風

中風微漸

凡人初覺食指次指麻木不仁或不用者三

知助各一兩料此治之先也宜先服愈風湯天麻丸



微覺大拇指及次指麻木不仁或手足少力或肌肉

先服愈風湯天麻丸或加減防風通聖散防其榮衛

或臂間服之亦可預防麻痺不仁或口眼歪斜言語

無力雖未致於倒仆其為中風暈厥之候可指日

而定矣早當從丹溪之法調治之愈○初覺風氣



醫寶鑑雜病篇卷之二

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

風

中風微漸

凡內人初覺食指次指麻木不仁或不用者三

知未大來之疾此其良也其先中風者必有先兆之證

微擊者此先兆也二年必有大風宜調其榮衛

以預防○竹瀝枳朮丸痰鯁與搜風順氣丸

或臂膊及髀股指節麻木不仁或口眼歪斜言語

無力雖未致於倒仆其為中風暈厥之候可指日

而定矣早當從丹溪之法調治之○初覺風氣

便服愈風湯及天麻丸相為表裏乃治未病之聖



藥也

調治預防

左半身不遂左手脉不足者以四物湯
右半身不遂右手脉不足者以四

君子湯
無用之
氣血兩虛而挾痰者二陳導痰等湯
飢

南星半夏枳實竹瀝薑汁之類
飲漸消或覺風邪未退者仍以羌活愈風湯
防風

通聖散加減調治而安

熱生風

俗云風生痰生熱熱生風
言末而忘其本也非謂肝病多因熱甚

甚而卒中者亦非外中於風良由將息失宜而心
火暴盛腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣

拂鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所
五志鬱
思過極而卒中者由五志過極皆為熱

甚故也
而風為標也凡有風者即風熱病也
熱以熱為本

人忽覺心腹中熱甚服治風藥而愈後到夷陵見
一太守夏月忽患熱甚不免以水灑地談輦卧其

上令人扇之次日急中風數日而殂及到澧陽見一老婦夏中亦患熱夜出卧廳上次日中風其子

煎飲小續命湯更召醫調治數日而愈始知人之中風因心腹中多大熱而後作也熱生風信哉

肥人多中風

所謂肥人多中風者肥則腠理緻密而多鬱滯氣血難以通利故多卒中也

人年逾五旬氣衰之際多有此疾壯歲之人無有也若肥盛則間有之亦是形盛氣衰而然也

肥人多中風者以其氣盛於外而歉於內也肺為氣出入之道入肺者氣必急氣急則肺邪盛肺金

克木膽為肝之府故痰涎壅盛治法先須理氣為急藿香正氣散點服如南星木香防風當歸非持

治中風之證中惡中氣尤宜鑒

中風所因

內經曰風者百病之長也至其變化乃為他病故有偏風腦風目風漏風內風首風腸風

泄風又有肺風心風肝風脾風腎風胃風勞風等證辨經○河間曰風病多因熱盛詳見○東垣曰

中風者非外來風邪乃本氣病也詳見○丹溪曰風之為病西北氣寒為風所中者誠有之東南氣

溫而地多濕有風者非風也皆濕生痰癢生熱熱生風也經曰亢則害承乃制河間曰土極似木數乎風河間主乎火東垣主乎氣丹溪主乎濕反以風為虛象而大異於昔人以予觀之昔人三子之論皆不可偏廢殊不知因于風者真中風也因氣因子與昔人論風之不同而立真中風之目愚竊疑焉夫中風之證蓋因先傷於內而後感於外之候也但有標本輕重之不同耳假如百病皆有因有證古人論中風者言其證也三先生論中風者言其因也知乎此則中風之候可得而詳論矣

中風大證

風中於人曰卒中曰暴仆曰暴瘖曰蒙昧曰

蹇澁曰痰涎壅盛

賊風虛邪中人

黃帝問曰余聞四時八風之中人也故有寒暑寒則皮膚急而腠理閉暑則皮

膚緩而腠理開賊風邪氣因得以入乎將必須入
正虛邪乃能傷人乎少師曰不然賊風邪氣之中
人也不得以時然必因其閉也其入淺以留其深其內極其
病人也卒暴因其閉也其入淺以留其深其內極其
遲帝曰有寒溫與天地相參也與然有卒病者其故
何也少師曰人與天地相參也與然有卒病者其故
月滿則海水西盛人血既積肌肉充皮膚緻毛髮
堅腠理郛烟垢着當是之時雖遇賊風其入淺不
深至其月郭空則海水東盛人氣血虛其衛氣去
形獨居肌肉減皮膚膚縱腠理開毛髮殘脆理薄烟
垢落當是之時遇賊風則其入深其病人也卒暴
○邪風之至疾如風雨故善治者治皮毛其次
治肌膚其次治筋脉其納○次治六府其次治五藏治
五藏者半死半生也納○邪乘虛入是謂虛邪納
○邪之不去其病則實納

中風大法有四

一曰偏枯半身不遂二曰風痺身無痛
四曰肢不舉三曰風懿奄忽不知人四曰

風痺諸痺
類風狀針

偏枯

血氣偏虛○虛邪偏客于肌肉半枯瘦入骨間疼痛謂之

榮衛稍衰則真氣去邪氣獨留發為偏枯○

病在分腠之間宜溫卧取汗且巨鍼取之○

宗筋縱帶脉不引而然痺病有言變志亂之證痿

之漸明是

風痺

神智不亂○痺之為病身無痛四肢不舉一臂不遂謂之

甚其言微知可治甚則不能言不可治○

一臂不遂智亂不能言者難治宜換骨丹○

者十全大補湯○

痛而不言不變志不亂邪在分腠之間即瘖志亂者

邪入于裏即東垣所謂邪中藏也

風懿

風懿然迷什舌強不語喉中室塞噫噫有聲謂之

汗者生汗不出身直者死由痰水制火閉塞心竅而不可語熱者牛黃清心元虛者導痰湯以開之

言病在藏府汗出身軟者生汗不出身直者七日

風痺

有全門在下

中風之名各不同

其中卒然仆倒者經稱為擊仆世稱為

半身不遂經稱為偏枯世稱為癱瘓及腿風乃

中倒後之證也○其舌強不言唇吻不收經稱為

脉法

凡中風脉無不大者非熱也是風脉也○寸口

膚絡脉空虚賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喝僻不遂邪在于絡肌膚不仁邪在于經即重不勝邪入于府即不識人邪入于藏舌即難言口吐涎沫。中風脉遲浮可治大數而極者死。中風脉浮滑無痰氣其或沉滑勿以風治或浮或沉而微而虛扶危溫痰風未可踈。大法治浮遲者吉急疾者凶。脉浮而遲者易治大數而急者死。脉浮而數中風使然。曰風。脉浮而數中風使然。

風有中血脉中腑中臟之異

中血脉則口眼喎斜中腑則肢節廢中臟則性命危

三者治各不同。中府者面顯五色有表證而脉浮惡風寒拘急不仁或中身之後或中身之前或中身之側皆曰中府其病多易治。中藏者唇吻不收舌不轉而失音鼻不聞香臭耳聾而眼瞤大小便秘結皆曰中藏其病多難治。中血脉而外者多着四肢中藏者多滯九竅。中血脈而外有六經之形證則從小續命湯加減及疎風湯治之。中府者先以加減續命湯隨證發其表如無

中藏則內有便尿之阻六經宜以三化湯或局方麻
仁丸妨鯁滋潤湯外無六經之形證內無便尿之
阻中隔宜養血通氣大秦羌湯羌活愈風湯養榮湯
○中藏者痰塞昏冒宜至寶丹之類鎮墜或活命
金丹牛黃定志丸祛風至寶丹○風中五藏舌瘖
眼瞽宜排風湯加減排風湯○但手足不遂言語
蹇澁當從愈風湯以行中道久服大風悉去治病
之法不可失于通塞或一氣之微汗加麻黃一錢
或一旬之通利加大黃二錢此為常治
之法久則清濁自分榮衛自和矣

小續命湯

治卒中風不省人事喎斜癱瘓瘖瘓諸風證

防風一錢半防己肉桂杏仁黃芩白芍藥人參川
芎麻黃甘草各一錢附子炮五分右剉作一貼入
薑三片棗二枚水煎服○一方無防己附子有
當歸石膏有熱用白附子○九中風六脉浮緊風
氣太盛心火暴升痰涎壅遏於經絡之中宜用小
續命湯用附子以其稟雄壯之資而有斬關奪將
之勢能引入參輩並行於十二經以追復其散失
之元陽又引麻黃防風杏仁輩發表開腠理以驅

散其在表之風寒引當歸川芎葦入血分以行血養
血以滋養其虧損之真陰或加石膏知母以降胃
火或加黃芩以清肺金若病勢稍退精神稍復輒
當改用丹溪之法以補氣血清痰之劑以調養其
本氣此急則治其標與
夫標而本之治也

疎風湯

治風中府手足不仁先宜解表後用愈風湯
調理羌活防風當歸川芎赤茯苓陳皮半夏

烏藥白芷香附子各八分桂枝細辛甘草
各三分左右剉作一貼入薑三片水煎服

加減續命湯

治風中府今人不分表裏虛實故張易
老授東垣以六經加減之法○太陽中

風無汗惡寒麻黃續命主之本方倍麻黃防風杏
仁有汗惡風桂枝續命主之本方倍桂枝芍藥杏

仁○陽明中風無汗身熱不惡寒白虎續命主之
本方倍桂枝黃芩加葛根一錢四分○太陰中風

無汗身涼附子續命主之附子加一倍甘草加二
錢一分乾薑加七分○少陰中風有一汗無熱桂枝

續命主之本方倍桂枝附子甘草○六經混淆繫
之於少陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁宜羌活

連翹續命主之方一兩加
羌活一錢連翹一錢半

三化湯

治府藏俱中風便尿阻隔不利厚朴大黃枳實羌活各等分右剉一兩作一貼水煎服日

二三微利即止

養榮湯

治風中血脈不能舉口不能言或痰迷不省當阻隔但肢不能舉口不能言或痰迷不省當

歸川芎白芍藥生地黃麥門冬遠志石菖蒲陳皮烏藥白茯苓枳實黃連防風羌活秦艽半夏南星

甘草各六分右剉作一貼入薑三片竹茹一塊水煎服

排風湯

治風中五藏精神恍惚手足不仁口眼喎斜獨活麻黃赤茯苓各一錢白朮肉桂川芎杏仁芍藥防風當歸甘草各八分白鮮皮

五分右剉作一貼入薑三片水煎服

加減排風湯

治同上通治五藏風天麻二錢蒼朮一錢防風川芎羌活獨活各八分麻黃七

分白鮮皮當歸白芍藥白朮半夏赤茯苓黃芩杏仁甘草各四分右剉作一貼入薑三片水煎服

大秦茺湯

治中風外無六經之形證內無便尿之動

舌強不能言語宜養血而筋自榮此主之秦茺石

膏各一錢羌活獨活川芎白芷生地黃熟地黃當

羌活愈風湯

治風中府中藏先以本藥治之後用此

盡當服此藥以行導諸經久則大風悉去清濁自

分榮衛自和矣蒼朮石膏生地黃各六分羌活防

風當歸蔓荊子川芎細辛黃芪枳殼人參麻黃白

芷甘菊薄荷枸杞子柴胡知母地骨皮獨活杜仲

秦茺黃芩白芍藥甘草各四分或分肉桂二分剉作

至寶丹

治卒中急風不語不省人事及風中藏精神

二參丹臨臥嚥下四白丹。一名愈風湯。心下

療肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憤或瘦而偏枯

或肥而不遂或恐而健忘或喜而多思思忘之道

皆精不足也能安心養神調陰陽使無偏勝錫

五錢龍腦麝香各二錢半銀箔五十片金箔五十片肉半為衣安息香以酒瀝去沙土爭一兩熬膏右為末入安息香膏搜和勻一兩分作四十九人參湯化下一九一日二三服局○安息香性硬難

化倉卒難用宜減半代煉蜜為佳

滋潤湯

治風中藏二便閉澀先服此後以愈風湯調當歸生地黃枳殼厚朴檳榔大黃麻仁杏

仁各一錢羌活七分紅花酒焙三分右剉作一貼水煎服

卒中風救急

初中至醒時隨即醒者宜治若不醒者宜掐人中至醒若痰涎壅塞者宜吐之口噤者

亦宜吐之若口開手散遺尿者為陽暴絕速宜大料參芪補接之若眼戴上者宜灸之○氣虛卒

倒濃煎人參黃芪湯加竹瀝薑汁服○卒中昏倒不省牙噤涎潮口眼喎斜精神恍惚倉卒之際

以手大指掐刻人中即省或急令入將病者兩手兩足從上而下頻頻趕出四肢痰氣即散免致攻

心即醒或急以三稜鍼刺合谷二穴人中一穴皆良去惡血就以氣鍼刺合谷二穴人中一穴皆良

十箔內四十箔為衣大棗二十枚蒸取肉研為膏
右為末棗膏八煉蜜和勻每一兩作十九金箔為

衣每取一丸
溫水化下

牛黃金虎丹

治急中風不省身強口噤鼻乾面黑遍
體壯熱汗出如油目瞪唇青心神迷悶

形體如醉痰涎壅塞喉中如拽鉅聲雄黃水飛
十五兩白礬枯天竺黃牛膽製南星各二兩五錢

天雄炮一兩二錢半膩粉龍腦各五錢牛黃二錢
半金箔八十片為衣右末煉蜜和勻每一兩半分

作十丸金箔為衣每一丸新汲水和灌之扶坐使
藥行良久以薄荷汁更化一丸灌之立愈如肥盛

體虛多涎有風之人宜常以此藥隨身備急為妙
芻○范子默中風涎塞不語服金虎丹四九氣不

通涎不下魂魄飛揚如墮江湖中頃欲絕即灸聽
會頰車地倉百會肩髃曲池風市三里絕骨耳前

髮際大顙風池氣遂通吐痰一撮繼又下十餘行
伏枕半月遂平此蓋灸百會之力其吐瀉乃服金

虎丹之功也
功也生

攝生飲

治卒中風不省無熱者用此南星炮半夏製各一錢半木香蒼朮細辛石菖蒲甘草各一

錢右剉作一貼入薑七片水煎服

省風湯

治卒中風不省有熱者用此防風南星炮各二錢半夏製黃芩甘草各一錢右剉作一貼

薑十片水煎服與導痰湯麝香一名小省風湯妙可以散風豁痰降火○

奪命散

治卒中風涎潮氣塞口噤目睛破傷風搖擗小兒驚風危急之疾天南星甜葶藶白芷半

夏巴豆去殼不去油各等分右為末每半錢薑汁一呼調下即效凡口噤藥不下者宜用此

開噤法

卒中風口噤不開難於下藥宜用開關散破棺散巴豆重法龜尿解噤法○口噤者以烏梅肉

和南星細辛末以中指蘸藥擦牙口自開○三陽之筋並絡入頤頰挾於口諸陽為風寒所客則

筋急故口噤不開

開關散

治卒中風目瞑牙噤天南星末五分龍腦一字右研和以中指蘸藥末揩齒二三度其一

口自開每用半錢至一字端午

巴豆熏法

治卒中風口噤不省巴豆去殼紙包種油

老良或以前紙燃燒烟熏鼻內亦可

龜尿解噤

治中風口噤不語取烏龜尿少許點舌下

刺之

取嚏法

卒中風不省先以皂角細卒末或南星半夏末吹入鼻中候有嚏可治無嚏不可治

昏悶先用通關散探鼻令嚏次用蘇合香元行氣

亦用通關散搐鼻實嚏即開

通關散

治卒中不省口噤氣塞細辛皂角薄荷雄黃

無嚏不可治如上方南星半夏皂角

通頂散

治卒中不省吹鼻即甦石膏二錢藜蘆川芎
細辛人參甘草各四分右為末每取一字吹

入鼻中即提起頂中發即甦
有嚏可治無嚏不可治

搐鼻通天散

治同上川芎細辛藜蘆白芷防風薄
荷皂角右等分為末用如上法

取吐法

卒中風暴仆昏悶不省人事或痰涎壅塞舌強
不語兩寸脉浮大而實急以瓜蒂藜蘆等藥吐

之以遇其勢。卒中風痰壅盛者口眼喎斜者
不能言者皆當用吐法輕者用瓜蒂一錢或稀涎

散或鰕汁重者急用吐法輕者用瓜蒂一錢或稀涎
少許為末薑汁調和灌入鼻內吐痰出如口不噤

者灌入口內吐痰盛者吐之宜稀涎散瓜蒂散而
不可吐者

散巴豆丸
散巴豆丸

鰕汁方

吐風痰鰕半斤入醬蔥薑等料物水煮先
次飲汁後以鵝翎探引吐痰出用鰕者

蓋引其風
出耳

皂角散

治卒中痰塞皂角蘿菹子等分為末每二錢水煎盡服即吐

巴豆丸

治卒中風痰塞垂死巴豆二枚去皮膜白礬如搗指大一塊為末右二味瓦上煨令豆焦

赤為度蜜丸芡實大每吐痰立愈

熏法

唐王太后中風不能言脉沉而口噤許胤宗曰既不能下藥宜以湯氣熏之藥入腠理周時可差濃

煎黃芪湯散斛置于床下氣如烟霧重之其夕便得語歎中風脉沉口噤非大補不可若用有形湯藥緩不及事熏以黃芪防風湯使口鼻俱受之此非智者通神之法不能迴也蓋人之口通乎地鼻通乎天口以養陰鼻以養陽天主清故鼻不受有形而受無形地主濁故口受有形而無乎也

不治證

卒中風口開手散眼合遺尿鼻聲如鼾者五藏氣絕也蓋口開者心絕手散者脾絕眼合者肝

絕遺尿者腎絕聲如鼾者肺絕也若見一猶可用工若面赤時黑主陽氣上散腎水反克心火無遺

尿口開氣喘者斷不可救也。○五藏氣絕速宜
 大料參芪濃煎湯救之。及臍下大艾炷多灸之。亦
 可轉死迴生也。○肉脫筋痛。發直。搖頭。上竄。面
 赤。如粧汗。綴如珠。吐沫直視者。皆不可治。○中
 藏之絡者。口眼俱閉。可治。如口開眼合。手散。遺尿
 鼻聲如鼾。及大吐大瀉下血吐血者。皆死。○口
 開者。心氣閉絕也。遺尿者。腎氣閉絕也。鼻鼾者。肺氣閉絕
 氣閉絕也。眼合者。肝氣閉絕也。鼻鼾者。肺氣閉絕
 也。皆不治。五證中。纔見一證。猶可治。蓋初中則眼
 合者。多痰上則鼻鼾者。亦多。惟遺尿口開。俱見為
 惡。心為五藏主。腎為五藏根。誠不可閉也。又肝木
 動止筋痛。名曰筋枯。不治無血滋筋。故也。又肝木
 克脾土。大便洞泄者。亦不治。○

暴仆

與卒中風救

暴瘖

凡語澁皆屬風。細緩弱。或耳聾腰背相引痛。腎瀝
 或口喎脚脢枯。細緩弱。或耳聾腰背相引痛。腎瀝
 湯地黃飲子主之。○內經曰。內奪而瘖也。腎氣內
 此腎虛也。少陰不至者。厥也。註曰。瘖廢也。腎氣內

奪則舌瘡足廢。中風瘡症宜月清心散加味轉
舌膏轉舌膏訪謚見正舌散解語九清神解語湯
資壽解語湯

腎瀝湯

治腎藏風語音蹇吃羊腎一具生薑二兩切
磁石碎一兩七錢以水一斗煮取五升乃入

玄參白芍藥白茯苓各一兩二錢半黃芪川芎五
味子桂心當歸人參防風甘草各一兩地骨皮五

錢並剉再煮取二
升去滓分三服

地黃飲子

治中風舌瘡足廢腎虛弱其氣厥不至舌
下熟地黃巴戟山茱萸肉苁蓉石斛遠志

五味子白茯苓麥門冬各一錢附子炮肉桂石菖
蒲各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚薄荷少

許同煎空
心服

正舌散

治中風舌強語澀神妙薄荷焙二兩赤茯苓
一兩蝎梢二錢半右為末每服一二錢溫酒調

下
兩炒用名茯苓神散鑒





轉舌膏

治中風舌強不語即涼膈散炒觀加石菖蒲遠志為末蜜九彈子大朱砂為衣每一丸薄

荷湯化

下

解語丸

治中風語言不正白附子石菖蒲遠志全蝎羌活天麻南星製膽白殭蚕右等分為末蜜

九菴豆大每五七丸薑湯吞下

清神解語湯

治中風痰迷心竅言語蹇澁或省人浸三日曬乾各一錢當歸川芎白芍藥生地黃麥門冬遠志石菖蒲陳皮白茯苓烏藥枳實黃連防

風羌活甘草各五分右剉作一貼入薑三片竹茹一團水煎入童便薑汁竹瀝調服

資壽解語湯

治風中心脾之脾舌強不語蓋心之別脉系于舌本脾之脉挾咽連舌本散舌下故

也熟羊角桂皮各一錢羌活甘草各七分半防風附子炮酸棗仁天麻各五分右剉作一貼水煎入

竹瀝五匙薑汁一匙服

精神蒙昧

風中藏昏冒宜用至寶丹牛黃清心元防

以蒙蔽也。中風者多昏冒氣不清利宜四白

四白丹

治中風昏冒能清肺氣養魄甜竹葉三兩白

人參甘草各五錢羌活獨活薄荷各二錢半細辛

知母各二錢藿香白檀各一錢半龍腦牛黃各半

二參丹

治中風健忘養神定志和血丹參熟地黃天

人參遠志石菖蒲朱砂各五錢右為末蜜丸梧

活命金丹

治風中藏神不清大黃一兩半桂心芒硝

辰砂四錢內二錢為衣麝香龍腦各二錢板藍根

貫衆乾葛甘草各七錢右為末蜜水浸蒸解和勻

每兩作十丸就濕以朱砂為衣再用金箔四十片

為衣每一丸如瘰癧風毒茶清化下臘月收合妙

牛黃定志丸

治心藏中風昏冒精神不守此藥壓驚
鎮心化誕安神朱砂水飛半夏薑製各

二兩雄黃水飛天麻烏蛇肉甘草各一兩琥珀七錢半牛黃龍腦全蝎白殭蚕炒白附子炮牛膽製南星各五錢麝香二錢半右爲末蜜丸芡仁大每一丸以人參薄荷湯嚼下

南星各五錢麝香二錢半
仁大每一丸以人參薄荷湯嚼下
心丹丸

祛風至寶丹

治風中藏昏冒及風熱滑石一兩半川芎當歸各一兩二錢半甘草一兩防風

白芍藥各七錢半白朮六錢半石膏黃芩桔梗熟地黃天麻人參羌活獨活各五錢梔子三錢連翹荆芥薄荷麻黃芒硝黃連大黃黃柏細辛全蝎各二錢半右爲末蜜丸彈子大每一丸細嚼茶酒任下此乃防風通聖散加九味也

口
眼
喎
斜

風中血脈則口眼喎斜。壅○自其邪氣之入人也。邪氣反緩正氣反急正氣引邪為喎。辟

爲竄視爲掣縱爲搖擗爲癰瘕爲反張在於陽則
皮膚緩在於陰則腹皮急緩則四肢不能收急則
一身不能仰口眼喎斜或左或右急搐入中拔頂髮灸耳垂珠
○風邪初入反緩正氣反急以致

下三五壯外用南星草烏各一兩白芨一錢白礬
蚕七枚為末薑汁調塗啗處正即洗去內用正舌
藥白附子白礬蚕全蝎等分為末酒調二錢服
○口眼喎斜者多屬胃土風木不及金乘之土寡
于畏也內經曰木不及曰委和委和之紀其動縵
戾拘緩縵者縮短也戾者口目喎斜也拘者筋脉
拘強也緩者筋脉弛縱也土寡于畏故土氣化而緩
而喎斜拘強也拘強也木弱則縱也土寡于畏故土
縱也○口眼喎斜之證大率在胃而有筋脉之
分經云足陽明手太陽筋急則口目為僻皆急不
能卒視此胃土之筋為邪也經云足陽明脉挾口
環唇所生病者口喎唇斜此胃土之脉為邪也
○口眼喎斜宜用清陽湯秦芫升麻湯不換金丹
牽正散理氣祛風散清痰順氣湯犀角升麻湯天
仙膏

清陽湯

治中風口喎斜頰急緊此胃中火盛必汗

一錢半甘草灸一錢蘇木甘草生各五分酒黃柏
紅花桂枝各二分右剉作一服酒三盞煎至一盞



三分溫服

秦艽升麻湯

治風中手足陽明經口眼喎斜升麻葛根白芍藥人參甘草各一錢半秦艽白

芷防風桂枝各七分右剉作一貼
八連根葱白三莖水煎服食後

不換金丹

治中風口喎薄荷三兩荊芥穗白僵蚕活風天麻甘草各一兩川烏生白附子羌活

細辛川芎蝎梢藿香各五錢右為末蜜丸彈子大茶清嚙下一丸如喎向左以此藥塗右腮便正

牽正散

治中風喎斜白附子白僵蚕全蝎並生用各等分右為末每二錢熱酒調下

理氣祛風散

治中風喎斜羌活獨活青皮陳皮枳殼桔梗南星半夏烏藥天麻川芎白芷防

風荊芥白芍藥甘草各六分右剉作一貼入薑五片水煎服

清痰順氣湯

治風中經絡口眼喎斜南星瓜蒌仁荊芥穗貝母陳皮蒼朮官桂防風各一錢

黃連黃芩並酒炒甘草各六分右剉入薑三片水煎八木香沉香末各五分調服

犀角升麻湯

治中風鼻額間痛唇口頰車髮際皆痛

痛此足陽明經受風毒血凝滯而然犀角一錢半升麻一錢二分半防風羌活各一錢川芎白附子

白芷黃芩各七分半甘草五分

天仙膏

治卒中風口眼喎斜南星大者一箇草烏大者一箇白芨二錢白朮七箇右為末生鱧

魚血調成膏付囑處覺正便洗去

手足癱瘓

凡風中府則肢節廢又云中府者多着四肢

痰火流注也血虛則痰火流注於右而為右痰急治則愈久則痰

火鬱結而難治法左癱宜補血無散痰火四物湯

氣薰散痰火四君子湯

瀝薑汁白芥子研○痛者為實先用二陳湯後用防風通聖散或何間換骨丹之類不痛者為虛左



○中風皆半身不遂其有遷延歲月不死者何也
曰如木之根本未甚枯而一邊之枝幹先萎耳經
曰根于中者命曰神機神去則機息夫神機未息
亦猶氣化之未絕耳故半身雖不運用然亦未至
於機息而死也○血氣散漫漫然筋脉弛縱坦然而
不舉也○痰者渙也○血氣散漫漫然筋脉弛縱坦然而
中風大法一曰偏枯○半身不遂二曰風痺四肢不
舉即全身不遂也○針○半身不遂失音不語亦謂
之○腰腿風○半身不遂男女皆有此患但男尤
忌左女尤忌右○若得此疾風藥不宜暫闕常宜身
上有灸瘡可也○宜用加減潤燥湯祛風除濕
湯加味大補湯天○宜用加減潤燥湯祛風除濕
虎骨散舒筋保安散
秘方疎風順氣湯

加減潤燥湯

治左半身不遂屬血虛與死血白芍藥酒炒二錢當歸一錢二分川芎白茯苓

白朮南星半夏天麻各一錢生地黄黃酒炒熟地黃
薑汁炒陳皮鹽水洗牛膝酒洗黃芩酒炒酸棗仁
炒各八分桃仁羌活防風薄桂各六分紅花酒洗
甘草炙各四分黃柏酒炒三分右剉作二貼水煎

一名竹瀝薑汁調服

祛風除濕湯

治右半身不遂屬氣虛與濕痰白朮一錢二分半身不遂屬氣虛與濕痰白朮一錢二分

半夏蒼朮烏藥枳殼羌活黃連黃芩並酒炒各一錢人參川芎桔梗防風各八分白芷七分甘草炙

五分左右坐分二貼入薑五片水煎服

加味大補湯

治左右癱瘓此氣血太虛也黃芪蜜炒人參白朮白茯苓當歸酒洗川芎白芍

藥熟地黃各七分烏藥牛膝酒洗杜仲酒炒木瓜防風羌活獨活薏苡仁各五分附子炮沉香木香

肉桂甘草各三分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

天台散

治中風癱瘓疼痛烏藥陳皮麻黃川芎枳殼白朮僵蚕枯梗白芷乾薑防風羌活天麻當歸

續斷威靈仙甘草各六分乳沒麝香沒藥麝香各三分右剉作一貼水煎八乳沒麝香沒藥麝香各三分

星附散

治中風只手足躄曳南星半夏並薑製入錢附子炮白茯苓川烏白礬蚕各一錢

沒藥五分右剉作一貼酒
水各半煎服得汗為度

全生虎骨散

治半身不遂肌肉乾瘦名曰偏枯忌用
發汗之劑惟當潤筋去風當歸一兩半

赤芍藥續斷白朮葉本虎骨各一兩烏蛇肉五錢
右為末每二錢溫酒食後調下骨中疼痛加生地

黃一兩

舒筋保安散

治癱瘓風筋脉拘攣走注疼痛木瓜五
兩單薛五靈脂牛膝續斷白殭蚕烏藥

松節白芍藥天麻威靈仙黃芪當歸防風虎骨各
一兩右剉以好酒一斗浸封口過二七日取藥出

焙乾搗為細末每服二錢以藥酒
半盞調下如酒盡以米飲調下

疎風順氣湯

治中風半身不遂或全體不能舉動因
元氣虛弱兼酒色之過而更挾外邪也

人參防風麻黃羌活升麻桔梗石膏黃芩荊芥穗
天麻南星薄荷葛根芍藥杏仁當歸川芎白朮細

辛皂角各五分右剉作一貼入薑五片水煎更入
竹瀝半盃服之外以艾灸治風穴得微汗而愈

秘方 治癰瘰如神熟牛骨內髓一椀煉熟蜜一升二味瀝過入炒麩一升炒乾薑末三兩拌勻如彈

子大一日服三四丸
細嚼溫酒下大效

四肢癱瘓搐搦為風疾 癱者筋脉急也瘓者筋脉緩也急則引而縮緩則縱而伸或縮

或伸動而不止名曰癱瘓俗謂之搐者甚也癱為

縮瘓者為伸○搐搦者手足牽引一伸一縮也○

不得伸縮者也○中風搐搦之時不可捉住

痰涎壅盛 祛風病皆痰為患故治以開關化痰為先急則

漸消尚有風邪未退以羌活愈風湯調之○初

中痰涎壅盛者當先吐之吐後用他藥吐法○凡

骨節皆有涎所以轉動滑利中風則涎上潮咽喉

中衮響以藥壓下涎再歸骨節可也○不可大吐出

時問快意非久枯了手足不可不戒○風痰壅

盛宜用導痰湯麩鯢加減導痰湯○風痰壅

湯沉香半夏湯三生飲青州白元子龍星丹蘇青元

導痰湯

治中風痰盛語澁眩暈勑鯁○加香附子烏

連名曰清熱導痰湯○加羌活白朮名曰祛風導
痰湯○加遠志菖蒲芩連朱砂名曰寧神導痰湯

門入

加減導痰湯

治中風痰盛不能言語熟者宜服南星

乾白茯苓陳皮白朮桔梗枳殼各一錢黃芩黃連
瓜蒌仁人參當歸木香各五分甘草三分右剉作

一貼入薑三片水煎
入竹歷薑汁調服

滌痰湯

治中風痰迷心竅舌強不能言半夏南星並
薑製各二錢枳實一錢半茯苓陳皮各一錢

石菖蒲人參竹茹各五分甘草三分右剉作一貼
入薑五水煎服○此藥治中風不語豁痰清熱

利氣補虛可謂
簡而當也

大省風湯

錢治川中風痰盛喎斜不遂防風半夏生甘草各二

一錢全蝎三分右剉作一貼入薑十片水煎服

沉香半夏湯

炮治中風痰盛去痰醒脾和氣益心附子一隻沉香與附子等分人參五錢半

夏製二錢南星炮一錢右為粗末每三錢水二盞薑十片煎至一盞空心服

三生飲

治卒中風痰塞昏仆不省脉沉無熱者可服南星生二錢川烏生白附子生各一錢木香

半錢右剉作一貼入薑十五片水煎服

青州白元子

治中風痰涎壅塞喎斜癱瘓一切風疾及婦人血風小兒驚風等證

加味青州白元子

治中風壅塞喎斜癱瘓白附子天南星半夏白薑各二兩天麻全蝎

白殭蚕各一兩川烏五錢右並生為細末薑汁麩糊和丸梧子大薑湯吞下五七十丸不拘時服

蝎麝白元子

治中風痰涎壅塞一切風疾他藥不能療者半夏七兩南星三兩白附子二兩

川烏天麻防風各一兩全蝎五錢麝香半錢右並生為末薑汁糊和丸梧子大薑湯下三五十九癰瘻風溫酒下日三服數日後當有汗便能舒展經三五日頻呵欠是應

龍星丹

治風熱壅痰涎盛昏冒眩暈牛膽南星朱砂各三錢黃芩黃連各二錢全蝎防風薄荷各

一錢片腦牛黃麝香各三字加青黛一錢右為末蜜丸櫻桃大別以朱砂為衣每一丸化燕下不

拘時○凡風病多是濕土生痰痰生熱熱生風此方既治風熱又無理痰凡風熱痰無不治也

蘇青元

元和氣一字散風痰青州白元子末三兩蘇合香元末一兩右和勻薑汁糊和丸梧子大淡薑

湯下三四
十九

中風熱證

風者百病之始也善行而數變行者動也風因熱生熱勝則風動宜以靜勝其躁是養血

也宜大秦芎湯坊見天麻丸若藏府無見或表裏兼攻宜防風通聖散○風熱宜用小通聖散人

參羌活散川芎石膏散
清氣宣風散透水丹

天麻丸

治風補血行榮衛壯筋骨生乾地黃四兩羌活三兩半當歸二兩半天麻牛膝單薛玄參

杜冲獨活各一兩半附子炮五錢右為末蜜丸梧子大每百九空心以溫酒或白湯吞下

防風通聖散

治諸風熱或中風風破傷風諸般風搐小兒驚風或洗頭風熱或破傷風諸般風搐小兒驚風

積熱或瘡疥或頭生白屑或面鼻生紫赤風刺癰疹風熱瘡疥或頭生白屑或面鼻生紫赤風刺癰疹

肺風瘡或大風癰疾或風火鬱甚為腹滿溢痛煩渴喘悶或熱極生風為舌強口噤筋惕肉瞤或大

小瘡腫惡毒或熱結大小便不通并解酒傷熱毒暄。滑石一錢七分甘草一錢二分石膏黃芩桔

梗各七分防風川芎當歸赤芍藥大黃麻黃薄荷連翹芒硝各四分半荊芥白朮梔子各三分半右

此方治熱風燥三片水煎服也

小通聖散

治風熱頭痛咽疼頰腫羌活防風薄荷當歸梔子大黃川芎桔梗各一錢防己甘草

各五分右剉作一貼入燈心一團竹葉七片同煎服

人參羌活散

治中風痰盛煩熱羌活獨活前胡人參防風天麻赤茯苓薄荷川芎黃芩枳殼

蔓荊子桔梗甘草各七分剉作一貼入薑三片桑白皮七寸同煎服

川芎石膏散

治與通聖散同能清神爽志宣通氣血通聖散無麻黃芒硝有寒水石人參縮

砂劑法服法亦同

清氣宣風散

治風熱當歸白朮白芍藥各一錢川芎羌活半夏生地黃白殭蚕各八分蟬殼

赤茯苓各六分防風甘草三分菊枳殼陳皮荊芥升麻黃連梔子各五分甘草三分剉作一貼入薑三片

棗二枚水煎服

透冰丹

治風毒上攻頭面腫痒痰涎壅塞口乾鼻煩下症腰脚腫痛生瘡大小便秘澀及癰瘻風

川烏二兩以江水浸半月三日一換水切作片焙乾用鹽一兩炒黃去鹽大黃梔子茯苓神威靈仙蔓

荊子益智白茯苓各一錢脾天麻白芷各五錢香墨燒醋淬細研麝香各一錢一字右為末煉蜜搜和

擣千杵旋圓芡實大用薄荷汁同溫酒化下二三丸

中風虛證

肥九中風年逾五旬氣衰之際多有此疾壯年

萬金湯全作八寶迴春湯

萬金湯

治風補虛及手足風累驗續斷杜冲防風白茯苓牛膝細辛人參桂皮當歸甘草各八分

川芎獨活秦艽熟地黃各四分右剉作一貼水煎服若手指無力不半劑可愈

八寶迴春湯

治一切風虛諸證去風和氣活血大有神效夫氣血和平榮衛調順則風證自

去白芍藥一錢二分黃芪八分白朮六分茯苓神半夏各五分附子人參麻黃黃芩防己香附子杏仁

川芎當歸陳皮防風肉桂乾薑熟地黃生乾地黃甘草各四分沉香烏藥川烏各三分右剉作一貼

味去風八味和氣八味水煎服右八

中風宜調氣

治風良劑小續命湯為上排風湯次之然藥主風不主氣須以人參順氣散烏藥

順氣散佐助其間氣一流行則風亦疎散矣。調氣宜用蘇合香元氣一八味順氣散勻氣散。

人參順氣散

治中風氣虛咽斜癱瘓語澁身疼麻黃陳皮川芎白芷白朮厚朴桔梗甘草各

一錢乾葛七分半人參乾薑各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚薄荷七葉同煎服

烏藥順氣散

治一切風疾先服此疎通氣道進以風藥又治癰瘕及歷節風麻黃陳皮烏藥

各一錢半川芎白芷白朮白芍枳殼桔梗各一錢乾薑五分甘草三分右剉作一貼入薑三片棗二枚

水煎服

八味順氣散

凡中風常間服此藥又云凡中風先宜服此以順氣

勻氣散

治中風氣虛不遂白朮二錢烏藥一錢半人參天麻各一錢沉香青皮白芷木瓜紫蘇葉

甘草各五分右剉作一貼薑三片水煎服

風非大汗則不除

風從汗散故治風多用發汗之藥也。續命排風越婢等悉能治風而千

金多用麻黃蓋以風邪不得汗則不能治也若自汗更用麻黃則反為大害此時續命煮散復榮衛却風邪不可缺也○治中風無密室不可療平人居室不密尚中風邪况服藥發汗之人乎針○

治風發汗宜用換骨丹去風丹

換骨丹

治中風喎斜癱瘓及暗風風癰蒼朮槐實桑白皮川芎白芷威靈仙參防風何首烏蔓

荊子各一兩苦參五味子木香各五錢龍腦麝香各五分右為末以麻黃煎膏和持萬杵每一兩分作十丸朱砂為衣每取一丸磨溫酒半盞以物合定不透氣食後臨卧一呬嚥之衣覆取汗即差○歌曰我有換骨丹傳之極幽秘踈開病者心扶起衰翁臂氣壯即延年神清目不睡南山張仙翁三百八十歲槐皮芎朮芷仙丹防首曼十件各停勻苦味香減半龍麝即少許朱砂作衣纏麻黃煎膏丸大小如指彈修合在深房勿令陰人見夜固服一粒遍身汗津津滿萬病自消除神仙為侶伴心○麻黃煎膏治卒中風不省用此膏加八湯藥內服或用此膏丸藥服之驗規

去風丹

治一切諸風及癰瘻風大風破傷風紫背浮

篩內下着水晒乾為末蜜丸彈子大每丸以豆

淋酒化下○歌曰天生靈草無根幹不在山間

不在岸始因飛絮逐東風泛梗青靑漂水面神仙

一味起沉病採我之時七月半選甚癰風與瘰風

些少微風都不算○豆淋酒內下三九鐵

幘頭上也出汗○一名浮萍丸

續命煮散

治風虛自汗桂皮七分半防風獨活當歸

遠志半夏甘草各五分○右剉

風病須防再發

藥以防之○再發再發則必重常須服

以防瘡癰○方規吐○愈風湯如覺風動便服此不

致倒仆○宜服定風餅子○最忌房室如道釋

定風餅子

治中風面喎鼻淵痰厥頭痛眩暈嘔吐天

生右等分爲末薑汁和丸
衣每一餅細嚼薑湯下預
防風疾爽慧神志軀爲

小中不須深治

中風須大作湯劑方有
足名曰小中不宜用正風
藥深治但用手

平和湯劑雖未能爲全人亦
可留連歲月戒之戒之

中風能食

此中風人多能食蓋甲已化土
脾盛故能多食

廣服藥不欲多食病能自愈
盛也木盛則克脾脾受敵求助
于食經曰實則夢

與虛則夢取當瀉肝木治風安
脾脾安則食少是其養矣

傷風證

傷風則涕流鼻塞聲重
宜辛溫或辛涼之劑散之戴氏云
新咳嗽鼻塞

聲重是也宜參蘇飲冲和散
防風證也

諸風病名

如頭風多饒白屑○毒風面上生瘡○刺風狀

緩○頑風不識痛痒○癰風頸項斑剝○暗風頭
旋眼黑不辨東西○瘡風面生朱點○肝風鼻悶





眼瞶兩臉赤爛○脾風偏風口多嘔逆○斜○酒風行步不前

○肺風鼻塞項疼○膽風令人不睡○氣風肉如

虫行○腎風耳內蟬鳴陰間濕痒寒濕脚氣○癰

風半身不遂○痰風手足拳攣○胃風不伏水土

○虛風風寒濕痒○腸風脫肛瀉血○腦風頭旋

偏痛○賊風發聲不響○產風四肢疼痛○骨風

膝腫如槌○膝風腿寒骨痛○心風健忘多驚○

盛風言語蹇澁○髓風臂膊痠疼○藏風夜多盜

汗○血風陰囊濕痒○烏風頭面腫塊○皮風赤

白癰癰○肌風遍身瘙痒○體風身生腫毒○閉

風病治法

者靈樞曰真氣者虛風之所受於天與穀氣并而充身

洒淅動形起毫毛而發腠理○邪之中人或中於

陰或中於陽上下左右無有恒常人方虛時及新

用力若飲食汗出腠理開而中於邪中於面則下

陽明中於項則下太陽中於頰則下少陽其中於

膺背兩脇亦中其經譖。風有中藏中府之分中
府者宜汗之中藏者宜下之汗亦不可過多也表
裏不和則須汗下之始也善裏已和是宜治之在經也
錫。風者百病之始也善行而數變行者動也治
須少汗亦宜少下汗下得宜然後可治。大率
治風主氣血虛有痰氣虛者獨參湯。加竹瀝
薑汁。血虛者四物湯。加附子。烏頭。黃薑汁。浸炒。加竹瀝
薑汁。肥人多濕少加附子。烏頭。行經。。丸。人春
服小續命湯五劑。夏服腎瀝湯三劑。秋服黃芪元
飭。規一兩劑。冬服藥酒兩三劑。此法終身常爾則
風病不生矣。

諸風通治

宜用通氣驅風湯秘傳順氣散烏藥順氣散
木香保命丹禦風丹烏龍丹一粒金丹換腎

丹鐵彈元
辟異鉸子

通氣驅風湯

治中風口眼喎斜半身不遂痰涎壅盛
語言蹇澁行步艱難精神不爽烏藥一

錢半川芎白芷桔梗陳皮白朮甘草各一錢
枳殼人參各五分左右剉作一貼入薑三片棗二枚



水煎服。一名祛風通氣散。

秘傳順氣散

治中風喎斜癱瘓一切風疾。青皮、陳皮、枳殼、桔梗、烏藥、人參、白朮、白茯苓、半夏。

川芎、白芷、細辛、麻黃、防風、羌活、白朮、白芍、甘草。各六分。右剉作一貼，入薑五片，水煎服。

烏藥順氣散

治風氣流注，手足間微汗，為筋脉拘攣，宜多汗以手足間微汗為妙。坊見。

木香保命丹

治中風一切諸證，本獨活、羌活、海東皮、白芷、杜仲、厚朴、藁朮。

甘菊、牛膝、酒浸白虎骨、酒浸酥炙天南星、漿水煮天麻、當歸、蔓荊子、虎骨、酒浸酥炙、天南星、漿水煮。

防風、山藥、甘草、酥炙、赤箭、各五錢、朱砂、七錢、半。為衣，麝香一錢，半。右為末，蜜丸，彈子大。朱砂為衣。

每溫酒送下。

御風丹

治中風口眼喎斜，半身不遂，神昏語澀，麻黃、防風、白芷、各一兩、半、乾生薑、甘草、各七錢、半。

川芎、白芍、藥、桔梗、細辛、白朮、蠶、羌活、南星、各五錢、右末，蜜丸，彈子大。朱砂二錢，半。為衣，每丸熱酒。

化下

烏龍丹

治中風口眼喎斜手足痺曳言語蹇澁神驗

腦麝香各半錢和勻滴水丸如彈子大每一丸先以薑汁研化次日煖酒調服一日兩服五七丸便

覺手移足步十九
可以自梳頭搥

一粒金丹

治一切諸風川烏炮附子炮白附子炮各一兩白殭蠶白茯苓炒五靈脂白礬枯過

沒藥各五錢朱砂細墨磨麝香各二錢半右為末以墨汁和勻每兩作六丸金箔為衣每一丸薑汁

和酒半盞溫熱調服更飲一二
升以助藥力覆衣汗出為效

換骨丹

治中風喎斜癱瘓語澁痰盛一切
風疾無不治之汗出神效坊見

鐵彈元

治中風喎斜癱瘓涎潮語澁筋攣骨痛應是
風疾無不治之五靈脂二兩川烏炮一兩乳

香沒藥各五錢麝香一錢右為末滴水
和九彈子大每一丸薄荷酒化下



辟異錠子

治一切諸風及破傷風小兒急慢驚風疾

川芎白芷人參薄荷木香白朮茯苓神各五錢牛黃
龍腦乾生薑白附子各三錢麝香二錢全蠍二十
箇生用白礬蚕二十一箇生用右細末用麻黃一
斤甘草八兩蜂蜜二兩煎作膏子入藥末和勻兩
作十錠溫酒化下每

風痺之始

內經曰汗出而風吹之血凝於膚者則為痺

為痺納邪之所湊其氣必虛留而不去其病則
實納虛邪中人留而不去則為痺衛氣不行則

為不仁納不仁者何以明之仁者柔也仁謂
不柔也痛痺不知寒熱不知灸刺不知是謂不

仁也

三痺

內經曰黃帝曰痺之安生岐伯對曰風寒濕三氣
雜至合而為痺也其風氣勝者為行痺寒氣勝者

為痛痺濕氣勝者為著痺○行痺宜防風湯
痛痺宜茯苓湯著痺宜川芎茯苓湯三痺湯

防風湯

治行痺走注無定防風一錢半當歸赤茯苓獨活杏仁桂心甘草各一錢麻黃五分黃芩

秦艽葛根各三分右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服暄

茯苓湯

治痛痺四肢疼痛拘攣浮腫赤茯苓桑白皮各一錢半防風桂皮川芎芍藥麻黃各一錢

右剉作一貼入棗二枚水煎服汗出為效暄

川芎茯苓湯

治着痺四肢麻木拘攣浮腫赤茯苓桑白皮各一錢半川芎防風麻黃赤芍藥

當歸各一錢桂皮甘草各五分右剉作一貼入棗二枚水煎服暄○着痺即麻木不仁也

三痺湯

治風痺氣血凝滯手足拘攣杜冲牛膝桂皮細辛人參赤茯苓白芍藥防風當歸川芎黃

芪續斷甘草各七分獨活秦艽芎生地黄各三分右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服暄

五痺

帝曰其有五者何也岐伯曰以冬遇此者為骨痺以春遇此者為筋痺以夏遇此者為脉痺以至陰遇此者為肌痺以秋遇此者為皮痺○帝曰內舍五藏六府何氣使然岐伯曰五藏皆有合病久

而不去者內舍於其合也故骨痺不已復感於邪
 內舍於腎筋痺不已復感於邪內舍於肝脉痺不
 已復感於邪內舍於心肌痺不已復感於邪內舍
 於脾皮痺不已復感於邪內舍於肺所謂痺者各
 以其時重感於風寒濕之氣也○帝曰其客於
 六府者何也岐伯曰此亦其飲食居處為其病本
 也六府亦各有俞踰而良飲應之循俞而入各
 舍其府也○滯氣喘息痺聚在肺滯氣憂思痺
 聚在心滯氣遺尿痺聚在腎滯氣之竭痺聚在肝
 滯氣肌絕痺聚在脾諸痺不已亦益內也註曰滯
 氣謂氣之妄行者也從外不去則益深而至於身
 內○宜用五痺湯增味五痺湯行濕流氣散

五痺湯

治風寒濕氣客留肌體手足緩弱麻痺羌活
 白朮薑黃防己各二錢甘草一錢右剉作一

貼入薑七片
 水煎服

增味五痺湯

治風寒濕合為痺肌體麻痺不仁羌活
 防己薑黃白朮海東皮當歸白芍藥各

一錢甘草炙七分半右剉作
 一貼入薑十片水煎服

行濕流氣散

治風寒濕痺麻木不仁手足煩軟薏苡仁二兩白茯苓一兩半蒼朮羌活防風

川烏炮各一兩右為末每二錢溫酒或葱白湯調下

痺脉

脉澁而緊為痺痛。風寒濕氣合而為痺浮澁而緊三脉乃

備

痺病形證

內經曰帝曰痺或痛或不痛或不仁或

也有寒故痛也其不痛不仁者病久入深榮衛之行澁經絡時疎故不痛皮膚不滑故為不仁其寒者陽氣少陰氣多與病相益故寒也其熱者陽氣多陰氣少病氣勝陽乘陰故為痺熱其多汗而濡者此其逢濕甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也。病在筋筋攣節痛不可以行名曰筋痺病在肌膚皮膚盡痛名曰肌痺病在骨骨重不可舉骨痛名曰骨痺。帝曰痺之為病不痛傳也岐伯曰痺在骨則重在於肉則不疑而不流在於筋則屈而不伸在於肉則不仁在

痺之類寒故其此五者則不痛也凡

痺病吉凶

內經曰帝曰痺其持何也岐伯曰其入藏者死其留筋

痺病多兼麻木

雖不知痛痺氣亦不覺流木是濕痰死血蓋麻猶痺也

風痺與痿相類

靈樞曰痺陰陽俱病命曰風痺陽者表與上

也陰者裏與下也○痺者氣閉塞不通流也或痛

盛肺焦而純乎中風則陽受之痺無風寒濕三氣

痺病難治

似故世為證有筋攣不伸肌肉不仁與風絕相

固當分其所以因風則陽受之痺則陰受之為病多
重痛沉着患者難易得去如錢仲陽為宋之一代
名醫自患周痺止能移於手足為之
偏廢不能盡去可見其為難治也

痺病治法

痺之初起驟用參芪歸地則氣血滯而邪鬱
不散只以行濕流氣散主之

經絡以久而不已則入五藏或入六府隨其藏府之
俞合以施鍼灸仍服逐三氣發散等藥則病自愈

矣○痺證因虛而感風寒濕之邪既着體不去
則須製對證藥日夜飲之雖留連不愈能守病禁

斗者以法啖之可扶持也如錢仲陽取茯苓其大逾
不令入藏庶可扶持也

悍如無疾者壽八十
而終惜乎其方無傳

痺證病名及用藥

風痺濕痺寒痺俱宜附子湯冷痺宜
蠲痺湯周痺宜大豆蘗散骨痺筋痺

脉痺肌痺皮痺行痺痛痺着痺俱宜三痺湯五痺
湯增味五痺湯行濕流氣散防風湯茯苓湯川芎

茯苓湯宜用羚羊角湯○風寒痺宜用烏藥順氣散
筋痺宜用羚羊角湯○

踈痛氣
道見

附子湯

治風寒濕合而為痺骨節疼痛皮膚不仁肌
肉重着四肢緩縱附子生白芍藥桂皮人參

白茯苓甘草各一錢白朮一錢半
右對作一貼入薑七片水煎服三

蠲痺湯

治手冷痺一云冷痺者身寒不熱腰脚沉重
即寒痺之甚者當歸赤芍藥黃芪防風薑黃

羌活各一錢半甘草五分右剉作
一貼入薑五片棗二枚水煎服

大豆蘗散

治周痺周痺者在於血脉之中隨脉以上
隨脉以下不能左右各當其所大豆蘗一

升炒熟為末每一錢
溫酒調下日三服

升麻湯

治熱痺肌肉熱極體上如鼠走唇口反縱皮
色變升麻二錢茯苓神人參防風犀角羚羊角

羌活各一錢桂皮五分右剉作一貼
薑五片同煎入竹瀝五匙調服

五物湯

治血痺夫尊榮人骨弱肌膚盛疲勞汗出而
卧加被微風遂得之形如風狀但以脉自微

滋在寸口關上小緊宜鍼引陽氣令脉和緊去則愈黃芪桂枝白芍藥各三錢右剉作一貼入生薑

七片大棗三枚水煎日三服一方有人參

羚羊角湯

治筋痺肢節束痛羚羊角桂皮附子獨活各一錢三分半白芍藥防風川芎各一錢

右剉作一貼入薑三片水煎服

歷節風病因

歷節之痛皆由汗出入水或飲酒汗出當風肝致熱○歷節風古方謂之痛痺今人

謂之痛風也○痛風者大率因血受熱已自沸騰其後或涉冷水或立濕地或坐所當風取涼熱

血得寒汚濁凝澁所以作痛夜則痛甚行於陰也治宜辛溫之劑流散寒濕開發腠理血行氣和其

病自安○古之痛痺即今之痛風也諸書又謂之白虎歷節風以其走痛於四肢骨節如虎咬之

狀而名之也○痛風之證以其循歷遍身曰歷節風甚如虎咬曰白虎風痛必夜甚行於陰也

○白虎歷節亦是風寒濕三氣乘之或飲酒當風汗出入水亦成斯疾久而不已令人骨節蹉跌



歷節風證狀

歷節風之狀短氣自汗頭眩欲吐手指攣

掣不能屈伸蓋由飲酒當風汗出入水或體虛膚空掩護不謹以致風寒濕之邪遍歷關節與血氣搏而有斯疾也其痛如掣者為寒多其腫如脫者為濕多肢節間黃汗出者為風多遍身走注徹骨疼痛晝靜夜劇狀如虎咬者謂之白虎歷節久不治令人骨節蹉跌須當大作湯丸不可拘以尋常劑淺近之

歷節風治法

多用風多屬血虛血虛然後寒熱得以侵之

用趁痛散煉。丹溪治痛風法主血熱血虛血汚或挾痰皆不離四物潛行黃栢牛膝生甘草桃仁

陳皮蒼朮薑汁隨證加減可謂發前人所未發也。治痛風大法蒼朮南星川芎白芷當歸酒

芩在上加羌活威靈仙桂枝桔梗在下加牛膝防己木通黃栢。薄桂治痛風無味而薄者能橫

行手臂領南星蒼朮等至痛處。風寒濕入於經絡以致氣血凝滯津液稽留久則悌鬱堅牢阻

碍榮衛難行正邪交戰故作痛也須氣味辛烈暴悍之藥開鬱行氣破血豁痰則悌鬱開榮衛行而病方已也。防風天麻散。風活血湯。四妙散。活湯。蒼朮復煎散。二妙散。龍虎丹。活絡丹。五靈丸。歷節風宜用神。通飲定痛散。虎骨散。加減虎骨散。麝香元乳香黑。虎丹。乳香。定痛丸。捉虎丹。○肢節腫痛宜用靈仙。除痛飲。○痰飲注痛宜用芎夏湯。控涎丹。痰消。痰茯苓丸。○宜用拈痛散。當歸散。○痛風熨烙。宜用拈痛散。當歸散。

趁痛散

治痛風多屬血虛血汚宜調血行血。挑仁紅。花當歸地龍五靈脂牛膝酒浸羌活酒浸香。

附子一錢童便浸甘草生各二錢溫酒調下。藥。各一錢右為末每二錢溫酒調下。研。

大羌活湯

治風濕相搏肢節腫痛不可屈伸羌活升。麻各一錢半獨活一錢蒼朮防已威靈仙。

白朮當歸赤茯苓澤瀉甘草各七分。右剉作一貼水煎服。醃。

蒼朮復煎散

治風濕熱痛風蒼朮四兩黃柏三錢柴。胡升麻葉本澤瀉羌活白朮各五分紅。

花二分右劉先以水二碗煮蒼朮至二鍾去渣入餘藥再煎至一鍾去渣服

防風天麻散

治風濕痺走注疼痛或偏枯或暴瘖滑石二兩防風天麻川芎羌活白芷草

烏炮子白附子荊芥穗當歸甘草各五錢右為末蜜丸彈子大每取半丸或一丸熱酒化下覺藥力運

行微麻為度此散鬱開結宜風通氣之妙劑也

疎風活血湯

治四肢百節流注刺痛皆是風濕痰死血所致其痛處或腫或紅當歸川芎威

靈仙白芷防己黃柏南星蒼朮羌活桂枝各一錢紅花三分右剉作一貼入薑五片水煎服

四妙散

治痛風走注威靈仙酒蒸五錢羊角灰三錢蒼朮耳子一錢半白芥子一錢右為末每一錢薑湯調下

無蒼耳子有蒼朮一方

麻黃散

治歷節痛風無汗麻黃二錢羌活一錢半黃芪細辛各七分半右剉作一貼水煎服

潛行散

治血虛陰火痛風及腰以下濕熱注痛黃柏酒浸焙乾為末每一錢薑汁和酒調服必無

服四物湯間
服之妙心

二妙散

治濕熱痛風筋骨疼痛黃柏酒浸焙蒼朮
治浸焙右等分為末熟薑湯調下一錢心

龍虎丹

治痛風走注或麻木半身痛草烏蒼朮白芷
各一兩用童便薑葱汁拌會熟八乳香沒藥

各三錢當歸牛膝各五錢右為末酒
糊和九彈子大每一丸溫酒化下

活絡丹

治一切痛風筋脉拘攣沉痛時或上衝川烏
炮草烏炮南星炮地龍焙各一兩乳香沒藥

各二錢二分右為末酒糊和九
子大空心溫酒下二三十九

五靈丸

治風冷氣血閉身體麻痛五靈脂二兩川烏
炮一兩半沒藥一兩乳香五錢右為末水丸

彈子大生薑湯和溫
酒磨化一丸服之

神通飲

治歷節風木通二兩剉細長流水煎湯頓服
空心飲一兩一人因風濕得白虎歷節風遍身

疼痛足不履地者三年百方不效一日夢與木通
湯愈遂服此藥服後遍身痒甚上體發紅丹如小



豆大隨手沒去出汗至腰而止上體不痛矣次日

又如前煎服下體又發紅丹汗出至足而無痛後

定痛散

治風毒攻注皮膚骨髓之間痛無常處晝靜夜劇筋脉拘攣不得屈伸蒼耳子骨碎補自

然銅血竭白附子赤芍藥當歸肉桂白芷沒藥防風牛膝各七錢半虎脛骨龜板各五錢天麻檀榔

羌活五加皮各二錢半右為末每加一錢溫酒調下

虎骨散

治歷節風百節痠痛無定處久則變成風毒痛入骨髓不移其處又云骨髓痛者宜此藥

虎骨酥炙二兩白蛇肉天麻防風牛膝白殭蠶炒當歸酒浸乳香桂心各一兩全蝎炙甘草炙各

五錢麝香一錢右為末每二錢溫酒調下豆淋酒尤好鱗〇一方加有自然銅白附子檳榔羌活白

芷川芎各一兩地龍沒藥雄黃各五錢服法亦同治白虎歷節風走痛

加減虎骨散

治白虎歷節痛晝夜不止虎脛骨三兩沒藥五錢右為末每二錢溫酒調下

麝香元

治白虎歷節疼痛遊走無定狀如虫行晝靜夜劇川烏大者三箇全蝎二十一箇地龍生

五錢黑豆生二錢半麝香一字右為末糯米糊和丸萊豆大空心溫酒下七九或十九出汗便差

乳香黑虎丹

治諸風寒濕骨節渾身疼痛立效草烏五兩蒼朮三兩白芷五靈脂羌活當歸

川芎自然銅醋淬七次各二兩乳香一兩右為末酒糊和丸梧子大百草霜為衣臨睡溫酒下五九

或七九忌食熱物汁三

乳香定痛丸

治遍身骨節痛蒼朮二兩川烏炮當歸川芎各一兩丁香五錢乳香沒藥各三

錢右末棗肉和丸梧子大溫酒吞下五六十九

捉虎丹

治一切痛風走注癱瘓麻木白虎歷節及寒濕脚氣妨觀

靈仙除痛飲

治肢節腫痛痛屬火腫屬濕無受風寒而發動於經絡之中濕熱流注於肢節

之間麻黃赤芍藥各一錢防風荊芥羌活獨活威靈仙白芷蒼朮片苓酒炒枳實桔梗葛根川芎各



五分當歸梢升麻甘草各三分右剉作一貼水煎服一名麻黃芍藥湯

半夏芩朮湯

治濕痰流注肩臂痛蒼朮二錢白朮一錢陳皮赤茯苓各五分威靈仙三分甘草二分

右剉作一貼入薑三片水煎服一方有羌活心

拈痛散

可熨烙痛風羌活獨活細辛肉桂防風白朮良薑麻黃天麻川烏吳茱萸乳香川椒全蝎

當歸各五錢白薑二錢半右粗末每兩或一兩半鹽一升同炒極熱絛袋盛熨烙痛處冷則易或

炒用之鑒

當歸散

熨烙寒濕痛風防風當歸藁本獨活荊芥穗荊葉各二兩右粗末一兩鹽四兩同炒熟

袋盛熨之冷則易熨○宜去頑荊葉代椒葉亦佳

禁忌法

凡味酸傷筋則緩味鹹傷骨則痿令人發熱變為痛痺麻木等證慎疾者須戒魚腥麪醬酒醋

肉屬陽大能助火亦可量契痛風諸痺皆然

破傷風病因

破傷風者多由亡血筋無所營故邪得以

產後致斯病者槩可見矣。破傷風者初因擊

破皮肉視為尋常殊不知風邪乘虛而襲變為惡

候或諸瘡久不合口風邪內襲或用湯淋洗或着

艾焚灸其火毒之氣亦與破傷風邪無異也其證

寒熱間作甚則口噤目斜身體強直如角弓反張

之狀死在朝夕。○產病者難治也多是血氣

內虛風痰盛而成產病凡傷寒雜病汗吐後入風

亦成產病大發濕家汗亦成產發瘡家汗亦成產

產後去血多亦成產有跌磕打傷瘡口未合貫風

者亦成產此名破傷風也。○破傷風有四因一

者卒暴傷損風邪襲虛二者諸瘡湯洗艾灸逼毒

痊與瘕通稱破傷風

瘕者筋勁強直而不柔和也。○

破傷風形證

夫人之筋各隨經絡結束於身血氣內虛

身白痂瘡口閉塞氣

難通泄傳播經絡

外為風寒濕熱之氣所中則成瘕故寒則



緊縮熱則弛張風則弦急濕則弛緩風散氣故有
 汗而不惡寒寒澁血故無汗而惡寒熱消氣故為
 瘰縱濕溢血故為緩弱經所謂大筋綆短小筋弛
 張皆濕熱不攘之所為也原其所因多由亡血筋
 無所營故邪得以襲之所以傷寒汗下過多與夫
 病瘡人及產後致斯病槩可見矣因○筋脉相引
 而急名曰瘰瘕俗謂之搐是也○諸熱脅瘕皆
 屬于火熱勝風搏并于經絡風主動而不寧風火
 相乘是以脅瘕生矣治宜祛風滌熱之劑折其火
 熱可立愈若妄加灸火或發其表則死不旋踵○
 風脉沉弦緊者○瘰脉弦直上下行○瘰脉皆伏
 脉濃如蛇弦緊尚有力陽明也浮而弦小少陽也
 力太陽也蛇弦長而有力陽明也浮而弦小少陽也
 ○凡瘰脉如兩濺散
 出指外者立死○

破傷風治法

破傷風者諸瘡久不合口因熱甚鬱結而榮衛不得宣通怫熱因之遍體故多白痂

是時瘡口閉塞氣難宣通故熱甚而生風也先辨瘡口平無汁者中風也邊自出黃水者中水也並

欲初作瘡急治之。又痛不在瘡處者，傷經絡亦死。證也。初覺瘡腫起，白痂身寒熱急，用王真散貼之。傷在頭面，急用水調膏和雄黃，付瘡上腫漸消為度。若腰脊反張，四肢強直，牙噤通身冷，不知人急用蜈蚣瘡病口噤，擦牙吐涎，沫立甦。亦宜按摩導引。腳紫扯手足戰搖，伸縮者，是風痰瘡。若身冷手足冷，脉沉細，名為陰瘡，俱宜參歸養榮湯。若身熱喘嗽，生痰脉滑，數名為痰火瘡，宜用瓜蒌枳實湯。不可全用風藥散氣，死之速矣。翻○破傷風如表，則辛以散之。在裏則苦以下之。無散之汗下，後通利榮血祛逐風邪，防風通聖散。助門一兩加荊芥穗。大黃各二錢煎水調全蝎末羌活末各一錢服之。○破傷風多死，宜用防風全蝎之類。全蝎散最妙。○破傷風口噤，擦肢體反張，須臾欲死，宜用全蝎散。○大蜈蚣散風口噤，盛者二烏丸風痰者，王真散。烏蛇散手足戰掉，宜用朱砂指甲散。血凝昏悶者，烏鴉散。○破傷風宜用香膠散。一字散退風散。○大凡破傷風在頭面，則白芷為君，隨身梢用在下部，則身體及四肢，則以防風為君。隨身梢用在下部，則

以獨活佐之心丹○諸瘡欲變瘡宜急風散散防風散
發汗多成瘡宜防風當歸散亡血多成瘡宜當歸

地黃湯

玉真散

治破傷風口噤身強直防風天南星等分爲末每二錢薑汁和溫酒調服以滓付瘡口上

口噤者童便調下南星爲防風所制服之
不麻可以開關定搐○一名定風散醫鑑

水調膏

治破傷風發熱紅腫風邪欲傳經絡而未深
入者杏仁研爲泥白麪等分新汲水調成膏

塗傷腫處即腫
消熱退神驗醫鑑

參歸養榮湯

治風痰瘡陰瘡人參當歸川芎白芍藥
熟地黃白朮白茯苓陳皮各一錢甘草

五分右剉作一貼入薑
三片棗二枚水煎服翻

瓜蒌枳實湯

治痰火瘡瓜蒌仁枳實貝母桔梗片苓
陳皮梔子茯苓麥門冬人參當歸蘇子

各八分甘草三分右剉作一貼
入薑三片煎和竹瀝薑汁服翻

全蝎散

治破傷風口喎噤肢體反張須臾欲死蝎梢七箇為末熟酒調服日三九患破傷風非此

不除

大蜈蚣散

治破傷風搖擗反張蜈蚣二條魚鱧炒左蟠龍炒烟盡各五錢右為末每二錢以防

風煎湯調服服此一條江鯪三錢為末每服一錢防風羌活煎湯調下

一條全蝎炒二箇右為末擦牙內或吹鼻中名曰

小蜈蚣散

二烏丸

治破傷風角弓反張牙關緊急生川烏白芷天麻各二錢生草烏雄黃各一錢右為末酒

糊和丸梧子大溫酒下十丸

烏蛇散

治破傷風痰盛烏蛇六錢麻黃一兩草烏炮乾薑附子炮川芎白附子天麻各五錢蝎梢

二錢半右為末每錢熱酒調日三服



朱砂指甲散

治破傷風手足戰掉不已朱砂水飛天南星薑製獨活各二錢人手足爪甲燒

存性六錢右為末分作三貼熱酒調下立效

烏鴉散

治破傷風血凝昏悶烏鴉翎燒灰酒調一錢服服後飲酒一二盞以助藥勢

香膠散

治破傷風口噤身強直魚膠燒十分留性麝香少許右細末每二錢熱酒米飲任下

一字散

治破傷風急者金頭蜈蚣一條灸天麻草烏各五錢全蝎十箇白芷一錢右為末每一字

發熱茶清調下發寒溫酒調下

退風散

治破傷風不省人事防風天麻白芷麻黃赤茯苓當歸各一錢薄荷七分荊芥白殭蚕甘

草各五分右剉作一貼入薑七片水煎服

急風散

治久新諸瘡傳變為破傷風麝香一字朱砂一兩生黑豆二錢半草烏三兩半生用半焙

存性米醋同淬右為末酒調半錢服之神效

防風當歸散

治發汗過多成瘧防風當歸川芎生地黃各二錢半右剉作一貼水煎服

當歸地黃湯

治亡血過多變成破傷風宜養血當歸地黃芍藥川芎葉本防風白芷各一錢

細辛五分右剉作一貼水煎服

破傷風之治同傷寒三法

破傷風有在表在裏半表半

下和三法也。發汗過多因致瘧身熱足寒項

強頭搖口噤背反張者太陽瘧也無汗宜汗之有

汗宜止之若頭低視下手足牽引肘膝相搆者陽

明瘧也若一目或左右視并一手一足搯搦者少

陽瘧也。○背後搯者太陽也。身前搯者陽明也。

兩傍搯者少陽也。○河間曰太陽宜汗陽明宜

下少陽宜和若明此三陽而不論三陰者蓋傳入陰

經其證已危若腹滿自利口燥咽乾舌卷卵縮皆

無可生之理故置而不論也。○破傷風在表則皆



之宜羌麻湯防風通聖散
見在裏則以寒藥下
之宜小芎黃湯大芎黃湯左龍丸
○破傷風雖

宜發汗若自汗多則宜
用白朮湯白朮防風湯

防風湯治破傷風在表未入裏急服此藥防風羌活
獨活川芎各一錢二分半右剉作一貼煎水

調小蜈蚣散
服之效

羌活防風湯治破傷風初傳在表羌活防風川芎白
芍藥藁本當歸甘草各一錢地榆細辛

各五分右剉作
一貼水煎服

羌麻湯治破傷風在半表半裏無汗羌活麻黃甘菊
川芎石膏防風前胡黃芩細辛枳殼白茯苓

蔓荊子甘草各七分白芷薄荷各五
分右剉作一貼入薑三片水煎服

小芎黃湯治破傷風入裏猶有表熱川芎三錢黃芩
二錢甘草五分右剉作一貼水煎服二三

服後用大
芎黃湯

大芎黃湯

治破傷風入裏二便秘小便赤自汗不止

一貼水煎服以下

左龍丸

治破傷風入裏發搐目直視二便秘澀宜此

各五錢雄黃一錢蜈蚣二條天麻二錢右為末分

作三貼先將二貼燒飯為丸梧子大朱砂為衣次

將一貼加巴豆霜半錢飯丸梧子大每用朱砂丸

白朮湯

治破傷風大汗不止筋攣搐搦白芍藥三錢

白朮葛根各二錢升麻黃芩各一錢甘草五

白朮防風湯

治破傷風發汗過多自汗不止貼水煎

服



痙有剛柔二證

痙證寒熱類傷寒但脈沉遲弦細如發

痙終日不醒為異因傷寒發汗過多或大發濕家汗皆作痙風性勁故為剛痙而無汗濕性緩故為

柔痙而有汗門○無汗為剛痙有汗為柔痙去麻黃有

剛柔二痙並可與小續命湯功見柔痙去麻黃有

熱減半桂枝附子門○黃芩○剛痙之病胃滿口噤卧不

續命湯加生附子門○剛痙之病胃滿口噤卧不

着席脚攣急必齮齒可用大承氣湯勑門

下之○剛柔二痙通用九味羌活湯門

破傷風凶證

痙病有灸瘡難治○破傷風宜早治若入藏則

痙病有灸瘡難治○破傷風宜早治若入藏則

難治有二指許者皆死○破傷風宜早治若入藏則

額上有汗珠不流三者眼小目瞪四者身上汗出如油麵○太陽風瘥之證始則發熱腹痛喘息涎浮次則牙緊頭搖十指微搖漸加項背強直轉側不仁甚者昏困失音目睛直視滑泄不禁身腰反張如此則十不救一○瘥○瘥○病○目○瞪○口○開神氣昏冒不知人者斷死無疑也○

車方

凡三十七種有禦風膏五加皮酒竹瀝湯豆淋酒虎骨酒

石灰

治中風口眼喎斜石灰一合醋炒調如泥右喝塗左左喝塗右候纔正即洗去

菖蒲

治三十六種風無不效取根剉浸酒或釀酒服法見雜方

甘菊

治諸風及風眩取乾煮湯飲之或浸酒或釀酒服釀法見雜方

白朮

治一切風及瘧痺或中風口噤不省木四兩酒三升煮取一升頓服之

獨活

治下風羌活治上部風並療一切風百節風取一部治風下

一兩坐酒二升煎至一升黑豆五合炒熱投酒中蓋定良久取溫服之



防風分頭身梢治上中下部風邪。治三十

蒼耳子治一切風氣及風濕痺取子三兩為末水一

仙靈脾治中風半身不遂取一斤剉袋盛

藁本治一百六十種惡風又治

天麻治諸風痺癱瘓不遂其苗名定風草

草麻子治中風口眼一斜取子去殼搗爛右嚼塗左

在手心單麻子上用熟水置盂中候口眼

稀簽治中風久百醫不差五月五日摘其葉嫩枝酒

或米飲下五七十九久服則眼

松葉治中風口喎青葉一升搗令汁出清酒一瓶一

黃松節

治偏風口眼喎斜毒風筋攣

五加皮

治風補虛又治風痺及目僻眼瞤有五花而

自正即五加皮也粗末酒浸飲之其目瞤自正

桑枝茶

治偏風及一切風桑枝未生葉者剉炒水煎如茶每服一盞久服則終身不患偏風又可

預防風氣○霜後葉煮湯淋濕手足去風痺殊勝

竹瀝

○卒中風口喎不語煩悶竹瀝一升飲之連飲佳○破傷風欲死灌入二三升即活○治風痺

恍惚竹瀝二升生葛汁一升薑汁五合相和服名曰竹瀝湯

皂莢

治卒中風口喎不省皂莢末吹鼻取嚏即甦○中風口喎皂莢為末醋調右喎塗左左喎塗右

乾則易○中風不省取末和白礬末或半夏末薑汁調灌口吐痰即醒

鱖魚

治中風口眼喎斜取魚大者以鍼刺頭上出血左斜塗右右斜塗左正則洗去鱖放水中燂



蜈蚣

治破傷風口噤身冷強直蜈蚣
細末擦牙吐出涎沫立甦

蟾蜍

治破傷風極有神效初覺急取
一二箇用手捏住待虫口中吐些
少水就抹在

破傷處身穿厚衣裳待片時瘡口
覺麻兩脇微汗

將肚內黃水塗瘡口再滴些少入
熱酒飲之汗出
立效

蚕沙

治風痺癱瘓不仁取沙炒熟袋
盛熨之冷即易酒拌炒尤佳

白花蛇

治一切風喎斜癱瘓疼痛取蛇
浸酒取酒飲
又肉作末和酒服之○烏蛇治風尤勝

杏仁

治諸瘡入風水紅腫欲成破傷風
杏仁泥入白麩和水塗之即消

梨

治中風失音不語煩熱取梨汁服一
合日三
○風疾人喫消梨不限多少旬日
頓爽

黑豆

治中風口噤不語喎斜癱瘓取豆
炒令
極熟投酒中飲之

葱白

主中風面目腫
煮取汁飲之

荊芥

治一切中風啗斜痺及

薄荷

生取汁飲之又不語及熱風煩悶

野鴿糞

或即左蟠龍取乾者酒漬服

烏雞

治中風語澁及風寒濕痺取肉作羹入葱椒薑

尿白同黑豆炒

鵲

治中風啗斜取生鵲劈開腹及可

鴈肪

主諸風拘攣偏枯血氣不通及麻痺

烏鴉

治急中風啗斜不遂取全者鹽

熊脂

主風又大匙治風痺不仁以酒煉過毒

虎骨

主筋骨毒風攣急屈伸不得走注

鹿生肉

則治中風喎斜取肉和生椒同搗付之正

鍼灸法

欲治中風莫如續命湯之類然此可扶持初病若

氣閉塞也灸則喚醒脉道而血氣得通故可收全

功。中風痰盛聲如曳鋸服藥不下宜灸臍下

氣海關元二三百壯亦不可轉死迴生五藏氣絕危

證亦宜灸之。○九人非時足脛上及手食指次

指忽痠疼麻痺良久方解此將中風之候急灸三

里絕骨各三壯春秋報灸常令兩脚有灸瘡為妙

○九人不信此法不肯灸忽然卒死是謂何病

曰風入藏故也風病者不可不知。○九覺手足

或麻或痛良久乃已此將風中府之候宜灸百會

曲鬢肩髃曲池風市三里絕骨。○九覺心中憤

亂神思不怡或手足麻痺此將風中藏之候宜灸

百會風池大領肩井曲池間使三里。○治風七

穴百會耳前髮際肩井風市三里絕骨曲池一方

加有風池合谷肩髃環跳九九穴。○九中風皆灸

之。○卒中風喎斜涎塞不省宜灸耳前髮際大領風

百會肩髃曲池風市三里絕骨耳前髮際大領風



以三稜鍼刺絕
骨出血立愈

寒

冬爲傷寒

從霜降以後至春分前凡有觸冒霜露體中寒邪即病者謂之傷寒

暑熱秋氣清涼冬氣冷冽此四時之正氣也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒夫觸冒之

者乃名傷寒其有殺厲之氣也中而即病者爲傷寒最毒者以其有殺厲之氣也

寒不即病者其寒毒藏於肌膚中至春變爲溫病至夏變爲暑病暑者熱重於溫也是以辛苦之人

春夏多溫熱病者皆由冬時觸寒所致非時行之氣也

傷寒號爲大病

傷寒世號爲大病。傷寒一證與雜病不同若不對證妄投藥餌罪犯非輕

誤人多矣。○傷寒證候頃刻傳變傷寒治法繩尺謹嚴非可以輕心視之也其間種類不一條例

浩繁是固難矣。至於陰極發躁熱極發厥陰證如陽陽證如陰脚氣似乎傷寒中暑似乎熱病凡此

等類尤當審思而明辨之若疑似未別體認未明切不可妄投決病之劑方七雖微死生係焉可不謹歟

兩感傷寒為死證

帝曰其兩感於寒而病者必不免於死○兩感於寒者病一日巨陽與

少陰俱病則頭痛口乾而煩滿二日則陽明與太陰俱病腹滿身熱不欲食譫言三日則少陽與厥

陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人六日死○兩感傷寒古無治法仲景云兩病俱作治

有先後如下利不止身體疼痛急先救裏如不可利身體疼痛急當救表救裏固宜急而表亦不可

緩也救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯○二病俱感此必死之證然所稟有虛實所感有淺深實而感

淺者猶或可治予嘗用大羌活湯陰陽未分者陶氏冲一云表裏俱急者大羌活湯陰陽未分者陶氏冲

和湯探之○兩感傷寒者日傳二經之候也仲景無治法惟東垣有治兩感大羌活湯云十可救

其一二未知是否

大羌活湯

解利兩感傷寒或傷寒見風脈傷風見寒

知母川芎各一錢羌活防風獨活各五分右剉作一貼

水煎服未解再服三四貼。此方治陰陽已分陽證多者宜服。

陶氏中和湯

治兩感傷寒陰陽未分者以此探之羌

葛白芷石膏各一錢細辛甘草三七粒同煎服。作一

貼。入薑三片棗二枚黑豆三七粒同煎服。作一

脈法

凡治傷寒以脈為先以證為後凡治雜病以證為

見脈未見證雖小投藥亦無害也。緊脈為傷

寒得之傷寒。絛脈陰陽俱盛而緊。絛脈盛身

數動滑此名陽也。沉瀡弱弦微此名陰也。凡陰病

見陽脈者生陽病見陰脈者死。絛脈靜當便瘥。喘熱脈

浮洪細小徒費用神功汗後脈靜當便瘥。喘熱脈

傷寒變熱

也。內經曰：寒傷於寒而傳爲熱，何也？曰：夫寒盛則

陽俱盛重感於寒變爲溫瘧同病異名○陰陽俱盛病熱之極浮之而滑沉之散澁○中寒緊澁

○風溫
陽脉○
濡弱
陰脉
洪數
弦緊
更遇
濕氣
變爲
濕溫
○陰

乃傷風溫。用寒藥。陽浮而弱，陰濡而弱，小而急，此非風寒。

法之正至於大法自有仲景。傷寒有五脉，此非一端。陰陽俱盛，聚澁者，寒陽浮而滑，陰濡而弱，此名。

及入少陰其脉遂緊厥陰熱甚脉伏厥冷○在陽
當汗次利小便表解裏病其脉實堅此其大略治

亂命應終。○寒傷太陽脉浮而瀉及傳而變名。

生故人傷於寒轉而爲熱也汗之而愈則
疑內鬱之理可知矣斯乃雜病數日者也

傷寒傳經

內經曰巨陽者諸陽之屬也其脈連於風府故為諸陽主氣也人之傷於寒也則為病熱

熱雖甚不死其兩感於寒者必不免於死帝曰願聞其狀岐伯曰傷寒一日巨陽受之故頭項痛腰

脊強二日陽明受之陽明主肉其脈挾鼻絡於目故身熱目疼而鼻乾不得卧也三日少陽受之少

陽主膽其脈循脇絡於耳故脅痛而耳聾三日太陽經絡皆受其病而未入於藏故可汗而已四日太

陰受之太陰脈布胃中絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥

舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰三陽五藏六府皆受病榮

衛不行五藏不通則死矣○其不兩感於寒者七日目巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈

九日少陽病衰耳聾微聞十日太陽病衰渴止不滿舌乾已故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已

而噫十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣○煩滿者小腹煩滿也下云小腹微下

者謂此也大氣皆去則病人精神爽慧也○若過十三日不問尺寸陷者大危問謂廖也○

傷寒或愈或死日期黃帝曰今夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆以六七日之類

間其愈皆以十日已上者何也不知其解願聞其

故岐伯對曰兩感於寒而病者到六七日解三陰三

陽五藏六府皆受病榮衛不行水漿不入六日死

帝曰兩感者三日當死而六日乃死何也岐伯曰

陽明者十二經脈之長也其血氣盛故不知人三日

其氣乃盡故死矣其不兩感於寒者到十二日

六經再傳故愈矣

傷寒大法傷寒大法有四曰傳經曰專經曰即病曰鬱

寒邪之中人無有定體或中於陽或中於陰或但

中於太陽未及鬱熱而即發首尾只在本經而

傳變者宜發散表邪而愈或有從太陽陽未及鬱熱

不從陽明少陽過而遂入於三陰之經者亦有

曾入於陽經而直傷於三陰之經而即病者宜溫

中通脈而愈若夫始從太陽陽鬱熱以次而傳至於

陽明少陽次第傳變於三陰之

經者則為傳經之熱證明矣

太陽六傳

者太陽者巨陽也為三陽之首膀胱經病若渴

名曰巡經傳為發汗不盡利小便餘邪不盡透入

于裏也○太陽傳少陽膽木者名曰越經傳為元

受病脉浮無汗宜用麻黃湯而不用故也○太陽

傳太陰脾土者名曰誤下傳為元受病脉緩有汗

當用桂枝而反下之故也病當腹痛四肢沉重○

太陽傳少陰腎水者名曰表裏傳為表病急當汗

而反不汗不發所以傳裏也○太陽傳厥陰肝木

者為三陰不至於首惟厥陰與督脉上行與太陽

相接名曰巡經得度傳藏

六經標本

經絡為標膀胱為本餘倣此

太陽形證用藥

太陽為表裏故發熱冬月麻黃桂枝湯餘

月九味羌活湯○太陽以皮膚為表以膀胱為裏

熱在皮膚則頭疼項強宜麻黃桂枝湯九味羌活

湯熱在膀胱則口渴尿赤宜五苓散○

發熱惡寒脉浮者屬表即太陽證也

太陽傷風

太陽傷風陰弱者汗自出而陰弱陽浮者熱自發

發熱鼻鳴乾嘔桂枝湯主之

太陽傷寒

惡風無汗而喘身發熱身疼腰痛骨節皆痛

身疼腰痛以至牽連百骨節俱痛者此大陽傷寒榮血不利故也

太陽兩傷風寒

脈浮者大青龍湯主之○發熱惡風煩

躁手足溫為傷風候脈浮者為傷寒候脈寒脈也寒多熱少不煩躁手足微厥為傷寒候脈

浮緩為傷風脈是傷寒見風脈也蓋脈似桂枝反無汗病似麻黃反煩躁是也

太陽病似瘧

太陽病似瘧發熱惡寒熱多寒少脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可發汗宜桂

婢各半湯○太陽病八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可發汗宜桂枝湯主之○發熱惡風煩躁手足微厥為傷寒候脈

太陽畜血

太陽病六七日表證因在下脉微而沉反不結胃其人如狂者以證熱在下焦小腹當滿

小便自利者下血乃愈抵當湯主之○太陽陽證俱在而脉反沉無發狂小腹硬者宜用此藥防

麻黃桂枝湯

太陽病八九日發熱惡寒往來如瘧狀桂枝芍藥各二錢麻黃一錢二分甘草

一錢杏仁八分右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服

九味羌活湯

無汗問四時但有頭痛骨節痛發熱惡寒

則其變不可勝言故立此法使不得服桂枝若誤服

解表神方羌活防風各一錢半蒼朮川芎白芷黃

一貼入生薑三片大棗二枚葱白二莖水煎服

撥亂反正之主也防風治一身盡痛聽軍將命令

而後行蒼朮雄壯上行氣能除濕氣下安太陰甘

草緩裏急和諸藥川芎治太陰肺熱在胃白芷治

治少陰心熱在內黃芩治太陰肺熱在胃白芷治

陽明頭痛在額細辛治
少陰腎經苦頭痛傳正

桂枝湯

治太陽傷風自汗惡風寒桂枝三錢白芍藥二錢甘草一錢右剉作一貼入生薑三片大

棗二枚水煎溫服須臾啜稀粥一盞以助藥力令遍身繫繫微汗為佳得汗勿再服陶氏桂枝

湯本方加防風川芎羌活藁本薑棗煎臨熟入飴糖二匙熟服微汗之即解肌也陶氏

麻黃湯

治太陽傷寒頭痛身疼百節痛無汗惡風寒麻黃三錢桂枝二錢甘草六分杏仁十枚右

剉作一貼入薑三片葱白二莖水煎服如上法有汗勿再服陶氏麻黃湯本方加升麻川芎白

芷防風羌活藁本八薑葱豆豉煎熱服如上法陶氏

大青龍湯

善解風寒兩傷麻黃三錢桂枝二錢杏仁一錢半石膏四錢甘草一錢右剉作一貼

入薑三片棗二枚水煎服如上法有汗勿服陶氏發熱惡風煩躁手足溫為傷風候脉浮緊為傷寒脉是傷風見寒脉也寒多熱少不煩躁手足微厥為傷寒候脉浮緩為傷風脉是傷寒見風脉也蓋

脉似桂枝反無汗病似麻黃反煩躁是也此藥能
主之。仲景治傷寒一則桂枝二則麻黃三則
青龍桂枝治傷風麻黃治傷寒青龍治傷風見寒
脉傷寒見風脉三者如鼎立予嘗深究三旨若證
候與脉相對則無不應手而愈

桂婢各半湯

治太陽病脉微身不痒石膏二錢桂枝
芍藥麻黃各一錢甘草三分右剉作一

貼入生薑三片大棗
二枚水煎溫服

桂麻各半湯

治太陽病脉微身痒麻黃一錢半桂枝
芍藥杏仁各一錢甘草七分右剉作一

貼入薑三片棗
二枚水煎服

陽明形證用藥

陽明者大腸為標與肺為表裏故微惡
寒發熱為經病宜葛根解肌湯渴而有

汗者宜白虎湯胃為本目疼鼻乾潮汗閉澀滿渴
狂譫宜調胃承氣湯○陽明以肌肉之間為表
胃府為裏熱在表則目疼不眠宜葛根解
肌湯熱入裏則狂譫宜調胃承氣湯

陽明病有三

明病有太陽陽明有正陽陽明者脾約是陽也

正陽陽明者胃家實是也少陽陽明者發汗利小

便胃中燥煩實大便難是也○陽明者之為病胃

家實也問曰緣何得陽明病答曰太陽陽病發汗若

下若利小便便者此亡津液胃中乾燥因轉屬陽明

者此名陽明病也難

不更衣內實大便難者此名陽明病也難

陽明病陰陽結

曰脉浮而數能食不大便者此為實名

陰不能食身體重九日當劇難

陽明外證

反惡熱也○傷寒轉屬陽明者其人不惡寒

陽明證潮熱

詳見

陽明病惡候

傷寒若吐若下後不循不大便五六日

如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而不

安微喘直視脉弦者生脉瀋者死○微者但發

熱譫語宜大承氣湯下之○一人病傷寒利則止後服脉弦

者生脉瀋者死○發潮熱手足絳兩手撮空直視喘急諸醫皆走

此誠惡候仲景雖有證而無法但云脉弦者生脉

瀋者死謾且救之與小承氣湯一服而大便利諸

疾漸退脉且微弦半月愈或問曰脉弦者生何也

予曰錢仲陽云手尋衣領及捻物者肝熱也此證

在王函列於陽明部蓋陽明者胃也肝有熱邪滯

陽明實證宜下

于胃經故以承氣瀉之且得弦脉則

肝平而胃不受尅此有生之理也熱

陽明虛證宜補

湯一入傷寒發狂欲走脉虛數用柴胡

也○氣湯下之○潮熱○手足濕然汗出者此大便秘小便利赤手足溫脉洪

也○譫語有潮熱○承氣湯下之○熱不潮者勿服○明鞭

一服狂定再服安睡而愈○嘗治循衣摸床者數人皆用大補氣血之劑惟一入無調振脉代遂於補劑中略加桂亦振止脉和而愈

陽明證汗渴

治汗後脉洪大而煩渴宜用白虎湯和

中外俱熱自汗煩渴亦宜此藥○汗下後表裏俱熱舌上乾燥而大渴脉洪大者參白虎湯主之○汗而不解脉浮者蒼朮白虎湯主之○無汗而渴者不可服○陽明證汗渴竹葉石膏湯最妙

陽明三證

陽明證上焦熱小便不利是乃三焦俱熱宜飲

熱邪從小便而出是用猪苓湯惟汗多而渴者不可服

陽明脾約證

數趺陽脉浮而瀦浮則胃氣強瀦則小便

丸主之一名脾約丸方觀默便



陽明病禁忌

陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃氣虛冷故也。傷寒嘔多雖有陽明

證不可攻也。○胃家實不大便若表未解及有半表者先用桂枝柴胡和解之乃可下也。○陽明病自汗出小便自利者此為津液內竭大便雖鞭不可攻之宜用蜜導法通之。○陽明病口燥但欲漱水不欲嚥此必衄不可下宜用犀角地黄湯。

葛根解肌湯

治陽明經病目疼鼻乾不得卧宜解肌

並桔梗各一錢甘草五分右剉作一貼八薑三棗二水煎服。○一名柴葛解肌湯。

白虎湯

治陽明病汗多煩渴脉洪大石膏五錢知母二錢甘草七分粳米半合右剉作一貼水煎

服。○本方加蒼朮一錢名曰蒼朮白虎湯。○本方加人參一錢名曰人參白虎湯。

猪苓湯

治陽明證小便不利汗少脉浮而渴赤茯苓猪苓阿膠澤瀉滑石各一錢右四味剉水煎

臨熟入阿膠煎烱溫服。

少陽之爲病口苦舌乾者屬少陽咽乾○目眩滿乾○嘔往

來寒熱者屬少陽。少陽病也。○少陽病也。○口苦耳聾，胸脇痛，耳鳴，尺寸脈俱弦者，少陽受病也。○少陽受病也。○胸脇痛，寒熱，嘔而口苦，宜從中治。俱宜小柴胡湯。

少陽居太陽陽明之中半表半裏也禁汗恐犯太陽禁下恐犯

陽明禁利小便恐生發之氣陷入陰中故只用小柴胡湯和之門外少陽以脅之間爲半表半裏表多則小柴胡湯裏多則黃芩湯已上發熱太陽惡寒陽明自汗少陽多嘔皆三陽證也門外

傷寒脉弦細頭痛發汗則譫語仲景

血氣虛媵理開邪氣因入與正氣
相搏結於脇下邪正分爭往來寒

而熱休作無時不飲
嘔宜用小柴胡湯
食

少陽病壞證

太陽病不解轉入少陽者脇下硬滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沉緊

者與小柴胡證罷此為壞病依壞法治之

少陽病脇痛

少陽證熱熱汗出頭痛心下痞硬滿引脇下痛乾嘔短氣不惡寒此表解裏未

和也宜十棗湯若合下不下則令人脹滿遍身浮腫也

○杜壬曰裏未和者蓋痰與燥氣壅於中焦故頭痛乾嘔短氣汗出是痰隔也非十棗湯不治

小柴胡湯

治少陽病半表半裏往來寒熱能和其內熱解其外邪傷寒方之王道也柴胡三錢

黃芩二錢人參半夏各一錢甘草五分右剉作一貼八薑三棗二水煎服

○一錢一名三禁湯以其禁發汗禁利小便禁利大便故只用此藥乃和解之劑也

○專治少陽半表裏證及汗下後不解過經不解時氣瘟疫熱入血室等證其間有五證尤為不當傷寒五六日心煩喜嘔者一也寒熱往來

者二也耳聾脅痞者三也發潮熱者四也差後發熱者五也此五證尤為可服

黃芩湯

治少陽半表半裏證多者宜用此○一名黃芩芍藥湯方觀

十棗湯

治傷寒有懸飲伏飲脇下引痛芫花微炒甘遂大戟炒右等分爲末別取大棗十枚水一

盞煎至半盞去藥調藥末強人一錢弱人半錢服大便利下水以粥補之○河間曰芫花之辛以散飲二物之苦以泄水甘遂直達水氣所結之處乃泄水之聖藥然有毒不可輕用暄

太陰形證用藥

甚太陰之時腹自痛○太陰而吐食不下自利益

身目黃脾爲本故腹滿痛宜大柴胡湯防見身黃者茵陳蒿湯如自利不渴爲瘧宜理中湯九身黃

理○太陰證腹痛自利不渴宜理中湯時痛吐利不渴者爲

太陰宜四逆湯防見理中湯腹滿時痛復如故此虛寒

從下而上也當以溫藥和之宜理中湯○飲食

治中湯○傷寒自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜用四逆湯

太陰病腹痛

傷寒陽脉濡弱不弦法當腹中急痛先

桂枝湯加芍藥主之凡言加者謂倍入也大便秘實痛者桂枝湯加芍藥主之凡言加者謂倍入也大便秘實

太陰病腹脹滿

太陰證下利清穀若發汗則必脹滿

湯

太陰病發黃

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利

但頭汗出餘無汗劑頸而還小便不利發黃

何以不發黃答曰白虎證也頭面汗出頸以下無汗發

黃證也

理中湯

治太陰腹痛自利不渴人參白朮乾薑炮各

理中丸

治同上以理中湯材作末蜜丸

四順理中湯

治腹痛一倍是也一名四順湯倍甘

四順理中丸

即理中湯倍甘草一倍為末蜜和

治中湯

治太陰腹痛即理中湯

厚朴半夏湯

治傷寒發汗後腹脹滿厚朴三錢人參

貼入生薑七片水煎服

茵陳蒿湯

治太陰證發黃茵陳蒿一兩大黃五錢施

味煎又減半去滓溫服日二小便便當利色正赤腹漸減黃從小便去也

少陰形證用藥

少陰之為病脉微細但欲寐蓋氣寤則

利但欲寐也○少陰心為本故舌乾口燥或下



青四肢厥冷指甲青黑宜薑附湯○少陰病始

得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯主之○

少陰病二三日無證故微發汗也用麻黃附子甘草湯微發之○

三日無證故微發汗也無證謂無吐利厥證也○

湯○少陰病一二日口中和背惡寒當灸之宜附子

湯主之○少陰病身重體痛手足寒骨節痛脉沉

者附子湯主之○少陰病身重體痛手足寒骨節痛脉沉

五六日自利而渴者屬少陰也○虛故引水自救若

小便色白者以下焦有寒不能制水故色白宜四

逆湯○下痢清穀必鬱胃脉沉而遲其人面少赤身有微汗

少陰病脉沉

而少陰證口燥舌乾而渴尺寸脉俱沉

口乾燥者

當下燥者

枝湯主之○少陰病吐利手足厥冷煩燥欲死吳茱

萸湯主之○少陰病下利便血者桃花湯主之○

者其面戴陽下虛故也○下利腹脹滿身體疼

痛先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯○

者其面戴陽下虛故也○下利腹脹滿身體疼

痛先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯○

者其面戴陽下虛故也○下利腹脹滿身體疼

痛先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯○

少陰病脉絕

少陰病下利脉絕或無脉者宜通脉逆

脉微欲絕身反不惡寒吐下後汗出而厥四肢拘急

不鮮脉微欲絕通脉四逆湯加猪膽汁下之

少陰病下利脉微與白通湯利不止

少陰病自利

藥傷寒下利心下痞硬服湯利益甚理中

者理中焦此利在下焦赤石脂湯主之

至四五日腹滿痛小便便利或有熱故也宜白頭翁湯

湯主之少陰病熱利不止三黃熟艾湯及薤白湯主

大承氣湯主之少陰病自利純青水心下痛口燥乾者宜

少陰四逆證有二

少陰病四逆或咳或悸或小便不利或泄利下重宜四逆



散○邪熱入深則手足漸冷此熱厥似陰之證宜服四逆散○傷寒直中陰經初來無頭痛無身熱無渴怕寒踈卧沉重欲眠唇青厥冷脉微而欲絕或脉伏宜四逆湯四逆者四肢逆冷也

少陰病伏氣咽痛

氣伏於少陰經謂非時有暴寒中人伏

脉更微弱先發咽痛似傷寒非喉痺之病必下痢宜服半夏桂枝湯助便差古方謂之腎傷寒人

○少陰下利咽痛可與甘草湯不差與桔梗湯○少陰病二三日咽痛可與甘草湯不差與桔梗湯

○少陰病咽中痛宜半夏散

少陰病禁忌

○少陰病脉細沉數病為在裏不可發汗

其血未知從何道來或從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治也

薑附湯

治傷寒陰證及中寒乾薑炮一兩附子炮一

白通湯

麻黃附子細辛湯

治少陰病但欲寐發熱脈沉麻黃

一貼水煎服。傷寒無熱惡寒者陰經病也。今少陰病始得當無熱而反發熱但頭不痛為異。乃

邪在表也。脈雖沉尤宜溫劑發汗之。

麻黃附子甘草湯

治少陰病無吐利厥逆宜用此微發汗也。即麻黃附子細辛湯。

去細辛加甘草二錢也。

附子湯

治少陰病脈沉手足寒骨節痛又治口中和背惡寒白朮四錢茯苓芍藥各三錢附子炮

人參各二錢右剉分二貼水煎溫服。

黃連阿膠湯

治少陰病欲寐二三日後煩心不得眠。黃連阿膠芍藥各二錢黃芩一錢雞

子一箇右剉作一貼水煎至半去滓。乃納膠再一沸。又絞雞子黃攪勻服。日三服。一名黃連雞子

湯。

四逆湯

治傷寒陰證要藥也凡三陰脈遲身痛並用

子生一枝右剉分二貼水煎服

通脉四逆湯

治少陰病下利四逆厥冷脉微欲絕或

錢右剉作一貼水煎服○脉絕者通脉四逆湯煎水和猪膽汁半枝溫服

逆湯入葱白三莖同煎服

白通湯

治少陰病下利脉微乾薑三錢附子生半箇葱白三莖右剉水煎服

逆脉不至煩躁白通湯煎水和童尿一合猪膽汁半枝服之

赤石脂禹餘糧湯

治少陰證下利不止當治下焦宜用此赤石脂禹餘糧各二錢半右

剉碎水煎服

桃花湯

治少陰病下利便膿血赤石脂五錢半生半炒乾薑二錢糯米一合右剉水煎至半去渣

一別入赤石脂細末
錢調服日二

真武湯

治少陰病腹滿痛小便不利或下利或嘔茯苓芍藥附子炮各三錢白朮二錢右剉作一貼

入薑五片水煎服。○古名玄武湯後世避諱改為真武湯

白頭翁湯

治少陰病下利欲飲水以有熱故也宜用此白頭翁黃柏秦皮黃連各一錢半右剉

作一貼水煎服且治挾熱下利後重而渴

三黃熟艾湯

治傷寒大下熱利不止黃芩黃連黃柏熟艾各一錢半右剉作一貼水煎服

薤白湯

治傷寒下利如爛肉汁赤帶下伏氣腹痛二錢半合綿裹薤白一握梔子七枚右剉水煎服

升半先煎梔子十沸下薤白煎至二升入豉煎至一升二合分二服

四逆散

治傷寒病手足自熱而至溫從溫而至厥乃傳經之邪也宜用此柴胡芍藥枳實甘草炙

各等分右為末每二錢淡米飲調服日二

猪膚湯

治少陰客熱咽痛猪膚一兩水一盞煎至五分入白蜜一合白粉半合熬香熟和勻服之

熱白蜜以潤燥除煩白粉益氣斷利

甘草湯

治少陰客熱咽痛甘草剉

桔梗湯

治少陰寒熱相搏咽痛甘草三錢

半夏散

治少陰客寒咽痛半夏剉水煎服

厥陰形證用藥

厥陰心包絡為標故舌卷厥逆冷過肘膝小腹絞痛三味參芩湯四順湯主之

肝為本故男則囊縮女則乳縮手足乍冷乍溫煩滿者大承氣湯主之

衝心心中疼熱飢不欲食食則吐衄傷寒六七日煩滿囊縮其脉尺寸俱微緩者足厥陰肝經

受病也其脉微浮為欲愈不浮為難愈脉浮緩者必囊不縮外證必發熱惡寒似瘧為欲愈宜桂枝

麻黃各半湯功見若尺寸俱沉短者必是囊縮毒氣入腹宜承氣湯下之

變陽經先受病故次傳入陰經以陽主生故太陽
水傳足陽明土土傳足少陽木為微邪也陰主殺
故木傳足太陰土土傳足少陰水水傳足厥陰木
至六七日當傳厥陰肝木必移氣剋於脾土脾再
受邪則五藏六府皆因而危殆榮衛不通耳聾囊
縮不知人而死速用承氣湯下之可保五生一死
人語。若第六七日傳厥陰脈邪無所容否極泰來榮
脈也故知脾氣全不受剋邪無所容否極泰來榮
衛將復水升火降則寒
熱作而大汗解矣人語

厥陰病手足厥冷

凡厥者手足陰陽氣不相順接便為厥

之手足便厥冷不溫者是陰經受邪可用四逆湯
溫之若手足自熱而至溫從四逆而至厥者傳經
之邪也可用四逆散防壅遏必煩識此勿令誤也
○諸手足逆冷皆屬厥陰不可汗下然有須汗須
下者謂手足雖逆冷時有溫時手足
掌心必煖非正厥逆當消息之候

厥陰病煩滿囊縮

厥陰微證手足厥冷小腹痛煩滿囊
縮脈微欲絕宜當歸四逆湯



傷寒六七日尺寸脉微緩者厥陰受病也其證小腹煩滿而囊縮宜用承氣湯下之

三味參萸湯

治厥陰證乾嘔吐涎沫頭痛及少陰證厥冷煩躁欲死陽明食穀欲嘔者皆妙

吳茱萸三錢人參二錢生薑四片大棗二枚右剉水煎溫服

當歸四逆湯

治厥陰證手足厥冷脉微欲絕當歸白芍藥各二錢桂枝一錢半細辛通草甘

草各一錢右剉作一貼入棗二枚水煎服

傷寒陽證

凡仲景稱太陽病者皆表證發熱惡寒頭項痛也若脉大則與證相應宜發汗若脉反微

不與證相應則不可發汗但用一二各半湯和之可也

而無身熱若身熱而又頭痛屬陽證無疑矣

此為表寒裏熱屬陽證宜陽旦湯

冬月麻黃湯桂枝湯虛者人參順氣散

羌活冲和湯

散芎芷香蘇散

人參羌活散

陽證頭痛身熱脉浮

蘇飲十神湯

飮

陽旦湯

治傷寒陽證身大熱反不欲近衣桂枝芍藥各三錢黃芩二錢甘草一錢右剉作一貼入

薑三片棗二枚水煎服

傷寒陰證

凡傷寒四肢厥冷吐利不渴靜謐此陰證之

脈便是不可伏陰急與五積散加附子如脈有力是陽證也

傷寒微者寒邪外襲漸入經絡宜麻黃附子細辛湯或辛黃三白湯甚者卒中陰經初起無頭痛

身熱便惡寒厥冷或胃腹痛嘔吐下利太陰用附子理中湯少陰用附子湯厥陰用當歸四逆湯

傷寒有口沃白沫或唾多流冷涎俱是寒證宜吳茱萸湯理中湯切忌冷藥

旦湯入參養胃湯藿香正氣散不換金正氣散正陽散○陰證似陽面赤而脈微

五積散

治感傷風寒頭痛身疼四肢逆冷胃腹作痛嘔吐泄瀉或內傷生冷外感風冷並主之



蒼朮二錢 麻黃陳皮各一錢 厚朴桔梗枳殼當歸
乾薑白芍藥白茯苓各八分 白芷川芎半夏桂皮

各七分 甘草六分 右剉作一貼 入薑三片 葱白三
莖 水煎服 服一 方除白芷肉桂餘材慢火炒令

色變攤冷入桂並名曰熟料五積散 不炒者名曰生料五積散

辛黃三白湯 治陰證傷寒在表經者 人參白朮白芍
藥各二錢 白茯苓當歸各一錢 細辛麻

黃各五分 右剉作一貼 入薑三片 棗二枚 水煎服

陰旦湯 治陰證傷寒身大熱欲近衣 此為內寒外熱
也 桂枝二錢 黃芩乾薑各一錢 半芍藥甘草

各一錢 右剉作一貼 入棗二枚 水煎服

人參養胃湯 治傷寒陰證及外傷風寒內傷生冷增
寒壯熱頭痛身疼 蒼朮一錢 半陳皮厚

朴半夏製各一錢 二分 茯苓霍香各一錢 人參
草果甘草炙各五分 右剉作一貼 入薑三片 棗二

枚 烏梅一箇 水煎服 令微汗 澱然自然
解散 若有餘熱 以參蘇飲欸調之

藿香正氣散

治傷寒陰證頭痛身疼如不分表裏證以此導引經絡不致變動藿香一錢半

紫蘇葉一錢白芷大腹皮白茯苓厚朴白朮陳皮半夏製桔梗甘草炙各五分右剉作一貼入薑三

片棗二枚水煎服

不換金正氣散

治傷寒陰證頭痛身疼或寒熱往來蒼朮二錢厚朴陳皮藿香半夏甘草

各一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

正陽散

治陰證傷寒麻黃一錢半陳皮大黃生乾薑肉桂芍藥附子炮半夏製甘草炙各七分吳

茱萸五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服取汗轉

傷寒表證

凡傷寒初得病二三日頭痛身體痛惡寒發熱皆表證也○凡仲景稱太陽病者皆表

證發熱惡寒頭項痛也○發熱惡寒身痛而脈浮者表證也表證者惡寒是也惡寒屬太陽宜汗之○項強凡為太陽表證凡音殊如短羽鳥不能飛騰動先伸引其頭也項背強者動亦如

之一云無翅鳥欲飛貌。傷寒表證通用麻黃杏仁飲寒傷榮宜麻黃湯。傷衛宜桂枝湯。三時發表宜九味羌活湯。○表證宜香蘇散。十神湯。人參敗毒散。香葛湯。葱白散。參蘇飲。芎芷香蘇散。小青龙湯有神。木散消風。風百解。○表證無汗宜羌活冲和湯。有汗宜防風冲和湯。防見表裏不解宜

雙解散

麻黃杏仁飲

治傷寒太陽經發熱惡寒頭痛無汗。脉各一錢。杏仁細辛各八分。防風七分。甘草四分。右剉作一貼。入生薑三片。水煎服。門

香蘇散

治四時傷寒頭痛身疼發熱惡寒及傷風傷濕傷寒時氣瘟疫香附子紫蘇葉各二錢。蒼朮一錢半。陳皮一錢。甘草炙五分。右剉作一貼。入薑三片。葱白二莖。水煎服。門

芎芷香蘇散

治傷寒傷風表證頭項強百節痛陰陽未分皆可服。香附子紫蘇葉各二錢。蒼朮一錢半。陳皮一錢。甘草炙五分。右剉作一貼。入薑三片。棗二枚。水煎服。門

十神湯

治兩感風寒頭痛寒熱無汗香附子紫蘇葉升麻赤芍藥麻黃陳皮川芎乾葛白芷甘草

各一錢右剉作一貼入薑三片葱白二莖水煎服

人參敗毒散

治傷寒時氣發熱頭痛項強肢體煩疼及傷風咳嗽鼻塞聲重羌活獨活柴胡

前胡枳殼桔梗川芎赤茯苓人參甘草各一錢右剉作一貼入薑三片薄荷少許水煎服

加天麻地骨皮等分名曰人參羌活散。加荊芥穗防風等分名曰荊防敗毒散。

香葛湯

治傷寒不問陰陽兩感頭痛寒熱蒼朮紫蘇葉白芍藥香附子升麻乾葛陳皮各一錢川

芎白芷甘草各五分右剉作一貼入薑三片葱白二莖豉七粒水煎服

葱白散

治四時傷寒傷風頭痛體熱煩渴麻黃二錢蒼朮白朮川芎各一錢半石膏乾葛甘草各

七分半右剉作一貼入薑三片葱白二莖水煎服

參蘇飲

治感冒風寒頭痛發熱咳嗽及內因七情痰盛胸滿潮熱入參紫蘇葉前胡半夏乾葛赤

茯苓各一錢 陳皮 桔梗 枳殼 甘草 各七分半
右剉作一貼 入薑三片 棗二枚 水煎服 湯

小青龍湯 治傷寒表不解 因心下有水氣 乾嘔 氣逆 發熱 咳喘 麻黃芍藥 五味子 半夏 製各一

錢半 細辛 乾薑 桂枝 甘草 炙各一錢 右剉作一貼 水煎服 服此渴者 裏氣溫水 欲散也 甞

神木散 治傷寒傷風 頭痛 體疼 惡寒 無汗 蒼朮 二錢 荊芥 葉本 乾葛 麻黃 甘草 炙各一錢 右剉作

一貼 入薑三片 葱白 二莖 水煎服 驗

消風百解散 治感冒風寒 頭痛 身疼 鼻塞 聲重 荊芥 蒼朮 白芷 陳皮 麻黃 各一錢 甘草 五分

右剉作一貼 入薑三片 葱白 二莖 水煎服 驗

雙解散 治傷寒表裏不解 滑石 三錢 甘草 一錢 石膏 黃芩 桔梗 各七分 防風 川芎 當歸 赤芍 藥大

黃麻 黃薄荷 連翹 芒硝 荊芥 白朮 梔子 各五分 右剉作一貼 入薑三片 葱白 三莖 豉 半合 同煎服 此

方乃益元散 與防風通聖散 合劑也 益元散 通裏通聖散 發表兩得其宜也 間

傷寒裏證

傷寒裏熱者若火熏蒸自內達表惟下之陽

明裏證也宜下之○陽明為病胃家實也胃實則潮熱譫語承氣湯下之○陽明病潮熱不大便

六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯轉屎氣者有燥屎可攻若不轉屎氣者無燥屎慎不可

攻也若攻之必脹滿不能食○發熱汗出不惡寒反惡熱者屬裏即陽明證也發汗後不惡寒但

惡熱者胃實也宜調胃承氣湯○大柴胡三承氣攻熱邪傳裏○下藥大承氣最緊小承氣次

之調胃承氣又次之○大柴胡湯又次之○如不惡寒反惡熱發渴譫語腹滿而喘手足濇然汗出不

急下之宜大承氣湯如邪未深恐有燥屎小腹痛宜用小承氣微和胃氣勿令大泄如不惡寒但實

者當和胃氣調胃承氣主之○已上三法不可差差則無者生之有者遺之○假令調胃承氣證不可

大承氣則愈後元氣不復以其氣藥犯之若大承氣證用調胃承氣則愈後神爽不清以其無氣藥

也小承氣湯證用大承氣則下利不止變而成虛後人合三藥為一方號為三一承氣殊失仲景本



意綱○裏證宜下通用三一承氣湯六一順氣湯陶氏黃龍湯

小承氣湯

治傷寒裏證小熱小實小滿宜緩下者用此大黃四錢厚朴枳實各一錢半右坐作

煎一貼水服

大承氣湯

治傷寒裏證大熱大實大滿宜急下者用此大黃四錢厚朴枳實芒硝各二錢右坐

作一貼水二大盞先煎枳朴煎至一盞乃下大黃煎至七分去渣入硝再一沸溫服

調胃承氣湯

治傷寒裏證大便硬小便秘赤譫語潮熱此大黃四錢芒硝二錢甘草一錢右剉作

一貼先煎大黃甘草至半去渣入芒硝再一沸溫服

者痞滿燥實堅俱全是用大承氣大黃滌熱枳實瀉實厚朴消痞芒硝潤燥軟堅若上焦傷者有痞

滿實而無燥堅是用小承氣厚朴消痞枳實瀉實大黃滌熱若中焦傷者無痞滿而有燥實堅是用

調胃承氣大黃滌熱芒硝潤燥軟堅甘草和中而已

燥調胃承氣大黃滌熱芒硝潤

大柴胡湯

治傷寒病少陽轉屬陽明身熱不惡寒反惡熱大便堅小便赤譫語腹脹潮熱柴胡

四錢黃芩芍藥各二錢半大黃二錢枳實一錢半半夏一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

傳○小柴胡去人參甘草加芍藥大黃枳實也以下痞悶也

以枳實去心

三一承氣湯

治傷寒雜病入裏之深大小便不通者

半右剉作一貼入薑三片煎至半去渣入芒硝再一沸溫服

六一順氣湯

治傷寒熱邪傳裏大便秘結實口燥咽乾

代大小調胃三一承氣大柴胡大陷胃等湯之神方也大黃二錢枳實厚朴芒硝柴胡黃芩芍藥甘草

草各一錢右剉作一貼入薑三片煎至半去滓入鐵銹水三匙調服

陶氏黃龍湯

治熱邪傳裏胃中燥糞結實心下硬痛

厚朴各一錢人參當歸甘草各五分右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎溫服

傷寒半表半裏證身上表裏極難識有言太陽陽明之前後者有言

後為太陽身前為陽明少陽居少陽之半表裏也

身之前後而言也小柴胡湯主少陽之半表裏也

來寒熱五苓散分利膀胱之半表裏也

吐瀉不定上下之半表裏也

汗裏證當汗又發熱煩渴小便赤却當下此表裏俱

見雙解散主之○假令不大便六七日頭痛身

熱是裏證又小便清知不在裏因在表須當發汗

此兩證俱見宜桂枝湯○假令心下滿口不欲

食大便硬脉沉數是裏證當下又頭汗出微惡寒

手足冷却當汗此半在表半在裏也小柴胡湯主

之○治表裏內外俱熱之證表者或脉浮或頭

痛或惡風或惡寒裏者或譫言妄語或揚手擲足

欲汗則裏證已急欲下則表證尚存通宜大柴胡

傷寒陰厥

之厥者手足逆冷是也其手足指頭微寒者謂

湯上工且傷寒須分表裏若表裏不分汗下差誤豈
為上加桂枝主之厥而脈滑為裏有熱白虎湯加人
參主之○均是水氣乾嘔微利發熱而咳為表有
水小青龙湯主之○身涼表證罷咳而脇下痛為裏
有水土十棗湯主之○均是惡寒有熱而惡寒者發
於陽也麻黃桂枝小柴胡主之○均無熱而惡寒者發
於陰也附子湯四逆湯主之○均是身熱而惡寒者發
發熱頭痛身體痛者為裏不和四逆湯主之○脈
沉自利身體痛者為裏不和四逆湯主之○脈

逆冷脈沉微而不利清穀或多瀉臥時惡寒或引衣自
覆不飲水或下利清穀或多瀉臥時惡寒或引衣自
而靜宜四逆湯通脈四逆湯當歸四逆湯○陰
厥者無頭痛無身熱吐利不渴靜蹠而卧手足盡
冷乃厥陰所主陰陽之氣不相接連而然太陰厥
手足指頭微冷者理中湯少陰厥脛寒足冷甚則
手至臂足至膝者四逆湯厥陰厥一身盡冷者當
歸四逆湯厥逆煩燥者不治門○小便數微惡寒



者陽氣不足也。心煩足蹇者，陰氣不足也。陽證四肢厥冷，脈沉遲，按之無力，則為陰。當溫之。陰證四肢厥冷，脈沉遲，按之無力，則為陰。當溫之。

傷寒陽厥

陽厥者，初得病，必身熱，頭痛，身熱，蓋熱氣深，至四

能發厥者，若微厥，却發熱者，熱深故也。其脈雖伏，按

之滑者，為裏熱。或飲水，或揚手擲足，或煩燥，不得

眠，大便秘，小便赤，外證悉具，而見四逆者，是因失下，湯隨

證用之。磁石，下證悉具，而見四逆者，是因失下，湯隨

氣不通，四肢便厥，醫不識，疑為陰厥。便進熱藥，禍

如反掌。大抵熱厥須脈沉伏，而滑者，手雖冷，時復

指爪溫，須承氣湯下之。人始為陽陰證，四肢逆冷，爪

甲青，脈沉疾，按之有力，則為陽。當下之，宜大承氣。爪

齒。陽厥者，未厥前，有頭痛，有身熱，陽邪深入，陷

伏於內，而後發厥。微厥，半日，間却又發熱，熱氣入

行，則腹痛，下利，或便膿血，若不便，血則熱氣上行

必為喉痺。○傷寒邪在三陽，則四肢熱，半表裏

及太陰，則邪漸入內，故四肢厥冷。然先由熱後厥，陰邪入

深而陷，伏於內，則四肢厥冷。然先由熱後厥，陰邪入

經熟厥也輕則四逆散重則大柴胡承氣湯下之
門○熟厥脉沉伏而滑頤上有汗手掌溫指梢亦

溫便宜
下門

陰陽厥輕重

傷寒至四五日而厥者必發熱前熱者

○傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進
厥多熱少陽氣退故為進也○傷寒發熱四日

反三日厥少熱多其病當自愈○傷寒病厥
五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥終

不過五日以熱五日故知自愈○熟
多厥少者易愈厥多熱少者難已○熟

辨陰陽厥法

陰陽二厥脉皆沉所以使人疑之然陰
厥脉沉遲而弱陽厥脉沉伏而消又陽

厥指爪時一溫陰厥常冷○若未辨陰陽且
與理中湯試之陽厥則便熱陰厥則不熱

厥有藏厥蚘厥

者發無暫定而厥者為藏厥○藏厥
者發躁無休息時且發熱七八日脉

微膚冷而躁或吐或瀉無時暫安者乃厥陰真藏
氣盡故曰藏厥仲景無治法四逆湯冷飲救之又

少陰厥而吐利發躁亦不治三味參黃湯救之
厥。靜而復煩吐蛔而厥者為蛇厥。蟬視人

厥與四逆不同

也。四逆者四肢不溫也。厥者手足必熱傳到

太陰手足自溫至少陰則邪熱潮深故四肢逆而
不溫及至厥陰則手足厥冷是又甚於逆其四逆
散涼藥以治四肢不溫其四逆湯熱藥以治寒極
而成逆厥者也。四肢通冷比之手足獨冷則有間
夫逆者以四逆言之可治者以厥冷言則亦可見
四逆與手足厥冷之有輕重淺深矣。蓋四肢通冷
其病為重手足獨冷其病為輕也。四肢與手足却
有所分以四字加於逆字之上是通指手足臂脛
以上言也以手足二字加於厥逆厥冷之上是獨
指手足言也。蓋以四逆為四肢通冷厥為手足獨
冷也。

傷寒陰毒

傷寒三陰病深必變為陰毒其證四肢厥冷

痛頭汗汗眼睛內痛不欲見光面唇指甲青黑手背
冷汗心下結硬臍腹等痛身如被杖外腎冰冷其

氣脈乍復或生煩躁者返陰丹復陽丹用之不可涼陽
藥門○又此證面青舌黑四肢厥冷多睡○積
陰感於下則微陽消於上故其候四肢沉重逆冷
腹痛咽喉不利或心下脹滿結硬燥渴虛汗不止
或時狂言爪甲面色青黑六脉沉細而一息七至
以效仍服還陽散元各灸二三百壯以手足溫煖
為效仍服還陽散退陰散○陰毒沉困之候六
脉附骨取之方有按之即無一息八至已上或不
可數至此則藥餌難為功矣宜灸臍下二三百壯
更以還陽散等熱藥助之如手足不和煖者不可
治○傷寒陰毒之病面青身痛如被杖咽喉痛
五日可治七日不可治甘草湯主之○陰毒宜
用正陽散附子散白朮散回陽救急湯熨臍法○
一人傷寒四肢逆冷臍下築痛身疼如被杖蓋陰
毒也急服金液丹來復丹助等藥其脉遂沉而
滑證雖陰而有陽脉可生仍灸臍下
百壯乃手足溫陽回得汗而解○

正陽散

治傷寒陰毒證附子炮一兩乾薑炮甘草灸
冬二錢半皂角一挺麝香一錢右為末每二

錢水一盃煎至五分和渣
熱服一方用白湯調下

甘草湯

治陰毒甘草炙升麻當歸桂枝各一錢雄黃
水煎服毒從汗出未汗再服

一名升麻鱉甲湯

破陰丹

治陰毒脉伏及陽脫無脉厥冷不省硫黃五
兩硝石太陰玄精石各二兩乾薑附子桂心

各五錢為末用鐵鉚先鋪玄精粉鋪硝石各一半
中間鋪硫黃末又布硝石玄精粉末蓋上以小

合着上用炭三斤燒令得所多令烟出急取瓦盆合
着地上候冷取出入餘藥同為末糊丸梧子大艾

湯下三十九
汗出為度

復陽丹

治陰毒面青肢冷脉沉萼澄茹木香吳茱萸
全蝎附子炮硫黃各五錢乾薑一錢右為末

酒糊和丸梧子大薑湯下三
十九復以熱酒投之取汗

還陽散

治陰毒面青肢冷心躁腹痛硫黃為末每二
錢新汲水調下良久或寒一起再服

汗出而差轉

退陰散

治傷寒陰毒川烏乾薑等分右為粗末炒
轉色放冷再為細末每一錢鹽一捻水少許

同煎溫服轉

附子散

治傷寒陰毒附子炮二錢半桂心當歸白朮
各二錢半夏製乾薑炮各一錢右剉作一貼

入薑三片水煎服

白朮散

治傷寒陰毒四肢逆冷心胃煩躁川烏炮桔
梗白朮附子炮細辛各五錢乾薑炮二錢半

右為末每二錢水煎服

迴陽救急湯

治傷寒陰證及陰毒四肢厥冷脉沉細
唇青面黑入參白朮白茯苓陳皮半夏

乾薑炮肉桂附子炮五味子甘草炙各一錢
右剉作一貼入薑七片水煎服

熨臍法

治陰毒危急體冷無脉氣息欲絕或不省人
事大蔥白把切去葉扎餅二三寸許連作四

五餅先將麝香硫黃各一字填臍內放蔥餅於臍上以熨斗火熨之如餅爛再換新餅又熨之以蔥氣入腹為效手足溫有汗即差更服四逆湯以其內如熨後手足指尚冷甲下肉黑者死○又溫法醃醋拌麤皮炒熨納布袋中蒸熱熨之尤速效

傷寒陽毒

或傷寒三陽病深必變為陽毒或有失於汗下

面赤眼紅身發斑黃或下利黃赤六脉洪大青

黛飲方觀數部○陽毒為病面赤斑斑如錦紋咽

喉痛唾膿血五日可治七日不可治宜陽毒升麻

湯陽毒梔子湯葛根湯外用水漬法○傷寒先

黑奴丸

治陽毒發斑煩躁大渴脉洪數麻黃大黃各

二兩黃芩釜底煤芒硝竈埃墨梁上塵小麥

奴各一兩右為末蜜丸彈子大每一丸新汲水化

服須臾振寒汗出而解未汗再服○陽毒久壞

傷寒醫所不治精魂已竭心下尚煖幹開其口灌藥下咽即活若不火渴不可與此藥

三黃石膏湯

治陽毒發斑身黃眼赤狂叫欲走謔語六脉洪大石膏三錢黃芩黃連黃栢山

掩仁各一錢半麻黃一錢香豉半合右坐作一貼入薑三片細茶一撮水煎服

陽毒升麻湯

治傷寒陽毒面赤狂言或見鬼脉浮大數黃芩二錢升麻射干人參各一錢犀

角一錢半甘草七分右剉作一貼水煎服出汗則解

陽毒梔子湯

治陽毒石膏二錢升麻黃芩杏仁柴胡各一錢梔子赤芍藥知母大青各七分

甘草五分右剉作一貼入薑五片豉百粒同煎服

葛根湯

治陽毒葛根二錢黃芩大黃醋炒梔子朴硝甘草各一錢半右剉作一貼水煎服

三黃巨勝湯

治陽毒發狂極甚姑以劫之即前三黃石膏湯去麻黃豆豉加芒硝大黃入薑

一片棗二枚水煎臨熟入泥漿清水二匙調服

水漬法

治陽毒大熱發狂不能制伏青布五六尺疊

又搭之曰數十易為佳端○又法菴豆煮湯一鍋
稍溫用青布數十重蘸湯搭於胃膈冷則再蘸湯搭
之日數十易被蓋覆得汗而愈蓋
菴豆青布性涼能退熱故也

陰盛隔陽

傷寒陰盛隔陽其証身冷反躁欲投井中唇
青面黑渴欲飲水復吐大便自利黑水六脉

沉細而疾或無脈○病人身冷脉沉細而疾煩躁
而不飲水者陰盛隔陽也○陰盛隔陽大虛證
也身熱而脉不鼓擊或身冷而欲坐井中欲漱水
而不入口非真熱也宜霹靂散迴陽返本湯○
一人患傷寒六脉沉伏不見深按至骨則若有力
頭疼身溫煩躁指末皆冷胃中滿惡心醫皆不識
許學士診之曰此陰中伏陽也仲景法中無此證
若用熱藥則為陰所隔不能導引真陽反生客熱
若用冷藥則真火愈消須用破散陰氣導達真火
之藥用破陰丹二百粒作一服冷鹽湯下不時煩
躁狂熱手足躁擾許曰俗所謂換陽也須臾稍定
略睡汗出身冷矣○若飲水者非此證也

陽盛拒陰

傷寒陽盛拒陰其證身體厥冷其脉滑數按

而身反盡寒宜三黃巨勝湯坊見

陰極似陽

陽邪不深不能至于厥逆陰邪不甚不能至

極則害之之義也陰證之極火浮於外發躁擾亂

狀若陽證然身雖煩躁而引衣自覆口雖燥渴而

漱水不下脉必沉細無力此陰極似陽也宜通脉

四逆湯

○脉煩極而反發厥乃陰所致言熱極則

反與陰盛發躁一

同必以四逆湯理中湯治之

陽極似陰

陽證之極熱伏於內故身涼四肢厥逆狀若

陰證但身雖冷而不欲近衣神雖昏而氣色

光潤脉必沉滑而有有力此陽極似陰也宜大柴胡

湯或白虎湯

○陰陽錯雜之證宜用從治法從

治者反治也熱藥冷飲冷藥熱飲或熱藥為君

而佐以涼藥或冷藥為君而佐以熱劑是也

霹靂散

治陰盛隔陽證附子一箇炮過以冷灰培半

時許取出切半箇細坐八臘茶一錢水一盞

煎至六分去渣入熟蜜半匙放冷服之須臾躁止得睡汗出差門○一方附子一枚燒存性冷灰培

為末入臘茶二錢分作二貼每取一貼水一盞蜜半匙同煎放冷服名曰黑龍散

迴陽返本湯

治陰盛陽附子炮乾薑炮人參陳皮麥門冬五味子甘草炙臘茶各一錢右

剉作一貼以清泥漿二盞同煎去滓入葱白七莖黃連和放冷服之取汗為效面赤者入葱白七莖黃連

少許同煎服

傷寒雜證

有頭痛身痛百節痛惡寒惡熱往來寒熱看面日舌色合病併病煩躁戰慄動悸動氣等

證

傷寒頭痛身疼百節痛

傷寒頭痛身疼腰疼以至牽連百骨節俱痛此太陽傷寒榮血

不利故也○傷寒頭痛知邪不在經也○太陽之證頭痛身熱脊強

○三陽之病有頭痛三陰無頭痛惟厥陰與督脉會於頭巔故有頭痛門○風寒入肌血脉凝滯所

以少身痛太陽身痛拘急而已少陽身痛必脇硬嘔
渴少陰身痛下利煩滿陰毒身痛宛如被杖門入

惡寒惡熱往來寒熱

傷寒之病邪之客於表者為寒邪與陽相爭則為熱矣邪在半表半裏外

者為熱邪與陰相爭則為熱矣邪在半表半裏外與陽爭而為寒內與陰爭而為熱是以往來寒熱

宜小柴胡湯和解之。病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發

於陰者六日愈以陽數七陰數六故也。發汗後惡寒陰微發熱寒多易愈熱多難愈。發汗後

病不解反惡寒者虛也。芍藥甘草湯主之。中則惡風者見風至則惡矣必居密室之內幃帳之中則

坦然自舒惡寒者則不待風而自寒雖身大熱而不欲去衣者是也活人云惡寒者不當風而自憎

寒惡風者當風而憎寒。○病入脉微而澁者其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛暑

欲着複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽氣微則惡寒陰弱則發熱也此由醫者過為汗令陽氣微

又大下令陰氣弱故欲着複衣冬月陽氣在表胃中虛冷陽氣內微不能勝冷故欲着複衣





煩熱陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身也。傷寒雖裏證悉具若有一毫惡寒者為表邪未盡須先解表乃攻裏也。入。發熱惡寒者傷寒也。近似傷寒者有五種脉浮而緊發熱惡寒者傷寒也。脉浮而澁發熱惡寒或寒或有痛處是欲作癰疽也。脉浮而滑發熱惡寒或頭眩嘔吐是風痰也。脉浮而弦發熱惡寒或欲思飲食此欲作瘧疾也。轉熱

芍藥甘草湯

治汗後惡寒桂枝二錢甘草炙一錢半芍藥白朮附子炮各一錢右剉作一貼

水煎服

傷寒看面目舌色

少陰病下利脉沉而遲其人面少赤必鬱冒汗出而解所以然者其面戴

陽下虛故也。辨。太陽病發汗不徹面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之。辨。面戴陽者面雖赤而不紅活乃下虛也。又曰陰盛者面赤而黯陽盛者面赤而光。辨。傷寒陰證無頭痛無身熱躁悶面赤飲水不得入口乃氣弱無根虛火炎上名曰戴陽證。陶氏益元湯主之。辨。欲愈之病目

皆黃眼胞忽陷定知亡。傷寒六七日若脈和
平其人大煩目重瞼內際皆黃者為欲解也。傷寒
傷寒目赤為陽毒目黃為黃疸。傷寒熱病目
不明謂神水已竭不能照物病已篤矣。急以六一
順氣湯下之。醫。○熱病在腎令人渴舌焦黃赤飲
水不止目無精光者死不治。○舌上白胎者邪
未入府屬半表半裏以小柴胡湯和解之。舌上黑
胎者熱已入胃調胃承氣湯下之。黑胎或生黃
芒刺者是腎水剋心火急以大承氣下之。此熱已
極也。醫。○治法取井水浸青布片子淨洗舌上後
以生薑片浸水時時刮舌黑胎自退。醫。時

陶氏益元湯

治傷寒戴陽證。甘草炙二錢。附子炮乾
薑治傷寒人參各一錢。五味子二錢。附子粒麥門

冬黃連知母各七分。熟艾三分。右坐作一貼。入生
薑五片。棗二枚。葱白三莖。水煎臨熟入童尿三匙。

去滓放冷
服之

傷寒合病

合病者一陽先病或一陽隨病或二陽同病
或三陽同病不傳者謂之合病。通。用羌活冲



和湯。三陽合病，頭痛，面垢，譫語，遺尿，中外俱熱，自汗，煩渴，或腹滿，身重，白虎湯主之。

傷寒併病

併者，催併逼迫之意。始初一經獨重，初證亦不

解罷通用羌活冲和湯

傷寒煩躁

煩乃心中懊憹欲吐之貌，躁則手足動也。臥不安，心中熱，則煩。腎熱則躁。為重。先煩而漸躁者，為陽證，不煩而便發躁者，為陰證。

腎主津液，血熱則躁，故用梔子以治肺。豆豉以潤腎，宜黃連、雞子湯、甘草、薑湯為藥。甘草湯以潤

煩躁者，懊憹不得眠也。懊憹者，鬱悶不舒之貌。煩者，氣也。火入於肺也。燥者，血也。火入於腎也。梔子

者，湯主之。神。煩者，身熱也。邪氣不為汗解，蒸於

經絡，鬱於肌表，故生熱。煩也。邪氣不為汗解，蒸於

腹滿，宜梔子厚朴湯。煩躁，示大便續臍痛發作

有時者，有燥屎也。宜下之。病人大便續臍痛發作，消穀微煩者，以病新差，人強與穀，脾胃氣尚弱，不能

升也

煩躁吉凶

內熱曰煩謂心中鬱煩也外熱曰躁謂氣

及先煩後躁者皆可治外熱為無根之火故但煩不躁

者謂先煩漸至躁也所謂躁煩者謂先發躁逆

復煩也從煩至躁為熱未有漸煩而躁者也先

躁後煩謂怵怵然更作躁悶此為陰盛備陽也雖

煩躁脚攣

傷寒脉浮自汗出小便數心煩微惡寒

乾煩躁吐逆作甘草乾薑湯與之以復其陽若厥

懊憹怫鬱

有人傷寒八九日身熱無汗時時譫語時

寒非痛終夜不得卧但心中無曉會處許學士診



氣湯下燥屎二十枚得利而解仲景云陽明病下
之心中懊憹微煩胃中有燥屎也又云小便不利
大便難時有微熱所以不得眠也胃中燥大便堅者
則卧不安此夜所以不得眠也胃中燥大便堅者
必譫語也非煩非躁也非寒
非痛所以心中懊憹也非寒

黃連雞子湯 治少陰病煩躁不得卧
即上黃連阿膠湯也

甘草乾薑湯 治煩躁吐逆而厥甘草灸四錢乾
薑炮二錢右剉作一貼水煎服

芍藥甘草湯 治煩躁見脚
攣急

梔子豉湯 傷寒汗下後虛煩不得眠刻者必反覆顛
倒心中懊憹此主之

虛煩也梔子七箇豉半合右剉水二盞先煎梔子
至一盞納豉再煎至七分去渣溫服得吐止未吐

再服梔子○若胃滿而嘔加生薑名曰梔子豉湯
○若胃中不和

懷者心鬱不舒也其證或因誤下正氣內
虛陽邪內陷結於其間重則為結胃也

梔子厚朴湯

治傷寒下後心煩腹滿卧起不安梔子一錢半厚朴三錢枳實二錢右剉作一

貼水煎服

傷寒戰慄

黃帝曰人之振寒者何氣使然岐伯曰寒氣客于皮膚陰氣盛陽氣虛故為振寒寒慄

○戰者身為之戰也○戰者心戰是也○正與邪爭則鼓慄而戰但虛而不至爭則心戰是也○振也戰之與振振振輕而戰重也○論○諸乘寒者則為厥薛胃不仁以胃無穀氣脾溢不通口急不能言戰而慄也○戰者身振而動○戰者心戰而惕○邪正相爭正氣勝則戰邪氣勝則慄○戰則病欲愈慄則病欲甚○戰屬陽故大汗以解不必藥也○慄屬陰所制故心寒足蹇鼓額厥冷便尿妄出不知人事宜理中四逆湯○若原係熱邪表證慄者羌活冲和湯裏證慄者大柴胡湯○有戰而汗解者太陽也有不戰而汗解者陽明也有不戰而解者少陽也○老人虛弱發戰而汗不行隨即昏悶者不治

治門



傷寒動悸

甚傷寒過多其人又手自冒心下悸欲得按

汗後臍下悸欲作奔豚宜茯苓桂枝甘草湯神昏者陶氏

升陽散火湯

桂枝甘草湯

治心悸欲得按桂枝四錢甘草

茯苓桂枝湯

治臍下悸欲作奔豚茯苓六錢桂枝四

以甘爛水二鍾先煮茯苓減二分

陶氏升陽散火湯

治撮空證此因肝熱乘肺元氣虛

冒心或撮空摸床人參當歸芍藥柴胡黃芩白朮

三片棗二枚入熟金同煎服

傷寒動氣

動氣者為等然動跳於腹者是也病

寒新邪與舊積相搏而痛等然跳動名曰動氣
大槩虛者理中湯去白朮加肉桂熱者宜柴胡桂

枝湯門○五積中惟臍下奔豚
衝心最急桂枝湯加桂一倍

動氣在右吐不可發汗發汗則衄而渴心苦煩飲水竭

咽燥鼻乾頭眩心悸

動氣在左宜不可發汗發汗則頭眩汗不可下筋惕肉瞤

內拘急食不下動氣更劇
身雖有熱卧則欲蹠

動氣在上不可發汗發汗則氣上衝正在熱煩身上甘

浮冷熱汗自泄
欲得水自灌

動氣在下不可發汗汗之則無汗心中大煩骨節苦

皮湯○不可下下之則腹脹滿卒
起頭眩食則下清穀心下痞

柴胡桂枝湯

治傷寒動氣等痛柴胡二錢桂枝黃芩

六分右剉作一貼入薑五片棗二枚水煎服

防風白朮牡蠣湯

治動氣誤發汗筋惕肉瞤防風牡

酒或米飲調下日二三服

甘李根湯

治動氣誤發汗氣上衝正在心端李根

一錢半夏甘草各五分右剉作一貼入薑三片水煎服

大橘皮湯

治動氣誤發汗心煩骨痛目暈吐食陳皮

作一貼入薑五片棗三枚水煎服

東醫寶鑑雜病篇卷之二