

# 東醫寶鑑

奎貴

7608

I

13

奎章閣圖書

部別

分類記號

圖書番號 貴1933

一部冊數 24

內別番號 13

서울대학교

# 東醫寶鑑

青

76111

1

3

張章閣圖書


館藏

1933

1933

1933

上海大學



雜病篇三

寒

下

暑

濕

燥

火



東醫寶鑑雜病篇卷之三




御醫忠勤貞亮扈聖功臣宗祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

寒下

傷寒煩渴

凡得病反能飲水此欲愈也。吐汗下後口乾

舌燥脉洪大人參白虎湯主之。吐汗下後五六日而渴欲飲水不能多者不當與之。何者以腹中熱尚少不能消故也。至七八日大渴欲飲水惟當少與之。常令不足勿極意也。言能飲一斗只與五升。若腹滿小便不利。若喘若噦者不可與之。若小渴咽乾者少少燕潤之。令胃氣和則愈。○渴欲飲水入即吐名曰水逆。五苓散主之。○厥陰病渴欲飲水者少少與之。愈。○熱入裏則渴耗奪津液而然也。然有渴必有煩者。腎主水。熱深則水竭而渴。肝木挾心火以生煩。故厥陰六七日飲水多而小便少者謂之消渴。渴欲水為欲愈者傳經已盡也。脉浮而渴屬太陽。宜白



東醫寶鑑雜病篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

寒下

傷寒煩渴

凡得病反能飲水此欲愈也。吐汗下後口乾

舌燥脉洪大人參白虎湯主之。○凡得病五六日而渴欲飲水不能多者不當與之。何者以腹中熱尚少不能消故也。至七八日大渴欲飲水惟當少與之。常令不足勿極意也。言能飲一斗只與五升若腹滿小便不利若喘若噦者不可與之。若小渴咽乾者少少燕潤之。令胃氣和則愈。○渴欲飲水入即吐名曰水逆。五苓散主之。○厥陰病渴欲飲水者少少與之愈。○熱入裏則渴耗奪津液而然也。然有渴必有煩者。腎主水熱深則水竭而渴。肝木挾心火以生煩故厥陰六七日飲水多而小便少者謂之消渴。渴欲水為欲愈者傳經已盡也。脉浮而渴屬太陽宜白

虎湯汗多而渴屬陽明宜竹葉石膏湯自利而渴屬少陰宜猪苓湯○凡渴欲飲水常令不足為

善經云若還不能飲非其治強飲須教別病生○渴欲飲水而不能飲者丹田有熱胃中有寒也

○陰盛陽之證口燥渴而漱水不○陰盛陽之證亦漱水不○陰盛陽之證亦漱水不

### 五苓散

治太陽證入裏煩渴而小便不利澤瀉二錢

為末每二錢白湯調下或剉作一貼水煎服○傷寒汗後亡津但渴欲飲水者邪在裏也然上焦虛躁或飲水不利者皆裏熱未實不能消水故爾五苓散而小便不利者皆裏熱未實不能消水故爾五苓散也

散藥也

### 竹葉石膏湯

治傷寒解後餘熱及陽明證自汗煩渴并差後虛煩等證石膏四錢人參二錢

麥門冬一錢半半夏一錢甘草七分剉作一貼入竹葉七片粳米百粒水煎入薑汁二匙服

### 傷寒潮熱

發指時而發者謂之潮其來不失時也一日一

即發熱非潮熱也陽明之潮熱屬陽明必於日晡時發者乃為潮熱也

○潮熱者似潮水之有信一日一發謂之潮必日晡而作陽明旺於未申故耳諸承氣湯選用下

之或潮於寅卯者屬少陽或潮於巳午者屬太陽為邪未入胃俱宜小柴胡湯和解之○吐下後

不大便潮熱若劇則不識人循衣摸床微喘直視脉弦者生脉濡者死

# 傷寒發狂

發狂者熱毒在胃併入於心使神昏不定言動急速妄語妄笑甚則登高而歌棄衣而走

踰垣上屋不食不卧非大承氣湯下不止表裏俱熱宜三黃石膏湯裏熱盛宜大承氣湯下

語宜辰砂五苓散○如狂者但睡中忽欲起行錯言妄語非若發狂莫能制也○陽毒發狂宜

陽毒升麻湯陽毒梔子湯坊見○發狂宜月妙香丸方觀三白飲治龍散破棺湯水漬法火劫法○

喜忘如狂蓄血證也○凡發狂見陽證陽脉者順見陰證陰脉舌卷囊縮者死

# 三白飲

治傷寒熱病極狂走雞子清一箇白蜜一大匙芒硝三錢右合作一處涼水調下



活龍散

治陽毒發狂活地龍大者四五條淨洗研取汁入薑汁薄荷汁及蜜各一匙新汲水調和

徐徐灌盡漸次涼快若熱熾則加片腦尤妙名曰地龍水

破棺湯

治傷寒熱病發狂心躁言語不定不省人事人尿乾者燒存性水漬飲汁一二盞即甦或

細研如麴新汲水調下三錢亦可俗名野人乾水

冰漬法

見上陽毒下

火劫法

治發狂炭火一盆置病人之前將醋一椀急沃火內使烟氣衝入鼻內須臾自定又將涼

水嚥面亦可

傷寒譫語鄭聲

實則譫語虛則鄭聲譫語者謂亂語無次第數數更端也鄭聲者謂鄭重頻煩

也只將一句舊言重疊頻言之也○陽明病胃實則譫語○大小便利手足冷脉微細者必鄭

聲宜用白通湯大便秘小便赤手足溫脉洪數者必譫語宜用調胃承氣湯○譫語有實有虛實

則可下虛不可為實者胃實有燥屎可下之虛者  
腸胃自利也難治也。傷寒大熱呻吟錯語不得  
眠黃連解毒湯主之。晝日明了夜則譫語如  
見鬼乃婦人熱入血室證也。傷寒發熱譫語  
宜柴胡連翹湯醫

### 黃連解毒湯

治傷寒大熱煩躁不得眠或差後飲酒  
復劇者及一切熱毒黃連黃芩黃柏梔

子各一錢二分半  
剉作一貼水煎服

### 柴胡連翹湯

治傷寒發熱譫語呻吟睡卧不得柴胡  
黃芩枳殼赤芍藥桔梗瓜蒌仁梔子

連翹黃連黃柏甘草各八分  
剉作一貼入薑三片水煎服

### 傷寒結胸

而傷寒若脉浮緊下之必結胸。病發於陽  
醫反下之胸膈內拒痛手不可近。一云心下滿而硬

痛此為結胸宜大陷胸湯。若按心下硬痛手  
不可近燥渴譫語大便秘實脉沉實有力為大結胸  
急以大陷胸湯加枳殼桔梗下之反加煩躁者

蠶胃湯○小結胃者正在心下按之則痛脉浮滑宜小

陷胃湯○寒實結胃無熱證者宜三物白散小

寒熱但用陷胃湯○熱實結胃及寒實結胃活人書不拘

出。名曰水結胃○無大熱者此為水結在胃脇但頭汗

實結胃宜用大陷胃丸○調○結胃宜用灸法熨法

未經下而胃滿非結胃也○只以小柴胡合小陷胃

一加枳殼○神梗

大陷胃湯治大結胃大黃三錢芒硝二錢甘遂末五

分納硝再煎一二沸去滓納甘

遂末攪服得快利止後服

小陷胃湯

治小結胃半夏製五錢黃連二錢半瓜

瓜蒌至一盞乃八半夏黃連煎至半去滓溫服末

利再服利下黃涎便安

勿判其子○瓜蒌惟判其殼

三物白散

治寒實結胃枯便貝母各三錢巴豆去皮心熬研如脂一錢右為末和勻白湯和服

半錢弱人減半或吐或利不利進熱粥一椀利不止進冷粥一椀

大陷胸丸

治熱實結胃大黃五錢葶藶子炒杏仁炒各三錢芒硝二錢半甘遂二字右為末蜜

丸彈子大每丸水一盞煎六分溫服未利再服

灸法

詳見胃部

熨法

詳見胃部

傷寒藏結

病有結胃有藏結其狀何如答曰按之痛寸脉浮關脉沉名曰結胃也何謂藏結答曰如

結胃狀飲食如故時時下利寸脉浮關脉細小沉緊名曰藏結舌上白胎滑者難治

素名曰藏結連在臍傍引入小腹入陰筋者此名藏結死

連臍痛引陰筋者藏結元來死不醫○病狀如結胃飲食如故時時下利而舌上白胎滑○病人素有



# 傷寒痞氣

痞氣再加傷寒與宿積相合使真藏之氣閉結不通亦名藏結慎不可下止宜小柴胡加生薑以和表灸關元以回陽解陰結危哉。○結在胃者為結胃相似皆下後邪氣入裏與陽相結結在胃者為結胃無陽證不往來寒熱或但寒不熱其陰結故藏結如常時時下利舌上白胎脇肋臍腹引入陰筋俱痛者丹田有熱胃中有寒所以難治。○傷寒嘔而發熱者若心下滿而不痛此為痞。○傷寒嘔而濡其脉關上浮者三黃瀉心湯主之。○心下痞按之濡其脉沉者附子瀉心湯主之。○心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之。○心下痞而利日數十行穀不化腹雷鳴心下痞硬甘草瀉心湯主之。○結熱乃胃中虛客氣上逆故也。○甘草瀉心湯主之。○汗解後胃不和心下痞硬心下痞硬下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之。○下利不止心下痞通心下痞硬表裏不解未除而數下之遂下利不止心下痞通心下痞硬表裏不解桂枝人參湯主之。○下利不止心下痞通心下痞硬表裏不解。

半夏瀉心湯

半夏製二錢黃芩人參甘草各一錢半乾薑一錢黃連五分右剉作一貼入薑

三片棗二枚水煎服

三黃瀉心湯

大黃黃連各二錢黃芩一錢右剉作一貼以麻沸湯一盞漬之良久絞去滓分

溫再服

附子瀉心湯

大黃黃連黃芩各二錢剉附子炮二錢別煮作汁右取百沸湯一盞入三味漬

之良久去滓納附子汁分溫再服

甘草瀉心湯

甘草二錢黃芩乾薑各一錢半半夏製人參各一錢黃連五分右剉作一貼入

大棗三枚水煎服

生薑瀉心湯

生薑半夏各二錢人參乾薑各一錢半黃連甘草各一錢黃芩五分右剉作一

貼入棗三枚水煎服



# 桂枝人參湯

桂枝另剉甘草炙各一錢半右剉作一貼水二盞

煎至一盞入桂枝煮取七分去滓溫服日二劑

# 傷寒筋惕肉瞤

動氣在左而發汗太過筋惕肉瞤理人以

真武湯主之然真武湯能止其汗而不能定其瞤者動也蓋汗多則傷血血虛無以榮筋筋愈急而四體百骸俱為之瞤動宜以四物湯去地黃加人參半夏茯苓甘草作劑以五靈脂為佐入生薑烏梅煎服自有神效此專主生血生血乃所以收汗也

# 傷寒除中證

厥而利反能食曰除中其死也可立待也

○邪在表則不能食邪在裏則不能食今傷寒厥深下利脉遲當不能食而反能食者名曰除中中之胃氣既除豈可再復乎○厥利當不能食今反能食恐為除中試食以索餅發熱者除中也不發熱者非除中知胃氣尚在必愈也

傷寒血證

大陽病六七日表證因在脉微而沉反不便

自利者下血乃愈抵當湯主之。○太陽證身黃發狂小腹硬滿自利者血證諦也宜抵當湯。○

傷寒小腹滿應小便不利者為有血也當下之宜抵當丸。○太陰病不解熱結膀胱其人

似狂若血自下者自愈但小腹急結者宜攻之宜桃仁承氣湯。○衄忌發汗者為無脉或脉微故

也若脉浮緊身疼惡寒發熱則汗之可也宜麻黃湯桂枝湯。○若脉微不可汗則犀角地黄湯主

之方。○少陰病強發汗血出九竅是名下厥上竭不治。○少陰病脉浮緊發熱無汗而衄

者自愈也。○傷寒頭痛發熱口乾口鼻血出午後昏沉耳聾脇痛俗名血汗病也犀角地黄湯合

小柴胡湯主之

抵當湯

治一切瘀血結胃譫語漱水等證水蛭炒虫炒去足翅桃仁留尖各十枚大黃蒸三錢

右剉作一貼水煎服



抵當丸

治蓄血在下而無身熱便黑喜忘如狂等證

但小腹滿而尿利者宜用此緩以下之水蛭

桃仁承氣湯

治血結膀胱小腹結急便黑謔語漱水

宜此攻之大黃三錢桂心芒硝各二錢

傷寒自利

傷寒陰證身痛脈沉大便秘自利或嘔或咳宜

玄武湯上方見傷寒陽證身熱脈數煩渴引

柴苓湯

治傷寒熱病發熱泄瀉柴胡一錢六分澤瀉

一錢三分白朮猪苓赤茯苓各七分半半夏

傷寒胸腹痛

傷寒腹痛中脘痛太陰也臍腹痛少陰也

小腹痛厥陰也脾心痛太陰也臍腹痛少陰也

為結胃若未經下者非結胃也乃邪氣填塞胃中

只以小柴胡加枳桔治之如未效小柴胡合小陷

胃加枳桔一服如神。○若心下脹滿而不痛者，乃痞氣也。宜瀉心湯加枳桔。○若小腹硬痛小

便利，則為蓄血之證。○若小腹痛，造臍硬痛，利則為尿澀之證。○若小腹痛，造臍硬痛，

小便澀，大承氣湯下之。○若小腹痛，造臍硬痛，

傷寒吐衄，傷寒有吐衄者，雖有大熱，忌下。○若小腹痛，造臍硬痛，

之兆也。急用理中湯，方見加烏梅二箇，紅椒十粒，煎服，待衄定，却以小柴胡湯退熱。○傷寒吐衄，

者手足冷，胃虛空也。○傷寒吐衄，

陰陽交證，黃帝問曰：有病溫者，汗出輒復熱，而脈躁疾，

名陰陽交者，死也。帝曰：願聞其說。岐伯曰：人所以汗出者，皆生於穀，穀生於精，今邪氣交爭於骨

肉，而得汗者，是邪却而精勝也。精勝則當能食而

不復熱。復熱者，邪氣也。汗者精氣也。今汗出而輒復熱者，是邪勝也。不能食者，精無俾也。病而留者，其壽可立而傾也。且夫熱論曰：汗出而脈尚躁盛

者死狂言不能食謂之陰陽交言交合陰陽之氣不

可分別此

壞證

傷寒病未退重感寒變為溫瘧重感風變為風溫

病經汗吐下溫鍼不解及過經不解壞證名壞證或

醫者不辨陰陽錯謬汗下使病不解壞證亂經久

而不差視其犯何逆以治之表證多者知母麻黃

知母麻黃湯

治壞傷寒以傷寒差後經久精神不守

汗下不盡毒留心甘草灸各一錢右剉作一貼水煎

芎藥黃芩桂心甘草灸各一錢右剉作一貼水煎

參胡芎藥湯

治傷寒十四日外餘熱未除或渴或煩

赤此為壞證生地黃一錢半人參柴胡芍藥黃芩  
知母麥門冬各一錢枳殼八分甘草三分右剉作

一貼入薑三片水煎服

### 奪命散

治傷寒壞證昏沉垂死或陰陽二證不明過

之證好入參一兩剉作一服水二升於銀石器內  
煎至一升去滓以新水沉冷一服而盡汗自鼻梁

上出消消如水是藥之效也一名獨參湯

### 驚甲散

治壞證諸藥不效驚甲二錢犀角前胡黃芩  
生地黃各一錢枳殼八分烏梅二箇右剉作

一貼水煎服

### 百合證

大病後未平復失於調理餘證在陽醫反下之

無復經絡故謂之百合傷寒其證常默默然欲食  
不能食欲卧不能卧欲行不能行或有時聞食臭  
或時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能  
治藥入口即吐利如有神靈身形雖似和其脉微



數每尿時輒頭痛者六十日乃愈若尿時快然但頭眩者二十

日愈宜用陶氏柴胡百合湯百合湯百合地黃湯百合滑石散

石代赭湯百合雞子湯百合湯百合地黃湯百合滑石散

陶氏柴胡百合湯

治百合病及勞復等證驚甲醋煮

人參黃芩甘草各一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

百合知母湯

治汗後百合證一宿當白沫出去其水

更以井水二盞煎至一盞去滓又將井水二盞另煎知母取一盞去滓二汁和勻同煎取一盞半分

溫再服

百合滑石代赭湯

治下後百合證百合一兩右煎如上法服

百合雞子湯

治吐後百合病百合一宿當白沫出去其

水更以井水二升煎取一盞  
去渣納雞子黃攪勻溫服

### 百合地黃湯

治不經汗吐下百合證百合七枚生地黃汁一升右先煎百合證百合七枚

黃汁煎取一升五分  
二服大便出如漆黑

### 百合滑石散

治百合病變寒熱者百合一兩滑石三兩右為末每三錢白湯下日三服

### 百合洗方

治百合病一月不差變成渴者百合一斗漬一宿洗一身已宜淡食

### 過經不解

傷寒六日以上傳經一遍七日當解而再傳至於

宜邪氣留連故也或從輕再汗再下宜參胡芍藥湯小柴胡湯調之方

柴胡湯

### 勞復食復證

見勞者動也動非一種有內外血氣之異若

寒是已○復者其病如初也傷寒新差津液未復血氣尚虛或梳洗言動太早或思為太過則成

勞復蓋勞則生熱熱氣乘虛還入經絡未免再復謂之勞復宜小柴胡湯麥門冬湯和之熱氣浮者

施鼓枳實湯鼠屎豉湯枳實湯鼠屎豉湯○食復者傷寒新差胃氣尚弱若恣食飲不能剋化依前發熱若用補藥

則胃熱轉增治須清熱消食輕者胃中微滿損穀自愈重者必須吐下宜施鼓枳黃湯胃痞者生薑

○勞復食復宜七味葱白散勞復虛者益氣養神

湯○凡復證先病七日出汗而解今復舉亦必十四

日而解雖三四次復舉亦必三戰

麥門冬湯治勞復氣欲絕能起死回生麥門冬二錢

米令熟去米八二藥及棗二枚青竹葉

施鼓枳實湯治勞復發熱梔子枳實各二錢香

鼠屎豉湯治同上梔子七箇雄鼠屎七枚枳殼三枚

粒同煎至一盞分二服勿令病人知

### 梔豉枳黃湯

治食復發熱梔子枳殼柴胡各一錢香

厚朴傷肉加山查傷麪飯加神麪

### 七味葱白散

治勞復食復葱白連根三莖乾葛麥門冬熟地黃各三錢香豉半合生薑切一

合右剉以甘爛水四升煎之三分去二分去滓分二服

### 益氣養神湯

治勞復宜養氣血人參當歸白芍藥酒炒麥門冬知母梔子炒各一錢白茯苓神

前胡各七分陳皮五分升麻生甘草各三分右剉作一貼八棗二枚水煎服

### 傷寒遺證

帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而強食之故有所遺也帝曰治遺

奈何岐伯曰視其虛實調其逆從可使必已矣帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也○遺謂遺熱內經註曰如遺之在人也所謂遺者大小便不禁也嘗見病差後

善飲食而大小便不禁故知之始○當與食復參看

# 陰陽易證

傷寒病新差陰陽未和因合房室則令人陰腫入腹絞痛婦人則裏急腰跨連腹內痛名

為陰陽易也其男子病新差婦人與之交得病名曰陰易

若二男二女並不相易所以呼為易者以陰陽相感動其毒著於人如換易然其病之狀身熱衝胃

頭重不能舉眼中生火四肢拘急小腹絞痛手足拳即死亦有不即死者病苦小腹裏急熱上衝胃

頭重不能舉百節解離經脈緩弱血氣虛骨髓乾便恍恍翕翕氣力轉少着床不能動搖起止須入

或牽引歲月方死○陰陽易宜燒裊散赤衣散猴鼠糞湯青竹茹湯竹皮湯乾薑湯囊縮痛氣欲

絕宜竹皮逍遙散○女勞復者不因易而自病復也治亦相同但多憎寒發熱虛弱者人參逍遙

散○陰陽易病見舌吐出者必死○顧子獻病傷寒新差華佗診脉曰尚虛未復陽氣不足勿

為勞事餘勞尚可女勞即死當吐舌數寸其妻聞病差從百里來省之往數宿果為勞事遂吐舌

數寸而死。人姦之。皆得婦人病。傷寒賊來不能走其賊。六七入姦之。皆得婦人病。傷寒賊來不能走其賊。

### 燒棍散

治陰陽易。取近陰處。一錢。日三小。便即利。陰頭。

微腫。即愈。男女互用。之。調。又方。人手足指。爪甲。二十片。燒灰。末。米飲。調。下。其效。亦同。

### 赤衣散

治陰陽易。最效。取室女月經布。

### 猴鼠糞湯

治男子陰易。病。非白根。一把。猴鼠糞。十。四。

汗未汗。再服。猴鼠雄鼠。也。糞。兩頭。尖者。是也。藏。

### 青竹茹湯

治勞復。及陰陽易。病。瓜蒌根。五錢。青竹茹。二錢。右剉。作一貼。水煎。服。一名。瓜竹。

湯治法。服法同。

### 竹皮湯

治陰陽易。及勞復。病。刮取青竹皮。一升。水。

### 乾薑湯

治陰陽易。病。速當汗出。于。滿。四。日。不可。療。乾薑。三錢。剉。水煎。服。得汗。出。于。滿。四。日。不可。療。乾薑。



方乾薑為末一兩溫湯調服覆衣取汗得解姑

### 竹皮逍遙散

治勞復及易病青竹皮剉碎白柴胡犀角甘草

草各一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚煎臨服

### 人參逍遙散

治女勞復虛弱者人參當歸各二錢柴胡一錢半白朮白芍藥白茯苓各一錢

右剉作一貼水煎服

### 熱入血室證

婦人傷寒則與男子無異惟熱入血室及妊

室即衝脉血海也婦人傷寒發熱經水適斷

晝日明了夜則譫語如見鬼狀此為熱入血室無

犯胃氣及上二焦必自愈活人書云小柴胡湯加

生地黃主之犯胃氣謂下之犯上二焦謂發汗也

為熱入血室不實滿者小柴胡湯加牡丹皮大實

滿者桃仁承氣湯主之蟬○熱入血室其血必結

而不行小柴胡加牡丹皮桃仁或八血室其血必結

湯主之牛黃膏亦主之。○婦人傷寒發熱，經水適來，經行盡則熱隨血散，不治自愈。如熱除而脈遲，身涼，胃脇下滿，按之痛者，謂之血結胃。當刺期門，穴名隨其實而瀉之，宜服桂枝紅花湯。

### 血結胃

或問熱入血室，何為而成結胃也？予曰：邪氣傳入經絡，與正氣相搏，上下流行，或遇經水

適來適斷，邪氣乘虛而入血室，血為邪迫，上入肝經，肝受邪則譫語，而見鬼復入，臆中則血結於胃。也，何以言之？婦人平居水當養於木，血常養於肝，方未受孕，則下行之以為月水。既妊，則中畜之以養胎，及已產，則上壅之以為乳汁。皆此血也。今邪氣蓄血，併歸肝經，聚於臆中，結於乳下，故手觸之則痛，非湯劑可及。故當刺期門也。

### 桂枝紅花湯

治熱入血室及血結胃。桂枝芍藥甘草各一錢半，紅花一錢。右剉作一貼，入薑

四片，棗二枚，水煎服，汗出而解。



傷寒無脉為欲汗

傷寒兩手無脉曰雙伏一手指無脉曰單伏○若病人寒熱而厥面色不澤

也如天之欲雨六合昏昧多用手無脉者必是有正汗

也如天之欲雨六合昏昧多用手無脉者必是有正汗

也如天之欲雨六合昏昧多用手無脉者必是有正汗

也如天之欲雨六合昏昧多用手無脉者必是有正汗

也如天之欲雨六合昏昧多用手無脉者必是有正汗

五味子湯

治傷寒喘促脉伏而厥五錢子三錢人參

薑五片棗二枚水煎服

差後昏沉

傷寒差後或十數日或二十日終不惺惺常

赤或作風疾多般治不差或朝夕潮熱往來煩

所致知母麻黃湯主之。極妙。傷寒後無寒熱雜證，但漸變神昏不語，或睡中獨語一二句，目赤唇焦，舌乾不飲，水稀粥與之，則燕不與，則不思，心下無痞，腹中不滿，大小便如常，形貌如醉人，此熱傳手少陰心經也。心火熏肺，所以神昏，名曰越經證，宜陶氏導赤各半湯。

### 陶氏導赤各半湯

治差後昏沉，黃芩、黃連、梔子、知母、錢甘草五分，右剉作一貼，入薑一片，棗二枚，燈心一握，煎入生芩汁三匙，服。一名瀉心導赤散。

細

### 餘熱不退

傷寒餘熱不退，通宜用小柴胡湯調之，尿赤澀者，柴苓湯見坊。吐汗下，三法之後，別無

異證者，涼膈散妙。方觀調之。暄。發熱之後，熱不發，狂言辰砂益元散最妙。方觀。下。發熱之後，熱不發，狂言尚浮者，白虎湯加蒼朮再解之。坊見。傷寒後虛熱不已，白虎加蒼朮人參一服，如神。汗止身涼，此

通神之法也如此則汗下後熱不退不問有汗無汗俱宜白虎加蒼朮人參解之最妙問傷寒後

六經餘熱不退宜加減涼膈散方現猷門

### 狐惑證

重舌證也如狐聽水猶豫不決之義其候四肢沉

目乍赤乍白乍黑變異無常此因大病後腸胃空虛三虫求食食人王藏蝕其喉則為惑其聲啞蝕

其肛則為狐其咽乾殺其人甚急當看上部者三黃瀉心蝕其藏下唇有瘡虫蝕其肛蝕上部者三黃瀉心

湯主之坊見蝕下部者苦參湯熏洗之蝕肛門者生艾汁調雄黃末燒烟熏之通用黃連犀角湯治

惑桃仁湯雄黃銳散門

### 黃連犀角湯

治狐惑黃連犀角烏梅木香桃仁各一錢右剉作一貼水煎服空心春

### 治惑桃仁湯

治同上桃仁槐子碎艾葉各二錢右剉作一貼入薑三棗二水煎空心服

### 雄黃銳散

治下部惑瘡雄黃青箱子苦參黃連各二錢桃仁一錢右為末以生艾汁和如棗核

傷寒差後雜證

傷寒差後虛煩不得眠宜酸棗仁湯  
傷寒差後虛煩不得眠宜酸棗仁湯

神散見方  
砂益元散  
○差後虛煩欲嘔宜竹葉石膏湯  
○差後有熱狂言宜辰砂五苓散  
○見

門入

酸棗仁湯

治傷寒後虛煩不得眠  
酸棗仁炒二錢  
冬知母各一錢  
茯苓川芎各一錢  
乾

薑甘草各二分半右  
生作一服水煎服

烏梅湯

治傷寒後虛煩不得眠心中懊憹柴胡二錢  
梔子炒黃芩甘草炙各一錢烏梅肉二箇右

剉作十一粒貼入薑三片

辰砂五苓散

治傷寒發熱狂言譫語及差後熱不退  
煩等證  
澤瀉  
赤茯苓  
猪苓  
白朮  
各二

錢半  
桂辰  
砂各  
五分  
右



辰砂益元散

治傷寒熱不退狂言譫語滑石六兩甘草

下日二  
三

傷寒治法

張仲景傷寒論載三百九十七法一百一十

變於成無已之詮註傳之愈久而愈失其真也

○帝曰治之奈何岐伯曰治之各通其藏脉病日

衰已矣其未滿三日者可汗而已其滿三日者可

泄而已○陽盛陰虛下之則愈汗之則死陰盛

陽虛汗之則愈下之則死此陰陽指表裏而言之

也○桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃亡

○傷寒五法者汗者汗之吐者吐之異下溫解也各有不同汗有

利之殊溫有無補者吐有宣涌探引者和解則一

而巳○汗吐下三法毫釐不可差誤在表宜汗

在裏宜下在胃宜吐在半表半裏宜和解表裏俱

見隨證滲泄○傷寒之病太陽屬膀胱非發汗

則不愈必用麻黃之類蓋其性能通陽氣却外寒

也陽明屬胃非通泄則不愈須用大黃芒硝以利

之少陽屬膽無出入道柴胡半夏能利能汗佐以  
黃芩則能解矣太陰屬脾性惡寒濕非乾薑白朮  
則不能燥少陰屬腎性畏寒燥非附子不能溫厥  
陰屬肝藏血養筋非溫中之藥不能潤竈○太陽  
陽明大承氣少陽陽明小承氣正陽陽明調胃承  
氣是三陽已入于藏者泄之也太陰桂枝湯少陰  
麻黃附子細辛湯厥陰當歸四逆湯是三日陰未  
于藏者汗之也○○傷寒二日以前汗三日後可  
下此大略言之耳凡病人有虛實邪氣有淺深豈  
可拘以日數仲景云日數雖多但有表證而脈浮  
者猶宜發汗○數雖少有裏證而脈沉者即宜下  
之此活法也○○九味羌活湯發三時之表瘧夏  
六神通解散理晚發之邪香蘇散十神湯參蘇飲  
發表調中葛根湯解肌湯小柴胡和解除半表大柴  
胡三承氣攻熱邪傳裏理中湯四逆湯傷寒中陰  
經柴苓湯益元散治泄瀉身熱○○傷寒宜用湯  
以盪滌邪熱不  
宜用丸藥也○

傷寒欲解

也傷寒三日脈浮數而微身溫和者此為欲解  
也脈浮而解者濺然汗出也○

能食也。脉不浮而解。必大。汗出也。○六七日脉  
 至。皆大煩而口噤。不能言。躁擾者。必欲解也。○  
 必當先煩。乃有汗而解。何以知之。脉浮。故知汗出  
 解也。○若脉平和。其人大煩。目重。臉內際黃者。  
 皆欲解也。○脉浮。數而微。身溫。和者。欲解也。○  
 凡病。反能飲水者。為欲愈。○問曰。脉病。欲知  
 愈。未愈。何以別之。答曰。寸口關上尺中三處大小  
 浮沉遲數。同。雖有寒熱。不調者。此脉為陰。陽和  
 平。雖劇。當愈。○問曰。病有戰而汗出。因得解者。  
 何也。答曰。脉浮。而緊。按之反芤。此為本虛。故當戰  
 而汗出也。其人本虛。是以發戰也。若浮而數。按之  
 不芤。此人本不虛。故但出汗。不發戰也。○問曰。  
 有不戰。不汗出。而解者。何也。答曰。其脉自微。此以  
 曾經發汗。若吐。若下。若亡血。以內無津液。待陰陽  
 自和。必自愈。故不戰。不汗出而解也。○太陽病。  
 無汗。而衄者。自愈。○問曰。凡病。何時得。何時愈。  
 答曰。日中得病。夜半愈者。以陽得陰。則解也。夜半  
 得病。日中愈者。以陰得陽。則解也。○太陽病。可  
 解者。為頭不痛。項不强。肢節不痛。則知表易解也。  
 陽明證。可知。解者。為無發熱。惡熱。則知裏易解也。

少陽知可解者寒熱亂作  
失其早晚知可解也

傷寒可吐證

傷寒三四月日邪氣未傳裏瓜蒂散吐之  
六七日胃煩懊憹懷梔子湯吐之

可汗不可汗證

傷寒寸口脈浮而緊浮則為風緊則為  
寒風則傷衛寒則傷榮榮則為風緊則為

煩疼當發其汗神愈傷寒前三日法當汗可用雙  
解散連進數服必愈心丹寒傷榮宜麻黃湯風傷

衛宜桂枝湯不得汗當用蒸法陶氏再造散主之  
服藥而不得汗當用蒸法陶氏再造散主之

○太陽證非頭痛項強不可汗○脈微弱或非身熱惡寒  
不可汗○非脈浮不可汗○脈微弱或非身熱惡寒

不可汗○血不得眠○汗出則必額上陷脈急  
直視不能瞬血不得眠○汗出則必額上陷脈急

慄而振○風溫濕溫並不可汗○虛煩不可汗○  
臍間左右上下有動氣不可汗○太陽病者咽乾

鼻衄小便淋並不可汗○當汗不咽喉乾燥者不可汗○  
婦人經來不可汗○當汗不咽喉乾燥者不可汗○

而不利則亦生黃多則為汗亡陽  
為蓄血當汗而過多則為汗亡陽



# 發汗法

益凡發汗不可欲令如水淋瀝耳若病不解當重發

汗以汗多則亡陽亡陽不得重發汗也。○凡發汗

雖淋瀝而腰以下至足微潤則病終不解。○凡

發汗服湯其方雖言日一二服若病劇不解當促

其服可半日間盡一二服連服三劑乃解。○若汗不

出者死病也。○凡發汗病證仍在者三日內可

二三汗之。○周遍為度。○若未汗可作熱粥投之。○粥內

加葱白甚妙。○凡服藥發汗中病即止不必盡

證也。○吐下亦過如亡陽。○陽證主之。○有汗過多漏不止名曰亡陽。○溫經益元湯

再造散主之。○無用蒸法。○禱觀。○太陽證惡寒脉當

# 腎氣不足難得汗

之太假。○陽病脉浮緊者不可發汗。○以何解

必痒桂枝各半湯主之。○方觀。○凡

再造散主之。○無用蒸法。○禱觀。○太陽證惡寒脉當

再造散主之。○無用蒸法。○禱觀。○太陽證惡寒脉當

再造散主之。○無用蒸法。○禱觀。○太陽證惡寒脉當

再造散主之。○無用蒸法。○禱觀。○太陽證惡寒脉當

再造散主之。○無用蒸法。○禱觀。○太陽證惡寒脉當

再造散主之。○無用蒸法。○禱觀。○太陽證惡寒脉當

再造散主之。○無用蒸法。○禱觀。○太陽證惡寒脉當

再造散主之。○無用蒸法。○禱觀。○太陽證惡寒脉當

再造散主之。○無用蒸法。○禱觀。○太陽證惡寒脉當

知之以榮血不足血少故也小建中湯虧觀加黃  
芪服之尺脉有力乃服汗藥繻○一人患傷寒發  
汗多驚悸目眩身戰孫曰太陽經病得汗早因太  
陽經欲解復作汗腎氣不足故汗不來所以心悸  
目眩身戰遂作真武湯三服微汗而解蓋附子白  
朮和其腎氣腎氣得行故汗得來也若但責太陽  
惟能乾涸血液爾仲景云尺脉遲者榮血不足  
不可以汗以此知腎氣怯則難得汗也

### 促汗夭壽

凡傷寒發汗須顧其表裏虛實待其時日  
若不循次第則暫時得安虧損五藏以促

壽限何足貴哉昔南朝范雲為陳武帝屬官適得  
傷寒恐不得預九錫之慶召徐文伯懇求促汗文

伯曰便差甚焉只恐二年不復起耳雲曰朝聞道  
夕死可矣何待二年遂以火燒地鋪挑葉設席置

雲於其上須臾大汗撲以溫粉翌日便愈  
雲甚喜文伯曰不足喜也後二年果卒轉

### 溫經益元湯

治發汗過多衛虛亡陽以致頭眩身慄  
筋惕肉瞤熟地黃人參白朮黃芪蜜炒

白芍藥當歸生乾地黃白茯苓陳皮甘草灸各一  
錢桂皮附子炮各五分石剉作一貼入薑三片棗



二枚糯米一撮水煎服

### 陶氏再造散

治陽虛不得汗名曰亡陽證人參黃芪桂枝附子炮細辛羌活防風川芎甘草

灸各一錢右剉作一貼入煨薑三片棗二枚煎至半入炒芍藥一錢再煎二三沸溫服

### 可下不可下證

出乃胃中乾燥結聚潮熱大便鞭小便

如常腹滿而喘或譫語脈沉而滑者裏證也裏證

內熱是也內熱屬陽明宜下也大小調胃三承

氣必須脈浮頭痛惡風惡寒表證盡罷而反發熱

惡熱譫語不大便方可用之若脈浮緊下之必結

胃若脈緩下之必痞氣鬱○傷寒後三日法當下

下之太早則必變他證輕者必危危者必死當用

平和之藥小柴胡涼膈天水蠶也合兩服之熱勢

未退又以下大柴胡合三承氣下之兩除表裏之熱

暄○凡轉下之藥與裏證藥參考選用○脈浮

不可下○脈虛不可下○惡寒不可下○嘔吐不

可下○不轉矢氣者不可下○惡寒小便清不可下

○非陽明本病不可下○非發狂滿燥實不可下○非陽明沉實不可下○非發狂滿燥實不可下

### 急下兩證

少陰主腎繫舌本熱氣入藏留於少陰之經腎汁乾咽路焦故口燥咽乾而渴宜急下

下之非若陽明宜下而可緩也雖然陽明一證發熱汗多亦急下之以胃汁乾宜急下之陽明證燥咽乾謂之腎汁乾宜急下之陽明證發熱汗多謂之胃汁乾亦急下之陽明證

### 脉不鼓擊不可下

醫欲用承氣湯下之煩渴脉七八至

之大駭曰幾殺此兒彼以脉數為熱今脉七至是極熱也殊不知內經云病有脉從者何也

岐伯曰脉至而從按之不鼓諸陽皆然此陰盛陽於外非熱也取薑附來吾以熱因寒用之法治

之藥未就而病者爪甲已青遂頓服八兩汗漸出而愈

### 下後熱不退宜再下

下後熱不退再三下之熱愈盛

可生之理若輟而不下則邪熱極盛陰氣極衰脉息斷絕必不可救如此之證是下之亦死不下亦

死而醫者到此殺入活人有一彈指間耳○經云三  
下而熱不退者死後人有三四次加至○十數行而  
生者此乃偶然誤中耳後學切不可爲法但用  
解毒湯合涼膈散調之庶不失人命○汗下後  
熟不退不問有汗無汗宜白  
虎湯加人參蒼朮解之妙○

陰耗陽竭證

裏熟內盛陽厥極甚皆因失下而成此  
證以致身冷脉微昏憒將死殊不知此

可和不可和證

傷寒熱邪半在表半在裏宜小柴胡湯  
和之倍口苦咽乾目眩耳聾脅滿

或往來寒熱而嘔屬少陽忌吐下宜小柴胡湯和  
之神○小柴胡湯一名和解散若加黑豆一撮煎  
名曰火邪湯入○病若半在表半在裏法當和解  
小柴胡合涼膈散方○主之劑○非往來寒熱不  
可和○非脇助急痛不可和  
○非胃滿而嘔不可和蠅

○可○和○  
非○胃○  
滿○非○  
而○脇○  
嘔○助○  
不○急○  
可○痛○  
和○不○  
燐○可○  
和○

傷寒凶證

傷寒病唇吻反青四肢多汗肝絕也。形如烟熏搖頭直視心絕也。環口鰲黑柔汗發

黃脾絕也。○汗出發潤喘而不休肺絕也。○狂言直視洩便遺失腎絕也。○汗出如油喘促不休水漿不入形體不仁命絕也。○

傷寒不治證

脈陰陽俱虛熱不止者死。○脈陰陽俱盛

者死。○少陰病吐利煩躁四逆者死。○汗後嘔吐水藥不入口者逆。○下利後脈絕手足厥冷時

脈還手足溫者生。○汗下後復發熱脈躁疾下利不止者死。○下利脈遲無脈灸之脈不還身不溫反微

喘者死。○直視譫語或喘滿或下利者死。○服麻

黃湯二三劑汗不出者死。○熱病脈躁盛而不得

汗者死。○發汗不至足者逆。○汗出如珠不流者

死。○忽冒昧無脈服藥後汗解則生。○若無汗脈不至者死。○七八日以上發大熱難治。○傷寒脈乍

疎乍數者不治。○脈代者不治。○口乾舌黑不治。○口張目陷不治。○尋衣摸空者逆。○厥陰證唇



青舌卷耳聾囊縮不治○陰陽易過六七日不治○大發濕家汗則成瘥熱而瘥難治○發風濕中

濕汗並逆○發風溫汗必譫語不治

傷寒十勸李子建所撰不可不察

傷寒頭痛身熱便是陽證不可服熱藥傷寒太陰病頭痛不

痛身不熱少陰病反發熱而無頭痛厥陰病有頭痛而無發熱即是陽證不可妄投熱藥

傷寒當直攻毒氣不可補益邪氣在經絡中當隨證

使毒氣流藏多致殺人

傷寒不思飲食不可服溫脾胃藥傷寒不思飲食自是常事終無餓死

之理如理中元之類不可輕服若熱氣增重或至不救

傷寒腹痛亦有熱證不可輕服溫煖藥傷寒腹痛多是熱毒仲景

方痛甚者加大黃則意可見也惟身  
冷厥逆腹痛方是陰證當消息之死者多矣未除真氣先涸

傷寒自利當看陰陽證不可例服溫煖及止瀉藥利

惟身不熱手足溫者屬太陰身冷四逆者屬少陰  
厥陰外其餘身熱下利皆是陽證不可用熱藥死

傷寒胃脇痛及腹痛不可妄用艾灸傷寒胃脇痛屬  
少陽腹脹痛屬

太陰切不可便用  
艾灸多致殺人死

傷寒手足厥冷當看陰陽不可一例作陰證傷寒有  
陰厥有

陽厥當仔細分辨  
不可例用熱藥死

傷寒病已在裏即不可用藥發汗傷寒須看表裏若  
一例發汗則邪氣

未除真氣先涸  
死者多矣

傷寒飲水為欲愈不可令病人恣飲過度病人發渴  
當與水以



消熱氣然不可過多  
常令不足為善竭

傷寒病初差不可過飽及飲酒食羊肉行房事愈病方飲

食過飽病即再來謂之勞復犯房室者必死病即再來謂之勞復犯房室者必死

傷寒戒忌傷寒新差後但少喫糜粥常令稍飢不得飽

得多言不得勞心費力反此則復得體未復犯房室者死○忌食羊雞狗肉肥魚油

膩諸骨汁及醢藏鮮脯油解麪等物病則再發

中寒證仲景論傷寒矣未及乎中寒先哲治冒大寒而

曰中未有議其異同者夫傷寒有即病有不即病必大發熱病邪循經而入以漸而深中寒則倉卒

感受其病即發而暴一身受邪難分經絡無熱可發溫補自解此氣太虛也不急治則死矣○中

寒者寒邪直中三陰卒然昏不知人直拘急疼痛若不急治死在朝夕先用熱酒薑汁

各半盞灌服次用回陽救急湯上方見附子理中湯  
術附湯田陽湯鑿○中寒雖燥熱煩渴可煎附子  
理中湯浸水中冷服之不可熱服鑿○冷極唇青  
厥逆無脉陰囊縮者急用葱熨法或吳茱萸熨法  
防見并灸臍中與氣海關元各三五壯而脉  
不出手足不溫者死臥○中寒則口噤四肢強直  
卒然暈倒

### 附子理中湯

乾薑炮甘草炙各一錢附子炮入參白朮

煎服因三○一方加吳茱萸肉桂當歸陳皮  
厚朴各等分煎脉亦名附子理中湯

### 術附湯

治中寒白朮三錢甘草炙一錢半附子炮一  
錢右剉作一貼入薑十片煎水調蘇合元三

丸服之

### 迴陽湯

治中寒益智仁青皮各二錢川烏生附子生  
各一錢乾薑炮五分右剉作一貼入薑七片

棗二枚水煎服



寒厥暴亡一婦人病傷寒暴亡脉絕有一道入見之

薪炭燒之俟極煖施薦覆坑昇病人卧其上厚被覆之少頃大汗沾衣即甦

葱熨法治中寒身冷脉微面青黑葱白連根切小麥

極熱絹包之互熨臍上冷則用水拌濕更炒熨之

感寒及四時傷寒飲寒温不節將理失宜乍煖脫衣甚熱

凌晨朝起呼吸冷坐卧當風居處暴露衝冒霜雪寒致生陰濕如此之候皆為邪厲侵傷肌膚入于

腠理使人身體沉重肢節痠疼項背拘急頭目不清鼻塞聲重淚出氣壅胷膈凝滯飲食不入凡此

之證若不便行解利伏留經絡傳變無已○尋常感冒有表證宜羌活冲和湯防風冲和湯芎芷

香蘇散坊見寒毒入裏吐利者藿香正氣挾食停痰人參養胃湯坊見時令感冒宜升麻葛根湯○

大抵感冒古人不敢輕發汗者正由麻黃能開腠理用或不得其宜則導泄真氣因而致虛變生他

證此藥乃平和之劑。馱鬱蟻止，能溫中解表，而有不致妄擾也。○雜病與傷寒相類者，極多。凡有感冒輕證，不可便認爲傷寒而妄治之。其或可者，蓋亦因其不敢放肆，多用和解和平之藥散之。爾氣散參蘇飲，是方沃雪湯，交加散，十味芎蘇散，助子痙對金飲。

### 羌活冲和湯

治春夏秋感冒風寒，發熱惡寒，頭痛項強，或無汗，或有汗，以代桂枝麻黃青龍。

各半湯治太陽經表熱之神藥也。○此藥非獨治四時風寒，春可治溫，夏可治熱，秋可治濕，治雜病亦有神也。坊見○

### 防風冲和湯

治春夏秋感冒風寒，頭痛身熱，自汗惡寒，脈浮緩，羌活防風各一錢，半白朮川芎白芷生地黃黃芩各一錢，細辛甘草各五分，右剉八薑三葱三煎服。○一名細辛甘草各五分。

### 冲和散

治四時感冒風寒，蒼朮四錢，荊芥二錢，甘草一錢，右剉作一貼，水煎服。○

沃雪湯

解利四時傷寒以此溫和表裏通順陰陽蒼  
術三錢厚朴一錢半川芎當歸防風白芍藥

陳皮葛根甘草各七分  
右剉作一貼水煎服

升麻葛根湯

治溫病及時令感冒葛根二錢白芍藥  
升麻甘草各一錢右剉作一貼薑三蔥

二煎服

交加散

五積散性溫敗毒散性涼凡入遇些少感冒  
取兩藥對半合和煎服則邪氣自散矣是坊

外感挾內傷證

傷外感無內傷用仲景法○傷寒挾內  
者十居八九蓋邪之所湊其氣必虛

只用補中益氣湯出入加減氣虛甚者少加附子  
以行參芪之功○方規○傷寒丹溪用補中益

氣湯海藏用○九味羌活湯皆是和解之意不使真  
氣散失也○丹溪海藏諸賢治傷寒皆以補養

無發散之法此乃風雨寒熱不得虛邪不能獨傷  
人之旨也俗醫謂傷寒無補法不得虛實一例汗

下而致天橫實醫門之罪人也○傷寒一證頭  
疼身熱惡寒微渴漈然汗出沉困身痛脚痠脉浮

虛無力名曰勞力感寒不可誤作正傷寒大發汗  
宜加味益氣湯春田。外感挾內傷宜陶氏補中益

氣湯十味

和解散

### 陶氏補中益氣湯

治內傷氣血外感風寒頭痛身熱惡寒自汗沉困無力人參生地黃

黃芪當歸川芎柴胡陳皮羌活白朮防風各七分  
細辛甘草各五分右剉作一貼八薑三片棗二枚

葱白二莖水煎服如元氣不足加升麻三分附

### 十味和解散

治外感內傷頭痛身熱白朮四錢桔梗二錢當歸陳皮枳殼防風白芍藥厚朴

人參甘草各五分左右剉作一貼  
八薑三片葱白三莖水煎服

### 加味益氣湯

治勞力感寒證羌活一錢半人參黃芪防風柴胡各一錢白朮陳皮當歸各七

分甘草五分升麻黃柏酒炒各二分右剉作一貼八薑三片水煎熱甚加酒炒黃芩三分春田

### 外感內傷虛證宜補

一婦年七十患傷寒發熱惡寒諸醫以藥發散旬日不效飲食

漸少昏沉不省口不能言眼不能開咽喉有微氣有欲絕之候六脉虛微若無以人參濃煎湯徐徐灌之連用頓甦又歷十四年而卒夫人參迴元氣於無何有之鄉果有起死迴生之功醫說載一人

傷寒成壞證只服人參湯鼻梁出汗而愈與此同

### 孕婦傷寒

孕婦傷寒宜用芎蘇散黃龍湯柴胡枳殼湯

黛伏龍肝井水調塗臍腹上乾則再濕塗庶免傷胎

### 芎蘇散

治孕婦傷寒頭痛寒熱咳嗽黃芩前胡麥門冬各一錢川芎陳皮白芍藥白朮各八分紫

蘇葉六分乾葛五分甘草三分

### 黃龍湯

治孕婦傷寒發熱及產後發熱入血室等證即小柴胡湯去半夏與四味涼血地黃

湯合用尤好

### 柴胡枳殼湯

治孕婦傷寒發熱口乾腹滿便閉譫語或發癰大青燠麴熟生地黃石膏各一



錢半柴胡一錢枳殼黃芩梔子知母麥門冬乾葛各五分升麻四分甘草二分右剉水煎服

### 罩胎散

治孕婦傷寒發大熱或發痘疹恐傷胎藏嫩

蜜水調下

### 痼冷

痼冷者謂痼久而冷也痼者固也冷者寒之甚也

之痼冷宜附子理中湯中湯坊見四柱散方觀衝寒散加減白通湯靈砂金液丹至聖來復丹代灸塗臍

膏加味理中湯

### 衝寒散

治痼冷腹痛泄瀉飲食減少香附子陳皮草果各一錢半縮砂白薑肉豆蔻各七分藿香

白茯苓木通吳茱萸各三分右為末每二錢溫酒或薑湯調下或剉作一貼水煎服

### 加減白通湯

治沉寒痼冷臍腹冷痛大便秘自利足脛

蕤煨半夏人參白朮甘草灸各一錢右剉作一貼八薑五片葱白五莖水煎服仍灸氣海三里穴

# 靈砂

治諸虛痼冷厥逆如神水銀四兩硫黃一兩右同入鐵鉚內炒成砂子有烟焰起以醋灑之研

細入水內火鼎赤石脂封口鹽泥固濟炭二十斤以經宿取出細研糯米糊和丸每五七九以

至十五丸空心以人參大棗湯下忌食猪羊血菜豆粉冷滑之物

# 金液丹

治久寒痼冷及吐利日久身冷脉微硫黃十兩研細飛過盛磁盒內以赤石脂泥縫外以

鹽泥固濟先掘地坑埋小罐子盛水令滿安盒子在上用泥固濟訖慢火養七日七夜候足加頂火

一斤煨取出放冷研為細末右藥末一兩用蒸餅一兩湯浸去水脉和丸梧子大每三十丸多至百

丸溫米飲下空心服

# 至聖來復丹

治痼冷心腹冷痛藏府虛滑及霍亂吐瀉脉微欲絕又治榮衛不交養心腎不

升降上實下虛氣塞痰厥一氣均調陰陽可令有胃氣無不獲安此藥配類二氣均調陰陽可令有胃

可緩可急功效殊勝硫黃硝石各一兩為細末入鉚內以微火慢炒用柳木篋不住手攪令陰陽氣

相入再研極細名曰二氣砂乃入水飛五靈脂陳皮青皮末各二兩次入太陰玄精石末一兩和勻醋糊和丸豌豆大空心來飲下三十丸或五十九

### 加味理中湯

治痼冷積寒附子炮人參白朮乾薑炒肉桂陳皮白茯苓甘草灸各一錢右剉

作一貼入薑三片棗二枚水煎服

### 代灸塗臍膏

治痼冷臍腹痛附子馬蘭子蛇床子吳茱萸肉桂木香右細末用白麝一匙薑

汁調成膏攤紙上圓三寸許貼臍下關元氣海自晚至曉其力可代灸百壯

### 傷寒有五種

以中有風有濕溫有傷寒有熱病有溫病而弱○濕溫之脉陽濡而弱陰少而急○傷寒之脉陰陽俱盛而緊○熱病之脉陰陽俱浮○浮之

而滑沉之散溢○溫病之脉行在諸經不

知何經之動也隨其經所在而取之

### 傷寒十六名

一曰傷寒二曰傷風三曰傷寒見風四曰傷風見寒五曰風濕六曰中濕七曰風濕

八曰濕溫九曰溫毒十曰中暍十一曰熱病十二  
曰溫病十三曰晚發十四曰瘧病十五曰溫瘧十  
六曰疫癘也○濕病有五種乃春溫風濕濕寒濕中  
濕濕痺也○溫病有五種乃春溫風濕濕寒濕瘧

溫毒也○  
辯觀癰也○

傷寒相類四證曰一曰痰飲二曰虛煩三

傷寒賦傷寒為病類先師究詳之遺旨太陽則頭  
反覆變遷成後學診治之良詮陽明則目

痛身熱脊強少陽耳聾脇痛寒熱嘔而口為之  
疼鼻乾不眠太陰腹滿自利尺寸沉而津不到

苦少陰舌乾口燥一二月可發表而散五  
咽厥陰煩滿囊縮三四日宜和解而瘥七

六日便實方可議下日傳二經病名兩感太  
八日不解又復再傳經傳六日應無一全太

陽無汗麻黃為最小柴胡為少陽之要領至  
陽有汗桂枝可先大柴胡行陽明之秘堅宜

三陰則難拘定法或可溫而或可下且如陰證下  
數變以曲盡生意或可方而或可圓

之早者乃為結胃	發狂為血蓄于內又大便之	之早者因成痞氣	發黃為熱積於中氣小便之	極實	微喘緣表之未解	喘滿而不惡寒者常	不利	微煩為陽之相勝	煩極而反發厥者乃	下而痊	狐惑蓋緣失汗虫蝕藏及蝕肛	渴乃	陰所致	蛇厥却緣多飢虫攻咽及攻胃	斑為	煩多	陽明內實則為寒熱往來	衄血雖為欲	熱熾	太陽中風因作剛柔二瘧	瘧利雖若尋	解重陰血者有厥竭之憂	厥有二端	陰厥脉	常反能食者有除中之忌	治非一類	陽厥脉	沉而細初緣利過	治陽則亡硝大黃	死生係	沉而滑始因便秘	治陰則附子薑桂	脉藥可	反掌之間	因知	胃風溫汗不止宜服禹餘糧	戰汗	折肱而治	歸于一經邪不傳兮表解疾愈	咳逆者羌活附	分為四證	陽勝陰兮熱退身涼	腹痛者桂枝大	子微虛相搏則為短氣	陽明背惡寒而唇口	黃勞食再復乃成內傷	少陰身體痛而筋肉	燥懸知白虎為最	將欲發黃先出頭汗	渴欲	惕乃聞真武至強	始因火迫終至亡陽	燥
---------	-------------	---------	-------------	----	---------	----------	----	---------	----------	-----	--------------	----	-----	--------------	----	----	------------	-------	----	------------	-------	------------	------	-----	------------	------	-----	---------	---------	-----	---------	---------	-----	------	----	-------------	----	------	--------------	--------	------	----------	--------	-----------	----------	-----------	----------	---------	----------	----	---------	----------	---



飲水入即吐者五苓散  
漱水入不下者犀角湯  
况乃大青龍兼理風寒

不得眠而煩燥甚雞子八於黃連  
但有熱而嘔噦頻薑汁加於竹葉  
一七瓜蒂

散吐傷寒中脘痰涎  
湯理少陰下利膿血  
厚朴半夏治腹脹為偏宜

調溫毒可用黑膏  
散亦癰當行紫雪  
吐血者須煎黃連藥皮  
咽痛者通用猪鬃甘桔

三物白雖云頗峻散結  
十棗湯固非泛常治痞滿  
痛連兩脇力以冰遲熱

語呻吟乾嘔者黃連解毒  
多寒少血弱者黃芪建中  
汗之過多動悸而惕

旋覆代赭理心痞而噫不息  
桂枝各半療身痒而汗不通  
勞復身熱湯名

猴鼠糞  
白頭翁  
疫癘者春夏秋冬各有分用須十全九  
百合者行住坐卧皆不定號為百脉一

證常謂多眠身猶灼熱風溫可用萎蕤  
宗當末牛蒡根  
不可汗本有數種動氣與風濕

痰宜行金沸草  
不可下自非一端動氣與陽浮

脉虛 濕證不可汗傷 溫病發於春夏要須采  
在表 霍亂多緣熱惱 奔豚挾逐寒邪多用桂

葛以解肌 蓋聞 乍寒微熱 名似瘧 瘡 下利白胎不  
苓為可保

藏結 口燥咽乾 雖少陰下莫可緩 陽明與少  
可醫 肉潤筋惕發動 氣汗以致羸 傷寒與熱

陽合病 脉弦者名曰負 身痛有表證裏證若陰  
病將痊 食多者號曰遺

陽則木附可用 脾弱者大便難而小便利數治用  
毒則四逆尤遲 協熱者小便澀而大便利用須

大黃枳殼 嘔吐有寒有熱 寒則當溫熱當以解  
黃連當歸 謔語有虛有實 實則可下虛不可

陽毒則狂 斑煩亂 以大清升麻可迴困篤  
陰毒則唇青厥逆 以正陽甘草或撻顛危

厥時胃煩尤甚 此此藏氣絕而精神散 嗟夫 生  
汗後身熱猶盛 此陰陽交而魂魄離

關 陽脉見於陰經 其生也可知 土衰木旺則  
主 陰脉見於陽經 其死也可許 水升火降則

為賊能無剋制之災 緣傷寒傳變之非常 是用  
為和會見歡欣之舉 非雜病徑直而可取



潛篤心神 推惻隱之端以濟乎今 庶幾可登  
洞窺藏府 拯疲癯之疾以遵乎古 不負乎諄

東垣之堂 諄之語

單方 十種

石膏 主傷寒熱病汗後脉洪大頭痛口燥  
大渴取石膏碎一兩水煎服之

硫黃 治傷寒陰證身冷脉微手足厥而躁  
錢為末艾湯調服即脉微手足厥而躁  
門入 愈

柴胡 療傷寒第一解肌除煩  
熟坐一兩水煎服之

葛根 療傷寒初患頭痛身熱葛根剉一兩水  
煎服○生葛取汁飲一升亦效

麻黃 療傷寒解肌發汗為第一  
去節取五錢水煎服之

百合 療傷寒陰毒煮百合  
濃汁服一升良

竹瀝 主傷寒勞復竹瀝小  
煎數數飲之取汗

梔子

十枚治傷寒熱病勞復梔子水煎服微汗

皂莢

有傷寒昏迷不省人事皂莢末以紙撚燒烟入鼻

皂莢半夏生白礬共一錢半為末薑汁調服探吐痰去即甦

牡鼠糞

專主勞復入葱豉水煎服

葱白

傷寒初覺頭痛身熱便服葱豉湯葱白一握豉一合生薑五片水煎溫服取汗時夜亦用此

生梨

主傷寒熱盛取食之

葱酒

治感寒初覺連鬚葱白細切投熱酒中飲之取汗差

荊芥

主傷寒頭痛取穗一兩濃煎服之

紫蘇葉

治感傷風寒濃煎湯飲之取汗差

忍冬藤

治同上濃煎湯溫服取汗

薄荷

療傷寒陰陽毒取葉煮汁溫服取汗良

菜豆粥

治傷寒熱病煩渴煮作粥常服之

人屎

即野人乾糞也主傷寒發熱發狂溫水漬取汁飲之

婦人月水

解衣溫水漬及陰經熱取月經衣溫水漬取汁飲之

鍼灸法

傷寒初得一壯二日傷寒頭痛寒熱宜灸巨關上腕中

骨補陷谷

合谷損竹○八關大刺血不出取合谷○傷寒頭痛刺

泚炊熨復溜

○傷寒汗不出取合谷○傷寒頭痛刺

寒汗多不止

取內庭又十腕骨陽谷復溜○傷寒頭痛

證刺陽池

丘墟風府風池○傷寒結胸先使人

穴次刺左間

使穴名曰雙關刺之慢慢呼吸停鍼立

邊結胃立效

右亦依上法刺之慢慢呼吸停鍼立

愈○傷寒胃痛取期門大陵○傷寒脇痛取  
 支溝陽陵泉○傷寒陰證腹痛灸足小指外側  
 上紋尖灸三壯男左女右○傷寒陰毒危極藥  
 餌無功速灸臍中三百壯又灸氣海關元各二三  
 百壯以手足溫煖為效○又法陰證已極王莖  
 縮入速令人捉定急將艾九菴豆大灸在陰莖口  
 上灸三壯其莖即出○傷寒手足厥冷取大都  
 臍一○傷寒六脉俱無取復溜○傷寒手足厥  
 支溝和肘絆此穴巨闕三寸氣衝○傷寒  
 熱退後再發熱取風門合谷行間絕骨燧○傷寒  
 熱病五十九刺法頭上五前行行五者以越諸陽熱  
 逆也謂頭中行上星顙會前頂百會後頂五穴也  
 兩傍謂承光通天絡却玉枕天柱十穴也○又兩傍  
 謂臨泣目窓正營承靈腦空十穴也○大杼膺俞  
 缺盆背俞此八者以瀉胃中之熱也○氣街三里  
 巨虛上下廉此八者以瀉胃中之熱也○雲門髃  
 骨委中髓空此八者以瀉四支之熱也○五藏俞  
 傍五此十者以瀉五藏之熱也○臍踰脚腫○五藏俞  
 不出大發發赤噦者死○熱病不可刺者有九一曰汗

○三曰目不明熱不已者死○四曰老人嬰兒熱而腹滿者死○五曰汗不出嘔下血者死○六曰舌本爛熱不已者死○七曰欬而衄汗不出不至足者死○八曰髓熱者死○九曰熱而瘥者死瘥者腰折瘕瘕齒噤齧也

# 暑

暑者相火行令也

夏至日後病熱為暑暑者相火行令也夏月人感之自口齒而入傷心包

絡之經其為證煩則喘喝靜則多言身熱而煩心大渴引飲頭疼自汗倦怠少氣或下血發黃生癍甚者火熱制金不能平水搖擗不省人事矣

傳變為溫為暑

凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫

暑當與汗皆出勿止

法

傷暑脉虛○脉虛身熱得之傷暑○脉中暑傷於氣所以脉虛弦細花遲體狀無餘○中暑

之脉陽弱陰虛微遲似乳。○暑脉弦細。乳遲何也。蓋寒傷形，熱傷氣，氣傷則氣消而脉弦細。乳遲所以弦細。乳遲皆虛脉也。轉○暑脉虛而微弱，或浮大而散，或隱不見，夫微弱隱伏皆虛類也。○中暑與熱病相似，但熱病脉盛，中暑脉虛。以此辨之。

### 暑病形證

暑病身熱自汗，口乾面垢而已。○傷暑之證，面垢自汗，身熱，背寒，煩悶，大渴，倦怠，少氣。

毛聳惡寒，或頭疼，或霍亂，或四肢厥冷，但身體無痛。○中暑之證，六脉沉伏，冷汗自出，悶絕而昏。

不知人矣。○太陽中暍者，暑病也。發熱惡寒，身重，頭痛，其脉弦細。乳遲，小便已，灑灑然，毛聳，手足

逆冷，少有勞身，即熱，口開，前板齒燥，若發汗，則惡寒甚，加溫鍼，則發熱甚，數下之，則淋甚。○何故

灑然，毛聳，蓋熱則諸毛孔開，故洒然惡寒，口不開，前板齒燥者，齒乃骨之精，今燥者，骨熱也。鍼藥不能

治，當灸大

### 中暑救急

夏月在道中，中暑暍死者，急扶在陰涼處，取途，中熱塵土，積死人心，又積臍上，作窩，令人

尿其中即活○中暑悶倒急扶在陰涼處切不  
可與冷水以布巾衣物蘸熱湯熨臍中及氣海續  
以熱湯淋布上令暖徹臍腹即漸醒如倉卒無湯  
掬道上熟土積於臍上冷則易之因○凡覺中暑  
急嚼生薑一大塊冷水送下如已迷悶嚼大蒜一  
大瓣冷水送下不能嚥水研灌之或灌入尿半碗  
或車輪土五錢冷水調灌之○中暑發昏  
以新汲水滴兩乳以扇扇之重者地漿灌之即醒  
若與冷水飲即死○中暑昏悶痰壅不省至聖  
來復丹點喉為末井水調下○中暑不省白芨  
燒甘草炒為末每二錢溫水調下○中暑神昏  
驚悸妄言辰砂益元散點喉井水調下二錢  
**中暍中熱之辨**仲景傷寒論中一證曰中暍即中暑也  
暑益氣湯等補益之○熱口燥一證曰熱病即中熱也  
脈洪而緊盛頭痛身熱口燥心煩宜白虎湯等清  
涼之劑○靜而得之為中暑者陰證當發  
散也或避暑於深堂大厦得之其證必頭痛惡寒  
身形拘急肢節疼痛而煩心肌膺大熱無汗為身  
室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越宜蒼朮白



虎湯動而得之六和湯加羌活川芎蒼朮或二香散

也若行人或農夫於日中勞役得之其證必苦頭

痛發躁熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大

### 夏暑宜補氣

陽生與天地同陽一索齋子月一陽生寅月三

也人之腹屬地氣於此時浮於肌表散於皮毛腹

中之陽虛矣世言夏月伏陰在內此陰字有虛之

義若作陰冷看其誤甚矣火令之時流金燦石何

### 生脉散

麥門冬二錢人參五味甘草各一錢水煎夏月

極金伏之際寒水絕體於斯時也故急救之以生

脉散除其濕熱肺欲收心苦緩以五味子之酸心火



真人曰夏月常服五味子以補五藏氣是也麥門冬之微苦寒能滋水之源而清肺氣微加黃栢

之苦寒以滋水之流除兩足之痿弱也鍊鍊○人參麥門冬五味子生脉脉者元氣也

### 清氣飲

治發熱汗大泄無氣力脉虛細而遲此暑傷元氣也白朮一錢二分人參黃芪麥門冬白

芍藥陳皮白茯苓各一錢二分知母香薷各七分黃連炒甘草各五分黃栢三分右剉八薑三水煎服用

○一名清暑益元湯醫

### 參薈飲

驅暑清熱壯元氣免霍亂吐利等疾白朮一錢半人參一錢二分麥門冬白芍藥白茯苓

各一錢知母炒陳皮香薷各七分甘草炙五分黃芩炒三分五味子十粒右剉八薑三水煎服必

一名却暑清健湯醫

### 黃芪湯

治中暍脉虛弱人參白朮白茯苓甘草黃芪白芍藥各一錢右剉八薑三片水煎服藏

### 黃芪人參湯

治暑月精神不足兩脚痿軟煩熱嘔噦自汗頭痛皆熱傷肺氣也即補中益氣

湯枋觀加蒼朮一錢神麴五分  
黃栢三分五味子十五粒也

### 清暑益氣湯

治長夏濕熱蒸人四肢困倦精神短少  
懶於動作身熱煩渴小便黃而數大便

溏而頻或泄或痢不思飲食氣促自汗蒼朮一錢  
半黃芪升麻各一錢人參白朮陳皮神麴澤瀉各

五分酒黃栢當歸青皮麥門冬乾葛甘草各三分  
五味子九粒右剉作一貼水煎服

黃芪升麻甘草麥門冬當歸五味子黃栢乾葛是  
清暑補氣也蒼朮神麴陳皮青皮澤瀉理脾也

### 十味香薷飲

消暑和胃補氣香薷一錢半厚朴白扁  
豆人參白朮白茯苓黃芪木瓜甘草各

七分右剉作一貼水煎服或為末  
每二錢熱湯或冷水任調下

### 暑有冒暑中暑傷暑三證

其腹痛水瀉者胃與大腸受  
之惡心嘔吐者胃口有痰飲

此冒暑也宜用黃連香薷散清暑六和湯消暑十  
全飲解暑三白散○其身熱頭疼躁亂不寧或身

如鍼刺者此為熱傷在肉分此傷暑也宜用人參  
白虎湯小柴胡湯貼寒貼○其咳嗽發寒熱盜汗

不止脉數者熱在肺經此中暑也宜用清肺生脉飲白虎湯益元散

### 暑風

中暑復傷風搖擗不省人事者宜先服蘇合香元

手足搖擗其蘇省乃與他藥。暑風暑厥者但以

乃取涼之過也或納涼於涼亭水閣風寒以傷其

發熱惡寒或胃腹痛嘔吐泄瀉宜藿香正氣散

和湯倍半夏加羌活川芎

### 二香散

治感冒暑風身熱頭痛或泄瀉嘔吐香附子

白扁豆甘草各五錢紫蘇葉陳皮蒼朮各一錢厚朴

此藥解表發散

### 暑熱煩渴

身熱自汗煩渴引飲即中暍也宜人參白虎湯竹葉石膏湯

香薷散清肺生脉飲桂苓甘露飲  
通苓散濯熱散醍醐湯春澤湯

### 益元散

治中暑身熱吐瀉腸辟下痢赤白瘰閉盪胃中積聚寒熱宜積氣通九竅六府生津液去

留結消暑蓄水止渴除煩大養脾胃之氣解百藥酒食邪毒滑石六兩甘草炙一兩右細末每三錢溫

蜜水調服欲冷飲者并水調下暄○因寒吐瀉反胃加一名天水散一名神白散暄○因寒吐瀉反胃加

乾薑五錢名曰溫六九○濕熱泄瀉加紅麴五錢名曰清六九俱以陳米飯作丸梧子大白湯吞下

五七寸  
丸

### 玉露散

治暑渴寒水石滑石石膏天花粉各一兩甘草五錢右為細末每三錢井水調下

### 黃連香薷散

治中暑熱渴香薷三錢厚朴一錢半黃連七分半右剉作一貼入酒少許水煎

沉冷服○一名黃連香薷飲

### 清肺生脉飲

治暑傷肺咳喘煩渴氣促黃芪二錢當歸生地黄黃人參麥門冬各一錢五味子

十粒右坐  
水煎服

通苓散

治傷暑煩渴泄瀉尿澁即四苓散加木通車前子茵陳瞿麥等分各一錢右剉入燈心麥

門冬各二十箇水煎服

桂苓甘露飲

治伏暑煩渴引飲滑石二兩茯苓澤瀉石膏寒水石甘草各一兩白朮猪苓肉

桂各五錢右爲末每二錢薑湯調下

濯熱散

治暑熱煩渴及霍亂後渴最妙白礬五倍子烏梅肉甘草各一兩右爲末入白麝四兩拌

勻每二錢新汲水調下  
註。一名龍鬚散

煎湯

解暑熱止煩渴烏梅肉另末一升草果一兩縮砂白檀香各五錢煉蜜五斤右細末八蜜

微沸攪勻磁器盛冷服

春澤湯

治暑熱燥渴引飲無度或水入即吐乃五苓散去桂代人參也

暑病吐瀉

散暑毒入腸胃致腹痛惡心嘔吐泄瀉宜香薷湯

香薷飲子縮脾飲  
大順散桂苓元

六和湯

治暑傷心脾嘔吐泄瀉或霍亂轉筋及浮腫

豆木瓜各一錢縮砂半夏杏仁人參甘草各五分  
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服○加麩炒

黃連一錢名曰  
清暑六和湯

消暑十全飲

治傷暑吐瀉香薷一錢半白扁豆厚朴  
紫蘇葉白朮赤茯苓藿香木瓜白檀香

各一錢甘草五分  
剉作一貼水煎服

解暑三白散

治暑熱引飲過多致吐瀉澤瀉白茯苓  
白朮各二錢右剉作一貼入薑三片燈

心二十莖  
水煎服

香薷湯

治暑病吐瀉香薷三錢白扁豆厚朴赤茯苓  
各一錢半甘草五分右剉作一貼水煎服或



為末湯點二錢服他暑藥皆不及此  
此藟○一方無茯苓有神效

### 香朴飲子

治傷暑吐瀉煩亂香薷一錢半厚朴白扁

豆澤瀉赤茯苓陳皮木瓜瓜半夏人參紫蘇  
葉烏梅肉各七分甘草五分  
作一貼入薑三片棗二枚煎服

### 大順散

治暑月煩渴引飲過多脾胃停冷濕作吐瀉

甘草剉長一寸二兩乾薑杏仁肉桂各四錢  
先將甘草以白沙同炒黃熟次入薑同炒令裂次

入杏仁同炒黃用篩下去沙淨乃入桂為末每二  
錢水煎溫服如煩躁井華水調下

### 桂苓元

治暑月傷冷濕吐瀉桂心赤茯苓右等分為  
末煉蜜和勻每一兩作八九丸井水化下一丸

調

### 縮脾飲

治暑月內傷生冷腹痛吐瀉縮砂研一錢半

草果烏梅肉香薷甘草各一錢白扁豆乾葛  
各七分右剉作一貼  
入薑五片水煎服

伏暑證

伏暑之證背寒面垢少有勞身即熱口開前板齒燥小便已灑灑然毛聳○伏暑者即冒暑

久而藏伏三焦腸胃之間變出寒熱往來霍亂吐瀉瘧痢煩渴或腹痛下血宜酒蒸黃連元消暑元

桂苓甘露散○每於夏月復發者為伏暑也

酒蒸黃連丸

治伏暑嘔渴惡心及年深暑毒不差者黃連四兩清酒七合浸之蒸乾以酒盡

為度右為末麩糊和九梧子大每三十九熟水吞下以胃腸涼不渴為驗○一名小黃龍元

消暑元

治伏暑氣欲絕半夏八兩赤茯苓生甘草各四兩右以醋二升半煮半夏醋盡熬乾右為

末以薑汁糊和丸梧子大每服五十丸熟水吞下藥下即甦

桂苓甘露散

治伏暑引飲泄利滑石一兩石膏寒水石澤瀉乾葛白朮赤茯苓甘草各五錢

人參桂皮藿香各二錢半木香一錢二分半右為末每二錢白湯調下

注夏病

人有遇春末夏初頭痛脚弱食少體熱世俗謂之注夏病屬陰虛元氣不足宜補中益氣湯去

升柴加黃栢白芍藥麥門冬五味子有痰加天南星半夏冊○宜服生脉散及參歸益元湯冊

### 參歸益元湯

治注夏病其證頭眩眼花腿痠脚弱食

減少脉數無力當歸白芍藥熟地黃白茯苓麥門冬各一錢陳皮知母黃栢並酒炒各七分人參五

分甘草三分五味子十粒右剉作一貼入棗一枚米一撮水煎服

### 夏暑將理法

衛生歌曰四時惟夏難將攝伏陰在內腹

心旺腎衰何所禁持忌疎泄通精氣寢處惟宜謹密問默靜志慮和心意冰漿菜茹不宜入必到秋

來成瘧痢○凡盛暑衝熱切不可冷水洗手面大損人目○夏一季是人脫精神之冷水洗腎

衰腎化為水至秋始凝及冬乃堅是故尤慎房室固養精氣○三伏之時大熱傷氣養生家於此

時尤慎之若縱酒恣色則令人內腎腐爛而死○人之心色絡與胃口相應胃氣稍虛或因飢冒

暑則暑毒自口鼻而入凝之於手頰達之於心色如響應聲遇暑以還急漱口而勿嚥可也○虛

人及老入中暑迷厥不省宜竹葉石膏湯麝香加  
附子冷服之麝香○太倉公辟瘟丹暑濕之月燒之  
能辟邪散氣  
防覷麝香散氣

### 暑熱通治藥

治暑之法清心利小便最好暑傷氣宜補  
真氣為要○夏月多食冷物過飲茶水

永漿致傷脾胃吐瀉霍亂故治暑藥多用溫脾消  
食治濕利小便之藥須要識此意○病暑者多

無身痛間有痛者或為澡浴水濕相搏耳門○  
暑病通用香薷散清暑和中散萬病無憂散

### 香薷散

治傷中一切暑病或霍亂吐瀉或昏塞欲絕  
香薷三錢厚朴白扁豆各一錢半右剉作一

貼入酒少許水煎  
去滓沉冷服之

### 清暑和中散

治中暑傷暑諸證霜降後勿用香薷二  
兩猪苓澤瀉滑石草果各一兩半黃連

酒炒厚朴木通車前子炒枳殼縮砂各一兩白木  
赤茯苓陳皮各七錢茴香五錢白扁豆四錢木香  
甘草各三錢右細末每二錢冷水  
調下或剉一兩水煎服亦佳

萬病無憂散 專治夏月霍亂吐瀉似瘧非瘧痢香薷

白扁豆各二兩 草果黃連滑石澤瀉各一兩 二錢 枳殼木通厚朴陳皮赤茯苓車前子猪苓縮砂各八錢 白朮茴香各五錢 六分 木香甘草各二錢 右細末 每二錢滾湯調服 或茶清調下 忌米飲

單方 凡五種

石膏 治天氣暑熱時得病以石膏為主

香薷 主一切暑病及霍亂吐瀉

大麥 即薏草也 治熱渴心悶 煮取濃汁飲之 夏月喝死亦灌之 乾

甜瓜 暑月食之不中暑 氣少食之佳 乾

馬通 臘月馬糞乾者煎湯飲之 治一切暑病 裕

濕

濕乃水氣

多濕即水也東南窪下風雨襲虛山澤蒸氣人

一身盡痛在藏府則清濁混而大便濡泄小便反

澁腹或脹滿濕熱搏則遍身黃如熏色○水氣

有入毒能為風濕痺水腫面黃腹大初自皮膚脚

手入漸至六府令人大小便澁至五藏漸漸加至

忽攻心便死○熱消爍骨肉南土尤

甚大略皆瘴類也○早濕依山則觸嵐氣近水則

霧露之氣為瘴○受南方土氣○東南兩廣山峻水惡地濕

濕熱如春秋時月外感霧毒寒熱腎滿不食此瘴

毒從口鼻入也宜平胃散○飢餓升麻蒼朮湯神術

散○南方地煖故太陰之時草木不黃落伏蟄

不閉藏雜毒因煖而生故嶺南從仲春訖仲夏行

青草瘴從季夏訖孟冬行黃茅瘴其治法與

傷寒無異惟能別其表裏不妄汗下為好○與

升麻蒼朮湯

治嶺南春秋之月感山嵐瘴霧毒氣發

厚朴陳皮枳實桔梗川芎木通升麻柴胡各七分  
黃連黃芩木香甘草各五分左右剉作一貼八薑五

片水煎服

### 神木散

治中霧露山嵐瘴氣頭疼項強蒼朮三錢川

芎白芷細辛葉本羌活甘草各一錢右剉作

### 脉法

一貼入薑三片葱白二莖水煎服

傷濕之脉細濡門○濕熱之脉緩大○或澁或

細或濡或緩是皆中濕可得而斷○脉浮而緩或

### 濕氣侵人不覺

風寒暑暴傷人便覺濕氣熏襲人多不

覺其自外而入者長夏鬱熱山澤蒸氣

冒雨行濕汗透沾衣多腰脚腫痛其自內得者生

冷酒麪帶脾生濕鬱熱多壯腹腫脹西止人多內

濕東南人多外濕○人居戴履受濕最多行往

坐卧實無染於冥冥之中滯而為喘嗽漬而為嘔



吐瀉而為泄瀉溢而為浮腫濕痰熱則發黃濕遍  
體則重著濕入關節則一身盡痛濕聚痰涎則昏  
不知人  
人指

# 霧露清濁之邪中人

寸口陰脈  
少陰之分  
名曰霧  
露濁邪  
中於下

人足脛逆冷便尿妄出或腹痛下利宜理中湯四  
逆湯  
發熱頭項強頸  
於上焦太陽之分名曰  
發熱頭痛項強頸  
邪中

香正氣散利後脈不緊手足溫則愈若脈陰陽俱  
邪也必吐利後脈不緊手足溫則愈若脈陰陽俱

緊口出氣出胎滑口乾燥踈臥足冷  
鼻涕出舌上胎滑口乾燥踈臥足冷

# 火熱生濕

潤秋涼則萬物乾燥失熱而怫鬱則生濕也  
火熱生濕潤秋涼則萬物乾燥失熱而怫鬱則生濕也

因濕生痰故用二陳湯  
風行濕蓋風能勝濕也  
而熱氣多為無病端  
怫鬱水液不能宣通停滯而生水濕也  
因於火熱

月之間濕令大行燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰以下痿軟癱瘓不能動行步不正兩足歌

### 濕病類傷寒

中濕風濕濕溫皆類傷寒中濕之由風雨襲虛山澤蒸氣濕流關節一身盡痛風濕

者其人先中濕又傷風故謂之風濕其一為中濕蓋而中暑名曰濕溫傷寒有五其一為中濕蓋風濕之氣中人為病發熱與溫病相類故曰濕溫也難經曰濕溫之脈陽濡而弱陰小而急

### 濕病有七

有中濕風濕寒濕濕痺濕熱

### 中濕

面色浮澤是為中濕中濕之內經中濕之脈沉而微緩

肢關節疼痛而煩或一身重著久則浮腫喘滿昏不知人挾風則眩暈嘔噦挾寒則攣拳掣痛癰○外中濕者或感山嵐瘴氣或被雨濕蒸氣或遠行涉水或久卧濕地而得○內中濕者因生冷過多或厚味醇酒停滯脾虛不能運化而得○中濕宜勝濕湯除濕湯加味木附湯白朮酒或五苓散

加羌活川芎  
蒼朮麴

### 勝濕湯

治坐卧濕地或雨露所襲身重脚弱大便泄瀉  
白朮三錢人參乾薑白芍藥附子炮桂枝

白茯苓甘草各七分半右剉作  
一貼入薑五棗二水煎服

### 除濕湯

治中濕滿身重着蒼朮厚朴半夏各一錢半  
藿香陳皮各七分半甘草五分右剉作一貼

八薑七片棗二  
攸水煎服

### 加味朮附湯

治中濕諸證附子炮二錢白朮赤茯苓  
甘草炒各一錢半右剉作一貼入薑七

棗二水煎服日再繞見身痺三服後則當如  
冒狀勿怪蓋朮附並行皮中逐水氣故爾

### 白朮酒

治中濕口噤不省白朮一兩剉作一貼以  
酒二盞煎至一盞頓服惡酒則水煎服

### 風濕

太陽經感風濕相搏其骨節煩疼者濕氣也汗出身  
關節不利故痛其掣而不能屈伸者風也

寒脉沉微短氣小便清而不利者寒閉也惡風者  
表虛也或微腫者陽氣不行也宜甘草附子湯



附湯白朮附子湯短氣惡風不欲去衣濕勝則小便  
勝則衛虛汗出短氣惡風不欲去衣濕勝則小便  
不利或身微腫宜防一身盡痛法當汗出而解值天  
湯不利○風濕相搏一身盡痛法當汗出而解值天  
陰雨不止醫云可發汗汗之而病不愈者何也答  
曰發其汗汗太出者但風氣去濕氣在故不愈也  
若治濕風者發其汗但微微自欲汗出者風濕俱  
去也○風濕相搏骨節煩疼掣痛近之則痛劇

甘草附子湯治風濕桂枝四錢甘草附子炮白朮各一錢

朮附湯治同上白朮三錢附子二錢甘草一錢

白朮附子湯治風濕身煩疼不能轉側白朮三錢附子炮甘草炙各一錢右剉作一貼入薑

七棗二水煎服

麻杏薏甘湯治風濕身疼不能轉側日晡加劇麻黃

作一貼水煎服

防已黃芪湯

治風濕身重痛自汗防已黃芪各三錢白朮二錢甘草一錢半右剉作一貼入

薑三片棗二枚水煎服

羌附湯

治風濕相搏肢體掣痛浮腫羌活附子炮白朮甘草各一錢半右剉入薑五水煎服

除濕羌活湯

治風濕相搏一身盡痛蒼朮葉本各二錢羌活一錢半防風升麻柴胡各一錢

右剉作一貼水煎服

寒濕

一名除風濕羌活湯。治寒濕交攻身體冷痛宜溲溼以尿清不渴為寒濕生

○附除濕湯治濕中不和湯五積散。治腰下冷重或痛是為腎着宜用腎着湯。復煎散

溲濕湯

治寒濕所傷身體重着如坐水中小便澀大

各一錢橘紅丁香各五分右剉作一貼入薑三棗二水煎服。○一方蒼朮半夏麴各二錢厚朴藿

香陳皮白朮白茯苓各一錢  
甘草五分補法服法如上

加劑除濕湯治傷濕身重腰痛四肢微冷嘔逆瀉泄

一錢橘紅桂皮厚朴各五分右剉作一貼入薑三棗二水煎服

生附除濕湯治寒濕蒼朮二錢附子生白朮厚朴木

水煎服

治濕中和湯治寒濕蒼朮炒二錢白朮陳皮赤茯苓

貼八薑三片燈心  
一撮水煎服

蒼朮復煎散治寒濕相合肢體皆痛行步無力蒼朮

麻各五分黃柏三分紅花一分右剉先以水三盞

煎蒼朮至二盞入諸藥復煎至一盞去滓空心熱  
服一各蒼  
朮復煎湯

濕痺詳見風門

濕熱六氣之中濕熱為病十居八九。內經曰因於濕有如是濕熱不攘大筋繆短小筋弛長繆短為

拘弛長為痿。○大筋受熱則縮而短小筋得濕則引而長縮短故拘攣而不伸引長故痿弱而無力

氣清其體虛故聰明得氣者為諸陽之會其位高其

通沉重而不爽利似乎有物以蒙冒之失而不治

拘攣濕傷筋不能束骨故小筋為痿弱也。○濕勝筋痿熱勝筋縮實者三花神祐丸防風虛者宜

清燥湯方視部○有氣如火從腳下起入腹此

濕鬱成熱而作宜蒼朮黃柏牛膝防己作丸服或

二妙丸加味二妙丸方觀單蒼朮丸能飲食病在

單蒼朮丸常服除濕壯筋骨明目蒼朮一斤米泔浸



宿並焙乾為末神麴糊和丸。或為末每二錢空  
心鹽湯或酒  
調下亦得

### 二妙丸

治濕熱蒼朮黃柏等分  
為末滴水為丸服之

### 濕溫

傷於濕者兩脛逆冷胃腹滿多汗頭痛妄言其人嘗  
而弱陰小而急治在太陽不可發汗汗出必不能

言耳聾不知痛所在身青面色變名曰重暍如此

死者醫殺之蒼朮白虎湯主之方觀濶門○一人

季夏得病曾頃多汗兩足逆冷諸語予診之其脉

關前濡關後數是濕溫蓋先傷暑後受濕也先用

人參白虎湯次服蒼朮白虎湯足漸溫汗漸止三

日而愈○一人病遍身汗兩足冷至膝下腹滿

不省人事六脉皆小弱而急孫曰此病傷暑陽微

厥也用五苓散白虎湯而愈九陰病脛冷則臂亦

冷此則脛冷而臂不冷所以知是陽微厥也○

濕溫宜苓朮湯茯苓白朮湯○濕

溫與中暑同但身凉不渴耳

苓朮湯

治冒暑遭雨暑濕鬱發四肢不仁半身不遂或入浴暈倒口眼喎斜手足不仁皆濕溫類

也赤茯苓白朮乾薑澤瀉桂心各一錢右剉作一貼水煎服

茯苓白朮湯

治濕溫赤茯苓朮白朮乾薑桂心甘草各一錢右剉作一貼水煎服

酒濕

酒濕之為病亦能作痺證口眼喎斜半身不遂渾似中風舌強語澁當瀉濕毒不可作風病治之而

汗也宜用蒼橘湯

蒼橘湯

治酒濕蒼朮二錢陳皮一錢半赤芍藥赤茯苓各一錢黃柏威靈仙羌活甘草各五分右

剉作一貼水煎服

破傷濕

破傷入水濕口噤身強直壯蠟燭為粉付瘡口仍取末二錢甘草湯調服

濕多身痛暑無身痛

暑病多無身痛蓋傷氣而不傷形故也

難以轉側風濕之痛一身盡痛○濕病多身痛中濕身痛則害人皮肉筋脉蓋濕傷形形傷故痛○濕氣感



關節則一身盡痛其掣而不能屈伸者風也煩疼濕則關節不利故痛其掣而不能屈伸者風也煩疼濕

### 濕有內外之殊

陰濕有自外者有自內出者東南地多

脚氣之疾治當汗散久則宜踈通滲泄西北地高多食生冷濕麪乳酪飲酒濕氣內鬱為鼓脹浮腫

之類治宜通利二便

### 濕病治法及通治藥

便濕家治法大槩宜發微汗及利小便

○治濕不利小便非其治也○濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為故而止平胃散內觔主

之濕在上宜微汗而解不欲汗多故不用麻黃乾葛輩宜微汗用防己黃芪湯○濕在中下宜利

小便此淡滲治濕也五苓散主之○治濕之法通利小便為上益脾順氣次之○治濕莫若生

附蒼朮為快宜用生附湯○治濕通川芎蒼朮二陳湯加桑白皮為主上焦濕加羌活川芎

中焦濕上加猪苓茯苓澤瀉下焦濕加黃柏防已木通滑石熱則上加黃芩中加黃連下加黃芩○木通用

湯 滲濕

生附湯

治傷生濕諸證又治寒濕蒼朮杜仲各一錢半

七分右坐作一貼入薑三棗二水煎服

滲濕湯

治一切濕證蒼朮白朮赤茯苓各一錢半陳皮澤瀉猪苓各一錢香附子川芎縮砂厚朴

各七分甘草三分右剉作一貼入薑三片燈心一分撮水煎服

濕病禁汗下及灸

凡濕病忌不得以火攻并轉利之若

利者死下利不止者亦死○治濕不得發汗及灼艾灸之○濕病誤下則為喘噦誤汗則發

痙而不可下○濕家不可汗汗之則發痙發痙者斃

難有

濕病大汗則成痙

太陽病發汗太多因致痙濕家大發汗亦作痙蓋汗太多則亡陽不能養

筋故筋脉緊急而成痙其證身熱足冷頸項強急  
惡寒時頭熱面赤目赤獨頭面搖卒口噤背反張  
者是也亦名破傷風

### 單方

凡十種

#### 蒼朮

治濕上下部皆可用。○山嵐瘴氣。○或湯或散或酒

浸常服最妙。○兩朮皆可服。

#### 澤瀉

除濕之聖藥也。其功長於行水也。

#### 芎藭

能去卑濕風氣。或末服或煎服皆可以治上部濕尤佳。

#### 防己

能治濕風口面喎斜木通同功。剉煎服之佳。

#### 藁本

辟霧露與木香同治霧露之氣。治上部風濕最佳。煎服之。

#### 茯苓

淡能利竅。甘以助陽。氣除濕之聖藥也。仙方有服餌之法。修製久服為佳。

龜肉

除濕及瘡氣作  
臠常食之佳

鰾肉

主濕痺煮熟取肉和五味作羹食之  
○九濕病宜食猪肉螺鰾之屬是也

木瓜

主濕痺又治腰脚濕氣可  
煎服九服或生食並佳

酒

辟霧露之氣○昔有三人晨行觸霧一人健一人  
病一死一健者飲酒病者食粥死者空腹蓋酒能

禦霧露辟邪  
氣故也

猪肝

勝濕可煮食之昔閔叔留寓  
常食猪肝蓋為濕疾也

薏苡

去濕輕身勝瘡氣作末煮粥常服  
之昔馬援南征多載之即此也

豺皮

主冷濕痺熟之以纏  
病上或裹軟脚良

土猪

主濕病取肉煮食又用皮  
坐卧其上最去濕痺

桑枝茶

去濕氣常服最好又與赤小  
豆同煮作粥常食尤佳

鍼法

濕病禁灸惟濕痺及濕熱脚氣痿  
證宜施鍼以通經絡之氣為佳

燥

燥因血少

內經曰諸澁枯涸乾勁皴揭皆屬於燥○火熱勝則金衰而風生緣風能勝濕熱耗液

而為燥陽實陰虛則風熱勝于水濕而為燥也蓋肝主筋而風氣自甚又燥熱加之則筋太燥也燥

金主於收斂其脉緊澁故不能榮養百骸故也○禁也夫燥之為病血液衰少不能榮養百骸故也○

脉法

傷燥脉濡○脉緊而澁或浮而弦或乳而虛

燥者肺金之病

由燥者肺金之本燥金受熱化以成燥澁風能勝濕熱能耗液而成燥也燥於

外則皮膚皴揭瘙痒燥於中則精血枯涸燥於上則咽鼻焦乾燥於下則便尿結閉宜當歸承氣湯

類○內經曰燥勝則津液涸故皮膚乾燥○燥勝則津液涸故皮膚乾燥○

燥宜養血

經曰燥者潤之養血之謂也○積液固能生皮積氣亦能生液宜服瓊玉膏○



膚皴揭折裂血出大痛或皮膚瘙癢爪甲浮起枯乾皆火燔肺金燥之甚也宜以四物湯去川芎合生脉散加天門冬天花粉黃栢知母酒紅花生甘草之類門入○榮衛枯涸濕劑所以潤之二門冬人參北五味子枸杞子同為生脉之劑二黃元亦好燥○燥病宜服瓊脂膏天門冬膏地仙煎生血潤膚飲○防風通聖散能清熱潤燥助聖散

### 當歸承氣湯

治燥之上藥也當歸大黃各二錢芒硝七分甘草五分右剉作一貼水煎八芒

硝攪化服之類

### 瓊脂膏

治燥病生地黃二十斤搗取汁去渣白蜜二斤煎沸去沫鹿角膠真酥油各一斤生薑二

兩搗取汁右先以慢火熬地黃汁數沸綿濾取淨汁又煎二十沸下鹿角膠次下酥油及蜜同煎候如錫磁器收貯每服一二匙溫酒下甞服

### 天門冬膏

治燥病天門冬生去心搗絞取汁瀝去滓砂鍋熬成膏酒服一二匙甞服



地仙煎治同上山藥一斤杵細杏仁一升研細生牛乳一升同攪勻絞取汁盛磁瓶重湯煮一

日酒服一匙

生血潤膚飲治燥證皮膚疥裂手足爪甲枯燥搔之

熟地黃麥門冬當歸黃芪各一錢酒片苓瓜蒌仁桃仁泥各五分升麻二分酒紅花一分五味子九

粒右剉作一貼水煎服

單方凡四種

山藥生者治皮膚乾燥以此潤之

牛酪作粥常服最妙

天麥門冬俱治燥病煎湯服或作丸久服佳

生熟地黃皆生血潤液作煎丸久服為妙

火

火有君相之二

五行各一其性惟火有二曰君火入乎

動者也以名而言生於虛無守位稟命因其動而可謂之君

以位而言生於虛無守位稟命因其動而可謂之君

謂之相天主生物故恒於動人所為也此生亦恒於動

火為元氣之賊

火能消物凡燦金虧土旺木涸水者皆

速其勢甚彰其死甚暴人身有二火曰君火猶人

火也曰相火猶龍火也在氣交之中多動少靜凡

動皆屬火化動之極也病則死矣。相火易起

五性厥陽之火相扇則妄動矣火起於妄變化莫

測無時不有煎熬真陰陰虛則病陰絕則死。陳○

又有藏府厥陽之火根於五志之內六慾七情激

之其火隨起大怒則火起於肝醉飽則火起於胃

房勞則火起於腎悲哀則火起於肺心為君主自



焚則死矣。火者元氣穀氣真氣之賊也。堯

### 脉法

火脉洪數虛則浮。○脉沉而實大為實火。○洪數

見於左寸為心火。○見於右寸為肺火。○見於兩尺為腎

關為肝火。○見於左關為脾火。○見於兩尺為腎

也。命門之火。○男子兩尺洪大者必遺精陰火盛

### 辨五臟熱證

其身熱有五而實火沉大隨其所見細數為害。○浮數

### 肝熱

肝熱者按之肌肉之下至骨之上乃肝之熱也。寅

癢不能起於床宜瀉青丸。○五臟觀柴胡飲子。○

### 心熱

心熱者微按至夜膚之下加力按之則全不熱是熱

在血脉也。○日中太甚其證煩心。○心湯。○見神部

熱而嘔宜導赤散。○五臟觀黃連瀉心湯。○見東垣

脾熱

脾熱者輕手捫之不熱重按至筋骨亦不熱不輕

證必怠惰嗜卧四肢不收無氣以動實熱則用人參黃芪

散散方觀調胃承氣湯寒門虛熱則用人參黃芪

肺熱

肺熱者輕手乃得微按全無瞥瞥然見於皮毛上

熱輕者宜瀉白虎湯散方觀人參地骨

腎熱

腎熱者輕按之不熱重按至骨其熱蒸手如火如

起於床滋腎丸方觀六味

柴胡飲子

治肝熱柴胡黃芩人參當歸赤芍藥大黃

服之

人參地骨皮散

治肺熱人參地骨皮柴胡生地黃黃



榮中熱脉按不足舉有餘乃陽有餘陰不足也積冷

# 手按辨熱深淺

之以手捫摸有三法輕手捫之則熱重按

按至筋骨之間則熱蒸手極其輕摸之則不熱是

熱在筋骨間也疎○輕手捫之不熱重手按之亦

不熱不輕不重按之則熱是熱在筋骨之上皮毛

血脉之下乃熱在肌肉也以三黃丸通治之疎○

輕手按之熱甚重手按之不甚熱此熱在肌表宜

清之重手按之熱甚而烙手輕手按之不覺熱此

熱在肌肉之傳正

內宜發之傳正

# 審臟腑熱之部分

內經曰心熱病者顏先赤肝熱病者左頰先赤肺熱

病者右頰先赤腎熱病者頤先赤○心居胃

背心熱則胃熱肺熱則背熱○肝膽居脇肝膽熱

則當脇亦熱○腎居腰腎熱則當腰亦熱○胃居

臍上故胃熱則臍以上熱○腸居臍下故腸熱則

熱臍以下

火熱有實有虛

以能食而熱口舌乾燥大便難者實熱也

盛而有力者是已鍊○不能食而熱自汗氣短者是

虛熱也以甘寒之劑瀉熱補氣脉虛弱無力者是

已鍊○五藏陰也所主皆有形骨肉筋血皮毛是

也此五藏皆陰足陰足而熱反勝之是為實熱若

骨痿肉燥筋緩血枯皮聚毛落者陰不足而有熱

疾是虛熱也○脉實數者實熱也○實火內

外皆熱口渴晝夜潮熱入裏宜調胃承氣湯熱在表宜羌活

冲和湯熱瀉門熱○虛火潮熱有問口燥不渴宜人

宜白虎湯熱瀉門見○或補中益氣湯加芍藥黃柏

○實火可補瀉黃連解毒湯之類

虛火可補參朮生甘草之類

熱有晝夜之分

上晝熱則行陽二十五度宜柴胡飲子

飲○平旦發熱熱在行陽二十五度宜四順清涼

白虎湯以瀉氣中之火日晡潮熱熱在行陰之分

腎氣主之故用地骨皮散以瀉血中之火○夜



知母地骨皮晝則靜夜則發熱者熱在血分四物湯加知母黃柏黃連梔子柴胡牡丹皮○晝夜

俱發熱熱在氣血之分四物湯合小柴胡湯加黃連梔子○氣分實熱白虎湯血分實熱四順清

涼飲氣分虛熱清心蓮子飲○病在氣夜病在血晝發少而降火湯○凡病晝病在氣夜病在血晝發少而

夜發多者足太陽膀胱血中浮熱微有氣也有時而發有時而止知邪氣不在表不在裏知在經絡

中也夜發多者是邪氣下陷之深當從熱入血室而論之宜瀉血湯退熱湯○

### 四順清涼飲

治血熱大黃蒸當歸赤芍藥甘草炙各一錢二分半○剉作一貼入薄荷十葉

水煎服○子○一

### 地骨皮散

治血熱及陽毒火熾○身壯熱石膏二錢柴胡黃芩知母生地黄黃各一錢羌活麻黃

各七分半○地骨皮赤茯苓各五分○剉作一貼入薑三片水煎服○

### 瀉血湯

治夜間發熱生地黄黃酒洗○柴胡各一錢熟地黃蒲黃丹參當歸酒洗○防己酒洗羌活甘草

退熱湯

生地黃蒼朮各七分當歸身升麻  
各五分右剉作一貼水煎服

火有上中下三焦之異

熱在上焦者因咳爲肺痿熱在中焦者爲堅<sub>謂</sub>也<sub>便</sub>熱在下焦

者為尿血淋閉  
痛口舌生瘡○  
中焦○  
有熱  
腎膈煩躁  
飲赤腫頭項腫  
○

下焦有熱小便赤澀大便秘結○五藏俱熱乃三焦熱也即生癰瘡瘰癧及五般痔疾暄

上焦熱

宜用  
涼膈散  
防見  
龍腦  
飲子  
抑青  
丸清  
心湯  
黃芩  
湯清  
金丸  
朱砂  
涼膈  
丸  
元黃  
連清

既濟解毒湯  
既濟解毒湯  
既濟解毒湯  
既濟解毒湯  
既濟解毒湯  
既濟解毒湯  
既濟解毒湯  
既濟解毒湯  
既濟解毒湯  
既濟解毒湯

龍腦飲子

治咽喉腫痛  
一兩二錢  
甘草蜜炙  
六錢  
石  
膏  
四錢  
瓜

萋根 縮砂 各三錢 藿香 葉二錢 四分  
 右爲末 每二錢 或三錢 蜜水調下 藪

抑青丸

伐心經之火無治酒熱黃連酒炒或薑汁炒  
右為末粥丸白湯吞下二三十九丸心丹一名

黃連丸

清心湯

治上焦積熱甘草一錢七分連翹梔子大黃  
酒蒸薄荷黃芩黃連各七分朴硝五分右剉

作一貼入竹葉七片蜜少許  
同煎至半入硝去滓溫服心丹

黃芩湯

治心肺蘊熱口瘡咽痛小便淋濁澤瀉梔子  
黃芩麥門冬木通生地黃黃連甘草右剉作

一貼入薑五片水煎服心丹

清金丸

治肺火片苓酒炒為末粥丸白湯  
下二三十丸心丹一名與點丸心丹

朱砂涼膈丸

治上焦虛熱肺腕咽膈有氣如烟搶上  
黃連梔子各一兩人參赤茯苓各五錢

朱砂三錢龍腦五分右為末蜜丸  
梧子大熟水下五七九日三服疎

九味清心元

治心胃毒熱蒲黃二兩半犀角二兩黃  
芩一兩半牛黃一兩二錢羚羊角麝香

龍腦各一兩石雄黃八錢金箔一千二百箔內四百箔為衣右為末蜜和兩作三十九金箔為衣每

用一丸熟水化服醫

### 黃連清膈丸

治心肺間熱麥門冬一兩黃連五錢鼠尾黃芩三錢右為末蜜丸萊豆大溫水

下二三十九丸

### 上清元

治上焦風熱薄荷葉一斤縮砂四兩黃芩防

風桔梗甘草各二兩右為末蜜和兩作二十丸每用一丸含化嚥下類

### 清金降火丹

治心肺虛熱天門冬麥門冬蓮實各一兩五味子五錢砂糖五兩龍腦三分右

為末蜜和兩作二十九丸含化嚥下類

### 子苓散

白茯苓麥門冬桔梗生地黄各五錢右為末

先用竹葉一握小麥七十粒薑三片水三盞煎至一盞半入藥末三錢再煎至七分去滓溫服

一方剉取一兩竹葉一握小麥七十粒薑三片同水煎服

### 加減涼膈散

甘草一錢半梔子治熱在上焦連翹二錢

各五分右剉作一貼水煎服。涼膈散去大黃芒硝加桔梗倍甘草或加防風同為舟楫之劑浮

而上之治胃膈中與六經之熱以手足少陽之氣

俱下膈絡胃中三焦之氣同相火遊行於身之表

能於無形之中至高之分此藥浮載亦至高之劑故

### 中焦熱

宜用調胃承氣湯。觀桃仁承氣湯。觀白朮除

濕湯既濟清神散

### 洗心散

治心中焦有熱頭目昏重咽喉腫痛口舌生瘡

赤芍藥甘草各一錢白朮五分右剉作一貼入薄荷七葉水煎服

白朮除濕湯

治中焦有熱午後發熱尿黃沉困及汗

澤瀉知母各一錢赤茯苓人參柴胡甘草各八分右剉作一貼水煎服

既濟清神散

治中焦熱清上實下枯梗黃芩赤茯苓川芎梔子當歸羌活白朮各一錢知母

薄荷甘草各五分右剉作一貼煎水調蜜一匙服

下焦熱

宜用大承氣湯歸飲子黃柏九回金九佐金九散防風當歸飲子黃柏九回金九佐金九

立效散

治下焦結熱小便赤黃淋痛瞿麥四錢梔子炒二錢甘草一錢右剉作一貼入連根葱白

七箇生薑七片燈心五十莖同煎服

五苓散

治腎氣內虛邪熱流入於腎經尺脉洪大小便頻澁赤濁而痛宜以瞿麥燈心煎湯調五

苓散藥有喜防覲其熱則勿

防風當歸飲子

治心肝火補脾腎陰治風熱燥熱濕熱補虛之良劑也滑石三錢柴胡人

參赤茯苓甘草各一錢大黃當歸赤芍藥防風各五分右剉作一服入薑三片水煎服○大黃瀉

陽明之濕熱從大便出滑石降三焦之妄火從小便出黃芩以涼膈防風以清頭目人參甘草以補

### 黃栢丸

去腎經火燥下焦濕及陰火氣從臍下起者黃栢一味炒褐色為末水丸服之空心○

一名大補丸○

### 回金丸

伐肝火黃連六兩吳茱萸一兩右為末蒸餅和丸梧子大空心白湯下三五十九○

名黃連丸○

### 佐金丸

佐肺金以伐肝木之火片苓六兩吳茱萸一兩右末蒸餅丸服如上法○

### 通治三焦火

宜用三黃湯三黃元防見三補丸加朱金

防風通聖散  
風觀清火湯

三補丸去三焦積熱瀉五藏火黃芩黃連黃柏各五分

七十丸

加味金花丸瀉三焦火止嗽化痰清頭目黃連黃柏黃芩並酒炒梔子各一兩大黃煨人參

半夏桔梗各五錢右為末滴水為丸梧子大茶清下三十丸

清心丸治三焦熱黃柏生二兩天門冬麥門冬各一兩黃連五錢龍腦一錢右為末蜜丸梧子大

臨卧薄荷湯吞下一二十丸

大金花丸治三焦火熱黃連黃柏黃芩太黃各等分

金花丸又名既濟解毒丸

清火湯治三焦熱大黃酒蒸一錢半桔梗玄參各一錢二分連翹梔子炒芒硝片苓酒炒黃連酒

炒貝母天花粉獨活前胡柴胡赤茯苓枳殼各一錢薄荷羌活川芎各八分防風六分甘草四分



剉分作二貼  
水煎服

### 積熱

藏府積熱煩赤煩渴口舌生瘡五心煩躁便尿秘  
澁或溫壯連滯致生瘡癰疽○欲去積熱三

黃湯元第一藥耳凡熱皆出於心熱甚則能傷血  
熱出於心洗心散坊見熱附不可關熱能傷血四順

清涼飲坊見又不可無也若酒後之麪飯後之酒  
最易生熱又當防於未然○積熱宜用三黃湯

三黃元加減三黃元散妙香丸  
散紫雪紅雪通中散妙香丸

### 三黃元

治三焦積熱大黃煨黃芩黃連各等分右為  
末蜜丸梧子大熟水下三五十九空心暄

### 三黃湯

治同上以三黃元材每取一  
錢半剉作一服水煎服暄

### 涼膈散

治積熱煩躁口舌生瘡目赤頭昏腸胃燥澁  
便尿秘結連翹二錢大黃芒硝甘草各一錢

薄荷黃芩梔子各五分右剉作一貼入青竹  
葉七片蜜少許同煎至半入硝去滓服

### 紫雪

治一切積熱口舌生瘡狂易叫走肉外煩熱不  
解及野道熱毒黃金十兩寒水石石膏各四兩

八錢玄參一兩六錢犀角羚羊各一兩甘草八錢升麻六錢沉香木香丁香各五錢以水五升先煮黃金及二石至三升入芒硝三兩二錢慢火煎以諸藥再煎至一升去滓入芒硝三兩二錢更下朱砂麝香末各三錢急攪不住凝入磁盆中更下朱砂麝香末各三錢細細嚥之或以井水調候冷凝成紫雪每取一錢

下一錢

### 紅雪通中散

治積熱除毒熱開三焦利五藏口瘡重舌喉閉腸癰等證朴硝八兩蘇木六錢

黃芩升麻羚羊角各三錢赤芍藥人參檳榔枳殼竹葉木香甘草各二錢梔子葛根木通桑白皮藍葉大青各一錢半朱砂一錢麝香五分右除朴硝朱砂麝香外細剉以水二升五合同煎至九合濾去滓煎沸下朴硝以柳枝不住手攪候凝次下朱砂麝香末盛磁器中經宿即成每取一二錢新汲水調下

### 妙香丸

治積熱潮熱解五毒朱砂九錢牛黃龍腦膩粉麝香各三錢巴豆三十二箇去皮心膜炒

去油熟研金箔九片右合研勻煉黃蠟六錢入白  
沙蜜少許和勻兩作三十九每用一九米飲或涼  
水吞下取轉下一切惡毒涎如要藥速行以鍼刺  
一眼子冷水浸少時服其效更速施○此疎快腸

胃制伏木火  
之劑也

### 骨蒸熱

蒸病有五一日皮蒸其根在肺四曰外蒸其根在脾

五曰內蒸其根在五藏六府蒸病皆因陰氣不足  
血氣不榮骨髓枯竭而得之腎主骨以其先從骨  
熟故曰骨蒸○凡人嗜慾無節勞傷過度真水  
枯竭陰火上炎而發蒸蒸之燥熱古方名曰蒸病  
其證咳嗽發熱咯血吐血痰白濁白淫遺精盜汗精  
神恍惚日漸羸漸成勞劇○肺蒸鼻乾○大  
腸蒸右鼻孔痛○皮蒸舌白唾血○膚蒸昏昧嗜  
卧○氣蒸鼻乾喘促氣熱○心蒸舌乾○小腸蒸  
下唇焦○血蒸髮焦○脉蒸唾白浪語脉緩急不  
調○脾蒸唇焦○胃蒸舌下痛○肉蒸食無味而  
嘔煩躁不安○肝蒸眼黑○膽蒸眼白失色○筋  
蒸瓜甲焦○三焦蒸乍熱乍寒○腎蒸兩耳焦○

膀胱蒸右耳焦。腦蒸頭眩熱悶。腎蒸肢細跌腫。中熱。骨蒸齒黑腰痛足逆冷。藏府皆熱。胞蒸小便黃赤俱宜五蒸湯。五蒸丸。麥煎散。地骨皮散。鱉甲飲。補天丸。逍遙散。婦人骨蒸。四仙散。團魚散。骨蒸發熱積病最多。先服荊蓬煎。元樹觀後服清骨散。暗合妙理。物湯加地骨皮。牡丹皮煎服。牡丹皮。人參。清肌散。骨皮。瀉腎火。骨蒸用柴前梅連散。入參。清肌散。知母。黃柏。地骨皮。麥門冬。秦艽。羌活。青蒿。鱉甲。石膏。竹葉。烏梅之類。是也。齏。

### 骨蒸不治證

骨蒸之極聲啞咽痛面鰲脉躁直視汗出如珠喘乏氣促皮焦唇反皆為不治

之證。不舉此則骨痿欲斯疾之有瘳也。難哉。不舉此則骨痿欲斯疾之有瘳也。難哉。不舉此則骨痿欲斯疾之有瘳也。難哉。

### 五蒸湯

治骨蒸潮熱脉數口乾煩躁石膏二錢生地黃乾葛各一錢半人參知母黃芩赤茯苓各

一錢甘草生五分右剉作一貼八竹葉七片粳米一合小麥二合同煎服



# 五蒸丸

治同上青蒿童便浸地骨皮生地黃石膏各一兩當歸七錢胡黃連五錢鱉甲一片右爲

末蜜丸梧子大每七十九小麥煎湯下

# 麥煎散

治骨蒸黃瘦口臭肌熱盜汗赤茯苓當歸乾漆鱉甲醋炙常山大黃煨柴胡白朮生地黃

石膏各一兩甘草半兩右麤末每服三錢小麥五十粒同煎服

# 地骨皮散

治骨蒸潮熱地骨皮秦艽柴胡枳殼知母當歸鱉甲醋炙各一錢川芎甘草各五分

右剉作一貼入桃柳枝各七寸薑三片烏梅一箇同煎服

# 補天丸

治陰虛骨蒸發熱羸瘦紫河車洗淨以布絞乾用補腎丸勸覲藥末搗細焙乾再研爲末

酒煮米糊和丸梧子大每服七八十丸夏加五味子

# 地仙散

治骨蒸肌熱一切虛煩地骨皮四錢防風二錢人參甘草熟薄荷各一錢右剉作一貼入竹

葉五片薑三片水煎服經四十一方有麥門冬一錢烏梅一箇無薄荷○人年四十以下患勞怯且不

必補只先退潮熱調理  
可愈此方退熱如神

### 團魚散

治骨蒸潮熱咳嗽貝母前胡知母杏仁柴胡各等分團魚二箇蠟右藥同團魚煮魚熟提

起去頭取肉連汁食之却將前藥焙乾為末就煎團魚裙甲及骨更煮汁一盞和藥為丸梧子大煎

黃芪湯勸覲吞下病安仍服  
黃芪益損湯勸覲調理

### 清骨散

初覺五心煩熱欲成勞瘵骨蒸如神生地黃柴胡各二錢熟地黃人參防風各一錢薄荷

七分秦芩赤茯苓胡黃連各五分  
左右剉作一貼水煎服

### 柴前梅連散

治骨蒸勞熱久而不痊三服除根柴胡前胡烏梅胡黃連各二錢右剉作一貼

取童尿二盞猪膽一枚猪脊髓一條韭白半錢煎至一盞去滓服  
心丹○此劫劑也胃虛者量用之

### 人參清肌散

治虛勞骨蒸潮熱無汗人參白朮白茯苓赤芍藥當歸柴胡葛根半夏麴各一

錢甘草五分左右剉作一貼入薑三棗二水煎服○一方有黃芩

五心熱

五心煩熱者是火鬱於地中也四肢者脾土也

則發之是也。堯。凡男女四肢熱。肌熱。筋熱。骨熱。中熱。如燎。捫之。烙手。此熱伏土中。由血虛而得。或

過食冷物。抑遏陽氣於脾土之中。火鬱則發。熱不宜

升陽散火湯。火鬱湯。堯。虛損。手。心。脚。心。發熱。不

可當加減。小柴胡湯。主之。醫。○。兩手大熱。如火。是

升陽散火湯

治火鬱及五心煩熱。升麻。乾葛。羌活。獨

分。防風。五分。甘草。生四分。右剉作一

火鬱湯

治同上。羌活。升麻。乾葛。白芍藥。人參。柴胡。甘

寸水煎服。堯。

加減小柴胡湯

治手足心熱。不可當本方加

一方

治手足心熱神妙施子香附蒼朮白芷半  
夏麴川芎各等分右末神麴糊丸服

潮熱

潮熱者有時而熱不失其時寒熱者寒已而熱相繼而發至於發熱則無時而熱也

為內傷為虛潮熱無時為外感為實  
熱者熱在行陽之分肺氣主之故為實  
以瀉氣中之火○日晡潮熱者熱在行陰之分腎

氣主之故用地骨皮飲地骨皮散中益氣湯  
火主之故用地骨皮飲地骨皮散中益氣湯  
虛無汗潮熱宜用人參清肌散方見○血湯

熱宜用人參養榮湯○血虛無汗潮熱宜茯苓  
補心湯○氣血兩虛有汗潮熱宜加減逍遙散○血虛

湯○氣血兩虛有汗潮熱宜加減逍遙散○血虛  
夜分潮熱宜四物二連湯○參蘇飲大解潮熱將

欲成勞瘵咳喘熱  
最效方觀鑒門熱

加減逍遙散

治子午潮熱逍遙散本方婦人加胡黃  
連麥門冬地骨皮黃芩秦艽木通車前

子各等分右剉入燈  
心一撮同煎服



# 四物二連湯

治夜分潮熱四物湯本方加黃連

虛煩也

心虛則煩心又肝腎脾虛亦煩心經曰夏脉者心

體重煩冤是知煩多生於虛也蓋金攻肝虛土攻

腎虛木攻脾虛而為煩也○虛煩者心胃煩擾

而不寧也內經曰陰虛則內熱今之虛煩多是陰

虛生內熱所致虛勞之入腎虛心旺及傷寒吐下

後霍亂吐瀉後津液枯竭多有虛煩之證○獨

熱者虛煩也與傷寒相似但頭身不痛脉不緊數

為異宜用既濟湯○虛煩宜橘皮湯人參竹葉湯

淡竹茹湯

## 既濟湯

治霍亂後虛煩自利手足冷即竹葉

## 橘皮湯

治虛煩橘皮三錢青竹茹甘草各一錢人

## 人參竹葉湯

治虛煩石膏各五錢麥門冬各二錢半夏一錢

貼入薑五片粳米

# 淡竹茹湯

治心虛煩悶麥門冬一小麥各二錢半夏一錢甘草五分右剉

作一貼入薑五片棗二枚青竹茹一塊煎服因

# 上升之氣屬火

也病人自言冷氣從下而上者非真冷氣

下而上其熱為甚自覺其冷者此火極似水積熱之甚也陽亢陰微故見此證冷生此火者出於高陽

生之謬言也。氣從左邊起者肝火也氣從臍下起者陰火也氣從脚下起入腹如火者乃虛之

極也蓋火不起于九泉之下十不救一。氣從左邊起宜回餘便是火不足者是氣虛。氣從左邊起宜回

金丸坊見當歸龍膏丸坊觀氣從臍下起宜黃栢丸坊見坎離丸坊見氣從脚下起宜用四物湯加

# 惡熱惡寒

惡熱非熱明是虛證惡寒非寒明是熱證。經曰陰虛則發熱夫陽在外為陰之衛陰

在內為陽之守精神外馳嗜慾無節陰氣耗散陽無所附遂致浮散於肌表之間而惡熱當作陰虛

治之納○經曰惡寒戰慄皆屬於熱原病式曰病熱而反覺自冷實非寒也古人遇戰慄之證有以

大承氣下燥糞而愈者明是熱證耳○惡寒者雖當炎月若遇風霜重綿在身自覺凜凜戰慄惡

寒之甚也○痼冷之病豈非身惡寒而口喜熱之病耶殊不知濕痰積中抑遏陽氣不得外泄身

必惡寒劉河間曰火極似水故見此證也宜吐出血涎苦參赤小豆為末薑水調服探吐之後用川

芎南星蒼朮酒芩為末神麴糊丸服○陽虛惡寒四君子湯加黃芪桂枝或加附

子少許陰虛惡寒發熱二陳湯合四物湯加知母黃柏地骨皮

陰虛惡熱上一人脚自踝以下常覺熱冬不可加綿於

虛宜早斷慾事以補養陰血庶乎可免彼笑而不答年近五十患痿而死

積熱惡寒不止婦人身冷惡寒六月重裘猶覺寒泄注

汲水淋之其人呼叫殺入猶不止連灌三四十桶  
大戰汗出昏困一二日而所苦皆除漢華佗北齊  
徐文伯亦治痼寒人候冬寒  
月以冷水發之此其法也

### 亡血致惡寒發熱

病人脉微而澁者其人亡血病當

熱欲着複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微  
則起寒陰弱則發熱此醫發其汗令陽氣微又大  
下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以  
陽氣內微不能勝冷故欲着複衣十一月之時  
氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱  
故欲裸其身又陰脉遲澁故知亡血也

### 陽虛外寒陽盛外熱

黃帝問曰陽虛生外寒奈何岐伯

之間今寒氣在外則上焦不通上焦不通則寒氣  
獨留于外故寒慄○帝曰陽盛生外熱奈何岐伯  
曰上焦不通利則皮膚緘密腠理閉塞  
玄府不通衛氣不得泄越故外熱

### 陰虛內熱陰盛內寒

黃帝問曰陰虛生內熱奈何岐伯  
曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛

上焦不行下脘不通胃氣熱熱氣熏胃中故內熱  
○帝曰陰盛生內寒奈何岐伯曰厥氣上逆寒氣  
積於胃中而不瀉不瀉則溫氣去寒獨留則血  
凝凝滯則脈不通其脈盛大以瀦故中寒納則血

# 辨陽虛陰虛二證

陽虛陰虛二證晝夜發熱晝重夜輕口中無味陽虛則

之證也午後發熱夜半則止口中有味陰虛之證  
也陽全陰半陽得以無陰陰不得以無陽自然之  
理也陽虛之證責在胃陰虛之證責在腎蓋飢飽  
傷胃則陽氣虛矣房勞傷腎則陰血虛矣古人以  
飲食男女為切要較有旨哉以四君子補氣四物  
補陽氣苦寒則能補陰血如以四君子補氣四物  
補血是也若氣血兩虛但以甘溫之劑以補其氣  
氣旺則能生血也若只血虛而以甘溫之劑則忌用甘  
溫之劑以補氣氣旺而陰血愈消矣故陽虛之與  
陰虛甘藥之與苦藥不可不慎也○氣虛熱升  
陽以散之四君子湯補中益氣湯益胃升陽湯並  
餉○血虛熱滋陰以降之四物湯加芩連梔子或  
滋陰降火湯坎離丸○氣血俱虛熱升陽滋陰無  
用十全大補湯人參養榮湯加知母黃栢勞嗽入

門○血虛發熱宜  
當歸補血湯瘕

### 當歸補血湯

治肌熱大渴目赤面紅其脉洪大而虛  
重按全無經曰血虛發熱是也證似白

虎惟脉不長實為辨耳誤服白虎湯必死宜用此  
黃芪五錢當歸二錢右剉作一貼空心水煎服瘕

○一名歸  
芪湯門

### 飲酒發熱

飲酒發熱黃連解毒湯加葛根主之防  
○因酒發熱用青黛瓜蒌仁為末入薑汁

每日服數匙三日而安冊○酒熱內鬱而惡寒者  
黃芪一兩葛根五錢水煎服大汗而愈冊○凡發

熱人極忌飲酒門○飲酒人發熱者難  
治不飲酒人因酒發熱者亦難治冊

### 滯血發熱

其人有脉溢必有漱水之證必有嘔惡痰涎之  
證必有兩脚厥冷之證亦有小腹結急之證

或唾紅或鼻衄宜以柴胡黃芩佐以川芎白芷桃  
仁五靈脂更加大黃濃蜜使滯血一通黑物流利

則熱不復  
作矣槌

陰虛火動

九發熱咳嗽吐痰咯血午後至夜發熱面赤唇紅小便赤澀便是陰虛火動也。潮熱盜汗咳嗽痰盛咯唾血氣力困急形容消瘦腰痛脚痠遺精夢泄皆陰虛火動之證也。○陰虛火

動宜滋陰降火湯清離滋坎湯後服滋陰清化膏。功保後之藥也。○四物湯加知母黃柏並鹽水炒是降火補陰之妙劑。甚者加龜板。○陰虛火

動宜滋陰降火湯清離滋坎湯後服滋陰清化膏。功保後之藥也。○四物湯加知母黃柏並鹽水炒是降火補陰之妙劑。甚者加龜板。○陰虛火

動宜滋陰降火湯清離滋坎湯後服滋陰清化膏。功保後之藥也。○四物湯加知母黃柏並鹽水炒是降火補陰之妙劑。甚者加龜板。○陰虛火

動宜滋陰降火湯清離滋坎湯後服滋陰清化膏。功保後之藥也。○四物湯加知母黃柏並鹽水炒是降火補陰之妙劑。甚者加龜板。○陰虛火

坎離膏先坎離丸後

滋陰降火湯

治陰虛火動睡中盜汗午後發熱咳嗽痰盛咯唾血飲食少思肌肉消瘦將成

勞察白芍藥一錢三分當歸一錢二分熟地黃麥門冬白朮各一錢生地黄黃酒炒八分陳皮七分知

母黃柏並鹽水炒甘草炙各五分右生作一貼入薑三片棗二枚水煎服。○

清離滋坎湯

治陰虛火動潮熱盜汗痰喘心荒熟地黃生乾地黃天門冬麥門冬當歸白芍

藥山茱萸山藥白茯苓白朮各七分牡丹皮澤瀉黃柏知母並蜜水炒甘草炙各五分右剉作一貼

水煎空心服

### 清肺滋陰散

治酒色傷肺久成陰虛火動咽喉生瘡失聲痰嗽喘急煩熱不睡少食生地黃

一錢半白芍藥八分川芎白朮炒陳皮黃柏蜜炒知母貝母麥門冬地骨皮各五分白茯苓款冬花紫莞遠志各四分五味子酸棗仁各三分黃連炒甘草炙各二分右剉作一貼入薑三片水煎調竹瀝五匙溫服

### 陰虛生內熱湯

治陰虛煩熱火動等證當歸川芎蒼朮陳皮各八分白朮麥門冬錢參各

七分白芍藥梔子天花粉各六分玄參五分黃柏三分甘草二分右剉作一貼入薑三片水煎服久

服去川芎冬月加破故紙

### 補陰瀉火湯

治陰虛火動潮熱盜汗痰嗽咯血脉沉數肌肉消瘦白芍藥當歸白朮各一錢



三分川芎熟地黃知母蜜酒炒天門冬各一錢黃柏

蜜炒陳皮各七分生地黄酒洗甘草炙各五分乾

薑炒紫色三分右對作一貼入薑三片水煎服氣

### 補陰丸

治陰虛火動九人陰常不足陽常有餘故常

入補陰內用不可與腎經藥同用王節齋以白朮

從氣其實不可與腎經藥同用王節齋以白朮

自少至老不可缺也熟地黃五兩瑣陽酥炙枸杞子

### 坎离膏

治陰虛火動潮熱盜汗咯唾血欲成勞瘵疾

三條和勻丸如梧子每取八丸

門冬各二兩杏仁七錢胡桃仁蜂蜜各四兩右剉

先將黃柏知母以童尿三碗水三碗側柏葉一把

煎至三四碗去滓又將天麥門冬生熟地黃入汁

內添水二碗煎汁去滓再搗爛如泥另用水一二

枕煎熬絞取汁入前汁將杏仁胡桃仁用水播爛  
濾汁再播再濾至無滓同蜜入前汁內火熬成膏

入水內去火毒每服三匙以側  
栢葉湯調空心服忌銅鐵器

**先坎離丸** 治虛火動遺精盜汗潮熱痰嗽黃栢知母  
等分用童便浸九蒸九晒九露為末以地

黃煎膏和九梧子大苺五七十九空心  
鹽湯或溫酒下脾弱者山藥糊和丸

**後坎離丸** 治同上四物湯四味各二兩加知母四兩  
黃栢八兩用鹽水入乳蜜水清酒浸黃栢

各二兩知母各浸一兩過一宿取出知栢日晒夜  
露三晝夜八四物同為末蜜丸桔子大空心鹽湯

下八九十九冬則溫酒下此藥取天一  
生水地二生火之意能升水降火

**坎離既濟丸** 治陰虛火動勞損之疾當歸酒洗六兩  
熟地黃生地黃酒洗天門冬麥門冬山

茱萸牛膝酒洗各四兩白芍藥酒洗五味子山藥  
龜板酥炙各三兩知母酒浸二兩鹽水浸二兩黃

栢酒炒三兩蜜水炒三兩鹽水炒三兩川芎一兩  
右為末蜜丸梧子大空心鹽湯下五六十九

# 陰虛火動者難治

也近世陰虛火動之疾十無一活何

惟痰嗽一二聲自謂無恙諱疾忌醫滅身無悟及

蔓延日久倒卧於床而堅氷已至不可復救余意

揆之方疾之始必致謹於三事而後可三者維何

一

要

遇

明

醫

二

要

肯

服

藥

三

要

守

禁

戒

三

者

缺

一

# 制火有方

之儒者立教曰正心收心養心皆所以防此火

守亦所以遏此火之動於妄也醫者立教曰恬澹虛無精神內

由於心靜之一字其心中之水乎門○火不妄動動

火自降慾斷則

腎水自升

# 退熱有法

退熱之法全在清心必用麥門冬燈心草白

萬令從心心不清則妄動而熱不退然熱能傷血

血滯則氣鬱而熱愈不退退熱之法又在調血法

用川芎當歸若夫陽浮於外則當斂以降之法用

參苓白朮散飭觀薑棗煎服○凡熱皆出於心

心血不可不清麥門冬不可缺也  
以燈心草為引  
子心丸壯熱煩躁用柴胡黃芩大黃解利之其  
熱不退宜用黃芩川芎甘草烏梅作劑入黃連生  
地黃赤茯苓入燈心一捻煎服其效甚速蓋川芎  
生地黃皆能調血心一血一調其熱自退  
○駱隆吉曰風火既熾當滋腎水棟

臟腑瀉火藥

之君火者以心火也  
可以濕伏可以水滅  
○心火

滅惟從其性而伏之  
黃連之相火者龍火也  
不可以水滅  
○心火

焦熱用梔子片芩  
○中焦熱用黃連芩藥  
○心火

熟用黃芩大黃  
○肝火黃連瀉心火  
○心火

芎藥瀉脾火  
○肝火黃連瀉心火  
○心火

○木通瀉小腸火  
○肝火黃連瀉心火  
○心火

連佐之石膏瀉胃火  
○肝火黃連瀉心火  
○心火

經熱藥肝氣柴胡  
○肝火黃連瀉心火  
○心火

○脾氣白芍藥血大黃  
○肝火黃連瀉心火  
○心火

氣玄參血黃芩  
○肝火黃連瀉心火  
○心火

血大黃  
○肝火黃連瀉心火  
○心火

血木通  
○肝火黃連瀉心火  
○心火

門冬血牡丹皮  
○肝火黃連瀉心火  
○心火

# 通治火熱藥法

除熱瀉火非甘寒不可也有大熱脉洪

火妄動夏月用益元散散鬱悶鎮墜之妙○虛熱

用荊芥薄荷梔子黃芩實熱用大黃芒硝○實

火可瀉○黃連解毒湯之類虛火可補○參朮主甘草

之急○火盛癲狂必緩之生甘草無瀉無緩參朮亦可

○火盛癲狂必緩之生甘草無瀉無緩參朮亦可

補陰則火自降○炒黃柏生地黃之類○○膀胱有

火邪并下焦有濕熱用防己草龍膽黃柏知母之

類○黃連黃芩白芍藥柴胡知母此皆苦寒之

味能瀉五藏有餘之火耳若內傷勞倦為陽虛之

病以甘溫之劑除之如參芪甘草之屬若相火熾

盛日漸煎熬為血虛之病以甘寒之劑降之如當

歸地黃之屬若心火亢極為陽強之病以鹹冷之

劑折之如大黃朴硝之屬若腎水受傷真陰失守

為陰虛之病以壯水之主劑之如生地黃玄參之

屬若命門火衰為陽脫之病以溫熱之劑濟之如

附子乾薑之屬若胃虛食冷鬱遏陽氣為火鬱之

○病以升散之劑發之如升麻葛根之屬湯

# 防風通聖散

此方治熱風燥三者之總劑也蓋風本

至其實一源流也此方能無之其用防風麻黃薄荷荊芥使熱邪從玄府出也梔子滑石使熱邪從小便出也大黃朴硝使熱邪從大便出也其餘黃芩散肺火連翹散心火石膏散胃火芍藥散脾火川芎當歸和血潤燥白朮甘草補脾和中桔梗開肺可謂善於處方也方觀心門

# 黃連解毒湯

方通治火熱及大熱煩躁并三焦實火本

服剉水煎

# 單方

凡四十五種有單石膏丸玉液丸清

# 石膏

除三焦火熱及胃熱身熱煩渴石膏四兩甘草

中蒸病五日內蒸所以言內者其根在五臟六府之



肢漸細足跌腫起宜服此藥以體涼為度○專治胃火及食積痰火熨為末醋糊丸如菴豆米飲

下三十九名玉液丸單石

生地黄

治骨蒸熱取汁投白粥攪勻空心服體涼

柴胡

治熱勞骨節煩疼剉取三錢水煎服之

薄荷

治骨蒸熱勞煮取汁服或生搗取汁飲又取汁熬為膏和眾藥服心丹

知母

治有汗骨蒸又瀉腎火水煮飲之或作丸服

黃芩

主熱毒骨蒸取片芩酒炒用能瀉肺火或以天門冬膏為丸服名曰清金丸

之火煎服丸服並佳心冊

黃連

治一切熱血熱酒熱剉浸井水盛磁攪熏湯煮取清汁服之

大黃

瀉實熱血熱及藏府積熱○又治風熱生瘡癰大黃二兩荊芥四兩水煎服名荊黃湯

青蒿

主骨蒸熱勞為最水者服之或作丸服並佳

地骨皮

善解骨蒸肌熱能涼血涼骨剉取三錢水煎服日二三

桑椹

治小腸熱及熟生瘡癰取黑椹搗取汁入瓦器熬成膏入煉蜜攪勻每服二三匙

黃栢

主五藏腸胃中結熱又瀉腎火及膀胱火作丸或煎服並佳

竹葉

除煩熱水煎飲之○竹瀝能療胃中大熱煩悶取飲之

梔子

主積熱心躁又瀉三焦火水煎飲之○又取仁炒黑為末麪糊和丸服名曰梔子金丸若蜜和為

丸名曰山梔丸又能去心胃煩熱

牡蠣

去煩熱取肉作膾和薑醋食之

蜆肉

去暴熱下熱氣和薑醋生食

蚌肉

除煩解熱毒服如上火法



田螺

去腹中結熱煮食飲汁佳

鼃

解勞熱及熱毒煮食飲汁佳此水中蛙也

鰾

除骨熱及骨節間勞熱取肉作臠和五味食之又甲灸黃為末酒服二錢

蟹

主胃中熱結生取黃和薑醋食之

烏梅

治骨蒸去煩悶水煮作茶飲

藕

解熱毒除煩悶蒸食生食並佳

梨

除客熱止心煩可常食之○風熱心煩取梨三枚切砂糖半兩水煎服不拘時

獼猴桃

解煩熱去實熱取獼猴桃和蜜作煎常食之

脂麻油

下熱毒甚良麻油一合雞子兩枚芒硝三錢攪服之少時即瀉下

黑豆

去一切熱毒煩渴大小便秘瀉黑豆二合甘草二錢生薑七片水煎服名曰甘豆湯

菜豆

壓熱可煮食之作粥良  
○菜豆粉除熱毒胆

甜介

除煩熱去皮  
食後喫之

西介

清心利小腸熱  
可常啖之胆

冬瓜

除積熱解毒熱止煩躁作羹  
可食之或搗絞取汁服之

松菜

除胃中煩熱去邪熱作  
羹及蘘蘘食並得

苦菜

主熱中痰作  
茹可常食

薇

去暴熱可作  
茹食之

水芹

去伏熱作羹蘘蘘或  
煮食生食並佳

蜜

若覺熱氣不和  
和蜜漿飲一椀即安

白鵝

解五藏熱煮汁  
飲之食其肉



白鴨

除煩熱消毒熱和葱豉煮汁飲食其肉

人屎

主骨蒸熱取乾者燒令黑納水中澄清飲一小升以差為度

人尿

小便降火極速。陰虛火動蒸熱如燎諸藥不效取童子小便乘熱服之或和竹瀝薑汁良

雞子

心胃煩熱生吞雞子清一枚。熱毒發雞子白三顆和蜜一合頓服即差

牛乳

解熱毒除胃中熱生飲之良烏牛乳尤佳

猪肚

主骨蒸熱勞蒸熱食之猪膽亦好和水服之

獺肉

主骨蒸熱勞煮爛經露一宿明朝和醋醬食之即差獺肉亦同

鼠肉

主骨蒸勞極四肢羸瘦或水煮或燒食之勿令病人知

鍼灸法

骨蒸勞熱取膏育三里。骨蒸勞熱形氣未脫者灸崔氏四花穴無有不效。體熱勞瘦

取魄戶。兩手大熱為骨蒸。取三壯或五壯立安。骨蒸熱以齒乾燥取大

顛灸之。身熱如火。  
足冷如冰。灸陽輔。錫。

東醫寶鑑雜病篇卷之三

