

東醫寶鑑

奎貴
7608
I
15


奎章閣圖書	
部別	分類記號
圖書番號	奎1933
一部冊數	24
內別番號	15
서울대학교	

東醫寶鑑

2000

1997

學校



雜病篇五

霍亂

嘔吐

咳嗽



東醫寶鑑雜病篇卷之五

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

霍亂

霍亂之因

內經曰土鬱之發民病嘔吐霍亂注下又曰太陰所至為中滿霍亂吐下又曰歲土不及風乃大行民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨搖併霍亂之病皆因飲食非關鬼邪針○內有所積外有所感陽不升陰不降乖隔而成非因鬼邪皆飲食所致此先哲確論也○霍亂者揮霍變亂也凡入內素有鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂然病本因飲食失節生冷過度以致濕熱內甚中焦失運不能升降是以以上吐下瀉○霍亂或因飲冷或冒寒或失飢或大怒或乘舟車傷動胃氣令人吐瀉併作用藥遲緩須臾不投○霍亂多責於熱故夏秋為盛○霍亂之病由風濕喝三氣之合也風者肝木也濕者脾土也喝者心火也肝主筋故風急甚則轉筋也吐者脾土也喝者心火也故



醫寶鑑雜病篇卷之五

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

霍亂

霍亂之因

內經曰土鬱之發民病嘔吐霍亂注下又曰

風乃大行民病飧泄霍亂體重腹絞痛筋骨搖併
霍亂之病皆因飲食泄霍亂體重腹絞痛筋骨搖併
有所感陽不升陰不降乖隔而成非因鬼邪皆飲
食所致此先哲確論也○霍亂者揮霍變亂也
凡入內素有鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂然病
本因飲食失節生冷過度以致濕熱內甚中焦失
運不能升降是以吐下瀉○霍亂或動胃氣令人
吐瀉併作用藥遲緩須臾不救○霍亂多責於
熱故夏秋為盛○霍亂之病由風濕喝三氣之
合也風者肝木也濕者脾土也喝者心火也肝
主筋故風急甚則轉筋也吐者脾土也喝者心火也故

嘔吐也泄者脾土也脾濕下流故泄瀉也
啓玄子曰皆脾熱所生也斯言爲正

霍亂形證

霍亂證心腹痛則先吐先腹
痛則先利增寒壯熱頭
眩暈先心痛則先腹俱

痛吐利並作甚則轉筋入腹即死。○三焦爲水穀之道，邪在上焦則吐，而不利；邪在下焦則利。

而不吐邪在中焦則吐利並作病因飲食不節清濁相干陰陽乖隔輕者只曰吐利重者揮霍變亂

乃曰霍亂因邪入脾胃故發爲吐利門。霍亂門。夏秋爲多寒月亦有之蓋有伏暑而作門。○人

之藏府冷熱不調或飲食不節生冷過多或起居失宜露卧當風使風冷之氣歸於三焦傳於脾胃

脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干飲食變亂於腸胃之間心腹疼痛發作吐利有心痛而先

吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛體疼而復吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者

四肢逆冷煩悶昏塞而欲死者隨證治之者或

霍亂脈多伏或絕心丹救○脈微遲而不語氣少則難差霍

1

○霍亂

多脉浮或洪絕可救
○脉微遲而不利語氣少則難差

霍亂脈多脈浮或洪可救○脈微遲而不語氣少則難差

霍亂脈多脈浮或洪可救○脈微遲而不語氣少則難差

霍亂脈多脈浮或洪可救○脈微遲而不語氣少則難差

霍亂脈多脈浮或洪可救○脈微遲而不語氣少則難差

亂又關脉滑為霍亂吐瀉又滑而不勻必是霍亂吐瀉之候脉代勿訝驚○滑數為嘔代者霍亂微滑者生澁數凶斷難○脉微而澁或代而散或隱而伏或大而虛或結或促或代皆不可斷以死脉亂故也○脉浮大而洪可救微弱而遲難救

霍亂有乾有濕

此病有乾霍亂死者少蓋吐利則所傷之物得以泄出雖甚重胃中水穀泄盡則止矣所以死者少也乾霍亂死者多者以其上不得吐下不得利則所傷之物不得出泄壅閉正氣隔絕陰陽煩擾悶躁喘脹而死矣

乾霍亂治法

吐利不得謂之乾霍亂○乾霍亂者忽然頃刻之間便致悶絕急用鹽湯吐之續以理中湯

頃刻之間便致悶絕急用鹽湯吐之續以理中湯枳殼木瓜煎服或吞下蘇合香元尤妙○赤茯苓枳殼木瓜煎服或吞下蘇合香元尤妙○吐以提其氣之橫格不可用涼藥宜二陳湯枳殼加解散芩川芎蒼朮防風白芷之類無用薑鹽湯

吐○絞腸沙者乃乾霍亂一名也腹痛不可忍或手足厥冷乃腸胃絞縮在腹也急用鹽湯吐之

○乾霍亂者氣痞於中吐利不得所傷之物壅閉正氣關格陰陽煩躁喘脹者必死急用吐法鍼委

中欲出血無服治中湯助
或藿香正氣散必效

薑鹽湯

治乾霍亂欲死鹽一兩生薑切半兩右同炒色變以童尿二盞同煎至一盞分二次服

濕霍亂治法

為熱不渴為寒濕霍亂○熱多欲飲水宜五苓散寒多不飲水宜理中湯

濕熱無風木為害治宜散風寒利濕降火四時通用藿香正氣散

月煩渴宜黃連香薷散散月虛冷用理中湯

以分消上下更合益元散散黃連散降火尤妙

生散加減正氣散○中暑霍亂宜香薷散桂苓白

事南星末三錢棗三枚薑五片煎極熱服一服可效或半夏末薑汁點服或白礬末一大錢沸湯點

服亦效

木萸散

治霍亂吐瀉肢體轉筋逆冷木瓜吳茱萸食鹽各五錢右同炒令焦餅盛百沸水三升入

藥同煎至二升冷煖任意服即效。如無前藥枯白礬末一錢沸湯調服如無白礬只用鹽一捻醋

一盞同煎服或鹽梅醃酸等物皆可煮服

二香黃連散

治伏暑霍亂腹痛躁悶脉沉手足冷霍香厚朴半夏赤茯苓陳皮白扁豆香薷

各一錢黃連澤瀉各八分甘草三分右剉作一貼水煎入薑汁一匙溫服

加味薑附湯

治霍亂吐瀉過多手足逆冷氣少不語六脉沉伏附子炮乾薑炮入參各一錢

半甘草炙七分右剉作一貼水煎服。一名四順附子湯

回生散

治霍亂吐瀉過多但一點胃氣存者服之回生藿香陳皮各五錢右剉作一貼水煎溫服

門入

加減正氣散

或異鄉人初到他方不伏水土遂成霍亂

砂研香附半夏甘草各一錢右剉作一貼

香薷散

治中暑霍亂吐瀉腹痛轉筋四肢逆冷

益元散

一名六一散治霍亂吐瀉取此

霍亂後轉筋

陽明屬胃與大腸以養宗筋暴吐暴瀉津

而巳重者遍體轉筋入腹手足厥冷甚風燭矣

倉卒之際以鹽填臍中灼艾不計壯數雖已死而

胃中有煖氣者立甦急用木葱散坊見加茴香甘

草紫蘇葉煎服再研大蒜塗兩腳掌心則雖昏危

入腹者亦效門○霍亂吐瀉過多遍體轉筋手足

厥冷氣欲絕者急灸臍中又取蓼一把煎湯泡洗

次投附子理中湯一兩煎服○霍亂後轉筋理

中湯麩醃加石膏一兩煎服○一法理中湯去

白朮加生附子一箇煨○轉筋屬血熱四物湯助

加酒苓酒花蒼朮南星煎服○吐瀉脇痛轉

筋脉弦者木克土也平胃散妨觀加木瓜五錢煎服

木瓜湯

治霍亂轉筋木瓜四分剉作一貼入薑三片紫

蘇十葉鹽一撮烏梅一箇同煎服

一法

治轉筋不止欲死男子以手挽其陰牽之女子則挽其乳近兩傍牽之此千金方妙法也

霍亂後煩渴

吐瀉既多津液暴亡以致煩渴引飲不止宜桂苓白朮散五苓散寒門椒豆散麥門

冬湯加減薤苓湯止渴湯

桂苓白朮散

治中暑霍亂吐瀉煩渴滑石一兩寒水石石膏澤瀉甘草各五錢白朮白茯苓

人參桂枝各二錢半右為末每三錢白湯或新汲水調下生薑湯亦可

麥門冬湯

治霍亂後煩渴麥門冬二錢陳皮半夏白朮白茯苓各一錢小麥半合人參甘草各

五分左右剉作一貼入薑三片烏梅一箇水煎服

椒豆散

治霍亂吐瀉後煩渴不能服藥或水藥不入口者胡椒荳蔻各四十粒右研為末新汲

水調下或水煎服。一名胡椒湯調下。

加減藿苓湯

治霍亂熱渴天花粉二錢赤茯苓一錢猪苓澤瀉香薷乾葛各七分黃連白朮

甘草各五分右剉作一貼入薑三片水煎服。

止渴湯

治同上人參麥門冬赤茯苓桔梗瓜蒌根澤瀉葛根甘草各五錢右為末蜜水調二錢服。

研

霍亂後虛煩

霍亂後虛煩不得眠或熱渴宜竹葉石膏湯。

參胡三白湯

治霍亂後煩熱口乾脉數或頭身痛柴胡白朮白茯苓芍藥當歸陳皮麥門

冬梔子仁甘草各八分人參五分五味子十粒右剉作一貼入棗二枚一燈心一團煎服。

既濟湯

治霍亂後虛煩不得眠麥門冬二錢人參竹葉半夏附子炮甘草炙各一錢右剉作一貼

八薑五片粳米
百粒水煎服

霍亂吐法

治乾霍亂心腹刺痛煩冤吐利不得氣欲絕者極鹹鹽湯熱飲一升刺口令吐不吐則再

飲一升須三吐使宿食盡乃止此法大勝諸治吐訖以理中湯藿香正氣散款緩調治

以鹽湯一盞入童便薑汁頓服探吐
令透未透再服吐後續用熨法

霍亂熨法

霍亂吐瀉心腹肚不可忍炒鹽二握紙包紗

則麤續以炒鹽熨其背則十分無事
○又法鹽炒吳茱萸熨臍下亦效

霍亂鍼法

乾霍亂刺委中紋腸沙證手足指頭瘡出血皆良法

可忍以手蘸溫水於病者膝腕上拍打有紫黑點處以鍼刺去惡血即愈

霍亂者乃寒濕太甚脾被絆而動氣被鬱而

不能行所以卒痛而手足厥冷俗名絞腸沙者蓋言痛之甚也北方刺青筋以出氣血南方刮胃背



手足為愈也。又治絞腸沙刺血法。詳見救急門。

霍亂灸法

霍亂轉筋入腹。手足厥冷。氣欲絕。以鹽填臍中。大艾炷灸之。不計壯數。立效。○霍亂已

死而腹中有暖氣者。依上法灸之。亦甦。○又法

灸氣海二七壯。妙。○霍亂吐瀉不止。垂死。灸天

胸

樞氣海。○霍亂已死。但有暖氣者。灸承筋七壯。立甦。

禁忌法

霍亂吐瀉之時。切勿與穀食。雖米湯一呷。下咽

漸而將息。○霍亂吐瀉時。慎勿與粟米粥湯入

胃。必死。○霍亂不可遽與米飲。粥飯以助邪。

氣必所傷。物盡然後稀粥。漸養之。○霍亂時

大忌。不可飲熱

酒。燒酒。不可飲。

霍亂轉筋腹痛四肢厥冷氣欲絕其脉洪大可治如脉微而囊縮舌卷者不治○霍亂喘脹

煩躁者不治。○乾霍亂吐瀉不得胃腹脹硬面唇青黑手足冷過肘膝六脉伏絕氣喘急舌短囊

渴者死
 大躁大_春汗_口
 遺尿者死
 回生散救之
 方視_大

乘船大吐瀉渴飲水者即死飲童尿最好自
已尿亦好心丹○枯白礬末一錢百沸湯點服

亦好湯門入療方○煎門見暈嘔吐大

一凡
種二
十

治乾霍亂鹽一大匙熬黃取童
 尿一升溫和平攪服吐下即愈

治霍亂取二錢百沸湯一盞投其中急攪服吐瀉立止

治霍亂入藥煎
用甚妙詳覲

和一名陰陽湯治乾霍亂能吐宿食惡毒之物
鹽服之尤妙即自沸湯合新汲水也韡

生薑

治霍亂欲死生薑五兩切取牛屎一升同煎取汁服即效

天南星

治吐瀉不止四肢逆冷不省人事南星為末每三錢入大棗三枚同煎服四肢漸煖神識

便省神妙

蘆花

一名蓬蓽治霍亂氣息危急者取一把濃煎取汁頓服即差

皂角

乾霍亂鹽湯一掬入皂角末少許調服探吐即效

木瓜

治霍亂吐瀉轉筋不止煮汁飲之枝葉功同○槓槓與木瓜同功

烏梅

治霍亂煩渴水漬和蜜飲之妙

林檎

青色者治霍亂吐瀉甚妙煮取汁飲或嚼食之

秣葛葉

治霍亂轉筋筋大如桃李搖不可忍取葉濃煎湯飲之

粟米泔

治霍亂煩渴飲數升立差○又研米泔水和濾取汁服之主轉筋入腹

糯米

治霍亂取汁任意飲之

麥

治霍亂轉筋濃煎乘熱熏洗因取飲一二盞即愈

香薷

治霍亂吐瀉轉筋濃煎飲之即止○治霍亂不可闕也

小蒜

治霍亂吐瀉煮汁飲之

牛糞

治霍亂吐瀉四肢逆冷黃牛糞以水煮瀝取清汁頓服一升即止

烟鹿皮

或烟獐皮熏烟最多黃色者水浸揉取汁頓服治乾霍亂即吐神效

醋

治霍亂未得吐下飲一二升良○治轉筋取衣絮漬醋煮令溫累患處冷則易即愈

牛涎

小兒霍亂牛涎一合灌下立效

嘔吐

嘔吐之因

內經曰諸嘔吐逆衝上皆屬於火○胃膈熱甚則為嘔吐火氣炎上之象也

俱屬於胃胃者總司也以其氣血多少為異耳嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也有食入則吐有食已則吐以橘紅為主歲者少陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也以半夏為主究其三者之源皆因脾氣虛弱或因寒氣客胃或因飲食所傷而致宜以丁香藿香半夏茯苓陳皮生薑之類主之燥○濕嘔者有物有聲故嘔已則吐嘔乾者空嘔無物總屬陽明氣血俱病故嘔比吐為重也○劉河間謂嘔者火氣炎上此持一端耳有痰隔中焦食不得下者有氣逆者有寒氣鬱於胃口者有食滯心脾之分新食不得下而反出者有胃中有火與痰而嘔者○嘔家雖有陽明證慎不可下逆之故也○

脉法

寸口脉數其人即吐○寸口脉細而數數則為熱細則為寒數為嘔吐○寸口問曰病人脉數數則為熱當消穀引食而反吐者何也師曰過發其汗令陽氣微膈氣虛脉乃數數為客熱不能消穀胃中虛冷故吐也○脾陽脉緊不能食而吐○食已即嘔寸緊尺瀦其人胃滿不能食而吐○脉滑為嘔

吐。嘔。吐。無。他。寸。緊。滑。數。微。數。血。虛。單。浮。胃。薄。乾。則。有。痰。最。忌。瀉。弱。翻。○。跌。陽。脉。浮。而。澁。浮。則。為。虛。澁。則。傷。脾。脾。傷。則。不。磨。朝。食。暮。吐。暮。食。朝。吐。完。穀。不。化。名。曰。胃。反。嘔。○。脉。緊。而。澁。其。病。難。治。○。脉。弦。者。虛。也。胃。氣。無。餘。朝。食。暮。吐。暮。食。朝。吐。○。反。胃。噎。膈。寸。緊。尺。澁。翻。○。朝。食。暮。吐。暮。食。朝。吐。○。反。足。脉。大。而。弱。氣。不。足。豔。

嘔吐治法

乃。吐。宜。加。味。二。陳。湯。令。者。面。青。手。足。厥。冷。食。久。湯。○。熱。者。面。赤。手。足。熱。食。已。即。吐。宜。保。中。湯。和。中。桔。梗。湯。黃。連。竹。茹。湯。清。熱。二。陳。湯。或。葛。根。竹。茹。湯。加。味。橘。皮。竹。茹。湯。○。大。病。後。胃。熱。虛。煩。而。嘔。老。竹。葉。石。膏。湯。○。加。薑。汁。服。即。止。○。時。常。口。吐。清。水。或。冷。涎。自。下。涌。上。者。脾。熱。所。致。也。二。陳。湯。加。白。朮。白。芍。藥。升。麻。神。麴。麥。芽。乾。生。薑。土。炒。苓。連。梔。子。或。水。煎。服。或。蒸。餅。為。丸。服。○。肝。火。出。胃。逆。上。嘔。吐。宜。抑。青。丸。○。火。方。○。半。夏。橘。皮。生。薑。為。嘔。家。主。藥。若。胃。虛。而。嘔。者。宜。推。揚。穀。氣。四。味。藿。香。湯。加。減。四。君。子。湯。主。之。○。久。病。胃。虛。嘔。吐。宜。藿。香。安。胃。散。



藿香平胃散比和飲。痰飲嘔吐宜茯苓半夏湯
小半夏湯大半夏湯痰見。神木丸治嘔吐清
水如神痰。○傳水而嘔者心下怔忡先渴後嘔
者宜赤茯苓湯。○先嘔後渴者宜猪苓散水入
即吐者宜五苓散。○方見嘔門。○嘔家聖藥是生薑
千金之說信矣然氣逆作嘔生薑散之痰水作嘔
半夏逐之生薑於寒證最佳若遇熱嘔不可無烏
梅也。○嘔吐宜服薤白粥。○嘔家有癰膿不須
治嘔膿盡自愈矣。○

加味二陳湯

治胃冷嘔吐二陳湯加縮砂一錢丁香五分也。○

丁香安胃湯

治嘔吐噦胃寒所致黃芪二錢吳茱萸
草豆蔻人參蒼朮各一錢丁香柴胡升

麻當歸身陳皮甘草炙各五分黃
柏二分右剉作一貼水煎服。○

加減理中湯

治胃寒冷嘔吐清水冷涎脉沉遲人參
白朮赤茯苓乾薑炮陳皮藿香丁香半

夏縮砂研桂皮各一錢右剉作一
貼入薑三片烏梅一箇水煎服。○

保中湯

因痰火致嘔吐不下飲食白朮土炒二錢黃連並土炒藿香梔子薑汁炒各一錢半

夏陳皮赤茯苓各八分縮砂三分甘草二分右剉作一貼入薑三片以長流水和黃泥澄清取水煎

之去滓稍冷頻服

和中桔梗湯

治上焦熱食已暴吐脉浮而洪半夏麴二錢桔梗白朮各一錢半陳皮厚朴枳

實赤茯苓各一錢右剉作一貼薑三片水煎取清調木香檳榔末各一錢空心服三服後吐漸止除

木香檳榔末更加白芍藥二錢黃芪一錢半煎服

黃連茹湯

治胃熱嘔吐煩渴脉數黃連薑汁炒梔子炒黑青竹茹各一錢人參七分白朮

赤茯苓白芍藥陳皮麥門冬甘草各五分右剉作一貼入棗二枚一水煎服

清熱二陳湯

治痰火嘔吐出涎沫半夏陳皮赤茯苓甘草人參白朮竹茹砂仁梔子麥門冬

各一錢右剉作一貼入薑三棗二枚一水煎服

葛根竹茹湯

治胃熱嘔吐葛根三錢半夏切薑汁漿水同煮焙乾二錢甘草一錢右剉作一

貼薑三片棗二枚竹茹一彈子大同煎服心○酒嘔尤妙○欲知胃中有熱手足心皆熱者是

胃熱也

加味橘皮竹茹湯

治胃熱多渴嘔吐不食橘皮竹茹赤茯苓枇杷葉麥門冬半夏各一

錢人參甘草各五分右剉作一貼薑三片水煎服○無枇杷葉則以蜜炙桑白皮代之

四味藿香湯

治胃虛嘔吐粥藥不停藿香人參橘皮半夏各二錢右剉作一貼薑三煎服

加減四君子湯

治久病胃弱全不納食聞食氣即嘔四君子湯藳朮去茯苓加人參黃芪

香附子各一錢右剉作一貼入生薑三片水煎服

藿香安胃散

治脾胃虛弱嘔吐飲食不待腐熟橘紅五錢人參丁香藿香各二錢半右為末

每取二錢薑三片同煎溫服

藿香平胃散

治同上蒼木二錢藿香厚朴陳皮各一錢半縮砂神麴各一錢甘草炙七分右

剉作一貼薑三片煎服

比和飲

治胃虛嘔吐月餘不納水穀聞食氣即嘔聞藥亦嘔人參白朮白茯苓神麴炒各一錢藿

香陳皮縮砂甘草各五分陳倉米一合右剉作一貼先以順流水三升泡伏龍肝末澄清取一升半

入藥及薑三棗二同煎至七分去滓稍冷服日三遂納而不吐別以陳倉米煎湯時時啜之全愈

醫鑒

茯苓半夏湯

治痰飲停胃嘔吐不止半夏二錢赤茯苓陳皮蒼朮厚朴各一錢藿香八分縮

砂乾薑甘草炙各五分右剉作一貼八薑三梅一水煎服

猪苓散

治先嘔後渴嘔吐而思水解者急與之猪苓赤茯苓白朮各等分右為末每服一二錢水調

服○一人每嘔水二三掬諸藥不效但吃并華水一口即止用此藥即愈

薤白粥

治嘔最效薤白三莖雞子三箇去黃粟米三合同煮作稀粥另用人參一兩細剉水一升

煎取三合去滓右以雞薤栗粥入煖入參湯相和攪勻頓服即止

惡心乾嘔

惡心者欲吐不吐也胃口有熱有痰二陳湯加薑炒笨連心○乾嘔者有聲無物也乾嘔或手足厥

冷者宜生薑橘皮湯○惡心者無聲無物但心中凡然無柰欲吐不吐欲嘔不嘔雖曰惡心實

非心經之病皆在胃口上宜用生薑薑宜生薑半夏吐清水胃口有痰有熱有虛皆用生薑薑宜生薑半夏

湯○乾嘔吐涎沫宜半夏乾薑散○胃中素有熱惡心乾嘔不止者宜梔子竹茹湯

生薑橘皮湯治兩右乾嘔或手足厥冷橘皮四兩生薑八

生薑半夏湯

治胃中似喘不喘似嘔不嘔以歲不歲

乾嘔最妙下一咽即愈

生薑半夏湯

治胃中似喘不喘似嘔不嘔以歲不歲

蓋半煎至半蓋入薑汁半蓋和勻緩緩服之
○大凡嘔吐藥忌一時頓服宜緩緩服之

半夏乾薑散

治乾嘔吐涎沫半夏乾薑各等分
右麤末每取三錢水煎緩緩服之

梔子竹茹湯

治胃熱惡心乾嘔不止梔子炒三錢陳
皮二錢青竹茹一錢半右剉作一貼水

煎和薑汁服

食痺吐食

食痺謂食已心下痛陰陰然不可名也
忍也吐出痛乃止此為胃氣逆而不下行也

經內○痛而嘔也○寒經云寒氣客於腸胃厥逆上出
故痛而嘔也○嘔吐而脉弦者肝勝于脾也由

風痰羈絆于脾胃之間故惡心欲吐飲食不下當
先實其脾土宜茯苓半夏湯麥天湯白朮茯苓湯

金花丸水煮
金花丸壅

茯苓半夏湯

治風痰羈絆於脾胃之間惡心欲吐宜
實脾土麥芽炒一錢半白朮白茯苓半

夏神麴炒各一錢三分橘紅天麻各一
錢右剉作一貼為麤末薑五水煎服壅

白朮茯苓湯

治同上白朮白茯苓半夏各三錢神麴炒一錢麥芽麴五分右剉作一貼薑五

片水煎服

金花丸

治同上半夏製一兩檳榔二錢雄黃水飛一錢半右爲末薑汁浸蒸餅和丸梧子大薑湯

下三五十九以吐止爲度風痰羈絆于脾故飲食不下用此以治風痰

水煮金花丸

治風痰羈絆脾胃飲食不下白麴四兩半夏天南星並湯洗寒水石燒各一兩

天麻五錢雄黃一錢半右爲末滴水丸梧子大每取百丸先煮漿水沸下藥煮令浮爲度瀉出生

薑湯吞下食前湯○風邪在胃翻翻不定或鬱酸水全不入食宜不換金正氣散麴麴或安脾丸不

宜輕用參朮惟久病脇痛者木克土也宜六君子湯方麴加青皮白芍藥柴胡升麻川芎砂仁神麴

煎服

麥天湯

治風邪羈絆脾胃有痰惡心欲吐麥門冬一錢半天麻一錢三分白朮白茯苓半夏神麴

陳皮各一錢右剉作一貼薑五水煎服

吐病有三

吐氣為上膈屬上焦食已暴吐者今世謂之反

出之屬中下二焦○朝食暮吐暮食朝吐今世謂之膈氣反胃也○

三焦論之上焦在胃口上通天氣主納而不出中焦在中脘上通天氣主腐熟水穀下焦

在臍下下通地氣主出而不納○上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脉浮而洪其證食已暴吐

渴欲飲水大便燥結氣上衝胃而發痛其治當降氣和中○中焦吐者皆從於積有陰有陽食與氣

相假為積而痛其脉浮而弦其證或先吐而後痛或先痛而後吐治法當以小毒其藥去其積木香檳

榔和其氣短○下焦吐者皆從于寒地道也其脉沉而遲其證朝食暮吐暮食朝吐小便清利

大便秘而不通治法宜以毒藥通其閉塞溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不令大府結閉而

自安也



噎膈反胃病因

內經曰三陽結謂之噎註曰三陽者大

大腸熱結則不能便膀胱熱結則津液涸三陽熱

結脉必洪數有力前後閉塞下既不通必反而上

行所以噎食不下縱下復出乃陽火上行而不下

降也門內經曰少陽所至為嘔涌溢食不下此

理明矣門乾○又曰食不下者胃脘隔也○血液

俱耗胃脘乾槁其槁在上近咽之下水飲可行食

物難入間或可入入亦不多名之曰噎其槁在下

與胃相近食雖可入入難盡入胃良久復出名之曰

噎亦曰反胃大便秘少若羊屎然名雖不同病出

一體○其槁在賁門食下則胃脘當心而痛須臾

吐出食出痛乃止此上焦之噎噎也或食物可下

難盡入胃良久復出此中焦之噎噎也

也其或朝食暮吐暮食朝吐其槁在闌門此下焦

之噎噎也○飲食不下而大便不通名曰噎噎

噎者有拒格之意即噎食反胃也門○噎噎有五

五噎者憂悲寒熱氣也在心脾之間上下不通或

結於咽候時覺有妨礙吐之不出噎之不下由

氣鬱痰結而然五噎者憂食勞氣思也飲食卒然

阻滯而不下反胃也噯也噯也受病皆同醫。張
雞峯曰噯當是神思間病惟內觀自養可以治之
其言深中病情。噯。噯之證不屬虛不屬實不
屬冷不屬熱乃神氣中一點病耳。噯病皆生
於血枯血枯則燥矣得病情
合經旨者丹溪一人而已

噯反胃治法

內噯病生於血乾夫血者陰氣也陰主靜
外兩靜則藏府之火不起而金水二

氣有養陰血自生腸胃津液傳化合宜何噯之有
○曰胃腕乾槁果可治乎曰古方用人參以補肺
胃蜜以潤燥薑以去穢正是此意。噯反胃大
率屬血虛氣虛有痰有熱血虛四物湯氣虛四君
子湯痰用二陳湯熱用解毒湯解毒湯四物湯
八物湯主之必和以童便竹瀝韭汁薑汁且多飲
牛羊乳為上策但不可用人乳代之蓋有七情烹
飪之火故也切不可用香炒藥宜薄滋味。噯
者加砂糖驢尿入內服以防生虫。噯宜用
平鮮丸神仙奪命丹丁香透膈湯五噯寬中散棗
肉平胃散妨觀瓜萎實丸神奇散當歸養血湯生



津補血湯聖灰散八仙膏○反胃宜用硫汞丸狗
米平胃丸枳櫟丸九仙奪命丹順氣和中湯安中

調氣丸回生養胃丹定生丹安
胃湯太倉丸奪命丹附子散端

平鯽丸

治噎氣不食大鯽魚一箇去腸留鱗以大蒜
切片填魚腹內濕紙包黃泥固濟慢火煨熟

去鱗骨入平胃散末枳丸梧子大
每三五十九空吞下

神仙奪命丹

治氣鬱嘔吐或噎食不下百草霜研五
錢雄黃鵬砂各二錢乳香一錢半茶豆

黑豆各四十九粒右為末烏梅三十箇水浸去核
取肉和藥末搏勻彈子大朱砂二錢為衣每嚥一

丸以茶泡熟餅壓下良久不吐乃藥之效若吐再
嚥化一丸服忌油膩鹽醋怒氣○一名二豆回

香丹

丁香透膈湯

治五噎十噎痞塞不通白朮一錢三分
甘草九分人參白茯苓縮砂香附子各

七分沉香藿香陳皮厚朴各五分丁香木香麥芽
青皮肉豆蔻白豆蔻各三分草果神麴半夏各二

十分右剉作一貼薑三棗二水煎服門○
十噉者冷風氣伏熱悲憂水食喜也綱

五噉寬中散

治五噉食不下厚朴香附子各一錢半
甘草五分青皮陳皮丁香縮砂各四分

木香三分白豆蔻二分右為麤末入薑三片鹽少許水煎服綱

瓜蒌實丸

治噎膈胃瞢痞痛微背喘急妨悶瓜蒌實
枳殼半夏製桔梗各一兩右為末薑汁米

糊和丸梧子大每五
七十丸薑湯吞下飯

神奇散

治噎膈反胃血虛有火三陽枯竭當歸川芎
白芍藥生地黃並酒炒陳皮縮砂半夏白茯苓

白朮土炒香附子枳實烏梅肉藿香赤茯苓檳榔
木通猪苓黃芩炒黃柏人乳炒知母人乳炒赤

芍藥天門冬麥門冬甘草各
五分右剉作一貼水煎服鑿

當歸養血湯

治老人痰結血枯成噎噎當歸白芍藥
炒熟地黃白茯苓各一錢黃連以吳茱

萸同炒去茱萸八分貝母炒瓜蒌仁枳實陳皮厚
朴香附子川芎蘇子各七分沉香五分水磨取汁

右剉作一貼薑一棗二水煎入沉香汁竹瀝調服

生津補血湯

治年少人噎膈乃胃腕血燥不潤故便閉塞而食不下當歸白芍藥熟地黃生

地黃白茯苓各一錢枳實陳皮黃連炒蘇子貝母各七分縮砂沉香水磨取汁各五分右剉作一貼

薑一棗二水煎入沉香汁調服

聖灰散

治噎食病及回食病咽噎噎食取初出蜜石灰投入鍋中滾水中化開去渣止用清水煮

乾炒黃色為度黃色難得牙色即可用罐收封口勿令泄氣過一二年則無用矣凡人年四十餘壯健者用四分年老氣弱只用二分或三分好燒酒調服一二鍾能飲者三四鍾或吐出虫或下虫

其病即愈如不吐不下遇發再服自痊

八仙膏

治噎食生藕汁生薑汁生梨汁生蘿菔汁甘蔗汁蘆汁無惻之砂白果汁銀竹瀝蜂蜜各一盞

右和勻盛飯熟蒸熟任意食之

硫汞丹

治反胃吐逆水銀八錢生硫黃末二錢同入

候結成砂子再研為末以棕尖拌丸

狗米平胃丸

治反胃諸藥不效黃雄犬一口餓數日

白煎湯煮作粥臨熟入沉香二錢平胃散末和

杵糠丸

治五噎杵頭糠牛轉草各半斤糯米一升為

末取黃母牛口中涎和砂糖三兩為丸

九仙奪命丹

治反胃噎食其效如神枳殼二兩白礬

南星薑製各二錢人參甘草各一錢豆豉研過一

兩右為末夜晴露過以人參厚朴煎湯調糊作餅

順氣和中湯

治嘔吐反胃嘈雜吞酸噎嘔吐痰水心

薑汁炒黑各一錢白朮土炒八分白茯苓七分半
夏神麴黃連薑汁浸晒乾猪膽汁拌炒各六分枳
實五分縮砂三分甘草炙二分右剉作一貼入薑
三長流水入黃土泥攪澄清水煎入竹瀝童便薑
汁溫服

安中調氣丸

治反胃及痰氣白朮土炒香附子長流
水浸三日炒黃各三兩陳皮二兩半夏

製油炒白茯苓神枳實神麴炒黃連薑汁浸猪膽汁
拌炒各一兩白芍藥八錢蘇子炒蘿菹子炒各六
錢川芎當歸酒洗白豆蔻炒各五錢甘草炙三錢
木香一錢右爲末以竹瀝薑汁打神麴爲糊和丸
衆豆大白湯下
一百丸

回生養胃丹

治脾土虛寒聚成痰涎以致大便秘結泄
小便赤而多嘔吐酸水漸成反胃結腸

之證蒼朮換泔浸六日蓮肉酒浸各四兩取猪
肚一箇以壁土揉擦洗淨入蒼蓮線縫好酒煮爛
搗細捏作小餅烘乾南星細切薑汁浸一宿伏龍
肝同炒去土半夏湯洗醋浸七日蒸熟橘紅伏龍

肝同炒去土粟米薑汁浸蒸焙各四兩人參白木
白茯苓厚朴蓬朮三稜二味並醋炒葦澄茄縮砂
白豆蔻穀芽炒麥芽炒甘草各一兩丁香木香沉
香各五錢右為末稀麪糊和丸梧子大米飲吞下

六七十
丸

定生丹

治反胃定生死雄黃朱砂乳香半夏木香肉
豆蔻百草霜各三錢沉香一錢阿魏硃砂

各五分萊豆四十粒烏梅四十箇湯泡去核右為
末以烏梅肉和搗作丸彈子大百草霜為衣陰乾
每一丸噙化嚥下以薑湯漱口復以陳麥餅火燒
熟細嚼壓下噙藥即燃官香一炷如香盡藥未化
者難治藥先化香
未盡者可愈

安胃湯

治反胃白朮白茯苓山藥炒當歸陳皮半夏
藿香各一錢黃連薑汁炒蓮肉各八分人參

縮砂各五分甘草三分左右剉作一
貼入薑三棗二烏梅一水煎服

太倉丸

治反胃噎膈白豆蔻縮砂各二兩陳倉米一
升黃土炒去土右為末薑汁和丸梧子大薑

湯下百丸

奪命丹

治反胃有起死回生之功。裘一箇、麝香一分、孩兒茶二分、金絲黃礬三分、朱砂春二分、夏

四分、秋六分、冬八分。○裘乃土糖，裘即蛻，娘所轉之彈丸糞土之下，皆有用彈中有白虫者，如指大

如蟬蟠一樣，將彈小破一點，蓋住火煨過，大黃色存性，不要燒焦了，入藥內并彈共為末，燒酒調空

心服，如覺飢，用小米煮粥，漸漸少進，一日二三次，不可多吃，吃一日進一椀，半足矣。多進則病復不可

治矣。忌生冷厚味、蔥蒜酒麪氣，惱五十以後一二服，即效。

附子散

治反胃大附子一箇，坐於磚上，回面着火，漸逼淬入生薑汁中，又灸，又淬之，可盡汁半椀。

許擣為末，粟米飲調下，一錢不過三服，差或加丁香一錢，同為末。

嘔吐噎膈反胃宜通大便

病人欲吐者，切不可下，通之故也。脾陽明之氣下行，則

順今逆而上行，謹不可泄固也。然嘔吐者，每喜大便秘結，上下壅遏，氣不流行，蓋思所以區畫而利

導之○陰虛邪氣逆上窒塞嘔噦不足之病也
此地道不通○當用生地黄當歸桃仁紅花無用甘
草微加○大黃芒硝以通其閉大便利則嘔吐自
止矣○嘔吐證忌用利藥此言其常只嘔吐而
大小便不通○秘澀者利藥所當忌也若大小腸膀胱
熱結不通○上為嘔吐膈食若不利用利藥開通發泄
則嘔吐○何由而止乎古入用三一承氣湯正是此
意○通利大便以開下焦之壅塞宜用紫沉丸
厚朴丸○附子丸人參利膈丸三一承氣湯四子調
中湯香白元大黃湯潤腸膏○方諸嘔吐家多大便
秘結虛冷者○用蘇合元溫而利之方觀若大便熱
結用蜜導法○方觀或猪膽汁和醋灌入下部妙
紫沉丸○治中焦吐食由食積與寒氣相格故吐而疼
肉各三錢丁香檳榔各二錢沉香木香杏仁白朮
各一錢白豆蔻巴豆霜各五分○右為末醋糊和丸
黍米大罇五十九薑湯下紫沉丸一百九○一法橘皮一箇去白
生薑一塊煨熟煎湯下○紫沉丸一百九一法橘皮一箇去白
大便通不吐○則止



厚朴丸

治同上方與萬病紫菀丸同
方與萬病紫菀丸同

附子丸

治下焦吐食朝食暮吐暮食朝吐大便不通
附子炮五錢巴豆霜一錢砒礞半錢右研極

細焙黃蠟為丸梧子大每服一二丸勿冷水送下利
為度利後更服紫菀丸常服一二丸

人參利膈丸

治噎膈大便燥結喘滿壅塞治噎膈氣之
聖藥也人參當歸藿香枳殼大黃厚朴

甘草各一兩木香檀榔各七錢半右為
末水丸梧子大白湯下五七十九丸

三一承氣湯

治嘔吐大便秘三陽結而不
通上為噎膈反胃

四子調中湯

治反胃痰盛二便澀半夏二錢桃仁一
錢半香附子枳實瓜蒌仁蘇子炒白芥

子炒各一錢黃連薑汁炒七分青皮陳皮沉香白
茯苓木通芒硝各五分右剉作一貼水煎入芒硝

攪勻空
心服

香白元

治痰涎壅盛嘔吐不止大便秘滯青州白元
子治痰涎壅盛嘔吐不止大便秘滯青州白元

下三十
九

大黃湯

治冷涎反胃其候欲發時先流冷涎次則吐食此乃勞證治不早死在朝夕大黃一兩生

薑自然汁半盞灸大黃令燥滓入薑汁中如此滓汁盡切焙為末每二錢陳米一撮葱白二莖水一

盞煎至七分先食葱白次服藥不十日去根軀仍九嘔噎大便秘結用大黃乃急則治標之法也仍

用四物湯加童便非汁竹瀝多服為妙

潤腸膏

治噎噎反胃甚捷新採威靈仙四兩搗取汁生薑四兩取汁真麻油二兩白砂蜜四兩陳

去沫右同入銀石器內慢火煎如錫時時以匙挑食之一料決效

難治不治證

嘔吐非反胃比也嘔吐如清菜汁者死此是乍然

年嘔吐非反胃比也嘔吐如清菜汁者死此是乍然

食不斷房室者不治氣血俱虛者則口中多出休但見休多出者必死

吐黃沫者
不可治

單方

凡三十種
有螺泥丸

黃丹

治反胃

黃丹一兩白礬二兩同入罐內火煨放
冷為末蒸餅和丸梧子大溫酒下五丸至七丸

黑鉛

等分而嘔者黑鉛炒成灰擯柳
末空心米飲調下

滑石

治反胃積飲滑石末生薑自然汁澄清白脚和
丸時時服之

妙

赤石脂

乾之

以水酒飲吐水成反胃石脂水飛每一錢空
任下加至二三錢無則以好赤土代

人參

治反胃垂死者人參末三錢薑汁五合粟米一
合煮粥空心食之

服日再

生薑

凡嘔吐皆因氣逆故用生薑之辛以散之。反胃嘔服薑汁

一升即差

半夏

凡嘔歲用半夏者散結氣也。○反胃嘔吐半夏一兩製生薑二兩剉分二貼水煎服。○嘔家

用半夏以去其水去則嘔自止

蘆根

治乾嘔服及五噎煩悶蘆根五兩水煎服

竹茹

主嘔噦取青竹茹一升水煎服。○嘔噦用竹茹者澁胃解煩也

鯽魚

治反胃取大鯽魚去腸留膽入綠礬滿腹以火灸焦為末每一錢米飲下日三服。○諸魚灰並

主噎

蚌蛤粉

治反胃吐食取爛粉米飲下一二錢。○現爛殼馬刀爛殼田螺爛殼並主反胃燒灰和飲



服

蜎主反胃吐逆取肉淹五味炙食

橘皮治反胃嘔吐橘皮用日照西方壁土末同

木瓜止嘔逆煮汁飲之佳生薑同煎服尤

蒲萄根止嘔飲之佳乾嘔煎服之

獼猴桃治熱壅反胃取汁和薑汁服之○藤汁至滑

杵頭糠主噎食不下咽喉塞取細糠蜜丸彈子大

甕子粟治反胃食不下和竹瀝

蓴和鯽魚作羹食之主

老牛口中涎主反胃噎膈取少許和水服之終身不

驢尿

主反胃吐不止朝夕垂絕取熟尿服二合再服便定七日本差精有毒不可多服

牛乳

治反胃噎膈要藥韭汁二盞牛乳一盞竹瀝半盞童便一盞生薑半兩取汁右和勻頓服

一人病反胃大便秘加附子大黃服且先以甘蔗汁

煮六君子湯方

食諸物半月大便潤而愈

田螺

治反胃大田螺多取新水養之待吐出泥澄去

上待半乾作丸梧子大每三十九藿香湯吞下立愈名曰螺泥丸其螺放於水中殺食無效

螃蛤

治反胃噎膈取螃蛤洗淨入水中高四指以香油小酒鍾入水中二指捻白麴撒水上涎即出

次日去蛤留水晒乾涎為末每服五分淡燒酒調下即效

馬剥兒

一名馬靴兒即王瓜也治噎膈反胃燒存性

食則可下然後隨證調理○一錢一

炊乾飯

治噯噯久不納穀取隔年炊乾飯以急流順水煮爛取汁時時飲之待能食以藥調治

雞穀袋

治噯噯取袋不以多少不可失包內一物用泥固濟火煨存性每袋一箇入薑炒香附末半

兩神麴糊和九梧子大薑湯吞下空心

猫胎衣

治反胃取猫生子胎衣陰乾燒為末酒調服甚效猫生子急取之稍遲則猫食之矣

狗膽

治反胃吐黃沫辰砂一兩大黃二兩為末狗膽浸二日乾再為末麴糊和九梧子大空心鹽湯

下三十丸

蝎虎

治噯食反胃取活蝎虎飲酒即愈○又雄雞餓一日火土溫之去蝎虎虎飲酒即愈○又雄雞餓一日

却取蝎虎切爛與雞喫取其糞焙乾為末每一錢燒酒調下

鍼灸法

灸乳下無度并乾嘔不止尺澤大陵皆灸三壯又

厥冷脉沉絕灸間使便通此回生起死之法○善嘔嘔有苦者邪在膽逆在胃取三里陽陵泉

育○吐食不化取上腕中腕下腕壅○反胃神效膏
中魁腕骨心俞中腕○今日食明日吐取心俞
膈俞豐中巨闕中腕○五壺五噦取天突豐中
心俞上腕中腕下腕脾俞胃俞通關中魁大陵三
里○反胃灸肩井三壯即愈乃神灸也○又
取水分氣
海灸之壅

咳嗽

咳嗽病因

○內經曰人感於寒微則為咳嗽又曰秋傷於濕上逆
而咳發為痿厥納○形寒飲冷則傷肺肺傷則咳
嗽○秋傷於濕冬必咳嗽者蓋秋傷於濕積於
脾也○大抵素秋之氣宜清而肅若反動之則氣必
上衝而為咳嗽甚則動脾濕而為痰也是知脾無
留濕則雖傷肺氣亦不為痰若肺有痰而寒少熱多
故咳嗽則雖傷肺氣亦不為痰若肺有痰而寒少熱多
外故風寒先能傷之也經曰五藏六府皆能使人
咳非獨肺也各以其時主之而受病焉非其時則

傳以與之也。所病不等。寒燥濕風火皆能令人咳嗽。惟濕病痰飲入胃留之而不行。上入於肺。則為咳嗽。假令濕在心經。謂之熱痰。濕在肝經。謂之風痰。濕在肺經。謂之氣痰。濕在腎經。謂之寒痰。所治不同。各隨證用藥。○咳謂無痰而有聲。脾濕動而有聲。肺氣傷而為痰也。咳嗽者。清也。嗽謂無聲而有痰。脾濕動而有聲。肺氣傷而為痰也。咳嗽者。有痰而有聲。因傷肺氣動於脾。濕故咳而無嗽也。○咳者。聲咳之咳。俗謂之嗽者。是也。肺主氣。形寒飲冷。則傷之。使氣上而不下。逆而不收。衝擊膈咽。令喉中澀澀如痒。習習如梗。是冷嗽甚者。續續不已。連連不息。坐卧不安。言語不竟。動引百骸。聲聞四隣矣。理。

脉法

咳嗽者。飲食傷脾。左關弦短。疲極肝衰。浮短。肺傷。法當咳。嗽五藏之嗽。各視本部。浮緊虛寒。沉數實熱。洪滑多痰。弦澁少血。形盛脉細。不足。以息。沉小。伏匿。皆死。脉惟。有浮大。而嗽者。生。外證。內脉。參考。秤停。○死關。上脉。微為咳。○脉弦。或緊。為寒。○脉浮。為風。○脉細。為濕。○脉數。為熱。○脉浮。軟者。生。沉小。沉數。為實。熱。○洪滑。為多痰。○脉浮。軟者。生。沉小。

伏匿者死。衄。喘急脉沉，肺脹停水，氣逆填胃，脉必伏取沉而實滑，身温易愈，身冷脉浮尺瀋難補。細。喘脉滑而浮者生，澁而數者死。大抵宜浮遲不宜急數。衄。喘鳴肩息者，脉實大也，緩則生，急則死。數者亦死，為其形損故也。繇。咳逆脉浮而者，死。數者亦死。為其形損故也。繇。咳逆脉浮而緩者，易治。弦急而按之不鼓者，難治。脉結或促，或微，皆可治。脉代者危。右關脉弦者，木乘土，位難治。衄。咳逆上氣，脉散者死。肺數，逆脉數為火刑金，必死。肺痿，唾膿血，脉數虛為肺痿。數實為肺癰。寸數虛，澁肺痿之形。強者死，滑者生。繇。寸數虛，澁肺痿之形。強者死，滑者生。

咳嗽雖屬肺亦有臟腑之異

中內經曰：咳嗽上氣，厥在胃。

○帝曰：肺之令人咳，何也？岐伯對曰：五臟六府皆令人咳，非獨肺也。帝曰：願聞其狀。岐伯曰：皮毛者，肺之合也。皮毛先受邪氣，邪氣以從其合也。其寒飲食入胃，從肺系上至於肺，則肺寒。肺寒，內外合邪，因客之則為肺咳。五臟各以其時受病，非其時則各傳以與之。乘秋則肺先受邪，乘春則肝先



受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘冬則腎先受之帝曰何以異之岐伯曰肺咳之狀咳而喘息有音甚則唾血心咳之狀咳則心痛喉中呖呖如梗狀甚則咽腫喉痺肝咳之狀咳則右肱下痛甚則不可以轉轉則兩肱下滿脾咳之狀咳則右肱下痛陰引肩背甚則不可以動動則咳劇腎咳之狀咳則腰背相引而痛甚則咳涎帝曰六府之咳奈何安所受病岐伯曰五藏之咳久咳乃移於六府脾咳不已則胃受之胃咳之狀咳而嘔嘔甚則長虫出肝咳不已則膽受之膽咳之狀咳而矢心咳不已則小腸受之小腸咳之狀咳而遺尿咳不已則三焦受之三焦咳之狀咳而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多濁唾而面浮腫氣逆也

臟腑治咳藥

肺咳宜麻子附子細辛湯
肝咳宜小柴胡湯
脾咳宜桔梗湯
胃咳宜升麻湯
大腸咳而遺尿久咳不
小腸咳而遺尿久咳不
三焦咳而腹滿不欲食飲此
寒腎咳宜麻子附子細辛湯
門腎咳宜麻子附子細辛湯
蚘蛄膽咳宜黃芩湯加半夏生薑
蚘蛄膽咳宜黃芩湯加半夏生薑

藥甘甘草湯肺宜赤石脂禹餘糧湯肺宜茯苓甘草湯肺宜

氏異功散肺宜錢

嗽作有四時早晏之異凡咳嗽春是春升之氣夏是火

風寒外束肺。大槩春氣上升宜潤肺抑肝夏火

上炎宜清金降火秋濕熱甚宜清熱瀉濕冬風寒

其痰庶不再來肺。○早晨嗽多者胃中有食積至

此時火氣流入肺中瀉白散加知母或二母散肺

嗽○上半日嗽多屬胃中有火用貝母石膏降胃

火一云上半日咳多者肝胃中有實火單石膏

丸炒肺加知母貝母若便閉喘渴痰稠者宜涼膈

散炒肺○午後嗽多屬陰虛四物湯加知母炒黃

柏先降其火一云午後嗽多屬陰虛四物合

二陳湯加知母黃柏麥門冬如寒熱盜汗遺精宜

滋陰降火湯肺○黃昏嗽多此火氣浮於肺不

宜用涼藥五味子五倍子肺嗽而降之一云黃昏嗽

多者肺嗽潤肺丸以斂之肺嗽肺也肺通用二陳湯

去半夏加貝母瓜蒌青黛梔子黃芩桑白皮。夜嗽用降陰分火心。○風寒鬱熱夜嗽者三拗湯加

知母黃芩生薑

桔梗湯

除痰止咳嗽又治心咳桔梗半夏製陳皮去白各一兩枳實三錢右為麤末每三錢薑五

水煎服

二母散

治諸般咳嗽無治痰喘知母貝母各一兩巴豆十粒作霜右為末每服一字與薑三片臨

卧細嚼白湯下便合口睡其嗽即定亦治久嗽不愈

咳嗽諸證

有風嗽寒嗽熱嗽濕嗽鬱嗽勞嗽食積嗽氣嗽痰嗽乾嗽血嗽酒嗽久嗽火嗽夜嗽天行

嗽通治咳嗽藥。○咳因氣動為聲嗽乃血化為痰肺氣動則咳脾濕動則嗽脾肺二藏俱動則咳

俱作也

風嗽

風乘肺則鼻塞聲重口乾喉痒語未竟而咳。○傷風咳嗽者脉浮增寒壯熱自汗惡風口乾煩燥鼻

流清涕欲語未竟而咳鑿鑿傷風咳嗽宜神木散
款冬花散人參荊芥散欬覲金沸草散三拗湯五

三拗湯加減

神木散

治傷風頭痛鼻塞聲重咳嗽蒼朮二錢羌活
川芎白芷細辛甘草各一錢右剉作一貼薑

三葱一煎服

款冬花散

治寒壅相交肺氣不利咳嗽痰盛麻黃貝
母桑白皮半夏款冬花各五分

右剉作一貼薑三片水煎服

金沸草散

治肺感風寒咳嗽聲重痰涎黃濁壅盛荊
芥穗二錢旋覆花前胡各一錢半麻黃赤

茯苓各一錢半夏七分半細辛甘草各三分右剉
作一貼入薑三棗二梅一水煎綿濾去滓服

三拗湯

治感風寒咳嗽鼻塞聲重失音麻黃不去根
節杏仁不去皮尖甘草不炙不去皮各一錢

半右剉作一貼入
薑五片水煎服



五拗湯

治感風寒咳嗽聲重咽痛三拗湯加荊芥穗桔梗各一錢煎服如上法

加減三拗湯

治風喘嗽麻黃二錢蘇子前胡各六分右剉

作一貼入薑三片水煎服

寒嗽

寒傷肺者咳則胃緊聲啞。脈緊增寒發熱無汗惡寒煩燥不渴遇寒而咳。○風寒者鼻塞聲

重惡寒二陳湯加麻黃杏仁桔梗。○一種咳嗽每遇寒則發乃寒色熱也解表則熱自除枳梗湯

枳梗湯加麻黃防風杏仁陳皮紫蘇葉木通黃芩。○脾肺皆受寒邪則面赤弦微涎出口甘水

反侮土寡於畏也腹中大寒痰白作泡。○寒嗽宜九者胃中寒而不和以辛甘熱去之。○寒嗽宜九

寶飲華蓋散杏仁湯紫蘇飲子橘蘇飲薑桂九人參款花膏半夏溫肺湯杏蘇湯白圓子人參潤肺

湯溫肺湯加味理中湯八

九寶飲

治諸般咳嗽及寒嗽久嗽陳皮薄荷麻黃桂皮桑白皮紫蘇葉杏仁大腹皮甘草各一錢

右剉作一貼入薑五
梅一箇水煎服

華蓋散

治肺感寒邪咳嗽上氣鼻塞聲重麻黃二錢
赤茯苓蘇子陳皮桑白皮杏仁各一錢甘草

灸五分右剉作一貼入薑
三片棗二枚水煎服

杏子湯

治感風寒痰盛咳嗽尤宜冷嗽人參半夏赤
茯苓白芍藥細辛乾薑桂皮杏仁五味子各

一錢甘草五分右剉作一貼入薑
五梅一水煎服加麻黃尤佳

紫蘇飲子

治脾肺虛寒咳嗽痰盛紫蘇葉桑白皮青
皮杏仁五味子麻黃陳皮甘草各一錢人

參半夏各六分右剉作
一貼入薑三水煎服

橘蘇散

治傷寒咳嗽身熱有汗脉浮數服杏子湯不
得者宜服此橘紅紫蘇葉杏仁白朮半夏桑

白皮貝母五味子各一錢甘草五
分右剉作一貼薑三水煎服

薑桂丸

治寒痰咳嗽桂皮二兩南星半夏並製各一
兩右爲末薑汁浸蒸餅和丸棗豆大薑湯下

三五十
丸楊

入參款花膏

治肺胃虛寒久嗽不已款冬花人參五
味子桑白皮紫菀各一兩右為末蜜丸

灸實大每一丸以淡薑
湯嚼下含化亦得

半夏溫肺湯

治虛寒咳嗽中脘有痰水冷氣心下注
洋嘈雜多唾清水脉沉弦細遲此胃虛

冷也半夏細辛桂心旋覆花陳皮人參桔梗白芍
藥甘草各一錢赤茯苓六分右剉作一貼入薑五

水煎
服

杏蘇湯

治傷風寒咳嗽痰盛杏仁紫蘇葉桑白皮陳
皮半夏貝母白朮五味子各一錢甘草五分

右剉作一貼入
薑五水煎服

人參潤肺湯

治傷寒咳嗽人參乾葛桔梗白芷麻黃
乾薑白朮甘草各一錢右剉作一貼薑

三葱二
煎服

溫肺湯

治肺虛客寒喘咳嘔吐痰沫乾薑桂皮半夏陳皮五味子杏仁甘草各一錢細辛阿膠珠

各五分右剉作一貼入薑三棗二水煎服

加味理中湯

治肺胃俱寒咳嗽人參白朮乾薑甘草赤茯苓半夏陳皮細辛五味子各一錢

右剉作一貼入薑三棗二水煎服

八味欬冬花散

治肺經寒熱不調涎嗽不已桑白皮紫菀茸五味子甘草各一錢右剉作一貼水煎去滓入黃蠟皂角子大再煎熔化服之

紫菀茸五味子甘草各一錢右剉作一貼水煎去滓入黃蠟皂角子大再煎熔化服之

飴薑元

治冷嗽果糖一介乾薑細末四兩右先焙糖次下薑末和勻待凝作片常嚼下

熱嗽

傷於暑熱兩得咳則口燥或吐涎沫聲嘶咯血鑿者脈數煩熱引飲口燥或吐涎沫聲嘶咯血鑿

凡咳嗽面赤胃腹脇常熱惟足乍有涼時其脈洪滑者熱痰在內也宜小脂胃湯熱嗽胃滿○熱嗽宜辰砂六一散散粉洗肺散人參瀉肺湯貝母散參朮調中湯苓半丸小黃九黃連化

痰九四
汁膏端

洗肺散

治咳嗽痰盛有熱肺氣不清利半夏三錢黃

仁一錢甘草五分右剉作
一貼入薑五片水煎服

人參瀉肺湯

治熱嗽即涼膈散炒梔去朴硝加入參

貝母散

治火嗽久嗽杏仁三錢款冬花二錢知母一

錢半貝母桑白皮五味子甘草各一錢右坐
作一貼入薑三片水煎服

參朮調中湯

除熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食桑

甘草各六分地骨皮一錢黃芪八分人參白朮白茯苓
二錢五味子二十粒右剉作一貼水煎服

芩半丸

治熱嗽生痰黃芩半兩夏各一兩右為末
薑汁和丸梧子大薑湯下七十丸

小黃丸

治熱痰咳嗽脉洪面赤煩渴黃芩一兩半南
星半夏並製各一兩右為末薑汁浸蒸餅和

九梧子大薑湯
下五七十丸

黃連化痰丸

治熱痰咳嗽黃連吳茱萸各一錢半陳皮五錢半夏一兩半右為末薑汁糊和

丸茶豆大薑湯
吞下一百丸

四汁膏

止咳嗽消痰降火雪梨汁藕汁生蘿菈汁生薄荷汁右等分入砂糖屑和勻慢火熬成膏

以匙抄
服門

濕嗽

濕勝肺者咳則身重骨節煩疼四肢重着或有汗小便不利

○濕嗽宜不換金正氣
散麝白木湯白木丸

白木湯

治濕嗽痰多身體重着脉濡細白木三錢半夏橘紅白茯苓五味子各一錢半甘草五分

右剉作一貼入
薑五水煎服

白木丸

治濕痰咳嗽身重脉緩白木一兩半南星半夏並製各一兩右末薑汁糊和九薑湯下五



七
十
九
十

鬱嗽

即火咳甚者乾咳而無痰乃腎水焦枯邪火獨炎於肺宜瀉白散功觀清化丸訶黎勒九霞天膏貼

門○火鬱者有聲痰少面赤者是也宜用清金降火湯

清化丸

治肺鬱痰嗽睡不安貝母一兩杏仁五錢青黛三錢右為末砂糖入薑汁糊和丸彈子大

心丹
禽化

訶黎勒丸

治勞嗽乾咳及肺脹喘急訶子皮五錢海粉瓜蒌仁青黛杏仁貝母便香附各二錢

半右為末薑汁和蜜為丸櫻桃大含化徐徐嚥下

清金降火湯

治熱嗽能瀉肺胃之火火降則痰消嗽止陳皮杏仁各一錢半赤茯苓半夏桔

梗貝母前胡瓜蒌仁黃芩石膏各一錢枳殼八分甘草三分右剉作一貼入生薑三片水煎服食後

此金

勞嗽

虛勞咳嗽也。勞嗽者盜汗出無痰多作寒熱宜補陰清金四物湯加竹瀝薑汁。○陰虛火動而嗽

四物合二陳加黃栢知母。○陰虛喘嗽或吐血四物加黃栢知母五味子麥門冬桑白皮地骨皮

○好色之人元氣虛弱咳嗽不愈宜瓊玉膏。○治虛勞乾咳嗽最捷。○勞嗽宜入參清肺湯加

味二母丸。人參芎歸湯加味。人參紫菀散潤肺丸。補肺湯溫金散大寧嗽湯知母湯寧嗽膏大阿膠

元。○酒色過度虛勞少血津液內耗心火自炎。遂使燥熱乘肺咯唾膿血上氣涎潮其嗽連續而

不已須用六味地黃丸。○加橘紅貝母黃栢知母。○

人參清肺湯

治久嗽勞嗽及肺痿唾血腥臭人參桑白皮地骨皮知母阿膠珠翬栗殼蜜炒

杏仁桔梗甘草各一錢。右剉作一貼。入大棗烏梅各一枝。水煎去滓。入蜜一匙。攪勻。澄清。服。○

一名人參清肺飲。○

加味二母丸

治久嗽勞嗽食積嗽。知母貝母同巴豆炒。黃色去巴豆。○



味等分右為末和薑汁入蜜為丸灸實大含
化燕下或加麥門冬陳皮阿膠珠亦好

人參芎歸湯

治乾嗽因虛勞少血燥熱乘肺咯唾膿
血動輒冒寒咳嗽當歸川芎白芍藥各

一錢半赤茯苓人參半夏陳皮阿膠珠細辛五味
子甘草各七分右剉作一貼薑三棗二水煎服

加味人參紫菀散

治虛勞咳嗽人參五味子紫菀茸
陳皮紫蘇葉貝母桑白皮白茯苓

各一錢杏仁甘草各七分半加川芎半夏麴各一
錢阿膠珠五分右剉作一貼薑五棗二梅一水煎

服

潤肺丸

治燥痰乾嗽勞嗽貝母一兩瓜蒌仁青黛
各五錢右為末薑汁蜜調成膏

補肺湯

治勞嗽桑白皮蜜炒熟地黃各三錢人參紫
菀黃芪五味子各一錢右剉作一貼水煎入

蜜一匙
服

溫金散

治勞嗽防風桑白皮黃芩甘草各一兩杏仁
去皮尖二十一粒入參茯苓神各五錢麥門冬

二錢半右取前五味入米泔水浸一宿晒乾次入人參茯苓神麥門冬同為末每取三錢入黃蠟大豆

許煎服

大寧嗽湯

治勞嗽神效半夏二錢五味子赤茯苓桑白皮紫蘇葉陳皮枳殼杏仁阿膠珠鸛栗

殼蜜炒各一錢細辛甘草各五分右剉作一貼入薑三棗二梅一水煎服

知母湯

治虛勞咳嗽唾膿血心肺有熱黃芪蜜炙一錢半白芍藥生乾地黃黃芩麥門冬人參白

茯苓桔梗知母各一錢甘草五分右剉作一貼入薑三片竹葉三片小麥一撮水煎服

寧嗽膏

治陰虛火動咳嗽咯血天門冬白朮各八兩百部根杏仁貝母百合各四兩款冬花五兩

紫菀三兩右釐剉以長流水一斗煎取三升又易新水煎取三升如此三次合取汁入飴糖八兩蜜

十六兩再熬入阿膠四兩白茯苓細末四兩和勻成膏每服三五匙不以時服

大阿膠元

治虛勞咳嗽吐血唾血發熱消瘦山藥五味子熟地黃阿膠珠白茯苓各一兩麥門冬

丹參貝母防風茯苓神柏子仁百部根杜仲各五錢
遠志人參各二錢半右為末蜜和作丸彈子大每

煎一丸以水略

食積嗽

山查子麥芽嗽胃滿意酸宜二陳湯加厚朴

又云有食積人面青白黃色不常面上如蟹爪路
一黃一白者是也○食積痰嗽發熱者半夏南星

並製為君瓜萋實蘿菹子為臣青黛石礪為使薑
汁糊為丸服心○一方三補丸瘰癧加二母炒知

嗽宜為末水丸嗽宜為末水丸青金丸二母寧嗽湯溫脾湯香附丸

方諸

瓜萋丸

治食痰壅滯喘嗽瓜萋實半夏麴山查子神
麴各等分右為末瓜萋瓢水和丸竹瀝薑湯

下五
十丸

青金丸

治食積火鬱嗽劫藥也貝母知母各五錢巴
豆霜五分右末薑汁糊和丸青黛為衣白湯

下五廿
丸

二母寧嗽湯

治傷飲食胃火上炎衝逼肺氣痰嗽久

一錢半梔子黃芩各一錢二分桑白皮赤茯苓瓜
蒞仁陳皮各一錢枳實七分生甘草二分五味子

十粒右剉作一
貼薑三煎服

溫脾湯

治食飽則咳甘草四兩大棗二十枚
右剉水五升煮至二升分三服針

香附丸

治食積痰嗽蒼朮三兩香附子一兩半蘿藦
子炒瓜蒞仁杏仁半夏各一兩黃芩赤茯苓

各五錢川芎三錢右為末薑汁
糊和丸淡薑湯下五七十九

氣嗽

七氣積傷成咳嗽痰涎凝結或如敗絮或如梅核
滯塞咽喉咯不出嚥不下婦人多有之

宜蘇子降氣湯
青龍散三子養親湯蘇子煎玉粉丸星香丸橘薑

方諸丸



團參飲子

治七情咳嗽勞傷肺脾多唾膿血漸成肺痿將作勞瘵人參半夏紫苑阿膠珠百合

款冬花天門冬杏仁經霜桑葉各一錢細辛甘草各五分五味子十五粒右剉作一貼薑三煎服

青龍散

治咳上氣不得卧人參陳皮紫蘇葉五味子右剉一兩薑三水煎服

三子養親湯

治咳嗽氣急養脾進食紫蘇子蘿菹子白芥子各一錢紙上微炒研煮湯飲勿

煎太過味苦

蘇子煎

治老虛人上氣咳嗽紫蘇子一升另擣為末杏仁去皮尖雙仁一升另研為泥生薑汁生

地黃汁白蜜各一升蘇杏二味以二汁澆之絞取汁其滓再擣再絞令味盡出乃合蜜攪勻盛器中

重湯煮如錫每服一大匙日三或去地黃汁代竹瀝亦佳

玉粉丸

治氣痰咳嗽喘急陳皮二兩南星半夏各一兩右為末以薑汁浸蒸餅和丸薑湯下五七

錫十九

餅和丸梧子大薑湯下五七十九半
夏須久浸薑汁炒黃色否則辣喉

橘甘散

治氣嗽痰嗽甚效橘皮生薑焙乾神麴炒各等分右為末溫水和丸梧子大米飲下五七

十九日
再

滴油散

治痰嗽面浮如盤蚌粉新瓦上炒令通紅放地上出火毒每半兩加青黛一錢以淡薑水

滴入麻油數點
調服即愈

玉芝元

治風熱痰盛咳嗽聲重半夏麴六兩人參薄荷白茯苓白礬枯南星泔浸焙各三兩右為

末薑汁煮麴糊和丸梧子
大薑湯下五七十九

澄清飲

治痰嗽服他藥不效者南星半夏並製蚌粉知母貝母白礬各一錢右剉作一貼薑五煎

澄清徐服

三聖丹

治久痰嗽極效半夏製二兩南星煨一兩甘草生半兩右以半星二味為末薑汁拌勻膏

作麵冬十夏五春秋七日取出再為末入甘草末和勻竹瀝一椀拌和作餅子焙乾又將竹瀝沃濕焙乾如此十數次以竹瀝盡為度再研為末煉蜜調和如飴臨卧抄一匙於口內嚥化以竹瀝漱口

燕下

藍漆煎元

治痰嗽藍漆二兩人參杏仁胡桃肉各一兩右為末蜜丸彈子大每服一丸薑湯或米

飲嚼下

安肺散

治痰嗽不問新久鴛栗殼炒黃色四兩麻黃甘草炒各二兩右麤末每三錢烏梅一箇同

煎服

人參散

痰嗽通用半夏麴二錢人參桔梗五味子細辛枳殼赤茯苓杏仁各一錢甘草五分右剉

作一貼入薑五梅一水煎服

白圓子

治風痰嗽有一種咳嗽直至頓吐飲食痰物俱出盡方小定此乃肝木尅脾土風痰壅盛



呀致宜以白元子方作生料賦覲加木香丁
香橘紅天麻全蝎白蠶蚕水煎和薑汁服

乾嗽連咳十數聲方有痰出是也此證本於氣澁澁微者

痰出是為乾咳極難治也此係火鬱之證乃痰鬱火邪

已在肺中用苦桔梗以開之不得用補陰降火之劑不

已則成勞須行倒倉法此不得志者有之用四物

湯加蜜煎瀝炒黃柏之類陳皮湯燥痰不出者用蜜水

吐之蜜煎生薑湯蜜煎陳皮湯燥痰生薑胡椒方皆

治無痰而嗽者以辛甘潤其肺也錫○治乾嗽補

肺生地黃二斤洗淨杏仁二兩生薑二斤取汁先挑

右搗如泥盛磁器置飯上蒸五七度每於五更挑

三匙嚥下轉○又方白蜜一升生薑二斤取汁先挑

秤銅器知斤兩訖內蜜復秤知數次內薑汁以微

火煮令薑汁盡惟蜜介兩在則止每服如棗子大

含化日三針○乾嗽宜用瓊玉膏觔潤

肺散加味二母丸訶黎勒丸抑痰丸

血嗽癆血致嗽者喉間有腥氣或吐唾血痰因打撲傷

服門。○生桃仁七粒以韭汁送下最佳。○
血嗽宜服人參百合湯。治勞嗽吐血紅白。白朮白茯苓人參五味子黃

人參百合湯。天門冬各一錢。白朮白茯苓人參五味子黃

甘草各三分。右坐作一貼。水煎服。○

桑皮散。治上焦有熱。血壅腥悶。嗽聲連併。氣不得透。

右剉作一見。入薑三片。棗二水煎服。○

當歸飲。因打撲損傷。肺氣咳嗽吐血。黑血大黃蘇木生

服溫酒調

酒嗽。酒性大熱。因傷引飲。冷與熱凝於胃中。不散而成。

○酒傷肺。成痰嗽。以竹瀝煎紫蘇。入韭汁。就吞瓜

蔓杏連丸。又

瓜蒌杏連丸

治酒痰嗽瓜蒌仁杏仁黃連各等分
右為末以竹瀝薑湯煮糊和丸服

蜂薑丸

治酒痰嗽及積痰久嗽留肺腕粘滯如膠氣
不升降便香附白強蠶炒海蛤粉瓜蒌仁蜂

房杏仁神麴各等分右為末以薑汁竹瀝入蜜和
丸櫻桃大含化嚥下

久嗽

乃積痰久留肺腕粘滯如膠氣不升降或挾濕與
酒而作

肺湯貝母湯九加味百花香散天鼠散清
肺湯馬兜鈴九加味百花香散天鼠散清

貝母湯

治諸般久嗽貝母薑製乾薑生五味子陳皮
半夏製柴胡桂心各五錢黃芩桑白皮各二

錢半木香甘草各一錢二分半右麤末每五錢入
製杏仁七箇生薑七片水煎服

服此一貼即
愈神效

九仙散

治久嗽乃收功後藥收斂之劑也
炒二錢人參款冬花桑白皮桔梗阿膠珠五

味子各一錢貝母半錢右剉作
一貼入薑三梅一水煎服

人參款花散

治久嗽驚栗款蜜炒黃色一兩人參款冬花各五錢知母貝母半夏製各三錢

右為麤末每五錢烏梅一箇同水煎服

天鼠散

治久咳嗽上氣十年諸藥不差編蝠除翅足燒令焦為末和飲服之妙

清肺湯

治久嗽及痰嗽肺脹嗽黃芩一錢半桔梗赤茯苓桑白皮陳皮貝母各一錢當歸天門冬

純子杏仁麥門冬各七分五味子七粒甘草三分右剉作一貼薑三棗二水煎服

馬堯鈴丸

治久嗽神效馬堯鈴半夏杏仁各一兩另研巴豆二粒去皮心油另研右細末

和勻以皂角煎膏和丸梧子大雄黃為衣以烏梅湯下十丸以利為度

加味百花膏

治久嗽不愈紫菀款冬花各一兩百部根五錢右為末每三錢薑三梅一煎湯

調下食後

潤肺除嗽飲

治遠年咳嗽如神款冬花紫菀茸麻黃陳皮石膏粉桔梗半夏桑白皮枳殼烏



梅肉 鷲栗 殼各七分 人參 杏仁 薄荷 生甘草 各五分 朱子九粒 右剉作一貼 薑三片 細茶一撮 同煎服

煎服

火嗽

○火嗽有聲痰少面赤者是或煩渴引飲脉洪數火

湯二母寧嗽湯抑心清肺丸玄霜雪梨膏人參清鎮丸滋陰清化膏海青丸

清肺飲

治肺熱咳嗽前胡 荊芥 桑白皮 枳殼 各一錢 知母 貝母 薄荷 赤茯苓 桔梗 紫蘇葉 阿膠 珠

杏仁 天門冬 甘草 各七分 右剉作一貼 入薑三梅一水煎服

柴胡枳桔湯

治傷寒胃脇痛潮熱咳嗽喘痰盛麻黃杏 仁枳殼 桔梗 柴胡 黃芩 半夏 知母 石膏

乾葛 各一錢 甘草 五分 右剉作一貼 入薑三水煎服

抑心清肺丸

治肺熱咳嗽咯血即黃連阿膠元也 欒蓋黃連赤茯苓能抑心火肺得其清

則嗽自止

玄霜雪梨膏

治勞嗽久不愈消痰止咳生津止咯唾

者勿用藕汁十鍾生地黄汁十鍾麥門冬煎取汁
五鍾生蘿菈汁五鍾茅根汁十鍾右汁重濾去滓

火上煎煉八蜜十六兩飴糖八兩柿霜八兩薑汁
半盞火上再熬如稀糊則成膏矣每服三五匙

人參清鎮丸

治熱止嗽消痰定喘柴胡人參各一兩
半生黃芩半夏甘草各七錢半麥門冬

三錢陳皮五味子各二錢青黛六錢右末
水糊和丸梧子大白湯下三五十九

滋陰清化膏

止咳嗽清痰火滋化源肺腎乃人身之
化源也生地黃熟地黃並酒浸天門冬

麥門冬各二兩黃柏鹽酒炒一兩半白茯苓山藥
枸杞子白芍藥酒炒知母鹽酒炒玄參薏苡仁炒

各一兩五味子七錢甘草生五錢右為末蜜丸彈
子大每丸空心中噙化嚥下○痰嗽甚加陳皮貝

母各一兩

海青丸

治火鬱嗽及肺脹氣急息重訶子皮海蛤粉
瓜蒌仁青黛半夏製便香附各一兩右為末



以薑汁浸蒸餅和凡菜豆
大薑湯下三五十九

夜嗽

夜間咳嗽屬陰虛治之用知母止嗽勿用火生薑以其辛散故

也。凡夜嗽久嗽多屬腎氣虧損火炎水涸或
津液涌而為痰須用六味地黃元虧覲加黃柏知

母天門冬貝母橘紅以滋陰清化膏麻黃蒼朮湯炒
亦佳。冬夜嗽宜用滋陰清化膏麻黃蒼朮湯炒

麻黃蒼朮湯

治秋冬夜嗽不絕至曉方緩口苦胃痞
脇痛痰唾涎沫不進飲食麻黃八錢蒼

朮五錢黃芪一錢半草豆蔻六分柴胡羌活各五
分防風當歸梢生甘草各四分炙甘草黃芩各三

分五味子十五粒右剉
分作二貼水煎服

天行嗽

時令不正人多感冒咳嗽宜服人參飲子一服散
○四時感冒咳嗽宜服人參蘇飲

人參飲子

治天行咳嗽痰盛寒熱人參桔梗五味子
赤茯苓半夏各一錢半枳殼甘草各七分

右剉作一貼薑五水煎服。寒暑之交氣盛人衣
厚作壅忽痰盛微熱此藥最宜若作感冒發其汗

必成大病此方佳處在赤茯苓能導心熱枳殼能疎肺壅故易為效

一服散

治時行暴嗽大半夏三箇杏仁七箇罌粟殼二箇烏梅二箇阿膠二片生薑十片紫蘇十

葉甘草一錢右剉作一貼水煎服

通治咳嗽藥

咳而無痰者以辛甘潤其肺故咳嗽治痰其痰而咳者自愈枳殼橘紅利其氣而痰飲自下痰而能食者小承氣湯微利之痰而不能食者厚朴湯未疎導之夏月嗽而發熱者謂之熱嗽小柴胡湯四兩入石膏一兩知母五錢冬時嗽而發寒者謂之寒嗽小青龍湯加杏仁此治法之大體也

也而痰滑也南星半夏十數不能出痰者肺燥勝痰濕也枳殼紫蘇杏仁之屬利其肺研外感久則鬱熱內傷久則火炎俱宜開鬱潤燥

宜以青皮疎肝氣無用白芥子之類後以二陳湯加南星香附青皮青黛薑汁糊為丸服

湯治咳嗽去痰伐病根之藥除陰虛血虛火盛乾咳嗽者勿用心刊○咳嗽通用清金飲五嗽元端

清金飲

治諸般咳嗽杏仁白茯苓各一錢半橘紅一錢二分五味子桔梗甘草各一錢右剉作一

貼水煎服必一名杏仁五味子湯

備急五嗽元

一曰氣嗽二曰飲嗽三曰燥嗽四曰冷嗽五曰邪嗽晝夜不止面目浮腫飲食

不下肉桂乾薑皂莢各等分右為末蜜丸梧子大溫水下十五丸

喘證有八

喘者火氣甚則火鬱而成喘痰在肺胃也○喘者火氣甚則火鬱而成喘痰在肺胃也○喘者火氣甚則火鬱而成喘痰在肺胃也○

促者謂之喘喉中有聲響者謂之哮喘虛者氣乏身冷痰如水實者氣壯胃滿身熱便硬○喘者肺主氣形寒飲冷則傷肺故其氣逆而上行衝衝而氣急喝喝而息數張口擡肩搖身滾肚者是為喘也○有起居如故而息有音者乃肺之絡脉逆而不隨經上下故也○火氣甚為夏熱衰為冬寒故病寒則氣衰而息微病熱則氣盛而息急又寒水為陰主乎遲緩熱火為陽主乎急數是以

寒則息遲氣微熱則息數氣盛而為喘也。阿○喘
非風寒傷肺則痰火脹肺風寒則祛散痰火則踈
導但火急者亦不可純用苦寒宜溫以却之。却藥
見下門○九喘未發以扶正氣為主已發以散邪

為主。喘○喘有風寒喘痰喘氣喘火喘水喘久
喘胃虛喘陰虛喘諸病發喘嗽通治喘嗽藥。諸

風寒喘

草散坊見麻黃散內鬱肺脹逆而為喘風宜金沸
○

寒宜加朱三拗湯人參定喘湯小青龍湯止喘元
蘇溫肺湯五味子湯九味埋中湯五虎湯

喘○冷喘則遇寒而發。鑿○肺寒肺
虛必有氣乏表怯冷痰如水之證。鑿

麻黃散

治傷風喘急痰壅涕唾稠粘麻黃二錢桂皮
一錢二分款冬花訶子皮甘草各一錢杏仁

六分右剉作一貼入
細茶一錢水煎服。細

人參潤肺散

治感冒風寒咳嗽喘急痰壅鼻塞麻黃二
錢貝母杏仁各一錢半人參甘草各一

錢桔梗阿膠各五分橘紅二分半右
剉作一貼入紫蘇葉二片同煎服。研

人參定喘湯

治肺感寒邪喘急亦治咳嗽驚栗殼蜜

麴阿膠珠甘草各一錢桑白皮五分右剉作一貼薑三煎服

參蘇溫肺湯

治形寒飲冷則傷肺喘喝煩心胃滿短

半夏桑白皮白朮白茯苓各一錢甘草五分右剉作一貼薑三煎服

五味子湯

治寒喘麻黃二錢五味子杏仁橘紅各一

貼紫蘇三葉煎服

加味三拗湯

治寒喘麻黃二錢陳皮一錢甘草五分

右剉作一貼薑三煎服

九味理中湯

治寒喘者手足冷脉沉細也縮砂

各一錢沉香木香各五分並水磨取汁右剉作一貼薑三煎入沉香木香汁調服

五虎湯

治傷寒喘急麻黃三錢石膏五錢杏仁二錢甘草一錢細茶一撮桑白皮一錢半右剉作

一貼入薑三片葱白一莖水煎服

止喘元

治冷喘草撥胡椒人參胡桃肉各等分右末蜜和兩作三十丸每一丸細嚼溫水下

痰喘

痰喘者凡喘便有痰聲門入痰喘宜千緡湯千緡導

痰化痰湯潤肺膏蘇子導痰降氣湯大羅皂丸祛

痰丸端○凡喘正發之時閉塞不通而喘當其時却吐痰者

乃痰在正發之時閉塞不通而喘當其時却吐痰者

引則易安宜桔梗瓜萋仁枳殼杏仁蘇葉前胡等

千緡湯

治痰喘數服即安半夏七枚炮四破皂角灸甘草炙各一寸南星炮一錢右剉作一貼薑

服五水煎



千緡導痰湯

治痰喘不能卧一服即安半夏七枚炮切作四片南星陳皮赤茯苓枳殼各一

錢皂角甘草各一寸並炙右坐作一貼八生薑五片水煎服

加減三奇湯

治咳嗽喘上氣痰涎不利半夏二錢桔梗陳皮青皮人參桑白皮紫蘇葉杏仁五

味予各一錢甘草五分右坐作一貼入薑三水煎服

貝母散

治熱嗽及痰喘辰時服酉時可安即上二母散也

平肺散

治喘嗽痰盛寒熱往來咽乾口燥陳皮一錢半夏驚栗殼薄荷紫蘇葉烏梅肉紫苑知母

桑白皮五味子杏仁桔梗各七分甘草五分右坐作一貼薑三水煎服

紫蘇半夏湯

治喘嗽痰盛寒熱往來桑白皮二錢杏仁一錢半半夏陳皮紫蘇葉五味子紫

苑各一錢右坐作一貼薑三水煎服

定喘化痰湯

治咳嗽痰喘陳皮二錢半夏南星並製各一錢半杏仁二錢五味子甘草各八

分款冬花人參各七分右剉
作一貼薑五片水煎服

潤肺膏

治同上紫苑杏仁款冬花各一兩麻黃桔梗
訶子細辛各五錢枯白礬一錢胡桃肉一兩

生薑二兩取汁清油八兩蜜一升右先將油煉熟
次入蜜煉去沫却下藥末攪勻每服二三匙白湯

調下臨
卧時心

蘇子導痰降氣湯

治痰喘上氣蘇子二錢半夏當歸
各一錢半南星陳皮各一錢前胡

厚朴枳實赤茯苓各七分甘草五分
右剉作一貼入薑三棗二水煎服

大蘿皂丸

治氣喘痰喘風痰食痰酒痰麪毒等證
薑子炒二兩皂角燒存性一兩南星半夏

並製杏仁瓜蒌仁便香附青黛陳皮各五錢右為
末神麴糊和丸梧子大薑湯吞下六七十九丸

祛痰丸

治風痰喘嗽人參木香天麻陳皮赤茯苓青
皮白朮各一兩皂角九錢槐角子半夏各七

錢半右為末薑汁糊和丸梧子大
每五十九溫酒或薑湯吞下



氣喘

七情所傷氣急而無聲響。驚憂氣鬱惕悶。引息鼻張呼吸急促而無痰聲者是也。喘者

上氣急促不能以息之謂也。鑿。氣虛氣短而喘。不可用苦寒之藥。火盛故也。宜用人參蜜炙黃柏

麥門冬地骨皮之類。研。○氣實人因服黃芪過多。而喘用三拗湯。上方見。以瀉其氣。研。○氣喘宜加味

四。七。湯。加味。白。木。散。定。肺。湯。杏。仁。半。夏。湯。蘇。子。降。氣。湯。方。規。加。味。白。木。散。定。肺。湯。杏。仁。半。夏。湯。蘇。子。降。氣。湯。

降。湯。加。味。四。君。子。湯。沉。香。降。氣。湯。方。規。

四磨湯

治七情鬱結上氣喘急。人參。檳榔。沉香。烏藥。各等分。濃磨。水取七分。盞煎三五沸。微溫。

服不拘時

六磨湯

治同上。又治胃中氣滿。甚當四磨湯。加木香。枳殼。等分。製法同上。煉。

清金湯

治咳嗽喘急。胃滿氣逆。坐臥不安。陳皮。赤茯苓。杏仁。阿膠。珠。五。味。子。桑。白。皮。薏。苡。仁。紫。蘇。

葉。百。合。貝。母。半。夏。麴。款。冬。花。各。七。分。鷲。栗。殼。人。參。甘草。各。三。分。右。剉。作。一。貼。入。薑。三。棗。二。梅。一。箇。同。

煎服

加味白朮散

治氣虛喘急飲食不進又治喘嗽飲酒必發者即參苓白朮散

夏各一錢右作一服入薑三片桑白皮七寸同煎服

定肺湯

治上氣喘嗽紫菀葶五味子橘皮蘇子杏仁桑白皮半夏枳殼甘草各一錢右剉作一貼

入薑五片紫蘇五葉水煎服

杏仁半夏湯

治肺氣不足喘嗽杏仁半夏桔梗陳皮赤茯苓防已桑白皮白礬各一錢皂角

薄荷各五分甘草一寸右末作一貼薑三水煎服

杏蘇飲

治上氣喘嗽浮腫紫蘇葉二錢紫菀甘草各一錢陳皮桔梗麻黃桑白皮阿膠珠各七分

半五味子大腹皮烏梅肉杏仁各五分右剉作一貼入薑五片水煎服

調降湯

治喘嗽上氣枳殼一錢三分甘草一錢半夏桔梗赤茯苓青皮陳皮蘇子檳榔葶藶子

各七分白豆蔻木香縮砂紫蘇葉各五分右剉作一貼薑五水煎服

加味四君子湯 治氣喘入參白朮各一錢三分甘草砂蘇子桑白皮各六分沉香木香各五分並水磨取汁右剉作一貼入薑三棗二水煎和二香汁調

服者咳嗽上氣喘喝煩心胃滿膨脹而喘咳所生病

火喘

者手太陰之脉是動則肺脹滿膨脹而喘咳所生病

行于胃中而作也○平居則有氣平和行動則氣促而喘者是衝脉之火上攻也

唾血痰平居則不喘稍行動則氣促喘急以滋腎丸妨觀空心服七八十丸其證大減此泄衝脉之

火邪故如此其效也○火炎於肺胃而喘者作進乍退得食則減食已則喘大槩胃中有實火膈

上有稠痰食入於咽墜下稠痰喘即暫止稍久食已入胃反助其火痰再升上喘反大作俗不知此

作胃虛治以燥熱之藥以火濟火也昔葉都督患此諸藥不愈後以導水丸防觀利五六次而安

○熱喘者發于夏不發于冬醫○火喘用白虎湯
○熱喘加瓜蒌仁枳殼黃芩煎服神效又雙玉散亦
效○火喘以導痰湯○火喘加杏仁連子杏仁瓜
蒌仁以清金降火消痰門○火喘宜麥門冬湯加
減瀉白散滋陰降火湯○火喘加味生脉散瀉火清
肺湯玉液散玉華散○華佗云盛則為喘減則
為枯活人書云發喘者氣有餘也凡看文字須會
得本意肺氣若盛而有餘則當清肅下行而不喘
以其火入于肺衰與不足而為喘焉故言盛者言
肺中之火盛也有餘者言肺中之火有餘也故瀉
肺火以苦寒之劑實補肺也

雙玉散

治熱喘痰涌如泉寒水石石膏各等分
右為細末每取三錢人參湯調下

麥門冬湯

治火喘麥門冬三錢半夏二錢人參一錢
甘草五分粳米一合大棗三枚右剉作一

貼水煎服日二劑○肺脹滿胸膈而喘咳者多用
五味子而人參次之麥門冬又次之黃連少許甚
則交兩手而脅者真氣大虛也若氣短加黃芪五
味子人參若氣盛去五味子人參加黃芩荊芥穗

如油脉浮而洪似將命絕速用麥門冬四錢人參

二錢五加瓜子一錢半煎服一貼喘之下止三貼痰

漸少再加瓜蒌仁一錢半白術當歸芍藥黃芩各

加減瀉白散

治陰氣在下陽氣在上咳嘔喘促桑白

人參八分陳皮五錢半地骨皮赤茯苓各一錢二分

加味生脉散

治脉伏喘促手足厥逆用此救之五味

右剉作一貼入薑五棗二水煎服○氣虛喘甚者

單人參湯頻服之喘定者生不定者死或元氣素

瀉火清肺湯

治火喘片苓一錢梔子枳實桑白皮陳

皮杏仁赤茯苓蘇子麥門冬貝母各八

分沉香五分水磨取汁朱砂末竹瀝調服

作一貼水煎八沉香汁朱砂末竹瀝調服

玉液散

治喘嗽口乾煩渴瓜蒌根知母貝母炒各一兩入參甘草各五錢右為末每二錢先熔黃

蠟二錢入米飲同調服之

玉華散

治咳嗽上喘清肺氣利咽膈甜葶藶杏仁貝母百皮炒天門冬馬兜鈴半夏紫苑杏仁貝母百

合人參各一錢百部根甘草各五分右剉作一貼入薑四棗二水煎服

水喘

水氣者澆澆有聲怔忡喘息宜葶藶散。病人飲水多必暴喘滿。支飲喘不得息葶藶大棗瀉

肺湯甚效。○水腫腹脹而喘者蓋喘必生脹脹必生喘二證相因皆小便不利肺主氣先喘而後

脹者宜清金降火而行之。○脾主濕先脹而後喘者宜燥濕行水而清金次之。○支飲喘不得

卧加短氣倚息其脉平小青龍湯。○主之。○夫不得卧卧則喘者是水氣之客也水者循津液

而流也腎者水藏主津液主卧與喘也宜神秘湯。○濕熱作喘宜平氣散加減瀉白散。○水喘

停飲胃膈滿悶脚先腫也宜平肺湯杏蘇飲

葶棗散

治水喘或面浮葶子炒黃為末
大棗十枚濃煎去棗調二錢服

葶藶大棗瀉肺湯

治肺癰喘不得卧又治支飲喘急
葶藶子炒黃色為末蜜和大如彈丸

九以大棗二十枚水三升煎取二升去棗八丸
更煎取一升頓服之○孫兆治一人吐痰頃間已

及一升喘咳不已服此一貼已
覺胃中快利略無痰唾矣

神秘湯

治上氣喘急不得卧卧則喘者水氣逆行上
乘于肺肺得水而浮使氣不得流通其脉沉

大宜服此紫蘇葉橘紅桑白皮各二錢人參赤茯苓
各半夏各一錢木香五分右剉作一貼入生薑五

片水煎服
日二服

平氣散

治濕熱喘急白牽牛頭末二兩半生半炒大
黃七錢陳皮去白五錢青皮檳榔各三錢右

細末每三錢薑湯調下○一婦人本肥盛霖雨時
因飲酒及酒乳得腹脹喘滿聲聞舍外不得安卧
大小便澀滯氣口脉大兩倍於人迎沉緩有力此
因濕熱太盛而為喘邪氣盛則實實者宜下之用

此藥一服減半再服喘止但有胃滿口乾時時咳嗽再與加減瀉白散全愈

加減瀉白散

桑白皮地骨皮知母桔梗陳皮青皮各一錢片苓甘草各五分右剉作一貼水

煎服

平肺湯

肺與腎皆以至陰積水喘急咳嗽蓋水乘之也葶藶子炒二錢桑白皮炒桔梗枳殼半夏

紫蘇葉各一錢麻黃七分半甘草五分右剉作一貼薑五水煎服

久喘

久病氣短不能接續似喘非喘者單人參湯或調中益氣湯妨觀服之○諸喘久不止宜小羅皂丸

或人參清肺飲坊見倍入栗殼澁之門○久喘未發時服人參半夏丸已發時用沉香滾痰丸

癰癰累效○久喘宜人參紫菀湯定喘湯蠟煎散金不換散人參潤肺丸

單人參湯

治氣虛喘急人參一兩剉水煎頻服之

一服聲除服至二升乃愈

小蘿皂丸

治久喘最妙蘿菹子蒸二兩皂角煨五錢南星以白礬水浸晒瓜蒌仁海粉各一兩

右為末薑汁八蜜和勻搗作丸櫻桃大含化嚥下

人參半夏丸

化痰墜涎止咳定喘治風痰茶痰食痰一切痰病海蛤粉二兩半夏乾薑白礬

寒水石各一兩人參赤茯苓薄荷南星炮各五錢藿香二錢半右為末水糊和丸梧子大薑湯下三

十九日三寶

人參紫菀湯

治咳嗽喘急久不愈鷺粟殼薑製二錢縮砂一錢半杏仁款冬花各一錢五味

子桂枝各五分人參紫菀甘草各四分右剉作一貼入薑五梅一箇水煎服

定喘湯

治肺虛久喘歌曰和劑須投定喘湯阿膠半夏及麻黃人參四兩同甘草四兩桑皮五味

強鷺粟二錢須蜜炙三錢煎服用生薑多年氣喘從今愈始信良醫有妙方

喘湯同但兩錢之數異宜考

蠟煎散

治虛勞久喘嗽或咯膿血杏仁人參麥門冬山藥白茯苓貝母百合鹿角膠驢櫪阿甘草

灸各等分右為麤末每三錢入黃蠟皂角子大同水煎溫服

金不換散

治喘嗽久不已鴛栗殼蜜炒五錢枳殼四錢杏仁甘草各三錢右剉作二貼入薑三

梅一煎服

人參潤肺丸

治肺虛咳喘日久成勞知母三兩桔梗桂皮各二兩半人參款冬花杏仁細辛

甘草各二兩右為末蜜丸實大每丸一丸細嚼薑湯下

胃虛喘

胃虛極則氣上逆擣肩擗肚喘而不休生脉散加杏仁陳皮白朮服

云胃為氣逆又云犯賊風虛邪者陽受之陽明厥則喘而惋惋則惡人或喘而死者或喘而生者何也厥逆連藏則死連經則生此胃喘宜加減白虎湯之類



陰虛喘

血虛則陽無所依附而上奔宜四物湯倍芍藥加人參五味子以收之

直衝清道而上宜降氣滋陰二陳湯加枳殼黃芩火補真陰益精血四物湯合二陳湯加枳殼黃芩

知母黃柏○陰虛火動痰喘不絕聲者急則治其標宜玄霜雪梨膏緩則治其本宜滋陰清化膏

去死○凡喘不得卧其脉浮按之虛而澀者為陰虛

青黛麥門冬五味子枳殼紫蘇葉○陰虛喘宜寧肺湯潤肺豁痰寧嗽湯人參五味子散

寧肺湯

治肺虛咳嗽喘急發熱自汗阿膠一錢半川芎當歸白芍藥熟地黃白朮五味子麥門冬

人參桑白皮白茯苓甘草各七分
分右剉作一貼入薑五煎服

潤肺豁痰寧嗽湯

治陰虛喘急及痰嗽陳皮半夏熟地黃黃柏知母二味並酒炒各八

分白茯苓七分黃芩酒洗桔梗當歸甘草各六分
右剉

作一貼入薑
三水煎服

入參五味子散

治氣血勞傷虛損喘嗽膿血寒熱盜汗人參五味子桔梗白朮白茯苓熟

地黃當歸甘草各七分地骨皮前胡桑白皮枳殼黃芪陳皮柴胡各五分左右剉作一貼入薑三片水煎服日

三冊

諸傷發喘嗽

凡入夜行則喘出於腎淫氣病肺有所墮

肺淫氣傷心渡水跌仆喘出於腎與骨當是之時勇者氣行則已怯者着而為病也納○吃酸成嗽

宜甘膽丸食熟致嗽宜葶藶散紫苑茸湯渡什致嗽宜杏參散打撲致嗽宜當歸飲坊見

甘膽丸

治吃酸搶喉因成喘嗽不止諸藥無效甘草二兩去赤皮作二寸段中半劈開用猪膽汁

五枚浸三日取出炙乾為細末煉蜜和丸菴豆大每服四五十九茶清吞下卧服神效曾有人患此

病諸藥不效用此一服愈輕

葶藶散

治過食煎炒及酒以致喘急不得卧及治肺癰甜葶藶子炒瓜蒌仁薏苡仁桑白皮升麻



葛根 桔梗 各一錢 甘草 五分
右剉作一貼 薑三 水煎服

紫菀茸湯 治過食煎煇邪熱傷肺咳嗽咽痒痰多喘急脇痛紫菀茸經霜桑葉款冬花百合杏

仁阿膠珠貝母蒲黃炒半夏各一錢犀角人參甘草各五分右剉作一貼薑五 水煎服

杏參散 治墜墮驚恐渡水跌仆喘急不安杏仁參桑白皮紫蘇葉甘草各七分

右剉作一貼薑三 水煎服

喘嗽通治藥 宜杏參散含膏丸定喘化痰散杏膠飲雞鳴丸二方

杏參散 通治咳嗽喘急杏仁人參桑白皮桃仁各一錢半右剉作一貼薑三 煎服

含膏丸 通治喘嗽葶藶子一兩隔紙熬令黑知母貝母通各一兩右同為末以棗肉半兩別消砂糖

一兩半和勻為丸如彈子大新綿裹一丸含之徐徐嚥津甚者不過三丸效

定喘化痰散 治喘至妙定喘化痰涎猪蹄甲四十九箇淨洗控乾每甲納半夏白礬各一字入

罐內封閉勿令烟出火燉通赤放冷細研入麝香一錢以糯米飲調下一錢幹

杏膠飲

治十六般哮喘杏仁明膠各一兩馬兜鈴半夏製入參甘草各五錢右細末每二錢水一

盞薑三片煎至七分臨卧服○心嗽加乾葛○肝嗽加烏梅一箇大米十四粒○脾嗽入薑三片棗二枚○胃嗽入蛤粉煎○膽嗽加茯苓神茶清調下○肺嗽入桑白皮煎○膈嗽薑汁調嚥下○勞嗽入秦苑煎○冷嗽入葱白三寸煎○血嗽入當歸棗子煎○暴嗽入烏梅生薑煎○產嗽入甘草三寸黃蠟少許煎○氣嗽入青皮煎○熱嗽蜜一匙葱白煎○哮喘入半夏三枚煎○腎嗽入黃芪白飴糖煎服即效幹

雞鳴丸

治十八般咳嗽哮喘吐血諸證如神知母炒四兩旋覆花陳皮馬兜鈴麻黃甘草炙各一

兩桔梗人參各五錢阿膠珠款冬花五味子各四錢杏仁葶藶子炒半夏製各三錢右為末蜜丸彈子大每一丸烏梅薑棗煎湯嚥下日三○十八般者肝咳心咳脾咳肺咳腎咳胃咳小腸咳大腸咳



喘咳因肺氣咳三焦咳內因咳外因咳不
內外因咳氣咳寒咳熱咳暴咳也

雞鳴丸

通治喘嗽知母酒炒貝母炒陳皮去白桑白
皮蜜炒款冬花旋覆花天門冬麥門冬人參

葶藶子炒桔梗杏仁麩炒半夏薑製阿膠珠甘草
各等分右為末蜜丸彈子大以烏梅湯或薑湯化

下一
九辨

喘嗽宜辨寒熱

因風者遇風則嗽甚因寒者值寒則嗽
劇因熱者遇熱則嗽即發更有一驗甚

的但問遇夜飲酒夜間如何若喫酒後嗽甚則有
熱也喫酒了嗽減則有寒也涎清白者有寒也黃

濁者有
熱也竭

喘嗽宜分虛實

治法最要分肺虛實若肺虛久嗽宜五
味子法款冬花紫菀馬兜鈴之類補之若

肺實有大邪或新嗽宜黃芩天麻花粉桑白皮葶藶
子之類瀉之

味子新病氣實而喘宜桑白皮苦葶藶心○肺之
生病嗽喘大抵秋冬則實春夏則虛若實則面赤

飲水身熱痰盛涕唾稠粘或咽乾面腫若虛則面白脫色氣少不語喉中有聲痰唾清利。肺感微寒八九月間肺氣大旺病嗽者病必實非久病也宜瀉之

喘嗽聲嘶

喘嗽聲嘶乃二虛受熱青黛蛤粉為末蜜丸常常化。宜用芩連四物湯購鑿音

喘嗽上氣出於腎虛

故夫腎虛為病不能納諸氣以歸元

髓虛多唾足冷骨痿胃腹百骸俱為之牽掣其嗽愈重其聲愈乾君子當於受病之處圖之可也。抑猶有說焉肺出氣也腎納氣也肺為氣之主腎為氣之藏凡咳嗽暴重動引百骸自覺氣從臍下逆奔而上此腎虛不能收氣也當以補骨脂安腎元虧競主之母徒從事於寧肺。下元虛冷腎氣不得歸元上喘氣急宜安腎元八味丸。人參湯吞下空心端。咳嗽煩冤者腎氣之逆也。

喘嗽却藥

諸喘不止微目極細末每一二錢薑湯調服止之止後因痰治痰因火治火虛弱者勿用

喘○諸喘劫藥羅菴子蒸熟一兩皂角燒灰三錢
右為末薑汁加蜜丸服○治嗽劫藥五味子五
錢甘草二錢半五倍子芒硝各一錢末蜜凡禽化

喘嗽藥

久喘嗽非此不除南星款冬花鵝管石礞石
佛耳草雄黃等分為末拌艾以生薑一片

留舌上○次用艾燒之須令烟入喉中一方無佛耳
草有鬱金○久咳夜咳冬咳風入肺竅者宜熏

冬花三錢久嗽風入肺鵝管石雄黃鬱金各一錢款
冬花三錢為末每取二錢拌艾捲作筒子燒烟及

潤之口中溫茶常呷下○款冬花如雞子大蜜拌
之甚效○無款冬花則用紫菀茸如法上法

紫菀茸如法上法熏之亦佳○喘即痰喘甚而常發
者以聲響言喘以氣息言○喘即痰喘甚而常發

哮喘

者以聲響言喘以氣息言○喘即痰喘甚而常發
乎痰宜吐法吐藥中多用醋不可用涼藥必帶表

散此寒色熱也必須薄滋味○哮喘遇冷則發
者有二證一者屬寒色熱中外皆寒宜東垣參蘇溫肺湯

坊有二者屬寒色熱宜越婢加半夏湯等發表之

劑防見或預於八九月未寒之時用承氣湯方下其熱至冬寒時無熱可包自不發作綱。一少
年病哮喘十月則發一通正當九月十月之交此疾
不得汗泄宜溫散麻黃黃芩每貼用一錢半為細
末入薑汁水煎臨卧時服之與小胃丹方十二
九津燕下心。喘促喉中如水雞響者謂之哮喘氣
促而連續不能以息者謂之喘甃。哮喘病氣實者
用紫金丹二十九吐去其痰虛者止服二三九則
不吐臨發時用此劫之丹溪方去豆豉更妙。水
哮喘者因幼時水蓄於肺為痰宜金沸草散方見小
青龍湯方欲斷根者宜服定喘湯黃芩利膈九方痰湯
坊見。遇厚味發者清金丸。久不得睡者堯鈴丸。
○哮喘宜用奪命丹立定散解表二陳湯五虎二
陳湯三
白丸方諸

紫金丹

治哮喘不得卧須三年後者可服信砒末一錢淡豆豉搗爛一兩精猪肉細切四兩三味

拌和分作三分用紙筋泥包裹烘令泥乾却用火煨青烟出盡為度放地上一宿出火毒取為末



湯浸蒸餅和丸紫金丹豆大食後冷茶清下大人

紫金丹

飲凡遇天氣欲作雨便發紫金丹中積有冷痰垂天陰寒

氣從背口鼻而入則肺脹作聲此病有苦至終身

者亦有子母相傳者每發即服不過七八次覺痰

腥臭吐出血色是絕其根本也白砒一錢生用枯

春

白礬三錢另研淡豆豉一兩水潤去皮蒸研如泥

定喘湯

歌曰諸病原來有藥方惟愁定喘湯最難當麻

同半夏水煮百沸不須薑病入遇此定喘湯杏仁一錢

方知定喘湯治哮喘神方麻黃三錢杏仁一錢

半片定喘湯半夏桑白皮蘇子款冬花甘草各一錢白

煎服不拘時服

清金丸

治哮喘遇厚味發者蘿菹子淘洗蒸熟晒乾為末一兩皂角燒存性為末三錢右末薑汁

浸蒸餅和丸如蘿菹子大每取三四十九淡薑湯吞下門〇一名清金丹

堯鈴丸

治胸膈喘促不得卧馬堯鈴杏仁蟬退各一兩信砒煨三錢右為末棗肉和丸葵子大臨

卧以冷葱茶清送下六七丸

奪命丹

治胸膈喘嗽上氣信砒一錢白礬二錢白附子三錢天南星四錢半夏五錢右先將信砒

白礬於石器內火煨紅出火黃色為度切不可犯鐵器却入餘藥末和勻薑汁麪糊和丸如黍米大

朱砂為衣每服七丸小兒三丸井水吞下忌食熱毒物〇此方治痰喘劫劑也病安之後即用知母

茯苓湯以補虛可也散寧

立定散

治哮喘秘方大皂角一箇劈開去子八巴豆肉鐵線札緊灸焦黃色末每一錢用半夏杏

仁各一錢香油煮黃俱為細末每柿餅一枚八一錢細嚼服之溫水送下



解表二陳湯

治哮喘一陳湯
黃杏仁桑白皮紫菀貝母桔梗各五分

右薑三

煎服

五虎二陳湯

治哮喘喘急痰盛石膏二錢麻黃杏仁
陳皮半夏赤茯苓各一錢人參八分甘

草五分木香沉香各五分水磨取汁右坐作一貼
入薑三蔥二蜜少許水煎後八二香汁調和服

三白丸

治乳氣大白半夏一兩生用白礬八砵末於礬
巴豆霜各三錢右將白礬熔化入砵末於礬

內焙乾取出播爛再炒成砂同前藥為末薑汁
糊和丸粟米大桑白皮湯吞下十九丸

黃九
計三

肺脹證

咳而喘上氣煩躁者為肺脹欲作風水發汗即愈
○咳而喘上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脉浮

大者越婢加半夏湯主之○肺脹咳而上氣煩躁
而喘脉浮者心下有水氣小青龙湯寒

主之○肺脹主收飲用訶子青黛杏仁佐以海
粉便香附瓜蒌仁半夏麴薑汁與蜜調和作丸

化○肺脹而嗽或左或右不得眠此痰挾瘀血碍

氣而病宜養血以流動乎氣降火疎肝以清痰四

越婢湯

石膏四錢麻黃二錢甘草一錢右剉作三貼
生薑五片大棗二枚加半夏二錢右剉水

煎服之

肺痿證

師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數

或從便難又被快藥下利重亡津液故得之○肺

痿吐涎沫而咳者宜生薑甘草湯○肺痿吐涎沫

而不咳者其人不渴必遺尿小便數所以然者以

上虛不能制下故也此為肺中冷必眩多吐涎甘

草乾薑湯以溫之○肺痿咳唾咽燥欲飲水者

自愈自張口者短氣也○肺痿○寸口脈數其人咳口

中反有濁唾涎沫者此為肺痿之病若口中辟辟

燥咳曾中隱隱痛脈反滑數此為肺癰○肺痿

之證寒熱往來自汗咳唾口中涎多知母茯苓湯

主之○火盛者人參平肺散主之○或為丸含化喘急

面浮者葶藶散功見大槩養肺養氣養血清金降火○肺痿將變為癰宜紫菀散○咳嗽有濁唾涎沫或咳嗽唾中有紅線膿血名曰肺痿熱在上焦故也宜門冬清肺飲人參養肺湯劫勞散論

化仙方

生薑甘草湯

治肺痿咳吐涎沫生薑五錢人參二錢甘草炙三錢大棗五枚右剉作一貼水

煎服日二

甘草乾薑湯

治肺痿吐涎沫而不咳甘草炙四錢乾薑炮二錢右剉作一貼水煎服

知母茯苓湯

治肺痿喘嗽寒熱往來自汗知母赤茯苓各一錢人參半夏製各七分五味子款冬花桔梗麥門冬柴胡各五分白朮甘草

各六分川芎阿膠珠各四分薄荷三分右剉作一

貼水煎服

人參平肺散

治心火刑肺傳為肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛寒熱盜汗桑白皮二錢知母人參

地骨皮甘草炙各一錢天門冬赤茯苓各八分陳皮青皮各五分五味子二十粒右剉作一貼薑三

水煎服

紫苑散

治肺痿咳唾膿血欲變成癰紫苑知母貝母各一錢半人參桔梗赤茯苓各一錢阿膠珠

甘草各五分五味子三十粒右剉作一貼薑三水煎服

門冬清肺飲

治肺胃虛弱氣促喘或吐唾血將成肺痿證紫苑茸二錢黃芪白芍藥甘草

各一錢半人參麥門冬各一錢當歸身六分五味子十五粒右剉作一貼水煎服

人參養肺湯

治肺痿證咳嗽有痰午後熱并聲嘶者柴胡二錢桑白皮一錢赤茯苓五味子

貝母杏仁枳實桔梗各七分人參阿膠珠甘草各五分左右剉作一貼薑三棗二水煎服

劫勞散

治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱熱過即冷時有盜汗四肢倦怠飲食減少體劣

黃瘦此藥能治微嗽唾中有紅線名曰肺痿若不治便成羸劣之疾也方觀燿

喻化仙方

治痰感咳喘吐膿血名曰肺痿甜梨汁生
蘿菔汁生薑汁白砂糖款冬花桔梗紫莖

各二兩五味子一兩右共熬去滓成膏入人參末一兩和九彈子大臨臥喻化一九翻

咳逆證

咳逆一口而作聲之逆乃氣病也氣自擠下直衝上出

火古方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柿蒂

之陰氣依胃為養胃土損傷則木來侮之矣陰為

上言胃弱者陰弱也虛之甚也研○原真人云

逆遍尋方論無此名稱蓋咳逆者噦逆之名古人

以咳逆為噦耳大抵咳逆者即內經所謂病甚者

其聲噦是也噦者今人所謂乾嘔是也噦○咳逆

者氣逆上衝而作聲也俗謂之飽逆是也其發也

或三五聲而止或七八聲而止或有連續不絕收

咳逆與噦為一

噦病成無已許學士謂之吃逆是也或以

爲咳逆何也答曰靈樞經云噦以草刺鼻令嚏嚏而已無息而疾迎引之立已大驚之亦可已詳此三法正是治吃逆之法今人用紙撚刺鼻便嚏嚏則吃逆立止或閉口鼻氣使之無息亦立已或作冤盜賊大驚駭之亦已此以噦爲咳逆爲得經旨也謂之噦者吃聲之重也謂之吃者噦聲之輕也皆因病聲之輕重而名之也○咳逆古人謂之簡是也

咳逆治法

咳逆當分有餘不足不足者因內傷及大病後發其證胃弱面青肢冷便軟○有餘者因外感胃燥及大怒大飽而發其證面紅體熱便閉○凡吐利後多作噦此由胃中虛膈上熱故噦或至八九聲相連收氣不回至於驚人者若傷寒及久病得此甚惡○咳逆陰證胃寒脉細或吐下虛極宜橘皮乾薑湯橘皮半夏生薑湯丁香柿蒂散羌活附子湯或三香散○咳逆陽證發熱口苦胃滿脉數宜小柴胡湯○傷寒熱病陽明內實皮竹茹湯半夏生薑湯○傷寒熱病陽明內實失下而發噦者宜調胃承氣湯大柴胡湯○咳逆者火熱奔急上行而肺陰不納何其當哉故便秘

者大承氣湯下之便軟者瀉心湯主之
○又有雜病咳逆五條詳見于下

痢後咳逆

痢後咳逆以人參白朮煎湯調益元散貼
頻服自止○胃氣不足不能接續而歲

作者宜補中益氣湯枳實加竹茹生薑炮附子一片煎服○氣從臍下逆上夜分轉甚者四物湯加黃栢知母陳皮竹茹生薑枳實○凡咳逆多發於痢後由中氣虛甚也補中益氣湯調中益氣湯枳實多用甚佳門

多用甚佳

食塞咳逆

飲食填塞胃中或食物太甚噎而不下發
為咳逆宜二陳湯加枳殼縮砂紫蘇葉或

三香散附○帝曰人之噦者何氣使然岐伯曰穀入于胃胃氣上注于肺今有故寒氣與新穀氣俱

痰閉咳逆

痰閉於上動於下無別證忽然發歲從
胃中起者宜用二陳湯加芩連桔梗梔子

薑汁炒煎服或人參蘆煎湯服而吐之則愈蓋參
蘆瀉肺肺衰氣降而火土復位矣門○痰挾氣虛

發歲宜六君子
湯方現門

水結咳逆

胃中虛冷不能食者飲水則歲神○或飲

小青龍湯去麻黃加炮附子煎服門方證觀寒○
飲水過多而吃逆者別無惡候五苓散主之方觀

過笑咳逆

笑噦探鼻取嚏或久閉氣可止綱紙

咳逆易治難治證

歲聲頻密相連者為虛難治多死死在朝夕

○咳逆至七八聲相連
收氣不回者難治綱

橘皮乾薑湯

治胃寒咳逆橘皮二錢人參一錢半通
草乾薑桂心甘草炙各一錢右剉作一

貼水煎
服

橘皮半夏生薑湯

治同上陳皮半夏各二錢乾生薑
人參通草各一錢右剉作一貼水



煎服之

丁香柿蒂散

治大病後胃中虛寒咳逆丁香柿蒂人

草二錢半生薑七錢半右為麤末每三錢水煎乘熱頓服或調蘇合香元服之尤妙一方七味各一

錢甘草半錢剉煎服亦可
綱目一名溫中散

羌活附子湯

治同上羌活附子炮茴香炒乾薑炮木香丁香各一錢右剉作一貼入鹽一撮

同煎服

三香散

治胃冷咳逆沉香白豆蔻紫蘇葉各等分右為末每錢以柿蒂煎湯調下

橘皮竹茹湯

治胃虛膈熱而咳逆橘皮三錢人參二錢青竹茹四錢甘草一錢右剉作一貼

入薑五棗二水煎服加白朮枳殼尤妙。一名陳皮竹茹湯

半夏生薑湯

治歲欲死半夏製五錢生薑切一兩右剉入青竹茹雞子大水煎服。一名

鮮陳
湯醫

取嚏法

一人患傷寒將愈忽患咳逆百藥無效遂用皂

餘次自是漸疎二三日而止此
合靈樞草刺鼻嚏之法同

鼻法

咳逆久不止服藥無效
宜用鼻法灸法治之

硫黃鼻法

硫黃乳香各二錢以酒煎之
急令患人當鼻下嗅其氣

雄黃鼻法

雄黃二錢酒一盞煎至七分
急令患人嗅其熱氣即止

一方

治咳逆久不止將乳香紙捲
筒燒烟熏鼻中吸之

禁忌法

凡火嗽忌用人參半夏陳皮等燥藥
凡咳嗽忌用鴛栗殼肉豆蔻等澁藥

乾咽燥有痰者不可用南星半夏
母若飲水者又不宜瓜蒌恐泥膈不鬆快耳

嗽喘咳逆不治證

咳而羸瘦脉小堅急者死
發熱脉小堅急者死○咳而脫形

肺脹有咽瘡失音者必死。上氣面浮腫肩息，脈浮大，血上氣不得卧者死。○不治，又加脹尤甚，衄。○咳，嗽，肺脹，辭過不得眠者，難治。○又加喘煩躁，無脈，身冷，神昏者死。○汗如油，汗出如珠，不流，擗肩，顛肚，喘而不休。○前高起，手足厥冷，脈散及數者，皆死。○汗出，後潤，喘者為肺絕。○身汗如油，喘者為命絕。○直視，謔語，喘滿者不治。○諸有篤病，正氣欲絕之時，邪氣盛行，多壅逆，久而為喘，然則喘之危惡，又安可以尋常目之。○壅逆，久而為喘，然則喘之危惡，又安可以者，不治。○凡咳逆，小便閉，澀，或腹滿者，不治。○見沉微散者，死。○○瀉痢後，咳逆及傷寒結胃發黃而咳逆，俱難治。○○傷寒及久病，得咳逆，俱為惡候。服藥不效，則宜灸之。必差灸而不差，則必不救矣。

單方

凡二十三種有人參胡桃湯參桃湯

人參

主肺虛氣短氣促咳嗽喘急人參膏勑覬獨參湯坊見皆有奇效。○治氣虛喘人參一寸胡

桃二箇去殼不去皮右剉入薑五水煎服名入參
胡桃湯一名參桃湯蓋人參定喘帶皮胡桃斂肺
也○肺虛合用人參如初感風寒邪盛及久嗽
鬱熱不可用反增喘滿嗽劇宜以沙參或玄參代

心丹之

五味子

主咳嗽上氣身熱○五味收肺氣乃火熱必
用之藥○人參五味子麥門冬治肺虛自

汗或少氣而喘蓋聖藥也○久嗽必用五味子
東垣之法然驟用之恐閉住其邪必先發散之或
無用可也

生薑

主咳嗽上氣○生與乾並治嗽○治嗽多用
生薑以其辛能發散也○傳○咳嗽喘急生薑一

升半砂糖五兩同煎減半常服之針○久患咳
逆生薑汁半合蜜一匙煎令熟溫分三服

瓜蒌實

治痰嗽利膈取實肥大者割開取子淨洗
槌破瓜細切焙乾半夏四十九枚湯洗十遍

切焙為末用洗瓜蒌水并子瓢同熬成膏研細為
丸梧子大薑湯下二十丸乾○瓜蒌子甘能補肺

潤能降氣宜為
治嗽要藥也

半夏

治痰嗽上氣及形寒飲冷傷肺而咳
半夏製生薑切各半兩煎服即效

葶藶子

主肺氣壅上氣喘促或面浮取子
炒黃色為末二錢棗湯調下

苧麻根

治哮喘取根和砂糖爛煮時時
細嚼燕下求絕病根神效

馬兜鈴

主咳嗽喘促氣急坐息不得兜鈴二兩去殼
只取裏面子童便拌炒甘草炙一兩為末

每錢水煎溫呷或含末嚥汁亦
得乾○馬兜鈴去肺熱補肺也

桑白皮

治肺氣喘滿咳嗽或吐血桑皮四兩泔浸三
宿剉細糯米一兩焙乾右同為末來飲調下

一二錢○桑白皮瀉肺氣然性不純良
用之多者當戒蓋以出土者有毒故也

皂莢

主咳嗽上氣唾濁坐不得卧酥炙為末
蜜丸梧子大棗湯吞下三九日三

鯉魚肉

主咳嗽燒為灰糯米飲調下
或取肉作膾以薑醋食之亦佳

橘皮

治咳嗽上氣橘紅四兩甘草炙一兩為末每二錢白湯點服日三〇又治吃逆橘皮一兩濃煎

服兼熟頓

胡桃

治痰喘能斂肺取胡桃三箇去殼不去皮與生薑三片臨卧細嚼以溫湯呷下

杏仁

主咳嗽上氣喘促及哮喘杏仁一兩去皮尖童便浸半月每日一換尿取出研取每服一素子

大薄荷葉蜜水少許煎服二劑永差又治老人久喘嗽杏仁胡桃仁等分蜜丸彈子大薑湯嚼

下細研〇杏仁散肺氣風熱然性實有熱因於寒者為宜研〇童便浸杏仁取其利肺氣潤劑也

梨

主熱嗽〇卒咳嗽梨一顆刺作五十孔每孔納胡椒一粒麪裹煨熟停冷去椒食之

取雪梨去心納蜜蒸熟停冷食之

紫蘇子

治肺氣喘急咳嗽蘇子水搗取汁和粳米煮粥食之

鴛栗殼

斂肺止咳喘然乃收功後藥也不可驟用



一錢蜜湯
調下

雞子

治哮喘取十箇略敲損殼不得損膜浸尿缸內
經三日臨夜暫煮食之連日服蓋能去風痰故

也

猪肺

治咳嗽喘急肺痿吐血猪肺一箇洗去血水若
病入每歲用杏仁一箇去皮尖將肺以竹簽穿

眼每眼入杏仁一箇麻扎重湯煮熟去杏仁只吃
肺即效○杏仁一箇麻扎重湯煮熟去杏仁只吃

碎煮熟入鹽豉
調和食之

阿膠

治肺虛損極咳嗽垂膿血非阿膠不補○喘甚
須用阿膠○阿膠炒為末米飲調服止喘

獐肉

主上氣咳嗽灸為末每二錢溫酒和服日二
肺痿上氣咳嗽灸為末每二錢溫酒和服

菹頭骨

治哮喘不得睡取頭骨燒為
灰溫酒調下二錢即止

人尿

主咳嗽肺痿又止勞渴嗽取溫尿飲
之童子尿尤好又主久嗽失音

鍼灸法

○咳嗽有痰宜灸天突肺俞以泄火熱瀉肺氣
乳下黑肉際各百壯○久患喘嗽夜不得卧夏月亦衣袂溫
背心是膏肓病也灸之而愈
次灸肺俞○喘急灸肺俞十一壯天突七壯
○傷寒咳甚灸天突即差
穴即愈如不愈其病不可治矣艾炷如小豆大灸
三壯男左女右
○咳嗽喘不得卧取雲門太淵中脘肺俞三
里行間
○氣逆發喘取膻中中脘肺俞三
里行間
○吃逆服藥無效灸中脘膻中
乳相直骨間陷中婦人即屈乳頭向
下度之乳頭
齊處是穴艾炷如小豆大灸三壯男
左女右火到
肌即差一云其穴當取乳下骨間動
脈處是也
○咳逆不止灸乳根二穴即止如神
又灸臍下氣
海五壯或七壯亦立止
可一邊眠者可左側者灸右足三陰
交可右側者



灸左足三陰
交立安

東醫寶鑑雜病篇卷之五