


東醫寶鑑

奎章閣圖書
7608
I
17

奎章閣圖書	
部別	分類記號
	圖書番號 貴 1933
	一部冊數 24
	內別番號 16
서울대학교	

東醫寶鑑



雜病篇六

積聚

浮腫

脹滿

消渴

黃疸

東醫寶鑑雜病篇卷之六

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

積聚

積聚之因

靈樞曰喜怒不節則傷藏藏傷則虛風雨襲虛則病起於上留著於脉稽留不去息而成

積。著於陽明之經則挾臍而居飽食則益大飢則益小。著於緩筋也似陽明之積飽食則痛飢


則安。著於腸胃之膜原痛而外連於緩筋飽食則安飢則痛。著於脊筋在腸後者飢則積見飽

則積不見按之不得。清濕襲虛則病起於下積之始生得寒乃生。厥乃成積厥氣生足挽足挽生

脛寒脛寒則血脉凝滯血脈凝滯則寒氣上入於腸胃入於腸胃則膜脹膜脹則腸外之汁沫迫聚

不得散日以成積。卒然多飲食則脹滿起居不節用力過度則成積。卒然多飲食則脹滿起居

傷則血溢於腸外有寒汁沫與血相搏則并合則血溢於腸外有寒汁沫與血相搏則并合



東醫寶鑑雜病篇卷之六


御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

積聚

積聚之因

靈樞曰喜怒不節則傷藏藏傷則虛風雨襲

積。者於陽明之經則挾臍而居飽食則益大飢則益小。者於緩筋也似陽明之積飽食則痛飢則安。者於腸胃之膜原痛而外連於緩筋飽食則安飢則痛。者於脊筋在腸後者飢則積見飽則積不見按之不得乃成積厥氣生足挽足挽生之始生得寒乃生厥乃成積厥氣生足挽足挽生脛寒脛寒則血凝滯血凝滯則寒氣上入於腸胃入於腸胃則臍脹臍脹則腸外之汁沫迫聚不得散日以成積。卒然多飲食則脹滿起居不節用力過度則陽絡脉傷陽絡脉傷則血外溢陰絡傷則血內溢於腸外腸外有寒汁沫與血相搏則并



脉法

鬱脉多沉伏或結或促或代。鬱脉結沉瀦積脉弦堅。病在右脇有積氣得肺。鬱脉結沉瀦積脉甚結微則積微肺脉雖不見右手脉當沉伏。心肺有積其脉皆喘數肝有積其脉弦長脾腎有積其脉皆大。○脉弦緊為積脉弦緊而微細者癥也。夫癥瘕積聚之脉皆弦緊在心下即寸弦緊在胃脘即關弦緊在臍下即尺弦緊。○內有積不見脉難治。見一脉相應為易治。○診積聚其脉堅強急者生虛弱者死。○脉弦而伏者腹中有癥不可轉也。必死不治。○五藏為積六府為聚。積在部位聚無定處。駛緊浮牢小而沉實或結或伏為聚。為積實強者生沉小者死。○五積屬陰沉伏附骨肝弦心乳腎沉急滑脾實且長肺浮喘卒。六聚結沉痼則浮結。○又有癥瘕其脉多弦弦急癥疾弦細癥堅。○沉重中散食成癖瘕左轉沉重氣癥胃前若肉癥右轉橫旋。○積聚癥瘕緊則痛纏虛弱者死實強可痊。○脉弦急者生虛弱小者死。○診婦人病癥積聚之脉弦急者生虛弱小者死。

六鬱為積聚癥瘕癖之本

氣血冲和百病不生一有

不散也

咽

○熱鬱而成痰痰鬱而

癥食鬱而

成痞滿此必然之理也○又氣鬱而濕

滯濕滯而

成熱熱鬱而成痰痰滯而血滯

而食不消

化而遂成痞塊此六者相因而為病也

衄○鬱者

結聚而不得發越也當升者不得升當

降者不得

降當變化者不得變化也此為傳化失

常六鬱之

病見矣○一曰氣鬱二曰食鬱三曰

熱鬱四曰

痰鬱五曰血鬱六曰六鬱也六

鬱不言風

寒者風寒鬱則為熱故也○治鬱之

法順氣為

先降火化痰消積分多少而治蒼朮蘇

芎總解諸

鬱○內經曰木鬱達之火鬱發之土

鬱奪之金

鬱泄之水鬱折之張子和曰不鬱達之

謂吐之令

其條達也火鬱發之謂汗之令其疎散

也土鬱奪

之謂下之令無壅碍也金鬱泄之謂滲

泄解表利

小便也水鬱折之謂抑之制其衝逆也

此治五鬱

之大要耳衄○諸鬱通用六鬱湯麩麩

加味麩

保和丸

加味麩

九端



六鬱湯

通治六鬱香附子二錢川芎蒼朮各一錢半

陳皮半夏製各一錢赤茯苓梔子仁各七分

縮砂甘草各五分右剉作一貼薑三水煎服

氣鬱加木香檳榔烏藥紫蘇葉○濕鬱加白朮羌

六鬱湯

活防已○熱鬱加黃連連翹○痰鬱加南星瓜蒌

仁海粉○血鬱加桃仁牡丹皮韭汁○食鬱加山

六鬱湯

麥芽神麴
五分右剉作一貼

薑三片水煎服

越鞠丸

等分諸鬱蒼朮便香附川芎神麴炒梔子炒各

越鞠丸

十丸○越鞠丸一名芎朮丸九願欲不

越鞠丸

遂如寡婦僧道之類名利不遂或先富後貧或久

越鞠保和丸

開鬱行氣消積散熱白朮三兩山楂肉

病不愈者皆

宜服此

夏白茯苓枳實黃連酒炒當歸酒洗各一兩梔子炒連翹蘿菥子炒木香各五錢右為末薑汁泡蒸

餅和九梧子大薑湯下五十丸

加味麤麥麴丸解諸鬱開胃膈進飲食蒼朮甘浸薑汁炒燕芎便香附神麴炒梔子炒各四兩

陳皮去白白朮炒黃芩炒各一兩半山楂肉蒸二兩右為末稀糊和丸梧子大白湯下五六十九丸

氣鬱胃滿脇痛脉沉澁宜用香附燕芎蒼朮木香調氣散解鬱調胃湯麤麥丸○二陳湯煎水

吞下交感丹

濕鬱周身關節走痛首如物蒙足重遇陰寒便發脉沉濡宜用蒼朮川芎白芷赤茯苓

散防觀平胃

熱鬱目蒙口乾舌燥小便赤濁脉沉數宜用青黛香附蒼朮川芎梔子○宜服升陽散火湯火鬱湯

門火壯

痰鬱胃滿動則喘急起卧急情寸脉沉滑宜用海石香

陳湯

血鬱四肢無力能食小便淋大便紅脉沉乳澁宜用桃

九當歸活血湯

食鬱噫酸惡食黃疸鼓脹痞塊脉氣口緊盛宜用蒼朮

散散鬱湯

木香調氣散治氣鬱烏藥香附枳殼青皮陳皮厚朴

皮甘草各三分右剉作一貼薑三片水煎服

解鬱調胃湯治氣分之火壅遏於中時作刺痛皆由

歸酒洗各一錢二分白朮陳皮白茯苓各一錢赤芍藥酒洗浸生乾地黃酒洗薑汁炒香附米各八分

神麴炒麥芽炒各七分川芎六分桃仁生甘草各四分右剉作一貼薑三片水煎服

瓜蒌枳殼湯

治痰鬱瓜蒌仁枳實桔梗川芎蒼朮香附杏仁片苓酒炒貝母炒陳皮各一錢

縮砂木香各五分甘草三分右剉作一貼水煎入竹瀝薑汁調服

升發二陳湯

治痰鬱半夏二錢陳皮燕芎赤茯苓各一錢半柴胡防風升麻甘草各一錢右

剉作一貼入薑三片煎服

生韭飲

治血鬱胃脘有瘀血作痛生挑仁七箇連皮細嚼以生韭汁一盞送下即效

順氣丸

治血鬱香附子八兩以童便浸晒乾為末以粟米糊和丸服

當歸活血湯

治血鬱當歸赤芍藥川芎挑仁各一錢牡丹皮香附子烏藥枳殼青皮各八分

紅花五分桂皮乾薑炮甘草各三分右剉作一貼入薑三片水煎服

香砂平胃散

治食鬱蒼朮厚朴陳皮便香附各一錢山查肉縮砂枳殼麥芽神麴乾薑木香

各五分甘草炙三分右剉作一貼
入薑三蘿菹子炒研一撮煎服

散鬱湯

治食鬱陳皮赤茯苓各一錢半蒼朮白芍藥
川芎梔子各一錢二分枳殼香附各一錢甘

草五分右剉作一貼入薑三煎服○鬱則胃熱鬱
散則上焦行下脘通水穀之陰自滋沛身中之陰

氣自生矣

痞塊積聚所屬部分

凡痞塊積聚在中為痰飲○在左右
為血塊右為食積中為痰飲此言誠然夫左關肝

膽之位主藏血液右關脾胃之位主藏飲食中間
則為水穀出入之道路所以左為血

塊右為食積中為痰飲其理昭然

痞塊證治

血塊是有形之物氣不能成塊乃痰與食積死
血也宜用化塊丸○凡痞塊在皮裏膜外

俱宜二陳湯加補氣行氣藥先須斷厚味○治
塊當降火消食積如行氣死血塊去後須大補之

其不能移動者是癥塊也或有或無或上或下或

左或右者是癰塊也俱用潰堅湯丸為主○脇下有塊宜當歸龍膏丸五錢加桃仁薑黃各一兩
穿山甲炒鱉甲燒各三錢玄胡索蓬朮各四錢每服五
七十九丸以利為度○痞塊宜用連蘿丸消塊丸
加味柴平湯消積保中丸開懷散柴香散保和丸
化痞丹無用膏藥外貼之○九腹中有塊不問
積聚癰瘕俱為惡候切勿視為尋常若脹滿已成
脅腹鼓急雖倉扁復生亦莫能救其萬一也

化塊丸

治痞塊及血塊海粉酒煮三稜蓬朮並醋煮
紅花桃仁五靈脂香附子各一兩石礪五錢

右為末醋糊和丸梧子大
白朮湯下三五丸

連蘿丸

治食積死血痰飲成塊在兩脇作痛雷鳴嘈
雜眩暈黃連一兩半取一半以吳茱萸五錢

同炒去茱萸一半以益智五錢同炒去益智白芥
子蘿菹子並炒各一兩半梔子川芎三稜蓬朮桃
仁香附子山查肉神麴各一兩青皮五錢右為末
蒸餅和丸梧子大白湯吞下五六十九丸

白芥丸
名消積丸
今

消塊丸
治痞塊
各一兩半
右為末
陳醋三升
置磁器內
先納

大黃煎
不住手攪
使微沸
盡一升
下餘藥末
熬至

惡物
硝石丸
針一

加味柴平湯
治積塊
有熟柴胡
黃芩半夏
蒼術厚朴

各七分
甘草五分
右剉作一
貼入薑三
棗二水煎
服

消積保中丸
散痞除塊
白茯苓白
朮土炒
三兩陳皮
去白二

芥子炒
神麴炒
黃連薑汁
炒各八錢
麥芽炒
六一兩

乾漆炒
五錢青皮
香油炒
縮砂炒
各四錢
木香阿

下八十
九

開懷散

治心下積塊痞悶或發熱柴胡草豆蔻各一錢三稜蓬朮並醋炒青皮陳皮半夏白茯苓

香附子檳榔枳實紅花甘草各七分右剉作一貼薑三煎服

柴香散

治心腹有氣一塊畧通或脇脹寒熱枳實地骨皮三稜蓬朮各一錢柴胡黃芩各七分赤

芍藥厚朴香薷黃連玄胡索各五分甘草三分右剉作一貼水煎服

保和丸

治一切飲食所傷及積聚痞塊久服自消白朮五兩陳皮半夏茯苓神麴山楂肉各三兩

連翹香附子酒炒厚朴蘇薑子炒各二兩枳實麥芽黃連酒炒黃芩酒炒各一兩右末薑汁糊和

梧子大茶清下五七十九丸

化痞丹

消積塊專攻之劑大黃四兩醋浸七日晒夜露又七日穿山甲土炒二兩木鱉子去油

香附子便浸炒桃仁各一兩紅花二錢青黛五分右爲末將大黃和好醋煮爲糊和丸茶豆大茅根

葛根煎湯下五七十九丸

積聚治法

可治積當察其兩痛以知其病有餘不足可補

結者散之客者除之留者行之堅者削之強者奪之
之賊以奠之苦以瀉之全真氣藥補之隨所利而
行之節飲食慎起居和其中外可使必已疎○凡
積病不可用下藥徒損真氣病亦不退當用消積
藥使之融化則自消除根矣○經曰治積聚有
化積消積挨積磨積而無下積之說蓋不可直便
取下以傷胃氣也○諸積勿輕吐下徒損真氣
積亦不去奔豚尤不可吐五積古有五方今增損
五積九更妙○內經曰破積用毒藥衰其大半
而止藥九大積大聚消其大半乃止藥過劑則死
疎○肝積用肥氣丸○心積用伏梁丸○脾積用
痞氣丸○肺積用息貫丸○腎積用奔豚丸○六
聚宜用散聚湯香稜丸大七氣湯大阿魏丸大安
丸○積初為寒宜辛溫消導大七氣湯烏白丸
阿魏丸○久則為熱宜辛寒推蕩木香檳榔丸
臘通玄二八丹消塊丸○治積要法大抵以所
惡者攻之肝喜者誘之則易愈○如硃砂水銀治
肉積○神麴麥芽治酒積○水蛭蠅蟲治血積○

木香 檀柳 治氣積 ○ 牽牛 甘遂 治水積 雄黃 膩粉
治痰積 ○ 礞石 巴豆 治食積 各從其類也 軀 ○ 又
云 三稜 蓬朮 治血積 香附 枳實 治食積 山楂 阿魏
治肉積 海粉 礞石 治痰積 雄黃 白礬 治虫積 乾薑
已豆 治寒積 黃連 大黃 治熱積 丹 ○ 五積 六聚 通
用 增損 五積 九消 積正 元散 肥氣 九伏 梁九 痞氣
丸 息貫 九奔 豚九 又有 奔豚 湯散 聚湯 香稜 九大
七氣 湯漬 堅湯 漬堅 九真 人化 鐵湯 燭 ○ 宿血 滯
氣凝 結為 癥 癥腹 中痞 塊堅 硬作 楚當 以破 氣藥
伐之 或以 類相 從如 敗梳 治風 癥銅 屑治 龍癥 麴
藥 治米 癥石 灰 治髮 癥端

增損五積丸

通治五積 ○ 黃連 升麻 五錢 脾腎積 七
錢 心 肺積 一兩半 ○ 厚朴 肝心 肺積 五

錢 脾腎積 八錢 心 肺積 五錢 川烏 肝肺積 一錢 心 腎脾積 五
分 ○ 乾薑 肝心 肺積 五錢 肺脾腎 一錢半 ○ 人參 肝
心 脾肺積 二錢 腎積 五分 ○ 茯苓 一錢 半巴豆 霜
五分 右為末 蜜丸 梧子 大初服 二九 漸加 以微糖
為度 治積塊 不拘 臍上 下左右 通用 ○ 如肝積 加
柴胡 一兩 川椒 四錢 蓬朮 三錢 皂角 昆布 各二錢



半○心積加黃芩三錢肉桂茯苓神丹參各一錢菖蒲五分○肺積加桔梗三錢稜天門冬青皮陳皮白

豆蔻各一錢紫薤川椒各一錢半○脾積加吳茱萸黃芩縮砂各二錢澤瀉茵陳各一錢川椒五分

○腎積加玄胡索三錢苦練肉全蠲附子獨活各一錢澤瀉菖蒲各二錢肉桂三分丁香五分

消積正元散治痰飲氣血鬱結食積氣不升降積聚

消積正元散

索海粉各一錢赤茯苓陳皮青皮縮砂麥芽炒山楂肉甘草各七分右剉作一貼薑三水煎服○一

名開胃正元散

肥氣丸

肥氣丸

治肝積柴胡一兩黃連七錢厚朴五錢川椒四錢甘草三錢蓬朮人參昆布各二錢半皂

角白茯苓各一錢半乾薑巴豆霜各五分川烏二分

加二九至大便澹便漸減服

伏梁丸

治心積黃連一兩半厚朴人參各五錢黃芩桂枝茯苓神丹參各一錢乾薑菖蒲巴豆霜川

烏各五分紅豆蔻二分右為末蜜丸梧子大黃連湯下服如上法

痞氣丸

治脾積黃連八錢厚朴四錢吳茱萸三錢黃芩二錢縮砂一錢半白茯苓人參澤瀉各一

錢茵陳乾薑各一錢半川烏川椒各五分桂皮巴豆霜各四分白朮二分右為末蜜丸梧子大甘草

湯下服如上法

息賁丸

治肺積黃連一兩三錢厚朴八錢川烏桔梗白茯苓川椒紫苑各一錢半青皮巴豆霜各五

分右為末蜜丸梧子大薑湯吞下服如上法

奔豚丸

治腎積厚朴七錢黃連五錢川鍊子三錢白茯苓澤瀉芎藭各二錢玄胡索一錢半全

附子獨活各一錢川烏丁香香巴豆霜各五分肉桂二分右末蜜丸梧子大鹽湯下服如上法

通玄二八丹

治積聚黃連八兩為藥當歸生地黃烏梅各五錢為末雄猪肚一具入藥於內

以線縫之鋪韭菜二斤於鍋內蒸之一日以藥熟為度取出搗丸梧子大空心薑湯下七十丸或酒

一二二次以
粥補住

奔豚湯

治腎積半夏二錢川芎當歸各一錢半甘草各七分

劉作一貼入薑三棗
二水煎空心服

散聚湯

治六聚及癥瘕隨氣上下心腹刺痛二便不利

心赤茯苓各一錢川芎附子炮甘草炙各五分半
夏檳榔當歸各四分右剉作一貼薑三水煎服

香稜丸

治五積六聚氣塊三稜檳榔各三兩山楂肉

皮各一兩黃連神麴麥芽鱉甲乾漆桃仁硃砂縮
砂當歸尾木香甘草各五錢右為末醋糊和丸梧

子大白湯下
三五十九

大七氣湯

治五積六聚心腹脹二便不利三稜蓬

桂甘草各一錢右剉作一貼薑三棗二水煎服
一方加大黃檳榔各一錢治諸般痞積面色萎黃

四肢無力皆緣內有虫積或好食生米或壁土或
茶炭鹹辣等物只此一服除根用水煎露一宿空
心溫服不得些少飲食不然則藥力減而虫積不
行矣服後心腹痛當下惡物如魚凍虫驚至日午
下積盡方用
溫粥止之

潰堅湯

治五積六聚諸般痞塊當歸白朮半夏陳皮
枳實山查肉香附子厚朴縮砂各一錢木香

五分水磨取汁右剉作一
貼水煎調木香汁服之

潰堅丸

治同上煎方加海粉瓦礫子蟹甲炙為細末
將阿魏醋煮化入薑汁糊和丸梧子大酒下

五七十
丸

真人化鐵湯

治五積六聚痞塊瘕三稜蓬朮青皮
陳皮山查肉神麴香附子枳實厚朴黃

連當歸川芎桃仁檳榔各五分紅花木香甘
草各三分右剉作一貼薑二棗一煎服

瘕瘕癖證治

飲食積死血而不移瘕者堅而能移皆因痰
飲食積死血而不移瘕者堅而能移皆因痰

實一也。○癥名有七：蛟龍魚鱉、獺狐蛇是也。亦曰蛇蛟鱉肉、賸虱米也。癥名有八：青黃燥血、脂狐蛇鱉是也。此等病偶因食物相感而然。癥比瘕稍輕，又有腸覃、石癥、血蟲，皆女子之疾，種種不同。乃瘕塊之異名也。針。○瘕者，徵也。腹中堅硬，按之應手曰瘕。瘕者，假也。腹中雖硬而忽聚忽散，無有常處。曰瘕。瘕因傷食，瘕是血生，瘕原傷氣。瘕則傷精，閉治法詳見婦人門。○瘕者，在腹內近臍左右各有一條筋脉，急痛如臂，如指如弦之狀，名曰瘕。○瘕者，偏僻在兩脇之間，有時而痛，名曰瘕。瘕得冷則痛，門。○瘕者，跡也。按痰血以成形，跡亦鬱積至久之謂也。聚者，緒也。依元氣以為端緒，亦聚散不常之意也。○瘕者，徵也。又精也。以其有所徵驗，及久而成精萃也。瘕者，假也。又遐也。其假借氣血成形，及歷年遐遠之謂也。○瘕瘕者，懸絕隱僻，又玄妙莫測之名也。○大抵瘕與瘕瘕，刁胃膈間之病，積與聚為肚腹內之疾，其為上中二焦之病，多見于男子，其瘕與瘕獨見于臍下，是為下焦之疾，故常得于婦人也。○治法同，積聚。

○腸覃石瘕血蠱見下腸覃生於腸外月事時下石瘕生於胞中月事不下針

養正積自除

易老云養正積自除譬如滿座皆君子縱

氣強則積自消矣更能斷厚朱節色慾戒暴怒正思慮庶乎萬全而無害○壯人無積虛人則有

之皆由脾胃怯弱氣血兩衰四時有感皆能成積若遽以磨積破結之藥治之疾似去而人已衰矣

治法當先補虛使氣血壯則積自消宜用木香枳殼丸○又治五積六聚癥瘕積塊元氣虛弱瘕

怯飲食不進四肢沉困宜補中益氣湯○九攻積蓬朮青皮香附桔梗藿香益智肉桂○九攻

擊之藥有病則病受之無病則胃氣受傷胃氣者清純冲和之氣也惟與穀肉菜果相宜蓋藥石皆

偏勝之氣雖參芪性亦偏况攻擊者乎

木香枳殼丸

治飲食積聚心腹脹痛嘔逆吞酸黑丑頭末微炒大黃各二兩枳殼茯苓白朮

厚朴半夏人參木香青皮陳皮三錢蓬朮檳榔神麴麥芽各一兩乾生薑枳實各五錢右為末薑汁

糊和丸梧子大薑湯下七十九。凡人有積病則氣滯而發此方攻補兼施真得古人養正積自除之理宜誠心服之。

腸覃石瘕血蠱證治

腸覃乃寒氣客於大腸與胃相搏結而為瘕覃延日久瘕肉乃生始

如雞卵久如懷胎按之堅推之移月事時下或多或少此氣病而血未病也宜二陳湯加香附三稜蓬朮鱉甲並醋炒○石瘕者胞中傷損瘀血結成久則堅硬如石塞於子門大如懷孕月事不下乃先感寒氣而後血壅○血蠱即癰瘕之甚者腹肚堅經丸如石宜用醋煮三稜丸三稜煎元萬病丸桃奴散抱甕丸斑玄丸

晞露丸

治腸覃病惡血成癥瘕作痛三稜蓬朮各一兩並酒浸以巴豆三粒去皮同炒黃去巴

豆乾漆炒烟盡川烏炮各五錢硃砂四錢另研茴香鹽炒青皮去白雄黃另研各三錢穿山甲炮二錢麝香五分輕粉另研一錢右為末薑汁糊和丸梧子大溫酒或薑湯下二三十丸

石英散

治石瘕紫石英醋淬一兩當歸尾馬鞭草紅花炒烏梅肉各五錢蓬朮三稜並醋炒蘇木

節各三錢後藥琥珀二錢甘草各一錢薑湯調下

桃仁煎

治婦人血蠱血瘕血積經候不通桃仁大黃各一兩並虫炒五錢朴硝一兩右為末先以

醇醋一升二合銀石器中慢火煎取七合許下桃仁大黃並虫末攪千下次下朴硝更熟攪良久出

之丸如梧子前一日不吃晚飯五更初溫酒吞下五丸取下惡物如豆汁雞肝未下再服見鮮血即

針止藥

醋煮三稜丸

治血蠱三稜四兩醋煮竹刀切晒乾川芎二兩醋煮大黃五錢醋煨右為末醋

糊和丸梧子大每三十丸醋湯下一月見效

三稜煎元

治婦人血積血塊血蠱大黃八兩為末三稜蓬朮各一兩並煨為末右將大黃醋煮

令稠和丸菜豆大白湯下三五十九

萬病丸 治室女月經不通臍下堅結大如盃升寒熱

羸瘦若生肉癢不可為也乾漆炒令烟盡牛膝酒浸一宿各一兩六錢生地黄四兩八錢取汁右銀石器內下地黃汁八二藥末慢火煮九如梧

子大酒下一二丸病去即止

桃奴散 治血蠱及瘀血停積經水不通桃奴猥糞

玄胡索肉桂五靈脂香附子各炒過縮砂桃仁各等分右為末每三錢以溫酒調下

抱甕丸 治血蠱及婦人鬼胎如抱一甕荒花吳茱萸

川烏秦芄柴胡白殭蚕巴戟巴豆各等分右為末蜜丸梧子大每七丸蜜酒吞下惡物立出而愈

心冊

斑玄丸 治鬼胎惑於妖魅狀似癰瘕及一切血病斑

為效胎墮

息積病

帝曰人有病脇下滿氣逆二三歲不已是為何病岐伯曰病名曰息積此不妨於食不可灸刺

積為導引服藥藥不能獨治也納○
宜服磨積元化氣湯無行導引法○

磨積元

治腸胃因虛氣癖於育膜之外流於季脇氣逆息難積月頻年醫所不治久則榮衛停凝

一朝敗濁潰為癰膿多致不救胡椒一百五十粒木香二錢半全蝎十箇右為末粟米飯和丸菜豆

大橘皮湯下十五丸

化氣湯

治息積癖於腹脇之下偏脹脇下妨飲食諸藥不能療逢朮乾生薑陳皮青皮丁香香皮

茴香炒甘草炙各五錢縮砂桂心木香各二錢半胡椒沉香各一錢一字右為末每取二錢以生薑

紫蘇葉鹽少許煎湯調下

導引法

治息積以兩手指壓無名指本節作拳按髀趺坐叩齒三十次屏氣二十息燕氣三

口再屏息再燕如是三作以氣通為效遲子午卯酉時則行

諸物傷成積

凡人脾胃虛弱或飲食過常或主冷過寒不能剋化致成積聚結塊心腹脹滿噫氣

吞酸面青肌瘦一曰食積二曰酒積三曰麪積四曰肉積五曰魚蟹積六曰果菜積七曰茶積八曰

水積九曰血積十曰虫積

食積

食不消化成積痞悶宜用平胃散枳實加縮砂香附子神麪麥芽八生薑紫蘇葉煎服○食積宜

用保和丸大安丸連羅丸

酒積

酒傷成積者面黃黑腹脹時嘔痰水宜用對金飲子枳實加葛根赤茯苓縮砂神麪煎服○酒積

宜用麪蘖元酒積丸○治酒積方甘遂一錢為末以猪槽頭肉一兩細切搗爛和藥末作一丸濕紙

裹火煨令香熟取出臨卧細嚼以酒送下○又方黃連酒浸一宿焙為末以橘紅葛根湯調下一

錢麪○葛花解酲湯常服亦佳○遇仙丹枳實保和丸烏白丸並治酒積

麪積

食麪過多成積噯酸心腹作痛百藥不效取青木

香元飭觀三百粒白丁香十粒神麴二錢同為末
入巴豆肉三粒更研和勻蒸餅為丸菴豆大以生

薑橘皮湯下二三十九滯去自安○素粉
積以紫蘇濃煎湯加杏仁泥服即散

肉積食肉過多成積宜用阿魏

魚蟹積食魚蟹過傷成積香蘇散 觀多加生薑

果菜積多食果菜成積用平胃散加丁香麝香為末熟

粥

茶積喜吃茶成積成癖及吃乾茶者石膏黃芩升麻為

末砂糖水調下○茶積取川椒為末麪糊和丸

水積多飲水漿成積胃脇引痛瀝洛有聲宜十棗湯

服之三花神佑丸

佳服之並

血積

瘀血成積或因打撲或因墮落以致蓄于胃腹面黃糞黑宜用抵當湯麝香桃仁承氣湯麝香勝紅

元增味四物湯三稜煎三稜煎丸坊見

蟲積

飲食積聚變化成虫宜用妙應丸

保和丸

治食積酒積山瘡肉一兩半夏薑製蘆薈子炒黃連炒陳皮各五錢神麝香炒

二錢右為末神麝香糊和丸梧子大白湯下五七十丸心〇一方山瘡五兩神麝香半夏各三兩茯苓陳

皮蘆薈子連翹麥芽炒各一兩右末別以神麝香五兩為末作糊丸服

大安丸

治食積乃脾經消導之劑也山瘡肉白朮各二兩神麝香半夏茯苓各一兩陳皮連翹蘆薈

子炒各五錢右為末神麝香糊和丸服如上法

紅圓子

治食積酒積脾積血氣諸般癥塊三稜蓬朮青皮陳皮各五兩胡椒乾薑各一兩右為末

醋煮麝香糊和丸梧子大礬紅為衣薑湯吞下五七十丸

佐脾丸治食積山楂肉三兩連翹陳皮蘿菥子炒各五錢赤茯苓半夏各一錢右為末粥丸

大溫水吞下

麴蘖元治酒癖不消腹脹吞酸嘔逆不食神麴炒麥芽炒各一兩黃連五錢巴豆肉三粒同炒去

巴豆左右為末沸湯和丸梧子大薑湯下五七十九丸

酒積丸治酒積烏梅肉黃連酒浸一宿各一兩半夏

錢巴豆霜一錢右為末蒸餅和丸

烏白丸治酒積消痰食烏梅肉生薑各四兩白礬半

神麴麥芽陳皮青皮蓬朮丁香皮大薑湯下五十九丸

阿魏元治食積食生果過多不能剋化致成積腹痛嘔

神麴炒蘿菥子青皮白朮乾薑各五錢百草霜三錢巴豆三七粒去皮油右為末薄糊和丸

薑湯下二三十九丸麩傷用麩湯

阿魏丸

治肉積及食積成塊阿魏一兩醋煮軟山楂

兩右為末炊餅和丸服○一方阿魏山楂各一兩黃連六錢半連翹五錢右為末醋糊和丸服名

曰小阿魏丸門入

三稜煎元

治肉積脾虛為肉食所傷腹滿脇痛三稜

神麩麥芽並炒各三兩青皮乾漆炒蘿菔子炒各二兩杏仁硃砂飛研各一兩右為末以三稜膏和

丸梧子大薑湯下二三十九丸

妙應丹

治飲食中蠱毒或食水陸果苾子卵入腹而

箇七錢重者生去皮臍剉作瓮入硃砂共一兩七錢重麩裏煨熟去麩不用葷撥木香青皮破故紙

各三兩半右為末麩糊和丸梧子大生薑橘皮湯下三十丸

桂香丸

治多食雜芡果子成積腹脹氣急桂心一兩麝香一錢右為末飯丸茶豆大白湯吞下十

五九

磨積元

治茶積飲食減少面黃腹痛陳倉米半升巴豆肉七粒同炒令米赤去巴豆入青皮橘紅

各二兩右為末好醋搜和為丸
豌豆大淡薑湯下二三十九

勝紅元

治血積酒積及婦人脾血積氣三稜蓬朮並醋炒青皮陳皮乾薑炮良薑炒各一兩香附

子醋炒二兩右為末醋糊和丸
梧子大薑湯下三五十九

增味四物湯

治血積四物桂各湯料加三稜蓬朮乾漆炒肉桂各等分煎服

三稜煎

治食癥酒癖血癥氣塊三稜蓬朮各四兩荒花一兩同入磁器中米醋五盞浸之封口灰

火煨令乾取出稜朮將荒花以餘醋炒令微焦共焙乾為末醋糊和丸茶豆大薑湯下十五九

一方三稜蓬朮各二兩青皮半夏麥芽炒各一兩米醋六升同煮乾焙為末製法服法同上

破積導飲丸

治水土積痰飲積木香檀榔陳皮青皮枳實枳殼蓬術三稜半夏神麴麥芽茯苓

乾薑澤瀉甘草各五錢白朮頭末六錢巴豆三十粒去皮心膜油右為末薑汁糊和丸梧子大薑湯

下三五
十九丸

積聚癥瘕痞塊通治藥

宜用溫白元萬病元金露元荊蓬煎元秘方化滯丸

三稜消積丸寬中丸萬應丸
延年護命丹桃溪氣寶丸

溫白元

治積聚癥瘕痞塊黃疸鼓脹十種水氣八種痞塞五種淋疾九種心痛遠年瘧疾及療七十二

種風三十六種尸症癰狂邪祟一切腹中諸疾川烏炮二兩半吳茱萸桔梗柴胡菖蒲紫菀黃連乾

薑炮肉桂川椒炒巴豆霜赤茯苓白芍大薑湯下三九參各五錢右為末煉蜜和丸梧子大薑湯下三九

或五丸至七丸弱○一名萬病紫菀丸○治婦人腹中積聚有似懷孕羸瘦困瘵或歌笑如邪祟

服此藥自愈久病服之則皆
瀉出虫蛇惡膿之物乃愈

萬病元

療七種瘕塊八種瘡病五種癰癤十種疔

疾十種水病八種大風十二種濕痺及積聚脹滿

久遠心腹痛疳蛔寸白諸虫久積痰飲消瘦疲困

或婦人子藏中瘀血凝滯因此斷產服此藥以三

九為一劑不過三劑其病悉除說無窮盡故稱為

萬病元藥川椒肉桂芍藥乾薑防風巴豆霜常

歸犀角鎊桔梗荒花醋炒赤茯苓人參黃芩黃連

桑白皮蒲黃前胡大戟葶藶子炒麝香細辛雄黃

朱砂紫苑禹餘糧醋淬研水飛甘遂牛黃各一兩

蜈蚣十二節去頭足炙荒青二十八箇糯米同炒

米黃色取去翹足蜥蜴去頭尾足炙四寸右為末

蜜丸小豆大溫水或薑湯下三丸以吐利為度旋

金露元草烏炮黃連各一兩生乾地黃貝母巴豆霜

桔梗柴胡紫苑吳茱萸黃芩蒲乾薑白茯苓桂心芎

藭人參甘草防風厚朴枳殼鱉甲川椒甘遂各五

錢右為末麪糊和丸梧子

大薑湯下三丸或五丸

荆蓬煎元

消癥塊冷熱積聚破痰癖消化宿食三稜蓬木並酒浸三日夏則一日取出同巴豆

肉三十八粒石器內同炒黃色去巴豆却用湯浸去白各二兩木香枳殼青皮茴香炒檳榔各一兩

右為末麩糊和丸菜豆大薑湯下三五十九丸

秘方化滯丸

理一切氣化一切積久堅沉痼磨之自消暴積乍留導之立去奪造化有通塞

之功調陰陽有補瀉之妙三稜蓬木並煨各四錢八分半夏麩木香丁香青皮陳皮并去白黃連各

二錢半巴豆肉醋浸一宿熬乾六錢烏梅肉焙乾細末五錢右為末以烏梅末八白麵少許煮作糊

和丸黍米大每服五七丸至十九丸欲通利則以熟湯下欲磨積則以陳皮湯下欲止泄則飲冷水

三稜化積丸

治諸般積聚三稜酒煮六兩山楂肉四兩治諸般積聚三稜酒煮六兩山楂肉四

香青皮陳皮香附子醋炒枳實厚朴縮砂神麩炒麥芽炒南星薑湯泡半夏薑製蘿藦子炒黃連炒

挑仁乾漆炒甘草各一兩石為末醋糊和丸梧子大白湯下四五十丸

寬中丸

治七癥八癥一切沉滯之疾蒼朮炒烏藥香附

子各二兩三稜蓬朮並醋煮焙青皮陳皮乾薑炮

良薑炮茴香炒神麴炒麥芽炒各一兩右為末醋

萬應丸

破一切積散一切氣氣蠱血塊癥癥積聚食

積肉積酒積鼓脹浮腫痰癖等證礞砂水飛

阿魏醋研大黃吳茱萸青礞石與焰硝同煨肉桂

木香青皮玄胡索五靈脂茴香炒穿山甲蛤粉炒

延年護命丹

乳香沒藥當歸菖蒲皂角乾漆炒甘遂荒花大戟雄

三稜蓬朮並醋煨丁香良薑炒甘遂荒花大戟雄

黃各二錢半巴豆霜下一錢半右為末醋

糊和丸梧子大薑湯下三錢半右為末醋

黑丑頭末一兩蓬朮三稜並炮荒花驚甲醋炙各

五錢陳皮二錢半與荒花同醋浸一宿焙乾沒藥

乳香輕粉各一錢右為末蜜和搗千杵每一兩分

作四九細嚼一九溫水送下臨卧時明早取下惡

將物為效三日只喫白粥
息忌生冷油膩

桃溪氣寶丸

治一切積聚癥瘕腹脇如抱一窠瘦瘠露骨

丑頭末二兩大黃一兩半檳榔青皮各一兩羌活
川芎陳皮茴香炒木香當歸各五錢右為末熬皂

角膏和丸薑湯
下五十七丸

外貼法

三聖膏用藥外貼今消散可用

三聖膏

色貼積塊風化石灰半斤為末瓦器炒令淡紅

炒候熟減入桂心末五錢畧炒入米
醋熬成黑膏厚紙攤開貼患處

琥珀膏

治同上大黃朴硝各一兩為末大蒜搗為膏
和勻作片貼之

黃膏

五仙膏

治一切瘡塊積聚癰疾大黃皂角生薑生葱
蒜各半斤右共搗爛水煎取汁去渣再熬

成膏黑色為度攤絹帛上先

貼痞膏

水紅花子二錢大黃朴硝山梔石灰各一錢酒酵一塊雞子大共搗成膏用布攤開貼痞

塊上再用湯瓶熨手帕勒之三日後揭起肉黑如墨是其效也

熨癥法

吳茱萸三升碎之酒和煮熱布裹熨癥上冷更炒熨移走則逐而熨之

握藥宣積

巴豆乾薑芥子良薑硫黃甘草檳榔各等分右為末飯丸如中指頭大早朝先以川椒湯

洗手了麻油塗手掌中握藥一圓移時便瀉欲止瀉即以冷水洗手

難治證

積聚癥瘕不轉動者難治必死。五積中奔豚證最為難治奔豚從小腹起上衝咽喉發作欲

死復還止皆從驚恐得之越人曰驚者神上越也蓋奔豚病上衝咽喉者隨神上越故也

論之醫為病所困首惟陰虛之難補久積之難除玉山自倒陰虛之謂也養虎遺患久積之謂也人

之罹此二患者可不懼哉

單方

凡二十種

牛膝

破癥結及卒暴癥腹中有如石刺
取一兩細剉酒煎溫服空心乾

三稜

主老癖癥瘕結塊取三七酒服日二乾
成膏每朝取一七酒服日二乾

玄胡索

破癥癖與三酒服二錢效乾
等分為末酒服二錢效乾

大黃

破癥瘕積聚推陳致新最效大黃為末醋煮成
膏入蜜更煎九如梧子薑湯下三十九。疎風

熱去積滯大黃黑丑頭末半生半炒等
分蜜九梧子大茶清下十五九空心乾

商陸

主暴癥腹中有物如石痛刺若不治百日死多
取商陸根搗爛蒸之以布藉腹上安藥熨之冷

復易自消乾

牽牛子

治五般積聚瘕癖氣塊黑丑取頭末半生半
炒蜜九梧子大臨卧時以薑湯吞下甚妙乾

葫蘆

主暴癥腹中堅如石痛欲死葫蘆根一小束
細切酒一瓶浸三宿溫服五合日三神效乾

壯百壯中癰癰灸足踝後宛宛中灸隨年壯又灸氣
海百壯中腕二百壯○癰癰積塊先於塊上鍼
之甚者又於塊首一鍼塊尾一鍼立應鍼訖灸之
又灸三里○積聚取中腕懸樞脾俞商曲補尺
澤大谿○伏梁取上腕三里○息賁取巨闕期
門○奔豚取玉泉神章門○積塊取章門中
腕氣海天樞上腕通谷○專治痞塊取痞根穴
穴在十三顚下各開三寸半多灸左邊如左右俱
有左右俱灸○又法用稭從尾骨尖量至大指齊量
至足後跟中住將此稭從尾骨尖量至大指齊量
傍各開一韭葉許在左灸右在右灸左鍼三分灸
七壯神效○又法於足第二指歧又處灸五七壯
左患灸右右患灸左灸後一
晚夕覺腹中響動是驗也門

浮腫

浮腫之因

腫者鍾也寒熱氣所鍾聚也鑿○諸濕腫滿
皆屬脾土○三陰結謂之水註○曰三陰結滿

○謂脾肺之脉俱寒結也脾肺寒結則氣化為水
○下焦溢為水註曰下焦焦分注之所氣室不瀉

則爲溢水。納。○問曰：少陰何主腎？腎何主水？對曰：腎者至陰也。至陰者盛水也。肺者太陰也。少陰者冬脉也。故其本在腎，其末在肺，皆積水也。問曰：腎何以能聚水而生病？對曰：腎者胃之關也。關閉不利，故聚水而從其類也。上下溢於皮膚，故爲浮腫。附腫者，聚水而生病也。納。○陰陽氣道不通，四海閉塞，三焦不瀉，津液不化，水穀滲泄，并行腸胃之中，別于迴腸，留于下焦，不得滲泄。膀胱則下焦脹，水溢則爲水腫。蠶。○水腫由脾虛濕勝，凝閉滲道，水漬妄行，故通身面目手足皆浮而腫，皮薄而光，手按成窞，舉手即滿，是也。或腹大如鼓，而面目四肢不腫者，名曰脹。滿。○腎熱傳於膀胱，熱盛逆於脾胃，脾虛而脹重也。蠶。○腎熱傳於膀胱，熱盛逆於脾胃，脾虛而加喘者，重也。何以然？腎水勝而克退脾土，反勝若加喘者，重也。何以然？腎水勝而克退脾土，反勝久喘，又勝肺，肺爲心剋，故喘也。蠶。○

浮腫微兆

諸有之水氣者，微腫先見於目，下亦陰也。帝曰：何以

陰之所居故水在腹者必使目下腫也。微腫如卧蚕起之狀曰水。水納○足脛腫曰水。水納○視人之目窠上微壅如蚕新卧起之狀其頸脉動時咳按其手足上微壅而不起者風水膚脹也鼻頭色微黑者有水氣。腰脊者身之大關節也肢脛者人之管以趨翔也。莖垂者身中之機陰精之候津液之道也故飲食不節喜怒不時津液內溢乃下流於畢血道不通日大不休俛仰不便趨翔不能此病榮然有水也。

浮腫形證

本水病下為筋腫大腹上為喘呼不得卧者標

卧者一曰濕勝則濡泄甚則水閉。五種一曰風水其脉自浮外證骨節疼痛惡風。二曰皮水脉亦浮外證肘腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗。三曰正水其脉沉遲外證自喘。四曰黃汗其脉沉遲身發熱胃滿四肢頭面腫灸不愈必致癰膿又曰久則肌肉潰爛陰囊足脛水出。又有五藏水心水者其身重而少氣不得

卧煩而躁其陰大腫○肝水者其腹大不能自轉
側脇下腹中痛時時津液微生小便續通○肺水
者身腫小便難時時鴨溏○脾水者其腹大四肢
苦重津液不生但苦少氣小便難○腎水者其腹
大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆
冷而黃瘦黧○其狀目胞上下微腫如裹水通身
浮腫咳喘怔忡股間清涼小便澁黃皮薄而光手
按成窟舉手即滿是浮腫也○又有陽水陰水
陽水多外因涉水冒雨或感風寒暑濕其證先腫
上體肩背手臂熱渴而二便閉○陰水多內因飲
水及茶酒飢飽勞役房勞其證先腫下體腰腹脛
跗身重○大便利○勞○煩渴小便赤澁大便秘結此
為陽水○不煩渴大便溏小便赤澁此為陰水
腫○又曰石水者腎水停在小腹腫大結硬
如石故云石水○肺水者流溢皮膚遍身皆腫但
腹如故○不滿亦不渴○水蠱者水毒之氣結聚於
內令腹漸大動搖有聲常欲飲水皮膚蒼惡○
朝寬暮急血虛暮寬朝急氣虛朝暮急血氣俱虛

脉法

脉者可得治諸微細當責有水身體腫重。○水病腹大如鼓。脉洪大

生虛者死。○水氣得沉脉則逆。○比陰脉也。○水氣浮大則宜沉細。○水腫脉多沉伏。○病陽水

滑可安。微細難療。○水腫脉多沉伏。○病陽水。無陽證。脉必沉數。病陰水。無陰證。脉必沉遲。○

沉伏相搏。名曰水陽。虛陰實為水。必矣。○

水腫治法

治腫脹大法。宜補中行濕。利小便。使人參白。木通氣下陷。加升麻。柴胡。此補腹脹氣不運。加木香。

使以制肝木。少加厚朴。以消腹。○治濕湯方也。○

○治浮腫。宜以辛散之。以苦泄之。以淡滲利之。使

上下分消。其濕正。所謂開鬼門。繫爭府。開鬼門。若

謂發汗也。繫爭府者。利小便也。○夫為腫之血。亦

因之而化。水欲藉脾土以制之。導腎氣以利之。殊

不知脾病則金氣衰。木寡於畏。而來侮土。脾欲不

病。不可得矣。治法宜清心經之火。補養脾土。全運

化之職。肺氣下降。滲道開通。使敗濁之氣稍清者。

復回而為氣為血為津液甚者在上下為汗在下為
尿以漸而分消矣。諸有水者腰以下腫當利
小便宜五苓散。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。
當發汗乃愈。宜麻黃湯。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。
麻黃湯。陽水宜八正散。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。
復元丹。防風黃芩。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。
宜平胃散。防風黃芩。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。
通經湯。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。
減胃苓湯。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。
飲葶藶丸。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。
飲葶藶丸。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。
湯妨親加。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。
○水蠱證宜。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。
泄水宜三花神祐丸。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。
疥癩水腫宜赤小豆湯。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。
香散大橘。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。
皮湯。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。黃芩湯。

補中治濕湯
蒼朮 陳皮 赤茯苓 麥門冬 木通 當歸 各錢

七分黃芩五分厚朴升麻各
三分

澤瀉散

治水腫二便澁澤瀉赤茯苓枳殼猪苓木通
檳榔黑牽牛頭末各等分右為末生薑葱白

湯調下
二錢

神助散

治遍身水腫喘急小便澁黑丑頭末三錢葶
藶子炒二錢椒目一錢半猪苓澤瀉木香各

一錢右為末先以漿水一盞葱白三莖煎至半盞
入酒半盞調藥三錢絕早面東服如人行十里久
以漿水煮葱白粥入酒五合熟啜當利小便
三四升隔日再服須斷鹽味及房室三年

麻黃甘草湯

治腰上浮腫麻黃三錢甘草二錢右剉
作一貼水煎服溫覆令出汗小汗再服

神功有人患氣促積久不差
遂成水腫服此湯即效

越脾湯

治腰上浮腫咳嗽喘麻黃三錢蒼朮二錢石膏
甘草各一錢右剉作一貼入薑五片棗二枚

水煎
服

防已茯苓湯

治皮水上體腫赤茯苓三錢防已黃芪桂枝各一錢半甘草一錢右剉作一貼

水煎服

實脾散

治陰水發腫先實脾土厚朴白朮木瓜草果大腹子附子炮白茯苓各一錢木香乾薑炮

甘草炙各五分到作一貼薑三棗二水煎服

復元丹

夫心腎真火能生脾肺真土今真火既虧不能滋養真土故土不制水水液妄行三焦不

瀉樞機不運腫脹滿溢喘急奔急股冷舌乾不能止偃小便不通澤瀉二兩半附子炮二兩木香

炒川椒獨活厚朴白朮略炒橘皮吳茱萸桂心各一兩肉豆蔻煨檳榔各五錢右為末糊丸梧子

大紫蘇湯下五十丸此藥世傳屢驗其間君臣佐使與造物同妙當屏去諸藥一日三服且禁慾絕

年醖半

導滯通經湯

赤茯苓澤瀉各二錢陳皮桑白皮白朮木香各一錢右剉作一貼水煎服○許

魯齋因霖雨所傷肢體浮腫大便溏腹脹腸鳴時痛飲食減少脉弦細而緩此脾胃虛弱而濕氣盛也先服平胃散加白朮赤茯苓草豆蔻諸證皆愈止有四肢浮腫用此藥全愈

退腫塌氣散

治積水驚水或飲水過多積於脾故四肢腫而身熱赤小豆陳皮蘿蔔子炒各

二錢甘草一錢木香五分右剉作一貼入薑三棗二水煎服

分氣飲

治腫脹喘急桔梗赤茯苓陳皮桑白皮大腹皮枳殼半夏麴蘆子炒蘇葉各一錢草果甘

草各五分右剉作一貼入薑三棗二水煎服

葶藶丸

治肺氣喘促面目浮腫葶藶子防己木通杏仁貝母各一兩右為末蒸棗取肉和丸梧子

大桑白皮湯下五十丸

加味腎氣丸

治腎虛不能行水以致浮腫附子炮二兩白茯苓澤瀉肉桂牛膝車前子炒山

藥山茱萸牡丹皮各一兩熟地黃五錢右為末蜜丸如梧子大空心米飲下七十丸或百丸

黃米丸

治水蠱乾絲瓜一棒去皮剪碎和巴豆肉十粒同炒以巴豆色黃為度去巴豆入陳倉

米如絲瓜之多少同炒米黃色去瓜取米為末水丸梧子大每湯下百丸數服即愈蓋絲瓜如人脉

絡引巴豆之氣入皮膚也

漆雄丸

治水蠱真生漆一兩鍋內熬乾雄黃一兩為末右兩末醋糊復入鍋內熬乾雄黃一兩為末右兩末醋糊

和丸梧子大每四丸麥芽煎湯吞下

三花神佑丸

治中滿腹脹喘嗽林閉一切水濕浮腫脹滿濕熱沉積變生諸疾

煨腎丸

治脾虛邪水注腰膝浮腫而痛甘遂生五錢木香一兩右為末每錢猪腰子一枚剉

開去筋膜藥在內薄荷葉裹定外用濕紙四五重慢火煨熟臨卧細嚼溫酒送下利去黃水為度

五皮散

因他病變作水腫浮虛大腹皮茯苓皮生薑皮桑白皮陳皮各一錢半右剉作一貼水煎

服

赤小豆湯

治年少氣血俱熱生瘡疥變為腫滿赤小

赤芍藥各一錢右剉作一貼入薑五水煎服

葶藶木香散

治白木葶藶子猪苓赤茯苓各一兩木

香澤瀉木通桂皮甘草各五錢右為末白湯調下三錢

大橘皮湯

治濕熱內攻心腹脹滿并水腫小便不利

茯苓猪苓澤瀉各一錢桂皮七分檳榔六分木香五分甘草灸四分右剉作一貼入薑五水煎服

十水證

一曰青水先從左右脇腫起根在肝用葶藶子。二曰赤水先從舌根腫起根在心用葶藶子。

三曰黃水先從腰腹腫起根在脾用甘遂。四曰白水先從脚腫起根在肺用桑白皮。五曰黑水

先從外腎腫起根在腎用荒花。六曰風水先從四肢

腫起根在骨用澤瀉。八曰石水先從腎腫起根在膀胱用藁本。九曰高水先從小腹腫起根在小腸用巴豆。十曰氣水或盛或衰根在大腸用赤小豆。或盛

十水丸

治十種水氣。古十證看病根源除一味倍多。為君餘九味等分修製焙為細末蜜丸。梧子

大以赤茯苓湯吞下三九。或五九。二三日服。忌食生冷油膩。鹹鹽及猪魚酒麪。一百二十日。○神助散亦佳。方視註。

結陽證

內經曰結陽者腫四肢。註曰素嘗氣疾濕熱加。之氣濕熱爭故為腫也。邪氣漸盛正氣漸微。陽

氣衰少致邪代正。氣不宣通故四維發腫。諸陽受。氣於四肢也。今人見手足關節腫痛全以為風治

者誤矣。犀角湯主之。註。

犀角湯

治結陽證。四肢腫閉。犀角玄參各一錢。升麻。木通各八分。連翹柴胡各六分。沉香射干甘

草各五分。芒硝麥門冬各四分。右剉作一貼。水煎服。○

氣分證血分證

氣為飲隔痞滿腹鳴骨痛冷痺則曰氣
分亦曰水分○經脉不行血化為水四

肢紅腫則白血分皆水氣之所由作也○
氣分宜桂枝湯血分宜桂枝湯

桂枝湯

治氣分桂枝一錢枳殼乾薑各七分半白朮麻黃細辛甘草各
一錢

片水煎
服

桂枝湯

治血分桂枝皮赤茯苓當歸川芎赤芍藥蓬朮
三錢桑白皮檳榔蒼朮大腹皮瞿麥青皮陳

皮甘草五分葶藶大黃煨各二分半
右剉作一貼入薑五片水煎服

婦人產前後浮腫

詳見婦人門

不服藥自去水方

用丹房奇術塗
臍膏消河餅

丹房奇術

治腫脹不服藥自去水
銀粉二錢硫黃生一錢右同研成餅先

用新綿一片布臍上次以餅掩之外用帛縛如人行三五里許自然瀉下惡水待下三五次去藥以

粥補住鑿。久患者隔日取水一餅可救二三十人。燒一方治水蠱商陸根赤者杵爛貼臍上以

帛縛定水自小便出。

塗臍膏治水腫小便絕少地龍生研猪苓甘遂鹹砂各五錢右為末搗葱涎調成膏敷臍中約一

寸以絹帛束之以小便多為度日兩易之。

消河餅治水腫膨脹大田螺四箇大蒜五箇車前子末三錢右研成餅貼臍中以帕縛之少時尿

出如注即愈。鑿

浮腫通治藥宜加減胃苓湯四苓五皮湯集香湯實脾飲沉香琥珀丸三仁丸椒豉元海金沙散

諸

加減胃苓湯治浮腫蒼朮一錢半陳皮澤瀉白朮赤茯苓木瓜各一錢厚朴猪苓神麴檳榔

各八分山楂肉縮砂各七分香附子薑汁炒大腹皮各六分甘草炙三分右剉作一貼入薑三燈心

一團水
煎服

四苓五皮湯

治浮腫桑白皮陳皮地骨皮茯苓皮生薑皮大腹皮蒼朮白朮澤瀉猪苓青皮

車前子炒各一錢
剉作一貼水煎服

集香湯

治虛腫先用此以透關絡然後審證療之木香藿香川芎赤茯苓檳榔枳殼甘草各三錢

沉香丁香各二錢乳香一錢半麝香一字右為
麝末每三錢入薑三片紫蘇五葉煎服空心植

實脾飲

治水腫臌脹蒼朮白朮厚朴赤茯苓猪苓澤瀉
瀉縮砂香附子枳殼陳皮大腹皮木香枳殼

汁各七分剉作一貼入燈心
一塊煎去滓調木香水服之

沉香琥珀丸

治水腫尿澀葶藶子炒郁李仁沉香各
一兩半琥珀杏仁蘇子赤茯苓澤瀉各

五錢右為末蜜丸梧子大麝香為衣每
三十九至五十丸以蘿菹子煎湯下

三仁元

治水腫喘急大小便不利郁李仁杏仁薏苡
仁各一兩右為末糊丸梧子大米飲下四五

十九
蠟

椒鼓元治浮腫神方椒目一錢鼓二七粒巴豆一箇去皮心熬右研細滴水和丸菴豆大溫水吞

下三九或五九以微注為度氣
盛者巴豆或二箇或三箇

海金沙散治脾濕太過腫脹喘急黑丑頭末一兩半一治半炒一太過腫脹喘急黑丑頭末一兩半

沙三錢右為末每二錢煎
倒流水一盞食前調下煉

一方治外腎腫大莖物水泡通明方木香流氣飲加白芷木通紫蘇葉煎湯吞下青木香元貼

效驗百粒

又方腫滿後作瘡或發水疱成瘡是脾土崩壞真平
胃散妨觀細末清油調付濕則乾糝立愈蠟

可治不治證以手按之有窩者可治腫滿善證男

從上而腫下從下而腫上所患未久旋利腫退
喘定則愈矣得○男從脚腫而上女從頭上腫

而下皆不治。○男從脚下女從頭上腫起皆為逆陰陽微妙如此。○大九虛腫先起於腹而後散於四肢者可活。先起於四肢而後歸於腹者不治。○至若蠱脹而肚上有青筋。○腹滿而大便滑泄。○心久瘡而轉作虛浮。○與夫唇黑傷肝。○缺盆平傷脾。○突傷脾。○足心平傷腎。○背平傷肺。○皆為不治之證。○或肉硬或手掌平皆不治。○瘰癧。○唇腫齒焦者死。○卒唇腫而蒼黑者死。○掌腫無紋者死。○臍腫凸出者死。○缺盆平者死。○足跌。○陰囊莖俱腫者死。○脉絕口張足腫者死。○足跌。○陰囊如斗者死。○盈。○九水腫大喘氣。○不食乃腎水盈。○溢上行。○傍浸於肺也。○不治。○

禁忌法

凡水腫惟忌鹽。雖毫末許不得入口。若無以

之流勿服藥果。欲去病切須忌鹽。○尤忌鍼刺。○

病嗽及水全

單方

凡二十種有桑白皮
飲二氣散雞醴飲

桑柴灰汁

桑柴灰水淋取清汁煮赤小

桑白皮

治水腫喘急桑白皮四兩青梁米四
合同煮爛取清飲名桑白皮飲

白朮

治四肢腫滿白朮三兩剉大
棗三枚右水煎服日三四服

澤瀉

逐膀胱三焦停水或剉煎服
或為末白湯調下日二三服

葶藶子

治頭面手足虛腫又治水氣喘急葶藶子隔
紙炒為末素肉和丸小豆大煎湯下十

丸日三服
兩綠頭鴨切頭瀝血於白中令血盡納藥末和鴨

頭更搗五千杵丸如梧子空心白
湯下十九此藥利小便如神

商陸

能瀉十種水病取白色生根細
切雜生鯉魚煮作羹湯服之

牽牛子

治水氣蠱脹白丑黑丑頭末各取二錢大麥
麩四兩和作燒餅臨卧茶清爵下降氣為驗

名曰二氣散
取細末入於猪腎慢火煨熟而溫酒爵下則借腎

入腎兩得其便惡水
既泄不復泛溢矣

單麻子

治十種水氣五蠱瘴氣單麻子去殼用麻布包壓去油薄攤在木杓內仰放在鍋中水面

上以蓋合往煮二十餘沸以藥無白色為度取出每服六錢滾水化開空心溫服不過二三劑以小

便大利
為效

郁李仁

治水腫腹脹喘急大小便秘澀郁李仁一兩研取汁薏苡仁末二合和煮粥食之

方郁李仁一合為末和麪作餅燒餅與契即大便通利氣便差

鯉魚

治水腫脚滿氣急鯉魚肉十兩葱白一握麻子一升取汁煮作羹入鹽豉薑椒調和空心食之

同煮取二升許汁去滓分二服當下利即差

蝼蛄

治十種水病腫滿喘促生土狗一箇手足全者研細入縮砂末等分老酒調下

五日取蝼蛄不以多少不可見日焙乾每一病以七箇為度先用七箇頭治上次用腹治中次用足

治下皆為未空
心好酒調下

黑豆

酒治浮腫黑豆一升水五升煮取三升汁去滓納

之

赤小豆

又治方赤腫下水氣和桑白皮或通草煮服之

色商陸一條切同水煮豆爛湯成去葫薑商陸只

冬介

水病初得危急冬瓜不限多少任

苦瓠

煮治浮腫下水取白瓠實捻如大豆粒以綿裹

三年內慎口味不乾。苦瓠須擇

雞屎

酒治水腫氣腫濕腫皆效乾雞糞一升炒黃好清

中大轉動作鳴從大便利下於膝脚及臍上下先

滾酒淖熟食之即止名雞醴飲

青頭鴨

治十種水病垂死青頭鴨一隻治如食法和米并五味煮令極熟作粥空腹食之白鴨亦

好乾○鴨頭能利水而涼血故也

蝦蟆

治水腫鼓脹如神大蝦蟆一箇以縮砂七粒推入其口使吞入腹用罐子盛鹽泥封固炭火煨

通紅烟盡取出候冷去泥研為末作一服或酒或陳皮湯送下候撒屁多乃效

腫脹滿癰蝦蟆二三枚裝在雄猪肚內酒煮一伏時去蝦蟆將肚與酒食盡大便屁如雷或水下其

消腫自

猪肝

治浮腫脹滿猪肝一具細切以醋洗蒜齏食之又以熱水煮單喫亦可

獐肉

治十種水不差垂死獐肉半斤切粳米三合水三升入葱椒薑豉作粥食之○又作羹臠食之

下水大效

鍼灸法

四肢及面皆浮腫灸水分氣海即消。水腫惟得鍼水溝餘穴則鍼之水分盡即死庸醫多為人

鍼水分殺人多矣惟灸水分最為要穴蓋此穴能分水不使妄行有人患水腫灸水分與氣海翌日面如削矣

脹滿

脹滿之源

帝曰脹者焉生何因而有岐伯曰衛氣之在

乃得天和五藏更始四時有序五穀乃化然後厥氣在下榮衛留止寒氣逆上真邪相攻兩氣相搏乃合為脹也榮氣循脉衛氣逆為脉脹衛氣並脉循分為膚脹。凡九人七情內傷六淫外侵飲食失節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職胃受水穀不能運化故陽自升陰自降而成天地不交之否於是清濁相混隧道壅塞氣化濁血瘀鬱為熱熱留而久氣化成濕濕熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以其外雖堅滿中空無物有似乎鼓其病膠固難以治療故又名曰蠱若虫侵蝕有蠱

之義。入五藏。飲食不節。起居不時者。陰受之。陰受之則入五藏。入五藏則臍滿閉塞。納。○濁氣在上則生臍脹。注曰。濁氣謂寒氣也。寒氣在上聚而不散。則成臍脹。○足太陰之脉。病腹脹。足陽明之脉。病亦腹脹。○不能化五穀。乃大寒。為臍滿。脾為陰中之太陰。無陽則不能化。五穀乃大寒。為臍滿。故脉經云。胃中寒。則臍滿。此之謂也。○凡臍初起。是氣久則成水。治比水腫。更難。蓋水腫。飲食如常。鼓脹。飲食不及。常病根深。痼必三年五年。而後成。治腫。惟補中行濕。足矣。治脹。必補中行濕。無以消導。更斷。鹽醬。音樂。妄想。不責速效。乃可萬全。門。

脹滿形證

中滿。腹脹者。其面目四肢不腫。而腹肚脹起。中空。似鼓者。是也。○臍腹四肢悉腫者。為水。但腹脹。四肢不甚腫者。為蠱。蠱即脹也。○腹

滿。臍脹。支滿。脇下。厥上。冒過。在足太陰陽明。○腹。○脹。有虛實。虛脹。為邪吐利。不食。時脹。時減。按之則陷而軟。○實脹。陽熱。為邪身熱。咽乾。常脹。內痛。按之。不陷而硬。○腹脹。時減。復如故。此為寒。宜溫之。○實。可下之。○腹脹。時減。復如故。此為寒。宜溫之。○



腹滿不減減不足
言須當下之

脉法

其脉大堅以瀉者脹也。脉盛而緊曰脹。納虛。脈滿。脈弦。脾制於肝。洪數熱。脈遲弱陰寒。浮為虛。

滿緊則中實。浮則可治。虛則危急。難。關上脉虛。則內脹。遲而滑者。脹。虛而緊澁者。脹。或弦。

而遲。或浮。而數。皆脹也。難保。諸氣。脹滿。浮大。可療。虛小。難保。

脹病有七

夫脹者。皆在於藏府之外。排藏府而募胃脇。水脹。氣脹。血脹。蠱脹。小脹。病亦謂鼓脹。其脇痛。

面黑。是氣鼓。脇滿。小脹。病亦謂鼓脹。有血。絲縷。是血鼓。去清氣。作酸飽悶。腹脹。是食鼓。惡寒。手足。

厥冷。瀉。是痞散。成鼓。利。厥冷。宜溫之。瀉。吐。

是痞散

寒脹

利。厥冷。宜溫之。瀉。吐。

熱脹

熱者。以陽并陰。則陽實。陰虛。陽盛。生外熱。陰虛。生內熱。脈必浮。數。浮。則為虛。數。則為熱。陰虛。不能宣導。

飲者為熱腹中脹

穀脹

能失飢傷飽痞悶停酸朝則陰消陽長穀氣難化故不能食是為穀

脹

水脹

脾土受濕水漬於腸胃而溢於皮膚

氣脹

七情鬱結氣道壅塞上不得降下不得

血脹

煩燥漱水迷忘驚狂痛悶嘔逆小便

脹滿治法

于適寒涼者脹下之則脹已○中滿者瀉之

而熱脹少也○鼓脹宜補中行濕此脾虛之甚

必須遠音樂斷厚味大劑人參白朮佐以陳皮茯苓

制木使脾無賊邪之慮滋腎水以制火使肺得清

行利藥以求一時之快殊不知寬得一日半日其
脹愈甚病邪甚矣真氣傷矣去死不遠此病之起

固非一年根深蒂固欲取速效自求禍耳知王道
者可與語此也○凡腹脹須用薑製厚朴初得

是氣脹宜行氣疎導之劑木香檳榔枳殼青皮陳
皮之類久則成水脹宜行濕利水之劑蒼朮白朮

茯苓澤瀉防己之類○瘦人腹脹是熱宜芩連施子厚
茯苓滑石澤瀉○

○朴○色白人是氣虛宜人參白朮白茯苓陳皮○
○中滿比脹稍輕俗云倒飽是也○

有穀脹水脹氣脹血脹
又有寒脹熱脹蠱脹

穀脹宜雞矢醴散

雞矢醴散及治穀脹朝食則不能暮食又治氣脹水脹
及蠱脹雞矢白乾者大黃桃仁各等分右

為末每二錢薑湯調服○一方羯雞屎一升炒
黃色細末百沸湯三升淋汁每取一大盞調木香

檳榔末各一錢空體飲正以
平為期名曰雞矢醴散

大異香散

治穀脹亦治氣脹三稜蓬朮青皮陳皮藿香半夏麴桔梗益智仁香附子枳殼各一

錢甘草二分半右剉作一貼入薑五棗二水煎服

水脹

宜防已椒蘆丸

防已椒蘆丸

治有水氣也防已椒目葶藶子炒大黃

各一兩右為末蜜丸梧子大白湯吞下十九日三劑

木香散

治水脹木香大戟白丑頭末各等分右為細末取猪腰子一隻批片糝藥末二錢在內煨

熟空心細嚼溫酒送下如食右腰子則搗右臂食左腰子則搗左臂而卧如未全愈則於肚上滿塗

甘草遂末却飲甘草湯則便去

氣脹

宜三和湯分心氣飲

二和湯

治氣脹大小便不利白朮陳皮厚朴各一錢

枳殼海金沙甘草各五分右剉作一貼
薑三水煎服

氣鉞元

專治氣膨薑黃青皮各一兩木香丁香胡椒
全蠍肉豆蔻煨各五錢右為末羅薑子二兩

爛研和勻用紅酒生薑汁各少許煮糊和丸
梧子大以紫蘇葉陳皮煎湯下四五十九

金蟾散

治氣鼓如神大蝦蟆一箇以縮砂推入其口
使吞入腹以滿為度用泥罐封固火煨通紅

烟盡取出候冷去泥細研末為一服或酒
或陳皮湯調下候散屁多乃見其效

血脹

宜人參芎歸湯散
血消腫湯桃奴丸

人參芎歸湯

治血脹是瘀血凝聚成脹滿也川芎二
錢當歸半夏各一錢半蓬朮木香縮砂

烏藥甘草各一錢人參桂皮五靈脂各五分右
剉作一貼八薑五素二紫蘇葉四片水煎服

散血消腫湯

治血脹煩燥漱口與上人參芎
歸湯同而無烏藥有芍藥耳

桃奴丸

治血脹及婦人月經不通漸成脹滿與男子
血蟲病同桃奴猴鼠糞玄胡索肉桂香附子

五靈脂縮砂桃仁各等分右為末每三錢溫酒調下。或醋糊和丸梧子大醋湯下三五十九裕

寒脹

宜中滿分消湯溫胃湯順氣木香散厚朴橘皮煎

中滿分消湯

治中滿寒脹大小便不通益智仁半夏木香赤茯苓升麻各七分半川芎人參

青皮當歸柴胡生薑乾薑葶藶黃連黃芪吳茱萸草豆蔻厚朴各五分右剉作一貼水煎服

溫胃湯

治胃氣虛冷張滿食不下乾薑炮一錢半附子炮半夏麴厚朴人參陳皮甘草炙當歸各

一錢二分半川椒炒一錢右剉作一貼水煎服

順氣木香散

治寒脹心腹刺痛面黃氣瘦或泄瀉縮砂丁香皮良薑乾薑炮肉桂陳皮厚朴

桔梗茴香炒蒼朮炒各一錢甘草炙五分右剉作一貼入薑三棗二水煎服。或為末鹽沸湯點服

二錢

厚朴橘皮煎

治傷冷腹肚脹如覆枵痞喘急厚朴三兩枳殼乾薑良薑各一兩二錢

青皮陳皮肉桂全蝎各七錢右爲末醋糊和丸梧子大生薑橘皮湯下三五十九

熱脹

宜七物厚朴湯枳殼剉散中滿分消丸

七物厚朴湯

治熱脹厚朴三錢枳實一錢半大黃甘草各一錢桂心五分剉作一貼薑五

棗二煎服粥

枳殼剉散

治熱脹厚朴枳殼桔梗各二錢大黃蒸甘草各一錢右剉作一貼薑五棗二水煎

服

中滿分消丸

治中滿鼓脹及氣脹水脹然只治熱脹不治寒脹厚朴一兩人參白朮薑黃黃

芩黃連枳實半夏各五錢知母四錢澤瀉陳皮各三錢白茯苓縮砂乾生薑各二錢猪苓甘草各一

錢右爲末水浸蒸餅和丸梧子大熱湯下百丸

蠱脹

宜消蠱湯消脹飲子諸蠱保命丹

消蠱湯

治氣作蠱脹但腹脹而四肢頭面不腫半夏

肉豆蔻枳殼青皮陳皮五分右剉作一貼薑三棗二煎

服

消脹飲子

治蠱脹單腹腹猪苓澤瀉人參白朮赤茯苓

砂木香檳榔大腹皮木通羅當子甘草各五分右剉作一貼薑五棗二水煎服

諸蠱保命丹

治蠱各一蠱腹肉苳蓉三兩青礬紅棗香

苳蓉棗礬八罐內同火燉烟盡和藥末糊丸梧子

大每二三十九食後酒下○勞單腹腫大而四肢

極瘦者名曰蜘蛛蠱古方雖有八物湯防蟻煮地

脹滿通治藥

湯宜半夏厚朴湯廣朮漬堅湯濟生紫蘇子

消湯四聖丸木香檳榔丸四炒枳殼丸木香
分氣丸消脹元木香消脹元葶澄茹元諸

半夏厚朴湯

通治脹滿諸證半夏一錢厚朴八分神
麴六分蘇木紅花各五分三稜當歸梢

猪苓升麻各四分肉桂蒼朮白茯苓澤瀉柴胡陳
皮生黃芩甘草各二分木香青皮各二分

分吳茱萸黃連乾生薑各一分桃仁七
箇昆布少許右剉作一貼水煎服

廣木潰堅湯

治中滿腹脹內有積聚堅硬如石大小
便澀滯半夏一錢半黃連厚朴黃芩益

智仁草豆蔻當歸各七分陳皮青皮神麴澤瀉柴
胡甘草各五分蓬朮升麻吳茱萸各三分紅花二

分右剉作一貼薑三水煎服○服此藥中
滿減半止有積塊乃服半夏厚朴湯

濟生紫蘇子湯

治憂思傷脾心腹膨脹喘促胃滿
腸鳴大小便不利脉虛緊而澀白朮

二錢蘇子人參各一錢大腹皮草果半夏厚朴木
香陳皮枳殼甘草各五分左右剉作一貼八薑三片

棗二枚水煎服

大正氣散

治風寒暑濕所傷成脹滿白朮蒼朮陳皮厚朴藿香半夏各一錢枳殼檳榔各七分

桂枝乾薑甘草各五分右剉作一貼入薑五棗二水煎服粥

四香散

治脾氣血氣血蠱水蠱石蠱腫脹以稍箕木香沉香乳香甘草各二錢半川芎胡椒

陳皮人參白礬各五錢桂心乾薑縮砂茴香各一兩大茹焙五兩右為細末每二錢陳米飲調下

撞關飲子

治脹滿用此衝開關格使脹自消香附子二錢烏藥一錢二分厚朴一錢縮砂八分

三稜白豆蔻甘草各五分丁香沉香各三分右剉作一貼入薑三水煎服。又為末紫蘇湯調下二

錢

沉香飲

治腹脹氣喘坐卧不得蘿菹子炒研二錢沉香木香枳殼各一錢右剉作一貼入薑三片

水煎服

分消湯

治中滿成鼓脹滿悶蒼朮白朮陳皮厚朴枳實赤茯苓各一錢香附子猪苓澤瀉大腹皮

各八分縮砂六分木香三分右剉作一貼八薑二片燈心一團水煎服

四聖丸 治小兒心腹虛脹全蠲炒一兩胡椒木香青

薑橘湯下五七丸。○腹脹由脾胃虛氣攻作也肺與脾為子母肺主目胞腮之類脾主四肢子母皆

虛則目胞腫四肢黃色用塌氣丸漸消之塌氣丸即四聖丸去木香青皮也

木香檳榔丸 疎導三焦通利大小便下濕痰凝滯則

去皮弦子郁李仁各二兩木香檳榔枳殼杏仁麩炒青皮各一兩右為末別以皂角四兩浸漿水搓

揉熬膏去滓八煉蜜少許和丸

四炒枳殼丸 治氣血凝滯成鼓脹積聚枳殼米泔浸

一兩以水同煮乾炒黃色去蒼朮。○一分薤蒿子一兩以水同煮乾炒黃色去薤蒿子。○一分茴香

一兩以水同煮乾炒黃色去茴香。○一分乾漆一兩以水同煮乾炒黃色去乾漆。○香附子醋浸炒

二兩。三稜蓬朮各二兩童便並浸一宿次日用
去殼巴豆三十粒同水煮熟乾炒黃色去巴豆不用
取汁好醋一椀打麪糊和九梧子大米飲下七九

十丸

木香分氣丸

治脾胃不和腹脇膨脹痰嗽喘急飲食

薑黃玄胡索白朮枳殼三稜赤茯苓陳皮肉豆蔻
右為末麪糊和丸小豆大薑湯吞下三五十九丸

消脹元

快氣寬中除脹消食黑丑頭末蘿菹子炒木
香檳榔各等分右為末滴水丸梧子大薑

湯下三五寸丸
一名小檳榔元

木香消脹元

治脹滿蘿菹子炒二兩陳皮大腹子枳
殼桑白皮蘇子炒香附子各一兩檳榔

五錢木香二錢半右為末麪糊和丸
梧子大薑湯或棗湯下五七十九丸

葶澄茹元

治痞滿脹滿穀脹氣脹葶澄茹白豆蔻縮
砂青皮蘿菹子木香陳皮各七錢半肉豆

葱茴香桂皮丁香各三錢七分半右為末
麩糊和丸梧子大陳皮湯下三五十九粒

濁氣在上則生臌脹

內經曰清氣在下則生飧泄濁氣

寒在上焦則水穀精微之氣不能運化鬱結而為
脹滿○一人患脹夜分尤甚脉弦而細正是濁氣
在上生臌脹也先灸中脘欲引胃中生發之氣上
行陽道後以木香順氣湯服之良愈
亦治此證
湯沉香交泰丸

木香順氣湯

厚朴白茯苓澤瀉半夏各一錢蒼朮八
分青皮陳皮各六分甘草豆蔻人參當歸

各五分益智仁吳茱萸各三分木香乾生薑升麻
柴胡甘草各四分右剉作一貼入薑三水煎服
○經曰留者行之結者散之以柴胡升麻之苦平
行少陽陽明二經發散清氣運行陽分為君以生
薑半夏草豆蔻益智仁之辛甘大熱消散中寒為
臣以厚朴木香蒼朮青皮之苦辛大溫通順滯氣
當歸人參陳皮之辛甘溫調理榮衛滋養中氣氣
之薄者陽中之陰茯苓甘草澤瀉之氣薄導引濁

陰之氣自天而下故以為佐濁氣不降以苦泄之
吳茱萸苦熱泄之者也故以為使氣味相合散之
泄之上之下之使清濁
之氣各安其位也

吳茱萸湯

治濁氣在上生腹脹又陰盛生寒腹滿臍
脹常如飽不欲食飲吳茱萸厚朴官桂乾

薑各一錢白朮陳皮川椒炒各五分右剉作
一貼水煎服。或為末每二錢薑湯點服

沉香交泰丸

治濁氣在上生腹脹吳茱萸大黃酒浸
各一兩厚朴五錢沉香白朮陳皮各三

錢白茯苓澤瀉當歸木香青皮各二錢右為末
湯浸蒸餅和丸梧子大溫水下七八丸

傷寒熱病腹脹滿

詳見寒門

脹滿乃真臍病也

胃勞滿由脾虛之極乃真臍病也如反
胃勞亦然皆真臍病也凡人之病

真藏不病則五行相生相制以適於平雖不服藥
而自愈如火極傷金則有水以制之有土以生之
如木極克土則有金以制之有火以生之所謂亢
則害承迺制也雖然亦有惡藥忌醫而誤之者蓋

正氣與病邪不相兩立一勝則一負久則病劇正脫而不免於死然則有病不服藥可乎不用醫可

手冊

脹滿泄瀉

腹脹經久忽瀉數升晝夜不止服藥不驗乃為氣脫最難救取益智仁濃煎湯服之立愈

門入

外敷法

治積聚脹滿血蠱等病宜外敷神膏及外敷藥

外敷神膏

每大黃二兩朴硝各四兩麝香一錢為末

外敷藥

治腹脹硬如石先用熟水嚼甘草調遍塗腹

上神效

可治不可治證

腹不滿得之未久或脹或消腹皮稍軟不泄不喘隨治隨差若臍心突起利後腹

張急久病羸乏喘息不得安名曰脾腎俱敗不治
○腹脹身熱脉大是一逆也○腹鳴而滿四肢

清泄其脉大是二逆也。腹脹便血其脉大脹四末清脫形泄甚是三逆也。腹脹便血其脉大脹四末清脫形泄也。

並不治。腹滿不得小便。或無身熱。或無如瘡。皆不而不下。泄不治。腹滿或無身熱。或無如瘡。皆不。

可治。心突。久病。羸乏。卒然。腹滿。喘。息。不得。與。夫。臍。心。突。起。或。下。利。頻。頻。未。見。一。愈。者。耳。擿。

單方

九種

厚朴

治腹脹。乃結者。散之。神藥也。湯。○有人。心腹脹。滿。只以厚朴。細剉。薑製。每取五錢。或七錢。薑七

片。同煎。服。滓。又煎。服。五六次。即愈。○腹脹。必少。佐以厚朴。者。蓋其味辛。能散。以氣聚。上焦。故也。

大戟

治大戟。取大棗。一斗。置鍋內。與大戟。同。水。煮。熟。去。大戟。取。大棗。一。斗。置。鍋。內。與。大戟。同。水。煮。熟。

鷓鴣屎

治腹滿。取鷓鴣屎。炒。黃色。作末。每。一。錢。溫。水。調。下。即效。○雷公云。體寒。腹大。全賴鷓鴣屎。是也。

蝦蟆

治蠱脹。取一箇。去內腸。八。錢。七。枚。新瓦上焙焦。乾。為末。糊。丸。酒。服。七。枚。

雞屎

治穀脹。及諸脹。取尿。白。炒。黃。湯。漬。之。取。清。汁。服。之。乾。

黑豆

和桑柴灰汁煮服
下水鼓腹脹效

赤小豆

下水煮作粥常服
水脹滿以桑柴灰

紫蘇莖葉

治心腹脹滿煮作
飲如茶常服

蔓菁子

治心腹脹取一合搗爛水一升和研瀝取汁
一盞頓服或自吐或利或汗腹中自寬

蘿蔔子

治腹滿炒研水煮如茶常服
○蘿菔取子陳根煮服亦佳

大麥麵

治腹常食最佳
大麥飯亦好

桑枝茶

下氣消脹常服最佳
或和赤豆作粥亦良

烏牛尿

治久患氣脹取熱尿空服
一升日一服氣散即止

椒目

治水蠱能行水作末
溫水調一錢服之

鍼灸法

腹中膨脹取內庭○水蠱取偏歷○鼓脹取臍
上下左右各刺二寸二分○單蠱脹取水分

入二寸半或灸五十壯。脹滿取足三里瀉之。○
九脹皆取三里是脹之要穴也。○又取中脘氣滯
或鍼或灸

消渴

消渴之源

內經曰二陽結謂之消。註曰二陽結謂胃及

手陽明大腸主津液所生病熱則目黃口乾是津
液不足也足陽明胃主血所生病熱則消穀善飢
血中伏火是血不足也結者津液不足結而不潤
皆燥熱為病也。○消者燒也如火烹燒物理者
也。○心移寒於肺為肺消。消者飲一溲二死
不治。註曰金受火邪肺為肺消。消者飲一
而溲二也。○心移熱於肺傳為膈消。註曰心
兩間中有斜膈膜膈膜下際內連於橫膈膜故心
熱入肺久傳化內為膈熱消渴而多飲也。○
瘴成爲消中。註曰瘴謂消熱病也。多飲數溲謂之
熱中多食數溲謂之消中。○九消瘴肥貴人則
膏粱之疾也。此人因數食甘美而多肥故其氣上

溢轉為消渴。註曰：食肥則腠理密而陽氣不得外泄，故肥令人內熱。甘者性氣和緩而發散逆，故甘令人中滿。然內熱則陽氣炎上，炎上則欲飲而噤。乾中滿則陽氣有餘，有餘則脾氣上溢，故轉為消渴。○喜渴者，由心熱也。心主便汗，便汗多則腎中虛燥，故令渴。凡夏月渴而汗出多，則小便少；冬月不汗，故小便多。皆平人之常也。○

消渴形證

消渴病有三：曰消渴，曰消中，曰消腎。○熱氣上騰，心虛受之，心火散漫，不能收斂，胃中煩燥，

舌赤唇紅，此渴引飲，常多小便，數而少，病屬上焦。謂之消渴。○熱蓄於中，脾虛受之，伏陽蒸胃，消穀善飢，飲食倍常，不生肌肉，此渴亦不甚煩，小便數而甜，病屬中焦，謂之消中。○熱伏於下，腎虛受之，腿膝枯細，骨節痠疼，精走髓虛，引水自救，飲水不多，隨即尿下，小便多而濁，病屬下焦，謂之消腎。○自消腎而折之，又有五石過度之人，真氣既盡，石勢獨留，陽道興強，不交精泄，謂之強中。消渴輕也，消中甚焉，消腎又甚焉。若強中則其斃可立待也，消中甚焉，消腎又甚焉，若強中則其斃可立待也。○上消者，肺也，又謂之瞶，消多飲水而少食大

便如常小便清利○中消者胃也渴而飲食多小便赤黃○下消者腎也小便濁淋如膏油之狀面黑耳焦而形瘦○渴而多飲為上消消穀善飢為中消渴而尿數有膏油為下消○五藏六府皆有津液熟氣在內則津液竭少故為渴夫渴者數飲水其人必頭目眩背寒而嘔皆因裏虛故也

水少○飲水而安睡者實熱也飲水少傾即吐者火邪假渴耳

脉法

○消渴脉實大病久可治脉懸小堅病久不可治

○消渴脉數大者活細小浮短者死○消渴者陽氣勝也○細小脉微小為消瘵○心脉數為渴滑者陽氣勝也○細小脉微小為消瘵○心脉數

大者生沉小者死○心脉滑甚為喜渴○跌陽脉數胃中有熱即消穀引飲大便必堅小便即

數大忌虛小○消渴脉宜

消渴有三

加上消者舌上赤裂大渴引飲○膈消是也白虎

若不能食而渴宜加味錢氏白朮散又麥門冬飲

子降心湯人參石膏湯清心蓮子飲和血益氣湯



生津養血湯黃芩湯皆治上消。中消者善食而瘦，自汗大便硬，小便數，所謂瘵，成為消中者，是也。調胃承氣湯、甘露湯、順氣散、人參散、黃連、猪肚丸、藕飲、子生、津甘、露湯，順氣散、人參散、黃連、猪肚丸、藕汁、膏皆可用。○下消者，煩燥引飲，耳輪焦，乾小便，如膏，腿膝枯細，所謂焦煩水易，鬻者，是也。六味地黃丸，主之。○又宜入參、茯苓、散、加減、八味、元、方、齏、加減、腎氣丸、補腎地黃丸、元、鹿茸丸、補、○養肺降火，生血為主，分上中下治之。○三消多屬血虛，不生，津液宜以四物湯、方、○為主，治上消，加人參、五味子、麥門冬、天花粉、煎入牛乳，汁生地黃汁、生藕汁、酒客、生葛根、汁調服。○中消，加知母、石膏、寒水石、滑石、○下消，加黃柏、知母、熟地黃、五味子、○消渴病，小便反多，如飲水，一斗，小便亦一斗，腎氣丸、主之。○

加味錢氏白朮散

治消渴，不能食，又治消中，善飢，乾葛二錢，人參、白朮、白茯苓、藿香、甘

草各一錢，木香、柴胡、枳殼、五味子，各五分，右剉作一貼，水煎服。

麥門冬飲子

治肺痿麥門冬二錢知母天花粉人參五味子葛根茯苓神生地黃甘草各一錢

右剉作一貼入竹葉十片水煎服

降心湯

治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消天花粉二錢人參遠志當歸熟地黃白茯苓

黃芪蜜炒五味子甘草各一錢右剉作一貼入棗二水煎服

人參石膏湯

治肺消石膏四錢知母二錢三分人參一錢七分甘草一錢三分右剉作一貼

水煎服

清心蓮子飲

治心火上炎口乾煩渴小便赤澀蓮子二錢赤茯苓人參黃芪各一錢黃芩車

前子炒麥門冬地骨皮甘草各七分右剉作一貼水煎服

和血益氣湯

治酒渴小便數舌上赤脉肌體枯瘦黃柏酒洗升麻各一錢生地黃酒洗黃連

酒洗各八分石石膏杏仁桃仁各六分知母防已羌活各五分當歸梢四分柴胡麻黃根生甘草炙甘

草各三分紅花少許右
剉作一貼水煎服

生津養血湯

治上消當歸白芍藥生地黃麥門冬各一錢川芎黃連各八分天花粉七分知

母黃柏並蜜炒蓮肉烏梅薄荷甘草各五分右剉作一貼水煎服

黃芩湯

治上消片苓梔子桔梗麥門冬當歸生地黃天花粉乾葛人參白芍藥各一錢右剉作一

貼入烏梅一箇水煎服

蘭香飲子

治一消渴善食而瘦二便結數石膏三錢知母一錢半生甘草防風各一錢炙甘草人

參蘭香葉連翹白豆蔻桔梗升麻各五分半夏二分右為末蒸餅糊調成餅晒乾為末每二錢淡薑

湯調下

生津甘露湯

治消中能食而瘦大便燥小便數石膏草龍膽黃柏各一錢柴胡羌活黃芪酒

知母酒黃芩炙甘草各八分當歸身六分升麻四分防風防已生地黃生甘草各三分杏仁十箇桃

仁五箇紅花少許右剉作一貼水二盞煎至一盞加酒一匙稍熱服不拘時。一名清涼飲子煉

順氣散

治消中愈厚朴二錢半大便黃赤以此微利至不飲

剉作一貼水煎服不拘時

人參散

治消中滑石二兩寒水石甘草各一兩石膏五錢人參二錢半右為末每取二錢溫水調

下

黃連猪肚丸

治消渴消中亦治強中證猪肚一箇黃連五兩麥門冬知母瓜蒌根各四兩

右四味為末入猪肚內以線封口置醃中蒸爛於石臼中令搗爛入蜜少許作丸梧子大米飲下百

九

藕汁膏

治胃熱消中藕汁柏蘗生地黄黃汁牛乳汁和黃連天花粉末佐以薑汁白蜜為膏以匙抄

取徐徐留舌上以白湯送下日三四次

入參茯苓散治腎消尿濁如膏滑石寒水石各一錢

黃各五分連翹三分人參白朮澤瀉桔梗梔子天

花粉縮砂各二分右剉作一貼水煎服

加減腎氣丸治腎消口燥煩渴兩脚枯瘦熟地黃二

兩牡丹皮白茯苓山茱萸五味子澤瀉

補腎地黃元治腎消能降心火益腎水止消渴明耳

目黃栢一斤剉同地黃晒乾生地黃半

斤酒浸二日蒸爛研膏與黃栢拌晒乾白茯苓四

鹿茸丸治腎虛消渴小便無度麥門冬二兩鹿茸熟

地黃黃芪五味子雞肫脰麩炒肉苁蓉酒浸

山茱萸破故紙炒牛膝酒浸人參各七錢半白茯苓

地骨皮玄參各五錢右為末蜜丸梧子大空心

米飲下五
七十丸

食飮證

○內經曰大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食飮

易而過不生肌膚也
治法與消中同

消渴小便甜

理消渴者腎虛所致每發則小便必甜以物

入之食後滋味皆甜入流在膀胱若腰腎氣盛則上

蒸炎氣化成精氣下入骨髓其次為脂膏又其收

為血氣其餘則為小便便故小便色黃血之餘也五

消渴由坎火衰少

潤肺為五臟華蓋若下有煖氣蒸則肺

渴易乾上坤下其卦為否陽無陰不降陰無陽不

升故成否也譬如釜中有水以火煖之又以板覆



氣飲食得火力則潤上而易消亦免乾渴之患宜服八味腎氣丸

消渴與脚氣相反

病則相反脚氣雖始發於二三月盛於

五六月衰於七八月消渴始發於七八月盛於十

一十二月衰於二三月其故何也蓋脚氣壅疾也

消渴宣疾也春夏陽氣上故壅疾愈審此二者疾可理

消渴通治藥

湯宜滋陰養榮湯活血潤燥生津飲桑白皮

黃湯天花散黃連地黃湯生地黃飲子清神補氣湯黃

玉泉散玄菟丹三消丸玉泉丸五汁玉泉丸生地

滋陰養榮湯

治消渴亡津液口燥咽乾當歸二錢人

母黃柏五粒蜜水炒各一錢甘草五分五

味子十五粒右剉作一貼水煎服

活血潤燥生津飲

通治消渴天門冬麥門冬五味子瓜蒌仁麻子仁當歸熟地黃生地

黃天花粉甘草各一錢
右剉作一貼水煎服

桑白皮湯

治三消渴疾重根桑白皮藥桂皮各一錢甘

草五分剉作一貼水煎服

梅花湯

治三消渴利神效糯穀旋炒作曝桑根白皮厚老細切各五錢右作一貼水煎渴則飲之

不拘時

大黃甘草飲子

治一切消渴大黃一兩半甘草大者四兩剉黑豆五升另煮三沸去苦水

右用井水一桶同煮爛令病人食豆飲汁無時不三劑病去

清神補氣湯

消渴證纔愈止有口乾此藥主之升麻一錢黃柏酒洗黃連酒洗知母生甘草各五

泥各一錢黃柏酒洗黃連酒洗知母生甘草各五分石膏熟地黃各四分生地黃細辛各二分杏仁

六箇川椒貼水煎服。一粒紅花少許。右剉作一。

黃芪湯治諸渴生乾地黃二錢黃芪茯苓神天花粉麥門冬各一錢五味子甘草各五分。右剉作一。

貼水煎服

天花散治消渴天花粉生乾地黃各二錢乾葛麥門冬五味子各一錢甘草五分。右剉作一。貼一。

米百粒煎服

黃連地黃湯治三消黃連生地黃天花粉五味子當歸人參乾葛白茯苓麥門冬甘草各一

錢右剉作一貼薑二棗一竹葉十片同煎服

生地黃飲子治消渴人參生乾地黃熟地黃黃芪天冬麥門冬枳殼石斛枇杷葉鱸翅

之澤瀉各一錢甘草五分。右剉作一。貼一。水煎服。此方乃二黃元合甘露飲材也。生精補血潤燥止。

渴佐以澤瀉枳殼疎導二府使心火下行則小便清利。肺經潤澤則大府流暢宿熱既消其渴自止。

造化精深妙
無踰此

門冬飲子

治老虛人消渴麥門冬二錢五味子人參地骨皮白茯苓甘草各一錢右剉作一貼

薑三煎服

玉泉散

治消渴之聖藥天花粉二錢粉葛麥門冬生地黃五味子甘草各一錢右剉作一貼糯米

一合煎服

玄菟丹

治三消渴利神藥禁遺精止白濁延年免絲子十兩酒浸製五味子七兩白茯苓蓮子肉

山藥各三兩右為末別研山藥末三兩將菟絲子所浸酒煮糊和丸梧子大空心米飲下五七十丸

○煉蜜和丸亦佳

三消丸

治消渴黃連爭為細末不以多少冬瓜搗取自然汁和作餅陰乾再為末再浸再乾至

七次即用冬瓜汁和丸梧子大煎大麥仁湯送下五七十丸



玉泉丸

治消渴口乾天花粉乾葛各一兩半麥門冬人參白茯苓黃芪半生半蜜炒烏梅甘草各

一兩右為末蜜丸彈子大每一丸溫水嚥下

五汁玉泉丸

治消渴黃連乾葛天花粉知母麥門冬五味子人參生地黃烏梅肉蓮肉當歸

甘草各一兩右為末另取人乳汁牛乳汁甘蕉汁藥末和煎成膏後將各藥末和煎成膏後將各藥末和煎成膏

茶匙米飲調下日二三忌辛熱之物

生地黃膏

治渴通用生錢右地黃二斤蜜一兩白茯苓一兩

半次入參苓末拌和磁器盛以匙挑服溫水送下

荔枝膏

止消渴生津液乳糖二兩十六兩清蜜十四兩烏梅肉八兩生薑五兩取汁麝香五分右先

取清蜜烏梅肉以水一斗五升熬至半瀝去滓下

一大匙新水調下日二三服

衛生天花元

歌曰消渴消中消腎病三焦五藏生虛

小便晝夜不流通骨冷皮焦心肺裂本因飲酒炙

燂多酒餘色慾勞無節飲水喫食日加增肌肉精

髓轉枯竭漩甜如蜜滑如油口苦咽乾舌如血三

消病狀最為危有此仙方真妙訣○黃連童便浸

三日三兩白扁豆炒二兩蘆薈七錢半辰砂白炭

各二錢十片左右為末生瓜萋根汁和生蜜

為丸梧子大麥門冬湯下三五十九丸

酒渴

治嗜酒積熱津液枯燥煩渴引飲專嗜冷物宜龍

鳳元烏梅木瓜湯五豆湯酒蒸黃連丸

龍鳳元

治酒渴山藥菟絲子各二兩鹿茸火燎酒浸

炙一兩左右為末蜜丸梧子大麥門冬湯下三五

烏梅木瓜湯

治酒熱消渴烏梅打碎不去仁木瓜各

一貼入薑五片水煎服

五豆湯

解酒毒止消渴乾葛甘草並剉各一斤貫衆

以水五斗五升臘八日柶大明大鍋熬至熟濾去滓盛磁器封口春夏月開用隨意飲之大人渴後

生瘡最妙酒後渴尤好

朱砂黃連元

治酣飲成消渴黃連三兩生乾地黃二兩朱砂一兩右為末蜜丸梧子大燈心

棗湯吞下三五丸

蟲渴

虫在藏府耗其津液而成消渴宜苦練湯蠲

苦練湯

治虫渴苦練根皮一握切焙入麝香少許水二盞煎至一盞空心飲之雖困頓不妨自後

下虫三四條其渴頓止乃知消渴一證有虫耗其津液也

強中證

多因耽嗜色慾或服丹石真氣既脫熱邪獨盛飲食如湯消雪肌膚日削小便如膏油陽強與

盛不交精泄三消之中最為難治姑錄一二
方聊為備用宜石子薺芫湯黃連猪肚丸

石子薺芫湯

治強中證薺芫石石膏各一錢半人參茯苓
神瓜萋根磁石知母乾葛黃芩甘草各

一錢右剉作一貼先以水三盞猪腰子一箇黑豆
一合煮至一盞半去滓入藥煎至七分去滓食後

服次投
下藥

黃連猪肚丸

治同上服上藥後便服此雄猪肚一箇
黃連小麥炒各五兩天花粉茯苓神各四

兩麥門冬三兩右為末入猪肚中封口安醅中蒸
爛搗爛作丸梧子大米飲下七十九丸入煉蜜少

可許亦
可

消渴傳變證

消渴之疾末傳能食者必發腦疽背瘡不
能食者必傳中滿鼓脹皆為不治之證張

緊古老人分而治之能食而渴者白虎加人參湯
緊主之或加減白虎湯不飲食而渴者錢氏白
朮散妨覲倍加葛根與之或曰末傳癰疽者何也此
平不復傳下消矣

火邪勝也其瘡痛甚而不潰或赤水者是也末傳中滿者何也如上消中消制之太急寒藥傷胃久

而中滿之疾所謂上熱未除中寒復生也瘰癧消渴久病變成發癰疽或成水病或雙目失明

○甚而水氣浸漬溢於肌膚則脹為腫滿猛火自炎留於分肉則發為癰疽此又病之深而證之變

者也能制水液故隨飲即小便也以其內熱故小便利

小便利則津液竭熱氣留滯故成癰疽也

加減白虎湯石膏二錢半知母一錢人參黃栢各七

作一粒水煎入梗米

加減白朮散乾葛二錢人參白朮白茯苓各一錢木

右剉作一貼水煎服

消渴須預防癰疽消渴之人常須慮患大癰必於骨節

間忽發癰疽而卒須預防之宜加減

八味元黃芪六一湯
服為妙又益元散
一湯觀觀忍冬元長

加減八味元

渴亦免生癰疽
此方有五味子最為得力不惟止

壯得

忍冬元

花葉皆可預防發癰疽
忍冬草不以多宿取出晒

乾入甘草少許搗為末以所浸酒為糊和九梧子
大酒飲任下百丸此不特治癰疽亦能止渴

不治證

無內經曰肺消者飲一
津液而津液不治蓋肺藏氣肺

筋骨血脈餘者為洩肺病則津液無氣管攝而精
微者亦隨洩下故飲一洩二而如膏油也津液下

脫未能榮養故漸形瘦焦乾也或問經云飲一未
二死不治仲景復用八味丸治之何也曰飲一未

至洩二者病尚淺猶可治故仲景腎氣丸治飲水
一斗小便亦一斗之證若小便過於所飲則無及

矣。○消渴之餘傳為脹滿發
為癰疽及強中證皆不治

禁忌法

內經曰熱中消中不可服膏粱芳草石藥。消渴病宜慎者有三一飲酒二房勞三鹹食及麪

能慎此三者雖不服藥亦可自愈針。凡消渴大忌飲酒房事及食炙煨辛熱鹹藏之物。凡百日以

上不可鍼灸鍼灸則瘡中出膿水不止而死。○渴疾大忌半夏南星燥劑礮

單方

凡四種

石膏

主消渴搗末取汁飲。五錢和粳米煮取汁飲。韃

竹葉

止消渴取汁飲。韃葉煮汁飲。韃

滑石

治消渴為末取三錢井水或蜜水調下。即益元散也。一名神白散。韃

地漿

治熱渴心悶取一盞飲之。妙。韃

竹瀝

治消渴不拘時飲之。妙。雷公云久渴心煩宜投竹瀝。韃

麥門冬

治消渴及口乾燥渴去心煮湯飲之。韃

黃栢

主消渴水煎服之

黃連

治消渴要藥酒浸蒸晒乾為末蜜丸白湯下五七十丸

黃芪

治消渴宜多取黃芪煮湯服之妙

葛根

主消渴取五錢水煎飲之

瓜蒌根

即天花粉也治消渴之甚佳藥也

漬苧汁

主消渴取汁飲之

地骨皮

治消渴水煎服之

蚊蛤

即五倍子也最能回津止渴為末沸湯調下二錢最妙

忍冬草

治消渴水煎取汁四時長服

桑枝茶

療口乾如茶常服為佳



桑根白皮

主熱渴水煎飲之。黑椹搗濾去滓入石器中入蜜熬膏每取二三匙沸湯點服止

渴生精神

牡蠣肉

治酒渴和薑醋生食之俗名石花

蚌蛤

止消渴煮食或和薑醋生食並佳

鮎魚涎

主三消取涎搜黃連末作丸烏梅湯下五十丸渴頓減

田螺

治消渴小便數取螺五升水一斗浸經宿取水飲之每日易水又取螺煮汁飲食肉良

生藕

取汁一盞入蜜一合分三服止渴最好

红柿

止渴取之乾

烏梅

療口乾止消渴作湯和少蜜常

梨

止消渴取消梨常常啖之最治心熱渴

獼猴桃之止消渴取霜後熟者常啖

五味子又止消渴最良作飲常啖之

麻仁三升消渴取汁溫一升擣碎之

粟米泔飲之止消渴甚良常取

萊豆研取汁服並佳飲之或

青粱米主熱中消渴煮取汁飲之

糯米主消渴淘取泔飲之又水研取白汁恣飲之以

治死有人教以糯稻稭灰淋汁飲之甚妙一人病渴

中燒作灰每取一合湯水一掬沃浸良久澄去滓

冬瓜主三消渴擣絞取汁飲之



葶

主消渴作羹作

菰菜

或取汁飲亦可

雄雞湯

治三消渴疾退雄雞湯澄清飲

白鵝

主消渴者取

黃雌雞

主消渴煮熟取汁

牛乳

又作酪粥常食亦佳

猪肚

止渴利瀾蒸和

黃疸

黃疸之因

經曰濕熱相交民病瘴瘴即黃單陽而無陰

便自利蓋熱結下焦則熱耗血而不耗津液故小便不利

○發黃譬如禽麴五疸同歸濕熱蓋濕熱熏蒸血
熱土色上行面目延及爪甲身體俱黃黃即疸也
○蓋黃疸者濕熱與宿穀故也俗謂之食勞黃
○食勞疸黃一名黃胖夫黃疸者暴病也故仲
景以十八日為期食勞黃者宿病也至有久不愈
者○九病當汗而不汗則生黃當利小便而不
利亦生黃蓋脾主肌肉四肢寒濕與內熱相合故
也○五疸同是濕熱終無寒熱之異○脈沉
渴欲飲水小便不利者必發黃○九時行感冒及伏暑未
黃躁不得睡屬黃家○九時行感冒及伏暑未
解宿食未消皆能發黃○九時行疫癘亦能發黃
殺人最急○傷寒病遇太陽太陰司天若下之
太過往往變成陰黃寒水太
過土氣不及故多變此疾

黃疸有五

身痛而色微黃齒垢黃爪甲上黃皆黃疸也
○尿黃赤安卧者曰黃疸註曰安卧而尿

黃赤也○疸病有五一日黃疸二日酒疸三日穀疸
疸○疸病有五一日黃疸二日酒疸三日穀疸

四曰女勞疸
五曰黃汗



黃疸

者小便便面目光牙齒肢體如金因暴熱用冷水洗浴熱留胃中故食已善飢安卧懶動門已食如飢

酒疸

病酒發疸必小便便不利其候心中熱足下熱是其證也。酒疸心中懊懷而熱不能食時欲吐名曰酒疸。進食常少心中懊懷鼻燥足熱是謂酒疸。常

穀疸

穀疸之為病寒熱不食食已頭眩腹脹因胃熱大飢過食停滯所致。食則腹滿。怫鬱眩暈心忪是謂穀疸。瘕瘕

女勞疸

額上黑微汗出手足心熱薄暮則發膀胱急小便致發熱惡寒小腹滿急。是謂色疸亦曰女勞疸。瘕瘕

黃汗

黃汗之病身腫發熱汗出時入水浴得之。身腫而汗汗如黃。身汗曰黃汗。瘕瘕

脉法

五疸實熱脉緩大者順弦急而微澁證屬虛弱

黃疸治法

○諸疸小便黃赤色者為濕熱當作濕熱治之

虛寒證當作虛勞治之利小便○諸疸小便不利為裏

實宜利小便或下之利小便宜茵陳五苓散下之

宜黃連散○無汗為表實宜發汗或吐之發汗宜

麻黃醇酒湯吐之宜瓜蒂散○色如烟熏黃乃

濕病也一身盡痛色如橘子黃乃黃病也一身不

痛濕家之黃色暗不明熱家之黃如橘子色甚者

勃勃則出染着衣如黃柏汁○治黃疸與濕病相

似輕則滲利重則大下黃自退矣○黃疸因食

積者下其食積其餘但利小便

黃連散

治黃疸壅熱二便秘澁大黃醋炒一兩黃芩

黃連甘草各一兩右為細末溫水調下二錢

麻黃醇酒湯

治黃疸麻黃一兩好酒一升半煮至

黃疸宜茵陳湯加減胃苓湯茵陳三物湯陶

茵陳五苓散治濕熱黃疸茵陳一兩五苓散五錢右為末每二錢米飲調下○或剉一兩水

煎服亦可入

茵陳三物湯治黃疸小便不利茵陳三錢梔子黃連各二錢右剉作一貼水煎服之

陶氏茵陳湯治黃疸熱盛大便不利茵陳二錢大黃一錢梔子仁厚朴枳實黃芩甘草各一錢右

剉作一貼薑二片燈心一握水煎服小便不利合五苓散服

加減胃苓湯治黃疸飲食無味行步倦怠脈濡而濡胃苓湯妨觀去桂加藿香半夏大腹皮

山楂子羅菡子三稜蓬朮青皮各五分右剉作一貼入薑三棗二水煎服

茵陳散治濕熱黃疸茵陳厚朴滑石各一錢右剉作一貼

燈心一握同煎服

酒疸宜半溫半熱湯治酒後犯房成疸宜辰砂妙香散枳元翳酒枳殼大戟甘草各七分黃芩當歸茵陳

半溫半熱湯治酒疸半夏赤茯苓白朮各一錢前胡

各五分右剉作一貼
薑三片水煎服

梔子大黃湯治酒疸一合右剉作一貼水煎服

葛朮湯治酒疸一錢豆豉根蒼朮各二錢枳實梔子甘草

當歸白朮湯治酒疸有飲癖心胃堅滿不進飲食

前胡葛根甘草各一錢半夏七分半當歸黃

穀疸宜茵陳梔子湯治酒疸中九大溫中九鉞砂丸

茵陳梔子湯治酒疸一錢右剉作一貼水煎服

茵陳湯治酒疸一錢右剉作一貼水煎服

牛黃散子

治穀疸酒疸及水氣蠱脹黑丑取頭末春

分夏九分秋七分冬四分○甘草春八分夏九分秋七分冬

四分○右細末每服三錢五更時面東南井華水調服疾隨下即愈忌生冷蠶

穀疸丸

治冒暑痰熱食穀不消熱鬱發黃苦參三兩

末牛膽汁猪膽一兩和九梧子大以麥粥飲下五七十九日二門○一名苦參元

小溫中丸

治食積疸白朮三兩山植肉青皮蒼朮神

右為末醋糊和丸梧子大空心鹽湯下七八十丸脾虛者須以參朮陳甘作湯使

大溫中丸

治黃疸黃胖黃腫香附子一兩半鉞砂一

參白朮各五錢生甘草二錢鉞砂製法服法同○可借此為制肝燥脾之用○鉞砂代以青礬亦妙

鉞砂丸

治穀疸酒疸濕熱發黃等證鉞砂炒紅醋淬

八兩香附子童便製蒼朮各四兩神麴炒茵

豫薑汁炒麥芽炒各二兩芍藥當歸生地黃川芎
青皮各一兩半三稜蓬朮並醋煮陳皮各一兩

子炒薑黃升麻乾漆炒各五錢右為末
醋糊和丸梧子大薑湯下六七十九

紫金丹 治食勞氣勞遍身黃腫欲變成水膽礬三兩
黃蠟二兩大棗慢火熬半日取出棗去皮核次

醋三升先下礬棗慢火熬半日取出棗去皮核次
下蠟熬一二時如膏入臘茶末二兩和丸梧子大

每服二三十九茶酒任下礬以瀉肝素以補肝極
妙轉○無膽礬用綠礬○一入患酒疸下血面如

蠟服此即愈轉

女勞疸 宜礬硝散石膏散
秦芃飲子腎疸湯

礬硝散 治女勞疸白礬硝石各一錢右為末以大麥
粥飲調下門○一方去硝石代滑石治濕疸

門入

石膏散 治女勞疸身黃額黑日晡發熱小腹急足下
熱石膏煨滑石各等分右為末每二錢大麥

下粥飲調

秦艽飲子

治女勞疸秦艽當歸芍藥白朮桂皮赤茯苓陳皮熟地黃川芎小草各一錢半夏甘草

草各五分右剉作一貼薑五片水煎服

腎疸湯

治腎疸目黃尿赤蒼朮一錢升麻羌活防風藁本獨活柴胡葛根白朮各五分猪苓四分

澤瀉神麴人參甘草各三分黃芩黃栢各二分右剉作一貼水煎服

黃汗

宜芪陳湯桂枝黃芪湯

芪陳湯

治黃汗石膏二錢黃芪赤芍藥茵陳麥門冬豆豉各一錢甘草五分右剉作一貼入薑五

片水煎服散

桂枝黃芪湯

治黃汗黃芪二錢半桂枝芍藥各一錢甘草一錢右剉作一貼好酒三合水

一盞半煎服○又名桂枝苦酒湯

酒疸最重

五疸之中惟酒疸變證最多蓋酒之為物隨人性量不同有盈石而不醉者有濡唇而輒

亂者以醞釀而成有大熱毒滲入百脉不止發黃而已溢于皮膚為黑為腫流於清氣道中則眼黃

鼻艱種種不同也

黑疸難治

脾與腎俱病為黑疸色疸又名女勞疸身黃額黑黃家曰晡時當發熱而反惡寒此

為女勞得之膀胱急小腹痛滿一身盡黃額上黑足下熱因作黑疸腹脹如水狀大便黑或時澹此女勞之病非水也腹滿者難治○酒疸因下之久變為黑疸目青面黑心中如啖蒜薑狀大便正

黑小便亦或果難治

陰黃

治陰黃身面俱黃肢體沉重背寒身冷心下痞硬自汗小便便利脉緊細空虛此寒涼過度變陽為陰

也或遇太陽太陰司天之歲寒濕太過亦變此疾宜茵陳湯加六方及茵陳附子乾薑湯○此理中湯寒門加茵陳茯苓亦效

茵陳茯苓湯治陰黃小便不利煩燥而渴茵陳三錢

一錢煎服

茵陳橘皮湯治陰黃煩燥喘嘔不渴茵陳一錢湯加

茵陳附子湯治陰黃遍身冷茵陳一錢湯加

茵陳四逆湯治陰黃肢體逆冷自汗茵陳一錢湯加

茵陳薑附湯治陰黃冷汗不止茵陳一錢湯加

茵陳吳茱萸湯治陰黃曾服薑附諸藥未愈脉尚遲

薑炮木通當歸各一錢也太遲發黃脉沉細遲無力次第用藥至茵陳附子

湯大效冷次第用藥至茵陳四逆湯大效

茵陳附子乾薑湯治陰黃附子炮乾薑炮各二錢茵

夏澤瀉各五分白朮四分白茯苓橘紅
各三分右剉作一貼薑五片水煎服

疫癘發黃

天行疫癘亦能發黃謂之瘟黃殺人最急宜
瘴疸九茵陳瀉黃湯濟生茵陳湯苦參散

瘴疸九

治天行病急黃及瘴癘發黃茵陳湯苦參散
芒硝各一兩杏仁六錢常山鱉甲巴豆霜各

四錢豆豉二錢右為末蒸餅和丸梧子大每三九
或五九溫水吞下以吐利為效

元同即今
茵陳九也

茵陳瀉黃湯

治時氣發熱變為黃疸所謂瘟黃葛根
一錢半茵陳黃連薑汁炒梔子炒白朮

赤茯苓白芍藥厚朴木通人參各一錢木
香七分右剉作一貼入薑三片水煎服

濟生茵陳湯

治時行熱鬱通身發黃茵陳四錢大黃
二錢梔子一錢右剉作一貼水煎服

苦參散

治人無故忽然振寒皮膚麤瑩出小便赤澀
大便秘諸藥不除因為久黃葶藶子炒五錢

苦參黃連瓜蒂黃柏大黃各二錢半右為
末每錢米飲調服當吐下消息服之

搐鼻退黃法

凡黃疸由濕熱毒氣浸入清氣道中宜然藥鼻中滴出黃水即愈宜搐鼻瓜蒂散如

神散

搐鼻瓜蒂散

治黃疸渾身如金色瓜蒂二錢丁香一錢黍米四十粒赤小豆半錢右為末

臨卧時先含水一口却於兩鼻孔搐半字便睡至明取下黃水便服黃連散或茵陳五苓散慎不可

吹入

如神散

治酒毒發黃苦瓠子苦葫蘆子各三七箇黃黍米三百粒安息香二皂子大右為末取一

字搐入鼻中滴盡黃水若過多則以黍穰燒灰麝香末各少許搐入鼻中立止

黃疸通治藥

黃疸之疾脾受濕熱鬱而不行亦多有腹脹之候治法大要疎導濕熱於大小便之

中宜胃苓湯枳實加茵陳及茯苓滲濕湯又退黃散一清飲石膏茵陳散茵陳大黃湯必效散退黃

丸綠礬丸退金丸棗子綠礬丸並可諸

茯苓滲濕湯

治濕熱黃疸茵陳二錢赤茯苓澤瀉猪苓各一錢黃連黃芩梔子防己白朮蒼

朮陳皮青皮枳實各五分右剉作一貼水煎服○一名茯苓除濕湯

退黃散

治黃疸身面如金小便如黃柏汁柴胡升麻草龍膽茵陳黃連黃芩梔子黃柏木通滑石

各一錢甘草五分右剉作一貼入燈心一握水煎服

一清飲

治黃疸柴胡三錢赤茯苓二錢川芎桑白皮各一錢甘草五分右剉作一貼入薑三棗二

水煎服

石膏茵陳散

治黃疸一身皆黃食已即飢石膏二錢梔子仁茵陳木通大黃各一錢甘草五

分瓜蒌實一箇右剉作一貼入薑五葱白二莖水煎服

茵陳大黃湯

治傷寒大熱發黃疸茵陳梔子柴胡黃芩升麻大黃各一錢草龍膽五分

右剉作一貼水煎服

必效散

黃疸通用葶藶子炒草龍膽梔子黃芩各一錢茵陳二錢右剉作一貼水煎服

退黃丸

治黃疸水腫腹脹唐泄等證青礬二兩銅內熔化入陳黃米四升用醋拌勻慢火炒令烟

盡入平胃散六兩同炒少頃去火毒為末醋糊丸梧子大每七十丸空心臨卧米飲下忌糯米泔麪

生冷硬物○此方即周益公陰陽丸也蓋青礬乃銅之精液用醋製以平肝愈於鍼砂如服鍼砂必

忌鹽而後復發青礬則不忌鹽不復發

綠礬丸

治黃腫病最捷五倍子炒黑神麴炒黃各八兩鍼砂炒紅醋淬綠礬薑汁炒白各四兩右

為末薑汁煮棗肉和丸梧子大溫酒下六七十九不飲酒米飲下終身忌食蕎麥麪犯之再發難治

証

褪金丸

治黃腫絕妙鍼砂煅紅醋淬香附子便浸各六兩蒼朮白朮各二兩半陳皮神麴麥芽各

一兩半厚朴甘草各一兩右為末麪糊和丸梧子大米飲下五七十九忌魚腥濕麪生冷等物○有

塊加三棱蓬朮並醋煮各一兩半

棗子綠礬丸

治黃疸胖病鐵砂燬紅醋淬綠礬炒蒼朮厚朴陳皮神麴各一兩甘草五錢右

為末蒸棗肉和丸梧子大米飲下五七十九切忌蕎麥羊肉母猪肉食之急死無醫

疸癖愛喫土炭生米茶葉

治宜用四寶丹及

四寶丹

治黃病喫生米茶葉黃土黑炭等物○食生米者麥芽一斤使君子肉二兩檳榔南星

製各一兩○食茶葉者茶葉一斤使君子肉二兩檳榔南星薑製各一兩○食黃土者壁土一斤使

君子肉二兩檳榔南星薑製各一兩○食黑炭者黑炭一斤使君子肉二兩檳榔南星薑製各一兩

○右為末蜜丸梧子大早晨砂糖水下五十丸

一方

治黃疸愛喫茶葉蒼朮白朮各三兩石膏白芍藥黃芩南星陳皮各一兩薄荷七錢右為末砂

糖水煮神麴作糊和丸梧子大糖水空心吞下五七十九

一方

治黃疸喜喫生米白朮一錢半蒼朮一錢三分

一作

錢厚朴七分藿香五分甘草三分右剉

一方

通用使君子肉二兩南星薑製檳榔各一兩

一斤炒過

○喫土用壁土一斤炒過○喫茶葉用茶葉一

五十九

可治不治證

黃疸之病當以十八日為期治之十日已

治疸而渴者難治發於陰部其人必嘔發於陽部

其人振寒而發熱腫○凡黃家候其寸口脉近掌

無脉口鼻冷果色並不可治○形體如烟熏直

視搖頭為心絕環口黑柔汗發黃為脾絕皆不

治○黃疸以十八日為期十日以外入腹喘滿

煩渴面黑者死○脾胃稍實更斷厚味則可治

傷酒色恣口腹者難治○疸

病面黑黃作渴腹脹難治○

單方酒煮茵陳湯

臘雪水治黃疸微

車前草取汁服之

茵陳蒿主黃疸通身發黃小便赤以水濃煎服名酒煮

茵陳湯

葛根取一兩水煎服

瓜蒌根主八疸身面黃

酸漿草主黃疸根味絕苦

萱草根主酒疸擣取汁飲

王瓜根治酒疸變成黑疸醫不能治取根擣取汁空

那部

青蒿

治熱黃心痛搗取汁飲之

篇蓄

治熱黃搗取汁頓服一小升

黃蘗

主黃疸水煎服之

梔子

主胃熱食疸水煎飲之

小麥苗

治酒疸搗取汁服或煮食之

大麥苗

亦主黃疸取汁服

鮒魚

主黃疸作膾和五味食之又取活者置水中常常看之日一易最效

鯉魚

治黃疸如鮒魚法用之

鰾

治酒疸烹熟如常法作羹食數箇愈

桃根

治黃疸身面如金色取東引桃根一握細切水

薄雲散惟眼最後差可時時飲一

蔓菁子

主急黃疸及內黃腹結不通取子搗細和

乾出差

甜瓜蒂

治黃疸初發及時氣急黃瓜蒂為末搗兩鼻

乾差

絲瓜

治積傷酒麪發黃完絲瓜連皮子燒灰為末因

種

水芹

治五種黃病取汁飲之作羹菹

生葱

治傷寒發黃目不識人生葱火煨熟去麤皮取



酒口禽令病人開目
噴之其眼自明

苦瓠

去黃疸煎取汁滴
鼻中出黃水差

絲蓴

治熱疸作羹作
羹常食佳

冬葵

治時行黃病煮汁飲
又作羹作羹常食

白烏雞

傷寒發黃胃心昏悶不省死在須臾白烏雞
一隻去毛及腸屎以刀爛切鋪心頭上少

頃即
活鑿

熊膽

療天行黃疸取
少許和水服

猪糞

治同上取糞漬
水取清頓服

猪脂

治五疸及胃中有乾屎發黃煎猪脂
取三合日三服大便乾屎下乃愈

東醫寶鑑雜病篇卷之六