

東醫圖書寶鑑

奎章閣圖書
7608
1
19

奎章閣圖書	
部別	分類記號
	圖書番號 貴 1933
	一部冊數 24
	內別番號 18
서울대학교	

東醫寶鑑

卷之六

七

八

東醫寶鑑


卷之六

七

八

九

十



雜病篇八

癰疽

下

諸瘡

東醫寶鑑雜病篇卷之八


御醫忠勤貞亮扈 聖功臣宗祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

癰疽 下

腸癰腹癰

關元欲屬小腸天樞欲屬大腸丹田欲屬三焦其穴分隱痛者為疽上肉微起者為癰也

淋時時汗出發熱而復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫狀甚者腹脹大轉側有水聲或逆臍生瘡膿從瘡出或有出臍中者惟大便下膿血者自愈膿從濕熱鬱積腸內成癰脉遲緊者宜大黃牡丹湯或五香連翹湯坊見下之脉亢澁者四物湯或挑仁紅花玄胡索木香脉洪數者三仁湯小腹痛尿澁者膿帶也宜牡丹散或腹皮急按之濡身無熱乃陰冷所成宜牡丹散或內托十宣散加茯苓甚者敗醬散小腹痛痞堅按之痛身有熱乃結熱苓入附成宜大黃牡丹湯或桃仁承氣湯湯熱證雲母膏為丸牛膝湯吞下利去



醫寶鑑雜病篇卷之八

御醫忠勤貞亮扈聖功臣宗祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

癰疽下

腸癰腹癰

關元欲屬小腸天樞欲屬大腸丹田欲屬三焦其穴分隱痛者為疽上肉微起者為癰也

○時汗出發熱而復惡寒身皮甲錯腹皮急如

腫狀甚者腹脹大轉側有水聲或逆臍生瘡膿從

濕熱鬱積腸內成癰脈遲緊者宜大黃牡丹湯或

五香連翹湯方見下之脈洪數者宜四物湯或


桃仁紅花玄胡索木香脈洪數者宜三仁湯或

尿澀者膿滯也宜牡丹散或內托十宣散加熟

無熟乃陰冷所成宜牡丹散或內托十宣散加熟

苓甚者敗醬散小腹痞堅按之痛身有熱乃結熱

○成宜大黃牡丹湯或桃仁承氣湯或下利去



腹破膜即愈或蠟警元亦佳坊見○腹癰者生於肚腹皮裏膜外左關脉洪數而腹腫甚者是也治法

同腸癰

脉法

腸癰難知脉滑可推數而下下為熱腸癰何疑遲緊未

而數知當尿膿也○新○腸癰之脉滑而數滑則為實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑

上升榮衛相干血為敗濁

大黃牡丹湯

治腸癰脉遲緊膿未成可下之○大黃芒硝各一錢半牡丹皮桃仁瓜蒌仁各二

錢半右剉作一貼水煎服有冬菰仁無瓜蒌仁神效

針

三仁湯

治腸癰中疔痛縱非癰疑似間便可服薏苡仁三錢冬菰仁二錢半桃仁牡丹皮各二

錢右剉作一貼水煎服

○一名薏苡湯

牡丹散

治腸癰冷證腹軟而痛時下膿血牡丹皮人參天麻白茯苓黃芪薏苡仁桃仁白芷當歸

川芎各一錢官桂甘草各五分木香三分右剉作一貼水煎服

敗醬散

治腸癰身無熱腹濡冷薏苡仁二錢半敗醬一錢半附子炮五分右剉作一貼水煎服小

便當下膿血而愈附子敗醬散

黃黑散

治腹內癰腫大黃一兩取末四錢半破故紙一兩取末二錢牛蒡子一兩取末一錢黑牽

牛子一兩取末二錢右和勻分二貼每取一貼蜜水調空心服以利為度

腸癰治驗

一婦腹痛百方不效孫兆診曰腹痛脉當沉細今反滑數此腸癰也雲母膏作丸溫

酒吞下服一兩下膿血而安

臂癰

臂上手陽明經分生癰此得之八風之變者傷於風者上先受之宜服白芷升麻湯

白芷升麻湯

治臂癰黃芪酒黃芩各四錢生黃芩三錢白芷一錢半升麻桔梗連翹各一錢



醫癰

酒紅花甘草各五分右剉分二貼每取一貼酒水各半煎服其位僻雖曰多血氣運不到此陰中之陰也其道遠

可生癰纔有腫痛然之脉證但見虛弱便與滋補氣血可保終吉若用尋常驅熱舒氣之藥虛虛之禍如指諸掌○醫癰初起未成膿者隔蒜灸再用慈熨法欲作膿者內托羌活湯痛甚者仙方活命飲
十全湯
坊見
尼醫
生癰
堅硬
腫痛
宜內托羌活湯

懸癰

穀道前後生癰謂之懸癰此病生穀道外腎之間初發如松子大甚痒漸如蓮子數十日後始覺赤

腫如桃子即破苦破而大小便皆從中出者為難治宜服國老膏○此疾首尾常服國老膏雖患亦輕雖潰亦淺誤用寒涼則不可救
○初起作痛尿澀者仙方活命飲
坊見
去大黃服之
膿已成者急鍼之
久生成漏者
加水
中苳葉細搗綿裹納下部日

三即愈

國老膏

治懸癰橫紋大甘草帶節一兩四寸切以山

午乾則投前水再灸直待水盡看甘草中心潤透
為度細剉好酒二升煎取一升空心隨量飲之三
日一服二三服可保無虞此藥雖不即消過二十
日後必盡消有人患此癰已破服兩貼瘡即合甚

妙

便癰

俗名便毒實血病也一名驕馬癰此奇經衝任

病而癰見於厥陰經之分野其經多血故又名
疔或先有疔瘡而發或卒然起核疼痛而發皆熱
鬱血聚而成初發宜疎利之即散變膿後如常用
托裏內補之藥○便毒處所上不在腹下不在
腿介乎兩者之中也○便癰生於腿跨小腹之
間或一邊腫痛或左右兩邊俱發先用五苓散
門寒加大黃或雙解散復元通氣散○偏癰宜蘇
方活命飲以見仍戒房室行動○○偏癰宜蘇
散牡蠣大黃湯千金內消散黃黑散土香連翹湯



三坊消毒飲玉燭散神奇散○便毒初起射十寸生薑

箇研細熱酒調下舂○便毒初起射十寸生薑

如指大搗細順流水煎服以瀉為度因用阿膠醋

煮塗患處○生山藥砂糖同搗塗上即消又生

薑一塊蘸米醋磨取千步峯泥付腫處即

消千步峯即入家行步地上高塊是也

蘇方散治便癰木鱉子當歸尾赤芍藥白芷川芎射

分右剉作一貼酒

水各半煎服

牡蠣大黃湯治同上大黃牡蠣煨各二錢半甘草一

錢黃瓜蔓一箇右剉作一貼水煎服

消毒飲治偏毒三四日可消皂角刺金銀花防風當

歸大黃瓜蔓仁甘草各一錢三分右剉作一

貼水酒各半煎服仍頻

提掣預中驗立效

玉燭散治偏毒腫痛大黃芒硝各二錢川芎當歸赤

服空

神奇散

治便毒魚口瘡
錢黃連黃芩黃柏金銀花連翹各一錢半穿

山甲三片土炒木鱉子三箇去殼黃蠟
三兩右剉分作二貼酒水各半煎服

雙解散

治偏毒大黃黑丑炒頭末各一錢半官桂白
芍藥澤瀉槐仁各一錢甘草七分右剉作一

貼薑五片水煎服空心先小便快是熱
從小便出也後大便利皆是稠毒

囊癰

老濕熱下注也
道因陰道或虧水道不利而然膿氣順下將流入滲

也或有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開
懸掛水出以熨炭末付之外以紫蘇葉包裏仰臥

養之○癰疽入囊者曾治數入悉以濕熱入肝經
處治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫畢九懸掛者

皆不死○取紫蘇葉焙乾為末付之如燥香
油潤之皮脫者青荷葉包之其皮自生

附骨疽

附骨疽與白虎飛尸歷節皆相類但歷節痛則
走注不定白虎飛尸痛淺按之則便止附骨疽

痛深按之亦無益○白虎飛尸亦能作膿着骨而
生及其腐潰碎骨出盡方愈然則同是一病但淺

深不同耳。附骨疽，筋骨之內痛如錐刺，外則全無赤腫，突起初因露卧，風冷或無涼浴，水寒濕襲，深初起痛不能轉，寒熱無汗，經久寒鬱為熱，變而為膿，膿成即用火鍼使毒不得內潰。○初起宜漏蘆飲子五香連翹湯，坊見。下之，次用內消升麻湯，在尻臀宜內托羌活湯，坊見。在腿內羌活防己湯，在腿外托裏黃芪湯，黃連消毒飲，坊見。潰後久不愈，宜蟾蜍膏，赤朮元平肌散，門○初起大痛而肉色不變，名附骨癰，三生散最妙，無用青膏。甘草節二味煎服。○附骨疽與緩疽，石疽，賊風而相類，宜辨而治之。門入

緩疽石疽賊風辨

緩疽，石疽，皆寒氣伏於骨髓之間，其熱緩慢，積日久，乃紫黑皮

肉俱爛，故名曰緩疽。○腫與皮肉相似，疼而堅硬如石，故謂之石疽。生商陸根，搗爛和鹽少許塗付。日一換，即軟。○賊風，由風邪搏於骨髓，故其痛亦徹骨，遇寒則甚。外證惡寒，有汗，痛處常欲熱熨，失治則變為拳曲偏枯。○緩疽，石疽，宜服補虛托裏溫熱之劑。賊風宜服越婢湯，疎通之劑。門入

始發預防法

環跳穴痛不已防生附骨疽急用青草

貼又不效恐疽將成急掘地坑以火燒紅沃以小

便令患人赤體坐其上以被圍抱下體使熱氣熏

漏蘆飲子

治附骨疽初起宜服他惡瘡初起亦可服

大黃一錢半漏蘆白斂黃芩麻黃枳實升

內消升麻湯

治附骨疽疎下後服此大黃升麻當歸

黃芩赤芍藥枳實各一錢半甘草一錢

羌活防己湯

治附骨疽發於太陽厥陰太陰分者羌

活川芎蒼朮各一錢二分防己木香連

托裏黃芪湯

治附骨疽發於足少陽陽明分者當

分連翹鼠粘子肉桂黃芪各一錢黃柏升麻
甘草各五分右剉作一貼酒各半煎服

蟾蜍膏

治附骨疽久不差膿汁敗壞或骨從瘡口出
大蝦蟆一枚亂髮雞子大猪脂四兩右以猪

脂煎二物令稠去滓疑如膏貼之先以桑白
皮烏豆煎湯淋洗瘡口拭乾然後却貼之

赤朮元

治附骨疽久不差赤朮一斤泔浸去油用川
椒葱白同煮黑色焙乾面香破故紙川練子

炒赤茯苓白芷挑仁各一兩右為
末蜜丸梧子大溫水下百丸

平肌散

治附骨疽成漏久不合老狗頭骨煨露蜂房
亂髮灰各二錢半新桑白皮末一錢二分半

右為末入輕粉麝香各少許
濕則乾糝乾則油調付之

三生散

治附骨疽及瘡口久不合神驗露蜂房蛇退
亂髮各等分燒存性為末每取三錢溫酒調

下空
心保

青草蒼栢湯

治附骨疽始作宜預防青皮一錢半甘
草節五分蒼朮黃栢各三錢右剉作一

貼水煎和薑汁三匙空心飲之冬加桂枝夏加條芩體虛加牛膝門

流注骨疽

有流者行也注者住也或結塊或慢腫皆因素

而發多生四肢或感風寒邪氣流行至其痰注之處

熨法防見實者十味流氣飲坊見無服竹瀝達

痰丸癰自潰通用榮衛返魂湯合二陳湯癰令其

自消自潰若潰後久不斂宜以托裏為主更佐以

豆豉餅琥珀膏癰規膿成以火鍼破之門○流注

起於傷寒傷寒表未盡遺毒於四肢經絡溢於所

滯而後為流注也蓋流注者傷寒之餘毒骨疽者

流注之敗證也翻○痰飲流注於胃背頭項腋脇

腰腿手足聚結腫硬或痛或不痛按之無脈或有薄

或有微紅亦淡薄不熱堅如石破之無脈或有薄

血或出清水或如紫汁又有壞肉如敗絮或又如

瘰癧在皮肉之間如雞卵可移動軟活不硬破之

亦無膿血鍼口努肉突出惟覺咽喉痰塞作寒作

熱榮衛返魂湯主之翻○骨疽者由瘡潰後氣血

不榮骨自脫出膿水腐潰碎骨出盡方愈蓋人身

有止骨附骨傳合形成形附骨出則愈後如常正骨

腐出則為終身廢疾隨腫硬之處潰後久不愈則必出疔骨外用附子餅灸或葱熨法祛散寒邪補接榮氣則骨自脫瘡自斂矣

榮衛返魂湯

主一切痰飲為患專治痰腫又治癰疽發背流注腫毒赤芍藥木通白芷何首

烏枳殼茵香烏藥當歸甘草各一錢右剉作一貼酒水各半煎服

散又名何首烏散此方宜與十宣散相間用之並加忍冬藤

此藥大能順氣血自然榮衛通順不生癰疽合內疽

半夏腫毒堅硬不穿加川芎麻黃葱白全蠍穿山甲流注加獨活流注者氣血凝滯加獨活則可以

動一身血脉既動豈復有流注乎此藥治流注癰疽發背至於救壞病活死肌

萌之前拔根於既愈之後大能順氣勻血蓋氣陽也血陰也只調陽不和陰則氣耗而凝肌必不活

如五香連翹之類是也此藥無之氣弱病必再作如內補十宣之類是也此藥無之

真神仙妙劑也

疔疽

發於足上下名曰四淫其狀大癰不急治之百日死○發於足傍名曰厲疽其狀不大初從小指發

急治之去其黑者不消輒益不治百日死○發於足指名曰脫疽其狀赤黑者死不治不赤黑者不

死治之不衰急斬之否則死○蓋故謂之疔近世大丁○疔瘡初發突起如釘○膏梁之變足生

多見因食自死牛馬禽獸之肉而發或感襲天地暴疹之氣而發或恣食辛辣厚味積毒而發其形

有十三種治法皆同初起僅一小瘡殺人於一二日之內比之癰疽尤毒又有紅絲疔魚臍疔其毒

尤甚○疔瘡發無定處在手足頭面背骨節間最急其餘處為緩○疔瘡初發必先痒後

疔疽形證

疔疽生黃疱中或紫黑色初發必先痒後痛先寒後熱四肢沉重頭痛心驚眼花若

太重則嘔逆為難治○瘡頭黑硬如釘四畔帶赤如火盤根突起隨變焦黑不幾腫大而光轉為

濕爛深孔透肌如大鍼穿之狀○外證心驚頭痛拘急惡寒四肢痛強或寒熱交作頰舌間赤黑



點點如珠○或不痛痒只麻木寒熱眼以鍼刺
牙關緊急時時驚惕甚則嘔吐喘急以鍼刺
瘡不痛無血是其候也又中陷
如針蓋撼之有根是疔也

疔疽治法

凡疔瘡毒氣攻心欲死以鍼刺瘡心若覺
痛有血下鍼子若累刺至心側皆不痛無

血者急刺百會穴痛有血者下鍼子若無血以親
人熱血代之猶活三四宜用迴瘡鍼子碧霞鍼子

迴瘡蟾酥鉸子○又法急以艾炷灸之鍼疔因
邊皆令血出以迴瘡鍼子鉸子經之上用膏藥貼之

服五香連翹湯千金漏蘆湯見坊疎下之若鍼之
不痛無血者以猛火燒鐵鍼通赤於瘡上烙之令

如焦炭取痛為效亦經前鍼子經一二日膿潰根
出服托裏湯散以取平復○治法急用飛龍奪

命丹或雄黃丸下之去其毒熱○次服化毒丸及二
活散○實者初服賽命丹坊見三九以葱酒發

表虛者服保生鉸子以解毒門○通治紫金鉸返
魂丹一捻金神效奪命丹蟾酥丸獨蟾丸五聖湯

還魂散千金
消毒散選用

紅絲疔

疔瘡或有一條如紅線直上倉卒之際急用

香等膏於正瘡內塗之鍼時以病者知痛出血為
好否則紅線入腹必致危殆○疔生兩足多有
紅絲至臍疔生兩手多有紅絲至心疔生面部多
有紅絲入喉者俱難治急鍼其絲出血以泄其毒

方可保
生門

魚臍疔

又有一種瘡頭黑深形如魚臍破之滲出黃
水四畔浮漿謂之魚臍疔其毒尤甚絲瓜葉

連鬚葱白韭葉各等分研搗如泥取汁以酒和服
其滓貼腋下如病在左手貼左腋下在右手貼右

腋下在左腳貼左膝在右腳貼右膝在身中貼心
臍并以帛縛住候肉下紅絲皆白則安矣或蛇退

燒灰雞子清調付內
服神仙解毒丸

脫疽疔

內經曰膏梁之變足生大疔蓋因膏梁酒色
蘊積惡毒或久患消渴之餘多有此瘡靈樞

經所謂發於足傍名曰厲疽發於足指名曰脫疽
其狀赤黑者死不治治不衰急斬之否則死正謂





此也謂之脫疽以其指節潰爛脫去也○輕者色赤自潰先用隔蒜灸內服仙方活命飲○重者魂散重者色黯不痛先用隔蒜灸更服賽命丹○上及補藥庶可保生○甚者赤變為黑急須在指則斬在肉則割否則黑延上足必死外治用桐油及無名異煎一沸入川椒一勻看瘡大小剪蓼葉在此內同煎浸七日後單以此葉貼瘡上即安○

一方

治疔疳危篤二服即愈輕者一服效○土蜂房一

性為細末每錢一錢空為黃水調服少頃腹中大痛痛止而其瘡已化為黃水矣因服五聖湯○

疔疽死證

疔瘡含蓄毒氣突出寸許痛痒異常一二日間害人甚速是尤在癰疽之上也○

疔毒入心則口乾煩悶恍惚似醉嘔吐不定危證也萬病解毒丹○

賽命丹○然真人奪命丹皆可服○疔毒入心腹則煩悶嘔逆恍惚癡眠其斃可立待也○瘡走黃過心者難治若太重則嘔逆嘔逆者難治姑用乳粉托裏散○

拔疔法

草葉等分爲末用竹筒兩頭去節套在疔上陷入肉內以線緊縛取藥末一匙滴水和之灸於筒內

少時藥滾起則疔自拔起未效則漸加度數其疔必拔去後以金銀白芷散調之

○ 銚子或保生銚子
蒼耳莖葉燒灰醋調塗疔
疔上散拔去疔根調治
乾則易不遇十日
則易不遇十日

留瘡口塗四圍竅疔根出○拔去○
即根出和雄黃尤妙○蟬蛻白殭蚕
為末○
雄黃尤妙○蟬蛻白殭蚕為末○

新瓦上焙爲末熟酒調二錢服仍少許塗疔

稍上根自出蠟○一云蟬
白貼疥上根○一出即愈
○斑貓一下校捻破之以其
鐵肉

刺灸上封之根即出○取黑虱十枚置疔上以荻
 縛繩作炷灸虱上即根出○白狗屎燒存性和酒

服又塗
上出根
○馬齒
根自出
○苦苣
取莖中
白汁塗
疔

食疫死牛馬禽獸肉生疔

近見患疔者皆食此疾

十患十死宜急取紫金錠半錠淡酒化下重者服

一錠外用涼水磨塗疔上日夜各數次或吐或利

神效口白頸蚯蚓八九條搗爛和酒瀝去滓飲之

其滓塗疔四圍留頭出毒氣○大蜘蛛一箇放疔

上自啞其毒連易三五箇其毒自敗以蜘蛛

蛛入水不傷蛛命又無用蟬法○觀奇

紫金錠一名萬病解毒丹治癰疽發背諸腫諸癰疔

瘡惡瘡一切腫毒鰐鯢每取半錠淡酒化下

重者一錠外以涼水調塗患處一日

返魂丹

治十三種疔瘡危惡者雄黃白礬各二錢

輕粉沒藥乳香各五分麝香一字蝸牛生不拘多

少右為末以蝸牛蟾酥研爛和丸芡實大每一丸

令病入先嚼葱白三寸許放在掌心將藥丸裹在

葱肉以熱酒一盞吞下煖處卧汗出為效○內經

曰汗之則瘡已蓋此

藥能化毒為汗也

一捻金

治疔疽即賽命丹坊見為末每服二三分溫酒調下如服賽命丹後毒未盡起再用此藥

催之服此藥後身涼者即死

神效奪命丹

治疔瘡惡瘡及破傷風昏沉危急者朱砂三錢半為衣輕粉血竭各二錢枯白

礬蟾酥各一錢銅綠一字鍋牛二十箇右末用初男乳汁和丸梧子大朱砂為衣患人自嚙生葱白

數根吐山裏藥一丸以溫酒吞下如吐逆以熱酒壓下遍身汗出毒氣自消

蟾酥丸

治疔瘡惡瘡無名腫毒朱砂雄黃各三錢麝香一字右末端午日取蟾酥和丸黍米大葱

酒下三九

五聖湯

治疔疽皂角刺一兩大黃金銀花甘草各五錢黃瓜蒌一箇右剉酒二升同煎至八分溫

服

還魂散

治疔瘡及癰疽能令內消去毒化為黑水從小便出萬無一失知母貝母白芨半夏天花

粉皂角刺乳香金銀花穿山甲各一錢右剉作一貼好酒一椀同煎至半椀去滓乘溫盡服將渣搗

爛加芙蓉葉一兩蜜水和付瘡上如乾以蜜水潤之過一宿自消鑒

千金消毒散

治疔瘡發背一切無名惡瘡腫毒初發

二錢大黃芒硝連翹黃芩赤芍藥各一錢皂角刺牡蠣天花粉各五分右剉作一貼酒水各半煎服

迴瘡錠子

治疔疽神效草烏一兩巴豆肉七箇蟾酥

之錠子先於瘡頭至痛見血用此錠子入以膏藥貼之重者於瘡四圍縫之二三日疔根自拔出

一名迴生

碧霞錠子

治疔瘡及惡瘡不覺痛銅綠一兩硃砂二錢蟾酥一錢右末飯和作錠子先鍼刺疔

心出血以錠子縫之用膏貼之

迴瘡蟾酥錠子

治疔瘡天南星款冬花巴豆肉黃丹
砒礞各一錢獨活五分斑貓七箇右

細末用新蟾酥和勻如黍米大作錠子先以鐵刺
疔頭有血出下錠子以膏藥貼之膿出自差

飛龍奪命丹

治疔瘡及惡瘡朱砂三錢砒礞一錢半
硃砂鵬砂乳香沒藥黃丹血竭各二錢

麝香一錢二分半南星半夏各一錢斑貓十二箇
去足翅巴豆十二箇去皮油右為末蟾酥計和九

紅豆大五分內取一分加八斑貓四箇然後捻成
錠子如小麥大先用鐵刺疔心下錠子用飯粘

封口用前四分內一丸
窩在舌上凉水送下

雄黃丸

治同上雄黃麝香少許右末滴水為丸
十箇麝香少許右末滴水為丸

清下二
十丸

化毒丸

治同上朱砂硃砂雄黃各一錢龍腦麝香各
五分輕粉一字蟬蛻二十枚右為末蟾酥和

丸葉豆大每用一丸放
於舌上取涎而愈

二活散

治疔瘡羌活獨活當歸烏藥赤芍藥金銀花
天花粉連翹白芷甘草節各二錢紅花蘇木

荆芥蟬蛻乾葛各一錢半檀香一錢
右為末每三錢蒼耳煎湯調下

獨蟾丸

治疔瘡及一切惡瘡蟾酥取得九如菴豆大
一蟾或作一丸多者作二丸每取一九置舌

上卧片時其苦水滿口即嚥下或鍼刺
疔頭納一丸於中紙貼護之神效

保生錠子

治疔瘡蟾酥三錢雄黃二錢為末用青桑
皮生者二兩同搗如泥六分重捻作錠子

朱砂為衣陰乾以冷葱湯磨服八分仍用冷葱湯
吞下外用鍼刺疔頭將錠子掉入該處出汗二日

爛出即愈體虛清貴人及婦
女胎前前後毒淺者最宜

神仙解毒丸

治疔瘡魚臍瘡諸般惡瘡初發白礬不
以多少熔化作丸如菴豆大朱砂為衣

每十九葱白煎湯
送下一服立消

金銀白芷散

治疔疽金銀花二錢皂角刺一錢半黃
芪當歸白芷甘草各二錢檳榔川芎防

風天花粉各五分右為末分三貼
每取一貼酒水各半煎連渣服

四聖旋疔散

治疔瘡生於四肢勢微者先用醋調此末塗疔上服托裏之藥其疔自出已

豆肉五分輕粉硃砂白蠟各
二錢半右為細末醋調用之

癰疽雜證

有癰疽煩渴有癰疽寒熱有癰疽作痛有癰疽泄瀉

癰疽煩渴

乾熱毒方盛或發大渴此乃毒氣攻心今舌
乾煩渴但用補心氣藥內補即止

山茱萸五味甘子細加減八味元虧加黃芪麥門冬
疾首尾通用人參黃芪湯黃芪六湯金銀花散五

葉黃芪湯忍冬丸忍
冬湯財防選用

癰疽逆

癰疽逆

未潰時嘔者當作毒氣上攻治之潰後當
作陰虛補之若年老人潰後嘔不能食宜

參苓白朮膏防觀補之河間謂瘡瘍嘔者濕氣侵
于胃也五倍白朮

心則多嘔逆宜乳粉托裏散生薑甘草桔湯○食不能下服藥而嘔六君子湯痰喘加木香縮砂麴○

或用獨參湯即愈

癰疽痰盛

二癰疽生痰有二一者胃寒二者鬱熱俱宜陳湯或榮衛返魂湯

○痰盛喘急六君子湯加薑棗煎服或補中益氣湯

癰疽寒熱

或連日未愈之間先嘔痰而寒熱汗出而止

○癰疽虛證寒戰明乳香研細半兩每錢熟水調下戰發於肝乳香著肝而溫之寒戰隨止

癰疽作痛

為熱毒不可不痛亦不可大痛未潰前痛者

者鍼之已潰膿出而反痛者虛也○癰疽寒熱虛實皆能為痛若熱毒之痛以寒涼之劑折其熱

若寒邪之痛以溫熱之劑熨其寒虛而痛者補之實而痛者瀉之

○穢氣所觸者宜和解之風冷所逼者宜溫散之補者當歸黃芪之類和解者乳香芍藥之類溫散

者防風桂枝之類。○黃芪湯或十全大補湯。○膿血既泄腫痛尤甚。人參○止痛當歸湯二仙散香靈散選用。

癰疽泄瀉。煎湯調下。宜乳粉托裏散以木香白茯苓。

腹痛泄瀉。咳逆昏憤。急用托裏溫中湯。或用六君子湯。癆瘵加炮附子。

清腫竹葉湯。根治癰疽煩渴。竹葉升麻黃芪蜜炙。瓜蒌。人參知母。白茯苓。甘草。炙。各七分。半。右剉作一貼。入棗二枚。水煎服。

竹葉黃芪湯。半治癰疽惡瘡發渴。竹葉生地黃。各一錢。人參半夏。石膏。甘草。各七分。半。右剉作一貼。入薑五片。水煎服。

人參黃芪湯。治癰疽潰後。少食不眠。煩熱。黃芪蜜炙。麥門冬。當歸。神麴。甘草。各五分。黃柏。四分。右剉作一貼。水煎服。

黃芪六一湯

治癰疽煩渴黃芪蜜炙六兩甘草炙一兩右剉每三錢入薑三棗二煎服此藥

大治渴疾常服可免癰疽之患○一方黃芪六兩半生用半鹽水潤蒸三次粉草一兩半主半灸

右末每二錢白湯點服

金銀花散

治同上金銀花四兩甘草炒一兩右麤末分三貼水酒相半煎服

五味子湯

治癰疽口燥舌乾此腎水竭也此藥治之五

作一貼水煎日服三五次

乳粉托裏散

治癰疽惡瘡毒氣攻心迷悶嘔吐喉舌生瘡名曰心氣絕初起宜服此藥最能

返出毒氣不致內陷菴豆粉四錢乳香一錢右為末每二錢甘草湯調服

○一方癰疽疔瘡惡瘡須服此預防毒氣攻心

○豆粉四兩乳香一兩朱砂三錢右為末每二錢甘草湯調下名曰乳香護心散

生薑甘桔湯

治癰疽毒氣上衝咽膈室塞嘔吐不已
桔梗一兩甘草生薑各五錢右剉并

水煎服

加味不換金正氣散

治癰疽寒熱往來或挾風邪或
內氣虛餒蒼朮橘紅半夏麴蘗

香茅各一分半木香五分半甘草炙一錢白茯苓川
芎各七分半

水煎服

止痛當歸湯

治癰疽穿潰疼痛人參黃芪當歸白芍
藥生地黃官桂甘草各一錢右麴末水

煎服日三

二仙散

治癰疽疼痛不可忍白芷味麴一貼五錢貝母
味麴一貼五錢

半煎服

香靈散

治癰疽腹痛辣桂二錢半木香白芍藥五錢
脂各一錢二分半右麴末每三錢入薑棗煎



服

托裏溫中湯

治癰疽陽氣下陷腹痛泄瀉逆昏憤
附子炮二錢乾薑羌活各一錢二分半

甘草灸一錢益智丁香沉香木香茴香陳皮
各五分右剉作一貼入薑五片水煎服

癰疽通治藥

千金漏蘆湯陽益胃散千金內消散仙傳化毒湯榮衛

返魂湯紫金錠賽命丹淵然真入奪命丹飛龍
奪命丹忍冬丸忍冬酒忍冬湯皆可用

千金漏蘆湯

治五發癰疽及疔瘡內疽一
切熱毒惡腫皆治之見

五香連翹湯

癰疽瘡癰瘰癧結核乳癰內疽
一切惡瘡毒腫皆治之見

仙方活命飲

一切癰疽惡瘡毒腫皆治之內外請證
並治排膿止痛消毒之聖藥也坊見

升陽益胃散

五發癰疽及內外一切
惡瘡毒腫皆治之坊見

千金內消散

五發癰疽及背癰內疽一切惡瘡
毒腫乳癰腸癰便毒皆治之坊見

仙傳化毒湯

無名腫毒發背內疽乳癰一切

榮衛返魂湯

此凡氣血逆於肉理令癰結為癰疽毒腫

切諸癰

紫金錠

治內外癰疽惡瘡疔瘡無名毒腫乳癰便毒疔瘡見

賽命丹

治內外癰疽發背疔瘡惡瘡魚口便毒一切無名毒腫惡瘡見

淵然真人奪命丹

五發癰疽發背疔瘡惡瘡無名腫毒皆治之坊見

飛龍奪命丹

治五發癰疽一切無名腫毒皆治之坊見

忍冬丸

通治一切癰疽諸瘡消渴後發疽尤宜服此忍冬草不以多少根莖花葉皆可用右入瓶

內好酒浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘草少許

九酒飲任下

忍冬酒

治一切癰疽惡瘡背癰乳癰不問發在何處初發便當服此百發百中忍冬藤生取一把

以葉入砂盆研爛入酒少許調和塗付四圍中心留一口又取五兩搥碎甘草生一兩到入砂瓶內

水二碗文武火煎至一椀入好酒一大椀煎數三沸分三服田父野老最宜服此

忍冬湯

治一切癰疽內發外發乳癰腸癰常服托裏消毒或加黃芪當歸各二兩尤妙方與上忍

冬酒方
同門

癰疽鍼法

息鍼者宜以末如劍鋒以取大膿。夫癰氣之

也。納。○癰疽成膿以馬啣鐵作鍼形如韭葉兩面皆利。可以橫直開裂以取膿血。○癰疽如椒眼

數十粒或如蜂窠。連房而膿出痛不除。宜以鉞鍼橫直裂之。則毒血挾膿出而愈。○癰疽作膿若

不鍼烙毒氣無從而解。膿瘀無從而泄。過時不鍼烙反攻其內。欲望其生。豈可得乎。○癰疽皮薄惟用鍼

以決其膿血。不可烙也。○小膿水出不快者。宜得亂行鍼烙。○癰疽皮厚口小。膿水出不快者。宜

用鍼烙精○大抵用鍼只欲引膿出如
鍼刺無膿是氣伏也不可用鍼烙預

蟻鍼法

癰癤初發漸大以濕紙一片搭瘡上其一點
先乾處即是正頂先以水洗去人皮取大

筆管一箇安於正頂上却用大水蛭一條安其中
頻以冷水灌之蛭當吮其正穴膿血皮皺肉白是
毒散無不差如毒大蛭小須用三四條方見效若
吮着正穴蛭必死用水救活累試奇效如血不止
以藕節上泥塗之○蟻鍼一法可施於輕小證
候若癰疽大毒積在藏府徒竭其血於外無益也

癰疽烙法

或問烙法何如曰膿或汪洋欲出奈何皮厚
肉深難穴者不用烙以開竅脉膿何由出○

膿本肉腐所成皆挾毒熱之氣若久留肉腠間則
毒氣浸淫好肉亦化為膿腐此所以烙法有功用乎
潰瘍也○癰疽成膿宜烙烙可用銀篦大二分長
六寸火上燒令赤急手熨烙毒上得膿為效○
近代良醫只以金銀鐵鍼其樣如鍼者以木炭熟
火猛燒通赤蘸油烙之尤妙隨鍼烙出膿者順也

如膿不出實者撚髮為絛虛者以紙為絛於絛上
蘸藥維入鍼孔引出膿毒如腫不退疼不除急服

排膿托裏湯藥以助其勢○膿色黃
白即好若赤黑色防後有鮮血出

癰疽灸法

熱九癰疽之發或因內有積熱或因外寒鬱內
熱若於生發之處灸以散其毒治之于早

可以移深為淺改重為輕諸項灸法皆好惟
馬灸法鍼覲尤為切要此消患於未形之策

癰疽已覺微漫腫硬皮不變色脉沉不痛者當外
灸之引邪氣出而方止經曰陷下者灸之如外微

覺木硬而不痛者當急灸之是邪氣深陷也淺者
不可灸硬如有膿水亦不可灸當鍼之○癰疽初

覺腫痛先以濕紙覆其上視之先乾處是頭也大
蒜切片安頭上以大艾炷灸之先乾處是頭也大

者灸之不痛不痛者灸至痛乃止大槩以百壯為
准最要早覺早灸為上如有頭則不必紙覆也

○若十數頭作一處生者即用大蒜研成膏作薄
餅鋪頭上聚艾于餅上灸之○初發小點一二

日急以蒜片貼其中心以三四艾炷灸五壯而止
○始發一二日十灸十活三四日六七日活五六日

三四活○灸法所以暢達按引鬱毒此從治之意也譬如盜入人家必開門逐之使出萬一門不開無從而出必傷主乃已○頭為諸陽之會若有發宜灸艾炷宜小壯數宜少三五壯而已腹背則多灸為妙○多灸則內服乳粉托裏散防火氣入心○有善治癰疽者皆於瘡上灸至二三多則作效必矣○艾炷小作之小則人不畏灸灸多則作效必矣○艾炷小作之小則人不畏灸灸灸法附子灸法硫磺灸法上餅灸法並治癰疽惡瘡腫毒鐵規

灸灸治驗

以一人發背醫療逾月勢益甚有張生者教

明日鐫去黑痂膿盡鑽肉理皆紅不復痛乃以膏藥貼之日一易易時剪去黑爛月餘乃平復

灸石癰法

堅硬不潰名曰石癰當上灸百壯石子當碎出

灸發頤法

此瘡最險頭面腫大牙齒亦脫解開頭後

九壯而止



灸疔疽法

大蒜爛搗成膏塗瘡四圍留瘡頂以艾炷灸之以爆為度不爆難愈灸百壯無不愈

傳

灸便毒法

用細草隨患人左右手量中指自手掌盡處橫紋量起通三節至指盡則住不量爪

甲切斷却將此草於手腕橫紋量起引草向臂當中草盡處即是穴艾炷如麥大灸二三壯腫散痛

止即安

調理及禁忌法

癰疽患時將理法避風邪○少睡卧○勿驚憂○勿嗔怒○徐行動○省言語○

○戒閨房○絕思慮○防觸穢○聽好事○擇飲食○洗○藥常助○鹽漱聞香○二便順序○

內充無飢飽失度○付藥運掉屈伸瘡口常加愛護○妄用惡草愈滋其毒○不忌飲食反害其瘡

○惡肉去盡瘡口收斂欲平之際尚忌起立行步○待賓客酒肉宴會嗔怒沐浴勞動等事直待

瘡痂平復精神如故氣力完全方無所忌百日內慎勿觸犯○癰疽最宜節慎飲食其熱毒方盛

或發大渴多飲冷水及冰漿之類此乃毒氣攻心
令口乾煩渴但以心氣藥內補藏府即止矣
凡癰疽勿食羊雞牛鵝魚麪煎燂炙炒法酒等味
犯之必發熱蓋厚味能引起宿火之熱此誠富貴
養口腹者所宜謹守若冬寒與虛老人寧無權
法乎略加滋味以補胃氣庶易收斂
後氣血虛弱則可食羊肉鵪鶉蔓菁蘿蔔薑醬
薺稀粥軟飯若肌肉漸生思想滋味則宜食白
酥餅羹粥羹湯熟軟溫和不勿令大飽
瘡瘍皆屬於心如茯苓茯神遠志益智石菖蒲等
輩須當佐助於其間抑使病人不得憂恐嗔怒勞
精疲神有觸於心尤關利害
隱凡用菰豆十餘斗作一大袋隱伏則自然心涼
身安
表以去之○瘡瘍鬱冒俗呼
昏迷慎不可下汗之則愈
瘡

單方

凡三十七種
有陶潛膏

朱砂雄黃

古之傷醫以五毒攻瘡中物也凡解瘡毒
不可無雄黃朱砂
○朱砂雄黃膽礬白

礬石置瓦盒中火煨三日夜其烟上着蓋中以雞羽掃取之以注惡瘡則惡肉附骨膿血即潰出

而愈此五毒也

伏龍肝之諸癰疽發背一切腫毒以雞子黃和塗

煉石諸惡腫及發背取石子火燒赤醋淬十餘度取

甘菊○治癰毒及疔腫垂死菊葉搗取汁飲一升神驗

野菊花治疔瘡野菊花葉付疔上亦效名曰陶潛膏

生地黄治一切癰腫地黃泥貼腫上三度差乾木香

羌薺莖葉療疔瘡乳癰及諸毒腫搗取汁飲之滓外付乾

白鳳仙花醋洗患處後付藥一日一換如神春以米

辟荔治背癰取葉爛研取汁和酒絞取汁煎數沸服之乾

黃芪治癰疽久敗瘡排膿止疔濃煎服之內托陰證瘡瘍必用之藥也

忍冬藤治一切癰疽腫毒花莖與葉生搗煖酒調服

蒼耳主疔瘡取莖葉燒存性醋調塗疔上當出根加雄黃尤妙
○又方蒼耳一握生薑四兩搗碎汁

入酒和服治疔毒入心嘔逆者效

白芷治發背乳癰能止痛生肌蝕膿敗膿不去加白芷即去

茅鉞癰毒惡瘡不作頭酒茅鉞取汁服一鉞一孔二鉞二孔必穿穴

大黃治癰疽熱毒大黃酒洗劉二錢甘草一錢煎服脉實膏梁之人宜服

茨菰取根莖搗付腫毒癰上即消水煎服亦效

槐花治百種瘡毒槐花四兩炒香入酒二搗煎二三沸去滓盡服即消

黃桑葉癰疽瘡口成大蜜不斂經霜黃桑葉為末類糝瘡中或煎湯洗之

乳香

止痛長肉令諸瘡內消。凡血滯則氣壅經終

家奇藥也

皂角刺

治癰疽能鑽引至痛處亦能宣毒

槲木皮

煎湯洗諸瘡敗爛瘡及

生龜

刺取血塗癰疽腫

蜘蛛

治懸癰取大者一箇研爛

胎麻油

治癰疽發背毒瘡初作便服使毒氣不內攻

五次溫服一日夜服盡此神

雄雀屎

一名白丁香治癰腫已有膿未潰出以

甜瓜子

主腹內結聚破潰膿血最為腸胃

蜀葵花

諸癰瘡腫痛不可忍。葵根爛搗貼之立效。○黃蜀葵花葉入鹽研爛付之亦效。○

葫

細小蒜也。治癰毒瘡腫。呼不得卧。取獨頭蒜。細搗麻油調和厚付瘡上。乾則易神效。○

人口中唾

凡癰瘡微有紅頭。隱疼者。急用不語津。頻頻塗之。自消。飲酒了不可用。○

猪蹄

治癰疽潰爛。取猪蹄。濃煎取清浸洗。妙。○

商陸

熨除癰腫。付惡瘡。○一切熱毒腫。商陸根和少鹽搗付。日一易效。○

芋根

癰疽發背。未成膿者。芋根葉熟。搗付上。日數易。腫消。即差。○

醋

消癰腫。歌曰。發背疔瘡。識者稀。醋磨京墨。澆四圍。生薑猪膽同塗。上天明。恰似鬼神移。○

赤小豆

消熱毒。癰腫作末。雞子清調塗。之。即差。亦治一切腫毒。作痛。○

芙蓉

治發背瘡。癰諸般腫毒。及杖瘡。芙蓉花及葉。並晒乾。為末。醋調付。杖瘡。雞白清調。白蓮尤佳。○

荊芥

搗爛和醋。付疔腫。甚效。又水煎取濃汁服之。亦可。○



入屎

癰疽發背欲死取野人乾屎燒存性醋和如泥付腫上乾則易甚良又治疔腫封其上一日根

爛

諸瘡

大風瘡

脉風成爲癩癩者榮衛熱腐其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚癢潰

五死一曰一種風水二種傳變三種者自不調攝○五死者一曰皮死麻木不仁二曰肉死割切不痛三

曰血死潰爛成膿四曰筋死手足脫落五曰骨死鼻梁崩塌眼斷唇翻聲啞○又曰一風者肺受病

先落眉毛二風者肝受病面起紫疱三風者腎受病脚底先穿四風者脾受病遍身如癰五風者心

受病先損其目○或有墳墓居址不謹糞坑房室床母夫先妻家人適相傳染或在野外小謹糞坑房室床

鋪衣被橋上樹下歇息去處命值委死凶星遭此惡疾宜服消風散追風散磨風元無用洗藥敷藥

之彌然○大風病是受得天地間殺物之風古人謂之癘風者以其酷烈暴悍可畏也得之者須分在

上在下夫在上者以通天以再醉仙散取臭涎惡血於齒縫
中出在下者以通天再造散取惡物虫積於穀道
中出所出雖有上下之殊然皆不外乎陽明一經
蓋陽明者胃與大腸無物不受乃脾肺二藏之府
也脾主肌肉而肺主皮毛乃府及於藏病也
服藥下虫積後用防風通聖散方觀調之重者又
與換肌散夫上下同得者甚重自非醫者神手病
者鐵心罕能免此若遇此疾切須戒鹽及一切口
味公私世務悉宜屏去○此疾雖治得愈若不
絕味斷慾皆不免再發而終於不救孫真人曰嘗
治四五百人終無一人免於死非真人不能治蓋
無人能守禁忌耳○初起白屑紫雲如癰風然
或有遍身白皮脫落者三蛇丹鼻崩者換肌散補氣瀉
花蛇丸眉鬚落者三蛇丹鼻崩者換肌散補氣瀉
榮湯通用凌霄花散加味苦參丸換骨丸大蘇風
丸紫雲風丸返魂追命再造散烏蛇苦參元可選
用諸○治癰以蒼耳葉為君更以酒煮烏蠡魚代
補蛇之或缺為末糊丸梧子大茶清下七八十丸
更入紫葢尤捷數月而安○服藥瘳後終
身不得食牛馬驢驘等肉犯者復發必死

消風散 第一日服白芷全蝎人參各一兩右為末每

效燥為

追風散 第二日服瀉血追虫錦紋大黃六兩鬱金蟬

服五錢或六錢入大風油一錢半朴硝少許入內

好溫酒一椀調化五更空心服之直待辰時又如

前誑藥一椀入熟蜜少許勿令患人知先以水盥

漱爭然後服藥必以蜜解口切勿不可卧良久痛瀉

數次不妨以薄粥補之。此藥老弱者難治五十

以丁者可治精壯者十日內三服謂如正月月初一

日服消風散初二日服追風散初三日服磨風

磨風丸 第三日服日進二次當歸羌活獨活川芎天

子牛蒡子車前子皺面草薺子大溫酒下五七十九

晒乾為末酒麪糊和丸梧子大溫酒下五七十九

藥熏洗仍用後

洗藥

治滿身瘡爛地骨皮荊芥苦參細辛各二兩右剉以河水煎用大桶盛浸浴熏洗通身出血為

效

敷藥

治瘡爛遍身黑狗脊鯽鱗寒水石硫黃白礬枯各二兩蛇床子一兩朴硝五錢右為末臘猪脂

調付

浴法

治遍身癩瘡桃柳桑槐楮五般枝多水濃煎湯盛大桶浸坐沒頸一日換湯如油安矣

醉仙散

治大風癩瘡胡麻牛蒡子枸杞子蔓荊子各一兩同炒白蒺藜苦參瓜蒌根防風各五錢

右細末每十五錢末八輕粉二錢拌勻每服一錢茶清調下晨午夕各一服後五七日先於牙縫內

出臭黃涎渾身疼悶如醉然後利下膿血惡臭氣病根乃去矣

肉油膩燒炙之物只吃淡粥及煮熱時菜并烏蛇白花蛇淡酒煮熟食之助藥力

通天再造散

治同上皂角刺黑大者一兩半大黃煨一兩白牽牛頭末三錢炒三錢生薑金



五錢右為末每二錢或三錢早晨面東好酒調下
當日利下惡物或膿或虫服藥後泄出虫視
其色如虫黑色乃是多年赤色是為近年三四日
後又進一服直候無虫乃止後取防風通聖散方

服調加苦參天麻蟬蛻煎

換肌散

蛇治大風年深毛脫鼻塌深重者取效如神烏
蛇白蛇地龍各一兩當歸細辛白芷天麻

蔓荊子威靈仙荊芥穗甘菊苦參紫參沙參木賊
不灰木甘草炙白茯苓藜蘆天門冬赤芍藥赤箭何首

烏石菖蒲胡麻子草烏蒼朮木鱉子川芎各三錢
半右為末每五錢溫酒調下酒多為妙其中紫參

無不灰木雖
無不妨

補氣瀉榮湯

治癰風先砭瘡上令惡氣消盡後服此
藥連翹升麻各六分桔梗五分黃芩生

地黄各四分黃芪蘇木黃連地龍全蝎當歸各二
分白豆蔻人參各二分甘草一分半胡桐淚一分

麝香少許挑仁三箇為泥虫虫炒水蛭另末外都作
為末右剉除胡桐淚麝香虫虫水蛭

一貼水二盞酒一盞煎至一盞去滓入細末藥煎至七分早飯後午飯後服之煉

凌霄花散

治癩風神效蟬殼地龍炒白礬蚕全蝎炒各七箇凌霄花五錢右為末每二錢熱酒

調下

加味苦參丸

治大風瘡苦參四兩防風荆芥蒼耳子胡麻子皂角刺各二兩半蔓荊子牛蒡子枸杞子何首烏禹餘糧蛇床子各七錢半白芷四錢右為末皂角煎膏和丸梧子大茶清或酒下

五十丸

換骨丸

治癩風苦參浮萍各一兩半大黃槐花白芷川芎各一兩二錢半蒼朮一兩乳香沒藥沉香木香各三錢麝香五分右為末以麻黃五斤煎膏和丸彈子大每一丸溫酒化下忌風二三日

大麻風丸

治大麻風初起遍身瘡點五色不知痛痒麻木證苦參一斤羌活獨活白芷白斂白

蒺藜天花粉何首烏各一兩三錢皂角刺當歸各二兩七錢右為末別用皂角一斤剉水煎王日歸各

淳熬膏和丸溫
酒下百丸

紫雲風丸

治癰初起如紫雲癰風或發紫血瘡瘡何首烏四兩五加皮白殭蚕苦參當歸各二

兩全蠲一兩半惡實羌活獨活白芷細辛生地黃防己黃連赤芍藥蟬退防風荊芥蒼朮各一兩右

為末酒糊和丸梧子大溫酒或米飲下七十丸

返魂追命再造散

治大風癰皂角刺一兩半大黃一兩右為末每二錢冷酒調下瀉虫

出攪○一方治大風勢重不可救者皂角刺一錢九蒸九晒研為末食上濃煎大黃湯調下二

一旬鬚髮再生肌膚悅潤眼明倍常其效如神

烏蛇苦參元

治癰風及惡癰苦參一斤半烏蛇肉八兩石菖蒲四兩右為末蜜丸梧子大茶

清下百丸

愈風丹

治癰疾深重一名三蛇丹治大風髮脫眉落遍身麻木瘡爛烏蛇白花蛇土桃蛇各一條

並酒浸三日取肉為末苦參一升剉搗取頭末四兩皂角濃煎汁熬膏和丸梧子大以防風通聖散煎水吞下五

白癩瘡

癩風初起白屑剥落又一種每朝瘡上退白皮一升許如蛇蛻宜服解毒雄黃元嘑觀無

服白蛇丸

白花蛇丸

治癩風白屑瘡痒皮膚皴燥白花蛇一條當歸二兩川芎白芷生地黃防風荊芥酒

萃連翹胡麻子何首烏升麻羌活桔梗各一兩右為末將浸蛇酒和水煮麩糊和丸梧子大茶清下

五七十丸

白花蛇酒法

治大風癩瘡白蛇一條先蒸糯米二斗缸底先安酒麴次將蛇以絹袋盛之

頓於麴上然後以糯飯和勻頓於蛇上以紙封缸口候三七日開取酒將蛇去皮骨焙乾為末每溫酒一盞調蛇末一匙服之仍以酒脚并糟做餅食之○烏蛇釀酒法亦同上

鍼法

癰風者素刺其腫上已刺以銳鍼鍼其處按出

大風骨節重鬚眉墮名曰大風刺肌肉為故汗出

百日刺骨髓汗出百日九二百日刺肌肉生而止鍼

天庖瘡

一名楊梅瘡與癰大形如楊梅焮紅濕爛痒痛之

者屬心○形如綿花者屬肺○形如鼓釘黃豆者屬脾多生

滿面○形如魚疣內多白水按之於尻腎兩陰筋骨

之按之○形如魚疣內多白水按之於尻腎兩陰筋骨

庖瘡乃此類之輕者○初起即服防風通聖散

一貼去毒以麻黃以去內毒再用一貼去毒發汗以

去外毒輕者一劑重者十貼後宜服化毒散三日

尾要藥輕者一劑重者十貼後宜服化毒散三日

却用吹藥三日瘡乾欲落欲落再服化毒散三日

後量用通聖散加減○失治久則風毒流入經

絡而成頑癬或氣血虛敗而成漏或誤服水銀輕

粉而成風堆腫爛流膿出汁病至治之為難

亦有蝕傷眼鼻腐爛王莖拳攣肢體與癩無異門入

○初起宜服消風敗毒散加減通聖散加減通聖

丸門入○從肚皮起者裏熟發於外速服防風通聖散門入

○成頑癬者宜皂根丸○成腫塊者宜仙遺糧

丸西聖復煎丸消腫遺糧湯○筋骨痛宜香鰾湯

通仙五寶丹仙遺糧湯換骨散回生保命丹茯苓

湯○成漏宜象牙丸○通治宜用活魂丹水硃丸

六六九天疔丸三黃敗毒散取輕粉法○外治宜

洗方搽方熏鼻方吹藥方照藥方

方滅癰法禁忌法鵝掌癬治方

加減通聖散

治楊梅瘡初起牛蒡子一錢二分門入

花五分門入白鮮皮赤芍藥連翹黃芩各一錢金銀

加減通聖丸

治同上即前方共半斤再加苦參半斤

右為末酒糊或蜜和丸梧子大酒飲任

化毒散

治楊梅瘡重者生大黃一兩門入鱗熟穿山甲五

錢破右為末每二錢
溫酒調下日二服

消風敗毒散

治天庖楊梅瘡初起當歸尾川芎赤芍藥升麻乾葛黃芩生地黃各一錢黃連

黃柏連翹防風各八分羌活金銀花甘草各五分蟬殼二箇初服加大黃二錢芒硝一錢半

用右剉作一貼水煎服

皂根丸

治楊梅瘡成頑癰當歸二兩黃芪一兩半人參陳艾各一兩麻黃五錢皂角樹根皮四兩

右為末蜜丸梧子大土茯苓湯下五十丸

仙遺糧丸

治楊梅瘡後腫塊成癰土茯苓各一斤防風木通薏苡仁防己白茯苓金銀花木瓜白

鮮皮皂角刺各五錢白芥子四錢當歸身七錢右為末蜜丸梧子大酒飲任下五七十九或浸酒服

忌生冷雞豬魚煎炒等物

西聖復煎丸

治楊梅瘡後腫塊經年破而難愈百方不效用此如神乳香沒藥孩兒茶丁香

各一兩白花蛇阿魏血竭各四錢俱為末白麩炒
一升蜂蜜六兩煉香油四兩煎熟大棗二十枚去
皮核右和勻搗千杵丸如彈子大每一丸土茯苓
二兩水二碗煎至一碗藥丸再煎至半去渣溫

服

消腫遺糧湯

治楊梅瘡後腫塊土茯苓十五兩木通

白鮮皮皂角刺各五錢白芥子炒研四錢當歸身
七錢右剉分作二十貼每貼一貼水煎服朝夕兩服

香鰾湯

治楊梅瘡毒筋骨疼痛苗根麻黃烏藥細茶
槐花炒川椒各五錢魚鰾三錢以脂麻同炒

成珠乳香一錢右剉分作二貼每貼一
貼薑葱各五水煎服二三貼即愈

通聖五寶丹

治楊梅天庖綿花等瘡潰爛見骨或筋

癰或皮破肉爛口臭難當一切瘡惡毒並皆治
之鍾乳粉三分丹砂二分琥珀片腦各土釐真珠

二釐半右細末每服五釐另入飛白霜二分半炒過合作一貼每日取土茯苓一介水煎取汁十梳

以湯一梳入藥一貼攪勻晨服其茯苓湯須一日服盡不可別用湯水服一料即愈神驗乃治楊梅

天下古今第一仙方也
細口飛白霜疑是輕粉

仙遺糧湯

治楊梅風毒或誤服輕粉以致癰瘻筋骨疼痛發肌傷骨者服此除根永無後患土

茯苓七錢一濕醋防風木瓜通薏苡仁白鮮皮金銀花各五分皂角刺四分右剉作一貼水煎日三

服

換骨散

治天庖瘡筋骨疼痛土茯苓四兩皂角刺一兩乳香沒藥各一錢半右剉分作十貼每

取一貼水三梳煎至一梳分二次服之

回生保命丹

治楊梅天庖瘡及輕粉毒筋骨腫痛不拘新久皆效槐花一兩輕粉四錢二

分朱砂四錢川芎白芷雄黃各三錢當歸炒二錢丁香血竭孩兒茶各一錢乳香沒藥各五分牛黃

四分右為末棗肉入米粉打糊和丸黍米大用

茯苓湯

治遠近楊梅天庖瘡毒甚至腐爛肌肉膿汁

瓜白芷當歸尾黃栢生地黃牛膝白芍藥防風各一兩皂角川椒紅花各五錢甘草節羌活各七錢

金銀花二兩土茯苓四兩右剉分作十五貼每一貼水煎服日二次

象牙丸

治楊梅瘡成漏象牙三錢鯨甲獐皮並燒各一箇右為末棗肉和丸櫻桃大每一丸空心

以童尿化下茶清亦可七日後取三味末猪膽汁調付瘡上

活魂丹

治楊梅天庖瘡潰爛喉穿鼻崩膿血淋漓血竭乳香沒藥銅綠白礬枯黃丹穿山甲煨焦

各一錢輕粉蟾酥各五分麝香一字右細末鍋牛研如泥和丸菴豆大每一丸重者二丸細嚼葱白

裹藥熱酒送下空心

水硃丸

治年久楊梅頑瘡不愈者水花硃礬一錢枯白礬朱砂各一錢半右為末用全蠍酒煎

膏和勻分作六九分三日服以羊
肉鮮魚等湯送下九日全愈

六六丸

治天庖楊梅瘡輕粉一錢三分黃丹八分朱砂雄黃各五分乳香麝香各三分右為末糯

米糊和勻分作六九每
日茶清下一丸

天庖丸

治同上輕粉一錢半朱砂雄黃陳石灰各半錢右為末陳米飯和丸茶清

吞下

三黃敗毒散

通治天庖楊梅等瘡防風荆芥連翹白芷當歸赤芍藥黃芩黃連梔子地骨皮

五加皮白鮮皮木瓜苦參蟬退金銀花薏苡仁白
僵蚕皂角刺黃栢白蒺藜川芎剉木通衛肭甘

草各一兩土茯苓一貼水煎服日二餐

取輕粉法

取出腹內輕粉之毒可免後患用開口川

利輕粉於椒內從大便出洗起
川椒服至椒內無輕粉乃止

仙遺糧

善治久病天庖楊梅癰漏及曾誤服輕粉肢體廢壞筋骨疼痛者能收其毒而祛其風補

其虛○右一味為末蜜丸梧子大川椒煎湯吞下五十九鼻崩眉落筋緩骨拳者皆效但初起肺熱

便秘者勿服

一方

治楊梅天庖諸瘡香油二斤入水一盞煎至白烟起收貯每用黃酒一鍾入油一盞溫服日三

次服盡全愈○又方鴨一隻餓二日只與白水飲之用輕粉一兩梗米飯四兩拌勻喂鴨待吃盡以

葦根搥碎泡水令鴨飲之解去輕粉之毒待鴨毛落盡煮鴨食之

洗藥方

治楊梅瘡爛防風蒼耳子地骨皮荊芥苦參細辛各三兩剉以河水煎盛大桶浸浴熏洗

通身出汗出血為效○又方苦參蛇床子白礬煎湯浸

浴亦佳

搽藥方

治楊梅天庖遍身瘡爛杏仁十四枚鉞挑火上燒半生半熟輕粉一錢片腦二釐為末猪

膽汁或香油調探淨。○又野菊花棗木根煎湯洗後防風通聖散同蚯蚓糞為末略炒蜜調付之極

妙門。○又用千金散麝香輕粉散

千金散

治楊梅瘡爛乳香沒藥血竭雄黃杏仁各二錢輕粉孩兒茶白礬枯各五分膽礬三分麝

香二分洗瘡後為末先以猪膽汁洗瘡後上

麝香輕粉散

治天庖瘡爛及諸惡瘡白礬乳香各一兩輕粉五錢麝香半錢右為末每取少

許糝付之

熏鼻方

治楊梅天庖瘡熏鼻甚奇黑鉛水銀各一錢朱砂乳香沒藥各五分血竭雄黃沉香各三

分右為末和勻捲作紙撚七條用香油點燈放床

上令病人放兩脚包住上用單被通身蓋之口噙

凉水頻換則不損口銀白錫百草霜各一錢先用一條熏之。○又方水銀白錫百草霜各一錢先用錫熔化八二味和勻研末捲作紙撚九條每早午

晚各一條用紙作罩勿令泄氣熏鼻孔男左女右

口噤涼水溫則易之一日
熏三次三日九次全愈

吹藥方

治楊梅天庖瘡黑銀一錢半炒化入水銀一錢
同結成餅銀珠椰輕一錢半炒化入水銀一錢

一錢為末棗肉搗勻分作六丸每取一丸放火籠
內令病人以巾包頭口吹眼看其藥丸待烟盡即
止當日早午晚各吹一丸次日早午吹二丸第三
日只早吹一丸吹後三五日或口流涎以黃連葉
豆煎湯解之又服化毒散坊見調斷根三日後
以加減通聖散丸坊見調斷根三日後

照藥方

服一錢茯苓湯後五次用照藥水銀黃丹炒白錫各
一錢血竭末五錢京香三分無麝香者右為

末用熟艾鋪紙入藥在中捲作條放盞內入香油
一椀將藥條作燈心點火安木桶內四圍用單被
圍住勿泄氣眼看燈口噤涼
水熱則換水盡藥條為度

滅癰法

治天庖楊梅瘡愈後癰痕紅黑用大黃白
礬等分同研擦患處其痕即去如常

禁忌法

天庖楊梅瘡忌食牛馬狗肉雞猪魚生冷及
酒麪菜油膩辛辣熱等物痛斷酒色宜炒食

麵

鵝掌癬

凡天庖楊梅瘡服輕粉愈後手掌上發癬退

宜服蒼耳散擦玉脂膏○一方猪前蹄爪破開

皮皂角雄黃各五分鈆炒水銀三分為末臨臥以

鵝脂薑汁調擦次早以磁鋒磨刮去麤皮服蒼耳

散擦玉脂膏更灸勞宮或內關穴○又方

蒼耳散

治鵝掌癬猪牙皂角刺方風荊芥連翹各一錢蒼

耳散耳子金銀花皂角刺方風荊芥連翹各一錢

玉脂膏

治同上牛乳柏油鹽側鵝香油黃蠟各一分

右為末入內攪勻抹癬上火

上烘擦再烘再擦如神

瘰癧

瘰癧之證內經謂之結核是也生頸前項側結核

如馬刀蛤者為馬刀瘰癧○繞項起核連續者為瘰癧形長

肩項或赤或白或沉或浮初生如豆久似核年久浸久其大如梅或如雞卵排行成列或生二三或

生六七是也用力思慮過多久之則疼痛赤腫早治為上○流注瘰癧者婦人多有之其性急躁其

氣怫鬱其心熱着初生在項破後流注四肢遍體結毒如梅李狀不療自破孔竅相穿寒熱疼痛或

流膿汁是也又名千歲瘡化氣調經湯主之○瘰癧始起於少陽不守禁忌延及陽明太抵食味

之厚鬱氣之積皆此二端招引變換以其屬膽經主決斷有相火而且氣多血少婦人見此若月經

行寒熱不作則可生稍久轉為潮熱危矣自非斷慾絕慮食淡雖神聖不可治也○瘰癧與肝合且

主筋病則筋累累如貫珠寒熱焮痛乃肝氣動而為病也當清肝火為主宜清肝益榮湯功觀柴胡

清肝湯勸觀扼子清肝湯○肝燥火動而筋攣補中勝毒餅為主多怒火宜清肝解鬱湯功觀有

寒熱單夏枯草散通用貓頭丸海藻散堅丸門火
治法大槩以地膽斑貓為主滲泄小便以瀉心火

立應散是也然性甚峻服後量體調治實者宣熱
丹虛者托裏益氣湯方觀門症○瘰癧之毒莫不

有根地膽斑貓製度如法能使根從小便中出
或如粉片或如塊血或如爛肉皆其驗耳但毒根

從行小便必澁當以木通滑石輩導之然是毒必
從小便出者何哉蓋諸痛痒瘡瘍皆屬於心故也

熟丹○通治宜化氣調經湯貓頭丸海藻散堅丸宣
散蠟礬元天花散夏枯草散○瀉肝膽火宜梔子

清肝湯○瀉毒宜立應散薄荷丹白蛇散四聖散

○補虛補中勝毒餅益氣養榮湯○馬刀
瘡宜連翹散堅湯消腫湯柴胡通經湯諸

化氣調經湯製羌活白芷各一兩牡蠣粉天花粉皂

角刺甘草各五錢右為末
每二錢清酒調下日三服

梔子清肝湯治肝膽火盛耳後頸項胃乳等處結核
腫痛寒熱柴胡二錢梔子酒炒牡丹皮

各一錢三分赤茯苓川芎赤芍藥當歸牛蒡子各一錢青皮甘草炙各五分右剉作一貼水煎服

補中勝毒餅

治癰瘰馬刀瘡黃芪一錢半連翹一錢防風升麻柴胡甘草各五分當歸生地

黃熟地黃白芍藥陳皮人參各三分右為末湯浸蒸餅調和捏作二餅子晒乾每一餅搗為末白湯

調下

夏枯草散

大治癰瘰散結氣有補養厥陰血脉之功夏枯草末六錢甘草末一錢右和勻每二

錢茶清調下○又取一兩水煎服虛者多服益善無服十全大補湯酌加香附遠志貝母治癰瘰

馬刀退寒熱之聖藥也

貓頭丸

治癰瘰馬刀已破未破皆效貓頭骨一箇炙

南星白礬各一兩右為末黃蠟熔化

海藻散堅丸

治癰瘰馬刀堅硬形瘦潮熱無治癰氣神麴四錢海藻昆布草龍膽蛤粉通草

貝母白礬枯真松蘿各三錢半夏二錢右為末蜜丸葉豆大蔥白湯下三十丸或取末二錢溫酒調

服

宣熱丹

解癰癰風熱之毒自小便出薄荷皂角連翹何首烏蔓荊子三稜荊芥各一兩右為末熟

醋浸豆豉二兩半搗膏和丸梧子大熟水下三十丸日一服

三聖丸

通治癰癰丁香香五十五粒斑蝥十箇去毒炒麝香一錢右為末鹽豉五粒湯浸研如泥和

五九葉豆大每服五七丸空溫酒送下日進三服五七日外覺小便淋瀝或下如青筋膜之狀是病

之根也

小犀角丸

治諸癰應效如神常服去根黑丑半生半炒取頭末犀角青皮陳皮各一兩連翹五

錢右為末皂角二條去皮弦子湯浸絞取汁一椀新薄荷二斤取汁同熬膏和丸梧子大連翹薄荷

湯吞下三十丸食後服

散腫潰堅湯

治瘰癧及馬刀瘡堅而不潰或潰出膿水黃芩一錢酒洗半生半炒草龍膽酒

洗六分瓜蒌根酒洗黃柏酒炒知母酒炒桔梗昆布海藻各七分柴胡六分炙甘草三稜酒洗蓬術

酒炒連翹各五分葛根白芍藥當歸梢各四分黃連酒洗升麻各三分右剉作一貼水浸半日煎服

食後去枕低頭而卧含一口作十次嚥下徐徐服之另搗一料為細末蜜丸茶豆大每服百丸以煎

藥湯送下

內消丸

治瘰癧結核熱毒鬱滯服之內消黑丑八兩取頭末青皮陳皮各二兩右為末以薄荷皂

角各三兩煮爛取汁熬膏和丸茶豆大以荊芥茶清吞下三十丸食後服

琥珀散

治瘰癧結核內消神效白丑頭末滑石白礪

藥柴胡各五分斑貓三錢去翅足炒甘草三錢琥珀二錢右剉分作六貼水煎服

天花散

治瘰癧潰爛疼痛金銀花二錢赤芍藥一錢七分天花粉一錢五分穿山甲一錢二分白

並當歸各一錢貝母七分
乳香二分右剉作一貼酒
水煎服五錢

立應散

治癰癤馬刀瘡連翹赤芍藥川芎當歸滑石
甘草各五錢黃芩斑荊去毒炒各三錢白丑

頭末生土蜂房蜜水洗飯上蒸晒乾各二錢半
烏尖七箇右為末每錢一錢濃煎木通湯調下臨卧

服毒從小便出如粉片血塊是也未效再服斑
性毒濟以烏尖或衝上麻悶嚼葱白茶清下以解

之如尿澁益元散或五苓散燈心煎湯
調下宜毒後繼服薄荷丹解其風熱

薄荷丹

解癰癤毒服藥從小便出後常服此薄荷皂
角連翹何首烏蔓荊子三稜荊芥各一兩右

為末鼓二兩半以熱醋淹鼓令軟研
為糊和丸梧子大熟水下三十丸

白蛇散

治癰癤馬刀瘡連翹赤芍藥川芎當歸滑石
青皮黑丑頭末半生半炒各五錢犀角二錢

半右為末每一錢入輕粉五分研勻五更以糯
飲調下已時利下惡物乃病根也十日後再服後

用四聖散補
之永斷根

四聖散

治癰癰用白蛇散取轉後用此補之海藻石

飲調下日三服下
清水盡為妙

蠟礬元

治癰癰馬刀惡瘡衛護內膜驅
解諸毒自然內消神妙

益氣養榮湯

治懷抱抑鬱癰癰流注日晡發熱或潰

當歸酒洗川芎白芍藥酒炒生地黃陳皮香附子
貝母各七分柴胡桔梗地骨皮甘草炙各五分
劉作一貼水煎服日二次

連翹散堅湯

治馬刀癰癰流注遍體作核作瘡柴胡

各一錢二分黃芩酒炒三次一錢當歸梢生黃芩
蓬朮酒炒三稜酒炒連翹白芍藥酒炒各七分
甘草五分黃連酒炒蒼朮各四分右剉作一貼水
浸半日乃煎去枕仰卧一口作十次嚥之留一口
送下丸藥另取一劑為細末蜜丸菜豆大每
百丸以煎藥水送下更以龍泉散塗之



消腫湯

治馬刀瘡連翹二錢生黃芩柴胡各一錢二錢當歸梢甘草各七分

鼠粘子黃連各五分紅花二分

柴胡通經湯

治少陽經分項側有核堅而不潰名曰

一錢黃連並酒炒鼠粘子三稜甘草生各

一方

治瘰癧烏雞卵一服煎五積散麝香送下四五

枚即效

外治法

其凡瘰癧馬刀荏苒日久內必成膿若腫高消軟

鍼決核中用追毒蝕肉鉗子絛之膏貼之綠雲

膏貼之三日後取去核中稠膿膿盡取去核外薄

膜先破初起之核一枚以絕其源服藥則後出者

皆愈或不能收如銀杏者盡皆開了核猶存故膿

自潰者猶如木果之腐熟肉雖潰而核猶存故膿

水淋漓久難得愈治法用鐵烙燒赤烙去其破核
猶存者併肉潰處次用金寶膏追去蠹惡之根遂
能長肉而愈

蟾酥膏

蟾酥如大豆許白丁香十五枚巴豆肉五粒
寒水石寒食麪各少許右各另研合和再研

蜜丸藁豆大每一丸或二丸三丸納入鍼
竅中如膿未盡再納數丸以膿盡為度

綠雲膏

黃連大黃黃芩玄參黃柏木鱉子肉各一錢
右剉香油一兩同煎焦黃色去滓入松脂五兩

再煎成膏濾入水中扯拔如金色再熬放溫入猪
膽三箇汁銅綠醋浸一宿去滓三錢攪勻如常攤

貼如瘡口不乾加乳
香沒藥輕粉尤妙

金寶膏

去腐肉惡肉不傷良肉桑柴灰五碗以沸湯
十碗淋瀝取汁穿山甲煨胖二兩信砒一錢

杏仁七枚三味同研細生地黃二兩朱砂一錢輕
粉麝香各半錢右將灰汁下銅煎濃下甲末等及
地黃汁候焦乾下麝香次下輕粉次下朱砂候將
成膏下炒石灰末一兩以成塊子收入罐內勿見

風每取付核上再付即
去舊藥併靨即效

禁忌法

人有此患不惟懲忿窒慾其於飲食百味一切
戒之謹○切忌毒藥兼蝕及妄用鍼刀割破必

死戒
之生

糝貼藥

凡瘰癧馬刀惡瘡宜用蚕蛭散
龍泉散蝸牛散燒灰散生權散選用○初起未

破十香膏琥珀膏蘇方見常貼之可自消○治
瘰癧神效方白膠香海螵蛸降真香等分為末糝

患處外以水紙掩之一夕而退○又方未破者蜜
蜂二十一箇蛇蛻七分半蜈蚣二條端午前收者

右用香油四兩同熬成入光粉二兩以桑枝七條
急攪候冷出火氣七日收貯每用攤紙上貼患處

○此二方不須服藥只
貼上五七日可便消

蠶蛭散

治瘰癧蚕蛭三箇白朮砒礞各一錢右並
火煨為末糝爛肉上三日其核即下

猫蝠散

治瘰癧多年不愈神效猫頭骨一箇編蝠一
箇右二味俱撒黑豆上同燒存性研為末乾

門入糝

代灸散

治瘰癧潰爛臭不可聞。粉五分，麝香二分，右為末。用槐皮一片，將鐵

密密刺孔，置瘡上。上糝藥一撮，以炭火灸熱其藥氣自然透入瘡中，痛熱為止。二三次全愈。鑒

龍泉散

治瘰癧癰三錢，粉龍泉粉炒，即磨刀礪上粉也。昆

末熟水調塗瘡上，即效。○瘰癧先出一箇用四楞鐵環定住，不令出移，破作口，了以油紙熬經之，勿

令合了，以絕其瘡源。其效至速，如瘡不破，或病入不肯破，龍泉散塗之，三日一瘡，易破。

蝸牛散

治瘰癧癰潰，與未潰皆存性。為末，入輕粉少許。

取猪骨髓調勻，攤紙花貼瘡上。用法：一

燒灰散

治同上。大田螺并殼肉燒存性，為

生權散

治同上。生權一箇，取四足，臍尾皆并兩耳，右

洗傳方

治瘰癧白芷荊芥煎湯溫洗拭乾貼膏藥膿汁出盡後半夏南星血竭各一錢輕粉少許

為末唾
調傳效

難治可治證

帝曰寒熱瘰癧生於頸腋者何氣使然岐伯曰此皆鼠瘻寒熱之毒氣留於脉

而不去者也帝曰決死生柰何岐伯曰反其目視之其中有赤脉上下貫瞳子見一脉一歲死見一

脉半一歲半死見二脉二歲死見三脉三歲死見三脉三歲而死見赤脉不貫瞳子者不可治

也經閉有潮熱或咳者死王燭散散於臍心無潮熱者可治也

日服一貼七八日自消也故勞瘵類有曰腹中有塊咳乃瘰癧傷證之標也

頸上有核最難治門肺經部分者死瘰癧延及

灸法

治瘰癧以手仰置肩上方微舉肘取之肘骨尖上

於掌後手腋盡處橫紋量起向臂中直上三寸

半是穴灸三壯即效○秘法肩尖肘尖二穴即

肩髃肘髃二穴宜灸此穴味通經絡○
癰核上每灸七壯隔蒜片灸之尤妙○

結核

獨形而小核者為結核○結核者火氣熱甚則鬱結堅硬如中核也不須潰破但熟氣散則自

消○結核在一身如腫毒者在皮裏膜外多是濕痰流注作核不散問其平日好食何物吐下後

用藥散核○痰癰推動滑軟○結核在頸項二陳湯加酒炒大黃桔梗柴胡連翹煎服○

結核在臂二陳湯加連翹防風川芎酒芩蒼朮皂角刺白蠟蚕煎水入麝香少許服行太陰厥陰之

積痰則自消○遍身有核多是痰注宜加味小胃丹竹瀝達痰丸痰癰見通用海帶丸含化丹門

○結核宜用消風化痰湯開氣消痰○結核內托白欽散消解散消核丸

海帶丸

治痰核癰氣久不消海帶青皮貝母陳皮各等分右為末蜜丸彈子大食後嚥化一丸○

含化丹

治耳項結核酒蒸大黃白蠟蚕青黛牛膽南星各等分右為末蜜丸彈子大食後嚥化一

門九



卷之三

三



消風化痰湯

治結核因風痰鬱結白附子木通各一錢南星半夏赤芍藥連翹天麻白僵蚕

蒼耳子金銀花天門冬桔梗各七分白芷防風羌活皂角各五分全蝎陳皮各四分甘草二分右剉作一貼薑五片水煎服

開氣消痰湯

治胃中胃脘至咽門窄狹如線疼痛及手足俱有核如胡桃者桔梗便香附白

僵蚕各一錢陳皮片苓枳殼各七分檳榔前胡半復枳實羌活荊芥射干威靈仙各五分甘草四分木香三分右剉作一貼薑三片水煎服

內托白欵散

治腋下痰核因酒怒氣發腫痛潰膿久不差赤芍藥當歸連翹各一錢白芷白

欵片苓酒炒瓜蒌仁各八分川芎天花粉乳香各七分防風桔梗柴胡各五分白茯苓生甘草各四分右剉作一貼水煎服

消解散

治咽喉結核腫痛頸項不得回轉兩腋下或

有塊如石硬南星半夏各一錢陳皮枳實桔

蘇子蓬術蔓荊子木通甘草各五分右剉作一貼

薑三片燈心一團同煎服

消核丸

治頸項耳後結核三五歲成簇不紅不腫不

翹各一兩片芩酒炒梔子炒各八錢半夏麴玄參

酒拌牡蠣煅童便淬另研天花粉瓜蒌仁桔梗各

又方

治項後少陽經中疣瘡結核或赤硬腫痛生山

神和勻每服一錢至二錢茶清調下研甘草末一錢

痰核疣瘡商陸根生南星合搗爛塗之立消

大蜘蛛研爛好酒浸去

癭瘤

人身氣血凝滯結為癭瘤癭則憂患所生多着於



堅硬不可移者名曰石癭肉色不變名曰肉癭筋
脉露結名曰筋癭赤脉交結名曰血癭隨憂愁消
長名曰氣癭五癭皆不可決決破則膿血崩潰
多致夭枉也○癭亦氣血凝滯結聚而成初作梅
李皮嫩而光漸如盃卵癭名有六骨癭肉癭膿
血癭石癭脂癭亦不可決潰肉癭尤不可破破則
殺人惟脂癭決去其脂則愈也○癭多着頸項及肩
凝滯結成惟憂患耗傷心肺故癭隨處有之○
也勞慾邪氣乘經之虛而住故癭隨處有之○
通治癭瘤蠟礬元久服則自然消縮最妙○
指○五癭六癭或軟或硬無痛無痒宜破結散
參化癭丹海帶丸坊見紙掌散神效○結散治
癭方枯癭方化癭膏南星膏○服治癭癭藥先
須斷厚味○凡癭癭癭癭癭癭癭癭癭癭癭癭
理於年壯可無後憂也○癭癭癭癭癭癭癭癭
味流氣飲癭癭癭癭癭癭癭癭癭癭癭癭癭癭
門膏

破結散

治五癭及癭即上海藻散堅丸也○有方
生癭大如茄子潮熱形瘦百治不效得此方

去松蘿代真桑寄生一倍服
三五日其癭自消散而愈

人參化癭丹

治癭瘰癧海帶海藻蛤粉昆布上四味皆
焙澤瀉炒連翹各一兩猪鬃羊鬃

增粥饌中各十枚切片焙乾右為末蜜丸芡實大
食後噙化一九日三服○癭瘰癧多用昆布海藻海

帶鹹能軟堅
之藥治之

舐掌散

治癭海藻黃連各一兩右為末取少許置掌
中時時舐之津液嚥下如消三分之二止藥

分○一方海藻海帶昆布蓬朮青鹽等
分為末蜜丸彈子大噙化嚥下日三服

神效開結散

治癭瘰癧皆效沉香二錢木香三錢陳皮
四錢真珠四十九粒火煨猪厭肉子雞

類灯微龍絲紅散如四十九箇瓦上焙乾右為末
每二錢卧時冷酒調和徐徐嚥下輕者三五服效

重者一料
全愈

治脂瘤方

一種脂瘤粉紅色全是痰結用鍼決去脂
粉則愈或有如茄垂下根甚小者用藥點

其帶竅落即用生肌膏貼之防其出血

枯瘤方

砒礞砂砂黃丹雄黃輕粉各一錢斑貓生三
餅和丸捏作基子搽暴乾先灸三壯於瘤頂以藥
餅蓋上以黃栢末水調貼之數日自然枯落

化瘤膏

赤芍藥黃芩黃連當歸白礬各五錢吳茱萸
二錢半右為末雞子黃調勻攤帛貼之

南星膏

治瘰癧生天南星大者一箇細研滴醋三五
點為膏先將鍼刺瘤上却以藥攤紙上貼之
頻貼取效如無生者乾薑汁調付之亦佳

又方

治氣瘰癧鍼砂浸水缸中平日飲食皆用此水十
日一換鍼砂服半年自消
瘰癧結氣海藻昆布等分為末蜜丸常含化燕汁
飲之○海藻昆布等分為末蜜丸常含化燕汁
○夏枯草散瘰癧結氣水煎服即愈
○治瘰癧大蜘蛛一箇搗酒頓

服附○羊靨鹿靨酒漬
灸含燕汁七日差韃

灸法

壯治癰灸天突三七壯又灸肩髃男左十
右十七壯妙八

疳瘻

瘻者諸瘻之潰漏也狼瘻鼠瘻蝮瘻蜂瘻蟻瘻
瘻者諸瘻之潰漏也狼瘻鼠瘻蝮瘻蜂瘻蟻瘻

穿孔一深膿汁不盡風冷併入消消而成漏矣
○漏喜發於項腋及陰僻肛門之間療治失節即

生寒熱凡癰疽諸發苟有宿膿朽骨停蓄其間皆
為之漏瘻○內經曰陷脉為瘻留連肉腠者是也

可用附子灸法蒜餅灸法鐵絛灸之瘻口無
霞散或翠霞鈿子絛之外貼膏藥○治法溫散

風冷為急宜溫解散內塞散○收水次之宜牽牛
酒○生肌又次之宜龍骨牡蠣人齒犬牙加血竭

乳麝散蜂房散選用○通治宜加味蠟礬丸內生肌
牙散蜂房散選用○通治宜加味蠟礬丸內生肌

九乳麝雲母膏溫經丸○外治宜截疳散雄黃膏
黑靈散○熏方洗方取久漏中朽骨方治心漏方

取漏虫法
禁忌法

溫解散

治漏瘡散風冷蒼朮厚朴陳皮藿香半夏麴川芎白芷細辛各一錢官桂白薑甘草炙各

七分右剉作一貼入薑三棗二水煎服

內塞散

治疳瘻瘡久不差人參黃芪當歸白茯苓防風白芷桔梗川芎遠志厚朴官桂赤小豆甘

草炙各五錢附子炮一箇右為末每取二錢溫酒調下

牽牛酒

引漏瘡中惡水自大腸出黑牽牛頭末二錢入猪腰子內以線札縛濕紙包慢火煨熟空

心細嚼溫酒送下○一名猪腎酒夫水屬腎也腎虛水溢則滲漉於漏瘡行腎之水無如黑牽牛

取其細末入猪腎服之則借腎入腎兩得其便惡水既泄則不復淋漓矣

人牙散

治漏瘡惡瘡能生肌人牙煨油髮灰雄雞內金各等分右為末入麝香輕粉各少許和勻

濕則乾○一名齒髮散

蜂房散

治久年漏瘡露蜂房炙黃七錢半穿山甲焦龍骨各二錢半麝香少許右為末臘猪脂調

付之

加味蠟礬丸 治久新諸漏象牙五錢露蜂房白礬蚕

礬二兩右為末黃蠟四兩融化

內生肌丸 治漏瘡枯白礬鹿角屑脂麻各一兩為末

蜜丸梧子大溫酒下三十九竅塞後去鹿

乳麝雲母膏 治漏瘡穿山甲一百片蚌粉同炒候焦

錢麝香末半錢夾和雲母膏十五

溫經丸 治陷脉久痿附子二兩醋浸炮七次去皮臍

厚朴官桂白朮乾薑木香甘草炙各一兩右

截瘡散 治年深疔瘡瘦瘡白斂白芨黃丹密陀僧各二

錢黃連一錢龍腦麝香輕粉各二分右為末

月十

乾糝或
維之塊

雄黃膏

治久年冷癰油髮灰黃蠟各五錢雄黃末硫黃末各二錢半香油二兩右和勻熔化候成

膏貼之

黑靈散

通治漏癰露蜂房五錢牡蠣粉黃丹硫黃研各二錢半右同炒烟盡為末入油髮灰二錢

半麝香少許右和勻糝付搗

翠霞散

治漏瘡惡瘡去毒生肌滑石五錢銅綠二錢半輕粉一錢龍腦麝香粉霜各二分半右為

末蘸維瘡口上以膏貼之

翠霞錠子

治久冷漏瘡內有死肉銅綠寒水石煅滑石各三錢白礬輕粉砒礪雲母石各一錢

二分半右極細末合糊為錠子如麻黃龍細量瘡深淺絛之上貼膏藥

熏漏瘡方

艾葉五倍子白膠香苦練根右等分剉如燒香法置長桶內坐其上熏之

洗漏瘡方

凡漏瘡房孔中多有穢惡常須避風洗淨白芷露蜂房或大腹皮苦參煎湯熏洗拭乾

取東向石榴根皮為末乾糝以殺

取久漏中朽骨方

久疽及痔漏中有朽骨宜取去之

火燉通紅取出去泥研為末飯丸粟米大以紙撚送入竅內外用膏藥封之其骨自出

治心漏方

胃前有多孔常出血水謂之心漏此病醫書

等分右為末棗肉和丸梧子大空心溫酒下三十丸

取漏蟲法

取活鱧魚數條令盤屈以竹簽串定香油塗上下覆瘡上以布巾繫定良久覺痒痛

不可忍取鱧入水中有虫如線出焉未盡再覆虫盡後以艾湯入白礬洗淨黃連檳榔末糝付治廕

瘡亦妙

禁忌法

凡漏切忌七情房勞尤戒怒氣不然則核則大漏則水多

單方

治漏瘡疔瘻瘡橡斗子十二箇一實黃丹一實白礬兩藥相合定麻皮纏了燒存性研細入麝

香少許洗淨糝上之名曰烏金散○蟾○取蟾蜍去兩頭安瘡口上以艾炷灸之七壯一易不過七

救無不效○并食其肉甚效○鯉魚腸火灸封魚取膏塗之○鯉魚腸火灸封

瘡口○半日許覺痒開看○出差○鯉魚腸火灸封瘡口令滿日三易即效○鯉魚腸火灸封

肛漏多孔熟犬肉蘸藍汁食之七日差○

灸法

久漏瘡足內踝上一寸灸三壯在上則灸肩井鳩尾○冷漏多在腿足之間先雖積熱所注

久則為寒宜用附子灸法○硫黃灸法○

疥癬

疥瘡有五一日乾疥皮枯屑起宜吳茱萸散○二日濕疥疥瘡有五一日乾疥皮枯屑起宜吳茱萸散○二日

疥細如砂子或痛或痒宜剪草散○四日疥瘡疥瘡細如砂子或痛或痒宜剪草散○四日疥瘡

膿色厚焮痛宜三黃散○二日疥瘡疥瘡膿色厚焮痛宜三黃散○二日疥瘡

狀如虫行搔之汁出○二日疥瘡疥瘡狀如虫行搔之汁出○二日疥瘡

○三曰風癬○又名乾癬搔生白屑○四曰馬癬微
癢○白點相連○五曰牛癬如牛領皮厚且堅○疥
癬皆血分熱燥以致致風毒剋於皮膚浮淺者為疥
深沉者為癬疥多挾熱癬多挾濕疥狀如被介甲
癬狀如走苔薛大槩相同○治疥宜升麻和氣
飲一掃散神異膏如聖散油調立效散○升麻和氣
麻豆膏蠅蝱膏胡粉散連粉散○通治疥癬宜一
上散秘傳一擦光當歸飲子何首烏散蕪荑散浮
萍散諸○凡疥痛甚加寒水石痒加黑狗脊微
痒加蛇床子有虫加雄黃喜溫熱加硫黃研

吳茱萸散

治乾疥及春月發者以此開鬱蛇床子三
錢治寒水石二錢半白礬吳茱萸各二錢黃

栢大黃硫黃輕粉各一錢樟腦半
錢檳榔一箇右為末香油調付

一上散

治疥癬痛痒蛇床子炒黑狗脊各五錢雄黃三
錢寒水石各一兩枯白礬黃連各五錢雄黃三

錢半硫黃吳茱萸各三錢斑蝥十四箇去翅足右
為末臘猪脂或香油調先以蒼耳煎湯洗去痂後
掌中擦藥令熱鼻中嗅二三
次却擦瘡上一擦即愈

剪草散

治砂疥蛇床子三錢寒水石蕪荑各二錢剪

雄黃各五分輕粉一錢
右為末香油調付服

硫黃餅

治虫疥及喜湯火灸熨者礬製硫黃一兩為

末用水調成餅貼磁碗底覆轉用熟艾一兩為

三黃散

治膿疱疥瘡治熱為主黃芩黃連大黃各三

錢治蛇床子寒水石各二錢白礬一錢黃丹五

升麻和氣飲

治疥瘡痛痒乾葛二錢陳皮甘草各一

錢半升麻蒼朮桔梗各一錢赤芍藥七

分半大黃五分半夏當歸茯苓白芷各三

一掃散

治一切瘡疥藜蘆皮三錢蚌粉鉛粉各一錢

半雄黃七分輕粉一錢右為末另用大鯽魚

一箇入香油煎候熟去
魚攤令調藥擦瘡

神異膏

治同上全蠲七箇皂角二錢巴豆去皮七箇
蛇床子末三錢雄黃另研三錢輕粉一字清

油一兩黃蠟半兩右先用全蠲皂角巴豆入油煎
變色去三味入蠟熔化放冷入雄黃蛇床輕粉和

勻成膏先以藥水洗瘡拭
乾後乃上藥擦之神效

如聖散

治肺藏風變生瘡疥浸展胡粉一兩黃連七
錢半蛇床子五錢水銀二錢半右為末生麻

油調
塗

油調立效散

治濕疥浸淫久不差輕粉綠礬黃柏硫
黃各等分右為末生麻油調洗瘡後塗

擦
竭

麻豆膏

通治諸癬麻油二兩入巴豆肉單麻子肉各
十四粒斑貓七粒熬煎至枯黑色去滓却入

白蠟五錢蘆薈末三錢攪勻成膏塗擦之
身生癬獨莖羊蹄根另搗白礬末以米醋調成膏

塗擦之加輕粉
黃丹尤妙

蝎猫膏

治牛皮癬全蝎斑猫各十枚巴豆肉二十枚香油一兩右同熬候色焦者先去之去盡三

物了乃入黃蠟一錢候熔收貯朝擦暮愈不損皮
肉調○一方治遍身牛皮癬川烏草烏何首烏白

並蘇木各等分右麝少許常挑一匙空心酒調下
色去澤候冷入鹽少許常挑一匙空心酒調下

胡粉散

治癬神效胡粉硫黃雄黃各二錢半砒礞一
錢二分半大草烏生一箇斑猫一箇蝎梢七

枚麝香少許右為末先以半蹄根蘸
醋擦動患處次用藥少許擦之

連粉散

治風癬濕瘡黃連胡粉黃栢黃丹枯白礬各
五錢輕粉龍骨爐甘石各五分右為末乾糝

或油調
塗

秘傳一擦光

治疥癬及諸般惡瘡神效白礬枯六錢
蛇床子苦參蕪荑各五錢雄黃硫黃川

椒大風子肉各二錢半輕粉樟腦
各一錢右為末生猪脂調付

當歸飲子

治遍身疥癬腫痒流膿當歸赤芍藥川芎生地黃防風荊芥白茯苓各一錢二分何

首烏黃芪甘草各七分右生作一貼入薑三片水煎服

何首烏散

治遍身疥癬痒痒荊芥穗威靈仙蔓荊子何首烏防風甘草各等分右

為末每取二錢溫酒調下

蕪荑散

治疥無問新久亦治癬白蕪荑一兩檀榔吳茱萸各五錢硫黃二錢右為末猪脂或香油

調擦之

浮萍散

治諸疥癬及癩瘡浮萍四兩當歸川芎赤芍藥荊芥穗麻黃甘草各二錢右剉分作二貼

入葱白三莖豆豉六箇同煎服出汗

洗藥

治疥癬痒痒生瘡細辛荊芥白芷川芎黃芩防風地骨皮甘草各等分右麝末每取二兩水二

大槐煎十餘沸乘溫淋湯患處名曰八仙散○何首烏陳艾等分濃煎浸洗治遍身疥癬○冬



瓜藤煎湯浸洗亦佳
○溫泉浴最妙

單方

硫黃生用治疥癬及惡瘡臭其臭不止可愈疥
○雄黃治疥癬殺虫立效
○藜蘆治疥癬作

滓研臘猪脂擦疥殺虫立效
○羊蹄根治疥癬爛搗和醋付

末生麻油調塗疥
○殺虫立效
○藜蘆治疥癬作

之妙
○治頑癬槿樹皮加巴豆斑蝥入砒少許
○水銀

為末水調付心
○脂麻生取油付疥癬及惡瘡甚

妙
○牛皮癬久皮鞋底燒灰入輕粉少許油調

付
○田螺煮熟取肉用酒醉炒熟食除一許油調

疥
○鵝脂生磨杏仁加輕粉少許搗擦治疥

身
○銀洋三錢右為末薑汁調擦立效
○水

鍼灸法

治瘡疥頑癬取絕骨三里間使解豁委中或

瘡
○八月八日出時令患人正當東向戶長跪舉兩

手持戶兩邊取肩頭小瘡際骨解宛宛中左右兩

火俱下灸七壯七日愈
○一女子兩股間濕癬

下至膝疼痛流黃水百藥不效戴人以鍼當痒處刺青餘處血出盡煎鹽湯洗之四次方除蓋濕淫

不於血不
鍼也子可

癩頭瘡

頭上生瘡如癩防風通聖散方鹽湯爲末酒浸焙
三次食後白湯調服日三服○

散方見付之久不愈者神效
飲外雄黃水銀等分爲末
臘猪脂半生半熟調

付之濕爛者燕窠土黃柏爲末乾糝粉○白禿頭瘡宜神應膏醫○頭面瘡密陀僧硫黃各二錢輕

粉少許右爲末
塗擦極妙
又方松皮灰五錢黃丹白膠香各

二錢半 枯白礬 大黃 黃栢 各一錢 二分 右爲末 熟
油調付心卅 ○ 小兒癩頭瘡 松脂一兩 懸龍尾黃丹

各三錢白芷五錢松樹皮水銀雄黃白礬各二錢
右爲末另用香油入亂髮煎爛調勻付之

方爛木耳爲末蜜調付○又炭燒紅淬長流水令熱洗之○又胡荽子伏龍肝懸龍尾黃連白礬爲

末油調付連床散如聖黑膏亦佳
○又兔絲子或蒺藜子煎湯洗之心冊

酒歸飲

治頭瘡酒當歸白朮各一錢酒天麻蒼朮蒼耳各七分

半酒黃柏酒甘草各四分防風三分右剉作一貼水煎日三服服後穩睡片時

神應膏

治白禿頭瘡羊糞燒存性為末用鴈油調塗一二次即愈

連床散

治小兒癩頭瘡及身上諸瘡黃連五錢蛇床子五倍子各二錢半輕粉少許右為末荆芥

湯洗後油調付心

如聖黑膏

治小兒白禿頭瘡豆豉半升甘草龍膽蕪荑各二錢半右燒存性為末香油半斤熬至

四兩下藥調勻付之神效

人面瘡

多生膝上亦有臂上生者古書云冤業所生須清心悔過內服十六味流氣飲癰癩久者大苦

參九腎氣丸勸觀外用貝母為末付之着痂而愈門口人身有瘡如入面面目一鼻皆具昔有一人左膊上生瘡以歷試諸藥皆無苦至貝母其瘡乃聚色醫者教以歷試諸藥皆無苦至貝母其瘡乃聚

眉閉口其人喜曰可治即取貝母末和水灌入口中數日成痂而愈

大苦參丸

治人面瘡及臙瘡苦參二兩防風荊芥白芷川烏生赤芍藥何首烏川芎獨活活柅子

皂角蔓荊子赤茯苓山藥白茯苓黃芪羌活白附子各五錢草烏炮一錢半右為末水煮熟和丸

梧子大每服五七十丸空心酒下不飲酒以茶代

陰蝕瘡

夫陰瘡大槩有三等一曰濕陰瘡二曰妬精瘡三曰陰蝕瘡亦曰下疳瘡也○濕陰瘡者由腎

虛風濕邪氣乘之瘙痒成瘡浸淫汁出狀如疥癬○妬精瘡者由壯年久曠房室思色動慾以致則

精流入莖內陰上生瘡赤腫潰爛作白痛痒妨悶○陰蝕瘡者由熱結下焦經絡澀滯或婦人子宮

有敗精停留或月水未斷與之交合房勞後又不洗浴邪穢留滯遂令陰莖連累九腫痛小便如淋

經久潰爛侵蝕肌肉膿血不止遂成下疳瘡久不愈則必成楊梅瘡宜服仙遺糧湯坊見預防之寒

熱尿澁宜八正散妨觀濕熱甚則腫痛尿澁莖中痒痛或出白津宜龍膽瀉肝湯妨觀腫潰後八物



湯動或加柴胡梔子知母久服門下疳瘡日久
不愈或成便毒或損爛陽物多致危篤俗云疳瘡
未已便毒復來生也
疳乃督任衝三脉之會其瘡一生則便毒屬風瘡
次第而來先宜升麻葛根湯
解毒丸即愈不必服輕粉毒藥
在陰頭如栗拂之即痛甚出清膿作白孔蝕之大
痛婦人有生於玉門內正似疳蝕瘡但不痛為異
磨風膏溫潤之
○甘草湯漬之洗毒散煎湯浴之
○通用消疳敗毒散涼血解毒

丸

涼血解毒丸
治下疳瘡苦參四兩黃連二兩連翹一兩半大黃一兩二錢半惡實生乾地黃

白芷各一兩防風石膏各五錢右為末
煎湯打糊和丸梧子大空心溫水下百丸

消疳敗毒散
專治下疳瘡柴胡一錢半黃柏赤芍藥
赤茯苓木通草龍膽各九分連翹荊芥

黃連蒼朮知母各七分防風獨活各六分
草三分右剉作一貼燈心一團水煎服

洗瘡藥

凡下部諸瘡常須藥湯洗淋洗以去膿汁惡水宜洗瘡湯大豆甘草湯洗毒散洗下疳方

洗疳湯

治下疳瘡川練子黃連瓦松川椒葱根艾葉右等分煎水以青布蘸洗立效

大豆甘草湯

治陰蝕下疳瘡甘草一握右濃煎取清候溫黑豆一合槐條一握

浸浴日二

洗毒散

治陰蝕瘡及諸般惡瘡蛇床子地骨皮大薊麻黃荊芥防風枯白礬各三錢葱白三莖煎

湯溫洗

洗下疳瘡方

黃栢黃連當歸白芷獨活防風朴硝荊芥各三錢入銅錢五十文烏梅五箇鹽

一匙同煎取湯日洗四五次乃付藥

糝付藥

藥水淋洗後乃用糝付之藥宜栢蛤散津調散鳳衣散早螺散截疳散方見珍珠散磨風膏或

糝或付

栢蛤散

治下疳濕瘡黃栢以磁鋒刮取末蛤粉燥濕也

津調散

治妬精瘡黃連款冬花等分右為末先以

鳳衣散

治下疳瘡鳳凰衣煨卿雞抱黃丹各一錢輕

門

旱螺散

治同上白田螺殼煨入腦麝輕粉各少許右

殼為妙

珍珠散

治下疳瘡黃連黃栢乳香沒藥孩兒茶輕粉

洗後

磨風膏

治陰蝕瘡蛇床子五錢大風子十四箇杏仁

各三錢雄黃一錢半銀硃一錢右為末生麻

油和丸彈子大每用少許呵洋遍擦之

一方

初治下疳瘡并王莖蝕了盡用此藥也長出來如

不見星入寒水石三錢半輕粉二錢半鵬砂一錢

治舌被入咬斷

又方

皮初如少陽道與強當泄不泄不泄強泄脹斷嫩

楚日甚用荊芥黃柏甘草生葱地骨皮煎水洗去

事臨睡喫冷水勿令陽道與

又方

莖頭三五孔小漏瘡出血微膿油髮灰津唾調

黃連輕粉為末香油調塗○外腎府瘡雞卵

○陰莖上生瘡取月經布燒灰蜜調塗即愈○

付



不治證

下疳瘡重者心中疔痛
悶絕虛煩甚者不治

廉瘡

生於兩脚腫爛臭穢步履艱辛此瘡生於臚骨為
重以其骨上肉少皮薄故難愈治法當先取虫然

後外貼膏藥內服蠟礬丸
勿多行履庶可全愈

腫作痛三陰虛也宜八物湯
寒少食屬肝腎虛宜八味丸

參丸或馬齒膏濕熱者
或馬齒膏濕熱者

次貼蠟礬膏○內外通用
後貼黃蠟膏○內外通用

黃芪丸
神捷膏馬齒膏翠玉膏白膠香散貼藥三方

洗法
虫法

龍骨膏

治外臚瘡龍骨乳香沒藥密陀僧各二錢海
蛸一錢半皂角子五箇燒存性右為末用

綿紙兩重以鍼掉亂孔香油調藥
夾內縛貼瘡上隔日翻貼之

馬齒膏

治臙瘡馬齒黃蠟五兩再熬成膏塗之

蜜土膏

治外臙瘡久年蜜土或竈心黃土黃栢赤石脂黃丹各五錢輕粉乳香沒藥各一錢右

為末香油調成膏先以茶清洗後油紙攤藥貼之以巾縛定縱痒不可忍直待結痂去之未愈再貼

火邪竈心土以燥濕清熱黃栢之辛以散

礬紙

治內臙瘡神效綿紙疊十二重看瘡大小剪

四十九粒慢火熬黑去渣入槐枝四十九寸煎枯

黑去渣入黃蠟一兩枯礬一錢輕粉二分蟾蜍化

即入前紙令油滲透勿令焦黃取起貼時先以藥

黃蠟膏

治內外臙瘡香油一兩八油髮如梅大熬消

石脂血竭末各三錢攪勻候冷盛磁器每用捏作薄片貼瘡上綃帛縛定三日後翻過貼之



粉麝散 治外腫瘡臭爛數十年不愈生龜殼一箇醋

粉麝香各一錢和勻先以葱湯洗後塗上

神捷膏 治內外腫瘡久年不愈清油半斤先煎入黃

藥輕粉血竭孩兒茶枯白礬龍骨煨各三錢川椒

四錢刺孔攤藥貼瘡上一日換藥必洗淨貼上二日

翠玉膏 治腫瘡瀝青四兩黃蠟銅綠各五錢沒藥三

錢右將香油半斤同黃蠟瀝青於火上熔化

白膠香散 治內外腫瘡白膠香赤石脂枯白礬各五

錢黃丹乳香沒藥輕粉各二錢右為末乾

單方 治腫瘡黃蠟一兩猪膽一箇輕粉二錢右熔化

和勻攤油紙上貼之。又方白膠香黃柏軟

石膏各一兩青黛五錢龍骨一錢右為末香油調
付○又方羯羊屎燒存性五錢石膏二錢半赤
石脂一錢二分右為末香油調付以巾包定除根
○冷○臙瘡○鹿角灰油髮灰乳香為末清油調付
○臙瘡○成○白久不乾好砂糖屑津調塗付日二
次○臙瘡○成○白久不乾好砂糖屑津調塗付日二
真珠煨二分枯礬髮灰白麩各一分右
為末黃蠟二兩熔化調勻貼之神效
鐵法乃貼膏藥忌日光火氣陽氣如有黑腫未盡可
再出血以紫果
血盡為度

熏洗方

治臙瘡臭爛先以海桐皮石榴皮煎湯洗後
牛蒡子半兩研為末燒熏之無海桐皮煎湯洗後

骨皮代之○搗枝葱白川椒煎湯
或茶清淋洗搥乾後乃貼膏藥

取蟲方

久臙瘡宜取虫生鱗魚數條以清油塗腹下
置臙瘡上盤屈以帛繫定少頃覺痒不可忍然

後取視腹下有小竅皆虫也未盡再付却用死人
脚脛骨燒灰油調付○久臙瘡蠶魚腸以五末



火上灸貼虫
出即去之幹

腎臟風瘡

初起兩足時熱脚跟作痛多於內脛或臚上

之以腎氣丸靈方觀為主佐以四生散風方觀黃芪丸

入猪腎內煨熟空心鹽湯嚼下尤妙門血風瘡

與腎臟風瘡相類乃三陰經風熱鬱火血燥所致

瘡痒不常膿水淋漓潮熱盜汗宜四物湯加

浮萍黃芩或當歸拈痛湯足觀外治瘡風膏場見

大馬齒膏塗之門下疰瘡亦與腎臟風瘡相類

生於脚脛或打撲而成其瘡口狹皮內極闊皮薄

如竹膜極痒痛黃水淋漓積年不愈又染易他人

患者須忌房室取韭菜地地龍糞為末入輕粉清

大馬齒膏

治兩足血風瘡馬齒寃焙乾五錢黃丹黃

桐油或麻油調勻攤油紙上先

以藥水淋洗挹乾後乃貼之門

櫛柳散

治足上生瘡潰爛臭穢全蠲七箇斑貓十四箇巴豆肉十四粒櫛柳一箇香油一兩半右

慢火煎先入蠟一兩候熔去滓入蠟次入蠟油入黃柏灸蛇床子

各二錢雄黃硫黃黃丹海螵蛸各一錢白膠香黃連杏仁輕粉各半錢右為末入蠟油中調勻藥水

洗瘡付之立效

活血驅風散

治腎藏風瘡痒痛此由肝腎虛為風濕所侵也蒼朮炒杜仲薑汁炒肉桂天麻

薏苡仁橘紅櫛柳厚朴枳殼各六分當歸川芎白芷細辛白蒺藜炒桃仁白芍藥半夏五靈脂甘草

各五分右剉作一貼薑五片棗二枚同煎入乳香末少許空心服

雞心散

治腎藏風發瘡疥雞心櫛柳二箇破開以黃丹三錢合在內濕紙裹煨全蠲六箇硫黃四

錢入輕粉青黛各半錢麝香少許右和勻磁器收貯每用少許清油調抹兩掌掩外腎女掩兩乳各

睡至醒次日又用之經驗

單方

脚肚上生瘡漸大爬搔不已痒不可忍石榴

浸淫瘡

初生甚小先痒後痛汁出浸淫濕爛肌肉延至

流向四肢者可治從四肢流來入口者不可治

宜○小兒浸淫瘡

苦瓠散

梁苦瓠二兩蛇蛻燒灰蜂房微炒各五錢

單方

卒得浸淫瘡不早治周身則殺人胡麻生爛

米熬黃杵末水調付之○雞冠熟血

凍瘡

冬月凍傷成瘡流水俗呼為凍瘡宜用生附散白

之門○足凍爛生瘡黃丹猪脂調付○足跟凍

末調牛骨髓付之○蠟等分清油減半熬膏塗之○雄雞五倍子煎湯洗

後取兔腦髓雀

生附散

治凍瘡爛痛生附子

白斂散

治凍耳成瘡黃栢白斂各五錢
右為末鹽湯洗後油調付之

如神散

治凍瘡皮爛不可忍大黃細末
新水調塗瘡上痛止立效

臘享膏

治凍瘡猪脂獾油各二兩半香油二合半海
松子油一合松脂黃蠟各三兩七錢半右各

煉去滓和合成膏先
以藥水洗後塗之

湯火瘡

凡湯火燒傷初時強忍痛急向火灸強忍一時
即不痛慎勿以冷物搨之使熱毒不出免爛入

筋骨用寒水石三兩半黃栢黃連黃芩梔子大黃
赤石脂各五錢片腦少許右為末鴨子清調付酒
調亦可入湯火瘡宜赤石脂散保生救苦散黃
栢散冰霜散四黃散燭○火燒以好酒洗之以鹽
付上○皮脫者酒熬牛皮膠付之○湯傷者以淋
過第二次灰滓付之○熱酒傷者糯米粉炒黑末

酒調付之心冊○湯火燒
瘡大黃當歸油調付心冊

赤石脂散治湯火傷瘡赤石脂寒水石大黃

保生救苦散治湯火熱油所傷爛痛寒水石大黃黃

煉

黃栢散治同上雞子殼黃栢朴硝大黃寒水

冰霜散治湯火熱油所傷皮爛肉痛寒水石朴硝青

油調塗
之心冊

四黃散治同上大黃黃芩黃連黃栢白芨

單方湯火瘡黃蜀葵花為末新水調塗之心冊

側栢葉搗爛如泥冷水調塗以帛繫定二三日愈
乾○生梨切片貼之不爛止痛乾○生胡麻爛搗

如泥付之。○生白礬為末，香油調塗。○湯火傷及熱油傷，白蜜塗之。竹中白膜貼之，日三，痛立止。即愈。○醋泥付之。無痕。豆醬汁付之，妙。○

翻花瘡

翻出一肉突如菌，或如蛇形，長數寸。雄黃為末，付之內服，十全大補湯，或八物湯，是。○

民歸本外用，藜蘆為末，猪脂調塗，日一易。候元氣漸復，腫毒將盡，時塗之，則努肉自入。○

出若誤用鍼刀，蝕灸必危。○中品。○治翻花瘡。○一名綿花瘡。○一名廣東瘡。○川芎天

花粉各五錢，輕粉二錢，半朱砂，雄黃各一錢，二分。半麝香五分，右為末，蒸餅和，丸。○

至九。○酒下。○

中品錠子

專治翻花瘡及癰瘤。白礬三兩，八錢，半乳香沒藥各五錢，半朱砂三錢，牛黃七分，半

硃砂五分，熟五分，生砒礬一兩，半火煨黑，烟止。用淡青烟，右為末，麪糊和勻，捻作錠子，量瘡揷入。○

單方

治翻花瘡。○柳枝葉濃煎，作膏塗之。○



漆瘡

人有惡漆者因見漆中毒生瘡面痒而腫遍身皴痛生蟹取黃塗之○石蟹取汁頻塗之○

茶末油調付柳枝葉煎湯洗○井中苔搗付之○洗之針○鐵漿頻洗即差○

○川椒煎湯洗之即愈○生薑真汁付之亦可○雞子黃塗之○乾○韭葉研付之○紫蘇葉搗

爛擦之

軟癰

內有小癰血也世謂之熱癰大如酸棗或如豆色赤而

雞一抱卵殼燒灰入輕粉少許油調付之○大枳殼一投去瓢磨令口平以稠麩糊塗四唇覆貼

上自破膿出甚妙

豬頭散

治軟癰愈而復作野蜂房二三箇燒為末另用巴豆肉三七粒清油煎三沸去豆取油調

蜂房末付之立效○又枯白礬末油調付亦效此方療病有以豬頭為謝故名之

三物散

治鬚邊生軟癰名發鬚有數年不愈用此極妙猪頸上毛猫頸上毛各燒存性各一撮鼠

屎一枝右為末加輕粉少許清油調付

大黃膏

治軟癰大黃黃柏當歸各等分右為末以生地黄汁調塗之

有名無名諸惡瘡

瘡走皮癢天行斑瘡白蛇纏瘡魚目瘡熱毒

瘡火斑瘡此皆有各瘡也○此外皆無名諸惡瘡也○又有洗瘡法殺虫法生肌法諸瘡中風水作

痛法

蒲萄瘡

瘡頭如蒲萄色四圍腫起先追膿盡次用水梅罨之神愈

天行斑瘡

人身發天行斑瘡一身周匝如火瘡皆戴白漿不治則數日必死差後瘡癰一歲

方滅此惡毒之氣所為取好蜜煎升麻數洗拭塗之鞣○又煮葵菜葉以蒜蘆啖之數日即止

月蝕瘡

小兒多有之生耳後隨月盛衰胡粉炒黃枯白礬黃丹黃連輕粉各二錢乾胭脂一錢

香少許右為末香油調塗○又黃連枯礬末付之妙



內疳瘡

生於口上腭初發如蓮花根帶小而下垂乃大治法以鈎刀決其根燒鐵烙以止其血次

以雄黃輕粉粉霜白芷白斂為末付之以槐枝作枕支其牙頰間毋使口合一兩時許瘡癰定合口

自便吹付之膿

癰瘡

生手足間相對如新菜萁痒痛折裂有孔如蝸久不愈杏仁乳香各三錢硫黃輕粉各一錢半

右為末麻油三錢入黃蠟五錢熔化入前藥末攪煎成膏塗之

走皮癰瘡

生滿頰項發如豆梅蔓延兩耳流汁濕爛先用桑寄生聯惻桑根皮各一握白芷

黃連各少許煎湯洗之候血盡次用皂莢竹笋皮燒存性黃栢白芷藍葉等分為末清油調塗神效

○小兒胎瘡皂角枯禁輕粉黃栢黃連為末敷之

皮葱白煎湯洗後生藍葉生艾葉入蜜搗付

蛇纏瘡

身上生瘡有頭尾儼似蛇形初起宜隔蒜於頭上灸之雄黃為末醋調付之又酒調服之

門○遍身生瘡狀如蛇頭取蠟磬
九癩觀每服百丸大有神效門

魚目瘡

遍身生瘡如魚目無膿又名征虜瘡升麻
剉水濃煎入蜜二三匙鵝翎蘸拭洗瘡

熱毒瘡

遍身生熱毒瘡痛而不痒粘着衣被夜不得
睡苜蒲作末厚布席上恣卧其間不五七日

其瘡如失應手神驗
宜用紫草膏葵花散

火斑瘡

入常近火則多生火斑瘡出汁痛痒黃柏
薄荷葉為末糝之即安或煎湯洗亦佳

諸般惡瘡

諸般遍身瘡及惡瘡出膿血痛痒宜涼血
飲又平血飲合人參敗毒散

疎風解毒散合掌散松脂貼敷二黃膏貝母膏金
華散爐灰膏青金錠子一掃光生肌散黃蠟膏洗

藥方殺虫方生肌方諸
瘡中風水方單方

平血飲

治諸瘡遍身出膿血痛痒即升麻葛根湯
加天麻蟬殼也右剉與人參敗毒散合和

加生薑薄荷生地
黃麥門冬煎服

凉血飲

治血熱生瘡赤芍藥黃芩川芎荊芥生苧麥門冬天花粉甘草各一錢右剉作一貼入燈

心十莖竹葉十片煎服

連翹飲

治惡瘡遍身痛痒及血風瘡連翹赤芍藥當歸荊芥防風惡實川芎梔子黃芩瞿麥木通生乾地黃瓜蒌根麥門冬甘草各七分右剉作一貼入燈心一塊水煎服

疎風解毒散

治遍身瘡痒痛白芷細辛蒺藜子炒麻黃檳榔當歸鬚生乾地黃川芎赤芍藥獨活白牽牛微炒桑白皮炒蒼朮炒枳殼甘草炙各七分右剉作一貼入黑豆七十粒紫蘇五葉生薑五片同煎服

煎服

紫草膏

治熱毒瘡紫草茸黃連黃柏廬各五錢赤小豆末茶豆粉各一合右為末猪脂或清油調日三付

葵花散

治一切熱瘡鬱金黃連黃柏梔子葵花各等分右為末冷水調膏貼之神效

合掌散

治遍身生瘡百藥不效攢柳玉箇為末疏黃生研五錢輕粉半錢右為末每一錢安手掌

內油調夜卧時塗外腎不得洗手但擦手令乾一二日即愈

松脂貼散

治一切惡瘡及無名瘡黃柏黃連松脂翻臘粉土蜂窠似翫甘草各一錢右為末另

取水銀一錢放在掌心以唾擦為泥入磁器中和藥末及清油令如稀餡先以藥水洗瘡拭乾塗之

即愈治疥尤妙

二黃膏

治一切惡瘡清油三兩煎巴豆肉二十粒微黑色去豆入黃蠟一兩熔化又入硫黃雄黃

末各一錢和勻成膏以藥水洗瘡後擦付二三次神效

貝母膏

治諸惡瘡貝母三錢半夏三錢南星五倍子白芷黃柏苦參各二錢半黃丹一錢半雄

黃一錢右為末蜜水調付或乾摻

金華散

治一切濕熱惡瘡亦療小兒黃丹一兩黃柏黃連各五錢輕粉一錢右為末藥水洗後摻

之貼
心冊

爐灰膏 治一切惡瘡除去
瘡肉最妙

青金錠子 治諸惡瘡膿出不快及多年疔瘻瘡白丁
香銅綠硃砂粉霜輕粉各五分麝香龍腦

各一字 右為末 麵糊和 搥作錠
子 入瘡口中 或糝付亦可

一掃光 治小兒頭瘡及多虱子瘡痒成瘡膿水不止
細茶 水銀 各一錢 同研 細牙皂 川椒 各二錢

右為末 油調 擦上

生肌散 治一切瘡斂口大效 寒水石 煨 滑石 各一兩
烏賊骨 龍骨 各五錢 蜜陀僧 枯白礬 乾胭脂

定粉 各二錢 半 右為末 乾糝 瘡中妙

黃蠟膏 治諸瘡能生肌香油黃蠟松脂各等分
右熔化待凝貼之 加油 髮灰 尤妙

洗藥方 治諸般惡瘡黃柏茵陳荊芥葱白藿香煎水
淋洗為妙 藥 洗諸般惡瘡毒艾葉細茶葱

白桃枝柳枝川椒濃煎湯入鹽頻洗

殺蟲方

治惡瘡有虫膽礬輕粉乳香各一錢硃砂雄黃土蜂房各二錢龍骨虎骨白礬露蜂房各

二錢半麝香五分片腦一字右為末藥水洗後付之神效

山甲五片燒灰麝香一字右為末茶清調塗

生肌方

治惡瘡令生肌宜用生肌散黃蠟膏

用消蝕之藥直待黑肉去盡方可上生肌散如開瘡口用生肌去死肉用煨砒生好肉去砒加

枯白礬

諸瘡中風水發腫痛

凡瘡瘍未合風入為破傷風濕入為破傷人最急宜

慎之。諸瘡入皂角水及惡水熱痛不止皂角子燒存性研二錢半砂糖末五錢和勻如膏貼瘡上。諸瘡中風水疼腫鯉魚目燒灰研付汁出印愈。諸魚目並得。又方川椒一升和麪作餅

灰火煨熟斷開口封合瘡上冷則易出水即差
○又方桑柴灰淋汁漬之冷復易○又方葱白
連鬚煮湯洗之或連莖葉煨研罾付○又方薤
白搗爛火灸令熱付瘡上以帛裹定冷則易出水
即差

單方

治惡瘡及諸瘡生胡麻油塗之妙生麻油亦可
○馬齒莧爛搗付上便愈○熊膽汁塗之

妙○犬膽亦可○蟾蜍燒灰油調付諸惡瘡甚妙
○久遠惡瘡不差蛇蛻燒灰油調付○

朝生暮落花一名鬼蓋即朝菌也生糞穢處如菌
作末和油塗之甚佳牛糞上黑菌尤佳○一切

惡瘡蠅蛆十枚端午日收乾作末油調付○臘
猪脂療惡瘡和雄黃輕粉付之妙○鼯鼠膏主

惡瘡塗之妙○經霜芭蕉葉為末香油調付○
○石灰淋取汁溫洗妙○雄黃硫黃治惡瘡為

第一○小便澀出一婦人臍下連二陰患惡瘡熱痒而痛
大○小便澀出一婦人臍下連二陰患惡瘡熱痒而痛

扶取馬齒莧四兩青黛一兩同研勻付瘡上乾則
易新者仍服八正散○

瘡貝母末入雄
黃少許糝之

東醫寶鑑雜病篇卷之八

