


東醫圖書寶鑑

奎章閣圖書
7608
1
19

奎章閣圖書	
部別	分類記號
	圖書番號 貴1933
	一部冊數 24
	內別番號 18
서울대학교	

東醫西寶鑑



雜病篇九

諸傷

解毒

救急

怪疾

雜方

東醫寶鑑雜病篇卷之九

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

諸傷

金刃傷

金瘡腸斷者視病淺深各有生死腸一頭見者不可連也若腹痛短氣不得飲食者大腸一日

半死小腸三日死腸兩頭見者可速續之先以鍼縷如法連續之斷腸便取雞冠血塗其際勿令氣

泄即推納之但出不斷者作大麥粥取汁洗腸以漬納之且作粥清稍稍飲之二十餘日乃喫糜粥



百日後乃可進飯○金瘡失血其人當苦渴然須忍之常令乾食可與肥脂之物以止其渴又不

得多飲粥則血溢出血入也又忌嗔怒及大言笑動作勞力及食鹹酸熱酒熱羹輩皆使瘡痛衝發

甚者即死○凡金瘡及折傷不可飲冷水血見寒則凝入心即死

不治證

難過○左脇下傷透內者○腸傷斷一半可



東醫寶鑑雜病篇卷之九

御醫忠勤貞亮扈聖功臣宗祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

諸傷

金刃傷

金刃傷不可連也若腹痛短氣不得飲食者大腸一頭見者

半死如法連續三日死腸兩頭見者可連續之先以鍼

縷如法連續之國腸便取雞冠血塗其際勿令氣

泄則推納之且作粥清稍稍飲之二十餘日乃喫糜粥

漬納之後乃可進飯○金瘡失血其人當苦渴然

須忍之常令乾食可與肥脂之物以止其渴又不

得多飲粥則血溢出血殺入也又忌嗔怒及大言笑

動作勞力及食鹹酸熱酒熱羹輩皆使瘡痛衝發

甚者即死○金瘡入心即折傷不可

飲冷水血見寒則疑入心即折傷不可

不治證難過○左脇下傷透內者○腸傷斷一

半可

○醫全斷不可治○小腹下傷內者○證候繁多者○
○脉不實重者○老人左股壓碎者○傷破陰子
者○血出盡者○肩內耳後傷透於內者皆不必
用藥○凡金瘡傷天窓欲眉角腦後臂裏跳脉
解內陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五藏六府俞
皆死處又破腦出髓而不能語戴眼直視喉中沸
聲口急唾出兩手
妄舉皆不治○

金瘡脉候

金瘡出血太多其脉虛細者生數實者死○
金瘡出血脉沉小者生浮大者死斫刺出血

不至脉來大者七日死滑細者生
虛細則宜實大則傾竭○傷雖淺命脉虛促可慮
傷至重命脉和緩永無慮也○血出
甚者脉不要洪大只要平正重實竭

腸肚傷治法

可治。○腸出在外，若腸全斷，難醫。不斷者，及肚皮破者，所縷爲線，或桑

白皮尖茸爲線以花蓋石散付線上從裏縫之腸
子則以清油熬活放入肚內乃縫肚皮不可縫外
重皮留皮開用藥糝符生肉○傷破肚皮腸與
脂膏俱出尤用湯藥如活血散佛手散歸脾湯與服

用手擘去膏不妨此是閑肉放心去之然後推腸
入內用線縫之仍服通利藥勿令二便秘澀

金瘡先宜調血

大凡金瘡及折傷墜墮內損者必有
瘀血停積先宜逐去瘀血若亡血過

多則調養氣血為主
散導滯散破血消痛湯復元活血湯皆可用
花益石散奪命散雞鳴

止血生肌合瘡藥

在傷至重者海味中鹹白鱈成片鋪
血收口方白膠香老松皮白芷血竭為末付之單

血竭末付之尤妙
○黃丹滑石末付之夏月以薄

荷葉貼之一日一次以藥水湯洗
○金傷散糝

付神效
○金瘡血不止黃丹白礬為末糝之又
下子蚕蛾燒灰付之
○下蚕室瘡不合取所割

勢火燬為末酒調服昔有一人自割其勢瘡久不
合用此方不
數日而愈

箭鏃及金刃中骨脉不出

白歛半夏等分為末每取
一錢淡薑湯調服日三至

二十日自出
○箭鏃及鍼入肉不出象牙屑和
水塗其上又螻蛄取汁頻塗又鼠腦塗之又好磁

石着其上
自出鱉

救急方

其金瘡及諸傷重痛悶欲死取牛一隻剖腹納

末醋湯調飲出血而愈或戰陣砲矢所傷血流滿

體氣貫胃膈悶絕者亦甦
熱尿多灌即甦
童尿尤好

活血散

治刀鎗傷腹裂腸出者黃芪當歸川芎白芷
續斷赤芍藥鹿茸黃芩細辛乾薑附子炮各

等分右為末每三錢溫
酒調服日三立驗

花藥石散

治一切金刃斫傷及打撲損傷牛馬交踢
或至死者急於傷處糝藥其血化為黃水

再服藥便活更不疼痛如藏府有瘀血內損煩悶
欲死服此藥則化為黃水或吐或下泄出花藥

石四兩礪黃一兩為末入瓦罐內鹽泥固濟晒乾
安四方磚上以炭火從巳午時煨至經宿候冷取

出研細每取一大匙童
尿入酒煎熱調服

奪命散

治金刃所傷及從高墮落木石壓損瘀血瘀積心腹疼痛二便不通水蛭以石灰拌炒焦五

錢大黃黑牽牛頭末各二兩右為末每取二錢熱酒調下過數時無效再用一服以下惡血為度

雞鳴散

治金刃傷打撲傷血瘀凝積煩悶欲絕大黃酒蒸五錢當歸尾三錢桃仁二七粒研右剉

作一貼酒煎雞鳴時服次日下瘀血即愈治折傷亦妙

導滯散

治傷損內有瘀血大便不通壅滯欲死大黃一兩當歸二錢半麝香少許右為末每三錢

熱酒調下

破血消痛湯

治傷損墮落惡血流於脇下痛楚不能轉側水蛭炒烟盡另研三錢柴胡連翹

當歸梢各二錢蘇木一錢半羌活防風桂皮各一錢麝香少許右除水蛭麝香外餘藥剉作一貼酒

水相半煎去滓入蛭麝調服空心兩貼立愈

復元活血湯

治同上大黃二錢半當歸一錢七分柴胡一錢半穿山甲炒研瓜蒌根甘草各

一錢桃仁十箇為泥紅花五分
右剉作一貼酒水相半煎服

金傷散

治一切金瘡重午日早朝使四人各出四方
採草木莖葉各半把至日午時入石灰一斤

同搗極爛鑿大桑木三兩株作孔納藥實等以桑
皮蔽之油調石灰密塗之勿令泄氣更以桑皮填

固至九月九日午時取出陰乾百
日搗羅為末如遇傷慘之神效藥

單方

凡二十種

新汲水

人金瘡及損傷腸出以新汲
泉水實之令身禁腸自入也

石灰

療金瘡甚良人為金刃所傷以石灰末覆之定
痛止血神效○又石灰和雞子白火煨為末付

瘡立
差

葛根

療金瘡止痛為末付之
又濃煎取汁服之

桑白皮

可以縫金瘡取生皮作線縫腹破腸出者唐
安金臧剖腹用此法便愈○神仙刀箭藥妙

不可言桑葉為末乾糝之○
金瘡止痛桑柴灰付之佳

蝼蛄

箭鏃入骨不可拔微熬巴豆與蟬蛻同研勻塗
度箭鏃在咽喉胃膈不出蟬蛻搗取汁滴上三五

出痒鍼自

蟬蛻

傷處待極痒便撼動拔之立出後以生肌膏貼

之○出箭鏃方蟬蛻全者麝香少許
同為末搽動箭頭藥瘡內自出

旋菑根

即旋花根也合金瘡續斷筋取
根搗汁滴瘡中滓封瘡上妙

象牙

主箭鏃及鍼入肉不出為末和
水付瘡上即出舊牙梳尤佳

蝙蝠

主金瘡出血內漏取二枚燒為末每一錢和
水服令一日服盡當下如水乃血消也

黑虱

主箭頭入肉不出取頭上黑虱
及人牙齒同研塗之即出

葱

治金瘡因驚出血不止取葱灸熟授取汁付之血
即止○金瘡中風水腫痛葱莖葉煨研罾付立愈

韃

身醫等金藥方卷二

下

三

小麥

主腸出不入小麥五升水九升煮取四升去滓
令極冷使人含嚙瘡上又嚙其背腸漸自入勿

令衆人見韃

石榴花

治金瘡血流不止石榴花和石灰搗爲末糝之血使斷韃

壁錢

主金瘡血不止取汁點瘡上良韃

鼠腦肝

治箭鏃及鍼刀在咽喉胃膈諸隱處不出取生鼠腦及肝搗付之即出韃

紫檀香

治金瘡急刮紫檀末付之止血止痛至妙韃

血竭

療金瘡止血止血止痛生肌最妙刮屑付之但性急不可多用韃

琥珀

止血生肌合金瘡作末付之○中弩箭悶絕琥珀末一錢童尿調服妙韃

蛇含草

主金瘡搗付之佳○又云蛇含膏連已斷之指韃

青蒿

生授付金瘡止血

熟艾

或搗金瘡止血止痛易合

小薊

主金瘡血不止

藍葉汁

金瘡血悶取

車胎

鍼入肉不出取車胎脂攤紙上

擗撲墮落壓倒傷

凡墮壓死者急安好處以袖掩其口

之若初覺氣絕急擘開口以熱小便灌之利去瘀

血如僧打坐令一人將其頭後控放低以半夏末

或皂角末吹入鼻內如活却以薑汁香油打勻灌

之胸○若取藥不及急扶開口以熱小便多灌之

筋

骨皮肉皆出血不止或瘀血停積若去之不早

則有入腹攻心之患○跌撲傷損須用蘇木活

血黃連降火白朮和中以童便煎服妙傷在上宜
飲韭汁。○凡顛打壓傷或從高墮落皆驚動四
肢五藏必有惡血在內專怕惡心先用通二便藥
和童便服之立效大小腸俱通利則自無煩悶攻
心之患矣。○凡傷損專主血論肝主血不問何
經所傷惡血必歸於肝流於脇鬱於腹而作脹痛
實者下之宜通導散桃仁承氣湯。○凡
上虛者復元活血湯。○見當歸鬚散調之。○凡
出血已多而又嘔血不止者難治宜用蘇木煎湯
調蚌霜散服之。○諸傷疼痛宜乳香定痛散。○乳
香散雙烏散。○尋痛元陣王丹補損當歸散。○蘇
合香元治打撲墮落挾驚悸氣血錯亂昏迷不省
急取三五丸溫酒童便調灌即甦。○方觀瀾門。○頭
上有傷或打破或金刃傷用藥糊角縛不使傷風

慎之

通導散

治傷損極重大小便不通心腹脹悶宜用此

仁各一錢厚朴陳皮木通枳殼甘草各五分
剉作一貼水煎空心服。○一名大成湯。○右

當歸鬚散

治打撲損傷致氣凝血結胃腹脇痛當歸尾一錢半赤芍藥烏藥香附子蘇木各一

錢紅花八分桃仁七分桂皮六分甘草五分

蚌霜散

治傷損大吐血鮮粉百草霜各等分

乳香定痛散

治諸傷損疼痛白芷當歸生芩牡丹皮赤芍藥川芎乳香沒藥白朮甘草各等

分右為末每二錢溫酒童便各半調勻服之

乳香散

治打撲傷損痛不可忍白朮炒當歸炒白芷桂皮乳香沒藥甘草各等分

溫酒調下

雙烏散

治諸傷損久後時常疼痛者及新被傷作痛亦宜川烏草烏略炮各二錢當歸白芍藥

蘇木大黃生乾地黃紅麴炒各五錢麝香少許右為末入瓦瓶以酒煮放冷服如覺麻痺無害但草

烏生用恐太猛所以畧炮

尋痛元

治諸傷止痛清心行氣活血如神草烏生用乳香火熨後藥火熨五靈脂各三錢生麝香

少許右為末酒糊丸如指頭大朱砂為衣每丸薄荷湯薑汁磨化服得

陣王丹

治諸折傷止血定痛大黃一兩石灰六兩右同炒紫色為度去火毒搗篩為末敷傷處妙

門

補損當歸散

治墮撲折傷疼痛連川芎一兩半桂心川

椒當歸甘草各七錢半附子炮澤蘭各二錢半右為末每二錢溫酒調服效如神

打撲傷消腫滅癰

發熱以九味羌活湯煎服取

汗外用杏仁搗爛入白麪少許新汲水調付瘡上腫即消○治傷損腫痛瘀血流注紫黑或傷眼

上青黑不散大黃為末生薑汁調付患處即消名將軍膏○散被毆癰痕亦治跌撲麻油清酒各

一搥同煎數沸服之服了卧火燒熱地上一夜痛止腫消無痕有被傷者仇家陰令術士以此治之

次日驗審了無一毫傷痕。翻瓦上打撲傷肌膚青腫。

酒調二錢服一
夜消盡無痕。

脉候及不治證凡打撲損傷內有瘀血其脉堅強者生

當虛細若得急疾大數者死。醫○凡折傷外損筋

骨者可治內損藏府裏膜及破陰子耳後者並不

單方凡十

蒲黃治撲損瘀血在內煩悶蒲

白楊樹皮治撲損瘀血痛不可忍

生龜治撲損厚塗傷處立效。飲之

鱉主打撲跌折血在脇下堅滿痛

鼠屎

治落傷筋骨痛不可忍取屎燒為末猪脂調急裹之不過半日愈

荷葉

治打撲落傷惡血攻心悶亂乾葉燒為末童便調服尿調下二錢日三〇未展荷葉為末童便調服

利下惡物

胡桃

壓撲傷損胡桃肉搗爛和溫酒頓服便差

麻根

主打撲落傷或煮服之非時則取乾麻煮汁飲

稻稈灰

治墮落撲損痛楚稻稈灰和糟酒淋灰取汁乘溫淋洗痛處立差

芥子

撲損瘀血作痛芥子研微煖塗貼患處即效

葱白

治打撲傷損痛不可忍取葱白入糖火煨乘熱擘開其中用有涕便將罨損處冷則易熟者須更

痛定韃〇又葱白砂糖等分爛研付之痛立止且無癢痕

人尿

主撲損落傷瘀血攻心暈絕熱尿頓服一二升即甦童子尿尤佳

烏雞

被壓窄墮舟車轢馬踢牛觸胃腹破脂四肢

酒一升得喘以新布搗病處取藥塗布上奄定乾

乾

烏鴉

羽翅墮落損傷瘀血脹心面青氣短取右

犬膽

治撲損刀箭傷內有瘀血取膽熱酒調服瘀血

亦有奇效

酒糟

主打撲墮落損傷瘀血腫痛

水蛭

主墮撲落傷折傷內有瘀血水蛭炒焦為末

骨折筋斷傷

九脚手各有六出白四折骨每手有三處

互相鎖或出白則是挫出鎖骨之外須是搗骨於

入外方入窠臼只用手拽斷難入窠十有八九成
瘡疾也○骨節損折肘臂腰膝出臼蹉跌須用

法整頓歸元先用麻藥與服使不知痛然後可用
手法整頓○搗骨歸窠用竹一片性柳鉢板夾定一

邊一愈後不用夾須存屈直處時時拽屈拽直不然
則愈後曲直一得○凡骨碎者須用麻藥腳

與服或用刀割開甚者用剪剪去骨鋒使不衝破
肉或有粉碎者與去細骨免膿血之禍且以藥水

一日一洗莫令臭穢○凡骨碎者用接骨藥火
上化開糊骨上然後夾定外用夾骨法活血散接

骨丹二生膏糯米膏內服麥斗散沒藥降聖丹接
骨散自然銅散接骨紫金丹○淋洗用蔓荊散

草烏散即麻藥也凡骨節出臼用此麻之然後用手
整頓皂角木鱉子紫金皮白芷半夏烏藥當

歸川芎川烏各一兩二錢半草烏苗香坐拏草各
二錢半木香一錢並無煨製右為末諸樣骨節出

臼窠者每服二錢好紅酒調下麻倒不識痛處然
後或用刀割開或剪去骨鋒以下整頓骨節歸

用夾夾定然後醫治如箭鏃入骨不出亦用此藥
麻後或鉗出或鑿開取出然後取鹽湯或鹽水與

服立醒

夾骨法

小蠟四箇皮硝三分生薑一兩酒糟一
搗腫者加紅內消調勻同搗敷折傷之處

門

活血散

治折傷處以桑皮夾定其效如神一方熟酒醋

調付

接骨丹

當歸七錢半川芎沒藥骨碎補各五錢川烏
煨四錢古文錢三箇火煨醋淬七次乳香一

錢半木香一錢黃香松脂六兩香油一兩半右為
末和油成膏攤油紙貼患處如骨碎筋斷用此復

續如初

二生膏

治折傷手足生地黃一介生薑四兩右搗爛
入酒糟一斤炒熱布裹罨傷處熨之傷筋損

骨痛不可忍神效
黃搗爛攤油紙上
次搽木香末一層又攤地黃貼

患處明目痛中止痛○治折傷斷筋損骨生地黃
搗取汁好酒和服日二三次最妙又搗爛蒸熟封

傷處一月筋骨連
續蓋地黃屬骨

糯米膏

治撲傷筋斷骨折糯米一升皂角切碎半升
銅錢百箇同炒至焦黑去錢右為末酒調膏

貼患處
神效

麥斗散

治跌傷骨節上驚一箇瓦上焙巴豆一箇去
殼半夏一箇生乳香沒藥各半分自然銅火

煨醋淬七次用些少右為細末溫清酒調服一釐
如重車行十里之久其骨接之有聲初跌之時須

整理如舊以綿衣蓋覆方服
藥勿轉動端午日製尤妙

沒藥降聖丹

治打撲閃肭筋斷骨折痛不可忍生乾
地黃川芎各一錢半自然銅火煨醋淬

十二次另研川烏生骨碎補白芍藥當歸乳香沒
藥各一錢右為末薑汁與蜜補白芍藥當歸乳香沒

四錢每服一匙水酒各半盞入蘇木
一錢同煎去蘇木調藥空心熱服

接骨散

治骨折乳香沒藥各二錢半自然銅煨淬力研五錢滑石一兩龍骨赤石脂各一錢半麝香少許右為末好醋浸潤煮乾炒燥為末臨睡服時入麝香和勻溫酒調下一錢若骨已接去龍骨

赤石脂而服極效○一方將藥除麝香浸酒煮乾為末黃蠟五錢熔化乃入麝和勻作丸彈子大

每空丸酒煎以東南柳枝攪散空心熱服名曰接骨丹

自然銅散治打撲筋骨折傷乳香沒藥蘇木降真香

自然銅散

治打撲筋骨折傷乳香沒藥蘇木降真香半血竭一錢地龍土狗五箇油浸焙右為末每五錢

好酒調下自頂心尋病至下雨手兩足周遍一身病入自覺藥力習習往來遇病處則颯颯有聲

接骨紫金丹治跌打骨折瘀血攻心發熱昏暈土驚

接骨紫金丹

治跌打骨折瘀血攻心發熱昏暈土驚碎補大黃血竭當歸尾乳香沒藥鵬砂各一錢右為末每取八釐熱酒調服其骨自接

蔓荊散治打落筋骨折傷瘀血結痛頑荊葉獮蚃

蔓荊散

治打落筋骨折傷瘀血結痛頑荊葉獮蚃蔓荊子白芷細辛防風川芎桂皮丁香皮羌

活各一兩右為麤末每一兩入鹽一匙連鬚葱白五莖漿水五升煎七沸淋洗痛處冷則易

單方九種

赤銅屑

治打撲墮落骨折傷取赤銅火煨醋淬七次或九次細研溫酒調一字或半錢服直入骨

損處錐之。有人墮馬折足取銅末和酒服遂瘞亡後十餘年改葬視脛骨折處有銅束之

自然銅

療傷損骨折火煨醋淬七次研細水飛同當歸沒藥各半錢溫酒調服仍以手摩痛處

骨。此藥新火煨者有毒若折不碎骨則不可用自然銅

合歡皮

主骨折專能接骨取皮炒黑色四兩芥子炒一兩右末酒調二錢服以滓罨傷處

生地黄

主屬骨若傷損骨碎生地黄爛搗蒸熟裹傷處日再易

續斷

治撲損瘀血能續筋骨煮汁內服外搗付之

旋菑根

即旋花根也療被斫筋斷取根搗汁瀝瘡中以滓封瘡上日二三易筋便續

白蠟

屬金稟收斂堅凝之氣外科之要藥生肌止血

蟹

微脚中髓及腦并該中黃並能續斷折筋骨取碎之

蟾蜍

療跌折骨破血結取汁

人中白

治閃挫跌撲傷骨極重人中

牡鼠

療折傷筋骨生搏付傷處

生栗

主筋骨折碎血瘀腫痛細嚼生栗塗付

萵苣子

主打落折傷取子微炒為末酒服

烏雄雞

主跌折骨傷骨痛取血和酒服仍破腹罨傷

勻溫酒調下
二錢空心

療傷斷耳鼻舌方

治擦落耳鼻用油煖灰末垂急以所





人爲驢所咬下鼻一僧用此綴之神效。○自行
顛仆穿斷舌心血出不止取米醋以雞翎刷斷
處其血即止。仍用蒲黃杏仁鵬砂少許爲末蜜調
禽化而愈。○接指方蘇木爲末敷斷指間接定
外用蚕蛭包縛完固數日如故。○一人落馬被
所佩鎖匙傷破陰囊二丸脫落懸掛未斷痛苦無
任諸藥不效。予教人漫漫托上多取壁
錢敷貼傷處日漸就安其囊如故。○
杖傷

杖傷

凡杖甚妙。實者雞鳴散。好酒各一鍾。合而溫服。免血攻
心。甚妙。實者雞鳴散。好酒各一鍾。合而溫服。免血攻

上。加柴胡羌活煎服。仍用葱白搗爛炒熱搭杖處
冷。則易止痛。散瘀如神。○又白片豆腐鹽水煮熱

鋪杖處其氣如蒸其腐。即紫復換貼。以色淡爲度。
潰爛者亦宜。○痛甚者。內服乳香定痛散。坊見。

腫。以熱酒盡量而飲。外貼黃蠟膏。○杖瘡有血瘀壅
熟。先刺出惡血。然後乃貼膏藥。○杖瘡只是血

貼。以五黃散。或大黃黃柏爲末。生地黄汁調付之。
○又野苧根嫩者洗淨。同鹽搗乾。則易一夜血散。即

仙花科連根葉搗爛貼患處。乾則易。一夜血散。即

愈醫○又菴豆粉微炒雞子清調付之醫○杖瘡
宜服乳香散化瘀散補氣生血湯烏龍解毒散端
壅○大槩通滯血皆以酒化服蓋血滯則氣壅
肌肉須腫痛者以經絡傷氣血不行故如是
凡杖瘡忽乾黑陷毒氣攻心恍惚煩悶嘔吐者死

五黃散

治杖瘡止痛黃丹黃連黃芩黃柏大黃乳香
各等分右為末新水調成膏以緋絹攤貼傷
處日三易藥

乳香散

治杖瘡腫痛自然銅火煨醋淬七次當歸各
五錢茵香四錢乳香沒藥各三錢右末每三

錢溫酒調下

化瘀散

治杖打重血上攻心煩悶蘇木當歸尾各三
錢大黃紅花各二錢右為末每三錢溫酒童
便調和服



補氣生血湯

治杖瘡潰爛久不愈人參白朮白茯苓地黃甘草各一錢右剉作

一貼酒半煎服

烏龍解毒散

治人受杖責後疔甲爛肉疼痛難忍不

木耳一四兩入砂鍋內炒焦存性為末右每服五錢

熱酒一椀調服服後少頃其藥力行至杖瘡上從

肉裏透如鍼刺痒甚不時流血水即以藥水洗淨

貼膏藥

○去疔甲取雞子清入麝香少許以銀

打著不痛方

未打之前先取白蠟一兩細切入碗內

單方

九五種

蘿蔔根

治杖瘡皮不破而內損者

馬糞

治杖瘡入風疼痛馬或驢濕糞
替換熱熨日五十遍極效

沒藥

主杖瘡腫痛不可忍細研
取一錢熱酒調服妙

鼠

治打傷瘡生鼠一枝和腸肚剉油半斤
煎令焦黑收之以雞羽蘸付瘡上妙

飴糖

治打損瘀血飴糖熬
和酒服能下惡血

人咬傷

人咬傷成瘡龜板或
驚甲燒灰油調付

諸獸傷

虎傷

人被虎咬先飲清油一椀又白礬為末納傷處
又砂糖水調服一二碗并塗傷處

瘡取青布緊捲燒一頭納竹筒中向瘡口令烟熏
之佳

○虎犬咬人并雞取汁飲一升日三滓付傷處
○虎狼傷人生雞肉食之又生葛汁飲之又洗

瘡又婦人月經赤衣燒為灰和
酒服

熊傷

熊傷人燒青布取烟熏瘡口令毒出。又煮葛根取濃汁以洗瘡十度并搗葛根為末調葛

根汁服日五。熊虎傷煮生鐵令有味洗之。熊虎爪

甲傷。生栗付之。鞣。

馬驢咬踢傷

馬咬踢傷益母草搗爛和醋炒付。又馬鞭梢燒灰塗之。獨顯栗子

燒灰貼亦妙。又鼠屎二七枚故馬鞭梢五寸

同燒灰猪脂調付。又用艾灸傷處取人屎或

雞冠熱血塗瘡中或浸之。生栗付之。或人

牛傷

牛觸腸出不損者急送入以桑白皮尖或生白

血止立活勿封。罨恐內作膿。破腸出臭穢

皮自合。喫羊肉。糞十日愈。

犬傷

凡春夏初交犬多發狂但見其尾直下不捲口中流涎舌黑者即是狂犬若被其傷乃九死一口

生之患急用鍼刺去血以入小便洗淨用胡桃殼

半邊以人糞填滿掩其瘡上着艾灸之穀焦糞乾則易之灸至百壯次日又灸百壯灸至三五百壯

為佳針。風狗咬處嚼生薑擦之又用葱白嚼爛塗之又

人尿淋咬處嚼生薑擦之又用葱白嚼爛塗之又

杏仁嚼爛付之以帛繫定或同馬蘭根研細葱湯

洗後塗之尤妙。於患人頂心中有紅一綫即

去頭翅足以糯半一勻先將貓七箇同炒不令米

赤去貓再入七箇同炒貓色變去之又入七箇同

炒米出青烟去貓取米研為粉冷水入清油少許

空心調服三服少頃又進一服以小便便利下惡

熱物

犬咬毒防再發

風狗咬急用斑貓七箇去頭翅足為末溫酒調服其毒必從小便中出可



將尿缸盛清水令患人尿其中停半日見濁氣盡
結如狗形則毒已出如不見狗形須服七次方可
無狗形乃不再發極驗若小便澁益元散勦水
調服最妙計三○狂犬咬先口禽漿水洗淨用王
真散勦乾貼之更不再發神效研○又仍殺所
咬犬取腦付傷處後不復發韃○狗犬傷或經久
復發無藥可療雄黃明者五錢麝香五分右為末
酒調二錢服服後必使得睡切勿驚動任其自醒
須利下惡物乃效

狂犬傷出毒法

宜用扶危散○防風五錢大黃黑丑
頭末各三錢斑貓一錢麝香三分雄

黃二錢半右為末每二錢滾水調服惡物從小便
而出○狂犬傷蚯蚓糞封之出犬毛神效韃○
又生麻油研豆豉為膏丸如彈子大常常搯拭所
咬處却搯開看豉丸內若有狗毛茸然此毒氣
已出搯至無茸毛
方乃痊可計三

扶危散

治風狗咬斑貓七日内用七箇七日外每日
加一箇十日十箇百日百箇去翅足糯米同

炒滑石一兩雄黃一錢麝香一字右為末溫酒調服不飲酒者米飲下毒從大小便出即愈

狂犬毒入心

犬狂犬咬人久不差口吐白沫者為犬毒入心

止乾○犬咬人久不差口吐白沫者為犬毒入心

狂犬咬人發狂如犬吠末酒調二錢服之又虎

禁忌法

發被狂犬咬人終身禁食犬肉及蚕蛹此毒再

房事常食杏仁以防其毒

單方種

白礬

獼犬咬白礬末納

葛根

狂犬咬葛根搗取汁服

杏仁

殺狗毒作粥常食之又



野菊

主風狗咬研細酒調服盡醉止效

草麻子

主犬咬傷取五十粒去殼研為膏付之

蟾蜍

即蝦蟆也主狂犬咬發狂欲死作膾食之勿令知又取後兩腿擣爛酒調服亦佳

鍼灸法

自狂犬咬人當先鍼刺去惡血仍灸瘡中十壯後日灸一壯至百日乃止忌飲酒蠶○被

壯犬咬者無出於灸只就咬牙跡上灸之一日三壯灸至一百二十日乃止常食韭菜永不發針

○常飲韭菜自然汁以滓封灸瘡永不發針○犬傷毒不出發寒熱速以艾灸外丘穴再三壯又

灸所咬之處七壯立愈

猫傷

人為猫所傷取薄荷葉細爵付之○又虎骨虎毛燒為末塗之

鼠咬傷

取猫毛燒灰入麝香少許津唾調付之○又麝香塗之

諸蟲傷

蛇咬傷

中蛇咬毒昏困五靈脂五錢雄黃二錢半為末酒調二錢灌之以滓付患處即甦○又

五靈脂雄黃二錢半為末酒調二錢灌之以滓付患處即甦○又

亦良○雄黃二錢半為末酒調二錢灌之以滓付患處即甦○又

細末貼瘡口立效○又萬莖取汁和雄黃作餅

子候乾為末貼瘡口毒水流腫痛即消○卒

被蛇傷白礬火上熔汁滴咬處立差無白礬則速

作艾炷灸五壯良○毒蛇螫欲死雄黃乾薑等

分為末付傷處○中蛇毒眼黑口噤欲死蒼王

橄葉一握搗取汁溫酒和灌之滓付瘡上○又

白芷末麥門冬湯調服滓付傷處○又細辛白

芷各五錢雄黃二錢麝香少許為末每二錢酒調

調服○又貝母為末酒調令病人盡量飲之少

頃酒自傷處為水流末酒調令病人盡量飲之少

又白礬甘草等分為末每二錢冷水中垂塗之○又

蛇螫急以熱人尿洗出血次取口中唾塗之○又

牙塗封傷處又取人尿厚付布裹即消○急飲

好醋二碗令毒氣不隨血走或清油亦可○急飲

蛇毒取獨頭蒜或小蒜或苦苣○又水蓼或豆葉或

荏葉皆搗飲汁以滓付傷處○又絲瓜根洗淨

搗研生酒調吃一醉立已。或又鵲嘴及脚骨燒灰飲服。滓付之。○

牛耳中垢猪耳中垢取付之。猪齒燒灰付之。○

被蛇咬人忌食酸物。梅子犯之。猪齒燒灰付之。○

蝎螫傷

蝎有雌雄。雄螫痛在一處。并泥付之。無兩時。新水從

屋上淋下。取泥用。○

即不痛。水微煖復痛。即易新水。○

生一字雄黃一字巴豆一箇。右同研付之。○

蜈蚣咬傷

如死而痛。未止更易生者。如蜘蛛咬處。當自吸毒

水中救活。○

咬處又烏雞血及尿塗之。○

研塗之。又人頭垢塗之。不痛不痒。○

取烟熏之。又鹽湯漬之。又黃蠟火上熔汁滴患處。

乾

蜘蛛咬傷

蜘蛛咬人腹大如孕一蜘蛛咬遍身成瘡取好

酒飲令大醉須臾於肉中一小如米自出乾○又青葱葉去尖納蚯蚓一條緊捻頭勿通氣候化水

點咬處即差○蜘蛛咬人瘡中出絲屢有死者惟飲羊乳可制其毒○又藍汁一椀入雄黃麝香末各一錢和之細飲其汁並點咬處有人被斑

蜘蛛咬腫痛垂死得此方即愈只服藍汁亦好○調塗之穴土蜂燒末油和付之○又取土蜂窠土醋

尿灌瓮中坐浸其身防毒入內○又烏雞屎浸酒服又取冠血塗之○薤白或韭白搗付之

又雄黃末付之又桑白皮汁塗之又蔓菁子研油調付之又小薊汁飲之○又蔓

蚯蚓傷

有人中此毒腹大夜聞蚯蚓鳴於身有人教

先飲鹽湯一盃次以鹽湯浸其足即愈○蚯蚓咬其形如大風眉鬚皆落以石灰水浸身愈○



蚋咬瘡雞屎付之○蚰蟥咬鴨屎付之
又老茶葉細末油調付○

蠧螬傷此虫又名八角虫隱於壁間以尿射人適身
生瘡如湯火傷烏雞翎燒灰雞子清調塗之

小脚○蠧螬尿瘡如熱癰而大繞腰匝不可療虫如
小蜈蚣色青黑長足取扁豆葉授付即差鞣○又

鹽湯淋漬瘡上數日愈又犀角水磨塗之又雞屎
塗之又胡燕窠中土猪脂苦酒和塗之又雞腸草

授付之又胡粉和醋付
之又爵梨汁付之鞣

蜂叮傷蜂螫人嚼青蒿付之○又薄荷授貼之○蜂
房為末猪脂和付○授芋莖擦之即愈○醋

磨雄黃塗之又清油擦之○人頭垢及
鹽擦之又醬塗之又冬瓜葉授付之鞣

蚕咬傷屋上爛茅和醬汁研付○麝香蜜調塗之○
亭汁飲之又塗之亭近蚕種則蚕不生鞣

蝸牛傷人為蝸牛虫所咬毒遍身
者蓼子汁浸之即差鞣

螻蛄傷螻蛄咬人石灰醋和塗之○榧葉
燒灰以泔水和浸洗以滓付之鞣

壁鏡傷

壁鏡咬毒人必死桑灰淋濃汁調白
禁末塗之。又醋磨雄黃塗之。

夏月諸瘡傷辟蠅蛆法

夏月諸般傷損潰爛蛆虫極盛臭不可近蛇退燒存性一

兩蟬殼青黛各五錢細辛二錢半右為末每三錢黃酒調下日二名曰蟬花散又寒水石治夏月諸

瘡臭爛。一人夏月收麥被驢跪倒又咬傷二三處至五七日膿潰臭惡蛆蠅極盛藥不能救一道

人見之傳以此方修合服之蛆皆化水而出蠅亦不敢近旬日良愈。

雜色蟲傷

夏月有雜色毛虫極毒觸人生瘡痒痛骨肉皆爛鼓一梳清油半盞同搗厚付傷處

經一宿取見鼓中有虫毛埋土中棄之白芷湯洗後烏賊魚骨末付之即愈。又伏龍肝醋和作

團於傷處搓轉其毛皆出在上上痛立止神效。又蒲公英根莖白汁付之。○毒蛇尿草木著

人似刺割便腫痛肉爛若着手足指節墮落研砒礪和膠清塗之。○蛇骨刺人毒腫痛燒死鼠為

末付之。○諸虫毒傷青黛雄黃等分為末新汲水調下二錢。又外塗之。○人被天蛇毒似癩而

非癩天蛇即草間黃花蜘蛛也入被其螫因為露
水所濡乃成此疾遂煮秦皮汁一斗飲之差幹○
諸毒虫傷大紙撚蘸香油燒火吹滅以烟熏之即
愈○蛇蝎蜘蛛咬生雞卵輕敲一小孔或藍葉搗汁飲又
幹○蛇蝎蜘蛛咬生雞卵輕敲一小孔或藍葉搗汁飲又
付之

簽刺傷

又竹木刺入肉不出瞿麥濃煎取汁飲日三幹○

灰和猪脂塗之不覺自出幹○又人頭垢塗之即
出又烏雄雞生搗菴之亦出幹○又白梅肉爵封
之刺即出又栗楔生爵菴之亦出又螻蛄研付之
妙又蠟蛭生研菴之亦妙又鱗鱗碎付之刺即出
又牛膝根搗爛塗之亦出又魚鱗取付瘡上四邊
肉爛刺即出幹○魚骨在肉中不出爵吳茱萸封
之骨當爛出又取海狗皮煮汁服又魚狗鳥燒為
末和飲頓服又象牙末厚塗自軟出幹○鐵棘竹
木刺入肉不出鼠
腦厚塗之即出幹

九蛇虺蜈蚣毒虫咬傷於傷處灸五壯或七壯即愈
心丹
○被惡蛇螫即貼蛇皮於螫處艾火灸其上

凡有蠱之鄉見人家門限屋梁無灰塵絜
爭者其家必畜蠱當用心防之○蠱者

人取三虫之類蝮蠹蟻其自相啖食餘一存者名爲蠱而能變化人有作敬事以酒肉祭之取出放毒於飲食中人其毒心悶腹痛面目青黃或吐苦鮮血或下膿血病人所食之物皆化爲虫侵蝕藏府蝕盡則死急者十數日便死緩者延引歲月死後病氣流注染着傍人故謂之蠱症針口中蠱者面色青黃是蛇蠱面色赤黃是蜥蜴蠱面色青白若內脹滿吐出成科斗形者是蝦蟆蠱面色多青或吐虫如蛻螂形者是蛻螂蠱病

如入蠱鄉飲食即潛於初下筭時收藏一
塊在手儘喫不妨少頃却將所藏一塊潛



埋於人行十字路下即蟲於其家作鬧蟲主必反

來求救或食時讓主家先動筋或明問主家云莫

驗蟲毒法

有蟲麼以筋等卓而後食如是則蟲不能為害

如是有蟲麼以筋等卓而後食如是則蟲不能為害

蠱毒中毒脉候

凡中毒蠱毒脉類如釵股。人為百

死○又脉洪大而遲者生微細而數者死

送蠱法

去人也。中蠱毒當服藥如知蟲主姓名便呼取以

飲調服一錢病人須更自呼蟲主姓名取皮燒為末

即愈。中蠱毒下血如猪肝藏府敗壞惟待死

葉荷葉密安病人卧席下勿令知病者自呼蠱主
姓名令取去即愈。蔣士先得疾下血言中蠱
家人密以囊荷置卧席下忽大笑
曰蠱我者張小也乃收小小走

蠱毒治法

人中蠱毒則心腹小切痛如有物咬面色青
黃或吐血或下血不即治蝕五藏盡則死

宜服太乙紫金丹王樞丹萬病解毒元雄礬丸雄
麝散辰砂丸保靈丹獨勝散國老飲或吐或下之

而愈

太乙紫金丹

挑一名紫金錢一名萬病解毒丹治蠱毒
毒山嵐瘴氣毒諸藥金石草木鳥獸百虫一切諸

毒蚊蛤去虫土三兩山茨菰去皮焙二兩紅芽大
戟洗焙一兩半續隨子去皮油一兩麝香三錢右

為末糯米粥和勻搗千餘杵每一料分作四十錠
每服半錠重者一錠並用薄荷湯化下。修合時

宜端午七夕重陽日或遇天德月德日在淨室焚
香齋戒勿令婦人孝服人雞犬見之。自縊落水

鬼迷驚死心頭溫者並冷水磨灌即醒蛇犬諸惡



虫傷以酒化服
水磨塗傷處

玉樞丹

一名追毒丹治病服法同上○即上太乙紫金丹加雄黃一兩朱砂五錢也製法同上

○入蟲鄉繞覺意思不快即服一錢或吐或利而愈誠濟世衛生之寶也

萬病解毒元

治蟲毒挑生毒藥毒草毒畜獸毒蚊蛤一兩半山茨菰一兩大戟七錢半山豆

根續隨子去皮油各五錢朱砂雄黃各二錢麝香一錢全蝎五枚右為末糯米糊丸分作三十五丸

每服一丸薑汁蜜水磨下井水研付所傷處

雄礬丸

治蟲毒及虫蛇毒即蠟礬丸癰觀加雄黃等分作丸梧子大每七丸熟水吞下

雄麝散

治五種蟲毒雄黃麝香等分為末取生羊肺如指大以刀開裏藥吞之

辰砂丸

治蟲毒從酒食中着者辰砂雄黃赤足蜈蚣續隨子各一兩麝香二錢半右為末糯米飯

和丸芡實大每一丸以酒化下
端午日合○一名丹砂元

保靈丹

治五錢雄黃丹麝香黃藥子續隨子兩山豆

另研巴豆去皮不去油斑貓去頭足翅各二錢半

赤足蜈蚣二條一生一灸糯米半生半炒為末作

糊之於端午重陽臘日修合為末不令雞犬婦人

見丸茶清吞下不得嚼破須臾將毒物或吐或利

獨勝散

治蟲毒及藥毒虫蛇諸毒大甘草節麻油浸

神效

國老飲

治蟲毒白礬甘草等分為末清水

金蠶蠱毒

南方畜金蚕其蚕金色食以蜀錦取其遺糞

暴富而遭之極難水火兵刃所不能害必多以金



嫁金蚕蠟○人中金蚕蠟毒先嚼白礬味甘不澁
次嚼黑生豆不腥者是也石榴根皮濃煎汁飲之
吐虫
即愈

挑生毒

嶺南有挑生毒乃挑毒於飲食中以害於人其
候初覺胃腹作痛次則漸漸攪刺滿十日則物
生能動在上則胃痛在下則腹痛在上者膽礬末
五分投熱茶內化服探吐之在下者礬金末二錢
米飲調服瀉下惡物後以四君子湯去甘草煎服
調理○有人忽肋下腫起頃刻間大如椀此中
挑生毒也埃五更菜豆細嚼試之若香甜則是也
升麻為細末取冷熟水調二大錢連服之洞泄出
葱數莖根鬚皆具腫則消
縮仍服平胃散調補

禁忌法

凡中蠱之人用藥已差自後飲食永不得喫冷
若飲食帶冷則鬼氣乘之毒虫復生竟不能救

門

灸法

灸蠱毒法於足小指尖上灸三壯即有物出酒飯
得之隨酒飯出肉菜得之隨肉菜出即愈神驗皆

於灸瘡
上出針

吐蠱藥

一凡中蠱煮甘草湯服之當吐出蠱○又升麻

蠱下血如雞肝四藏悉壞惟心未毀只待死馬蘭
根為末水如雞肝一四藏悉壞惟心未毀只待死馬蘭

取根葉搗汁服當吐下蠱○又治五種蠱毒馬兜
鈴根為末一兩水煎頓服當吐蠱出未快再服蠱

○又櫛木止陰白皮煎取一升空心服即吐蠱
出○又蠶皮燒為末水和服一錢當吐蠱○蠱

又苦瓠一枝水煮取汁服立吐○又獨胞湯○又人頭
垢米飲或酒化服即吐蠱○蠱

卵許服之
即吐蠱

下蠱藥

凡中蠱毒商陸末和水服即下蠱○又續

○牽牛子取頭末二錢和水服一錢即下蠱○又
斑貓一枝去頭足翅研為末和飲服當下蠱○蠱

○又斑貓去足翅熬大戟桃白皮東引者三物等
分為末冷水調服半錢其毒即下若未出更一服

奇效只單服大戟亦好。乾○又燕屎三合熬獨頭蒜十枚和搗為丸。梧子大服三九。蟲當隨利下而。

通治單方

中蠱毒。蚕退紙不拘多少。以麻油紙撚燒。

絕昏迷。口噤吐血者。服之即甦。○又凡中蠱毒。藍葉汁飲之。良。○又菑根濃煎服之。又與囊荷同煎飲。數升即愈。○又桔梗搗汁飲之。危重者亦甦。○

服並佳。○又絞魚皮燒為末。和水服。治中蠱吐。又鮫魚皮燒為末。和水服。治中蠱吐。又鮫魚皮燒為末。和水服。治中蠱吐。

但飲其汁已死者。皆可活。○又蜈蚣灸為末。和飲服亦佳。○又治蠱毒。胡荽根搗汁。半升。和酒。

服蠱立下。又取胡荽子研水煮。取汁冷服。半升。日二。○又大蒜或小蒜。並常食之。治蠱毒。○又

狐五藏及腸。治如食法。和五朱煮。作羹食之。去蠱毒。炙食亦良。有人病蠱。夢道人示。頌云。似犬非犬。

似貓非貓。烹食遂差。白氏六帖云。古丘狐食之。令人不

殺而烹食。遂差。白氏六帖云。古丘狐食之。令人不

中蠱。又獺肝主蠱毒。燒酒與大蒜最妙。斡。

救諸中毒方

抑論中遠近久則不救。又手足被害何物之中。

亦不救。治法上宜吐之。急以香油多灌。相。鵝翎。

甘草湯調服。利之亦可。服毒宜急。救之。大法。甘草。藟豆。

能解百毒。又法不問何毒。

解毒丸

治飲食中毒。并百物毒。救人於必死。板。藍根。

丸。梧子大。以青黛另為衣。稍覺精神恍惚。是。

砒礬毒

欲吐。面口青黑。四肢逆冷。須臾不救。此毒於。

肉。飯中得之。則易治。於酒中得之。則其毒散。歸百。

萬病。解毒丹。如下之。如無黑。急取青藍汁。一。碗。

二。一。三。

或香油一二升灌服又取地漿三碗和松粉頻灌服旋刺猪狗羊雞鴨熱血飲之又人糞汁灌之諸

○又白扁豆青黛甘草各一錢巴豆去殼一箇云

餅為末砂糖大一塊水化調一盞飲之毒隨利下

和水○又臘月猪膽水和服之立解○又稻稈灰

和豆取汁飲而解之○又

藍根砂糖攪爛和水服○又

菌蕈毒 山中有毒菌人煮食無不死地生者為菊木

熟者煮訖照人無影者欲爛無虫者皆有毒不可

食○冬春則無毒秋夏有毒者因蛇虫毒氣熏蒸

兩致也○人中其毒地漿飲之又人糞汁飲之又

馬蘭根葉搗取汁服之又人頭垢和水服以吐為

度又六畜及鵝鴨之屬刺取熱血飲之又油煎甘

草冷飲只多飲香油亦好○中蕈毒吐下不止

細紫芽○雜為末新汲水調服神效又荷葉搗爛

和水服○○煮頭煮汁飲即愈○楓樹菌食之

令人笑不止而死飲地漿最妙

人糞汁次之餘藥不能救○

河狔毒

諸魚中河狔最毒其卵尤毒人中其毒必死
急取蘆葦根搗取汁飲之○或人糞汁或香

油多灌吐即愈又白礬末白湯調下又白
扁豆末和水服又羊蹄葉搗取汁飲之

川椒毒

人誤食椒戟人咽喉氣閉欲絕喫大棗三枚
解之○川椒閉口者有毒人誤吞之便氣欲

絕或下白沫身體冷痺宜急治之飲井水一二升
便差○又桂皮煎湯飲之又地漿飲之又濃煎黑

豆汁飲之又
人尿飲之

杏仁毒

杏子雙仁者有毒人誤食必死若中其毒藍
葉汁飲之又藍實水研取汁飲之又地漿飲

二三枚又香油
多灌之妙

苦練毒

服苦練根瀉不止
飲冷粥止之

藜蘆毒

人中此毒令吐逆不止葱白煎湯飲之又雄
黃末和水服又香油灌之又溫湯飲之

巴豆毒

人中毒則令大瀉或吐煩渴發熱急用黃連
黃栢煎湯冷服○又黑豆煮取汁飲之又寒

水石磨水服之。又菖蒲或葛根搗取汁飲之。更以冷水浸手足。忌食熱物。斡。又藍根砂糖搗爛和服。

草烏川烏天雄附子毒

人。中。川。烏。天。雄。附。子。毒。則。心。煩。躁。悶。甚。則。頭。岑。岑。然。遍。身。

皆黑必死。煎菴豆黑豆汁冷服之。又甘草黑豆濃煎飲汁。又防風甘草煎湯冷飲之。又甘草黑豆濃煎服入口。即定。又棗肉飴糖服之。並解。又乾薑煮汁冷飲之。又多飲井水。大吐瀉即愈。○中草烏毒。則令人麻痺。暈悶。又黃連湯飲之。生薑汁飲之。又童尿飲之。又黃連湯飲之。斡。

礬石毒

黑豆煎汁飲之。斡。

金銀銅錫鐵毒

人服金銀中毒。服水銀即出。蓋水銀能解金銀銅錫毒也。○取鴨血飲之。

又白鴨屎淋取汁飲之。又生雞卵吞之。又黑豆汁或藍葉汁水芹汁飲之。○人參煮汁服之。○鐵毒。煮磁石飲之。○錫胡粉毒。取杏仁研汁服之。○金石藥毒。取黑銖一介。鍋內熔成汁。投酒一升。如此。

十數遍候酒至半
升去鈔頓服之之鞞

斑猫茺青毒

豆中此毒令人吐逆不止急用菴豆或黑
或糯米和水研取汁服之○又藍汁

飲之又猪肪服之又
澤蘭葉採取汁飲之鞞

硃砂毒

生菴豆水研取汁
一二升飲之之鞞

硫黃毒

令人心悶取猪羊熱血飲之又宿冷猪肉及
鴨肉羹公食之又黑錫煎取汁飲之又生羊

血飲
之鞞

雄黃毒

防已煎取
汁飲之之鞞

水銀毒

肥猪肉煮冷食之
又猪脂服之之鞞

大戟毒

中此毒令人冷泄不禁煎薺
汁飲之又菖蒲搗取汁飲之之鞞

狼毒毒

杏仁研水和取汁服之又藍葉汁飲之
又白斂為末和水服又占斯取汁飲之鞞

躑躅毒

梔子煎取汁飲之又
甘豆湯煎湯服之

甘遂毒

黑豆煎汁
飲之

半夏毒

生薑汁飲之又
乾薑煮汁服之

芫花毒

桂皮煮汁飲又甘草
或防風煎汁服

良莠毒

人中此毒則衝心大煩悶眼生星火狂亂
走見鬼拾鍼水研葉豆汁飲之甘草薺煎

汁飲之又犀角磨水服之又
汁服之又甘豆湯濃煎服之

苦瓠毒

食苦瓠吐利不止飲
黍穰灰汁解之

石藥毒

人服諸石藥中毒人參煮汁服又
肪服之又白鴨屎為末和水服之

艾毒

艾葉久服亦有毒發則熱氣冲上狂躁不能
禁至攻眼有瘡出血者甘豆湯冷服之

菡豆汁
飲之

海菜毒

凡海中菜多食損人令腹痛發氣吐白沫飲熱醋即安凡海菜傷皆同此法

馬毒

開剥死牛馬中毒遍身生紫疱俱潰馬汗馬氣紫金鉞吐瀉即愈

馬毛並能為害○馬汗入人瘡毒氣攻作心悶欲絕燒粟稈灰濃淋作汁熟煮蘸瘡於灰汁中須臾

白沫出盡即差白沫是毒氣也○凡生馬血入肉中三兩日便腫連心則死有人剥馬被骨傷手

指血入肉中一夜即死○馬汗入肉毒氣引入如紅線先以鍼刺瘡口出血烏梅和核爛研醋調

塗之○又馬齒覓取汁飲之○馬汗及毛入瘡腫痛以冷水浸瘡數易飲好酒立愈○驢涎

馬汗入瘡腫痛生烏頭末付瘡上良久黃水出立安又白礬枯黃丹炒等分調貼瘡上○馬毒瘡

婦人月經血塗之又生栗及馬齒覓搏付之

諸獸肉毒

解六畜肉毒犀角濃磨汁一搗絞絞取汁數食馬獸六畜肉中毒水浸豆豉絞取汁數

升服之○食自死六畜肉中毒黃栢末二三錢水調服不解再服○食自死鳥獸肝中毒取人





頭垢一錢熟湯化服。○食諸肉中毒或吐下血
胡荽子一升煮取汁停冷每服半升日二又胡葱
一升煮取汁冷服半升又生韭汁飲之又燒猪骨
末和水服又犬屎燒灰和酒服。○凡肉盛密器
蓋之隔宿者名為齕肉又茅屋漏水沾濕脯名為
漏脯皆有毒害人黑豆濃煎汁飲數升又燒犬屎
末和酒服又搗韭取汁服一升又多飲人乳汁
又燒人屎和酒服。○食牛馬肉又肝中毒先到
頭髮令寸長拌好土作塘泥二升合和飲之須臾
髮皆貫所食肝出即愈又人乳汁飲一二升亦立
愈。○食馬肉中毒欲死香豉二兩杏仁三兩和
蒸一炊久熟杵服日二又蘆根煮取汁飲一二升
又多飲清酒即解濁酒即加。○食馬肝中毒人
頭垢和水服又雄鼠屎三七枚研和水服。○食
狗肉不消心下堅脹口乾發熱妄語煮蘆根取汁
飲之又杏仁一升去皮研水三升煎去滓分三服
利下血片為效。○食牛羊肉中毒地漿飲之。○
汁服一二升。○食生肉中毒地漿飲之。○

犀角

多服則令人煩麝香
一字調水飲之

諸禽肉毒

食鵝鴨肉中毒糲米泔或溫酒飲之又秫

下犀角末和水服一錢或以水濃磨取汁飲○食

中毒箭死鳥獸肉及野鳥肉中毒狸骨燒灰和水

諸魚毒及蟹毒

煮魚中毒飲冬瓜汁最驗又海獺皮

魚皮燒灰和水服之○食蟹中毒生藕汁冬

汁煮蒜汁飲之並佳又紫蘇華煮汁飲之

之亦良又黑豆汁豉汁並解之○食鱸魚鰾

魚中毒盧根煮汁飲一二升生汁亦可○食鱧中

毒食蟹解之食鱧蟹中毒豉一合投新汲水半碗

取濃汁頓服即愈○多食生薑不消胃膈不快瓜

蒂散疔睨吐之若日久成癥病大黃朴硝陳皮久

三錢水煮頓服下之○又方取水中石子數十

枚燒赤投五升水中七次即熱飲之三度當利

出痰○凡食魚肉過度還飲肉汁即消食腦立消

萬物腦能消身所以食膾食魚頭羹也○食膾



燒存性為末和酒服二錢日二癥結即出

莽果毒

食菓中毒猪骨燒灰和水服又桂皮濃煎取汁飲之又服瓜蒂散吐之即愈○食雜菓

子過多腹脹氣急桂心為末飯丸棗豆大以水吞下十丸未愈再服○又桂心末五錢麝香一錢

飯丸棗豆入白湯下十五丸即效名曰桂香丸○食銀杏中毒香油多飲吐之又地漿藍汁甘草

汁飲之○治苾毒石首魚灸食或煮汁服自消○食桃得病取桃梟燒為末和水服之即愈

菜蔬毒

服食諸菜中毒發狂煩悶或吐下葛根濃煎汁服生汁尤佳又烏雞屎燒為末和水服又香

油多飲之又甘草湯飲之又人乳汁或小兒尿服二升即愈○菜蔬魚肉毒苦參剉三兩苦酒一

升煎服吐即愈

燒酒毒

過飲燒酒中毒則面青口噤昏迷不省甚則

覺便脫衣推身滾轉之無數吐之即甦又溫湯裸體浸灌常令溫煖若灌冷水即死又取生芡及

蔓搗取汁幹開口灌之不住又碎米頻納口中
及肛門又葛根搗取汁灌口中漸醒而愈

豆腐毒

過食豆腐腹脹氣塞欲死新汲水多飲即安
若飲酒即死○中豆腐毒令人生瘡噫氣

遺精白濁蘿菹煎湯飲之
又杏仁水研取汁飲之

麵毒

人食熟麵多中毒蘿菹搗取汁飲之無生者則
取子水研取汁飲之又地骨皮煮取汁飲之又

赤小豆末和水服即愈

服藥過劑或中毒煩悶欲死

犀角以水濃磨取汁飲之或
又葛根搗取汁飲之

水煮取汁服之又青藍汁飲之又生雞卵取黃吞
之又地漿飲之又胡粉水和服之又粳米粉和水

服又豉汁
飲之

通治百物毒

人中諸物毒服萬病解毒丹最妙○又
茶白礬每取三錢末新水調服即效

名礬茶散○又五倍子為末好酒調下三錢在
上即吐在下即瀉○又大甘草為極細末微炒



量病入酒量多少好酒調服須更大吐瀉雖渴不可飲水飲水則難救心○臘雪水解一切毒取飲之○又甘草薺芫煎湯服之入口便活○解諸藥毒殺諸虫毒青黛雄黃等分爲末新水調下○二錢○又白扁豆爲末新水調下○二錢○又白根○又犀角以水濃磨取汁服能解百毒○又香白狗屎絞汁服或燒灰和水服○黑豆汁飲之又毒第

甘豆湯

甘草黑豆皆解百藥百物毒各取五錢作一貼水煎取汁溫冷任意服之神效或加竹葉

或加薺芫尤效

水毒

江南溪澗中有虫名爲短狐亦名射工一名蜺其虫無目利耳能聽在水中間人聲輒以口中

毒射人故謂之射工又含沙射人之影故謂之射工中人其毒寒熱悶亂頭目俱痛亦如中尸卒不

能語又有水毒虫一名溪温其病與射工相似但有瘡為射工無瘡為溪温○又有沙虱乃毒蛇鱗中虫也夏月蛇為虱所苦蝕身江灘刷其虱入沙中行入中其毒如瘡如鉞孔粟粒四面有五色文須剗去小肉即愈不然三兩日死○射工溪温皆能殺人治法取湯數斛以蒜五升投湯中温浴之身體發赤癰者水毒冬消水毒飲子並主之門入

消水毒飲子

兩吳柴萸半升生薑犀角升麻陳皮各一兩烏梅七箇右剉水七碗煎至二碗分

二服

救急

十件危病

華佗云人有急病疾如風雨命醫不及須臾不救視其橫夭實可哀怜予選十件危病三

十妙方以救之不可不知○又云人有急病疾如風雨須臾不救命在頃刻世人纔見一時氣絕便以為死更不知有可救之理可救之方故以所歷經驗數方錄梓以廣其傳便可對證尋方服藥急



救門。庶幾倉卒無矢橫之患矣。一霍亂吐瀉，鮮見。

○二纏喉風，閉塞，嚙，咽。○三吐血，下血，鮮見。

○四中砒礪毒，覘鮮。○五尸厥。○六中惡客忤。

○七脫陽。○八鬼魘鬼打。○九孕婦橫逆產，婦人見。

門。不下。胎衣。

中惡

野。或遊空，冷屋室，或行人所不知之地，忽見眼見。

鬼物口鼻，吸着惡鬼氣，驀然倒地，四肢厥冷，兩手。

握拳，口鼻出清血，性命遂巡，須臾不救，此證與尸。

厥同，但腹不鳴，心腹俱煖，切勿移動其屍，即令親。

戚衆人圍繞，打鼓燒火，或燒麝香，安息香，直候記。

醒。人事方可移歸。○先用蘇合香、元、薊、覘、薑湯。

或溫酒化下三九蘇省，後用他藥。太乙神精丹尤。

好。勸親且用朱犀散，備急丸，勸覘。○急取半夏末。

或皂角末吹兩鼻中，即活。心頭溫者，一日亦可活。

○又取故汗衣，須用內衣，久遭汗者，佳。男用女。

衣。女用男衣，燒灰爲末，每二錢百沸湯調下。○

又麝香一錢，研和醋二合，服之，便差。又取葱黃汁。

刺鼻中，入深四五寸，令目中出血，即活。又生薑汁。

麴酒各半盞同煎再沸灌服之又白犬斷頭取熱
 血一升灌之又韭汁灌口鼻中又菖蒲搗取汁灌
 之又桃梟酒磨服之又黃丹一錢
 蜜三合和服口噤者折齒灌之

鬼擊鬼打鬼排

治法同
中惡

朱犀散

脉候

中惡之脉緊細易治浮大難痊
 曰暴厥暴厥者不知與人言
 滑沉則為貫滑則為氣實氣相搏血氣入藏即死
 入府即愈此為卒厥不知人何謂也
 冷為入藏即死身溫和汗自出為入府即愈
 厥逆連藏則死連經則生註云連藏死者神去故
 也納○尸厥呼之不應脉伏者死脉大反小者死
 ○卒中惡腹大四肢滿脉大而緩者生緊大而浮
 者死緊細而微者亦生

尸厥

尸厥者脉動而無氣氣閉不通故靜如死也還魂

脉動如故或脉無倫序或乍大乍小或微細不見

而死問疾或入墓登塚卒中邪惡與藏氣相忤忽然

手足逆冷頭面青黑牙關緊急頭旋暈倒昏不知

人或錯言妄語急取蘇合香丸三丸溫酒或薑湯

灌下又煎還魂湯灌之又故汗衣燒灰末二錢百

沸湯調灌又菖蒲汁灌口中故汗衣燒灰末二錢百

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

○邪容於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆

還魂湯

一名追魂湯主中惡尸厥暴死客忤鬼擊飛

酒一盞煎百沸灌下

煎灌之如無則薑汁半盞

黃散朱犀散方見又附子炮一校為末分二服酒

氣走如雷鳴聽其耳中如微語聲者是也急用研

即甦○尸厥之證卒死脉猶動四肢逆冷腹中

形無知也其狀若尸名曰尸厥以竹管吹其兩耳

會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脉皆動而

○邪容於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

○邪容於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

於上則為太厥厥則暴死氣復反則生不反則死

桂心甘草各一錢右剉作一貼水煎灌服口噤者
幹開口灌之藥下立甦神○凡尸厥鬱冒卒死卒

中之類皆當發表仲景云鬱
冒欲解必大汗出是也

硫黃散

治尸厥奄然死去不省人事命在頃刻硫黃
一治尸厥奄然死去不省人事命在頃刻硫黃

好酒如一盞同煎覺焰起傾於盞內蓋著候溫灌
服之如人行五里又進一服不過三服即甦

鬼魘

人眠睡則魂魄外遊為鬼邪所魘屈其精神弱者
則久不得寤乃至氣絕所以須傍人助喚并以方

術治之針○鬼魘鬼打之證人到客舍館驛及久
無人居冷房睡中為鬼物所魘但聞其舍人吃吃作

聲便令人叫喚如不醒乃鬼魘也急救則死宜
用雄朱散吹○人為鬼魘卒死不得著燈火照亦

不得近前急喚多殺活人但痛咬其足跟及大拇指
甲邊并多唾其面即活如不醒者移動處些子餘

喚之若元有燈即存不可喚滅如無燈切不可用
燈照仍用筆管吹兩耳又取半夏末或皂角末吹

兩鼻中○鬼魘卒死及卒中鬼擊血漏腹中煩
滿欲死雄黃末吹入鼻中又酒調一錢服日三能



化血為水。乾。又生韭汁灌口中及耳鼻中。薤白汁亦可。又東向桃柳枝各七寸煎湯灌下。又伏龍肝末二錢并水調灌服。更吹入鼻中。又羊真燒烟熏鼻中。即甦。端。夢中被刺殺。或被打諸般不祥。忽然吐血。衄下血。甚者九竅皆出血。宜以升麻獨活續斷地黃各五錢桂皮一錢。右為末。每二錢白湯調下。日三調。

雄朱散

治鬼魔牛黃雄黃各一錢朱砂五分。右為末。每挑一錢於床下燒之。次挑一錢以酒調灌。

鬱冒

人平居無疾。忽如死。人身不動。搖默。然不知人。目閉。不能開口。啞。不能言。或微知人。惡聞人聲。但如眩冒。移時方寤。此由汗出過多。血少。氣并于血。獨上而不下。氣壅塞。而不行。故身如死。氣過血還。

白薇湯

白薇當歸各一兩。人參半兩。甘草二錢。半右為末。每五錢水煎溫服。麝。厥婦人多有之。宜白薇湯。倉公散。即甦。軀。陰陽復通。故移時方寤。名曰鬱冒。亦名血。

倉公散

藜蘆瓜蒂雄黃白礬各等分
右為末取少許吹入鼻中轉

客忤卒厥諸證

客忤者心中惡之類也多於道間門外得

治亦殺又取人取百草霜五錢鹽一錢和研溫水調下

當吐惡物又取細辛桂心為細末納口中又銅器

或瓦器盛熱湯用厚衣觀腹上於衣上熨之冷則

易使愈又至寶丹又熟艾一兩水煎取汁頓服即

或童尿調灌端○又熟艾一兩水煎取汁頓服即

差半日遠至帝曰厥令人腹滿或令人暴不知人或至

上則下虛下虛則腹脹滿陽氣盛於上則下氣重

上而邪氣逆逆則陽氣亂陽氣亂則不知人納○

九卒急之證有氣厥血厥痰厥食厥中風中寒中

暑中濕之類皆詳見各門隨證治之○風至聖來

卒死

帝曰人有卒然暴死暴病皆何也少師荅曰三虛

復丹勦眼通治諸

厥危急之疾○

虛者乘年之衰逢月之空失時之和因爲賊風所傷是爲三虛逢年之盛遇月之滿得時之和雖有賊風邪氣不能危之是爲三實。三虛相搏則爲暴病卒死。雷公問曰：人不病而卒死，何以知之？帝曰：火氣入於藏府者，不病而卒死矣。雷公曰：病小愈而卒死者，何以知之？帝曰：赤色出於庭，兩顴大如拇指，指者病雖小愈必卒死。黑色出於庭，兩顴大如拇指，指者必不病而卒死。癰疽。○凡卒死者，口張目開，手散遺尿，爲虛宜補氣。目閉口噤，手拳爲實，宜發表。○人見五色，非常之鬼，遂令暴亡者，皆自己精神不守，神光不聚故耳。非外所侮，乃元氣極虛之候也。○凡暴亡，不出一時，可救之。雖氣閉絕，四肢冷，若心腹溫，鼻微溫，目中神彩不轉，口中無涎，舌與陰卵不縮者，皆可活也。○救卒死，或常居寢臥，奄忽而絕，急割取雄雞冠血，頻塗其面，乾復塗之，并以灰管泥人一周，鞅。○狐膽主暴亡，臘月取者尤佳。○若有人卒死，未移時者，溫水研灌入口，中即活。鞅。○清心元至寶丹，助。○蘇合香元，勑。○至聖來復丹，勑。○灌服。○救卒死，急取半夏末，或溫酒，或童尿，調和灌服。○救卒死，急取半夏末，或溫

皂角末吹入鼻中又雄雞冠血滴入鼻中又牛黃或麝香一錢溫酒調灌即甦

溫酒灌之即活

備急丸

主諸卒死暴疾百病及中惡客忤鬼擊鬼打面青口噤奄忽氣絕大黃乾薑巴豆霜各一

兩右為末蜜和搗千杵作丸小豆大卒死者取三丸熱酒吞下口噤則以酒化灌之下咽即活或溫

水下亦得○張易老又名獨行丸乃急劑也

脫陽證

凡人因大吐大瀉之後元氣不接四肢逆冷面黑氣喘冷汗自出外腎縮搖不省人事須臾不

救與傷寒陰陽易同證宜急服大固陽湯○又桂枝二兩剉好酒煎取汁服又連鬚葱白三七莖以

酒濃煎服陽氣即回又生薑一兩研酒煎服亦效又葱鹽爛搗炒熟熨臍下氣海即愈

大固陽湯

大附子一枚炮切作八片白朮乾薑炮各五錢木香二錢半右剉作一貼水煎去滓

放冷灌服須臾又進一服神效

救自縊死

旦自縊死者自旦至暮雖已冷必可活自暮至

當徐徐抱下解之不可截斷繩子令安卧被中急
須按定其心却撚正喉龍令一人以手掌掩其口
鼻勿令透氣氣急即活又令一人以脚踏其兩肩
以手挽其後常令弦急勿使縱緩一人以手據按
曾上數摩動之如此一人摩捋臂脛屈伸之若已強直
漸漸強屈之如此一人吹頃雖得氣從口出呼吸眼
開仍引按勿止○又法用手厚裹衣物緊填穀
道捏起解繩放下揉其項痕仍搗藥入鼻及以竹
管吹其兩耳待其氣回方可放手若便後分泄氣
則不可救矣○急救雞冠血滴口中即活男雌
女雄又取雞屎白如棗大酒和灌鼻中尤妙○
又以藍汁灌之又取梁上塵如大豆許納竹管中
四人各一管同時極力吹兩耳鼻中即活又取半
夏末或皂角末或細辛末吹入鼻中得嚏即甦須
更少與溫粥清令喉潤漸漸嚥下乃止○五絕
者一曰自縊二曰墻壁壓三曰溺水四曰鬼魘五
曰產乳皆取半夏末吹鼻中
心頭溫者雖一日皆可活○

救溺水死

凡溺口水死者一宿尚可救急急捏出先以刀

衣服多灸臍中二三百壯令兩人以筆管吹其兩

耳又取皂角末綿裹納下部須臾出水即活又取

鴨血灌入口中又將醋半盞灌鼻中又用蘇合香

元三九薑湯調灌又萬病解毒丹一錠冷水磨化

灌下即甦溺死縊死皆效門○又法取甕中熟灰

燻砂一石埋其身只出頭面水出七孔即活神

○又法將牛一頭行將死者腹橫覆在牛背上兩邊

用人扶策徐徐而行則水自下亦活○又法以酒

生人倒臥死人即負持走吐水便活○又法以酒

壘一箇以紙錢一把燒壘中急以壘口覆死人面

救凍死

人遇寒凍死四肢強直口噤只有微氣者用大

釜炒灰令煖囊盛熨心上冷則易口開氣出然

後以溫粥清稍稍灌之或溫酒或薑湯灌之即甦

若不先溫其心便將火灸則冷氣與火爭必死矣

○又法用鹽或蒿薦裹死人以索繫定放平溫



和即
活粥

救餓死

者凶荒之歲人多餓死若累日不得食飢困將死

嚥下今咽腸滋潤過一日漸與稀粥頻啜之過數日乃與稠粥軟飯則自然生活

攪腸沙

此證心腹絞痛冷汗出脹悶欲絕俗謂之攪腸沙與乾霍亂同由山嵐瘴氣或因飢飽失時陰

陽暴亂而致也○所感如傷寒頭痛惡寒身壯熱手近指末微厥或腹痛悶亂須臾能殺人先濃

煎艾湯試之如吐即是也○治法蚕退紙燒末熟酒調服立效又多飲鹽湯吐之亦愈○有

陰陽二證陰沙腹痛而手足冷看其身上有小紅點以香油燈點火燒於紅點上令其煖爆或服葱

豉湯汗出即愈陽沙腹痛而手足煖以鍼刺其十指背近爪甲半分許血出即安先自兩臂按摩其下

其惡血令聚於頭血出為好○又法以手蘸溫水於病者膝灣內打拍有紫黑點處以鍼刺去惡

血即愈○患痛之人兩臂腕中有筋必致黑色用砂鍼擊刺出紫黑血痛即止神效○

八井塚卒死

凡入井塚須先以雞鴨毛投之直下則無

其中停久乃入鞞○夏月淘井多致殺人五六

尤甚古塚中及深井中皆有代氣若入則令人冒

悶奄忽而死即取井水嚥其面并冷水調雄黃末

一二錢服之轉筋入腹痛欲死者使四人捉住手

足灸臍左邊二寸十四壯又用生薑一兩剉酒五

盞濃煎頓服又醋煮衣絮令熱徹濕裹轉筋處又

濃煎鹽湯浸手足洗脅間即甦○新城縣人

家有枯井一口有客人兩者於五月間因失鈔袋

疑在井中一人先下井中寂然無聲又一人繼下

亦久不出傍人怪之與家主議用繩吊縛木板令

人登踏下井看之其人亦無聲即牽上井則其人

昏迷不省用冷水救甦更用雞犬縛繩下試亦皆

死焉遂拆毀井畔見兩人身尸用繩吊縛上來看

審則身尸青黑了無傷痕此其中毒而死也治法

同上

蛇入七竅

夏月因熱就涼睡有蛇八人耳鼻口中挽不

出急以刀傷蛇尾納川椒胡椒二三粒裹着



即出又以艾灸蛇尾即出又割母猪尾頭瀝血入口中并孔中亦出後取雄黃末調人參湯服制蛇毒心○人卒為蛇繞不解以熟湯淋之無湯則令人尿之即解

鍼灸法

邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡俱竭令人身脉皆動而形無知其狀若尸名曰尸

厥先刺隱白後刺涌泉後刺厲兌後刺少商後刺神門納○尸厥當刺期門巨闕中極僕參隱白大

敦金門○卒厥尸厥百會灸四十九壯氣海丹田灸三百壯覺身體溫暖即止○中惡客忤卒死灸

臍中百壯○中惡取人中中腕氣海○卒死灸心下二寸臍上三寸臍下四寸各三壯即差又灸手

足兩爪後二七壯○諸卒死及驚死急於人中及兩脚大姆指內離爪一韭葉許各七壯即活○

卒被鬼擊如中箭用桃皮一片安痛上取一匙頭安桃皮上用艾胡桃大安匙頭灸之即差門

怪疾

有二十六條

怪疾異常

怪證異於常患之病故謂之怪疾

肉癥

三肉癥者思肉不已食訖復思白馬尿

酒癥

五一人病心痛此酒稍敬方復飲至前量至明朝嘔青

黃水數口夜變魚腥臭六七日始安戴人張好以藥吐之乃吐虫一條青黃色長六寸口目鼻俱

全狀如蛇醢乾一二斗視人乃酒癥也翹○一男自幼喜飲酒日飲一二斗無酒叫呼不絕全不進食日

就癯弱家中設策令人用手中縛住手足却取生酒一壘於口邊打開其酒氣衝入口中病者必欲

就以飲堅不與之須臾口中忽吐物一塊直下壘中以物蓋覆猛火烘滾約乾一半却開取之其物如

猪肝狀約三兩重周回有小孔如鍼眼不可數計棄之於江自後雖滴酒不能飲矣

髮癥

一人有飲油五升以來方始快意常喫則安不飲則病此是髮入胃化為虫雄黃半兩為末水

調服虫自出投沸油中棄之江中病即愈○一道人心腹煩滿彌二歲甄立言診曰腹有蟲誤食

髮而然令餌雄黃一劑少頃吐一蛇無目燒之有氣乃愈○一人患腰痛牽心每發輒氣欲絕

衆吐以爲肉癰徐文伯視之曰此髮癰也油投之即吐物如髮稍引之長三尺頭已成蛇能動掛門上滴盡惟一髮而已門中常有一婦人病胃膈微痛時復流涎沫自言咽下胃中常有雷聲心膈微痛時復發昏鍼灸藥餌三載不愈戴人用痰藥一涌而出雪白虫一條長五六寸有口鼻牙齒走於涎中病者惡而斷之中有白髮一莖此髮癰也紉

雞瘕

褚澄爲吳郡太守李道念到郡澄見謂曰汝有重病答曰舊有冷病今五年矣澄爲診曰汝病

非冷非熱當是食白淪雞子過多所致令取蒜一升煮服之乃吐一物如升大有涎裹之開看則是雞雛翅羽爪距悉具能行走澄曰此未盡令更服藥又吐如向者十三頭而安

蛟龍瘕

春秋二時龍帶精入芹菜中人偶食之得病發則似癰面色青黃腹滿痛不可忍名爲蛟

龍病取飴糖二三升日兩度服吐出如蜥蜴三五枚即差○蛟龍子生在芹菜中食之入腹變成龍子日用錫糖粳米杏仁乳餅煮粥食之三升日三服吐出蛟龍子有兩頭可驗

蛇瘕

華佗行道見車載一人病噎塞食不下呻吟

之果吐大蛇一枚而愈韃○一人常飢吞食則下

至胃便即吐出醫作噎治不效任度曰此因食

蛇肉不消而致斯病但揣心腹上有蛇形也

視之果然遂用硝磺合而服之微利即愈

驚瘕

人食驚肉不消成瘕伏在心上消昔有人與奴俱得

此病奴先死剖其腹得驚置庭中有垂白馬客來

看其馬放尿驚上即便消化其主知其奇效取飲

之即愈○白雌雞一隻勿與食令飢過一宿明日

以猪脂煎飯喂之取其屎熬乾為末白湯調下一

錢日三服須消盡乃

止好了殺雞食之

蛤精疾一人患脚跟腫痛諸醫莫識徐之才曰蛤精

疾也由乘船入海垂脚水中而得為剖出二

愈蛤而

眼見五色物近一人酒色過度眼見空中有五色物稍

近變成一美婦人亭亭而立徐之才曰

此色慾多太虛所致乃處
補藥飲之數劑而愈

視物倒植

皆一人因大醉極吐熟睡至次早眼中視物

致倒膽府故視物皆倒法當復吐以正其膽則自

愈

四肢堅如石

寒熱不止經日後四肢堅如石以物擊

等分判煎湯飲之自愈

化生鰕魚

口鼻腥臭水流以碗盛之有鐵色鰕魚如

壤也任意飲食雞肉自愈

腹如鐵石

腹中如鐵石臍中水出旋變作虫行之狀

木湯浴之以蒼朮末入麝香少許水調服之而痊

遍身波浪聲

遍身忽皮底渾渾如波浪聲痒不可忍搔之血出謂之氣奔人參苦拔青鹽細

辛各一兩剉作四貼每

身出斑毛

眼赤鼻張大喘渾身出斑毛發如銅鐵乃目熱毒氣結於下焦白礬滑石各一兩

為末水煎服不住乃安

十指斷壞

手十指節斷壞惟有筋連無節肉虫出如燈心長數尺餘遍身綠色名曰血餘赤茯苓

胡黃連煎湯飲之自愈

有蟲如蟹

有虫如蟹走於皮下作聲如小兒啼為筋肉之化雷丸雄黃各一兩為末糝於猪肉

片火上炙熟食之自安

肉出如錐

遍身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食此名血壅若不速治潰而膿出赤皮葱燒

灰和水淋洗喫鼓湯自安

毛竅血出

遍身毛竅節次血出若不出皮膨脹如鼓須臾眼鼻口被氣脹合此名脉溢飲生薑

汁一盞
即安

身生猫眼瘡

面上及遍身生瘡似猫兒眼有光彩無膿血但痛痒不常久則透脛名曰寒瘡

多喫魚雞韭葱
等物則自愈

口鼻氣出不散

口鼻中氣出盤旋不散凝如黑蓋色過十日漸至肩胛與肉相連堅勝金

鐵多因瘡後得之煎澤瀉
湯日飲三盃五日乃愈

渾身生療疮

渾身生療疮如甘棠梨每箇破出水內有石一片如指甲大疮復生抽盡肌膚

肉不可治三稜蓬朮各五兩
為末分三貼酒調服自愈

人身作兩

人自覺其形作兩人並卧不辨真假不語問亦無對乃是離魂辰砂人參白茯苓濃

煎湯服之真者氣
爽假者化也

生瘡如櫻桃

項上生瘡如櫻桃大有五色瘡破則項皮斷但逐日飲牛乳自消

四肢節脫

四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解用酒浸黃蘆三兩經一宿焙乾為末每二

錢酒調下愈

身腫如蛇狀

身上及頭面肉上浮腫如蛇狀取兩滴階磚上苔痕一錢水化開塗蛇頭立消

得

身有光色

頭面發熱有光色他人手近之如火燒人用蒜汁半兩酒調服如蛇狀遂安

雜方

救荒辟穀方

粒食者生人所資數日乏絕便能致命本草有不飢之文而醫方不言斯術者以其

涉在仙竒非庸俗所能導也遂使荒饑之歲餓死橫路良可哀哉今畧載其易為者云若值奔竄在無人之鄉及墜墮溪谷空井深坑之中而四顧絕無可以藉口者便須飲水服氣其法如左



燕津服水法

飢餓欲死便閉口以舌攪上下齒取津液而嚥之一日得三百六十燕便佳漸

習乃可至千自然不飢三五日小疲極過此便漸輕強若有水處卒無器便以左手掬水呪曰承椽吏之賜真乏糧正赤黃行無過城下諸醫以自防呪畢三叩齒右手手指三叩左手如城此三遍便飲之有盃器貯水尤佳如法日服三升便不飢針

服六天氣法

六天氣服之如龜蛇服氣則不死陵陽子明經

言春食朝霞日欲出時向東氣也夏食正陽南方日中氣也秋食飛泉日欲沒時向西氣也冬食沆令北方夜半氣也并天玄地黃之氣是為六氣皆正陽日入為飛泉夜半為沆瀣并天玄地黃為六氣○昔有人墮穴中其中有蛇每日常作此氣服之其人依蛇時節飢時便服蛇一日如躍之久漸有驗似能輕舉啓蟄之後人與蛇一日如躍之久漸有驗

斷穀不飢藥

餌松栢葉法

周行山澤間取松栢葉細切和水服二

無衣服身皆生黑毛跳坑越澗如飛至合圍取獲

則乃一婦人言我是秦宮人關東賊至秦王出降

驚走入山飢無所食有一人老公教我食松栢葉

秦時

已三百餘年矣針

黃精

或久服斷穀不飢甘美易食根葉花實皆可服餌

天門冬

取根蒸熟去皮食之甚香美荒

木取木作丸散久服餌可以代糧○一人避亂山

薯蕷

取根蒸熟食之或搗粉作麪食

旋菑根

蒸熟食之可斷穀不飢

葛根可採取斷穀作粉餌之

何首烏亦可採根蒸曝丸散任意

百合採根可蒸煮食之甚

松葉守中不飢斷穀所宜取細切如粟和水或米飲

末和水服亦佳○松白皮蒸熟食之辟穀不飢○

松脂一介白茯苓四兩為末每晨和水服或蜜丸

栢葉服法同松脂久

榆白皮荒歲人食之以當

白茯苓善能斷穀不飢○大麥麴亦麥麴一介茯苓

和得百日以黃蠟代油燂成煎餅飽食一頓便絕食

三日後飲脂麻湯少潤腸胃

橡實去皮煮食最益人實中令

蠟仙經斷穀最為要用今人但嚼食充飢可辟穀不飢食

胡桃肉即解○白麪一斤黃蠟為油作煎餅飽食

可胡百日不飢○合松脂杏仁棗肉茯苓等分為末

栗煨熟食之令

藕蒸食可休糧食之最佳○蓮子去皮心蒸熟

海松子食之不

大棗久服不

菱芡菱仁或芡仁皆可休糧○今多蒸曝取仁為

芋

煮熟食之可以當糧食而度飢年

烏芋

作粉食之或煮熟食令人不飢荒歲可充糧

桃膠

補中不飢以桑灰漬之服餌身輕百病愈數月斷穀

胡麻

九蒸九曝熬搗餌之斷穀不飢長生○又合白大豆素同蒸曝作團食令不飢斷穀○胡麻休

之糧入重

白脂麻

仙方蒸曝服餌以辟穀

榛子

久食令人不飢

大麻子

令人不飢○麻子二升大豆一升熬令香搗末蜜九日二服令不飢○又麻子一升白羊

脂七兩蠟五兩白蜜一合和搗蒸食之不飢

黑豆

炒熟以棗肉同搗之為麪可以代糧○左元放救荒年法擇取雄黑豆三七粒生者熟按之令

煖氣徹豆心先一日不食次早以冷水吞下魚肉菜果不復經口渴則飲冷水初雖小困十數日後

體力壯健不復思食矣○仙方修製

粳米

荒年穀貴無以充糧取粳米一升酒三升漬之出曝乾又漬又曝酒盡乃止稍稍食之渴飲冷

水辟三十日足一斛二升辟周年○又大米三合炒過以黃蠟二兩熔銚內入米炒令乾任便食之

數日不飢如食胡椒二箇即思食○胡椒

糯米

岩遇凶年穀貴取糯米一斗淘洗百蒸百曝搗末日一食以冷水得三十日都盡則可終身不

食不飢○乾

青梁米

青梁米一斗以苦酒一斗漬之三日出百蒸百曝好裹藏之遠行一食十日不飢重食九

十日不飢○青梁醋拌百蒸百曝可作糗糧辟穀○乾

蔓菁子

取子用水煮三遍令苦味盡暴乾搗末水服二錢日三久漸增服可以辟穀○又蔓菁取

苗葉莖根四時長服可以備饑歲

荏子服食斷穀○可蒸令熟烈日乾之

辟穀絕食方欲年荒穀貴或遠方水火不便或修行入

晒乾去皮為末大麻子三升五升淘洗蒸三遍

勻成團如拳大再入甑蒸之從一夜至二塊以飽為度

不得喫一切物第一頓七日不食第二頓七七日

勝更不惟粹如渴則飲大麻汁以滋潤藏府若

亦可○一方有白茯苓五兩

千金麴草二斤白麴六斤香油二斤白茯苓四兩甘

拌勻搗作塊甑內蒸熟陰乾為末每取一大匙冷水調下可經百日不飢其麴於絹袋盛之可留至

十年

類聚

辟穀不飢方

甘菊花白茯苓黃蠟松脂蜂蜜等分爲末先煉蜜次下藥和勻丸如彈子每一

丸白湯
嚼下類聚

避難大道丸

黑豆一升去皮貫衆甘草各一兩茯苓
蒼朮砂仁各五錢剉碎用水五盞同豆

慢火熬煎直至水盡揀去藥取豆搗如泥作灸實
大磁器密封每爵一丸則恣食苗葉可爲終日飽
雖異草殊木素所不識亦無毒計甜與進飯糧一
同。一方黑豆一升貫衆一升細剉同煮豆香熟
反覆令展盡餘汁絞去貫衆只取黑豆空心日啖
五七粒任食草木無妨忌魚肉菜果及熱湯數日
後不復思食少

諸法

取水火法

陽燧向日然而爲火許慎云陽燧金也取
金盃無緣者熟摩令熱日中時向日以艾



承之則然得火也。○日者太陽真火以水精珠或
心凹銅鏡向日射之以艾承接其光聚處火出故

知之。○方諸大蚌也。向月承取
水二三合如朝露。主明目。乾取

磁石指南。獨以磁石磨鍼鋒則能指南。其法取新續中

之則鍼常指南。以鍼橫貫燈心。浮水上亦指南。然
常偏丙位不全南向也。蓋丙為大火。庚辛金受其

理相感如是物

不畏寒。酒服二錢。日再則大寒時單衣汗出。乾末

香身法。煮服之。亦可零陵香亦香。身飲浴皆佳。乾氣

令人勇。服雄雞腸中搏爛生食之。令人勇。雄雞三枚。納

去鬼通神。安息香燒之。去鬼

見鬼方。要見鬼者。以生麻子石菖蒲等分。為末。蜜丸。彈子大。每朝向日服。一丸。服滿百日。即

見鬼

隱形法

白犬膽和通草桂心作末蜜和為丸服能令人隱形青犬尤妙

令夫婦相愛

夫婦不和取鴛鴦肉作羹驪私與食之即相怜愛○五月五日取布穀鳥脚腦

骨帶之亦令夫妻即相愛

去妬方

薏苡仁天門冬赤黍米等分蜜丸男婦服之皆不妬忌○又鷄鷄肉食之亦不妬忌

去衣油及衣垢

東壁土可除油污衣勝石灰滑石○合歡皮及葉可洗衣垢又梅葉搗碎

湯洗衣垢易脫又芋煮汁洗垢衣白如玉又赤小豆粉解油衣粘綴甚妙○又皂角湯去垢最妙

軟玉法

蟾蜍肪塗玉則刻之如蠟但不可多得取肥者剉煎膏以塗玉亦軟滑易截古玉器有奇

特雕琢非人功者多是昆吾刃及蟾蜍肪所刻也

爛石法

地榆根燒灰能爛石○蟾蜍尿取以塗石亦能爛石



香譜通芳
 和四
 香疑
 花百
 碎
 雲
 寶
 清

文苑
 沉香
 白檀
 沉香
 甘松
 玄參
 丁香
 麝香

新料
 降真
 白檀
 甘松
 白芷
 茅香

笑蘭
 白檀
 沉香
 沉香
 降真
 麝香
 腦子
 甲香

清遠
 茅香
 沉香
 沉香
 沉香
 麝香
 白檀

錦囊
 腦子
 零陵
 麝香
 木香
 白檀
 藿香
 丁香

醒心
 藿香
 麝香
 腦子
 沉香
 沉香
 沉香

凝和
 麝香
 丁香
 白檀
 甲香
 沉香
 甘松
 腦子

右為末用蜜少許拌勻
 如常法燒之文房中

瑞雲香毬
 酸棗仁一升水
 和研汁一椀煎成膏香附
 子白芷各三兩白檀茅香艾納香坤砵

妹草豆蔻丁香各一兩木香五錢龍腦一錢右為末以酸棗仁膏搜和入熟蜜和勻拌令不粘手得

尺許為丸蓮子大每燒一丸青烟直上三尺

芙蓉香

沉香一兩丁香白檀各二兩零陵香甘松香茅香各一兩丁香白檀各三兩子八角各七錢小腦五錢白

筋子大兩陰乾燒之此芙蓉水和小炷法也

聚仙香

沉香東香二兩白檀香一兩丁香三兩子狼苔

蜜焰硝各五錢龍腦麝香各一錢白芨三兩右七料為末分兩包取鈔子安於火上攪油蘇合安

息蜂蜜熔化放令微溫乃入一包香末及腦麝焰硝攪令十分和勻用一包乾末作粉糝手塗擦竹

心上一陰乾燒之○一名清遠香

淹藏果實法

臘雪水淹藏一切果實良○酒糟藏物不敗可淹

香肥皂

沉香白檀丁香零陵香三兩子各一兩小腦三錢麝香一錢右為末入皂角末五兩黑糖

二兩或三兩於火上熔化拌和香末作丸彈子大
九盥洗時用此搓洗手面去垢膩俗名香飛露

辟蚤虱

虱菖蒲甚去虱殺蚤虱虱亦可辟去之青蒿殺虱煎湯

洗之○水銀殺皮膚中虱唾研塗之鼈虱輕粉亦
同鞣○九人洗濯衣服於粉糲內入水銀少許研

白糲衣其後虱永不生○帶砒礬辟蚤虱○
壁虱蜈蚣其後虱永不生○即去又青鹽水遍洒床席

絕上

辟蚊蠅

五月取浮萍陰乾燒烟去蚊蠅○百部根殺

○鰻鰻魚乾者燒室中蚊蠅化為水○五月五日取
編蝠晒乾和桂皮乳香為末燒之去蚊蠅○木鱉

子川芎雄黃為末
燒之蚊遠去

辟蠹

諸蠹魚燒熏中斷蛀虫置骨箱中斷白魚免

置書中無蠹患○薺菜花將去席下辟虫蠹○
棋插置衣箱中殺虫魚○烏賊骨投井中虫蠹盡

死
斃

殺禽獸賊鼠

○狼毒殺飛鳥走獸亦殺鼠
○馬刀殺禽獸賊鼠斃

殺魚

○巴豆殺虫魚○川椒殺一切魚取皮投水中可
取魚○椒木皮汁殺諸魚置水中則魚盡死斃

集鼠

○蟹燒之致鼠○蟹黃并熬燒烟可以集鼠於庭
○蟹以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢至斃

粘瓦石

○榆白皮濕搗如糊用粘瓦石極有力
○雞子白和白礬末粘磁器甚固斃

獸食物即醉

○虎食狗則醉○猫
食薄荷即醉○貓

解鬱氣

○凡久閉空房不宜輒入先以香物及蒼术皂
莢之類焚之使鬱氣消散然後可入不然感

之成
疾

解烟熏

○居民逃避石室中賊以烟火熏之欲死迷悶
中摸索得一束蘿菹嚼汁下咽而甦○炭烟

熏人頭痛嘔吐往往致死生蘿菹搗取汁飲
之即解無生則蘿菹子水研取汁服亦解





枸杞子酒

能補益枸杞子五升清酒二斗研細浸七日取出滓飲之初以三合為始後則任

性乾

地黃酒

糯米一斗生地黃三斤細切同蒸爛熟入白麴如常法拌釀候熟任意飲之大能和血駐

顏小

天門冬酒

補益天門冬去皮心搗取汁二斗漬麴二升麴發以糯米二斗准家釀法造酒封四

七日取出澄清飲之若得天門冬為末和服尤佳端

戊戌酒

糯米三斗蒸熟黃雄犬一隻去皮腸煮一伏時候極爛搗為泥連汁與飯同拌勻用白麴

三兩和勻釀之二七日熟空心飲一盃極能補養元氣老人尤佳端

神仙固本酒

鹿末六兩枸杞子還童牛膝八兩何首烏

門冬生地黃熟地黃當歸人參各二兩肉桂一兩糯米二斗白麴二升蒸熟和藥末釀如常法端

蒲萄酒

蒲萄熟者接取汁同糯米飯白麴和釀之自然成酒味亦美好山蒲萄亦可釀

蜜酒

好蜜二斤水一椀白麴一升半好乾酵三兩右先熬蜜水去沫令極冷下麴酵每日三攪三日

熟甚佳

雞鳴酒

右先將粘米三升淨淘水六升同下鍋煮作粥夏攤冷春秋溫冬微熱麴酵麥芽皆擣細

末二日

同餵篩下在粥內拌勻釀之冬五日春秋夏各二日即為美醞矣○歌曰甘泉六椀米三升做粥

溫調

勻黃昏時候安排了來朝便飲瓮頭春用必

白花春

糯米一斗百度洗淨浸一盃水常法釀之過三日蒸熟以所浸水澆之入白麴如常法釀之過三

日即成美醞白蟻浮上最佳

煮酒

好清酒一撮濕米於其上重湯煮之其米成一錢緊封口

矣取出放冷用



作酒本

待白米一升洗淨浸水中冬十春秋五夏三日

接按十分調勻納缸中封口冬置溫處夏置涼處待消化成酒乃取用其味微酸澁而滑為好

造神麴法

如六月六日謂諸神集會之晨故名為神麴

料至上寅日踏麴亦是○白虎即帶麴白麴二十斤○勾陳即蒼耳自然汁一升○滕蛇即野蓼

自然汁一升三合○青龍即青蒿自然汁一升○玄武即杏仁去皮尖○青龍研如泥一升三合○朱

雀即赤小豆煮熟擣如泥○又云或甲寅戌寅庚寅用上寅日踏極實為度○

日乃三奇也○神麴六神之麴也必六物備可謂之神也

百藥煎法

麴五倍子二斤半烏梅肉白礬各四兩酒白

烏梅煎不可多水要得其所却入五倍末并礬麴和勻如作酒麴樣入磁器內遮不見風候生白

取出晒乾聽用染鬚者加綠礬四兩

造鼓法

以大豆為黃蒸餅末每一斗加鹽四升川椒

熱加生薑細切五兩拌勻入器內封口埋蓬艾積

草中厚覆之或馬糞中過七日或二七日乃取用

造飴糖法

以糯米煮粥候冷入麥芽末候熟取清再

熬如琥珀色者謂之膠飴可入藥其牽白

造半夏麴法

等半夏不以多少為末以生薑汁白礬湯

入藥○風痰以皂角煮汁去渣煉膏和○火痰老

痰以竹瀝入薑汁和○濕痰寒痰以生薑濃煎湯

加枯白礬三分之一和椒餅麴三兩造麴如前法

造海粉法

紫海蛤一斤火煨紅童便淬過九三次為

麻繩穿貫懸當風處吹乾為末聽用

造輕粉法

起為末綠礬各等分同放鍋中煮令黃色取

兩拌勻同八瓦罐內上用鐵燈蓋蓋之外用黃泥如法固濟勿令泄氣候乾用炭火旋旋燒上頻頻

以水滴鐵燈蓋內候罐通紅則內藥盡升上罐口候冷拆開即成輕粉入藥聽用

作熟地黃法

採生地黄不拘多少以水浸之沉者名

天黃其人黃天黃及細根擣取汁其地黃浸之以柳木甑或瓦甑盛地黃蒸熟取出晒乾又浸汁中

一宿又蒸之出晒乾如此九蒸九晒蒸時每以糯米清酒洒之十分爛熟色如烏金色則成就矣乃

晒收之入藥聽用

煮鹿角膠霜法

取鹿角鋸斷一寸長置長流水中浸三日洗刷去垢膩入砂鍋內以清水

煎過不露角以桑葉塞口以桑柴火煮之旋添熱水勿令火歇如是三日候角爛軟酥即止

取角晒乾謂之鹿角霜其汁澄瀝取清候凝作片
風中吹乾謂之鹿角膠膠霜收取聽用入藥○勿

用自落角者連腦
骨者乃殺取也

取蟾酥法

五月五日取活蟾蜍捉住後以鍼刺破眉
間以物輕輕鼓其背則白汁自出以竹篦

刮下塗油紙上
陰乾用之

晒乾人乳法

人乳數碗入瓦盆內莫攪動四圍晒乾
刮取之又晒又刮直至乳盡以薑汁拌

晒用
之

酒煮蠟法

黃蠟十兩於銀石器內熔化作汁用
瀝去滓以清酒一升煮蠟熔滾取起候冷

其蠟自浮於水
上去酒取用

製牛膽南星法

南星為末臘月取黃牛膽汁拌勻入
膽內封口掛當風處陰乾聽用

陰煉秋石法

人尿多聚置大盆中以新水相和攪轉
百匝放令澄清辟去清水只留濁脚又

以新水同攪水多為妙又鋪厚紙於篩內傾在此十餘上
直候無臭氣水香為止鋪厚紙於篩內傾在此十餘上
瀝去清水晒乾為末以初男乳汁和勻如膏烈日
中暴乾如此九度色如粉白蓋假太陽氣也謂之
陰煉秋石能
滋陰降火

陽煉秋石法

其尿多聚置盆中入皂角汁少許以殺

破辟去清水只取濁脚又入水攪百餘更澄清
去水取濁更以布濾去滓取濃汁入淨鍋內熬乾
刮下搗篩再入鍋以清水煮令化乃於箕筲內布
厚紙兩重傾汁于其上淋過去水再入鍋熬乾又
用湯煮化布紙淋汁如色未潔白更准丁淋候色
如霜雪即止因入固濟砂盒內歇口火煨成汁傾
出候瑩白玉色即止細研入砂盒內固濟頂火四
兩養七晝夜久養火尤善謂之陽煉秋石治諸般
冷疾久年虛損服之皆愈○煉秋石謂之取龍虎
水法龍屬木虎屬金即童男童女之稱擇年方十
三四十五六無疾病未破陰陽者各置淨室精潔
飲食用磁缸收貯小便積至一二石煉用但功力

甚大故只取無病入小
便積多亦可煉用

茯苓造化糕

白茯苓蓮肉山藥芡仁各四兩為細末
粳米二升擣為粉砂糖一升刮為雪右

和勻入甑中以竹刀劃為片子以簾布覆甑蒸
熟取出晒乾任意食之若覆木蓋則不熟矣醪

秘傳三仙糕

人參山藥蓮肉白茯苓芡仁各四兩另
為細末白蜜一升砂糖一升刮為雪糯

米三升粳米七升各擣作末右和勻蒸出
晒乾再為末每取一大匙白湯調下

造煎藥法

白薑五兩桂心二兩丁香胡椒各一兩半
已上另為細末大棗蒸去核取肉為膏二

銖三升為阿膠煉蜜各三銖右先熔膠次入棗蜜
消化乃入四味藥末攪勻煎微溫下篩貯器待凝

取用

六香膏

治冬寒凍傷皸瘰白檀香沉香丁香零陵
香甘松香八角香各一兩為麤末入三升蜜

中浸之封口經七日或十日取出於火上微溫下
篩去滓乃入三乃子細末五錢小腦末三錢冬瓜

○仁細末七兩或十兩攪勻再下疎篩野器中用之

衣香

茅香蜜炒一兩白芷五錢沉香三錢沉東香白檀香零陵

香甘松香八角香丁香三錢乃子各二錢右並為

十香膏

沉香一斤丁香白檀甘松鬱金各五錢麝香剉入麻

油以文武火煎二三十沸用綿濾去滓拭鐺下了煉

珠然後乃入乳香木香白膠香龍齒蘇合油末各

五錢麝香末二錢半攪勻三五遍候凝作片用

琥珀膏

琥珀一兩丁香木香各七錢半木通桂心當

一介右除琥珀丁香木香桂心朱砂為末外其餘

並剉浸油三宿慢火煎攪候白芷焦黃色瀉出次

下松脂熔化濾去滓再熬下黃丹一介以柳篋不

往手攪令黑色滴水成珠乃入琥珀等五末攪

勻候凝作
片聽用燭

神仙太乙膏

玄參白芷當歸肉桂赤芍藥大黃生地黃各一兩剉浸麻油二斤春五夏三秋

七冬十日慢火煎令白芷焦黃色去滓下黃丹一升極攪勻滴水成珠乃候凝作片聽用燭

救苦膏

治風濕痰疼川烏炮三錢牛膝黃丹乳香另研各五錢白芷貝母白芨白欽各二錢槐潤

一錢撫癰代沒藥另研七錢白膠香另研杏仁泥各三兩當歸一兩瀝青另研八兩香油半盞右末

和勻以香油澆潤火上焙化每二兩作一貼攤油紙付患處

玉容膏

一名玉容西施膏塗燥瘡黃芪當歸白芷川芎藿香零陵香白檀香香附子白欽白芍藥

白芨杏仁各一兩瓜蒌一箇龍腦二錢清油四升黃蠟一升右除龍腦並剉浸油中春五夏三秋七

冬十日滿於石器煎候白芷焦黃色乃去滓入蠟熔化又去滓入龍腦攪勻密封用之冬則蠟減

半袖



雲母膏

雲母煇硝甘草各四兩槐枝柳枝陳皮桑白皮側柏葉水銀各二兩川椒白芷沒藥赤芍

藥肉桂當歸鹽花黃芪血竭菖蒲白芨芎藭木香白欽防風厚朴麝香桔梗柴胡松脂人參黃芩蒼

朮草龍膽合歡乳香附子茯苓高良薑各五錢黃丹十四兩清油二斤半右除雲母煇硝血竭沒藥

乳香麝香黃丹鹽花外餘藥剉浸油中七日後文火煎候白芷附子焦黃色以布絞去滓再熬後下

黃丹等八味細末以柳木篦不住手攪直至膏凝滴水中成珠為度傾在磁器內彈水銀在上每用

刮去水銀凡癰疽瘡腫外貼內服神效

臘享膏

治凍瘡臘猪脂獐油各二兩半香油二合半海松子油一合明松脂黃蠟各三兩七錢半

右各煉去滓熔化成膏待凝貯器中塗之

神異膏

洗淨玄參杏仁各一兩黃芪七錢半蛇退鹽水

丹五兩右先將油及髮銚中熬候髮烺盡入杏仁候杏仁黑色綿濾去滓乃入黃芪玄參熬一二時

稍停入蜂房蛇退攪熬至紫黑色又瀝去滓慢火熬下黃丹急攪千餘轉滴水不散膏即成矣磁器

收貯用治諸般癰毒瘡

萬應膏

大黃黃芩各二兩白斂黃蠟各一兩黃柏芍藥白芷黃芪木鱉子仁杏仁當歸白芨生地

黃官桂玄參沒藥乳香各五錢黃丹一斤香油二斤八兩右十四味剉浸油三宿慢火熬以柳枝攪

以白芷焦黃色為度綿濾去滓入黃丹再熬滴水成珠乃入乳沒蠟熔化攪勻收貯盛器埋土中七

日取出攤用治一切癰腫久瘡

善應膏

黃丹八兩白膠香乳香沒藥並另研當歸白芷杏仁大黃草烏赤芍藥續斷生乾地

黃川芎瀝青另研亂髮各一兩右香油一升浸藥三宿慢火熬至黑色再入葱白亂髮煎少時瀝去

滓再上慢火熬却入黃丹以柳篦不住手攪滴水成珠不散乃入乳沒膠香十分攪勻盛器沉水中

三日取出聽用治諸般惡瘡腫毒及諸傷



白龍膏

白薇白芷白欵黃芪商陸根柳白皮桑白皮
各一兩輕粉五錢另研乳香二兩另研定粉

黃蠟各八兩杏仁油一介
日揉熬令白芷黃色去滓下黃蠟乳香令溶化出
火再瀝微冷下輕粉定粉急攪至冷收貯
攤緋帛上貼之治諸般惡瘡久瘡腫毒翻

靈應膏

白麥飯石火煨醋淬十餘次研令極細
燒存性白欵並為細末右取石末白欵末各

二兩鹿角末四兩並要極細不細則反痛取好米
醋八銀石器煎令魚眼沸却入三味藥末竹篦子

不住手攪熬一二時稀稠得所傾出候冷先以猪
蹄湯或藥水洗去膿血提乾鵝翎拂藥塗四圍凡
赤處盡塗之但留一日洗換十日後兩日一換其效

以醋拂濕初便一日洗換十日後兩日一換其效
如神治癰疽惡瘡
瘰癧結核乳癰癰

爐灰膏

治癰疽惡瘡內點去瘀肉最妙用響糖爐內
灰一兩煨燥一升半風化石灰一升炒紅以

箕子盛貯用滾湯三碗慢慢淋自然汁一
鍋盛慢火熬如稀糊先下巴豆末次下蟾酥各二

錢白丁香末五分石灰炒一錢攪勻再熬如乾麪
糊取起候冷磁罐盛貯勿令泄氣每用時以簪頭
挑少許放指甲上研呵氣調勻如泥用鍼
撥開患處以藥點之勿點好肉及眼上門

造黃丹法

黑鉛一斤土硫黃焰硝各一兩先熔鉛成
汁下醋點之滾沸時下硫黃一小塊續下

硝少許沸定再點醋依前下少許硝黃已消沸定
黃亦盡炒為末成丹矣入藥又炒令色變細研水
飛二遍門用之

取竹瀝法

截青大竹二尺許劈作兩片浸井水一宿
以塼二塊排定將竹片架於塼上兩頭出

一二寸下以烈火逼之竹兩頭以器承瀝收合綿
濾去滓砂瓶收貯暑月以冷水沉冷以防瀝酸寒

月置溫處勿令凍傷心

造紅燒酒法

凡燒酒煮取時先將紫草細切納於缸
中一瓶燒酒則紫草五錢或七錢為准

乃承取熱燒酒於紫草缸中
停久則其色鮮紅可愛裕



辟果樹上烏鳥法

取生人頭後掛樹上則烏鳥不敢來食其實矣○有人逃走取其

於緯車上却轉之則迷亂不知所適矣

鹿角粥

一大能補髓腦牢牙齒益精血固元氣每白粥一匙入鹿角霜粉五錢白鹽一匙攪勻服

山芋粥

上能潤肺益氣山芋生者去皮於石上或新瓦上細磨如泥二合蜜二匙牛乳一鍾粥半於

慢火上同炒令極熟乃投白粥一椀中攪勻服之不極熟則辣喉

避難止小兒哭法

閉其氣以一小毬略使滿口而不致

漬之臨時縛置兒口中使嚙其味兒口有物實之自不能作聲而綿軟不傷兒口蓋不幸而遇禍難

啼聲不止恐為賊所聞棄之知道傍哀哉用此法活人甚衆不可不知門

東醫寶鑑雜病篇卷之九