


東醫圖書寶鑑

奎章閣圖書
7608
1
19

奎章閣圖書	
部別	分類記號
	圖書番號 貴1933
	一部冊數 24
	內別番號 18
서울대학교	

東醫寶鑑



雜病篇十

婦人




東醫寶鑑雜病篇卷之十

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

婦人

求嗣

人生之道始於求子求子之法莫先調經每見婦人無子者其經必或前或後或多或少或將行作痛或行後作痛或紫或黑或淡或凝而不調不調則血氣乖爭不能成孕心○求嗣之道婦人要調則血氣要神足又寡慾清心○為上策寡慾則不經調男子要神足又寡慾清心○為上策寡慾則不妄交合積氣儲精待時而動故能有子是以慾寡則神完不惟多子抑亦多壽○男子陽精微薄則雖遇血海虛靜流而不能直射○男子宮多不成就胎蓋因平時嗜慾不節施泄太多宜補精元兼用靜工存養無令火動候陽精充實依時而合一舉而成功矣○男子陽脫痿弱精冷而薄宜固本建陽丹續嗣丹溫腎丸五子衍宗丸○男子脉微弱而流為無子精氣清冷也宜陽起石元龜○女宜鼓動微陽宜玉鑰啓榮丸龜斯丸○



東醫寶鑑雜病篇卷之十

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

婦人

求嗣

人生之道始於求子求子之法莫先調經每見婦

人無子者其經必或前或後或多或少或將行作痛或行後作痛或紫或黑或淡或凝而不調不調則血氣乖爭不能成孕。○求嗣之道婦人娶經調男子要神足又寡慾清心為上策寡慾則不交合積氣儲精待時而動故能有子是以慾寡則神完不惟多子抑亦多壽。○男子陽精微薄則雖遇血海虛靜流而不能直射。○子宮多不成就胎蓋因平時嗜慾不節施泄太多宜補精元氣用靜工存養無令火動候陽精充實依時而合一舉而成功矣。○男子陽脫痿弱精冷而薄宜固本健陽丹續嗣丹溫腎丸五子衍宗丸。○男子脉微弱而澁為無子精氣清冷也宜陽起石元龜。○女宜鼓動微陽宜王鑰啓榮丸螽斯丸。○女宜

婦人無子多由血少不能攝精宜調養經血宜百
子附歸丸琥珀調經丸加味養榮丸加味益母丸
濟陰丹勝金丹調經養血元溫經湯王湯先天歸一湯神仙附
益丹調經養血元溫經湯王湯先天歸一湯神仙附
真精不能攝入子宮雖交不孕雖孕不育是以男
女配合必當其年孕○無子婦人瘦怯者乃子宮
乾澀宜滋陰養血四物湯鱈魚南星加香附黃芩肥
軀脂滿溢子宮宜行濕燥痰南星加香附黃芩滑石
防己羌活或導
痰湯防覷痰門

相女法

未笄之婦陰氣未完慾盛之婦所生多女性行
和者調經易挾性行妬者月水不勻相貌惡者

刑重顏容美者福薄太肥脂滿子宮太
瘦子宮無血俱不宜子不可不知

脉法

求嗣之脉專責於尺○右尺偏旺火動好色○左
尺偏旺陰虛非福○惟沉滑勻易為生息○微澁

精清無遲冷極○若見微濡入房無力○女精不
生亦尺脉瀦○男子脉微弱而澁為無子精氣

清冷也

固本健陽丹

凡入無子多是精血清冷或房勞過傷以致腎水欠旺不能直射子宮故爾豈

可專責於母血之不足虛寒耶熟地黃山茱萸各三兩巴戟二兩兔絲子續斷酒浸遠志製蛇床子

炒各一兩半白茯苓神山藥酒蒸牛膝酒洗杜仲酒洗切酥炒去絲當歸身酒洗肉苁蓉酒浸五味子

益智仁鹽水炒鹿茸酥炙各一兩加枸杞子三兩入參二兩右為末蜜丸梧子大空心鹽湯或溫酒

下五七十丸
臨卧再服

續嗣丹

無子宜服山茱萸天門冬麥門冬各二兩半破故紙炒四兩兔絲子枸杞子覆盆子蛇床

子巴戟熟地黃韭子炒各一兩半龍骨黃芪牡蠣山藥當歸瑣陽各一兩人參杜冲各七錢半陳皮

白朮各五錢黃狗外腎酥炙二對為末用紫河車一具蒸製同門冬地黃爛搗他藥並為細末煉蜜

和勻搗千杵作丸梧子大每取百丸空心及臨卧以溫酒或鹽湯任意吞下

溫腎丸

服之有子山茱萸熟地黃各三兩巴戟二兩兔絲子當歸鹿茸益智杜冲生乾地黃茯苓神

山藥遠志續斷蛇床子各一兩右為末蜜丸梧子大空心溫酒下五七十丸精不固倍鹿茸加龍骨

壯蠟

五子衍宗丸

治男子無嗣枸杞子五兩車前子三兩兔絲子酒浸製七兩覆盆子五兩

子一兩右搗為末蜜丸梧子大空心溫酒吞下九

十九臨卧鹽湯吞下五十九春丙丁巳午夏戊巳辰戌丑未秋壬癸亥子冬甲乙寅卯須上旬晴日

合忌見僧尼寡女孝子六畜不爭之物
精者去車前子代蓮子

陽起石元

治丈夫精冷真精氣不濃不兆施是以無子陽起石火煨研兔絲子酒浸製鹿茸酒

蒸焙天雄炮韭子炒肉苁蓉酒浸各一兩覆盆子酒浸石斛桑寄生沉香原蚕蛾酒炙五味子各五

錢右為末酒煮糯米糊和丸梧子大空心鹽湯下七十九丸

玉鑰啓榮丸

治婦人無子香附子搗去皮毛醋水浸三日炒乾細末十五兩當歸二兩白芍

藥川芎赤石脂葉本人參牡丹皮白茯苓白薇桂
心白芷白朮玄胡索沒藥各一兩右除石脂沒藥
外餘藥剉酒浸三日焙乾為末足十五兩重羅極
細入別研赤石脂沒藥末煉蜜和丸彈子大每取
一丸空心雞未鳴時先以溫茶或薄荷湯漱口後
細嚼溫酒或白湯送下以乾物壓下服至一月即
效○一名女金丹無桂心有熟地黃治婦人無
子或無痰火等疾經候亦調容顏不減但久無孕
乃子宮有陰無陽不能生發宜服此鼓動微陽一
月即效或赤白帶下崩漏及血風血氣虛勞諸證
無所不治真女
中金丹也

螽斯丸

經補受補者服七日即交合孕後勿服香附
子白薇半夏白茯苓杜仲厚朴當歸秦艽各

二兩防風肉桂乾薑牛膝沙參各一兩半細辛入
參各二錢三分右為末煉蜜和丸梧子大空心酒

下五七
十丸

煖宮螽斯丸

婦人無子者服之厚朴一兩二錢半吳
茱萸白茯苓白芨白芍石菖蒲白附子



桂心人參沒藥各一兩細辛乳香當歸酒浸二十

酒洗各七錢半右為末蜜丸小豆大酒下一二十

百子附歸丸

久服有孕及治月水參差不調四製香

熟地黃阿膠珠陳艾葉各二兩右為末用石榴心

枝連皮搗碎煎水打糊和丸梧子大每百丸空

琥珀調經丸

治婦人胞冷無子能令經正香附米一

爭熟艾四兩拌勻再加醋五椀入砂鍋內同煮乾

為度入川芎當歸白芍藥熟芩生芩沒藥各二兩

加味養榮丸

治經脈來前外潮內煩咳嗽食少頭昏

火等證服之有孕又治胎前胎動胎漏常服可無

小產之患熟地黃當歸白朮各二兩白芍藥川芎

黃芩香附子各一兩半陳皮貝母白茯苓麥門冬
各一兩阿膠七錢甘草五錢黑豆炒去皮四十九

粒右為末蜜丸梧子大空心溫酒
或鹽湯下七十九忌食諸血門

加味益母丸

芍藥木香各二兩右為末蜜丸梧子大
服之百日有孕益母草半斤加當歸赤

白湯下
百丸門

濟陰丹

治婦人久冷無子及數經墮胎皆因衝任虛
損胞內宿挾疾病經候不調或崩漏帶下三

十六疾皆令孕及生子充實無病蒼朮八兩香附子熟
令人有孕及生子充實無病蒼朮八兩香附子熟

地黃澤蘭各四兩人參桔梗蚕退石斛藁本秦茺
甘草各二兩當歸桂心乾薑細辛牡丹皮川芎各

一兩半木香白茯苓京墨燒桃仁各一兩川椒山
藥各七錢半糯米炒一升大豆黃卷炒半升右為

末煉蜜和勻兩作六丸每
丸細嚼溫酒或醋湯送下

勝金丹

治月水愆期久無嗣息及血癖氣痛百般諸
疾牡丹皮藁本人參當歸白茯苓赤石脂白

並肉桂白薇川芎玄胡索白芍藥白朮各一兩沉香甘草各五錢右為末蜜丸彈子大每一丸空心

溫酒爵下服二
十九當有孕

調經種玉湯

治婦人無子多因七情所傷致經水不調不能受孕熟地黃香附子炒各六錢

當歸身酒洗吳茱萸川芎各四錢白芍藥白茯苓陳皮玄胡索牡丹皮乾薑炒各三錢官桂熟艾各

二錢右剉分作四貼每一貼入薑三水煎空心服待經至之日服起一日一貼藥盡交媾必成孕矣

此藥百發百中
回春無薑桂艾三味。

先天歸一湯

當歸酒洗一兩二錢白朮麩炒白茯苓牛膝酒洗各八錢縮砂炒香附子牡丹皮半夏各

七錢陳皮六錢甘草四錢右剉分作十貼薑三水煎空心服渣再煎臨卧服經未行先服五貼經行

後服五貼藥盡即效經調脉和即當有孕矣

神仙附益丹

香附米一升童便浸透水洗露一宿再浸再露再晒如此三次用好醋浸透

宿晒乾為末○益母草十二兩東流水洗淨烘乾
為末右別以香附四兩艾葉一兩煮取汁用三分
醋七分和煎二末為丸梧子大空心臨卧淡醋湯
下七九十九不惟治婦人百病而生育之功效如

神醫鑒

調經養血元

治經脉不調久不受孕香附子十二兩
酒醋鹽湯童便各浸三日焙當歸酒洗

白芍藥酒炒生乾地黃酒洗牡丹皮酒洗各二兩
川芎白茯苓白芷乾薑炒肉桂紅花桃仁沒藥半
夏油炒阿膠珠各一兩玄胡索六錢蓬朮煨醋炒
甘草炙各五錢茴香炒二錢右為末醋糊和丸梧

子大空心白湯或溫酒
下百丸有孕勿服

溫經湯

治衝任虛損月事不調或前或後或多或少
或逾月不至或一月再至或曾經半產瘀血

停留唇口乾燥五心煩熱小腹冷痛久不受胎
胎方○一名調經散散○一名大溫經湯

一方

男子陽旺則能直射子宮種子之仙方也又治
男子精冷無子兔絲子酒浸煮製細末雀卵清



為九梧子大每七十九空心溫酒送下用之屢驗
年至五十及陽痿者每兔絲子末一升加天雄四

兩麪裹煨熟去皮臍切作四片童便浸
透慢火焙乾為末同丸服之尤效

又方戊戌酒治婦人久冷無子飲之最驗
肉久食令人有子。男子無嗣者多灸臍中

有效

綱

胎孕

以九欲求嗣必先視其婦之經脉調否其或未調必
以藥而調之經脉既調宜以人事副之按其法而

行之庶不失其候也蓋婦人月經方絕金水纔生
此時子宮正開乃受精結胎之候妙合太和之時

過此佳期則子宮閉而不受胎矣。○月經行後
一日三日五日交會者成男。二日四日六日交會

者成女。過此則不孕矣。亦要在子時後方可也。○
婦人經水來時有兩日半淨者三日而淨者亦

有。女人血旺氣盛六七日淨者但觀寶田經水之
顏色何如耳。乃以潔白之物或綿或帛夾之于戶

口取而目之。金色者佳期也。鮮紅者未淨不及也。
淺淡者太過也。惟以取血去淨新血生如金者為

佳期此時交合無不成矣春○夫人之始生也血海始爭一日二日三日精勝其血則為男子四日五相薄長先身生謂之神又謂之精道與釋二門謂之本來面目是也○欲求子者但待婦人月經絕後一日三日五日擇其旺相日如春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸以生氣時夜半後乃施瀉有子皆男必壽而賢明二日四日六日施瀉有子必女過六日後勿為施瀉可也○

陰陽交合避忌

凡男女交會當避丙丁日及弦望晦朔大風大雨大霧大寒大暑大雷電大霹

靂天地晦冥日月薄蝕虹霓地動則損人神不吉損男百倍令女得病有子必癩痴頑愚瘡瘕聾聵擊跛盲眇多病短壽不孝不仁又避日月星辰火光之下神廟佛寺之中井竈圓廁之側塚墓尸柩之傍皆所不可夫交合如法則有福德大智善人降詔胎中仍令性行調順家道日隆若不如法則薄福愚痴惡人來詔胎中令性行凶險所作不成家道日否禍福之應有如影響可不戒哉○

十月養胎

婦人懷胎一月之時足厥陰養○二月足少陽養○三月手少陰養○四月手少陽養○五月足太陰養○六月足陽明養○七月手太陰養○八月手陽明養○九月

足少陰養○十月足太陽養○十一月足少陽養○十二月足陽明養○

乳汁活兒養母○姓婦不可灸刺其經必墮胎○

於肝膽也○娘○姓婦不可灸刺其經必墮胎○

一月

父之厥陰養胎○夫人之有生也○母之血室方開○

乘衝氣自然旋轉不息○如蟻之滾○其吞啖含受○

成一團圓○璇璣九日一息○不然而後陰陽大定○玄○

黃相包外似纏絲○瑪瑙其中自然虛成一竅○空洞○

結為胞衣○初薄漸厚○如彼米飲豆漿○面上自結○二○

皮中竅日○生從無入○有精血日○化從有八○無九日○

之後次九○又九○九二○十七日○即成一月之數○竅自○

然凝成一粒○如露珠然○乃太極動而生陽○天一○生○

水謂之胚○此月經閉○無潮無痛○飲食○

稍異○平日不可觸犯○及輕率服藥○

二月 足少陽脉養胎又三九二十七日即二月數此

地二生火謂之暉此月腹中或動或不動猶可狐

疑若吐逆思酸名曰惡阻有孕明矣或偏嗜一物

三月

手少陰心主心包絡脉養胎又三九二十七日即三

月數百日間變成男女形影如清鼻涕中有白

絨相似以成人形鼻與雌雄二器先就分明其諸

四月

手少陽三焦脉養胎是月男女已分始受水精

安胎飲

五月

足太陰脾脉養胎始受火精以成陰

六月

足陽明胃脉養胎始受金精以成



七月

手太陰肺脉養胎始受木精以成

八月

手陽明大腸脉養胎始受土精以成皮膚

九月

足少陰腎脉養胎始受石精以

十月

足太陽膀胱脉養胎受氣足五藏六府齊通納

惟手少陰手太陽無所專主者以君主之官無爲

而巳○其有延月而生者富貴而壽有月不足者

妊娠脉

婦人足少陰王水本作手少陰全本爲是動甚者動

搖太甚也○陰搏陽別謂之有子註曰陰謂尺

氣挺然則爲有妊之兆何者陰中有別陽故也○

○經脉不行已經三月者尺脉不止者是胎也○

○脉滑疾重以手按之散者胎已三月也○脉重手

按之脉不散但疾不滑者五月也○婦人三部脉浮

沉正等按之無絕者妊娠也。細者死。○妊娠八月六七日

勻易產大浮緩氣散難產繼

驗胎法

婦人二三月經不行疑是兩身却疑血滯心煩寒熱恍惚宜用神方驗胎散之。○艾醋湯

亦可驗

神方驗胎散

真雀腦芎一兩當歸全用重一兩者只用七錢右二味細末分作二服濃煎好

艾湯一盞調下或好酒調下二三時問覺腹臍微動仍頻即有胎也動罷即愈如不是胎即不動如不覺效再煎紅花湯調下必有神效。○

艾醋湯

驗胎有無以好醋煮艾葉服半盞腹中大痛是孕不痛無孕。○

辨男女法

婦人有孕令人摸之如覆盃者則男也。如肘頸參差起者女也。○婦人有娠左乳房有

核是男右乳房有核是女也。○還復呼之左回首者是男右回首者是女。○看妊

婦上圓時夫從後急呼之左回首者是男右回首者
 者是女蓋男胎在左則左重故回首時慎護重處
 而就右也女胎在右則右重故回首時慎護重處
 而就左也推之於脉其義亦然胎在左則血氣護
 胎而盛於左故脉亦從之而左疾為男左大為男
 也胎在右則血氣護胎而盛於右故脉亦從之而
 右疾為女右大為女也
 陰陽之理自然如是

脉法

婦人妊娠四月欲知男女法左疾為男右疾為
 女俱疾為生二子謂俱滑而疾也

偏大為男右偏大為女左右俱大產二子
 手沉實為男右手浮大為女左手沉實為女
 二男左右手俱浮大為女二女左右手俱沉實
 左取左手疾為男右疾為女沉實為女浮大為女
 右取右手疾為男左疾為女沉實為女浮大為女
 以預剖

雙胎品

胎成以精血之後先分男女首緒澄之論也
 愚竊惑焉東垣曰經斷後一二日精勝血者

成男四五日血勝精者成女此亦未瑩易曰乾道
 成男坤道成女夫乾坤陰陽之性情也左右陰陽

之道路也男女陰陽之儀象也父精母血因感而
會精之泄陽之施也血能攝之陰之化也精成其
子此萬物之資始於乾元也血成其胞此萬物資
生於坤元也陰陽交媾胎孕乃凝胎之所居名曰
子宮一系在下上有兩歧一達於左一達於右精
勝其血及剛日陽時感者則陽為之主受氣於左
子宮而男形成精不勝血及柔日陰時感者則陰
為之主受氣於右子宮而女形成矣或曰分男分
女吾知之矣其有雙胎者何也曰精氣有餘歧而
分之血因分而攝之故也若夫男女同孕者剛日
陽時柔日陰時感則陰陽混雜不屬左不屬右受
氣于兩歧之間者也亦有三胎四胎五胎六胎者
猶是而已或曰其有男不可為父女不可為母與
男女之無形者又若何而分之耶曰男不可為父
得陽氣之虧者也女不可為母得陰氣之塞者也
無形者由陰為駁氣所乘而為狀不一以女無男
形者有二一則遇男為妻遇女為夫一則可妻而
不可夫又有下為女體上具男之全形此又駁之
甚者也或曰駁氣所乘獨見於陰而所成之形又
若是之不同耶予曰陰體虛駁氣易于乘也駁氣

所乘陰陽相混無所為主不可屬左不可屬右受
氣于兩歧之間隨所得駁氣之輕重而成形故
無之形有不可得而同也。○丹溪此論極造精
微。○又法左右尺脉俱浮大為生二男不爾
作男生左右尺脉俱浮大為生二女不爾
男作女生也此乃男女無形之說也。○

轉女為男法

是懷娠三月名曰始胎血脈不流象形而變

信待。○始覺有孕以斧懸窠下則一果盡是雄雞可驗

門。○石雄黃一兩絳囊盛帶孕婦左臂一云弓弩弦縛腰中

滿三月解之。○萱草花一名宜男姪婦佩之。○如

雞長尾拔三莖置孕婦固席下勿令知。○取夫頭

惡阻

惡阻謂嘔吐惡心頭眩惡食擇食是也。○婦人

不能食無寒熱名姪娠於法六十日當有此證。○

有醫治逆者却一月加吐下者則絕之。○註曰絕者

絕其醫治逆者却一月加吐下者則絕之。○註曰絕者

阻病其狀顏色如故脉息和順但覺肢體沉重頭目昏眩擇食惡聞食氣好食鹹酸甚者或作寒熱心中潰悶嘔吐痰水恍惚不能支持巢氏謂之惡阻○惡阻者或大吐或時吐清水惡聞食臭由子宮經絡結於胃口故逢食氣引動精氣衝上必食吐盡而後精氣乃安亦有誤交合而子宮穢盛者過百日即愈○姓娠之初經脉內閉育養胎息腸胃沮洳散入焦膈若素有痰飲則飲與血搏急飲食輒吐頭目旋暈憎聞食氣喜啖酸醎四肢倦怠多卧少起厭厭困懶名曰惡阻已產之後胞外餘血敗瘀流利名曰惡露蓋惡者不善不爭之義阻者阻節之阻血搏痰飲當漸消之露者露水之露當急逐之由是而知胎前曰惡阻產後曰惡露古人命名之意深有以也○惡阻謂有孕而惡熱心阻其飲食者是也多從痰治肥者有痰瘦者有熱○瘦人熱肥人痰俱宜二陳湯勑門加竹茹生薑熟加苓連日久水漿不入口吐清水宜參橘散白朮散保生湯○惡阻宜用半夏茯苓湯苓參連半夏湯歸原散竹茹湯○懷孕愛喫一物乃一藏之虛如血氣弱不能榮肝肝虛故愛喫酸物

○之物妊婦惡食但以所思之物任意與之必愈

二陳湯

婦人月事不行全不入食日就瘦弱全似虛勞然而穀雖不入果子雜物常喜食之却只

是有孕謬所謂孕婦做不得百般病者此也但以二陳湯加縮砂桔梗入薑棗烏梅煎服消痰順氣自

然安平○大論半夏動胎而用乎予治阻病累用半夏皆用半夏豈不知此而用乎

薑製炒黃用之未嘗動胎經云有故無殞是也

參橘散

治惡阻病嘔吐痰水全不入食橘皮赤茯苓各一錢半麥門冬白朮厚朴人參甘草各一

錢右剉作一貼入薑七片青竹茹雞子大煎服

白朮散

治惡阻吐清水十餘日粥藥不入白朮五錢二錢半丁香一錢二分甘草五分右剉

作一貼入薑五片煎服

保生湯

治婦人月經不行身無病似病脉滑大而六脉俱勻乃孕婦之脉也精神如故惡聞食氣

或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻宜服此白朮香附子烏藥橘紅各二錢人參甘草各一

錢右剉作一貼薑三煎服

半夏茯苓湯

治惡阻病嘔吐心煩頭目眩暈惡聞食氣好食酸鹹多卧少起百節煩疼羸瘦

痰盛半夏一錢半赤茯苓熟地黃各一錢橘紅旋覆花人參白芍藥川芎桔梗甘草各七分右剉作一貼入薑七片水煎服

芩連半夏湯

治惡阻病胃脘滿痛黃芩一錢二分半白朮半夏各一錢赤茯苓七分半黃連

陳皮當歸梔子枳殼香附人參蒼朮縮砂甘草各五分右剉作一貼入薑七片水煎服

歸元散

治惡阻全不入食白朮白茯苓陳皮各一錢半半夏一錢人參川芎當歸白芍藥丁香甘

草各五分桔梗枳殼各二分半右剉作一貼入薑五棗二水煎服

竹茹湯

治惡阻青竹茹麥門冬各三錢前胡二錢橘皮一錢蘆根半握右剉作一貼水煎服



一方

服之婦孕兩月嘔吐頭眩用參朮川芎陳皮茯苓

問之果然肝氣既逆又挾胎氣參朮之補大非所

妊娠禁忌

酒及以後大忌男女交合門致成諸疾止用飲

水煎服為好得。受孕之後切宜避忌胎殺所遊

者竅必塞打擊者色青黯繫縛者

飲食禁忌

食鹽馬肉過月難產。食犬肉令子無聲

食螃蟹令子橫生。食羊肝令子多厄。食雞肉

及卵合糯米食令子生寸白虫。食鴨肉及卵令

雀子斑。心寒。食鯊肉令子項短縮頭。食薑芽令子

多指。食薏苡墮胎。食麥芽消胎氣。食鮎魚令子生疳蝕瘡。

食山羊肉令子驚風而夭。食諸般菌蕈令子驚風而夭。

藥物禁忌

歌曰荒耽斑龜水蛭及蠹虫○烏頭附子與天雄○野葛水銀并巴豆○牛膝薏苡

連蜈蚣○三稜代赭荒花麝麝○大戟蛇蛻黃雌雄雄黃○牙硝芒硝牡丹桂枝○槐花牽牛皂角

同○半夏南星與通草○瞿麥乾薑蟹甲爪○硃砂乾漆魚桃仁○地膽茅根莫用好齏○又忌躑

躑躅花螻蛄牛黃藜蘆金箔銀箔胡粉蜥蜴飛生蟬

子犀角大黃

妊娠將理法

安胎太溫○勿食無太飽○飲無大醉○勿妄服湯藥○勿妄用鍼灸○勿舉重登高

涉險○勿勞力過傷○勿多睡卧須時時行步○心有大驚子必癰瘡○臨月不可洗頭○勿登

高厠

胎漏胎動

胎漏謂有胎而血漏下也屬氣虛有熱四物湯加阿膠珠白朮條芩縮砂香附炒黑

艾葉少許加糯米煎服○犯房下血者真漏胎也八物湯加阿膠艾葉救之○胎漏胎動



皆下血而胎動有腹痛胎漏無腹痛此為異耳胎漏宜清熱胎動宜行氣

尿血者自尿門下血也亦有飲酒房室而傷者有衝任經虛受胎不實故也亦有胎動不安者由衝任經

而傷者有喜怒而傷者有胎自安有胎不堅固動致而胎動者但治母病其胎自安有胎不堅固動致

母疾者但當安胎其母自愈○孕婦內傷勞役以致小腹常墮甚則子宮墮出者氣陷也宜用補

中益氣湯妨礙知因房勞者八物湯加酒炒黃芪為君防風升麻為使○胎漏胎動皆令墮胎胎

漏宜用枳殼湯寄生湯桑寄生散○胎動不安宜艾四物湯當歸寄生湯桑寄生散○胎動不安宜

用杜續丸當歸地黃湯安胎散安胎飲黃芩湯內補丸獨聖散知母丸生地黃粥葱粥葱白湯

枳殼湯一治胎漏下血白朮三錢半枳殼黃芩各錢七分半右剉作一貼水煎服

小膠艾湯四治胎動下血阿膠珠二錢艾葉錢右剉作一貼水煎服

膠艾湯治胎漏安胎極妙熟地黃艾葉當歸川芎阿膠珠甘草灸黃芪各一錢右剉作一貼水煎

服日二次
無黃芪有白芍藥

膠艾芎歸湯

治胎動下血在八九月內者及治半產後因續下血不絕者阿膠珠艾葉川芎

當歸各二錢甘草炙一錢右剉作一貼水煎服○胎動腹痛或下黃汁如漆如豆汁者野苧根金銀

花根各五錢水酒相半煎服

膠艾四物湯

治胎漏腹痛熟地黃當歸川芎白芍藥阿膠珠條芩白朮縮砂艾葉香附子炒

各一錢右剉作一貼入糯米一撮水煎空心服

當歸寄生湯

治胎漏下血入參桑寄生熟地黃續斷各一錢半當歸川芎白朮艾葉各七分

半右剉作一貼水煎服

桑寄生散

治胎漏及經血妄行桑寄生續斷川芎當歸白朮香附子阿膠珠茯神各一錢入參

甘草各五分右剉作一貼入薑三片水煎服

杜續丸

治胎動不安腰痛以此防其欲墮杜仲炒續斷各二兩右爲末棗肉和丸梧子大米飲下

五七十丸

當歸地黃湯

治胎痛熟地黃四錢當歸二錢右剉作一貼水煎空心頓服

安胎散

治因驚胎動腹痛下血熟地黃三錢川芎枳殼各一錢半糯米一合右剉作一貼薑三棗

二水煎服

安胎飲

治胎動不安五六月常服數貼甚妙白朮二錢條芩一錢半當歸白芍藥熟地黃縮砂

研陳皮各一錢川芎紫蘇葉各八分甘草四分右剉作一貼水煎服

生地黃降火也胎不安加阿膠胎痛加縮砂黃芩安胎者行氣也若血虛而胎

不安阿膠主之

黃芩湯

治胎動不安黃芩白朮縮砂當歸各一錢半右剉作一貼水煎服

內補丸

治衝任脉虛補血安胎熟地黃二兩當歸一兩微炒右為末蜜丸梧子大空心溫酒下五

七十丸

獨聖散

治因墮落傷損致胎動不安腹痛不可忍縮砂不以墮落傷損致胎動不安腹痛不可忍縮

二錢熱酒調下須臾覺腹內極熱胎已安矣神效不飲酒者米飲調下

行氣安胎也

知母丸

治妊娠日月未足而欲產者腹痛知母為末蜜丸梧子大米飲下三五十九日三服不拘

時

生地黃粥

治胎漏糯米二合煮粥臨熟入生地黃汁一合調服空心

葱粥

治胎動糯米作粥入葱白三五莖再煮食之

葱白湯

治胎動不安腰痛搶心或下血葱白濃煮汁飲之主安胎若胎死即出

佛手散

一名立效散治胎動不安腹痛

一方

古方治胎動不安一月用烏雌雞三月用赤雞十月用猪腰子餘月用鯉魚煮汁入藥煎服

神妙

又方

孕婦為夫所困胎動氣欲絕竹瀝飲一升立愈

又方

妊婦月數未足而似欲產腹痛者槐子蒲黃等分為末蜜丸梧子大酒下三十丸以止為度

半產

墮胎乃血氣虛損不能榮養而自墮猶萎則花墜有因勞怒傷情內火便動亦能墮落

胎猶風撼其木人折其枝也火能消物造化自然病源乃謂風冷傷於子藏此未得病情者也大抵

屬虛屬熱當視其輕重而治之。正產則比之證正

如新栗碎其膚殼損其皮膜然後取得其實以其

胎藏傷損胞系斷去而後胎墜下大抵半產須加

十倍調治。復有市井村落之間恣情妄作偷生

不正或多男女厭於養育往往以草藥毒之驚見

敗血不下衝心悶亂喘汗交作死者同記須以解毒行血藥亟救之宜用白扁豆散○婦人受孕遇三五七陽月必墮宜服芩朮湯安胎九以清其熱若氣血不足則預服八物湯○防墮落○半產多在三五七月內若前次三箇月而墮則其後必如期復然凡半產後須多服養氣血固胎元之藥以補其虛厥後有胎先於兩箇月半後即服清熱安胎藥數貼以防三月之墮至四箇月半後再服八九貼防過五月又至六箇月半後再服五七貼以防七月及至九月箇月可保無虞○半產宜用金匱當歸散芎歸補中湯安榮湯千金保胎九五味安胎九和痛湯○

白扁豆散

治毒藥攻胎藥毒衝心口噤握拳自汗不省其脉浮而軟十死一生白扁豆生爲末

新汲水調下二三錢即甦口噤者斡開灌之○

芩朮湯

治懷孕四五月常墮不安者內熱甚故也子芩三錢白朮一錢半右剉作一貼水煎服○

芩朮湯乃安胎之聖藥也凡卒有所下急則一日三五服緩則五日十日一服安胎易產所生之兒

又無胎毒蓋妊孕脾土運化遲滯則生濕濕則生熱故以黃芩清熱以養血白朮健脾以燥濕安胎

此方金匱當歸散皆

安胎丸 治同上即芩朮湯下五七十九丸

金匱當歸散 孕婦宜常服養血清熱素憤半產者宜服以清其源而無後患也黃芩白朮當

歸川芎白芍藥各一兩右為末每三錢溫酒調下或酒糊和丸米飲下五七十九丸

碍脾運化遲而生濕濕而生熱古人用白朮黃芩為安胎之聖藥蓋白朮補脾燥濕黃芩清熱故也

况妊娠賴血培養此方有當歸川芎芍藥以補血尤為備也服此藥則勿產所生男女無無胎毒則

痘疹亦稀無病易育而聰明

五味安胎丸 素憤半產者宜服之養血清熱當歸川芎條芩白芍藥各一兩白朮五錢右為

末酒糊和丸梧子大茶湯任下五七十九丸

芎歸補中湯

治懷孕氣血虛弱不能榮養以致胎漏

藥各一錢乾薑阿膠珠川芎五味甘
草各五分右剉作一貼水煎服

軀

安榮湯

治胎氣不固時常小產宜以此預防固胎熟

生白朮黃芩縮砂各一錢糯米
百粒右剉作一貼水煎服

千金保胎丸

凡婦人受胎經三月而墮者雖氣血不

養胎孕至此時必須謹節飲食絕色慾戒惱怒服

此藥庶免半產之患矣杜冲薑汁炒白朮土炒各

二兩當歸酒洗熟地黃薑汁炒阿膠蛤粉炒成珠

條芩炒益母草續斷酒洗香附米以酒醋鹽水童

便各浸一包經三日焙乾各一兩以川芎艾葉醋煮

陳皮各五錢縮砂二錢半右為末以棗肉和丸梧

子大每百丸空

心米飲吞下

和痛湯

治小產心腹痛當歸川芎芍藥酒炒熟地黃各一錢三分玄胡索一錢澤蘭香附子青

皮各八分桃仁紅花各五分右剉作一貼以水一鍾童便清酒各半鍾煎服

一方

四五年入每懷孕至三箇月必墮不肯服藥予以

不數日而胎固至月滿而生男

又方

一婦人有孕至三個月左右必墮予教以濃煎白

至三月正屬相火所以易墮不然

脉法

少陰脉漏下革脉主之弱則血耗立見傾危

細

卒墮胎

孕婦六月七月暴下故也斗餘水其胎必倚而墮

今暴下而多故知墮胎也

察色驗胎生死

胎動不安甚者當以母形色察之母面赤舌青者母活子死面青舌赤口中沫

出者母死子活唇舌俱青兩邊沫出者母子俱死○孕婦腹痛胎不動欲知生死以手摸之冷在

何面冷者為死溫者為生○胎死腹中則產母面青指甲青唇舌青口臭如兩臉微紅則母活子

死○孕婦舌黑者子已死矣全以舌為證驗佛手散救之○

欲產候

產也○滿月滿脈離經離脈設腹痛引腰脊為欲

此是兒轉蓋腎繫於腰胞繫於腎故也○孕婦八月腹痛或作或止名曰弄痛非正產之候或腹

雖痛而腰不甚痛非正產之候胎高未陷下者非正產之候穀道未挺逆者非正產之候水漿未破

血未出者非正產之候漿血雖出而腹不痛非正產之候且令扶行熟忍不可坐草○九孕婦直

待胎氣陷下子逼陰戶腰重痛極眼中生火穀道挺逆此正欲產之候方上草用力

脉法

歌曰欲產之婦脉離經沉細而滑也○難經云一

呼三至曰離經一呼一至亦曰離經婦人欲產者

脉皆離經夜半覺痛日中即生也

如切繩轉珠者即產也

保產

難產之婦皆是八九箇月內不能謹愆以致氣血

虛故也

○大凡生產自有時候切不可強服催

生○滑胎等藥又不可坐草早及令坐婆亂用手法

娘○世之難產者多見於富貴安逸之人其貧賤

辛苦者無有也古方有瘦胎飲

主作也以其奉養厚而氣盛故

實非極至之論也一婦人苦於難產後遇胎孕則

觸而去之予以大全紫蘇飲加補氣藥與十數貼

後得男而甚快因名其方曰達生散

婦不曾在行動舒伸忍痛曲身側卧故子在腹中不

能轉動以致有橫生逆產甚則子死腹中慎之

○九月數滿足方覺腹痛不可驚動太早令產母

恐怖蓋恐則氣怯怯則上焦閉下焦脹氣乃不行

以致難產急服紫蘇飲防見以寬其氣

母腹中全賴漿水滋養十月數足血氣完全形神

俱備忽如夢覺自能拚胎求路而出夫胞漿者本

胞內養兒之水也若胎元壯健者胞既拆破即隨
漿而下故易產也其困弱者轉頭遲慢胞漿既乾
汚血閉塞道路是以難產宜用催生如聖散催生
丹神效乳珠丹佛手散如神散黑神散二退散三
退散○臨產不可喧闐且進粥飯令人扶策徐徐而
行若不得則凭物而立痛陣轉密產候將至然後
坐草且進催生藥直待兒逼產門用力一下自然
易產○坐草之時驚然目翻
口噤吐沫者宜用霹靂丹

瘦胎令易產

者及婦氣血虛弱者九十月之際不謹守養

滯而不能轉運者宜用達生散瘦胎散
散佛手散益母丸縮胎丸東胎丸神寢元則自然

易產

達生散

孕婦臨月服二十餘貼易產無病大腹皮酒

一錢人參陳皮紫蘇葉枳殼縮砂研各五分右到
作一貼入青葱五葉水煎服○或以煎水吞下益



母丸尤佳
一名縮胎飲

瘦胎枳甘散

孕婦八九月內胎氣壅滿宜常服之滑

二錢白湯點服或加香附一兩尤妙
名滑胎枳殼散

救生散

孕婦八月服之瘦胎易產勝於枳殼散人參

每三錢水煎服

佛手散

孕婦臨月服之則縮胎易產自無難產之患

入酒少許再煎溫服若加益母草三錢尤妙
婦人一名芎歸湯即芎歸等分也

益母丸

正開時收採陰乾不犯鐵器搗為末蜜丸彈

子大每一丸白湯化下或九返魂丹催生易產又

治橫逆產後百病

縮胎丸

孕婦八九箇月用之縮胎易產黃芩夏一兩

兩陳皮三兩右為末粥丸梧

束胎丸

令縮胎易產白朮枳殼各等分右為末以水

下

神寢元

能瘦胎易產枳殼二兩乳香一兩右為末以

煉蜜丸梧子大酒下三十丸

十產候

十產候者一曰正產二曰坐產三曰卧產四曰

產九日熱產十日凍產

正產

正產謂月數已滿忽然臍腹陣痛胎孕

坐產

謂臨產孕婦疲倦久坐椅蓐兒抵生路不能下



生兒即順

卧產

謂產母卧定背平着席體不偃曲則兒不失其道自然易產娘

横產

謂兒先露手或臂者治法當令產母仰面安卧收生之人徐徐先推兒下截令直上冲通手以

中指摩其肩推上而正之漸引手攀其耳令頭正候兒身正門路順却服催生藥安詳上草自然易

產

逆產

逆產者先露足横產者先露手坐產者先露臀皆用力太早之過也若手足先露者用細鍼刺

兒手足心入一一分三四次刺之以益塗其生輕經送入兒得痛驚轉一縮即順生下又兒脚先生

者謂之踏蓮花生急以益塗兒脚心因急搔之併以益摩母腹上則自然正生矣

偏產

謂兒頭偏柱一傍雖逼近產門初并露正頂止露額角者治法令產母仰卧收生之人輕輕推

兒近上以手正其頭令兒頭端正向產門一逼即下○又有兒頭後骨偏枉穀道者當以綿衣灸

火令熱裹手急於穀道上外傍徐徐推之

礙產

謂兒頭雖正產門已露其頂而不能生治法令

產母仰臥收生之人輕輕推兒近上徐徐通手以

即產

盤腸產

謂孕婦產時子腸先出兒即隨產治法如

腸頭為風吹乾不能收入以磨刀水微溫潤腸煎

溫湯潤其腸令產母仰臥以言安慰却用好醋半

一巽一縮三巽三

熱產

臨產時當盛暑宜居深幽靜室日色遠處開

凍產

謂嚴冬解產宜密閉房戶內外生火常令煖



傷產

傷產者過月而產有經一二年至三四年而產者或蒼皇用力太早漿水先下敗血裹住宜

用勝金散或新汲水磨京墨服之墨裹兒即出門

催產

臨產日久產母困倦宜服催生藥以助血氣令兒速生

交骨不開難產

難產垂死及矮石女子交骨不開者用龜殼散免腦丸來甦散加味芎歸湯

○凡產時交骨不開者陰氣虛也亦用加味芎歸湯○產前軟勝方烏梅生薑甘草各等分剉煎服便令胯骨軟易產不痛

催生如聖散

治難產及漏血胎乾者立效黃蜀葵子研為末每取二錢以酒調瀉去渣溫服

○一方用蜀葵花為末熱酒調下一錢即效

臨危難產時免得全家俱失泣

催生丹

治產難及橫產逆產臘月兔腦一箇取髓去皮膜研如泥乳香細末二錢半丁香細末

錢麝香二分半右拌勻和丸雞頭實大脚炙陰乾
油紙裹每取一九溫水磨化服即產隨男左女右
手握藥出是驗
須臾日合妙驗

神效乳珠丹

研催生神效又治子死腹中不下明乳香

晒乾每一九冷酒化下未下再服
端午日或歲除夜收合尤妙

如神散

催產極驗臨產時令人取路傍草鞋一隻取

生男右足者生女覆者兒死側者
有驚自然埋也○一名神驗散

二退散

治產難蛇退全者一條蠶退紙方圓

三退散

治難產及橫逆產或子死腹中蛇退全者一

燒存性為末分二服溫酒調下○

二退六一散

催生神效益元散一兩男子頭後雞子

五枚穿山甲一片右各燒存性為末用麝水煎
二沸入煖灰調服立下一名滑胎散

兔腦丸

治產難日久血乾宜用此滑之臘月兔腦髓
一枚鼠內腎一部母丁香益母草各一錢乳

香二錢半麝香二分半右為末兔髓和丸灸實大
朱砂為衣油紙裹陰乾每丸醋湯化下即產男

左手文右手握
藥出是驗

龍蛻散

催生秘傳蟬退一兩大蛇蛻一條並燒存性
滑石冬葵子微炒各一兩右為末一錢順

流水微溫調服
不可使熱湯燂

黑神散

治產難及橫逆產凡坐草日久漿水多下則
其血必乾子道艱澁如舟坐灘須湧水而後

可通服此藥再固其血則如魚得水決自轉生百
草霜白芷各等分右為末每取二大錢清酒童便

各半盞入麝香少許同煎沸熟服不過再服即驗
法服此藥後外用葱白二斤搗爛鋪於小

腹上取急水灘頭沙一斗炒熟布裏於葱上輕輕
擦即產一名催生如神散一名神應黑散

心丹

黑龍丹

治產難及死胎不下胎衣不下產後兒枕痛

活神驗不可言五靈脂當歸川芎良薑熟地黃各一兩右剉盛砂盆紙筋鹽泥固濟炭十斤煨候冷

取出却入百草霜三錢硫黃乳香各一錢半花藥石煨琥珀各一錢右研細末醋麪糊和丸彈子大

每服一丸入薑汁童便溫酒中細研服之○一方靈脂當歸川芎良薑生乾地黃各一錢入雞子殼

內益泥固濟火煨百草霜一兩硫黃乳香各二錢琥珀花藥石各一錢製法同上

催生散

治產難白芷炒黑百草霜滑石各等分

勝金散

治產難及橫逆產鹽豉一兩以青布裹了燒存性入麝香一錢右末秤錘燒紅淬酒調下

一錢

霹靂丹

治臨產驚然氣痿目翻口噤面黑唇青口中沫出子母俱殞兩臉微紅子死母活急用此



救之蛇退一條蚕退紙並燒存性各二錢男子頭
髮燒灰路上左脚草鞋燒存性各一錢乳香五分

黑鉛二錢半水銀七分半二物入銚中火上熔化
結砂子研細右為末以獾猪心血和丸梧子大

箔為衣每取二三丸倒流水送下如不
下化為衣每取二三丸倒流水送下如不

龜殼散

治產難日久垂死及矮石女子交骨不開
龜殼一箇生男女婦人頭髮一握燒存性

芎當歸各一兩右為末每三錢
水煎服良久生胎死胎俱下

來麤散

治臨產用力太過氣衰脉微精神昏暈口
面青不省人事木香神麤陳皮麥芽黃芪阿

膠白芍藥各一錢芎根甘草各三錢糯米一合
加生薑三片煎服連用為妙或幹開口灌下

加味芎歸湯

治臨產交骨不開難產
即上龜殼散方也

催生宜用滑利藥

凡催生多用滑利迅速之藥如兔腦
髓筆頭灰弩牙蛇退之類是也

水血多下子道乾澀者如猪脂香油蜂蜜醇酒
尿葵子牛乳滑石榆白皮之類是也○若風冷或

入氣血凝滯者牛膝葱白桂心生薑之類是也○
若觸犯惡氣心煩躁悶而難產者宜麝香朱砂乳
香青竹茹之類是也○難產日久漿水多下石
乾兒不得下香油清蜜各一椀火上微沸調滑
末一兩攪服之外以油蜜摩母臍腹上即驗○
油蜜童尿和服最治難產和益母膏尤妙○
皮湯亦可用○

榆白皮湯

治產難胞乾不下榆白皮冬葵子瞿麥各二錢牛膝麻仁去殼各一錢半木通一錢

右剉作一貼水煎服

襪法

臨產之初先脫產婦尋常所穿衣以籠竈頭及竈口則易產勿令產母知○臨產取赤馬皮鋪之

令產母坐其上則催生易產○又法取魴鼠皮毛

把一校即驗

外貼法

凡難產催生內服湯丸外用藥付貼庶有十全之效宜如神丹如聖膏立聖丹遇仙丹諸

如神丹

巴豆三枚單麻子七粒並去殼入麝香少許捏作餅子貼臍中分產即以溫湯洗去○歌

曰巴三單七脫衣裳細研如泥入麝香捏作彈丸臍下貼須臾子母便分張

如聖膏

治難產及死胎不下十粒分危急者巴豆十六箇去殼單麻子四十九粒去殼麝香二錢同

搗如泥攤絹帛上貼臍上一時產下即洗去母一方單麻子去皮一兩雄黃二錢同研成膏塗臍

右腳心纔產速洗去否則腸出用此膏塗頂上腸自入亦名如聖膏

立聖丹

治橫逆產惡候及死胎不下神驗寒水石四兩內二兩生用二兩煨赤研為細末入朱砂

末如深桃花色每用三分井水調如薄糊用紙花剪如杏葉大攤貼臍心候乾再易不過三上便產

細

遇仙丹

治法同上單麻子十四粒去殼朱砂雄黃各一錢半蛇蛻一條燒右為末漿水飯和丸彈

子大臨用先以椒湯淋潔臍下次安藥一丸於臍中以蠟紙覆上以帛繫定須臾生下急取去藥

下死胎

須參考上驗胎生死條治之。○胎死則其舌必黑外證指甲青黑心腹脹悶口中極臭平胃散

坊觀一貼加朴硝五錢酒水相半煎服此則死者出生血水而下

者安蟹爪一升大甘草五錢半生半炒東流水十盞煎至三盞去滓八阿膠二兩半生半炒令消化

分二三次頓服即出藥竈宜東向用葦為薪聚○死胎着脊不出氣欲死猪脂白蜜各一升醇酒二

升右合煎取二升分溫兩服即下○死胎不下宜用佛手散三退散坊見香桂散桂香丸奪命丸

烏金散催生散坊見

佛手散

治胎傷心腹痛口噤欲絕用此探之胎不損則痛止子母俱安若胎死則立便逐下神效

坊見

香桂散

下死胎桂心三錢麝香半錢右為末作一貼溫酒調下須臾即下

桂香丸

下死胎肉桂一兩麝香一錢右為末飯丸茶豆大湯下十五丸



奪命丸

治胎死腹中捨心悶絕欲死或食惡物或誤服之可下或胎腐爛者立可取出此方至妙桂枝赤茯苓牡丹皮赤芍藥桃仁各等分蜜丸芡實大

空心服三九或九如彈子大淡醋湯化下一丸。即仲景方桂枝茯苓丸也治婦人宿有癥病而孕胎及三月而漏血不止胎動在臍上故知是癥也當

下其癥宜用桂枝茯苓丸丹溪亦稱妙法

烏金散

治難產胎乾子死危急者先進佛手散探之胎死則進此藥後更進香桂散即下

烏金散

一方

死胎不下取烏雞一隻去尾細剉水三升煮取二升去雞用布蘸湯摩臍下即出

如聖膏塗母右脚心上即下

胞衣不下

凡產後胞衣不下稍久則血流入胞中胞為血所脹上衝心胃喘急疼痛必致危篤宜急

斷臍帶以小物繫帶牢固然後切斷使惡血不潮
入胞中則胞衣自當痿縮而下縱淹延數日亦不
害人只要產母心懷安泰勉進粥飯終自下矣累
試有驗○因以此而殂或損破尿胞為終身之害可不
謹歟○或因兒之初生惡血流入衣中衣為血所脹
如聖膏不能下須臾衝上逼心即死急服奪命丹貼
石散牛膝湯一字神散返

奪命丹

治產後血入胞衣脹滿衝心日久不下危急
者附子炮五錢牡丹皮乾漆炒各一兩右為

末以醋一升八大黃末一兩熬成膏和丸梧子大酒下五十九

花藥石散

胞衣不下惟花藥石散最為要緊若胎衣
上衝至死但心頭煖急以童便調一錢服

之取而下敗血如猪肝或化為黃
水而出其胞衣即下或覷傷

牛膝湯

治產後胞衣不下腹滿即殺人服此即爛下
石末二錢木通當歸牛膝瞿麥各一錢半



冬葵子二錢右坐
作一貼水煎服

三退飲

治胎衣不下神效蛇退一條全者蚕退紙一
方蟬退四十神效蛇退一條全者蚕退紙一
九箇右並燒存性為末順流水

調下立
出傳

一字神散

治胎衣不下鬼白黃色者研如粉不用羅
還以手指撚之每服二錢溫酒一盞同煎

此至八方分服之立生如神
此方救人幾萬數

一方

治胎衣不下猪脂白蜜清油各半盞於火上熔
化溫分二服便下極驗一云但多服猪脂亦佳

三姓家鹽各取三撮相和頓服仍探口令嘔即下
三姓家鹽各取三撮相和頓服仍探口令嘔即下

服之方童尿一升生薑葱白各三錢右煎數沸熱
服之方童尿一升生薑葱白各三錢右煎數沸熱

襪法

胎衣不下取產婦襪初洗兒湯一盞服之勿令產
立下襪○又法取產婦襪初洗兒湯一盞服之勿令產

母知立
下要

產前諸證有子癰子煩子腫子淋子嗽子癰子腹中鍾子懸

子癰姓婦中風項背強直筋脉攣急口噤語澁痰盛昏迷時作時止或發搖不省入事名曰子癰亦曰兒

暈甚則角弓反張宜用羚羊角湯輕者四物湯

羚羊角湯羚羊角鎊獨活酸棗仁當歸川芎茯苓神杏仁各七

分木香甘草各五分右剉作一貼薑三水煎服

子煩難婦心煩躁悶謂之子煩多於受胎後四五月間相火用事或值天令君火大行暑熱之時俱能發

煩躁或胎動不安宜用竹葉湯竹瀝湯

竹葉湯白茯苓二錢麥門冬黃芩各一錢半防風一

錢右剉作一貼入青竹葉七片水煎服日二

竹瀝湯赤茯苓一兩剉右以水一升半煎至半去滓和竹瀝一合服○又竹瀝細細飲之最妙

子腫

孕婦因胎中有水多於五六箇月以致遍身浮腫

治必損其胎宜用鯉魚湯因常食鯉魚粥又茯苓

湯防己湯全生白朮散亦佳○或頭面不腫兩脚

謂之浮甚則自脚面腫至膝腿足指間有黃水出者

鯉魚湯

治子腫白朮赤茯苓各二錢白芍藥當歸各

一錢半橘紅五分右剉作一貼先取鯉魚一

蔺修事如食法水煮熟取清汁一盞半入藥及薑

七片煎至一盞空心溫服以水盡腫消為度

茯苓湯

治子腫當歸川芎白芍藥熟地黃白朮赤

防己湯

治同上桑白皮赤茯苓紫蘇葉各二錢防己

煎服

全生白朮散

治同上白朮一兩生薑皮六腹皮陳皮茯苓皮桑白皮各五錢右為末每二錢

米飲調下

一方

治子腫山梔子仁炒為末每一錢米飲調服治

子氣

子淋

始婦熱積膀胱或胎氣壅滿小便淋澀作痛名曰子淋又謂之子滿宜澤瀉湯安榮散地膚子湯葵

子茯苓散忘憂散或芎歸湯防見加木通麥門冬入參燈心甘草臨月加滑石煎服小○轉胞一證

胎婦稟受弱者憂悶多者性急躁者食味厚者大津有之因思胞為胎所壓轉在一邊胞系了戾不

通耳胎若舉起懸在中央胞系得疎則水道自行宜用參朮飲空心煎飲隨以指探吐候氣定又與

又吐小便立通歷試皆效○姓婦胞轉不得尿腎氣丸動觀主之即八味丸

澤瀉湯

治子淋澤瀉桑白皮赤茯苓枳殼檳榔木通各一錢半右剉作一貼入薑五片空心煎服



齋

安榮散

治同上人參川芎麥門冬木通滑石當歸燈

地膚子湯

治同上地膚子車前子各一錢半知母黃

甘草各七分右剉作一貼水煎服

葵子茯苓散

治孕婦小便不利冬葵子赤茯苓各

忘憂散

治子淋琥珀為末每半錢取

參朮飲

治孕婦轉胞尿閉四物湯錢甘草五分右剉

一作一貼入薑水煎飲後探吐

一方

治轉胞尿閉葱白細切和

一法

治轉胞尿閉脹急令產婆香油塗手自產門入

孕婦倒豎起則
尿自出亦妙

子嗽

紫菀湯
治百感風寒久嗽不止請之子嗽宜

紫菀湯

梗一妊娠咳嗽胎不安紫菀天門冬各二錢桔
梗一妊娠咳嗽胎不安紫菀天門冬各一錢右剉作

一貼入蜜半匙再一沸溫服

百合散

治子嗽百合紫菀茸貝母白芍藥前胡赤茯
苓桔梗各一錢甘草五分右剉作一貼入薑

服五水煎

馬兜鈴散

治子嗽氣壅喘急陳皮大腹皮桑白皮紫
蘇葉各一錢二分馬兜鈴桔梗人參貝母

五味子甘草各七分半右剉作一貼入薑三片水煎服

天門冬飲

治子嗽天門冬紫菀茸知母桑白皮各一
錢半五味子桔梗各一錢右剉作一貼水

煎服



一方

治子嗽貝母去心麩炒黃為末以砂糖和作丸櫻桃大常用含化神效

子痢

常歸芍藥湯白白腹中疔痛裏急後重名曰子痢宜

宜用訶木散大寧散

當歸芍藥湯

治子痢白芍藥白朮各一錢半當歸白茯苓澤瀉條芩各一錢木香檳榔黃連

甘草各七分右剉作一貼水煎服○白痢腹痛去芩連加乾薑

白朮湯

治孕婦下痢膿血一貼水煎服

雞黃散

治子痢烏雞卵一箇傾出清留黃黃丹一錢入雞子殼內攪勻厚紙糊口鹽泥固濟火煅

研為末右每取二錢米飲調下一服愈者是男二服愈者是女

鴨子煎

治同上生薑年少者百錢年老者二百錢搗取自然汁鴨子一箇打破入薑汁內攪勻右

同煎至八分入蒲黃二錢再煎五七沸空心溫服立效

訶木散

治妊娘泄瀉由食生冷當風涼所致訶子皮白朮各一錢半陳皮良薑木香白芍藥酒炒

肉豆蔻煨甘草炙各一錢右剉作一貼薑五水煎服

大寧散

治妊娘下痢赤白或泄瀉腹痛垂死者黑豆三十五粒鸛粟殼二兩半生半炒甘草二兩

半生半炒右為麤末都作一貼八薑三片同煎空心服神效

子瘡

妊婦患瘡寒熱往來謂之子瘡宜醒脾飲子露薑飲

醒脾飲子

治子瘡寒癰厚朴草豆蔻研各五錢乾薑三分甘草二分右剉作一貼入薑五棗二

同煎空心服

驅邪湯

治妊娘感冷發瘡良薑白朮草果橘紅藿香縮砂白茯苓各一錢甘草五分右剉作一貼

入薑五片棗二枝水煎服

濟生石膏湯

治妊娘熱瘡渴飲無度石膏二錢生地黃一錢半黃芩麥門冬人參知母乾葛

各一錢甘草五分右剉作一貼入烏梅一箇同煎服

子懸

妊婦胎氣不和逆上心胃脹滿疼痛謂之子懸宜用紫蘇飲葱白湯轉

紫蘇飲

治子懸及臨產驚惶氣結難產最妙紫蘇葉二錢半人參大腹皮川芎陳皮白芍葉當歸

各一錢甘草五分右剉作一貼入薑四片葱白三莖水煎服

葱白湯

治子懸葱白二十莖即二握右以水一升半於銀石器內煮至半取汁頓服食葱盡即愈

服

感寒

孕婦傷寒產前安胎產後補血為主治法無犯胃氣及上二焦為三禁謂不可汗不可下不可利小

便也但當和解小柴胡湯主之麝一名三禁湯

保安白朮散葱白湯○孕婦熱病發黑癰用梔子

大青湯○熱病護胎方取浮萍朴硝大黃蛤粉藍

根等分為末貼臍

上安胎極妙

芎蘇散

川芎紫蘇葉白芍藥白朮麥門冬陳皮乾葛各一錢甘草五分右剉作一貼入薑五葱白

三莖水煎服

黃龍湯

治孕婦感寒寒熱如瘧柴胡四錢黃芩人參甘草各一錢右剉作一貼水煎溫服

保安白朮散

治孕婦傷寒安胎白朮黃芩各等分剉新瓦上同炒香右為末每三錢薑三棗

一煎水調下或同煎服亦可最妙

葱白湯

生薑切二兩右剉水煎連服取汗

梔子大青湯

治妊婦熱病發癰黃芩升麻梔子各二錢大青杏仁各五分右剉作一貼葱白

三莖同煎服

孕婦不語

內經曰人有重身九月而瘕此為何病岐伯

脉貫腎繫舌本故不能言無治也當十月復註曰分娩則日能言勿藥可也○孕婦瘕瘕不能言

物湯方時加大黃芒硝各一錢水煎去滓入蜜少許沉冷時時呬服心火下降肺金自清則能言矣

兒在腹中哭

含者在腹中哭者因妊母登高取物脫出兒口以此作

聲也令妊母曲腰向地拾物使兒復得含入口中

止其聲即止又方多年空屋下鼠穴

孕婦腹中鍾鳴

孕婦腹中作鍾鳴取多年空屋下鼠

產後諸證

有兒枕腹痛血暈血崩血喘咳嗽逆產後

下乳汁產後陰脫產後鬱冒產後風痊產後頭痛

泄痢產後浮腫

兒枕痛

胎側有成形塊為兒枕子欲生時枕破血下若敗血不下則成塊作痛不可忍乃血瘀也宜用

失笑散紫金丸三聖散黑龍丹上方見花藥石散傷諸起枕散立效散○芍歸湯加三稜蓬朮玄胡

索牡丹皮桃仁紅花煎服即效

失笑散

治產後兒枕臍腹痛欲死百藥不效五靈脂蒲黃炒各等分右為末每二錢和醋熬成膏

入水一盞煎至七分熟服立效

紫金丸

治同上右以失笑散末和醋熬膏丸如櫻桃大每二丸童便溫酒各半盞調服

三聖散

治產後兒枕痛不可忍當歸一兩玄胡索桂心各半兩右為末每二錢童便或熱酒調下

傳○一名玄胡索散

起枕散

治兒枕痛極苦當歸白芍藥各二錢川芎一錢半白芷桂心蒲黃牡丹皮玄胡索五靈脂

沒藥各七分分右剉作一貼水煎入好醋空心服

立效散

治兒枕痛五靈脂炒為末每二錢溫酒調下



一方

治兒枕痛百藥不效蟬蟬一箇燒存性研為末
空溫酒一盞調服立止生男用尖臍蟬生女

用團臍蟬○一方蟬蟬爛搗和酒服鹽○又方真
蒲黃二錢白湯調下又大芥燒赤投酒中溫服

血暈

產後血暈由氣血暴虛血隨氣上迷亂心神故眼
前生花甚者悶絕口禁神昏氣冷宜用清魂散

○產後血暈有二有下血多而暈者但昏悶煩亂
而已當補血宜用芎歸湯防見有下血少而暈者

乃惡露上搶於心心下滿急神昏口禁絕不知人
當破血行血宜奪命散花藥石散方觀端傷○產

後血暈宜用四味湯
荊芥散醋墨法端

清魂散

治產後血暈荊芥穗五錢川芎二錢半入參
澤蘭葉各一錢二分半甘草一錢右為末以

溫酒熱湯各半盞調二
錢灌之下咽即甦

奪命散

治血暈譫妄沒藥血竭各等分右為末每二
錢以童便好酒各半盞煎數沸調服神效○

一名血竭散

四味湯

治產後血暈當歸玄胡索血竭沒藥各一錢
右麤末童便煎服

調下名曰四味散

荊芥散

治血暈如神荊芥穗搗為末每二錢
童便一盞調熟服口噤幹開灌之

醋墨法

防血暈墨半錢燒赤投醋中研
細每五分淡醋湯調下即效

一方

醋破血暈取美清醋熟煎稍含之即愈又以
醋喚其面醒來與醋細呼之又炭火沃醋常聞

其氣煖○又乾漆或舊漆器燒烟熏鼻即醒
又韭菜細切盛瓶中以熱醋沃之向產婦面熏其

也氣即醒○又治血暈悶絕紅花一兩酒煎服即甦
乾○又治血暈悶絕紅花一兩酒煎服即甦

又方

治產後忽昏悶不省人事者暴虛故也生雞卵
三枚吞之若未醒童便一升飲之又不起竹瀝

服五合日三五次即甦因以半
夏末或皂角末吹鼻中令嚏

血崩

產後血崩不止是謂重傷宜大劑芎歸湯防見加
芎藥煎服救之若小腹滿痛是肝藏已壞為難治

汁○產後血崩不止四物湯
○煎服
○產時下血過多

危急宜用濟危上丹
○血崩宜五灰散
○產後下血不止宜用

濟危上丹

治產時下血過多虛極生風
唇青肉冷汗

此乳香硫黃五靈脂太陰玄精石藥研微火炒再研細
膠卷栢各等分
右將前四石藥研微火炒再研細

方八後四藥為末以生地黃汁和
九梧子大溫酒下二三十九

補氣養血湯

治小產後下血不止
人參黃芪當歸白芍藥酒炒艾葉阿膠川芎青皮香

附子炒縮砂研甘草炙各一
錢右剉作一貼水煎服

一方

治產後血崩取木耳及一介或半介者燒存性
為末入麝香末一錢煨枳殼末二錢右和勻每

取一錢以烏梅煎
湯調下即止

血血

產後口鼻黑色起及鼻衄者名曰胃絕肺敗此證
不可治急用荊芥散坊見及襃法
○產後氣血

散亂入於諸經不得還元故口鼻黑色起及變鼻

襠法

急取緋線一條并產母頂心髮兩

喘嗽

產後喘極危多死也難。產後喉中氣急喘促者

因所下過多榮血暴竭衛氣無主獨聚肺中故令

喘此名孤陽絕陰為難治宜用大劑芎歸湯小參

蘇飲。○產後喘急命在須臾宜用奪命散。○

二母散

治產後惡露流入肺經咳嗽知母貝母白茯苓

貼水煎服

小參蘇飲

治產後敗血入肺面黑發喘欲死者蘇木

錢服之

旋覆花湯

治產後感冒風寒咳嗽喘痰盛旋覆花赤芍

仁前胡甘草各一錢右剉作一貼入薑三棗二水煎服

咳逆

產後咳逆不止欲死肉桂五錢剉薑汁三合右同煎溫服二合以手炙火摩背上令熱時塗藥汁盡

為妙方○一方煎壁鏡窠三五箇取汁熱呷即差

產後不語

由敗血干心氣閉塞故舌強不語者宜孤鳳散○產後失聲言不出者宜茯苓補心湯方規

七珍散

治產後不語人參生地黃石菖蒲川芎各二錢細辛防風辰砂各一錢右為末每錢薄

荷湯調服○加甘草一錢名曰八珍散

孤鳳散

治產後閉目不語白礬為細末每取一錢熟水調下不以時難

產後見鬼譫妄

產後見鬼言譫顛倒此由敗血干心也蘇合香元一錢童便調服即醒小調經

散亦佳防見加龍腦少許服之○痰血迷心言語
謔妄昏暈宜八物湯勸覲去芍藥加琥珀栢子仁
遠志朱砂金銀煎服交感地黃煎元亦妙○產
後昏冒不省瞑目無所知蓋因血暴亡心神無所
養故也甚則循衣摸空錯語失神宜生地芩連湯
鱉膽全生活血湯防覲寧神膏茯苓散栢子仁散
諸

交感地黃煎元

治產後眼見黑花發狂如見鬼狀或
中風角弓反張或下血如豚肝狀臍

腹疔痛結為癥瘕生地黃二斤洗搗以布裂汁留
滓生薑二斤洗搗以布裂汁留滓以生薑汁炒地
黃滓以地黃汁炒生薑滓各至乾燥為末為度蒲
黃炒四兩當歸玄胡索琥珀各一兩右為末蜜丸
彈子大當歸酒
化下一丸

寧神膏

治產後亡血心神昏悶言語失常不得睡卧
酸棗仁炒人參赤茯苓各一兩琥珀七錢半

朱砂乳香各五錢右為末燈心大棗煎湯調
下一錢或蜜丸彈子大薄荷湯化下一丸



茯苓散

治產後心虛怔忡不定言語錯亂人參當歸山藥甘草各一錢半遠志茯苓神桂心麥門冬

各七分半右剉作一貼入薑三棗二水煎服

柏子仁散

治產後謔言妄語皆心血虧欠心神不守肝致柏子仁遠志人參桑寄生防風琥珀

當歸熟地黃甘草各等分右剉每五錢先以白羊心一枝煮汁取二盞乃入藥煎至一盞去渣溫服

傳

產後發熱

產後血虛熱入血室以致發熱煩躁晝輕夜重或謔語如見鬼或往來寒熱宜用柴胡四

物湯涼血地黃湯牛黃膏緹○產後發熱有五有去血過多者脉必虛大無力腹內無痛宜芎歸調

血飲○有惡露不盡者必大小腹有塊作痛宜黑神散○有傷飲食者當消導○有感冒風寒者當發

散○有蒸乳者乳必脹痛但捏去乳汁自愈○產後因傷寒熱病熱入血室或有瘀血宜柴胡破

瘀湯或柴胡地黃湯○產後發熱因風寒則宜用柴胡防歸湯竹葉防風湯○產後發熱因風寒則宜用

湯入參當歸散散門○大小產熱入血室小柴胡
加五靈脂佐以黃連赤茯苓清心涼血即效

柴胡四物湯治產後發熱及熱入血室柴胡生地黃
各二錢川芎赤芍藥當歸黃芩各一錢

人參半夏甘草各五分右剉作一貼
入薑三片水煎服○一名三元湯

涼血地黃湯治產後發熱生地黃三錢赤芍藥當歸
各一錢半右剉作一貼水煎服

牛黃膏治產後熱入血室朱砂礬金各三錢牛黃二
錢半牡丹皮二錢甘草一錢龍腦五分右為

末蜜丸皂子大每
一丸井水化下

芎歸調血飲治產後去血過多以致發熱心煩腹痛
頭暈眼花或口噤神昏當歸川芎白朮

白茯苓熟地黃陳皮便香附烏藥乾薑益母草牡
丹皮甘草各七分半右剉作一貼入薑五棗二煎

黑神散治產母惡露不下以致發熱煩躁當歸熟地
黃白芍藥酒炒肉桂甘草灸各五錢沉香棕

一錢灰蒲黃沒藥各二錢半乳香一錢半赤芍藥

柴胡破瘀湯

治產後因傷寒熱病熱入血室或惡露

歸生地黃各一錢桃仁五靈脂

柴胡地黃湯

治產後熱入血室寒熱譫妄如見鬼柴

錢甘草五分右剉作一貼水煎服

柴胡防歸湯

治產後發熱不因亡血蓄血傷食蒸乳

錢川芎一錢半柴胡人參各一錢半夏陳皮防風

水煎服

竹葉防風湯

治產後傷風頭痛發熱青竹葉二十四

各一錢右剉作一貼水煎服

熟地黃湯

治產後虛渴天花粉二錢人參麥門冬各一錢半熟地黃一錢甘草五分右剉作一

貼入糯米百粒薑三棗二水煎服

人參當歸散

治產後亡血生內熱煩渴當歸熟地黃白芍藥人參麥門冬各一錢桂皮五分

右剉作一貼先以梗米一合青竹葉十片水二盞煎至一盞去米葉乃入前藥及薑三棗二再煎服

一方

治產後發熱煩渴生藕汁飲一升合生地黃汁尤妙

水飲之
最妙

產後乳懸證

詳見乳部

下乳汁

產後乳汁不行有二有氣血盛而壅閉不行者有氣血弱而枯涸不行者壅閉則宜用漏蘆散

枯涸則宜用通乳湯是粘離猪蹄粥。下乳汁治法

當參考乳部用之

玉露散

芍藥一錢半人參赤茯苓甘草各一錢當歸

五分右剉作一貼水煎服

猪蹄粥

治乳無汁猪蹄四隻治如食法右水二斗煮取六升去滓入葱豉及

煮取六升去滓入葱豉及小麥煮作稀粥食之

一方

下乳汁立效葛苳子糯米各一合右細研水一

麥門冬末二錢酒磨犀角汁一盞調服又赤小豆煮汁飲又鯉魚羹食之

又方

治乳無汁野豬脂每取一匙和一盞溫酒服日三乳即下且多可供五兒臘月脂尤佳

酒煮服良

產後陰脫

產後陰門脫出蓋努力太過所致若脫肛狀迫腫痛清水續續小便淋露宜用當歸黃

芪飲外用硫黃烏賊骨各五錢五倍子二錢半為末付患處即效

加防風升麻須用酒炒黃芪為君煎服外以樗根白皮五錢荊芥升麻藿香各二錢煎湯熏洗患處

即入又枳殼二兩煎湯溫浸良久自入

陰戶突出四物湯鯢肭加龍骨五錢連用二貼外以香油和湯洗患處且取如聖膏貼頂上

門○產後陰戶兩傍腫痛手足不能舒伸用四季蔥入乳香末同搗成餅安於陰戶兩傍良久即愈

門○子宮大痛不可忍五倍子白礬等分煎湯重洗又為末糝之

○洗一法香油五斤煎熟盛盆坐其中一食頃以角末吹鼻作嚏即收

○煎熟盛盆坐其中一食頃以蘸油點火吹滅以烟熏產母鼻即上

當歸黃芪飲

治產後陰脫黃芪酒炒三錢人參當歸升麻各二錢甘草一錢右剉作一貼水

煎服日三

硫黃湯

治產後玉門不斂硫黃四兩吳茱萸兔絲子各一兩半蛇床子一兩右研每五錢水一梳

煎湯乘溫頻熏
洗患處自斂

陰脫治驗

一婦人產後陰戶中下一物如合鉢狀有

麻當歸黃芪大料二貼與之半日已收但乾破一

片如掌大落在席上其婦恐腸破失泣予思之此

非腸胃乃糟粕也肌肉破尚可補完若氣血充盛

必可生滿用補中益氣湯妨去柴胡連進二三

大劑一響而收後以四物湯加人

參百餘貼連服三年後復生子

又法出肉線一條長三四尺牽引心腹有傷陰戶中垂

手微動則痛苦欲絕先服失笑散二方見數貼仍用

生薑三斤淨洗不去皮搗爛清油二斤拌勻炒熟

以油乾為度却用熟絹五尺摺作一團納在水道口却用

綃袋兜裏油薑令稍溫付在肉線止熏之覺薑冷

又用熨斗火熨之如薑氣已盡又用新者如此重

熨一日一夜其肉線已縮一半再用前法越兩日

肉線盡入腹中其病全安却再服失笑散芍歸湯

調理不可切斷肉
線即不可治矣

鬱冒

婦人經水適下而發其汗則鬱冒不知人何也師
曰經水下故為裏虛而發其汗則表亦虛此為表

裏俱虛故令鬱冒也繃○產後亡血昏冒不省移
時方悟名曰鬱冒亦名血厥宜用倉公散蓄鼻令

嚏內服白薇湯救二魴門見○婦人產後亡血昏冒
不省瞑目無所知蓋因血暴亡心神無所養故也

何疑焉全生活血湯主之陰亡血補血又
與目合眼之病悉屬於陰亡血補血又

產後風痊

凡產後發熱若舌蹇唇急手指微動便急作
風痊療之宜歸荊湯獨活酒○產後中風

名曰蓐風口噤反張涎潮者為瘳瘳欲死宜愈風散
荊湯如口噤反張涎潮者為瘳瘳欲死宜愈風散

紫湯散○產後血氣大虛不宜發表但用防風
當歸散最妙○產後風病宜用血風湯○產

後瘳因虛遇風挾痰而作宜服人參竹瀝之類又
竹瀝一升頻服大效針○產後中風必當大補氣

血然後治痰切不可作中風治而用發表出汗之
藥八物湯加減用之為可○產後汗多風

難入成痼者治

歸荊湯

治產後風痙荊芥穗微炒當歸身尾各等分右為末每三錢豆淋酒調下

獨活酒

治產後風痙獨活白鮮皮各五錢右剉酒二升煎取一升分二服

愈風散

治產後中風荊芥穗畧炒為末每三錢豆淋酒調下

交加散

治產後痙生地黄黃汁炒生薑滓以生薑汁炒生

地黃滓合焙乾為末每三錢溫酒調服

豆淋酒

治產後風黑豆一升炒熟乘熱投三升清酒中密封隨量飲之

紫湯

治同上黑豆二合炒香熟以酒一盞煮取七分去豆空心頓服

防風當歸散

治產後痙防風當歸川芎熟地黃各二錢半右剉作一貼水煎服

血風湯

治產後諸風痙急或痿弱川芎當歸熟地黃白朮白茯苓各一兩白芍藥秦芩羌活白芷

各七錢防風五錢右以一半為細末溫酒吞下五七十九
錢以一為末蜜丸梧子大溫酒吞下五七十九
心丹

產後頭痛

此九產後發熱身痛頭疼不可便作感冒治之

或四物湯加柴胡煎服○產後頭痛宜用一婦產

散見三頭痛與心腹痛互作苦極欲死用黑龍丹

產後心腹腰脇痛

神產後心腹腰疼痛全失笑散宜八味黑

產後惡露斷絕腰腹痛重宜桃仁湯桂當歸九

服之即效○紅花玄胡索各一錢煎水調後藥散

痛宜推氣養血丸○冬月解產臍下痛宜羊肉

生藕汁各一升薑汁慢火煎如稀錫每取一合溫酒



調服

八味黑神散

治產後惡露不盡心胃臍腹撮痛及血

地黃甘草各一兩黑豆四兩炒右為末右為末每
二錢童便溫酒調下

烏金

桃仁湯

治產後惡露方行忽然斷絕腰腹重痛或流

水蛭並炒各三十枚右為末每三錢水一盞煎
至六分去滓溫服惡血下即止如有大痛處必作

癰疽宜取五香連翹湯勸服之

桃桂當歸丸

治產後惡露方行忽然斷絕驟作寒熱

各五錢當歸桃仁沒藥各二錢半
各三十枚右為末醋麪糊和丸
或大豆大醋湯下三

十九

沒藥散

治產後血瘀作痛沒藥三錢
每取二錢二服之

命保

養血佐肝丸

治產後左脇脹悶一塊痛卧不着席香

皮半夏油炒白朮炒青皮油炒神麴炒薤蒿藥酒炒陳

壯丹皮紅花白茯苓各一兩柴胡酒炒桃仁炒各

推氣養血丸

治產後右脇脹有塊如豎弦一條着

八錢草龍膽酒洗六錢三稜蓬朮並醋炒各五錢

右為末酒糊和丸梧子大空心白湯下百丸

羊肉湯

此冬月解產寒氣入產門臍下脹痛手不可近

各八錢麥芽炒肉桂各六錢木香三錢右為末

醋糊和丸梧子大空心以米飲吞下百丸

至一兩右剉水三攪酒一盞煎

至一攪去滓分二次溫服

產後嘔逆

產後腹脹滿悶嘔吐不定此由敗血入脾胃故不能飲食也宜用抵聖湯香靈丸

抵聖湯

治產後嘔逆惡心不能飲食赤芍藥半夏澤蘭葉人參陳皮各一錢半甘草五分右剉作

一貼入薑七片水煎服

香靈丸

治產後嘔逆不止丁香辰砂另研各六分五靈脂一錢右研勻用狗膽或猪膽和丸炙實大

以生薑陳皮煎湯磨化一丸服之

產後淋瀝遺尿

婦人產後理不順致傷遺尿無持宜用參朮膏

後遺尿宜桑螵蛸散黃芪芍藥湯

參朮膏

治產後臍損成淋人參二錢半白朮二錢黃芪一錢半陳皮桃仁白茯苓各一錢甘草五

分右剉作一貼水煎猪羊脬後入藥再煎去滓溫服空心

一產婦因收生者不謹損破尿脬而致淋瀝不禁遂為廢疾因思肌肉在外而破尚可補完診其脉虛甚試與峻補服參朮膏至一月而安

盖血氣驟長其睟自完
恐稍遲亦難成功

茅根湯

治產後淋白茅根四兩白茯苓二兩瞿麥葵子人參各一兩蒲黃挑膠滑石甘草各五錢

紫貝五箇石首魚頭中石十六箇右為末每二錢木通湯調下或為麤末三錢燈心同煎服亦可

桑螵蛸散

治產後淋數及遺尿桑螵蛸十五箇炒鹿茸酥炙黃芪各一兩半牡蠣粉人參赤石

脂厚朴各一兩右為末空心以米飲調下二錢蠔○又桑螵蛸酒炒為末薑湯調下二錢亦效

黃芪芍藥湯

治產後遺尿不禁黃芪當歸尾白芍藥各一錢半白朮一錢人參陳皮各五分

甘草灸三分右剉作一貼水煎空心服

產後泄痢

產後泄瀉宜的奇散○產後月內痢宜鴨子煎坊見又四物湯加桃仁黃連木香主之

○當歸芍藥散亦可

的奇散

治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸為瀉下青黑色物是驗大荆芥穗於盞內然火



燒存性不得犯油火入麝香少許研為末每取一錢沸湯一二呷調服神效

產後大便秘結

液故大便秘結難蓋新三種疾鬱胃則多汗出致胃燥亡津
○產後大便不通腸滿氣急難以坐卧取麥蘗末

酒調下一合神效

滋腸五仁丸

仁二錢半郁李仁一錢右各另研為膏合
橘紅末蜜丸梧子大米飲下五六十九粒

產後浮腫

宜大調經散小調經散正脾散張○產後浮腫必
大補氣血為主四君子湯加蒼朮煎服忌峻

利之劑或用水腫宜用澤蘭散○產後風腫水腫

大調經散

治產後腫滿喘急尿澁黑豆炒一兩茯苓神
五錢琥珀一錢右為末烏豆紫蘇葉煎湯

錢調下二

小調經散

治產後浮腫當歸一兩桂心赤芍藥各五錢沒藥琥珀甘草各二錢細辛麝香各一

錢右為末每服一錢溫酒入薑汁調服

正脾散

治產後通身浮腫蓬朮炮便香附子陳皮前香甘草各等分右為末每二錢燈心木通

煎湯調下

五味白朮散

治產後腫宜補中導水行氣白朮三錢陳皮一錢半木通川芎赤茯苓各一錢

右剉作一貼入水煎吞下與點丸炒二錢五丸

澤蘭散

治產後風腫水腫澤蘭防己各等分右為末每二錢溫酒或醋湯調下

產後脉法

婦人產後之脉洪實不調者死沉微附骨不絕者生○診婦人新產脉沉小者生實大堅

強急者死○新產之脉緩滑吉實大弦急死來侵又云沉細之脉附骨不絕生



產後治法

產後當大補氣血為先宜用補虛湯雖有難證以末治之○又云胎前毋滯產後毋虛

後切勿不可發表又不可用芍藥以性味酸寒能伐生發之氣故也○產後必先用逐瘀補虛為主瘀

消然後方可行補如不逐瘀遽服參芪之屬或致瘀血攻心即危○產後用補虛湯如發熱輕則

加茯苓淡滲之重則加乾薑或問大熱用乾薑何也曰此非有餘之邪乃陰虛生內熱耳蓋乾薑能

補肺分利肺氣又能入肝經引眾藥生血然必與補陰藥同用之此造化之妙非天下之至神其能

與於此哉○大抵產病天行則用增損柴胡湯

倍川芎夏倍芍藥秋倍地黃冬倍當歸

補虛湯

人參白朮各一錢半當歸川芎黃芪陳皮各一錢甘草七分右剉作一貼入薑三片水煎

服熱輕倍加茯苓熱重加酒芍熟甚加乾薑炒黑引諸藥入肝經生血

產後虛勞

產後未滿月不宜多用七情勞倦行動或作鉞工怒食生冷粘硬之物及犯觸風寒當時

未覺厥後即成蓐勞凡產後滿百日乃可交合不
爾至死虛羸百病滋長慎之○產後勞傷過度
名曰蓐勞其證虛羸乍起乍卧飲食不消時有咳
嗽頭目昏痛發渴盜汗寒熱如瘧十全大補湯
先將川芎加續斷牛膝鱉甲桑寄生桃仁為糞末
半入煎藥末三錢及葱白三寸烏梅一箇荊芥五
穗再煎至七分去滓空心溫服○產後蓐勞宜
用當歸羊肉湯當歸建中湯助增損
四物湯入參鱉甲散熟乾地黃散增損

當歸羊肉湯

治蓐勞肥羊肉四兩當歸川芎黃芪各
一兩二錢半生薑一兩半剉水九盞

煎至三盞分三服○一方
無羊肉代以豬內腎一雙

增損四物湯

治產後亡血榮衛虛損乍寒乍熱四物湯
去熟地黃加入參乾薑甘草等分煎服

人參鱉甲散

治產後蓐勞黃芪鱉甲各一錢二錢半
牛膝一錢人參桂心桑寄生當歸白茯苓

苓白芍藥桃仁熟地黃麥門冬甘草各七分
半續斷五分剉作一貼空心水煎服



熟乾地黃散

治產後氣血未復而有房事勞損下血

炒鹿角膠珠男子棍布燒存性各一錢伏龍肝七

分半蒲黃炒白茯苓白芍藥各五分桂心甘草各

過月不產

青竹茹一錢水煎服

過月不產者名曰盛胎蓋其理何歟曰其按月行經而胎自長者或及期而分
自長者名曰盛胎蓋其理何歟曰其按月行經而胎自長者或及期而分
血尤有餘故也其有數月胎而血大下者謂之漏
胎蓋因事觸動經脉故血下而未傷於子宮故也
雖然孕中失血胎雖不墮其氣亦虧多致逾月不
產予曾見有十二三月或十七八月或二十四五
箇月生者往往有之俱是氣血不足胚胎難長故
爾凡十月之後未產者當服大補氣血之藥以培
養之庶分娩之無虞也
○過月不產用八方湯
物湯加黃芪鹿角膠珠煎服峻補之
○又方四
縮砂紫蘇葉水煎服即產

妊娠通治

宜用芎歸湯四物湯
當歸芍藥散益母丸
坊見保安丸

芎歸湯

治產前產後諸疾及血暈不省橫生逆產死
胎不下血崩不止臨月服之則縮胎易產產

後服之則惡血自下川芎當歸各五錢右剉作一
貼水煎服日二三次○又治半產去血多產後去

血多崩中去血多眩暈悶絕不省人事者連進數服
一切去血過多

即麝香○當歸六錢見
芎四錢名佛手散

保安丸

治產前產後諸疾生乾地黃另為末馬鳴退
灸麝香各一兩赤茯苓牡丹皮白芍藥各七

錢半川芎細辛人參肉桂當歸牛膝白芷木香藁
本麻黃澤蘭葉附子炮甘草灸寒水石煨防風桔

梗蟬退各五錢石茱萸沉香各二錢
半右為末蜜丸彈子大酒下一丸

當歸芍藥散

治妊娠心腹痛及泄痢產前產後通用
白芍藥二錢半川芎澤瀉各一錢半當

歸赤茯苓白朮各七分半剉作一貼
水煎服或為細末溫酒調下二錢

益母丸

一名濟陰丹治產前產後一切諸病及難產橫逆能行血養血安胎順氣又能活血行氣

有補陰之妙故名益母丸

益母膏

一名返魂丹通治姙娠不出諸病及催生神效又治橫生逆產及死胎不取出胞衣不下益母草

斷產

婦人產育艱難或一歲一產可以此少間之四物湯加芸薹子一撮煎於經行後空心服之

宿疾終不可保胎者牛膝四分分瞿麥桂心蟹爪各二分為末空心溫酒調服以下之免害其母

姙婦因疾病胎不能安可下之法麴○又四兩麥芽神蓋煎取一盞去滓分三服即下之

麴各半升和酒煮服之即下神效○又方附子二枚為末醋調塗母右足去之良○又斷子法

用白麴麴一升好酒五升打作糊煮至二升半以絹濾去渣作三服候月經將來日晡下吃一服次

日五更吃一服天明吃一尺服燒存性為末酒飲調

心○又方故蚕紙方圓一尺服燒存性為末酒飲調

服終身不復懷孕。○又方：油煎水銀，空心服，如棗核大一丸，永斷不損人。○

寡婦師尼之病異乎妻妾

宋褚澄療師尼，寡婦別製方。蓋有謂也。此二種寡居獨陰。

無陽慾心萌而多不遂，是以陰陽交爭，乍寒乍熱。全類溫瘧，久則為勞。史記倉公傳載濟北王侍人韓女，病腰背痛，寒熱衆醫多，以知為寒，熱倉公曰：「病得之欲男子，不可得也。何以知之？」診得其脉，肝脉弦出寸口，是以知之。蓋男子以精為主，婦人以血為主，男子精盛以思，室婦人血盛以懷，胎如厥陰脉，弦出寸口，又上魚際，則陰盛可知。故知褚氏之言有謂矣。○寡婦師尼鬱抑成病，其證惡風體倦，乍寒乍熱，面赤心煩，或時自汗，肝脉弦長而出寸口，宜柴胡抑肝湯。芙蓉散抑陰，地黃丸。○勸親○每日上午，神思昏憤，怕見明處，惡聞人聲，至午後方可頭昏腹痛，驚惕稍涉勞動，與月經來時，其證尤劇。此不得遂之故也。宜清神養榮，以四物湯加人參、茯苓、陳皮、柴胡、羌活、香附、子甘草煎服。○或有與鬼交通者，由神不守舍，或時獨笑，或泣脉遲伏，或如雀啄，顏色不變者，宜茯苓神黃芩湯。○

柴胡抑肝湯

治寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂以致寒熱類癰柴胡二錢青皮一錢半赤芍藥牡丹皮各一錢地骨皮香附子梔子蒼朮各七分川芎神麴炒各五分生地黃連翹各三分甘草二分右剉作一貼水煎服

一貼水煎服

芙蓉散

治男無室女無夫思慾動火以致胃痛自汗頰赤脉亂用芙蓉葉有花帶花有子帶子採一朶搗爛和井水濾去渣服之即效

一朶搗爛和井水濾去渣服之即效

抑陰地黃丸

治寡婦勞證生乾地黃二兩赤芍藥一兩柴胡黃芩秦艽各五錢右為末蜜丸梧子大烏梅湯下三十五丸

梧子大烏梅湯下三十五丸

茯神黃芪湯

茯神羌活蔓荊子防風薏苡仁黃芪五味子麥門冬石菖蒲黃芩各一錢甘草五分右剉作一貼水煎服

五分右剉作一貼水煎服

藏燥證

婦人藏燥悲傷欲笑象如神靈所作數欠伸甘麥大棗湯主之難有自笑者紅棗煖存

性米飲
調服

甘麥大棗湯
甘草一兩小麥三合大棗七枚右剉作
貼水二升煎至一升溫服產前產後

皆可
用

治驗

鄉里有一婦人數欠無故悲泣不止或謂之有
祈禳請禱皆不應予急治甘麥大棗湯服三

貼而
愈

臨產預備藥物

芎歸湯○紫蘇飲○四物湯○花藥石散○催主丹○失笑散○香桂散○

命散○三退散○益母丸○返魂丹○催生如神散○

涼血地黃湯○黑龍丹○霹靂丹○生葱油○生薑○單麻

子○犀角地黃湯○石燕子○豬脂○香油○益母草○

白蜜○阿膠○蒲黃○雞卵○陳艾○清酒○生地黃○滑石○麝

香○朱砂○皂
莢○鼯鼠皮

婦人雜病

婦人者衆陰之所集常與濕居十五以上陰氣浮溢百想經心內傷五藏外損姿容月水

去留前後交牙瘀血傳凝中道斷絕其中傷墮不可具論所以編人別立方者以其氣血不調胎妊

產生崩傷之異故也婦人之病與男子十倍難瘳以其嗜慾多於丈夫感病倍於男子加以疾妬憂

也悲慈戀愛憎深着堅牢情不自抑所以爲病根深

婦人病雖有名數莫詳以證狀推原其生理無非血病。滿○

宜抑氣散異香四神散入○婦人虛勞宜用滋陰
百補丸人參荊芥散逍遙散加味逍遙散滋血湯

滋陰地黃丸
○百病通治
宜神湯
仙三合湯
聚寶丹
○濟身有血
陰丹
坊見
益橘
母歸

無汗 血 門 滋 陰 至 寶 湯 治 虛 勞 熱 嗽 有 汗 翻

抑氣散

香附子四兩陳皮二兩茯苓神甘草各
一兩右爲末每二錢沸湯點服

異香四神散

香附子四錢陳皮三錢烏藥二錢甘草
一錢附子到作一貼入薑三片棗二枚

煎服

滋陰百補丸

治氣血不足乍寒乍熱不思飲食羸

草末四兩當歸三兩川芎熟地黃白朮各二兩白芍藥一兩半白茯苓人參玄胡索各一兩甘草五

錢右為末蜜丸梧子大或酒或醋湯或白湯下五七十丸

人參荊芥散

治血風體痛寒熱盜汗煩赤口乾痰嗽

人參荊芥生乾地黃柴胡驚甲酸棗仁炒枳殼羚羊角白朮各七分半桂心川芎當歸防風牡丹皮

赤芍藥甘草各五分右剉作一貼入薑三片煎服

逍遙散

治月經不調及血虛五心煩熱寒熱如瘧白

甘草薄荷各五分右剉作一貼入薑三片水煎服

加味逍遙散

治血虛煩熱潮熱盜汗痰嗽似勞白芍藥白朮各一錢二分知母地骨皮當歸

各一錢白茯苓麥門冬生地黃各八分
各五分桔梗甘草各三分
右剉作一貼水煎服

滋血湯

治婦人心中肺俱損血脈虛弱
水愈期當歸白芍藥山藥黃芪熟地黃各一

錢半人參川芎白茯苓各七分
半右剉作一貼水煎空心服

滋陰地黃丸

治虛勞吐血不調咳嗽血發熱痰嗽盜汗
或經水不調不通熟地黃薑汁浸焙

四兩山藥天門冬麥門冬生乾地黃酒洗
知母酒炒貝母炒當歸酒洗香附米童便浸炒各

二兩白茯苓牡丹皮澤瀉各一兩半
末蜜丸梧子大空心鹽湯吞下百丸

茯神湯

治婦人風虛夢與鬼交妄有所見言語謔亂
白茯苓神一錢半白茯苓人參石菖蒲各一

赤芍藥五分右剉作一貼水煎空心服

三合湯

治婦人虛勞鍼灸不效者
黃芪白茯苓熟地黃川芎各一錢柴胡人參

各七分半黃芩半夏甘草各五分
八薑三棗二水煎服

○即八物湯合小柴胡湯

三方合劑也一名三分散劑

橘歸丸

治婦人肌膚手足俱有血線路此怒氣傷肝血失常經故也橘紅四兩當歸二兩右為末

蜜丸梧子大溫酒下五七十九

神仙聚寶丹

治經候不調及血氣攻注腹脇疼痛積聚成塊及婦人諸疾琥珀當歸各一兩

沒藥乳香各二錢半辰砂木香麝香各一錢石為末滴水為丸每兩作十五丸每丸溫酒磨下

滋陰至寶湯

治婦人諸虛百損五勞七傷經脉不調寒熱羸瘦當歸白朮各一錢白茯苓陳

皮知母貝母便香附地骨皮麥門冬白芍藥酒炒各八分柴胡薄荷甘草各五分右剉作一貼薑三


水煎服

安產室

上妊娘入月便寫產圖一本貼掛產母房內北壁隨月換圖不用入節之日只於朔日貼之

符借地法

安產方位圖



產圖及催生
符借地法
以朱書於
母身內
上先貼
次貼
次貼
讀呪
遍而止
法

凡逐月安產藏胎衣並向月德月空方位所有十
三神殺並須避忌若交得次月即換次月產圖有
人從入節十日作產圖者非也假如正月十四日立
春若姪婦十三日卧乳豈可作去年十二月用也
必依每月朔日用之乃是若依節氣更換則天德
月德所在差矣○凡產訖棄後汚穢不淨之水並
隨藏衣之方所向不拘遠近棄之切忌閉肚方娘
○如正月月德在丙可安產室月空在壬可藏胎
衣餘倣此娘

安產藏胎衣吉方

九月月德安產室
月空藏衣為準

正月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

天德丁 坤壬 辛乾甲 癸艮丙 乙巽庚
月德丙 甲壬 庚丙 甲壬 庚丙 甲壬 庚
月空壬 庚丙 甲壬 庚丙 甲壬 庚丙 甲



生氣子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

催 生 符

𡗗

月 月 月
月 水 月
月 月 月
月 生 月
月 死 月

二
月月月月
弓弓弓弓

體玄子借地法

呪曰東借十步
 北借十步
 西借十步
 上借十步
 南借十步
 下借十步

右符以朱砂書之貼於房內北壁上遇坐草之時
於鍼上就燈燒之不得飛揚溫水調服妙旅

步壁房之中四十餘步安產借地恐有穢污或有東海神王或有西海神王或有南海神王或有北海神王或有招搖舉高十丈天符地軸八地十丈令此地空閑

海神王或有日遊將軍白虎夫人遠去十丈軒轅
招搖舉高十丈天符地軸入地十丈令此地空閑

產婦某氏安居無所妨碍無所畏忌諸神擁護百邪逐去急急如律令勅讀三遍

月遊胎殺所在

正月在房床○二月在竈○三月在門堂○四月在房床○五月在竈○六月在門堂○七月在確磨○八月在廁戶○九月在門房○十月在床房○十一月在爐竈○十二月在門房○

月在床倉○十月在床房○十一月在確磨○八月在廁戶○九月在門房○十月在床房○十一月在爐竈○十二月在門房○

月在床
房榻

日遊胎殺所在

甲巳日在門○乙庚日在確磨○丙辛日在井竈○丁壬日在廚竈○戊癸日在米倉○子丑日在井竈○寅卯辰酉日在竈○巳午日在門○未申日在中堂○戌亥日在房○

日在米倉○子丑日在井竈○寅卯辰酉日在竈○巳午日在門○未申日在中堂○戌亥日在房○

○九胎殺所在不宜修整雖隣家興動孕婦當避縱不墮胎令兒破形色育體孳竅塞或至夭殞可

不戒
之禍

房中日遊神所在

癸巳甲午日在房內西○甲辰乙巳日在房內東○丙申丁酉日在房內西○戊戌己亥日在房內東○庚子辛丑日在房內南○壬寅日在房內北○

丙午丁未日在房內東○六戊六己日在房中○庚子辛丑日在房內南○九遊神所在忌安



床換帳致重物於床中必主傷產墮胎竭

推婦人行年法

逐一排行年吉凶于後按
右件七神詳斷吉凶

宜宜 生禍絕閉八反 懸
卧 着 氣害命肚症支 房
方衣 方方方方方月 方

十三歲

庚申

西南黃衣

坤

巽

辛甲正

七

辰

戊

十四歲

己未

正南赤衣

離

兌

壬癸二

八

卯

酉

十五歲

戊午

正北黑衣

坎

艮

癸壬三

九

寅

申

十六歲

丁巳

正東青衣

震

艮

乾甲辛四

十

丑

未

十七歲

丙辰

東北黃衣

艮

震

坎乙庚五

十一

子

午

十八歲

乙卯

西北黑衣

乾

坎

震丙丁六

十二

巳

亥

成

酉

申

未

午

亥

成

西

三

未

二十九歲

甲辰

西南黃衣

坤

巽

辛乙五

子

午

三十歲

癸卯

正南赤衣

離

坤

兌

壬癸六

二十

三十一歲

壬寅

正北黑衣

坎

乾

艮

癸壬正

七

三十二歲

辛丑

正東青衣

震

艮

乾

甲辛二

八

三十三歲

庚子

東北黃衣

艮

震

坎

乙庚三

九

三十四歲

己亥

西北白衣

乾

坎

震

丙丁四

十

三十五歲

戊戌

正西白衣

兌

巽

離

丁丙五

十一

三十六歲

丁酉

東南黃衣

巽

兌

坤

庚乙六

十二

三十七歲

丙申

西南黃衣

坤

離

巽

辛甲正

七

三十八歲

乙未

正南赤衣

離

坤

兌

壬癸二

八

三十九歲

甲辰

正北黑衣

坎

乾

艮

癸壬正

七

三十歲甲午

正北黑衣

坎 乾 艮 癸 壬 三

寅申

四十歲癸巳

正東青衣

震 艮 乾 甲 辛 四

丑未

五十歲壬辰

東北黃衣

艮 震 坎 乙 庚 五

子午

六十歲辛卯

西北黃衣

乾 坎 震 丙 丁 六

巳亥

七十歲庚寅

正西白衣

兌 巽 離 丁 丙 七

辰戌

八十歲己丑

東南黃衣

巽 兌 坤 庚 乙 八

卯酉

九十歲戊子

西南黃衣

坤 離 巽 辛 甲 九

寅申

六十歲丁亥

正南赤衣

離 坤 兌 壬 癸 四

丑未

七十歲丙戌

正北黑衣

坎 乾 艮 癸 壬 五

子午

八十歲乙酉

正東青衣

震 艮 乾 甲 辛 六

巳亥



四十歲甲申 東北黃衣 艮震坎乙庚正七 辰戌

一生氣方 產婦宜向之坐卧及床 帳向之開門大吉 禍

二反支月 遇此月即鋪灰用牛皮或馬驢 皮訖鋪草勿令惡血汚地吉 禍

三禍害月 不得於其上產又不得向 之大小便避之大吉 禍

四絕命方 不得於其上產又不得向 之大小便避之大吉 禍

五懸尸方 遇此日產不得攀繩宜 懸馬轡攀之大吉 禍

六閉肚方 臨月及滿月並不得向之大小 便及棄不爭之水謹之吉 禍

七八疰方 產帳不得向之開 門忌之大吉 禍

小兒初生救急 八條

小兒 初生氣欲絕不能啼必是難產或冒寒所致急 以綿絮包置懷中勿斷臍帶且將胞衣置爐火

中燒之仍作大紙撚蘸油點火於臍帶下熏之令
火氣入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須令氣回啼哭

如常方可
斷臍帶

小兒

初生面青身冷口噤乃胎寒也用白殭蚕散急
救之白殭蚕木香肉桂陳皮檳榔甘草灸各五

分
綿蘇入兒口中取汁以

小兒

初生有即死者急看兒口中懸雍前腭上有泡
如石榴子以指摘破出血以帛拭去後灰摻之

若惡血入口
中即死

小兒

初生忽患撮口不飲乳名曰馬牙不治則百無
一生便看兒齒齦上有一小泡子如粟米狀急以

鍼挑出血用墨磨薄荷汁斷母後少許裹手指此
墨遍口內擦之勿飲乳一時許即差

泡為齒糞以鍼或指爪
搔破點生蜜亦效

小兒

初生穀道無孔不得大便急用金玉簪尖看其
的處刺穿作孔以蘇合香元少許作鍼納孔中

或以油紙撚絛
住不令再合

小兒初生不飲乳不小便大蔥白一寸四破

小兒初生嘔吐不能飲乳乃穢惡入口用黃連枳殼

入口中又木瓜生薑
煎湯灌口中亦妙

小兒初生大小便不通腹脹氣欲絕急令婦人以溫

處每一處凡嘔三五次漱口更嘔取紅赤色為度

須臾自通不爾則死
勻抹兒口中與
乳吮下即通

小兒初生小便不通急用生地龍數條蜜少許同研

香各少許麥門冬燈心
煎湯調灌口中即通

小兒初生大便不通先以硬蔥尖絛入肛門內如不

下用朱砂丸朱砂水飛南星炮巴豆霜各等分

右為末糊九黍米大薄荷煎湯灌下二九即通如氏

小兒口初生撮口不乳飲取牛黃二分半調竹瀝灌入

如粉每五分以猪乳汁二合和勻分二次灌口中效得

小兒初生口內白屑滿舌上不能吮乳謂之鵝口急

脫用雄黃三錢鵬砂二錢甘草一錢龍腦二分半為末蜜水調塗或乾糝之妙錫○又方鼠婦五取

汁塗之又白楊樹枝燒取瀝塗之神效

小兒初生遍身無皮但是紅肉以白

小兒初生遍身為末摻之因服蘇合香元門以

小兒初生鼻塞不通乳不得下取猪牙皂角草烏各

星為末薑汁調和貼額門上效得

小兒

初生外腎縮入取硫黃吳茱萸各五錢為末以大蒜汁調塗臍腹上仍以蛇床子燒烟微熏之妙

小兒

初生發驚乃胎驚也朱砂雄黃各等分右為末取少許猪乳汁調抹口中即效八麝香少許尤妙

小兒

初生遍體發丹毒赤腫遊走若入腹入腎則必死名曰赤遊乃胎毒也宜以細鍼或砂鍼隨赤

○又周匝刺出惡血最妙仍以芭蕉汁鱧鱉汁塗之

又焔硝一分冷水調和塗之○又溝渠中小鰕搗爛付之幹

單方

二九五十種

朱砂

治產後敗血入心如見鬼崇朱砂一二錢乳汁三四匙調和納活地龍一條于藥袞轉取去地

龍入好酒與乳汁和合七分

大芥

治產後血癥痛取芥燒赤淬酒中取酒飲

伏龍肝

治橫逆產及子死腹中不出其母氣欲絕取伏龍肝一二錢以水調下其兒當頭戴土出

甚妙○難產三日不下伏
龍肝細末一錢酒調服心冊

朴硝治死胎不下朴硝細研半兩
童便調服即效心冊

石燕子主難產孕婦臨產兩
手各把一枚立驗心冊

生地黃治一妊娠胎漏血不止胞乾即死取生地黃
汁一升酒五合煮三五沸服二三次乾

芫蔚即益母草也主產前產後百病能行血養血採
取莖葉搗取汁於銀石器熬成膏和酒服之量

治難產及死胎一合溫服乾○天行不息所以生生而不窮芫蔚

子活行氣有補陰之功命名益母以其
行中有補也故曰胎前無滯產後無虛心冊

蒲黃治產後出血太多發渴真蒲黃二
錢白湯調下如渴甚井水調下乾

當歸治婦人百病又治產後腹痛當歸末三錢水煎
服名獨聖湯○血刺痛用當歸乃和血之藥

若血積刺痛宜用挑
仁紅花當歸頭心冊

芍藥

主婦人諸疾并產前後諸病

艾葉

使婦人有胎又能安胎止腹痛○胎漏生艾汁

不安或腰痛下血不止艾葉

黃芩

產前安胎黃芩白朮妙藥也○黃芩安胎聖藥也俗人妄以溫

熱之藥可養胎殊不知產前宜清熱養血令血循

經而不妄行故能養胎也必取細挺沉實者用之

紅花

主產後血暈口噤悶絕紅花一兩酒

玄胡索

主產後血暈及惡血衝心或兒枕痛欲絕為

當歸一兩右為末每二錢童便或熱酒調下

心

治產後血癢痛悶欲絕桂心為末

膽汁和丸櫻桃大熱酒磨下二九

桑寄生

治胎漏不止能安胎令胎牢
固或煎服或為末服並佳

蘇木

治產後血暈及惡露不下痛悶
欲死蘇木一兩剉酒煎服

桑螵蛸

主妊婦小便數不禁右為末
每二錢空心米飲調下

鯉魚鱗

治產後血瘕痛取鱗燒灰
研酒服一錢能破滯血

烏賊魚肉

主絕嗣無子久食令人有子
有墨主婦人血崩心痛甚者名曰殺血

痛小產下血過多而心痛者亦
然取墨炒為末醋湯調下

淡菜

主產後血氣積聚可煮久食之
瘠血後血結腹痛或因產瘦

蛇蛻

治產不順手足先見者蛇蛻
麝香一字面東酒服一錢更以
一條全者燒灰入

生即順
生

藕汁

主產後煩悶及血上衝心痛生藕汁飲二升
產後忌生冷惟藕不忌者為其能破血故也



柑子皮

主產後浮腫酒煎服之雷公云

蒲萄根

治孕婦子上下衝心取根濃煮汁飲之即下而其胎亦安

桃仁

主婦人產後百病又治暑月產乳取涼大炒成腹中積聚桃仁一千二百枚去皮尖雙仁熬搗

細末以清酒一斗半研如麥粥入磁缸中密封口重湯煮一伏時取出溫酒和服一匙日再名曰桃

仁煎針。產後陰腫痛桃仁細研塗之又和五倍子枯白礬為末研桃仁為膏塗之

胡麻油

下生搗竿取油飲之即下

大麻根

汁催生令易產胎衣不下亦妙

黑豆

孕婦月數未足子死腹中母欲悶絕及胞衣不下黑豆三升醋煮取濃汁頓服立出

神麴

落胎并下鬼胎取末二錢和水服又濃煎取汁服

大麥蘖

能催生落胎有病欲去胎服之即下

醋治孕婦胎死不出醋三升煮黑豆

冬葵子主難產取子一合搗碎水服立

葱白治胎動不安或胎上搶心煩悶葱白大者二十

馬齒莧主產後血痢腹痛搗取汁三合

繁蕒主產後有血塊腹痛搗取汁

雞子主產後血暈風痙身強直口目喎斜雞子三箇

破入醋攪服立產

鹿角膠能安胎止痛炒成珠作

阿膠治難產困乏明膠二兩好酒一升半微火令熔

鹿角主死胎不出鹿角細屑一兩水一盞

兔頭骨

主催生落胞并產後惡血不下兔頭骨和毛髓燒為灰作末酒下一錢妙

猫頭骨

治難產催生甚驗猫頭骨兔頭骨各一箇火煨研為末每二錢芎歸湯煎水調下即產

頭骨尤妙

羊腎

主產後虛羸瘦弱無力作羊腎一雙炮熟細切和五味作羹或作粥食良

猪腎

治產後勞骨節痛汗不止猪腎細切造稀臠和五味入米煮作粥食之

等分以猪肝煮水調服即效

麝香

取麝香一錢水調下

榆白皮

二升即下中或母病欲去胎榆白皮煮汁服

令產極易

甘竹根

治胎動不安甘竹根煮汁服之

苧根

治二兩妊婦胎動欲墮腹痛不可忍苧根

瞿麥

破胎墮子○治產難經日不出或子死腹中母欲死瞿麥煮取濃汁服之

車前子

治難產及橫逆產不得出炒為末酒服二三錢

水銀

治胎死腹中不出其母氣絕取水銀二兩吞之立出

大黃

治產後惡血衝心或胎衣不下腹中成塊大黃一兩為末醋半升同熬成膏丸如梧子大以溫

醋化五丸服之良久血下即愈

鍼灸法

男子無嗣者以鹽填臍灸之連日灸至二百壯必效○婦人絕嗣灸關元三十壯可

報灸之○婦人妊子不成數墮胎灸胞門子戶各五十壯胞門在關元左邊二寸子戶在關元右邊

二寸子戶一名氣門○又灸子宮三七壯或鍼入二寸穴在中極傍左右各開三寸○無子取

陰交石門關元中極涌泉等處陰交○催生難產及下死胎取大衝補合谷補三陰交○立

時分解○子上衝逼心取巨闕令產母正坐使人
抱頭抱腰微偃鍼入六分留七呼得氣即瀉立甦
如子掬母心生下兒手心有鍼痕子頂母心兒人
中有鍼痕向後則枕骨有鍼痕是其驗也神效
○一婦人產後暴卒其母為灸會陰三陰交各數
壯而甦其母蓋名醫女也○橫生逆產諸藥不
效急於產母右腳小指尖頭上灸三壯即產亦治
胞衣不下醫鑑云即至陰穴○灸三壯即產亦治
陰交中極照海內關崑崙○產後血暈取三里
三陰交陰交神門關元○產後陰下脫灸臍下
橫紋二七壯又取照海○婦人無子或產後久
不再孕取稗心一條長同身寸之四寸令婦人仰
卧舒手足以所量稗心平摺橫安前點處兩頭盡處
墨點記後以此稗心平摺橫安前點處兩頭盡處
是穴按之自有動脈應手各灸三七
壯神驗即上云胞門子戶穴也

醫寶鑑雜病篇卷之十