

東醫圖書寶鑑

奎章閣圖書
7608
1
19

奎章閣圖書	
部別	分類記號
	圖書番號 貴 1933
	一部冊數 24
	內別番號 18
서울대학교	

東醫圖書寶鑑


東京醫學書局

昭和十三年四月

發行

1933




醫學



雜病篇十一

小兒





東醫寶鑑雜病篇卷之十一

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉 教撰

小兒

小兒病難治

古語曰寧醫一婦人莫醫一小兒蓋小兒難問證難察脉

治之尤難以其藏府脆嫩皮骨軟弱血氣未盛經絡
為尤難以其藏府脆嫩皮骨軟弱血氣未盛經絡
如絲脉息如毫易虛易實易冷易熱氣未盛經絡
言手不能指疾痛之莫知非觀形察色聽聲切脉
究其病源詳其陰陽表裏虛
實而能療之者蓋亦寡矣

臟腑生成

夫一月之孕有白露之稱二月之胚有桃花
之譬及其三月則先生右腎而為男陰包陽

也先生左腎則為女陽包陰也其次腎生脾脾生
肝肝生肺肺生心以生其勝已者腎屬水故五藏
由是為陰其次心生小腸小腸生三焦以生其勝
膽生胃胃生脾脾生心以生其勝已者腎屬水故五藏
膽生胃胃生脾脾生心以生其勝已者腎屬水故五藏

醫寶鑑雜病篇卷之十一

御醫忠勤貞亮扈聖功臣宗祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

小兒

小兒病難治

古語曰寧醫一婦人莫醫一婦人蓋小兒難問證難察

治之尤難故也。為尤難以其藏府脆嫩皮骨軟弱血氣未盛經絡如絲脉息如毫易虛易實易冷易熱無之口不能言手不能指疾痛之莫知非觀形色聽聲切脈實而能療之者蓋亦寡矣

臟腑生成

夫一月之孕有白露之稱二月之孕有桃花

也先生左腎則為女陽色陰也其次腎生脾生肝生肺生心以生其勝已者腎屬水故五臟由是為陰其次心生小腸小腸生大腸大腸生膽生胃胃生膀胱膀胱生三焦以生其勝已者小

腸屬火六府由是為陽其次三焦生八脉八脉生
十二經十二經生十絡二絡生一百八十絡
絡絲絡生一百八十五骨節絡生三萬四千孫
孫絡生三百六十五骨節絡生三萬四千孫
穴大穴生八萬四千毛竅則耳
目口鼻百骸之身皆備矣

初生解毒法

嬰兒在胎口中若有惡物兒纔生不候聲出
坐婆急用軟帛裹手指蘸黃連甘草濃煎

汁拭去口中惡物若燕八腹中必生諸疾○更以
煉蜜少許調朱砂末一字抹入口中令嚥下則一

生免瘡痘之患○朱蜜燕下然後乃飼乳酌量
與之勿令大飽恐成吐乳○既繙裹了取黃連

甘草煎汁以退惡物於大便秘兒口令啞之
三日以來

初生洗浴法

三朝洗之則兒少驚○尋常澡洗用猪膽汁
湯洗之則兒少驚○尋常澡洗用猪膽汁

入湯中洗之即與不久坐湯水之中風冷外傷水濕
熱或遇澡浴即與不久坐湯水之中風冷外傷水濕

內滲變成風搐
可不戒之慎

初生斷臍法

雖子在腹中胞胎十月止於臍中與母通氣

臍之後招風致病者有之其法初生小兒綿裹臍

帶離肚五六寸先用軟綿綳住腳於線外將臍咬

斷片時去線待血流盡以手輕輕揉散艾灸臍頭

三壯或五壯結作紃絡軟帛要裹切不可常時揭

看待臍根落去自然無事○初生即將臍剪斷用生

臍根綳住待第三日離肚二指許將臍剪斷用生

薑自然汁或香油和麩裹臍四圍於臍頭以艾灸

三壯謂之熏臍後不招風○先斷兒臍帶可只

留二寸許以線繫定然後洗浴不

然則濕氣入腹必作臍風之疾娘

擇乳母法

凡擇乳母須精神爽慧性情和悅肌肉充肥

白則可以飼兒不得與娘如娘大段酸鹹飲食仍忌

纔衝寒暑來便餒兒娘如此則必成娘癖或驚疳

瀉痢之疾娘○如陰陽交接之際切不可飲酒恐

此正謂之交娘必生癖娘○娘母不可頻飲酒恐

兒作痰嗽驚熱昏眩之疾娘○乳母宜謹節飲食

飲食下咽乳汁便通情慾動中乳脉便應病氣到

乳汁必凝滯兒得此乳疾病立至不吐則瀉不瘡則熱或為口糜或為驚搐或為夜啼或為腹痛病之初來其尿必甚少便須詢問隨證調治毋安子安可消患於未形也。夫飲食之擇猶是小可脆母稟受之厚薄情性之緩急骨相之堅脆德行之善惡兒能速肖尤為關係。堦

小兒乳哺法

人生十六歲以前血氣俱盛如日方升如月方圓惟陰長不足腸胃尚脆而窄養之

道不可不謹。堦。○凡初乳先須俚去宿乳後與之。○毋欲寐即奪其乳恐睡困不知飽足也。○兒啼未定乳毋勿遽以乳飲之恐停滯胃膈而成嘔吐也。○乳後不與食哺後不與乳乳食相併則難以剋化結於腹中作痛大抵成癖成積成疳皆自此始。○小兒血氣俱盛食物易消故食無時然腸胃尚脆而窄一切發熱難化之物皆宜禁絕只與乾柿熟菜白粥非惟無病可以養德此外生栗味鹹乾柿性涼可為養陰之助然

小兒保護法

凡嬰兒肌膚未實若厚衣過暖則傷皮膚損血脉發瘡瘍汗出候理不閉風邪易入

若天氣和暖抱之使見風日則氣血堅剛可耐風寒不致疾病今人懷抱小兒不着地氣致令筋骨緩弱疾病易生非愛護之道○夜間不得令兒枕臂須作一二豆袋令兒枕無左右附之可近乳母之側蓋覆衣衾須露兒頭面若一向仰卧恐成驚疾須時時回動之娘○天寒時兒用父母常着舊衣作衣服不可用新綿綃○宜用七八十歲老人則筋骨軟弱易致疾病娘○宜用七八十歲老人舊襦舊襖改作小兒衣衫真氣相滋令兒有壽富貴之家切勿不宜新製紵綾羅之類與小兒穿不惟生病抑且折福○初生三五五月宜繃縛令卧勿豎頭抱出六箇月方可與稀粥亦不可與乳同

契門

養子十法

一要背煖○二要肚煖○三要足煖○四要頭涼○五要心胃涼○六要勿見怪物

○七脾胃常要溫○八啼未定勿便飲乳○九勿服輕粉朱砂○十少洗浴

調護歌

養子須調護看承莫縱弛○乳多終損胃食壅則傷脾○被厚非為益衣單正所宜○無

風蟄見日寒暑順天時

變蒸候

小兒變蒸俗謂之牙生骨長比如蚕之有眠龍之蛻骨虎之轉爪皆同此類變生而長也

小兒變蒸是胎毒散也。變蒸者陰陽水火蒸於血氣而使形體成就。是五藏之變氣而七情之

所由生也。蓋兒生之日至三十二日一變每變蒸畢即覺性情有異於前何者長生藏府意智故也

何謂三十二日長骨脉添精神人有三百六十五骨以象天數以應期歲以分十二經絡故初生至

三十二日一變生腎心一百二十四日二變一蒸生膀胱九十六日三變生心一百二十四日四變二蒸生

小腸一百六十日五變生肝一百九十二日六變三蒸生膽二百二十日七變生肺二百五十六

日八變四蒸生大腸二百八十八日九變生胃其手厥陰心包手少陽百二十日十變五蒸生胃其手厥陰心包手少陽

三焦無形故不變而不蒸夫十變五蒸乃天地之數以生成之然後始生齒能言知喜怒故始全也

大倉公云氣入四肢長碎骨於十變是矣。變蒸既畢兒乃成人也。變者變生五藏也。蒸者蒸養

六府也又云變者上氣蒸者體熱每經一變一蒸輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脉亂而數或吐或汗或煩啼躁渴輕者五日解重者七八日解其候與傷寒相似但變蒸則耳冷尻冷上唇中心發白庖狀如魚目珠者是也治法和平之劑微表之宜用惺惺散防見熱實則微利之宜用紫霜丸防見或不治亦自愈切不可妄投藥餌及鍼灸也

小兒繼病魁病

腹大有娠或發或差取百勞鳥毛帶之一名

○賜即博勞也又以紅紗袋盛夜明砂與兒佩之身體痿痺名爲魁病魁暗靨也用伏翼燒灰細研以粥飲調下五分日四五次灸令香熱嚼哺兒亦效伏翼即蝙蝠也鱣○婦人先有小兒未能行而母更有娠使兒飲此乳則作魁病令兒黃瘦骨立發熱髮落千金論小兒魁病者是也姓婦被惡神導其腹中妬嫉小兒令生此病魁亦小鬼也其證微微下利寒熱往來毛髮聳聳不悅者是也宜服龍膽湯



龍膽湯

大黃煨二錢龍膽草柴胡黃芩桔梗釣藤皮赤芍藥赤茯苓甘草各一錢蜣螂二箇右剉

作一貼水一升煮取五合去滓一合十歲以下服二三合得下利即止針服

相兒命長短法

下兒三歲以上十歲以下視其性氣高下即知其夭壽○兒少時識悟通敏

過人者多夭○預知人意回旋敏速者亦夭○兒骨法成就威儀回轉遲舒稍費人精神彫琢者壽

○初生叫聲連延相屬者壽○聲絕而復揚急者不壽○啼聲散啼聲深汗不流頭四破小便凝如

脂膏常揺手足頭毛不周匝者並不成人○臍中無血者好○臍小者徧身軟弱如無骨者汗血者

多厄並不壽○鮮白長大卵縫通達黑者並壽○目視不正數動者大非佳兆○早坐早行早齒早

語皆惡性非佳人○髮稀小者性強不聽人○額上有旋毛妨父母或早貴○初生枕骨不成能言

而死○尻骨不成能踞而死○掌骨不成能匍匐而死○踵骨不成能行而死○臙骨不成能立而

死○身不收者死○股間無生肉者死○人中深長者壽○陰不起者死○陰囊下白者死○赤者小

死

虎口三關脉法

初生曰嬰兒初生三歲曰小兒十歲曰童子

五歲六歲曰嬰孩察三關脉三關在小兒男左手

女右手次指內有紅紋似線者為驗第一節名曰氣

關脉見則病重尚可治○則病輕○第二節名曰命關脉見

則病極乃九死一生若直射三關青黑紋者死○

第一節赤紋乃飛禽內外人驚赤紋微乃火驚

黑紋水驚青紋乃天雷四足驚內隱青紋微屈則

是急風候○第二節紫色紋乃驚疳青色紋乃疳

傳肝白色紋乃疳傳肺黃色紋乃疳傳脾黑色紋

難安○第三節青黑紋三關通度斜歸指甲則不


治○五色之中紅黃易安紅盛作紫紫盛作青

青盛作黑青黑之色至純黑則不可治○歌曰

紫風紅傷寒青驚白色疳黑

時因中惡黃則困脾端赫

三關圖




三關在虎口次指
之側第一關第
二氣關第三命關
也決病輕重死生

診小兒脉法

小兒之脉三歲至五歲以一指按掌後人迎氣口之脉常以一指按掌後人迎氣口之脉

八歲以一指按掌後人迎氣口之脉
一息五六至為常脈
為平和八九至為發熱五至為內寒
亂不須治藥頓治○弦急氣不和○沉緩傷食○
促急虛驚○浮為風○沉細為冷○沉緩傷風
洪緊傷寒數則為熱
遲則為寒

觀形察色圖



頰下屬腎水居北

左頰爲肝右頰爲肺天庭爲心地閣爲腎準頭爲脾凡五岳赤者皆熱淡白者皆虛○天庭爲火色紅主大熱青乃肝風○印堂青者人驚紅白者水火驚紅者痰熱○印堂連準頭紅者三焦積熱○印堂至山根紅者心小腸熱山根至鼻柱紅者心胃熱○鼻居面中爲脾紅黃色者無病○脾應唇紅主渴蛔虫咬心頭者唇必反人中唇際也黑者瀉痢死紅色熱痰壅成青色驚風黑色爲痛中惡黃色傷食吐利○左太陽青色驚重紅色輕紅色傷寒黑青色乳積○右太陽青色驚重紅色風搖眼目黑

者死。逆紅者，地閣為腎色，青食時驚，或煩躁，夜啼黃多。頻見災危，必死。黑色痢疾，赤者肺熱。○山根青黑，紅色夜啼，紫色傷飲食。○中庭、天庭、司空、印堂、額角、方廣皆命門部位，青黑為驚風惡候，亦忌損陷。

面上形證歌

痢疾眉頭皺，驚風面頰紅。渴來唇帶赤，毒熱眼瞳○。山根若見脈橫青，此病

明知兩度驚，赤黑困疲時吐瀉，色紅啼夜不曾停。○青脈生於左太陽，須驚一度見推詳，赤是傷寒微燥熱，黑青知是乳多傷。○右邊青脈不須多，有則頻驚，怎奈何？紅赤為風抽眼，目黑青三日見，閻羅

五體以頭為尊一面惟神可恃

無精光黑睛，無運轉

目睫無鋒芒，如魚貓眼狀，或兩眼閉而黑睛朦朧者，死。或外若昏困而神藏於內，不脫者，生。黑珠滿輪睛明者，少病；眼白多睛珠，或黃或青者，稟弱多病。目證內赤者，心熱；淡紅者，心虛；熱青者，肝熱；淡者，肝虛；白而混者，脾熱；無睛光者，腎虛。白而混者，肺熱也。

聲有輕重啼有乾濕

風聲輕者氣也高喊者熱欲狂也濁者流也

神驚也聲塞者痰也聲戰者傷風也驚尖聲沉不響者

重也聲濁沉靜者疳積也如生來不大啼尖聲啾

啾者天○火之大發忽然驚叫乃火動氣虛必死

夜半發者多有口瘡宜看之○睡中驚啼聲浮

者易治聲沉不響者難痊或聲如鴉中彈者不治

小兒初生救急

詳見婦人門

八條

噤口撮口臍風證如粟米狀吮乳不得口吐白沫二便

皆通此胎中熱毒流於心脾一名鵝口瘡○鵝口

瘡小兒初生有白屑滿口如鵝之口鼻外亦有不能吮乳由心脾熱也以亂髮纏指頭蘸薄荷汁拭

樹水塗之枝燒取瀝鯽也付婦之神口效又白齒楊

撮口

者面黃赤氣喘啼聲不出乃胎熱流毒心脾
則舌強唇青撮口聚面飲乳有妨用白殭蚕二

撮口者初生一臘內之篤疾七臘令兒氣促撮口者初生一臘內之篤疾七臘令兒氣促

撮如囊而不乳也。慎齏。○治法牛黃一錢竹瀝一

合調和射抹口中即差宣風散亦可用
心冊○撮口

證若口出白沫四肢冰冷最爲惡候
臍見之尤

初生七日內患撮口瘡風不得飲乳急看

輕輕擦破即開口便安不用服藥。以手指蘸溫水。

不
開
南
星
末
一
錢
腦
子
少
許
研
勻
調
薑
汁
以
指
蘸
擦
兒
牙
齦
上
口
立
開
胸

臍風

臍者小兒斷臍後為風濕所乘或尿濕褌裙遂成風面赤喘急啼聲不出其證臍腫突腹脹滿

日夜多啼不能飲乳甚則發搐噤口撮口宜用調氣益黃散甚者用金烏散或宣風散

在曾堂伸引努氣亦令臍腫發氣宜千金龍膽湯
門外 臍風撮口不待飲乳宜蠲稍餅宜風散
門外

門ハ○ 膺風撮口 不待飲乳宜蠲餅宣風散 門ハ○

門ハ○ 膺風撮口 不待飲乳宜蠲餅宣風散 門ハ○

凡臍邊青黑爪甲黑者死○初生七日內見瘰口撮口臍風三證者危百日內見此證手足蹇者

亦不治

臍腫臍瘡治法

臍腫以荊芥煎湯洗淨後取葱葉火灸過候冷指甲刮薄貼腫處次日

便消方服通心飲○斷臍後多啼不能乳哺宜用栢風冷致令四肢不和臍腫多啼不能乳哺宜用栢

墨散五通膏香螺膏○臍中血水汁出或赤腫痛當歸白石脂末乾蝦蟇燒灰油髮灰皆可付之

○斷臍作瘡白瘰枯龍骨煨當歸末皆可糝上或油調付之妙

保命散

治鵝口瘡不能吮乳枯白瘰朱砂各一錢馬牙硝五錢右為末每取一字用白鵝糞搗水

調塗舌上及口內日三次即效

朱礬散

治同上朱砂白礬枯右等分為細末付口舌上日三遍

一捻金散

治同上雄黃三錢鵬砂一錢甘草半錢龍腦少許右為末乾糝或蜜調塗之

蝎梢散

治撮口風及一切胎風瘡風蝎梢四十九枝

炒以薄荷乾酥為度再入白殭蚕四十箇薑汁

炒乾入腦麝各少許右為細末調勻以紫雄雞肝

宣風散

治臍風撮口多啼不乳口出白沫全蝎一十

一箇全者酒炙為末入麝香末一字和勻每

調氣益黃散

治噤口撮口臍風三證金頭赤足蜈蚣

瞿麥五分右為末每一字以鵝翎管吹入鼻中實

金烏散

治臍風金頭赤脚蜈蚣半條酒浸炙川烏尖

三箇生麝香少許右為末每取半字以金銀

通心飲

治旋螺風赤腫而痛清心火通小便退潮熱



○劉作一服入燈心麥門冬同煎服效得

栢墨散

治臍風臍腫多啼不能乳哺黃栢末釜下墨

五通膏

治臍風撮口生地黄生薑葱白蘿菹子田螺

泄而愈

香螺膏

治臍風腫硬如盤田螺三箇入麝香少許

客忤中惡

識見之客忤者小兒神氣軟弱忽有非常之物或相

忤也故謂之客忤其狀口吐青黃白沫或下水穀

鮮雜面變五色腹痛反側瘕瘕狀似驚癇但眼不

上竄耳其口中懸雍左右若有小小種核即以竹

鍼刺潰之或以指爪摘破急作醋炭皂角燒烟熏



三才圖會卷之五十一

乙



研和醋一合服之即差錢○客忤取豉三合水濕
搗為丸雞子大摩兒顙上及足心各五六遍次摩
臍心及上下良久中自有毛於路上一擲之○
中馬汗氣或馬鳴驚忤取馬尾燒烟熏兒面以差

為度

雄麝散

治客忤雄黃一錢乳香五分麝香一字右為
末每刺雄雞冠血調灌之仍以丹衣覆

愈
兒身即

黃土散

治小兒卒客忤竈心黃土蛭蚓糞各等
分右研細水調塗兒頭上及五心良藥

辟邪膏

治小兒中惡降真香白膠香沉香虎頭骨人
參鬼箭羽草龍膽各五錢右為末入雄黃五

錢麝香一錢煉蜜和勻作膏取少許以乳香
湯化下兒口中又令兒帶及燒卧內尤妙

夜啼

小兒夜啼有四證一曰寒二曰熱三曰口瘡重舌
四曰客忤○寒則腹痛而啼面青白口有冷氣手
足冷腹亦冷曲腰而啼又曰下半夜啼者蓋夜則
陰盛寒則作痛所以夜半後啼也宜用六神散益

黃散防見。熱則心躁而啼，面赤，小便赤，口中熱，腹煖，或有汗，仰身而啼。又曰：上半夜仰身有汗而啼，面赤，身熱者，必痰熱也。到曉方急，導赤散功。加黃芩煎服，通心飲，亦可。口瘡重，舌則吮乳，不得口，到乳上即啼，身額皆微熱，急取燈照口，若無瘡，則舌必重也。照口瘡重，舌類治之。其啼自止。客忤者，犯客忤夜啼，或觸生人氣，忤犯而啼。有日啼驚，夜必黃昏，前後尤甚者，乃客忤中惡也。錢氏安神丸主之。防見依客忤法治之。○月內夜啼驚搖者，乃胎中受驚，所致宜用猪乳膏鎮驚散。有痰者，抱龍丸防見。○小兒夜啼，作心經有熱，有虛治之，宜用燈心散。黃連飲，蟬花散。○夜啼不止，蟬蛻二七枚，去足為末，入朱砂末一字，蜜調送下。○又法：潛取雞窠草一握，置小兒卧席下，即止。○初生月內多啼者，吉胎熱。

六神散

治腹冷痛夜啼。白茯苓、白扁豆、炒各二錢，人參、白朮、山藥、炒各一錢，甘草、炙七分。右為麤末，每取一錢，入薑三棗二水煎服。



猪乳膏

治胎驚夜啼琥珀防風各一錢朱砂五

鎮驚散

治同上朱砂牛黃麝香各少許右合

燈心散

治小兒心燥夜啼燈心花三四顆研細以燈心

花七枚鵬砂一字朱砂少許研細蜜調抹唇上立止

黃連飲

治心經有熱夜啼人參二錢黃連一錢半甘草五分青竹葉十片生薑一片右剉水煎

取汁灌口中

蟬花散

治小兒夜啼狀若鬼祟蟬殼下半截為末初

以上半截為末依湯調用啼復如初古人格物之妙如此

五臟所主虛實證

後虛則補其母實則瀉其子必先實母

盛不可更補到所剋位不可瀉餘攸此

病到春不可補到秋不可瀉餘攸此

心主驚

實則叫哭發熱飲水而搖○心氣熱則合面

病則氣不得通故喜仰卧使氣得上下通也○心

則煩熱○心實發搖難言合面而卧煩熱故上

就涼宜瀉心湯導赤散○防見主之○虛則

肝主風

實則目直視大叫呵欠項急煩悶○實則兩

亦發驚手循衣領亂捻物甚則身強反張宜瀉青

丸○肝病風搖拘急實則風搖力大瀉青

脾主困

實則困睡身熱飲水○脾病困睡泄瀉不思

熱渴欲飲水泄瀉赤黃色宜瀉黃散○虛則

吐瀉生風或泄瀉白色睡露睛或有痰宜錢氏白

木散



肺主喘

實則悶喘促有飲水者有不飲水者。肺

白散功。虛則喘。實則喘。而氣盛或渴宜瀉。

氣長出氣短。虛則喘。實則喘。而氣短。肺病悶亂。

後用門膠散主之。若悶亂氣喘。肺藏怯則唇白。色當補肺。

損故也。○脾肺病久則虛。而唇白。脾者肺之母也。

母子皆虛。不能相營。故曰怯。此以唇診肺之法也。

唇白。色者肺藏怯也。○肺

藏怯也。○肺

腎主虛

證無實。○腎病自無精光。畏明體骨重。○腎虛

中白。睛多。顫解。顫開。面色。色。白者皆為難養。雖長

不過八八之數。若恣色慾。則不及四旬而亡。或有

因病而致腎虛者。非此類也。○又腎不足。下竅蓋

骨重。惟欲墜下。而身縮也。腎者陰也。腎氣虛則畏

明。皆宜補腎。六味地黃元主之。功。○腎主寒。自

病。則足脛寒。而逆人之五藏。惟腎無實。但小兒瘡

疹。變黑陷。則是腎實。水剋退心火也。○腎虛者

下竅足熱。下竅者骨重。惟欲墜下。而縮身也。足熱

者不喜覆衣也。心氣熱則上竅宜導赤散腎氣虛則下竅宜地黃元

五臟相乘

凡五臟自病者為虛邪。正邪。子乘母為實邪。○夫

乘妻為賊邪。○所謂乘者猶乘車之乘五臟相乘莫測如肝病必先治肺補腎然後審肝藏虛實

而調之餘藏倣此。○從前來者為實邪。○從所勝者為微邪。○

○從後來者為虛邪。○從所不勝者為賊邪。○從所勝者為微邪。○

○從所不勝者為賊邪。○從所勝者為微邪。○

則伏於脾火動則壅於肺痰火交作則為急驚或

成嗽痺痰火結滯則為癇釣或為咳嗽痰火來去

驚風證

小兒之病急慢驚風與夫痘疹等證最為酷疾

以其急凶反掌生死須臾故也。○小兒驚風



驚風先見之證

驚者虛惕怔忡氣怯神散痰涎未去其

則面紅臉赤惕惕夜啼○驚邪入肝則面目俱青

驚邪入肺則面色淡黃○驚邪入腎則面黑惡叫齒齬咬牙○

面色淡黃嘔吐不食○喘急氣乏○驚邪入脾則

神志不定恍惚懼人○劄眼上視左顧右盼伸手握

拳悶鬱努氣情態不如尋常皆驚風先證也○

咬牙甚者發驚○目直視○呵欠面青者驚風○

呵欠面黃者脾虛驚○目赤無青者發驚○肝藏實熱手尋衣履亂捻物目

直視必發驚○肝有風目連劄不搐有熱則目直

視亦不搐得熱則搐○肝主風風動而上於頭

目目屬肝風入於目上下左右如風吹不定兒不

任故目連劄也若熱入於目牽其筋脉兩皆緊

不能轉視故目直視也若得心熱則搐其子母俱

有實熱風火相搏故也錢氏曰肝風心火二藏交爭而

動心神而生驚○錢氏曰肝風心火二藏交爭而

致搐也

也

驚有四證八候四證者驚風痰熱也小兒熱盛生痰

急而八候生焉○其肝主風其脾生痰其肺作

熱其心發驚四證相臨重者先發○八候者一

搐二擲三掣四顫五反六引七竄八視也搐者兩

手伸縮擲者十指開合掣者勢如相撲顫者頭偏

不正反者身仰向後引者臂若開弓竄者目直似

怒視者睛露不活○又云一搐者臂肘搐縮○

二擲者十指開合○不已即成握拳男子看之○大

拇指其指握在外為順在裏為逆女子反看之○

三掣者肩膊搐掣或連身跳起○四顫者或手或

脚或頭或身四體顫動○五反者身首反張○六

引者以手有如挽弓狀男子左手直右手曲為順右

直左曲為逆女子反看之○七竄者眼上竄觀高

男子斜目視左為順視右為逆視女子反看之○八視者

男子上竄為順下竄為逆女子反看之○八視者

驚風大抵熱論虛實證別逆順治有後先蓋實熱為急

驚慢驚本無熱所以熱者虛使然爾急驚屬陽用

藥以寒慢驚屬陰用藥以溫甚不可以陰陽無別



故曰熱論虛實者此也。男搖左視左女搖右視右。男眼上竄女眼下竄。男握拇指出外女握左曲凡此皆順反之則逆亦有先搖左而後雙搖者但搖順則無聲搖逆則有聲其指紋形勢彎弓入裏者順出外者逆出入相半者難痊故曰證別逆順者此也。○熱盛生痰痰盛生驚驚盛生風風盛發搖治搖先於截風治風先於利驚治驚先於豁痰治痰先於解熱其若四證俱有又當無施正理一或有遺必生他證故曰治有先後者此也。○凡搖痰因氣鬱氣順則痰化而搖自止先以蘇合香元氣以薄荷湯入薑汁化下或星香散助

門

驚搖之證有五驚搖一也而有晨夕之分表裏之異身

什地作聲醒時吐沫者為癇頭目仰視者為天吊角弓反張者為瘈瘲治各不同也。○因潮熱變為搖在早晨寅卯辰時者因潮熱發搖在巳午未時者黃元治肝瀉青丸。○因潮熱發搖在巳午未時者

心旺也當補肝治心補肝地黃元治心導赤散涼

驚丸防見○因潮熱發搖在申酉戌時者此肺用

事之時也是肝旺當補脾益黃散治肝瀉青丸治

心導赤散蓋脾病肝強法當補脾恐木賊害故先

搖搦瘈瘲輕重

百日內發搖真者不過兩三次必死假

傷風冷蓋氣血未實不能勝任乃發搖也欲知假

者口中氣出熱治之可發散大青膏主之○錢乙

○其有搖搦反張斜視而牙關不緊口無痰涎者

多是外感或內傷夾驚而成謂之假搖非內生驚

癇也宜參蘇飲麝香一縮即瘈瘲之甚者也○搖搦

者手足牽引一伸一縮即瘈瘲之甚者也○搖搦

孝忠曰似搖而不甚搖此名瘈瘲○凡搖男左女

右為順易治男右女左為逆難治○急驚初則搖

搦俱作久而搖住只搦有急有緩但只肩動瘈

瘈瘈瘈者候之輕也搖則盛也搦又重也慎

驚搐有聲無聲

驚癇發搐男發搐目右視無聲左視無聲右視有聲

故也更有發時證。又曰男反右視女反左視亦皆有聲。機。男為木故左視木位無聲右視金位

相擊則有聲女為金故右視金位無聲左視木位有聲相擊故也。錫。一童子三歲發搐自卯至巳

目右視大叫尖錢氏曰此逆也男為陽木發左視無聲則順右視有聲則逆所以然者左肝木也右

肺金也逆則二藏相戰金木相擊而有聲也治宜瀉強補弱假令女發搐目左視是肺來乘肝肝不

能任故叫尖也當瀉其肺後治其心續治其肝

驚風發搐不可把捉

小兒急驚方搐時不用驚擾此不足畏慢驚雖靜乃危病也急驚此不

搐時但扶持之不可擒捉蓋風氣方盛恐流入筋脉或至手足成拘攣也。小兒搐搦時切戒把

捉手足握持太急必半身不遂也當其搐時置一竹簾鋪之涼地使兒卧其上任其搐搦時行遍經

絡勢極自止不至傷人。紉。一。小兒病手足搐搦戴人曰心火勝也勿持人捉其手任其搐搦此由乳

母保護太過所致乃令爭掃地以水洒之令極濕
卧兒于地上良久渾身轉側泥漿皆滿仍以井水

洗之即
差舛

胎驚癇風

者乃孕婦嗜慾忿怒驚撲或傷風邪兒初生
下即嘔吐搐掣口眼喎斜聲啼聲短腮縮顙

開或頰赤或面青噤口咬牙眼合涎潮筋骨拘攣
身腰強直臍腹腫起與噤口撮口同證視其眉間

氣色紅赤者生青黑者死辰砂膏最妙
猪乳膏鎮驚散貯上太乙散亦佳

辰砂膏

治胎驚癇風及噤口風辰砂三錢玄明粉二
錢鵬砂馬牙硝各一錢半全蝎真珠末各一

錢麝香一字右為末油紙封裹自然成膏每取一
豆許薄荷湯調下或乳汁調塗乳頭上令兒吮之

太乙散

治胎驚天漿子天南星白附子天麻防風白
茯苓各二錢全蝎朱砂各一錢麝香一字右

為末每取五分
乳汁化下

急驚風

急驚者因聞大聲或大驚而發搐過則如故也
無陰也當下之宜利驚丸○急驚者內有熱即

生風或因驚而發涎潮搐搦身體與口中氣皆熱
及其發定或睡起即了如故用藥利下痰熱心
神安寧即愈。急驚乃卒然得之心受驚肝主
風致筋脉搐搦肝又主筋宜通心飲坊見瀉青丸
涼驚元大青膏。急驚者因聞不常之聲或遇
禽獸之吼以致牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐
搦顛動口中熟氣頰赤唇紅大小便黃赤其脉浮
數洪緊蓋由內有實熱外挾風邪心家受熱而積
驚肝家生風而發搐肝風心火二藏交爭血亂氣
併痰涎壅塞所以百脉凝滯關竅不通風氣蕃盛
而無所泄故暴烈也。治法通關截風定搐去
痰其熱尚作則當下之一泄已後急須和胃鎮心
○截風定搐先與開關散嚏驚散次與驅風膏鎮
心丸鎮肝丸錢氏安神丸鎮驚丸保幼化風丹靈
神膏痰盛宜抱龍丸截風丸鎮安丸神宜金箔鎮
心丸寧心膏。所謂溫驚丸利驚丸涼驚丸者蓋
虛則溫之實則利之熱則涼之是謂活法。○驚
風形證不明若言陰證則渾身又溫若作陽證則
又不大搐乃陰陽不和宜用防風溫膽湯下大驚
元小驚元。○急驚先當定搐由風也風由熱

也搐既已作方可下熱退驚熱若不退驚亦不散
○急驚截風定搐為要風搐既定次與下熱熱去
則無風風散
則不搐慎

利驚丸

治急驚身熱面赤口中氣熱大小便黃赤宜
下用此黑丑頭末五錢天竺黃青黛輕粉各

一錢右為末蜜丸豌豆大一
歲兒用一九薄荷湯化下

溫驚丸

治急驚虛證牛膽南星四兩天竺黃一兩朱
砂一錢半胭脂胚半錢龍腦五分右末牛膽

汁和丸
化下○一名粉紅丸

涼驚丸

治急驚風黃連一兩草龍膽防風青黛各三
錢龍腦五分牛黃麝香各一字右為末麪糊

和丸
十丸金銀泡湯下

瀉青丸

治肝熱急驚搐搦○一名涼肝
元緣肝主風宜先涼肝而風自退

大青膏

治急驚風宜用此發散白附子一錢半天竺
青黛各一錢烏蛇肉蝎梢各半錢朱砂天竺



黃麝香各一字右細末生蜜和成膏月內兒梗米大半歲兒半皂子大一歲兒一皂子大以薄荷竹

葉煎湯化下

開關散

治驚風口噤不開蜈蚣一條炙白僵蚕南星炮各一錢麝香一字猪牙皂角三錢略燒存

性右為末以手點薑汁蘸藥少許擦牙或用物引滴入藥三兩點於口中涎出自開

嚏驚散

治急驚慢驚昏迷不省半夏生一錢皂角半錢右為末取豆許吹入鼻中即醒

驅風膏

治肝風發驚搐及胎風辰砂蝎梢當歸草龍膽川芎梔子大黃羌活防風甘草各一錢右

為末入麝香少許砂糖和丸炙實大每入一丸薄荷竹葉蜜湯化下

鎮心丸

治急驚風安心止驚散涼膈山藥白茯苓各一兩寒水石甘草炙各七錢半甜硝白者

朱砂各五錢人參二錢半龍腦麝香各五分右為末蜜和每一兩作五十九金箔為衣薄荷湯下一丸

鎮肝丸

治急驚風熱天竺黃生乾地黃當歸竹葉草龍膽川芎大黃煨羌活防風各二錢半右為

末蜜九灸實大每二
丸砂糖水化下

錢氏安神丸

治急驚風及心熱驚啼麥門冬馬牙硝
白茯苓山藥寒水石甘草各五錢朱砂

三錢龍腦二字右為末蜜和兩作
三十九每服一九砂糖水化下

鎮驚丸

治急驚風鎮驚寧神退熱化痰牛膽南星五
錢朱砂三錢半琥珀天竺黃雄黃各三錢牛

黃二錢真珠一錢麝香半錢金箔十片右為末
糊和九梧子大金箔為衣薄荷薑蜜湯下五六

保幼化風丹

治驚風四證八候去風痰驚熱南星半
夏川烏白附子各一兩麝香五錢右為

末裝入臘月黃牛膽內陰乾百日取出研為末
一兩入雄黃朱砂鵬砂煇硝各一錢片腦麝香各

少許共為末蜜丸豌豆大燈
心薄荷湯研化下一二九

靈神膏

赤茯苓神朱砂各一兩麥門冬五錢麝香二錢
半右為末蜜和作小餅子每餅臨睡以薄

荷湯化下神效○一老醫乃三世小兒科家傳只
有四五藥愈病無數如小兒驚搐多是熱證不宜

便用驚風藥只以導赤散加防風竹葉同煎
用二三貼導去心經邪熱其搐便止次服靈神膏

抱龍丸

治驚風潮搐身熱昏睡能下痰熱乃心肝
藥也牛膽製南星一兩無膽星則只取生者

剉炒熟用之天竺黃五錢雄黃朱砂各二錢半麝
香一錢右為末煮甘草膏和丸皂莢子大實大

溫水化下百日內兒一丸作三次服五歲兒一二
丸服臘雪水煮甘草和藥尤佳磯○抱者保也龍

者肝也肝為母心為子母安則子安况
心藏神肝藏魂神魂既定驚從何生

截風丸

治驚風痰搐天麻白僵蚕南星炮各二錢蜈
蚣一條白附子防風朱砂全蝎各一錢麝香

一字右為末蜜丸梧子大
每丸薄荷湯化下

金箔鎮心丸

治驚風鎮安心神全蝎七箇以薄荷葉
包裹慢火炙乾天麻防風羌活牛黃赤

茯苓犀角朱砂麝香甘草各一錢右為末蜜丸
皂子大金箔為衣每取一二丸薄荷湯化下

寧心膏

治小兒不定恍惚不寧恐畏多尖睡中驚
朱砂二錢人參白朮白茯苓神山藥羌活

甘草各一錢龍腦麝香各一字右為末
蜜丸灸實大以薄荷湯化下一丸

防風溫膽湯

治驚風消痰疎風順氣半夏枳殼赤茯苓各五分陳皮防風各二分半人參二

分甘草一分半右剉作一貼入生薑一片紫蘇二葉煎水調下大驚元小驚元服之

大驚元

治驚風安神定驚又治心熱夜啼酸棗仁去

朱砂麥門冬木香代赭石醋煮各二錢半白殭蚕

桔梗尾各一錢二分半全蝎三箇金銀箔各三片
右為末蜜丸梧子大金銀箔為衣薄荷

小驚元

治驚風鬱金皂角水浸煮黃連馬牙硝木香

糊和丸梧子大以雄黃朱砂麝香金銀箔為衣薄荷湯化下一二丸

急驚風不治證

動眼睛翻轉口中出血兩足擺跳肚腹搐

不嚏心中熟痛忽
大叫者皆不治



慢驚風

慢驚者得於大病之餘吐瀉之後及過服寒涼藥其證眼慢騰騰或露睛手足瘈瘲面色青白

渾身四肢冷默默不聲其脉沉遲用白朮散益黃散加防風冬瓜仁煎服

中氣太虛而得其身冷口鼻中氣寒大小便青白昏睡露睛目上視手足瘈瘲蓋脾虛則生風風盛

則筋急宜用黃芪湯溫白丸

驚陽證傳來纔經吐瀉便是慢驚男子以瀉得之為重女子以吐得之為重

似睡不睡十指或開或合似搖不搖口眼半開半合時牽掣脉或浮或沉身或涼或熱或吐或瀉或不

吐瀉或食乳或不乳名半陰半陽合病因吐瀉得者宜加味木附湯醒脾散養乳方虛風痰多宜八

仙散

散○方傳慢候而尚有陽證

截風調胃用蟬蜋散醒脾散若手足冰冷方可回陽但與陽用硫黃附子如腦麝銀粉巴硝輩一切禁斷

○古云病家怕驚不怕瀉醫家怕瀉不怕驚如泄瀉不止且先治瀉若更治風則驚風愈甚

滑青者宜防慢驚蓋瀉青色者乃夾驚木剋土也

○凡兒瀉出青色者由脾土受肝木剋勝而見本質由其藏之虛寒黃芪益黃散主之。小兒慢驚或吐利不止變成虛風搖搦者非風也胃氣欲絕故也用來復丹。寒疝五粒研碎米飲送下即效。三。慢驚宜用溫驚丸神效散。觀音散全蝎觀音散。湯防風元銀白散。諸。誕盛宜。奪命散。防見雙金丸。南星飲。端。

白朮散 治吐瀉日久不止。津液枯竭。煩渴引飲。欲成。

香甘草各一錢。右麤末。每二錢水煎。任意服。○泄瀉加山藥白扁豆。肉豆蔻。已成慢驚。加天麻細辛。全蝎白附子。○驚風泄瀉。煩渴皆津液內耗也。不問陰陽多煎。滿意取足飲之。彌多彌好。○一名錢。

氏白朮散。錢。一名清寧散。端。

益黃散 治慢驚風。黃芪二錢。人參陳皮各一錢。白芍藥七分。生甘草炙。甘草各五分。白茯苓四分。

黃連二分。右麤末。水煎。時服。○一名黃芪益黃散。凡驚兒瀉。青色大禁。涼驚丸。蓋風木旺。必剋脾。

主當先實其土後瀉其木也當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中瀉火以甘寒補金以酸涼

使脾土中金旺火衰則風木自虛矣

黃芪湯 治慢驚風大便泄青色黃芪二錢人參一錢甘草炙五分右作一貼水煎服加白芍藥一錢

錢尤妙○此證風木旺必剋脾土宜先實其土後瀉其木是為神治之法○一名保元湯

溫白丸 治慢驚風白殭蚕炒白附子生南星炮各一兩天麻生五錢全蝎一錢右為末麩糊和丸

茶豆大生薑米飲下五七丸至二三十九錢

加味木附湯 治吐瀉後變成慢驚或因藏寒洞泄得者附子炮白朮各一兩肉豆蔻煨二箇

木香甘草炙各五錢右麕末每二錢薑三棗二水煎服

醒脾散 治脾困昏沉吐瀉不止漸成慢驚人參白朮茯苓白附子白殭蚕天麻木香甘草各五分

全蝎二分半右麕末每二錢薑二棗一水煎漸服不可頓服

釀乳方

治慢驚風人參木香藿香沉香陳皮神麴麥芽各一錢丁香五分右剉作一貼入薑五片

紫蘇五葉棗三枚同煎乳母食後須去乳汁盡方取服之即仰臥霎時次令兒吮數口不可過飽如

嘔定急宜截風服八仙散此良法也如此調理無不愈者

八仙散

治慢驚虛風天麻白附子白蛇肉防風南星半夏麴冬瓜仁全蝎各二分半加川烏一分

分右剉作一貼入薑二棗一薄荷二葉同煎服

烏蝎散

治慢驚純陰證吐瀉不止四君子湯飭睨加川烏全蝎南星各一錢右剉入薑三棗二水

煎服之

蟬蝎散

慢驚風陽證尚在宜用此藥全蝎七箇蟬退二十箇南星一箇甘草二分半右麤末每

一錢八薑三片棗二枚水煎服

神效散

治慢驚風歌曰一粒丁香一箇蝎一字辰砂一點血○右三味俱為末男用男左手

指血女用女右手中指血
蘸藥末擦兒唇上即愈

觀音散

治脾困多瀉不思乳食精神困四肢欲
成慢驚人參一錢蓮肉神麴各二分白茯苓

一分半白朮黃芪木香白扁豆甘草各一
分右剉入薑二棗一藿香三葉同煎服

全蝎觀音散

治吐瀉後成慢驚風亦治慢脾風即
前方加羌活防風天麻全蝎也

三味天漿子散

治慢驚風天漿子白殭蚕全蝎各三
枚右為末每一字薄荷湯調下

補脾湯

治慢驚風白朮一錢三分陳皮黃芪蜜水炒人參
白茯苓半夏各七分

當歸川芎肉豆蔻煨乾葛神麴炒各五分黃連
炒甘草炙各三分右剉作一貼水煎稍稍服

保生丹

治慢驚風朱砂天麻白附子炮白殭蚕炒全
蝎微炒各二錢乾薑炮牛黃麝香各一錢右

為末蜜丸麻子大
薄荷湯下三九

延生丹

治同上南星炮二錢半朱砂牛黃羌活各一
錢二分半麝香六分蝎梢七枚白殭蚕三枚

右為末棗肉和丸棗豆大薄荷湯化兩丸服之

參朮半夏湯

治慢驚風子母俱服人參白朮各二錢半夏夏天麻各七分白茯苓陳皮各五分

細辛薄荷甘草各二分全蝎炒一
枚右剉作一貼薑三水分煎服

防風元

治慢驚風天麻防風人參各五錢全蝎白僵蚕甘草各二錢半朱砂雄黃各一錢七分半

右為末蜜丸芡實大人參湯或冬瓜仁湯化下

銀白散

治慢驚風祛風助胃蓮肉白扁豆白茯苓甘草炒各一錢陳米炒三錢右麤末每二錢全薑二片冬瓜仁七粒同煎服

甘草炒各一錢陳米炒三錢右麤末每二錢全薑二片冬瓜仁七粒同煎服

南星飲

治慢驚脾困涎盛不思乳食大南星一箇炒赤冬瓜仁白扁豆薑汁炒各三錢右為末每

二錢以薑二片防風少許同煎服

雙金丸

治吐瀉日久脾胃虛損手足厥冷精神昏塞多睡露睛口鼻氣冷欲成慢驚風金液丹貼

之惟多服乃效雖至危者往往死中得生十救八
九沈存中云金液丹治吐利垂絕服之得活須多
服方驗綱○一云金液丹真小兒吐瀉之妙劑也

驚風治驗

驚一小兒吐瀉諸醫以藥下之至虛變成慢

與瓜蒌湯枋觀其兒即開目而身溫其兒不大小
便諸醫以藥利之錢曰不當利小使利之必身冷
一二日果身冷錢曰不能食而胃虛若利大小便
則脾胃俱虛當身冷而閉目即死今幸胎氣實而
難衰也用益黃散助觀使君子丸枋觀四服後果
能飲食後又不語諸醫作失音治之錢曰此因涼
藥利小便致脾腎俱虛今脾已實腎尚虛
用六味地黃元一月而痊聲音如故

慢驚風不治證

慢驚風四肢厥冷吐瀉咳嗽面黯神慘

搖頭眼睛不轉涎鳴喘噎頭軟大小便不禁手足
一搖頭牽引者皆不治醫○似頭軟而不甚搖似睡而
精神慢四肢與口中氣皆冷睡中露睛或胃痛而
帝失如鴉聲此證已危蓋脾胃虛損故也

驚欲絕之時虛痰上攻咽喉引氣呼吸麓大脉來
浮數是謂陰盛強陽錯認以為陽氣已復直與峻
藥下痰痰隨藥下氣隨痰絕人以醫殺外之此
不識覆燈將絕之候雖不下藥亦無生意矣慎

急慢驚風通治

宜備急丸牛黃抱龍丸保命丹至聖保命
丹千金散星香散朱粉散奪命散探生散

備急丸

治急慢驚風五月五日取白頸蚯蚓不拘多
少去泥焙乾為末加朱砂等分糊丸菜豆大

金箔為衣每丸白湯下○一法取蚯蚓以竹刀
中斷之看取急跳者治急驚慢跳者治慢驚各另
研爛和朱砂末作丸菜豆大分
二器貯之記而用之神妙也

牛黃抱龍丸

治急慢驚風痰嗽潮搐能鎮驚安神牛
膽南星一兩天竺黃五錢雄黃辰砂各

二錢半麝香真珠琥珀各一錢牛黃五分金箔十
片右細末水煮甘草膏和丸次實大金箔為衣每

三歲兒服一九五歲二九十歲服三五九薄荷
湯化下○此方與上鎮驚丸同而錢數異

保命丹

治急慢驚風尚有陽證者常服安神化痰全
蝎十四箇防風南星蟬退白僵蚕天麻琥珀

各二錢 白附子 辰砂 各一錢 麝香 五分 有熟加牛

黃片腦 各五分 右為末 粳米飯搗九 兒子大金箔

千金散

治急慢驚風 痰喘 雖至死 但灌藥下咽 即活

湯化為下 一丸 小 牛膽 南星 甘草 各二分 牛黃 龍腦 各六釐

星香散

治急慢驚風 搐搦 竄視 逆潮 南星 炮二錢 半

木香 橘紅 各一錢 全蝎 二箇 右剉作一貼 薑

朱粉散

治急慢驚風 ○歌曰 一箇朱砂一片雪 輝粉

七箇 蠶三箇 蠟不問 驚風與慢風 服時須

用主 人血 蠟汁 ○右先將 蠶蠟 微炒 燥取 出待 冷

奪命散

如大能 控風痰 不問急慢驚風 痰塞咽喉 其響

同砂粉 研為細末 却以母乳汁調抹 於兒口內 立

用此藥入喉痰即墜下功有萬全奪天地之造化也青礞石一兩同焰硝一兩入鍋內火煨待硝盡候礞石如金色取用右細末急驚風身熱用薄荷汁入蜜調微溫服其藥自裹痰墜下從大便出如稠涕膠粘乃藥之功也次服去風退熱截驚等藥慢驚極危者用此藥以青州白元子再研為末薑汁調煎如糊熟蜜調下其涎即墜入腹次服蛇蝎蜈蚣川烏等藥○此藥治急慢驚利痰之聖藥以器盛水吐痰水上以礞石雖利痰之痰隨藥而下須用木香湯調下○以礞石雖利痰之痰隨藥而下須以木香佐之能裹痰從大便出而無糞來不動藏府始知藥妙

探生散

治急慢驚風諸藥不效用此吹鼻定其死生雄黃沒藥各一錢乳香五分麝香一字右為

末吹少許入鼻如眼淚鼻涕俱出者可治

至聖保命丹

治急慢驚風及胎驚天吊南星炮三錢

各二錢麝香半錢全蝎十四箇右為末飯丸梧子大朱砂為衣每一丸薄荷湯化下

慢脾風

慢脾風由慢驚後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所受故曰脾風若逐風則無風可逐若

療驚則無驚可療但脾間痰涎凝滯虛熱往來其
眼合者乃脾困氣乏神迷也世所謂慢風難療者
是也慎○若見眼合即是脾風○慢驚察視為要
眼睛昏定為重竄視為重四肢厥冷為重睛定不
取為重雖眊眊色至重眼在右顧亦重汗出如流亦重口面
忽作黧黯色至重眼在右顧亦重汗出如流亦重口面
所盛傳入藏間陽氣已虧脾經屬陰次第入脾故
言慢脾風候○慢驚其眼半開半合則當預作慢
脾風調理之○慢脾風之候面青額汗舌短頭低
眼合不開睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭噤口咬牙手
足微搐而不收或身冷或身溫而四肢冷其脉沉
微陰氣極盛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚風而
傳變宜用果附湯救之又生附四君子湯蠲附散
皆可慎○慢脾風用藥乃不得已也其危如燈無
油漸見昏滅錢氏用金液丹與青州白元子各半
研勻飯飲薄荷湯下一錢半此截風回陽也慎○
小兒頭雖熱眼珠青白而足冷○頭雖熱或腹脹
而足冷○頭雖熱雖熱或泄瀉而足冷○頭雖熱

吐而足冷○頭雖熱或渴而足冷已上五證作搖者名曰慢脾風速與補脾益真湯加全蝎一枝或

全蝎觀音散
方觀壯

黑附湯

治慢脾風危急者附子炮三錢木香一錢半白附子一錢甘草灸半錢右剉分二貼入薑

五水煎以匙灌下若手足煖而甦省即止

生附四君子湯

治慢脾助胃回陽四君子湯料加生

煎以是灌口中手足煖即止
方錢氣門

蝎附散

治慢脾風回陽豁痰附子炮二錢南星炮白附子炮木香各一錢全蝎七箇右剉取一錢

薑五煎服
效得

補脾益真湯

治慢脾風丁香木香訶子皮陳皮厚朴草果肉豆蔻白茯苓人參白朮桂枝半

夏附子炮甘草灸各二分全蝎炒一放右剉入薑二棗一水煎灌服服訖令揉心下以助藥力

慢脾風不治證

身冷粘汗直卧如尸喘嗽頭軟背直口噤頭搖大小便不禁唇縮氣竄痰

如牽鋸之聲者不治慎○慢脾風若也一藏絕即不可用藥如眼無光指甲黑四肢垂蹶五體俱冷並不須下藥慎

天吊驚風

孫真人曰乘馬遠行當沐浴更衣然後方可近於嬰兒否則多為天吊急驚之疾錢仲陽

曰步履糞穢之氣無使近於嬰兒令兒急驚風也○天吊亦驚風之證但天吊發時頭目驚風搖

驚風則無也○小兒瘈瘲不定翻眼戴睛狀若神祟頭目仰視手足抽掣如魚之上釣故曰天釣

甚者爪甲亦青宜服蘇合香元氣風邪所致宜用乳母過食熱毒心肺生熱加以外感風邪所致宜用九

龍控涎散○又有驚風內釣之證腹痛多啼面青唇

黑偃倮反張外腎腫尿如米泔眼有紅筋血點乃寒氣壅結宜釣藤膏

九龍控涎散

治天吊蜈蚣一條酒塗灸臘茶雄黃甘草各二錢乳香天竺黃白礬枯荊芥穗

各一錢 萊豆半生半炒一百粒 右為末 每半錢人參薄荷湯調下 瘳

釣藤散

治同上人參犀角各五分全蝎一名 釣藤飲有甘草一分 右剉水煎服 門○

釣藤一味 氏湯一

釣藤膏

治驚風內釣木香薑黃各二錢乳香沒藥各一錢半木鱉子肉五箇 右為末 蜜調成膏 收

罐內以釣藤煎湯或薄荷湯化下 少許 門

痊瘕

瘕與瘕亦驚風之類 ○瘕者手足冰冷瘕者舉身強直瘕瘕本一病當以陽剛陰柔別之 剛者有汗

柔者無汗其證肢體強直腰身反張甚於風瘕大抵不治 慎○身軟時醒者為瘕身反張強直如弓

小兒時醒者為瘕十無一生 楊○證候治法詳具風門

癰癩

驚風三發則為癰癩者小兒惡病也大人曰癰癩

為癰癩曰癰其實一也又曰十歲以上為癰癩十歲以下聲醒時吐涎沫急慢驚則不作聲不吐沫也 門○



癇者卒然暈倒目眩流涎神氣鬱勃四肢搖擗沉
默昏憤似死似生其聲惡呌過後惺惺。錢氏
方有五癇病關五藏用五色丸。驚風者恐怖
驚風食三種陰陽二證別而治之。驚癇者
積驚而發啼呌恍惚宜定魄丸。沉香天麻湯。風
癇者風邪外襲先屈手指如數物乃發宜追風祛
痰丸。癇者乳食時遇驚停積或成癖或
大便酸臭宜紫霜丸。始也身熱抽掣啼呌是為
陽癇。易治宜龍腦安神丸。清心滾痰丸。是為
始也。身無熱手足清冷不抽掣不啼呌是為陰癇。
難治。宜五生丸。引神歸舍丹。是為癇。因急驚為
癇。宜三癇丹。因慢驚成癇。取來復丹。麝香薄荷
泡湯化下一二丸。得利即愈。又有胎中受驚
成癇。宜燒丹丸。癇病方萌耳後高骨間必
有青紋紛紛如線見之急用爪破須
令血出啼呌尤得氣通易效也。

定魄丸

治因驚發癇人參琥珀茯神遠志朱砂天麻
石菖蒲天門冬酸棗仁甘草各等分。右為末。

蜜丸。皂子大。朱砂為衣。每
丸燈心薄荷煎湯化下。

沉香天麻湯

治小兒因驚成癇發搐痰涎壅塞目多

活五分獨活四分防風天麻半夏附子炮各三分

沉香益智川烏炮各二分薑屑當歸甘草各一分

紫霜丸

治食癇及腹中食積痰癖吐乳嘔

十粒去皮油杏仁五十箇去皮尖右先將杏仁泥

巴豆霜八二石末相和搗千杵若硬入少蜜野密

器中月內兒服麻子大一粒乳汁化下百日內服

小豆大○食癇用此取積並不虛人兒有熱不

三癇丹

治急驚為癇蜈蚣一條牛膽南星二錢全蠍

麝香一字金銀箔各三片右為末糊丸梧子

疳病

疳者乾也瘦瘁少血也兒童二十歲以下曰疳五

藏疳外有蛔疳脊疳腦疳乾疳疳渴疳瀉疳痢腫

脹疳無辜疳疳丁奚疳露疳治之各有方其病多因乳

哺失常肥甘不節腸胃積滯而得之故其為證頭

皮光急毛髮焦稀腮縮鼻乾口淡唇白兩眼昏爛

揉鼻擗目脊聳體重闔甲咬牙焦渴自汗漩白瀉

酸肚脹腸鳴結癖潮熱或身多瘡疥酷嗜瓜果酸

鹹炭米泥土多飲水者是也惟腎疳害人最速蓋

腎虛受邪疳奔土焦故以走馬為喻初作口臭次

傳齒黑齲爛熱血迸出甚則齒脫宜急治之縱得

全活齒不復生矣○疳乾疳渴疳勞疳瀉疳痢

疳腫皆五疳之危證曰蛔疳腦疳脊疳無辜疳疳

奚疳疳疳疳疳疳疳疳疳疳疳疳疳疳疳疳疳

也○大抵疳病當辨冷熱肥瘦其初病者為肥

熱疳久病者為瘦冷疳冷熱交作者為冷熱疳當

分治之○疳病因多食肥甘所致故名曰疳

疳○凡兒大便色白小便便濁如米泔此疳病也

○諸疳皆依本藏補其母假令日中發潮熱是心

虛熱也肝為心母法當先補肝母肝實而後瀉

心得勢氣則內平而潮熱自愈矣

五臟疳

一曰肝疳其證搖頭揉目白膜遮睛合面而卧

羸瘦又曰心疳其證渾身壯熱吐利無常頰赤面黃

口舌生瘡痢久不痊多下膿血有時虛驚又曰心

疳一名驚疳苦要驚啼常契水

腹多青筋乳食不多心腹脹滿面色萎黃骨立毛

焦乳食不消好契泥土痢多酸臭又曰脾疳亦曰

食疳面黃腹大好食泥土身有瘡疥

其證咳嗽氣逆皮毛乾焦揉鼻咬甲壯熱憎寒口

鼻生瘡頻頻泄利糞中米出皮上粟生又曰肺疳

亦曰氣疳咳嗽氣急口鼻生瘡

肌肉消瘦齒齲生瘡寒熱時作腦熱如火脚冷如

冰乳食減少瀉痢頻作又曰腎疳又名急疳言五

疳中惟腎疳為最急即走馬牙疳也

卧冷地

○五疳通用五疳保童元疳積餅消疳九

○心疳舌乾肝疳啼乾脾疳口乾肺

疳聲乾腎疳尿乾通用連膽九

五疳保童元

治五藏疳黃連白鱧頭煎蘼煎草龍膽

香青黛天漿子熊膽蘆薈胡黃連各二錢半蟾頭
一枚灸黃色右為末飯丸麻子大一歲兒米飲下

一二九

疳積餅

治五疳諸積使君子肉一兩白朮黃連各三錢青皮陳皮山楂肉神麴炒麥芽炒三稜煨

蓬朮煨木香各二錢半縮砂瀝榔肉豆蔻訶子肉
甘草灸各二錢茴香炒川練肉夜明砂炒各一錢
半乾蟾一箇右為末白麴三斤炒黃以砂糖五兩
水煮熟和勻得所印作餅子每重一錢每服二三

餅任意嚼吃
米飲送下

連膽丸

治五乾疳黃連五錢猪膽汁浸瓜蒌根烏梅
肉蓮肉杏仁各二錢右為末牛膽汁浸糕和

丸麻子大每十五丸
烏梅薑蜜煎湯下

消疳丸

治五疳蒼朮陳皮厚朴枳殼檳榔神麴炒山
楂肉麥芽炒三稜煨蓬朮煨縮砂茯苓黃連

炒胡黃連蕪荑使君子蘆薈各等分右為末蒸餅和丸彈子大米飲化下一丸

諸疳

疳有熱疳冷疳冷熱疳蛇疳腦疳脊疳走馬疳無辜疳疳丁奚疳疳哺露疳又有疳渴疳勞疳渴疳痢疳

腫疳瘡洗藥方

熱疳

熱疳病初起臉赤唇焦潮熱如火大便秘澀者為熱疳宜胡黃連赤唇焦潮熱如火大便秘澀者為

毒物或生瘡宜五福化毒丹局方龍膽元

冷疳

疳病久則目重面鰲腹脹滑泄或青或白或如疳疳者為冷疳宜至聖丸

冷地煩躁啼叫大便滑泄漸成羸瘦宜木香丸使君子丸疳在內目腫腹脹痢色青白無常漸瘦弱

此冷證也

冷熱疳

冷熱交互非新非久宜消積和胃滋血調氣用如聖丸

蛔疳

因缺乳契粥飯肉食太早或甘肥過多化為蛔虫多啼嘔沫腹痛唇紫蛔雖食虫却不可動

從口鼻出者難治凡疳積久莫不有虫宜服下虫丸

腦疳

腦疳者鼻痒毛髮作穗面黃羸瘦。頭皮光急頭髮作穗或有頭瘡腫至顛顛腫則多損眼

項軟倒肥而不瘦附子生天南星右為末薑汁調攤貼患處又鯽魚膽滴於鼻中三五日效。○腦

疳滿頭餅瘡腦熱如火顛腫顛高遍身多汗宜龍膽丸

脊疳

小兒疳積漸黃瘦拍背如鼓鳴脊骨如鋸宜服蘆薈丸露星膏。○脊疳者虫蝕脊脊骨如鋸

齒拍背如鼓鳴十指背生瘡頻咬爪甲煩熱黃瘦下利宜蘆薈丸

走馬疳

腎疳又名急疳多因痘後餘毒更加乳食不調甘味入脾而生虫上蝕齒齕則口瘡出血

臭氣甚則齒根潰爛齒黑脫落頤有穴者名曰走馬疳言陽明熱氣上奔如馬然下蝕腸胃則下痢

肛爛其證腦熱肌削手足如冰爪黑面鰲甚者天柱骨倒宜腎氣丸。○

馬牙疳宜用乳香丸。○效散銅青散尿白散。○

無辜疳

無辜疳者其候面黃痿直時時壯熱飲食不

無辜晝伏夜遊兒家洗浣衣褥露天經宿或遇此

鳥飛過落羽所汚而與兒穿卧便令有此疾也又

腦後有核初生軟而不覺痛其中有虫如米粉不

手足細弱或大便泄膿血十全丹連丸

手足細弱或大便泄膿血十全丹連丸

突胃滿或生癰瘻愛喫生米土

哺露疳

虛熱往來頭骨分解反食吐虫煩渴嘔噦骨

體瘦削亦由胎稟所成盡皆無辜種類並

疳渴

疳病日則煩渴引飲乳食不

疳勞

骨蒸潮熱盜汗咳嗽泄瀉肚硬如石面色如



疳瀉

身瘦面黃有瘡疥或食泥土瀉青白黃末

疳痢

疳在內則目胞腫腹脹痢色無常錢。疳痢黃

元九水香

疳腫

小兒疳病虛中有積身面浮腫肚腹

疳瘡

脾疳腎疳皆身有瘡疥無辜疳虫氣流散肌肉

皮膚宜服蘆薈九月蟾九化蜜九

胡黃連九

治熱疳胡黃連黃連各五錢朱砂二錢半

懸胎煮一飯時許取出入蘆薈青黛蝦蟇灰各二

至一十

五福化毒丹

治熱疳多生瘡癰及痘瘡餘毒口齒出

桔梗八錢人參赤茯苓馬牙硝各五錢青黛二錢
半甘草一錢麝香五分金箔銀箔各八片右為末

蜜和每兩作十二丸金銀箔為衣一歲兒一丸
分四服薄荷水化下雀目陳粟米泔水化下

龍膽元

治熱疳龍膽草黃連青皮使君子各等分右為
末猪膽汁和丸羅薑子大熟水下二十丸

至聖丸

治冷疳木香厚朴使君子陳皮肉豆蔻各二
錢丁香木香皮各一錢右為末神麴糊和丸

麻子大來飲下七丸
至十九十五丸

木香丸

治冷疳木香青黛檳榔肉豆蔻各二錢半麝
香一錢半千金子去皮炒一兩蝦蟆曬乾燒

存性右為末蜜丸棗豆大每三五丸至一二丸
薄荷湯下○一女子得疳疾百藥無效與此藥不

數服而愈後用
無不獲效

使君子丸

治冷疳使君子麴蘖煨去殼一兩厚朴訶
子皮半生半煨甘草炙各五錢陳皮去白

二錢半右為末蜜丸芡實大每一丸米
飲化下三歲以下服半丸乳汁化下



如聖丸

治冷熱疳黃連胡黃連蕪荑使君子肉各一兩麝香五分乾蝦蟆五箇酒浸煮成膏右五

味為末和膏丸如麻子大人參湯下二三歲兒五七丸

下蟲丸

治蛔疳乾蝦蟆灰三錢苦練根皮貫衆木香桃仁蕪荑檳榔各二錢鶴虱一錢輕粉半錢

使君子肉五十箇右為末糊丸使子大每一二十丸肉汁下

龍膽丸

治腦疳龍膽草升麻苦練根防風赤茯苓蘆薈油煖灰青黛黃連各等分右為末猪膽汁

浸糕和丸麻子大薄荷紫蘇湯下一二十九丸

蘆薈丸

治脊疳龍膽草黃連蕪荑各一兩先炒蕪荑黃色次入二味同炒赤色右為末另入蘆薈

二錢半和勻爛飯和丸黍米大一歲兒十丸二歲兒二十丸米飲下

露星膏

治同上黃芪蜜水炒胡黃連地骨皮柴胡各等分右為末蜜丸炙實大隔宿酒浸露一宿

次日澄去瀝薄荷湯浸服之

乳香丸

治走馬牙疳如神乳香輕粉砒礪各五分麝香少許右研細以薄紙一韭葉許按過揉紙

患少許和丸如黃米大臨卧將藥填

立效散

治走馬牙疳青黛黃柏白礬枯五倍子各一錢右為末先以米泔漱口糝之

銅青散

治同上白芷五錢銅綠二錢半馬牙硝一錢麝香一字右為末乾糝之

尿白散

治走馬牙疳雖遍口齒落唇穿者亦效人中白火煨白礬枯白梅肉燒存性各二錢右為

末先用韭菜根陳艾煎濃汁以雞翎蘸汁刷去腐肉洗去鮮血然後付藥日二三次

月蟾丸

治無辜疳蝨一杓入內任蛆食一日夜取出以却取糞蛆一杓入內任蛆食一日夜取出以

布袋繫之於急流水中浸一宿毛上焙乾入麝香一字為末飯丸麻子大每三十丸米飲下一服虛

煩退再服渴止三服瀉住

十全丹

治丁奚疳露無辜壞證陳皮青皮蓬朮川芎五靈脂白豆蔻檳榔蘆薈各五錢木香使君



子蝦蟆灰各三錢右為末以猪膽汁浸
糕和丸麻子大米飲下二三十九丸

二連丸

治無辜疳黃連胡黃連燕莢青黛各五錢乾
蝦蟆一箇酒浸去骨焙右為末糊丸粟米大
米飲下二三十九丸
日三次服之

布袋丸

治丁奚疳露無辜疳夜明砂燕莢使君子各
二兩蘆薈人參白朮白茯苓甘草各五錢右
為末湯浸蒸餅和丸彈子大每一丸用絹袋盛之
次用精猪肉二兩同煮候肉爛熟提起藥掛風前
陰乾只用肉和汁與兒食之
次日依前煮服藥盡為度

褐丸子

治疳腫腹脹羅菖子一兩黑丑頭末半生半
炒七錢半青皮陳皮三錢蓬朮五錢靈脂赤茯苓
各五錢胡椒二錢半木香一錢半右為末
麩糊和丸菜豆大每取十五丸羅菖煎湯下治五

疳八疳肌瘦腹
大者如神

化蠶丸

治肺疳鼻流臭汁流處隨即成瘡名曰疳
蠶宜用此燕莢蘆薈青黛川芎白芷胡黃連

黃連蝦蟆灰各等分右為末猪膽汁浸
糕和丸麻子大杏仁湯下一二十丸

玉蟾散

治諸般疔瘡乾蟾煖灰三錢黃連二錢青黛
一錢麝香一字右為末先以甘草湯洗後塗

之妙

猪肚黃連丸

治疔瘡自孩提至弱冠潮熱發瘡乃疔
氣使然疔虫食其肌膚肌潮熱發瘡乃疔

流注遍身熱瘡發歇無已雄猪肚一具洗淨黃連
七兩剉右黃連入猪肚中線縫密頓在五升米上

蒸十分爛取入白中入些飯擣千杵眾手丸
如菜豆大米飲下二三十九冠者倍之

木香元

治疔瘡黃連三錢木香厚朴縮砂夜明砂炒
各二錢訶子肉一錢右末飯丸麻子大薑湯

下十五
丸

洗疔瘡藥

甘草黃柏馬鞭草連根葱荊芥穗煎湯溫
洗後訶子燒灰入麝香輕粉各少許

諸疔通治藥

通治宜用肥兒丸疔積餅坊見五疔消食
元消疔丸坊見十味蘆薈丸五疔保童元



坊見

肥兒丸 凡疳病以肥兒丸疳積餅為主此藥消疳化積磨癖清熱伐肝補脾進食殺虫胡黃連五

錢使君子肉四錢半人參黃連薑汁炒神麴炒麥芽炒山楂肉各三錢半白朮白茯苓甘草灸各三

錢蘆薈碗盛泥裹糠灰火煨透二錢半右為末黃米糊和丸漿豆大米飲下二三十九

五疳消食元 通治諸疳殺虫退熱磨積進食使君子草龍膽麥芽陳皮蕪荑神麴黃連山楂

肉各等分右為末陳米飯和丸黍米大米飲下二三十九

十味蘆薈丸 治諸疳殺虫和胃止瀉退熱胡黃連雷丸蘆薈蕪荑木香青黛鶴虱黃連各五

錢蟬退十箇麝香五分右為末猪膽汁浸糕和丸疳子大米飲下三十九

疳眼 小兒疳眼雀目或盲膜不見物或流膿宜煮肝丸龍膽飲子

煮肝丸 治疳眼盲膜不見物夜明砂青蛤粉殺精草各等分右細末小兒一錢七歲以一二錢

肝一大片批開糝藥麻線縛定米泔半碗煮肝熟取出肝湯則傾碗內熏眼取肝分三次嚼訖却以

肝湯下一日三服十日必退如大

龍膽飲子

治疳眼流膿神效青蛤粉蛇脫皮穀精草各五錢羌活草龍膽各三錢麻黃二錢半

黃芩炒升麻各二錢茶清調下

諸疳不治證

肝疳目帶青左脇下硬多吐沫眼頭黑者

不治者○脾疳肚大青筋唇口無血色人中平下痢

者不治○腎疳要契賊醋契水不住小便如粉汁

齒黑有瘡骨出耳乾腦焦不治○如五乾俱見

身上栗生色斑黑者必死○如疳勞疳瀉面槁

色夭骨露齒張腹硬不食皆危篤證也○疳渴

諸熱

有肝熱心熱脾熱肺熱腎虛熱潮熱驚熱痘熱癰



熱風寒熱壯熱實熱虛熱。面上左腮為肝右腮

為肺額上為心鼻為脾額為腎赤色者熱也隨證

治之。○身熱不飲水者熱在外身熱飲水者熱在

內也。○小兒熱病六一散散於外身熱妙藥也寒水石散

亦佳。○凡熱證疎利後或和解後無虛證勿溫補

熱必隨生。○諸熱通用小兒清心丸。○天乙丸。

肝熱 肝熱者手尋衣煩亂捻物左

心熱 心熱者口舌中氣溫或合面卧及眼上竄

脾熱 脾熱者面黃肚大怠惰嗜卧身熱

肺熱 肺熱者咳嗽寒熱壯熱飲水喘悶

腎熱 腎虛熱者下竄畏明額赤

潮熱 潮熱者似潮有信每日應時而發過時即

胎熱 胎熱者胎中受熱生下而面赤眼閉大便秘小便

赤黃不飲乳宜用生地黃湯及釀乳方以喂之

骨蒸熱心煩躁宜用地仙散炒乾潮熱盜汗五

痰熱咽痰熱者面赤身熱喘咳胃膈不利

瘧熱一瘧發熱者一日一發或二三日

風寒熱風寒熱可欠鼻塞發熱宜人不歇身熱口中氣

壯熱壯熱者遍身發熱一見向熱而不已甚則

實熱實熱者身熱飲水大渴小便秘

虛熱虛熱者身熱不飲水大小

寒水石散治小兒諸熱利小腸去心熱下驚涎寒水

錢暑月冷水調下
寒月溫湯調下

甘露飲治潮熱寒水石石膏欝金薄荷甘草各

梨漿飲治同上青蒿童便浸一宿晒乾柴胡人參茜芩前胡秦芫甘草各二分生梨一片薄荷二

葉生地黃一寸右剉作一貼水煎服

生地黃湯治胎熱生地黃赤芍藥川芎當歸瓜蒌根各一錢半右剉作一貼水煎乳母食後服

以飼乳并畧與小兒服之

釀乳方治同上澤瀉二錢生地黃一錢半猪苓赤茯苓茵陳天花粉甘草各一錢右剉作一貼乳

母食後煎服

生犀散治骨蒸熱犀角地骨皮赤芍藥柴胡乾葛甘草各三分右龕末入薄荷五葉水煎服之

人參羌活散治傷風寒發熱羌活獨活柴胡前胡枳殼桔梗人參赤茯苓川芎甘草各二分

天麻地骨皮各一分右剉作一貼入薄荷三葉水煎服

地骨皮散治虛熱知母半夏柴胡人參地骨皮赤茯苓甘草各三分右為龕末入薑三片水煎服

小兒清心丸

治諸熱及驚熱煩躁人參茯苓神防風朱砂柴胡各二錢金箔三十片右為末蜜

丸梧子大每一丸竹瀝調下

天乙丸

凡小兒生理本天一生水之妙凡治病以

也凡小兒蘊熱丹毒驚風痰熱變蒸發熱之病用

之景當而嘔吐瀉利無不治也燈心一兩六錢以

二錢半入赤茯苓乾為末入水澄之浮者為燈心取

膏和丸如櫻桃大朱砂為衣金箔裹之每一丸以

積癖

化食積者凡小兒失乳以食飼之未有食腸不能剋

傷乳傷食而身體熱者惟肚熱為甚耳夜間有熱者

多嘔○小便如油○眼○有積滯須辨虛實實者多睡

赤白痢下○多瀉凡有積滯須辨虛實實者多睡

服進食丸消食丸虛而有疳瘦者宜服肥兒丸助
上○小兒病癖由乳食不消伏在腹中乍涼乍熱
飲水不止或喘而嗽與潮熱相類若不早治必成
勞瘵寒熱飲水膈下有形硬痛法當用藥漸消磨
之以其有癥癖故令兒不食脾胃虛而發熱故
飲也○癖塊者僻於兩脇痞結者否於中脘
因乳哺失節飲食停滯邪氣相搏而成也○
食積宜用七聖丸厚腸丸白餅子○癖塊宜用紫
霜丸如神散○愛契泥土宜清胃養脾湯治喫泥
化癖

方綱

進食丸 消癖積不香枳殼當歸代赭石朱砂各三錢
巴豆霜一錢麝香五分右為末麪糊和丸黍

米大一歲兒取二
三丸米飲吞下

消食丸 治宿食不消消乳積食積香附子炒五錢縮
砂陳皮三稜蓬朮神麪麥芽各二錢半右為

末神麪糊和丸
法服之○一名消乳丸

七聖丸

治乳食積三稜蓬朮川練子青皮陳皮羌活杏仁泥各等分右先用醋浸羌花一宿炒漸

乾次入蓬稜同炒赤色又入陳練再炒令微焦取出為末入杏仁泥和勻醋糊和丸黍米大一歲兒

常服二丸臨卧溫湯送下使日間所食之物一夜而化永無疳疾能使黃瘦子頓作化生兒腸

厚腸丸

治乳食積腹脹瘦弱枳實麥芽神麴末各五分橘紅半夏蒼朮人參各三分厚朴青皮各

二分右為末麴和丸麻子大溫水下二三丸

白餅子

腹中有癖則不食但飲乳此主之滑石輕粉白附子南星炮各一錢為末巴豆二十四粒

去皮膜水一升煮水盡為度右研勻糯米飯和丸如棗豆大捏作餅子三歲以下一二餅三歲以上

三五餅葱白湯下磯○一名玉餅子一名白玉餅

此此方南星以豁痰輕粉滑石以

六味三稜丸

治未喫食小兒有癖積者蓬朮三稜並煨神麴麥芽並炒青皮陳皮各等分右



為末麪糊和九葉豆大
白湯下一二寸丸

廣木化癖丸

治乳癖食廢木香五錢代諸石稜醋淬
當歸炒朱砂研枳殼炒蓬術三稜並炮

各二錢半麝香大巴豆霜各一錢二分半右為末
麪糊和丸麻子大一歲兒米飲下二三丸

千金消癖丸

治小兒癖塊水紅花子微炒神麴炒麥
芽炒各四錢人參白朮白茯苓各三錢

使君子胡黃連山楂肉香附子三稜蓬朮並醋炒
各二錢蘆薈阿魏青黛木香檳榔厚朴陳皮甘草

各一錢右將阿魏研水和麪打糊
和丸葉豆大白湯下三四十九丸

化癖如神散

治痞塊積聚蟾酥黃蠟各二錢巴豆肉
一錢羚羊角末牛黃各五分麝香三分

硃砂龍腦各一分右為末九如菜子大每用一丸
以鍼刺破患處用藥貼上一伏時揭起其痞化膿

血出盡
而愈

清胃養脾湯

治小兒愛喫泥土乃脾虛胃熱所致石
膏一錢陳皮白朮赤茯苓甘草黃芩各

二分右剉作一貼
水煎時服之

治喫泥方

治小兒喫泥土及腹肚膨脹
砂糖搜和丸麻子大空心米飲下一丸
瀉

出土即差稠。小兒食土取好土濃煎黃連
取清汁搜和日乾與服即止名曰黃金餅

吐瀉

小兒吐瀉泄黃傷熱乳也吐瀉泄青傷冷乳也皆
當下白餅子主之坊見下後傷熱乳者王露散傷

冷乳者益黃散坊觀服之。初生吐瀉大便色白
朱砂丸後以朱沉煎調之。初生吐瀉昏睡露睛

停乳也紫霜丸下後用香橘餅。吐瀉昏睡露睛
者胃虛熱也宜白朮散坊見和中散吐瀉昏睡不

露睛者胃實熱也宜益元散散。暑月
吐瀉身熱宜玉露散或五苓散散。玉露散。暑月

調服。寒月吐瀉身冷宜益黃散散。坊觀理中湯
。吐瀉有寒痰半栗散主之。小兒初生拭口

中穢惡不盡燕入喉中故吐不止宜用木瓜丸
如吐驟或瀉完穀者傷風甚也凡傷風多作吐瀉

者風木好侵脾土故也宜大青膏坊見。吐瀉不
止危甚者用燒鍼九。經年吐乳眼慢糞穢有筋

膜者乃父母交感時契乳所致名曰交精吐姦宜用益黃散五疳保童元坊見○吐瀉久將成慢驚

風宜用和胃丸雙金元坊見○小兒吐瀉通用助胃膏最妙○

玉露散

治暑月吐瀉身熱或煩渴石膏寒水石各五錢生甘草一錢右細末或半錢或一錢溫水

涼水任下

朱砂丸

治初生兒吐瀉此因穢惡入胃中所致朱砂南星巴豆霜各等分右為末糊丸黍米大以

薄荷湯化下二三丸後以朱沉煎調之

朱沉煎

朱砂二錢藿香三錢滑石五錢丁香十四粒右為末以新汲水一盞入麻油滴成花抄藥

五分在上須臾墜下澄去水別用溫水下○月內生嘔先用朱砂九下之次用朱沉煎墜其邪氣使

穢物自下而不為嘔也

香橘餅

治初生停乳吐瀉木香橘皮青皮各二錢半厚朴神麴麥芽縮砂各五錢右為末蜜丸

寶大每丸以紫蘇煎湯或米飲任下

和中散

和胃止吐瀉定煩渴人參白朮白茯苓甘草炙乾葛黃芪白扁豆炒藿香各二分半右麤末作一貼入薑五片棗二枚水煎服

腹痛泄瀉厚朴一錢白朮五分乾薑甘草各三分

水煎服亦名和中散

半粟散

治吐涎沫或白綠水者胃冷宜用此半夏薑製二錢陳粟米一錢右作一貼入薑十片水

煎服

木介丸

治初生吐不止本瓜麝香木香檳榔膩粉各一字右為末麪糊和丸如黍米大甘草湯下

一二丸

燒鍼丸

治內傷乳食吐瀉不止危甚者黃丹朱砂白礬枯各等分右為末棗肉和丸炙實大每一

丸用鍼挑於燈焰上燒存性乳汁或米飲化下此藥清鎮專主吐瀉



和胃丸

治吐瀉不止欲生慢驚丁香白朮各一兩半夏五錢藿香蝎尾各一錢右為末薑汁糊和

九小豆大一歲兒十九薑湯化下

助胃膏

治小兒吐瀉和脾胃進乳食最妙山藥五錢人參白朮白茯苓陳皮甘草各二錢半木香

一錢縮砂二十箇白豆蔻七箇肉豆蔻二箇右為末蜜丸皂子大每服一九米飲化下或為末木瓜湯

調下一錢

吐瀉論證

此一玉歲兒吐瀉壯熱不思食飲錢氏見曰

多病夫面色晄白者神怯也黑睛小者腎虛也黑睛屬水本性而虛故多病也縱長成必肌膚不壯不耐寒暑易虛易實脾胃亦怯更不可縱恣酒色若不保養不過壯年也面上常無精神光澤者如婦人之失血也今吐利不食壯熱者傷食也又虛怯不可下下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛但消積也錢

磨化之為微有食積也錢

感冒風寒

貪睡口中氣熱呵欠煩悶者傷風證也頭目疼痛而畏人畏寒者傷寒證也

體痛○鼻塞流涕○咳嗽噴嚏○頰赤○眼澁○山根青色皆傷風寒也○傷風宜用大青膏貼

上雄黃膏○感冒風寒通用參羌活散坊見參蘇飲魁惺惺散

雄黃膏

治傷風溫壯熱引飲寒水石五錢甜硝甘草末各三錢龍腦一字朱砂五分雄黃小棗大

研蘿菹根水并醋一大盞煮令盡右研勻煉蜜成膏薄荷湯化下半皂子大

惺惺散

治傷風發熱痰嗽煩渴人參白朮白茯苓桔梗川芎白芍藥瓜蒌根甘草各二分半細辛

薄荷各一分右剉作一貼薑二水煎服

痰涎喘嗽

痰乃風苗火靜則伏於脾火動則壅於肺痰火交作則咳嗽喘急宜瀉白散坊見合導痰

湯剉觀煎服○脾寒嗽宜華蓋散熟嗽宜清金降火湯貼貼嗽○脾母子也二藏俱虛則生煩涎

煩涎者脾肺所出也涎則流溢在於咽喉如水雞之聲喘嗽煩悶宜抱龍丸奪命散貼坊○馬脾風



宜用馬脾風散牛黃奪命散保命丹方見附

馬脾風散

治寒邪入肺寒鬱為熱痰喘上氣肺脹齁

一錢半輕粉五分右為末每取一字以溫漿水少許上滴香油一點抄藥在油花上待沉下却去漿

水灌之
神效

牛黃奪命散

治小兒肺脹胃滿喘促氣急兩脇扇動

夕白丑半生半熟黑丑半生半熟取頭末各五錢
大黃一兩檳榔二錢半木香一錢半右為末入輕

粉一字和勻每取一錢或二錢蜜水調下微利為度

泄痢

小兒疳痢瀉青白黃沫水痢色變易無常○疳即

水漸加瘦瘠○赤痢宜黃芩芍藥湯虛滑宜固腸
丸疳疳○白痢宜益元散散溫六丸疳鯁○

赤白痢宜蘇感元疳鯁○八痢危證一見曰赤痢二曰疳腹

痢三日曰赤白痢四曰食積痢五曰驚痢六曰脾虛痢七日時行痢八曰疳痢通宜小駐車元真人養

藏湯便方難親大○小兒痢穀道不閉黃汁長流者不治

一方

治瀉痢五倍子炒黃為末烏梅肉水浸和丸彈子大每服一九白痢米飲下赤痢薑湯下水瀉冷

水翻下

腹痛腹脹

小兒腹痛曲腰乾啼無淚面青白唇黑肢冷或大便色青不實為盤腸內吊急煎葱湯淋

洗其腹揉葱白熨臍腹間良久尿自出其痛立止續用乳香散○小兒腹痛多是乳食所傷宜用

消食散○積痛食痛○面青白身冷水瀉為冷痛宜理中湯○積痛食痛虛痛虫痛大同一小異惟虫痛小

兒多有之其證心腹痛叫哭倒身撲手嘔吐清水涎沫面色青黃時作時止口唇紫黑色者是蛇厥

也宜用安虫散安虫丸○腹脹者由脾胃虛氣攻作也宜用撮氣丸消積丸十全丹○方現

乳香散

治盤腸內吊腹痛乳香沒藥各少許細研另取木香一塊於乳鉢內磨水二分滾數沸調

乳沒末服之只一服即效

消食散

治食積腹痛白朮陳壁土炒二錢半麥芽縮砂山查肉各一錢橘紅香附米泔麴青皮各

七分甘草五分左右為末每一錢米飲調下或剉取二錢入薑三片煎服亦可

消積丸

治乳食傷積腹脹氣急丁香縮砂各十二箇烏梅肉巴豆肉各三箇使君子肉五箇右為

末飯丸麻子大每三九或五九橘皮湯下

安蟲散

治虫痛胡粉炒黃檳榔苦練根鶴虱白礬半生半枯各二錢右為末每服一字大兒五分

米飲調下○或以米糊和丸麻子大一歲兒五九溫漿水入清油打勻送下名曰安虫丸

搗氣丸

治小兒腹虛脹胡椒全蝎各四十九箇右末麴糊和丸粟米大飲下五七九至一二十

九如腹大者加羅當子炒

五軟五硬

五軟者頭項軟○手軟○脚軟○身軟○口軟是也頭項軟者天柱骨倒也通用健骨散

外貼生筋散○手軟者無力以動也宜薏苡丸○
脚軟者行遲也貼○身軟者肉少皮膚自離或
遍身筋軟者鹿茸四斤九加當歸青鹽服之○口
軟者語遲也胎胎已上五軟皆稟受不足或因吐
瀉若不治必成篤疾○五硬者頭項硬○手硬
○脚硬○身硬○口硬也硬者強直冰冷乃肝受
風邪宜用烏藥順
氣散方視風門

健骨散

治頭軟頭不能正也項軟者天柱骨倒也白
蠶炒為末每服五分或一錢薄荷泡酒調

下日
三

生筋散

外貼之木鱉子三箇單麻子三十粒俱去殼
右研勻先捏起兒頭摩項上令熱作片貼之

薏苡丸

治手軟薏苡仁當歸秦艽酸棗仁防風羌
各五錢右為末蜜丸灸實大荊芥湯化下

鹿茸四斤丸

治身軟筋骨痿弱肉痿萎牛膝木瓜兔
絲子熟地黃鹿茸天麻杜仲五味子各

等分為末蜜丸梧子大溫酒或米飲下
三五十九丸○一名加減四斤元

解顱

年大小兒頭縫不合如開解故曰解顱此由腎氣

亦有不數歲者不能合也凡得此疾者不過千日其間

腎氣不成故也長必少笑更有目白睛多面不白

色瘦者多愁少喜也○解顱即小兒頭縫不合

也宜服六味地黃元○解顱即小兒頭縫不合

三神散

治解顱乾薑七錢半細辛桂心各五錢右

天南星散

治同上天南星微炮為末醋調塗

填顱陷

脾其氣上衝則腫起也○因乳哺失常或寒熱乘

攻亦致顱填突起汗出毛髮黃而短是也若寒氣

上衝則牢硬熱氣上衝則毛髮軟當風熱宜用寒氣

熱渴引水漿致成泄利則氣血虛弱不能上交腦

髓故顛陷如坑不得平滿宜用黃
狗頭骨炙黃為末雞子清調付門

語遲行遲

語遲者五軟中口軟是也兒在胎時母有驚
怖驚氣入於心包絡使心神不足舌本不通

宜服芎蒲丸○小兒五歲不能言諸病後不能言宜雞頭丸
磯○一小兒五歲不能言咸以為廢人用六味地

黃丸○一小兒五歲不能言咸以為廢人用六味地
半○一始發一二年言至一年始言語如常○行遲

者脚軟是也氣血不充骨髓不滿軟弱不能行或
肝腎俱虛肝主筋筋弱不能束骨宜六味地黃元

加鹿茸牛膝五味子○五加皮○久服之虎骨丸亦佳
或用五加皮散○丸小兒行遲齒遲解顛五軟

鶴膝睛白多愁皆因稟受腎氣不足宜以六味地
黃丸加鹿茸補之或用調元散○小兒鶴膝者

由稟受不足血氣不充故肌肉瘦瘠骨節呈露如
鶴之膝乃腎虛得之宜六味地黃元加當歸牛膝

鹿茸久服仍以大南星炮為
末醋調烘熱貼之甚良○

芎蒲丸

治心氣不足五六歲不能言石芎蒲人參麥
門冬遠志川芎當歸各二錢乳香朱砂各一



錢右為末蜜丸麻子大米飲
下十九至二十九日三服

雞頭丸

治小兒諸病後不能言雄雞頭灸一箇鳴蟬
灸焦三箇大黃煨甘草灸各一兩當歸川芎

遠志麥門冬各七錢半木通黃芪各五錢右為
末蜜丸棗豆大空心米飲下五九日三四服

虎骨丸

治行遲虎脛骨生乾地黃酸棗仁白茯苓肉
桂防風當歸川芎牛膝黃芪各等分右為末

蜜丸麻子大木瓜湯
下五九或十丸

五加皮散

治三歲不能行五加皮二錢半牛膝木
各一錢二分半右末每服一錢米飲調下

調元散

治行遲山藥五分白朮白芍藥熟地黃當歸
川芎黃芪蜜炒各二分半人參白茯苓茯神

各二分甘草一分半石菖蒲一分
右剉作一貼薑三棗二水煎服

髮不生齒不生

髮不生者因稟受血氣不足不能榮於
髮宜服從蓉元○齒不生者由齒者骨

之所終髓之所養稟氣不足則髓不能充於骨故
齒久不生宜服芎黃散○齒久不生用雄雌散

從夢元

下魚磨化二三
九塗擦頭上
得

芎黃散

將乾末糝擦齒
上日二
齧

龜背龜腎

丹枳殼丸且取龜尿點脊骨節上即平○龜胃者
胃高脹滿其狀如龜此肺藏受熱所致也或乳母
多食五辛及酒麪過度或夏月多飲熱乳宜服百
合丹雞子白○龜胃乃肺熱脹滿攻於胃膈而成宜瀉

白散
子五
煎觀
服加
軋片

松藥丹

黃龜背松花枳殼防風獨活各一兩麻黃大
黃前胡桂心各五錢右爲末蜜丸

飲下十丸

枳殼丸

治同上枳殼防風獨活大黃前胡當歸麻黃各三錢右為末麩糊和丸黍米大末飲吞下

一二十丸
一名龜背丸

百合丹

治龜背大黃七錢半天門冬杏仁百合木通桑白皮枳殼甜葶藶石膏各五錢右末蜜丸

菴豆大白湯下五七丸至十丸

滯頤

小兒滯頤者口角流涎是也涎者肝之液流出積於頤上此由脾胃虛冷不能制其津液故也法當

溫脾○內經論舌縱涎下皆屬於熱可辨冷熱而治之熱涎者胃火炎上宜用通心飲坊見冷涎者

胃虛也宜用木香半夏丸
○滯頤冷證宜用溫脾丹

木香半夏丸

木香半夏麩丁香各五錢白薑白朮青皮陳皮各二錢半右末蒸餅和丸麻子

大米湯
灌下

溫脾丹

半夏麴丁香各五錢白朮青皮乾薑各二錢
半右為末糊丸黍米大末飲下一二十丸

丹毒

小兒丹毒乃熱毒之氣與血相搏而風乘之故赤
腫其遊走遍身者又名赤遊風入腎入腹則殺人

也○錫○小兒丹毒百日內發者必死急急救之
○金絲瘡一名紅絲瘡其狀如線巨細不一經謂

丹毒是也○難治○丹毒自腹內生出四肢則易愈自
四肢入腹則難治○毒氣入裏腹脹則死毒氣

所走之處截經刺之出血一云急以細鍼刺出惡
血即消○丹毒宜服犀角地黄湯○四順清

涼飲○外敷○用按毒散○散○米黃散○泥金膏○塗之○又
溝渠中小鰕鰂魚血芭蕉根汁○葉汁○水中

鯉魚血鱧魚血○蟬蟻吸出惡血最妙○中
苔塗之皆可○

拔毒散

治丹毒遊走○煨熟寒水石二兩三錢石膏一
兩黃栢甘草各三錢右為末水調塗之芭蕉

汁調尤
妙

冰黃散

治同上○煨硝大黃末各五錢
右井水調勻雞羽掃塗○

泥金膏

治丹毒熱癰無名腫毒並到糞二分

諸瘡

小兒初生月裏諸疾乃胎毒之深者宜按法治之若一二歲後

惡瘡天氣溫時頻與澡洗更衣名曰外宣亦不須服藥春用柳條荊芥夏用棗葉槐枝秋用苦參

煎湯溫洗錫○一二歲生瘡遍身先服五福化毒丹坊見犀角地黃湯外親熟小便雞羽

蘸洗青黛末之妙○小兒面瘡通面壞爛無全膚流膿才百藥不效臘猪脂付之神效白楊木

枝燒取瀝行酒製之亦效○小兒癩頭瘡以防風通聖散取酒製為末每○一錢水煎服三十貼見效

又詳見諸瘡門可參考○小兒口中百病及口瘡重舌重腭喉痺腫塞宜用牛黃散○胎熱血

熱風熱諸瘡遍身痒痛宜用大連翹飲生料四物湯

牛黃散

牛黃片腦鵬砂各一分辰砂雄苗青黛各二分黃連黃柏末各八分煇硝一錢半右末每

少許參之

大連翹飲

治諸瘡甘草四分柴胡黃芩荊芥各三分連翹車前子瞿麥滑石惡實赤芍藥梔子

木通當歸防風各二分蟬殼二分半右剉作一貼入竹葉二片燈心十莖水煎服

生料四物湯

治同上生地黃赤芍藥川芎當歸防風各三分黃芩薄荷各二分右剉作一貼

水煎服

紅絲瘤

一人生子遍身生紅絲瘤不救後生三四

氣相傳生子故有此疾俗名胎瘤是也令祖之果如其言遂以滋腎丸數服瀉腎中火邪忌酒肉辛

熱之物其妻以六味地黃元養其陰血後受胎五月以黃芩白朮作散與服而生子前疾不復作矣

藥毒成淋

一童子自初生患淋五七日必一發發則大痛下如黍粟者約一盃然後定意其父

必多服下部藥遺毒在胎留於子之命門而然紫雪和黃栢末丸梧子大晒極乾熟湯下百丸

半日痛大作連腰腹乃下如黍粟者一握許病減十分之八又與陳皮一兩桔梗木通各五錢作貼

與之又下如黍粟者一合而安父得燥熱且能病
子况母得之者乎書此以證東垣紅絲瘤之事

斷乳

小兒二三歲時欲斷乳宜用盡眉膏門

畫眉膏

山梔子炒黑三箇雄黃朱砂輕粉各少許為末清油調勻候兒睡着濃抹畫兒兩眉上醒

來自不喫乳未效再畫仍用墨搽乳頭門

小兒諸病死證

無眼上赤脉下貫瞳人眦赤○顙門腫起

筋○忽作鴉聲○直視○虛舌出口○齒○指甲黑色○

魚口氣急啼不作聲○肺○蛔○既出必是死形○

○凡病困汗出如珠不流者死○凡兒病其頭手足

皆上逆者死○唇口乾目皮反口○中氣冷手足

痘癍疹三證專由胎毒

太○古○夫○胎○在○腹○中○至○六○七○月○則

已成形食母腹中穢液入兒五藏食至十月即穢
液滿胃至生時兒口中猶有不潔產母以手拭淨
則無疾病俗以黃連甘草水下其臍糞之穢此亦
母之無不潔餘氣入兒藏中遇風寒邪氣相搏而成
痘疹也。子生在母腹中十月之間隨母呼吸呼
吸者陽氣也而生動作滋益精氣神飢渴皆食母
血兒隨月長筋骨皮肉血脉形氣俱足十月降生
口中尚有惡血啼聲一發隨吸而下此惡血復歸
命門胞中僻于一隅隱伏而不發直至兒因內傷
乳食濕熱之氣下陷合于腎中二火交攻榮氣不
從逆於肉理惡血乃發諸癰疹皆出於腎水其大
後聚肉理歸於陽明故三番癰疹始見之證皆足大
陽壬膀胱剋丙小腸其始出皆見於面終歸於陽
明肉理熱化為膿者也二火熾盛反勝寒水遍身
俱出此皆從足太陽傳變中來也。癰○癰之為病
皆由子在母腹中時浸漬食母血穢蘊而成毒皆
太陰濕土壅滯君相二火之所作也。○內經曰
諸痛痒瘡瘍皆屬心火蓋因胎毒藏於命門遇少
陰少陽司天君相二火太過
熱毒流行之年則發作矣。𩑦

稀痘方

稀痘方有服朱砂法延生第一方稀痘免紅丸
滌穢免痘湯獨聖丹百壽散服梅花方秘傳稀

痘湯

服朱砂法

如米細光明朱砂水飛為末每五分作三
次煉蜜調量兒大小加減溫水送下不拘

痘出未出首尾可消但性微寒不可稀者可無黑陷者
可起痘癰者可消但性微寒不可稀者可無黑陷者

蜜少許調朱砂
末一字用端

延生第一方

小兒初生臍帶脫落後取置新瓦上用
炭火四圍燒至烟將盡放土地上用瓦

蓋之類蓋之存性研為末預將朱砂砂透明者為極
細末水飛過臍帶若五分重朱砂砂用二分五釐

生地上黃當歸身濃煎汁一二日內調和前兩味抹
兒上臍間及乳母乳頭上一日之內用盡次日大

便遺下污穢濁垢之物終身永無瘡疹
及諸疾生一子得一子十分妙法也

稀痘免紅丸

一名太極丸臘月初八日取採生兔一
隻取血以蕎麥麴和之少加雄黃四五

分候乾成餅凡初生小兒五九或七九三歲後十五
三九乳汁送下
丸服久則遍身發出紅癍是其驗也有終身不出
痘疹者雖出亦稀小兒已長會飲食者就以免血
啖之尤妙或云不必八日但臘月
免亦可用然終不若八日佳

醫鑑

滌穢免痘湯

五六月間收取絲瓜小蔓藤絲陰乾約
二兩半重收起至正月初一日子時父約

母只令一人知將前絲瓜藤煎湯待溫洗兒全身
頭面上下一以去其胎毒洗後不生痘也如出亦輕
只三五顆而已

醫鑑

獨聖丹

以絲瓜近蒂取三寸連皮子如納於固濟砂瓶內
以桑柴火燒存性為末以如數配入砂糖搗

成餅時時與兒吃盡為佳小兒痘疹服此則少或
全然只燒蒸三兩日不出者或每遇作熱時即與
食之出痘必少醫鑑○凡痘疹初出或未出時服此
藥則多者可少少者可無重者可輕也又云入
朱砂少許
尤妙

朱砂少許



百壽散

初生月內用之老無瘡疹黃連一兩朱砂一錢右水煎先拭去口中涎淨灌下少許令嚥

之却以餘藥傾盆中浴兒身令遍

服梅花方

服梅花可免出痘十二月收梅花不拘多

酒化下念太乙救苦天尊一百遍妙不可言

秘傳稀痘湯

六月上伏日採葫蘆嫩蔓數十根陰乾遇正月初一日五更勿令人知將葫蘆

蔓安鍋內燒湯一盆洗未出痘小孩兒渾身頭面上下無處不洗到方可此後即不出痘

痘瘡預防法

每遇冬月溫煖恐春發痘宜預服三豆飲油飲子

之能活血解毒則不染宜獨聖丹免紅丸疳疔並龍鳳膏

三豆飲

赤小豆黑豆綠豆各一升甘草五錢右水煮熟逐日飲計契豆任意服已染則輕解未染

者服之過七日永不出

油飲子

此小兒陽盛無陰以制令頭髮豎直飲食減少

日飲之令盡則永不出痘

龍鳳膏

一鳥雞卵一箇地龍細小活者一條右雞卵開

熟去地龍與兒食之每歲立春一日食一枚終身不出痘疹覺鄉隣有此證流行食一二枚亦效

新痘證

傷寒傷食瘡疹證皆相似○傷寒則增寒壯熱口中氣熱呵欠煩悶項急○傷食則口熱口

醋氣餘熱小消腹中疼痛○瘡疹則腮赤燥多噴嚏悸動昏倦四肢冷○昏睡喜笑者將發瘡疹

也○瘡疹候者面燥腮赤目胞赤赤呵欠煩悶

涼乍熱咳嗽噴嚏足稍冷夜卧驚悸多睡○發

大抵與傷寒相似發熱煩躁臉赤唇紅身痛頭疼

乍寒乍熱噴嚏呵欠喘嗽痰涎始發之時有因感傷風寒而得有因時氣傳染而得有因傷食發熱嘔吐而得有因跌撲驚恐畜血而得或為目窠口



狂悶昏睡謔語或自汗或下利或發熱或不發熱
證候多端卒未易辨必須以耳冷尻冷驗之蓋瘡

疹屬陽腎藏無證其耳與尻俱屬腎故腎之所邪
獨冷又不若視其耳後有紅脉赤縷為之真也

○痘疹證以耳冷尻冷足下冷及耳後有紅縷赤
脉驗之然須見心胃間細點如粟起則為真也

痘瘡亦時氣之一端其凡傷寒時氣熱毒內盛多發始瘡

瘡其色或白或赤若頭作癰漿戴白膿者其毒則
輕若紫黑色作根隱隱在肌肉裏者其毒則重其

則周匝遍身五內
七竅皆有也

痘有五般證五藏各有一證○肝藏水痘色或青○肺

疹或如麤糠色○歸腎變黑此為五色凡痘疹一
色者善或二色三色相合而作者凶第大小不等

為好藏○小兒在胎十月食五藏穢血生下則其
毒當出故瘡疹之狀皆五藏之液肝主淚肺主涕

心主血脾為裹血其瘡出有五名肝為小瘡以淚
出如水其色青而小者為膿疱以涕稠濁如膿其

色白而大心爲癰主血其色赤而小次於水疱皆大爲疹其色赤黃而小滌淚出多故膿疱水疱皆大

血榮於內所出不多故癰疹皆小
瘡者涕淚俱少以液從瘡出故也
譬如泡中容水膿

水去則泡瘦矣藏海○水疱者俗謂之瘡子也水痘之形狀者俗謂之痘子也癰者俗謂之瘡子也

麻子最大水痘次之如麻子也藏海

痘瘡諸證

次至收靨面謂之常證○異
常謂之變證○永痘廕
疹謂之類證○不治謂之壞
證○餘毒謂之癰證○

痘瘡治法

養適其寒溫使出無不快之經成無不
愈之後不致遺毒流汗虛腠目疾腎膜
瘡癰癰瘰癧

發喉閉
於咽
肌腫
肉潮
陽熱
明汗
胃泄
氣此
主之
之治
脾法
土之
一大
一畧
溫也
胃
氣
隨
暢
決
瘡
瘡

無熱則不能起發比之種豆值天時暄暖則易生

瘡○凡見出遲發慢者根窠欠紅活者便當變應
調治切勿袖手待斃○瘡疹惟用溫平藥治之
不可妄下及妄攻發受風冷○瘡疹始終未有他
證○不可下當用平和藥頻與乳食不受風冷可也
之類○溫平者非熱劑如荊芥薄荷防風惡實甘草
之類○活人書氣粘子湯繫古解毒防風湯選而用
之○方觀齋○惡實連翹山植甘草乃痘瘡終始必
用之藥也○首尾俱不可妄下但用溫涼之劑
無而濟之解毒和中安表而已○有大熱者當
利小便宜導赤散四苓散有小熱者當解
毒飲四聖散
○四勤規下

痘瘡日限
聖瘡七日熱而發七日泡而乾又七日則平
復如舊矣○除初熱三日不第蓋有熱發

三五日或十餘日故也自報痘至收靨首尾一十
二日中間有不守禁戒以至淹纏又有氣血和者
不數日後方死屬毒愈○痘瘡屬虛寒者可延至
十數日後方死屬毒盛轉紫色者不過七八日死
蓋痘是胎毒自內出外二三日方出齊毒氣尚在
內出至六日則當盡發於表七八九日成膿而結

痲矣若毒氣盛不能盡出過六日毒反內入藏府故須於六日以前急服涼血解毒之藥以驅出之六日以後醫無及矣故其死最急若虛弱毒氣少者只是氣血不足不能貫膿成就故綿延日久而後死矣○發熱三朝自出痘至收靨要十二日可保平

安

發熱三朝

痘疹亦時氣之一端大抵與傷寒相類○痘疹欲出證○呵欠○噴嚏○耳尖冷○又○

澁○睡中急驚○卒暴壯熱○肌膏繃急○又○昏睡喜嚏悸者將發瘡疹也○熱動五藏則五藏之證俱見其呵欠煩悶者肝也時發驚悸者心也乍涼乍熱手足冷者脾也面與頤頰赤咳嗽噴嚏者肺也惟腎無候以在腑下不能食穢故也○或發驚搐渾身熱甚一向發熱者是也○葛根湯參蘇飲見點加味敗毒散解表○熟葛根湯參蘇飲見點加味敗毒散解表○盛發驚搐為吉候用紅線散調加味六一散表之痰涎壅盛者薄荷湯化下抱龍丸坊見○發熱欲

出痘作腰痛者急服神解湯出汗以痛止為度免
出腎經之痘。發熱之初急宜表汗使藏府胎毒
及外感之邪盡從汗散則痘出稀少然表藥必在
紅點未見之前也。傷寒瘡疹疫癘潮熱五日
已衰疑似未辨者宜用四物解肌湯五日已裏發
出即出五日已外無者非痲也。發熱三日未見
形跡宜以生酒塗身上時時
看之狀如蚤痕者是痲也。時

發熱時吉凶證

發熱時身無大熱腹痛腰不痛過三
日後纔生紅點堅硬碍手者吉勿藥

有喜兆。發熱時不時發驚者痘在心經而出也乃
為吉兆。發熱時一日遍身即生紅點稠密如蚤
種樣摸過不碍手者凶。發熱時頭面上有一片色
被杖出痘乾燥者凶。發熱時頭面上有一片色
如胭脂者凶已
上皆決死證

加味敗毒散

柴胡 前胡 羌活 獨活 防風 荊芥 薄荷 枳
殼 桔梗 川芎 天麻 地骨皮 各三分 右剉

作一貼宜加紫草 蟬殼 紫蘇 麻黃 葱白
煎服表汗之本方除參苓恐助火也

紅綿散全蠲作一貼更加薄荷紫草蟬殼水煎服右剉

加味六一散治熱毒太盛狂言煩渴及痘瘡紅紫黑

砂水飛三錢片腦三分另研別入右和勻春秋以燈心煎湯調下夏月以新汲水調下三五歲兒服

一錢散調下能解毒稀痘出痘紅紫者亦效

神解湯治發熱欲出痘而腰痛者柴胡一錢半乾葛一錢麻黃白茯苓升麻防風各八分甘草五

分右剉作一貼水煎服溫覆出汗不汗再進一服免出腎經之痘此法甚奇

四物解肌湯傷寒瘡疹疑似未辨者以辛涼之劑調

之即此湯也

出痘三朝發熱一日即出痘者太重二日即出痘者亦

身涼乃見痘者尤輕自出痘一日至二三日方齊

瘡略相似若根不紅頂虛軟畧有清突堅實捫之碍手者瘡也若根不紅頂虛軟畧有清突堅實捫之碍手者瘡也
疹癰瘡也。如發熱過三日瘡不出或不快出即微發之用消毒飲化毒湯。犀角消毒飲如瘡發後不多出即瘡本稀不可更發也。如三服瘡如加藥發後不多出者為子孫母好子孫多則自然有不等者然亦無害。○出速且密。胃背尤多此乃毒盛宜服消毒飲。解毒熱煩渴。湯以防後日青乾黑陷。○出盛而內外壅熱。煩渴。湯以防後日青乾黑陷。○出盛而內宜難快出。宜用透肌湯。○瘡出而液風寒復入者。瘡或用加味四聖散。或快癰散。○頭面上忽生三五箇。或只一箇。高大紫黑。儼似疔瘡。者名曰飛瘡。此最輕。或只此一瘡。再不然生瘡。○瘡者名曰飛瘡。此見紅點。此由毒氣太盛。故出速。宜用此。○瘡草紅。花。蟬。殼。涼。血。解毒。蠶。○凡瘡出不快。宜四聖散。加味。四聖散。紫草。飲。及。絲。瓜。湯。之。類。蠶。○一。便。密。如。鍼。頭。形。勢。重。者。合。輕。其。表。而。涼。其。內。連。翹。升。麻。湯。主。之。○瘡。疹。稠。密。身。長。熱。急。與。鼠。粘。子。湯。以防後日青乾黑陷。○瘡。疹。稠。密。身。長。熱。急。與。鼠。粘。子。湯。

宜消毒飲加酒炒芩連外用護眼膏
○痘出不快宜樺皮飲子胡荽酒

出痘時吉凶證

如痘瘡始出如粟米大似水珠亮澤明淨者吉○

痘一出即變黑者腎證也此為惡候保元湯防見
加紫草紅花救之○痘出紅赤以手摸過皮軟不

碍指者名曰賊痘過三日變成水疱甚至紫黑
此危證也保元湯加紫草蟬殼紅花解之已成水

痘則保元湯加四苓散○發熱出痘時妙法也不
則遍身爪破赤爛而死○發熱出痘時妙法也不

一片色如胭脂者凶○出痘時發紅如錦紋者
六七日後決死急用化毒湯加紅花黃芩升麻救

之變黑癰
則即死

消毒飲

治痘不快出及胃前稠密急用三四服快透
解毒神效鼠粘子二錢荊芥穗一錢生甘草

防風各五分右剉作一貼水煎服或加山楂
子酒芩紫草服或和犀角磨汁服尤佳

化毒湯

治痘出不快且令稀少紫草茸一錢升麻甘
草各五分左右剉作一貼入糯米五十粒同煎



服神效

犀角消毒飲

治痘疹未能快透或已出熱尚未解急服此藥鼠粘子二錢荊芥穗防風黃芩

各一錢犀角屑甘草各五分
分右剉作一貼水煎服

解毒防風湯

凡痘出速且密或七日後壯熱毒盛氣弱聲啞此藥主之防風一錢地骨皮黃

芪白芍藥枳殼荊芥穗鼠粘子
各五分右剉作一貼水煎服

透肌湯

治痘不快透紫草白芍藥升麻各一錢糯米五十粒右剉作一貼水煎服

四聖散

治痘滯出不快及倒靨紫草茸木通枳殼甘草各等分右為麤末每一錢水煎服

痘景要大小分解毒錢氏四聖散用木通枳殼極好

加味四聖散

治痘出不快或陷伏倒靨一切惡候紫草茸木通木香黃芪川芎人參甘草各

四分蟬殼二分右剉作一貼入糯米百粒水煎服能養而發之

快癰散

治痘出不快或被風復入紫草茸蟬殼人參
白芍藥各六分木通三分半甘草二分半右

剉水煎服

紫草飲

治痘瘡出不快三四日隱隱將出未出紫草
二兩細剉以百沸湯一大椀沃之以物蓋定

勿令氣出候溫服半合或一合痘即出
紫草皆當用茸有發出之功今人用根反利大便

勿用大便泄者

絲介湯

發痘疹最妙取絲介連皮子燒存性為末砂
糖溫水調下半匙許或以紫草茸甘草煎湯

調服尤妙今人水煎服亦得

連翹升麻湯

治瘡疹一發便密如蚕種或如糠粃毒
盛者即升麻葛根湯點服加連翹一味

也

鼠粘子湯

治痘疹稠密身表熱急用此以防後患地
骨皮五分柴胡連翹黃芩黃芪各三分半

鼠粘子當歸身甘草各二分
半右剉作一貼水煎服

樺皮飲子

治痘不快出樺皮
剉濃煎汁飲之

胡荽酒

治同上胡荽剉二兩以清酒二升同煎令
沸便以物蓋定勿泄氣候溫去滓實一身令

遍勿噴頭面以衣溫覆須臾痘
子快出神效無莖則用子幹

又方

治痘出不快蒲萄研酒飲之又食之盡出無生
則用乾者。蟬殼三七箇水煮取汁服之

山查子取肉為
末湯點服之

起脹三朝

起脹三朝毒盡浮於表蓋痘出三日後當潮
起脹先出者先起後出者後起至五六日後當潮

氣盡發於表觀痘虛實變毒淺深全在此關○觀
上紅者終不起脹觀臉乃一身之主若觀上先脹

者四肢必順觀上不脹遍體皆不脹○上體已脹
下體緩慢者無害下體已脹上體緩慢者逆○已脹

體時漿滯不行頂陷不起或風寒所剋俱宜水揚
湯浴之方○凡起脹時毒盡在表須賴裏實

則無虞苟略有瀉則內氣虛脫毒乘虛內攻而癰
胎伏矣宜用固真湯防見○痘不起脹灰白頂陷
者虛寒也宜內托散加丁香或酒調紫草膏若紫
黑陷伏不起乃火盛血熱宜紫草湯調四齒散或
獨聖散疳疔防並○起脹時有痘長大而紫黑名曰
痘疔把住痘瘡令不起失治則死急用保元湯助
下加鼠粘子荊芥穗芩連芷酒炒外用銀簪挑破
頭令父母吮去惡血或綿裹指甲搯去惡血蓋
痘破而毒氣發泄故也仍用雄黃末一錢調胭脂
汁令濃點疔痘上立見紅活雄黃拔毒胭脂活血

也

起

脹時吉凶證

五六日頂尖滿紅起如鼓釘捫之碍指
光澤明潤肥滿紅活者吉○出不快

直待起脹時陸續出如粟米於痘空隙處圓爭者
吉○起脹時根窠全不起頭面紅腫如瓠瓜之
狀者凶○起脹時遍身陷伏不起腹脹不食氣促神昏
者凶

鑒



內托散

易活血均氣調胃補虛內托瘡毒使之盡出今

也。○若紅紫黑陷屬熱毒者去桂加紫草紅花黃芩若淡白灰黑陷伏屬虛寒者加丁香當歸膿煎熟入人乳好酒溫服

紫草膏

治瘡疹不起脹白附子麻黃紫草茸甘草各五錢蟾酥一錢全蝎二十箇白殭蚕炒八箇

右細末另將紫草一兩剉熬成膏又用蜜二兩八酒半盞煉過同紫草膏攪勻調藥末丸如皂角子大一歲兒半丸三歲兒一丸用之紅紫黑陷者紫草湯化下淡白灰陷者好酒化熱服

又方

治痘不肥綻不起脹黃狗蠅四五枚溫酒研服未綻再服冬月蠅在狗耳內可取用

樹內蠱虫二三箇溫酒研服未起再服。烹鼠水治不起脹雄鼠大者一枚去腸肚洗淨以水煮熟

取汁服臘月者尤佳。○母酒能令痘肥脹取母酒和水猛煮以殺酒毒。○乃服之亦能補氣。○麥麪能發痘起痘疹取細末作粥和砂糖服又云極好米能解痘毒令發起可作粥和砂糖服又云極好

養胃氣 鞣肉○痘不起 脹煮黍穰汁煮免
皮汁 臘猪肉煮汁並洗之 鞣○胡荽酒噴身能起

上脹助

貫膿三朝

升貫膿三日胃氣升也痘以胃氣為本胃之氣

滿光潤者順○氣血大振毒漿已滿將欲收斂之
時也○當結膿窠而不結由血熱相薄毒氣內外

灌注必復入心宜用猪尾膏防見○貫膿時九竅
慎宜封閉飲食藥餌極忌寒涼疎淡之物若傷脾

胃則清氣下陷不能貫膿也○出痘歷七日當
貫膿之時外若起脹而中空乾燥無膿血者死若

略有人參黃芪當歸煎紅活猶有生意用內托散此
人參黃芪當歸煎紅活猶有生意用內托散此

膿之巧法也○九日十日四水之時元氣熏蒸
真陽運化其水自然消燦此循環之妙理也若未

曾解毒則至此時水不能化反歸于胃胃病則不
能貫膿成就或致吐瀉陷伏宜用定中湯方觀都

○痘七日後壯熱毒盛氣弱
聲啞宜用解毒防風湯方見





貫膿時吉凶證

漿行瘡裏肥滿黃色或蒼蠟色或黃
綠色者吉若色淡者虛也保元湯助

下加乾薑肉桂糯米煎服○頭面先回漿四肢方
纔起脹者吉○貫膿時或吐瀉不食乳食不化腹

脹聲啞寒戰咬牙痘爛無膿肌肉黑者凶○貫
膿純是清水皮白薄如水泡三四日遍身抓破而

死○貫膿時遍身抓破痘中乾枯
全無血水皮白乾如豆殼者凶鑒

收靨三朝

收靨三日漿老而結如果熟蒂落氣收血平
光色始欽自上而下按之堅硬蒼蠟色或黃

黑色或似紫紅蒲萄色者佳○當靨不靨謂之慢
有毒盛不結痂者猪心龍腦膏最妙防見有觸穢

不收靨者異功散調四糞散最妙○防並○寒戰
咬牙足膝如冰耳尻反熱於起脹貫膿收靨時極

忌乃氣血虛極宜保元湯防見加桂甚者異功散
救之○方視○痘痂不焦是內熱蒸於外散漫而

行故也宜宣風散防見導之生犀磨汁解之必着
痂矣○宜當靨不靨發熱蒸蒸用甘露回天飲即

時熱退痘靨○外潰不結痂甄陶散糝之方○
○發膿窠不肯靨但調砂糖水與契即結痂○

痘疹膿而不焦此失清涼之氣也如五穀得陽氣而成熟非涼風一至則不能實也天地嚴肅之氣一加則萬物秀而實矣與痘疹何異須察證候而清涼之則瘡必即痂矣飲膳下儲之涼猪尾膏龍腦膏並佳

收靨時吉凶證痂落從頭上至胃膈手腹腰足節節

白無血色者過後亦死急用消毒飲二貼坊見後用補氣血養脾胃藥預防之○陰囊及足上先靨起者凶○將靨時其痘一時盡黑非靨也火極攻裏即凶○當靨時逆身臭爛如餅搭不可近目神者凶無

甘露回天飲砂糖屑半盞入百沸湯一椀調服

通治痘瘡首尾宜保元湯為主治○不快出不起脹不貫膿不收靨通用猪尾膏救之○防見○出不起脹不起行俱以水楊湯浴之防見

保元湯

人參二錢 嫩黃芪甘草各一錢 右剉作一貼 入薑一片 水煎服 醫○一二日初出乾紅少

潤此毒尚淺宜用活血勻氣無解毒之藥加白芍藥一錢當歸五分以活血加陳皮五分以勻氣加

玄參鼠粘子各七分以解毒○二三日根窠雖圓而頂陷者為氣虛弱血亦難聚宜加川芎官桂○

四五日根窠雖起色不光澤為氣弱血盛宜加白芍藥官桂糯米○五六日氣盈血弱色昏紅紫宜

加木香當歸川芎○六七日不能成漿為氣血少寒不能制宜加官桂糯米○七八日毒雖化漿而

不滿宜加官桂糯米發陽助漿○八九日漿不冲滿氣弱而險宜加糯米以成漿○十一日十二日

血盡漿足濕潤不斂者內虛也加白朮白茯苓助其收斂○十三十四十五日毒雖盡解或有雜證

相仍只以此藥隨證加減不可用大寒大熱之劑恐致內損之患 醫

解毒

疎則無毒密則有毒急用涼藥解之雖數十貼不妨無害眼之患○密則毒甚宜以清涼之劑解之

酒炒芩連之類是也酒炒芩連能解喉毒○痘初出如芡前稠密急服消毒毒飲坊見加山查子酒

黃芩紫草茸○痘出太多以犀角地黃湯舂○加
味犀角消毒飲加山楂子紫草茸糯米解之○

痘毒攻脾則泄瀉浮腫攻肝則眼生翳膜攻腎則
耳痛膿出攻肺則咳嗽痰盛○初出狀如蚊咬

色黑者毒氣與熱相薄也宜用人齒散散防見猪尾膏貼
下○毒鬱藏燥痰盛狂叫宜四齒散散防見加蟬殼

黑陷驚狂謔妄宜加味六一散方見或紫草燈心
煎湯磨犀角玳瑁汁調服失治則不日聲啞而死

○毒入胃則腹上痘多青紅紫色外證口角流涎
者死○痘初出如蚊咬如蚕種或血紅一片不

分地界毒氣太盛宜神功散解之○解痘毒宜
解毒湯黑散子三豆飯絲瓜湯服牙砂法見坊

加味犀角消毒飲治痘疹毒氣壅遏未能勻透及口
舌生瘡不能吮乳鼠粘子一錢二

分甘草五分防風升麻各三分荊芥穗麥門冬
犀角屑桔梗各二分左右坐作一貼水煎服○

神功散治痘毒太盛以此解毒之毒氣即散陷者即起
川芎當歸升麻甘草各六兩右為麤末一起

取東流水煎三次每次用水三碗文火煎至一
碗半瀝下又煎二次共藥水四碗半聽用又用一

朱砂四兩以綃袋懸入磁罐加煎藥水封固水煎盡為度取出焙乾為末以紙羅過聽用再以引經散用糯米二三合以紙包緊外用黃泥固濟入火煉紅冷定打碎取米黃色者用之白色者不用每服以砂末一錢米末一錢煉蜜二匙好酒二匙百沸湯一小鍾共一處調勻用茶匙喂盡取效蠶子

黑散子

解痘毒初出服此便消不冷研細每二錢新盛瓦片蓋口火煨存性放

下水調服

辨痘吉凶

痘者痘也大小不一無妨惟欲圓滿硬實不宜虛軟陷伏○痘自頂額上不變則吉貫膿時變

固肉然遍身變壞獨頂額上可治收靨時敗證悉具惟成水疱惟額上不破者可治收靨時敗證悉具惟頂額上未靨如舊者可生○頭粒尖而白根紅潤譬如一顆真珠放在胭脂上故曰生頭粒紅紫地界不分譬如二色血猪肝故曰死○凡痘疹只出一般者善或二色三色相合而作者凶謂痘癰疹相合也○痘脚稀疎○根窠紅活○不瀉不渴乳食小減○痘四肢溫○根身無大熱已上

六證並不服藥自愈。一者
 憂齒痘黑陷喉中涎喘。二
 者痘不治證有七。一者
 伏○三○者瘡作坑內無膿
 痘○癰○變○疳○口○臭○齩
 爛牙落。五者聲啞氣噎。或
 藥腹中鳴。六者痘初出半
 出。七者誤於踈轉氣啞者。
 及○兩○手○心○兩○足○心○密○者○皆○不○治○。二○曰○紫○黑○色○喘○喝○
 一○曰○痒○塌○寒○戰○咬○牙○煩○躁○。二○曰○紫○黑○色○喘○喝○
 不○寧○。三○曰○頭○溫○足○冷○悶○亂○欲○飲○。四○曰○灰○白○色○
 頂○脂○腹○脹○喘○渴○。五○曰○目○上○視○氣○促○泄○瀉○不○止○。六○者○
 蚕○種○。三○者○隨○出○隨○沒○。一○者○初○出○勇○壯○。二○者○出○如○
 倒○出○。六○者○飲○水○如○促○鼻○翻○。鼻○
 燥○有○黑○氣○以○手○拭○鼻○孔○者○必○死○。凡○鼻○
辨痘輕重順逆
 少○輕○者○作○三○次○出○。大○小○不○一○。頭○面○稀○
 種○。眼○中○無○。臍○中○無○。身○熱○腹○脹○。一○齊○並○出○。密○如○蚕○
 種○。稠○密○無○縫○。身○熱○腹○脹○。頭○溫○足○冷○。密○如○蚕○
 不止。耳中有。臍中有。輕變重者犯房室。
 不忌口。先曾渴。飲冷水。餌涼藥。重變輕。

者避風寒○常和暖○大便稠○不燥渴○忌生冷○忌外人觸○凡出痘收靨從頭至足為順從足至頭為逆頭脚齊出齊靨者險○輕者靨出俱從頭至足痘亦稀○重者稠密頭上未出未靨脚上先出先靨○身體溫煖者順寒涼者逆○能食大便實者順不能食大便秘者逆○瘡疹屬陽出則為順故春夏為順秋冬為逆○冬月腎旺又盛寒故病多歸腎變黑黤○痘疹惟腎無候但見平證耳涼尻涼為順若痘黑陷耳及尻反熱者為逆○痘黑而忽瀉便膿血并痂皮者順水穀不消者逆蓋瀉出痂皮根在內病出而安也○水穀化者脾實故順水穀不化者脾虛故逆○一發出便密如鍼頭如蚕種如糠粃者重如浮萍不分箇數者逆○一發便出盡者必重痘挾疹者半輕半重瘡端黑如鍼孔者熱劇黤

辨痘形色善惡

色者五藏精華紅黃綠者為佳黃綠乃脾胃正色毒將出也淡紅者毒始出也

鮮紅則為血熱初起紫者大熱也全白者氣虛也灰白者血衰而氣滯也黑者毒滯而血乾也○痘

色初出淡紅紅變白白變黃者吉初出鮮紅紅變紫紫變黑者逆○痘出色不紅潤者毒盛壅塞故也宜用紫草飲方見外用芥子末塗脚心方見○黑屬血熱涼血為主四物湯加黃芩黃連紅花○白屬氣虛補氣為主保元湯方見去甘草加紫草

照燈影法

凡痘形色雖險若燈光影與痘根圓暈相為周旋根窠紅活漿影深厚則皆可調治

若根窠不紅不起血死不活漿無影者雖輕難治故曰亦必用麻油或熬煎之服法神巧全在治此

辨痘虛實

吐瀉少食為裏虛陷伏倒靨灰白色為表虛二證俱見為表裏俱虛並用異功散救之助

下○不吐瀉能食為裏實紅活凸絞無汗為表實○不吐瀉少食為裏虛○表裏俱實者難出易靨實吐瀉為表實身涼多汗為表虛便秘能食為裏實吐瀉少食為裏虛○表裏俱實者難出易靨表裏俱虛者易出難靨表實難出裏虛難靨○肺主氣氣不足則致三證○自汗○聲不出○瘡

頂陷塌宜保元湯坊見四君子湯鈔覲○心主血

澤宜芎歸湯婦人或四物湯

辨痘陰陽證嘔乳食○目睛青○脈沉數已上屬陰證

不可服冷藥○足脛熱○兩腮紅○大便秘○小

不可服熱藥○痘瘡虛寒用異功散○

保護痘瘡頻與乳食不受風冷不能食內虛○瘡變為色○

瘡常令衣服適中溫涼處坐臥○痘瘡宜善加

調護使房室溫盡○痘瘡當謹避風寒蓋內外

飲食痘以脾胃為主自始至終以能食為順又曰淡食

也○痘或瘡忌食生冷肥膩生忌茶醋酒葱蒜魚羊

肉猪肝血柿棗飴糖特忌雞鵝鴨卵烹食令兒目
盲肝○勿食酸辣五辛穢蠶薑有毒之物忌熱毒

熏肝生眼中○腎障○痘瘡有犀切不可飲冷水
少與滾熟水則可○自發熱至收靨諸般血肉皆

不宜食蓋助火邪滋熱毒故也若脾胃虛弱則止
用煮魚鰾鮐及精猪肉去盡脂肪淡煮少食以助

滋味○乳母當慎口不可令飢及受風寒必變
黑歸腎難治○嬰兒未能服藥則當無治乳母

以調氣通榮之劑則瘡心肥滿光澤無陷伏之憂
矣○乳母食後須捏去宿乳令盡乃

服藥即仰臥要時乃令兒吮其乳汁○

痘疹宜食物

宜食○菜豆○赤小豆○黑魚○鰻魚○雄猪肉

○海松子○蒲荀○栗子○生蠶之○蔓菁○蘿菔○

○薤白飯○糯米粥○蕎麥麪○

糕○酒○砂糖○雪

禁忌

痘瘡切忌諸般臭穢煎炒油烟父母行房梳頭等
觸犯未發而觸則毒氣入心悶亂而死已發而觸



則瘡痛如割以至黑爛切宜深戒○痘瘡勿親近狐臭漏腋房中淫慾及婦人月候醉酒葷穢

黃蚊藥一切腥臊燒頭髮等氣○痘瘡最怕穢惡之氣切忌外人及僧道看經往來蓋人之氣聞

香則行聞臭則止故也○房內勿燒沉檀降真龍腦麝香恐燥血衄○痘自初至終父母切忌房事

嫩○痘瘡纔落肌肉尚嫩不可澡浴太早

浴法

痘瘡因氣血虛弱或為風寒所剋不能起脹或貫膿或枯燥陷伏俱宜水楊湯浴之○痘不起

脹或陷伏宜用黍穰煮湯○胡荽煎湯○芸薹煎湯○兔皮毛煎湯○臘猪肉煮湯○馬肉煮湯

皆可用浴

水楊湯

楊柳五斤春冬用枝夏秋用葉洗淨搗碎取長流水一大釜煎六七沸去渣將三分之一

注盆中先用保元湯坊見加川芎桂皮糯米煎服乃棄熟洗浴良久以油紙擦點照之累累然有

起勢陷處有圓暈紅絲此漿影也漿必滿足如不滿又如前浴弱者只浴頭面手足勿浴背如燈照

而無起勢則必添湯久浴使透徹肌肉踈通內外
令毒氣隨煖氣而發也此藥升提開豁萬竅枯者
轉潤白者轉紅陷伏者自起
矣冬寒則溫房內浴之

樣法

痘瘡觸犯穢汚痒痛者焚辟穢散熏之更以胡荽
酒洗瘡現化下蘇合香元防現懶門○痘兒左右當

令有胡荽氣能辟去穢惡之氣○常懸胡荽於房
中且以胡荽酒噴床帳及衣被○

甲乳香以辟惡氣○穢汚毒氣
入內成黑陷宜用再甦散

辟穢散

一名祛穢散亦名辟穢丹蒼朮細辛甘草
芎藭乳香降真香右等分爲麝末烈火焚之

再甦散

一名再甦丹明白礬地龍炒各等分右爲末
每取五分以小猪尾血一椀斗許同新汲水

調下

痘瘡諸證

有聲音咽喉痛腰腹痛驚搖嘔吐泄瀉痰喘
煩渴腹脹自汗痒痛斑爛寒戰咬牙失血尿

澁便秘倒靨黑陷護
眼滅癍凡二十一條

聲音

瘡已出而聲不變者形病也瘡未出而聲先變者氣病也。○聲出肺與心或感風寒或多啼氣噎

不間瘡已出未出失聲者身溫則解毒防風湯。上身體冷則內托散倍桔梗。○如漿滿聲啞者

肺氣絕也不治。○瘡出不好聲啞者亦死。

咽喉痛

瘡出咽喉痛宜消毒飲。○瘡出如聖飲。○咽乾

入軍用紫雪。○或吐或常乾嘔者危。○如聖飲。○若水漿不入或吐或常乾嘔者危。○如聖飲。○若水漿

二便閉者反吉。○瘡生於口舌瘡爛不能吮乳。○宜

如聖飲

麥門冬、桔梗、各一錢、鼠粘子、甘草、各

腰腹痛

凡發熱欲出痘腰腎痛急服神解湯。○發熱時腹中大痛

腰如被杖及出痘乾燥者死。○瘡初出便作腰痛見紫黑點者多死。○瘡初出便作腰痛

臨證消息。○痘疹必先腹痛，蓋痘子先自腸胃中出，然後發於外。宜升麻、葛根、湯、黠、靨、加減紅綿散。○方綱：「○發熱時，腹痛或腹脹者，由毒氣與外邪相薄，欲出而不得，出宜參、蘇、飲、黠、靨、去、人、參、茯苓、加縮砂、表之、鑿、○收、醫、時、腹、痛、散、○痘、疹、在、中、腕、乃熱毒凝滯，瘀血作痛，宜手捻散。○痘疹出不透，腹痛甚，或黑陷，宜蟬退湯。」

手捻散

鼠粘子、白芍藥、大黃、桃仁、各六分、紅花、四分、桂枝、二分、半、右剉作一貼，水煎服。○

蟬退湯

蟬殼二十一分、一箇甘草一錢、半、右剉水煎服。○為末，每錢一錢，白湯調下，腹痛立止，而出透神效。

驚搐

欲發瘡疹，先身熱驚跳，搐搦非驚風，宜服發散藥，加減紅綿散是也。○痘毒驚搐，心肝熱也，瀉肝。

則風自去，宜瀉青丸。○痘者輕先，痘後驚者逆。○赤散功觀。○發熱時發驚者，痘在心經而出也，乃為吉兆。○痘未出先發，搐是無外邪，宜加減紅綿散。○痘發。

稠密毒熱內熾或倒靨黑陷時作搐搦宜用猪心龍腦膏子方現鱣陷

加減紅綿散
麻黃荊芥穗全蝎天麻薄荷紫草茸同
散各五分右剉作一貼入葱白一莖同

煎服

嘔吐

上凡顯痘疹若自吐瀉者不可妄治而多吉謂邪氣上下皆出也

○吐瀉喘渴而吐者毒已出目直視大便流腸垢者死

並作宜用定中湯加木香丁香肉豆蔻煨薑下利

定中湯

沙石者胃氣止吐瀉神妙取真正黃色土不雜

定飛雄黃末一錢少加砂糖溫服二服立止

泄瀉

痘出後極忌泄瀉起脹時尤忌○痘瀉急用保元

湯坊見加肉桂白芍藥煎服腸滑者肉豆蔻煨一
箇乳香一豆大為末糯米飲調下
澤不起發根窠不紅或瀉而渴或腹脹或氣促是

表裏俱虛宜異功散煎水吞下肉豆蔻丸○腹脹
瀉渴乃胃中津液少也宜用木香散○泄瀉頻
多津液內耗血氣不榮其痘雖起發必不能靨宜
木香散救之○起脹時泄瀉則內氣虛脫瘡必

陷伏宜用
固真湯鑒

異功散

治痘靨之際頭溫足冷腹脹渴瀉如寒戰咬
才腹脹足冷過膝者用此救之木香當歸各

三分半桂皮白朮白茯苓各三分陳皮厚朴人參
肉豆蔻煨丁香各二分半附子炮半夏各一分半
右剉作一貼入薑三棗二水煎服○此等
證亦多屬熱不可不察有熱則不可用

木香散

治痘瘡腹脹渴瀉木香丁香桂枝陳皮半夏
赤茯苓人參訶子皮大腹皮前胡甘草各三

分右剉作一貼薑三片水煎服
○冷證可用有熱則不可用

肉豆蔻丸

治痘疹泄瀉赤石脂白礬枯各七錢半白
龍骨肉豆蔻煨訶子肉各五錢木香縮砂

各三錢右為末麪糊和丸黍米大溫米
飲吞下一歲兒三十丸三歲兒百丸



固真湯治瘧瘧泄瀉黃芪人參白朮白茯苓白芍藥

煎服。○分右剉作一貼入糯米五十粒同水

痰喘前胡枳殼湯○痘出後痰盛喘急宜先用人參清肺散

九坊見降痰醫○痘痰用白附子杏仁煎水磨服

通乃胃氣上越欲絕故也以真黃土鼻邊聞之立

止翻○痘疹咳嗽氣喘乃毒攻肺脹也胃高聲啞

人參清肺散白朮黃芪紫苑地骨皮滑石各三分石

前胡當歸白芍藥知母赤茯苓

前胡枳殼湯前胡枳殼大黃赤茯苓甘草各

煨渴痘瘡煩渴飲水渴轉甚者乃脾胃虛津液少也宜

牙渴亦多屬熱不可不察若誤用則禍如反掌○
當齧而不齧煩渴腹脹泄瀉頭溫足冷速與木香
散救之○痘瘡煩渴切不可與冷水喫亦不宜與
蜜水紅柿西瓜梨橘等冷物若冷毒內攻腹脹喘
悶寒戰咬牙則難治○痘瘡者尾不可飲冷水
少與滾熟水則可若飲水過多濕損脾胃則氣血
凝滯不散故瘡痂遲落而生癰腫也○痘瘡發渴
乃氣弱而津液枯竭也宜保元湯坊見○加麥門冬
五味子煎服若不止參苓白朮散坊見○加乾葛天
花粉五味子煎服即止○痘渴宜紅花子湯加
鼠粘子煎服雖口中如烟起即解切不可用素湯
若大渴者定中湯坊見和砂糖服立止○痘瘡
煩渴乃毒火炎上也宜烏梅湯甘草湯○飲水過
多而尿少恐濕漬脾土成癰腫宜益元散○飲水過
之○血虛痘黑火動發渴者
難治凡虛證見渴者皆死○

紅花子湯

治痘渴及痘不快出紅
花子一合水煎服之

烏梅湯

治同上黑豆菉豆各一合
烏梅三箇右水煎服之



甘草湯

治同上甘草水煎服之

腹脹

腹脹由脾胃虛氣攻作也又脾虛則腹脹飲水多則亦作腹脹
散服之方見毒氣內陷而脹宜入齒散○腹脹不宜

食神昏者死

白汗

痘瘡初起自汗不妨蓋濕熱熏蒸而起故也甚者當以參芪止之防其難醫○痘出後切忌汗多

痒痛

血不榮肌腠所發痒也血和肌潤痒自不作○手足常搖動者將發痒也因食毒物及食鹽而痒四君子湯加酒炒芩連大黃微潤之○痘疹出多身痛叫喚及煩躁脹痛宜小活血散○痘痒通用蟬退湯痒甚水楊湯浴之坊見○又法鹽和百草霜水拌略炒燒烟熏之痒立止又蜜水調滑石末雞羽潤瘡上亦止○痛乃痘之善證初出時宜參蘇飲寒輕者消毒飲坊見起振貫膿時作痛

不妨。厚密難出。為痛寒折。宜參蘇飲。肉腠密。宜小活血。散。因食毒物。作痒。宜蟬退湯。坊見。百。花。膏。因。痘。痒。難。任。宜。糝。敗。草。散。坊。見。蕎。麥。粉。亦。好。○。因。虛。發。痒。遍。身。爪。破。宜。內。托。散。坊。見。去。挂。倍。白。芷。當。歸。木。香。氣。行。血。運。其。痒。自。止。○。痘。瘡。煩。痛。宜。硝。磺。硬。而。痛。宜。塗。酥。油。潤。之。猪。脂。亦。好。○。收。靨。時。通。身。發。痒。爪。破。無。膿。如。豆。殼。者。死。蠶。

小活血散 白芍藥為細末每

百花膏 白蜜畧用湯和時時

斑爛 痘毒出盛表虛難靨以致肌肉壞爛名曰斑爛膿

爛生蛆以帶葉柳枝鋪地上卧之或藉以芭蕉葉

又生水楊湯以見浴之○痘瘡斑爛煩痛或臭

膿水不乾宜白龍散○穢氣衝觸發痒爪破斑

爛宜服內托散坊見外用祛穢散坊見焚熏
擦破周身不能回水或痘靨濕爛淋漓粘淖並宜

甄陶散糝之最妙調○遍身臭
爛如餅搭目中無神者死

敗草散多年蓋屋上爛草晒乾細末糝之若
露感天地陰陽之氣善解瘡毒門

硝膽膏芒硝為末調猪胆汁之

白龍散黃牛糞晒乾火煨成灰取
中心白者綿裹撲傳之

甄陶散新瓦研為細末羅過絹包裹撲患處若
乾痂堆積內有審膿以鴨卵清調付

寒戰痘瘡黑陷必寒戰蓋黑者歸腎水惡證也
脾土不剋水故脾虛寒戰則難治○七日前寒

戰者表虛也咬牙者內虛也七日後寒戰者氣虛
也咬牙者血虛也氣虛用保元湯坊見寒加桂血虛

泄瀉保元湯加川芎當歸○當歸不醫
寒戰此屬虛寒宜異功散坊觀

用保元湯加川芎當歸○當歸不醫
泄瀉寒戰此屬虛寒宜異功散坊觀

交牙

齒上齒下齒相磨切有聲謂之齧咬牙即交牙也亦曰戛

牙門以下之此熱入胃府也錢仲陽曰痘黑陷口噤咬

乃熱毒入藏府也百祥丸治戛齒甚妙然太峻宜代以加味宣風散

失血

痘疹熱盛吐血衄便尿失血並宜犀角地黃湯二便

下血者亦死○起脹貫膿時便血而痘壞無膿者

死又九竅流血者亦死

尿澁

當消息小便澁者宜導赤散○痘毒內鬱

翹丹○上方見大便秘則通大便宜四順清涼飲炒

散紫草木通湯

人參蟬蛻散

人參蟬蛻甘草各五分右剉作一貼水煎服



紫草木通湯

紫草四分甘草二通人參赤茯苓糯米各

便秘

瘡疹用藥固有大權度大小二便不可不通一有秘結則腸胃壅遏脉結氣滯毒氣無從發泄目閉聲

啞者為肌肉鰓黑不旋踵而變矣。一日三四便為利。一便者為順。三四日不便為秘。一日三四便為利。一便者為順。三四日不便為秘。一日三四便為利。一便者為順。三四日不便為秘。

錢氏雖云瘡疹始終不可下。若有裏證及大便結者。安得不下。當歸丸。棗變百祥丸。防見四順清涼

飲。炒。選。而。用。之。○。痘。熱。壅。盛。便。閉。不。通。蜜。皂。丸。導。之。或。用。油。膏。法。潤。之。○。四。五。日。不。大。便。可

用肥嫩猪肉白水煮熟與兒食之。令瀉。府滋潤。大便秘。自通。瘡。亦易落。最妙。心。

當歸丸

連治痘瘡大便秘結。當歸五錢甘草二錢半黃

子乃入三七味末和勻作丸。菜豆大。米飲吞下。五七丸。漸加服。以利為度。藏。

蜜皂丸

蜜二錢三兩。熬如飴。糖入皂角末二錢。和勻。捻

角末和勻作錠。用之尤速效。鑒。

油醬法

治大便久不通香油清醬各一合攪令十分和勻以小竹筒挿入肛門內取油醬灌入竹

筒內令人吹之令漸入或以物推入肛內即通

倒靨

痘形陷伏倒靨者自其內傷氣虛而不能起發謂之陷伏當溫中托裏宜內托散保元湯

散若觸穢則辟穢散坊見熏解之○當出不出當

脹不脹當貫不貫當當不靨勻謂之陷伏倒靨○痘出或為風冷所折致水硬宜調解散

色將靨時如豆殼者因初起時飲水多其靨不齊俗呼為倒靨但服實表之劑宜保元湯

出不快及倒靨宜四聖散加味四聖散

調解散

青皮陳皮桔梗枳殼當歸紫蘇葉半夏川芎紫草茸木通乾葛甘草各三分人參一分半

右剉作一貼入薑三棗二水煎服

水楊湯

治陷伏倒靨不起浴之神效

黑陷

痘變不過陷伏倒靨黑陷斑爛四者而黑陷最危可不究諸○痘黑陷毒氣入裏心神昏悶宜和尾

膏○痘瘡黑陷毒鬱煩躁痰盛狂叫宜四齒散○觸犯穢汚毒入內黑陷者服再懸散辟穢散○

規吐○痘疹重者十活四五黑者十難救一其候寒戰○咬牙或身黃腫紫急以百祥丸或棗變百

祥丸下之身熱氣溫欲飲水者可治如惡寒不已身冷出汗耳尻反熱者死蓋脾能勝腎故身熱欲

飲水脾不勝腎故惡寒身冷腎主黑陷故也○未絞一齊黑者為黑陷已絞而不齊黑者為將靨穢

○青乾黑陷身不大熱大小便澀則熱在內也宜用宣風散加味宣風散○痘瘡初出光壯忽

然黑陷心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神○痘瘡不速治則毒入藏必死宜回生散龍腦膏子○痘瘡黑陷

宜加味四聖散更以胡荽酒噴其身○痘瘡黑陷則用獨聖散甚則宜加味宣風散○痘瘡黑陷

猪尾膏龍腦膏子無比散無不驗○痘瘡黑陷危惡至死宜四齒散○黑陷狂躁煩渴熱毒太盛

宜加味六一散○黑陷發搐目直喘急宜用周天宜用二角飲罐○

散門○痘瘡倒靨黑陷宜用麻黃湯斡○痘黑陷悶亂神昏者死又目閉無魂者死不治

猪尾膏

治痘瘡陷伏倒靨不起發或毒氣入裏黑陷危惡者龍腦一錢刺取小猪尾尖血和丸小

豆大淡酒或紫草飲化下熟盛則新汲水化下神驗蓋猪尾無一時休息取振掉發揚之意也

四齒散

治痘不紅不起發或黑陷焦枯人齒猫齒狗齒各等分盛砂鍋內火煨候冷研為細

末每取五五分熱酒調下一二歲兒服二三分五六歲兒服四五分取效如神蓋黑證屬腎四齒亦屬

腎故能發腎毒又猫齒能解熱毒若無猫齒只用人齒亦可但不如四齒全方

百祥丸

治痘紫黑陷伏寒戰口噤憂齒危證紅芽大戟不以多少陰乾漿水煮軟去骨晒乾復納

汁中煮汁盡焙乾為末右水丸黍米大每一二九研脂麻湯下此方太峻宜代以棗變百祥丸加

味宣風散

棗變百祥丸

治痘黑陷及大便秘結紅芽大戟去骨一兩大棗去核二十枚右水二盞同煎



水盡為度去大戟不用將棗肉作丸如法服之蓋大戟性峻以棗變者緩其性也

宣風散

治痘青乾黑陷煩渴腹脹而喘二便赤澁乃熱蓄於內宜服黑丑四兩取頭末一兩半生

半炒陳皮甘草各二錢半檳榔兩箇右細末二歲兒服五分四五歲已上兒一錢蜜湯下

加味宣風散

治同上即宣風散加青皮二錢半也依上法服之先下黑糞次下褐糞後以四

君子湯加厚朴木香糯米煎服和胃良久糞黃瘡自微出又以胡荽酒上方見實身即發起

回生散

生人齒小兒齒自落者佳火煨研為細末每箇作一服淡酒調下入麝香少許尤妙

黑陷甚則用人齒五分羌活一錢穿山甲炮麝香各少許為末每一錢麻黃薄荷湯調下一服便起

凡人齒不可過用一錢過則陽盡出表急以四君子湯加芎歸救之

不快或倒靨黑陷○錢氏方用溫酒調下雲歧子方用升麻紫草湯調下凡痘瘡最怕麝香與酒

氣然則只用紫草湯自好

龍腦膏子

治痘瘡未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神或已發而倒靨黑陷不速治則毒入藏

必死梅花腦子一錢研細滴猪心血和丸如豆子大每服一丸并華水化下心煩狂躁紫草湯化下

黑陷溫淡酒化下服畢少時心神便定得睡瘡復透活○一名猪心龍腦膏

獨聖散

治黑陷氣欲絕穿山甲取前足及紫上者炒研為末木香煎湯入酒少許調五分服入麝

香少許尤妙

無比散

治黑陷焦枯熱毒內熾惡候朱砂二錢半牛黃麝香龍腦膩粉各二分半為細末新汲

水入小豬尾血三五點同調服小兒二分半大兒五分得睡後利下惡物便安

四糞散

治倒靨黑陷危惡者童男黑貓黑犬黑猪各一俱取未破陽雄者先於重九日各置淨室

中勿雜食收其屎陰乾至臘月初八日日未出時火煨存性為細末每用一錢蜜水調下

倉卒無此藥只取無病小兒糞燒灰以蜜水調下○一名無價散一名捷效化毒散



散

二角飲

治痘焦乾黑陷身熱如火犀角羚羊各等分并水濃磨取汁服有回生之功

周天散

治黑陷發搐目直喘急蟬殼五錢地龍一兩為末每二錢研乳香湯調下

麻黃湯

治倒靨黑陷麻黃去節五錢煎沸去上沫再煎去三分之一去滓乘熱服神效

一方

治黑陷牛黃清心元半丸并水調下

護眼

痘瘡盛發先用此藥則痘不入眼為害宜消毒飲

上回漿時眼腫不能開者以水濕絹巾拭去膿尿

略用手拊攀開眼必損雙目宜清解內毒以預防用

消毒飲犀角地黃湯

黃栢膏

一名護眼膏一名神應膏黃栢一兩甘草四兩紅花二兩菜豆粉一兩半右為末清油調

從耳前至于兩眼
四畔厚塗之

胭脂膏

乾胭脂蜜調塗兩眼
則痘不入眼

一方

痘初出鼻粘子為未水調
貼額門上則痘不入眼

滅癰

若不纔着痂即遲揭則瘡痂硬必隱成癰痕
若不纔着痂即遲揭則瘡痂硬必隱成癰痕

痂頻以酥油或白蜜潤之可揭即拔血出無妨若
乾硬必成癰痕○痘將靨乾硬而痛宜以真酥潤

之無酥則猪脂煎汁代之○痘痂雖落其癰猶
黯肉起而或凹或凸當用滅癰散

落後宜用滅癰散如膏每日塗瘡上○或用稀痘湯
粉一錢右研如膏每日塗瘡上○或用稀痘湯

○密陀僧末臨卧
塗面明朝洗去

滅癰散

細部粉一兩
細煉猪油調和塗瘡上日三次

蜆子水

痘後以此洗面漸生肌肉無癰痕取活蜆子
不以多少以水養五日每日取此水常洗手





面

稀痘湯

即秘傳稀痘湯也。凡痘收靨時，取此湯微溫洗面，則無癰痕。洗半面，則半面無癰痕。神效。

坊見

痘後雜病

痘疹愈而再發，或氣虛稟弱，坐卧振搖者，宜用保元湯。坊見。○愈後忽遍身青黑，口噤，搖。

搦此氣虛感風，宜用消風散。○愈後非時發，搖目，竄面赤，乃心熱挾痰，宜用抱龍丸。坊見。○

愈後餘瘡塞鼻，中不得睡，卧宜用木筆花散。○愈後心痛，不可忍，此餘毒歸心，急服乳香散。○

○痘愈後失音，宜用天花散。○痘愈後喉腫，走馬疳，牙齦腐爛，宜付搽牙散。○痘愈後咽喉腫。

痛，宜服七味甘桔湯。○痘餘毒肝虛，則入眼目，肺虛，則為疥癬，或為癰癤，而發在骨節、腎之虛也。

發在肌肉，脾之虛也。或在筋，或在頭，或在面，或牙

齒疳，蝕或咽喉腫痛，宜服解毒藥，消毒飲，三豆飲。

之類。方

觀。方

木筆花散

辛夷花細末加麝香少許以
葱白蘸入鼻中數次即通

乳香散

乳香二錢水
一盞煎服

天花散

天花粉桔梗使白茯苓訶子肉石菖蒲甘草各
等分右為末用水調半匙在碗內外以小竹

束點火在碗內煎服

擦牙散

白梅肉燒存性白礬枯各二錢半八中白
錢右為細末先以韭菜根老茶濃煎水雞

羽蘸洗去腐爛惡肉至見鮮血乃可藥日三次
至喉中者用小竹筒吹藥入雖牙齒爛落口唇穿

破付藥皆愈但鼻梁
發紅點則不可治

七味甘桔湯

甘草桔梗各五分防風玄參鼠粘子
升麻射干各三分右剉水煎服

痘後諸疾

有痘後醫膜痘後癩疾凡三條

痘後醫膜

痘後餘毒入眼生醫膜遮睛用瀉青丸五粒
大效初覺易治每取二丸或三丸以竹葉煎



和砂糖化下微利神效。瘰癧○瘰癧入眼生翳膜宜用

宜密蒙花散通聖散。○瘰癧入眼生翳膜宜用

蟬猪散半年內者一月取效。一年者不治。○瘰癧

後目生翳但活血解毒則疼痛自止。○瘰癧

不宜點藥蓋毒氣自藏達外。○瘰癧

○無翳但眼目無光者過百日氣血復則自明。○瘰癧

痘後眼腫痛或生赤眵或白膜遮睛。○瘰癧

易治若暴遮黑睛多致失明。宜用地黃散。○瘰癧

物睛凸出不宜二仙散。○瘰癧

坊見眼腫不開黃連末調雞子清貼兩太陽穴及

兩足心。○瘰癧

但瞳子不陷者。○瘰癧

宜用蟬菊散羌菊散。○瘰癧

明散無用吹雲散入耳。○瘰癧

密蒙花散。○瘰癧

濕紙裹煨熟空心。○瘰癧

以米泔爵下。○瘰癧

通聖散。○瘰癧

錢白菊花葉豆皮穀精草各等分。○瘰癧

乾柿一箇米泔一盞同煎候泔盡只取柿

食之日
三

蟬猪散

蟬殼一兩猪懸蹄甲二兩八錢半右爲細末一歲兒

取三分三歲兒五分漿
水調服日三夜一

地黃散

生地黃熟地黃當歸防風羌活蟬殼犀角木
賊藜精草白茯苓大黃各一錢玄參五分木

通甘草各二分半右爲末每
取五分以羊肝煮汁調服

二仙散

仙靈脾威靈仙各一錢
右剉作一貼水煎服

决明元

石决明煨川芎黃栢各一兩蒼朮五錢右爲
末以兔肝和丸茶豆大米泔下三十九無兔

肝代以
羊肝

蟬菊散

蟬殼白菊花各一錢右
入蜜少許水煎服之

羌菊散

治痘後生醫膜疼痛羞明羌活蟬殼蛇蛻防
風甘菊藜精草木賊梔子白茯苓大黃黃連



甘草各等分右為末每
一錢清米泔調下

通明散

當歸 川芎 赤芍 藥生 地黃 防風 乾葛 甘菊 天
花粉 蟬殼 各二分半穀精草五分右剉作一
貼水煎服

吹雲散

黃丹 水飛一錢輕粉三分龍腦一釐右為末
以鵝翎管吹入耳內如左眼病吹入右耳右
眼病吹入左耳一日三次無服
通明散宜早治之久則難治

兔屎湯

治痘後生腎障兔屎焙為末
每錢茶清調下最妙

四皮飲

治痘後生腎菜豆黑豆赤小豆水浸取皮各
半錢新採桑白皮一錢右剉煎水調下蟬菊
散最妙
○生桑白皮能
瀉肺膜不生腎便退

點法

治痘後腎膜生鱗魚倒懸刺項下取血黑腎上
最妙
○痘後腎雖云不宜點藥惟此最妙

痘後癰癤

凡痘癰必手足及脉絡之處或有紅腫或
有硬痛處皆發癰之兆也痘未愈則不須治

○痘毒流注脉絡輕者結核瘡癰而已甚者頭面

胷脇手足肢節焮腫作痛宜用消毒湯○痘癰膿

血不收宜用斂肌散○痘後生疳瘡疥癰宜用金

華散○痘疹餘毒未殄頭面身體多生癰癤宜

用犀角化毒丹○痘疹餘毒未殄頭面身體多生

止若不治則多潰爛○痘癰鍼後成瘡人宜用雄黃散

綿璽散○痘癰初起紅腫時黑紫赤○三豆醋浸

研取汁以雞羽蘸刷上隨手退消神效○痘後癰

毒腫痛宜消毒飲方見心勝膏○痘靨落後

餘毒不盡變成癰癤苦痒臘猪油塗之神妙○

消毒湯

赤芍藥連翹各一錢甘草節桔梗各五分貝

母忍冬草白芷瓜蒌根各三分剉作一貼

斂肌散

黃連黃栢地骨皮五倍子甘草

金華散

黃丹黃栢黃連大黃黃芪各三錢輕粉麝香

犀角化毒丹

治痘疹餘毒未解頭面身體多生癰癤

一兩連翹玄參各六錢生乾地黃酒洗赤茯苓

粘子微炒各五錢焰硝犀角鎊甘草各三錢青黛

雄黃散

雄黃一錢銅綠二錢右為末蜜和每兩分作

綿蠻散

綿蠻一箇須用出蟻空者以生白礬末填滿其中炭火燒令礬汁盡取出研細乾糝之

必勝膏

馬齒莧搗取汁猪脂白蜜右等分合和熬膏塗之

痘後痢疾

痘後下痢膿血或下腸垢宜用犀角地黃湯

赤膿血宜服

薤白湯

薤白切半盞豆豉一盞山梔子十枚去皮右水煮薤白爛去滓溫服

附孕婦痘瘡

孕婦發痘瘡宜內托散上方見甚宜參蘇飲去

桂加香附烏藥胎動宜安胎散

罩胎散

赤茯苓 白朮 當歸 赤芍 藥柴 胡乾 葛人參 桔梗 條芩 防風 陳皮 荊芥 枳殼 紫草 阿膠 白芷

川芎 縮砂 甘草 各三分 右剉作一貼 入糯米百粒 柿蒂七箇 苧根七寸 瓜蒂一箇 以銀器用荷葉蓋

覆水煎空 心服無銀器以砂 罐煎之 荷葉雖無不妨 齏

安胎散

人參 陳皮 大腹皮 白朮 當歸 川芎 白芍 藥香 附子 童便 炒縮砂 紫蘇 葉赤 茯苓 甘草 各三

分 右剉作一貼 入燈心七 葉米百粒 同煎服 齏

附癰疹

有色點而無顆粒者曰癰 浮小而無顆粒者曰疹 紅痕如錦紋或如蚊跡 熱極則發疹

者如粟米微紅 隱隱皮膚不出 作痒全無腫痛 麻子最微 隱隱如麻子頂平軟不碍指 即有清水

痘多挾疹 同出麻亦多挾疹 同出故曰痘疹 麻疹 癰疹屬五藏為陰 難出難靨 麻屬六府為陽 易出

易靨 癰疹遍身無空處 初熱三日發 出起脹共三日 狀如 麻子

而又沒而又出 沒一周時許 重者遍身 癰脹 眼亦封閉 有赤白微黃色 不同仍要紅活 最嫌黑





脂○麻疹雜證與痘瘡大同但始終藥宜清涼○
 疹○以升麻葛根湯加蔥白紫蘇葉乃麻疹○
 初起之神方也或用蘇葛湯亦佳或以加味敗毒
 散坊見表之汗後身凍紅痕自滅○麻不出而喘
 者死○變成黑癰者亦死○麻後後餘毒內攻循衣摸
 床謔語神昏者亦死○麻疹當以蔥白湯飲之
 其麻自出如渴只宜蔥白湯以滋其渴使毛竅中
 常微汗潤澤可也過三日不沒者內有實熱犀角
 地黃湯舂解之○○癰駁疹毒之病是肺胃熱
 毒熏發於皮膚狀如蚊蚤所咬故謂之赤癰今俗
 謂之紅疫毒疫宜用
 葛根麥門冬散

蘇葛湯

紫蘇葉乾葛甘草各二錢白芍藥一錢半
 皮縮砂研各五分左右剉入蔥白二莖生薑三

片水煎
 服

葱白湯

生蔥去青葉取白根連鬚
 不拘多少水煎取汁服

葛根麥門冬散

石膏一錢葛根麥門冬各六分人參
 升麻赤茯苓各三分

劉水煎
服心丹

單方
十種

白礬 小兒臍瘡及臍中汁出不止枯白礬末糝之○
初生兒有皮膜如石榴膜累舌可以指爪刺破

令血出以枯白礬末敷之若不摘去兒必瘕

伏龍肝 治小兒赤遊丹毒行於身上至心即死取
為細末芭蕉汁或雞子白或井水調塗

胡粉 小兒卒患肚皮青黑不急治即死酒和
胡粉塗腹上乾則再塗又用灸法

臘雪水 治小兒熱癰狂啼小溫飲之
赤遊丹毒取水塗之

焰硝 治小兒火丹毒取硝納
湯中雞羽頻頻塗上

地龍汁 治小兒熱病癰瘡
取少許飲之

藍葉汁 殺疳虫治小兒壯熱疳取
飲之亦治丹毒入內

黃連

殺疳虫猪肚蒸搗為丸服○亦治鼻疳鼻下作瘡取為末付日三乾

蒲黃

治小兒虛熱蜜和作果食之甚益小兒乾

酸漿

除小兒食之能除熱有益乾

王瓜

封臍治小兒痢疾良方王瓜藤經霜晒乾燒存性為末香油調納臍中立效

使君子

殺小兒疳虫及蛔虫寸白取中仁食之虫即下乾

天南星

治驚風聲啞不能言及諸病後不能言南星一箇去皮臍泡為末三歲兒半錢或一字以

猪膽汁調下即能言神效

篇蓄

治小兒蛇虫痛煮汁令濃飲之虫即下取汁煮粥服亦佳乾

芋根

治小兒惡毒瘡五色無常芋根煮湯浴日三四乾

五加皮

治小兒三歲不能行取皮細末每取一錢粥飲調次入好酒少許服日三便行走乾

竹葉治小兒驚熱煎湯飲之○

柳絮兒多積可作鹽極柔軟宜與小兒

龜尿治小兒龜背取尿

鯽魚鼻中三五日差○頭瘡口瘡取頭燒灰為末塗

之

露蜂房不通小兒赤白痢燒為末和服一錢日二乾

蟹小兒脫肛驚頭燒為灰付之乾○

蟹小兒解顯不合取蟹螯并白

蟬殼主小兒驚癇夜啼身熱為末和飲

鱉丹走皮中浸淫取

烏賊魚骨

治小兒痢為末以米飲調下

白殭蚕

治小兒客忤及臍風撮口口噤取二枚為末蜜和付唇內即差

蝸牛

入嬰兒驚風藥最勝細研入藥和用

蟾蜍

治小兒疳積口瘡燒為灰和米飲服

牡鼠肉

主小兒疳疔瘡口瘡燒為末付之

雄鼠糞

治小兒齒不生取三七粒每日用一粒搯齒齦上二十一日齒當出其兩頭尖者是雄糞

也

小鰕

小兒赤白遊疹丹毒取溝渠中小鰕生搗碎付之

蛇蛻

主小兒一百二十種驚癇燒末猪脂調付

蜘蛛

主小兒大腹丁奚三年不能行者燒熟啖之

蛭蚓

治小兒丹毒流腫及月蝕瘡
取地龍糞水和塗之妙

蜈蚣

初生小兒口噤不開不吮乳蜈蚣
炙為末猪乳二合調半錢灌服

水蛭

小兒丹毒及赤白遊疹用
法取水蛭吮出惡血最妙

雀瓮

治小兒慢驚天漿子鰓雀白殭蚕全蠋各三枚
為末麻黃煎湯誦服一字神效。驚癇取汁灌

蛙

治小兒熱癆瘵瘵瘵碎付之。赤白痢
及泄瀉煩熱或煮或煨食之妙

壁錢

治小兒吐逆取二
枚煮汁飲之

栗毛殼

主小兒火丹及五色
丹栗殼煮汁洗

蒲萄

主痘疹不出食之盡出
或研酒服之亦佳

乾柿

和米粉作餅與小
兒喫治秋痢

梨

治心藏風熱昏憒燥悶生梨取汁入米煮粥食之

胎麻

生醫付小兒頭瘡取汁飲之

赤小豆

治小兒丹毒及詐肥軟癰搗為末和雞子白塗之逐手即消

麥實

治小兒頭瘡搗為末和雞子白塗之

冬瓜仁

主慢驚風或末服或煎服皆效

薄荷

主小兒驚風壯熱又治風涎為切要之藥水煮熟取汁飲

馬齒莧

主小兒疳痢煮熟和五味空心食之

芥子

治痘出不快色不紅潤宜內服紫草乾則再塗

紅快出

雞腸草

治小兒赤白痢搗取汁一合和蜜服之甚良

水芥

治小兒暴熱及霍亂吐利搗取汁服之或煮取汁飲之

人爪甲

小兒初生便多驚剪取父母兩手爪甲燒為灰麩糊和丸麻子大井水下

亂髮灰

治小兒熱瘡取亂髮雞子大於銚上熬令汁出塗之甚妙

雞子

治小兒疳痢及休息痢雞子殼末和猪脂付之煎餅與食

白鴨

主小兒熱驚癇頭生瘡腫取肉和葱豉煮汁飲之

鵝毛

取輕茸細毛夾布為褥偏宜覆小兒無辟驚癇蓋柔而性冷故也

夜明砂

治小兒無辜疳及諸疳夜明砂炒為末入飲食中任意與食

鷓鴣屎

主小兒疳蛔取屎研為末炙猪肉點與啖有奇效

鵲鴝

治小兒疳痢下五色取鵲鴝炙熟朝朝食之甚補下止痢

百舌鳥

治小兒久不語取肉炙食之即今之鸚鵡也一名反舌

鍼灸法

小兒初生癰疽撮口諸藥不效然谷鍼八三分或灸三壯立效

上入幾際三分宛宛中灸三壯炷如小麥大又取百會癰脈

發治陽蹇申脈夜發治陰蹇兩蹇主之男陽女陰晝○急慢驚灸印堂○急慢驚風危極不可灸者

當兩乳與黑肉上男左女右灸三壯○次灸幾際眉心額會各三壯○手足大指當甲角以物縛兩

手作一處以艾騎縫灸男近左邊女近右邊半甲半肉之間灸三壯先脚後手亦可治陰陽諸癰

炷如小麥大○慢驚慢脾逆惡證候諸藥不效者如有大衝脈則取百會穴灸之神效○小兒

卒然腹皮青黑而死灸臍上下左右去臍各半寸并鳩尾骨下一寸凡五處各灸五壯仍酒和胡粉

塗腹上乾則易○小兒龜背灸肺俞膈俞各三五壯止炷如小麥○小兒龜背取兩乳前各一

寸五分上兩行三骨罅間凡六處各灸三壯炷如小麥春夏從下灸上秋冬從上灸下若不依此法

灸之無效○頭門不合臍上臍下各五分二穴各灸三壯灸瘡未發先合○小兒瘳氣中腕畜

門各灸七壯○灸癰法穴在小兒背脊中自尾
骹骨將手揣摸脊骨兩傍有血筋發動處兩穴每
一穴用銅錢三文壓上穴上以艾炷安孔中各灸
七壯此是癰之根貫血之所也○小兒瘡久不
愈內庭灸一壯大顛百會各灸隨年壯○小兒
霍亂男左女右第二脚指上灸三壯即愈○小
兒雀目灸兩手大指甲後一寸內廉橫文頭白肉
際各一壯○瘡眼灸合谷一壯○小兒脫肛灸
尾骹骨尖上一壯又灸
臍中三壯百會七壯○

東醫寶鑑雜病篇卷之十一