文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,普濟方,卷三十一
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書
普濟方卷三十一
明 周王朱橚 撰

腎臟門

腎臟虛冷氣攻腹脇疼痛脹滿 附論

夫腎臟虛冷氣者由腎氣不實下焦久寒陽氣外虛陰氣內積邪冷之氣在於臟腑積稽不散上攻於脾脾虛受乏則脹冷搏於陰經則痛也而又足少陰支脉行於兩脇令腎與脾俱虛為邪冷所攻正氣與邪氣相擊故令腹脇疼痛脹滿也

逆兩脇虛脹不思飲食四肢乏力

方

蕚澄茄散 出聖惠方 治腎臟虛冷氣攻心腹疼痛或時吐

蕚澄茄 木香 人參 去蘆頭 肉桂 去皺皮 肉豆蔻 檳榔 訶梨勒皮 陳橘皮 湯浸去白穰焙各一兩 丁香 硇砂 去皮乾薑 炮裂剉 京三稜 微煨剉 赤茯苓 白朮 各三分 附子 一兩半炮裂去皮臍 赤芍藥 甘草 炙微赤剉各半兩

列印日期/時間：02/05/2005 04:52:24
列印頁數：1
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右搗細羅為散每服不計時候以熱酒調下二錢

沉香丸 出聖惠方 治腎臟虛冷氣攻心神悶亂四肢逆冷腹脇脹滿疼痛喘促嘔吐

沉香 木香 檳榔 苦楝子 桂心 蘼香子 當歸 炒 劉微 肉荳蔻 去殼 桃仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 阿魏 麵裹煨麵熟為度 蓬莪茂 各一兩 丁香 乾薑 炮裂劉 乾蝎 微炒 吳茱萸 湯浸七遍焙乾微炒 青橘皮 湯浸去白穰焙各半兩 硫黃 一兩半細研水飛過

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下三十丸

五味子丸 楊子建萬金護命方 治腎臟虛冷腹脇疼痛脹滿非時足冷陰痿行步無力

五味子 續斷 牛膝 酒浸切焙 附子 炮裂去臍皮臍 桂 去麤皮 杜仲 去麤皮劉 蘼香子 炒黑 白茯苓 去皮 芎藭 山芋 當歸 切焙劉 檳榔 一方無檳榔用木瓜 吳茱萸 湯洗焙炒 細辛 去苗葉 青橘皮 湯浸去白焙各一兩一方用川椒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸空心鹽湯下

硫黃丸 出聖惠方 治腎臟虛冷氣攻腹脇脹滿發渴疼痛足脛逆冷骨節痠疼食少無力

硫黃 細研 硼砂 細研 薑澄茄 檾香子 補骨脂 石斛 去根木香 丁香 肉荳蔻 去殼 桂心 當歸 劉微炒 檳榔 吳茱萸 湯浸七遍焙乾微炒 各一兩 何首烏 一兩半 麝香 半兩細研

右為末入研了藥令勻以酒煮麵糊和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以温酒下十五丸

補腎湯 出聖濟總錄 治腎臟虛冷氣攻兩脇下脹小腹急痛牽引腰背

磁石 水飛研淘去水而汁 附子 炮裂去皮臍各二兩 黃耆 劉 五味子 當歸 切焙 白茯苓 去黑皮 人參 沉香 各一兩 桂 去麤皮一兩半 陳橘皮 湯浸去白焙三分 蜀椒 去目并閉口炒出汗 枳殼 去穰各半兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右咬咀每服三錢水一盞入生薑一棗大拍碎棗三枚擘破煎至六分去滓食前温服

沉香散 出聖惠方 治腎臟虚冷氣攻腹脇疼痛或多嘔吐不思飲食兩脇脹滿四肢羸瘦

沉香 白荳蔻 去皮京三稜 微炒劉 桂心 當歸 劉微炒 木香 吳茱萸 湯浸七遍焙乾微炒各半兩 青橘皮 湯浸去白穰焙三兩 厚朴 去皮膞 劉炙 白茯苓 白朮 各三分 高良薑 劉 附子 炮裂去一兩去臍皮塗生姜汁炙令香熟 檳榔 三錢

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時熱服

華澄茄丸 出聖惠方 治腎臟虚冷氣攻心腹疼痛脇肋脹滿

華澄茄 木香 沉香 乾蠍 微炒 白朮 當歸 劉微 青橘皮 湯浸去白炒各半兩 桂心 訶梨勒 煨用皮 檳榔 各一兩 蘘香子 蓬莪朮 高良薑 劉各三分

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熱生薑酒下二十丸

葫蘆巴丸 出聖惠方 治腎臟氣虛下膲積冷氣攻腹脇脹滿臍下疼痛面色青黑足脛多冷

葫蘆巴 薤香子 硫黃 細研 附子 炮裂去皮臍各一兩 木香 研 桂心 當歸 炒劉微 阿魏 研入 青橘皮 湯浸去白穰焙 沉香 二兩湯浸去皮尖 白荳蔻 去殼各半兩 桃仁 雙仁別研如膏

右為末入研了藥令勻用好酒一升半先熬桃仁膏令稠拌和諸藥末搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以溫酒下二十丸

欽定四庫全書

普濟方

沉香湯 出聖濟總錄 治腎臟虛冷腹脇疼痛脹滿 沉香 細辛 去葉苗 續斷 木香 芎藭 當歸 切焙 甘草 炙劉 檳榔 劉 石斛 去根 牛膝 酒浸切焙 枳殼 去穰麸炒各半兩

右麄搗篩每服三錢水一盞煎至七分空心去滓溫服

檳榔散 出聖惠方 治腎臟虛冷氣攻心腹疼痛兩脇脹滿 檳榔 薤香子 桂心 當歸 劉微炒 芎藭 白荳

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蔻去皮木香青橘皮湯浸去白穰焙各三分丁香吳茱萸湯浸七遍焙乾微炒各半兩附子一兩炮裂去皮臍

右為散每服四錢水一中盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候熱服

薷香子丸出聖濟總錄治腎臟虛冷氣攻腹脇脹滿疼痛心氣喘悶手足厥冷

薷香子炒木香桂去麤皮檳榔劉去皮尖雙仁焙研成膏蓬莪茂煨劉各三分青橘皮湯浸去白焙萊菔子炒附子炮裂去皮臍各半兩厚朴去麤皮生薑汁炙一兩半

右搗羅九味為末入桃仁膏研勻以酒煮麵糊丸如梧桐子大每服三十丸空心食前温酒下

華澄茄煮散出聖濟總錄治腎臟虛冷氣攻腹脇疼痛脹滿煩倦

華澄茄甘草炙劉人參芍藥各一兩薷香子炒檳榔劉各三分乾薑炮阿梨勒皮桂去麤皮各半兩

右為散每服三錢水一盞煎至七分温服不拘時

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蘹香丸 出聖惠方 治腎臟虛冷氣攻兩脇脹滿腹内疼痛四肢不和

蘹香子 木香 桃仁 湯浸去皮尖雙仁別研為膏 桂心 蓬莪茂 槟榔 各三分 蘿蔔子 半兩微炒 青橘皮 湯浸去白穰焙半兩 厚朴 一兩半去麤皮生薑汁炙香熟 右為末以醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下三十丸

蘹香子丸 出聖濟總録 治腎臟冷氣攻腹脇疼痛脹滿

蘹香子 炒 蓬莪茂 煨劉棟實 煨去核 白术 訶梨勒皮 各一兩 丁香 一分 吳茱萸 湯浸焙乾炒半兩 桃仁 三分去皮尖雙仁研如膏 右搗羅七味入桃仁膏研勻煉蜜丸如銀杏大每服一丸温酒或鹽湯嚼下不拘時

異香散 出和濟方 治腎氣不和腹肋膨脹痞悶噎塞喘滿不快飲食不化噫吞酸一切氣痞腹中刺痛此藥能破癥瘕結聚大消宿冷沉積常服調五臟三焦和胃進食

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

石蓮肉 去皮一兩 蓬莪朮 煨 京三稜 炮 益智仁 炮 甘草 炒各六兩 青皮 去白各三兩 陳皮 去白各三兩 厚朴 去麤皮薑汁炙二兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚鹽一撮煎至七分通口服不計時候鹽湯點或溫酒調皆可服

木香湯 出聖濟總録

治腎臟虚冷氣攻腹中疼痛兩脇脹滿

木香 沉香 各半兩 青橘皮 湯浸去白炒 京三稜 煨剉各一兩

右麄濤篩每服三錢水一盞生薑三片棗二枚擘破煎至七分去滓温服空心

葫蘆巴飲 出聖濟總録

治腎臟氣冷腹痛嘔逆腹脇脹滿

葫蘆巴 炒 桂 去麤皮 當歸 切炒 檳榔 剉 厚朴 去麤皮生薑汁炙各三分

右麄濤篩每服三錢水一盞生薑三片棗二枚擘破煎至七分去滓温服

四肢少力不思飲食

葫蘆巴 白茯苓 去皮 舶上檳香 各一兩 肉豆蔻 去殼 木香 附子 炮裂去皮臍各半兩 沉香 三分

右�once咀每服三錢鹽一撮煎至七分去滓温服空心

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

食前

烏頭藘香子丸 出聖濟總録

治男子腎氣虛攻腹脇疼痛脹滿

烏頭 炮裂去皮臍 藘香子 劉炒 楝實 劉炒 當歸 切炒各一兩 木香 半兩 硼砂 研一錢

右為末和勻醋煮麵糊丸如梧桐子大丹砂為衣每服二十丸温酒下不拘時

檳榔湯 聖濟總録

治腎臟虛冷氣攻腹脇脹滿疼痛

檳榔 劉生 木香 各半兩 菴蔺子 炒各二兩 桔梗 炒各二兩 肉桂 去麤皮 附子 炮裂去皮臍各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓温服

巴附丸 聖濟總録

治腎臟虛冷腹脇脹滿

巴豆 一半兩 附子 炮裂去皮臍 硫黄 研各一兩 藘香子 炒三分 檳榔 劉去麤皮各半兩 桂 去麤皮 葫蘆巴 炒各一兩

右為末和勻酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸温酒或鹽湯下空心日午臨臥服

列印日期/時間：02/05/2005 04:52:27
列印頁數：9
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

荳蔻飲 聖濟總録 治腎臟虛冷腹脇脹滿

肉豆蔻 去殼 葫蘆巴 薤香子 炒 丁香 各一兩 沉香 三分

右麄擣篩每服三錢水一盞入鹽少許煎至七分空心食前去滓温服

葫蘆巴丸 聖濟總録 治腎臟虛冷腹脇脹滿

葫蘆巴 二兩 附子 炮裂去皮臍 硫黄 研各三分

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸鹽湯送下

艾葺丸 聖濟總録 治腎臟虛冷氣攻腹脇脹滿疼痛

木瓜 三十枚去皮核作瓮子 甘菊花 為末 青鹽 研各一斤

右將甘菊花并青鹽填滿木瓜瓮子内置籠牀内蒸以木瓜爛為度研成膏再入新艾葺二斤搜和作劑丸如梧桐子大暴乾每服三十丸空心食前米飲下

燒腎子 十便良方 治下焦虛冷臍腹撮痛心胷痞脹和元氣進飲食益胃

舶上茴香 川附子 官桂 川椒子 木香

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

胡椒　陳橘皮　巴戟　乾薑各半兩　京三稜一兩

右十味杵為末用豬腰子一對去筋膜切作片子以末二錢入葱絲少許鹽半錢温紙裹煨熟餌訖以酒或粥飯壓之須臾覺臍下煖甚妙

羊脊骨湯　主腎臟虚冷腰脊轉動不得

用羊脊骨一具嫩者捶碎爛煮和蒜薤空腹食之兼飲酒少許妙

鹿角屑散　主腎臟虚冷腰脊痛如錐刺不能動搖

用鹿角屑二兩熬令微黄搗末空腹煖酒服方寸匕日三兩服

治腎臟虚冷腰膝無力自覺渾身沉重懶行步無精神氣力小便餘瀝方　楊子建萬全護命方

菟蘼　杜仲　續斷　牛膝　石斛　狗脊去毛當

歸　五味子　芎藭　蒺藜　茯苓　附子火炮去皮

獨活　兎絲子　甘草　細辛　木香　官桂各一

分

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右細杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大每朝空心鹽湯
温酒任下三十丸
治腎臟虚冷内感寒邪睡中交鬼泄精方 楊子建萬全護命方
菓蘗半兩 去皮 杜仲 續斷 狗脊 去毛 芎藭 龍骨 木香 各一分 阿魏二錢用稀麵和成團焙令乾使 香茯苓 益智 獨活 天靈蓋酥炙黄黑色 石斛
右細杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯温酒下三十丸留末一半早朝入鹽煎空心去滓喫不要多喫丸藥也病效丸藥止更不喫

腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛 附論
夫腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛者由腎氣虚弱宿有冷疾或久坐濕地强力入水或食生冷過度觸冒風寒傷於腎經陽氣虚微陰氣獨盛邪正相擊故卒攻臍腹疼痛不可忍也

方
木香散 聖惠方
治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛脹滿壅悶

列印日期/時間：02/05/2005 04:52:28
列印頁數：12
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

木香 乾薑 炮裂剉 蘘香子 桂心 檳榔 桃仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 鷄舌香 蓽澄茄 青橘皮 湯浸去白穰焙各三分

右擣羅為細散每服不計時候以熱酒調下一錢

阿魏丸 聖惠方 治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛不可忍

阿魏 麵包煨麵熟為度別研 青橘皮 湯浸去白穰焙 附子 炮裂去皮臍 自然銅 細研各半兩 桂心 乾蝎 微炒 木香 檳榔 已上各三分 桃仁 一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃別研

右擣羅為末以童子小便二升入桃仁阿魏於銀鍋子內以慢火煎令稠入諸藥末和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下二十丸

沉香散 出聖惠方 治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛不可忍手足逆冷

沉香 二兩 附子 炮裂去皮臍 肉豆蔻 去殼各一兩 肉桂 去皺皮 蘘香子 蓬莪茂 青橘皮 湯浸去白焙 阿魏 麵包煨麵熟為度各三分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右擣細羅為散每服不計時候以温酒下二錢

蝉蜍散 出聖惠方 治腎臟虚冷卒攻臍腹疼痛不可忍及兩脇疼痛

蝉蜍 三十六枚頭足全擘一地坑子面闊四寸深五寸用炭火五斤燒坑子令通紅便淨去灰土用頭醋一升潑在坑子内候滲乾便匀排蝉蜍坑子底用一瓷碗盖之一宿取出 蘿蔔子 木香 各一分 胡椒 三十粒 檳榔 一枚去殼 肉荳蔻 一枚去殼

右擣細羅為散每服不計時候以熱酒調下一錢

桃仁丸 出聖惠方 治腎臟氣虚觸胃風寒冷氣卒攻臍腹

欽定四庫全書

疼痛

桃仁 湯浸去皮尖仁麩炒微黄 附子 炮裂去皮臍 硫黄 細研水飛過 檳榔 各三分 香子 木香 高良薑 剉各三分

右擣羅為末用煎醋浸蒸餅和丸如梧桐子大每服不計時候以熱酒下二十丸

硫黄丸 出聖惠方 治腎臟冷氣攻臍腹疼痛兩脇脹悶飲食不下

硫黄 一兩細研水飛過 木香 檳榔 桃仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒微

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃各半兩 青橘皮 湯浸去白穰焙 蘘香子 各三分

右擣羅為末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服以熱

酒下十丸不計時候服之

胡椒丸 出惠方 治腎臟冷氣卒攻臍腹撮痛不可忍

胡椒 木香 沉香 桂心 蜱蜍 各三分 阿魏 一分

麵裹煨麵熟為度

右擣羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以熱生薑

酒下二十丸不計時候服

硼砂丸 出惠方 治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛甚者

硼砂 三分 雄黃 硃砂 黃丹 微炒各一分 麝香 一錢 巴豆

十枚去皮心研紙裹壓去油

右藥都入於乳鉢内順手研半日用煎醋浸蒸餅和

丸如菉豆大每服以温酒下五丸不計時候服

阿魏丸 出惠方 治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛不可忍

阿魏 一分麩包煨麩熟為度 蜱蜍 一分微炒 木香 一分 肉荳蔻 一分去殼

桃仁 湯浸去皮尖雙仁炒微黃別研 硼砂 各半兩

普濟方

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,普濟方,卷三十一
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右擣羅為末入桃仁以醋煮麵糊和丸如菉豆大每服煎檾香酒下十五丸不計時候服

硼砂丸 出聖惠方 治腎冷氣卒攻臍腹疼痛日夜不止

硼砂 半兩 乾蝎 一分 微炒 桃仁 三十枚 湯浸去皮尖雙仁研如膏

右擣羅為末入桃仁同研令勻以酒煮麵糊和丸如菉豆大每服不計時候以生薑熱酒下三十丸

蕪荑丸 出聖惠方 治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛不可忍

蕪荑 半兩 木香 三分 銅綠 三分 蓽澄茄 半兩

右擣羅為末以醋煮麵糊和丸如菉豆大每服以熱酒下十丸不計時候服之

檳榔散 出聖惠方 治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛搐撮甚者

檳榔 一分 棘針鉤子 一合 微炒

宜服此方

定痛丸 一名乾蝎丸 出聖惠方 治腎臟冷氣卒攻臍腹疼痛至

半中盞更煎三五沸去滓不計時候稍熱分為二服

右為散都作一服以水一大盞煎至五分又入好酒

列印日期/時間：02/05/2005 04:52:29
列印頁數：16
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甚

乾蝎 三分 微炒

右擣羅為末以清酒及童子小便各一升同煎如稠膏丸如梧桐子大每服不計時候以温酒下二十丸

硼砂丸 出本草集驗方 治元臟虚冷氣攻臍腹疼痛

硼砂 一兩 川烏 去皮臍二兩生用 纖霞草 二兩

右三味為末與硼砂同研勻用一小沙罐不固臍慢火燒通紅赤熱將拌了硼砂入罐子内不盖口加頂蓋火一秤候火盡爐寒取出研與烏頭末同研勻湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服三丸熱木香湯醋湯下

夫人臟腑虚損腎氣不足則内生冷寒風邪之氣乘虚所侵入於足少陰之經風冷相搏伏留在臟久而不除攻於臍腹脹滿疼痛故謂之風冷氣也

腎臟風冷氣 附論

沉香散 出聖惠方 治腎臟風冷氣攻腰脊相引痛脚膝疼痺體虚無力服之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

沉香 黃耆 劉 石斛 去根 劉 人參 去蘆頭 各一兩 白朮 防風 去蘆頭 石龍芮 細辛 天雄 炮裂去皮臍 牛膝 去苗 草薢 劉 當歸 炒 劉 微 木香 杜仲 去粗皮炙微黃劉各三分 桂心 半兩

五味子

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服

硼砂丸 出聖惠方 治腎臟風冷氣腹脇疼痛四肢無力

硼砂 肉豆蔻 去殼 木香 檳榔 硫黃 細研水飛過 蛑 炮裂去皮臍 青橘皮 湯浸去白穰焙 肉桂 去皮 各一兩 丁香 阿魏 麩裹煨麩熟為度 桃仁 麩炒微黃 各半兩

右為末用無灰酒三升調藥末於銀鍋內以慢火熬看硬軟得所丸如梧桐子大每服食前溫酒下三十

丸

山芋丸 出聖濟總錄 治腎臟風冷氣胷中聚痰夜夢泄精腰膝無力小便頻數

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

山芋 車前子 韭子 炒令熟 兎絲子 附子 炮裂去皮臍 白龍骨 山茱萸 五味子 白茯苓 去皮 牡丹皮 石斛 去根一兩半 牛膝 酒浸切焙 桂 去粗皮各一兩 熟乾地 黃 焙五兩 肉蓯蓉 去皺皮酒浸切焙二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服四十丸煖酒下空心服

狗脊丸 出聖濟總録 治腎臟風冷氣腰膝疼痛

狗脊 去毛 附子 炮裂去皮臍各二兩 五味子 覆盆子 山芋

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服四十丸温酒送下空心食前服

附子丸 出聖惠方 治腎臟風冷氣腰脚疼痛頭目昏悶耳鳴腹脹四肢無力

附子 炮裂去皮臍 麋角霜 石斛 去根對 牛膝 去苗各一兩 五加皮 丹參 蛇床子 巴戟 桂心 海桐皮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

木香　蒿蒲　漢椒（去目及閉口者微炒去汗各三分）　七過濤碎細研水飛過　磁石（二兩醋淬）

右為末煉蜜和丸搗三二百杵丸如梧桐子大每日空心以温酒下三十丸晚食前再服

山茱萸丸（出聖濟總録）　治腎臟風冷氣腿膝無力小便數利

山茱萸　山芋　巴戟天（去心）　兎絲子（酒浸別搗研焙）　人參　天雄（炮裂去皮臍）　楮實　覆盆子　五味子（各一兩半）　菟蘼

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服四十丸煖酒送下空心食前服

黄耆丸（出聖濟總録）　治腎臟風虚冷小便多腿脚細弱漸漸羸瘦

牛膝（切焙）　桂（去粗皮各一兩）　熟乾地黄（焙二兩半）

黄耆（劉炙）　熟乾地黄（劉龍骨去土碎各一兩半）　枳殼（去穰麸炒）　肉蓯蓉（酒浸一宿別搗）　鹿茸（去毛酥炙）　兎絲子（酒浸一宿焙）　澤瀉（各一兩一分）

麥門冬（去心焙各二兩）　牡丹皮　石斛（去根）　五味子（炒各一兩）　桑

列印日期/時間：02/05/2005 04:52:30
列印頁數：20
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

螵蛸 二十一枚 炙

右為末煉蜜丸如梧桐子大每空心煎黃耆湯下三十丸

木香散 出聖惠方 治腎臟風冷氣腹脇脹滿心胷壅滯腰脚無力脾胃虛弱少思飲食

木香 三兩 白蒺藜 微炒去刺 蘼香子 羌活 赤茯苓 附子 炮裂去皮臍各三分 訶梨勒皮 一兩

桃仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 青橘皮 半兩湯浸去白穰焙 沉香 檳榔 各一兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

蘼香丸 出聖惠方 治腎風冷氣臍腹虛脹疼痛

蘼香子 附子 炮裂去皮臍 硼砂 天麻 木香 白附子 炮裂 白礬 燒令汗盡 阿魏 麩裹煨麩熱為度 自然銅 細研各三分

桃仁 二兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃 乾蝎 一兩微炒

右為末以酒煮麵糊和搗百餘杵丸如梧桐子大每服不計時候以生薑葱白煎酒下二十丸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蝉蜍丸 出聖惠方 治腎臟風冷氣攻心腹疼痛
蝉蜍 微炒 肉豆蔻 去殼各一兩 硼砂 木香 青橘皮 湯浸去白瓤焙 安息香 桃仁 湯浸去皮雙仁麩炒微 硫黄 細研 附子 炮裂去皮臍 阿魏 一分麩裹煨麩熟為度 磁石 二兩燒醋淬七遍搗碎細研水飛過
右為末用醋浸蒸餅和搗三二百杵丸如菉豆大每服不拘時候以熱生薑酒下二十丸

黄耆湯 一名十薑飲 治腎臟虛損風冷相搏在臍腹不散脹滿疼痛不已 方見補虛治風類諸虛門
乾蝎丸 出聖濟總録 治腎臟風冷氣攻腹脹痛腰脇拘急及膀胱冷氣疼痛
乾蝎 去土炒 肉豆蔻 炮去皮 青橘皮 湯浸去白焙 磁石 煅醋淬二 附子 炮裂去皮臍 桃仁 去皮尖雙仁別研作膏各半兩 阿魏 醋化開麩調作一兩 七遍各炙乾一分 木香 三分 安息香 八分
右除別研外為細末入研藥拌勻酒浸炊餅和丸如梧桐子大每服二十丸温酒下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

牛膝丸 出聖濟總錄 治腎臟風冷氣久積臍腹虛脹不消攻擊疼痛腰背相引拘急

牛膝 去苗浸焙 五加皮 劉 巴戟天 去心 羌活 去蘆頭 各一兩 附子 炮裂去皮臍 菖蒲 桂 去粗皮 各半兩 木香 各兩

右為細末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒下

木香湯 出聖濟總錄 治腎臟風冷氣攻臍腹脹滿疼痛

木香 桃仁 湯浸去皮尖雙仁炒研 各半兩 檳榔 羌活 炒去蘆頭

右為細末每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎七分去滓溫服不拘時候

沉香湯 出聖濟總錄 治腎臟風冷氣臍腹脹滿攻腰背相引疼痛

沉香 劉 五味子 細辛 去苗葉 防風 去又 黃耆 細劉 石斛 去粗皮根 蓯蓉 桂 去粗皮 各一兩

右麄搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗二枚擘破

青橘皮 湯浸去白穰焙 當歸 切焙 芎藭 烏頭 炮裂去皮臍 各一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

同煎七分去滓温服不拘時候

荳蔻丸 出聖濟總録 治腎臟虚損久積風冷臍腹滿疼痛不止

肉荳蔻 炮去皮 附子 炮裂去皮臍 蓬莪茂 炮 天麻 酒浸炙各一兩 乾蠍 去土炒各半兩 硼砂 别研一分 木香 檳榔 劈 乾

右内七味為細末入研藥拌匀酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸温酒下

加味宣風散 出直指方 治通利腎臟風氣

鷄心檳榔 三个 橘皮 桃仁 浸去皮焙 白芷 枳殼 製各半兩

牽牛 三兩重半 炒半生

右為末每服二錢蜜湯調下食前服

乾地黄丸 治腎家風又益精氣

以枸杞葉上蟲窠子曝乾為末入乾地黄為丸益陽事

腎瀝湯 治除風下氣彊腰脚明耳目除痰飲理榮衛永不染時氣諸風疾

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃耆 芎藭 茯苓 五味子 防風 澤瀉
獨活 玄參 人參 牛膝 各六兩 麥門冬 去心 地骨皮 各八兩 桂心 甘草 三兩炙 丹參 五兩
右切分作二十四貼著生薑一兩切杏仁十四枚去尖碎以水三升煮一貼取一升去滓澄清取九合頓服每日一貼晚間必氣下心胷空妙十服以後身力不可當常須護惜將養之以飲食補之每年春夏秋冬服一劑勝服腎氣丸二十劑永不患風氣先有諸病自然除差

腽肭劑丸 出聖惠方 治腎臟風虛冷氣溫脾胃思飲食安心志强氣力利腰脚補虛損

腽肭臍 一兩炙微黃 鹿茸 一兩去毛塗酥炙微黃 肉蓯蓉 一兩酒浸一宿 刮去皺皮炙乾 兎絲子 一兩酒浸三日曝乾別搗為末 陽起石 一兩酒煮半日細研水飛過 附子 一兩去皮臍炮裂 蘼香子 一兩 桂心 三分 山茱萸 三分去核 乾蠍 三分微炒 人參 三分蘆頭 石斛 一兩去根 苁蓉 一兩酒浸切焙 木香 一兩 補骨脂 一兩微炒 白朮 三分 蓽薢 三分

列印日期/時間：02/05/2005 04:52:32
列印頁數：25
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熟地黃 一兩
牛膝 三分 去苗
遠志 一兩 去心
鉛粉 一兩 細研
檳榔 一兩
硃砂 一兩細研 水飛過
麝香 半兩 細研

右為末入諸研藥令勻煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前以温酒下三十丸

治腎臟風虛腰膝冷痺眼生黑花耳內虛鳴四肢不舉飲食減少面色青黑 楊子建護命方

官桂 生使
附子 炮去皮臍 防風 獨活 補骨脂 炒 牛膝 菟蘇 當歸 芎藭 山茱萸 石斛 續斷 細辛 木香 巴戟 去心各一分

右細杵羅為末煉蜜和丸如梧桐子大空心鹽湯温酒下四十丸

治元臟傷冷及開胃 本草

附子炮過去皮尖搗羅為末以水二盞入藥二錢鹽及棗葱薑同煎取一盞空心服去積冷暖下元肥腸益氣酒食無碍

腎臟風虛耳鳴 附論

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夫足少陰之經者是宗脉之所聚也其氣上通於耳耳者腎之竅若經脉虛損氣血不足為風邪所乘入於耳脉則正氣否塞不能宣通邪正相擊故令耳虛鳴也

方

腎瀝湯 聖惠方

治腎臟風虛兩耳常鳴

磁石二兩搗碎水洵去赤汁以帛包之 巴戟 附子炮裂去皮臍 肉桂 去皺皮 熟乾地黃 各一兩 沉香 石斛去根劉 人參去蘆頭 五味子 桑螵蛸微炒 澤瀉 防

風去蘆頭 各半兩 牛膝去苗 山茱萸 各三分

右為散每服五錢水一大盞用羊腎一對切去脂膜入生薑半分每用磁石包子同煎至五分去滓空心及晚溫服

附子散 聖惠方

治腎臟風虛兩耳常鳴腰背痛强小便多利虛羸無力

附子炮裂去皮臍 熟乾地黃 桂心 沉香 白龍骨 各一兩 石斛去根劉 五味子 杜仲去粗皮炙微黃劉 人參去蘆

列印日期/時間：02/05/2005 04:52:33
列印頁數：27
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

頭續斷 牛膝去苗 黃耆劉 當歸劉微炒 木香各三分 磁石二兩搗碎水淘去赤汁

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前溫服

葛蒲散聖惠方 治腎臟風虛耳中常鳴或如風雨聲

葛蒲 附子炮裂去皮臍 桂心 熟乾地黃 沉香各一兩 人參去蘆頭 山茱萸 杜仲去粗皮 遠志去心 防風去蘆頭 天麻 石斛去根劉 黃耆劉各三分 磁石二兩搗碎水淘去赤汁以帛包之

右為散每服五錢以水一大盞入磁石包子同煎至六分去滓食前溫服

六分去滓食前溫服

肉蓯蓉丸聖惠方 治腎臟風虛耳內常鳴

肉蓯蓉酒浸一宿刮去皺皮炙令黃 鹿角膠搗碎炒令黃 兔絲子酒浸三日曝乾別杵為末 熟乾地黃 黃耆劉 巴戟 五味子炮裂去皮臍 澤瀉 牛膝去苗 附子炮裂去皮臍 山茱萸 菖蒲 防風去蘆頭 乾薑炮裂半兩劉 各一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末煉蜜和搗三五百下丸如梧桐子大每日空心以溫酒下三十丸晚食前再服漸加至五十丸

腎瀝湯 聖惠方 治腎臟風虛耳鳴四肢羸瘦小便滑數夜臥多寒喫食減少

磁石 二兩 搗碎水洵去赤汁以帛包之 肉蓯蓉 酒浸去皺皮微炙 附子 炮裂去臍 劉去皮臍 熟乾地黃 桑螵蛸 微炒各半兩 人參 去蘆頭 黃耆 桂心 石楠 五味子 白龍骨 白茯苓 各三分

右為散每服五錢以水一大盞用羊腎一對切去脂膜生薑半分棗三枚每用磁石包子同煎至五分去滓空心及晚食前溫服

桑螵蛸丸 聖惠方 治腎臟風虛耳鳴腰脊強直小便滑數

桑螵蛸 微炒 菖蒲 山茱萸 續斷 五味子 各三分

磁石 二兩 搗碎細研水飛過 燒醋淬七遍 附子 炮裂去皮臍 肉蓯蓉 酒浸一宿 刮去皺皮炙令乾 薯蕷 蕖蘑 沉香 藿香子 各一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每日空心及晚食前以温酒下三十丸

鹿茸丸 聖惠方 治腎臟風虛耳内恒鳴腰脚疼痛

鹿茸 去毛塗酥炙微黄 巴戟 五味子 石斛 去根劉 菖蒲 各一兩 磁石 二兩燒醋淬七遍搗碎細研水飛過 天雄 炮裂去皮臍 桂心 各一兩 肉蓯蓉 二兩酒浸一宿刮去皺皮炙令乾 半兩

右為末煉蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服食前以温酒下三十丸

腎瀝湯 聖惠方 治腎臟風虛兩耳常鳴

附子 一兩炮裂去皮臍 桂心 熟乾地黄 人參 去蘆頭 山茱萸 各三分 磁石 搗碎水淘去赤汁以帛包之 肉蓯蓉 酒浸一宿刮去皺皮炙令乾 各二兩

右為散每服五錢以水一大盞用羊腎一對切去脂膜入生薑半分薤白三莖每用磁石包子同煎至五分去滓空心及晚食前温服

羊角湯 聖濟總録 治腎臟風虛臟氣不足腰痛耳鳴肢體

列印日期/時間：02/05/2005 04:52:33
列印頁數：30
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不隨煩倦無力

羚羊角鎊 鹿茸去皮酒浸炙各三兩 五加皮 茯神去木各二兩 酸棗仁炒 枳實去穰麩炒熟 乾地黃焙各一兩半

右粗搗篩每服三錢先以水三盞煮羊腎一隻取汁至一盞半去腎下藥再煎至一盞去滓空心溫服

萬靈丸宣明論 治腎臟一切耳鳴腰疼肋骨痛

草烏頭炮 黑狗脊各三兩 仙木一兩 赤芍藥 五靈脂 防風 黃耆 細辛 海桐皮 山茵陳 骨碎補 何首烏 蔓荊子 白附子 川烏頭 巨勝子各八分 御米子炒各二分 黑牽牛半兩 芫花三分炒 青皮 補地龍 牛膝

右為末酒麵糊丸如梧桐子大每服十丸至二十丸溫酒下空心食前

補益腎肝丸東垣蘭室方 大寒相損止一丸與中寒冬寒心肺表寒嗽噴鼻流清涕咳嗽痰涎此藥大寒治目中流火視物昏花耳聾鳴困倦乏力寢汗憎風行步

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不正二脚欹側臥而多驚脚膝無力腰下消瘦

柴胡 羌活 生地黃炒 苦參炒 防己炒 已上各半分 附子一分 肉桂一分 當歸身三分

右件為末熟水為丸鷄頭仁大每服五十丸温水下食前與表寒冬寒心肺寒藥中每服兼一丸須以二藥相兼服之不可單服

太陽經噦藥東垣蘭室方

防風二分 羌活根三分 紅豆少許 兩个

右件為細末鼻内嚏之

牛膝海桐皮煎丸王氏普濟方

治腎臟風并腎餘氣時或痛或時無力耳作蝉鳴以至重聽大壯筋骨補元氣上攻耳目頭面背膊及流痓手擘腰脚筋絡頑麻疼

牛膝半斤 海桐皮半斤酒五升二味細剉杵為末用好赤芍藥一兩 肉桂一兩去皮 當歸一兩 麻黄一兩去根節 地龍一兩 虎脛骨一兩炙令黄色 大黄二兩半 桃仁二兩去皮尖麸炒黄色 赤箭二兩去皮臍 川烏頭二兩炮去皮臍 川苦楝二兩 五加皮二兩炮去皮臍 附子四兩塗酥

列印日期/時間：02/05/2005 04:52:34
列印頁數：32
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

去土微炒川芎二兩 木香 獨活 沒藥研 乳香研 防風去蘆骨碎補 麒麟竭 舶上茴香 沉香 乾蝎天南星生用各一兩研砌砂半兩研水飛過麝香半兩研

右件二十九味修事淨同為末再研令勻細後入前膏內和勻再杵三二千下丸如梧桐子大每日空心温酒或鹽湯下十丸忌生冷油膩毒物等

治腎氣虛耳中如風水鳴或如打鐘磬之聲卒暴聾草本

以蜀椒和巴豆葛蒲松脂以蠟溶為筒子內耳中一日一易甚神驗

列印日期/時間：02/05/2005 04:52:34
列印頁數：33
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

普濟方卷三十二

明 周王朱橚 撰

腎臟門

腎臟風毒流注腰脚 附論

夫腎臟風毒流注腰脚者其狀腰脚沈重筋脈拘急或作寒熱或為疼痛或發瘡瘍是也蓋腎主腰脚風邪客於腎經久而不去風毒流注發於下部故變脚弱之證

虎骨酒 出聖惠方 治腎臟風毒流注腰脚疼痛行立無力

虎脛骨 二兩酥炙黃 熟地黃 二兩續斷 赤箭 石斛 去根去蘆 芎藭 去蘆 牛膝 去蘆 丹參 去蘆 桂心 當歸 剉微炒 菟絲子 酒浸一宿刮去皮炙令乾 木香 各一兩 荆芥 去目 川椒 去閉口者炙微炒去汗各半兩 烏蛇 一條五兩用無灰酒浸三宿復取出頭尾皮骨去盡炙微黃

防風 去蘆 牛膝 去蘆 丹參 去蘆 桂心 當歸 剉微炒 菟絲子 酒浸一宿刮去皮炙令乾 木香 各一兩 荆芥 去目 川椒 去閉口者炙微炒去汗各半兩 烏蛇 一條五兩用無灰酒浸三宿復取出頭尾皮骨去盡炙微黃

芎藭 酸棗仁 炒微 山茱萸 五味子 漏蘆 五加皮 仙靈皮 附子 炮製去皮臍 骨碎補 海桐皮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右都細剉用生絹袋盛以無灰酒三斗浸經七日後每於食前煖一小盞服之

牛膝丸 出聖惠方 治腎臟風毒流注腰脚筋骨疼痛行立艱難

牛膝 二兩 去蘆 塗醋炙微黃 羌活 鹿茸 去毛塗醋炙微 附子 炮製去皮臍 熟乾地黃 檳榔 肉蓯蓉 酒浸一宿 刮去粗皮炙乾 杜仲 去皮微炒 海桐皮 當歸 微炒 巴戟天 芎藭 去蘆 桂心 防風 去頭 石斛 酸棗仁 微炒 仙靈皮 補骨脂 微炒 乾蝎 微炒 天麻 木香 各三分

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食前以温酒下三十丸

木香人參湯 出聖濟總錄 治腎臟風毒攻四肢頭面腰脚生瘡口苦舌乾形容瘦弱涕唾不時心下滿悶肢節怠惰狀如勞疾

木香 人參 黃耆 當歸 切焙 防風 去蘆 牛膝 酒浸切焙 桂 炙劉 荊芥穗 巴戟天 去心 半夏 薑製用薑汁 鼈甲 去裙醋炙 甘

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

草白茯苓去皮 秦艽去苗 柴胡去苗各半兩 乾蝎炒全者 附子去炮製臍 羌活去蘆 枳殼去瓤麩炒 肉豆蔻去殼 熟乾地黃焙各三錢

右㕮咀每服三錢水一盞葱白三寸切生薑三片同煎至七分臨熟入酒少許不拘時候温服

許去滓不拘時候温服

腰胯注痛脚膝無力

内補丸出聖濟總録 治腎臟風毒元氣衰憊膀胱冷痿

狼毒濕紙煨 附子去炮製臍 鹿茸塗酥炙去毛各二兩 天麻酒浸炙 巴戟天去心 補骨脂微炒 石斛去根 菟絲肉蒸 蓉酒浸去皮 沒藥研 桂去粗皮各一兩半 乾蠍全者炒 蔾藜子炒去角 天雄泡去皮裂 獨活去蘆 乾漆熬去烟各一兩 膃肭臍細剉搗篩為末四兩用酒五升煎

右除膃肭臍外擣羅為細末研勻用膃肭臍煎搜和為丸或煉蜜和丸如梧桐子大每三十丸空心温酒或鹽湯送下

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:04
列印頁數：3
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

羌活散 出聖濟總錄 治腎臟風毒流注腰脚虛痛或上攻頭目昏眩耳聾生瘡及脚氣衝心頭迷悶腹脝堅硬冷汗出者

羌活 去蘆一兩 乾蠍 炒三兩 楝實 劉炒一半 硇砂 飛煉成霜一分 桃仁 去皮尖雙仁勿用炒 附子 炮製去皮臍 天麻 白附子 炮去粗 桂 去皮 檳榔 劉 芎藭 炮製去皮臍 地龍 去土炒 木香 沈香 各一兩 阿魏 用醋化麵拌作餅子半兩

右為散每服二錢温酒送下

木瓜丸 出聖濟總錄 治腎臟風毒氣攻注四肢疼及瘡腫煩熱

木瓜 切爆乾取二兩 附子 炒裂去皮臍一兩 甘遂 麪炒 磁石 煅醋淬二十遍 白牽牛 炒 羌活 去蘆 陳皮 去白 防風 巴戟天 去心 藿香 子 炒 木香 地龍 炒 乾薑 炮 乾蠍 炒 防己 各半兩

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大空心温酒送下十五丸微利為効

萆薢散 出聖惠方 治腎臟風毒流注腰脚筋脈拘急起

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

動艱難

葶藶 杜仲 去粗皮 炙微黃 牛膝 去蘆 五加皮 檳榔 當

一兩

歸 去酒洗 去蘆 酸棗仁 防風 去蘆 肉桂 去皮 去皺 附子 炮裂去皮臍 獨活 海桐皮 羚羊角屑 木香 枳殼 鉄炒黃 各

右為散每服四錢以水一鍾生薑半片煎至六分去

滓温服日三

白花蛇散 聖濟總録 治腎臟風攻注遍體生瘡皮膚瘙

欽定四庫全書

普濟方

痒

白花蛇 去皮骨 酒浸 去蘆 丹參 蔓荆子 蒺藜子 炒去角 元參 秦艽 去苗 山芋 甘草 炙剉 苦參 防風 去蘆 附子 炮裂去皮臍 天麻 牛膝 酒浸切焙 各半兩

右為末每服二錢温酒調下

安息香丸 聖濟總録 治腎臟風毒腰脚疼痛陰痿緩弱

言語混濁呼吸短氣

安息香 四兩剉細 一宿來日漉出 入胡桃肉四枚酒五升半同浸 入沙盆研如糊同前酒調

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

攞去滓入銚子內煎磁石（醋淬）肉蓯蓉（酒浸去皮炙）巴戟（去心）附子（炮裂去臍）蒺藜子（炒去角）補骨脂（微炒）桃仁（湯泡去皮尖炒）天麻（酒浸）沈香（劉）桂（去粗皮）菟蘼（酥炙去毛）酸棗仁（鹿茸（去毛）各一兩）各三分

右為末研桃仁同和勻入安息香煎膏為丸如梧桐子大每服十五丸加至二十丸荊芥湯下木瓜酒亦得

杜仲丸（出聖惠方）治腎臟風毒流注腰脚疼痛

杜仲（二兩去粗皮炙）續斷 虎骨（塗醋炙黃）附子（炮裂去皮臍各二兩）丹

腫下疰脚膝少力筋骨熱疼

機關不利上攻口齒咽喉臭爛生瘡浮腫頭面虛

威靈仙丸（王氏博濟方）治肝腎氣虛風邪攻注筋骨拘急

子大每服三十丸鹽湯下

威靈仙（去土）藿香葉（自然銅（煅赤醋淬）附子（炮裂去皮臍）狗脊（去毛）萆薢 漏蘆（去蘆）肉蓯蓉（酒浸去皺皮焙）骨碎補（去毛）牛膝（去蘆酒浸一宿焙）木鱉子（去殼）防風（去蘆）地龍（去土炒已上各等分）

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

參蘆去 芎藭 桂各半兩 草薢劉 牛膝去蘆 赤芍藥 海桐皮乾蠍微炒三分各 石斛丸出聖惠方治腎臟風毒流注腰脚疼痛四肢少力不能飲食 石斛去根 防風去蘆 鹿茸去毛塗酥炙微黃 天雄炮裂去皮臍 羌活 一兩 木香 當歸微炒 附子炮裂去皮臍 杜仲去粗皮炙微黃各一兩 牛膝二兩去蘆 仙靈脾 桂心各一兩 心及晚食前温酒下三十丸 右為末煉蜜和勻三百杵丸如梧桐子大每日空心温酒下三十丸晚食前再服 右為末煉蜜和勻三五百杵丸如梧桐子大每服空心温酒下三十丸晚食前再服 暖腎散聖總録經治腎臟氣發動攻腰髓四肢疼痛 草薢茄蜀椒去目及合口者去出汗炒出汗 乾薑炮各半兩 附子炮裂去皮臍 桂去粗皮 蒺藜子炒去角 杜仲去粗皮酒浸炙去麤 澤瀉檳榔去皮 牛膝酒浸去蘆 桃仁去皮尖炒 蘼香子炒 右為散空心温酒調下三錢日再服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蒽苡仁酒出聖惠方治腎臟風毒流注腰膝拘急疼痛

蒽苡仁 牛膝去蘆各三兩 防風去蘆 獨活 生乾地黄二兩當歸炒微 酸棗仁炒微 黄耆 丹參去蘆 桂心 附子炮裂去皮臍各二兩 黑豆五合炒令熟

右細剉生絹袋盛用酒三斗漬五七宿後每於食前煖一小盞服之

痛

威靈仙散聖濟總録治腎臟風毒攻注腰脚或瘡腫或

威靈仙去蘆 防風去蘆 巴戟 何首烏去黑皮 黄耆剉 白花蛇去皮骨酒炙 白殭蠶炒 晚蠶炒 附子炮裂去皮臍 蒺藜炒去角 沙半炒各兩

右為散每服一錢温酒調下早晨日午臨臥服

補元散聖濟總録治腎臟風毒下注多生熱瘡或頭目虚腫日漸瘦

牛膝酒浸焙 地龍去土炒 海桐皮 羌活去蘆 當歸切焙 白芷 葛蘿 白附子炮裂去皮臍 巴戟天去心各一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

兩

右為散每服一錢用獵猪腎批開入藥末外更入椒鹽少許煨熟空心細嚼用津嚥下

蕨靈仙丸 聖濟總錄 治腎經不足風冷乘之腰痛如折或引背膂肉俛仰不利轉側艱難或因役用力過多勞傷於腎或因寢臥冷濕地氣傷於腰或因墜墮損傷或因風寒客搏背冷腰痛

蕨靈仙 去土一兩 桂 去皮 白附子 炮 當歸 酒洗 地龍 去土炒 赤小豆 去土半兩 羌活 去土各

欽定四庫全書

普濟方

右為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心或酒或鹽湯下

八斤丸 聖濟總錄 治腎臟風氣攻注腰脚腫痛

附子 炮去皮臍 牛膝 酒浸焙 天麻 酒浸焙 當歸 焙乾 烏頭 炮去皮臍 白附子 炮 烏藥 五靈脂 各一斤

右為末蒸木瓜酒入藥一處杵一二千下丸如梧桐子大每服温酒下二十丸至三十丸不拘

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

防風散 聖濟總錄 治腎臟風上攻下注腫痒脚膝生瘡

防風 去蘆 黄耆 旋復花 枳殼 麩炒去瓤 羌活 獨活 去蘆 枇杷葉 炙去毛 蒺藜 各炒去角 各一兩

右為散每服二錢空心晚食前温酒調下

木香散 聖濟總錄 治腎氣發動上攻下注

青木香 檳榔子 炒 桃仁 去皮尖炒 丁香 蜀椒 去目及合口者炒出汗 一分 蒺藜子 陳皮 去白 檳榔 各三分

右八味搗羅為散空心温酒下四錢

磁石丸 和濟方 治腎臟風毒上攻頭面浮腫耳鳴眼暗頭皮腫痒太陽穴痛鼻塞腦悶牙齒動摇項背拘急渾身腫痒癮疹生瘡百節疼痛皮膚麻痺下注脚膝筋脈拘攣不能屈伸脚下癮疹步履艱難並宜服之常能補益去風明目活血駐顔

磁石 燒醋淬二十遍研如粉 十兩 牛膝 酒浸六兩 黄蠟 蜀 炒八兩 川芎 二兩 肉桂 去皮 赤芍藥 黑牽牛 炒各四兩 草烏 炮去皮臍十四兩

右為細末酒糊為丸每服三十丸煨葱茶下亦得偏

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

正頭疼生葱茶下婦人血風渾身疼痛頭目眩暈面浮體瘦淡醋湯下日三服大有神効

羌活硫黄丸 治元氣虛弱風氣攻注脚膝疼痛

羌活 去蘆 硫黄 天雄 炮去皮臍 蘘香子 炒 木香 天麻 酒浸焙 硇砂 水飛各一兩 艾葉 五錢

右搗五味為末用木瓜一枚切開頂去皮子入硫黄硇砂艾葉三味在内以元頂密蓋蒸爛與藥味和搗丸如梧桐子大每服二十丸鹽湯或酒送下

諸虛門 平補

蕆靈仙丸 一名神仙八味丸 治腎臟風毒流注腰脚疼痛 方見

熱疼痛行動不得 方見諸虛門補益諸疾類

黄耆丸 出聖濟總録 治腎臟風毒攻注腰脚或生瘡虛腫

羌活散 出聖惠方 治腎臟風毒流注腰脚疼痛

羌活 牛膝 去蘆 附子 炮去皮臍 五加皮 當歸 酒洗微炒 桂心 蓽薢 桐皮 各三兩 防風 去蘆二兩

右為散每服四錢以水一鍾煎至五分入酒二合更

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煎三兩沸去滓食前温服

沈香丸 出聖惠方 治腎臟風毒流注腰脚疼痛腹脇滯悶

沈香 劉 鹿茸 去毛酥炙 附子 炮去皮臍 牛膝 去蘆 各一兩 桂心

海桐皮 蕳蘿蔔 檳榔 各三分 乾蠍 半兩微炒

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服食前以温酒下三十丸

七聖丸 出聖濟總録 治腎臟風毒攻注腰脚熱痛或生瘡

蕨靈仙 去心 烏頭 炮去皮臍 烏藥 藘香子 炒 蜀椒 去子炒 各一兩

右為末煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸空心鹽湯或温酒下日晚再服

黄耆散 出聖濟總録 治腎臟風上攻頭面下注腰脚

黄耆 去蘆 白附子 炮去皮臍 蒺藜子 炒去角 藘香子 炒 各一兩

右為散每服二錢羊腎一隻披破入藥在内濕紙裹火煨令熟空心用温酒嚼下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

猪肚丸 出聖濟總錄 治腎臟風毒氣攻注腰脚或瘡或腫 臍腹熱痛 獵猪肚 一個洗淨 蒔蘿 炒 半兩 硫黄 研 附子 炮去皮臍 各一兩 硇砂 欽定四庫全書 普濟方 檳榔散 出王氏博濟方 治腎臟風攻注生瘡兼療諸般惡瘡 心温酒下三十丸 酒盡將猪肚入木白中搗三百下丸如梧桐子大空 右除猪肚搗為末於猪肚内用線密縫酒煮爛候 止痛生肉 檳榔 一枚 甘草 黄連 去鬚 蜜陀僧 燒 各半兩 木香 一分 右為末先以温鹽漿水洗瘡揾乾以津唾調傅止 痛生肌 木瓜丸 出聖濟方 治腎臟風毒攻注脚膝筋脈拘急行步艱難疼痛 木瓜 去皮穰用一斤半 牛膝 去蘆酒浸 天麻 乾蝎 去土炒各一斤 右除木瓜外為末先將木瓜以瓦器盛瓶内蒸令爛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

留蒸下汁候冷放入盆内夾木瓜研細為膏次將三味藥末入膏中同和勻更入煉蜜杵千百下丸如梧桐子大每服三十丸空心食前温酒或鹽湯下加至五十丸

蘘香子丸 出聖濟總録 治腎臟風毒氣衝注腰膝生瘡

蘘香子 炒二兩 肉蓯蓉 酒浸一宿 附子 炮去皮臍一兩 五味子 一兩

右細剉用好酒一升并猪腎一對細切和藥置一處浸一宿取出焙乾為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸或好茶或豆淋酒下

四生丸 出聖濟總録 治腎臟風毒攻注腰脚生瘡

烏頭 炮去皮臍 木鱉子 去殼 狗脊 去毛各半兩 苦參 去蘆三錢

右為末爛研猪腎入少許麵糊和丸如梧桐子大每服二十丸温酒下不拘時

四靈散 出聖濟總録 治腎臟風毒上攻下注行步艱難

白附子 炮 牛膝 酒浸一宿 巴戟天 去心 黄耆 各一兩

右為散每服用猪腎一個批開去筋膜糝藥一錢并

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鹽蒔蘿各少許在内用濕紙裹煨熟為度早晨空心細嚼温酒送下

四白散出王氏方 治腎臟風毒攻注四肢頭面生瘡徧身瘙痒

白花蛇酒浸一宿去皮骨 白附子炮 白殭蠶炒 白蒺藜子炒去角各一兩

右為散每服二錢早晚食前温酒調下

燒腎丸出王氏博濟方 治腎臟風上攻頭面耳内生瘡及腰脚腫痛

磁石煅醋淬七遍細研水飛過 附子炮去皮臍 巴戟天去心 蜀椒去目及閉口者炒出汗各一兩

右為散每服用猪腎一箇去筋膜薄切入葱白薤白

白鹽花各少許藥末二錢濕紙裹炭火内煨熟空心細嚼温酒送嚥之十日内見効

四聖丸出聖濟總録 治腎臟風毒下攻及五勞七傷徧身疼痛兼女人血氣風勞緩弱

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

烏頭 去皮臍 地龍 去土炒 赤小豆 烏藥 各一兩
右並生搗羅為末醋煮糊丸如小豆大每服二十丸
鹽湯下

乳香丸 出聖濟總録 治腎臟風毒上攻壅悶下注沈重
乳香 一兩 烏頭 炮去皮臍二兩 蔵靈仙 去土一兩
右為末酒麵糊丸如梧桐子大每服三十丸温酒送
下早晚服之

甘遂散 出仁存方 治腎臟風攻疰膝脚腫痛
甘遂一錢 木鱉子 二十枚去殼

腰子批開入藥末一錢濕紙裹煨熟五更時嚼吞米飲下精水多則利多精水少則利少服後將息若雙脚患用腰子兩箇是方許學士云在毘陵有姓馬人宿患腎臟風一足發腫如瓠痛不可忍臥欲轉則兩人挾持方可學士語以上法服之下膿如水晶者數升腫消拄拐而行再以赤烏散令塗貼斯愈後十年

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:08
列印頁數：16
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

過毘陵率子列拜叩謝脚疾至今不復作

煨腎丸 出永類錄方 治腎經積水流注經絡腿膝攣急四肢腫痛

甘遂 半兩 木香 一兩

右為末每服二錢以猪腰子一箇批開糝藥在内鋪匀以薄荷裹定外以紙包數重水濕煨熟臨晚温酒

細嚼當下黄水

五味湯 治腰腎間濕癖當用水洗

用鰻魚和五味子末煮空腹食之甚補益濕癖脚

氣服之良

蕨靈仙丸 出本草 治腎臟風壅積腰膝沈重

用蕨靈仙末蜜和丸如桐子大初服温酒下八十丸

平明微利惡物如青膿即風毒積滯也如未動夜

再服一百丸服下後喫粥補之一月仍常服温補

藥

應用丸 出王氏博濟方 治腎臟風毒氣攻刺脚膝疼痛生瘡

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

烏頭二兩大附子一兩萊菔一兩黑豆一斗已上各味以度取烏頭附子薄切為片肉桂各一兩活川芎牛膝酒浸乾木瓜乾漆天南星已上已炒豆蔻四箇去殼麵煨檳榔四箇木香一分菊花二兩硫黃一分白

癥

白蒺藜散出王氏博濟方治腎臟風下痒脚膝疼痛或麻痺生

湯下三十丸忌魚肉

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心午後臨晚鹽

大通丸出王氏博濟方治丈夫腎臟風上攻下注脚膝疼痛生

癥及小便膀胱宿冷滯氣攻刺腹脇并婦人血風攻

痒腰膝拘攣兼能進食

右五味各等分同為細末每服二錢空心温酒下三

服見効忌發風食

金釵石斛一兩牛膝一兩酒浸大附子二箇一兩去皮臍乾薑三分

白蒺藜炒黑附子炮羌活川芎黄耆

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

花蛇（酒浸去皮骨二兩）枸杞子（二兩九蒸九晒炒）
右為細末以酒煮糊為丸如桐子大每服空心温酒下如喫了轉覺脛骨内疼甚者乃藥効力如疼發過後只管喫即永差如怕痛住藥疼亦止愈婦人當歸酒下如作散温酒調下如常服大妙

煨石子散（王氏博濟方）治腎臟風上攻下注脚膝腫痛
黄耆 白蒺藜（炒）巴戟天（去心）川椒（炒）白附子 茴香 川芎 木香
右各等分同杵為末每服空心用猪腎子一對去筋膜批開入藥末二錢半用麻線紮定濕紙裹煨熟為度以温酒或米飲嚼下

皂角散（出瀋方）治腎臟風毒腰脚生瘡大便風秘等症
大皂角（去皮酥炙搥碎）石菖蒲 樟柳根 赤小豆 黑豆 川烏（炮）草烏（炮各一兩）五靈脂（半兩）
右為末以皂角膏為丸每服二十丸鹽酒吞下

經進地仙丹（出醫方大成）治腎臟虛憊風濕流注脚膝酸疼

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:09
列印頁數：19
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

行步無力

川椒 去目閉口者炒出汗四兩 兔絲子 酒浸 覆盆子 白朮 一兩 白

附子 炮 羌活 防風 各二兩 人參 三兩 烏藥 二兩 川烏 一炮

附子 一兩炮 茯苓 四兩 地龍 一去土三兩 赤小豆 骨碎補

一兩 甘草 一兩炙 木鱉子 一去殼三兩 萆薢 一兩 狗脊 去毛 蒺藜 酒浸

牛膝 去蘆酒浸 南星 湯泡 二兩 黃耆 一兩 何首烏 二兩

右為末酒糊丸如梧桐子大每服四十丸空心溫酒下

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五十丸溫酒或鹽湯下

艱難一切風癖

川練子 炮 赤小豆 蒺藜 炒 茴香 炒 地龍 去土炒 防風 各二兩 烏藥 二兩 黃耆 二兩

黃耆丸 出醫方集成 治腎臟風毒上攻頭面下注腰脚行步無力 羌活散 出王氏博濟方 治腎臟風上攻下痓頭面浮腫及有瘡者婦人血風攻注並宜服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

羌活 蘆去 防風 蘆去 川芎 荆芥穗 麻黄 甘草 木通 黍黏 炒各等分

右為末每服三錢茶湯或酒調服不拘時服

沒藥散 出王氏博濟方 治腎臟風攻注脚膝疼痛瘡腫

沒藥 三分 甜瓜子 半兩炒 自然銅 二兩燒醋淬一度研碎 乳香 一分

右為末用酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服空心臨臥温酒下

骨碎補 半兩 紅芍藥 半兩 五靈脂 半兩 當歸 半兩微炒 地龍 一分

思仙續斷丸 出如宜方 治腎虚風毒下注脚膝不可踐地小便微澀 方見本門腎虚類

紫金丹 出王氏博濟方 治腎風上攻下注虚腫疼痛補暖丹田大進飲食及療婦人血風血氣流注筋骨疼痛或發熱口苦舌乾四肢煩倦血海久虚兼化痰涎

星 炮半兩 半夏 半兩 肉豆蔻 五箇 木香 半兩 防葵 半兩 青箱子 半兩 硃砂 半兩 水銀 一分 自然銅 一兩火煅醋淬七次

黑附子 半炮半兩 丁香 半兩 縮砂 半兩 當歸 半兩 硇砂 半兩 天南

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右先將水銀硇砂二味同研合一處為細末和勻以醋糊為丸如桐子大薄荷茶下十丸或薄荷湯下亦得每日二服

補腎湯 治卒患脚腰疼痛 出本草

以杜仲一兩去粗皮炙微黃剉以水二盞煎至一盞去滓用羊腎一對細切去筋膜入藥中煮次入薤白七莖白鹽花椒薑醋同作湯空心食之

腎臟虛損氣痿弱 附論

夫腎者元氣之本精志之藏内主於骨氣通於陰若人動勞傷精氣自衰損陰陽不和臟腑既虛精氣空竭不能榮華故令陽痿弱也

兔絲子丸 出聖濟總錄

治腎臟虛損陽氣痿弱腹拘急四肢酸疼面色黧黑唇乾舌燥目暗耳鳴氣短力少精神倦怠小便滑

兔絲子 酒浸透別搗 桂 去皮 鹿茸 去毛酥炙 附子 炮去皮臍 澤瀉 石龍芮 去殼一兩 肉蓯蓉 酒浸焙 杜仲 去粗皮 白茯苓 巴

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

戟心去熟地黃 萆薢 茄 沈香 茴香炒 石斛去蘆
牛膝酒浸一宿 續斷 各三分 桑螵蛸炒酒浸 芎藭 覆盆子
去枝葉五味子各半兩
右為末以酒煮糊丸如桐子大每服二十丸温酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜湯下晚食前再服
乾地黃丸出聖濟總録 治腎臟虚損腰重不舉陽氣痿弱
熟地黃三兩半 白茯苓 肉蓯蓉酒浸去皮各一兩 遠志去心
肢體瘦瘁
牛膝酒浸焙 山茱萸 續斷 蛇床子炒 附子炒去臍各一兩半 兔絲子酒浸 牡丹皮 桂去粗皮 杜仲去皮炒
人參 鹿茸 黄耆炙 覆盆子 石斛去根 巴戟心去 澤瀉
兔絲子丸出聖惠方 治腎臟虚損肌體羸瘦脚無力志
右為末以煉蜜為丸如梧桐子大空腹温酒下三十丸至四十丸日再服
意昏沈陽氣痿弱小便滑數

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

兔絲子（酒浸三宿為末）肉蓯蓉（酒浸一宿炙乾一兩）鹿茸（去毛塗酥炙黃色）蛇床子 鍾乳粉 牡蠣（為粉）天雄（炮去皮臍）遠志（去心）桂心 五味子 杜仲（去粗皮炒）車前子 雄蠶（微炒）石龍芮 雄雞肝（微炒）腽肭臍（酒浸一宿一兩半去根）石斛（一兩半去根）

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食前以溫酒下三十丸

保壽丸（出聖惠方）治腎臟虛損陽氣全乏

鹿茸（去毛酒洗炙微黃）鍾乳粉 補骨脂（炒）天雄（炮去皮臍）硇砂（細研）兔絲子（酒浸三宿曝乾為末）白馬莖骨（酒浸一宿黃色塗炙）腽肭臍（酒浸三宿炙微乾為末）肉蓯蓉（酒浸去皮）青鹽 巴戟（去心）硫黃（細研飛過）桂心 雄雀兒（二十枚去腸肚研以酒煮）石膏（三分酒洗微炒）陽起石（酒洗水飛為末）

右為末入雀肉搗為丸如梧桐子大每日空心及晚食前溫酒下三十丸

黃犬莖并腎一對（切乾）雄雞肝（三箇切焙乾）

鹿茸散（出聖惠方）治腎臟虛損陽氣乏弱

鹿茸（去毛酥炙）兔絲子（酒浸三宿晒乾為末）陽起石（酒煮半日細研碎）

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鍾乳粉 二兩半 各
雄鼠蜈蚣 一兩 微炒
遠志 一兩 微炒
桂心 二兩
附子 去炮皮臍 二兩
桑螵蛸 一兩 微炒
蛇床子 一兩
肉蓯蓉 酒浸一宿 炙乾 二兩
石楠 一兩 腊肭臍 酒浸 炒 一兩 微

右為散每服空心及晚食前以温酒調下二錢

神効地黄散 出湯氏家藏方 治男子腎臟虚損陽事不舉

地黄 五兩
丁香 一兩
蓯蓉 二兩 酒浸
蛇床子 二兩
桑子 三兩
黄精 二兩半
遠志 二兩
白茯苓 二兩
蛤蚧 三兩
人參 一兩
川練子 一兩 炒
青鹽 一兩
茴香 二兩 三錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服空心温酒下

七日見効

磁石湯 出聖濟總録 治腎臟虚損髓枯竭小便滑數腰背拘急耳鳴色黯陽氣痿弱

磁石 火煅醋淬二十遍 二兩
附子 炮去皮臍 二兩
黄耆 炒 五味子 白朮 地骨皮 桂去粗皮 牡蠣 澤瀉 白茯苓 人參 熟地黄 焙各三兩

右㕮咀為末每服三錢用水二鍾羊腎一具去筋膜

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

切開煮取一盞去羊腎入藥并生薑三片大棗二枚一同再煎至七分去滓

鹿茸散 出聖惠方 治腎臟虛損精氣不足腰脚痛羸瘦無力陽道痿弱宜服

鹿茸 去毛塗炙一兩 巴戟天 一兩半 天雄 炮去皮臍一兩 五味子 二兩 蛇床子 一兩 石斛 去根一兩 肉蓯蓉 酒浸一宿炙二兩 菟絲子 酒浸三宿晒乾為末 牛膝 各二兩 遠志 去心一兩 雄蠶蛾 半兩炒 石龍芮 三分

右為散每服食前用酒調下二錢

硫黃散 出千金方 治腎臟衰乏陽氣痿弱脚膝無力宜服

硫黃 細研飛過 白石英 細研飛過 白馬莖 塗酥炙 鹿茸 去毛塗酥炙 遠志 去心各二兩 菟絲子 酒浸三宿焙為末 天雄 炮去皮臍一兩 雄蠶蛾 炒一兩 女貞 二兩 蛇床子 一兩 五味子 一兩半 石楠 一兩半

右為散每服二錢空心及晚食前溫酒調服 一方無石楠蛇床子勿服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

山芋丸 一名無比山藥丸出聖濟總録 補臟元益陽氣輕身駐顏壯氣血 方見虛勞門 虛勞羸瘦類

鹿茸丸 出聖惠方 治腎臟虛損陽氣癒弱精洩不禁

鹿茸 二兩塗酥炙黃 萆薢 水洵去浮者水煮令芽出候乾炒黃黑色 磁石 燒赤醋淬七遍細研水飛 附子 炮去皮臍 天雄 炮去毛臍 硫黃 細研飛過 蛇床子 二兩炒 韭子 一兩 桂心 一兩半 硇砂 細研一兩 龍骨 熟地黃 各一兩

右為末用羊腎一對去脂膜研如泥入酒二升煎成膏入諸藥末和搗三五百杵丸如梧桐子大每日空心及晚食前温酒下三十丸

四雄丸 出聖惠方 治腎虛損陽氣癒弱

雄雀肝 十具炙乾 雄雞肝 三具炙乾 雄蠶蛾 五十枚微炒 天雄 炮去皮臍 白馬莖 塗酥炙令微黃黑色 龍腦 細研 白礬 硇砂 細研 萆薢 水洵去浮者水煮令芽出候乾炒黃色各一兩 木香 吳茱萸 湯浸七遍焙乾微炒各半兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

前溫酒下二十丸

木香散 出聖惠方 治腎虛寒氣攻注臍腹疼痛飲食不進

面色癆黃無力

木香 乾薑 泡 檳榔 各五分 雞舌香 青橘皮 去白 革薢 茄 白朮 各三分

右為末每服二錢溫酒調下食前再服

天雄散 出聖惠方 治腎臟虛損陽氣癆弱

天雄 炮去皮臍 遠志 去心 兔絲子 酒浸三日焙乾為末 肉蓯蓉 酒浸一日去皮炙 五味子 鹿茸 去毛塗酥炙乾 巴戟 杜仲 去皮炙黃色各二兩

右為散每服食前溫酒調下二錢

肉蓯蓉散 出聖惠方 治腎臟虛損精氣衰竭陽道癆弱

方見腎虛門 腎臟虛損類

天雄散 出聖惠方 治腎臟虛損陽道癆弱

天雄 二兩炮去皮臍 遠志 去心 續斷 蛇床子 桂心 雄 鑿 炒 肉蓯蓉 酒浸炙 石龍芮 各一兩半 兔絲子 一兩酒浸三宿晒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾為末

右為散每服食前温酒調下二錢

助陽丸 出聖濟總録 治腎臟虚損陽道痿弱肢體無力

志意不爽

鹿茸 去毛酥炙 兔絲子 酒浸 雄蠶 炒 附子 炮 鍾乳粉 肉蓯蓉 酒浸去皮炒 黄耆 人參 各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸温酒或鹽湯下空心服

欽定四庫全書

八味丸 出聖濟總録 治腎臟虚損陽道痿弱臍腹疼痛夜多便溺四肢緩弱面色黧黑 方見諸虚門補虚固精類

菟菅子丸 出聖惠方 治腎臟虚損陽道痿弱

菟菅子 一兩水洵去浮者水煮芽出焙乾炒黄色令冷研為末 蛇床子 附子 炮 雄雀糞 兔絲子 酒浸三日晒乾為末各一兩 蜀茶 碙砂 細研各半兩

右先取菟菅子雄雀糞碙砂三味用白蜜四兩同和將水三升煮勿住手攪煎如餳入諸藥末和搗三五

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

百杵丸如桐子大每日空心晚食前鹽湯下十丸

陽起石丸出聖惠方治腎臟虛損陽氣痿弱

陽起石酒煮半日白礬鍾乳粉硫黄龍腦研砂各一兩伏火硇霜半兩

右為末如粉用軟粳米飯和丸如梧桐子大每服食前温酒下十丸日進二服

五味子丸治腎虛損精氣衰竭陽道痿弱脚膝無力

五味子鹿茸去毛酥炙巴戟去心兔絲子酒浸肉蓯蓉酒浸去皮炙乾別杵為末肉蓯蓉酒浸三日晒乾各二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸温酒或鹽湯下空心服

附子丸治腎臟衰弱手足多冷

附子炮去皮臍蛇床子鍾乳粉鹿茸去毛酥炙微黄兔絲子酒浸去皮炙乾各二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心晚食前温

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

酒下三十丸

鍾乳丸　治腎臟虛損陽痿弱宜服助陽氣神效

鍾乳粉　硫黃　陽起石　磁石各一兩　硃砂二兩

右藥都研如粉用琅玕石一斤搗為末分為三分先入一分於甕瓶内即用紙裹前藥末入瓶内即加餘二分蓋之築令實如法封固入炭池每日常用炭二斤連煅七日滿加炭七斤煅赤候冷開之取藥攤於淨地上以盆蓋之三日取出細研如粉煮棗肉為丸如梧桐子大每日空心及晚食前以温酒下五十丸加至八十丸

五精丸　治腎臟虛痿弱大補元氣方見諸虛門補元陽類

固元丸　治元氣虛弱腎水不能生肝木是以子母俱虛肝主筋腎主骨筋既弱則腰腹筋脉拘攣此藥主之

八角茴香炒　覆盆子酒浸　白茯苓　小茴香炒　牛膝去蘆酒浸　磁石火煅醋淬　龍齒煅　補骨脂一兩炒　天雄一兩鹽一兩用

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:13
列印頁數：31
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

研入酒一盞浸三宿為度五味子酒蒸兔絲子酒浸各二兩鹿茸

蓯蓉酒浸十宿各二兩半車前子半兩炒麝香半錢鍾乳粉川烏炒附子炮去臍桂心巴戟去心各一兩半

右為細末酒煮鹿角膠丸如梧桐子大每服五十丸加至一百丸食前温酒吞下

白馬莖丸　治空房獨處見敵不興口乾汗出失精

囊下濕癢尿有餘瀝陰偏大引疼膝冷脛痠目中流淚小腸及腰脊强痛

白馬莖　石葦　天雄　遠志　赤石脂　蛇床子　菖蒲　薯蕷　杜仲　瓜蔞根　肉蓯蓉　石斛　續斷　牛膝　山茱萸　栢子仁　細辛　防風各八兩

右為末白蜜丸如梧桐子大酒服四丸日再服加至二十丸七日至一月百病愈

生薑丹　治腎受邪陽氣衰弱意志不快多倦男子既腎不受邪即病不生

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用茴香二兩生薑四兩不去皮者杵茴香入陶器內掩片時不透氣取出用慢火炒不得過次入鹽一兩同為細末煮好麵糊為丸如梧桐子大每服三五十丸空心溫酒或鹽湯下並無忌此藥是用茴香鹽引生薑入腎經能養氣也小腸氣人尤宜服

治腎臟損陽氣痿弱

用車前子數十莖葉根剩下煎服彊陰益精

腎臟虛損骨痿羸瘦 附論

夫腎臟虛損骨痿羸瘦者蓋骨屬於腎腎虛損則髓竭骨枯陽氣既衰身體無以滋養所以骨痿肌膚損削而形羸瘦也經曰髓者骨之腋不能久立行則振掉骨將憊矣此之謂也

紫石丸治腎臟虛損羸瘦飲食不進肌膚骨痿無力腰脚疼痛宜服補益氣力令人健

紫石英 一兩細研水飛過
肉蓯蓉 二兩酒浸一宿去皮炙令乾
磁石 二兩醋淬七遍細研水飛過
鹿茸 去毛酥炙乾
兔絲

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

子 二兩 浸三日 晒乾為末 人參 一兩半 去蘆 黃耆 二兩 鍾乳粉 二兩 熟地黃 二兩 巴戟 一兩半 白茯苓 一兩 補骨脂 一兩 炒 覆盆子 二兩 去皮膚炮 杜仲 一兩 去皮炒 天門冬 一兩 去心 當歸 一兩 酥炙微黃 五味子 半兩 天門冬 三錢半 去心 磁石 二兩 燒為細末 肉蓯蓉 二兩 酒浸一宿去皮 鍾乳粉 二兩 黃耆 一兩 巴戟 一兩 石斛 一兩 白茯苓 一兩 桂心 一兩 杜仲 二兩 去皮炒 續斷 半兩 木香 半兩 兔絲子 一兩 酒浸三宿 陽起石 一兩 牛膝 一兩 去心 遠志 二兩 去心 附子 一兩 皮臍 澤瀉 五分 覆盆子 沈香 各三分 熟地黃 一兩 丹參 一兩 去蘆 乾漆 三分 炒

磁石丸 出聖惠方 治腎氣虛損骨痿羸瘦耳鳴心煩小腹痛急氣引膀胱連腰膝疼痛不欲飲食

下三十丸漸加至五十丸

右為末煉蜜為丸桐子大每服空心及晚食前溫酒

棘刺 一兩 牛膝 二兩 去心 續斷 一兩 腽肭臍 一兩 酒浸 五味子 二兩 石斛 二兩 桂心 一兩 柏子仁 一兩 蛇床子 一兩 附子 二兩 去皮臍炮 杜仲 一兩 去皮炒 天門冬 一兩 去心 當歸 一兩 白茯苓 一兩 補骨脂 一兩 炒 覆盆子 一兩 半 巴戟 一兩 熟地黃 二兩 人參 一兩半 去蘆 黃耆 二兩 鍾乳粉 二兩

右為末煉蜜和搗二三百杵如梧桐子大每服空心

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

及晚食前溫酒下三十丸漸加至五十丸

石斛丸 出聖惠方 治腎臟虛損頭昏耳鳴目暗茫茫心中善忘恍惚不定飲食無味心恒不樂多有恐思時吐酸水面無悅澤肌體虛羸骨痿不能行立

石斛 一兩 去根 天門冬 半兩 去心 五味子 三兩 巴戟 半兩 五加皮 三分 牛膝 一兩 肉蓯蓉 酒浸三分 乾漆 半兩 炒 兔絲子 一兩 酒浸一宿 地黃 三分 覆盆子 半兩 薯蕷 半兩 補骨脂 一兩 炒 人參 半兩 杜仲 三分 去皮 炒 天雄 三分 去皮臍 鹿茸 一兩 酥炙 狗脊 石楠葉 各半兩

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每空心及晚食前以溫酒下三十丸漸加至五十丸

牛膝丸 出聖惠方 治腎臟虛損骨痿無力坐而難起目視茫茫恍惚不定短氣肌體羸瘦

石莢 一兩 細研 鹿茸 一兩 塗炙黃 牛膝 一兩半 栢子仁 三分 桂心 三分 白茯苓 三分 黃耆 一兩 白

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

炮覆盆子一兩山茱萸三分兔絲子三兩酒浸杜仲三分去粗皮炒熟地黃三分防風三分去蘆石斛一兩去根肉蓯蓉一兩酒浸去皮微炒磁石一兩燒醋淬七次研水飛補骨脂一兩微炒

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒下三十丸

鹿茸丸聖濟方治腎臟虛損骨痿羸瘦心煩腹急腰重耳鳴行步無力

鹿茸酒浸一宿酥炙石斛去根附子炮去皮臍桂心一兩牛膝酒浸一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每日空心温酒下十

五丸漸加至三十丸

補腎丸聖濟總録治腎臟虛損氣乏羸瘦

肉蓯蓉酒浸三兩炙附子炮去皮臍澤瀉巴戟天去心各二兩枳殼去瓤麩炒桃仁去皮尖雙仁炒牡蠣煆過白朮一兩蒺藜

肉蓯蓉酒浸二兩熟地黃二兩萆薢炒一兩人參二兩五味子一兩蛇床子炒一兩白茯苓一兩覆盆子一兩黃耆二兩木香一兩天門冬去心山芋各一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

牛膝 酒浸 去苗 炒 一兩
兔絲子 酒浸 乾薑 炮 一兩
蜀椒 去目及合口者炒出汗 一兩半
桂 去粗皮 檳榔 陳皮 去白 各一兩
五味子 炒 一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心溫酒下三十丸

石斛飲 濟方出聖 治腎氣虛損骨瘦體瘦無力兩耳鳴甚即成聾短氣不足

石斛 去根 一兩 當歸 一兩 人參 二兩 肉蓯蓉 酒浸一宿三兩 芎藭 一兩
附子 去粗皮 一兩 白茯苓 一兩 熟地黃 焙 二兩 白朮 米泔浸一宿 一兩
桑螵蛸 一兩 磁石 火煅醋淬二七次各一兩 羊腎 一對去筋膜炙令黃

右吸咀如麻豆大每服三錢鹽水一盞煎至七分去滓溫不拘時服

補腎湯 濟方出聖 治腎臟虛損耳作蟬鳴腹疼痛
黃耆 炙 一兩半 蜀椒 去目合口者炒出汗 一兩 人參 二兩 白茯苓 一兩 獨活 二兩
芎藭 一兩 當歸 二兩 白朮 一兩 蒺藜 炒去角 二兩 附子 炮去皮臍 各一兩
澤瀉 一兩

右剉如麻豆大每服五錢水二鍾先煎羊腎一箇至一盞半入藥煎取八分去滓空心服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾地黃丸 出聖惠方 治腎臟虛損肌體羸瘦骨痿無力腰脚痛小便滑數

熟地黃 二兩 山茱萸 二兩去核 白茯苓 二兩 山芋 二兩 石斛 去根 牛膝 酒浸炒 巴戟天 去心 二兩 五味子 二兩 澤瀉 酒浸研 一兩 肉蓯蓉 酒浸炒 二兩 天門冬 去心 二兩 鹿角膠 一兩 栝子仁 一兩 兔絲子 酒浸研 一兩 桂 二兩 附子 炮去皮臍 牛膝 酒浸 一兩 杜仲 炒 一兩 蓯蓉 酒浸 一兩 防風 一兩 兔絲子 二兩 桂 一兩 破故紙 二兩 沙苑 半兩 白蒺藜 一兩 蔾 一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸温酒下

牛膝丸 出濟生拔萃 治腎臟虛損骨瘦不能起筋緩不能自收特宜煖中

牛膝 酒浸 二兩 蓯蓉 酒浸 二兩 防風 一兩 兔絲子 一兩 桂 一兩 破故紙 二兩 沙苑 半兩 白蒺藜 一兩 蔾 一兩

右等味為末酒煮豬腰子為丸每服五七十丸空心温酒下如腰痛不起者服之甚効

補骨脂丸 出聖濟總錄 治腎臟虛損骨瘦肉瘦耳鳴心煩小腹裏急氣引膀胱連腰膝痛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

補骨脂二兩 五味子二兩 杜仲二兩 天雄一去皮臍兩 石斛各二兩 人參二兩 白茯苓二兩 兔絲子酒浸一宿焙乾為末 熟地黃各二兩 肉蓯蓉酒浸一宿各二兩

下鹽湯亦得

腰膝疼痛

肉蓯蓉丸出聖濟總錄 治腎氣虛損羸瘦飲食不作肌膚

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心日午夜臥溫酒下鹽湯亦得空心日午臨晚服

肉蓯蓉酒浸一宿石斛去皮臍火煅醋淬七次鹿茸酥炙桂去粗皮巴戟天去心杜仲炒去絲各一兩 木香一兩 覆盆子一兩

肉蓯蓉酒浸一宿各一兩 五味子炒 龍骨研各一兩 黃耆炒 兔絲子 石斛去根各一兩 牡蠣炮去殼 白朮炒去皮臍各一兩半 附子炮去皮臍 桑螵蛸炒各二兩 菟絲子酒浸一宿焙乾為末 熟地黃 白茯苓 天雄去皮臍

瘦

肉蓯蓉酒浸一宿 石斛去根各一兩 五味子炒 龍骨研各一兩 黃耆炒 兔絲子 石斛去根各一兩半

丸溫酒下鹽湯亦得空心日午臨晚服

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸至三十

肉蓯蓉丸出聖濟總錄 治腎臟虛損小便數滑脛無力漸羸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心鹽湯下

石鍾乳丸 出聖濟總錄 治腎臟虛損骨痿羸瘦行無力氣不足腰背相引疼痛

石鍾乳 二兩 研為末 酒浸一宿 兔絲子 酒浸研為末 一兩 五味子 一兩 蛇床子 一兩 黃耆 二兩 續斷 一兩 菟薢 烏頭 炮去皮臍 各一兩

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下空心日午夜服

兔絲子丸 出聖濟總錄 治腎臟虛損精髓枯竭形體瘦弱筋骨痿軟晝夜疼痛腰膝冷痺耳內虛鳴宜服

兔絲子 酒浸三日 肉蓯蓉 酒浸 天雄 炮去皮臍 各二兩 骨碎補 去毛 鹿茸丸 出聖濟總錄 治腎臟傷憊腰膝無力形瘦骨痿頭目昏沈時忽發暈項背疼痛不得俛仰

一兩 薏苡仁 炒 地龍 去土焙乾 各一兩 石硫黃 研半兩

右為末酒煮糊丸如梧桐子大空心溫酒或鹽湯下二十丸加至三十丸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鹿茸 酥炙 天雄 炮去皮臍 白附子 鹿髓去膜別研如膏各一兩 臈肭臍 一對 酥炙

右以四味為末與鹿髓同研和令勻煉蜜和丸如梧桐子大溫酒下三十丸日三兩服

巴戟天 出聖濟總錄 治腎臟冷虛體羸瘦骨痿腰脚疼痛臍腹冷痛飲食無味行坐無力夜多夢泄耳內蟬鳴

巴戟天 去心 補骨脂 炒各半兩 附子 炮去皮臍 檳榔子 炒兩

右為末用酒熬一半成膏一半杵和丸如梧桐子大每服二十丸空心食前鹽湯下

腎虛多唾 附論

夫水飲非升降不能傳導非陽氣不能消爍腎虛多唾者腎臟不足陽氣虛微而又陰寒凝結停滯於胸膈之間不能消爍水飲上溢於齒牙故喜唾也夫腎主於水其下為膀胱是腎之腑主於津液二經允象於水故為表裡也若臟腑和平水液下流於小腹若腎氣勞

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

損膀胱虛弱陰氣不足陽氣有餘則上生熱心胸壅滯水飲停積故令常唾也

赤茯苓丸出聖惠方 治腎虛損上壅痰滯常唾稠濁腹脇脹滿喫食無味

赤茯苓一兩 甜瓜子三分 人參三分去蘆 旋復花三分 半夏一兩 檳榔三分 枳殼半兩麩炒 草豆蔻半兩去皮 前胡三分 附子一枚炮去皮臍 厚朴三分去皮薑汁製

右為末以生薑汁煮糊和丸如梧桐子大每服食前

服以薑棗湯下二十丸

白术丸出聖濟方 治腎臟虛損心膈痰涎壅滯常唾胸脇悶

白术一兩 赤茯苓一兩 附子三分炮去皮臍 桂心一兩 紫苑三分 訶黎勒一兩 前胡一兩 桔梗一兩去蘆 人參一兩 陳皮三分 檳榔半兩

半夏一兩微炒

右為末以生薑汁麵糊丸如梧桐子大食前以枳殼

湯下二十丸

澤瀉散出聖惠方 治腎臟虛損上壅痰涎結聚常唾胃弱少

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:16
列印頁數：42
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

食宜服

澤瀉一兩 人參三兩 旋復花三分 麥門冬三分去心 枳實五錢炒 前胡三分 桔梗三分 甘草一兩炙 杏仁三分去皮尖 半夏二兩炒

右為散每服三錢以水一鍾入生薑半分煎至六分去滓食前服

人參散出聖惠方 治腎臟虛損冷氣所攻下焦虛冷壅滯唾液稠粘

人參一兩 五味子 白术 附子炮去皮臍 細辛 半夏各半兩 桂心 枳實麩炒 甘草各三分

右㕮咀如麻豆大每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服

半夏丸 治腎臟虛損壅塞唾液不休心胸煩悶

半夏湯浸七遍去滑為末三兩 前胡一兩去赤茯苓 檳榔 陳皮去白 訶子炮去皮臍半兩 枳殼麩炒 人參 桔梗炒 五味子各半兩 附

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服二十丸至三十

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丸食前溫酒生薑湯下

前胡湯　治腎臟虛損頭目昏眩順三焦氣利胸膈進

飲食

前胡一兩　白茯苓三錢　木香五錢　附子炮去皮臍大腹皮一兩　桔梗炒半兩　枳殼半斤炒五味子一兩　甘草炙半兩　半夏半兩生薑自然汁四兩水一升於銀器內浸晒乾焙五味子一兩　甘草炙半兩　半夏半兩生薑

右剉如麻豆大每服五錢水二盞入生薑三片同煎至一盞去滓食前服

欽定四庫全書

前胡散　出聖惠方　治腎臟虛損脾氣乏弱津液不榮上焦生熱常唾稠粘胸膈壅滯不欲飲食

前胡一兩　大腹皮三錢半夏一兩湯泡炒　杏仁去皮尖炒一兩　陳皮去白三錢　澤瀉一兩　赤茯苓一兩　甘草半兩炙

右為散每服三錢水一盞入薑三片煎至六分去滓食前溫服

半夏散　出聖惠方　治腎臟虛損上熱下冷心胷壅滯痰毒結實唾如筋膠飲食少進

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏一兩湯浸七次炒 川烏頭半兩去皮臍 防風半兩 旋復花一兩
前胡二兩 赤茯苓一兩 桂心一兩 白朮半兩 甘草半兩炙
右為散每服三錢水一鍾入薑三片煎至六分去滓
食前服

地黃湯 治腎虛多唾
熟地黃焙 鹿茸酥炙 巴戟去心 枸杞子 丹參 五加
皮各一兩 車前子一兩 桂三錢 防風一兩
右㕮咀如麻豆大每服四錢水二盞煎至半盞去滓
温服

茯苓湯 治虛損短氣咽喉凝唾不出如膠 方見虛勞門虛勞少氣類
訶黎勒丸 治腎虛常唾
訶子半夏湯泡七次炒 桔梗 陳皮去白 杏仁去皮尖研 檳榔 五味子 澤瀉各等分
右搗七味為末入杏仁和勻生薑汁煮麵糊丸如梧桐子大每服三十丸淡薑湯下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五味子丸治腎虛痰唾不休

五味子　白茯苓　冬去心山茱萸各半兩　貝母三錢　五味子　白茯苓　前胡各一兩　半夏湯泡七次炒　麥門

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食前薑湯送下日二服

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:17
列印頁數：46
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

素問云夫腎精者身之本也蓋五臟六腑皆有精腎為都會關司之所命聽於心人能法道清淨精氣内持火來坎户水到離宫陰平陽秘精元密固矣若夫思慮不節嗜欲過度使水火不交精元失守由是為赤濁白濁之患焉赤濁者是心虚有熱也常因思慮而得之白濁者腎虚有寒也過於嗜欲而得之其狀凝面如油光彩不定常時濁漏粘如膏糊皆思慮嗜欲之所致耳各分致病之由施以治法坎離既濟陰陽協和然後火不上炎而神自清水不下滲而精自固安有赤濁白濁之患哉雖然思慮過度不特傷心亦能病脾脾土虚而腎不足故土邪克水亦令人便下渾濁史戴之又云夏則土燥而水濁冬則土堅而水清醫若峻補則疾愈甚以中

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

和之藥療之水火既濟土自堅其精固矣遺精白濁二證脈息多濇醫經曰男子二八腎氣盛天癸至天癸者精之本也腎臟不足皆由不善衛生喜怒多勞憂愁思慮嗜欲過度起居不常遂致心火炎上而熄腎水散漫而無歸上下不得交養心腎受病令人遺精白濁腎受病者當禁固之心病者當安寧之更有少壯之人情動於中所願不得意淫於外一門內有是證者大要於心腎不交關鍵不定之故耳病者亦令人遺精白濁皆心腎不交關鍵不定之故耳腎病者當禁固之心病者當安寧之更有少壯之人遺精白濁腎受病令人遺精白濁而無歸上下不得交養心腎受病令人遺精白濁腎受病者當禁固之心病者當安寧之更有少壯之人情動於中所願不得意淫於外一門內有是證者大要於心腎不交關鍵不定之故耳病者亦令人遺精白濁皆心腎不交關鍵不定之故耳慮嗜欲過度起居不常遂致心火炎上而熄腎水散漫而無歸上下不得交養心腎受病令人遺精白濁腎受病者當禁固之心病者當安寧之更有少壯之人情動於中所願不得意淫於外一門內有是證者大要於心腎不交關鍵不定之故耳病者亦令人遺精白濁皆心腎不交關鍵不定之故耳精之本也腎臟不足皆由不善衛生喜怒多勞憂愁思慮嗜欲過度起居不常遂致心火炎上而熄腎水散漫而無歸上下不得交養心腎受病令人遺精白濁腎受病者當禁固之心病者當安寧之更有少壯之人情動於中所願不得意淫於外一門內有是證者大要於心腎不交關鍵不定之故耳病者亦令人遺精白濁皆心腎不交關鍵不定之故耳證脈息多濇醫經曰男子二八腎氣盛天癸至天癸者精之本也腎臟不足皆由不善衛生喜怒多勞憂愁思慮嗜欲過度起居不常遂致心火炎上而熄腎水散漫而無歸上下不得交養心腎受病令人遺精白濁腎受病者當禁固之心病者當安寧之更有少壯之人情動於中所願不得意淫於外一門內有是證者大要於心腎不交關鍵不定之故耳病者亦令人遺精白濁皆心腎不交關鍵不定之故耳和之藥療之水火既濟土自堅其精固矣遺精白濁二證脈息多濇醫經曰男子二八腎氣盛天癸至天癸者精之本也腎臟不足皆由不善衛生喜怒多勞憂愁思慮嗜欲過度起居不常遂致心火炎上而熄腎水散漫而無歸上下不得交養心腎受病令人遺精白濁腎受病者當禁固之心病者當安寧之更有少壯之人情動於中所願不得意淫於外一門內有是證者大要於心腎不交關鍵不定之故耳病者亦令人遺精白濁皆心腎不交關鍵不定之故耳

治之法不宜秘固秘固則愈甚惟當以後方猪苓丸主之蓋半夏有利猪苓導氣使通之也但虛損精滑之人不降是以有清濁不分又有脾精不禁小便漏濁淋瀝不止手足腰背酸疼用蒼术等劑則脾精生於內也邪客於陰神不守舍故心有所感夢而後泄也其候有少足而熱赤曰赤濁心不足而腎冷者為白濁陰不升陽却不宜服無因而出者曰尿因見聞而出者曰精心不年氣盛鰥曠多時強制情欲不自覺知此泄如瓶之滿

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

而溢者也人或有之是為無病勿藥可矣心家氣虛不能主宰或心受熱陽氣不收此泄如瓶之側而出者也人多有之其病猶輕令和平之劑補之臟腑精弱其元久虧心不攝念腎不攝精此泄如瓶之碎而漏者也人或有之其病最重須當大補湯主之夢泄尤甚於房勞此世習聞其説者也又有神氣消磨異性橫生風邪乘虛致干其正往往與妖魅交媾是尤甚也宜用法藥調治之

欽定四庫全書

普濟方

韭子丸 出千金方 治房室過度精洩自出不禁腰背不得屈伸食不生肌兩脚苦弱此藥治之

韭子 一升
甘草 一兩
桂心 半兩
紫石英 半兩
當歸 二兩
禹餘粮 一兩
遠志 一兩
山茱萸 一兩
天雄 一兩
紫苑 半兩
薯蕷 半兩
細辛 一兩
茯苓 一兩
薑蠶 半兩
菖蒲 半兩
人參 一兩
杜仲 一兩
白朮 二兩
乾薑 二兩
芎藭 二兩
附子 一枚
石斛 各一兩
大棗 五十個
牛膝 一兩半
乾漆 半兩
天門冬 一兩半
茯苓 一兩
黃耆 一兩
兔絲子 一兩
乾地黃 二兩
蛇床子 半兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為細末入牛髓同白蜜棗膏合搗三五千杵空心服丸如梧桐子大每服十五丸日再服可加至二十丸

玉鎖固真丹 出危氏方 治心氣不足思慮太過腎經虛損真陽不固旋有遺泄小便經歲白濁或淡赤或如膏夢寐精泄甚則身體拘倦骨節酸疼飲食不進面色黧黑容枯肌瘦唇乾舌燥虛煩盜汗舉動力乏多服效

白龍骨 半斤 磁石 醋淬七次 硃砂 各一兩 牡蠣 煅一兩 紫梢花 一兩半 家韭子 兔絲子 各二兩 鹿茸 酒浸炙 白茯苓 一兩 川巴戟 一兩 官桂 一兩 肉蓯蓉 酒浸 桑螵蛸 酒浸 當歸 各二兩 木香 不見火 遠志 甘草水煮取肉 蒼术 各一兩 茴香 炒 吳萸 炒 川練子 炒 桑寄生 各半兩 沈香 半兩 黃耆 一兩 綿附子 炮去皮臍 一兩

棘刺丸 治虛勞諸氣不足夢泄失精 方見虛勞門夢泄類

湯下

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸溫酒鹽

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

八藥靈砂丸出危氏方治諸虛百損白濁耳鳴

當歸酒浸 鹿茸去毛鹽水酒炙黃耆各一兩 沈香一兩 北五味半兩

遠志一兩 酸棗仁一兩 茴香炒 吳茱萸去核 破故紙炒 牡蠣煅 熟地二兩 人參一兩 龍骨煅 附子 巴戟各一兩 硃砂一兩

右為末酒糊和丸每服五十丸至七十丸温酒鹽湯下

龍齒補心湯出直方治諸虛不足潮熱心内驚惕睡臥不寧小便油濁

龍齒煅 人參 當歸酒浸 熟地各一兩 桔梗焙 酸棗仁炒熟 麥門冬去心半兩 半夏麴各一兩 白术炒 甘草各半兩炙 枳殼炒麩 白茯苓去木遠志一兩 肉桂二錢半 黃耆七錢半炙

右為末每服三錢水盞半薑五片粳米一撮同煎不拘時服

鹿茸益精丸出直方治心虛腎冷漏精白濁

鹿茸去毛酥炙 桑螵蛸瓦上焙 肉蓯蓉 當歸 巴戟天

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:42
列印頁數：5
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

心去 兔絲子 酒浸 杜仲 鹽水炒 斷絲 益智仁 川練子 去皮 取肉 赤石脂 韭子 炒 禹餘粮 煆用醋淬碎 為度各三錢 破故紙 山茱萸 龍骨 二兩 滴乳香 一分 右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十丸食前白茯苓煎湯下

茸兔丸 出經驗方 治心腎不交小便滑數精神耗散腰脚無力

鹿茸 肉蓯蓉 乾地黄 菟薢 杜仲 五味子 白茯苓 各二兩 木瓜 一兩 巴戟 枸杞子 川牛膝 補骨脂 青鹽 各二兩 兔絲子 金鈴子 各五兩 蓮肉 八兩 右依法炮製為末酒煮山藥末糊為丸如梧子大每服五六十丸空心温酒或鹽湯送下

暖腎丸 出格方 直治腎虛多溺或小便不禁而濁

葫蘆巴 一兩炒 破故紙 一兩炒 川練子 一兩炒研 益智仁 二兩 熟地黄 三兩 鹿茸 一兩酥炙 赤石脂 各一兩 山茱萸 一兩 代赭石

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:42
列印頁數：6
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

龍骨 煅醋淬 各半兩 海螵蛸 一兩 艾 炙 一錢 丁香 沈香 乳香 各二錢 禹餘粮 煅醋淬三次碎

右為末糊丸桐子大每服五十丸煎石菖蒲湯送下

子午丸 出危氏方 治心腎俱虛夢寐驚悸常自煩悶短氣不樂消渴停飲下赤白濁甚至四體無力眼昏形瘦耳鳴頭暈惡風怯冷

枸杞子 白龍骨 川巴戟 去心 破故紙 炒 真虎珀 各一兩 芡實 一兩半 赭石 白礬 枯 榧子 二兩去殼 蓮肉 去心 赤茯苓 各一兩 文蛤 半兩 蓮花 半兩 牡蠣 煅 一兩

右為末酒蒸肉蓯蓉一斤爛研為丸如桐子大硃砂為衣煎蓍薛湯空心吞下忌勞力房事

十四友丸 補諸虛不足益血收斂心氣治怔忪不寧精神昏倦不安赤白濁甚

心腎丸 見虛門諸 治水火不濟心下怔忪夜盜汗便赤夢遺

鹿茸散 治臟腑久虛夢泄

鹿角屑 一兩 鹿茸 酥炙 一兩 白茯苓 三錢 人參 一兩 桑螵蛸 研 一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

兩 芎藭 一兩 當歸 一兩 破故紙 炒 龍骨 各半兩 栢子仁 去殼 甘草 炙 各一兩 椹子 酒浸一宿半兩 右為末每服三錢半生薑五片棗三枚粳米百粒食前煎服

家韭子丸 出格方直 治腎氣不足精遺 方見小便淋門遺精類

遠志丸 出格方直 治腎不足遺精白濁驚悸健忘夢寐不安足脛酸疼

遠志 去心 取肉 地黃 洗 天門冬 去心 龍齒 各一兩研 麥門冬 去心 五味子 一兩 車前子 半兩 白茯苓 去木 地骨皮 各一兩 桂 三錢 山藥 炒 一兩 熟地 一兩半 右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸食前粳米湯送下

芡實丸 出氏方危 治思慮傷心房勞傷腎心腎不交精元不固面少顏色驚悸健忘夢泄小便赤澁遺精白濁足脛酸疼耳聾目昏 方見諸虛門補虛固精類

瑞蓮丸 出生方濟 治思慮傷心便下赤濁

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:42
列印頁數：8
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白茯苓 去木 石蓮肉 去心炒 去心 龍骨 生用 天門冬 去心 麥門冬 去心 遠志 去心 甘草 煮 栢子仁 炒 研 當歸 酒浸 紫石英 醋煅七次 酸棗仁 炒去殼 龍齒 以上各一兩 乳香 半兩 各研

右為末煉蜜為丸如梧桐子大硃砂為衣每服七十丸空心温酒棗湯下

下虛小便赤白常服鎮心益血 方見諸虛門諸虛補益類

降心丹 出格方直 治心腎不交盜汗遺精及熱藥過多上實下虛小便赤白常服鎮心益血 方見諸虛門諸虛補益類

清心蓮子飲 一名加味清心飲 治心中客熱煩躁赤濁

石蓮肉 白茯苓 各一兩 益智仁 水浸出薑汁炒 遠志 水浸 麥門冬 去心 人參 各半兩 石菖蒲 車前子 一兩 白术 一兩澤瀉 甘草 炙 各二錢

右剉散每服三錢添燈心一握煎熱加薄荷少許

韭子丸 出金方 出千方直格 治小便失精及夢泄精 方見虛勞門虛勞失精類

妙應丸 治赤白濁通用

真龍骨 辰砂 厚朴 以腐草裹重包定火煅并研細 石菖蒲 各二錢半 川練子 蒸去皮取肉半兩 白茯苓 二兩 益智仁 三兩 石蓮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肉一兩 砂仁三兩 桑螵蛸瓦上焙 兔絲子酒浸一宿各半兩
右以藥碎研為末糊丸如梧桐子大每服五十丸煎
人參酸棗湯下臨臥服或粳米飲送下

韭子丸 治虛勞夢泄 方見虛勞門夢泄類

固精丸出生方治嗜慾過度勞傷腎經精元不固夢遺白濁

肉蓯蓉酒浸薄切焙 陽起石煅研 韭子炒 龍骨生用 赤石脂煅七次 川巴戟去心 白茯苓 鹿角霜 附子炮去皮臍各等分

欽定四庫全書

十補丸 治真氣虛損下焦耗竭臍腹强急腰腿疼痛出血盜汗遺泄白濁大便自利小便滑數或三消渴飲食倍常肌肉消瘦陽事不舉顏色枯槁久服補五臟行榮衛益精髓進飲食 方見諸虛門補虛固精類

薰草湯 治夢失精

薰草一兩 人參一兩 乾地黃三兩 白朮芍藥各兩 茯神一兩 桂心 甘草各二兩 大棗十二枚

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右切以水八升煮取三升分為二服如人行四里一

方又有茯苓三兩忌桃李雀肉大酢海藻松菜生葱

石斛散　治男子夢泄精

石斛七分　桑螵蛸　紫苑各二分　乾漆煮　五味子　乾

地黄　鍾乳粉研　遠志皮　附子炮去皮臍各二分

右搗合為末以酒服方寸匕漸增至二匕日三服忌

猪肉冷水蕪荑

蓮子清心飲一名清心蓮子飲　治心中蓄熱時常煩躁因思勞

力憂愁抑鬱致小便白濁或有凝脂夜夢走失淋瀝

便赤如血或因酒色過度上盛下虚心火炎上肺金

受尅口舌乾燥漸成消渴睡臥不安四肢倦怠男子

五淋婦人常下赤白帶病後氣不收斂陽浮於外心

煩熱方見諸虚門補虚益氣類

小溫金散出危氏方　治虚熱或觸冒暑氣旋下或赤或白或

淋瀝不止

人參去蘆　石蓮肉去心巴戟去心　益智仁去殼　黄耆去蘆　菴蘭

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

酒浸焙 麥門冬去心 赤茯苓去皮 甘草各等分

右為散每服三錢水一盞燈心二十根紅棗二枚煎

食前溫服以後藥同煎俱為散服

秘精丸一名固精丸 治下虛胞寒白濁或如米泔或如凝脂

腰膝少力方見諸虛門補虛固精類

金鎖鎮元丹治真氣不足氣促喘乏心怔忪盜汗小

便滑數遺精白濁一切元臟虛寒方見諸虛門補虛固精類

赤茯苓散出醫方大成 治心經伏暑小便赤濁

人參 白朮 赤茯苓 香薷 澤瀉 猪苓

蓮肉 麥門冬去心各等分

右㕮咀四錢每服水一盞煎服

蒼朮薑炒 川練子去皮取肉各三兩 川烏炮去皮臍各三兩 破故紙炒 白茯苓 龍骨研各三兩

蒼朮薑去粗皮米泔水浸一宿 茴香炒

蒼朮難名丹出直格方 治元陽氣衰脾精不禁白濁淋瀝腰

痛無力

右為末酒糊和丸如梧桐子大硃砂為衣每服五十

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丸空心縮砂煎湯下或粳米湯下蒼术收斂脾精故也

遠志丸 出經驗良方 治白濁

白茯苓 一兩 麥門冬 去心一兩 遠志 去心 石菖蒲 各半兩 人參 去蘆 益智仁 去皮各二錢半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大麥門冬燈心煎湯送下三十丸

桑螵蛸散 出危氏方 治男子小便日數十次如稠米泔色心

神恍惚瘦悴食減多因房勞過度耗傷真氣得之服不終劑而愈

桑螵蛸 遠志 去心 水煮取肉 甘草 菖蒲 龍骨 煅 人參

茯苓 當歸 酒洗 鱉甲 醋炙各等分

黃耆湯 治諸虛失精

黃耆 當歸 甘草 炙各二兩 桂心 六分 蒺藜 石斛 各三

一方無桑螵蛸遠志右各等分為末每服二錢夜臥人參或茯苓湯調下

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:44
列印頁數：13
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甘棗 一百三兩 十枚 白蜜 二斤

右切以水一斗煮取四升內蜜煎取三升分為四服日三夜一以食相間忌海藻菘菜生葱

鹿角湯 治勞夢泄精

鹿角屑 一斤 韭白 半斤 生薑 一斤 芎藭 茯苓 各二兩 當歸 酒洗 鹿茸 炙 各二兩 白米 二合

右切先以水五斗煮鹿角取一斗二升去滓內諸藥煮取四升分服一升日三夜一鹿角唯取胖者打碎

用忌酢物

通治還少丹 出危氏方

治心腎俱虛漏精白濁

山藥 牛膝 酒浸 白茯苓 山茱萸 去核 茴香 炒 各一兩半

菟絲子 酒浸 續斷 去蘆 各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯下

白濁方

烏藥 蓮子 藕節 白茯苓 益智仁 各一兩 花椒 甘草 各三錢

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右等味為粗末用猪肚洗淨入藥在內以線縫口入鍋用水二三盞文武火煮之候猪肚軟取去藥滓薄切食之用汁作粥食之尤良甚效

續斷丸 出經驗良方 治遺精白濁

川續斷 獨活 栢子仁 各二兩 穀精草 二兩半 蓮花藥 半兩 雞子 七箇用白

右為末將雞子白打和藥末次用酒糊為丸空心温酒送下五六十丸

欽定四庫全書 普濟方

又方治便濁不止漸成虛損每便過張目仰視自然盜汗致損失神

用白茯苓三兩研為末鎔蠟和丸如圓眼大細嚼二丸空心棗湯下神效

又方

用冬瓜仁砂為末空心米湯調下五錢許

金櫻子煎 補腎秘精治小便白濁

金櫻子 一升搥碎用好酒二升銀鍋內熬乾至一升去滓再煎成膏 桑白皮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桑螵蛸 浸酒 雞頭粉 龍骨 蓮花藥 各半兩
右為末入膏子和丸每服二十丸用鹽湯送下食前服之

治玉柯硬不癒即腎精流無歇時精如針狀捻之則碎乃為精漏疾矣 出經驗方

用韭子破故紙各一兩為末每服二錢水一盞煎至六分每日三次飲之愈即住服

治白濁

用榆樹皮一味或焙或爆乾為末湯浸蒸餅為丸每服三十丸空心白湯下

治夢中遺精 出經驗方

用乳香如大拇指一塊臨臥時將放口中嚼爛至半夜即吞下不兩三次病愈

遠志丸治心腎虛損精神恍惚健忘多驚白濁泄精

精虛汗耳聾此藥皆治之 方見諸虛門補益諸疾類

耆絲丸治少年色欲過度精血耗竭心腎氣敗遺泄

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白濁腰背疼痛面色黧黑耳聾目昏口乾脚弱便利夢與鬼交陽事不舉（方見諸虛門補虛固精類）

治白濁

用茴香丸或八味以五苓散下之

心腎丸（出經驗方）治男子白濁小便多滑婦人血冷

蒼术（一斤酒糟三斤淹兩宿去糟）肉桂（二兩）川椒（四兩炒去鹽）吳茱萸（四兩同蒼术糟半斤炒川練子去糟用）茴香（二兩同茱萸炒）川練子（四兩）

右為末酒糊為丸桐子大硃砂為衣每服五十丸鹽湯溫酒下

地黃丸（出危氏方）治心腎水火不濟或因酒色遂至已甚謂之土淫蓋脾有虛熱而腎不足故土邪干水蓋夏則土燥而水濁冬則土堅而水清此其理也醫者往往峻補其疾反甚此方中和補瀉兼之水火既濟而土自堅則其流清矣

熟地黃（九蒸十兩）菟絲子（酒浸半兩）茯苓　栢子仁（各三兩）附子（炮一兩）

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:45
列印頁數：17
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末鹿角膠煮糊和丸如梧桐子大每服百十丸鹽湯下

分清飲 方仁存 通心氣補漏精治男子小便白濁由思慮過度致陰陽不分清濁相干不宜亟補唯此藥能分清濁不調湛濁淋瀝

利之及婦人經候不調湛濁淋瀝

四錢 蕳蘛 去皮毛 石菖蒲 白茯苓 醋浸兩日 烏藥 各一兩 甘草

右為末每服三錢水一盞鹽一撮同煎一方無茯苓

甘草只四味等分名蕳蘛分清飲

蒜丸 危氏方 治白濁

杜仲 川烏 破故紙 人參 巴戟 各等分

右為末蒜膏和丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯温酒送下

腎濁祕精丸 一名附子丸 治元氣不固遺精夢泄 出醫方集成

大附子 炮去皮臍 龍骨 煅 蓯蓉 酒浸 巴戟 去心各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯空

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

心送下

固真丸 危氏良方 專治精洩不禁

禹餘粮 石中黃 赤石脂 紫石英 石燕子 五味各一兩炭火煅醋十兩淬至乾為度研用

右以白茯苓四兩人參二兩青鹽一兩同為末入無灰酒約量多少打糊拌和衆藥為丸以硃砂為衣如臥服一名仙方固真丹

小雞豆每服二丸至三丸温酒下或鹽湯下空心臨

灰酒約量多少打糊拌和衆藥為丸以硃砂為衣如

右以白茯苓四兩人參二兩青鹽一兩同為末入無

固真丸 危氏良方 專治精洩不禁

禹餘粮 石中黃 赤石脂 紫石英 石燕子 五味各一兩炭火煅醋十兩淬至乾為度研用

參苓丸 經驗良方 治泄精無常

藕節 菱角肉 各二兩 人參 白茯苓 各半兩 石蓮肉 一兩

右為末用黃酒糊為丸如梧桐子大煅土末為衣每

服三十丸温酒下

搏金散 仁存方 治便濁之疾皆緣心腎不濟或因酒色遂

至已甚謂之土淫蓋有虚熱而腎不交故土邪干水

史載之嘗言夏則土燥而水濁冬土堅而水清此其

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

理矣醫者往往峻補其疾反甚此方中和服之水火既濟而土自堅其流清矣

人參一兩 白茯苓二兩 絡石二兩 龍骨一兩煅

右為末每服二錢空心臨臥米飲調下

治虛勞尿精白濁方 出千金方

用榆白皮切二斤水二斗煮五升分五服

用搗乾羊骨為末服方寸匕日二服

治白濁 出千金方

四白頭 亦名玉華白丹 治虛寒壯胃飲食作痰喘嗽清上實下

兼治婦人白帶男子白濁遺精 仁存方

焰焇 二兩研細 白礬 三兩研細 石膏 四兩研細 砒霜 二兩研細

右用一火鼎子先以火炙用生薑自然汁塗内外數遍炙乾先下砒末半兩次以砒末半兩和□硝末一兩和礬末一兩半和石膏二兩按實却以石膏末二兩緊按在上用圓瓦片子蓋合口上止簇炭五斤發頂火煆烟盡為度去火候冷取藥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

刮淨研如細粉再加好白石脂煅一兩研細和前藥滴水為丸雞豆大候乾再入新鍋内用瓦蓋定置磚上簇炭三斤一煆通紅為度用鉗鉗出傾丹在厚氈盆内乘熱攪動候冷丹出火毒每服三粒用冷水吞下以乾物壓之忌熱物

金鎖丸 治男子婦人滑精鬼交遺泄 方見諸虛門補固類

坎離丸 出仁存方 治水火不濟滋補心腎治白濁夢泄

辰砂 一兩 酸棗仁 一兩取肉 附子 炮去皮臍 一兩 乳香 半兩

右碾附子末入三味和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服一丸温酒送下空心服須是臘月合磁器收

寧志膏 出和濟方 治心臟虧損神志不寧恐怖赤濁恍惚健忘睡臥不安夢涉危險一切心疾並皆治之 方見心門心臟

類狂

茯苓散 治心虛夢泄亦治白濁神効見東坡方如服湯法飲食内皆可服

用白茯苓為末每服四錢粳米湯調下間用温

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

水調下空心食前臨臥日三服

四精丸 方危氏 治白濁

鹿茸 蒐蓉 山藥 茯苓 各等分

右為末米糊和丸如梧桐子大每服三十丸棗湯下

小菟絲子丸 方危氏 治腎氣虛損五勞七傷小腹拘急四肢疼痛面色黧黑唇乾口燥目暗耳聾心忪短氣夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味

或用沈香木香湯下

右為末山藥糊和丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒或鹽湯下如脚膝無力木瓜湯下晚食前再服

一兩

石菖蒲 二兩 菟絲子 酒浸焙為末五兩 山藥 二兩七錢半 白茯苓

延年聰耳明目

補骨髓續絶傷補五臟去萬病明視聽益顏色輕身

濕痺水道澁滯小便出血時有遺泄並宜服之久服

舉動乏力心腹滿腰脚疼小便滑數房室不舉股内

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:47
列印頁數：22
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桑螵蛸丸　治下焦虛冷精滑不固遺瀝不斷
附子（去皮臍）　五味子　龍骨（各半兩）　桑螵蛸（三錢）
右為末純糯米糊和丸每服三十丸空心鹽湯吞下

治白濁

白濁遺精最擾人　茯苓半夏小烏沈
更加益智四十丸　不顧年深歲月深

四精丸　治思慮色慾過多心氣不足神志耗散遺精
白濁小便頻數常服補益精髓駐顏悅色（方見諸虛門補）

虛固精類

斬夢丹　治夢泄遺精
知母（一兩）　黃柏（一兩去皮）　滑石（三兩）

遠志丸　治小便赤濁
遠志（去心甘草水煮半斤）　茯神　益智仁（各二兩）

右為末白水和丸空心温酒鹽湯送下

栝蔞丸　治男子尿精
右為末酒糊為丸每服五十丸臨臥棗湯送下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

栝蔞根 澤瀉 土瓜根 二兩

右為末以牛膝和丸如梧桐子大先食服三十丸良

茯苓散 一名白茯苓散 治白濁甚至下血 方見勞門小便白濁類

牡蠣散 治夢遺精淋瀝 方見諸虛門補益諸疾類

分清飲 治白濁

益智仁 主益精治虛漏小便淋瀝 萆薢 主陰痿遺尿補腎臟益精 菖蒲 通心氣止小便治白濁

右為末各等分每服三二錢

三白散 治小便遺泄痛赤白濁

遠志 去心 蓮肉 白茯苓

右各等分為細末用好酒調下每服二三錢空心服

金櫻子丸 治諸虛漏精白濁

真龍骨 厚牡蠣 煅 桑螵蛸 各一兩

右以黑豆一盞淘濕將前三件置黑豆上蒸半日去豆焙三件為末入白茯苓末一兩金櫻子四十枚去刺并穰蒂洗淨搥碎入磁器内入水一盞煮濃汁

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

濾清調茯苓末為丸如梧桐子大每服三十丸食前用益智仁五枚連殼搥碎北五味子十粒縮砂仁三箇煎湯下

煉鹽方　治漏精白濁

白鹽　入磁器内以瓦蓋定黄泥封火煅一日取出陰一宿用磁器收貯

山藥　各一兩

右為末入鹽一兩研勻用棗肉和丸如梧桐子大每服三十丸空心棗湯送下蓋欲以甘濟鹹脾腎兩得也

玉鎖丹　治心氣不足思慮太過腎經虛損真陽不固致有遺泄小便白濁如膏夢泄身體倦怠骨節酸痛

茯苓散　一名鎖陽丹　治泄精及治膀胱

虛煩盜汗　方見本門腎虛類

茯苓　猪苓　木饅頭　去皮子各等分

右為末每服二錢用米飲調一方不用猪苓

鎖陽丹　治精泄不禁

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桑螵蛸 三兩 焙乾 龍骨 二兩 白茯苓 一兩

右為末米糊和丸如梧桐子大每服五十丸煎茯苓鹽湯送下食前服

威喜丸 治精氣不固遺瀝常流小便白濁夢中頻泄及治婦人血海冷白帶白濁白淫下身常濕小便如泔或無子息

白茯苓 四兩 木猪苓 一兩去皮煮茯苓數沸 黃蠟 四兩溶

右以茯苓為末用蠟為丸如彈子大空心細嚼含生津液徐徐嚥下兼治耳鳴口乾忌米醋并腥氣

三白丸 治遺精白濁及滑泄盜汗

龍骨 全用一兩 牡蠣 煅一兩 鹿角霜 二兩

右為末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服四十丸空心食前用鹽湯送下

治小便白濁如精之狀

沒藥 木香 當歸 各等分

右為末以棘心自然汁為丸如梧桐子大每服五十

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丸食前鹽湯下

兔絲子丸　治思慮太過心腎虛損真陽不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻泄方見本門腎虛類

禁精湯　出千金方　治虛勞尿精方見虛勞門失精類

蓮肉丸　海上良方　治夢泄白濁

蓮肉　去心　白茯苓　各等分

右為末白湯空心調下

治失精暫睡即泄　一名固真散方見諸虛門補精類

茯苓丸　三因方　治心腎氣虛神志不寧小便淋瀝或不禁及遺泄白濁

赤茯苓　白茯苓

右為末以新汲水攪洗澄去浮沫控乾別取地黃汁同好酒入銀石器內熬成膏和丸如梧桐子大空心鹽湯嚼下常服輕身延年

三仙丸　出危氏方　治夢泄

益智仁　二兩用鹽二兩炒去鹽　烏藥

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:48
列印頁數：27
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末用山藥一兩為糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心臨臥鹽湯下以硃砂為衣凡病精泄不禁白濁頭眩虛極或寒熱用補澁之藥不効其脈浮軟而散蓋非房室過度也此無他因有所欲想而不遂故致其疾既以藥補且猶不効將何治之緣心有愛則神不歸意有想則志不寧當先和榮衛榮衛和則心神安次調脾胃脾氣和則志舍定心腎交媾精神内守其病自愈其治用人參三錢當歸一錢酒洗焙乾為末作三服沸湯調服頭眩遂瘥精不禁者用白芍藥半兩丁香三錢木香三錢剉散每服用生薑五片棗三枚煎空心服即心安神定精固神悅

珍珠粉丸 濟生拔粹方

治白淫夢泄遺精及滑出而不收

黃栢 一斤 新瓦上焙乾

真蛤粉 一斤 煆

右為末滴水丸如梧桐子大每服一百丸空心温酒下陽盛乘陰故精泄也黃栢降火蛤粉鹹而補腎陰也兼治思想所願不得

欽定四庫全書 普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白糯丸 良經方撰 治小便脚停白濁老人多有此證令人卒至頭昏

死大能耗人精液主頭昏

大白芷 一兩為末 真糯米 五錢重炒赤色

右為末糯米為丸煎木饅頭湯吞下無木饅頭用根

亦可後却用和濟局方補腎湯調補如後生禀賦怯

弱房室太過小便太多水道蹇澁小便如膏脂加石

葛蒲牡蠣即効

黃耆散 良經驗方 治白濁

黃耆 鹽半兩炒 一兩 茯苓 一兩

右為末每服一二錢空心白湯送下

清心蓮子丸 治經絡熱夢遺心中恍惚 方見諸虛門補虛固精類

五味子丸 良經驗方 治白濁及腎虛兩腰及背脊穿痛

用五味子一兩炒赤為末用醋糊為丸醋湯送下三

十丸瀉用薪艾湯吞下

牡蠣丸 治精氣不禁白濁夢遺

半夏 一兩鹽水洗十次每箇分作兩箇以猪苓去皮二兩為粗末同半夏浸火炒黃放地去火

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

壽一宿不用猪苓 牡蠣一兩研成粉 右為末以山藥糊為丸如梧桐子大養藥磁器内密

收每服三十丸茯苓湯下

約精丸 直方格 治小便泄精 冬霜後採者一斤酒浸一宿搗細 白龍骨二兩 新韭子 酒浸一宿搗細 右為末酒調糯米糊為丸如梧桐子大每服三十丸

空心鹽湯下一方為散酒服

蓮子六一湯 直方指 治心經虛熱小便赤濁 石蓮肉 連心 六兩 甘草炙一兩 右為末每服二錢燈心煎湯調服

黑丸 治精血耗竭面色黧黑耳聾目昏口乾多渴脚弱腰疼小便白濁上燥下寒不受峻補 方見諸虛門補虛益精類 水陸二仙丹 仁存方 治白濁 金櫻子 去子洗淨搗碎入瓶中蒸令熱用湯淋之取汁慢火熬成膏 芡實 去殼炒熟為末

右二味用酒糊為丸每服三十丸酒吞食前服一方

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,普濟方,卷三十三
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用女子乳汁丸為妙一方鹽湯下

破故紙散 三因方

治精氣不固

破故紙 青鹽同炒香

右各等分為末每服二錢用米飲調下

猪苓丸 一名半夏丸

治年壯氣盛情慾内動所願不得意淫於外夢遺白濁精滑不禁素問云腎者作強之官伎巧出焉又云腎氣藏精能攝精氣是生育之府也或斂或散皆主於腎今腎氣閉則身之精血無所管攝故妄行而出不時也

半夏一兩 猪苓一兩

右以半夏剉如豆大用猪苓為末先將一半炒半夏黄色不令焦放地出火每半日取半夏為末糊和丸如梧桐子大候乾更用餘猪苓末同炒裂入不油沙瓶中養之每服四十丸空心温酒鹽湯送下如常服

於申未間冷酒下一方雞子清為丸煎白茯苓湯下名雞清丸一方酒糊為丸鹽酒米飲下名半夏丸一

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:50
列印頁數：31
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

方陳粟米飯為丸温粟米飲下一方黄蠟為丸好酒鹽湯送下

羊脛灰丸　治思慮傷脾脾不攝精遂白濁（方見諸虛門補虛固）

精類

治失精（方十全）

石榴皮（合切五）　桑螵蛸（炙用）　桑白皮（蜜炙各五錢）

右以酒五升煮取三升分三服一方石榴皮作枯白皮

治男子婦人精滑夜多遺精

用益智四十九箇當甲穿過作一串用青鹽一小塊水二盞煎一盞去滓温服一方用二十四箇剉加鹽煎服

乾膠散（方千金）　治失精

用乾膠三兩為末以酒二升和分服瘥即止一方用鹿角膠

韭子方（方千金）　治夢泄失精及溺白

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:50
列印頁數：32
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用新韭子二升十月霜後採好者用好酒八合浸一宿明旦日色好身子向南搗一萬杵平旦酒五合服再一方微炒為散食前酒服一方生韭子空心鹽湯下三十丸

凝真丹　治下丹不凝結則真氣不固夢遺白濁骨酸短氣面黃體重形容瘦悴情思不樂飲食減少方見諸虛

四妙丹　一名神益固真丹　治元氣久虛及小腸腎餘膀胱疝氣

五淋白濁精滑精漏婦人血海虛冷赤白帶下血崩

香妙散　出危氏方　治男子婦人小便赤濁諸藥不効者

五苓散　辰砂妙香散

右和勻用天門冬麥門冬去心煎湯空心調服一二錢一日三服

羊骨湯　治失精多睡

羊骨　一具　飴糖　生地黃　白术　各三斤　大棗二十枚　桑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白皮　厚朴　阿膠各一兩　麥門冬　人參　芍藥各二兩　生薑　甘草各三兩　茯苓四兩　桂心八兩

右㕮咀以水十斗煮羊骨去骨取三斗煮藥取八升湯盛下入膠飴糖令勻平旦服一升後旦服一升

五味子丸　衛生家寶方　補心腎治白濁久服行步如少年

五味子半四錢　續斷一錢　山藥七錢　人參七錢　菟絲子一錢　白栢子仁二錢　川芎一錢　牛膝半兩　遠志一錢　茯苓一錢　山茱萸一錢半　龍骨半兩生用

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯下

寧心志濟經丹　衛生寶方　治心腎氣不足

硃砂　乳香　沒藥　白茯苓　白芍藥　當歸各二兩　酸棗仁　遠志去心　葛蒲　人參　白茯神各一兩　熟地二兩

右除硃砂別研外並為末同和煉蜜為丸如梧桐子大食後熟水下忌猪羊血每服三十丸

茯苓丸　衛生家寶方　治男子小便白濁漸成淋瀝或痛或不

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

痛日久覺鬱瘦四肢乏力不思飲食神驗

猪苓二兩 茯苓半兩 半夏半兩

右半夏湯浸八九次剉作兩片同木猪苓一處炒令黃色去猪苓不用只取半夏研細同茯苓粟米糊調丸如梧桐子大食前空心時熟水下二十丸

治小便白濁出髓條 危氏良方

智 淨洗 大茴香 牡蠣 火煅碎為度 人參 白茯苓 破故紙 炒 益智 炒 酸棗仁 炒 白朮

右各等分為末加青鹽酒糊為丸每服二十丸空心温酒下米飲亦可日進二服

瑩泉散 出京邑良方

治心脾不調腎氣弱成便溺白濁

厚朴 一兩生薑汁製微炒用 白茯苓一錢

右咬咀作一服水酒各一椀煎至一椀分作二服食前温服

訶子丸 出海岱居士秘方

治腎虛脫精

訶子 龍骨 各一兩

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:51
列印頁數：35
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為細末滴水為丸如小指頭頂大硃砂為衣每服一丸早晨空心葱湯下

治男子婦人白濁或腸漏出永類鈐方

厚朴薑汁炒 益智仁鹽水浸炒

右薑棗煎不拘時服

金鎖丸出千金良方

治腎冷及精滑小便頻數

肉蓯蓉五兩酒浸三日熬膏 巴戟二兩 破故紙四兩 附子三兩炮去皮臍

胡桃三十箇同蓯蓉研

右為末同前蓯蓉膏和搗五七百杵丸如梧桐子大

酒下五十丸

牡蠣丸出衛生家寶方

治中年已後腎氣虛冷夢遺泄精小便白濁

石亭脂研用

牡蠣煅用醋浸少時生用

青鹽

龍骨真者飯上蒸一次

右等分為末以青鹽打糊為丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽湯温酒下見効即住服中年以下去石

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

亭脂

治白濁赤濁道人龍骨丸 出衛生家寶方

龍骨 半兩
牡蠣 半兩

右研為細末同入鯽魚腹内用紙裹入火内炮熟為杵為丸每日用鯽魚大小無拘三四尾只看上件藥盡為度服時看藥効如何更入茯苓半兩遠志半兩同入藥内尤佳每服二十丸空心米飲下

葫蘆巴丸 出楊氏方

治下焦陽憊臍腹冷痛小便白濁肌膚消瘦飲食減少及膀胱疝氣並宜服之

葫蘆巴 炒
破故紙 炒
川練子 去核炒
茴香 炒
川椒
青鹽
山藥
青橘皮 去白
陳皮 去白
附子 炮去皮臍

右件各等分為細末酒煮糊為丸如梧桐子大每服五十丸温酒空心食前服

龍骨丸 出楊氏家藏方

治下虚胞寒小便白濁或如米泔或若凝脂腰重力少

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

牡蠣（煅粉）　熟地（煅為末）　菟絲子（酒浸一宿）　白茯苓（各半兩）　龍骨　肉桂　白石脂　五味子（已上四味各二錢半）

右件為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸或温酒或鹽湯送下空心食前服

水仙丹（出楊氏家藏方）治水火不足精神恍惚怔忪健忘遺精白濁小便淋瀝消渴吐血衄血溺血及虛煩發熱並皆治之

白芨（一兩剉用麻油一小盞同入銚子內煎令藥焦黑色為度去藥更煎油良久以木筯點油向冷水中成花不散為度如未更煎良久入盞內收之）　硃砂（不拘多少細研水飛過）　木通（令為細末一兩）

右件將前油和研細硃砂木通看多少和如軟麵相似用濃皂角水洗藥劑數遍令油盡却以水浸之每日空心丸如梧桐子大每服三粒至七粒新水下無忌其浸藥水一日一換

鎖精丹（出續易簡方）治腎氣閉遺精

龍骨（一兩）　蓮心（一百箇）　半夏　猪苓（各二兩）

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:52
列印頁數：38
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右將龍骨蓮心為末半夏用湯浸以竹刀分四方界之不可令斷開猪苓如半夏切了搥扁同半夏炒令黄色揀半夏研為末入龍骨蓮心内粟米糊丸如梧桐子大外別研猪苓為末養此丸子每服三十丸空心食前鹽湯下遺白濁

益陽丹 出訣方 治丈夫心腎不交陽氣癈弱纔交即洩夢

丁香 二錢 木香 三錢 木通 二錢去皮 遠志 一兩 石蓮肉 半兩麥門冬 半兩去心 白茯苓 半兩 龍骨 煅 一兩 半夏 半兩用大猪苓半兩切作小粒同炒色黄猪苓 茴香 半兩翅足同炒黄色去斑猪

強志丸 出驗方 朱焦益心血活腎水治白濁

兔絲子 熟地 各二兩 茯伸 山藥 黄耆 石蓮 各一兩半 栢子仁 附子 遠志 枸杞子 杜仲 破故紙 鹿茸 各一兩

每服四十丸空心温酒鹽湯下亦能分清濁

右為末酒煮山藥入砂盆内杵千下丸如梧桐子大

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:52
列印頁數：39
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服四五十丸空心酒下赤濁用麥門冬煎湯下硃砂為衣

石斛丸　治腎經精寒丹田凝陰小腸時痛腰膝時冷小便白濁頭暈耳鳴或痰涎壅塞身倦怠膈滿怔忪飲食化遲腸鳴氣走

葫蘆巴　菟蘇　石斛　附子　巴戟去心　菟澄茄　揀用茯苓　山藥　沈香　鹿茸

右各一兩為細末猪腰五對煮爛用汁調藥為丸如梧子大空心米飲下四五十丸酒亦可

茯苓散　治夢中虛滑遺精

白茯苓二兩　縮砂仁一兩

右件為細末入鹽二錢用精羊肉批作大片摻藥在上炙熟空心服之然後飲酒三盞

治男子溺精遺瀝腎勞白濁

用真玉華白丹人參茯苓益智仁湯下甚効

酸棗湯　永類鈐方

有夢遺服心腎藥無効醫問腦冷否蓋腦

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

冷則髓不固遂服驅寒藥腦氣冲和兼効醫説秘方所傳

加半夏一兩

右瓦器盛薑棗煎臨臥服

痼俳附論

内經謂内奪而厥則為痼俳此腎虚也痼俳之狀舌瘡不能語足疼不為用蓋腎脈挾舌本腎氣内奪氣厥舌本至不能語而為痼腎脉循陰股循髓骨内踝入足下腎氣不足故足廢而為俳地黄飲治腎氣厥語聲不出足廢不用

熟地巴戟菜萸炒 蓯蓉酒浸 附子炮去皮臍 石斛去根 五味子 桂白茯苓各一兩 麥門冬去心 遠志去心 菖蒲各半兩

右為粗散每服三錢水一盞生薑三片棗二枚擘破

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

同煎七分去滓服

八味丸　治腎氣內奪舌瘡足廢　方見諸虛門補虛固精類

菟絲子丸　治腎氣內奪舌瘡足廢

菟絲子（酒浸）　白茯苓　附子（炮去皮臍）　桂　菖蒲　遠志（去心各等分）

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒或鹽湯下空心服

補骨脂丸　益腎氣治瘡俳

補骨脂（一兩炒）　遠志（去心一兩）　鍾乳粉（各半兩）　菖蒲（半兩）　肉蓯蓉（酒浸一兩）　麥門冬（去心半兩）

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸煎木通湯下空心臨臥服

石斛丸　治腎氣內奪厥逆瘡俳補腎　一名金釵石斛丸方見諸虛門補虛類

解㑊　附論

內經謂各脈太過則令人解㑊脊脈痛而少氣不欲言

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:53
列印頁數：42
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夫腎為作强之官精為身之本所以運動形體者也一或受邪則腎實而精不運故有脊脈痛少氣不欲言之證名曰解㑊者解有解緩之義㑊則疑於寒亦疑於熱疑於壯亦疑於弱不可必之辭其尺脈緩而濇利腎湯　治解㑊脈痛氣乏不欲言此為腎氣傷也

澤瀉　生地黃　赤茯苓　各一兩　桃柳　劉　牛膝　酒浸　各一　麥門冬　去心焙　柴胡　枳殼　麩炒　茯苓　各五錢

右為粗散每服三錢水一盞煎至七分去滓温服

通腎湯　治解㑊少氣不能言脊脈急痛腰脊强直足下熱疼小便癃閉心煩噎氣

蒴蒲　劉　羚羊角　鎊　生地　焙　赤芍藥　各二兩　五味子　甘草　猪苓　去皮　黑　澤瀉　各一兩

右為粗散每服三錢七分水一盞煎至七分去滓温勻氣散　治腎氣有餘足少陰脈太過令人脊痛少氣不欲言

服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

枳殼 去瓤 麩炒 澤瀉 赤茯苓 牡丹皮 木通 剉 檳榔 元參 各一兩

右為粗散每服三錢水一盞煎七分去滓温服

凡骨髓虚實之應主於腎膀胱若其臟腑有病從骨生熱則應臟寒則應腑腑故腎生骨髓若腎氣之餘其氣虚則骨弱痿疼倦而無力其氣實則骨熱苦煩津液内燥當隨證以治之夫骨髓之病應肝膽若其臟腑有病從髓生熱則應臟寒則應腑腑故髓虚者腦痛不安身常青悚髓實者身體煩燥勇悍驚悸亦當隨證治之

人參飲治骨極虚寒面腫垢黑腰膝疼不能久立屈伸夢寐驚悸上氣小腹急痛腰背四肢常冷小便白濁

人參 五味子 熟地黄 焙 赤芍藥 甘草 炙 麥門冬 去心 白茯苓 桂 各一兩

右為粗散每服五錢水一盞半羊腎一箇去筋膜切

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

同煎至八分去滓不拘時温服

羌活丸 出聖惠方 治髓虚寒腦痛不安補髓

羌活 芎藭 炒各一兩 桂一兩 當歸一兩 人參二兩 大棗三十箇取肉 大麻仁 研 羊髓 酥 牛髓各一兩

右搗為末與棗肉麻仁酥髓相和入銀瓷器中重湯煮候稠可丸即丸如梧桐子大每服三十丸空心服温酒下加至四十丸一名羌活補髓丸

柴胡湯 出千金方 治髓實勇悍熱生煩躁

柴胡 升麻 梔子仁 各三錢 澤瀉 淡竹葉 生地黄各一兩 黄芩 細辛 枳實各二錢

右為㕮咀每服五錢水一盞下芒硝半錢再煎一沸去滓分二服早晨一服日午一服一名柴胡發泄湯

地骨皮湯 治髓實使人强悍驚熱

地骨皮二兩 胡黄蓮 柴胡 當歸 澤瀉 黄芩 各半兩 甘草炙 枳實去瓤各一兩

右粗搗每服三錢水一盞煎至七分去滓温服日二

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夜一

蒺藜湯　治骨髓虛冷痠痛

肉蒺藜（炒去皮膚）　補骨脂（炒）各一兩　酒浸兔絲子　人參　黃耆（劉）　木香　附子

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓温服食前服

秦艽湯　治骨實煩熱

秦艽（半兩）　甘草（炙）　前胡　柴胡（各一兩）

右為㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓温服

補骨脂湯　治骨虛痠疼多倦

補骨脂（炒）　附子（炮去皮臍）　人參　肉蒺藜（酒浸切焙）　五味子（各一兩）

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分臨熟入二分攪勻去滓温服

枳實湯　治髓實氣勇悍煩熱

枳實（去瓤）　柴胡　當歸　甘草（炙）　芎藭（各一兩）

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:54
列印頁數：46
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服食前夜臥

温髓湯　治髓虚骨寒

附子（炮去皮臍）　人參　黄耆　細辛　桂（各一兩）

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心食前温服

地骨皮湯　治骨實熱煩痛苦

地骨皮　柴胡　甘草（炙各一兩）　胡黄連（一錢）

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服

四物湯（出千金方）　治骨實苦痛煩熱

葛根（汁取）　生地黄（汁取）　麥門冬（汁取）　蜜

右各半盞和勻分三服每服水半盞同煎至六分温服

地黄煎　治骨虚骨寒

生地黄（焙五斤）　補故紙　人參（各五兩）

右為末每服水二升藥末二兩羊腎一具去筋膜一

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

處細研慢火熬稠瓷器盛之每服一小匙溫酒化下空心日午睡時服

地黃散 出千金方 治骨虛髓冷痛無力

地黃八斤 地黃搥二升

右同於甑上炊兩次曝乾為散每服二錢溫酒調下不拘時候服

地黃酒 治骨髓虛冷痛

用生地黃一石洗切木臼中搗取自然汁絞去滓用酒二斗和勻同於瓷石器中煎熟為度瓷器盛貯每服酒飲一盞不拘時候

天門冬散 治骨熱疼痛

用天門冬為散酒服方寸匕日三一百日取瘥

虎骨酒 治骨虛痠痛不安好倦主膀胱寒

用虎骨一具通炙取黃焦汁盡碎如雀頭大釀者其骨見麴而飲水所以加之也酒熟封頭五十米三石麴四斗水三石如常釀酒法所以加水麴

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:55
列印頁數：48
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

日開飲之

芍藥散　治骨虛冷痛倦怠

骨極　附論　方見本門　骨極類

夫骨極之病本於腎臟中風腎主身之骨髓風邪中其臟則傷骨故為骨極所謂骨極者令人瘦削齒苦痛手足煩疼不可久立屈伸不利其氣衰則髮墮齒槁極實熱皆由腎受邪氣若氣陰則虛虛則寒寒故面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利其氣衰則髮墮齒槁不欲動是也然骨有極虛寒有極實熱皆由腎受邪氣若氣陰則虛虛則寒寒故面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利其氣衰則髮墮齒槁焰隱曲膀胱不通牙齒腦苦痛手足瘦削耳鳴色黑腰背相引而痛甚即咳唾氣陽則實實則熱熱故面是骨極之至也宜隨證補瀉當治其微若甚則足少陰氣絶而骨枯髮無膏澤是為骨先死骨絶者不可治其痛切而伸縮不得者不過十日則死矣

肢節痠痛宜服

生地黃　八斤淨洗晒乾搗絞取汁　大麻子仁　半斤以杵研取汁　牛髓　一斤

地黃煎丸　治骨極腎臟勞傷少氣不足羸瘦無力

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白蜜二斤 無灰酒五升 大棗五十箇煮取肉 天門冬一斤取汁已上七味同於銀錫器中熬成膏入後藥味 鹿角膠五兩搗碎炒黃色 石斛去根二兩 覆盆子二兩 酸棗仁二兩肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皮炙乾 人參二兩去蘆頭 附子二兩炮去皮臍 牛膝二兩 白茯苓二兩 五味子二兩 熟地黃三兩 補骨脂三兩炒 乾漆二兩搗碎炒令出烟 肉桂二兩 杜仲二兩 菟絲子一兩酒浸一宿曝乾別搗為末

右為末入前地黃汁中以慢火熬候可丸即丸如彈子大每服以溫酒化下一丸空心午前晚後服若丸

欽定四庫全書

如梧桐子大每服三十丸其藥臘月合

鹿角膠丸 治骨極肌體羸瘦腎虛弱腰膝無力宜服

鹿角膠三兩炒研 補故紙一兩熟地黃一兩薯蕷一兩人參去蘆 附子一兩炮去皮臍 菟絲子一兩酒浸一夜曝乾別搗為末 白术一兩 栢子仁一兩去粗 杜仲一兩去粗皮炙為末 山茱萸一兩 酸棗仁一兩 虎脛骨一兩酥炙 牛膝一兩塗刮去皮乾 五味子一兩 巴戟一兩去心 肉蓯蓉二兩酒浸一宿

普濟方

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,普濟方,卷三十三
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服以温酒下三十丸空心及晚食前服

附子丸 治骨極肢節瘧痛脚脛無力兩耳虛鳴

附子 二兩炮去皮臍 肉蓯蓉 二兩酒浸一宿刮去皮炙令乾 補骨脂 一兩炒 柏子仁 一兩去皮 肉桂 一兩去皮 牛膝 一兩去蘆 薯蕷 一兩 山茱萸 一兩 酸棗仁 一兩 芎藭 三錢 鹿茸 一兩去毛酥炙黃 黃耆 一兩半 杜仲 一兩去粗皮炙令黃 五味子 一兩 牛膝 一兩 木瓜 五枚將硇砂十兩研細湯浸絹濾澄清石器煎成膏後將木瓜刮去皮切片和硇砂拌勻 碗內蒸令熟收藏用每料用木瓜三兩 雀 四十雙去頭足腸醋煮爛砂盆研布絞取肉以硇砂 木瓜入乾薑椒末各二兩酒三升慢火熬成膏用 附子 炮去皮臍 兔絲子 酒浸三日 沈香 別 木香 天雄 炮去皮臍 石斛 去根 蓯蓉 酒浸焙乾 天麻 酒炙 蒺藜子 炒去刺各二兩 羌活 一兩半 藁

補骨脂 炒 焙末各三兩

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:56
列印頁數：51
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

香子 炒 三錢
右除膏搗羅為末同為丸如梧桐子大每服三十
丸煨薑鹽湯下
腎瀝湯 治骨極面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不
利夢寐驚悸上氣小腹裏急痛引腰脊四肢常苦寒
冷小便或白
人參 芍藥 麥門冬 去心 生地黃 焙 當歸 切焙各一兩半
甘草 炙 芎藭 遠志 白茯苓 去皮 五味子 各一兩 乾
薑 炮 一兩 黃芩 半兩 桂 二兩 羊腎 二箇去筋膜
右除羊腎外粗搗篩每服五錢先用水二盞煮羊腎
一雙至一盞除羊腎下藥末大棗二枚去核同煎至
一盞去滓空心日午夜臥服若遺小便加桑螵蛸二
十枚切破炒
乾地黃丸 出聖惠方 治骨極羸瘦心神虛煩脚膝疼痛久
立不得宜服
熟地黃 二兩 白茯苓 一兩 牛膝 一兩 羚羊角屑 三錢 酸棗

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:56
列印頁數：52
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

仁一兩微炒 草薢三兩 黃耆三兩 桂心三錢 蒺藜一兩酒浸 石斛一兩去根 薯蕷一兩 人參一兩去蘆

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒下三十丸

骨碎補丸 治骨極腰脊疼不能久立髮墮齒槁手足疼甚

骨碎補炒 附子一枚炮去皮臍 肉豆蔻去殼各二兩 蒺藜炒去角 杜仲去皮炒去粗 山芋五味子 牛膝酒浸 山茱萸炒 獨活去蘆各半兩 芎藭三錢 黃耆一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心温酒下三

十丸

思飲食宜服

生地黃散出聖惠方 治骨極頭熱肢節疼痛不得睡臥兼不

生地黃一兩 白茯苓一兩 當歸一兩 麥門冬去心一兩 人參一兩 酸棗仁一兩 車前子三錢去蘆 黃耆一兩 枳殼三錢麩炒 白芍三錢 甘草半兩炙

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:56
列印頁數：53
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右搗篩為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不計時候溫服

地黃煎出聖惠方治骨極强骨髓令人健

生地黃汁二升 防風去蘆三兩 當歸二兩 丹參二兩 黃耆二兩 鹿角膠二兩搗碎炒黃色 桑寄生二兩 狗脊二兩 牛膝二兩 羊髓一升

右搗羅為散先煎地黃汁減一升將藥末入汁中入髓攪令勻慢火煎如膏收瓷盒中每於食前以溫酒下半匙

乾棗湯 療骨極主腎實熱則色炲隱曲膀胱不通大便壅塞四肢急疼

乾棗十枚去核 大黃大戟 甘草炙 甘遂 黃芩各一

兩 芫花炒半兩 芒硝三錢

右切以水煮取一升六合後下芒硝分四服忌海藻菘菜

元參湯出生方濟治骨極耳鳴面色焦枯形瘦削膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足瘦疼大小便閉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

元參 生地黃 枳實 麩炒 車前子 炒 白芍藥 甘草 炙 黃耆 當歸 酒洗 麥門冬 去心 各一兩

右㕮咀每服四錢水一鍾半生薑三片煎至八分去滓溫服不拘時候

大黃湯 治骨極色黑疼痛隱曲膀胱不通小便壅塞四肢拘急

大黃 大戟 炒 赤茯苓 甘草 黃芩 各一兩 芫花 醋拌 炙 各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞半入棗二枚擘破煎至一盞去滓溫分二服空心日午各一

酸棗仁散 出聖惠方 治骨極腎虛腳膝骨髓痿疼宜服

酸棗仁 炒 八兩 虎脛骨 八兩 酥炙 熟地黃 八兩 杜仲 三兩 去粗皮 桂心 三兩 牛膝 三兩 去苗

右細剉以清酒一斗五升浸經三日曝乾復入酒三日曝乾如此浸令酒乾盡搗羅為散每於食前以溫酒調下二錢

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

三黃湯 出千金方 治骨極主腎熱病則膀胱不通大小便閉塞顏色枯黑耳鳴此藥治之

大黃 切漬水一升 黃芩 各三兩 梔子 十四箇 甘草 一兩 芒硝 二兩

右㕮咀以水四升先煮黃芩梔子甘草取一升五合去滓下大黃又煮兩沸下芒硝分二服

生地黃煎 出聖惠方 治骨極實熱骨髓痠疼宜服

生地黃汁 三升 天門冬汁 一升 白蜜 半升

右件藥相合令勻以慢火煎如膏每服食後煎竹葉湯調下半匙

芍藥湯 出千金方 治骨極骨髓中疼

芍藥 五兩 生地黃 三兩焙 虎骨 酒浸炙二兩

右粗搗篩以酒一升浸一宿焙乾再搗羅為散每服三錢空心溫酒調下日午夜臥再服

三黃丸 一名金黃丸出三因方 治骨極熱耳鳴面色焦枯隱曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足痠疼大小便閉

黃芩 六兩冬用三兩 大黃 二兩冬用三兩 黃連 春用七箇夏用七箇秋用六箇冬用

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:57
列印頁數：56
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,普濟方,卷三十三
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末蜜和丸如豆大每服十丸至十五丸米飲下

一方溫水下如臟腑壅塞可加數丸以利為度

鹿角丸 出醫方集成

治骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立氣衰髮落齒槁腰脊痛甚則喜唾不了

鹿角二兩 牛膝酒浸去蘆一兩半 焙

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽湯送下

虎骨酒方 出千金方

治骨極膝脛痠痛肢節多痛宜服 方見

精極 附論

夫五臟六腑皆有精腑臟調和則精常輸寫若臟腑衰則形體皆極令人少氣五臟內虛齒黑焦毛髮落悲傷喜忘目視不明耳聾行步不正身體重皆精極之候然精極有虛極有實極凡陽氣害五臟陰氣害六腑陽實則從陰引陽陰實則從陽引陰陽病主高高則實實

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:58
列印頁數：57
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

則熱故宜瀉陰病主下下則虛寒故體重耳聾行步不正若邪氣入臟則欬多唾面腫氣逆也此邪氣逆於六腑厥於五臟所以精極治法形不足者温之以氣精不足者補之以味當治其微若腎絶則五氣俱絶即目轉而睛奪是為志先死不可救矣

地黄煎丸 治精極臟腑虛骨節煩疼不止益氣養神駐顏調血脈

生地黄 五斤搗取汁
薤蓉 酒浸切焙二兩
無灰酒 一斗銀石器盛入地黄汁用文武火熬成膏入後藥味

巴戟 去心
鹿茸 酒浸
桑螵蛸 炒
附子 去炮皮臍
黄耆 肉豆蔻 去一兩殼各
沈香 五錢
五味子
蛇床子 炒
牛膝 酒浸
青木香
枳殼 炒麩
石斛 去根
補骨脂 炒
陳皮 去白三錢
菴澄茄 五錢

右為末以地黄煎和丸如梧桐子大每服三十丸酒下加至四十丸空心食前服

地黄煎丸 聖惠方 治精極五臟六腑虛羸骨節煩痛精常漏泄宜服此益氣養神駐顏色調血脈久服令人

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肥健

生地黃五斤取汁 無灰酒一斗已上二味於銀鍋中慢火熬成膏入後藥末為丸

巴戟一兩去心 肉蓯蓉二兩酒浸一宿去皮炙乾用 鹿茸二兩去毛酥炙 桑螵蛸一兩微炒 五味子一兩 蛇床子一兩 石斛一兩去根 附子二兩炮去臍皮 補骨脂二兩炒 枳殼一兩麩炒 黃耆一兩 牛膝一兩 兔絲子一兩酒浸一宿曝乾別搗為末 石龍芮一兩 陳皮一兩去白 沈香一兩 鹿茸一兩酥炙 菟絲子一兩酒浸一宿曝乾別搗為末 石龍芮一兩 陳皮一兩去白 沈香一兩 鹿茸一兩酥炙 菟絲子一兩酒浸一宿曝乾別搗為末

右為末用地黃煎和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以温酒下三十丸

牛膝煎丸出聖惠方 治精極及百病虛羸瘦損

牛髓一斤半 羊髓一斤 白蜜一斤已上五味同於銀石鍋熬成膏 棗肉一斤已上五味同於銀石鍋熬成膏 天門冬一兩去心 當歸一兩 牛膝一兩 人參一兩 防風一兩 肉蓯蓉二兩浸酒內一宿刮去皮炙 五味子一兩 熟地二兩 鹿角膠一兩搗碎炒 菟絲子一兩酒浸三宿為末 入後藥 茯苓一兩 芎藭一兩

右為末入前牛髓膏中更熬令稠可丸如梧桐子大每日空心及晚食前温酒下三十丸忌鯉魚

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人參丸 一名磁石 千金方 治精極虛寒小腹拘急耳聾髮落

行步不正夢寐失精驚悸遺瀝小便白濁甚則勞

弱欬嗽

人參 麥門冬 去心 赤石脂 遠志 去心 續斷 各三錢 韭子 炒 各一兩 赤石脂 研 各二兩 熟地黃 一兩半焙 茯苓 龍齒 研 磁石 醋煅 蒐蓉 酒浸 各一兩 丹參 栢子仁 炒研 各二兩 鹿茸 酥炙 三錢 子 一兩炒

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每日空腹温酒下二十丸

磁石丸 方濟生 治精虛極驚悸羸瘦夢中遺泄尿後便遺白濁甚則陰痿小腹裏急

磁石 醋二兩煅 肉蒐蓉 酒浸 鹿茸 酒浸 續斷 酒浸 杜仲 炒去絲 栢子仁 炒研 赤石脂 火煅 熟地 酒蒸 山茱萸 取肉 菟絲子 酒浸 巴戟 去心 韭子 炒 各一兩

右為末酒糊為丸如梧桐子大每服七十丸空心温酒鹽湯任意下一方蜜丸

生地黃湯 方千金 治精極五臟六腑俱損傷虛熱遍身煩

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:58
列印頁數：60
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

痛骨中痠痛煩悶

生地黃汁 二升 麥門冬汁 赤蜜 各一升 竹瀝 一合 石膏 八兩 人參 桂心 甘草 黃芩 麻黃 各三兩 當歸 四兩

右㕮咀以水七升先煮八味取二升去滓下地黃等汁取四升分四服日三夜一

黃耆湯 治精極腎氣內傷夢泄盜汗小便餘瀝陰痿濕痒小腹强急

黃耆 人參 赤芍藥 桂 地骨皮 五味子 各一兩 白茯苓 防風 陳皮 去白 半兩 甘草 炙 磁石 煅 醋 淬 牡蠣粉 各一錢

右粗搗篩每服三錢鹽水一盞生薑五片棗二枚擘破煎至七分去滓空心温酒服

鹿茸散 治精極虛損夢中失精陰氣微弱小腹拘急體重耳鳴

鹿茸 酒炙 龍骨 露蜂房 各半兩 澤瀉 白茯苓 兎

列印日期/時間：02/05/2005 04:53:59
列印頁數：61
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

絲子 一兩酒浸宿 桂 去皮 牛膝 酒浸切焙 石龍芮 赤芍藥 各一錢

韭子 一兩炒 巴戟 去心三錢

右為散每服三錢空心温酒調下或煉蜜丸如梧桐子大空腹温酒下二十丸加桑螵蛸亦得

天門冬散 治精極五臟六腑俱虛偏身及骨髓煩疼宜服

天門冬 二兩去心 羚羊角屑 一兩 人參 一兩 黄耆 一兩 枸杞子 一兩酸棗仁 一兩 芎藭 一兩 車前子 一兩 當歸 桂心 各一兩

澤瀉 一兩 甘草 半兩

右為散每服四錢鹽水一盞煎至六分去滓入竹瀝半合蜜一茶匙同煎三兩沸不計時候忌鯉魚

鹿茸丸 治精極上焦熱下焦冷補十二經脈添髓養血宜服

鹿茸 四兩去毛酥炙 硃砂 二兩細研水飛過 野雞脛骨 二兩 天門冬 二兩 車前子 二兩 兔絲子 二兩酒浸宿曝乾為末 雀腦 二十枚 肉蓯蓉 三兩酒浸一宿刮去皮 熟乾地黄 三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末煉蜜與羊脛髓拌和搗三二百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以酒服三十丸忌鯉魚生血

類

羌活補髓丸 一名羌活丸 治精極髓虛中傷臟腑方見本門骨髓虛竇

茯神散 治精極實熱勇悍多驚壯熱

茯神 三兩 柴胡 二兩去蘆 黃耆 三兩劉 遠志 一兩去心 天門冬 二兩 人參 去心一兩 澤瀉 二兩 生地黃 二兩 甘草 一兩炙

右為散每服三錢以水一鍾入淡竹葉七片煎至六分去滓不計時候溫服

竹葉黃芩湯 治精極實熱眼視不明齒焦髮落形體疼痛通身虛熱

竹葉 切一升 黃芩 茯苓 各三兩 麥門冬 大黃 各二兩 甘草 二兩 生地黃 六兩 芍藥 四兩 生薑 六兩

右咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

石斛湯 治精極實熱眼視不明齒髮焦落形衰通

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

身虛熱甚則胷中煩悶夜夢泄精

小草　石斛去根　黃耆　麥門冬去心　生地黃酒洗　白茯苓　元參各一兩　甘草炙半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候

竹葉湯　治精極實熱視不明齒焦髮落形衰通身虛熱甚則胷中痛煩悶泄精

生地黃五兩　芍藥四兩　黃耆　茯苓　澤瀉　甘草

麥門冬去心各三兩

右剉散每服四錢水一盞半薑五片淡竹葉十片煎七分去滓不拘時服

生地黃煎　治精極補骨髓

生地黃十斤絞取汁搗牛酥　白蜜各一斤

右先以慢火煎地黃汁減半內牛酥更煎良久次下蜜攪令勻候稀稠於瓷器中盛每日空心午時及晚食前溫酒下半匙

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

補益鹿茸煎　治精極骨髓虛竭

用鹿茸五兩去毛塗酥炙令微黃為末以清酒二升於銀鍋中慢火煎膏盛於瓷器中每服空心及晚食前以温酒下半匙

白淫　附論

内經曰思想無窮所願不得則意淫於外入房太甚宗筋施縱發為筋疾及為白淫夫腎藏天一以慳為主志意内馳則精因而出思想為淫房室太甚則固者搖矣故淫不守隨流而下也然本於筋痿者以宗筋施縱故也

七珍丸　王氏博濟方

補真益氣壯腰膝進飲食治小兒白淫

肉蓯蓉　半斤細切酒煮爛研成膏

補骨脂　炒

巴戟天　去心

附子　去炮皮臍各二兩為末

杏仁　湯浸去皮尖

桃仁　湯浸去皮尖

胡桃仁　研各一兩

右將後六味搗研為末與蓯蓉膏同研勻更入煉蜜搗三五百杵丸如梧桐子大每服一丸熱酒化下日三服一名四神煎

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蓮實丸　治下元虛冷小便白淫

蓮實（去皮）　附子（炮去皮臍）　巴戟天　補骨脂（炒）　各二兩　覆盆子（炒）　一兩　山茱萸　一兩　龍骨（研）　半兩

右為末煮米糊和丸如梧桐子大每服二十丸空心鹽湯下

龍骨湯　治小便白淫及遺泄無故自出

龍骨（研）　五兩　人參　白茯苓　甘草（炙）　牡蠣（煅）　桂（去粗）　各二兩　熟地黃（焙）　各二兩　龍骨（皮）

右為散每服五錢鹽水一盞半煎至八分去滓食前服

內補鹿茸丸　一名鹿茸丸　治勞傷思慮陰陽氣虛益精止白淫　方見虛勞門腰痛類

金鎖丸　一名金鎖子丸　治下元虛小便白淫夜夢遺泄　方見虛勞門遺泄類

石斛散　治陽虛憊小便白淫

石斛（去根）　巴戟天（去心）　兔絲子（酒浸二宿別搗各三兩）　杜仲（去粗皮炙）

列印日期/時間：02/05/2005 04:54:00
列印頁數：66
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

劉桑螵蛸 炒 各一兩半

右為散每服二錢空心温酒調下至晚再服

白石英散 治小便白淫

白石英 研 肉蓯蓉 酒浸焙 澤瀉 韭子 各一兩 白粳米 合 溻五

右為散每服二錢米飲調下食前日三服

秘真丸 宣明論

治小便白淫不止精氣不固及有餘瀝或

夢寐陰人交泄

右為末煮糯米粥為丸如菉豆大以丹砂為衣每日

為衣

龍骨 研 一兩 訶黎 炮去皮 五箇 縮砂仁 去皮 半兩 丹砂 研 一兩 留一錢

空心熱酒下一丸夜臥冷水下三丸勿多服或大便

秘欲通用葱湯點茶服之即通

陽起石丸 楊氏家藏方

治下元虛憊耳鳴面黑腰背疼痛遺

泄白淫手足冷肌瘦

陽起石 煅 研 一兩 白芷 黄蠟 各半兩 生砒 研 一分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右將三味同研勻以黃蠟為丸如梧桐子大每服
三丸空心冷鹽湯或冷酒下微温亦可服藥後忌熱
食少時久服美進飲食補下元暖腰脚
天雄散 治腎臟虚冷小便白淫 方見虚勞門 虚勞失精類
附礬丸 治白淫過甚
附子 炮去皮臍 二兩 礬石 二兩燃去汁
右為末水煮麵糊和丸如梧桐子大每服十丸至二
十丸空心夜臥清茶下
黃連丸 治心腎氣不足思想無窮小便白淫
黃連 去鬚 白茯苓 去皮 去黑皮 各一兩 牛膝 酒浸 肉蓯蓉 酒浸已上各一兩 龍骨 山茱萸 桑螵蛸 兔絲子 各一兩 破故紙 韭子 炒 各一兩
右等分為末酒糊和丸如梧桐子大每服三十丸煎
補骨脂湯下不拘時
金泊丸 衛生寶鑑 治下焦虚小便白淫夜多夢泄
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸温酒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下空心食前服

補真玉露 衛生寶鑑 治陰盛精脫淫樂脛酸

白茯苓 白龍骨 火煅 韭子 酒浸各二兩 兔絲子 酒浸一兩

右為細末米醋同麵糊丸如梧桐子大每服五十丸溫酒下鹽湯亦得須空心食前服待少時以美飯壓之

列印日期/時間：02/05/2005 04:54:01
列印頁數：69
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,普濟方,卷三十四
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書
普濟方卷三十四
明 周王朱橚 撰
膽腑門
總論
夫膽腑者主肝也合氣膽膽者清淨之腑也號將軍決曹吏重三兩三銖長三寸三分在肝短葉間下貯水精汁二合能喜能怒能剛能柔目下果大其膽乃橫凡膽腦髓骨脉女子胞此六者地氣之所生也皆藏於陰而象地故藏而不瀉名曰奇恒之府若胃與大腸小腸三焦膀胱此五者天氣之所生也其氣象天故輸瀉受五臟濁氣名曰傳化之府此不能久留輸瀉者也所謂五臟者藏精氣而不瀉也故滿而不能實六腑者傳化物而不藏故實而不能滿也所以然者水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛故曰實而不滿滿而不實也左手關上陽絶者無膽脈也若膽夜疼口中苦味譫語或如見鬼多驚劣刺足厥陰治在足大拇趾間或刺三

列印日期/時間：02/05/2005 04:54:27
列印頁數：1
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

毛中　左手關上陽實者膽實也若腹内不安身軀弱也刺足少陽穴穴在足上第二趾本節後一寸是　膽病中善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之咽中介介然數唾候在足少陽之本末亦見其脈之陷下者灸之其寒熱刺陽陵泉若善嘔有若長太息中澹澹善悲恐如人將捕之邪在膽逆在胃膽溢則口苦胃氣逆則嘔苦汁故曰善嘔刺三里以下氣逆刺足少陽血絡以閉膽却調其虛實以去其邪也　膽熱曰脇下痛脹口苦太息　肝前受病移於膽肝效不已則嘔膽汁厥氣客於膽則夢鬬訟　肝應筋爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪軟色赤者膽緩爪真色白無約者膽直爪惡色黑多敗者膽結扁鵲云足厥陰少陽為表裏表清裏濁其病若實極則傷熱熱則驚動精神不守臥起不定若虛則傷寒寒則恐畏頭眩不得臥發放玄水其根在膽先從頭面患腫至足膽有病則眉為之病人眉一絲者七日死

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,普濟方,卷三十四
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

膽實熱論附

夫左手關上脈陽者足少陽也為膽實熱蓋實則為有餘有餘則生熱故其證苦神驚不安起居不定胸中胃脘下腫馬刀癭皆謂膽氣實疼目銳眥痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀癭皆謂膽氣實洒洒寒熱心脇痛不能轉側足外反熱是為陽厥及頭悶身體弱頭項强口吐苦汁腹中氣滿飲食不下咽乾

龍膽瀉肝湯出衛生寶鑑

治內熱盛口苦膽癉乃肝主謀慮足少陽經壅滯故也

膽主決斷汁計七合清淨之府肝待決於膽志或不決為之怒怒則氣逆膽汁上溢故口苦或熱盛而使然也

柴胡一錢　黃芩七分　生甘草　人參　天門冬去心　黃連去心五錢　山梔子　麥門冬去心五錢　五味子七個

龍膽草　知母

菊花散出聖惠方

治膽經伏熱精神驚悸不安

右咬咀都作一服水煎食遠服

列印日期/時間：02/05/2005 04:54:28
列印頁數：3
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甘菊花 一兩 牛黃 五錢研 犀角 三錢鎊屑 鐵粉 半兩 黃連 三去鬚 麥門冬 半兩去心 獨活 一兩 白附子 半兩炮 鉛霜 半兩

右為末每服二錢食後淡竹瀝調下金銀煎湯下亦得一方無獨活有人參甘草

半夏湯 治膽腑實熱精神不寧

半夏 宿薑 各三兩 黃芩 一兩 生地 五兩 遠志 茯苓 各二 秫米 一斗 酸棗仁 五合

右㕮咀長流水五升煮秫米令蠏目沸揚三千餘遍澄清取九升煮藥取三升半分三服一方治虛煩悶不得眠無地黃遠志有麥門冬桂心各三兩甘草人參各二兩

酸棗仁圓 出永類鈐方 治膽氣實熱不得睡神思不安

茯苓 酸棗仁 去核 遠志 去心 栢子仁 炒 防風 各一兩 生地黃 各半兩 枳殼 半 竹茹 二錢半

右為末煉蜜如梧桐子大每服七十丸不拘時熟水下

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,普濟方,卷三十四
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

升麻湯 出聖惠方 治足少陽經熱積久腹中氣滿睡臥不安頭昏口苦小便不利膽實熱精神不守

升麻 麥門冬 去心 黃芩 茯神 去木 大黃 炒 地骨皮 羚羊角 鏤 炙各等分

右搗篩每服三錢水一盞入青竹茹少許煎七分去滓温服食後臨臥忌炙煿物一名麥門冬散

棟實丸 治膽經實熱心神驚悸小便不利

棟實 三兩 童子小便浸一宿 又煮爛去皮焙乾 大黃 梔子仁 各一兩 炒

右除別研外搗羅為末一處拌勻煉蜜如梧桐子大每服在早食後及夜臥用熱水下十五丸至二十丸

瀉熱湯 治實熱精神不安之病

人參 赤茯苓 酸棗仁 去皮 蛇黃 炒令赤酒浸淬五次各一兩

右除別研外搗羅為末一處拌勻煉蜜如梧子大每服在早食後及夜臥用熱水下十五丸至二十丸

右搗每服三錢水一盞煎至七分去滓食後温服日

龍膽草 酸棗仁 微炒 黃芩 去心黑 茯神 去木 升麻 伏龍肝 竹茹 甘草 炙各等分

列印日期/時間：02/05/2005 04:54:29
列印頁數：5
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

瀉膽湯 鈐出永類方 治膽經實熱反洒洒寒熱腹中氣滿脇下硬口苦咽乾頭疼不欲飲食

半夏 三兩泡去滑 生地黃 五兩 酸棗仁 二兩半 黃芩 一兩 遠志 去心 茯苓 各二兩 甘草 一兩炙

右剉散長流水一斗糯米一升煮蟹眼沸揚二三千遍澄清每用水二盞抄藥四錢七薑七片煎七分去滓不以時服

流水湯 治膽實生熱腹中氣濁飲食不下咽乾頭重洒洒惡寒兩脇眼痛

半夏 一兩洗炒 酸棗仁 二兩 黃芩 半兩去黑心 赤茯苓 一錢 山梔子 去皮 生地黃 遠志 各一兩去心

右除別研外搗篩再拌勻每五錢用東流水二盞入秫米半升薑五片煎一盞去滓溫二服空心食後各

一服一方無地黃

枳殼湯 出聖惠方 治膽經有積熱腹中氣滿不安咽乾頭重心神驚悸小便不利一名人參散

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

枳殼 一兩 去瓤 炒
人參 葵子 甘草 各半兩 炙 赤茯苓 黃芩 各三兩

右搗篩每服三錢水一盞入生薑三片煎七分去滓温服不計時

山梔子飲 治肝膽邪熱神思不寧喜怒狂躁口苦舌乾

山梔仁 一兩半 竹茹 一兩 豆豉 一升 大青 入錢 陳皮 一兩 湯浸去白

右搗篩每服三錢水一盞蜜少許煎七分去滓温服食後臥各一服

胡黃連丸 出聖惠方 治膽經熱精神不寧臥起不安口中常苦

胡黃連 一兩 羚羊角 一兩 屑 蛇黃 半兩 火煅 熊膽 一分 青黛 一分 別研

右為末研令勻用黃牛膽丸如菉豆大每服七丸煎竹葉湯下晚間再服無牛膽以羊膽代

膽虛寒 附論

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夫左手關上脈陽虛者足少陽經也為虛寒蓋膽虛則
生寒寒則其病恐畏不能獨臥口苦善太息嘔宿汁心
下澹澹如人將捕之噫中介介數唾頭眩癡躄足指不能
拳指不能搖坐不能起頸僵視俛蓋膽虛精神不守其氣
上溢循其所在而生病也
薯蕷丸 出聖惠方 治膽經虛冷精神不守常多恐懼目暗頭
昏四肢不利
薯蕷 一兩 白茯苓 二兩 決明子 三錢 兔絲子 一兩酒浸三日焙乾別研
山茱萸 三錢 黃耆 遠志 去心 桂心 酸棗仁 各三錢
天雄 一兩炮去皮臍 防風 三錢 柏子仁 三兩 熟地黃 一兩 人參
為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸溫酒服下
右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸溫酒服下
中正湯 出聖惠方 治膽氣不足常多恐懼頭眩癡厥四肢
不利僵仆目黃失精一名酸棗散
茯苓 去皮 酸棗仁 黃耆 羌活 各一兩 甘菊花 熟
地黃 栢子仁 防風 各一兩 人參 白芍藥 當
歸 甘草 各半兩炙

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服不拘時忌生冷猪魚

遠志湯 出聖惠方 治膽經虛冷不能獨臥心下澹澹如人將捕之頭昏癢厥目失精一名茯神散

遠志 去心 熟地黄 各一兩 防風 人參 甘菊花 白术 桂 去粗皮 茯神 前胡 去節 各三錢 枳殼 半兩 去瓤 麵炒

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎七分去滓不拘時候

茯苓湯 出鈐方 水類 治膽氣痿虛冷頭眩痛心神恐畏遇事多驚不能獨臥腦中滿悶口苦

茯神 去木一兩 酸棗仁 黄耆 白芍藥 五味子 桂心 熟地黄 酒洗 人參 甘草 各半兩炙

右㕮咀每服四錢水一鍾薑三片煎七分去滓温服不拘時

天雄丸 治膽虛生寒氣溢胸膈頭眩口苦喜太息嘔宿水

列印日期/時間：02/05/2005 04:54:30
列印頁數：9
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

天雄炮去皮 人參 山芋 桂去皮粗 黃耆 白茯苓

防風去皮 栢子仁研 山茱萸 酸棗仁炒各三錢

右除栢子仁外搗細末與栢子仁和勻煉蜜為劑杵

丸梧桐子大每服三十丸溫酒空心食前下

黃耆湯 治肝虛膽寒心神不安臥即驚覺目昏心躁

四肢不利多恐

黃耆蜜炙劉 人參 檳榔劉 白朮 百合 酸棗仁

炒 白茯苓去皮 麥門冬去心 桂去皮 附子炮去皮臍

右㕮咀每服五錢水一盞半薑五片煎至一盞去滓

溫服空心食前

沉香湯 治足少陽經不足目眩癢厥口苦嘔水多睡

沉香 白茯苓去皮 黃耆 白朮各一兩 芎藭 熟地

黃 五味子各三分 枳實去瓤炙 桂各半兩去皮

右搗篩每服三錢水一盞薑三片煎七分去滓不拘

犀角飲 治膽受冷精神不安眼昏目暗臥起不定

時服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

犀角 一兩鎊屑
羌活 一兩去蘆
酸棗仁 二錢炒
茯神 三錢去木
甘菊 一兩
防風 三錢
人參 柴胡 各一兩
右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓温服

人參湯 一名蔘湯 出聖惠方 治膽虚煩勞精神不守奔氣在胸眠臥不定多恐 方見本門膽虚不得眠類

決明子丸 出聖惠方 治膽虚膽冷神思昏沉頭眩目暗

決明子 天雄 炮去皮臍 柏子仁 兎絲子 酒浸三日焙乾別研 各一兩
右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸温酒空心下晚服

膽熱多睡 附論
夫積熱多睡者膽實清淨決斷所自出今肝膽俱實榮衛壅塞則清者濁以故陰陽不和胷膈多痰臟腑壅滯精神昏憒常臥皆積熱不除膽氣實故多睡也

茯神散 出聖惠方 治膽熱多睡神思不安昏悶

茯神 去皮 麥門冬 地骨皮 茯苓 各一兩又一方用黄芩 白

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蘚皮　酸棗仁　沙參　各半兩　甘草　半兩炙

右末每服三錢水一盞煎六分去滓食後服一方有羚羊角

屑

麥門冬湯　出惠方　聖治榮衛氣澁精神不守及膽熱多睡頭目昏眩

麥門冬　去心　天門冬　去心　羚羊角　鮫各三錢　木通　前胡　去節　大黃　各四錢　半夏　炒　甘草　炙　防風　各半兩

右搗篩每服三錢水一盞薑三片煎六分去滓食後

服忌羊血

遠志丸　治氣昏多睡晝夜不足

遠志　去心　人參　山芋　防風　玄參　各二兩半　苦參

鐵粉　細研　烏頭　燒灰存性　各三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大食後米飲下二十丸再漸加至三十丸

人參散　出惠方　聖治膽經熱心神昏悶多睡

牛黃　一錢　研　羌活　三錢　遠志　三錢　去心　升麻　半兩　麥門冬　二兩　去心

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人參 三錢 犀角 半兩 赤芍藥 一兩

右為末每服一錢薄荷温水調下忌猪肉濕麵等食

後服

遠志丸 出聖惠方 治膽熱多睡

遠志 三錢去心 人參 一兩 馬頭骨 三錢 茯神 三錢 葛蒲 半兩 硃砂 半兩飛過 鐵粉 半兩研

右為末入硃砂等分令勻煉蜜丸如梧子大每服十丸食後服

半夏湯 治膽熱精神不守昏悶多睡方見本門膽實

熱類

黄連湯 出楊子護命方 治膽熱口苦神昏多睡左手關脈實

黄連 去鬚 黄芩 赤茯苓 去皮 麥門冬 去心 升麻 各一兩

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓温服食後

大宜服此方

治膽熱多睡 出聖惠方

馬頭骨灰 一兩 鐵粉 一兩 硃砂 半兩研 龍骨 半兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五丸竹葉湯食後服

酸棗仁湯　治膽風毒氣虛不調昏困多睡

酸棗仁 一兩生用研 臘茶 二兩生薑汁塗炙焦

右搗篩每服二錢水一盞煎七分去滓温服

治多睡 本草

取白馬頭骨作枕枕之

治人嗜眠喜睡 本草

父鼠目一枚燒作屑魚骨和注外若不眠薰取二

物紗袋子盛貯之

膽虛不得眠 附論

夫膽虛不得眠者是五臟虛邪之氣干淫於心心有憂患伏氣在膽所以睡臥安心多驚悸精神怯弱蓋心氣憂傷膽虛冷致不得眠也又有大病之後腑臟尚虛榮衛不和生於冷熱邪客於陰陰氣虛木氣獨行於陽下不依於陽故令不得睡也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

千里流水湯一名膽湯溫治膽虛不得眠及膽虛頭眩厥足痿指不能搖臂不能起僵仆目黃失精虛勞煩擾因驚膽懾奔氣在胷喘急浮腫不睡

右千里水一斛煮米令蠏目沸揚萬遍澄清取一斗煮藥取二升半分三服一方無生薑

桂心炙 黃芩 遠志去心 蒲蘛 人參各二兩 生薑二兩 秫米一斗

麥門冬去心半夏各三兩湯浸 茯苓四兩 酸棗仁二升炒 甘草

酸棗仁丸 治膽虛睡不安精神恐怯

酸棗仁二兩研 人參 白朮 白茯苓去皮 半夏炒 乾薑各一兩炮 陳皮去白 榆白皮剉 旋覆花 前胡各一兩 檳榔五枚

右末煉蜜丸如梧桐子大空心煎棗湯下二十丸加至三十丸

茯神散一名遠志湯 治膽經虛冷目眩頭疼心神恐畏不能獨處胸中滿悶方見本門膽虛寒類

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治煩悶不得眠

枸杞 兩五 生地黃 兩五 麥門冬 甘草 前胡 兩各三 茯苓 知母 兩各四 人參 二兩 粟米 一鼓 錢各五

右㕮咀水八升煮三升七合分四服

五補湯 治肝虛膽寒夜間少睡即驚覺心悸神思不守目昏心躁肢節痿弱補肝去膽寒和氣方見本門

虛寒類

人參散 出本事方 治膽氣虛常多畏心恐不能獨臥如人將捕之頭目不利胸中悶

人參 枳殼 五味子 桂心 各三兩 栢子仁 熟地黃 各二兩 山茱萸 甘菊花 茯苓 枸杞 各二兩

右細末每服二錢溫酒調服

五味子湯 出楊子建護命方 治膽經虛冷頭痛心中驚悸睡臥不安常如人將捕之精神不守

五味子 白茯苓 去皮 人參 芎藭 遠志 去心 酸棗仁 熟地黃 焙 麥門冬 各一兩 去心 桑寄生 半兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右搗篩每服三錢水一盞棗二枚煎七分任意服

酸棗仁湯

酸棗仁 五升 人參 桂心 生薑 各三兩 石膏 茯苓 知母 各三兩 甘草 一兩半

右搗篩水一斗煮酸棗仁取七升去滓下藥煮三升分為三服日三

補膽防風湯 出本事方

治膽虛目暗喉痛唾數眼目眩暈五色所障夢見人訟恐懼面色變青

防風 一錢 人參 六分 細辛 五分 芎藭 甘草 茯苓 獨活 各三分 前胡 各三分

右搗篩每服四錢水一盞半棗二枚煎八分去滓食前服

茯神散 出聖惠方

治膽虛不得睡神思不安

茯神 一兩半 栢子仁 一兩半 酸棗仁 一兩炒 黃耆 一兩 人參 一兩 熟地黃 半兩 遠志 五味子 各半兩

右為末每服一錢溫酒調下不拘時服

列印日期/時間：02/05/2005 04:54:32
列印頁數：17
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

溫膽湯 出永類鈐方 治心膽虛怯觸事易驚夢寐不祥異象所感遂使心驚膽懾氣鬱生涎涎與氣搏變生諸證或短氣悸乏或復自汗四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐臥不安大病後虛煩不得眠此膽寒故也服之效

半夏 竹茹 枳實 各三兩麵炒 陳皮 三兩 甘草 茯苓 一兩半 人參 一兩

右剉散每服三錢水一盞半薑五片棗二枚煎至八分食前服未效加遠志去心薑炒北五味子各一兩酸棗仁一兩蜂蜜粉炒一方無人參用白术

鱉甲丸 出聖惠方 治膽虛不眠四肢無力

鱉甲 酸棗仁 羌活 黃耆 牛膝 人參 五味子 等分

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三四十丸温酒下酸棗仁丸 出衛生寶鑑 治膽氣虛熱不睡膽經不足心經受忌葷菜

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熱精神恍惚恐畏多驚情思不安時有盜汗虛煩不眠朝差暮劇或發眩運

酸棗仁炒 地榆各一兩 丹砂研炒 茯神 人參 菖蒲各半兩

右除丹砂外搗末入丹砂令勻蜜和丸梧桐子大每服二十丸米飲下不拘時砵砂為衣煎人參湯下

酸棗仁煎出聖惠方

治膽虛不睡

酸棗仁五兩炒取二兩半 乳香二兩 蜜四兩 牛黃一錢研 糯米二合炒為末 砵砂半兩研水飛過

右用酒一鍾和蜜等一處慢火煎如沸不計時以温酒調下一茶匙

山芋丸 治膽虛冷精神不守寢不寧頭目昏眩恐畏不能獨處

山芋 酸棗仁各一兩炒 栢子仁 茯神 山茱萸各三錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸温酒下米

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

飲亦得不拘時服

人參散（一名安神散）治膽虛睡臥不安多驚（出聖惠方）

人參 白茯苓（各一兩） 茯神（一兩去木） 丹砂（半兩別研）

右搗為末每服一錢粥飲調下不拘時服一方無茯

神

酸棗仁丸（出聖惠方）治膽虛不得眠

酸棗仁（微炒） 地榆（一兩） 茯神（一兩去木）

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸米飲下無

時

乳香散 治膽虛不得眠精神恍惚

乳香（一兩研） 酸棗仁（二兩） 馬頭骨灰（一兩）

右研細末每服二錢温酒調下不拘時

治膽虛夜不眠（出聖惠方）

用酸棗仁半兩炒黄研末酒三合浸汁先以粳米三合

煮作粥候熟下棗仁汁更煮三五滚空心食一方為

末每服三錢竹葉湯下又白苣菜常食之令人輕身

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

少睡調和十二經脈利五臟此出本草

治人夜睡言語 草出本

以靈床下果子食之佳

治臥床不寤 草出本

勿以火照火照之殺但痛齒其踵及足拇指甲際而

多唾其面即活又井底泥塗目畢令人垂頭於井中

呼其姓名便起

治從早夜連時不得眠

暮以新布瓦火炙以熨目并蒸大豆便裝囊成枕枕

冷後更湯熱終夜常枕熱豆即立愈

治食飲不得息 草出本

蓴蘼子三兩炒黃研末以水三升煮大棗三十枚得

汁一升內藥中每服如棗大煎取七合頓服

酸棗仁湯 草出本

治驚悸不眠

以酸棗仁二升茯苓白朮人參甘草各二兩生薑六

兩六物切以水八升煮取三升分四服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

酸棗仁湯 出本草 主虛不得眠煩不可寧

以酸棗仁二升蜜母乾薑茯苓芎藭各二兩甘草一兩炙並切以水一斗先煮棗煎三升後内五物煮取三升分服一方加桂一兩

膽癉

夫内經謂有病口苦名曰膽癉膽為中正之官清淨之府十一臟之所取決咽為之使若數謀慮不決則膽虛氣上溢而口為之苦臟主藏而不瀉今數謀不斷則清淨者濁而擾矣故氣上溢而其證為是也經所謂是動則病口苦以氣為是動也

半夏茯苓湯 治謀慮不決膽氣上溢致口苦神思不爽

半夏湯洗去滑炒去 赤茯苓去皮 麥門冬去心 酸棗仁 桂 黄芩去皮 遠志去心 人參各二兩 甘草一兩半炙

右搗篩每服五錢水一盞半薑五片秫米一匙頭許煎一盞去滓温服不拘時

列印日期/時間：02/05/2005 04:54:34
列印頁數：22
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

地骨皮湯　治謀慮傷膽膽氣上溢膈脘虛煩常覺口苦

地骨皮　生　地黃　各五兩　前胡　二兩半　茯神　二兩　麥門冬　去心　知母　人參　甘草　各二兩炙

右搗篩每服五錢水一盞半入脫粟米各少許同煎一盞去滓溫服不拘時

麥門冬湯　一名升麻湯　治膽虛氣逆口常苦煩躁引飲方見本門膽實類

欽定四庫全書

益膽湯　出聖惠方　治肝膽俱虛熱氣上薰口中常苦煩渴臟腑因虛致熱

黃芩　甘草　各二兩炙　人參　桂　各一兩去皮　苦參　茯苓　各半兩去皮

右搗篩每服三錢水一盞半煎七分去滓溫服不拘時

梔子湯　出聖惠方　治腹熱氣逆口苦煩濁

梔子仁　二十枚　升麻　黃芩　大青　茯神　去木各二錢

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甘草 半兩 炙剉

右搗篩每服三錢水一盞豉五十粒煎七分去滓入蜜半合更煎三二沸食後温酒服忌熱麵炙煿等

人參湯 一名枳殼湯 治膽虛氣逆邪熱攻衝口苦煩渴方見本門膽實熱類

列印日期/時間：02/05/2005 04:54:34
列印頁數：24
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,普濟方,卷三十五
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書
普濟方卷三十五
胃腑門
明 周王朱橚 撰
總論
夫胃腑者主脾也口唇者是其候也脾合氣于胃胃者水穀之府也號倉庫守內嗇吏重二觔十四兩迂曲屈其中常留穀二斗水一斗五升廣眩大頭弦脅五穀乃伸長一尺六寸大一尺五寸徑五寸受水穀三斗五升容而滿上焦洩氣出其精微慄悍滑疾下焦不下溉洩諸小腸腸胃所受水穀之數也凡平人無不皆然故胃滿則腸滿胃虛則腸虛更滿更虛氣得上下五臟安定血脈和利精神乃居故神者水穀精氣也五臟不足調施于胃故腸胃之中常留穀二斗四升水一斗一升故人一日再至後二升半一日中五升七日五七三斗五升而留水穀盡故好人不飲不食七日而死者水穀精氣津液皆盡故七日而死　右手關上陽絶者無胃脈

列印日期/時間：02/05/2005 04:54:55
列印頁數：1
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

也若吞酸頭痛胃中有冷刺足太陰治陰在足大指本節後一寸　右手關上陽實者胃也若腸胃中伏伏不思食得食不能消刺足陽明治陽在足上動脈　脈浮而芤浮則為陽芤則為陰浮芤相轉胃氣生熱其陽則絶　趺陽脈浮大者此胃家微虛煩躁必日再行動作頭痛重熱氣盛者居胃胃脈搏堅而長當病其色赤當病析髀其斬而散者當病食癉髀痛病先發于胃脹滿五日之腎少腹腰脊痛脛疼三日之膀胱背臂筋痛小便秘五日上之心脾心痛閉塞不通身體痛重三日不已死冬夜半後夏日昳　胃病者腹膜脹滿胃管當心穴而痛上支兩脇膈咽不通飲食不下下取三里穴飲食不下隔塞不通邪在胃管在上管則抑而刺之在下管則散而去之　胃脹者腹滿胃管痛鼻聞焦臭妨于食大便難　胃中有癖食冷物者痛不能食食熱則能食脾前為病移于胃脾欬不已嘔吐長蟲　厥氣客于胃則夢飲食　診得胃脈病形如何曰胃脈實則脹

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

虛則洩脹脾應肉腳肉腳堅大胃厚肉腳麼者胃薄肉腳小而麼者胃不堅肉腳不補其身者胃下胃下者脘約肉腳不堅者胃緩肉腳無小果瘰癧堅者胃急肉腳多小果累者胃結胃結者上脘約不利　扁鵲云足太陰與陽明為表裏脾胃若病實則傷熱欲飲水漿常渴虛則傷寒寒則苦饑常痛發于風木其根胃先從四肢起腹滿大通身腫　胃絶不治五日死何以知之舌腫溺血大便赤洩　咽者嚥物之門户也膈者上焦胸中心肺之分野不通者升降之氣上不得交又云清氣在下則生飧洩洩黄如糜米穀不化者是也濁氣在上則生脹脹中脹滿不得下大便難或先結後溏皆是症也濁氣在上當降而不降者乃腎肝吸入之陰氣不得下而逆在上也胃氣逆上或為嘔或為吐或為噦者是陰火之邪上衝而吸入之氣不得入故食不下也此皆氣衝之火逆胃之脈反上而作者也清氣在下則生飧洩者胃氣未病之日當上行心肺而經營也因飲食失節

列印日期/時間：02/05/2005 04:54:56
列印頁數：3
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

勞役形體心火乘于土位胃氣弱而下陷于陰中故米穀入而不升遂降而為飧洩也膈咽之間交通之氣不得表裏者皆衝脈上行逆氣所作也蓋胃病者上支兩脇膈咽不通飲食不下取三里者是也鍼經云清之與濁相干亂于胸中是為大悗者惑也氣不交通最為急證不急去之諸變生矣聖人治此有要法陽氣不足陰氣有餘先補其陽後瀉其陰是先令陽氣升發在陽分而後瀉陰也春夏之日陽氣在經當益其經脈去其血絡秋冬陽氣降伏當先治其臟腑若有噎有塞塞者五臟之所生陰也血也噎者六腑之所生陽也氣也二者皆由陰中伏陰而作也

胃實熱 附論

夫右手關上脈陽實者足陽明經也病若渴引水頭痛汗不出如溫瘧唇口乾善噦乳癰缺盆腋下腫痛腹脹心懸消穀喜饑溺黃名曰胃實熱也 胃氣盛熱則壅澁不宣蘊積生熱面目悉黃譫妄狂周身熱多汗腹脇堅滿大便祕難皆其證也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

方

凝神散 出脈訣 數方 收斂胃氣清涼肌表

人參 白朮 茯苓 山藥 各一兩 白扁豆 粳米 知母 生地黃 甘草 各五錢 淡竹葉 地骨皮 各二錢半 麥門冬 各二錢

右�once咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎不拘時候服

清陽湯 出濟生拔粹方 治口喝頰腮急緊胃中火盛必汗不止而小便數

升麻 黃耆 當歸 各二錢 葛根 一錢半 紅花 桂枝 各一錢 酒黃蘗 各一分 甘草 一錢炙 蘇木 甘草 生各半錢

右�once咀作一服酒三大盞煎一盞三分去滓稍熱食前服訖以火熨其緊結處即愈夫病口喝筋急者是筋脈血絡中大寒此藥以代燔針刼刺破惡血以去其凝血內作泄衝脈之火熾

通熱湯 出聖惠方 治胃氣實熱苦頭痛汗不出口中乾燥 一名

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

子苓散

人參 二兩
甘草 一兩 炙
柴胡 去黑心 葛根 劉 麻黄 去節根 白茯苓 去黑皮各一兩 用赤茯苓 黄芩 去黑心 五加皮 各半兩 劉 石膏 三合 碎

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎七分去滓温服無時

加味大黄湯 治面熱如醉此為胃熱上薰其面加大黄以利之

服一方無人參

右水一斗煮三升去滓温服半升日三

半夏 杏仁 各半 舶

茯苓 四兩 甘草 乾薑 細辛 大黄 各三兩 五味子 半夏 各一兩 湯泡七次 人參 甘草 各半兩 炙 赤茯苓 去皮 橘皮 去白 枇杷葉 刷去毛 麥門冬 去心 青竹茹 永嘉 橘皮竹茹湯 治胃熱多渴嘔噦不食

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分去滓温服無時

列印日期/時間：02/05/2005 04:54:57
列印頁數：6
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃芩梔子湯 聖惠方 治胃氣實熱頭痛寒熱狀如溫瘧唇口乾燥或生乳癰腋下腫

黃芩 去黑心 梔子仁 犀角 鎊 赤茯苓 去皮 赤芍藥 各一兩 射干 一兩 大黃 半兩 劉炒

右㕮咀每服五錢水二盞煎一盞入生地黃汁半合蜜一匙攪勻更煎數沸去滓食後溫服一方無芍藥

忌炙煿熱麵

黃芩湯 聖濟總錄 治胃氣實熱口舌乾燥頭痛煩渴

黃芩 去黑心 紫苑 去苗 各一兩 葛根 劉 赤芍藥 各三兩 甘草 半兩炙 石膏 二兩碎

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

洩熱蘆根散 聖惠方 治胃實熱常渴引飲水

蘆根 劉 栝蔞根 麥門冬 各一兩 去心 赤茯苓 知母 各三錢 甘草

右㕮咀每服三錢水一中盞入小麥五十粒竹葉二十七片生地黃一分生薑半分煎六分去滓食後溫

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

服

黃連丸 聖惠方 治胃實熱氣盛消穀善飲頭目痛衄血煩渴

黃連 去須 栝蔞根 麥門冬 去心焙 知母 焙 茯神 各一兩去木

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸熱水下不拘時粥飲下亦可

前胡湯 聖濟總錄 治胃實熱乾嘔煩悶目黃燥渴

前胡 一兩半去蘆頭 茅根 二兩劉 麥門冬 去心焙 甘草 各一兩 黃芩 半兩去黑心 茯神 去木劉一兩 栝蔞根 麥門冬 各三兩半去心焙 葳蕤 各二兩焙

茯苓散 聖濟總錄 治胃腑實熱發渴飲水漿不止

右㕮咀每服二錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

右㕮咀每服二錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時

右㕮咀每服先以水三五盞煮小麥一合淡竹葉一

錢沸去滓然後下藥末五錢生地黃半錢棗一枚擘

列印日期/時間：02/05/2005 04:54:57
列印頁數：8
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

破煎一盞去滓温呷

清胃散 濟生拔粹 治因服補胃熱藥而致上下牙痛不可忍

擡引頭腦滿熱發大痛此足陽明別絡入腦也喜寒惡熱此陽明經中熱盛而作也

升麻 一錢 牡丹皮 半錢 當歸身 生地黄 各三錢 酒製 淨黄連 六分不好加二分夏月倍加之無易法 右�mouth咀作一服水一盞半煎七分去滓稍冷服

赤芍藥湯 治胃氣實熱煩躁多渴唇焦口乾引飲不連

黄連丸 聖總録 治胃氣實熱煩躁多渴

黄連 去須 各三兩 赤茯苓 去黑皮 麥門冬 一兩去心焙 苦參 半兩 右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸食後臨卧竹葉湯下

犀角飲 聖惠方 治實熱嘔噦吐逆不食頭痛煩渴

犀角 鎊 枇杷葉 炙去毛 麥門冬 去心焙 葛根 各一兩劉 右㕮咀每服三錢水一盞煎七分去滓温服不拘時

列印日期/時間：02/05/2005 04:54:58
列印頁數：9
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

一方有生薑半分

葛根湯 出聖濟總錄 治胃實熱煩渴咽乾吐逆

葛根 十兩 劉汁 甘草 三兩 炙 半夏 二兩 生薑汁半盃 漿水半升同浸焙乾

右㕮咀每服三錢水一盞生薑二片竹茹少許煎七分去滓温服不拘時

地黃飲 聖濟總錄 治胃氣實熱唇口乾燥頭昏體倦五心煩熱

生地黃 汁 生薑 汁 藕節 生蜜 各二合

右調和令勻分三服不拘時

欽定四庫全書

普濟方

地骨湯 聖濟總錄 治胃氣盛實壅塞不宣蘊積為熱口渴煩

地骨皮 二兩 防風 去叉 甘草 各一兩 炙

右㕮咀每服三錢水一盞半煎一盞去滓食後温服

薑汁飲 一名三和飲子 治胃中實熱吐逆心煩不下飲食

治通利腸胃除胸中煩熱解酒渴

用菘菜二斤煮作羹啜之止作韭菹食亦得

治胃癉熱中陰渴止痢小便益氣力補虛輕身長年

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用梁米炊飲食之

理胃中熱去身腫健脾消穀止脹

用大豆一升煮令熟杵米飲服之

補氣湯 十便良方 生胃中津液并治上焦虛熱夜卧口乾

五味子 三兩用途東須 甘草 半兩 白鹽 一兩炒三件同拌于器中經一宿取出焙乾 吳茱萸 一錢

右為細末乾淨磁瓶中盛每以熟湯不拘時點一盞

欽定四庫全書

治胃氣實熱口乾唇裂中心熱燥大腸祕非時煩渴睡

中口内生涎 楊子建萬全護命方

大黃 半兩 桔梗 枳殼 只使青 前胡 葛根 梔子 各一錢

右件細搗羅為末每服二錢匕水一盞生薑三片同

煎取八分食後和滓啜

平胃散 醫方集成

治胃經實熱口乾舌裂大小便祕澀及熱

病後飲熱不除畜于胃中四肢發熱口渴無汗

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

厚朴 去皮薑炒 射干 米泔浸 升麻 茯苓 各半兩 芍藥 一兩 枳殼 去穰炒黑 大黄 蒸 甘草 各一兩炙

右㕮咀每服四錢水一盞煎七分空心食前服

治胃中熱下氣 本草

以滲疏作湯浴之

若病胃脹滿心胃悶發熱 本草

即用菓耳服之

治胸胃熱氣 本草

以蛇母草絞汁食之効

升麻湯 治瀉胃食熱方見本門

胃虚冷 附論

夫胃合于脾陽明是其經也為水穀之海凡五味五穀入口則胃實而腸虚食下則腸實而胃虚六腑實而不滿五臟滿而不實臟氣不足調之於胃胃虚則生寒寒則苦饑心腹恒痛兩脇虚脹善鳴時寒時熱唇口乾咽喉不利飲食不下面目浮腫漸漸惡風目中急足脛

列印日期/時間：02/05/2005 04:54:59
列印頁數：12
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

寒不得安臥則是胃虛冷之候也

健脾丸　治虛勞羸瘦身重胃冷飲食不消洩瀉不止或作帶下變五色噦臭

鍾乳粉　赤石脂（各一兩煅）　枯礬（乾薑炮）　蒐蓉（酒浸）　石斛（酒浸）　五味子　桂心　澤瀉　桑上寄生　遠志（去心焙）　人參　栢子仁　當歸　酸石榴皮　龍骨（煅）　天雄（炮去皮臍）　牡蠣粉　白頭翁（去苗）　甘草（各一兩炙）

右為末蜜丸梧桐子大米湯下三十丸空心服

欽定四庫全書

硇砂丸（出聖濟總録）　治胃氣虛冷不思飲食

陳橘皮（湯浸去白焙）　桂（去粗皮）　乾薑（炮）　當歸（切焙）　厚朴（去粗皮薑汁炙）　芎藭　胡椒　縮砂（去皮）　甘草（炙）　附子（各四兩炮去皮臍）　白朮（三兩）　五味子（一兩半）

右除別研外為末用銀石鍋好酒一升白蜜一十兩先下硇砂二兩阿魏半兩青鹽二兩好礬一兩煎煮稀稠成糊入藥末和劑熟杵丸梧桐子大每服二十丸生薑鹽湯送下不拘時

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

調中散 出直指方 治腸虛洩瀉止嘔進食
藿香葉 縮砂 蓬朮 炮 肉桂 草果 各半兩 麥芽 炒 益智仁 橘紅 各三錢 蒼朮 炮 神麴 炒 桔梗 各一兩 甘草 三錢炙
右用乾薑薑茴香各半兩為末每三錢薑棗少鹽煎服

木香散 出衛生家寶方 治臟寒冷極及久冷傷敗口瘡下洩米穀不化飲食無味肌肉瘦瘁心多嗔恚虛陽上衝婦人產後虛冷下洩及水瀉冷痢
芍藥 陳皮 肉桂 各半兩 白朮 胡椒 茱萸 各一兩 木香 一兩 破故紙 一兩 良薑 砂仁 厚朴 薑製 各三兩 赤肉豆蔻 四個 檳榔 一個
右為末每三錢用不經水猪肝四兩批片重重糝藥漿水一碗醋入茶脚少許入瓶蓋覆煮熟入鹽葱白三箇薑切一彈大同煮水欲蓋空心作一服冷食之初微溏不妨此是逐下冷氣少時自住經年冷痢滑洩只是一服渴則飲粥湯忌冷油膩如不能則漿水

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煖食之若只用漿水煮猪肝丸梧子大每服五十丸用粥湯下若暴瀉只一服一方用銀石器盛煮

熟乾地黃散出聖惠方 治胃中虛冷肌肉不榮身體枯燥骨節皆痛

熟地黃一兩 白茯苓三錢 當歸三錢劉炒 麥門冬三錢去心焙乾 薑半兩炒 川椒一分去目并閉口者炒去汗 甘草半兩炙 人參一兩去蘆 五味子三分 木香三分 吳茱萸一分湯浸焙炒 桂心一分

右為末每服二錢溫酒食前調下忌生冷

丁香溫氣湯出百一選方 治胃寒嘔吐涎沫張上舍名萃云其母常服有効

丁香 吳茱萸湯浸炒 桂心各一兩去粗皮 附子炮去皮臍 黃耆去蘆 甘草炙 人參去蘆 半夏湯炮七次 良薑 白茅各一

右㕮咀每服四錢水一鍾半薑五片棗二枚煎七分無時服

調衛湯出濟生拔粹方 治補胃氣虛弱表不任外寒

黃耆一錢 麻黃根一錢 生甘草半錢 猪苓二分 羌活七分 麥門

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

冬三分當歸半錢稍生地黃三分生黃芩半分五味子七個蘇木一分紅花一分半夏半錢湯浸七次

右㕮咀每服水二盞去滓稍熱服中風証必自汗汗多不得重發汗故禁麻黃而用根節也

茯苓湯出聖濟總録治胃冷不思食痰逆多吐

白茯苓一兩去皮半夏一兩湯浸七遍焙人參一兩半丁香半兩陳橘皮一兩半去白焙木香半兩檳榔一兩半劉草豆蔻二兩去皮桂三錢去皮粗厚朴一兩半去粗皮薑汁炙枳殼半兩去瓤麩炒

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分不拘時去滓温服

人參補虛湯治胃虛苦飢寒痛

人參當歸茯苓桔梗芎藭橘皮厚朴各三兩炙桂心甘草白朮吳茱萸二兩大棗擘二十枚生薑三兩炙

右用水一斗二升煮三升去滓分三服忌海藻菘菜桃李雀生肉葱猪肉酢物等

藿香養胃湯治胃虛不食四肢痿弱行立不能皆由陽

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

明虛宗筋無養遂成痿躄

藿香　白朮　白茯苓　神麴炒　烏藥去木　縮砂仁　薏苡仁炒　半夏麴　人參　藁澄茄　甘草各半兩

右切每服四錢水一盞生薑五片棗二枚煎七分去滓無時候服

人參附子湯聖濟總錄治胃氣冷不思食

人參　附子炮去皮臍　桂心去粗皮　半夏湯浸焙　枳殼去瓤麩炒　丁香　陳橘皮　白朮　草豆蔻各一兩去皮　甘草一錢

右㕮咀每服三錢生薑二片水一盞煎七分去滓溫服

欽定四庫全書

半夏乾薑三錢炮

普濟方

人參散出聖惠方治胃中虛冷胸膈脇脹滿四肢不利

人參三去蘆錢　白朮　赤茯苓　黃耆各半兩劉　附子三錢炮去　木香　大腹皮各半兩劉　甘草一錢炙劉　陳橘皮湯浸去白焙　訶梨勒煨去核各一兩半　桔梗一兩半去蘆

右㕮咀每服三錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白术散　治胃冷氣脹滿悶四肢急體重

白术　訶梨勒　各去核三兩　甘草炙劉寄奴丁香　厚朴去粗皮薑汁炙各一兩　木香　桂去粗皮　各二兩　人參　檳榔半生半熟各三兩　陳橘皮去白　各二兩

右為末每服二錢生薑木瓜煎湯調下

人參散　補虛寒身枯絶諸骨節皆痛

人參　甘草　細辛　各六分　麥門冬　桂心　當歸　各七分　乾薑　二分　遠志　一分　吳茱萸　二分　蜀椒　三分

右治下篩食後酒服方寸匕

大七香丸　出和劑方　治男子婦人脾元氣冷胃氣虛乏不思飲食心膈噎塞漸成隔氣脾洩痢氣刺疰中酒冷痰翻胃霍亂吐瀉並皆治療

香附子　一百九十二兩炒去毛　麥蘗　一百兩炒　丁香皮　三百十兩　縮砂仁　三百二兩　甘松　煉四兩　烏藥　各六十兩　陳橘皮　二百五十兩洗去白　肉桂　去粗皮　甘草　各三百五十兩

右為末煉蜜丸彈子大每服一粒鹽湯鹽酒嚼下婦

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人脾血氣如經水不調並用炒薑酒嚼下醋湯亦得
忌生冷及肥膩之物大有神効
丁香丸出聖濟總録治胃氣虛冷
丁香 乾薑 吳茱萸炒 五味子 訶子 檳榔
各半兩 厚朴薑汁炙 桃仁各一兩去皮尖 木香 青橘皮各五錢去白
右為末煮棗肉丸如菉豆大每服十丸橘皮湯下
補胃煮散出聖惠方治胃中虛冷惡寒洒洒卧而不寐少氣口
欽定四庫全書
苦身體虛弱
細辛一兩半 栢子仁 人參 芎藭各一兩 防風 桂
去皮各半兩 陳皮 吳茱萸三錢水浸一宿炒 甘草二錢 黃耆一兩
右為末每服二錢水七分煎沸通口服一方咬咀生薑半分棗三枚水煎服一方無黃耆
頭眩臂疼露冷風癖之氣
千金五套丸出直指方治反胃胸膈滿宿滯不消停痰留飲
南星二兩每個切十餘塊 良薑一兩 半夏切研用二兩以水浸三日逐日換水一次同

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用白礬二兩研 乾薑 白朮 茯苓各一兩 丁香 木香 青皮 橘紅各半兩

右為末用神麯一兩大麥芽二兩同末打糊丸如梧子大每服五七十丸米飲下一方無良薑

藿撥丸 治胃家氣虛冷大便滑洩臍腹多痛方見脾胃門洩痢類

和中丸出水類鈐方 治和胃氣吐瀉

石蓮肉 茯苓各二兩半 藿香 人參 白扁豆 大腹皮 麥芽 縮砂仁 白朮 甘草各半兩炙 麻 木香 白朮 甘草各半兩炙

右㕮咀每服四錢水一鍾薑三片煎服

人參丸出聖惠方 治胃中虛冷氣上奔胃中憤悶腹中疼痛吐痢宿水甚效

人參去蘆 桂心 乾薑炮製 白茯苓 陳皮湯浸去白 白朮 木香各半兩 訶梨勒皮一兩去皮 厚朴一兩去薑汁炙

右為末煉蜜丸如梧桐子大每食前米飲下三十丸

養胃湯出簡易方 養胃正陽溫中調氣內逐陰冷滯氣外辟

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:01
列印頁數：20
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

風寒嵐瘴常服春無感冒秋不生瘧痢冬不致感寒

橘紅 三兩 甘草 一兩炙 厚朴 去皮薑汁炙 蒼术 各一兩去皮泔浸 人參 茯苓 藿香 草果 各半兩 半夏 一兩湯炮七次

右㕮咀每服四錢水盞半生薑七片烏梅一箇煎六分去滓熱服

禹餘糧丸 醫方大成 治下痢滑數肌肉消瘦飲食不入脈細皮寒氣少不能言有時發虛熱由脾胃虛耗則氣奪由穀氣不入胃胃無以養故形氣消索五臟之液不收謂之五虛此為難治

禹餘糧 煅 赤石脂 煅 龍骨 鞭撥 訶子 麵包煨乾 薑 肉豆蔻 麵包煨 附子 炮去皮臍 各等分

右為末醋糊丸梧桐子大每服七十丸食前米飲下

沉香湯 出聖濟總錄 治胃氣虛冷不思飲食及冷氣攻腹脇痛四肢少力口吐酸水噦食無味

沉香 劉 白豆蔻 各一兩去皮 青皮 一兩半 高良薑 半兩 桂 一兩 吳茱萸 厚朴 各三兩去粗皮 檳榔 劉

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右㕮咀每服二錢水一大鍾煎七分去滓温服不拘時

烏頭湯 出聖濟總錄 治胃氣虛冷不思飲食脇肋滿胸膈不快臟腑不利

烏頭 炮去皮臍 二兩 粟米 五合 白鹽 一兩 炒

益智 去皮炒 各三兩 青橘皮 一兩半 湯浸去白焙

木香 訶梨勒 去核 各半兩 山

右㕮咀每服三錢水一大盞煎七分濾去滓放温食前服

白朮八味散 治胃虛苦饑寒痛

白朮 厚朴 人參 吳茱萸 麥蘗 炒 茯苓

芎藭 橘皮 各三兩

右搗羅為細末食前服方寸匕煖酒進之隨性服忌桃李雀肉大醉

平胃散 出千金方 凡身倦不得食食無味心下虛滿時時欲下喜臥者皆宜

杏仁 五十枚 丹參 三兩 苦參 葶藶 玄參 各三兩 芎藭

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桂心 各一兩
右為末煉蜜丸梧桐子大酒服五丸日三以止為度
參苓白术散 出直指方 治虛勞胃弱飲食不進嘔吐洩瀉及大病後調助脾胃
人參 白茯苓 白术 甘草 炒 山藥 各三兩 炮 白扁豆 一兩半 製 縮砂 蓮子肉 桔梗 炒 薏苡仁 各一兩
右搗羅為末每服二錢棗薑略煎服小兒量歲數與之此藥中和不熱久服養氣育神醒脾悅色順正辟邪
香朴丸 治腸腹虛冷洩瀉注下無度虛氣閉不進飲食
厚朴 五兩 薑汁炒 白术 三兩 茴香 炒 各三兩 陳皮 訶子 炮去核 各一兩 赤石脂 各一兩半 煅
右為末麵糊丸梧子大每服以五十丸空心米湯下
常服煖腸胃
丁香湯 出聖濟總録 治胃中虛冷霍亂吐瀉煩熱發渴下痢

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

赤白丁香皮二兩白朮四兩甘草一兩炙草豆蔻五個乾薑半兩枇杷葉二十片去毛

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎七分去滓食前温服

豆蔻湯出聖濟總録治胃虚冷嘔逆

草豆蔻一兩半桂半兩生薑三分去皮切甘草炙一兩丁香各一兩半附子炮去皮臍

右㕮咀每服五錢水一盞半棗一枚擘煎八分去滓温服

理中湯出直指方治腸胃虚弱腹内痛身體怯寒洩瀉青黑兼治傷寒挾寒而利臍下冷名鶩瘡證

人參白朮乾薑甘草各一兩炙加茯苓厚朴各二兩薑製

右㕮咀每服三錢水一盞煎空心服

六君子湯出危氏方治臟腑虚怯心腹脹滿嘔噦不食腹洩

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:02
列印頁數：24
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

瀉

人參 甘草 白茯苓 白朮 肉豆蔻 紙裹煨訶子 各等分 煨去核

右㕮咀每服三錢生薑三片棗子二枚同煎或為末

鹽湯下

調中湯 治胃氣虛不欲食四肢重短氣調和五臟并療諸病

薤白 一升切 枳實 六枚 陳皮 大棗 粳米 三合 香豉 六合

右枳實橘皮棗以水六升煮薤得四升內米豉煮取一升半邊寒温服中分服之

厚朴散 出聖惠方 治胃中虛冷氣攻腹脇脹悶食久不消

厚朴 三兩去粗皮薑汁炙 肉豆蔻 三錢去殼 訶梨皮 一兩煨 木香

右為散每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎六

檳榔 陳橘皮 各三錢湯浸去白焙

厚朴丸 治胃氣虛冷臍腹疼痛或洩瀉下痢并不思

分去滓食前稍熱服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

飲食方見脾藏門脾虛冷類

川椒丸 治臟虛洩瀉無度胃寒

黃連炒 烏梅肉 當歸 川椒炒去汗 桂心 乾薑各等分炮

右為末糊丸如梧子大每服三五丸空心米湯服

訶梨勒湯出聖濟總錄 治胃氣虛冷腹瀉

訶梨勒五枚炮去核 大腹五枚剉 草蔻十四箇去皮 甘草炙 白术人參各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分去滓食前服

厚朴湯出聖濟方 治胃冷嘔逆

厚朴去麤皮薑汁炒 白术 桂各去粗皮 丁香各三兩 桃仁半兩去皮 丁香半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分酸醋濾去滓熱呷

丁香湯出聖濟方 治胃寒胸膈虛滿面目浮飲食不化

丁香 藿香葉 附子各一兩炮去皮臍 乾薑半兩炮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右咬咀水一升煎五合去滓徐徐呷盡

丁香散 出本事方
開胃進食

丁香 四十粒
藿香 半兩
巴荳 二十粒去殼取肉
粟米 一合

右先將粟米巴荳肉同炒令赤色去巴荳不用只使粟米與丁香藿香同研為末每服二錢米調下

藿香半夏散 出和劑方
治胃虛中寒停痰留飲噦逆嘔吐胸滿噎痞短氣倦怠不入飲食

丁香皮 半兩
藿香葉 一兩
半夏 二兩湯浸七次炒黃色

食前

右咬咀每服二錢水一盞薑七片煎七分去滓温服

火輪丸 出大成醫方
治腸胃虛寒心腹冷痛洩瀉不止

乾薑 炮
附子 炮去皮
肉豆蔻 各等分麵裹煨

右為末米糊丸如桐子大每服五十丸空心米飲下

白朮附子湯 出永類鈐方
治腸胃虛寒腸鳴洩瀉或自多汗

白朮 二兩
附子 炮去皮
茯苓 各一兩

右為散四錢水盞半薑七片棗一枚煎七分去滓温

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

服無時

治胃冷嘔逆氣厥不通 出十便良方
母丁香 三粒炒
陳橘皮 一隻全者湯浸去白焙
右用水一盞取半盞去滓熱服

治患胃虛并嘔吐食及水者 出本草
白梁米 二合汁
生薑 一合汁
右服之性微寒除胸膈中客熱止五臟氣續筋骨

猪臟丸 治臟寒洩瀉飲食氣體倦怠
右用豬猪臟頭一截去脂膜淨洗將茱萸入臟内兩頭札定温火煮令極爛用甑蒸熟尤好二味于臼搗千下令極細丸梧桐子大每服五丸米飲下

平胃氣和中益五臟
用鯽魚和茱萸作羹食良

蓼酒 出十便良方 治胃管不能飲食耳目不聰明四肢有氣冬臥脚冷服此酒十月後目既精神體又充壯

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用八月三日取蓼曝燥把之如五升大六十把水六石煮一石去滓釀酒如常法隨多少飲之其効甚速

治元臟傷冷及開胃

用附子炒過去尖搗為末水二盞入藥二錢鹽及生薑同煎取一盞空心服

治胃氣冷喫食即欲得吐

用白豆蔻子三枚研細好酒一盞微温調併飲三二盞佳

治胃主虚羸風熱不能食及四肢煩熱

用羊胃一枚與肉一觔切以水二斗煮取九升每服一升三日盡便作兩劑乃差肉多入湯

用生薑取汁拌雞子生地黄少許蜜一匙頭和水三合頓服立差

温胃煮散 出聖濟總録

治胃虚冷中脘氣滿不能傳化善饑

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:04
列印頁數：29
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不能食

人參末 二錢半 生附子末 一錢 生薑 一分 均和勻用水七合煎

二合雞子一枚取清打轉空心服

厚朴丸 一名八味厚朴丸 治胃氣虛冷饑瘦少力不思飲食 方見脾藏門脾胃虛冷水穀不化類

順氣湯 一名温氣煮散 治胃氣虛冷腹脇脹滿痰逆不思飲食 方見脾藏門虛冷類

草豆蔻散 出王氏博濟方 治胃口冷喫食無味及脾洩瀉不止

草豆蔻 半兩煨焦黃 每個 肉桂 一兩 甘草 一兩炙 陳皮 一兩去白 蠻

薑 一兩

右件為細末每服一錢半更下陳米末一錢棗一枚同煎至七分温服其滓再煎服

調中散 出楊子建萬全護命方 治胃氣虛冷少思飲食面色痿黃口無滋味非時吐出清水頻發泄瀉忽時下黃沫白沫嘔逆惡心身多寒慄唇皮無光肌膚不澤腸內虛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

嗚心腹刺痛忽然心中沉冷胸膈不安一切脾胃虛冷證候並宜服之

蓬莪茂　京三稜　各三分　甘草　黃橘皮　一兩　獨活

芎藭　防風　桔梗　白芷　白朮　木香　各一兩

青橘皮　三錢

右細杵為末每服二錢空心入温鹽煎點任意喫

又方治胃氣虛風邪攻之食即嘔逆食不進腹大泄瀉面黃消瘦方　出楊子建萬全護命方

訶子　一兩麵裹炮只用皮　舶上黃　二兩　肉荳蔻　吳茱萸　防風　厚朴　川芎　蒼朮　藿香　獨活

右細杵羅為末煉蜜丸如梧子大空心米湯下三十丸

丸

治胃冷口常酸水心下連臍痛立效　出徐居士選方

厚朴　一兩生薑汁合塗炙為末　蓽撥　半兩炒為末

右相合入熟烏鯽魚研和為丸如菉豆大每日米飲下二十丸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

補胃 出木草

以羊肥肚羹食三五度

温中 出本草

以糯米飲食之

胃熱腸寒 附論

夫腸胃相通疾病相連人因飲食不節寒温失宜致腸胃受邪有冷有熱疾證但見食則善饑小腸痛脹為胃熱腸寒之病胃熱則消穀故善饑腸寒則血凝脈急故小腹痛又寒則氣裂故痛且脹

麥門冬湯 出聖濟總録

治胃熱腸寒善食數飲小腹脹痛

麥門冬 去心 甘草 各二兩 羌活 白茯苓 旋覆花 白皮 當歸 各一兩 胡黄連 木香 熟地黄 一兩半 玄參 白术 芍藥 柴胡 人參 升麻 桑

黄耆湯 出聖濟總録

治胃熱腸寒食已腹饑小腹脹分氣

右㕮咀每服三錢水一盞入甘草一寸煎八分去滓温服不拘時候

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃耆 兩半 人參 白朮 白茯苓 京三稜 莪蒁
陳皮 去白 麥門冬 去心訶子 前胡 桔梗 柴胡
各半兩 牡丹皮 甘草 芍藥 各三錢
右�once咀每服三錢水一盞生薑三片煎七分去滓温服無時

半夏湯 出總錄 聖濟
半夏 麥門冬 去心 人參 白茯苓 桔梗 青皮
脹痛
治胃熱腸寒冷熱不勻善食數饑小腸
右�once咀每服三錢水一盞半生薑三片煎一盞去滓熱服

京三稜煎丸 出總錄 聖濟
京三稜 三兩 硇砂 一兩 用米醋三升煎成膏 當歸 大黃 麝甲 去皺炙裙 五靈脂 木香 沉香 各半兩 檳榔 桂 乾漆 各三錢 没藥 馬蘭花 各一錢 蓬朮 一兩 炮
治胃熱腸寒食已腹饑小腸痛
白芷 各一兩 枳殼 厚朴
柴胡 防風 前胡 細辛 款冬花 紫苑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末入三稜煎丸菉豆大每服七丸空心臨卧温酒或鹽湯下

前胡木香湯 出聖濟總録 治胃熱腸寒善食數饑小腹脹痛

前胡 木香 柴胡 秦艽 桂 檳榔 三個麵裹煨 肉豆蔻 三個 莒藭 甘草 青皮 葶藶 各半兩 各一兩炒

右㕮咀每服四錢水一盞半薑三片煎一盞去滓温服

沉香散 出聖濟總録 治胃熱腸寒食已饑小腹痛

沉香 白檀香 烏藥 山芋 甘草 白茯苓 京三稜 前胡 桔梗 各半兩 人參

右為末每服一錢入鹽少許沸湯點服不拘時

熟地黄湯 出聖濟總録 治胃熱腸寒善食數饑小腸痛脹

熟地 人參 白茯苓 麥門冬 枇杷葉 去毛 地骨皮 甘草 炙 石斛 黄耆 各等分

右㕮咀每服一錢水盞半煎七分去滓服不拘時

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芍藥丸 出聖濟總錄 治胃熱腸寒善饑小腹痛脹

芍藥 人參 赤芍藥 厚朴 各三兩 薑汁炙 陳皮 木香 桂 桔梗

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十丸食前米飲下日二

立通丸 一名青橘皮丸 治胃熱腸寒善食數饑小腹脹痛大便或澀 出聖宣明論

京三稜 黃連 青皮 蓬莪朮 各一兩 巴豆霜

右為末麵糊丸菉豆大每服五丸食後茶酒任下

調中湯 出聖濟總錄 治胃熱腸寒食已輒饑小腹痛脹

人參 白茯苓 各十兩 紫河車 甘草 各二兩 生用

右�once煎至七分去滓空心食前温服

胃寒腸熱 附論

夫病有腹脹而洩為胃寒腸熱胃受寒則氣脈不行而為脹滿腸客熱則水穀不聚而為洩注病本濁寒之氣

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

在上清熱之氣在下故脹而且洩

大腹木香湯 出聖濟總錄

治胃寒腸熱腹洩痢

大腹皮 前胡 木香 半夏 各二兩 白朮 白芷 桂 陳皮 玄胡索 當歸 旋覆花 甘草 炙 各半兩 乾薑 人參 各三錢 柴胡 芍藥 各半兩

右�once咀每服三錢水一盞生薑三片棗三枚擘破煎六分去滓稍熱食前服

香橘丸 出聖濟總錄

治胃寒腸熱腹脹洩利

丁香 六錢 青皮 半兩 硇砂 細研水飛一 木香 京三稜 蓬 術 縮砂 陳皮 桂 各半兩 烏梅 二十二枚去皮 巴豆 二十二枚去皮 同烏梅一處搗

右為末麵糊丸菉豆大每服十五丸食後溫生薑湯下

溫胃丸 出聖濟總錄

治胃寒腸熱腹脹洩痢調氣

半夏 二兩洗七次 肉豆蔻 桂 人參 各半兩 訶子 良薑 各一錢 木香 陳皮 去白 各一兩 蜜 棗子肉 各一兩 生薑汁

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:06
列印頁數：36
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

盞入蜜衆熬為膏

右為末用薑蜜棗膏丸如梧子大每服十丸米飲下

生薑湯送下亦得

訶梨勒湯 出聖濟總録

治胃寒腸熱腹滿悶洩瀉不止

訶子 一兩半 大黄 半兩 青皮 半兩 良薑 半兩 甘草 一錢 防風 一錢

枳殼 半兩 薑 一錢 厚朴 半兩薑汁製 陳皮 三錢

右為咬咀每服三錢水一盞半薑棗煎七分去滓温服不計時

厚朴丸 出聖濟總録

治胃寒腸熱腹脹洩痢

厚朴 一兩半薑汁製 訶子 乾薑 附子 去皮臍炮 黄連 各一兩

當歸黄連丸 出聖濟總録

治胃寒腸熱腹脹洩痢

當歸 黄連 二兩 木香 吳茱萸 各一兩 赤茯苓 厚朴 薑汁炙 訶子 各一兩

茱萸湯下米飲亦得日三

右為末醋浸炊餅丸梧桐子大每服三十丸空心煎

連 白石脂 吳茱萸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸食前米飲下

日三

和胃丸 出聖濟總錄 治胃寒腸熱腹脹洩痢

半夏 牽牛 各半兩炒 生薑一兩 人參 礬蝴蝶 藿香 各半兩 丁香

右先將半夏牽牛生薑于銀石器内慢火煮候水盡焙乾與人參等藥同杵為末用生薑汁煮麵糊丸梧桐子大每服二十丸空心生薑米湯下

欽定四庫全書

妙應丸 出宣明論 治胃寒腸熱腹脹洩利水穀不化痞滿不

普濟方

已

烏頭 半兩去皮臍生用 梔子 一錢去皮 乾薑 一錢生用

右為末用生薑自然汁丸如梧桐子大每服七丸温酒下食前服

益腸胃 出本草

用越瓜和飲作鮓并薤菹亦得

胃中宿食 附論

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夫凡病宿食在上管當吐之脈數而滑者實也有宿不消下之愈中有澼食冷物即痛不能食有熱物即卻食大腹有宿食寒慄發熱如瘧狀宿食在小腹者當暮發熱明旦復止寸脈緊即頭痛風寒或腹中宿食不化寸口脈緊者如轉索左右無常脾胃中宿食不消寸口脈浮而大按之反澀故知宿食

霍亂

大麴蘗丸 出千金方
主消穀斷下温和又寒冷者長服不患

乾薑 一兩
麥芽 麴 各一升
附子 一枚
乾薑 當歸 人參 各三兩
赤石脂 一兩
桔梗 瓜蔞 各二兩
吳茱萸 皂莢 各五兩
椒 二兩半
烏梅 五十個

右為末蜜酢中半漬梅一宿蒸三斗米許去核搗如泥和藥再搗三千杵丸如梧子大每服十丸白湯下日三下甚者加龍骨阿膠艾各三兩

乾薑散 出千金方
治不能食心意冥然忘食

乾薑 法製
蜀椒 大麥芽 豉 各一升

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末食後米飲服方寸匕日三以能食為度

消食斷下丸 出千金方 治數年不能食寒冷者常服

之

麴 大麥芽 各一升 吳茱萸 四兩

右為末蜜丸如梧子大每服五十丸白湯日三服

麴蘗散 出千金方 消穀能令除腸中水氣腹脹

法麴 麥芽 杏仁 各五兩

右為末食後酒服一合日三

開胃生薑丸 治中焦不和胃寒水穀不化噫氣不通

噎塞痞滿口淡吞酸食時臌脹噦逆惡心嘔吐痰水

宿食不消噦脇肋刺痛寬中開胃進美飲食

皮 各去白二兩 廣茂 當歸 縮砂 四十九個

桂心 一兩 甘草 炙二兩 生薑 一斛切鹽三兩淹一宿焙乾 青皮 去白陳

平胃丸 出千金方 治丈夫小兒食實不消胃氣不調或溫濕

化下

右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸食前細嚼沸湯

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:07
列印頁數：40
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熱結大小便不利者有病冷者服露宿丸熱藥後當
進此丸調胃
葶藶 各一兩 杏仁 五十枚 大黃 二兩 小草 甘草 芍藥
芎藭 各一兩
右為末蜜丸桐子大每服五丸米飲下日三一歲小
兒二丸漸加之千金翼有葛蒲當歸乾薑茯苓麥
門冬細辛為十二味無杏仁
調中益五臟開胃令人能食 出本草
以草鼓食之
利五臟健胃令人能食
以蛆煮食之以飯壓之不爾令人口乾
以蓮藕生研服之
開胃消食 出本草
開胃通心膈 出本草
以麥芽炙作熟水飲
主開胃 出本草

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以蓮藕蒸煮食之良

開胃通利五臟

用鮰魚煮食以食令人肥健而開胃 鮰魚似鯉身圓頭匾骨軟生江海水中

調中消食去惡氣

用羅勒生食之 即蘭香也味辛温有小毒

食亦 論

夫内經曰大腸移熱于胃善食而瘦故謂之食亦胃移熱于膽亦曰食亦胃為水穀之海所以化氣味而為榮衛者也胃氣和則飲食有節精血盛而膚革充盈若乃胃受邪熱消爍穀氣不能變精血故善食而瘦也病名食亦言雖能食亦若饑也胃移熱于膽亦曰食亦以膽為陽木熱氣乘之則爍土而消穀也

甘露飲 出聖濟總録 治胃熱善食不生肌

生地熟地天門冬去心麥門冬去心枇杷葉去毛黄芩石斛甘草炙枳殼麩炒山茵陳各一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓食後温服日三

升麻湯 出聖濟總録 治胃熱健食消穀善饑不生肌肉病名食亦

升麻 梔子仁 射干 赤茯苓 各三兩 芍藥 四兩 白朮 五兩 生地黄 蜜 各一升

右咬咀六味如麻豆大每服五錢水一盞半煎一盞去滓加地黄汁半合再煎兩沸次下淨白蜜半匙共煎取一盞温服老少加減

沉香湯 出聖濟總録 治胃熱消穀善飲不為肌膚

沉香 人參 麥門冬 去心 地骨皮 小草 生甘草 生地黄 各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去滓温服日三

參苓丸 出宣明論 治胃中熱結消穀善食不生肌肉

人參 赤茯苓 菖蒲 遠志 去心 地骨皮 牛膝

不拘時

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:08
列印頁數：43
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

各一兩酒浸切焙

右為末煉蜜丸如梧子大每服二十丸温米飲下日三不拘時候服

乾地黄湯 出聖濟總録 治胃熱善食而瘦病名食亦

地黄 麥門冬 去心 栝蔞根 各三兩 甘草 炙 枳殼 黄芩 各一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎七分去滓温服日二

噫酸 附論

夫上焦有留飲脾胃挾宿寒致飲食滯于膈脘不能傳化令人脹滿氣逆所以噫酸也

和胃丸 出聖濟總録 治噫酸惡心痰飲嘔逆不思飲食 方見脾臟門兼理脾胃類

丁香散 出聖濟總録 治脾胃虚弱噫氣吞酸食飲遲化

丁香 縮砂 白朮 乾薑 人參 陳皮 去白 附子 各二兩炮去皮臍 高良薑 桂 檳榔 白豆蔻 陳

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:08
列印頁數：44
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麝 各半兩 甘草 炙各一錢 木香

右為末每服二錢炒生薑鹽湯下不拘時

丁香煮散 出聖濟總録

治噫酸吞酸不欲食

丁香 半兩 赤茯苓 桔梗 白朮 白芷 桂 半

夏 薑汁製 甘草 人參 各一兩 乾薑 半兩 檳榔 高良薑

肉豆蔻 枳殼 各一錢

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至六分去滓温服

木香平氣丸 聖濟總録 治心胸有痰噫酸吞酸

木香 沉香 丁香 肉豆蔻 丹砂 射香 各半兩 檳榔 麵裹慢火煨熟去麵不用 乳香 一兩揀通明者生薑汁内煮軟別研如膏 半夏 二兩湯浸七次焙乾為末生薑汁和作餅子入藥同研

右除丹砂乳香半夏射香四味別研外將木香等七味一處為末次入丹砂射香再拌研勻細後將乳香半夏末入生薑汁煮作薄糊拌和前藥如拌和未就以生薑汁煮糊拌和硬軟得所為度丸如梧桐子大每

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

服十五丸至二十丸食後溫米湯送下

丁香丸 聖濟總錄 治胃寒痰飲噫酸吞酸胸膈妨悶

丁香 母丁香 丹砂 麝香 乾薑 礬石 飛過 枚去皮膜別研為膏去油 附子 炮去皮 吳茱萸 杏仁 去皮炒 硫黃 各一錢 巴豆 三十

右研末拌勻用蒸棗肉和劑丸菉豆大放乾每服三五丸不拘時溫薑湯下

丁香丸 聖濟總錄 治噫酸吞酸或時惡心懶進飲食

丁香 五味子 半夏 人參 各半兩 甘草 琥珀

乾薑 各一兩 枳殼 炒熬 昆布 洗去鹹水 訶子 桂

右為末煉蜜丸梧子大每服三十丸煎薑橘皮湯下

京三稜丸 聖濟總錄 治噫酸吞酸消積進飲食

京三稜 三兩濕紙裹煨熟 白术 二兩 丁香 半兩 檳榔 一兩 半夏 四兩

右除研為細末入研藥再研令勻以生薑自然汁煮

麵糊丸如梧桐子大每服二三十丸木香生薑湯下

滑石 去 麝香 一錢 丹砂 半兩

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:09
列印頁數：46
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

無時

丁沉煎丸 方和劑 辟寒邪散胸膈中凝滯調順三焦和養榮衛治心胸痞悶噫酸吞酸嘔逆痰水津液不收兩脇刺痛腹中堅滿口苦無味不思飲食

丁香 十二兩 沉香 二兩 木香 一錢半 陳皮 一兩 白豆蔻 九兩半

右為末別用甘草熬膏子為丸每一兩分作二百五十丸每一粒含化空心食前常服養榮衛散滯氣治噫酢咽 肘方後 治人食畢噫酸及醋心

吳茱萸 半兩 人參 二兩 生薑 三兩 大棗 十三枚

右�once咀水六升煮水二升先服一升日再

半夏丸 聖總錄濟 治上焦冷氣噫醋吞酸吐沫嘔逆不思飲食

半夏 二兩去滑 丁香 半兩 乾薑 一錢

右為末生薑自然汁煮麵糊為丸梧桐子大每服十五丸熟水鹽湯下不拘時

又半夏丸 聖總錄濟 治上膈痰滯吞酸吐沫涕唾稠粘胸膈

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不利

半夏 二兩用生薑炙 山芋一兩 礬石飛過

右為末麵糊為丸每服十丸至二十丸食後臨卧生薑湯下

丁香丸 聖濟總録 治噫酸息臭胸中有痰

丁香 荜撥 各一兩 硇砂半兩研細用百沸湯量多少化研以淨紙濾過入次磁碗内慢火熬乾

右同研令勻好新黄蠟二兩入甕器内鎔化入上味攪勻候温酒通手丸桐子大如硬難丸復近火温之以丹砂一分研為衣每用煨生薑湯下空心夜卧各一服三丸逐日加一丸至五丸後三日加一丸至七丸止

欽定四庫全書 普濟方

藿香半夏丸 聖濟總録 治膈中有痰脾胃積冷噫酸吞酸不思飲食

藿香葉一分 丁香 半夏 五兩薑汁浸一宿焙乾

右為末麵糊丸梧桐子大每服十五丸不拘時温生

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

薑湯下

薑棗丸 聖濟總録 治胃寒痰逆噫酸吞酸胸膈不利不思飲食

生薑 四兩 丁香 附子 各一兩炮 橘皮 去皮臍二兩 檳榔 四兩

右為末用蒸棗肉丸梧桐子大每服十五丸至二十丸米飲不拘時送下

治胃冷常吐清水醋心 聖濟總録

乾薑 礬石 各一兩燒過別研

右為末米飲丸如梧桐子大葱茶下二十丸食後服

欽定四庫全書 普濟方

治醋心 肘後方

橘皮 二兩 檳榔 四兩

右為末空心生薑湯下方寸匕一方蜜湯下

又方 傳信遍方用

用胡桃爛嚼以乾薑下之或只嚼胡桃喫乾薑亦可

治噎 酸漿

治

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用取頭垢漿水煎煮膏服之驗一方水煎服

治酸心每心氣上攻如醋 肘後方

用取菜萸一合水三盞煎七分頓服涎濃亦須強服

近有人心如蜇破服此方後二十年不發

增損成氣丸 療胷脇肋滿背上時有灑熱則痛腹脹

多噎醋咽氣逆兩脇滿

前胡 枳實 橘皮 大黃 各七分 桂心 吳茱萸

乾薑 各五分 茯苓 四分 芍藥 六分 厚朴 杏仁 七十個 去皮炒

右為末內杏仁脂中研爛篩度蜜和丸每服食後

少時酒飲任性初服七丸如梧子大以氣宣下洩為

度忌生葱大醋

茯苓湯 治吐酸

茯苓 陳皮 生薑 各十二分 白朮 甘草 人參

桂心 各六分 紫蘇 一錢 檳榔 七枚

右㕮咀水九升煮二升絞去滓分溫三服每服如人

行六七里未好差三兩日更服一次老小腹微痢忌

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:10
列印頁數：50
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生葱酢物雀肉海藻菘菜

檳榔散　療吐酸水每食則變作醋水吐出

檳榔　人參　茯苓　陳皮 六分　葶藶 炒 六分

右為末空腹取生薑五大片合搗絞汁温内散方寸匕攪調頓服旦服漸加至一匕半若利多減以微通止

茯苓湯　療心頭氣結連胸臍皆痛及吐酸水日夜不

洩為度忌酢物生冷油膩猪魚等

右合搗日乾以酒服三寸匕日三

治酢咽

麴末 一升　地黄 三觔

物桃李雀肉等一方有吳茱萸人參 各三兩

内之甚安穩三日服一劑類服六五劑則可停忌酢

去如人行七八里須利加檳榔末一兩半湯欲熱時

右咬咀水九升煮二升七合絞去滓分温三服每服相

茯苓　厚朴 各四兩　檳榔　白朮 各二兩　生薑 十兩

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:11
列印頁數：51
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白术散　治食訖醋咽多噫食飲不下及脾胃虛冷

白术一兩　吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒　高良薑半兩

右為粗散每服三錢以水一大盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候稍熱服

前胡丸　治胸脇支滿背上時寒腹脹多噫醋咽逆氣

前胡一兩半蘆頭　枳殼一兩麩炒微黃去瓤　桂心一兩　草豆蔻一兩去殼　高良薑二兩劉　乾薑半兩炮製劉　赤芍藥一兩　川大黃二兩劉碎微炒　厚朴二兩去粗皮生薑汁炙令香熟　甘草半兩炙微赤劉　川大黃一兩劉碎微炒　訶梨勒皮一兩半湯浸去白焙　陳橘皮一兩半湯浸七遍焙乾微炒　桂心一兩　吳茱萸半兩湯浸七遍焙乾微炒　厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右製為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎七

檳榔散　治酸咽吐水及白沫飲食不消腹脹脇滿

檳榔一兩　厚朴二兩薑汁炙令香熟　甘草半兩炙微赤劉　川大

計時候以生薑湯下三十丸

右為末煉蜜丸搗三二百杵丸如梧桐子大每服不

七遍乾微焙　赤芍藥一兩　川大黃二兩劉碎微炒　厚朴二兩去粗皮生薑汁炙令香　杏仁一兩湯浸去皮尖發麵炒微黃

高良薑二兩劉　乾薑半兩炮製劉　赤茯苓一兩　吳茱萸一兩湯浸

前胡一兩半蘆頭　枳殼一兩麩炒微黃去瓤　桂心一兩　草豆蔻一兩去殼

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

至六分去滓不計時候稍熱服

檳榔丸　治脾胃氣冷上攻胸膈嘔吐酸水不思飲食腹脇虛脹

檳榔 半兩　高良薑 三錢劉　陳橘皮 半兩湯浸去白瓤焙　桂心 一錢　厚朴 半兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟　訶梨勒皮 半兩　半夏 半兩湯浸去滑　草豆蔻 半兩去皮　白术 半兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候生薑湯下三十丸

木香散　治脾胃冷氣上攻胸膈切痛醋咽不能下食

木香 一兩　厚朴 一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟　陳橘皮 二兩湯浸去白瓤焙　白术 二兩　甘草 一兩炙微赤劉　高良薑 半兩劉　前胡 二兩去蘆頭

右為粗散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候稍熱服

人參散　治食畢即咽醋心胸氣滯腹脇疼痛不能下食

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人參 二兩去蘆頭 吳茱萸 半兩洗七遍焙乾微炒 木香 半兩 半夏 一兩湯浸洗七遍去滑 陳橘皮 二兩去白瓤焙 高良薑 一兩劉

右為粗散每服三錢以水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時稍熱服

半夏散 治醋咽胸中氣塞飲食不下

半夏 半兩湯洗七遍去滑 人參 一兩去蘆頭 赤茯苓 一兩 甘草 半兩炙微

右為粗散每服三錢以水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

赤劉 吳茱萸 半兩湯浸七遍焙乾微炒 訶梨勒皮 二兩

右為粗散每服三錢以水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

陳橘皮散 治噦逆酸咽胸膈不利食少腹脹

陳橘皮 二兩湯浸去白瓤焙 白檳榔 一兩 人參 一兩去蘆頭 白朮 一兩 厚朴 一兩半去粗皮塗生薑汁炙香熟

右為粗散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服

療醋咽

用羌活五兩搗用水一升浸三宿每日溫服五合差

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:12
列印頁數：54
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

生薑湯　治酒食所傷心胸煩滿口吐酸水多嘔逆飲食無味胸膈不快

乾生薑一勭　白麵炒三勭　甘草十三勭炒　杏仁去皮尖麵炒另研十勭

右炒鹽二十二勭同為末每服半錢如茶點喫常服一匙消食化痰寬胸膈不拘時候

除胸間酸水草本

以雞蘇作生菜食之

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:12
列印頁數：55
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

普濟方卷三十六

胃腑門

胃反 附論

明 周王朱橚 撰

夫寸緊尺澀其人胷滿不能食而吐吐止者為下之故不能食設言未止者此為胃反故尺為之微澀差跌陽脈浮而澀浮即為虛澀傷脾脾傷而不治磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名胃反跌陽脈緊而澀其病難治

翻胃者始則由七情氣鬱而生澼及飲食生冷喜啖炙煿饑飽不時傷損脾胃脾胃之中州不能磨化水穀胃之下口不能宣達於關門秘別之所以致氣復回升飲食而反治之之法須當運化米穀為先溥洩胃之下口使氣得下達隨引米穀下透於小腸則止不吐矣 翻胃者本乎胃寒食物嘔吐胃不受納言胃口翻也多因氣先逆食酒過傷或積風寒或因憂思悒怏或因憤怒抑鬱宿滯病症積聚冷痰動擾脾胃不能消磨穀食致

欽定四庫全書 普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

方

證類乎五膈又當以嚴氏瓜菜蒌實丸治之臨證又宜詳審

絮滿痞急肌中苦痛緩急如刺不得俯仰名曰胷痞其

濡者為難治之證又有下虛之人氣上控膈令人心下

丁香附子為末於掌心舐喫亦一法也如趺陽脈緊而

胃不能以療此症如水穀並不能下方便集中一方用

夜而反至此亦甚危矣非硇砂墜氣化痰兼以剛劑暖

則氣體虛弱脾胃冷絶致成翻胃食罷即反或一日一

者為五膈治療之法當順氣化痰温脾養胃久而不治

而不降飲食不下蓋氣留於咽嗌者為五噎五膈結於胷膈

勞役驚恐無時七情傷於脾胃鬱而生痰痰與氣搏升

有不由五噎五膈而始者五噎五膈者喜怒不常憂思

附散之類皆可對證選而用之　翻胃之症其初也未

病既異醫療宜審如玉浮丸胃丹等藥及入藥靈砂丁

多因下元冷憊有終食而便吐者有食久而後翻者受

成斯疾原其所由女人得之多由血氣虛損男子得之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

胃丹 出永類鈐方
硃砂稟太陰之精不經火煅以丁附等脾藥陰煉成丹平補不僭善治真陽衰虛心火怯弱不養脾土冲和失布中州虛寒飲食不進胷膈痞塞或不食而脹滿或已食而不消痰逆惡心翻胃吐食臟氣虛寒不問男子婦人可服之米穀不化心腹時絞痛洩利不止應是一切脾胃諸疾

硃砂 揀大塊者五十兩 新羅人參 肉豆蔻 麵裹煨 縮砂仁 華澄茄 白豆蔻 紅豆蔻 高良薑 炒剉 白术 厚朴 薑汁炙炒 胡椒 益智仁 麥門冬 去心 草果 仁 橘紅 丁香 不見火 藿香葉 五味子 乾薑 各四兩炮去土 附子 四兩炮去皮臍

右各如法修製剉以銀鍋一口用白砂蜜五觔將藥一半同蜜拌勻入銀鍋以夾生絹袋盛貯硃砂懸袋入銀鍋內以桑柴火重湯煮四日四夜換蜜五觔入煎藥一半和勻再煮三日三夜取砂淘淨焙乾入乳鉢用玉鎚研直候十分細米粉為丸如菉豆大陰乾每

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

服十粒加至十五粒空心食前用人參湯下棗湯亦得如或嘔吐用淡薑湯下忌食猪羊肉

玉浮丸 永鈐方類 治男子婦人脾胃虛弱一切嘔吐及患新翻胃不問得病之由皆可服之真良方也

人參 白殭蠶 炒去絲 白朮 乾薑 炮 丁香 肉豆蔻 麵裹煨 橘紅 白豆蔻仁 麥蘗 炒 附子 炮去皮臍 木香 南星 炮 檳榔 半夏 湯炮七次 甘草 炙各等分

右為末每服用生麵一錢和勻生薑自然汁溲丸梧桐子大入百沸湯煮令浮極和丸藥用淡薑湯下不拘時病甚者不過三服惡熱藥者去附子大便秘者去肉豆蔻

奪命回生散 治五膈五噎翻胃嘔吐不進飲食 方見膈噎門膈噎類

治胃翻朝食暮吐食訖腹中刺痛此由久冷

橘皮 三兩 甘草 厚朴 茯苓 桂心 細辛 杏仁 竹皮 各二兩 檳榔 十枚 前胡 八兩 生薑 五兩 人參

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:38
列印頁數：4
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右咬咀水一斗三升煮取三升分三服一方有柑皮二兩

丁香餅　治脾胃虛寒痰逆嘔吐飲食減少十膈五噎反胃惡心並皆治之

丁香　木香　各一兩　人參　三錢　藿澄茄　三錢　白豆蔻　肉豆蔻仁　人參　丁香　縮砂　肉豆蔻　附

草　二錢

豆蔻　半夏麴　神麴　各半兩　白朮　陳皮　各一兩半　甘

右為末生薑汁煮糊作餅子棊子大每服一餅細嚼

生薑湯空心下

治胃反吐逆不消食吐不止

人參　澤瀉　桂心　茯苓　四兩　橘皮　甘草　黃

耆　各三兩　大黃　一兩半　生薑　八兩　半夏　一升　麥門冬　三升

右咬咀水一斗二升煮取三升二合一服八合日三

夜一嬴人六合已利去大黃

養胃湯　出醫方大成　治脾胃虛冷不思飲食翻胃嘔吐

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:38
列印頁數：5
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

子炮粉草炙沉香橘皮麥牙麥蘗各二錢半
右為末薑鹽湯下每服三錢

哽生散 治反胃吐食

丁香半兩半木香二錢半官桂心二分半人參神麴各二分半
草果仁二個廣茂七分半川芎七錢半訶子七個巴豆十四粒水浸一宿如泥
右除巴豆外並生用為極細末入巴豆泥和勻磁器內盛貯密封之此藥過臘月半辰時不見火方合藥以至來年夏至後方可用服每服用一銅錢半匕令病人男左女右置藥米湯調成稀糊以舌餂之少時復用細米粥湯壓之病多年可服二服病淺一服修合不見雞犬婦人忌生冷硬物油膩濕麵鹽醋等物止服白粥百日孕婦不可服

葶撥丸出危氏方 治反胃吐酸水心胸壅悶

葶撥木香乾薑炮各半兩枳殼去瓤麩炒檳榔劉碎縮砂仁訶梨勒皮煨白茯苓去黑皮人參各三錢

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服二十丸生薑湯下

安脾散 出醫方集成

治胃氣先由飲食過度或憂思蓄怒宿食痼癖積冷痰動擾脾胃不能消磨穀食致成斯疾女人得之多由血氣虛損男子得之多因下元冷憊有食罷疾吐有朝食暮吐暮食朝吐所吐酸臭味或吐黃水凡有斯疾乃是脾敗惟當速療遲則發煩渴大便秘水可飲餘悉不得入口不旋踵斃矣

高良薑 一兩 百年壁上土三合敲碎 用水二碗煮乾薄切成片

南木香 胡椒 草果 麵裹煨去殼

白茯苓 白术 丁香 懷乾

陳橘皮 湯浸去瓤

人參 各半兩 蘆

甘草 一兩 炙半

右為末每服二錢食前米飲下鹽點酒亦得甲申之春以事至臨安寓止木家橋詹翁年六十餘苦翻胃危殆已治棺在床側適余有宣司之辟往別而去時詹翁已不能言及十一月自淮上歸過其門意此翁已不存為之慘然方訪問而此翁已出迎揖見其顏色極紅潤甚驚異之問其所以乃云有一川官來歇

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

得藥數服遂無事其後得此方以之治人皆效

丁香煮散 出和濟方 治脾臟伏冷胃脘受寒胸膈痞悶心腹刺痛痰逆惡心寒噦中滿臟腑虛滑飲食減少翻胃上逆四肢逆冷但是沉寒痼冷無問久新功效不可具述 方見脾臟門脾胃虛冷水穀不化類

治反胃

前胡 生薑 各四兩 阿膠 一兩 大麻仁 五合 橘皮 三兩 桂心 三寸 甘草 五寸 大棗 十枚 吳茱萸 四合

右㕮咀水三升酒二升煮取一升七合分二服

鹽衰丸 出危氏方 治翻胃膈氣

丁香 木香 肉豆蔻 縮砂 青皮 陳皮 胡椒 薑撥 沉香 各半兩

右為末以大蒜瓣子不拘多少每瓣作二片入去殼巴豆一粒用餅藥調麵裹蒜瓣慢火煨熟取去巴豆及麵只將蒜研成膏將前項藥末一半搜和丸梧桐子大每服三十丸於鹽内滾過煎蘿蔔湯調前藥二

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

錢吞下神效

人參湯 出聖濟總錄 治胃反食下便吐

人參 澤瀉 甘草 炙 桂 去粗皮 大黃 各二兩 剉炒 陳橘皮 湯浸去白炒焙乾薑 各一兩炮 赤茯苓 四兩去黑皮 青竹茹 三兩

右㕮咀每服五錢水二盞去滓溫服日三夜一

丹砂丸 出聖濟總錄 治反胃吐食日久不止大腸結燥

丹砂 研 鉛丹 研 陳橘皮 各半兩去白炒 半夏 湯浸七次去滑炒 厚朴 去麤皮炙 麥蘗 炒 陳麵 焙 各一兩煅 皂莢 去皮子炙取半

右為末和勻糊丸梧桐子大每服二十丸空心日午臥時用溫酒下米飲亦得

藿香湯 治心虛滿飲食不入時時嘔吐抑鬱短氣或大病將理未復胃氣無以養日漸羸弱反胃

藿香 人參 桂 桔梗 木香 白术 各半兩 茯苓 半兩 枇杷葉 十片去毛 半夏 一兩湯洗用薑十製

右㕮咀每服五錢水二盞入薑皮一分煎七分去滓

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

食前服之

沉香透膈丸 出德生堂

治反胃吐食一切膈氣噎氣只三服見效如三服不見效不可治之

丁香 沉香 木香 各一兩 粉霜 半兩 硇砂 三錢 巴豆 四十九個大者去油 麝香 一錢 信二錢用錫炒去錫 硃砂 五錢

右為末酒糊丸粟米大每服十五丸病輕者七丸冷加味薑附湯治遠年近日翻胃嘔吐全不進飲食

薑湯送下

大附子 一個一兩已上者炮分四破生薑一觔取自然汁於銚內慢煮附子至乾後焙丁香 胡椒 各半兩 木香 葷澄茄 各二錢 沉香 三錢 甘草 三錢炙 乾錫糟 半觔搗作餅焙乾

右為末每服二錢燒鹽少許米湯點空心服

藿香丸 出聖濟總錄

治反胃吐逆虛氣上攻疼腹痛多吐酸水

藿香葉 木香 各一兩 半夏 二兩湯洗去滑 丁香 檳榔 各三錢 白朮 一兩劉錢 葷澄茄 各半兩 紅豆蔻 各半兩去皮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末酒煮麵糊丸梧桐子大每服二十丸橘湯無
時下
橘皮湯 出聖濟總錄
治脾虛胃反食下即吐
陳橘皮 湯洗去白焙
人參 甘草 炙劉
澤瀉 各一兩
赤茯苓 去黑皮
乾薑 炮裂
桂 去粗皮各一兩半
青竹茹 二兩
右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓温服不
拘時
通膈湯 出聖濟總錄
治反胃不下食
昆布 洗去鹹水
白朮 各一兩
丁香 檳榔 煨劉
訶梨勒皮 各三兩
木香 半夏 各洗七次炒
大黄 劉研炒半兩
右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片煎六分去滓温
服
廢食則吐或朝食夜吐名曰反胃或氣噎不飲食數年
羸消唯飲水亦同此方病源失療榮衛俱虛血氣不
足停水積飲在於胃管則臟冷臟冷而脾不磨脾不
磨則宿穀不化其氣逆而成胃反也則朝食暮吐暮

欽定四庫全書 普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

食朝吐心下牢大如盆盃往來寒熱甚者食已則吐其脈緊而弦緊則為寒弦則為虛虛寒相搏故食已則吐名為反胃也

半夏（六兩剉去皮湯洗）人參（三兩）生薑（一兩）橘皮（二兩）牛涎（一升）春杵頭糠（一升綿裹）厚朴（二兩）羚羊角（三兩）

右㕮咀木八升煮取三升分溫三服相去十里从欲頻服者可至三劑

半夏飲子　治飲食吐逆或水穀不化此為胃反

半夏（八分湯洗去滑盡）厚朴（炙）人參　白朮（各四兩）粳米（一合）橘皮（四分）京棗（七枚）生薑（七片切）

右㕮咀水二大升煎取一升去滓分溫四服空肚服

二服忌羊肉湯

安中散　治遠年近日脾疼翻胃口吐酸水寒邪之氣留於內停積不消胷膈脹滿攻刺腹脇惡心嘔逆面黃肌瘦四肢倦怠又治婦人血氣刺痛小腹連腰攻痠重痛

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:40
列印頁數：12
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

玄胡索 去皮 良薑 炒 油乾薑 炮 茴香 炒 肉桂 各五兩 牡蠣 四兩 煅 甘草 十兩 炒

右為末每服二錢熱酒調下婦人淡醋湯調不飲酒鹽湯下不拘時

吳茱萸丸 一名茱萸礬石丸 治年深腸氣翻胃飲食之物至晚皆吐悉皆生存不化腸上常有痰涎時嘔血胷中多時復冷滑或閉結 出衛生家寶方

滿口吐清水無時夜吐輒至曉日漸羸瘦腹中痛楚

吳茱萸 三兩 上炒 胡椒 人參 當歸 各半兩 劉焙 白礬 半兩燒存性 甘草 半兩 浸令透火內慢煨乾又復如此七次 半夏 一兩用生薑四兩研洗沙鑵子內薑汁并水煮候劈破看存二分白心取半夏細研為膏

右為末以半夏膏和丸如稍硬添薑汁丸梧桐子大每七丸桑柳枝各三十莖銀器內煎湯吞下日三服

忌諸毒物惟可食油煎猪腔脾軟飲一方無白礬石

半兩以鹽泥固濟之火養三日次用猛火煅通赤去火毒研令無聲

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人參厚朴湯 出聖濟總錄 治胃氣虛弱停飲相擊發為虛脹其氣逆上食已反出

人參 厚朴 去麤皮薑汁炙透熱 半夏 湯洗去滑薑汁製炒 桂 各二兩去粗皮 陳橘皮 去白炒 甘草 炙 白朮 各一兩

右㕮咀分作十貼每貼水二盞生薑半分拍破用煎取一盞去滓空心頓服

鉛丹丸 出聖濟總錄 治久積痰壅胃反嘔逆不下食

鉛丹 半夏 各一兩湯洗去滑七遍 山芋 人參 各三錢 乾薑 陳橘皮 各半兩湯洗去白焙 甘草 一錢炙

右為末研勻湯浸蒸餅丸梧桐子大每服二十丸人參桂湯 出聖濟總錄 治胃嘔吐不止妨於飲食

人參 桂 去麤皮 澤瀉 甘草 各三兩炙劉 陳橘皮 湯浸去白焙 麥門冬 各二兩去心焙 半夏 一兩湯洗滑薑汁製炒

右㕮咀每服五錢生薑一棗大拍破水一盞半煎八分去滓溫服不拘時日三五服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治胃反朝食暮吐食訖胷腹中刺痛此由火冷

橘皮 三兩 白术 人參 各二兩 蜀椒 二百二十粒 桂心 一兩 韭白 一把

右㕮咀水二升浸一宿内羊肚中縫合以三升水煮水盡出之決破去滓分三服

附子丁香散 出良方 治翻胃惡心吐逆臟洩瀉等病

白术 半兩 甘草 三錢 附子 一兩炮 乾薑 半兩炮 丁香 半兩 肉豆蔻 半兩 柿蒂 一兩 生薑 半兩 陳皮 半兩去毛

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片煎六分空心温服

茯苓散 出聖濟總錄 治胃反吐逆發渴飲水

赤茯苓 二兩去黑皮 澤瀉 乾薑 各一兩炮 白术 桂 去麤皮 甘草 各半兩炙

右㕮咀每服五錢水一盞半去滓空心服頻呷日三

治反胃吐食 出聖濟總錄

人參 虎掌 各三兩 附子 一枚炮製去皮臍 枳殼 去瓤麩炒 厚朴 去麤皮生薑汁炙 枇杷葉 各半兩炙去毛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右呅咀令勻每服五錢水一盞半入生薑半分切煎
七分去滓温服
肉豆蔻飲出聖濟總錄
治反胃飲食入口即吐
肉豆蔻炮去殼四枚 高良薑 白芷 人參 赤茯苓去黑皮 檳榔各一兩半剉
右呅咀每服三錢水一盞半韭白三寸切煎至一盞去滓空腹温服如人行五里再服
厚朴飲出聖濟總錄
治胃反雨脇妨脹食不消化
厚朴去粗皮薑汁炙 生薑各半兩切焙 檳榔三枚剉 肉豆蔻一兩去殼 陳橘皮一兩泡去白 吳茱萸三錢焙炒 炮
右呅咀每服三錢水一盞去滓空腹温服如行人五里再服
治胃反為病朝食暮吐心下堅如盃升往來寒熱吐逆不下食此為關上寒邪所作將成肺癆治之一名華陀方
珍珠雄黃丹砂各三兩 朴硝五兩 乾薑十兩

欽定四庫全書 普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末蜜丸梧桐子大先食服三十丸若小煩者飲水即解下無所忌一方用桂心一兩

大半夏湯 出十便良方 治胃反不受食食已即嘔吐

半夏三升 白蜜 白朮各一升 人參二兩 生薑三兩

右�once咀水五升和蜜揚之二三百下煮取一升半分三服一方無白朮

化鐵丸 治結腸翻胃兼治蠱脹緊急如皷妨悶氣促不能坐臥飲食頓減手足乾瘦累治不效者服之即

差

五靈脂 去砂石 陳皮 不去白真者 青皮 各一兩並不去白 陳秣 一合 去糠作糯米 巴豆 七十五粒去膜

右為末先炒五靈脂透次下青皮候色變又下陳皮變色却下秣米同巴豆炒須要秣米黃色取出以紙攤在地上出火毒去巴豆不用只用三五粒亦可為末用好米泔浸蒸餅丸綠豆大每服十五丸至二十丸葱湯或茶湯下婦人醋湯下艾湯亦可

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丁香飲　治翻胃嘔逆

丁香　各四個
石蓮肉　十枚
北棗　七個切碎
生薑　七片
黃秫米　一合

右將水碗半煮稀粥去藥食粥

丁香散　出衛生寶鑑

治翻胃吐食水不能停

黑錫　一錢半　名黑鉛
舶上硫黃　五錢
官桂　一錢
水銀　一錢半　二件一處於慢火上焙炒研為細末

右為末用小米湯調三錢再用生薑自然汁三錢調和一處空心服之

木香湯　出聖濟總錄

治反胃不下食

木香　半兩　剉
高良薑　一錢　剉炒
蓬莪茂　二兩　炮
甘草　一兩　炙
胡椒　一錢

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓食前温服

橘皮飲　出聖濟總錄

治翻胃噦逆膈脘妨脹不下食

陳橘皮　一兩湯泡去白
訶梨勒　煨去核
乾木瓜　去瓤切焙
薏苡仁
木香　各一兩半

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑五片煎一盞去滓

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:42
列印頁數：18
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

空心溫服如人行五里再服

半夏飲　治反胃不食食即吐逆羸瘦少力

半夏　二兩湯洗七次去滑焙　厚朴　一兩半去粗皮薑汁炙　糯米　兩合　陳橘皮　一兩湯洗去白焙　生薑　一兩半切焙

右㕮咀每服三錢棗二枚劈破水一盞半煎一盞去滓空腹溫服如人行五里再服

桂苓散　治翻胃發渴

半夏　四錢　桂心　甘草　各三錢　赤茯苓　四兩　澤瀉　四兩

右㕮咀每服四錢生薑煎服

木香豆蔻散

人參　木香　肉豆蔻　各半兩　麵裹煨　白豆蔻　一錢　甘草　一錢　半炒

右㕮咀每服三錢薑棗煎服

治翻胃

人參　茯苓　棗肉　茴香　各二兩為末　平胃散　半劑

右用大蒜大者二個用煮酒浸煮搗爛入藥將餘酒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

糕糊為丸陳米湯下三十丸

治翻胃無問遠近冷熱水米入口不得者悉宜服之李

直方舍人任韶州刺史因患反胃餌藥無效有賣薪

人傳此立效

右以雞子白及薤白米粥等三味熱調攪勻然後入

人參湯相和更調攪頓服之不限早晚服無忌當時

便定准前方服藥百不失一如思飲食即與粟米粥

飲漸漸加粳米和之

平氣丸　治胷中痞悶氣不下行飲食不化翻胃吐食

由胃氣滯而不轉胃中為濁氣逆行則吐

右為末飯為丸每服五七丸薑湯下

粉霜砂　治脾疼翻胃

霜砂 一兩二味炒 丁香 各四十

人參 去蘆一兩細切以水一大升煎取汁 薤白 二莖 雞子 三個去黃 熱稀粟米粥 一大合

烏梅 一個 巴豆 二粒去油 丁香 三粒 砂仁 四粒

霜砂 一兩 蛀粉 一兩二味炒畧變色研細 丁香 胡椒 各四十九粒

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:43
列印頁數：20
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末薑自然汁煮半夏糊丸梧桐子大每服三十丸翻胃生薑湯吞虛人脾痛炒鹽湯下煨薑尤佳

入藥靈砂　治翻胃嘔吐飲食不下

靈砂末一兩　丁香末　胡椒末　木香末各半錢

右和勻煮棗圈肉杵和為丸如菉豆大每服五十粒生薑米飲送下不拘時

火食丸　治脾虛弱不進飲食翻胃不食

陳米食炒一升黃土炒米熱之不用　白豆蔻仁一兩　丁香一兩縮砂仁二兩

右為丸用生薑自然汁法丸如桐子大每服百丸食後淡薑湯下

平胃散　治惡心翻胃方見脾臟門兼理脾胃類

生薑散　治胃反吐逆不止心膈不利飲食減少

生薑三兩切焙　蓬莪茂劉炒　陳橘皮湯浸去白炒　甘草各二兩劉炒

右為末每服一錢入鹽少許沸湯點服

半夏丸　治胃嘔逆不下食

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏 湯浸焙 各一兩 伏龍肝 各三兩 白礬 煅令汁枯 各一兩 鉛丹 各三兩研

右為末生薑汁煮麪糊丸梧桐子大每服二十丸至三十丸

紅豆丸 治諸嘔逆膈氣翻胃吐食不止

丁香 胡椒 縮砂 各二十一枚 紅豆 十一枚

右為末生薑汁為丸如皂角子每服一丸棗一枚去核填藥麪裹慢火燒熟細嚼白湯下空心日進三服

參橘湯 治翻胃

人參 真橘紅 石蓮肉 各半兩 透明乳香 一錢半

右為末每一錢薑湯點服

朴附丸 治虛寒相搏翻胃吐食中焦氣痞

厚朴 去粗皮劉 附子 各去臍劉 各一兩炮 生薑 八兩取自然汁

右為二味薑汁煮乾為度焙乾為末酒煮翻糊為丸梧桐子大米飲下三十丸食前一方用銀石器內慢火熬薑汁盡為度

千轉丹 治反胃吐食等病

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

牛涎 觔半
好蜜 觔半
木鼈子 三十個 去油皮
右為末牛涎蜜一處於銀器內用慢火熬用槐條匕攪煨乾為度每和白粥兩匙日進三服

通胃散 出經驗良方
治結腸翻胃

肉豆蔻 雞心檳榔 各一枚
胡椒 四十九粒
右為末每服半錢以無灰酒枳殼末少許調下空心服稀粥壓

治翻胃吐逆

藿香葉 去土 各半兩
香附子 去毛 二錢
橘皮 二錢
右為末每服二錢薑三片水一盞煎六分服

治翻胃吐食暑氣煩躁不食小兒嘔吐洩瀉黃色殺疳蟲進食

平胃散 一兩
硫黃 硝石 各半兩
右薑汁煮令乾為末同平胃散酒煮糊為丸桐子大每服二十丸米飲下

六丁丸 出危氏方
治翻胃如神

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:44
列印頁數：23
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五靈脂 五錢 生辰砂 二錢 母丁香 一兩 不見火

右為末入黃狗膽粽子尖丸鷄頭大薑米湯飲下每服一丸三十年病三兩丸止本事方香靈丸只用丁香分兩不同母丁香即丁香也沈存中筆談言之甚詳

治翻胃吐食

孤科蒼耳 生牡蠣 透骨草 各等分

右㕮咀每服三錢水一盞半煎七分去滓温服即用

菓壓之

木香湯 一名定胃散

治翻胃不飲食開胃和氣 出十便良方

木香 一分 剉 胡椒 三十粒 糯米 一撮

右同炒至米熟㕮咀分作五服每服用水一盞煎六

分去滓温服席戎年乳媪病得此方而愈

石亭脂丸 治年久胃反不止

石亭脂 紫貝鉛 各二兩 鹽滷 五兩

右旋燒鉛煎滷中汁滓盡將鉛與石亭脂攪勻炒之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

或焰起即將銚子放水上焰止候勻熟水浸炊餅丸成如梧桐子大每服二十丸煎石蓮乾棗乾柿乾薑湯下

礬石丸 出聖濟總錄 治胃虛氣逆食已反出

白礬 鉛丹 各二兩 石亭脂 半兩生為末後入

右先將前二味和研入乾鍋内以炭半秤漸煅令通亦為度駐少更養一夜取出細研出毒兩日乃入石亭脂同研細以粟米飯和丸如菉豆大每服米湯下

十五丸

欽定四庫全書

田季散 出聖濟總錄 治久患翻胃及小兒驚吐諸吐逆蘇内

硫黃 半兩細研 水銀 一分與硫黃再煎無星 生薑 四兩取汁

翰言如神

右同研如黑煤色每服三錢酒一盞同薑汁煎熟調藥空心服衣被蓋覆當自足指間汗出迤邐遍身汗徹即差常有人病反胃經三年不差消羸殆盡服藥一服汗出皆如膠腥穢不可近當日更不復吐遂差乂

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

小兒諸吐用此藥量兒長少服一錢以約至一匙用冷水調下吐立定此散極乳難調須先滴水以指緩緩研殺稍稍增湯使令調和若傾入湯酒盡服泛不可服又烏頭煮散茱萸散皆治反胃惟田季散有陰陽理勝於二方今全載二方於後但性差熱更時量腑臟寒温用之可

茱萸散 出聖濟總錄 治胃氣虚冷不能飲食食已即吐酸水

吳茱萸 湯洗七次炒乾 乾薑 炮製

烏頭散 出聖濟總錄 治年深腦氣翻胃常有痰涎時時嘔吐胷中多酸水吐清水無時腹中痛楚或時秘結或時冷滑此藥主之

川烏頭 炮去皮臍 各一兩半 檳榔 木香 各一兩

右為末每服二錢水一盞煎至七分入鹽一分温服有一婦人年深翻胃服此效

覆粟粥法 治翻胃不下食

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白覆粟米二合人參二錢生山芋大長五寸右為細切研水一升二合煮取六合入生薑汁及鹽花少許攪勻分二服不計早晚食之亦不妨別湯丸

大半夏湯出肘後方治胃反嘔吐者亦治膈間痰飲半夏二升洗去滑右以水一斗二升和蜜搗之二百四十遍煮藥升半温服一升餘分再服

治胃反食即吐出上氣

蘆根茅根各二兩右以水四升煮取二升頓服之得下良

交和散治遠年近日翻胃嘔吐全不進食

嘉和散五膈寬中散右用見成局方二藥合而為一和勻每服三錢薑棗煎治丈夫婦人老少遠年日近翻胃吐食出本事方

五靈脂不拘多少為末黄狗膽汁右丸如龍眼大每服一丸好酒半盞頓湯瓶頭温磨

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:45
列印頁數：27
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

開服不止再服不過三服即效

治翻胃吐食出本事方

白礬二兩 黃丹一兩

右為末入瓦罐內煅令如蒸餅虛空取出以淨絹承於地上盆蓋一宿出火毒再為末用蒸餅丸菉豆大每服三丸至七丸空心溫酒下更量老少虛實與之治逆不食及翻胃

母丁香 神麴炒合等分

甘露湯出瀕湖方治翻胃嘔吐不止飲食減少常服快利膈膈調養脾胃快進飲食常傳一富人病翻胃往京口甘露寺設水陸泊舟岸下夢一僧持湯一杯與之飲罷記其香味便覺膈膈少快早入寺知客供湯乃是夢中所飲者膈膈尤快遂求其方修製數十服後疾遂瘥名曰觀音應夢散一友得之常以待賓易名曰甘露湯在臨汀療一小吏旋愈切勿忽之

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:45
列印頁數：28
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾鍚糟 六分醉者 頭 四分和皮 生薑

右拌和研爛作餅子或焙或曬乾每十兩用甘草二兩炙同研為末每服入鹽少許沸湯調無時

大效散 出百一選方 治翻胃

大田螺殼 黃蜆殼 二件不以多少在泥土中多年陳者尤佳各處焙成白灰

右每劑用白梅肉四兩田螺蜆殼灰二兩同搜拌令勻作團用砂合子盛蓋了泥固封發頂火煅令焦黑存性取出碾細每服二錢用人參縮砂湯調下陳米亦得如無合子只用連盞兩隻相合依前法燒食前服凡覺心腹疼痛即翻胃先兆此亦能治之

治翻胃吐食

大雪梨 一個 丁香 十粒 半

右將丁香刺入梨內用濕紙裹包四五重炭火煨熟

熱服

鎮脾散 出聖濟總錄

京三稜 一兩半炮 丁香 三分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末每服一盞淺沸湯點服不拘時

雌黃丸 出聖濟總錄 治反胃嘔吐不止飲食不下

雌黃 一分研 甘草 半分生

右為末爛飯為丸梧桐子大用五葉草糯米同煎湯下四丸

小半夏丸 出百一選方 治翻胃不快飲食

半夏 湯洗十次 胡椒 各等分

右為末薑汁丸梧桐子大每服三五十丸薑湯下

正胃散

半夏 二兩 天南星 二兩

右為末用水五升入鐺內與藥攪勻浸一宿去清水焙乾重研令細每服水二盞藥末二錢薑三片煎至八分溫服至五服效

加味清金丹 出南方指 治清濁不分中焦氣痞若心下大如緊弦則為虛緊則為寒虛寒相搏此名為格與關格

孟或時寒或時熱朝食朝吐暮食暮吐其關脈弦而

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:46
列印頁數：30
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

同也是謂反胃

硫黃 水銀 各等分

右各研細不見星子為度入木香末丁香末各等分用生薑自然汁煮糊丸梧桐子大每服十丸食前米

欽定四庫全書

普濟方

蓮子散 出指方直 治翻胃

湯下

右為末米湯乘熱調服二方寸匕患痢噤口通用

治翻胃時吐水及吐食

大黃 四兩 甘草 二兩炙

右�once咀水三升煮取一升去滓分温再服如得可則

兩日更服一劑

健胃丁香散 出生德堂 治反食嘔吐氣噎膈格不通

廣木香 淨全丁香 各一兩

右�once咀每服四錢水一盞半煎一盞時先用好黃土和泥作成碗樣一個却以藥濾去滓於土碗内食前服滓依時再煎服此方有一掾吳安之得傳於内壹

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蓋耘夫都事自得之效本堂試果驗蓋用土碗盛藥取其有生助脾土之功

丁香附子散 一名大掌中金出永類鈐方 治反胃不納飲食服水並不得者

大附子 一個緊實者切去上頂用一小片留作蓋勿碎將下竅一竅丁香四十九粒

右將丁香安附子竅内以小籤蓋之用線絆縛置砂銚内用生薑汁浸過附子為則慢火熬至乾取附子丁香為末和勻每調少許在掌内舌舐而喫日十數次忌毒物生冷一方以生薑入丁香如前製一方以乾薑鑽穴入丁香尤易作末倉卒嘔甚者可用若煩渴則徐食糜粥宋淳熙元年冬樞姪自瀋陽往四明過婺源義烏有野服者邑醫孫道攻療眼疾密與之語孫曰君貴家子料必藏好方畀我一二或以為人起疾密索秘反胃方即以受之孫喜書之於册未幾源鈐轄苦此疾危孫為亟治用此方數服愈一方麵裹煨末米飲下不過膈者薑汁蘸嚼

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:47
列印頁數：32
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治胃反食即吐出肘後方
用粟米搗作麵和丸梔子大七枚爛煮内火中細細
添之得下便已麵亦得用之
白梅丸　治反胃
用生硫黄將白梅研成膏丸梧桐子大每服二十丸
米飲下
治反胃見食即嘔噦出聖惠方
羊糞
去滓分三服
用乾濕共七枚乾者碎之以童便一大盞煎至六分
治胃反食即吐出上氣
用燒自死鷄肫胵灰服男雄女雌
香牛飲出危氏方治哽噎翻胃吐食
用羯牛先以繩掛開口將淨布抹令口舌却拖牛舌
出來後有涎出以碗乘之每服用八分盞為一服研
好麝香末一捻打勻却以銀盞盪令温先以絹帛束

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:47
列印頁數：33
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

縛中脘胃口令極緊候氣喘一二口便服藥時先對病人說煮白粥溜慎之并煎丁香汁和粥服藥罷隨與粥喫一方老牛涎沫如棗核大置水服之終身不噎

丁附散 出瀋療方 治冷吐翻胃及喫食移時即吐緣水不勝火復還脾脾不能受即吐

附子 一大個煮週回鑽孔用丁香插入孔内以麵裹煨熟去麵不用

右以附子丁香為末用猪臀肉切片炙熟蘸藥末嚼下空心頓服十數片用薑汁鹽湯漸下一方不用丁香用粟米一捻北棗二個煎湯調服

又方 一名丁附奪命散 治證同前如七情内鬱者宜蘇合香丸寬中散

附子 一個 生薑 自然汁兩分三處

用附子不去皮臍破作兩片以薑汁二兩煮候乾又破四片以薑汁二兩煮乾又破作八片用薑汁二兩煮細切焙乾入丁香二錢半同為末每服一錢以湯

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:47
列印頁數：34
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

調服

治翻胃 出儒門事親

用黃蘗末

鯽魚散 出本事方 治翻胃

用大鯽魚一個去腸留膽綠礬末填滿縫口以火炭炙令黃乾為末每服一錢陳米飲調下日三服

大黃湯 出本事方 治冷涎翻胃其候於發時先流冷涎次則不食此是勞證治之不早死在旦夕

欽定四庫全書

用大黃一兩生薑自然汁半茶盞炙大黃令乾又淬入生薑汁中如此淬盡切焙為末每服二錢陳米一撮葱白二莖水一大盞煎七分先食葱白次服其藥

普濟方

螺泥丸 出經驗良方 治翻胃嘔噎不十日根絶

用田螺不拘多少洗淨磁盆水養令吐出泥用米篩張灰於地上却將沙皮紙鋪於灰上去已養田螺令泥水漸澄清旋去上面清水却將泥傾於紙上候泥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾調丸梧桐子大每服三十丸藿香湯下立愈仍將
田螺放江中如殺食之其病不安一方用爛殼燒為
末服之
治反胃朝食暮吐暮食朝吐旋即吐者出危氏方
用甘蔗汁七升生薑汁一升相和打如粉分作三服
正胃散　治翻胃嘔吐藥食俱不下結腸三五日至七
八日大便不通如此者必死之疾昔全州大智禪師
得方於異人服之十全八九

用偶有白水牛喉收取一條去兩頭節并筋膜脂肉
又取下如阿膠黑片不可用須就宰牛人買下修事
了臨病時旋炙條合用好米醋一大盞浸頻翻動浸
冷用微火炙乾淬醋炙再炙再淬醋乾為末不見太
陽火研為細末用厚紙包收或遇陰濕時月連紙包
於微火上温焙之再收如有此疾每服一錢食前陳
米飲調下輕者一服立效切不可專意殺牛取喉決
不效非惟無益於病者且徒然有害於物且受殺牛

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:48
列印頁數：36
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

之報收方君子見藥須收以濟人病

治翻胃

用木槿花煮糯米粥服之

又方 出百一選方

用松節剉碎酒煎服之

又方 出百一選方

用灶中土十餘年者為細末米飲調下三二錢 經驗方并

用炭灰

欽定四庫全書

又方

用乾大米殼煎汁服之

又方

用田上細葉紫背草杜烏藥烏泡心羊右棘心酒煎

服之

又方 出朱氏集驗方

用驢小便昔有患此疾每服食餅及羹粥等項須臾

吐出貞觀中許奉御兄弟柴蔣等家時稱名醫奉勑

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

令治鑿竭其術所患竟不能療漸至羸憊死絶候在朝夕忽有一衛士云服驢小便即日服二合後食唯吐一半脯又服二合人定時食粥吐即便定近至今日午時奏知之大内中五六人患翻胃同服一時俱差此藥有毒服時不可過多盛取尿及熱服二合病深七日以來服之良後來療人並愈又一方用馬莧汁飲之

又方 出經效濟世方

用家鷄兒一個口中入硫黄令滿以新磁礶合盛用黄泥固臍火煅令存性碾為末用冷熱水調服

又方 出俾信通驗方

用生薑如錢大麻油煎過為末用軟柿蘸服

又方

用早禾藁燒灰淋汁帶温服之令吐蓋胃中有蟲灰能殺之

治翻胃及脾間諸疾腹痛洩瀉 出百一選方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用皺面地葱花即火枚草花也不拘多少焙乾為末

蜜麵糊丸梧桐子大每服五十丸白湯送下不拘時

服

鉛丹丸　治胃反嘔吐噦逆

用黑鉛汁入紙灰以柳木槌同研成粉羅過一兩米醋一升同入砂石器內熬為膏入乾蒸餅少許搗令熟丸赤小豆大每服十丸生薑湯下或米飲下不拘時服

太倉散　治胃反及膈氣不下

用倉米或白米遇日西時於日下水微拌濕自心中想日氣如在米中便只日中曬乾紙袋盛掛通風處每服水煎一撮和汁飲之即時便下一方陳倉米炊飯焙乾為末五兩沉香末半兩令勻米飲調下

礬石丸　出聖濟總錄　治胃虛脹其氣上逆食已反出用白礬三兩燒令汁盡研細麵餅丸梧桐子大每服空心服十五丸米飲下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治反胃心胷間痰飲生出危氏方
用老蚌含珠殼為粉米飲下一方炒為末每服二錢
薑汁米飲調下
治翻胃吐食上氣及羸弱不欲動
用白芥子日乾為末酒服方寸匕一方小芥子
治翻胃羸弱不欲動
用老薑爛搗絞取汁作撥粥服作時如葛粉粥法
治胃反逆
效
治轉食
用淘鶴毛皮燒灰酒服
橘皮湯直指方
治反胃苦嘔吐
用真橘皮以日照西方壁土炒香取橘皮為末每服
二錢薑棗略煎服
温胃散仁齋直指方
治从冷翻胃
用蝟皮燒灰酒調又可煮汁服又可五味淹炙食良

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用附子一個生去皮臍分作四塊生薑半觔水一大碗慢火煮至水盡取附子切焙為末每服一錢空心温米飲調下一方大附子一枚生薑一觔細剉煮爛研如麵糊飲下

治胃反朝食夜吐夜食朝吐食羊生法

用羊肉去脂膜作成羹以蒜韭空腹任意多少食之一方加好醯醋同食之

治翻胃吐食

用銀鍋内煮銀烏梅滓焙乾倉米炒等分為末酒調

服

又方

用蘿蔔搥碎蜜煎細細嚼嚥

治魚肉傷翻胃 經效濟世方

用生薑四兩右面作二十穴安胡椒二十粒左面作二十穴安丁香二十粒再用紙三重包裹再去紙右面安班猫十四粒左面安巴豆十四粒再用紙三重

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:49
列印頁數：41
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

襄水浸濕文武火煨熟取出去巴豆與班猫安地上俟出火毒氣令冷將生薑薄切同丁香胡椒焙乾為末每服用沸湯點服不拘時服

乾食方 出危氏方 治翻胃

用乾餅乾飯餅餌盡去美飲水漿水藥不用丸自不反動調理旬日奇效有人三世死於胃反至孫收效此方

赤石脂丸 出聖惠方 治反胃病吐後令永差

用赤石脂一個好臘無砂者搗羅研以蜜和丸梧桐子大每日空心以生薑湯下十丸加至二十丸一云水飛丸如菉豆大令乾以布揩以生卜薑冷光淨空腹津吞十丸却先以巴豆一枚去皮勿令破津吞之治反胃吐逆 出聖惠方

後服藥

用硫黃白礬各一兩二味於銚子内煉過入硃砂一分同研令如麵更以麵糊和丸如小豆大不計時候

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以生薑湯下五丸

白豆蔻散 聖惠方

治反胃胷膈不利食即嘔吐

白豆蔻去皮半兩 枇杷葉拭去毛一錢炙微黃 訶梨勒皮三錢 前胡一兩去蘆頭 人參三錢去蘆頭 檳榔一兩 白朮三錢 陳橘皮三錢湯浸去白瓤焙

右㕮咀每服三錢水一鍾入生薑半分煎至六分去滓不拘時候温服

大腹皮散 聖惠方

治反胃嘔噦全不進食

大腹皮厚朴去粗皮以生薑汁炙令香熟 人參去蘆 白朮 陳橘皮湯浸去白瓤焙 半夏各一兩湯浸七次去滑 桂心三錢 甘草炙微赤剉

右㕮咀每服三錢水一盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

麥門冬散 聖惠方

治反胃嘔噦吐食煩熱

麥門冬去心半夏各半兩湯洗七次去滑 白茯苓三錢 陳橘皮三錢湯洗去白刮瓤 甘草炙微赤剉 枇杷葉各一錢刷去毛炙微黃 人參三錢去蘆

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:50
列印頁數：43
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

頭

右㕮咀每服三錢以水一盞入生薑半分棗一枚煎六分去滓不拘時候服

人參蝟皮丸 聖惠方

治反胃嘔噦不下食

蝟皮 炙令燋黃

人參 去蘆頭

白茯苓 生乾地黃 厚朴 去粗皮塗生薑汁炙令香熟 甘草 各一兩炙微赤剉

薑湯下二十丸

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大不拘時候以温生

枇杷葉散 聖惠方

治反胃嘔噦不止胷膈悶

枇杷葉 拭去毛炙微黃

前胡 去蘆頭

檳榔 陳橘皮 各一兩湯洗去白瓤焙

桂心 半兩

人參 三兩去蘆頭

右㕮咀每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候温服

枳實散 聖惠方

治反胃嘔噦吐食及噎悶

枳實 半兩麩炒微黃

人參 三兩去蘆頭

陳橘皮 三兩浸去白瓤焙

吳茱萸 一錢湯洗七次焙微乾

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:50
列印頁數：44
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右咬咀每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

半夏散 聖惠方

治反胃吐食嘔噦渴欲飲水

半夏 浸七遍去滑 白茯苓 澤瀉 各一兩 桂心 半兩 甘草 半兩

右咬咀每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓不拘時温服

麥門冬 二兩去心 炙微赤劉

右咬咀每服三錢水一中盞煎五分入牛乳半合不拘時候温服

肉豆蔻散 聖惠方

治反胃嘔噦吐食

肉豆蔻 半兩去殼 胡椒 華撥 各一兩 甘草 三錢炙微黃劉

欽定四庫全書

普濟方

白礬丸 聖惠方

治臟腑久積虛冷反胃嘔噦

白礬 黃丹 各二兩 硫黃 一兩

右先將白礬黃丹入於乾鍋内以炭火半秤燒通赤任火自消取出於濕地出火毒兩日入硫黃同研為末以粟米飯和丸如菉豆大不拘時以粥飲下二十

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

丸

丁香散出聖惠方治反胃嘔噦不止

丁香一兩拭去 人參二兩去蘆頭 枇杷葉一兩拭去毛炙微黃

右㕮咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候温服

又方出聖惠方

乾棗葉一兩 藿香半兩 丁香一錢

右㕮咀每服二錢水一小盞入生薑半分煎至六分即去生薑不計時候和滓熱服

欽定四庫全書 普濟方

治反胃嘔噦吐食數日不食出聖惠方

胡椒三分末 生薑一兩煨切微

右㕮咀以水二大盞煎取一盞去滓分温三服

治患痼冷反胃嘔噦不下食出聖惠方

附子三兩炮製去皮臍 生薑汁二升半

右切附子如豆許大入薑汁中煎令汁盡更入蜜一合搗一千杵丸如梧桐子大不計時候生薑湯下二

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

十丸漸加至三十丸

治反胃病吐後補 出聖惠方

白朮 五兩杵羅末 生薑 五觔取自然汁五升入酒一升白蜜二合酥二兩

右以汁下白朮以慢火煎去半入白蜜酥更煎和如稀錫瀉於銀器內令凝定每日空心以清酒調下半匙服之一月百病除愈

導引法 出危氏方 治翻胃除腹痛肚冷風宿疾積胃口冷食欲進還吐逆不下

正坐兩手向後捉腕反拓床盡勢使腹胘胘上下七左右換手亦然

治翻胃椒附丸 余居士選奇方

胡椒 白薑 茴香 川附等分 巴豆 四十九粒

右以巴豆去殼同炒去巴豆為細末每服半錢米飲

調下

藥 靈砂丹 出如宜方 治翻胃臟寒停飲後吐

靈砂 一兩 丁香 木香 胡椒 各半錢

右為末棗肉杵丸如菉豆大每服六十丸薑湯下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

清膈散 出家寶方衛生 治熱翻胃吐食

蟬退 五十個去盡土用 滑石 一兩

右為末水半盞調藥一盞去水用蜜一匙調下不拘時候服

黃附丸 出家寶方衛生 治翻胃嘔吐

附子 炮去皮臍尖

右為末糊丸如梧桐子大以大黃為衣每服十丸溫水下

欽定四庫全書

竹葉湯 出家寶方衛生 治熱吐翻胃及傷寒遍身發熱冷吐亦宜服之

竹葉 半斛 白茯苓 一兩劉 真珠小半夏 一兩洗 生薑 四兩切

右以水十碗煎一碗去滓俟溫不計時候服每服一盞連服亦可

硫黃丸 出家寶方衛生 治膈氣翻胃不進飲食

醋衣 半兩乾者 陳丁香 木香 半兩 石蒿蒲 半兩 青皮 半兩去白

硫黃 半兩研

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末酒糊丸彈子大每服一丸細嚼米飲下後用煨鯽魚米醋蘸食之次以油餅壓下

黑白附子丸 出衛生家寶方 治翻胃

白附子 黑附子 炮去皮 白朮 白茯苓

少時便喫粥一小碗即吐吐止可服補胃藥隨老少服三十丸用麻油於手心內磨動次滴水和油吞下

右各等分為末麵糊為丸如梧桐子大蚌粉為衣每疾加法在後烏頭減半更妙

厚朴丸 保生集方 治反胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸

神效

厚朴 二兩半 黃連 二兩半 紫苑 去上苗 吳茱萸 湯洗十次 葛蒲 去皮脘炙 柴胡 去苗 桔梗 皂角 去皮脘子炙 茯苓 去皮 官桂 刮乾 薑 已上各二兩炮 人參 二兩 巴豆霜 一兩 蜀椒 去目及閉口者微炒出汗 二兩

每服三丸漸次加至以利為度生薑湯下食後臨臥

右為細末入巴豆霜勻煉蜜和勻為劑旋丸桐子大

川烏頭 二兩半炮製去皮臍

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

此藥治療與局方中温白丸同及治處暑以後秋冬間臟腑下利大效春夏再加黄連二兩秋冬再加厚朴二兩計四兩

朴

治風癇病不能愈者服厚朴丸依春秋加添外又於每料中加人參葛蒲茯苓去皮各一兩半右依前法和劑服餌

治反胃又大便不通者是腸勝胃也服局方中半硫丸一二百丸如大便秘用後藥保命集方

附子半兩巴豆二枚砒豆許

右為極細末生薑糊為丸如菉豆大每服一丸白湯下

薑桂湯朱氏集驗方

治翻胃嘔吐不止

白薑炮　紅豆肉桂丁香粉草縮砂仁炒　敗薑用灶心土炒

右各半兩為細末每服一錢生薑自然汁一分沸湯調下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治翻胃嘔吐良方 朱氏集驗方
山櫻葉 不以多少炮黃用
黑小豆 炒香
田螺殼 火煅
右為末或酒或熱水調二三盞服之立止

水煮平胃散 朱氏集驗方
蒼术 厚朴 製 陳皮 甘草 四味各十兩
粟肉 半觔除核秤
生薑 二十兩切片子
粟米 一升洗以上是古本以下是加品
白术 茯苓
茴香 各二兩
右以上藥作一處用文武火煮水約過藥三寸煮乾

水為度火焙為末每服一錢空心鹽湯服

安胃散 出南方指
治胃反嘔

五靈脂 杏核大以醋和麪裹燒令香熟去麪
白茯苓 一枚杏大
丁香 三粒
硃砂 五分
人參 木香 各一分
右為細末每服半錢茶清調下

大白散 出南方指
治胃反嘔

大天南星 炮
右為末散每服三錢水三盞生薑三片粟米一撮煎

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:53
列印頁數：51
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

至一盞去滓温服

玉蔬丸 方雞岑 治胃虚因吐生風

白丸子 金液丹 各十五丸

右為細末煮麵糊丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

胡椒湯 十良方便 治寒氣攻胃效驗方

胡椒 三十顆 麝香 一錢細研

右搗破胡椒入麝香用酒一中盞煎至半盞稍熱服

又方 治翻胃嘔吐多因中脘停留寒痰冷飲凝滯而食入即吐

右用薑附丁香之類煎湯吞下養正丹并來復丹或用靈砂丹來復丹末以半夏末打糊為細丸服之尤妙其效甚驗

膈氣變翻胃用剪紅丸令吐淤血及蟲而食愈真方并附 永類鈐方

雄黄 半兩 木香 半兩 檳榔 三稜 莪术 煨 陳皮 貫

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

鈐方

衆各一兩去毛 大黃春三兩秋冬月一兩乾添一兩炒煙起

以上九味作末糊丸壯士可五十丸

又方

芫花一兩醋煮 巴豆二十一去油 甘遂一兩

右為末糊丸梧桐子大候乾用紅羅包之絹線扎繫剪十段斷一服前藥內加用一粒萬病轉湯使五更初服療疾醋炙肉嚥婦人醋湯名秦川剪紅丸氣膈服好蘇合香作丸原嚥薑汁少許喉中爆聲而愈

翻胃始因膈噎所成有痰毋蟲瘕非好手不能治用

永類

普濟方

附子片一兩 南星片一兩 巴豆二十一粒去皮

右用糯米一兩同炒色變去巴豆入乾薑丁香末各半兩同煎作末五更早掌中舌醮乾乾喫半錢津化仍以陳皮湯一呷送下又蘇合香丸青州白元打和同生薑合元服有翻胃噎塞煩悶諸藥不效蘆根煎湯下枳殼湯下又真阿魏末少加外野人拋下乾糞多

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
内文: 子部,醫家類,普濟方,卷三十六
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

作末五更初薑片蘸食能起死人趙玉田傳乂翻胃吐黑汁治不食趙用華澄茄末米翻丸薑湯下而愈再令服平胃散三貼及薑汁調白虎丹治翻胃如神白虎丹化摋大蒜丸

生料健脾丸 濟察方治嘔吐反胃脾瀉白利腸滑冷痢一切脾胃疾

厚朴 二兩半去粗皮生剉 半夏 生白豆蔻仁 草果仁 甘草 縮砂仁 各二兩

欽定四庫全書

右㕮咀用生薑一觔四兩細切摋碎滓汁並用同藥一處搜和令勻丸成一鷄子黃大日乾每服一丸水一盞半煎至七分去滓温温食前服

附子五苓散 朱氏集驗方治翻胃吐食

大附子 一隻取空入五苓散在内炮熟

右為細末用薑湯下

十膈散 朱氏集驗方治翻胃嘔吐

老薑二大拇指大 劑空中間以好子母丁香二粒在内合住濕紙煨

普濟方

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:53
列印頁數：54
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右以十膈散噐生薑丁香同下

生胃丹 朱氏集驗方

此丹兆天之五氣回黃及穀生精生陽壯脾元實腎水翻胃吐食胃虛生風手足搐搦痰潮作聲从病全不納食胃氣欲絶最能救之

人參 神麯炒 麥蘗炒 半夏各一兩 穀蘗炒 白朮 白芍藥 川續斷 川牛膝酒浸焙 川厚朴薑汁製 丁香 防風各一兩半 白豆蔻仁炮 山藥 白茯苓 木香各二兩 香附子三兩 縮砂仁二兩炒

右為細末法丸如菉豆大每服一百丸用白湯吞下

又方

粟米七升生薑五觔取自然汁浸粟米蒸爛焙乾 天南星一觔用生薑汁作餅真黃成泥包裹放慢火內煅令香熟去上焙為末

青橐散 朱氏集驗方 傳治脾胃泄瀉心膈膨脹疼痛不納飲食或作吐逆翻胃脾痛氣不能升降兼脾胃積冷

陳皮 甘草 乾薑 良薑各炒

右等分細末每服一錢鹽湯空心點服薑棗煎亦得

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

忌生冷魚腥酒猪肉動氣物只可喫鳩子雀兒猪肝肺等物

硇附餅子 出楊氏家藏方 治翻胃吐食十膈五噎嘔逆不止心腹疼痛弱藥不下

附子 一枚重七錢者剜臍作一竅子研硇砂一分在內填滿將餘附子碎末塞口用生麪作餅裹之如有剩餘附子末更以一枚裹之火煨令麪焦黃為度麪不用只用硇砂附子為末 木香 三錢 二味 三錢 丁香 三錢 二味同為末

右件一處拌勻麪糊為丸每一兩作二十丸捏作餅子每服一餅用生薑一塊如大拇指大切作兩破置藥在內濕紙裹煨令香熟和薑細嚼米飲送下不拘時候服

二氣散 出楊氏家藏方 治陰陽痞結咽膈塞壯若梅核妨碍飲食不愈即成翻胃

山梔子 炒乾薑 炮已上二味各一兩

右件為粗末每服二錢水一盞同煎至五分去滓食後熱服

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:54
列印頁數：56
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

透紅丸 出楊氏家寶方 治脾疼翻胃膈氣水瀉積痢及婦人血氣刺痛皆可服之

縮砂仁 一百粒

杏仁 一百粒去皮尖

巴豆 五十粒去皮膜取霜 坯子臙脂 一錢別研

川芎 一兩剉碎

右為細末次入杏仁巴豆臙脂研勻湯泡雪糕糊丸如梧桐子大大人兩丸小兒丸作黍米大每服三丸丁香湯下水瀉倒流水下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下並空心食前服

脾疼石菖蒲湯下婦人血氣刺痛醋湯下翻胃膈氣開胃 出本草

治翻胃胷中痰滯 出本草

用巽子粟合竹瀝作粥食之大佳

治反胃吐食除心胷痰水 出本草

取猴薑搗汁和生薑汁服之佳

以蚬糟煮服之良

治反胃 出本草

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以甑帶煮汁服

開胃及腸閉 出本草

以小芋極滑者煮吞之

治翻胃 出本草

用附子一個最大者坐於磚上四面著火漸透入生薑自然汁中又休前火逼乾復淬之約生薑汁可盡半碗許搗羅為末用粟米飲下一錢不過三服差

欽定四庫全書

普濟方

治反胃 出本草

以好井水及土石間新出泉飲之

療反胃嘔吐無常粥飲入口即吐困弱無力垂死 出本草

以上黨人參二大兩拍破水一大升煮取四合乘熱服日再兼以人參汁煮粥與噉昔李直方司勳徐郎中於漢南患反胃兩日飲諸方未差遂與此方當時便定差後十餘日發入京每與名醫遇特論此藥難可為儔也

調中開胃生肌令人肥白 出本草

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

以新羅椹子食之甚驗

十八味丁沉透膈散 出本草

治翻胃十膈五噎氣膈飲食不進又治氣滯作吐

丁香 半兩 木香 半兩 肉豆蔻 製 白豆蔻 青皮 麥芽 厚朴 製 沉香 各七錢半 白术 半夏 製 神麯 草果 三錢 甘草 一兩半 人參 香附子 砂仁 各一兩半 藿香 陳皮 去白 各半兩

右㕮咀薑棗煎服

治反胃羸弱不欲動

用仙人杖煮汁服之 仙人杖是竹笋欲成竹自死者色黑如漆五月收之

又方

用黃犍牛口中涎服之

治反胃吐逆內陰下常濕且臭或作瘡

用韶粉一分粉即瘥止常用大驗肘後方同

治反胃吐食

用小訶子日乾為末酒服方寸匕

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治反胃出本草
取蝟皮肉調五味淹炙食之不得食骨令人瘦小

普濟方卷三十六

列印日期/時間：02/05/2005 04:55:55
列印頁數：60
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

普濟方卷三十七

大腸腑門

總論

明 周王朱橚 撰

夫大腸腑者主肺也鼻主中央是其候也肺絡氣於大腸大腸者為行道傳瀉之府也號監倉椽重二斤十二兩長一丈二尺廣六寸當臍右回疊積還反十二曲貯水穀一斗二升主十二時定血脈和利精神千金明堂外臺同難經云長二丈一尺大四寸徑一尺之少半十六曲盛穀一斗七升半鼻遂以長以後大腸右手關前寸口陽絶者無大腸脈也若少氣心下有水氣立秋節即咳刺手太陰治陰在魚際間○右手關前寸口陽實者大腸實也若陽中切痛如刺刀所刺無休息時刺手陽明治陽在手腕中瀉之○大腸鳴者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感于寒則洩當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉○腸中雷鳴氣上衝胸喘不能久立邪在大腸刺肓之原巨虛上廉三里○大腸脹

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

者腸鳴而痛寒則洩食不化大腸有寒驚溏有熱便腸垢大腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀○肺前受病移於大腸肺咳不已咳則遺失便利厥氣客於大腸則夢田野肺應皮皮厚者大腸厚皮薄者大腸薄皮緩腹裏大者大腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結○扁鵲云手太陰與陽明為表裏大腸若病實則傷熱熱則腸滿不通口為生瘡食下入腸腸實而胃虛食下胃胃實而腸虛所以實而不滿之痢而發於氣水根在大腸○大腸絶不治何以知之乍實乍虛乍來乍去虛則傷寒寒則腸中雷鳴洩青白洩利無度利絶則死○病者乍寒乍熱損肺傷氣暴嗽嘔逆或體熱發斑喘咳引氣名曰氣狸以秋三月源從陽明係手太陰受疫淫邪之氣若腑虛為陰邪所傷則乍寒乍熱臟實為陽毒所傷則體熱發斑

大腸實 論

夫右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也病苦腸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

滿善喘咳面赤身熱喉咽中核狀名曰大腸實熱也大腸者傳瀉行導之府也其氣盛實燥熱生焉傳瀉不利腸中痛如錐刺或生鼠乳腫脹痛悶大便不通腹脇脹滿腰背重痛上氣喘滿皆大腸氣實之證也夫大腸實則生熱熱則腸結脹滿喜氣喘欬身面熱喉中噎乍實乍虛乍來乍去大腸有宿滯則發寒慄如瘧狀便秘不通則是大腸實熱之候也

茯苓麻黃湯 出聖濟總錄 治大腸實熱令人氣脹滿

白茯苓 去皮 麻黃 去根節各一兩半 黃耆 劉 大青 劉 桂 去麤皮各三分 細辛 去苗葉 杏仁 湯浸去皮尖炒各一兩一分 石膏 三兩 丹參 半兩碎 五味子 陳橘皮 去白焙 甘草 炙劉 貝母 各一兩 芍藥 枳殼 麩炒三枚

右㕮咀帛裹三錢井華水盞半煎八分去滓溫服

羚羊角散 出聖惠方 治大腸實熱心神煩躁口內生瘡

羚羊角屑 三分 甘竹茹 川朴硝 川大黃 劉炒各一兩

黃芩 梔子仁 紫蘇莖葉 杏仁 湯浸去皮雙仁炒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

玄參 木通 赤茯苓各三分 甘草半兩炙剉

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分去滓入地黄汁一合更煎一兩沸不計時温服

生薑洩腸湯出千金方 治大腸實熱腹脹不通口為生瘡

生薑 橘皮 青竹茹 黄芩 梔子仁 白朮 各三分 桂心一兩 茯苓 芒硝 各三兩 生地黄十兩 大棗四枚

右㕮咀水七升煮取三升去滓下芒硝分二服一方無桂心名

鵝白湯

檳榔丸出聖惠方 治大腸實熱氣壅不通心腹脹滿大便秘實

檳榔 大黄蒸 麻子仁炒去殼別研 枳殼炒麩去瓤 羌活去蘆 牽牛炒 杏仁去皮尖炒 白芷 黄芩各一兩 人參半兩

右㕮咀為末煉蜜丸梧桐子大每服四十丸空心用熟水送下以大腑流利為度

杏仁丸出聖惠方 治大腸實熱大便不通上氣喘咳心神煩悶

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杏仁 湯浸去皮尖雙仁炒 甘草 炙一兩 各剉 赤芍藥 黃芩 麥門冬 去心焙 細辛 去苗葉 五味子 各三分 石膏 碎二兩 大黃 剉炒一兩半

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前溫服

大黃丸 出楊子建護命方 治大腸秘熱心胸煩燥頭痛便秘腹脇脹滿口舌乾燥

大黃 炮半兩剉 桔梗 炒 枳殼 麩炒去瓤 芎藭 去蘆 羌活 去蘆頭 各一分 牽牛 一兩半炒熟半生用 木香 柴胡 去苗 獨活 去蘆頭 各一分

右為末熟煎菜菔入藥同於木臼內搗令丸得為度

丸如梧子大每服三十丸食後臨臥熱湯下加至四十丸

赤茯苓散 出聖惠方 治大腸實熱頭痛目眩驚狂喉痺腹脹滿悶手足煩痛

赤茯苓 麥門冬 去心 檳榔 各一兩 川大黃 一兩半 犀角 屑 枳實 麩炒三分 各 杏仁 湯浸去皮尖雙仁炒 丹參 各半兩 石膏 二兩

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:23
列印頁數：5
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前温服忌熱麵炙煿

柴胡散 出聖惠方 治大便實熱氣壅不通心腹脹滿發渴寒熱

柴胡 去苗 赤芍藥 檳榔 各一兩 枳實 麩炒 杏仁 湯浸去皮尖雙仁炒 黄芩 漢防己 各三分 川大黄 三兩剉炙 甘草 半兩炙炒

右咬咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前温服

大青湯 出聖濟總録 治大腸熱滿腸中切痛或生鼠乳大便不通

大青 剉三分 麻黄 去節 去根 石膏 碎 芒硝 碎 黄柏 去麤皮 生地黄 焙各一兩半 枳殼 麩炒去穰 赤茯苓 去黑皮

右咬咀每服三錢水一盞半入苦竹葉十片煎八分去滓温服日三

橘皮湯 出聖濟總録 治大腸熱欬脇滿掌中熱

陳橘皮 芒硝 紫蘇葉 各一兩半 白术 一兩 甘草 炙剉 桂 去麤皮各半兩 石膏 墜淨者碎三兩 杏仁 炒一分去皮

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:23
列印頁數：6
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右咬咀每服三錢水一盞半淡竹葉十片葱白四寸劈破煎八分去滓温三日

治白氣狸肺腑温病陰陽毒臟實為陽毒所傷熱肌膚發斑氣喘引色昏白者

紫苑茸一兩 梔子仁 升麻 前胡各三分 葶藶炒一分

右咬咀每服五錢水二盞煎七分去滓食前服

杏仁去皮尖炒 甘草半炙各兩

右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去滓食前温服

大腹湯出聖濟總録

治大腸實熱腹脹不通上衝口内生瘡

大腹皮 大黄生剉各二兩 木香一兩 訶梨勒皮三分 枳殼去穰炒一兩 去穰炒芎藭三分

大腹皮散出聖惠方

治大腸實熱腸脹不通熱氣上衝

大腹皮三兩剉 柴胡去苗訶梨勒皮 枳殼麸炒去穰各一兩

川大黄炒剉 川朴硝各二兩 羚羊角屑 甘草半炙各三分

口内生瘡

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:23
列印頁數：7
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右咬咀每服三錢水一盞半煎至八分去滓温服

神功丸 出聖濟總録 治氣壅大腸風熱大便不通 方見本門大便秘澁不通類四味神功丸

治腸痛如打

用豆半升炒令焦酒一升煮令沸熟取醉

瀉白湯 出鮑氏方 治大腸實熱腹脹不通夾臍痛喘不能久立口瘡

陳皮 淡竹葉 黄芩 梔子仁 黄栢皮 一兩半

欽定四庫全書

茯苓 芒硝 一兩 生地黄 五兩

普濟方

右為散每服四錢薑棗煎空心服

大腸虚 論

夫右手寸口氣口以前脈陽虚者手陽明經也病苦胸中喘腸鳴虚渴唇乾目急善驚洩白名曰大腸虚冷也其候胸中喘腸鳴虚渴唇乾皮膚乾燥目急善驚滑洩骨節疼痛不能久立蓋大腸者傳導之官變化出焉寒邪客於其間則冷氣虚弱不能自固而成諸疾診其脈

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右手氣口以前陽虛者是也

欬冬花丸　療大腸虛冷欠呿欬氣短少腹中痛

欬冬花七分　桂心　五味子各六分　乾薑　芎藭　甘草炙各五分　附子炮四分　桔梗四分　蘇子五合　蜀椒一升　百部汁

右為末將薑汁和蜜微火煎丸如梧子大每服温酒下三十丸加至四十丸日再忌海藻菘菜猪肉冷水生葱

食

草荳蔻散　出聖惠方　治大腸虛冷腸鳴腹痛下痢不思飲

草荳蔻去皮　陳橘皮湯浸去白瓤焙各一兩　高良薑劉三分　桂心

丁香　木香　白朮當歸劉炒　白荳蔻去皮肉荳蔻劉炒各一分　甘草炙一分　薑去皮半兩

右為末每服半錢食前以薑棗湯調下

木香丸　出聖惠方　治大腸虛冷切痛腸鳴食不消化

木香　白朮　桂心　蕪荑劉炒　高良薑劉各一兩　訶梨

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:24
列印頁數：9
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

勒一煨去皮兩半 肉豆蔻去殼乾薑三分炮 附子二兩炮裂去皮臍 厚朴二兩去麤皮薑汁塗炒 甘草炙半兩

下十丸

右為末用神麴末煮作糊丸梧桐子大食前薑棗湯

治白氣狸肺腑臟温病陰陽毒大腸腑虛為陰邪所傷寒熱互作上氣欬逆大腸殮洩色皓皓白者

白术人參各一兩 乾薑炮 麥蘗炒各三分 白茯苓五 味子 肉豆蔻 草菓 烏梅 甘草炙各半兩

右㕮咀每服五錢水盞半煎七分去滓食前服

吳茱萸散出聖惠方 治大腸虛冷腸鳴腹痛食不消化

吳茱萸湯浸七次焙乾炒 肉豆蔻去殼炮 乾薑炮 甘草炙各半兩劉

右為末每服一錢食前粥飲調下

訶梨勒散出聖惠方 治大腸虛冷腸鳴洩痢腹脇氣痛飲食不化

陳橘皮二兩去白焙 高良薑劉縮砂去皮 神麴搗碎炒 白术各一兩 厚朴二兩去麤皮薑汁炒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

訶梨勒 一兩半 煨用皮 附子 炮去皮臍 陳橘皮 湯浸去白 各一兩 焙 當歸 炒劉 肉豆蔻 去殼 各三分 桔梗 去蘆 木香 各半兩 吳茱萸 湯浸七次 炒焙 甘草 炙劉 各一分

右㕮咀每服三錢水一鍾入生薑半分棗三枚煎六分去滓食前稍熱服

防風丸 出聖濟總録 治大腸氣虛又因傷風胃雨大腸中下血

防風 去仁 芎藭 各一分 黄耆 劉 术 各半兩 五味子 續斷

欽定四庫全書

陳橘皮 湯浸去白 各一分 石硫黄 研一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大空心鹽米湯下三十丸

訶梨勒丸 出醫方集成 治大腸虛冷腸鳴洩瀉腹脇氣痛飲食不化

訶梨勒 麵裹煨 附子 炮去皮臍 肉豆蔻 麵裹煨 木香 不見火 吳茱萸 去梗 炒 龍骨 生用 白茯苓 去皮 華撥 各半兩

右為末薑汁煮糊丸梧桐子大每服七十丸空心米飲下

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連補湯 出千金方 治大腸虛冷痢下青白腸中雷鳴相逐

黃連 四兩 茯苓 芎藭 各三兩 酸石榴皮 地榆 五兩 伏龍肝 雞子大一枚

右㕮咀水七升煮取二升半去滓下伏龍肝末分三服

附子湯 出聖惠方 治大腸虛冷腰痛羸瘦

附子 炮去皮臍一兩半 人參 乾薑 炮 赤芍藥 桂 去皮粗 各一兩 甘草 炙一兩

右㕮咀每服三錢水一盞棗三枚煎六分去滓食溫服

茱萸丸 出聖濟總錄 治大腸虛冷飲食減少非飧洩

吳茱萸 湯浸晒乾焙 訶梨勒皮 丁香 草豆蔻 去皮 芎藭 防風 去叉各一分 石硫黃 研一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大空心陳米飲下

黃連湯 出聖濟總錄 治大腸虛冷痢下白膿腸內虛鳴相

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:25
列印頁數：12
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

逐
黄連去鬚酸石榴皮焙赤石脂各三兩白茯苓去皮黑乾薑炮各二兩半桔梗炒二兩
右㕮咀每服五錢水一盞半煎八分去滓温服日三服

鳴
葩葫丸出聖濟總録
治大腸虚腸痛不能久立或腰中虚鳴葩葫去穰各一兩半白朮三錢白茯苓去黑皮一兩丹參去根炙黄耆劉各二兩
右為末煉蜜丸梧桐子大空腹粥飲下三十丸日三服

鳴腹痛
朴附丸出聖濟總録
治大腸虚冷便痢滑洩不思飲食腸厚朴去粗皮生薑汁炙一兩附子炮去皮臍半兩甘草炙一兩乾薑炮一兩
右為末酒煮麵糊為丸梧桐子大每服五十丸食前

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

温米飲下

大建中湯 出聖濟總録

治大腸虚

乾薑 炮一兩半 甘草 炙 桂 去粗皮 各一兩

右㕮咀每服二錢棗三枚去核餘一塊水一盞煎七分去滓空腹温服日三服

乳豆丸 出濟生方

治大腸虚寒滑洩不止

鍾乳粉一兩 肉豆蔻 半兩麪裹煨香去麪不用

右為末煮棗肉杵為丸梧桐子大每服七十丸空心食前米飲送下

治大腸虚冷

用鰻鯉魚煮酒服蓋其魚能補虚

固腸湯 出氏方鮑

治大腸虚寒痢下青白腸中雷鳴大便秘小便赤上氣充胸難久立身腫腹急當臍痛

酸石榴皮 半兩 黄連 炒 地榆皮 一兩

右為散每服四錢薑五片烏梅一個煎空心服

腸風下血 附論

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夫腸風臟毒下血者皆因飽食過度房室勞損坐卧當風恣餐生冷或啖炙煿或飲酒過度榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑熱因乘之使血性流散積熱壅遏血滲腸間故大便下血血清而色鮮者腸風也濁而色黯者腸毒也肛門射如血線者蟲蛀也又有陽氣不升血隨氣降而下血者下虛也下虛之脈脈多洪大而芤蓋弦者勞也芤者下血也治療之法風則散之熱則清之寒則温之虛則補之治法合無不效者矣○大便下血或清或濁或鮮或黑或在便後或與洩物並下此由内外有所傷感凝停在腸胃清氣不通亦妄行之類故曰便血方書以鮮血為腸風瘀血為熱毒濺注為腸痔受病之初或因大腸有熱毒血朝於下或因下虛而腸臟無脂膜血得以滲入及其久則成痼疾矣亦時有所感觸而發之如遇熱發則為瘀血遇寒發則為清鮮遇濕發則為豆汁血色亦因而轉不可拘以一説○人之滋養一身惟氣與血血為榮氣為衛榮行於脈中衛行於脈

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

外故心主血肝藏之而脾為之統貴於氣順則血調若
内因七情并酒食所傷外為四氣相干則血氣逆亂榮
衛失度皆能令人下血若風入腸胃者其脈浮下血必
在糞前是名近血停積於大腸者其脈沈滯血在糞後
是名遠血臟寒者其脈沈微下血無痛積熱者其脈洪
數純下鮮血甚則鮮血多而不止廉痛傷濕者脈沈而
遲下血如豆汁令人面無顏色時寒時熱脈浮弱按之
絶者下血也○治法大要先當解散腸胃風邪熱者與
敗毒散冷者與不換金正氣散風邪既去然後隨其冷
熱而對治之或便血遇熱則行止血氣用凉藥如地榆
散藕皮湯黄連阿膠丸酒蒸黄連丸輩施之熱症固當
然爾其或陽虚陰走正氣不得歸元則用木香理中湯
附子理中湯震靈丹黑錫丹輩治之皆不可偏廢要之芎
藭湯一劑又調血之上品熱者加茯苓槐花冷者加茯
苓木香此則自根自本之論也雖然精氣血氣生於穀
氣故凡大腸下血大抵以胃藥收功真料四君子湯參

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

苓白术散以枳殼散小烏沈湯和之胃氣一回血自循於經絡矣然腸風之血自腸中來虫痔之血肛門傍邊別有小竅射如血線是也肛門既脫腐血浸淫於其間則俱化為虫蠹蝕腸口滴血淋漓自比又不能約而收之矣當以蕪荑艾葉苦楝根輩止血亦不用甘草但增棗入藥用○儒門事親書云棠谿欒彦剛病下血醫以藥下之默默而死其子企見戴人過而問之曰吾父之死竟無人知是何症戴人過曰病挫其心也心主行血不當下抑下之不滿數企曰四日死何為病挫心戴人故被挫則血不禁若血温温身熱者死其死必七日治法過曰智不足而强謀内不足而强舉心安得不挫也欒初與鄰爭屋不勝遂得此病企由是服拜而學醫○又論曰凡人有臟毒下血何謂也生氣通天論曰邪熱傷肝因而大飽筋脈横解腸癖為痔故膿血者血隨熱行參差入于腸胃之間乃成瀉血也若身體壯熱則為難治身涼者可治也可先調中消血蕩除積血瀉之二三

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:27
列印頁數：17
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

行瀉後服芍藥蘗皮丸黃連解毒湯五苓散益元散各以新汲水調下五七錢甚者取地黃汁半盞服之則愈矣○積年腸風下血不止者由人氣血衰弱臟腑憊或飲食勞損或毒氣風邪蘊蓄在臟腑流注於大腸既虛下血致面色萎黃四肢消瘦或累月連年諸醫不差故曰積年腸風下血○内經謂結陰者便血一升再結二升三結三升邪在五臟則陰脈不和不和則血流結陰之病以陰氣内結不得外行血無所禀滲入腸間故便血也

方

黃耆湯治腸風下血

黃耆 三兩 槐實 小蘇 桑耳 乾地黃 焙 當歸 炙 黃連 去鬚 白芷 各一兩 草豆蔻 二枚去皮 芎藭 赤石脂 天雄 炮去皮臍 去龍骨 各二兩 黃芩 去黑心半兩 紅藍花 訶梨勒皮 延胡索 厚朴 去粗皮薑汁炙 桂 去粗皮各一兩

右�once咀每服五錢水盞半薑一分煎八分去滓食前温服日二

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

乾地黃湯　治大便下血并多年腸風飲食不得
熟乾地黃 焙 赤石脂 各二兩 延胡索 牡蒙 桔梗
黃芩 去黑心 各半兩 當歸 切焙 各一兩半 黃連 去鬚 白芷
地榆 木香 紅藍花 炒 各一兩 桂 去皮 三分 乾薑 炮 黃耆 劉
右㕮咀每服五錢水一盞半煎八分去滓温服無時

五香聖散 出聖惠方　治腸風氣流注下部致生腫結牽引腑臟不和時發疼痛經久下血太多虛乏羸瘦
沈香 黃耆 劉 枳殼 去穰 麩炒 熟乾地黃 各一兩 麝香 半兩
右為末每服二錢食前粥飲調下

内補散 出聖惠方　治腸風痔疾失血過多虛乏羸困
白蒺藜 炒 川大黃 劉 炒 白芍 卷柏 炒 芎藭 各三兩
乳香 一分 木香 藿香 劉 炒 檳榔 當歸 劉 炒 白茯苓
右㕮咀每服五錢水一盞半煎六分去滓温服

續斷 熟乾地黃 各二兩 人參 去蘆 附子 去皮臍 炮 當歸 劉 炒
芎藭 黃耆 劉 白芍藥 桂心 麥門冬 去心 白茯苓
苓 乾薑 劉 炮 五味子 各一兩 白芷 甘草 炙 劉 各三分
右㕮咀每服四錢水一盞半棗三枚煎六分去滓温服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

日三四服

白花蛇丸 出聖惠方 治腸風下血日夜不絶疼痛至甚

白花蛇 二兩酒浸去皮骨炙黃 杏仁 半兩湯浸去皮尖雙仁炒黃 者 劉胡

薑子 炒 蝟皮 炙焦 人參 去蘆 鯉魚皮 燒灰 附子 炮去皮臍 當歸 各一兩 劉炒阜莢樹耳 炙各一兩 枳殼 麩炒去穰 男女髮 燒灰 肉桂 去皺皮各二兩

右為末煉蜜杵丸梧子大每服三十丸食前人參湯下

升陽去熱和血湯 出醫方大成 治腸癖下血乍便其血即出

有力而遠射四散如春節二月中天氣腹大作痛乃

陽明氣衝熱毒所作也當去濕毒和血而愈是其治

也 又名除濕熱和血湯

生地黃 牡丹皮 生甘草 各半錢 熟甘草 黃耆

當歸身 熟乾地黃 蒼术 蓽茇 肉桂

各一錢 橘皮 二分 升麻 七分 白芍藥 一錢半

右咬咀作一服水四盞煎一盞去滓稍熱空心服之

白术散 出聖惠方 治腸風痔疾失血虛損羸瘦飲食無味

面色萎黃四肢乏力

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

白朮 石斛 去根 劉 續斷 天門冬 去心 各三分 黃耆
熟地黃 人參 去蘆 肉從容 酒浸一宿 去皺炙 牛膝 白茯苓 各 一兩 桂心 甘草 去蘆炙劉 各半兩

右㕮咀每服四錢水一鍾生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時溫服

內補黃耆湯 出惠方聖 治腸風痔病下血太多虛羸無力

黃耆 劉 槐子仁 炒 枳殼 麩炒去穰 各三兩 白蒺藜 炒去刺 烏蛇肉 酒浸炙 鹿茸 去毛塗酥炙 附子 炮去皮臍 蝟皮 炙 當歸 劉炒

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三十丸食前桑枝湯下

沈香 檳榔 厚朴 去粗皮薑汁炙 各一兩

黃耆丸 出易簡方 治久年腸風痔漏 方見痔漏門痔漏類

熟乾地黃丸 出惠聖方 治內傷風冷大便下血不止

熟乾地黃 龍骨 燒赤 黃耆 劉 紫蘇子 蒲黃 當歸 附子 泡去皮臍 艾葉 炒 白礬 燒令汁盡 阿膠 碎炒 各一兩 枳殼 半兩 麩炒去穰

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心及晚食前粥飲下

腸風黑散 出指直方

治腸風下血腹痛

枳殼 製各一分

甘草 炒

烏梅肉 炒各半兩

敗棕 頭髮 木

饅頭 木賊 各存性燒

槐角 炒

右為末每服二錢陳米飲乘熱調下

槐皮膏

止痛癢血出

槐皮 三兩

薰陸 辛荑 甘草 白芷 各半兩

巴豆 七枚

欽定四庫全書

普濟方

乾漆 十枚

桃仁 十四枚

右以猪脂半斤煎之三上三下去滓以綿裹膏塞下部日四五止癢痛

內補散 出惠方聖

治腸風下血不止黃瘦虛羸

蒲黃 白石脂 熟乾地黃 各二兩

當歸 白芷

甘草 炙劉

黃連 去鬚

芎藭 各一兩

右㕮咀每服三錢水一鍾煎六分去滓溫服日三四服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

內補黃耆散出聖惠方治腸風下血不止面色萎黃氣力全少

黃耆 龍骨 槐子 泡 白芍藥 各二兩 當歸 劉炒 芎藭 甘草 炙劉 附子 各泡去皮臍一兩

右㕮咀每服四錢水一鍾煎六分去滓食前温服

側栢葉散出聖惠方治大腸風虛積冷下血不止

側栢葉 炙 棕櫚皮 燒灰 附子 泡去皮臍各一兩 防風 去蘆 槐花 炒 羌活 當歸 劉半兩炒各 白朮 三分

右為末每服二錢食前粥飲調下

鹿茸丸一名斷紅丸出聖惠方治臟腑久虛腸風痔漏下血多面色萎黃日漸羸瘦

鹿茸 去毛塗酯炙 附子 泡去皮臍 續斷 側柏葉 黃耆 劉 厚朴 去粗皮塗薑汁炙 阿膠 碎炒 當歸 劉炒各一兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三十丸食前粥飲下一方用白蘞無厚朴

黃連貫仲散出神效方儒門事親治腸風下血

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:29
列印頁數：23
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連 雞冠花 貫仲 大黃 烏梅各一兩 甘草炙三錢 枳殼泡 荊芥各一兩

右為末每服三錢食前温米飲調服

槐角散出大成方 治腸胃不調脹下滿下血

槐角二兩 甘草半兩 蒼术厚朴 陳皮 當歸 枳殼各一兩 烏梅半兩

右咬咀每服五錢水一鍾煎服

當歸和血湯一名槐花散出翳方大成 治腸癖下血濕毒下血

當歸身 升麻各二錢 荊芥六分 川芎 白术 熟地黃四分 白芍藥 黃芩各六分

右為末每服二三錢清米飲調下食前忌酒濕麵生冷物

加減四物湯出危氏方 治腸風下血不止

當歸去蘆酒浸 川芎各一兩 枳殼去穰 側柏葉 生地黃洗 荊芥穗 槐花炒 甘草炙半兩各

右咬咀每服四錢水一盞半薑三片烏梅少許煎七

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

分去滓食前温服一方加防風烏梅各半兩

烏雞丸 出經驗良方 治丈夫腸風婦人崩病

塵烏 火炮煤是也濃醋和作餅煅又名烏龍尾 蒲黄 乾地黄 芍藥 當歸 各五錢 甘草 川烏 泡 肉桂 各三錢半

右為末蜜丸梧桐子大每服三十丸炒黑豆淋酒服

黄耆散 出聖惠方 治腸風痔疾失血後虚損皮膚乾燥四支黄瘦心神虚煩少得眠卧不能飲食

黄耆 劉 熟乾地黄 人參 去蘆 柴胡 去苗 白茯苓 各一兩

栗仁 炒 麥門冬 去心 枸杞子 各三分 防風 去蘆 白术 甘草 炙 劉 各半兩

右㕮咀每服四錢水一鍾生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時温服

卷柏散 出聖惠方 治腸風腹痛下血不止

卷柏 熟乾地黄 黄耆 各一兩 劉 白术 芍藥 甘草 炙 劉 芎藭 各三分 枳殼 麸炒去穰 當歸 三分 劉炒 乾薑 半兩 泡 劉

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:29
列印頁數：25
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右咬咀每服三錢水一鍾煎至六分去滓温服日三四服

烏玉丹 方見痔漏類 治腸風痔漏著床頭痛不可忍

神丹 治腸風痔漏 方見痔瘻類 門痔瘻類

蝟皮丸 出聖惠方 治大腸毒下血疼痛

蝟皮 炙 營實 枳實 炒黙 黄耆 劉 桑木耳 炙 地榆

當歸 炒劉 烏賊魚骨 各一兩 槐子 炒二兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子每服三十丸食前粥飲下 久不瘥轉加羸困

黄耆丸 出聖惠方 治腸風積年久不瘥轉加羸困

欽定四庫全書 普濟方

黄耆 劉 白礬 燒灰 各三兩 附子 泡去皮臍 硫黄 研細水飛 蝟皮 炙焦黄 虎眼皮 炙黄熟 栝蔞 各一兩 檳藤子 去殼酥炙黄二枚 皂莢 去黑皮塗酥蒸一次二枚

右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧子大每服

腸風黑散 出危氏方 治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑之

三十丸食前粥飲調下

內或食生冷或喫炙煿或飲酒過度積熱腸間致使

腸虛弱糟粕不聚大便解血膿腹疼痛裏急後重或

肛門脱出或久患酒痢大便頻併皆療之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

荆芥燒二兩 枳殼去穰二兩 甘草炙一兩半 蜡皮各一兩 亂髮燒 槐花燒 槐角燒

右將合燒藥同入甕瓶内黄泥固臍燒存三分性出火氣同甘草枳殼為末每服二錢水一盞煎七分空心温服温酒調下亦可

結陰丹出御藥院方 治腸風下血及臟毒下血諸大便下血疾

枳殼去瓤麩炒 蕨靈仙 黄耆 椿根白皮 陳皮去白 何首烏 荆芥各等分

右為末酒麵糊内少許蜜同丸梧桐子大每服五十丸至七十丸食前米飲下一方不用蜜以醋少許陳米飲煎湯下

治腸風臟毒鮮酒毒

黄連一兩 防風 槐角 荆芥 烏梅 扁栢葉焦炒 黑為度 枳殼各五錢

右為末老米麴醋糊丸每服三五十丸空心米湯下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

玉屑丸 出本事方 治腸風瀉血不止
槐根白皮 去粗皮 四兩三
苦陳根 去皮各三兩 椿根白皮 四兩三
月後二月前取軟者日乾一方用樗根皮天南星 去膜生薑製 半夏 各半兩生薑製
蕨靈仙 一兩 寒食麵 三兩
右為末滴水丸梧桐子大乾之每服三十丸水八分一盞煎沸下丸子煮令浮以匙抄取温送下不嚼空心食前服頃年有一人下血盈盆頓爾瘦服諸藥皆不効予曰此症腸風冷服玉屑丸三服止余苦疾病三十年蓄下血藥方近五十品其間或驗或否或始驗而久不應者或初不驗棄之再服有驗未易立談大抵此疾品類不同對病則易愈如下清血絶鮮者腸風也血濁而色黯者臟毒也肛門射如血線者蟲痔也亦有一種下部氣虛陽氣不升血隨氣而降者仲景云脈弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下男子則忘血精此下部虛而下血者也若傳革脈却止服

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:30
列印頁數：28
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

温補藥蟲痔宜薰千金方用蝟皮艾者佳予嘗服頗得効

槐角散 出直指方 治腸風下血脫肛

槐角 一兩 防風 地榆 當歸 枳殼 製 木賊 茯神 各半兩

右為末酒麵糊丸梧桐子大每服三十丸米飲下

七妙散 治腸風

枳殼 生去穰 椿木皮 雷丸 天麻 白芨 猪牙皁角 各半兩 赤石脂

右為末每服一錢溫酒調下空心臨卧服

六君子湯 出德生堂方 治便血不止脾胃虛寒飲食不進身體羸弱

人參 白朮 白茯苓 當歸 黃耆 白扁豆 甘草 各一兩半

右為末每服二三錢米飲調日進三服

蝟皮散 出聖惠方 治腸風下血久不瘥面色萎黃

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蝟皮 灰
蒜莖 灰
乾薑 炮 劉 各 三兩
枳殼 麩炒 去穰
牡礪
黃牛角鰓 燒 灰
酸石榴皮 炙 各 一兩

右為末每服二錢食前粥飲調下

地榆散 出聖惠方
治大腸下血久不止

地榆 赤芍藥 生乾地黃 茜根 劉 龍骨 黃芩 鷄蘇苗 各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分去滓食前温服

治腸風臟毒下血 出本事方

川當歸 枳殼 側柏葉 陳槐子 芍藥 百草霜 各等分

右剉同一處炒令烟微起末之每服二錢空心温酒調下日午米湯調下

地榆散 出直指方
治腸風熱證下血

地榆 黃連 茜根 黃芩 各半兩 茯神 梔子仁 一錢

右㕮咀每服三錢薤白寸許煎服又方栢皮湯下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

木賊散出直指方 治腸風下血

木賊去節炒一兩 木饅頭炒枳殼製槐角炒茯苓荊芥各半兩

右為末每服二錢濃煎棗湯調下

腸風方出直指方

香附一兩製 枳殼三分當歸 川芎各半兩 槐花 甘草各一兩

右㕮咀每服五錢新汲水一盞半薑棗煎食前服

防風散出危氏方 治因食熱過度風氣蓄盛銷大腸膏脂以致榮衛之血滲流而下

羌活 荊芥 防風 枳殼 殭蠶去嘴炒 薄荷各等分

右㕮咀白水煎空心温服忌再喫熱物

涼血地黄湯出濟生拔粹方 治如飲食不節起居不時者陰受之陰受之則入五臟入五臟則填滿閉塞下為飧洩久為腸癖夫腸癖者水穀與血另作一派瀉出也

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

若時值長夏濕熱大盛正當客氣勝而土弱也故腸癖之病甚矣

熟地黃 青皮 不去穰 槐子 炒 當歸 各半錢 知母 炒 劉 黃柏 去皮 劉炒 各一錢

右㕮咀作一服水一盞煎七分去滓温服如小便澀臍下悶或大便後重則加木香檳榔末各半錢稍熱服空心或食前如裹急後重又不去者當下之如有傳變隨症加減

槐荊丸 方見痔漏類 治腸風下血先糞後紅

黃連散 出醫方大成 治腸風下血疼痛不止

黃連 去須炒 雞冠花 焙 貫仲 川大黃 烏梅 各一兩 甘草 三分炙

右為細末每服二錢温米飲調下日三服不計時

玉壺丸 治腸風病年深不効

青嫩角鐵 採半斤劈破用河水五升浸二七日入砂器中煮去四升存一升入藕汁半斤 一方無川大黃

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:31
列印頁數：32
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蜜一兩用火熬成膏稀稠得所去火放冷枳殼一兩針劄放灯火上燒存性入酒中浸透胡桃十個依前法沒藥二錢研香二錢研

右除前膏外後五味為末入前膏內為丸梧桐大每服二十丸腸風煎木賊湯下痔疾荊芥湯下時瀉血米飲下空心日三服

琥珀散 治腸風一切血病脾臟毒下血

琥珀屑研 鹿角霜 赤石豆 槐花 枳殼去穰麩炒 白芷各一兩

右除琥珀外並剉碎同炒令焦黑杵為散入琥珀研令勻每服二錢米飲調下空心食前各一服

防風餅 治腸瀉血

防風去叉 雞冠花 續斷 甘草炮 天麻 人參各半兩

右為末以油餅三個入藥三錢分作三個油餅早晨日午近晚以淡竹葉湯下

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:32
列印頁數：33
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

木香丸　治腸風不問年深日久

木香　白芷　乾蝎（去土炒）　阿魏（各一兩）　當歸（炙半兩）　漏蘆（去蘆二兩）

右各別搗以小童便一升煎阿魏三十沸後下木香末再和丸如桐子每服五丸至十丸空心温酒下

釣腸丸　治腸風瀉血不止疼痛

煎三十沸後又下乾蝎當歸再煎如餳入白芷漏蘆末再和丸如桐子每服五丸至十丸空心温酒下

右為末麵糊為丸梧桐子大每服二十丸槐花湯下

臭椿皮散（出聖惠方）　治積年腸風瀉血穀食不消肌體黄瘦

臭椿樹白皮（二兩炙剉）　乾薑（炮剉）　甘草（炙剉各三分）　雞冠花　附子（炮去皮臍）　槐蛾（炙各二兩）

右為末每服二錢食前枳殼湯下

附子（一個炮去皮臍）　石硫黄（研）　雞冠花　鯪鯉甲（炒）　皁莢刺（炒各一兩）　蝟皮（二個燒灰）

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,普濟方,卷三十七
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

附子丸 出聖惠方 治積年腸風瀉血面色萎黃

附子 二箇炮去皮臍 食鹽 當歸 劉炒 乾薑 劉炮 杏仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒 皁莢 去黑皮塗醋炙各一兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服二十丸食前陳米飲下

生地黃散 出聖惠方 治大便下血皆胃肺積熱流注大腸

生乾地黃 黃芩 赤芍藥 黃連 去鬚 蒲黃 地榆 劉 犀角 劉 各一兩

右㕮咀每服五錢水一大盞入竹茹一雞子大煎五分去滓頻温服

黃芩散 出聖惠方 治大腸積熱下血不止日夜度數無恒

黃芩 黃柏 黃連 去鬚 生乾地黃 地榆 劉 犀角 劉 各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞入青茹半雞子大煎至六分去滓食前温服

治大便下血

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:32
列印頁數：35
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

草錦　蓮蓬殼　敗棕　白茅茜　新錦各等分

右為末温米飲調下

五湯散　治瀉血不定

貫仲去毛土槐花　地榆　黄連去鬚甘草各等分

右為末每服一錢米飲調下

黑虎丸一名黑虎丹　治腸風累經大效

白礬研二兩　雞冠花乾者一兩　屋龍瓦屋下烟煤是五錢　青橘皮洗去白焙五靈脂焙各四兩

欽定四庫全書

右為末分一半末用米醋二升慢火熬成膏候冷和一半為丸梧桐子大每服三十丸空心陳米飲下

車螯散一名如聖散　治腸風下血痔漏不止

車螯一合　白莢刺四十九枚　硇砂　丹砂　乳香各一分三味同研

右以四味為末同車螯盛合子内以地龍泥固臍用炭六斤煅火盡為度取出研為細末空心温

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

酒調下一錢服

側栢散 治腸風瀉血等疾

側栢葉 二斤九蒸九曬令乾 黑豆 小者一升炒 甘草 炙剉二兩 白术 去粗皮各一兩 桂

右為末每服二錢熱湯調下日三不拘時

大安散 一名白礬散 治久患腸風瀉血

礬石灰 研三兩 硫黃 末 黃連 去鬚為末 乳香 研各一兩 蠟一錢

右為末熱湯調下每服三錢日二

桑耳散 治腸風下血風毒氣攻流注大腸疼痛

桑耳 炒 枳殼 去穰麩炒 木賊 當歸 剉炒 槐蛾 炙各一兩

右為末每服二錢食前粥飲調下

治積年腸風瀉血百藥無效

敗皮巾子 燒灰 白礬 燒灰各一兩 人指甲 燒焦 麝香 各一兩 乾

右為末每服一錢食前温粥飲調下

止血散 治腸風下血或在便前或在便後在便前

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:33
列印頁數：37
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

者其血近乃腎肝血也在便後者其血遠乃心肺血也

阜角刺 燒灰 二兩 胡桃仁 去皮 破故紙 炒 槐花 各一兩 五錢

右為末每服二錢米飲送下温酒亦可

治腸寒下血

槐花散 方見痔漏門諸痔類治五痔

治腸風臟毒下血

核桃殼 繭退 皮鞋底 赤雞冠花 各等分

右共燒灰為末每服一錢温酒調空心下

厚朴煎 治積年下血

厚朴 五兩生薑五兩同搗爛 子銀石器内炒令紫色 白术 一兩 大麥蘗 神麯 各一兩同炒紫色

右為末水麵糊丸梧桐子大疾作時空心米飲下一百丸平時三五十丸 昔王嗣康於蔡照先處得此方韓縣尉名楚鄉父服之作效嗣康云腸胃本無血緣氣虛腸薄自榮滲入今用厚朴厚腸胃神麯麥蘗消酒食白术導水血自不作也

治腸風有跕蹈瘡破者不治

馬蘭子 一斤研破酒浸夏三日冬七日曬令乾 何首烏 半斤 雄黄 四兩 雌

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃 四兩

右為末用浸馬蘭子酒打糊丸梧桐子大每服三十丸空心温酒下三服見效

治腸風臟毒

忌一切毒物

治腸風久血

右為末煉蜜丸梧桐子大每服隨湯送下不計時

黃連 一兩 黃芩 一兩 地榆 二兩 黃柏 半斤

和半炒焦半炙炒

茅花 敗荷葉 敗棕 各五錢燒灰存性 香附 杵淨一兩少鹽

右為末食前米飲調下

藥皮丸 治臟毒便血疼痛嘔噦

黃連 黃蘗 芍藥 槐花 炒各三兩

右為末滴水丸梧桐子大每服三十丸食前米飲

麝香散 治腸風大小便出血淋瀝疼痛婦人血崩

下日進二服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蠶退紙燒灰存性 晚蠶沙揀去土炒 繭黃燒灰存性 白殭蠶炒去絲各 等分

右為末每服二錢入麝香少許用飯飲調下糞前

紅者食前服如糞後紅者食後服血崩淋瀝等疾

不拘時日三服熱淋止用蠶退紙一味燒灰存性

研末飯飲下

治便紅

肥皂獨子者七箇去核 陳鹽海七箇入肥皂內水紙包裹文武火煨焦出火氣研為

細末香附炒黑末 陳艾燒灰各等分

右以米飯為丸空心飲湯送下

治便血

槐皮即大眼椿根上皮 水紅花即龍眼草上花 瓦松 川百煎各等

分

右為末空心溫新汲水調下

酒蒸黃連丸出德生堂方

治酒食過度便血臟毒諸痔漏及瀉痢赤白臟腑疼痛胷膈痞悶氣不舒暢男子

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

婦人皆可服之解酒毒每
黃連 一斤好酒浸二日鍋内蒸透為度取出曬乾留酒和麵 乾薑半斤 枳殼半斤
木香 四兩
右為末酒糊為丸梧子大每服五七十丸飯飲無時下
犀灰散 出傳信適用方一名異功散 治五積腸風瀉血下痢糞前有血號外痔糞後有血號内痔大腸不收號脫肛
穀道四面有努肉如妳號鼠妳頭上有孔號漏此藥並皆治之 方見痔漏門痔漏類

抵聖散 治腸風下血
椿根白皮 焙 蒺藜子 炒去刺 枳殼 去穰麩炒 防風 去叉各一兩
右為末每服一錢白湯點服
四聖散 治腸風
貫仲 荊芥穗 白蘞 飛過 猪牙皁角 醋炙各一兩
右同燒灰存性為末每服一錢温米飲調下空心食前日三服

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:34
列印頁數：41
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

槐實散　治腸風

槐實（炒黑）　枳殼（去穰麩炒透）　防風　黃耆（剉炒各一兩）

右為末每服一錢茶清調下

神應丸　治腸風經年不差瀉血疼痛

水牛角鰓（燒灰）　楮木頭　乾漆（酒浸一宿炒令烟盡取出各二兩）　槐

下

耳（一兩五錢）

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心熱酒

枳實丸　治腸風

枳實（麩炒）　槐莢（麩炒）　皁莢（猪牙者塗醋炙）　大黃（炒各一兩）

右為末麵糊丸梧桐子大每服二十丸荊芥蠟茶下空心食前服

礬石丸（出十便良方）　治腸風下血久不止下部疼痛

白礬（二兩飛過）　皁莢（二挺去皮存一分性塗醋炙）　附子（不去皮臍炮三度每度炮）

右為末用河水煮麵糊丸梧桐子大每服十丸鹽入水醃殺乾薑（炮各一兩）

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

湯空心食前服

木賊散 方見痔漏門腸痔類 治腸風下血多年不差

烏魚骨丸 治腸風

烏鰂魚骨 罐子內燒赤 肉蓯蓉 酒浸焙各半斤 桑根白皮 劉炒各五錢 蕪荑 各五錢

右為末醋煮乾飯丸梧桐子大空心米飲下五丸

不嚼

防風散 治腸風

防風 去叉炙 黃耆 劉炙二兩 甘草 劉炙 人參 各五錢

右為末每服二錢食前粟米飲調下

黃芩飲 治大腸風熱下血不止

黃芩 去黑心 黃柏 去粗皮 黃連 槲葉 炙各一兩五錢

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分入地黃炙半合去

滓溫服不拘時

野狸骨散 出聖惠方 治大腸風毒下血不止心神虛煩

野狸骨 一兩酥炙 防風 去叉五錢 益母草 五錢 膩粉 一錢

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末每服五分食前温酒調下

治腸風下血不止腹痛日漸厄羸出聖惠方

栝樓一枚生者 槐花一兩 白麵一兩 皁角一挺不蛀者

右共搗作餅子燒令黑色為末每服一錢食前温粥調下

牛角鰓散出聖惠方

治積年腸風或發或歇不止

牛角鰓燒灰 槐耳 臭椿根炙 瓦松炙各二兩

右為末每服一錢食前温粥飲調下

欽定四庫全書

治積年腸風下血出聖惠方

蜜陀僧 白礬搗碎 槐子仁炒為末 皂角燒灰為末各一兩

右將蜜陀僧白礬入磁罐内燒令通赤候冷取出為末入槐子皁角灰相和研令勻粳米丸梧桐子大每服十五丸食前粥飲下

蝕蘇丸出聖惠方

治積年腸風下血不止面色萎黃肌體枯悴

蝕蘇三枚割去蓋子 硫黃研 附子炮去皮臍 乾薑炮劉 猪牙皁

普濟方

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:35
列印頁數：44
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

角 去皮生搗碎各一兩

右共為細末入蜜蘇内以蓋子蓋定用竹籤插之以厚麵裹慢火燒麵黃焦為度候冷取出重研令極細以軟飯丸梧桐子大每服十五丸食前黃耆湯下

五槐丸 出危氏方

五倍子 槐花 陳者 百藥煎 好者各等分

右焙乾為末酒糊為丸梧桐子大每服二十丸空心米湯下日三服一方無百藥煎

治丈夫瀉血婦人血崩漬入大腸出血 出危氏方

豆蔻 檳榔 各紫色炒 罌粟殼 燒灰各等分

右為末每服二錢米飲空心調服

聚金散 出醫方大成

治腸中積熱或因毒大便下血腹中熱痛作渴脈來弦數之證

黃連 四兩一兩水浸曬乾炒一兩灰火炮一兩生用 黃芩 防風 去叉各一兩

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:35
列印頁數：45
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末酒糊丸梧桐子大每服五十丸米泔浸枳殼水下不拘時冬月宜入大黃一兩

香梅丸 出醫方大成

治腸風臟毒下血

烏梅 同核燒存性

香白芷 不見火

百藥煎 燒灰存性 各等分

右為末米飲糊丸梧桐子大每服七十丸空心米飲送下

三神金烏散 出仁存方

治大便下血

卷栢 側栢 棕櫚 各等分

右燒灰存性為末每服三錢以酒調下空心服一

欽定四庫全書

普濟方

方研飯丸梧桐子大服一百米飲下

治腸風久而下膿血日數十度不止 出百一選方一名枳實三百丸

枳實 半兩生用

槐花 半兩生用

皁角 一兩半燒灰存性

右為末煉蜜為丸梧桐子大約可得三百丸每服三十丸食前米飲下酒下亦可甚者一料即安

治腸風 出百一選方

生乾地黃 酒浸

熟乾地黃 酒浸

五味子 各等分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五七十丸酒或湯下因心氣下血人可用妙香散酒調服梁路分患此疾更十七藥不效服此一服而愈又方濃煎黃連湯下連翹丸或紅子丸

治酒毒便血不差經年者出百一選方一名槐花湯

槐斗子一兩 槐花一兩同炒黃色 白礬一分

右為末每服二錢温酒調下

椿皮丸出經驗良方

治大便下血

右為末醋糊丸梧桐子大空心米飲下四十丸

治腸風下血及肛門出出經驗良方

虎爪芳根 金罌子芳根 椿根各等分

右同烏梅甘草半水半酒空心服

治臟毒下血出經驗良方

側栢葉一兩白礬少許湯煮過焙乾 槐花二兩炒為末 棕數片陳者佳燒灰存性

椿樹根皮四面去粗皮焙乾 枳殼麩炒 蒼术各一兩泔浸

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:36
列印頁數：47
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末每服一匙溫酒隨意調下

三栝蔞酒　治便紅

天栝蔞　即木饅頭收二年者為佳　地栝蔞　即白爛田螺殼　水栝蔞　即蓮蓬殼久者佳

治腸風痔漏

右燒灰存性麝香油調下

荆芥三稜　用烏頭炒過切片子　馬兜鈴　穀精草

右等分用水煎沸薰洗大效

欽定四庫全書

治初得腸風及血痔　出本草

以槐粟葉微炙炒槐花減槐葉之半同為末米飲調服熱多者尤佳

治便血

蒲黃　生用　荷葉　頂大　蘿蔔皮　各等分

右將荷葉大蘿蔔皮燒灰存性碾末和勻米湯調下空心服

黃連飲　治腸風瀉血如痢腹中疼痛面色萎黃

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:36
列印頁數：48
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連 去鬚 一兩 乾薑 炮 分 甘草 炙 五錢

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚擘煎六分去滓溫服

黃耆丸 治腸風行步艱難

黃耆 炮剉 枳殼 去穰 炒 各一兩 蔵靈仙 去鬚 二兩

右為末煉蜜丸菉豆大每服三十丸至五十丸用溫水下並不損氣

烏梅丸 治瀉血

烏梅 二十枚 煮去核 白礬 三兩 飛過 訶梨勒 三十枚 炮去核

右將白礬訶梨勒為末與梅肉丸梧桐子大每服

七丸米飲下

神驗膏 治腸風下血冷不入食

背陰臭椿皮 根上不見日者 取剥嫩皮一斤 黑豆 半升 槐花 二兩

右以水五升于銀石器内慢火熬令豆熟為度續入蜜二兩再煎候蜜熟傾出盛淨磁内夜露兩宿每日食後臨卧各一服每服約半盞許用重湯温熱得所

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:37
列印頁數：49
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

旋旋服食

大效丸　治腸風瀉血

大薊根　七截各長一寸又名荊芥　白礬　一兩細研　麝香　當門子豆許大七粒研

右用不霑土大栝蔞一箇割下蓋子不去穰入大薊根白礬當門子在內用篦子左攪七遭安蓋在上以鹽一合和土固臍陰乾用炭火煅透赤便住候冷去泥細研為末取一半為散一半以糯米粥為丸梧桐子大每日空心將大薊苗煎湯調下五分至日午臨臥又煎大薊苗酒下十丸服三兩日便住須服過三五箇栝蔞永去病根

獨活丸　治腸瀉血不止

獨活　去蘆研為末五錢　黃蠟　五兩銀器中鎔成汁　生薑　半斤取自然汁

右以薑汁入熬以汁盡為度次入獨活末令勻衆手急丸梧桐子大每服四十丸以濃陳米飲送下空心臨卧服

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:37
列印頁數：50
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

榮順散　治腸風下血痛不可忍
枳殼 去穰炒 一兩 狹 荊芥穗 一兩 槐蛾 半兩 炒黃
右為末每服二錢温米飲調下不拘時未效再服

龍肝散　治腸風瀉血
伏龍肝 般丹 牡蠣 各五錢
右為末每服二錢陳米飲調下不拘時

治腸風痔漏大便常血 出肘後方
苦桃皮 萹竹 苦參
右煮汁漬之大妙燒稻藁灰汁漬之亦良

治腸風下血疼痛不止 出聖惠方
道人頭 一兩 荊芥穗 一兩 皁角 三寸去黑皮塗醋炙去子
右為末每服一錢食前粥飲調下

内補散 出聖惠方　治大腸風毒下血
黄耆 劉 枳殼 去穰麩炒 側栢葉 炙各一兩
右為末每服二錢食前粥飲調下

治大腸風毒下血不止 出聖惠方

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:37
列印頁數：51
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

枸杞子 槐子 炒 桑木耳 炙各二兩
右為末每服二錢食前黃耆粥飲調下
又方 出聖惠方
枳殼 去穰麩炒 何首烏 乾薑 炮剉各一兩
右為末每服一錢食前粥飲調下
又方 出聖惠方
釜下墨 棕櫚皮 訶梨勒皮 煨各一兩
右為末每服一錢食前粥飲調下
又方 出聖惠方
牛角鰓 棕櫚皮 乾薑 各一兩
右都為末研勻每服二錢食前粥飲調下
牛角鰓 一對 雄黃 一塊如桑子大 麝香 一分細研
右每一隻牛角鰓安雄黃一塊在內以稠泥封閉下面用桑柴火燒熟研為散入麝香和勻又以栝蔞一對亦用桑柴火燒令熟研為散每服栝蔞末二錢

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

牛角鰓末一錢相和令勻食前米飲調下

治腸風下血發歇不止 出聖惠方

荆芥穗 薄荷 枳殼 各一兩 炒去穰 麩

右為末每服一錢食前粥飲調下

又方 出聖惠方

皁莢 不蛀者 三兩 栝蔞 一枚 白礬 二兩

右件藥入瓶内以鹽泥固臍候乾以炭火燒令通赤候冷細研令勻每服二錢食前粥飲調下

神效方 出聖惠方 治腸風積年瀉血不止

黄丹 一兩 白礬 一兩 栝蔞 一枚 去頭入 二味在内

右以物蓋栝蔞頭鹽泥固臍安磚上大火燒令通赤放冷取出搗細為末每服一錢食前煖刺薊汁調下

治腸風積年下血不止 出聖惠方

野狸頭 一枚 桑根西枝 一握 對 附子 一枚

右件藥入瓶内鹽泥封固候乾炭火燒令通赤候

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:38
列印頁數：53
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

冷取出為末每服二錢食前粥飲調下

又方 出聖惠方

皁莢 七挺不蛀者去黑皮塗醋炙去子細研末 寒食蒸餅子 烏龍尾 各二兩

右共為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸食前粥飲調下

又方 出聖惠方

槐耳 半斤切 皁莢 十挺剝去皮子 硇砂 一兩細研

欽定四庫全書

普濟方

右以米醋三升煎取一升去滓再入鐺中以大火養成膏入硇砂和勻丸梧桐子大每服十丸空心及晚食前温粥飲下

治積年腸風下血疼痛 出聖惠方

竈突墨 二兩 荆芥 一兩 木香 一兩

右為末水浸蒸餅為丸梧桐子大每服三十丸食前槐子湯下

治積年腸風下血面色萎黄下部腫痛 出聖惠方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

綠礬 二兩 燒赤 釜底墨 烏賊魚骨 炙焦 各一兩

右為末粟米飯為丸梧桐子大每服三十丸食前

煎赤糙米湯下

又方 出聖惠方

皁角 去黑皮塗酥炙去子 蓁蓁子 炒 各一兩 枳殼 二兩 麩炒去穰

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服二十丸食前枳

殼湯下

治大便下血不止 出聖惠方

生乾地黃 二兩 阿膠 炒碎 白薇 五兩

右㕮咀每服三錢水一盞入竹葉二七片煎至六

分去滓食前温服

治腸風 出本事方

五倍子 白礬 各五錢

右為末順流水為丸梧桐子大每服七丸空心飯

飲下

治腸風瀉血 出本事方

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:38
列印頁數：55
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

牽牛 五兩 牙皁 三兩 炷者不
右水浸三日後除皁角以酒一升煮令乾焙為末煉
蜜丸梧桐子大每服七丸空心温酒下空心日午夜
卧各一服或轉下黄物不妨病後可常服每日五丸
飯飲送下

治腸風及熱毒下血或因食熱物發動 出本事方
金星草 陳乾薑 各三兩
右為末每服一錢新汲水調下

欽定四庫全書

大腸秘

赤小豆 五兩浸出芽曬乾一法蒸令拆 當歸 一兩
當歸赤小豆散 出千金方
治腸毒下血 出危氏方名卷栢散 一方
右為末漿水服方寸匕日三四服

地栢 生土石傍高四五寸根黄如絲上細有黄點正似栢枝曝乾用一作卷栢 黄耆 各等
分為細末
右末每服二錢水調下

普濟方

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:39
列印頁數：56
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治便血及臟毒下血經年瘦者出仁存方
槐花 五倍子 各炒焦 等分
右為末麵糊為丸梧桐子大每服五六十丸米飲吞下食前

荊芥散出經驗良方 治腸風下血
荊芥穗 縮砂仁 各等分
右為末每服三錢用糯米飲調下不拘時日進三服一方食前服

地榆湯出百一選方
地榆洗淨焙乾剖 卷栢不去根洗淨各等分
右㕮咀水一椀沙瓶內煮數十沸通口服不拘時每

萊菔丸出直指方 治腸風下血二三十年者
用一兩

鷹爪黃連 吳萊菔 各等分
右新瓦上同炒候萊菔香熟黑色為度去萊菔不用將黃連為末空心溫酒下二三錢米飲下亦得

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:39
列印頁數：57
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方黃連萊菔陳米糊丸梧桐子大每服五十丸米飲下日二服更以胃風湯煎如法吞下一方名翦血丸用木香一兩濕紙裹煨香以酒糊丸切忌白酒雞肉鮓醬

列印日期/時間：02/05/2005 04:56:39
列印頁數：58
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

普濟方卷三十八

明 周王朱橚 撰

大腸腑門

臟風下血

治臟毒下血 百一選方 一枚約重四五兩 五倍子 不拘多少 鯽魚 一枚去腸胃鱗腮 右以藥置魚腹中入藏瓶以火煅微欲煙盡取出為末温酒送下

又方 一名遠志香 治臟毒下血久遠不差 百一選方 黄連 木香 各等分 右為末蠟茶同調下

治酒毒下血多至升斗者 廬州郭醫云趙俊臣帥合肥日其壻司馬機宜患此服四物湯每料加炒焦槐花二兩如常法煎服止久之復作得此方遂效

猳猪肚 一枚洗淨 黄連 四兩去鬚 右以酒醋各二升半文武火煮候乾控出將肚並黄

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

連研杵極爛丸梧桐子大每服五十丸米飲調下

治腸風下血出氏方危

猪臟一條控乾槐花好淨者炒為末

右將槐花填入臟内兩頭線縛好米醋磁器内慢火細煮爛熟切片子砂鉢内研爛丸彈子大日乾每服用一丸空心食前當歸煎酒下

治便紅如傾水經驗良方

羊屎子根生者一斤所在有之夏秋生紅花結子如羊屎樣又名為鐵箱草子

右將羊屎子根煮生白酒一斗逐日隨量空心服至酒盡而可其生葉搗爛能煽合瘡口散血膿末漿水調用有一客在樟樹鎮胡元八郎家下如厠忽下血如傾水全行扶策卧牀病不能起店主請醫方用羊屎子

神應丸經驗良方

治積年便紅

大黄連去鬚洗淨稱八兩剉碎如黄豆大分作二分一分用薑四兩搗爛絞取汁浸一宿陰乾生薑連皮洗淨用最妙

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末用糕糊丸梧桐子大每服五六十丸空心米飲下

蒜連丸出事方本治腸風臟毒

黃連一兩 獨頭蒜五枚煨香熟

右將蒜研爛和黃連末丸桐子大每服三十丸陳米飲下

治便血經驗良方

黃連四兩 朴硝二兩

右同炒地上出火毒研為末如糞前紅先挑藥於磁盞內用酒調服如糞後紅先盛酒於盞內後挑藥浮於酒上調服

槐花散經驗良方 治臟毒酒病便血

槐花半兩半生半兩炒 山梔子一兩去皮炒

右為末每服二錢新汲水調下食前服

治臟毒寬大腸經驗良方

枳殼二兩浄麩炒 郁李仁一兩温水浸去皮

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末煉蜜丸梧桐子大或如彈子大細嚼空心温酒下

枳殼散 出楊氏家藏方 治腸風下血及治大便急澁

木饅頭 細剉焙 枳殼 去白炒各等分

右為末每服二錢空心槐花煎酒下一方無槐花煎

以野猪肉炙食不過十頓差或將外腎燒灰酒調下亦得

治腸風瀉血 出本草

以梔子仁燒灰水和一錢每服量其大小服之

治下鮮血 出本草

治積年久病腸風下血不止 一名温腸丸治下血當日止一名緑礬丸出聖惠方

緑礬 四兩入砂鍋内用新瓦蓋覆鐵線扣定鹽泥固臍火煅通紅為度候冷取出入青鹽同生硫黄各一兩同礬研過入砂鍋内依法封固再煅通紅候冷取出再研細令勻 附子 一兩炮去皮臍別研為末

右以粟粥丸梧桐子大生地黄汁下温酒米飲下亦可每服三十丸此是氣血虚寒人服如少壯者用青蒿調水酒又臟腑虚弱下血用四物湯加防風烏梅

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煎服一月病源頓除久服益臟腑

治腸風臟毒方

一兩茱萸半兩連　二味同炒不同研

糞前茱萸調酒下　糞後却用酒調連

究原方（一名烏犀方）　治痔疾下血等證（百一選方）

淡豉（十枚重研）　大蒜（二枚煨剝去皮同擂研）

右丸如梧桐子大每服二十丸煎香菜湯下不拘時服一方鹽湯下遇發時絶早空心用陳米飲先下五十丸午時再服一百丸以病安而止可以永絶病根

一無所忌廬州彭知録大辯亦云此藥甚妙其方所用大蒜先蒸九次然後用以和藥仍以冷薑水送下病止即輟藥昔朱解元成言兄子雲及陸子揖提刑皆服之數十年之疾更不復作

猪臟丸（出直指方）　治大人小兒大便下血日久多食易饑腹不痛裹不急名曰野雞痔先用海螵蛸炙黄去皮白者為末以木賊草煎湯調下服之三日後效

欽定四庫全書　普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黄連 二兩 劉研 嫩猪臟 二尺 去肥

右以黄連塞滿猪臟縛兩頭煮十分爛研細添糕糊丸梧桐子大每服三五十丸米飲下

鯽魚方 出聖惠方 治腸風血痔及下痢膿血積年瀉血面色萎黄

大活鯽魚 一个不去鱗肚下穿孔去其腸穢入白礬金橘大 白礬 一塊如

右用敗棕皮重包外用厚紙裹先煨令香熟去紙於

熨斗内燒帶生存性為末每服 闕 錢空心温米飲調下一方用瓦瓶内蓋定炭火燒為灰軟飯丸梧桐子大每服二十丸粥飲下

治下血二十年者

地榆 鼠尾草 各二兩

右水二升煮半頓服不斷水漬屋塵飲一小盞投之不過重作乃愈

二黄丸 出後方 肘 治腸風瀉血

黄耆 黄連 等分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末麵糊丸菉豆大每服三十丸米飲下

治遠年近月腸風下血不止

枳殼 燒灰存性 五錢 羊脛炭 為末 三錢

右和用濃米飲一盞調下空心服五更初一服如人行五里再服當見效忌油膩毒物等

治腸風入胃下血疼痛不可忍

鬱金 五个大者 牛黃 一皂子大另研

右同為末每服用醋漿水一盞煎三沸温服

治腸風下血 出肘後方

枳實 半斤麩炒去穰 一方作枳殼 黃耆 半斤洗剉

右為末非時下二錢若難服糊丸湯下三五十丸

治便血紅

荆芥 燒存性 百藥煎 等分

右用麩糊丸米湯下又熟煮木耳食之

阿膠丸 聖惠方

治腸風瀉血不時腹內疼痛

阿膠 炒燥 刺蝟皮 炙 當歸 剉 地榆 龍骨 研 訶梨勒

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:08
列印頁數：7
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煨去核 黄耆 劉 赤石脂 研各一兩 枳殼 麩炒去穰 惡實 炒各三分 黄牛角鰓 二兩燒灰 槐實 炒三兩

右為末軟飯丸梧桐子大每服三十丸米飲空心食前服

治被通中内留腹滿

生地黄汁 一升 白芒硝 三兩

右相和火上令熱通口頻服即血便息

治腸風臟毒下血不止

枳殼 去穰麩炒 無紋炭 各一兩

右為末每服一錢用荆芥米飲調下

烏金散 治腸風下血

猪牙皂角 四兩并皂子劉 胡桃 三十枚并皮炒碎

右和勻以藏瓶一隻於頂上敲一圓竅入前項藥以元瓦蓋之後用鹽泥固臍可厚一指許爆乾用炭火五斤煅候碧煙出絶即去火畧存性冷即出藥細研每服二錢入麝香少許温酒或米飲調食前服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治腸風下血

栝樓 一个為末 赤小豆 各半兩

右為末空心酒調服一錢

胡荽子散 治腸風下血不止變成痔疾

胡荽子 補骨脂 各半兩

右為末每服二錢陳米飲調下食前服

棕艾散 出聖惠方 治腸風瀉血不止腹痛

棕櫚灰 二兩 熟艾 搗羅成者 一兩

右用熟雞子二箇同研得所別炮附子去皮臍為末一錢煎數沸放温調前藥二錢空心食前服一方不用附子用粥飲調服

神效散 治腸風

槐實 皂莢子 各一兩

右用穀糠同炒令香熟去糠為末每服一錢煎陳粟米飲調下空心食前服

荆芥散 治腸風

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

荊芥 去莖 枳殼 去穰麩炒 各一兩

右為末每服逐味炒一錢拌勻入蠟茶末一錢熱湯點服不計時

樗根散 治腸風下血不止

樗根皮 劉炒 臭橘 爆乾劉炒 各三兩

右為末每服一錢煎皂莢子湯調下米飲亦得

槐荊散 治腸風下血

槐花 炒令香 一兩 荊芥穗 一分

右為末每服二錢糯米粥飲調下甚者一兩服效單

使槐花亦妙食前服之一方用酒調服

靈仙散 治腸風病甚不瘥

蕨仙靈土 去雞冠花 各二兩

右剉碎以米醋二升煮乾更炒過搗為末以生雞子清和作小餅子炙乾再為末每服二錢空心陳米飲調下午後更一服

絮灰散 治腸風瀉血

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:09
列印頁數：10
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

破絮 燒灰 枳殼 去穰麩炒各半兩

右為末每服二錢入麝香少許用陳米飲調下食前服

香术丸 治腸風痔漏脫肛瀉血面色萎黃年久不瘥

白术 一斤糯米泔浸三日細研劉炒焦為末 乾地黃 半斤淨洗用碗盛於甑上蒸爛細研

右相和如硬滴好酒少許衆手丸梧桐子大焙乾每服一十丸空心粥飲下加至二十丸

治便血

黑豆 一合 粉草 二條不拘多少

右水一碗半煎八分作二服調雞爪黃連末不拘多少空心服之

治腸風下血毒氣攻注大腸疼痛

鮮鯽魚 一枚重半斤者 硫黃末 一兩

右將魚不去鱗開腹去腸入硫黃在内用濕墨紙裹五七重又以泥厚封之候乾以大火燒令通赤取出

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

於土坑內出火毒半日細研為末每食前以酒研蕓薹子汁調下一錢

治腸風下血久不止大腸虛冷

附子炮去皮臍白礬燒灰各一兩

右為末每服二錢食前粥飲調下

治大腸風毒下血不止出聖惠方

薄荷一握麥蘗二兩炒

右為末不計時以茶點服

又方出聖惠方

雲薹子生甘草炙剉各半兩

右為末每二錢水一盞煎五分食前温服

又方出聖惠方

槐耳二兩燒灰炒乾漆一兩炒

右為末每一錢食前温酒調下

又方出聖惠方

附子一枚炮去皮臍生薑半兩

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:09
列印頁數：12
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右咬咀水一大鐘煎至五分去滓食前温服

又方 出聖惠方

棕櫚皮 半斤燒灰 栝蔞 一个炒灰

右為末每服二錢食前粥飲下

治腸風下血發渴不定 出聖惠方

膽子礬 二兩細研 栝蔞 一枚上開一口

右以礬入栝蔞内坐於慢火中更入米醋一小盞煨令醋乾却入罐子内以大火燒令通赤取出放冷細研用糯米飯和丸梧桐子大每服二十丸食前粥飲

下

又方

釜底煤 四兩 漢椒 二兩去目及閉口者炒去汗

右為末軟飯丸梧桐子大每服三十丸食前粥飲下

治大腸風毒下血 出聖惠方

蝟皮 一枚炙 皂角 三挺去黑皮塗醋炙枯去子

右為末軟粟米飯丸梧桐子大每服十五丸食前粥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

飲下

又方 出聖惠方

白礬 二兩燒汁盡 乾蝎 二兩炒

右為末每服半錢食前粥飲下

又方 出聖惠方

益母草 端午日採 藕節 六月六日採並陰乾各二兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸食前温米飲下

又方 出聖惠方

皂莢 五挺不蛀可長一尺者去黑皮塗酥炙三兩炙盡為度 白羊精肉 十兩細切

右先搗皂莢為末後與肉搗令熟丸梧桐子大每服二十丸食前温水下

治腸風積年下血 出聖惠方

鹿角膠 二兩炙 沒藥 半兩

右為末每服一錢食前粥飲調下

神效方 出聖惠方

治積年腸風下血不止

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:10
列印頁數：14
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

酸石榴皮 慢焙火 側栢葉 慢火焙各二兩
右為末每服二錢食前以木賊湯下

温白丸 治臟毒下血及腸風
用椿根白皮北引者去粗皮酒浸曬乾為末棗肉丸
梧桐子大每服三五十丸淡酒下或酒糊丸一方用
東行者醋糊為丸陳米飲下

治腸風及脫肛不收有血下部腫悶疼痛 出聖惠方
用不蛀皂莢五莖搥碎水一碗揉令皂角消盡絹二重
濾過取十分清汁將脫肛腸浸在藥水中自取收不
用手蕩如大腸收了更用湯盪其腰肚上下令皂角
氣行則不再作一方去黑皮塗醋炙為末棗肉丸梧
桐子大每服一十五丸食前粥飲下

治腸風瀉血 出本事方
用皂角樹上蓦新瓦上焙乾為末每服一錢温酒下

治腸風及熱毒下血或因食熱發動 出本事方
用赤小豆一升瓦上炒令小黑色為末每服三錢空

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

心粥飲下日一服一方杵末水調服方寸匕一方治卒下血搗碎以水二升絞汁飲之

又方出本事方

用好栝蔞三箇燒灰存性為末每服三錢米湯空心調下

又方

用蕨菜花不拘多少文武火焙乾為末每服三錢飯飲調下

治腸風出本事方

用好線茶不拘多少燒灰存性温酒調下二錢空心服一名蠻瓜一名天羅又名天絲瓜其實皆絲瓜也

治腸風並脫肛及有血出本事方

用蛇床子不拘多少炒為末去大腸肛垂處貼立收

烏梅丸一名獨聖散治大便下血不止兼治久痢下腸垢亦治酒痢

用烏梅三兩燒灰存性為末好醋打米糊為丸梧桐

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:11
列印頁數：16
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

子大每服七十丸空心食前用米飲送下當歸湯亦可一方研末每服二錢空心米飲調下一方為末五更煮糯米清粥以藥末鋪粥面喫一層又用藥末喫粥盡為度

必效散 一名霜柿散

治腸風臟毒用乾柿燒灰存性為末每服二錢米飲調下空心服一方用糊丸有人服之累有應效○百一選方云痔腸風臟毒一體病也極難得藥亦緣所以致疾不同雖良藥若非對症難一槩取效常人酒色飲食不節臟腑下血是謂風毒若釋子輩患此多因飲食久坐體氣不舒而得之乃脾毒也○王渙之舒州下血不止郡人朝議大夫陳宜父令四時取其方栢葉如春取東枝夏取南枝之類燒灰調二服而愈予既得此方後官贛上以治貳車吳令昇亦即效提點司屬官陳逸大夫偶來問疾吳倅告以用陳公之方而安陳君蹙頞曰先人也仍須用側栢尤佳道場慧禪師曰若釋

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

子恐難用此不若灼艾最妙平量脊骨與臍平處椎上炙七壯或年深更於椎骨兩傍各一寸灸如上數無不除根者又予外兄劉向嚴掾予過之留飲訝其瘦瘠問之答云去歲臟毒作凡半月自分必死得一藥服之至今無苦問何藥不肯言再三叩始云只這桌子上有之即是乾柿燒灰飲下二服本草云柿治腸風解熱毒消宿血後有病者宜以求之素問腸僻為痔曾茂招通利之子年十餘歲時常苦此凡治腸風藥如地榆之類遍服無效因檢書見此方用之一服而愈是乾柿燒灰者曾與予合肥同官親云爾

虎目湯 出仁存方 治便血及臟毒下血經年瘦者用好樗根咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓酒半盞或作丸子服亦可虛極人加人參等分極效一方為末空心溫酒調下或米飲下樗根即大眼桐一名虎眼樹一名山椿

治腸風瀉血并熱痢及殺疳虫 出肘後方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用苦參炒焦黑為末糊丸梧桐子大每服五六十丸米飲吞下一方煎服一方為末飯飲下

猢猻散 出仁存方 治腸風失血

右猢猻薑不拘多少去毛炒用酒煎去滓空心服一方燒存性碾為末米飲調下

治腸風 一名白梅飲出余居士選奇方

用橡斗子不拘多少用白梅肉以蜜拌和填在橡斗子内候滿兩箇相和鐵線紮之烈火煅存性為末米飲調下一方治便血用橡斗子以生硫黄合之紙裹鹽泥固臍燒煅存性為末空心酒調下二服

治臟毒下血久遠不差者 百一選方

用大蒜一枚上面切開作蓋子每一瓣中插帶殼巴豆一枚却蓋了將濕紙兩三重裹文武灰火煨香熟去巴豆不用將蒜爛研和丸加黄連細末得所丸梧桐子大空心米飲下二丸

又方 百一選方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用烏梅肉生乾地黃等分煉蜜丸梧桐子大米飲下五七丸不拘時

又方 百一選方 治臟毒下血久遠不差者

用茶節翦葉燒成黑灰研細入麝香少許空心糯米飲調下

治腸風 百一選方

用蜜炙蘿蔔任意食之昔曾見一婦人服之立愈

治下血久不差 百一選方

用地榆洗淨去鬚蘆為末糯米糊為丸小豆大每服三十丸米飲下日三服一方止腸風濃煎服

治腸風 一名白芷散余居士選奇方

用闕香為末米飲調下神效

治下血 百一選方

用葱鬚新瓦上炒乾為末每服二三錢米飲調下

治酒毒腸風下血 出百一選方一名螺殼散

用大田螺五箇洗淨仰頓放在火上燒殼白肉乾為

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

度為末只作一服熱酒下

治腸風 百一選方

用魏桑葉燒黑灰存性每服二錢米飲調下更量虛實甚虛人恐動臟腑

治腸風下血及酒毒下血 百一選方

用山裹棗俗名鼻涕團又名酸棗乾為末服之一方

燒末米飲下

又方 出危氏方

用栢樹子十四枚搥碎紗囊貯好酒三盞煎至八分

服之反覺加多再服立止

治便血 經驗良方

用荆芥炒為末每服二錢米飲調下婦人失血過多或經候不調溫酒調下一方拌肉餛飩麵裹煮食尤妙

絲瓜散 經驗良方

治酒痢便血腹痛或如魚腦五色腥穢者

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:12
列印頁數：21
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用乾絲瓜一枚連皮燒灰存性俗名魚滋是也為末酒調二錢空心服一方煨食之愈

經驗散　治腸風酒痢下血又治鼠子痔出血亦治血

痔

用黑狗脊不拘多少黃者不好須是黑者內肉赤色去皮毛剉焙乾為末每服二錢空心米飲調下難喫方二兩去蘆頭燒灰存性用瓦合地去火毒為末麝將醋糊丸梧桐子大每服三四十丸空心米飲下一香一字研勻米飲服二錢

本草名賈仲圖經云苗狗脊皮黑肉赤又名作草鶚頭是也

又方　出聖惠方

用白寇花炒棕櫚燒存性羌活各一兩細末粥飲調下二錢

黃花散　治臟毒大便血不痛

用槐花二兩新淨者炒黃為末每服二三錢溫酒下三服一方用陳久者為末亦以槐白皮煮汁調服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治糞後解紅 出危氏方
用艾葉濃煎生薑汁三合服一方艾葉煎湯服
又方
用紫菀末水調五撮服止又可用王不留行
又方
用凌霄花浸酒服
又方
用桑樹上白鮮花煎服為末調服亦可并止吐血

又方
用黃柏為末水調服
又方
用白雞冠花并子炒煎服
治便紅
用當歸酒飲立愈
又方
用鐵門□根煎酒服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方

用棕笋煮熟薄切曬乾為末蜜湯或酒調下

又方

用枯桑樹下蟲屎燒灰存性酒調服

又方

用萱草根和薑油炒酒濺服

又方

用鼠鳩禽俗謂鼠勾焙乾為末酒調服更能治百病

普濟方

治腸風下血不止

用秋後採楮皮陰乾不拘多少入麝香少許共為末

酒調三錢空心服

水調散出肘後方治多酒腸風及瀉血

用老山梔子不拘多少去皮研細如油出成團即擘開猛火焙乾手擦羅取末磁器盛貯臨發時新汲水調服一方梔子三十枚水三升煎一升去滓服一方燒灰水和一盞盞不量大小多少服之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治酒毒便血血濺
用麴一塊濕紙煨碾細空心米飲調二錢
橄欖散 出直指方 治腸風臟毒久不止
用橄欖核於燈燭上燒存性為末每服二錢陳米飲
食前調下
黃龍丸 一名酒連丸 出直指方 治腸風臟毒及暑瀉熱瀉
用黃連淨八兩酒一大升煮乾研細水麵糊丸梧桐子
大每服四十五丸陳米飲調下傷酒大便下血空心
熱水下又名香蘇散加黃連荊芥枳殼服
治腸風痔瀉血
用羊蹄根葉蒸爛一碗食之立差
用茄蒂燒灰存性為末每服三錢食前米飲下
茛菪煎 出聖惠方 治腸風積年不瘥羸弱
用茛菪實一升治之曝乾搗篩生薑半斤取汁相合
銀鍋内更以無灰酒二升投之煎令如稠餳即旋投

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

酒用酒可及五升以來即止煎令可丸乃丸梧桐子大每旦酒飲通下三丸增至五丸七丸上止若丸時粘手則菟絲粉襯隔煎熬切戒火緊使藥易焦而失力初服微熱勿恠疾甚者服過三日當下利疾去利亦止絶有效一方有熟地黄半斤為末和丸

治臟毒下血出肘後方

用苦楝子炒令黄為末蜜丸米飲下十丸至二十丸

治卒下血不止

用龍膽一虎口水五升煮取二升半分為五服

治瀉血不止

用木賊草十二莖切水一升八合煎八合去滓空心温服分二服如人行五里又至又服

治久年腸風等疾須常服勿令歇服之及一月諸疾皆愈及治久患腸風痔漏三十年不差面色虚黄飲食無味及患臟腑傷損多患泄瀉暑月常瀉不止及諸般淋瀝久患消渴婦人月候湛濁赤白帶下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

多年不差應是臟腑諸疾皆主之

用石燕洗淨刷去土每日空心服一枚於堅固無油

磁器内温水磨服如彈丸大者一箇分三服大小以

此為準晚食前更一服若欲作散須先杵羅為末

以磁石器杵頭鐵屑後更入堅鉢内以硬乳鉢槌碎

研細水飛過取白汁如泔乳者澄去水曝乾每服半

錢至一錢清飯飲調下温水亦得

治腸風 海上名方

欽定四庫全書

用銀杏爆熟出火氣每二箇用薄荷煎一丸細嚼米

飲送下

治男子臟毒下血

用冰蜜水任意飲之

法製香附方 治諸下血

用大香附去毛皮童便浸一日候乾又以醋焙為末每

服二錢米湯下治冷帶以炒艾煎湯下或酒醋各半焙

黄秫米為丸梧子大每服五十丸米湯下

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治糞前有血令人面色黃 出肘後方

用石榴皮杵末茄子枝湯下

治腸風

用肥皂獨牙者燒灰存性以一片研末糕糊丸一片

治多酒腸風瀉血及熱至多鮮血箭出如紅線者 出俚信適

為末飲湯調吞下

用方

用好實黃連三兩淨洗日乾分為三分一分剉作半寸

欽定四庫全書

截入陳米一兩炒黃色一分亦剉作截以手炒熱為度

一分生同焙為細末粟米粥和丸梧桐子大每服五

十丸空心溫陳米飲下一服立效如急速不及製只

用生黃連為末依法用之二服抵一服功亦治血痢

水瀉一方焙乾為末酒調下

治腸風下血疼痛不止 經驗良方

用敗毒菜根洗淨切片用連皮生老薑各半盞許同

炒赤却用無灰水酒一椀煎之就以椀蓋之令數沸

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

去滓取酒隨意飲之

如神丸　治腸風下血不止

用樗根皮於臘月內日未出時取背陰地北引者不

拘多少東流水淨洗剉碎於透風處挂令乾杵細

末每稱二兩入寒食麵一兩拌令勻再羅過入新

汲水丸梧桐子大陰乾每服三十丸先以水藥丸

令潤後於碟子內用白麵滾過水煮五七服傾出

用煮藥水温下不拘時服忌見日色見日無效此

藥兼治血痢如急要使不及臘月隨時依採合

椿荚散　治腸風下血

用椿荚不拘多少將一半生用一半燒存性為末每

服二錢温米飲調下不拘時

保應丸　治腸風瀉血諸藥不效

用天南星不拘多少用石灰炒黄色為末煮酒麵糊

丸梧桐子大每服二十丸食前温酒服

烏金散　治腸風瀉血

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用木鱉子不拘多少桑柴燒過微存性便用椀器合之候冷碾為末每服一錢煨葱白酒調空心服

決效方　治瀉血不止

用巴豆一枚去皮以雞子開一小竅入豆以紙塞定別以濕紙裹用火煨熟透去殼并巴豆將雞子喫盡其病即止不得少生氣若虛人分作二服

茄子酒　治久患腸風瀉血

用茄子種大者叁枚先將一枚濕紙裹於糠火内煨熟取出入磁罐子乘熱以無灰酒一升半沃之便以蠟紙封固經三宿去茄子煖酒空心分服如是便作不過三度差

又方

用黑豆小者三升淨揀退去皮搗為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心陳米飲下

蛇黄散　出聖惠方　治腸風下血不止及脱肛腫痛

用蛇黄兩顆醋淬七遍搗研如麵每服三錢陳米飲

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:15
列印頁數：30
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

調下

又方

牡蠣大者一枚煅淬七次細研每服三錢陳米調下日再服

治腸風痔漏大腸血

用枳殼根皮搗羅為細末每服一匙日三次亦可

抵聖枳殼丸 治五種腸風瀉血痔漏

枳殼根皮炙 枳實炙 各二兩

煮汁常飲甚妙一方用枳實根皮

枳殼 去穰麩炒 蕺靈仙 去苗土 陳皮 去白焙 續斷 各二兩

地黃 焙 連翹 槐實 炒 附子 去皮臍炮 乾薑 炒 白礬 煅過 生乾

人參 去蘆 羌活 去蘆頭 地骨皮 各二兩 何首烏 用米泔浸一宿竹刀刮去皮切二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心溫陳米飲下

大效勝金丸 治結陰便血及腸風不止

羊肉 精者去筋膜切一斤半用硫黃末糝在肉中以好醋一斗於銀石器中浸一伏時慢火煎

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

如泥入臼杵千下硫黃滴生甘草汁研三日極細候乾糝入肉中葫蘆巴革者二枚

澄茄沈香劉各半兩巴戟天去心補骨脂炒牛膝肉蓯蓉與牛膝同酒浸切焙同海同皮劉桂去粗皮白茯苓去黑皮甘草炙劉各一兩人參各一兩丁香一分肉豆蔻去殼三枚附子炮去皮臍用大

右除羊肉外搗為末以羊肉膏拌勻更杵千餘下丸梧桐子大每服二十丸空心溫酒下加至三十丸

紫參湯 治便血

紫參 茜根 赤芍藥 阿膠 蒲黃 青竹茹各一兩 黃芩去黑心 雞蘇葉 小薊根去土各三分

右㕮咀每服三錢水一盞生薑半塊大棗擘碎煎至七分去滓食後溫服

地榆散 治結陰瀉血

地榆 桑耳 甘草 赤芍藥 熟乾地黃焙伏龍肝各四兩 艾葉炒一兩 黃耆劉六兩

右為細末每服三錢米飲調下食後臨臥日三服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蝟皮散　治大便下血（方見痔漏門血痔類）

地黃煎丸　治結陰便血

生地黃汁　小薊汁各一升　沙糖一兩（同上二味熬成膏）　地榆根（劉焙）　阿膠（炙燥令焙）　側栢（焙）各二兩

右除上三味外搗為末入膏中丸小彈子大每服一丸水一盞煎至六分和滓温服

桂苓湯（一名桂心湯出聖惠方）　治結陰便血至三二升者皆由臟氣虛傷腹中疼痛

桂（去粗皮）　赤芍藥　苓蘑　當歸（焙）　黃芩（去黑心）各一兩　甘草（炙剉）半兩

右㕮咀每服三錢水一盞入竹茹彈子大一塊煎七分去滓空心温服日二服

屋龍丸　治大便下血腹内痛不可忍

屋龍尾　伏虎肝　黑（鬪燒令煙斷）當歸（切焙各一兩）　皂角子仁（炒半兩）

右為末麵糊丸梧桐子大陰乾每服三十丸煎生薑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

艾葉湯下空心食前服

神仙必效丸　治便血無度

阿膠　炒燥　二兩　當歸　切焙　烏賊魚骨　去甲　白芍藥　劉寄奴　各一兩

右為末蜜丸梧桐子大空心米飲下三十丸加至五十丸

阿膠芍藥湯　一名四神散　出聖惠方　治便血如小豆汁

阿膠　赤芍藥　當歸　切焙各一兩　甘草　炙剉半兩

右㕮咀每服水一盞半藥五錢入竹葉二七片煎八分去滓食前温服

黑神散　治久下血

藁本　去土　烏頭　炮去皮臍　皂莢　酥炙去皮子　蜜陀僧　搗碎研各等分

右熬斗内用炭燒黑取出為末每服二錢煎胡荽酒

調下

石榴散　出生濟方　治結陰瀉血不止

醋石榴皮　湯浸去白　甘草　炙剉　乾薑　炮各等分

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:16
列印頁數：34
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右焙乾為末每服二錢陳米飲調下日三服

芍藥湯 出王氏博濟方 治非時便血

赤芍藥一兩 去粗 桂皮一兩 去粗 甘草炙剉半兩

右㕮咀每服五錢水一盞入生薑二片煬少許煎至七分去粗溫服

立效湯 治大便下血

瞿麥穗一兩 甘草炙剉三分 山梔子仁炒半兩

右㕮咀每服五錢水三盞連根葱三莖擘破燈心二十根生薑七片煎一盞半去滓分溫三服

地榆湯 出論方宣 治結陰下血不止漸漸極多腹痛不已

地榆粗者四兩 甘草三兩半 炙剉

右㕮咀每服五錢水三盞入硝砂仁四七枚煎一盞

半去滓分溫二服

薤香子湯 治結陰下血不止腹痛

薤香子炒三兩 草烏頭炮粉同炒去皮臍剉一兩

右令勻每服三錢水一盞入鹽少許煎至八分去滓

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

露至五更冷服

雞冠丸　治結陰便血不止疼痛無時

雞冠花　椿根皮（並剉等分一用臭椿皮）

右為末煉蜜如梧桐子大每服三十丸濃煎黃耆湯下空心食前日三服

蕪荑丸　治下血結陰

用蕪荑一兩搗碎研細用紙裹壓去油再研為末用雄猪膽丸梧桐子大每服九丸甘草湯下日五六服

連三日可斷根

金屑丸　治便血一切血妄行結陰

用葉子雄黃不計多少入棗肉內線縛定滿煎湯用鉛一兩五錢鎔成汁傾入湯內同煮自早至晚不住添沸湯取出研令極細其棗子以磁器盞子盛於飯上蒸過取肉丸梧桐子大每服三丸煎黑鉛湯下便血甚者只三服差

金虎丸　結陰便血

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用黃蘗一兩去粗皮雞子清塗炙為末滴水丸菉豆大每服七丸温水下 出聖惠方

治大腸風毒瀉血不止 出聖惠方

用檻藤子三枚厚重者以七八重濕紙裹煨良久脹起去殼用肉研為末每於食前以黃耆湯下一盞

治腸風臟毒瀉血不止 出聖惠方

用五倍子擘破一半燒熟一半生用分兩不限多少為末陳米軟飯丸如梧桐子大每服二十丸食前

欽定四庫全書

普濟方

粥飲下

又方 出聖惠方

用何首烏二兩為末每服一錢食前温粥飲調下

治腸風瀉血不止甚者面黃弱瘦 出聖惠方

用川烏頭一兩去皮臍生用為散每服三錢水一中盞入生薑半分黑豆一百粒煎至五分去滓食前温服

治熱毒下血或因食熱物發動 出本草

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用生葛根二斤搗取汁一升并藕汁一升相和服

龍骨餅子　治臟毒便血不止

用龍骨烏賊魚骨各等分為末每服一錢入雞子清一枚白麵同和揑作餅子三枚糠火内煨熟細嚼用温米飲送下空心食前服

治腸風臟毒酒痢下血　出本事方

用黄連生薑湯下二氣丹次服五槐丸

用煎黑散調消風散又煎黄連湯下連翹丸或紅丸

欽定四庫全書　普濟方

治腸風　百一選方

治臟毒

子　黑散亦作婦人產藥黑神散

用槐角丸釣腸丸三黄丸烏梅丸酒蒸黄連丸同大

烏沈湯以沸湯調下

治腸風下血

用生料四君子湯煎服更患痔瘡亦服此藥即愈

治便血

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用胃風湯加粟米煎服

治臟腑虛損不收久作腸風下血出危氏方

用震靈丹玉華白丹二藥夾用煎不換金正氣散加川芎空心嚥下

治腸風出危氏方

用消風散米飲調吞烏荊丸酒蒸黃連丸隨意服

治臟毒便血不瘥裹急後重

用紅丸子小理中丸三稜丸連翹丸酒蒸黃連丸好酒空心服藥味分停加至一百丸每日三服三日立愈

治咽熱

出汗即投水中浴又值雨便血不效服諸藥難瘥用服五苓散獲安

治腸風

用胡荽子和生菜熱餅裹食良甚

黃耆湯

若血隨大便而下或先或後此飲食不節饑飽不時

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:18
列印頁數：39
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

勞傷脾胃榮衛不調或強忍大便氣無從出腹陷於
陰氣併於陰則血失常經或醉飽房勞酒入於胃絡
脈滿而經脈虛勞動則氣血相併不勝者為病故先
便而後血者其血遠先血而後便其血近所下不常有
所觸動則作血遠者宜 方見諸血門 諸失血類
烏荊丸 治腸風下血諸風拘攣每服二十丸用枳殼
散送下
聖金丸 一名百藥散 百一選方 治腸風下血溺血不止及臟毒
或無故便血
用百藥煎三兩生一兩炒焦一兩燒存性為末丸梧
桐子大每服五十丸米飲空心服一方用軟飯蜜丸
空心亦可一方為細末每服二錢米飲調下
四季側栢飲 治腸風臟毒瀉血不止
用草烏頭去皮尖切如黑豆大炒令焦色喫見不麻
方住炒用韭菜攪自然汁和丸如梧桐子大每服空
心陳米飲下十四丸不過兩服即瘥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

敗毒散　治脾毒下血臟腑疼痛頻往圊厠後重努咽
槐花　炒　白礬　燒　味等分　及八分許存性二
右為細末每服烏梅一箇藥一錢水一盞煎至六分
去滓温服
側栢散　治腸風臟毒酒痢下血不止
嫩栢葉　九蒸九曬二兩　陳槐花　一兩炒　半黑色
右為末煉蜜丸梧桐子大每服四十丸空心温酒下
槐花丸　治臟毒腸風下血
槐花　半兩炒　黄連　半兩淨　擇炒　木香　二兩　曬乾
右為末用烏梅十箇酸醋浸一宿取肉熬成膏同前
藥搗勻為丸如乾入少許煮梅醋和丸梧桐子大每
服十五丸至二十丸血成痢不止以地榆三寸搥碎
空心食前煎湯下或酒或穀道疼痛緊逼連進三
服尋常兩日一服
如聖丸　治腸風臟毒下血不止日久羸瘦
大蒜　研細　淡豆豉　地榆　各等分

欽定四庫全書　普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末大蒜同研令勻入煉蜜少許搗令得所丸如梧桐子大每服三十丸煎椿葉湯下空心服無椿葉取大眼桐皮刮青皮煎白湯下

血餘散　治瀉血臟毒一服效

血餘（燒灰）半兩　雞冠花根　栢葉

右為末臨卧温酒調下二錢來晨酒一盞投之立愈

没藥丸　治氣及酒毒瀉血泄瀉腰腿重及大便血似腸風者神驗

没藥（半兩）　五靈脂（三兩）　川烏頭（一兩四錢炮製去皮臍炒至黑焦色）　大附子（一兩）

當歸（大者一兩去蘆酒浸）　熟地黄（洗浸再酒浸一宿焙乾二兩）　川芎（一兩）　鷰

右為末稀糊丸梧桐子大每服十五六丸艾湯下米飲鹽湯亦得空心食前

當歸地黄丸　治男子婦人腸胃氣傷下血不止或鮮或黑日夜頻併及血氣衰弱皮膚枯燥腰脚疼痛榮衛不足渾身酸痛血氣虚肌瘦者尤宜服之

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:19
列印頁數：42
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

卵攀 二兩火煅盆覆地上出盡火毒
右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心鹽湯或
温酒服至五十丸
茶箬胭脂散 治腸風下血
茶箬 一握 綿胭脂 十箇 白梅 四十九枚
右件共燒灰和勻米飲調下二錢空心服
絲瓜散 治下血甚不可救者
絲瓜 一箇一名天蘿燒灰存性 槐花 等分如氣虚減分
右為末每服二錢飯飲調服神效
黄耆散 出指南方 治遠血
黄耆 二兩 甘草 半兩 枳實 三十箇去皮 青州棗 二十箇擣爛焙乾去核慢火煨
右為細末每服二錢匕米飲調下
地黄丸 出指南方
地黄 二兩 王瓜 一兩新瓜用炭火燒灰存性研 黄連 五錢
右為細末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸米飲下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

蒲黃散 出指南方 治純下青血

蒲黃 三兩 微炒 木賊 末一兩

右為細末每服二錢匕米飲調下

杏丹 出十便良方 治臟毒下血

杏仁 四十九粒 去皮尖 蠟一兩

右二味白中熟杵自然可以為丸每服空心米飲下

三二十丸忌魚腥服永不發曾有人服之效後傳與

一人每服即止惟不能忌魚腥然發亦不至於甚

通神散 出十便良方 治瀉血

縮砂仁 不拘多少 去粗皮

右為末米飲調熱服有效

斗肛丸 出十便良方 治大便後出血

白礬 附子 乾薑 各一兩

右搗篩蜜和丸如梧桐子大米飲服十丸至二十丸

日二忌猪雞酒麵生冷魚油膩等物

蓮子散 出家藏經驗方 治新舊腸風臟毒下血

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:19
列印頁數：44
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

旱蓮子

右用新瓦上焙乾為末每服二錢米飲調下食前服

人參散 出家藏經驗方

治腸風臟毒

人參 白茯苓 黃耆 蜜炙 甘草 五味子 各等分

右共為細末每服二錢白湯調下每日三五服孫運使云有此疾常常服之不至力乏不至面黃多多為佳皆以為妙

附子當歸丸 出續易簡方

治腸風冷在腸胃下血手足冷而脈微小

當歸 洗焙 三兩 白芍藥 一兩 附子 去皮 白术 各一兩

右為末醋麵糊丸如梧桐子大米飲下五十丸食前服

鳳眼草散 出楊氏家藏方

治腸風下血

鳳眼草 揀淨即椿樹葉也 褐油血 水洶淨已上二味各四兩 枳殼 去穰二兩 麩炒 麩字一 輕粉

右為末每服二錢酒調下米飲亦得空心食前服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

地榆散 出楊氏家藏方 治腸風下血不止

地榆 訶子 煨去核 赤芍藥 橡斗 各一兩

右為細末每服二錢酒調下米飲亦得空心食前服

蝟皮散 出楊氏家藏方 治腸風下血

刺蝟皮 一枚於銚子內煿焦去皮只用針 五錢 木賊 炒黃

右為細末每服二錢熱酒調下空心食前服

立聖散 出楊氏方 治年深日久腸風下血或如雞肝日夜無度全不入食通身黃腫者兼治尿血

黃連 去鬚 一斤

右為細末每服一錢濃煎荊芥蜜湯調下空心食前服

松皮散 出楊氏家藏方 治腸風下血過多

松木皮 就木上用刀刮麁者只取貼木嫩皮

右剉細焙令半乾再入銚內慢火炒乾為細末每服一錢入蠟茶一錢白湯點服食前

如聖散 出楊氏方 治年深日近腸風下血或諸般痔漏

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

臘日野狸一枚盤在瓦罐子内大棗半升枳殼半斤甘草四兩寸截猪牙皂角二兩都入在罐子内上用瓦片蓋定再加鹽泥封固候乾作一地坑用十字瓦支足令罐子不著地用炭五秤簇燒至黑煙盡若有青煙出便去火取出用濕土罨一宿研令極細每服二錢鹽湯調下一方取野狸淨肉製造美食次將骨燒灰每服一錢温酒調下並空心食前

鹿茸丸 出如宜方 治虚老人陽氣虧脱血不能存走失大腸

鹿茸 製十兩 熟地黄 十斤 附子 製十箇 牛膝 製二十兩 五倍子 二斤 山藥 四斤 肉蓯蓉 三斤 杜仲 製二斤半

右為末蜜丸梧桐子大麝香為衣每服二三十丸鹽湯温酒吞下

芍藥丸 出朱氏集驗方 治酒毒下血

芍藥 炒 白雞冠花 炒 陳槐花 各等分

右取青蒿根汁煮丸米飲下三十丸空心服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

四聖丸 出集驗方 治大便血一切下血
香白芷 枳殼 性燒存 川百藥煎 性燒存 烏梅 燒存性 各等分
右為末糊為丸每服五十丸空心米飲下熱水亦得
如聖散 出集驗方 治腸風下血等疾
革薤 細研 貫仲 去土
右等分為細末每服二錢空心温酒調下
梔葉飲 出集驗方 治便血
側梔葉 多用入白礬水煮焙乾 川百藥煎 炒 蔓荊子 炒二味等分
右入乳香末濃米飲下兩服見效

當歸丸 出集驗方 治酒毒下血
當歸 芍藥 炒 白雞冠花 陳槐花 炒各等分
右為細末青蒿根煮汁為丸米飲送下三十丸空心服

治虛老人便血 出永類鈴方
大艾葉 用好醋加糯米煮半日同搗作餅子焙乾 鹿茸 製 當歸 製 烏梅肉 茜根 各一兩淨

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:20
列印頁數：48
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末以烏梅為丸米飲送下二十丸空心服神效

治坐卧熱地因熱暴下便血 出永類鈐方

用薄荷煎同雪糕為丸荊芥煎湯下三十丸空心服

治腸風下血 出華陀中藏經方

檳藤子 二箇可當三錢大者如更大只用一箇另研極細 不蛀皂角子 四十 九粒燒灰存性另研細

右拌勻每服二錢温酒調下如人行五里再以温酒一杯趁之日服極效

越桃散 出華陀中藏經方

治下血及下血痢

越桃 梔子也 槐花 青州棗 乾薑 各等分

右各燒存性為末陳米飲調下二錢

皂角散 出華陀中藏經方

治五種腸風瀉血下痢糞前有血號痔糞後有血號内痔大腸不收號脱肛穀道四面有努肉號鼠妳痔頭上有孔號漏並皆治之

黄牛角 一箇剉 蛇蜕 一條 猪牙皂角 五枚剉 穿山甲 三片半或三片

右四味同入磁瓶内黄泥封固候乾先以小火燒令

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

煙出方用大小火煅令通紅為度取出候冷杵羅為末患者先用胡桃肉一箇分作四分取一分臨卧時研細如糊温酒調下便睡先引盡出至五更時温酒調下藥末二錢至辰時更進一服取下惡物永除根本

理大腸一切下血 出華陀藏經方

取雄黑豆緊小長者不拘多少微以皂湯浸發炒熟去皮為細末煉猪脂為丸梧桐子大每服三十丸陳米飲服熟水亦得甚效

升麻補胃湯 出東垣試效方

治宿有陽明血證五月間大熱因吃杏腸澼下血即遠去四下散漫如篩沈然腹中不痛血色紫黑病名曰濕毒腸澼是陽明少陽經血證也

升麻 羌活 各一錢 獨活 防風 各一錢 柴胡 半錢 葛根 分三 肉桂 少許 牡丹皮 熟地黄 生地黄 各半錢 白芍 藥一錢五分 當歸身 分三 黄耆 一錢 甘草 炙五分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右咬咀如麻豆大分作二服水二大盞煎至一大盞去滓稍熱食前服

益智和中湯 出東垣試效方 治腸癖下紅血或色深者紫黑腹中痛腹皮惡寒右三部脈中指下得俱弦按之無力關脈弦甚緊肌表陽明分涼腹皮熱而喜熱物熨之內寒明矣

升麻一錢 乾葛一錢五分 白芍藥一錢五分 甘草炙一錢 桂枝四分 益智仁五分 當歸身五分 黃耆一錢 牡丹皮五分 柴胡五分 半夏五分 乾薑少許 肉桂一分

右為粗末都作一服水三大盞煎至一盞去滓温服食前

烏梅肉丸 出東垣試效方 治腸風下血別無餘證登厠便見亦非內痔服之甚效

直殭蠶一兩 烏梅肉一百焙乾

右為末薄粥糊丸如雞頭肉大每一百丸食前服用白湯送下日三服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治下血不禁如刺猪者出附後方

用藥葛氏第一豉汁方不瘥重作大效

黑玉丹出醫方集成

治腸風積熱下血不止

刺蝟皮十兩刮八

猪懸蹄一百隻

牛角鰓十二兩劉

雷丸四兩

亂髮皂角水洗淨焙八兩

敗櫻劉八兩

苦楝皮五兩

槐角六兩

芝麻四兩

右剉碎用磁罐内燒存性研為細末入乳香二兩麝香八錢研令勻用酒打麵糊丸梧桐子大每服二十丸先細嚼胡桃一枚空心以温酒吞下多進得效

欽定四庫全書

治下血出傳信適用方

平胃地榆湯出衛生寶鑑方

用栢葉不拘多少焙乾為末飲調下

蒼术一錢

白术五分

陳皮五分

白茯苓五分

厚朴五分

乾薑五分

當歸三分

甘草三分炙

炒麴三分

地榆七分

人參三分

白芍藥

益智仁三分

升麻一分

葛根半分

黑附子一炮一錢

右件都作一服水二盞生薑三片棗二枚同煎至一盞去滓食前温服此藥温中散寒除濕和胃真定總

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:22
列印頁數：52
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

管史候男肢體本瘦因畋人致酒酸不欲食強飲三
兩杯少時腹痛次傳泄無度十餘日便後見血或紅或紫腸
鳴腹痛醫者曰見血皆熱以芍藥栢皮丸之類治之前證如故形體
愈瘦面色青黃心下痞悶惡冷物口乾煩燥不得安卧診
得脈弦細而微遲手足稍冷以平胃地榆湯主之數服病
減大半又灸中脘三七壯乃胃穴發原處灸則强食
生肉又以還少丹服之喜飲食添肉至春再灸三里
七壯脾温胃中生發原氣乃胃之合穴也遵服藥之

戒慎言語節飲食而愈

治腎虛下血 出濟
寮方
鹿茸 酯炙 一兩 烏梅 去仁 一兩 破故紙 炒 五錢 杜仲 五錢

治腸風臟毒便血等疾 出濟
寮方
右炒為末粟米粥為丸每服三十丸空心鹽湯吞下

右用温州枳殼不拘多少逐箇刮去穰入去殼巴豆
一粒以線紮兩片合定銀石器内米醋煮枳殼爛為度
洗淨去巴豆以枳殼剖焙為末醋糊為丸菉豆大每

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:22
列印頁數：53
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

服三十丸空心臘茶清吞下病愈住腹痢疾亦可用

初患則留巴豆少許亦可

雙聖丸 出察方瀋 治男子婦人老幼下血

陳槐花 五倍子 各等分 炒焦

右為細末取烏梅肉水浸于甑上蒸爛搗如膏搜和為丸梧桐子大每服三四十丸空心飯飲吞下

槐花散 治腸風臟毒下血

槐花 炒瓦 梔葉 荊芥穗 枳殼 炒各等分

右為細末清米飲下二錢空心服食前用

黃連犀角散 治下血如小豆汁者

犀角 屑三兩 黃連 末三兩

右水五升煮取三升去滓入豉一升更煮三沸去滓分二服

伏龍肝湯 出圓方二 治先便後血謂之遠血兼治吐衄

伏龍肝 半斤 甘草 炙 白朮 阿膠 乾地黃 千金方作乾薑 黃芩 各三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為剉散每服五錢水一盞煎七分去滓空心温服

一方有附子炮入可用三兩

治下血不止

用大古錢四百以酒三升煮取二升分三服亦可服

治腸風下血不止

用獺肝燒為末服一錢匕

治卒下血及金創出血不止 出本草

以衣中故棉絮一握煮汁温服之

欽定四庫全書 普濟方

治卒下血 出本草

用懸鉤根皮濃煮服之

治下血不止

以柿皮曝乾更焙篩末米飲和二錢匕服之不拘上

衝下脫兩服可止

治下血

用雞項草根十月採洗乾碾羅為散服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治大下血
用好墨細末二錢以白湯化阿清膠調稀稠得所頓服熱多者為相宜
治腸風瀉血 出本草
以緑礬釀鯽魚燒灰和服一方為末用酒調下即愈
治下血如雞鴨肝皮及治糞後鮮血
以黄蘗為末水調服及治男子莖上瘡為末傅之
治腸下蟲 出本草
用鰻鱺魚二斤治如食法切作段子入鐺内以酒三盞
炙入鹽散中食之魚有五色文者最佳
治臟毒下血經年瘦者及大腸風虚飲酒過度挾熱下痢膿血疼痛多日不瘥 出本草
槲樹根白皮 人參 各一兩
右為末每服二錢空心温酒調下不飲酒温米飲下
忌油膩濕麵青菜荸子甜物雞猪魚蒜等物〇昔洛陽女子四十六歲躭飲無度多食魚蟹攝理之方蔑

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

如也後以飲啖過常蓄毒在臟日夜二三十行大便與膿雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血痢藥不效又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿凡如此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熱藥則腹愈痛血愈下服稍涼藥即泄住氣羸弱食愈減服温平藥則病不知如此將暮歲醫告術窮垂命待盡或有人教服人參散病家亦不敢主當漫與服之纔一服知二服減三服膿血皆定自此不十服其疾遂愈

治腸風瀉血

用鱉魚尾 平 毒 微 燒為黑灰研作末酒下先服生地黄蜜等煎訖然後服鱉尾無不斷也鱉生南海大者如扇牡牝相隨牡無目得牝方能行如牝去牡死

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:23
列印頁數：57
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

文淵閣四庫全書電子版 -- 原文及全文檢索版
內文: 子部,醫家類,普濟方,卷三十九
用戶名稱：ZJAM

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書
普濟方卷三十九
大臟腑門
明 周王朱橚 撰

大小便不通 論

夫脾胃大小腸膀胱者倉廩之本營之居也名曰氣能化糟粕轉味而出入者也蓋營受水穀之真精榮衛之根源大小腸膀胱得以變化皆營為之本是以小腸為受盛之官水穀初未分也及其化物歸於膀胱而為溺轉於大腸而為糟粕必曰氣化則能出矣或陰陽之氣不平寒熱相勝或氣實塞而不通或氣虛損而為洩或燥而急或熱而祕皆陰陽不和之病也治此不槩以寒熱為法寒劑蕩滌熱劑乾燥反傷和氣耗其津液若關格不通三焦約病專以榮衛之否塞乳後便難與夫老者祕澀之病又以津液不足止可滑以利之潤以滋之苟蕩以駃劑則糟粕不通真氣受弊不可不知也○關格大便不通謂之內關小便不通謂之外格二便俱

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:54
列印頁數：1
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不通為關格也由陰陽氣不和榮衛不通故也陰氣太盛陽氣不得營之曰內關陽氣太盛陰氣不得營之曰外格陰陽俱盛不得相營曰關格關格則陰陽之氣痞結腹內腹滿氣不行於大小腸故關格而大小便不通也又風邪在三焦三焦約者則小腸痛內閉大小便不通曰不得前後而手足寒者為三陰俱逆三日死也診其脉來浮牢且滑直者不得大小便也○大小便難者由冷熱不調大小腸有遊氣在於腸間搏於糟粕小便不得氣流故大小便難也診其尺脉滑而浮大此為陽干於陰其人苦小腹痛滿不能尿尿即陰中痛大便亦然也

方

茱萸湯 出千金方

治腹脇脹滿關格大小便不通

吳茱萸 湯浸洗去涎 曝乾微炒 大黃 劉炒 當歸 切焙 桂 去粗皮 赤芍藥 甘草 炙劉 芎藭 各三兩 人參 細辛 去苗葉 各四兩 桃白皮 一去粗皮握 乾薑 一兩炮 雄黃 三錢與雄黃同研 真珠末 五分

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:54
列印頁數：2
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右將十一味咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓下
雄黃真珠末一字酒半盞更煎三沸空心服之一方作丸
梧桐子大每服三十丸生薑橘皮湯下無雄黃
木香散　治下焦熱大小便不通氣脹滿悶
木香 三分　黃芩 去黑心 三分　木通 劉炒 三分　陳橘皮 湯浸去白 焙 三分
冬葵子 研 一兩　瞿麥穗 一兩　檳榔 五錢　赤茯苓 去黑皮 五錢　茅根 五錢
右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去滓温服
治大小便難腹肚脹滿短氣
荆芥 一兩　芎藭 一兩　蒲黃 一兩　當歸 劉炒 一兩　桂心 一兩　蠐螬 三十
川大黃 炒 二兩　甘草 炙 劉 五錢　桃仁 四十枚 湯浸去皮尖雙仁麩炒
右為末煉蜜為丸梧桐子大每服三十丸主薑葱白
湯下不拘時
茯苓丸　治大小便不通
赤茯苓 去黑皮 五兩　芍藥 五兩　當歸 切焙 五兩　枳殼 去穰麩炒 五兩　白朮 五兩　人參 五兩　大麻仁 三兩　大黃 劉三兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末煉蜜丸梧桐子大每服十五丸至二十丸空心煎茅根湯下

大黃湯　治中焦熱實閉塞關格不通吐逆喘急

大黃（剉炒）五錢　前胡（去蘆頭）五錢　半夏（湯浸七次炒）五錢　人參五錢　黃芩（去黑心）五錢　赤茯苓（去黑心）五錢　木香五錢　檳榔（剉）五錢

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑五片煎八分去滓溫服

芍藥湯　治大小便難臍腹妨悶

赤芍藥五錢　羌活五錢　桂心五錢　川大黃（剉炒）一兩　郁李仁（湯浸去皮炒）一兩　檳榔一兩　大麻仁二兩

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服三十丸空心服溫水下

茯苓湯（一名大黃散）　治大小便不通心腹滿悶不能可過

赤茯苓三兩　桑根白皮（剉）二兩　瞿麥穗二兩　大黃（剉炒）二兩　榆白皮（剉）二兩　防葵（去蘆）二兩　麻子仁（研如膏）二兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓入芒硝末

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:55
列印頁數：4
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五分更煎二沸空心温服日晚再服

牽牛子丸　治下焦結熱腸胃燥澁大小便不通

黑牽牛 洵洗令淨炒令氣透便取出擣令冷取末二兩 青橘皮 焙去白用一兩 桑根白皮 一對炒兩 芍藥 焙一兩 梔蔞根 一兩 木通 一對兩 陳橘皮 焙並白用一兩

右為末煉蜜杵和丸梧桐子大每服十丸十五丸加至二十丸茶酒任下

白朮散　治大小便難腹脇脹滿氣急

欽定四庫全書

白朮 一兩炒 牽牛子 一兩炒 木通 一兩 川大黃 一對炒兩 檳榔 一兩 五錢去白焙 川朴硝 一兩 陳橘皮 五錢去白焙

普濟方

右吆咀每服四錢水一盞煎至六分去滓空心温服

滑石湯　治大小便俱不通

滑石 一兩五錢 茅根 三分 車前子 三分 天門冬 去心焙一兩 冬瓜瓤 一兩 莨菪子 浸去浮者煮令芽出曝乾微炒一兩

右吆咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食前温服日三

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治大小便氣壅不利脹滿關格不通

木通 劉一兩 川朴硝 一兩 郁李仁 湯浸去皮炒一兩 車前子 一兩

黃芩 五錢 瞿麥花 五錢

右㕮咀每服四錢水一盞煎六分去滓温服

大黃散 治關格不通妨悶大小便祕澀

大黃 劉二兩 桂 去粗皮三分 冬瓜子 炒一兩 滑石 研三兩 朴硝

生鐵銚子炒乾刮下紙裹於黃土內窖一宿取出研細三兩五錢

右先將前三味為散更與滑石朴硝同研勻細每服二錢濃煎白茅根湯空心調服至晚再服

黃芩湯 治大小便不通

黃芩 去黑心二兩 赤芍藥 三兩 白茅根 三兩 大黃 生用三兩 瞿麥穗

右㕮咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓入朴硝末五分更煎二沸空心温服

甘遂散 治氣痞心腹脹喘促大小便不利

甘遂 煨 牽牛子 炒 續隨子 去殼 葶藶子 大戟 各等分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末每服五分濃煎燈心湯空心調下服利水為度

治大小便不通

大黃 煨 牛蒡子 炒 羌活 獨活 滑石 各等分

右為末用熱水調下空心服即便利

五宣散 治大小便不通行滯氣

瞿麥 木通 甘草 虎杖 滑石 各等分

右為咬咀每服二錢水一盞燈心數莖煎七分臨卧服

車前子湯 治大小便俱不通

車前子 五兩 生用 木通 劉四兩 黃芩 去黑心 三兩 郁李仁 湯浸去皮 尖雙仁三兩

右將前三味搗篩與郁李仁拌勻每服五錢水一盞半煎一盞去滓入朴硝末五分更煎二沸食前温服日三

榆白皮湯 治大小便俱不通

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

榆白皮 甘草 炙 劉 各一 兩 五錢 滑石 劉 三 兩 去粗皮 桂 一兩

右㕮咀每服四錢水一盞半煎一盞去滓食前服日三

木通湯 治大小便不通

木通 劉 二 兩 大黃 劉 周生 滑石 麻子仁 一合 如膏 研

右㕮咀與麻子仁拌勻每服五錢水一盞半煎一盞入芒硝末五分更煎二沸空心服之

治大小便不通腹脅堅脹蒸下部方

蓮葉 三 兩 葱 三七莖 并用 鬚去葉 切 皂角 一挺 炙 劉 生薑 一兩 切

右以漿水一斗二升煮十餘沸并滓分兩度而旋旋盛入小口磁缸中坐缸上蒸冷即易之未通即傾藥於桶斛中添熱水坐醮下部即通

大黃散 出肘後方 治風冷氣入小腸忽痛堅急如吹狀大小便不通或小腸有氣結聚如升大腸起名為關格大小便不通

川大黃 劉 炒 苦參 劉 貝齒 燒灰 滑石 各一 兩

右為末每服二錢葵根湯下不計時候温服一方無

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大黃

治大小便不通

掩臍方 一名葱豆湯 出危氏方

連根葱 二莖 生薑 一塊帶土者 淡豆豉 一十一粒 鹽 二匙

右同研爛捏作餅子烘熱掩臍中以帛紮定良久氣透自通不然再換一劑一方搗碎為末米湯下

治諸大小便不通

海金沙 芒硝 朴硝 麝香 各等分

右為末白湯調服大便不通者加巴豆一粒

黃連散 治大小便祕澀壅熱累効

黃連 二兩 川大黃 二兩醋炒 黃芩 一兩好 甘草 一兩炙

右為末每服二錢食後溫水調下

芒硝湯 出千金方 治關格不通脬腹妨悶大小便不通

芒硝 研五錢 二兩 冬葵子 炒合 三 滑石 碎 三兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓入芒硝末五分更煎二沸空心溫服一方無滑石

芫花丸 治大小便不利

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芫花 炒 研 各 五錢 大黃 剉炒 三分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸葱湯下

治大便不通

滑石 二兩 葵子 一兩 榆白皮 一兩

右為散煮麻子汁一升半取二匕服二服即通

治大小便不通

乾薑 鹽 杏仁

右等分搗導之

治大小便鬭格不通腹腸喘急 出聖惠方

水銀 一分 膩粉 一分 滑石 一分

右為末研令水銀星盡每服葱湯調下一錢

治大小便祕結 出經驗良方

水銀 豆大一塊研細 巴豆 二粒去殼膜 硫黃 三塊如豆大

右研為膏作一劑塗於臍内良久才通即便去藥

治大小便難腹中有燥糞寒熱煩迫氣短汗出腹脹

方見本門大便祕澁不通類濡藏湯門

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治大小便難 出聖惠方
木香 五錢 青黛 五錢 麻油 二合
右水一大盞同煎令水盡惟有油去滓分三二服
冬葵根汁方 治大小便不通
生冬葵根 洗淨二斤搗羅取汁三合 生薑 四兩搗羅取汁一合
右攪勻分作二服空心一服有頃再服盡即通一方不用生薑
治大小便關格不通 出聖惠方
胡椒 二十粒搗研 川朴硝 五錢
右水一大盞煎胡椒至六分去滓入硝更煎一兩沸候温服
又方 出聖惠方
臘粉 一錢 生麻油 一合
右相和空心服之
治大小便關格不通肚脹氣築心悶絶 出聖惠方
蜀葵花 一兩搗爛 麝香 五分研

欽定四庫全書 普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右水一大盞煎至五分去滓服之無花即取根擘破用之

推車散 出本事方 治大小便秘經月欲死者

推車客 七箇 土狗 七箇 如男病推車客用頭土狗用身如女子病土狗用頭推車客用身

右用新瓦上焙乾為末用虎目樹皮向南者濃煎汁調只一服愈

治卒關格大小便並不通支滿欲死二三日則殺人 出肘後方

苦酒 硝 等分

右和塗臍上乾即易

又方 出肘後方

甘遂 二錢 貝齒 二枚

右搗下以三合漿水盡服之須臾即通

紫金沙散 治大小便不通

用紫金沙不拘多少蜂房蒂七枚搗為末每服一錢

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:58
列印頁數：12
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

温酒調下

土馬駿湯　治大小便不通

右用土駿馬不拘多少走水淘火上用新磚煅過為粗末每服二錢水一盞煎至七分温服

猪脂酒方　出千金方　治大小便不通

用冬葵子微炒一兩搗篩用水二盞煎一盞去滓入人乳汁半合和勻空心服之

髮灰散　出肘後方　治大小便不通及便血

用亂髮一兩洗淨燒灰為末細研每服三錢温水調

食前日三以通利為度

冬葵子湯　治大小便不通

用冬葵子微炒一兩搗篩用水二盞煎一盞去滓入人乳半合和勻空腹服之

治卒大小便不通　出家藏經驗方

用鹽以紙裹燒投水中服之一方以鹽實臍内即通

又以和苦酒傅臍又以水三升煮鹽三合使沸適寒

列印日期/時間：02/05/2005 04:57:58
列印頁數：13
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

温竹筒灌下部

又方

用含硝石吐出水

治大小便關格閉塞 出聖惠方

用葵菁子油一合空腹服之即通通後汗出勿怪

治大小便關格不通肚腹氣築心閉絶 出聖惠方

用烏柏樹東面白皮陰乾為末如五七日不通熱水調下二錢如急用火上焙乾為妙

欽定四庫全書

鐵脚丸 一名皂莢飲

治大小便關格不通經三五日者 出聖惠方 普濟方

用不蛀皂角燒灰研細粥飲調下三錢一方用皂角炙去皮子為末酒糊或煉蜜丸梧桐子大每服三十丸酒下温水亦得一方皂角燒置桶内薰其後部即通

治大小便不通 出千金方

用葵子末一升青竹葉一把水二升煮五沸飲服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方 出千金方
用榆白皮切一升葵子一升水五升煎取二升分三服
又方 出千金方
用甑帶煮取汁和蒲黃方寸匕日三服
治大小人大小便不利腹大且堅 出經驗良方
用故衣多垢者切一升水三升煮取一升分三服
治老人虛大小便不通 一名琥珀散 出經驗良方
用真琥珀研如粉人參湯調下亦治心痛老人虛大便不通葱白三寸水煎熟不用葱入阿膠一片於葱湯內鎔開溫服吳內翰母曾服得效 普濟方
治鬲格大小便不通脹滿欲死兩三日則殺人 出肘後方
用芒硝二兩紙裹三四重炭火燒之令內一升湯浸服當先飲湯一升已吐出乃服之
治卒鬲格大小便不通支滿欲死及旬日一月日不得大便 出千金方
用葵子二升水四升煮一升服內猪脂如雞子大一丸

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

彌佳

貼臍膏

用甘遂為細末以生麵調為糊攤紙上糝末在上塗臍中及塗臍下便處另煎甘草水温涼隨意服之以通為度

甘遂散 出危氏方

治大小便不通及腹滿氣急

用甘遂二兩赤皮者為末煉蜜二合和勻每一兩重分作四服日進一服蜜水下未知日二服漸加之一方用二兩為散分五服熟水下如覺心下煩得微利

治大小便不通

日一服

又方

用羊屎燒薰鼻又主中惡心腹刺痛

又方

用搗葱白以醋和封小腹上

又方

用萊菔角枝斷取如手第二指中節含之立下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方

用雄鼠糞兩頭尖者傅臍中立效

又方

用莧實末五錢分二服新汲水調下

又方

用礬細研末令患人仰卧置礬末於臍中滿用新汲水滴之候覺冷透腹内即自然通若曾灸即於原灸盤上用紙作環子高火盤一指半已來著礬末在内仍依前法滴之

木香丸　治重傷大小便不利腹痛

蒼术一兩　巴豆十粒　瓜蔞三稜五錢炒

右為末白麵餬丸菉豆大每服五七丸食後薑湯下

治男女水火不通諸藥不能療

用篇竹生紫花香根水邊生者為佳研自然汁一盞服通即止藥不可便服補藥

檳榔散　治大小便不通亦治腸胃有濕大便祕澀

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:00
列印頁數：17
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用檳榔至大者半枚用麥門冬熟水磨一錢重湯盪熱服之一方為末每服二錢蜜湯點服一方用童便葱白煎服

神仙導水丸　治上盛下虛水火不能升降大便祕澀小便不通赤眼口瘡便紅瀉血吐血洩痢不止者兼治諸積氣塊小兒脾疾婦人經脉不通男子打撲傷損等證

木香一兩　當歸一兩　枳殼炒一兩　黃芩一兩　黃連一兩　青皮一兩　陳皮一兩　檳榔一兩　香附子一兩　三稜五錢　莪朮五錢　大黃三兩　黃蘗三兩　牽牛末三兩

右為末米糊為丸梧桐子大每服五十丸米飲下不拘時服

祕傳解毒丸　治上盛下虛水火不能升降大便祕澀小便不通赤眼口瘡便血瀉血吐血洩痢不止者兼治諸積氣塊小兒癖病婦人經脉不通男子打撲傷損等證

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

貫仲　山豆根　黄藥子　牙硝　寒水石　草龍膽　乾葛　雄大豆　百藥煎　紫河車　甘草節　薄荷　梔子　大黄　豆粉　各四兩

右為細末煉蜜丸秤一兩作十丸外加銀箔為衣温米飲下不拘時加山茨菰二兩大妙

大黄散　治大小便不通

大黄　五錢　甘草　五錢　滑石　五錢　蒺豆　一合

右同研為細末每服二錢新汲水調下去滓服之立效

治關格脹滿大小便不通

用獨頭蒜燒熟去皮綿裹納下部氣立通

治大小人腹中諸疾疳濕大小便不通

以羊糞煮湯下灌

輕粉散　治大小便祕

用大棗十枚真輕粉一匣每一箇入輕粉少許合住以盞子盛覆之煮湯甑上蒸熟細嚼白湯下人虚者

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不宜用

蓮心散　通陰陽利大小便妙方

蓮心（四十九粒瓦上焙乾為末）建茶（一小桃）蜜（一匙）

右作一服用井花水半盞調勻服之立效

治大小腸並不通

用桃葉取汁和服半升冬用桃樹皮

利大小便去腹中結熱目下黃

以田中螺食之

調中下腸胃熱氣利大小便

用好井水及土石間新出泉水多飲之令至喉（闕）即

消下

治大小腸風熱

取猪腸臟服之

治大小便關格不通（出本草）

取黃麻汁煮粥食之

一方（出永類鈐方）治大小便皆祕加腹脹如鼓氣促

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:01
列印頁數：20
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大麻子 炒去殼 五錢 八角茴香 七箇

右作末生葱白三七箇同研熟湯調五苓散又三和

散加王不留行麥門冬

治宿食便祕而喘 出永類鈐方

沈香 三錢 青皮 淨七錢 三稜 七錢 莪术 七錢 巴豆 三十一粒去殼

右同三味炒去巴豆加淨陳皮三錢製半夏製枳殼

各一兩檳榔砂仁各五錢白茯苓淨香附子各五錢

甘草三錢炙薑煎服

治大小便不通

老鴉眼睛草 味甘温生江湖間葉如茄子葉故名天茄或云漆姑草也漆姑即蜀羊泉已見本經人亦不能決識之 木通 胡妥

右三味煎湯服之

治小便不通臍下滿悶

海金沙 一兩生湖南山谷中今處處有之初生作小株高一二尺七月採得日中曝乾以紙襯擊取其沙于紙上旋曝旋擊沙盡乃止 蠟面茶 五錢

右二味搗碾令細每服三錢煎生薑甘草湯調下服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

無時未通再服

大便祕澀不通 論附

四十四難曰七衝門何在然脣為飛門齒為會門户厭為吸門胃為賁門太倉下口為幽門大腸小腸會為闌門下極為魄門故曰七衝門也易老曰魄門對飛門其證為狐惑之病以下衝上故曰七衝門也幽門不通上衝吸門會厭噎大便燥祕氣不得上下治在幽門閉大便不通以通幽湯主之○夫胃大小腸膀胱者倉廩之本營之居也名曰氣能化糟粕轉味入出者也人或傷於風寒暑濕盛熱發汗利小便走枯津液致腸胃燥澀祕塞不通皆外所因或臟氣不平陰陽鬲格亦使大便不通名曰臟結皆内所因或飲食燥熱而成熱中胃氣強澀大便堅閉小便頻數謂之脾約屬不内外因既涉三因亦當隨其所因而詳治之燥則潤之澀則滑之祕則通之約則緩之各有成法○燥乾者全肺之本燥金受熱化以成燥令更兼火熱致金衰耗液而損血鬱而

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

成燥者由風强勝濕熱能耗液故經云風熱火同陽也寒濕燥同陰也又燥濕小異也今燥雖屬秋陰而其性異於寒濕而反同於風熱火也又加大便燥乃是大腸受熱化成燥澁經云諸澁枯涸又如癰患中風皆因火熱耗散血液亥肺閉塞不能浸潤金受火鬱不能發聲經云肺主聲肢痛緛戾者風熱濕相持而遂以偏枯成燥澁手足不隨也然中寒吐瀉亡液而成熱亦已鮮矣以有寒濕相鬱榮衛不開發貫主氣而成偏枯經云諸澁枯涸乾勁皴揭屬於燥也○若風氣壅滯腸胃乾燥是謂風祕胃蘊客熱口糜體黃是謂熱祕下焦虛冷窘迫後重是謂冷祕或因病重後亡津液或因老弱血氣不足是謂虛祕或腎虛小水過多大腸枯竭渴而多祕者亡津液也或胃實燥結時作寒熱者中有宿食也治法雖宜和順陰陽然疎風散火去熱除冷導引補虛之法不可偏廢當審其證以治之○腸胃本實而又為冷熱之氣所并結聚不宣故令大便難也又云邪在腎亦令

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大便難所以爾者腎臟受邪虛而不能制小便則小便利津液枯燥小腸乾澁大腸難及渴利之家大便亦難所以爾者為津液枯竭致令腸胃乾燥診其右手寸口人迎以前脉手少陰也經脉沈為陰陰實者病苦閉悶大便不利腹滿四肢重身熱苦胃脹右手關上脉陰實者脾實也病苦腸中怵怵一作伏伏如牢狀大便難脉緊而滑直大便亦難少陽脉微絃法當腹滿不滿者必大便難而脚痛此虛寒從上向下也○凡人五味之秀者養臟腑諸陽之濁者歸大腸大腸者所以司出而不納也令停蓄蘊結獨不得疎通何也熱邪入裏則胃有燥糞三焦伏熱則津液中乾此大腸之挾熱然也虛人臟冷而血脉枯老人腸寒而氣道澁此大腸之挾冷然也腹脹痛悶胷痞欲嘔此證結聚以宿食留滯得之腸胃受風涸燥祕澁此證閉寒以風氣燔灼得之若氣不下降而穀道難噫逆泛滿必有其證矣劑良治法熱者三黄湯冷者金液丹宿食者脾積丸風祕者脾約麻子丸氣不

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下降者枳殼桔梗湯然而大腸與肺為表裏大腸者諸氣之道路關焉熱則清利冷則温潤積聚者抉其壅邪鬱者疎其風又當流行肺氣也○諸有裏熱法當通利然大便難下腸頭熱腫而墜重者也更有熱有瘀血挾氣而血在下焦也當用黄連黄芩大黄輩下之於内以炒阿膠炒枳殼百藥煎為佐多入濃蜜並烏梅同煎薑大便不通陰陽關格水火不升降故也有熱者來復丹一錢四五片亦可凡通利大便若用大黄巴豆等藥而用三黄薄荷泡湯下無熱者養正丹夾神保丸橘皮湯煎下○儒門事親書云大便燥結戴人過曹南省親姨表兄病大便燥澁無他證常不敢飽食則大便極難結實如鐵石或三五日如圊眼前星飛鼻血出肛門連廣腸痛痛極則發昏服藥則病轉劇烈巴豆芫花甘遂之類皆用之過多則困瀉止則腹燥如此數年遂為藥性暴急不服但卧病待盡戴人過因診其兩手脉息俱滑而有力以大承氣湯下之繼以神功丸麻子丸等藥使食

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:03
列印頁數：25
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

菠薐葵菜及諸羊血作羹百餘日充肥親知見駭之鳴呼粗工不知燥分四種燥於外則皮膚竭渴燥於中則精血枯涸燥於上則脣鼻焦乾燥於下則便苦結閉夫藥用之巴豆可以下寒甘遂芫花可以下濕大黄朴硝可以下燥内經曰辛以潤之鹹以耎之周禮曰以滑養竅○老人臟腑秘澁不可用大黄老人津液少所以臟腑秘澁更服大黄以瀉之津液皆去定須再秘甚於前只可服寬潤大腸之藥更用槐花煎湯淋洗亦效更有老人發熱而大腸秘澁或因多服丹藥脾胃虚弱氣化不行遂為臟腑積熱須用神保丸得通瀉一行熱亦即退○有人因時疾瘥後秘塞不通遂致夭命大不可輕之凡大便不通皆因用滑膩之物及冷水致不通也病後面黄者即大便難○内經謂小腸移熱於大腸為慮□夫小腸者受盛之官化物出焉大腸者傳道之官變化出焉二者皆以傳化為事今也小腸受熱移於大腸則陰

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:03
列印頁數：26
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

氣盛而津液耗津液既不能滑利故糟粕內結沈伏而為虛瘕結聚腸間菀結大便祕澀是也

方

痢聖餅子　治年老人大便祕澀

草薬（去皮）　石菖蒲（去毛）　白茯苓　麻黄（去節）　厚朴（去根）　獨活　枳殼（炒黄）　藿香　白术　細辛（洗去葉）　吳茱萸（去梗）　甘草（炙）　木猪苓（去皮）　蒼术（浸）　良姜（去蘆）　防風（去頭）　赤芍藥　附子（炮去皮臍）　藁本（去蘆）　柴胡　澤瀉　半夏（製各等分）

右㕮咀每服三錢水一盞半薤白二條擘破煎至八分去滓食前空心稍温服老人小兒量以加減用之忌生冷油膩之物

京三稜丸　治痃癖注氣刺痛大便祕澀

京三稜　木香　當歸　桂（去粗皮）　肉蔻（酒浸炮）　牛膝（去苗葉浸切焙）　羌活（去蘆）　芎藭　赤芍藥　防風（去蘆）　枳殼（去穰炒黄）　白术（各五錢）　檳榔（生對半）　郁李仁（去皮尖雙仁另研如膏）　大黄（剉炒各一兩）

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右除郁李仁外為末與郁李仁同研勻煉蜜杵丸梧桐子大每服二十丸空心米飲或温酒下以利為度

萊菔湯 治脹滿閉塞不下方見本門大小便不通類

大黄丸 轉氣治百病

川大黄二兩剉炒 木香 乾薑炮剉 赤芍藥 白朮芍

右為末入巴豆研令勻煉蜜丸梧桐子大每日空心或夜卧時以温茶下三十丸至五十丸以利為度如要快瀉良久以熱茶投之

蘿蔔子炒 槐花炒 商殼麩炒去穰 枳實麩炒去穰 木通各五錢

沈香 檳榔 木香 青皮去穰 陳皮去穰 京三稜

遲化腸胃燥澁大便祕硬

搜風潤腸丸 治三焦不和胷膈痞悶氣不升降飲食

郁李仁一兩去皮

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五六十丸食前煎木瓜湯下常服滋潤腸胃導化風氣一方有大黄無木

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:04
列印頁數：28
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

通米飲湯送下

大黃丸　調利胷膈祛逐壅滯推陳致新疎風順氣

川大黃炒剉　檳榔　大麻仁　郁李仁湯浸去皮尖炒各二兩　牛膝去苗　芎藭　枳殼去瓤炒　獨活　防風去蘆　桂心　桃仁各一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服三十丸空心生薑湯下

大五柔丸　治臟氣不調大便不通和榮衛利九竅消穀益血

大黃　芍藥　枳實　蒺藜　葶藶　甘草　黃芩　牛膝各一兩　桃仁一百枚　杏仁四十枚

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三丸日三加至二十丸酒下

導水丸　下劑

大黃二兩　黃芩二兩　滑石四兩　黑牽牛四兩另取頭末

加後項藥

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:04
列印頁數：29
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

甘遂 一兩去濕熱瘀腫滿久雨則加依法製用 白芥子 一兩去痛泄水消痛 朴硝 一兩退熱散腫毒止痛久旱則加 郁李仁 一兩散結滯通關節潤腸胃行滯氣通血脉 樟柳根 一兩去腰腿沉重

右為末滴水丸梧桐子大每服五七十丸或加至百丸至三十丸溫水下食後加牽牛滑石亦妙

臨卧溫水下

潤腸湯 一名當歸潤燥湯 治大便閉燥不通

升麻 二錢 生地黃 二錢 大黃 炒三分 紅花 三分 麻仁 一錢 桃仁 一錢與麻仁另研了入煎

右㕮咀作一服水三盞先拌藥濕煎一盞去滓食前熱服一方有黃蘗無紅花

麻仁丸 出儒門事親書

郁李仁 去皮另研 大麻子仁 另搗二味各六兩 大黃 二兩五錢半生半熟 枳殼 炒各七錢五分 羌活 去蘆 防風 去蘆 乾山藥 五錢 檳榔 五錢 香 各五錢五分

右為末入另搗藥攪勻煉蜜丸梧桐子大每服二十

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大黃飲子 出聖惠方 治身熱煩燥大便不通骨節急痛
川大黃 濕紙裹煨五錢 杏仁 去皮尖炒五錢 梔子仁 五錢 川升麻 五錢 枳殼 去瓤麩炒五錢 生地黃 一兩 人參 二錢五分 黃芩 二錢五分 甘草 炙二錢五分
右�once咀每服三錢生薑五片豉二十一粒小烏梅一枚煎服一方用枳實

勻氣丸 治津液燥少腸胃挾風大便秘澀氣不勻
麻仁 另研二兩 人參 一兩訶梨勒皮 一兩枳殼 去瓤麩炒一兩 桂皮 去粗皮一兩 木香 一兩郁李仁 湯去皮另研三兩 白檳榔 三兩 大黃 炙三兩
右為末入麻仁等膏再研勻煉蜜丸梧桐子大每服三十丸加至五十丸溫熟水下不計時

枳殼湯 治大腸壅結不通腹脇脹滿膨悶不下食
枳殼 去瓤麩炒一錢 甘草 炙一錢 大腹皮 劉三錢 牽牛子 一兩 百合 一兩 赤茯苓 去黑皮一兩 赤芍藥 三分 桑根白皮 三分 郁李仁 湯浸去皮尖雙仁陰乾五錢

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:05
列印頁數：31
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓空心食
前溫服以通為度
宣氣木香飲　治膈氣痰涎食不消化大便不通腹
中雷鳴
木香　桂去皮　昆布去粗洗去鹹焙　檳榔劉一半生一半炮　大黃劉炒
半夏湯洗七次去滑麩炒各五錢　芍藥劉炙各一分　阿梨勒煨去核三分
右㕮咀每服五錢水一盞半生薑一塊大棗拍碎煎
八分去滓食後溫服日三
欽定四庫全書
五柔丸出千金方　治祕澀及虛損不足食不生肌膚三焦
不調和榮衛利臟腑補三焦
大黃一升用三斗米蒸　前胡二兩半夏　蓯蓉　芍藥　茯苓　當歸　蓼蘆　細辛各一兩
右為末蜜和搗萬杵丸如梧桐子大食後服十五丸
後稍增之日再〇崔氏云令人善飯消穀益氣有
憂者加松實五錢菴蕳五錢服之緩中不如意

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

便服之又加黄芩一兩

檳榔丸 出聖惠方 治腸胃冷熱不和大便壅祕食飯不消化心腹妨悶

檳榔 一兩 訶梨勒皮 一兩 郁李仁 湯浸去皮炒一兩 川大黄 劉炒 柴胡 一兩 去苗三分 草豆蔻 去皮五錢 木香 五錢 吳茱萸 湯浸七次炒五錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸食前生薑湯下

涼藥子丸 治五臟腹熱痰涎壅塞煩燥口舌生瘡大便祕結小便赤澀及小兒驚熱疳病

連翹 一兩五錢 牙硝 一兩二錢 甘草 生一兩二錢 大黄 一兩 石膏 五錢 薄荷葉 梔子 菉豆粉 各二錢

右為末煉蜜丸彈子大每服一二丸水化下日進二服

檳榔丸 治大腸祕澀冷熱相攻寒熱如瘧

檳榔 劉一兩 羌活 去蘆一兩 青橘皮 湯浸去白焙一兩 木香 一兩 郁

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:06
列印頁數：33
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

李仁 湯浸去皮另研 大黃 劉炒 大麻仁 另研 二兩 各 牽牛子 四兩 搗細 取 三 兩取

右為末入研藥令勻煉蜜丸梧桐子大每服二十丸 生薑湯送下

牽牛子丸 出聖惠方 治臟腑壅滯心腹氣悶宿食不消腰 脇疼痛大腸祕澀

牽牛子 一斤半生用一斤炒 桂心 一兩 枳殼 麩炒去穰 一兩 芎藭 一兩 木 香 一兩 青橘皮 湯浸去白焙 一兩 郁李仁 湯浸去皮炒 二兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服二十丸食前溫酒 下

治脹滿不通 出千金方 通草 四兩 朴硝 四兩 郁李仁 二兩 黃芩 二兩 瞿麥 二兩 車前子 五合 一方六兩 一方二升

右咬咀水八升煮取二升半分三服一方用絹袋盛 煮頓服二升

六合散 出宣明論 治一切燥結汗後餘熱宣轉不通亦名

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

金鑰匙散並治小兒腸氣結血腹滿胷中結病走注疼痛

大黃一兩紙煨生用 黑牽牛炒五錢 甘遂五錢 檳榔生三分 輕粉二分

右為末每服一錢蜜水調下量虛加減

滋腸五仁丸出醫方集成治津液枯竭大腸祕澁傳導艱難

桃仁一兩炒去皮 杏仁一兩炒去皮 栢子仁五錢 松子仁一錢二分 郁李仁一錢炒 陳皮四兩另為末

右將五仁別研為膏入橘皮末研勻煉蜜丸梧桐子大每服五十丸空心米飲湯送下

潤腸丸出醫方集成治大便祕澁不通

杏仁炒去皮尖麻仁陳皮各半阿膠炒防風各二錢五分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸蘇子湯荊芥湯任下

厚朴散一名厚朴湯凡臟腑之祕不可一例治療有虛祕有實祕胃實而祕者能飲食小便赤當以麻仁丸七

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

宣丸主之胃虛而祕者不能飲食小便清利此湯主之實祕物也虛祕氣也宜詳治之出衛生寶鑑

厚朴薑製三兩 白朮劉五兩 半夏麴二兩 枳實麩炒一兩 陳皮去白 甘草炙各二兩

右為粗末水煎空心溫服一方每服三五錢水一盞半生薑五片棗三枚煎至一盞去滓服云實祕者物也虛祕者氣也

欽定四庫全書

七聖丸出和濟方 治風氣壅盛痰熱結搏頭目昏重涕唾稠黏心煩面赤喉乾口燥精神不爽夜卧不安肩背拘急胷膈痞悶腹脇脹滿腰腿滿重大便祕結小便赤澀亦治大腸疼痛不可忍叔和云積氣生於脾臟傷大腸疼痛陣難當漸教稍瀉三焦是莫謾多方立紀綱

普濟方

川芎 木香生 肉桂去粗皮 羌活去蘆 檳榔 郁李仁去皮研 大黃蒸焙劉用各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服十五丸至二十丸溫

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熟水食後臨卧服嵐瘴之地最宜服之更量臟腑虛實加減取大便微利一服而愈切忌多利大便行其痛滋甚

七宣丸 出和濟方 治風氣結聚宿食不消兼砂石皮毛在腹中及積年腰脚疼痛冷如冰石脚氣衝心煩悶霍亂頭旋暗倒肩背重痛心腹脹滿膈閉塞風毒腫氣連及頭面大便或祕小便時澀脾胃氣痞不能飲食脚轉筋掣疼痛急心神恍惚眠卧不安等病

欽定四庫全書

柴胡 去蘆 三兩 枳實 炒 三兩 木香 三兩 訶梨勒皮 三兩 桃仁 去皮 尖 炒 三兩 甘草 炙 四兩 大黃 麵裹煨 十五兩

普濟方

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸米飲食後臨卧服稍增至四十五十丸取宣利為度覺病勢退服五補丸不問男女老少並可服餌量虛實加減一方

通幽湯 一名導滯通幽湯出東垣方 治大便難幽門不通上衝吸門幽門噎塞大便燥閉氣不得下治在幽門以辛潤

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

之

當歸一錢 升麻一錢 桃仁一錢研 生地黃五錢 熟地黃五錢 紅花一錢 甘草一錢炙

右㕮咀作一服水二盞煎一盞去滓調檳榔細末五分稍熱服

潤體丸

郁李仁 大黃 黑牽牛 桂心 當歸 黃蘗 生用各五錢 輕粉少許

欽定四庫全書

右為末酒水丸梧桐子大每服三十丸至四十丸溫水或生薑湯下

寬快湯 治氣不升降大腸澀滯

香附杵淨二兩 天台烏藥去心一兩 枳殼製一兩 縮砂仁七錢五分 蘇子炒五錢 青木香三錢 甘草炙七錢五分

右為末每服二錢陳皮煎湯調下或吞青木香丸少許

脾積丸出角氏方 治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大便

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:08
列印頁數：38
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

祕結積滯停結

蓬莪术 三兩 京三稜 二兩 良姜 五錢已上用醋一升于磁瓶内煮乾乾乘熱切碎焙

青皮 去白一兩 南木香 五錢 皂角 不蛀者三大挺燒灰存性 百草霜 三匙 村庄家鍋底者佳

右為末用川巴豆半兩只去殼研如泥漸入藥末研和麪糊丸麻子大每服五十丸加至六十丸橘皮煎湯送下

感應丸 出危氏方 治飲食所傷三焦氣滯大便祕澀

百草霜 用庄農家鍋底者研細秤二兩 新揀丁香 一兩五錢 川乾薑 炮製一兩 杏仁 去雙仁揀肥者一百四十粒去尖湯浸一宿去皮另研極爛如膏 南木香 去蘆二兩五錢 肉豆蔻 去粗皮用滑皮仁二十粒 巴豆 七十粒去皮心膜研細出盡油如粉

右除巴豆粉百草霜杏仁為末同拌研令細用好蠟六兩鎔化作汁以重綿濾過去滓更以好酒一升於銀石器内煮蠟鎔滾數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用凡春夏修合用清油一兩於銚内熬令

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

末散香熟次下酒煮蠟四兩化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清油一兩五錢同前煮熱作汁和蠟合藥末成劑分作小錠子以油紙裹之旋服消食祛熱潤燥

丸服餌

潤腸丸 出御藥院方 治津液耗少大便祕澁下焦氣滯常

蔵靈仙茸 一兩五錢 郁李仁 去皮 五錢 木香 二錢 枳實 麩炒 二錢五分 麻仁 七錢五分 檳榔 三錢 人參 三錢五分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸至五十丸生薑湯下

木香檳榔丸 治胃氣虛弱飲食無味上膈塞壅冷積癥癖癖氣食不消化肺氣積聚心胷痰逆喘急卒中風毒脚氣大腸祕澁奔豚氣痛

木香 檳榔 羌活 去蘆 芎藭 桂 去粗皮 各一兩 郁李仁 去皮雙仁研 大黃 剉炒 各二兩

右為末與郁李仁同研勻煉蜜丸梧桐子大每服二

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:08
列印頁數：40
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

十丸食前生薑湯下或諸氣痛溫酒下

治關格大便不通 出千金方

芒硝 五兩
烏梅 五兩
桑白皮 五兩
芍藥 四兩
杏仁 四兩
麻仁 三兩
大黃 八兩

右㕮咀水七升煮三升分三服一方無烏梅加枳實

乾地黃各二兩外臺秘要有榆白皮無桑白皮分兩同

大戟丸 出聖惠方

治腸胃積滯大便不通氣壅上奔

大戟 一兩炒
芜活 一兩
陳橘皮 湯浸去白焙一兩
桑根白皮 一兩
川大黃 二兩炒
木香 五錢
牽牛子 四兩炒取末二兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸空心薑湯下

麻仁丸 出聖惠方

治大便五臟氣壅三焦不和熱結祕塞

大麻仁 二兩
川大黃 一兩炒
枳殼 赤芍藥 川芒硝 郁李仁 湯浸去皮尖 檳榔 各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心生薑湯

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:09
列印頁數：41
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

檳榔散　治大腸卒不通腹脇脹滿氣上充心膈
檳榔　枳殼　去麩炒穰　牽牛子　炒　桑根白皮　剉　川大黃　剉炒　郁李仁　湯洗去皮尖炒　陳橘皮　湯洗去白焙各一兩
右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓温服

檳榔丸　治臟腑壅滯心膈妨悶大小腸不利
檳榔　五錢　郁李仁　浸去皮炒　川大黃　剉炒五錢　木香　五錢　木通　劉五錢　青橘皮　湯浸去白焙三分　牽牛子　炒二兩
右為末煉蜜為丸梧桐子大每服二十丸食前温水送下

檳榔丸　治一切氣臟腑壅滯
檳榔　桂心　枳殼　麩炒去穰　木香　訶梨勒皮　郁李仁　湯浸去皮炒　川大黃　剉炒各一兩
右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸温酒下

麥門冬湯　治虛熱痰實三焦痞結温壯煩熱大便不通
麥門冬　去心焙三分　赤茯苓　去黑皮五錢　甘草　炙剉五錢　黃芩　去黑

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:09
列印頁數：42
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

心五錢 大黃 五錢 劉炒 赤芍藥 一兩

右㕮咀每服五錢水一盞半入竹葉十片生薑一片棗六枚拍破煎八分去滓食前温服日三

牽牛子丸 治大便不通消除痞氣

牽牛子 生搗末一兩五錢 甘遂 五錢 劉炒 京三稜 三分 煨劉 木香 三分

陳橘皮 湯浸去白焙三分 訶梨勒皮 三分 煨去核

右為末用薑四兩絞取汁白蜜五兩煎成膏和丸藥劑杵丸如梧桐子大每服二十丸卧時煎粟米飲下

未利加至三十丸

大黃丸 一名透關散出聖惠方 治大便不通下焦傷熱壅塞

大黃 劉炒 檳榔 川芒硝 枳殼 麩炒去穰各一兩 木香

子芩 各五錢

牽牛子丸 治大便卒不通心神煩悶坐卧不安

牽牛子 二兩炒 川朴硝 大麻仁 川大黃 劉炒 木香

六分去滓空腹温服未通再服

右㕮咀每服四錢水一盞生薑五錢葱白七寸煎至

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

各一兩 甘遂 煨五錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸空心生薑湯下未通再服

木香丸 治大便卒不通心腹氣滿悶

木香一兩 檳榔一兩 川大黃劉炒一兩 桂心五錢 川烏頭炮去皮臍五錢

右為末入巴豆霜令勻煉蜜丸梧桐子大每服三丸加至五丸空心橘皮湯下

巴豆霜一分

檳榔丸 治上焦壅熱閉塞頭目不利大小腸祕澀心腹滿悶

檳榔一兩 羚羊角屑一兩 前胡去蘆一兩 大麻仁一兩 牽牛子三兩炒 枳殼一兩五錢麩炒去穰

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服三十丸食前生薑湯下以利為度

芒硝丸 出千金方 治脹滿不通

芒硝一兩五錢 芍藥一兩五錢 黃芩一兩六錢 杏仁二兩 大黃二兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末煉蜜丸梧桐子大米飲服十五丸加至二十丸取通利為度日三服

擒虎散　若有前證或臟腑稍實宜間服擒虎散三兩服疎導腸胃中滯澀鬱結毒氣（前證搜風潤腸丸治證在前）

没藥　當歸　黑牽牛（生）一兩　大黃（各一兩）　甘草（生一錢）

右㕮咀每服五錢用皂角刺七箇擂破隔宿酒一升浸之來日取酒一盞更加水一盞入栝蔞子七粒煎至七分放温食遠服以利為度

潤腸丸　治大腸風結氣澁

肥皂角（五片醋炙焦去皮子五斤生用去皮子二味共為末五片水一升揉取濃汁濾過慢火炒銀石器內熬成膏子入後藥）　南木香（一分）　青橘皮（去穰一分）　陳橘皮（去白一分）　檳榔（一分生用）

右為末和皂角膏搜成劑看得所後如硬入少蜜丸梧桐子大每服三十丸空心温酒送下治大便不通即時透

大黃　木通　枳殼　甘草　荆芥（等分）

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末每服三錢水一盞煎去滓服

木香遂氣丸　治食積虛滯通利大便兼治脚氣小腸氣諸氣攻刺腹痛

橘紅 五錢　青皮 去白 五錢　檳榔 雞心者 五錢　南木香 五錢　川巴 五錢　豆肉 一錢半研如泥　入前藥和研

右為末生薑自然汁調神麯末為餬丸麻子大每服十丸薑湯送下如氣攻腹痛枳殼木瓜煎湯下

枳殼散　治虛勞大便祕澀

枳殼 五兩　甘草 炙 一兩　杏仁 去皮炒　阿膠 炒酥　生地黃 各一兩

右剉如麻豆大每服三錢生薑五片蜜三匙烏梅一枚煎空腹服

大黃丸　治脾胃不和內有蟲滯大便祕難

大黃 劉三兩炒　赤芍藥 三兩　厚朴 去粗皮薑汁炙三兩　枳實 去穰麩炒一兩　大麻仁 另研如膏五錢

右四味搗為細末與麻仁同研令勻煉蜜杵丸如梧

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

桐子大每服十丸加至十五丸食前温水下以通利為度薑湯下亦可用

麻仁散　治大便不通腹内壅悶氣喘息促

大麻仁研如膏　大黄劉炒　葛根劉各一兩五錢　桑根白皮劉芒硝生鐵銚内炒

右三味同芒硝麻仁研勻煉蜜和劑搗熟丸梧桐子大每服二十丸空心煎粟米飲下至晚再服一方無葛根煎薑湯送下

葛根煎薑湯送下

黄三兩劉炒　烏巢子二兩　木香一兩　芍藥一兩　青橘皮湯浸去白焙一兩　川大

治大便不通胷腹妨悶不下飲食

右搗為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸以葱白皮薑汁煎湯送下

白生薑煎湯送下

麻仁丸　治大便祕澁虚瘦不通及一切壅熱

大麻仁另研膏三兩　大黄劉炒三兩　枳殼去穰麩炒一兩五錢　厚朴去粗皮薑汁炙三兩

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:11
列印頁數：47
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右三味搗為細末與麻仁同研煉蜜杵丸梧桐子大每服二十丸空心温水下以利為度一方塗酥杵令勻熱丸温酒送下

木香 三兩 枳殼 去穰麩炒 三兩 川大黃 劉炒 四兩 牽牛子 炒 四兩 訶梨勒皮 三兩

右搗羅為細末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸食前以薑湯下

大麻仁丸 治積年心腹氣肺氣脚氣冷熱氣痃癖氣

不能飲食縱食不消臟腑不調大腸祕澀

大麻仁 三兩 研如膏 另川大黃 劉炒 三兩 訶梨勒皮 三兩 人參 去蘆 一兩 陳橘皮 湯浸去白焙 一兩

右為末煉蜜杵丸梧桐子大每服二十丸食前薑湯下如未利加至三十丸酒下亦得此藥益利多不損人

治大便不通

大戟 一升 大豆 五升 商陸 三斤 牛膝 三斤

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為咬咀水五升煮二升以大豆五升煎令汁盡至豆乾初服三枚以通為度

治大便難

豉清　醬清　羊酪　土瓜根　汁

右和勻灌之立通

香枳湯　治大便祕結調風順氣

枳殼　防風　檳榔　甘草　各一兩

右為末熱湯調二錢空心服

四磨湯　治氣滯腹急大便祕結及老人虛祕

大檳榔　沈香　木香　烏藥

右擂盆内各磨半盞和勻温服有熱者加大黄枳殼

名六磨湯

潤腸湯　治大便祕澁連日不通

麻子仁　一錢五分細研用　永浸去皮取濃汁　芝麻　半升炒研用　永浸取濃汁　桃仁　湯浸去皮麩炒研如泥　荆芥穗　搗末各一兩

右用前藥入鹽少許煎可代茶飲之以利為度如煎

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:11
列印頁數：49
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

茶不宜煎過食前

南木香丸　治大便祕結

南木香　不見火　檳榔　麻仁　枳殼　各等分

右先將枳殼去穰每箇切作四片用不蛀皂角三寸生薑五片巴豆三粒畧搥碎不去殼用水一盞將枳殼同煮候滾濾去生薑巴豆皂角不用只將枳殼焙乾研細為末入前木香檳榔麻仁同末煉蜜丸蜜湯下

寬氣湯　利三焦順臟腑治大便多祕

香附子　潔淨新沙盆內焙乾秤六兩　烏藥　用天台真者去心取肉秤二兩縮砂一兩　甘草　炒一兩

右為末每一大錢濃煎橘皮湯下不拘時一方有杏仁枳殼

穿結藥　治大實大滿心胷高起氣塞不通者為結也

蟾酥　麝香　輕粉　巴豆　少許另研

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右再研至細孩兒乳汁為丸黍米大二粒生薑湯下無時

藏用丸

大黃二兩 黃芩二兩 滑石四兩 黑牽牛四兩

右為末水丸梧桐子大每服五七十丸食前溫水下

小通氣散 治虛人憂心傷肺肺與大腸為傳送至令祕澀服燥藥過大便祕

右等分㕮咀每服四錢水一盞煎溫服立通

承氣瀉胃厚朴湯 治胃實腹脹水穀不消溺黃體熱鼻塞□□血口喎脣緊關格不通大便苦難

厚朴去粗皮生薑湯炙三錢 大黃剉炒二兩 枳殼去穰麩炒 甘草炙各五錢

右㕮咀每服五錢水一盞半煎一盞去滓空心溫服

升麻湯 治強壯人熱毒流入腸胃骨節疼痛腹中煩

取利為度

陳皮去白 蘇軟莖葉 枳殼去穰麩炒 木通去皮節

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

滿大便祕澁

升麻四兩 大黃四兩剉炒 前胡去蘆 梔子仁炒各三兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎七分去滓食前温服未通再服

平胃煮散 治大病後重亡津液及老人津液不足大便祕澁

厚朴去粗皮薑汁炙五兩 蒼术去粗皮米泔水浸一宿焙八兩 陳橘皮湯浸去白焙五兩 甘草炙三兩

右㕮咀每服三錢加生薑二片棗二枚擘開煎一盞去滓温服

滌中丸 治宿食不消大便難及腸胃受熱瘕聚沉慮時行結熱

大黃剉炒八兩 葶藶隔紙炒二兩 杏仁去皮尖雙仁炒研 芒硝研各四兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服五丸至七丸食後温水下日三未通加至十丸一方有青橘皮名大黃丸

空心生薑湯下

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:12
列印頁數：52
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

半夏丸　治大便不通疎風轉氣下痰

半夏（湯浸去滑七次麩炒一兩）　牽牛子（四兩半生半炒）　木通（劉五錢）　青橘皮（湯浸去白焙五錢）

右為末煉蜜和劑搗熟丸梧桐子大每服四十丸夜卧時淡生薑湯下

大黃湯（出千金方）　治大便不通或大腸熱結風祕

大黃（劉炒）　黃芩（去心）　梔子仁　甘草（炙劉各一兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半煎八分去滓下滑石五分更煎兩沸空心溫服若大祕加滑石二兩

枳實丸　治風癖痰實大便祕澀頭旋眩運腹滿煩渴傷寒胃熱有燥屎譫言狂亂及結胸痛痞癰瘍瘡疾

大黃（五錢牽牛（炒取末五錢）　枳實（麩炒去穰）　人參（一錢）

右為末水丸黍粒大量人大小三五十丸或百丸水

治大便閉不通

皂角末　蒜

下

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:13
列印頁數：53
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右同搗爛貼臍心一方用皂角二挺去黑心皮為末
煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心温水下

雞脛骨丸　治反胃大便難肌膚乾瘦

雞脛骨 慢火煨 三兩
大黄 劉炒 五兩
大麻仁 研如膏 四兩

右為末與麻仁同研煉蜜杵丸梧桐子大每服二十
丸米飲湯下

牽牛子丸　治腹氣脹滿大便祕澀腹脇刺痛

牽牛子 三兩半 生半炒
檳榔 生劉 二兩
木香 一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸空心温酒下
或米飲湯下亦可

炒桃仁法　治裏急後重大便不快

桃仁 去皮尖 三兩
吳茱萸 二兩
鹽 一兩

右同炒熟去鹽并茱萸只以桃仁空心夜卧不拘時
任意嚼五七粒至三十粒

大腹湯　治老人虚祕

陳大腹皮 十五枚
木瓜 一枚
葱白 五莖

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右咬咀水五盞煎至二盞半去滓分溫五服

三仁丸　治大腸有熱津液竭燥裹急後重大便祕澀

松子仁　栢子仁　大麻子仁　各一兩

右研令勻黃蠟五錢鎔汁丸梧桐子大每服十丸空心食前米飲下未快加丸數服一方白蠟丸黃丹湯服之治老人虛祕

治五實病大腸難

川大黃　劉炒　郁李仁　湯浸去皮炒　各二兩　吳茱萸　五錢湯浸七次焙乾炒

右為末每服二錢食前蜜水調下以利為度

朴硝　二兩　五錢

治大便卒不通氣上奔心膈

皂莢　出黑皮塗酥炙去子　五靈脂　各一兩　巴豆霜　一分　阿魏　五錢　麩裹煨

右為末煉蜜丸菉豆大每服五丸生薑湯下未效再服

牽牛子丸　治臟腑壅滯心腹氣悶宿食不消腰脇疼

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

痛大腸祕澀
牽牛子 十兩 末六兩取 木香 五錢 青橘皮 湯浸去白 焙五錢 檳榔 五錢
右為末與牽牛子末和勻煉蜜杵丸梧桐子大每服
二十丸食前温酒下一方醋糊為丸米飲下薑湯亦
可
治大便難
醬清 三升 麻油 二升 葱白 三寸
右合煮令黑去滓待冷頓服一方不用醬清
葳靈仙丸 治年高氣衰大便祕結
黄耆 炙蜜 枳實 葳靈仙 各等分
右為末蜜丸梧桐子大每服五七丸薑湯熱水下一
方用防風忌茶
大黄通格丸
黑牽牛 大黄 木通 各五錢 另取末
右 闕
摩臍方 治大便不通腹脹

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

杏仁 湯浸去皮尖雙仁者三七枚生用
右研如膏每服取如酸棗大許塗手心摩臍上三百
轉須臾即利不止以冷水洗手即定

猪膽 一枚取汁 沙糖 少許 糯米 二合燒灰存性研細
右研如膏以少許入下部立通

猪膽 一枚取汁 皂莢 二挺去皮炙令黃為末 白梅肉 五枚 蜜 少許
右將白梅肉與蜜拌和皂角末如棗大以綿裹引內
下部中須臾即通

猪膽 一枚取汁 蜜 二兩 臘粉 一錢
右煮可丸入臘粉捏如中指長內下部立通

生葛根 二錢 猪膏 二錢 大黃 一兩
濡臟湯 治大便不通六七日腹中有燥糞寒熱反迫
短氣 闕 汗腹滿
穿腸湯 治大便七八日不通服諸藥未效者

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:14
列印頁數：57
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右㕮咀水五升煎二升去滓入膏煎三沸澄清强
人頻服瘦人再服亦治大小便不通
猪膽導方　治大便六七日不通奔氣上衝
用雄猪膽一枚繫口頭內下部漸解開頭倒瀉入肛
門須臾即通利
枳殼丸　治大腸結實
枳殼去麩炒黃 川大黃劉炒川 芒硝各一兩
右為末煉蜜丸梧桐子大食前生薑湯下三十丸
右水一大盞煎至六分去滓下朴硝空心分三服
吳茱萸生五十粒 梔子十四枚 川朴硝一兩
治上氣大便祕澀
杏仁五兩去雙仁皮尖熬 印成鹽三兩 乾薑三兩
右搗篩以醬汁和之令稀稠相得可長一寸餘如指
大兩頭尖仍以薄綿裹之於風日中曝令少乾內下部
中時時易之不過一易即有惡物下氣上即定亦

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

下食内藥痛時忍少頃如深内少頃亦不甚痛急出時物即出待痛定之後即得便利特出膿及惡物多大便不澁停之

治大便不通

治大便難

葛蒲 石鹽末 各一兩

右相和取半匙和烏麻脂少許綿裹内下部即通

醬清 烏梅

右將醬清漬烏梅灌下部中

又方

桑根白皮 榆根白皮 各一握

右㕮咀水三升煮取一升半分三服

又方

猪脂 一兩

葵子 一兩五錢

右將葵子為末猪脂和丸每服十丸温水服一方水三升煮取一升空心服

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:15
列印頁數：59
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

又方

葵子　牛酥　各一升　猪脂亦可

右水四升煮葵子取一升内酥煮一沸待冷分作二分

又方

葵子　汁　乳汁

右等分和服之立出一方單用葵根汁生服治大便祕塞不通

猪膽　羊膽　灌三合許令深入即出矣出

右用猪羊膽　闕

不盡須臾更灌一方加冬葵子汁和之妙又椒豉湯五升和猪膏三合灌之佳臨時易可得即用之又無灰濃酒半升鹽三錢煉成如上法

紫蘇麻仁粥　順氣滑大便男婦皆可用體虚之人風祕結燥服之皆得力

紫蘇子　麻子仁　各不拘多少

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右研爛水濾取汁煮粥食之○風科集驗方許學士云常有一貴人母年八十四歲或腹痛頭疼惡心不能食藥醫家供補脾進食治風清頭目藥疾數月益甚懇予辨之予曰悞矣此老人風祕臟腑壅滯聚膈中則腹脹惡心不喜食至顛頭痛神昏如得臟腑暢諸疾悉去予進蘇麻粥而氣洩下結糞十餘塊少間

通利諸證悉除

牛黃散　治上焦積熱臟腑祕結

大黃一兩　白牽牛頭末五錢　寵突墨一錢　滄鹽三錢

右為末有厥冷用酒調下三錢無厥冷手足煩蜜湯調下

小提盆散　治大便燥結服轉藥久不通

右研勻竹筒吹一錢肛門內立透

治大便不通

當歸　香白芷　各等分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末每服二錢溫米飲湯調下

葱白散　治老人及虛人大便不通

葱白 三莖 阿膠 一片

右以水煎葱候熱不用却入阿膠鎔開溫服一方用蜜二匙鎔服又以酢和葱封臍通吳内翰母夫人曾服得效

黄耆湯　治年高老人大便秘澁

綿黄耆　陳皮 去白皮 各五錢

右為末每服三錢用大麻仁一合研爛投取漿一盞濾去滓於銀石器内煎候有乳起即入白蜜一大匙再煎令沸調藥末空心食前服秘甚者不過兩服愈常服無秘澁之患此藥不冷不燥其效如神一方用枳殼五錢

蜜兌法　治閉結腸熱及肛塞腫縮生瘡

蜜 三合 猪膽汁 二枚

右以蜜入猪膽汁在内煎如飴以井水浸冷候凝撚

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

如指大長三寸塗油納下部立通活人書單用蜜一
方入皁角末在人斟酌用之一方入薄荷末代皁角
用尤好又或偶無蜜只嚼薄荷以津液調作挺用之
一方無猪膽
治大便不通
猪糞　猪羊膽
右以葦筒著膽縛一頭內下部入二寸灌之八錢立
下
治人有腸結之患
天麻十兩　蒺藜子一鎰　緩火熬焦熟
右先安置天麻於瓶中上用火焰過蒺藜子蓋內外
便用三重紙蓋並繫從巳至未時又出蒺藜子再入
熬炒準前安天麻於瓶內用炒過蒺藜子於中依前
蓋又隔二服時後出如此七徧瓶盛出後用布拭上
氣汗用刀劈剖焙之細剉搗用御風草修事法亦同
天麻

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:16
列印頁數：63
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

提盆散　治大便祕澀服藥轉取不通者
滄鹽（三版塊錢）　屋簷爛草節（七箇）
右為末研勻每用五分至一錢竹筒吹在肛門內寸
深立效

潤腸橘皮丸　降氣潤腸調和五臟並治三焦氣壅大
便祕澀老人虛弱服不損氣及治風祕
橘皮（一方用橘紅）　杏仁（去皮尖雙仁麩炒黃各等分）
右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十丸空心溫水下

一方米飲下

牽牛散　治大便祕澀
牽牛子（半生半炒）　檳榔（生剉各五錢）
右為末每服三錢生薑湯調下未利良久熱茶投
疏利為度

大豆麩方　治諸風濕痺筋攣膝痛胃中積熱口瘡
煩燥大便祕澀
大豆黃麩（炒熟搗末）　酥（五錢）
一升酥

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:17
列印頁數：64
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右研勻不拘食前後温水調下一匙

甘遂散　治大便祕澀不通

甘遂 一兩 炒
木香 一分

右為末每服一錢温酒調下不拘時

荆芥散　治大便不通無問新久癰悶不通小腹急痛肛門疼腫

荆芥穗 一兩
大黄 二兩並生用

右為末每服二錢生薑蜜湯調下未通再服

商陸煮豆方　治大便不通

商陸 乾者 大戟 剉炒 一分

右㕮咀水四升棗十枚去核煎一升半黑豆半合煎水盡乾取黑豆初吞三粒稍加之以通利為度

滑石散　治大便不通腹脹氣急妨悶

滑石 三兩 細研
手足指甲 翦患人自身者燒灰 研極細各分二貼

右取滑石末每貼水一盞半煎八分去滓調勻指甲灰空心辰時服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

粉糖丸　法大腸壅結不通

臘粉 五分　沙糖 如彈丸大一塊

右研令勻丸梧桐子大每服五丸臨卧温水下

皂莢散　治大便不通

猪牙皂莢 去皮酥炙 五錢　蒺藜子 炒去角 五錢

右為末每服一錢鹽茶湯調下

大黄丸　治大便不通

大黄 劉炒 五兩　大麻仁 研二兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服十丸食後熱水下

治肛門肺熱閉塞不通腫縮生瘡

右和丸如指大導下部姚云欲死者蜜三升微火煎如錫投冷水中令凝丸如指大長三四寸導之良

一方水四升蜜三升煎熟冷灌下部又常服蜜煎

五合

大黄芒硝丸　治大便暴閉不通氣悶絶

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:17
列印頁數：66
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

大黃六兩 芒硝五兩 用朴硝一方

右先切大黃水四升煮取二升去滓入芒硝頓服之

須臾利如良久不覺以熱飲投之一方為末每服二錢温米飲調下

治乾糞塞腸癥腸脹痛不通

毛桃花一兩 濕者三兩 麵三兩

右和麵作餛飩熟煮空腹食之日午後服如雷鳴當下惡物得效

治大便旬日不通

鼠糞二枚 白膠香半兩 大棗

右為末水和如棗核大油塗內穀道中良久便通

又方

臘粉一分 黃丹一錢

右為末每服一錢粥飲調下

治臟腑壅塞心腹氣悶宿食不消腰脇疼痛大腸祕澀

牽牛子一斤炒搗取末十兩 青橘皮三兩去白湯浸焙為末

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右都令勻杵和蜜丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸食前温酒下生薑湯亦可

治大便不通

用白礬石如指大導下部佳

又方

用漢瓜蒂七枚綿裹内下部如非時醬瓜亦得

治卒大便祕澀不通

用削瓜葅如指大導下部中即效

欽定四庫全書

普濟方

又方

用蜜和燕屎内大孔中即通又方蜜一升水四升煮

治大便難

熟冷灌下部中

用桃皮三升水五升煮取一升頓服一方水服桃花方寸匕無花白皮亦得又方桃葉取汁服亦佳

又方

用車前子及葉常服良

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治脹滿不通

用獨頭蒜燒熟去皮以綿裹內下部中氣立通及乾

薑鹽杏仁搗丸導之並佳

巴豆丸　治寒癖宿食久飲飽不消大便不通

用巴豆仁一升擣酒五升煮三日三夕後合酒微火煎令可丸如胡豆大欲取吐下者服二丸一方巴豆一粒去皮油心膜粳米飯二十粒丸如菉豆大温水下三丸

蜜劑方　一名霹靂箭　治大便久秘攻不透肺熱應肛門熱閉塞生瘡

用蜜不拘多少慢火熬令作劑稀則粘手硬則脆稀稠得所堪作劑搓如棗核大粗如箸長一寸許蘸油內于肛門中坐良久自透或加減少許一方可丸六七寸內肛門中到身向上頭下少時取痒即通加鹽相合亦可如用草烏頭末相合亦可鹽則軟堅潤燥草烏末則祛寒消結可隨證陰陽所宜用之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治虛人並老弱人虛祕
用大麻仁不計多少研細用水濾取麻飲以米相和
煮粥或煮蘿蔔食之一方水調服又方常煮子汁飲
蜜五合常服亦妙熟湯濾汁服亦可
蜜煎藥　治大便不通
用明黃蠟不拘多少油少許鹽少許撚作錠子放入
肛門
治大便祕澀不通
欽定四庫全書
用牽牛子半生半熟為末每服二錢煎薑湯調下
如未通時再服及熱茶投之量虛實無時候加減
服
治大便不通氣奔欲死
用烏梅十枚置湯中須臾去核為丸如棗大內下部
少時即通
治大腸久冷祕
用葳靈仙蜜丸梧桐子大於一更內生薑清米飲下

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

十丸至二十丸

治大便澀結

用陳皮不去白酒浸煮至軟焙乾為末復以溫酒調服二錢為妙一方以米飲湯調下

治大便秘澀不通

用蜣螂不拘多少去翅足為末熱酒調下一錢

治卒大便不通祕澀

用綿裹鹽丸作三丸如手指大內下部中一方用食鹽和苦酒傅臍中乾即易

敷藥　治閉結至急昏不知人

用生大螺螄三枚以鹽入殼內生搗碎置病者臍下一寸三分用寬帛緊繫之即大通未效烏柏木三寸研井水服亦效就多研爛咽下亦可

治大便不通

用烏柏木一寸許擘破以水煎取小半盞服之立通甚效

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

去燥糞

用生薑削如小指長二寸鹽塗内下部中立通

治下部閉不通

用蒴藋根一握搗汁水和絞去滓强人服一升數

治大便卒澀結不通

用之並治脚氣

用羊蹄根一兩剉水一大盞煎取六分去滓温頓服

治天行熱祕腸内結

用胡麻油熱服一合取利為度熟油損聲令體重生

治大便祕結積熱不通名獨棗湯

油殺蟲摩惡瘡

用黑腰棗三枚劈開去核以水銀粉於棗核中塞滿濕紙裹煨用生葱茶清嚼下一方以棗汁送下又方

用麻線縛定水一盞煮棗熟細嚼熱湯下一方丸

梧桐子大薑湯服五丸一方麵裹煨熟為末煎湯

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:19
列印頁數：72
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

調服亦效

附子散　治大便冷祕

用附子一枚炮製去皮臍削去外面留中心如棗大

碾為末蜜水調下一錢

玄明粉散　治大便不通亦治小便

用土瓜根用內方　治大便不通

土瓜根搗汁少許水解之竹筒傾內下部即通

用玄明粉五錢每服二錢將冷茶磨木香入藥温服

即通

郁李仁粥方　治大便不通

郁李仁一兩去皮細研分兩服煮薄粥一椀臨

熟時下郁李仁煮三兩沸傾出空心服即通未

通再服以通利為度

羚羊角飲　治健忘多驚大便難口中生瘡

羚羊角（鎊一兩）　人參（一兩）　胡黃連（五錢）　赤茯苓（去皮黑）　羌活（去蘆）　附子（炮去皮臍）　梔子仁（炒）　牡丹皮　黃芩（去皮黑）　麥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

門冬去心炒 薔薇根皮 大黃炒各一兩 防己二兩 甘草炙三分

右㕮咀每服五錢水二盞生薑半塊拍破鹽豉四十粒煎一盞去滓更入淡竹瀝少許攪勻食前温服

秦艽湯 治大腸虛瘕秘澁

秦艽去苗一兩五錢 防風去蘆一兩一錢 枳殼去穰麩炒一兩 桂去粗皮三分 檳榔炮剉一兩一錢 牽牛子生搗去麄頭一錢 獨活去蘆頭一兩 朴硝

細研一兩五錢湯成旋下

檳榔丸 出聖濟總録 治腸胃受熱氣不宣通瘕聚沈虛腹脇脹滿大便秘澁

檳榔剉 大黃剉炒各二兩 枳殼去穰麩炒二兩 大麻仁研 桃仁去皮尖雙仁麩炒研 青橘皮湯浸去白焙 木香各一兩

右除桃仁麻子仁外為末同研勻煉蜜丸梧桐子大

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:20
列印頁數：74
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

每服二十丸溫水送下日二服以知為度一方無青
橘皮
大黃飲 出聖濟總錄 治小腸移熱於大腸腹脇脹滿瘕聚
祕澀
大黃 劉絹裹淬三度焙乾炒 澤瀉 黃芩 去黑心劉 甘草 炙劉各一兩
右㕮咀每服三錢水一盞半煎八分去滓空心溫
服晚再服
欽定四庫全書
三黃湯 出聖濟總錄 治虛瘕大便祕澀
大黃 劉炒一兩五錢 芒硝 研 黃芩 去黑心各一兩 梔子仁 七枚 甘草 炙劉五錢
右除芒硝外㕮咀每服三錢水一盞煎七分去滓入
芒硝五分煎三沸溫服食後臨卧
檳榔丸 出聖濟總錄 治大腸受熱瘕聚沈虛祕澀不通
檳榔 炮劉一兩 大黃 劉炒二兩 木香 五錢 陳橘皮 湯浸去白焙一兩 牽牛子 二兩內一兩生為末一兩炒熟另為末
普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右將四味成末入犀牛子末和為丸煉蜜於白内塗酥杵丸梧桐子大每服三十丸空心温酒下

潤腸丸 出醫方集成 治發汗利小便亡津液大腸秘老人虚人皆可食

肉蓯蓉 酒浸焙 二兩 沈香 別研 一兩

右為末用麻子仁汁打糊為丸梧桐子大每服七丸空心用米飲下

潤腸丸 出東垣試效方 治脾胃中伏火大便秘澁或乾燥秘塞不通全不思食及風結秘血結秘皆令閉塞也以潤燥和血疎風自然通

麻子仁 一兩 去皮尖 桃仁 一兩 羌活 五錢 大黄 煨 五錢 當歸 尾

右除麻仁桃仁另研如泥外搗羅為末五上火煉蜜丸如梧桐子大每服三十五丸空心白湯下○如病人不大便為大便不通而滋其邪盛者急加酒製大黄以利之○如血燥而大便不行者加桃仁酒製大黄○如風結燥大便不行加麻子仁大黄○如風結

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

澀而大便不行者加皂角仁大黃秦艽以利之○如脈澀覺身有氣澀而大便不通者加郁李仁大黃以除之○如寒陰之病為結閉而大便不通者以局方中半硫丸或加煎附子乾薑湯冷與之其病雖陰寒之證當常服陽藥補之若大便不通者亦當服之與一服藥微通其大便不令閉結乃治大法○若病人雖是祕結或是陰寒之證其病煩燥脈實堅亦與陽藥中少加苦寒之藥以去熱燥燥止勿加○如陰燥欲坐井中者其二腎脈必按之虛或沈細而遲此易為辨耳如有客邪之病亦從權加藥以去之

活血潤燥丸 出東垣試效方 治大便風祕不通常燥結

當歸 一錢 防風 三錢 羌活 一兩濕 大黃 一兩濕紙裹煨 桃仁 二兩湯泡去皮尖 麻仁 三兩五錢二味另研入藥 皂角仁 燒灰存性去皮一兩五錢其性得濕則滑得滑則燥結自除用之勿悞

右除麻仁桃仁另研外為末同拌勻煉蜜去沫為丸如梧桐子大每服五十丸三兩服後日久不能結燥

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

也以磁器內盛紙封之無令見風

升陽瀉濕湯 出東垣 試效方 治膈咽不通逆氣不通裏急大便不行

青皮 二分 甘草 四分 槐子 二分 黃耆 一錢 黃蘗 三分 升麻 七分

生地 三分 熟地黃 三分 當歸 四分 桃仁 二錢 蒼术 五分

右㕮咀如麻豆大作一服另研桃仁如泥一處同煎水二盞煎一盞去滓稍熱食前服

麻黃白术散 出東垣 試效方 治大便不通三日一遍小便

黃赤渾腫面上及腹猶甚其色黃麻木身重如山沈

困無力四肢痿軟不動舉動喘促吐清水吐噦痰唾

白沫如膠時燥熱發欲去衣須臾而過振寒項額冷

如冰額寒猶甚頭旋眼黑目中溜火冷淚鼻不聞香

臭小腹急痛當臍有動氣按之堅硬而痛

生甘草 一錢 澤瀉 四分 茯苓 四分 橘紅 二分 青皮 一分 黃連 一分

厚朴 三分 炒麵 五分 升麻 二分 柴胡 三分 白术 三分 蒼术 三分

麻黃 不去節 五錢 桂枝 三分 杏仁 四枚 吳茱萸 草豆蔻 各五

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:22
列印頁數：78
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

酒製黃耆三分 人參三分 甘草炙一分 猪苓三分 黄皮一分

右㕮咀分作二服水二盞半先煎麻黄令沸去沫再入諸藥同煎至一盞去滓稍熱食遠服○此證宿有風濕熱伏於榮血之中其木火乘於陽道為至盛元氣短少喘為陽火傷於四肢瘿在腎水之間乃所勝之病今正遇冬寒得時乘其肝木又實其母肺金尅火凌木是火大勝必大復其證蓋恐欠多噦鼻中如有物不聞香臭目視眡眡多悲健忘小腹急痛通身黄腹大脹面目腫猶甚食不下痰唾涕有血目眥瘍大便不通只二服皆已

普濟方

驅風丸出朱氏集驗方 治大便不通或年高風祕

皂角七挺炮按水兩椀 巴豆四十九粒去殼心膜 枳殼一兩

右以皂角挼水煮乾為末去巴豆不用炒枳殼為末入木香五錢蜜丸如梧桐子大空心白湯下三十丸

順氣丸出如宜方 治大腸每祕澀即諸風病發或諸閟發

大黄五兩半生半熟 車前子 檳榔 麻仁炒 牛膝酒浸郁

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

李仁 湯浸去皮 兔絲子 酒浸蒸 山藥 各二兩 山茱萸 防風

右為末蜜丸梧桐子大茶湯米湯任下此藥補益通利疎風順氣治丈夫婦人膈上虛弱燥熱肺腑疾壅調三焦開胃口大小便祕結不通及腸風等疾

神功丸 出本事方

人參 五錢 阿梨勒 生用一兩 大黃 蒸一兩 麻仁 八錢

右為末除出麻仁研為膏次入前藥煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心茶酒任下

枳殼丸 出生方 治腸胃風氣壅盛大便祕澁

皂角 一挺去黑皮炒 枳殼 製炒 大黃 炒 羌活 木香 淨陳皮 白芷 桑白皮

右為末蜜丸梧桐子大每服七十丸空心米飲或薑湯下

三和散 方見三焦腑門三焦腑類 治七情氣結五臟不通脾胃不和大便祕澁

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

金液湯 出如宜方 治臟寒大腸挾冷結滯
硫黃 淨揀去沙石十兩研細飛過用磁盒盛水和赤石脂以鹽泥封固候乾地內先埋一小罐盛水令滿置盒在上再以泥封固以慢火養七日七夜候足頂上加火一片煅之候冷取出研為末
右藥末一兩用蒸一兩湯浸去藥水和為丸如梧桐子大每服三十丸多至百丸温米飲下空心服又宜麻仁杏仁煎湯下如大腸乾燥宜蜜導法 方見孺孩大小便淋瀝門大便不通類

正真丹 余居士選奇方 治老人氣虛滿悶大便祕瀝連日不通不敢服藥下者宜服此
硫黃 一兩研 陳皮 五錢去白 五靈脂 一兩分

右先搗陳皮次搗五靈脂硫黃同搗勻麵丸如梧桐子大每服五十丸食前米飲下

和血通經湯 出東垣蘭室方 靈壽縣長董監軍癸卯冬大雪時因公到真定忽有大風氣暴至 闕親張耘夫求醫診候得六脈俱弦甚急按之洪實有力其證手足攣急難明其狀大便祕瀝面赤而熱此風始至於身也四

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

肢者脾也以風寒傷之則搐極而攣閉乃風淫未深而寒在外也內經曰寒則筋攣正謂此也本人素飲酒內有實熱乘於腸胃之間故大便祕澀而面赤熱內則乃手足陽明受邪外則足大陰脾之經受寒之邪乃以桂枝甘草根以却其寒邪而挼其急搐又以葛根以升陽氣行手足陽明之經不令遏絶更以桂枝辛熱入手陽明之經為引用潤燥復以芍藥甘草黃栢之苦寒滑以瀉實而潤燥急救腎水使以升麻專補脾氣使人不受風寒之邪而退木邪專益肺也加人參以補元氣為之補佐加當歸身去裏急而和血

升麻 一錢　葛根 一錢　當歸身 一錢　人參 一錢　桂枝 二錢　芍藥 五分
甘草根 炙 一錢　黃栢 酒製 二錢

右剉麻豆大煎法如常令煖房中近火摩其手一

化積滯通大腸方 楊子建護命方

服乃愈

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:23
列印頁數：82
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

芫花一兩薄切醋煮乾 牽牛一兩鱉甲醋炙五錢 狼毒製如前 獨活 大黃 荊芥穗各一兩 半夏三錢 桔梗去心 當歸 牛膝 右件依法修製芫花狼毒二味木臼中杵羅為末後總合一處相滾令所餘諸藥合一處杵羅為末拌勻每服二錢匕土器內煎葱湯調下 大橘皮丸出十便良方 治大便祕

厚朴一兩 橘皮一兩 杏仁一兩三錢 欽定四庫全書 普濟方

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五七十丸非時米飲下 神效丸出衛生家寶方 治大便祕

黃梔子隔年者 大黃炮 甘草各等分 右碾羅細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸畧秘甚者用白湯下秘甚者以煎橘皮湯下之食前服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

五仁丸出瀋方 治大便祕澁可以常服

杏仁酒浸去皮尖麵炒令黃取淨一兩細研 郁李仁湯浸去皮尖取淨一兩細研

栢子仁揀淨一兩細研 酸棗仁湯浸去皮取淨一兩細研 大麻子仁曬令

右五味再合研令極細以水浸蒸餅為丸梧桐子大每服五十丸空心米飲吞下

通祕散出十便良方 治風秘大便澁

香白芷不拘多少炒乾

右為細末每服二錢蜜少許温米飲調下連進二服食前

香术丸出余居士選奇方 治腹脹痛臟秘

蒼术一兩厚朴薑汁炙一兩陳皮一兩生好硫黄二兩用蘿蔔煎沸湯洗三次

右搗羅為末浸蒸餅糊為丸如梧桐子大每服三五十丸日二服米湯下

麻仁丸出直指方 調三焦潤五臟治大便不通年高老

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:24
列印頁數：84
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

人宜服

白檳榔 半半生煨 車前子 羌活 去蘆 木香 各一兩 肉桂 去粗皮 山茱萸 兔絲子 酒浸一宿另研為末 枳殼 去穰麩炒 防風 去蘆 麻仁 另搗研 大黃 半蒸半生 郁李仁 去皮 各一兩 山藥 各一兩 又頭及 麻仁 另搗研 大黃 半蒸半生 郁李仁 去皮 各一兩 又頭及

右為細末共研和勻煉蜜丸梧桐子大每服十五丸至二十丸溫水吞下臨卧服

通腸丸 出十便良方

治大腸結不通

厚朴 製為末 豬胰 各分等

右用豬胰研和如梧桐子大每服三十丸生薑湯下

四順飲子 出十便良方

治大便不通面目身熱口舌生瘡上焦胃悶時欲得冷此三陽氣壅致大腸熱結脉氣洪大

大黃 赤芍藥 甘草 當歸 各分等

右為粗末每服五錢水一盞半煎一盞溫服

潤腸丸 出衛生寶鑑方

治胷膈痞悶大便澁滯

欽定四庫全書 普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

麻子仁 二兩五錢研極細
枳實 五錢麩炒
大黃 酒煨一兩五錢
白芍藥 五錢
木香 二錢
陳皮 三錢
升麻 五錢
檳榔 二錢
人參 三錢
桃仁 五錢
當歸尾 五錢
生甘草 三錢

右件除麻仁桃仁外搗為末却入麻仁桃仁泥子和勻蜜丸如梧桐子大每服七八十丸温水食前服

治大便不通 出本草

研麻子相和為粥食

治大便不通十日至一月 出本草

用冬葵子三升水四升煮取一升去滓服不差再

欽定四庫全書

普濟方

服

又方 出危氏方

用枳實阜角等分為末飯糊為丸米飲下

枳實湯 出濟生方

治腹脹發熱大便祕澀脈多洪數此名熱脹

枳實 去穰麩炒五錢
厚朴 薑製炒一兩
大黃 酒蒸三錢
甘草 炙三錢

桂心 不見火二錢五分

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片棗三枚煎至七分去滓溫服不拘時候嘔者加半夏一錢

小黃耆丸 出十便良方 治大腸風熱大便祕澀及五痔結核

防風 一兩 黃耆 二兩 川芎 五錢 皁子仁 一錢 枳殼 一錢

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸不拘時候米飲下

麻仁丸 出楊氏家藏方 治大便祕澀

麻仁 一兩 另研 杏仁 去皮尖麩炒二錢 枳實 去穰麩炒五錢 白芍藥 五錢 黑牽牛 一兩七錢

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸溫熱水送下食前

麻子仁丸 出因方三 治太陽脉浮而澀浮則胃氣强澀則便數浮澀相搏大便則堅其脾為約大便堅小便利而不渴

麻子仁 五兩炒 芍藥 八兩 枳實 麩炒八兩 大黃 蒸一斤 厚朴

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:25
列印頁數：87
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

薑汁炒五錢 杏仁去皮尖炒另研五兩五錢

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸溫水下未知加至五十丸一方麻仁一兩五錢杏仁三錢大黃一兩枳實芍藥厚朴各五錢此依局方上本是漢治大腸氣祕壅熱結澀出本草

兩乃均製合理用當以理推

兩杏仁用六錢一方麻仁一兩二錢五分芍藥一方合用大黃枳殼一斤正得合一兩厚朴當用四

一兩枳實芍藥厚朴各五錢此依局方上本是漢

加至五十丸一方麻仁一兩五錢杏仁三錢大黃

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸溫水下未知

牽牛子微炒搗取其中粉一兩 桃仁麩炒去皮尖取末五錢

右以熱蜜和丸如梧桐子大溫水服三二十丸不可久服亦行脾腎氣故也

導引法

養生方云偃卧直兩手捻左右脇除大便難腹痛腹中寒口內氣鼻出氣溫氣咽之數十病愈

普濟方卷三十九

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

欽定四庫全書

普濟方卷四十

大臟腑門

明　周王朱橚　撰

大便不禁　論

夫大腸為傳導之官掌化糟粕魄門為之候若其臟寒氣虛不能收斂致糟粕無所制約故遺失不時治之宜澀故津液方論所謂澀可去脫是也

方

陳橘丸　治大便不禁腹内疼痛

陳橘末　炒
白茯苓　去皮
附子　炮　去皮臍
龍骨　各一兩
當歸　切焙
乾薑　炮
赤石脂　各一兩
甘草　炙
人參　各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服十五六丸空心米飲下日再服

救陽丸　治大便不禁手足厥冷面色青白

吳茱萸　湯浸焙乾
乾薑　炮
赤石脂
蜀椒　炒出汗
硫黃　研飛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右等分為末稀糊為丸梧桐子大每服十五丸米飲下空心食前漸加丸數鹽湯亦得

龍骨湯 治大便不禁真氣羸弱

龍骨 阿膠 炙燥 乾薑 炮 黃連 去鬚炒各一兩 粳米 三合炒熟 附子 炮去皮臍半兩 甘草 炙劉 黃芩 去黑心 芍藥 各二分 石榴 一枚大者切另搗入

右㕮咀每服五錢水盞半煎一盞去滓空心溫服

日再

地榆丸 治大便不禁

地榆 一兩 白龍骨 赤石脂 沒石子 熟艾 去梗炒 橡實殼 炒半兩 黃柏 炙三分各去粗皮

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心米飲下

日再

附子湯 治下焦虛寒大便不禁

附子 炮去皮臍半兩 黃連 去鬚炒二兩 阿膠 炙燥三分 甘草 炙劉 乾薑 炮各半兩 赤石脂 厚朴 去粗皮薑汁炙各一兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右㕮咀每服五錢水盞半煎一盞去滓空心温服日
再
石榴皮湯　治虚寒客於下焦腸滑洞洩困極欲死
酸石榴皮炒　乾薑炮各一兩　黄栢去粗皮炙阿膠炙各三分
右㕮咀每服四錢水一盞煎四分去滓空心温服或
無黄栢用黄連亦得
厚朴荳蔻湯　治大便不禁
肉豆蔻去殼炮半兩　龍骨　白朮劉炒三分　厚朴去粗皮薑汁炙劉一
右㕮咀每服五錢水盞半生薑三片煎一盞去滓空
心温服
朝真丸　治虚損洩瀉大便失禁
硫黄一兩研飛　青鹽一錢研　晉礬熬枯研一兩
右研勻水浸炊餅丸菉豆大每服十五丸至二十丸
温酒下空心食前或用丹砂為衣亦得
福建丸　治大便不禁并腸鳴

欽定四庫全書　普濟方　兩

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

附子 去皮臍 一兩 厚朴 去麤皮二兩同附子用生薑汁浸一宿於瓦器內炒 右為末用酒煮陳橘末為糊丸梧桐子大每服十五丸至二十丸生薑鹽湯下空心食前服

石硫黃湯 治虛冷大便不禁氣脫神昏

石硫黃 明者細研 紫笋茶 焙乾研末各一兩 右水一盞下硫黃末半錢匕茶一錢匕煎六分去滓温服不拘時日三

欽定四庫全書

大理中丸 出危氏方 治大便虛滑不禁每一丸用平胃散一貼煎化服便止加鹽梅煎尤妙

人參 白术 乾薑 甘草 各等分 右為末煉蜜丸如指頭大

脫肛 論

夫肛門者主大行道肺大腸候也號為通事令史重十二兩長一尺三寸廣二寸三分應十二時若臟腸熱則肛門閉塞大行不通或腫縮入生瘡若臟腑寒則肛門開大行洞瀉肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之

普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

虛實和平依經調理之〇四十八難曰病之虛實出者為虛入者為實肛門之脫虛也蓋實則溫溫則内氣充而有所蓄虛則寒寒則内氣餒而不能收而況大腸之厚薄膏脂之肥瘠亦視夫内氣之虛耳大凡肛脫須以温湯洗令和軟然後摩掌而入治法以治斂行之其有産婦用力過多及小兒叫號努氣久痢不止風邪所襲亦有此證凡腸頭作癢即是中有蟲生取苦楝根煎湯薰洗仍以乾艾生薑煎服其脫肛腸風痔瘻者登溷不可用舊紙若包裹湯藥雜物尤不可用纔有一毫染汚其間立見痛腫如此急以温湯滌之患在肛腸登溷後須用一洗〇下痢脫肛者因大腸虛弱冷氣偃之至圊不能便極力於下肛門脫出故謂之脫肛温其臟則愈古方有坐湯温熨之藥皆良法也脫肛一證氣聚不散也裹急而不得出外脹而不得入先以枳殼散作劑又以枳殼燒灰存性細末摻傅或津唾調傅氣散則腫消矣仍用生薑汁調五苓散如膏入新水研散略煎吞

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

黃連阿膠丸此論肛門挾熱而腫脹也其或腸中虛薄不收則理中湯釣腸丸養臟湯輩主之烏鰂骨木賊草傅之

方

猪膽散出千金方治大腸寒應肛門寒則洞洩肛門滯出

猪膽一斤令燥熬 黃連 阿膠 芎藭各二兩 烏梅肉五兩 艾葉一兩

右為末每服二錢温酒調下白米飲亦可食前日再服

金鳳膏治痔瘡破者脫肛

鮮魚肝一個 龍腦一錢 麝香半錢 飛礬半錢 黃連末炒加些少

右為末用鮮魚膽調塗五六次立効

鱉甲丸出聖惠方治脫肛皆因从痢大腸虛冷所致肛門為大腸之候大腸傷於寒下痢用力其氣不逆則肛門脫出雖一年下痢脫肛門不收腹中冷可安

鱉甲醋炙一方用鱉頭 蝟皮炙 桂心各一兩 磁石二兩煅淬

右為細末蜜丸菉豆大米飲下五丸量大小加減服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

一方為散食前粥飲服

治脫肛神効方

蔓陁羅花子 蓮殼一對 橡碗十六個

右搗碎水煎三五沸入朴硝熱洗其肛自上

香膽丸方見痔瘻門諸痔類 治痔漏脫肛

荆芥散出直指方 治脫肛

大香附 荆芥穗各半兩 縮砂二錢半

右為末每服三錢食前新水煎數沸即服小兒通用

一方無縮砂洗

縮砂湯出直指方 治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

縮砂 黄連 木賊各等分

右為末每服二錢米飲調下

治大腸虛冷大便後脫肛洞出出聖惠方

鱉頭一枚塗酥炙令焦乾炒 鐵精一兩研 萇茗子一兩水洵去浮者水浸毛出候

右為末每服二錢食前粥飲下肛上更炙故麻鞋底

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:54
列印頁數：7
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

熨之

治大便風冷脫肛兼腰痛不可忍 出十便良方 一名三神丹

石灰 白礬 黃丹 各一兩

右研以油和為餅子新瓦上燒令通赤放冷細研又和又燒如此三度為末入麝香末一分更研勻每服一錢食前粥飲艾葉調下

治脫肛不差 出聖惠方

鱉頭 一枚 煉灰 蒲黃 半兩 白蘞 一兩

右為末傅於肛上按抑令入日三四度差

治脫肛瀉血不止 出聖惠方

石耳 五兩 炒 白礬 一兩 燒灰 蜜陀僧 五錢

右為末水浸蒸餅丸梧桐子大每服二十丸食前粥飲下

蝟皮散 一名鱉頭散 出千金方

治肛門脫出或因用力太過或因洞泄不收

磁石 四兩 桂心 一尺 蝟皮 一枚

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:54
列印頁數：8
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右為末飲服方寸匕日一服即縮慎舉重及急帶衣斷房室周年乃佳治女人陰脫出外用生鱉引出頭一枚齊甲裁之炙焦搗末為四味亦治脫肛仍用破草鞋底炙上面熨按入

壁土散 出千金方 治肛門滯出

故屋東壁土 一升碎 皂莢 三挺各長一尺二寸

右洗搗土為末挹粉肛頭出處次取皂莢炙暖更遞熨取入即止

又方 出千金方 治脫肛

鱉頭 故敗麻履底 各一枚

右將鱉頭燒為末傅肛門頭次將履底按入即不出矣

治脫肛 出醫方大成一名槐花散

槐花 槐角

右等分炒香黃為末用羊血蘸藥炙熱食以酒送下或云以猪脂去皮蘸藥炙服

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治大人小兒脫肛不收 出經驗良方 一名香荊散

荊芥 皂角 各等分

右為末煎湯洗了用鐵汁塗即入亦治痔及治婦人子宮出亦如此用

治大人小兒腸頭出 出經驗良方

百草霜 五倍子 各等分

右為末醋熬成膏子以鵝毛傅上即入

蛇床散 出經驗良方 治脫肛

蛇床子 甘草 各兩 各一

右為末熟湯調服一錢日進三服

又方 出永類鈐方

白鷄冠花 防風 各等分

右為末糊丸空心米飲下百丸

荊芥散 方見本門腸風下血類 治脫肛

香葺丸 一名麝香丸方見洩痢門腸垢類 治脫肛

治脫肛 方見本門腸風藏毒方 類治腸風藏毒方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治積痢脫肛 出千金方
用枳實石礬磨令滑鑽孔安柄蜜塗炙令暖更易熨肛
取縮止

治赤白痢脫肛
用木瓜一握百藥煎一塊陳白梅三個以水一碗煎
至半碗無時服

治大腸虛冷脫肛及痢後脫肛 出聖惠方
乾蝸牛子 一百枚炒為末 磁石 二兩搗碎淘去赤汁

右水一大盞煎磁石五錢至五分去滓調蝸牛子末
一錢服之日三服一方為末每服二錢匕空心米飲
調下日午再服

治脫肛瀉血不止 出聖惠方
附子 一兩燒熱地上用盞蓋出火毒 桑黃 一兩炙

治脫肛不縮 出聖惠方
石榴皮 茜乾 各一握

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸食前粥飲下

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

右咬咀好酒一大盞煎至七分去滓温服

治脫肛不收

赤石脂 白礬 半生半熟

右擦洗傅之用青物托進肛門

治腸頭挺出

用蝦蟆皮一片燒傅出處一方瓶内燒薰

治肛門滯出 出千金方

用炙故麻履底按令入頻按入永差

治肛門脫出 出千金方

用女菱一升以器中燒坐上薰之即入

治脫肛腸出熱痛 出千金方一名蒲黄膏

用蒲黄二兩以猪脂和傅肛上内之二三度即愈以

治腸隨肛出轉从不可收入 出經驗良方

粉塗之良

用生栝蔞為粉以猪脂膏温塗隨手抑按自得縮入

又方生搗汁温服以猪肉汁洗手接之令暖自得入

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

一方用栝蔞煎湯洗之

治脫肛歷年不愈 出聖惠方 用生鐵五斤水一斗煮取五升出鐵以汁洗日再無不差并燒礬石粉傅之亦良

木賊散 出指直方 治脫肛不熱 用木賊不拘多少燒存性為末摻肛門上按之

治脫肛 出經驗良方 用磨刀水下鐵漿以毛翎塗少許於肛門上却以磨刀水洗

又方 出經驗良方 石煎湯空心服半盞許一方用磨刀水洗

又方 出經驗良方 用貼水荷葉焙為細末好酒調下二錢又將荷葉一片將藥末二錢在禁上令人在葉上坐即入

治痔漏脫肛 出肘後方 用淡竹葉一把煎濃洗洗立效

用虎脛骨兩節重二兩酥塗炙令赤搗末水浸蒸餅

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

為丸如梧桐子大侵晨溫酒服二十丸隔晚先利過大腸然後服一方治肛門凸出燒虎骨末水服方寸七日三服良

治大腸脫肛

用草果去殼搥碎解頭上髻髮開留此藥於腦上髻髮中少縛定待腸頭收上門邊即急去了藥若婦人產後衣不下用此藥去殼搥碎縛兩脚心即下

火炮湯

治脫肛痔瘡等證

用葱鹽湯洗之却將薄荷煎細研葱白滴汁去滓入蜜調煎貼患處用油單紙傳上貼之坐卧亦可

鱉頭散 出千金方

治脫肛大腸久積虛冷每因大便脫肛收不能入

用鱉頭漫炙焦黃自死者尤佳為末塗傳腸頭用軟紙襯輕輕按入仍以方寸匕食前米飲調下一方如

列印日期/時間：02/05/2005 04:58:56
列印頁數：14
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

不愈以鱉血塗之又方燒令煙絶杵末傅肛上手按
援之一方用鞋底按入即不出

磁石散 出指方直 治脫肛

用磁石半兩蘸入煎沸醋中凡七次為末每服一錢
空心米飲調下酒服亦可次用鐵片燒通紅放冷葱
根煎湯洗淨托上

鐵粉散 出指方直 治大腸本虛風毒客熱乘之脫肛紅腫

用鐵粉研細入白歛末夾和傅之即按入又方鐵粉
以少許摻之按入即愈

橡斗膏 治脫肛

用橡子燒存性猪脂和傅按之

石灰方 治大腸積冷从年脫肛及治每因大便脫肛

用石灰炒熱以帛包裹肛坐其上冷又別換仍以海
螵蛸末傅之

文蛤散 治大腸寒肛門脫出不收用力過多及小兒

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

叫喚乆痢後皆便脫肛悉治之

用五倍子不拘多少為末水煎汁浸洗更入白礬蛇床子尤佳洗後用赤石脂為末以少許摻在芭蕉上頻用托入或長尺餘者以兩床相接中空一尺以磁瓶盛藥水滿架起與床平令病者仰卧以其所脫浸在瓶中換藥逐日如此浸縮盡為度用海螵蛸為末塗肛上亦可一方不用蛇床子

療大人小兒脫肛每天冷食即暴痢不止肛則下脫乆不療不瘥者

用紫菫草春間收紫菫草花二斤曝乾搗為末加磁石末七兩相和研細塗肛上内入即使人噀冷水於面上吸入腸中每日一塗藥噀面不過六七度即差

又以熱酒半斤和散一方寸匕空腹服之日再漸加至二方寸匕以知為度若五歲以下小兒即以半杏子許散和酒令服之亦佳忌生冷陳倉米苪

治脫肛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

用防己實焙乾為末如茶法煎服

又方 出直指方

用緣桑蝴燒末和猪膏傅之立縮此蝴全似蝎牛黄

小兩後好緣葉一方亦可乾作末敷之

治大腸脫肛从積虚冷每因大便脫肛收不得

用蝎牛有小毒生研取服止消渴一方燒灰猪脂和

傳則縮

治下部脫肛

紫蕨膏 出醫方大成

治臟熱肛門脫出

用葸茗子焦炒碾細末傅之

用紫背蕨一大握又名魚腥草擂爛如泥先用朴硝

水洗淨肛門用芭蕉葉托入却用藥於臀下貼坐自

然收入

治腸隨肛出

用羊脂傅上以鐵精粉傅羊脂上乃以布裹指炙令

温按内仍酒服磁石末一七日三服之

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

獨虎散 出直指方 治脫肛不收
用五倍子半兩末并水三碗入磁瓶内慢火煎半續入朴硝荆芥穗各一錢乘熱薰洗仍以五倍子末傅之
治脫肛
用鼈血灰治之一方用鱉 出德生堂方
治肛出糞門三五寸者 出德生堂方
用陳茶熬水温洗去穢垢却用田螺大者二三枚水中養一日去淨泥用黄連末少許揭起螺靨入藥

末田螺内候化成水却用雞翎蘸藥掃上再以軟帛托入肛門内自然再不舉發
治大腸風冷下血不止脫肛疼痛 出聖惠方
用野狸一頭以大磁瓶一個可容得者内於瓶中以厚泥固臍候乾以大火燒之纔及煙盡住火候冷取出入麝香末半兩研令匀於磁器中收之每於食前温粥飲調下二錢

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治脫肛不縮 出聖惠方 用生韭一斤細切以酥拌炒令熟分為兩處以軟帛裹更互熨之冷即再易以入為度

又方 出聖惠方 用五花槠葉不拘多少陰乾為末每服二錢食前粥飲下兼塗腸頭亦差

又方 出聖惠方 用蛇床子一兩炒為末貼之

治脫肛腸出 出經驗良方 用黃連研細末冷水調常塗腸頭

用豆醬清合酒塗之

治卒大便脫肛 出肘後方 治大腸虛冷脫肛不收及腸風諸症

釣腸丸 出聖惠方 牛蒡子 赤芍藥 防風 荊芥穗 甘草 當歸 各等分

右先以獵猪大腸頭長一尺二寸者兩三枚於沙鍋

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

内用水四五盞煮爛熟去腸頭入前藥煎四五沸取汁薰洗數次令肛軟却以黑芝蘇燒煙薰之

硇砂丸　治冷熱不和下部痛裹急後重虛滑或結澁腸頭脫出

硇砂飛一兩　硫黄研一分　白礬研一分

以上三味同研勻用菜菔一枚重五兩者割開留元蓋子剜作坑子填上件末在内蓋好用竹簽定以麵劑十五兩裹開地坑一所方一尺鋪馬糞厚三寸安菜菔之上發火燒候通黑即上去麵毬在上更以馬糞蓋之上發火燒候通黑即上去麵將菜菔藥搗爛如膏更入後藥

肉豆蔻一分炒　去殼葫蘆把各半兩　訶梨勒皮各一兩炒　附子一分炮　藿香葉一分　補骨脂一兩炒　木香一分　縮砂仁一分

右六味為末通前藥膏同搗滴少好酒和納令勻丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心食前温米飲下

赤石脂散　治大腸風冷久痢不瘥脫肛

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

赤石脂 龍骨 白石脂 各一兩 當歸 半兩 劉炒 肉豆蔻 去殼 黃連 去鬚 炒 白芍藥 厚朴 各半兩 去粗皮 薑汁炙 右為散每服二錢粥飲食前調下

卷栢散 治久病痢不瘥脫肛

卷栢 一兩 訶梨勒 煨用皮 黃連 去鬚炒 縮砂 去皮 肉豆蔻 去殼 葷撥 白石脂 各一兩 右為末每服二錢粥飲食前下

地榆芍藥湯 治洩痢膿血乃至脫肛

地榆 二兩 卷栢 三兩 芍藥 三兩 蒼术 八兩 右咬咀每服一兩水一大盞半煎一盞溫服

龍骨丸 治諸痢疾脫肛久不止

龍骨 艾葉 一炒 各兩 鱉頭骨 二枚塗醋炙令焦黃 右為散每服二錢粥飲食前調下

黑聖散 治瀉痢日久脫肛疼痛

用大蜘蛛一枚以瓠子葉兩重裹以線繫定合子內

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

燒令黑色勿太過細研入黃丹少許研勻每先用白攀葱椒煎洗湯浴拭乾後將藥摻在軟帛上將手掌按托上肛頭即不下

歲十月樞僕院判白文舉老僕面塵土長跪曰病脫肛日久服藥未驗近日復以赤白膿痢作裏急後重白多赤少不任其苦予乃曰此非肉食膏粱必多蔬食或胃氣不節其寒一也衣蓋或薄寒侵形體其寒二也不禁而腸頭脫下者寒也況天氣應時其寒三也衣蓋或薄寒侵形體其寒二也不禁而腸頭脫下者寒也滑也真氣不禁固也形質不收乃血脫也此乃寒滑氣泄不固故形質下脫也當療之以澀去其脫而除其滑微加酸味固氣以大熱之劑而除寒補陽以補氣之藥升益氣名之曰訶子皮散

訶子皮散 出東垣蘭室方

御米殼去花蓼蜜炒半錢 訶子煨去核七分 乾薑炮六分 橘皮半錢

右為末分作二服每服水二盞煎至一盞和滓温服空心一服減半再服痊愈

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

治腸頭出 出本草
用胡荽子搗醋煮熨腸頭出甚妙
治脫肛 出本草
用甑帶煮汁服
治卒脫肛 出本草
燒蜘蛛為末傅肛上
治脫肛 出本草
以年久筆頭燒灰水服之
治肛帶出 出本草
切胡荽子一升燒以煙薰肛即入
治脫肛
用益母草炙令香浸酒服之 益母草生山谷水澤葉如澤蘭莖赤高二三尺
肛門有蟲怕癢 論是也
夫肛門有蟲者由胃弱腸虛而蟯蟲下乘之也肛門為大腸候蟯蟲者九蟲內之一蟲也在胃間若臟腑氣

欽定四庫全書 普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

實則蟲不妄動胃弱腸虛則蟯蟲乘之重者成瘡或蟲從肛門溢出輕者慢蝕肛但癢也

蜣蜋丸 出聖惠方 治肛門癢或出膿血有蟲傍生孔竅內

蜣蜋 七枚 五月五日收去足翅炙為末 新牛糞 半兩 好肥牛肉 一兩 炒令香

右搗如膏丸如蓮子大炙令熱以新綿薄裹內下部中半日少喫飯腹中有蟲俱出三日五度永差

又方 出聖惠方

白蒺藜 五錢 炒 硫黃 一分 細研 猪牙皂角 一兩 燒灰

欽定四庫全書 普濟方

右為末入硫黃同研勻用葱薤汁丸如蓮子大綿裹一丸內下部中日二三易

又方 出聖惠丸

雄黃 胡粉 各半兩

右研以棗肉丸如蓮子大以綿裹一丸內下部中日再易之

肛門赤痛 論

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

夫肛門大腸之候其氣虛為風熱所乘熱氣擊搏故令肛門赤痛也

檳榔散 出聖惠方

治大腸風壅氣毒攻肛門赤腫疼痛

檳榔 川大黃 各一兩炙 沈香 赤芍藥 防風 去叉 甘草 半兩炙 枳殼 三分麩炒去穰

右㕮咀每服四錢水一盞煎六分去滓食前温服

芎藭 犀角屑 林

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓食前温服

牛蒡子散 出聖惠方

治大腸風毒肛門赤痛令人煩熱坐臥不安

牛蒡子 炒 川大黃 一兩炒各 黃耆 炒去 白蒺藜 刺

欽定四庫全書

普濟方

枳殼 三分麩炒去穰 當歸 炒 芎藭 甘草 半兩炙各

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓食前温服

大黃散 出聖惠方

治大腸風熱所攻肛門赤腫

川大黃 炒 黃芩 黃耆 玄參 各一兩 丹參 三分 赤芍

藥 半兩 枳殼 一兩麩炒去穰

右為末每服二錢食前粥飲調下

治大腸風壅氣毒攻肛門赤腫疼痛 出聖惠方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

枳殼 麩炒去穰 一兩
甘草 一兩 剉炒 炙
芎藭 沈香 各半兩
川朴硝 一兩半
川大黃
又方 出聖惠方
皂莢樹白皮 一兩塗醋炙
甘草 半兩剉炙
枳殼 二分麩炒去穰
右為末每服二錢食前清粥飲調下
治穀道鼈赤腫痛又痒方
用杏仁杵作膏傅之一方熬令黃搗以綿裹塞之
欽定四庫全書
又方 出本草
用雄黃塗在上良
治肛門腫痛
用鱉子去殼取肉四五枚研如泥安新磁器或木盆内以沸湯衝動薰洗以少許塗患處
又方
用枳殼燒薰煎枳殼洗服枳殼末為上藥
地榆散 治肛門痛痒或腫
普濟方

本軟件用家：上海波金書店(4)
(本產品僅限於中國大陸地區使用)

地榆　荆芥穗　蛇床子　蒴藿　苦參　各等分

右㕮咀每用藥一匙水一椀煎二三沸去滓通手避風處洗患處

三黄丸　治肛門腫痛或下鮮血

黄連　黄芩　大黄　各等分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服四十丸熟水吞下

列印日期/時間：02/05/2005 04:59:00
列印頁數：27
上海人民出版社/迪志文化出版有限公司