

欽定四庫全書

普濟方卷一百二十七 明 周王朱橚 撰

傷寒門

辨太陽病脉證并治法上第五

太陽之為病脉浮頭項強痛而惡寒

經曰尺寸俱浮太陽為陽主表脉浮

頭痛惡寒者

太陽病發熱汗出惡風脉緩者名為中風

風陽也寒陰也風則傷衛發熱汗出惡風者衛中風也榮病發熱無汗不惡風而惡寒衛病則發熱汗出不惡寒而惡風也以衛為陽衛外者也病則不能衛固其外而皮腠疎故汗出而惡風也傷寒脉緊傷風脉緩者寒

欽定四庫全書

普濟方

性勁急而風性解緩故也

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛

嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒

經曰凡傷於寒則為病熱謂寒氣客於經中陽

氣怫鬱而成熱也中風即發熱者風為陽邪及傷寒或已發熱未發熱者以寒為陰邪不能即熱鬱而方變熱也風則傷衛寒則傷榮虛者惡風榮虛者惡寒寒傷榮者必惡寒也氣病者則麻血病者則痛風令氣緩寒令氣逆體痛嘔逆者榮中寒也經曰脉盛身寒得之傷寒陰陽俱緊者知其傷寒也傷寒一日太陽受之脉若靜者為不傳頗欲吐若躁煩脉數急者為

傳也

太陽主表一日則太陽受邪至二日當傳陽明若脉氣微為不傳陽明胃經受邪則善吐寒邪傳裏

者則變熱如頗欲吐若煩躁脉急數傷寒二三日陽明者為太陽寒邪之變熱傳於陽明也



<p>少陽證不見者為不傳也<small>傷寒二三日無陽明少陽證知邪不傳止在太陽經中也</small></p>	<p>太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病<small>發熱而渴不惡寒者陽明也此太陽</small></p>	<p><small>受邪知為溫病非傷寒也積溫成熟所以發熱而渴不惡寒也</small>若發汗已身灼熱者名</p>	<p>曰風溫風溫為病脉陰陽俱浮自汗出身重多眠睡鼻</p>	<p>息必鼾語言難出若被下者小便不利直視失溲若被</p>	<p>火者微發黃色劇如驚癇時瘕瘕若火熏之一逆尚引</p>	<p>日再逆促命期<small>傷寒發汗已則身涼若發汗已身灼熱者非傷寒為風溫也風邪傷上而陽受</small></p>	<p><small>風氣與溫相合則傷衛脉陰陽俱浮自汗出者衛受邪也衛者氣也風則傷衛溫則傷氣身重多眠睡者衛氣</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>受風溫而氣傷也鼻息必鼾語言難出者風溫外盛而氣擁不利也若被下者則傷藏氣太陽膀胱經也內經</small></p>	<p><small>曰膀胱不利不為約為遺溺瘕者小便不利也太陽之脉起目內眥內經曰瞳子高者太陽不足戴眼者太陽</small></p>	<p><small>以絕小便不利直視失溲為下竭津液藏氣欲絕也為難治若被火者則風溫挾火之熱微者熱瘵而發黃劇</small></p>	<p><small>者熱勝生風如驚癇而時瘕瘕也先曾被火為一逆若更以火熏之為再逆也一逆猶尚延引時日而不愈其</small></p>	<p><small>再逆者必致危殆故云促命期</small>病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒</p>	<p>者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽</p>	<p>數七陰數六故也<small>陽為熱也陰為寒也發熱而惡寒寒</small></p>	<p><small>火陰法水火成數七水成數六陽病七日愈者火數足也陰病六日愈者水數足也</small>太陽病頭痛</p>
--	--	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------------------	--	--	--	--	---	------------------------------	---	---



也邪	鼻鳴乾嘔者風擁而氣逆也與桂枝湯和榮衛而散風	緩腠理疎是以惡風也翕者熇熇然而熱言熱在表也	虛則惡寒榮弱衛強惡寒復惡風者以自汗出則皮毛	也經曰太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強者是也	榮氣弱也風并于衛則衛實而榮虛故發熱而汗自出	熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之 <small>陽以候衛陰以候榮陽脈浮者衛中風也陰脈弱者</small>	熱自發陰脈弱者汗自出 <small>陽以候衛陰以候榮陽脈浮者</small>	寒在皮膚熱在骨髓也 <small>皮膚言淺骨髓言深</small> 陽脈浮者	得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣	欽定四庫全書 普濟方	日愈 <small>中風家發汗解後未全快暢者至十二日大邪皆去六經悉和則愈</small> 病人身熱反欲	氣則於午未太陽乘旺也 <small>風家解表而不了了者十二</small>	經曰陽中之太陽通于夏	陽道常饒也陰三經解時從亥至卯以陰道常之也內	行也遠陰行也緩陽主晝陰主夜陽三經從寅至戌以	太陰從亥至丑少陰從子至寅厥陰從丑至卯者以陽	解而太陽從巳至未陽明從申至戌少陽從寅至辰至	陽病欲解時從巳至未上 <small>巳為正陽則陽氣得復也始</small>	再傳陽明針足陽明為逆而奪之使經不傳則愈 <small>太</small>	七日太陽病衰頭痛少愈若七日不愈則太陽之邪	鍼足陽明使經不傳則愈 <small>傷寒自一日至六日傳三陰</small>	至七日已上自愈者以行其經盡故也若欲作再經者
----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---	--	--	-----------------------	---------------	---	---------------------------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------------------------------	-----------------------



桂枝湯方

桂枝 三兩 去皮 味辛熱
白芍 三兩 味苦 酸微寒
甘草 三兩 炙 味甘平
生薑

三兩切 味辛溫 大棗 十二枚 擘 味甘溫

內經曰辛甘發散為陽桂枝辛甘之劑也所以發散風邪內經曰風淫所勝平以辛溫佐以苦甘以甘緩之以酸收之是以桂枝為主芍藥為佐也又曰風淫於內以甘緩之以辛散之是以生薑大棗為使也

右五味以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升服已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆

欽定四庫全書

普濟方

一時許令遍身絳絳微似有汗者佳不可令大汗如水流瀉病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗小促役其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病症猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等物

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之

頭痛者太陽也發熱

汗出惡風者中風也 太陽病項背強几几反汗出惡風



<p>桂枝加葛根湯主之<small>凡凡者當無汗反汗出惡風者中風表虛也與桂枝湯以和表加麻黃主表實後葛根湯症云太陽病項背強凡凡無汗惡風葛根湯主之藥味正與此方同其無汗者常用麻黃今日汗出恐不加麻黃但加葛根也太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法若不</small></p>	<p>上衝者不可與之<small>太陽病屬表而反下之則虛其裏邪而氣逆上與邪爭也爭則邪仍在表故當復與桂枝湯解外其氣不上衝者裏虛不能與邪爭邪氣已傳裏也故不可更與</small></p>	<p>桂枝湯攻表<small>太陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此為壞病桂枝不中與也觀其脈證知犯何逆</small></p>	<p>欽定四庫全書<small>普濟方</small></p>	<p>隨證治之<small>太陽病三日中曾經汗吐下溫針虛其正氣復與桂枝湯當審觀脈證知犯何逆而治之逆者隨所逆而救之</small></p>	<p>人脈浮發熱汗不出者不可與也常須識此勿令誤</p>	<p>也<small>脈浮發熱汗出惡風者中風也可與桂枝湯解肌脈浮發熱不汗出者傷寒也可與麻黃湯常須識此</small></p>	<p>治也<small>勿妄</small>若酒客病不可與桂枝湯與則嘔以酒客不喜甘</p>	<p>故也<small>酒客內熱喜辛而惡甘桂枝</small>喘家作桂枝湯加厚</p>	<p>朴杏仁佳<small>太陽病為諸陽生氣中風其氣擁則生喘也與桂枝湯以散風加厚朴杏仁以降氣凡</small></p>	<p>服桂枝湯吐者其後必吐膿血也<small>內熱者與桂枝湯則吐如酒客之類也既</small></p>
--	--	--	---------------------------------	--	-----------------------------	--	---	---	---	---



<p>亡津液又為熱所搏後必吐膿血吐膿血者謂之肺痿 金匱要畧曰熱在上焦為肺痿謂或從汗或從嘔吐得 之重亡津 故也 太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四</p>	<p>肢微急難以屈伸者桂枝加附子湯主之 汗遂汗漏不</p>	<p>止而惡風者為陽氣不足因發汗陽氣益虛而皮腠不 固也內經曰膀胱者州都之官津液藏焉氣化新出小 便難者汗出亡津液陽氣虛弱不能施化四肢者諸陽 之本也四肢微急難以屈伸者亡陽而脫液也鍼經曰 液脫者骨屬屈伸不利與桂 枝加附子湯以溫經復陽 太陽病下之後脈促胸滿</p>	<p>者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒者去芍藥方中加附</p>	<p>子湯主之 脈來數時一止復來曰促促為陽盛則不因 下後而脈促者也此下後脈促不得為陽盛</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>也太陽病下之其脈促不結胸者此為欲解此下後脈 促而復胸滿則不得為欲解由下後陽虛表邪漸入而 客於胸中也與桂枝湯以散客邪通行陽氣芍藥益陰 陽虛者非所宜故去之陽氣已虛若更加之微寒則伏 當溫以散之 故加附子 太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱</p>	<p>多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩</p>	<p>者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗</p>	<p>更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得</p>	<p>小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯 傷寒八九日則邪</p>	<p>欲傳三陰之時也傳經次第則三日傳遍三陽至四日 陽去陰入不入陰者為欲解其傳陰經第六日傳遍三</p>
--	-----------------------------------	--	------------------------------	---	-----------------------	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--



熱表散	病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可	更與桂枝湯若大汗出脉洪大而煩渴不解者表裏有	解脉洪大者白虎加人參湯主之	一湯解散榮衛之邪	服桂枝湯大汗出後大煩渴不	之問也與桂枝二麻黃	服桂枝湯大汗出後大煩渴不	病證猶在者故當復作本湯服之服桂枝湯汗出後脉	洪大者病猶在也若形如瘧日再發者邪氣客於榮衛	如瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯	服桂枝湯如前法若形	愈	池風府以通太陽之經而除風氣却與桂枝湯解散則	出而身涼和若反煩不解者風甚而未能散也先刺風	欽定四庫全書	普濟方	不解者先刺風池風府却與桂枝湯則愈	各半湯小發其汗以除表邪	太陽病初服桂枝湯反煩	汗更下更吐也陰陽俱虛則面色青白反有赤色者表	未解也熱色赤色也得小汗則和不得汗則邪氣外散	皮膚而為痒也與桂枝麻黃	各半湯小發其汗以除表邪	太陽病初服桂枝湯反煩	也脉微為裏虛惡寒為表虛以表裏俱虛故不可更發	也故云欲愈脉微而惡寒者表裏俱虛也陽表也陰裏	則邪至少則脉微今日數多而脉微緩者是邪氣微緩	日再發者邪氣淺也日二三發者邪氣微也內經曰大	也寒熱間日發者邪氣深也日一發者邪氣復當出也	進而邪氣退也裏不和則嘔今不嘔清便自調者裏和	氣退故為病進也今雖發熱惡寒而熱多寒少為陽氣	熱多者為病退經曰厥少熱多其病為愈寒多熱少陽	三陽陽不傳陰則解如瘧發作有時也寒多者為病進	陰為傳經盡而當解其不解傳為再經者至九日又遍
-----	---------------------	-----------------------	---------------	----------	--------------	-----------	--------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------	---	-----------------------	-----------------------	--------	-----	------------------	-------------	------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



發汗宜桂枝二越婢一湯

桂枝二越婢一湯方

桂枝去皮芍藥 甘草各十生薑一兩三大棗四枚

麻黃十八銖石膏二十四銖

胃為十二經之主脾治水穀為卑藏若婢內經曰脾主為胃行其津液若湯所謂越婢者以發越脾氣通行津液外臺方一名越脾湯即此義也

右七味呶咀以五升水煮麻黃去上沫內諸藥煮取

二升去查溫服一升本云當裁為越婢湯桂枝湯合

欽定四庫全書

普濟方

飲一升今合為一方桂枝二越婢一

服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿

微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之頭項強痛

翕翕發熱雖經汗下為邪氣仍在表也心下滿微痛小便不利者則欲成結胸今外證未罷無汗小便不利則心下滿微痛為停飲也與桂枝以解外傷寒脉浮自汗

出小便數心煩微惡寒脚攣急反與桂枝湯欲攻其表

此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者作甘草乾薑湯

與之以復其陽若厥愈足溫者更作芍藥甘草湯與之



<p>其脚即伸若胃氣不和讞語者少與調胃承氣湯若重發汗加燒針者四逆湯主之</p> <p><small>脉浮自汗出小便數而惡寒者陽氣不足也心煩脚</small></p> <p><small>學急者陰氣不足也陰陽血氣俱虛則不可發汗若與桂枝湯攻表則又損陽氣故為誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者先作甘草乾薑湯以復其陽氣得厥愈足温乃與芍藥甘草湯益其陰血則脚脛得伸陰陽雖復其有胃燥讞語少與調胃承氣微溏以和其胃若重發汗為亡陽加燒針則損陰也經曰榮氣微者加燒針則血不行重發汗復燒針是陰陽之氣大虛四逆湯以復陰陽之氣</small></p>	<p>甘草乾薑湯方</p>	<p>甘草 四兩炙 乾薑 一兩炮</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>內經曰辛甘發散為陽甘草乾薑相合以復陽氣</small></p>	<p>右呶咀以水三升煮取一升五合去滓分温再服</p>	<p>芍藥甘草湯方</p>	<p>芍藥 四兩味苦 甘草 四兩炙</p>	<p><small>芍藥白補而赤瀉白收而赤散也酸以收之甘以緩之酸甘相合用補陰血</small></p>	<p>右二味呶咀以水三升煮取一升半去滓分温再服</p>	<p>調胃承氣湯方</p>	<p>大黃 四兩去皮 芒硝 半觔味鹹 甘草 二兩</p>
--	---------------	--------------------------	-----------------------	---	----------------------------	---------------	---------------------------	---	-----------------------------	---------------	--------------------------------------



內經曰熱淫於內治以鹹寒佐以苦甘芒硝鹹寒以除熱大黃苦寒以蕩熱甘草甘平助二物推陳而緩中益氣

右三味咬咀以水三升煮取一升去滓內芒硝更上微火令沸少少溫服

四逆湯方

甘草

二兩炙

乾薑

一兩半

附子

一枚生用去皮破八片辛大熱

內經曰寒淫於內治以甘熱又以寒淫所勝平以辛熱甘草薑附相合為甘辛大熱之劑乃可發散

陰陽之氣

欽定四庫全書

普濟方

右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可加乾薑三兩

問曰證象陽旦按法治之而增劇厥逆咽中乾兩脛拘急而譫語師曰言夜半手足當溫兩脚當伸後如師言何以知此答曰寸口脈浮而大浮則為風大則為虛風則生微熱虛則兩脛攣病證象桂枝因加附子參其間增桂令汗出附子溫經回陽故也厥逆咽中乾煩躁陽明內結譫語煩亂更與甘草乾薑湯夜半陽氣不足兩



脛當熱尚微拘急重與芍藥甘草湯尔乃脛伸以承氣

湯微澹則止其讖語故知病可愈陽旦桂枝湯別名也前症脉微自汗出小

便數心煩微惡寒脚攣急讖語桂枝湯證相似是證象陽旦也與桂枝湯而增劇得寸口脉浮大浮為風邪大

為血虛即於桂枝湯加附子温經以補虛桂令汗出以祛風其有治之逆而增厥者與甘草乾薑湯陽復而足

温更與芍藥甘草湯陰和而脛伸表邪已解陰陽已復而有陽明内結讖語煩亂少與調胃承氣微澹泄以和

其胃則陰陽之氣皆和内外之邪悉去故病可愈

辨太陽病脉證并治中第六

太陽病項背強几几無汗葛根湯主之太陽病項背几几汗出惡風者

欽定四庫全書

普濟方

中風表虛也項背強几几無汗惡風者中風表實也表虛宜解肌表實宜發汗是以葛根湯發之也

葛根湯方

葛根四兩 麻黄三兩 桂枝三兩 芍藥二兩 甘草二兩

生薑三兩 大棗十二枚

本草云輕可去實麻黄葛根之属是也此以中風表實故加二物於桂枝湯中也

右七味呔咀以水一斗先煮麻黄葛根減二升去沫

内諸藥取煮三升去滓温服一升覆取微似汗不須

啜粥餘如桂枝法將息及禁忌



<p>未解也病有未汗出而喘者有自汗出而喘者皆邪氣</p>	<p>利脉微遲邪在裏也促為陽盛雖下利而脉促者知表</p>	<p>熱遂利桂枝證者邪在表也而反下之虛其腸胃為熱</p>	<p>喘而汗出者葛根黃連黃芩湯主之 <small>經曰不宜下而便</small></p>	<p>太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也</p>	<p>諸藥煮取三升去滓温服一升覆取微似汗</p>	<p>右八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去白沫內</p>	<p>芍藥 二兩 桂枝 二兩 大棗 十二枚 半夏 半觔 洗</p>	<p>葛根 四兩 麻黃 三兩 去節 湯泡 生薑 三兩 切 甘草 二兩 炙</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>葛根加半夏湯方</p>	<p>夏以下逆氣而一以貫之矣</p>	<p>逆而不下者但嘔而不下利與葛根湯以散其邪加半</p>	<p>主裏裏氣不和氣下而不上者但下利而不嘔裏氣上</p>	<p>陽明合病不下利但嘔者葛根湯加半夏主之 <small>邪氣外甚陽不</small></p>	<p>氣虛故必下利與葛根湯以散經中之甚邪也 太陽與</p>	<p>併於陰則陰實而陽虛邪氣併於陽則陽實而陰虛寒</p>	<p>少陽合病陽明少陽合病皆陽也必自下利者以邪氣</p>	<p>合病謂之合病者邪氣甚也太陽陽明合病者與太陽</p>	<p>本太陽病不解併於陽明者謂之併病二經俱受邪為</p>	<p>太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之 <small>傷寒有併病</small></p>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--	-------------------	----------------	--------------------	------------------------------	------------------------------	---	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---



外甚所致喘而汗出者謂急喘而汗出也即裏熱氣逆所致與葛根黃連黃芩湯散表邪去裏熱而已

葛根黃連黃芩湯方

葛根 半兩
 甘草 二兩
 黃芩 二兩
 黃連 三兩

內經曰辛甘發散為陽表未解者散以葛根之辛甘草之甘以緩裏氣黃連黃芩之苦以清裏熱以

堅裏氣

右四味以水八升先煮葛根減二升內諸藥煮取二升去滓分溫再服

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而

欽定四庫全書

普濟方

喘者麻黃湯主之

此太陽傷寒證也寒則傷榮頭痛身疼腰痛以至牽連骨節疼痛者

太陽經榮血不利也內經曰風寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱者寒在表也風并於衛衛實而榮虛者自汗出而惡風也寒并於榮榮實而衛虛者無汗而惡風也以榮強衛弱故氣逆而喘與麻黃湯以發其汗

麻黃湯方

麻黃 三兩
 桂枝 二兩
 甘草 一兩
 杏仁 五十個

皮尖味辛溫去

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛麻黃甘草開肌發汗桂枝杏仁散寒下氣



右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥
煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥
餘如桂枝法將息

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯主之

陽受氣于胸中喘而胸滿者陽氣不宣發壅而逆也心
下滿胸滿皆為實當下之此以為胸滿非裏實故不可

下雖有陽明然與太陽合
病為屬表宜與麻黃發汗太陽病十日已上脉浮細而

嗜卧者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脉但浮

者與麻黃湯

十日已上向解之時也脉浮細而嗜卧者
表邪已罷也病雖已和解若脉但浮而不

欽定四庫全書

普濟方

細者則邪氣猶在表際
也與桂枝麻黃發散之太陽中風脉浮緊發熱惡寒身

疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脉微弱汗出

惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也

此中風見

寒脉也浮則為風風則傷衛緊則為寒寒則傷榮榮衛
俱病故發熱惡寒身疼痛也風并於衛者為榮弱衛強

寒并於榮者為榮強衛弱今風寒兩傷則榮衛俱實故
不汗出而煩躁也與大青龍湯發汗以除榮衛風寒若

脉微弱汗出惡風者為榮衛俱虛反服青龍湯
則令陽虛故生厥逆筋惕肉瞤此治之逆也

大青龍湯方

麻黃

六兩去節
味甘温

桂枝

三兩去皮
味辛熱

甘草

二兩炙
味甘平

杏仁



<p>四十粒去皮 生薑 三兩切 大棗 十二枚擘 石膏 如</p>	<p>子大碎味 甘微寒</p>	<p>辛甘均為發散然風以辛散寒宜甘發辛甘相合 乃能發散榮衛之風寒麻黃甘草石膏杏仁以發 散榮中之寒桂枝薑 兼以解除衛中之風</p>	<p>右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥 煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉 撲之一服汗出停後服</p>	<p>傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰症者大青</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>龍湯發之 此傷寒見風脉者傷寒身疼此以風勝故身 不疼中風者身重此以兼風故乍有輕時不 發厥吐利無少陰症者為風寒外甚 也與大青龍湯以發散表中之風寒傷寒表不解心下</p>	<p>有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利小</p>	<p>腹滿或喘者小青龍湯主之 傷寒表不解心下有水飲 則水寒相搏肺寒氣逆故</p>	<p>乾嘔發熱而欬鍼經曰形寒飲冷則傷肺以其兩寒相 感中外皆傷故氣逆上行此之謂也與小青龍湯發汗 散水水氣內漬則所傳不一故有 或為之症隨症增損以解化之</p>	<p>小青龍湯方</p>	<p>麻黃 三兩去節 芍藥 三兩微寒 乾薑 三兩熱 甘草 三兩</p>
--	---------------------	--	--	------------------------------	-----------------------	--	------------------------------	--	---	--------------	---



<p>炙味 甘平 五味子 半升 酸温 桂枝 三兩 味辛熱 半夏 半升 洗味辛</p>	<p>微温 細辛 三兩 味辛温 寒邪在表非辛甘不能散之麻黃桂枝甘草之辛甘以發散表邪水停心下而不行則腎氣燥內經曰腎苦燥急食辛以潤之乾薑細辛半夏之辛以行水氣而潤腎燥效逆而喘則肺氣逆內經曰肺欲收急食酸以收之芍藥五味子之酸以收逆氣而安肺</p>	<p>右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥</p>	<p>煮取三升去滓温服一升</p>	<p>加減法 若微利去麻黃加薤花如鷄子大熬令赤色下利者不可攻其表汗出必脈滿麻黃發其</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>陽水漬入胃必作利薤花下十二經水去則利止若渴者去半夏加括蔞根三兩酸甘而苦潤半夏味辛而燥津液非渴者所宜故去之括蔞味苦而生津故加之○若噎者去麻黃加附子一枚炮經曰水得寒氣冷必相搏其人即噎加附子温散水寒病人有寒復發汗胃中冷必吐去麻黃惡發汗也○若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩水畜下焦不行為小便不利少腹滿麻黃發津液於外非所宜也茯苓泄畜水於下加所當也○若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖金匱要略曰其人形腫故不內麻黃內杏仁以麻黃發其陽故也喘呼形腫水氣標本之疾具矣</p>	<p>傷寒心下有水氣欬而喘發熱不渴服湯已渴者此寒</p>	<p>去欲解也小青龍湯主之 欬而欲喘者水寒射肺也發熱不渴表證未罷也與小青</p>
--	--	-----------------------------	-------------------	---	-------------------	---	------------------------------	--



<p>龍湯發表散水服已渴者 裏氣溫水氣為欲解也 太陽病外證未解脉浮弱者</p>	<p>當以汗解宜桂枝湯 <small>脉浮弱者榮</small> 太陽病下之微喘者</p>	<p>表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之 <small>下後大喘則為裏氣大虛邪氣</small></p>	<p><small>傳裏正氣將脫也下後微喘則為裏氣上逆邪不能傳裏猶在表也與桂枝湯以解外加厚朴杏仁以降逆氣</small></p>	<p>大陽病外證未解者不可下也下之為逆欲解外者宜</p>	<p>桂枝湯主之 <small>經曰本發汗而復下之為逆也若先發汗治不為逆</small>太陽病先發汗</p>	<p>不解而復下之脉浮者不愈浮為在外而反下之故令</p>	<p>不愈今脉浮故知在外當須解外則愈宜桂枝湯主之</p>	<p>欽定四庫全書 <small>經曰柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆則其類矣</small>太陽病</p>	<p>脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解者表證仍在此</p>	<p>當發其汗也服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄</p>	<p>乃解所以然者陽氣重故也麻黃湯主之 <small>脉浮緊無汗發熱身疼痛</small></p>	<p>太陽傷寒也雖至八九日而表證仍在亦當發其汗既</p>	<p>服溫經發散湯藥雖未作大汗亦微除也煩者身熱也</p>	<p>邪氣不為汗解鬱而變熱蒸於經絡發于肌表故生熱</p>	<p>煩肝受血而能視始者氣傷榮寒寒既變熱則血為熱</p>	<p>搏肝氣不舒故目瞑也劇者熱甚於經迫血妄行而為 衄得衄則熱隨血散而解陽氣重者熱氣重也與麻黃 以解前太陽 之寒邪也 太陽病脉浮緊發熱身無汗自衄者愈 <small>寒風</small></p>
---	---	--	--	------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---



在經不得汗解鬱而變熱。二陽併病太陽初得病時則熱隨血散故云自衄者愈。發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽病證未罷者不可下下之為逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當表之熏之若發汗不徹不足陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以脈濇故知也。太陽病未解傳病併入陽明而太陽證未罷者名曰併病續自微汗出不惡寒者為

欽定四庫全書
普濟方

太陽證罷陽明症具也法當下之若太陽病未罷者為表未解則不可下當小發其汗先解表也陽明之經自面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表也當解之熏之以取其汗若發汗不徹者不足言陽氣怫鬱止是當汗不汗陽氣不得越散邪無從出擁甚於經故躁煩也邪循經行則痛無常處或在腹中或在四肢按之不可得而短氣但責以汗出不徹更發汗則愈內經曰諸過者切之濇者陰氣不足陽氣有餘為發熱無汗是以脈濇知陽氣擁鬱而汗出。脈浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗當自汗出乃解所以然者尺中脈微此裏虛須裏氣實津液自和便自汗出愈。經曰諸脈浮數寒言邪氣在表也是當汗出愈若下之身重心悸者損其津液虛其胃氣若身重心悸而尺脈實者則下後裏



<p>虛邪氣乘虛入裏也今尺脉微身重心悸者知下後裏 虛津液不足邪氣不傳裏但在表也然以津液不足則 不可發汗須裏氣實津液足便自汗出而愈也脉浮緊者法當身疼痛宜以汗</p>	<p>解之假令尺中遲者不可發汗何以知之然以榮氣不</p>	<p>足血少故也<small>鍼經曰奪血者無汗尺脉遲者為榮血不足故不可發汗</small>脉浮者病在</p>	<p>表可發汗宜麻黃湯<small>浮為輕手得以候皮膚之氣內經曰其在皮毛者汗而發之</small>脉</p>	<p>浮者病可發汗宜麻黃湯<small>浮則傷衛數則傷榮榮衛受邪為病在表故當汗散</small>病</p>	<p>常自汗出者此為榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不</p>	<p>共榮氣和諧故尔以榮行脉中衛行脉外復發其汗榮</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>衛和則愈宜桂枝湯<small>風則傷衛寒則傷榮衛受風邪而榮不病者為榮氣和也衛既容邪</small></p>	<p>則不能與榮氣和諧亦不能衛護皮腠是以常</p>	<p>自汗出與桂枝湯解風邪調和榮衛則愈也病人藏</p>	<p>無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其</p>	<p>時發汗則愈宜桂枝湯主之<small>藏無他病裏和也衛氣不和表病也外臺云裏和表</small></p>	<p>病汗之則愈所謂先其時者先傷寒脉浮緊不發汗因</p>	<p>其發熱汗出之時發汗則愈<small>傷寒脉浮邪在表也當與麻黃</small></p>	<p>致衄者麻黃湯主之<small>湯發汗若不發汗則邪無從出擁</small></p>	<p>甚於經迫血妄行因致衄也傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承</p>	<p>氣湯其小便清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭</p>
---	------------------------------	--	--	---	------------------------------	------------------------------	-----------------------	--	---------------------------	-----------------------------	------------------------------	---	------------------------------	---	---	-----------------------------------	------------------------------



痛必衄宜桂枝湯

不大便六七日頭痛有熱者故宜當

經曰小便數者大便必艱不更衣十日無所苦也况此

不大便六七日小便清者不可責邪在裏是仍在表也

與桂枝湯以解外若頭痛不已為表邪傷寒發汗解半

身涼為已解至半日許身復熱脈浮凡病若發汗若吐

數者邪不盡也可更發汗與桂枝湯

若下若亡津液陰陽自和者必自愈重亡津液則不能

愈矣和乃自大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿

治之得小便利必自愈因亡津液而小便不利者不可

欽定四庫全書 普濟方

也自愈下之後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外

俱虛故也發汗則表虛而亡陽下之則裏虛而亡血

之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜而不嘔不渴

無表證脈沉微身無大熱者乾薑附子湯主之下之虛

之虛其表既下又汗則表裏俱虛陽主晝陽欲復虛不

勝邪正邪交爭故晝日煩躁不得眠夜主陰陽虛不能

與之爭是以夜則安靜不嘔不渴者裏無熱也身無大

熱者表無熱也既無裏症又無表症而脈沉微者是陽



乾薑 一兩 味辛熱
附子 一枚 生用 去皮 破八片 味辛熱
內經曰：寒淫所勝，平以辛熱，虛寒大甚，是以以辛熱之劑勝之也。

右二味以水三升，煮取一升，去滓頓服。

發汗後身疼痛，脈沉遲者，桂枝加芍藥生薑各一兩，人

參三兩，新加湯主之。

汗後身疼痛，邪氣未盡也。脈沉遲，榮血不足也。經曰：其脈沉者，榮氣

微也。又曰：遲者，榮氣不足也。血少故也。與桂枝湯以發

汗後不可更行桂枝湯。汗出喘無大熱者，可與麻黃杏

仁甘草石膏湯主之。

汗出而喘，當作桂枝加厚朴杏仁湯。汗出而喘愈，今發汗後而喘是

欽定四庫全書

普濟方

邪氣擁甚，桂枝湯不能發散，故不可更行桂枝湯。汗出而喘，有大熱者，內熱氣盛也。無大熱者，表邪擁甚也。與麻黃杏仁甘草石膏湯以散其邪。

麻黃杏仁甘草石膏湯方

麻黃 四兩 去節 味辛溫
杏仁 五十粒 去皮 尖 味甘溫
甘草 二兩 炙 味甘平
石

膏 半 勛 碎 綿 味甘平

內經曰：肝苦急，急食甘以緩之。風氣通於肝，風邪外甚，故以純甘之劑發之。

右四味以水九升，先煮麻黃減二升，去上沫，內諸藥

煮取二升，去滓溫服一升。本云黃耳杯。



發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝甘	草湯主之 <small>發汗過多亡陽也陽受氣于胸中陽氣不足故病人叉手自冒心心下悸欲得按者與桂</small>	枝甘草湯以調不足之氣	桂枝甘草湯方	桂枝 <small>四兩去皮</small> 甘草 <small>二兩味甘平炙</small>	桂枝之辛走肺而益氣甘草之甘入脾而緩中	右二味以水三升煮取一升去滓頓服	發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗	欽定四庫全書	普濟方	湯主之 <small>汗者心之液發汗後臍下悸者心氣虛而腎氣發動也腎之積名曰奔豚發則從小腹上至心</small>	下為腎氣逆欲上凌心今臍下悸為腎氣發動故云欲作奔豚與茯苓桂枝甘草大棗湯以降腎氣	茯苓桂枝甘草大棗湯	茯苓 <small>半觔味甘平</small> 甘草 <small>二兩味甘平</small> 桂枝 <small>四兩去皮</small> 大棗 <small>五十</small>	擘枚	茯苓以伐腎邪桂枝能泄奔豚甘草大棗之甘滋助脾土以平腎水氣煎用甘瀾水者揚之無力取	不助腎邪也	右四味以甘瀾水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮
-----------------------	--	------------	--------	---	--------------------	-----------------	-----------------------	--------	-----	---	--	-----------	---	----	--	-------	----------------------



<p>取三升去滓溫服一升日三服○作甘瀾水法取水 二斗置大盆內以杓揚之水上有珠子五六千顆相 逐取用之</p>	<p>發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之 <small>後吐</small></p>	<p><small>脹滿與下後腹滿皆為實言邪氣乘虛入裏為實發汗 後外已解也復脹滿知非裏實由脾胃津液不足氣滯 不通壅而為滿與此 湯和脾胃而降氣</small></p>	<p>厚朴生薑甘草半夏人參湯方</p>	<p>厚朴 <small>半觔去皮</small> 炙 <small>味苦溫</small> 生薑 <small>半觔切</small> 味 <small>辛溫</small> 半夏 <small>半升洗</small> 味 <small>辛溫</small> 人參 <small>一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>溫</small> 味甘 <small>三兩炙</small> 甘草 <small>味甘平</small> <small>內經曰脾欲緩急食甘以緩之以苦泄之厚朴之 苦以泄腹滿人參甘草之甘以益脾胃半夏生薑 之辛以散滯 氣而三服矣</small></p>	<p>右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服</p>	<p>傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脉沉</p>	<p>緊發汗則動經絡身為振搖者茯苓白朮桂枝甘草湯</p>	<p>主之 <small>吐下後裏氣虛氣上逆者心下逆滿氣上衝胸表 裏陽不足也起則頭眩脉浮緊為邪在表當發汗</small></p>	<p><small>脉沉緊為邪在裏則不可發汗發汗則外動經絡損傷 陽氣陽氣外虛則不能主持諸脉身為振搖也而此湯</small></p>
---	---	--	---------------------	---	-----------------------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	--	---



以和經
益陽

茯苓桂枝白朮甘草湯方

茯苓 四兩 味甘平
桂枝 三兩 味辛熱
白朮 二兩 味甘溫
甘草 二兩

炙味甘平

陽不足者補之以甘茯苓白朮生津液而益陽也裏氣逆者散之以辛桂枝甘草行陽散氣

右四味以水六升煮取三升去滓溫服三

發汗病不解反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

發汗病解則不惡寒發汗病不解表實者亦不惡寒今發汗病且不解反惡寒者榮衛俱虛也汗出則榮虛惡

欽定四庫全書

普濟方

寒則衛虛而芍藥甘草附子湯以補榮衛

芍藥甘草附子湯方

芍藥 三兩 味酸微寒
甘草 三兩 味甘平
附子 一枚 炮去皮破

芍藥之酸收斂津液而益榮附子之辛溫固陽氣而補胃甘草之甘調和辛酸而安正氣

右三味以水五升煮取一升五合去滓分溫服○疑

非仲景意

發汗若下之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之

病宜解也若病仍不解者則發汗外虛陽氣下之內虛陰氣陽陰俱虛邪獨不解故生煩躁與茯苓四逆湯以



復陰陽之氣	茯苓四逆湯方	茯苓	六兩味甘平	人參	一兩味甘溫	附子	一枚生用去皮破八片味辛熱甘
		草	二兩味甘平	乾薑	一兩半味辛熱		
		四逆湯以補陽加茯苓人參以益陰					
	服 右五味以水五升煮取三升去滓分溫服七合日三						
	發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣						
	欽定四庫全書						
		與調胃承氣湯	汗出而惡寒者表寒也汗出而不惡寒但熱者裏實也經曰汗出不惡寒者表				
		解裏未和與調胃承氣湯以和胃氣		太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁			
	不得眠欲得飲水者少少與之令胃氣得和則愈若脉						
	浮小便不利微熱消渴者與五苓散主之	發汗已解胃中乾煩燥不					
	得眠欲飲水者少少與之胃氣得潤則愈若脉浮者表未解也飲水多而小便少者謂之消渴裏熱甚實也微						
	熱消渴者熱未成實上焦燥也與五苓散生津液和表裏也						
	五苓散方						
	猪苓	十八銖味甘平	澤瀉	一兩六銖味酸鹹	茯苓	十八銖味甘平	桂枝
							兩半



<p>去皮味 辛熱 白朮 味甘平 十八銖</p>	<p>淡者一也口入而為甘甘甚而反淡者甘緩而淡 滲豬苓白朮茯苓三味之甘潤虛燥而利津液味</p>	<p>下泄為陰澤瀉之鹹以泄伏水辛甘 發散為陽桂枝之辛甘以和肌表</p>	<p>右五味為末以白飲和服方寸匕日三服多飲煖水</p>	<p>汗出愈</p>	<p>發汗已脈浮數煩渴者五苓散主之 <small>發汗已脈浮數者表邪未盡也煩渴亡</small></p>	<p>津液胃燥也與五苓散和表潤燥 傷寒汗出而渴者五苓散主之不渴</p>	<p>者茯苓甘草湯主之 <small>傷寒汗出而渴者亡津液胃燥邪氣漸傳裏也五苓散以和表裏若</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>汗出不渴者邪氣不傳裏但在表而表虛也與茯苓甘草湯和表合衛</p>	<p>茯苓甘草湯方</p>	<p>茯苓 二兩 味甘平 桂枝 二兩 味辛熱 去皮 生薑 三兩 味辛溫 切 甘草 一兩</p>	<p>炙味甘平 茯苓甘草之甘益津而和衛 桂枝生薑之辛助陽而解表</p>	<p>右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服</p>	<p>中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之 <small>中風發熱至六七日則當解若不解煩者邪在</small></p>
---	--	---	-----------------------------	------------	--	---	---	--------------------------------------	------------------------------------	---------------	---	---	--------------------------	--



陽邪已而渴裏邪傳于得病六七日脉遲浮弱惡風寒手	表半裏服柴胡湯已渴者屬陽明也以法治之 <small>服小柴胡湯表</small>	氣與邪氣相搏而上行故使嘔也與小柴胡湯以解半	故曰痛下作病邪在上焦為邪高邪漸入裏為痛下裏	謂自外之內經絡與藏府相連也邪氣隨經必傳于裏	而結於脇下與正分爭作往來寒熱默默不欲飲食此	當更時遇賊風則其入深者是矣邪因正虛自表之裏	氣去形獨居肌肉減皮膚緩腠理開毛髮殘脆薄垢落	乘虛傷人則深鍼經月廓空則海水東盛人血氣虛衛	盛衰當月郭空之時則為血弱氣衰腠理開疎之時邪氣	其痛必下邪高痛下故使嘔也小柴胡湯主之 <small>人之氣血隨時</small>	正分爭往來寒熱發作有時默默不欲飲食藏府相連	欽定四庫全書 普濟方	血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下邪	也 <small>傷肺</small> 發汗後藥不得入口為逆若更發汗必吐下不止	飲水多必喘以水灌之亦喘也 <small>飲水多而喘者飲冷傷肺</small>	又試令效而不即效者耳聾也則陽氣虛明矣發汗後	重發汗虛故如此 <small>發汗多而亡陽胸中陽氣不足病人</small>	教試令效而不效者此必兩耳聾無聞也所以然者以	飲水而吐故名水逆而末持脉時病人又手冒心師因	表也渴欲飲水邪傳裏也裏熱甚則能消水水入不吐	裏熱少則不能消水水停則精不散飲而吐水也以其
------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--	-----------------------	---------------	-----------------------	---	--	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸

項強小便難者與柴胡湯後必下重本渴而飲水嘔者

柴胡湯不中與也食穀者噦得病六七日脈遲浮弱惡

半裏未為實醫反二三下之虛其胃氣損其津液邪滯

於裏故不能食而脇下滿者胃虛為熱氣熏蒸發於面

目及身故必黃也頸項強者表仍未解也小便難者內

乏津液雖本柴胡湯證然以裏虛下焦氣澁而小便雖若

與柴胡湯又走津液後必下重也不因飲水而嘔者柴

胡湯證若本因飲水而嘔者水停心下也金匱要略曰先

渴却嘔者為水停心下此屬飲家飲水者水停而嘔食

穀者物聚而噦皆非小柴胡湯所宜二者皆柴胡湯之

戒不可傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫

不識也

欽定四庫全書普濟方

而渴者小柴胡湯主之身熱惡風頸強者表未解也脇

則手足通熱邪在裏則手足厥寒今手足溫者知邪在

半表半裏之間也與小柴胡湯所以解半表半裏之邪

傷寒陽脈濇陰脈弦法當腹中急痛者先與小建中湯

不差者與小柴胡湯主之陽脈濇陰脈弦而腹中急痛

建中湯溫中散寒若不差者非裏寒也必由邪氣之裏

裏氣不利所致與小柴胡湯去黃芩加芍藥以除傳裏

邪之

小建中湯方

桂枝三兩去皮 甘草三兩炙 大棗十二枚擘 芍藥



六兩味 生薑 二兩切 膠飴 一觔味

建中者建脾也內經曰脾欲緩食甘以緩之膠飴大棗甘草之甘以緩中也辛潤散也榮衛不足

潤以散之桂枝生薑之辛以行榮衛酸收也陰氣不和芍藥之酸以和陰氣

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火

消解溫服一升日三服虛嘔家不可用建中湯以甜

故也

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具柴胡證是邪氣

在表裏之間也或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬但

欽定四庫全書

普濟方

見一證便宜與柴胡湯治之不必待其證候全具也凡柴胡湯病證而下之若柴

胡證未罷者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而

解邪在半表半裏之間為柴胡證未作裏實醫便以藥下之若柴胡證仍在者雖下之不為逆可復與柴胡

湯以和解之得邪氣外越外作蒸蒸而熱先經下裏氣虛邪氣欲出內則振振然而却也正氣勝陽氣生復發

熱汗出而解也傷寒中風五六日往來寒熱胸脇苦滿默默不

欲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇

痞鞭或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬者與

小柴胡湯主之病有在表者有在裏者有在表裏之間者此邪在表裏之間謂之半表半裏證



五六日邪氣在表傳裏之時或傷寒至五六日或中風
 至五六日而往來寒熱者即是非傷寒又中風也傷寒
 中風俱有柴胡證俱見一證便是不必悉具正是謂或
 中風或傷寒也邪在表則寒邪在裏則熱今邪在半表
 半裏之間未有定處是以寒熱往來也邪在表則胸腹
 不滿邪在裏則胸腹脹滿今止言胸脇苦滿知邪氣在
 表裏之間未至于胸腹脹滿也默默靜也邪在表則呻
 吟邪在裏則煩悶內經曰陽入之陰則靜默默者邪方
 自表之裏在表裏之間也邪在表則能食邪在裏則不
 能食不欲食者邪在表裏之間未至于必不能食也邪
 在表則不煩不嘔邪在裏則煩滿而嘔心煩喜嘔者邪
 在表方得裏也邪初入裏未有定處則所傳不一故有
 或為之證有柴胡證但見一
 證便是故有或為之證云

小柴胡湯方

欽定四庫全書

普濟方

柴胡

半劬味辛微温

黃芩

三兩味苦寒

人參

三兩味甘温

甘草

二兩味甘

半夏

半劬味辛温洗

生薑

三兩味辛温切

大棗

十二枚擘

味辛温

味辛温

內經曰熱淫於內以苦發之柴胡黃芩之苦以發
 傳邪之熱裏不足者以甘緩之參甘草之甘以
 緩中和之氣邪半入裏則榮衛爭辛甘解之半夏
 以除煩嘔邪半在表則榮衛爭辛甘解之薑棗以
 和榮衛

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取二升

温服一升日三服 後加減法

若胸中煩而不嘔去半夏人參加括萋實一枚

胸中煩而



痛者表邪也內經曰病發於不足標而本之先治其標	得清便自調裏氣已和然後急與桂枝湯以救表身疼	宜桂枝湯 <small>傷寒下之續得下利清穀不止身疼痛即當救裏者以裏氣不定必先救裏急用四逆湯</small>	後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表	傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏	升乾薑二兩 <small>內經曰肺欲收急食酸以收之五味子之酸以收逆氣肺寒則效溫以辛熱故易生薑以乾薑之熱也</small>	桂枝以發汗 <small>未解也故加</small> 若效者去人參大棗生薑加五味子半	者去人參加桂三兩覆微取汗愈 <small>不渴者裏和也故去人參外有熱表</small>	欽定四庫全書 普濟方	黃芩加茯苓四兩 <small>則水益堅故去黃芩味淡滲泄為陽茯苓甘淡以泄伏水之藥也</small> 若不渴外有微熱	與堅鞭者加牡蠣之鹹 <small>若心下悸小便不利者去</small>	芍藥以通壅 <small>若脇下痞鞭去大棗加牡蠣四兩</small> <small>甘能</small>	必當之藥也 <small>若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩</small> <small>黃</small>	成四兩半括蔞根四兩 <small>半夏燥津液非渴者所宜人參甘而潤括蔞根苦而涼微</small>	苦寒以泄胸中之蘊熱 <small>若渴者去半夏加人參合前</small>	用寒療聚宜苦括蔞實 <small>若渴者去半夏加人參合前</small>	不嘔熱聚而氣不逆也甘者令人中滿方熱聚無用人參之補辛散逆氣既不嘔無用半夏之辛治熱宜
-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	--	--	---	---------------	--	-------------------------------------	--	---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--



後治其本此以裏寒為標外邪為本也 病發熱頭痛脉反沉若不差身體

疼痛當救其裏宜四逆湯 發熱頭痛表病也脉反沉者

浮大今脉反沉遲故知欲愈也是表病而得裏脉則太

常差若不差是為內虛寒甚也宜四逆湯以救其裏太

陽病先下之而不愈因復發汗以此表裏俱虛其人因

致冒冒家汗出自愈所以然者汗出表和故也裏未和

然後復下之 冒者鬱也下之則裏虛而亡血汗之則表

虛而亡陽表裏俱虛寒氣沸鬱其人因致

之邪得解而冒愈又曰冒家欲解必大汗出汗出表和

而裏不和 然後下之 太陽病未解脉陰陽俱停必先振慄汗出而

解但陽脉微者先汗出而解陰脉微者下之而解若欲

下之宜調胃承氣湯 脉陰陽俱停無偏勝者陰陽氣和也

沉遲數同等此脉為陰陽和雖劇當愈今陰陽既和必

先振慄汗出而解也如陽脉微者陽不足而陰有餘也

經曰陽虛陰盛汗之則愈陰脉微者陰不足 太陽病發

而陽有餘也經曰陽盛陰虛下之則愈是也 熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風者宜桂

枝湯 太陽中風風併于衛則衛實而榮虛榮陰也衛陽

之故時發熱而汗出與桂枝湯解散風邪調和榮衛傷寒醫以丸藥大下之身熱

不去微煩者梔子乾薑湯主之 丸藥下之不能除熱但



中而未入深者則身熱不去微
煩與梔子乾薑湯吐煩和裏

梔子 十四枚 擘 乾薑 三兩 味 苦以湧之梔子之苦以吐煩 辛以潤之乾薑之辛以和裏

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服温進

一服得吐止後服 凡用梔子湯病人舊微澹者不

可與服之 病人舊微澹者裏虛而寒在下也雖煩則

後生他病者治其本必 且調之後乃治其他病

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身

欽定四庫全書 普濟方

動振振欲擗地者真武湯主之 發汗之後仍發熱者邪

身動振振欲擗地者汗出亡陽也裏虛為悸上虛

為眩經虛為身動振振與真武湯温經復陽

真武湯方

茯苓 三兩 芍藥 三兩 生薑 三兩 白朮 二兩 味 甘平 酸微寒 味 辛熱 味甘

温 附子 一枚 炮去皮破 八片 味 辛熱

右五味以水八升煮取三升去滓温服七合日三服

咽喉乾燥者不可發汗 津液不足也 淋家不可發汗發汗必

便血 膀胱衰熱則淋反以湯藥發汗亡耗 瘡家雖身疼



<p>痛不可發汗發汗則瘥<small>表虛熱聚則生瘡瘡家身疼如</small> <small>虛熱勢愈甚熱其</small> <small>生風故變瘥也</small> 衄家不可發汗汗出必額上陷脉急</p>	<p>緊直視不能眴不得眠<small>衄血上焦亡血也若發汗則上</small> <small>陷脉急緊諸經脉皆属于目筋脉急緊則牽引其目故</small></p>	<p><small>直視不能眴瞬合目也針經曰陰氣虛則目不能瞑亡</small> <small>血為陰虛是</small> 亡血家不可發汗發汗則寒慄而振<small>鍼經</small></p>	<p><small>以不得眠也</small> <small>血者無汗奪汗者無血發汗</small> <small>則陰陽俱虛故寒慄而振</small> 汗家重發汗必恍惚心亂</p>	<p>小便已陰疼與禹餘糧丸<small>汗者心之液汗家重發汗則</small> <small>心虛恍惚奪汗者無血故小</small></p>	<p><small>便已陰</small> 病人有寒復發汗發汗則胃中冷必吐<small>病人有</small> <small>寒則當</small></p>	<p><small>中痛</small> 欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p><small>濕散反發汗陽氣虛</small> <small>胃中冷必吐衄也</small> 本發汗而復下之此為逆也若先</p>	<p>發汗治不為逆本先下之而反汗之為逆若先下之治</p>	<p>不為逆<small>病在表者汗之為宜下之為逆病在裏者下之</small> <small>為宜汗之為逆經曰陽盛陰虛汗之則死下之</small></p>	<p><small>則愈陽虛陰盛汗之則愈下之則死藥不得入口為之</small> <small>吐逆發汗亡陽胃中虛冷也若更發汗則愈損陽氣胃</small></p>	<p><small>氣大虛故吐</small> 發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆</p>	<p><small>下不止也</small> 顛倒心中懊懺梔子豆豉湯主之<small>發汗吐下後邪熱乘</small> <small>虛客於胸中謂之虛</small></p>	<p><small>煩熱鬱胸中煩躁鬱悶而不得發散者是也熱氣伏於</small> <small>裏者則喜睡今熱浮于土煩擾陽氣故不得眠心惡熱</small></p>	<p><small>甚則必神昏是以劇者反覆顛倒而不安心中懊懺而</small> <small>憤悶懊懺者俗謂鶻突是也內經曰其高者因而越之</small></p>
---	--	---	---	--	---	---	--	-------------------------------------	---	---	--	--	---	---



與梔子豆豉湯
以吐胸中之邪

梔子豆豉湯

梔子 十四枚 擘 香豉 四合 絹裹
味苦寒 味苦寒

酸苦湧瀉為陰苦以湧吐寒以
勝熱梔子豉湯相合吐劑宜矣

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一

升半去滓分為二服溫進一服得吐者止後服

若氣少者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯

主之 少氣者熱傷氣也加甘草以益氣嘔者熱煩而氣
逆也加生薑以散逆氣氣少則氣為熱搏散而不

欽定四庫全書

普濟方

收甘以補之可也嘔者氣為熱
搏逆而不散辛以散之可也 發汗若下之而煩熱胸

中窒者梔子豆豉湯主之

陽氣鬱於胸中發汗若下使
陽氣不足邪熱客於胸中結
而不散故煩熱而胸中窒塞 傷寒五六日大下之後身

熱不去心中結痛者未欲解也梔子豉湯主之

傷寒五
六日邪

氣在裏之時若大下之身熱去心中空者為欲解若大
下之後身熱而心結痛者結胸也身熱不去心中結痛

者虛煩也結胸為熱結胸中為實是熱氣已收斂於內
則外身熱去虛煩為熱客胸中未結為實散漫為煩是

以熱去六七日為欲解之時以熱為虛煩
故云未欲解也與梔子豆豉湯以吐胸中虛煩 傷寒下

後心煩腹滿起卧不安者梔子厚朴湯主之

下後但腹
滿而不心



煩即邪氣入裏為裏實但心煩而不腹滿即邪氣在胸中為虛煩心煩且滿則邪氣壅于胸腹間也滿則不能坐煩則不能卧故不安與
梔子厚朴湯吐煩泄滿

梔子厚朴湯方

梔子

十四枚擘

厚朴

四兩薑炙

枳實

四枚水浸去穢炒味苦寒

酸苦湧泄為陰梔子之苦以湧虛煩厚朴枳實之苦以泄腹滿

右三味以水三升半煮取一升半去滓分溫服進一服得吐者止後服

傷寒腹滿譫語寸口脉浮而緊此肝乘脾也名曰縱刺

欽定四庫全書

普濟方

期門

腹滿譫語者脾胃病也浮而緊者肝脉也脾病見肝脉木行乘土也經曰水行乘火木行乘土名曰

縱此其類矣期門者肝之募刺之以瀉肝經之勝氣也

傷寒發熱嗇嗇惡寒大渴

欲飲水其腹必滿自汗出小便利其病欲解不解者此

肝乘肺也名曰橫刺期門

傷寒發熱嗇嗇惡寒肺病也

日作大渴欲飲酢漿是知肝氣勝也經曰傷寒欲飲水者愈若不愈者而腹滿是肝氣乘肺水不得行也木行

乘金名曰橫刺期門以寫肝之勝氣使肺氣水散而津液得通外作自汗出內為小便利而解也

病二日發躁反熨其背而大汗出火熱入胃胃中躁煩

必發譫語十餘日振慄自下利者此為欲解也故其汗



從腰已下不得汗欲小便不得反嘔欲失溲足下惡風

大便鞭小便當數而反不數及不多大便已頭卓然而痛

其人足心必熱谷氣下流故也

太陽病二日則邪在表不當發躁反躁者熱氣

行於裏也反熨其背而發汗大汗出則胃中燥火熱入胃胃中燥熱躁煩而譫語至十餘日振慄自下利者火

邪勢微陰陽復生津液得復也故為欲解火邪去大汗出則愈若從腰以下不得汗則津液不得通故欲小便

不得熱氣上逆而反嘔也欲失溲足下惡風者氣不得通于下而虛也津液偏滲令大便鞭者小便當數經曰

小便數者大便必鞭也此以火熱內燥津液不得下通故小便不數及不多也若火邪消津液利則結鞭之大便

得潤因自大便也便已頭卓然而痛者先大便鞭則陽氣不得下通既得大便則陽氣下降頭中陽虛故卓然

欽定四庫全書

普濟方

而痛谷氣者陽氣也先陽氣不通於下之時足下惡風今陽氣得下故足心熱也

太陽病中風

以火劫發汗邪風實也潮熱者被火熱血氣流溢失其

常度兩陽相熏灼其身發黃陽盛則欲衄陰虛則小便

難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿

微喘口乾咽爛或不大便久則譫語甚者至噦手足躁

擾捻衣摸床小便利者其人可治

風為陽邪因火熱之氣則邪風愈甚迫於

血氣流通失其常度風與火氣謂之兩陽相熱熏灼熱發必發身黃若熱搏於經絡為陽盛外熱迫血上行必

衄熱搏于內者為陰虛內熱必小便難若熱消血氣陽陰俱虛血氣虛少不能榮於身體為之枯燥三陽經絡



至頸三陰至胸中而還但頭汗出劑頭而還者熱氣炎
上搏陽而不搏陰也內經曰諸脹腹滿皆屬於熱腹滿
微喘者熱氣內鬱也內經曰火氣內發上為口乾咽爛
者火熱上熏也火氣上而不下則大便不鞭若熱氣下
入胃消鑠津液則大便鞭故云不大便久則胃中燥實
必發譫語內經曰病深其聲噦火氣大甚正氣逆上則
噦內經曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實火熱太
甚故手足躁擾捻衣摸牀擾亂也小便利者為火未劇
津液未竭而猶可治也

傷寒脉浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起

卧不安者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之

傷寒脉浮責邪在表醫以火劫發汗汗大出者亡其陽
汗者心之液亡陽則心氣虛心惡熱火邪內迫則心神
浮越故驚狂起卧不安與桂枝以解未盡之表邪芍藥
益陰非亡陽所宜火邪錯逆加蜀漆之辛以散之陽氣

欽定四庫全書

普濟方

亡脫加龍骨牡蠣之澁以固之本草
云澁可去脫龍骨牡蠣之屬是也

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯主之

桂枝 三兩 甘草 二兩 生薑 三兩 牡蠣 五兩 煅 龍骨 四兩 味 辛 平

四兩 味 甘 澁 大棗 十二枚 擘 蜀漆 二兩 味 辛 平

右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升內諸藥煮

取三升去滓溫服一升

形作傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火者必譫語

弱者發熱脉浮解之當汗出愈

形作傷寒謂頭痛身熱也脉不弦緊則無傷寒



<p>表脉也經曰諸弱發熱則脉弱為裏熱故云弱者必渴也若被火氣兩熱相合傳於胃中胃中躁煩必發譫語脉弱發熱者得脉浮為邪氣還表當汗出而解矣</p> <p>太陽病以火蒸之不得汗其</p>	<p>人必躁至六七日不解必清血名為火邪 <small>此火邪迫血而血下行者</small></p>	<p><small>太陽病用火蒸之不得汗則熱無從出陰陽俱虛被火必發燥也六日傳經盡至七日再到太陽經則熱氣當下</small></p>	<p><small>解若不解熱氣迫血</small> 脉浮熱甚反灸之此為實實以虛</p>	<p>治因火而動必咽燥唾血 <small>此火邪迫血而血上行者也脉浮熱甚為表實醫以脉浮</small></p>	<p><small>為虛用火灸之因火氣動血迫血上行故咽燥唾血</small> 微數之脉慎不可灸因火為</p>	<p>邪則為煩逆追虛逐實血散脉中火氣雖微內攻有力</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>焦骨傷筋血難復也 <small>微數之脉則為熱也灸能除寒不能散熱是慎不可灸也若反灸之</small></p>	<p><small>熱因火甚遂為煩逆灸本以追虛而復逐熱為實熱則傷血又加火氣使血散脉中氣主响之血主濡之血氣</small></p>	<p><small>散不能濡潤筋骨致骨</small> 脉浮宜以汗解用火灸之邪無</p>	<p>從出因火而盛病從腰以下必重而痺名火逆也 <small>脉浮在表</small></p>	<p><small>宜以汗解醫以火灸取汗而不得汗邪無從出又加火氣相助則熱愈甚半身以上同天之陽半身以下同地</small></p>	<p><small>之陰火性炎上則腰以下陰氣</small> 欲自汗者必當先煩乃</p>	<p><small>獨治故從腰以下必重而痺也</small></p>	<p>有汗而解何以知之脉浮故知汗出解也 <small>煩熱也邪氣還表則為煩</small></p>	<p><small>熱汗出而解以脉</small> 燒針令其汗針處被寒核起而赤者 <small>浮故為邪還表也</small></p>
--	--	---	---	--	---	-------------------------------------	-----------------------	--	--	---	---	--	---	------------------------------------	--	--



必發奔豚氣從少腹上衝心者灸其核上各一壯與桂

枝湯更加桂二兩燒針發汗則損陰血心氣虛針處被

寒而動發為奔豚金匱要略曰病有奔豚從核上驚發

得之腎氣欲上乘心故其氣從小腸上衝心也先灸核

湯以泄奔豚之氣火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘

草龍骨牡蠣湯主之先火為逆復以下除之裏氣因虛

生煩躁與桂枝甘草龍骨牡蠣湯以散火邪

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方
桂枝 二兩 甘草 二兩 牡蠣 二兩 龍骨 二兩

去皮 炙 煅 兩
欽定四庫全書 普濟方

辛甘發散桂枝甘草之辛甘以發散經中之火邪

滋可去脫龍骨牡蠣之瀯以收斂浮越之正氣

右四味為末以水五升煮取二升半去滓溫服八合
日三服

太陽傷寒者加溫針必驚也寒則傷榮榮氣微者加燒

損榮血而動心血金匱要略傷寒八九日下之胸滿煩

曰血氣少者屬於心故驚也驚小便不利讞語一身盡重不可轉側者柴胡加龍骨

牡蠣湯主之傷寒八九日邪氣已成熱而復傳陽經之

熱客於胸中也驚者心惡熱而神不寧也小便不利者裏虛津液不行也讞語者胃熱也一身盡重不可轉側



者陰氣內行於裏不榮于表也與柴胡湯以除胸滿而
煩加龍骨牡蠣丹鉛收斂神氣而鎮驚加茯苓以行津
液利小便加大黃以逐胃熱止讖語加桂枝
以行陽氣而解身重錯雜之邪斯悉愈矣

柴胡加龍骨牡蠣湯方

半夏二合 大棗六枚 柴胡四兩 生薑一兩 人參一兩

龍骨半兩 鉛丹半兩 桂枝二兩 茯苓半兩 大

黃二兩 牡蠣半兩

右十一味以水八升煮取四升內大黃切如碁子更

煮三沸去滓溫服一升

欽定四庫全書
普濟方

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微

利此本柴胡湯下之而不得利今反利者知以丸藥下

之非其治也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝

湯主之傷寒十三日再傳經盡當解之時也若不解胸

證若以柴胡湯下之則更無潮熱自利矣醫反以丸藥

下之虛其腸胃邪熱乘虛入府日晡所潮熱已而利

也潮熱雖為實熱胸脇之邪未解故先與小

柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝以下胃熱傷寒十三
日不解過經讖語者以有熱也當以湯下之若小便利
者大便當鞭而反下利脉調和者知醫以丸藥下之非



<p>其治也若自下利者脉當微厥今反和者此為內實也</p>	<p>調胃承氣湯主之<small>傷寒十三日再傳經盡謂之過經讞</small></p>	<p><small>之若小便利者津液偏滲大便當鞭反下利者知醫以</small></p>	<p><small>丸藥下之也下利脉微而厥者虛寒也今脉調和則非</small></p>	<p><small>也與調胃承氣湯以下胃熱</small>太陽病不解熱結膀胱</p>	<p>其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻當先</p>	<p>解外外解也但少腹急結者乃可攻之宜桃仁承氣湯</p>	<p>主之<small>太陽膀胱經也太陽經邪熱不解隨經入府為熱</small></p>	<p><small>搏若血不為畜為熱迫之則血自下血下則熱隨血出</small></p>	<p>欽定四庫全書<small>普濟方</small></p>	<p><small>而愈若血不下者則血為熱搏畜積於下而少腹急結</small></p>	<p><small>乃可攻之與桃仁承氣下熱散血內經曰從外之內而</small></p>	<p><small>盛於內者先治其外</small></p>	<p>後調其內此之謂也</p>	<p>桃仁承氣湯方</p>	<p>桃仁 五十粒 去皮 桂枝 二兩 去皮 大黃 四兩 芒硝 二兩</p>	<p>甘草 三兩 煎 以緩之辛以散之少腹急結緩以桃仁之甘下</p>	<p>右五味以水七升煮取二升半去滓內芒硝更上火</p>
------------------------------	---	---	---	--	------------------------------	------------------------------	---	---	---------------------------------	---	---	--------------------------------	-----------------	---------------	---	---------------------------------------	-----------------------------



微沸下火先食温服五合日三服當微利

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之

傷寒二三日邪氣在

表未當傳裏之時心中悸而煩是非邪氣傳裏所致心悸者氣虛也煩者血虛也以氣血內虛與小建中湯先

建其裏使在表之邪不致傳裏而自解也太陽病過經十餘日及二三下之

後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯嘔不止心下

急鬱鬱微煩者為未解也與大柴胡湯下之則愈

日數過多

屢經攻下而柴胡證不罷者亦須先與小柴胡湯以解其表經曰凡柴胡湯疾病而下之柴胡證不罷者復與

柴胡者是也嘔吐者表裏不和也若嘔不止鬱鬱微煩者裏熱也熱結於胃中也與大柴胡湯下其裏熱則愈

欽定四庫全書

普濟方

大柴胡湯方

柴胡 半劬味 辛温 黃芩 三兩味 苦寒 芍藥 三兩味 酸微寒 半夏 半升 洗味

生薑 五兩切 枳實 四枚炙 大棗 十二枚擘 大黃

三兩味 苦寒

柴胡黃芩之苦入心而折熱枳實芍藥之酸苦湧泄而扶陰辛者散也半夏之辛以散逆氣辛甘和

也薑棗之辛甘以和榮衛

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎温服一升日

三服 一方加大黃二兩若加大黃恐不為大柴



胡湯也

太陽病當惡寒發熱今自汗出不惡寒發熱關上脉細

數者以醫吐之過也一二日吐之者腹中飢口不能食

三四日吐之者不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐以醫吐

之所致也此為小逆惡寒發熱為太陽表病自汗出不惡寒發熱者為陽明證本太陽表

病醫反吐之傷動胃氣表邪乘虛傳於陽明也以關脉細數知醫吐之所致病一二日為表邪尚寒而未成熱

吐之則表寒傳於胃中胃中虛寒故腹中飢而口不能食病三四日則表寒已傳成熱吐之則表熱乘虛入胃

胃中虛熱故不喜糜粥欲食冷食朝食暮吐也朝食暮吐者晨食入胃胃虛不能尅化即知至暮胃氣行裏與

欽定四庫全書 普濟方

邪氣相搏則胃反逆而以胃氣尚在止云小逆太陽病吐之但太陽病當惡寒

今反不惡寒不欲近衣此為吐之內煩也太陽表病今反吐之傷其

胃氣邪熱乘虛入胃胃為邪熱內煩故不惡寒不欲近衣也病人脉數數為熱當消

穀引食而反吐者此以發汗令陽氣微膈氣虛脉乃數

也數為客熱不能消穀以胃虛冷故吐也陽受氣于胸中發汗外虛

陽氣是令陽氣微膈氣虛也數為熱本熱則能消穀客熱則不能消穀因發汗外損陽氣致胃中虛冷故吐也

太陽病過經十餘日心下温温欲吐而胸中痛大便反

澹腹微滿鬱鬱微煩先此時自極吐下者與調胃承氣



湯若不爾者不可與但欲吐胸中痛微澹者此非柴胡

證以嘔故知極吐下也心下溫溫欲吐鬱鬱微煩胸中痛當責邪熱客胃中若大便反澹

腹微滿則邪熱已下於胃也日數雖多若不經吐下止

是傳邪亦未可與調胃承氣當與柴胡湯以除上中二

焦之邪若曾吐損傷胃氣胃虛則邪乘虛入胃為實非

柴胡湯所能去與調胃承氣湯下胃熱以嘔知胃氣先

曾動也傷也太陽病六七日表證仍在脈微而沉反不結胸其

人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿小便自利者下血

乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也抵當湯主

之太陽膀胱經也此隨經入府者也六七日邪氣傳裏之時脈微而沉邪氣傳裏之脈也表證仍在則邪氣

欽定四庫全書普濟方

猶淺當結於胸中若不結胸其發狂者熱結在膀胱也

經曰熱結膀胱其人如狂此發狂則熱又深也少腹鞭

滿小便不利者為無血也小便自利

者血證諺也與抵當湯以下畜血

抵當湯方

水蛭 三十個 熬 味鹹 苦寒 蠱蟲 三十個 熬 去翅 桃仁 三十粒 去皮尖

味甘 平 大黃 三兩 酒浸 味苦 寒

苦走血 鹹勝血 蠱蟲水蛭之鹹苦以除畜 血甘緩結 苦瀉熱 大黃之苦以瀉結熱

右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一升不

下再服



太陽病身黃脉沉結少腹鞭小便不利者為無血也小

便自利其人如狂血證諦也抵當湯主之身黃脉沉結少腹鞭小便

不利者胃熱發黃也可與茵陳湯身黃脉沉結少腹鞭

小便自利其人如狂者則非胃之瘵熱為熱結下焦而

為畜血也與抵當湯以下畜血傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利

者為有血也當下之不可餘藥宜抵當丸傷寒有熱少腹滿是畜血

於下焦若熱畜津液不通則小便不利其熱不畜津液

而畜血不行小便自利者乃為畜血當與桃仁承氣抵

當湯下之然此無身黃屎黑又無喜忘發狂之証是未

至于甚故不可以餘藥下之但與抵當丸小下之可也

抵當丸方

欽定四庫全書
普濟方

水蛭 三十 蠪蟲 二十 桃仁 二十 大黃 三

右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合服之

晬時當下血若不下者更服

太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦

裏急也飲水多而小便自利者則水不內畜但腹中飲多令心下悸全匱要略曰食少飲多水停心下

甚者則悸飲水多而小便不利則水畜於內而不行必苦裏急也

辨太陽脉證并治下第七

問曰病有結胸有藏結其狀何如答曰按之痛寸脉浮



關脉沉名曰結胸何謂藏結答曰如結胸狀飲食如故	時時下利寸脉浮關脉小細沉緊名曰藏結舌上白胎	滑者難治 <small>結胸者邪結在胸藏結者邪結在藏二者皆下後邪氣乘虛入裏所致下後邪氣入裏與</small>	<small>陽相結者為結胸以陽受氣於胸中故也與陰相結者為藏結以陰受之則入五藏故也宜通而塞故痛邪結</small>	<small>陽分則陰氣不得上通邪結陰分則陽氣不得下通是故二者皆心下鞭痛寸脉浮關脉沉知邪結在陽也寸</small>	<small>脉浮關脉小細沉緊者知邪結在陰也陰結而陽不結雖心下結痛飲食亦自如故陰氣乘陽虛而下故時時</small>	<small>自下利陰得陽則解藏結得熱證多則為易治舌上白胎滑者則胸中亦寒故難治</small>	藏結無陽證	不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也 <small>藏結於法當下</small>	欽定四庫全書 普濟方	<small>無陽證為表無熱不往來寒熱為半表半裏無熱其人反靜為裏無熱經曰舌上如無胎者以丹田有熱胸中</small>	<small>有寒今舌上胎滑以表裏皆寒故不可攻</small> 病發於陽而反下之熱入因作結	胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之	太早故也 <small>發熱惡寒者發於陽也而反下之則表中陽邪入裏結於胸中為結胸無熱惡寒者發於</small>	<small>陰也而反下之則表中陰邪入裏結於心下為痞</small> 結胸者項亦強如柔瘥狀下	之則和宜大陷胸丸 <small>結胸病項強者為邪結胸中胸結膈滿心下緊實但能仰不能俛是</small>	項強亦如柔瘥之狀也	與大陷胸丸下結泄滿	大陷胸丸方
-----------------------	-----------------------	--	---	---	---	---	-------	--	---------------	---	---	-----------------------	--	--	--	-----------	-----------	-------



<p>大黃 <small>半升 味苦 寒</small> 葶藶 <small>半升 味苦 寒</small> 芒硝 <small>半升 味酸 寒</small> 杏仁 <small>半升 去皮</small></p>	<p>尖熬黑味 苦甘溫 大黃芒硝之苦寒所以熱葶藶杏仁之苦甘所以泄滿甘遂取其直達白蜜取其潤利皆以下泄</p>	<p>右四味搗篩大黃葶藶二味內杏仁芒硝合研如脂和散如彈丸一枚別搗甘遂末一錢匕白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為效禁如藥法</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>結胸證其脉浮大者不可下下之則死 <small>結胸為邪結胸中屬上焦之分</small></p>	<p>得寸脉浮關脉沉者為在裏則可下若脉浮大心下雖結是在表者猶多未全結也下之重虛邪氣復結則難治故云下 <small>結胸證悉具煩躁者亦死已深也煩躁者正</small></p>	<p>氣散亂也邪氣 勝正氣病必死 太陽病脉浮而動數浮則為風數則為</p>	<p>熱動則為痛數則為虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛</p>	<p>客氣動膈短氣躁煩心中懊懷陽氣內陷心下因鞭則</p>	<p>為結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘無汗劑</p>
--	---	--	-----------------------	--	--	--	---	------------------------------	------------------------------



頸而還小便不利身必發黃也動數皆陽脉也當責邪在表睡而汗出者謂之盜汗為邪氣在半表半裏則不惡寒此頭痛發熱微盜汗出反惡寒者表未解也當發其汗醫反下之虛其胃氣表邪乘虛則陷邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉邪氣內陷動數之脉所以變遲而脉浮獨不變者以邪氣結胸中上焦陽結脉不得沉也客氣者外邪乘胃中空虛入裏結于胸膈中拒痛者客氣動膈也金匱要略曰短氣不足以息者實也短氣躁煩心中懊憹皆邪氣實熱陽氣內陷氣不得通於膈壅塞心下為鞭滿而痛成結胸也與大陷胸湯以下結熱若胃中空虛陽氣內陷不結于胸膈下入于胃中者遍身汗出則為熱越不能發黃若但頭汗身無汗劑頸而還小便不利者熱不得越必發黃也

大陷胸湯方

欽定四庫全書

普濟方

大黃

六兩去

芒硝

一升味

甘遂

六錢七分

大黃為將軍苦以蕩之芒硝一名消石以其鹹以
與堅膚間有水甘遂以通水也其氣直達邪結之
處以導去
熱邪也

右以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一兩
沸內甘遂末溫服一升得快利止後服

傷寒六七日結胸實熱脉沉而緊心下痛按之石鞭者

大陷胸湯主之

病在表而下之熱入因作結胸此不云
下後而云傷寒六七日則是傳裏之實

是亦為結胸不因誤下也與陷胸湯以下結實傷寒十



餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無

大熱者此為水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯

主之傷寒十餘日熱結在裏是可下之證復往來寒熱

無大熱者非熱結也是水飲聚於胸脇謂之水結胸周

身汗出者是水飲外散則愈若但頭微汗出餘無汗是

水飲不得外泄停蓄而不得太陽病重發汗而復下之

不大便五六日舌上燥而渴日晡所有潮熱從心至少

腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯主之重發汗而復下

津液而邪熱內結致不大便五六日舌上燥而渴也日

晡潮熱屬胃此小有潮熱非但在胃從心下至少腹鞭

欽定四庫全書普濟方

滿而痛不可近者是一腹之中上下邪小結胸病在心

氣俱實也宜大陷胸湯以下其實邪下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯主之

凡心下鞭痛手

也正在心下按之則痛是熱氣猶淺謂之小結胸結胸

脉沉緊或寸浮關沉今脉浮滑知熱未深結可與小陷

小陷胸湯方

黃連一兩味半夏半升洗栝蒌實大者一个

苦以泄之辛以散之黃連栝蒌實

右三味以水六升先煮栝蒌取三升去滓內諸藥煮



取二升去滓分溫三服

太陽病二三日不能卧但欲起心下必結脉微弱者此

本有寒分也醫反下之若利止必作結胸未止者四日

復下之此作協熱利也太陽病二三日邪在表也不能卧但欲起心下必結者心下結

滿卧則氣壅而益甚故不能卧而但欲起也心下結滿

有水則有氣分有寒分今脉微弱知本有寒分醫見心

下結而反下之則太陽表邪乘虛入裏利止邪氣留為

結胸利不止至于四日後前下利不止者是邪熱下攻

腸胃為挾熱利也太陽病下之其脉促不結胸者此為欲解也

脉浮者必結胸也脉緊者必咽痛脉弦者必兩脇拘急

脉細數者頭痛未止脉沉緊者必欲嘔脉沉滑者協熱

利脉浮滑者必下血此太陽病下之後邪氣傳變也其

陰也故不作結胸為欲解下後脉浮為上焦陽邪結而

為結胸也經曰結胸者寸脉浮關脉沉下後脉緊則太

陽之邪傳於少陰經曰脉緊者屬少陰內經曰邪客於

少陰之絡令人噤痛不可納食所以脉緊者必咽痛脉

弦則太陽之邪傳於少陽經曰尺寸俱弦者少陽病也

其脉循太陽絡於耳所以脉弦者必兩脇拘急下後邪氣

傳裏則頭痛當止脉細數為邪未傳裏而傷氣也細為

氣少數為在表故頭痛未止脉沉緊則太陽之邪傳於

陽明為裏實也沉為在裏實則太陽之邪傳於裏實故必欲

嘔脉滑則太陽之邪傳於腸胃以滑為陰氣有餘知邪

氣入裏在于下焦也沉為血勝氣虛是為協熱下利浮

為氣勝血虛是知必下血經曰不宜下而便攻之諸變

欽定四庫全書

普濟方



<p>不可勝數 此之謂也 病在陽應以汗解之反以冷水噴之若灌之</p>	<p>其熱被劫不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不</p>	<p>渴者服文蛤散若不差者與五苓散寒實結胸無熱證</p>	<p>者與三物小陷胸湯白散亦可服 <small>病在陽為邪在表也法當汗出而解反以</small></p>	<p><small>冷水濕之灌洗熱被寒水外劫不得出則反攻其裏彌</small></p>	<p><small>更益煩肉上粟起者水寒之氣客於皮膚也意欲飲水</small></p>	<p><small>者有熱也反不渴者寒在表也與文蛤散以散表中水</small></p>	<p><small>寒之氣若不差是水熱相搏欲傳於裏與五苓散發汗</small></p>	<p><small>以和之始熱在表因水寒制之不得外泄內攻於裏結</small></p>	<p><small>於胸膈心下鞭痛本以水寒伏熱為實故謂之寒實結</small></p>	<p><small>胸無熱證者外無熱而熱悉收斂于裏也與</small></p>	<p><small>小陷胸湯以下逐之白散下熱故亦可服</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>文蛤散方 文蛤 五兩 鹹寒 <small>鹹走腎則可以勝水氣</small></p>	<p>右一味為末散以沸湯和一錢匕服湯用五合</p>	<p>白散方 桔梗 三分 味辛 苦微溫 巴豆 一分 去皮心熬 黑研如脂 辛溫 貝母 三分 味辛 苦平 <small>辛散而苦泄桔梗貝母之苦辛用以下氣巴豆辛溫用以散實</small></p>
--	------------------------------	------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	--	-----------------------	---	---------------------------	--



<p>半錢羸者減之病在膈上必吐病在膈下必利不利 進熱粥一杯利過不止進冷粥一杯身熱皮粟不解 欲引衣自覆者若以水澀之洗之益令熱邪不得出 當汗而不汗則煩假令汗已出腹中痛與芍藥三兩 如上述法</p>	<p>太陽與少陽併病頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞 硬者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可發汗發汗則 譫語脉弦五六日譫語不止當刺期門</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>者太陽表病也少陽之脉循胸脇如結胸心下痞 者少陽病也太陽少陽相併為病不純在表故頭項不 但強痛而或眩冒亦未全之裏故時如結胸心下痞 此邪在半表半裏之間也刺大椎第一間肺俞以瀉太 陽之邪肝俞以瀉少陽之邪邪在表則可發汗邪在半 表半裏則不可發汗發汗則亡津液損動胃氣少陽之 邪因汗於胃土為木刑必發譫語脉弦至五六日傳經 盡邪熱去而譫語當止若復不止為少陽邪熱甚也刺 期門以瀉肝膽之邪婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日 熱除而脉遲身涼胸脇下滿如結胸狀譫語者此為熱 入血室也當刺期門隨其實而瀉之</p>
---	--	-----------------------	--



於血室熱除而脉遲身涼者邪氣內陷而表證罷也胸脇下滿如結胸狀譫語者熱入血室而裏實期門者肝之募肝主血刺期者瀉血室之熱	審看何經氣實更隨其實而瀉之婦人中風七八日續	得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室必結故	使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之	熱而續得寒熱經水適斷者此為表邪乘虛入於血室與血相搏而血結不行經水所以斷也血氣與邪氣分爭因致寒熱如瘧而發作有時	與小柴胡湯以散傳經之邪	婦人傷寒發熱經水適	來晝日了了暮則譫語如見鬼狀者此為熱入血室也	無犯胃氣及上中二焦必自愈	傷寒發熱者寒已成熱也經水適來則血室空	欽定四庫全書	普濟方	虛邪熱乘虛入于血室若晝日譫語為邪客於府而與陽爭也此晝日明了暮則譫語如見鬼狀是邪不入府入于血室而與陰爭也陽盛譫語則宜下此熱入血室不可與下藥犯其胃氣其脇滿如結胸狀者可刺期門此雖熱入血室而無滿結不可刺期門犯其中焦必自愈者以經行熱隨血去血下已則邪悉除而愈矣所謂無犯上中二焦謂發汗為犯上焦者發汗則動衛氣衛氣出上焦故也刺期門為犯中焦者刺期門則動榮氣榮氣出中焦故也脉經曰無犯胃氣及	上中二焦必自愈豈謂藥不謂針耶	傷寒六七日發熱	微惡寒支節煩痛微嘔心下支結外證未去者柴胡加	桂枝湯主之	傷寒六七日邪當傳裏之時嘔而心下支結者裏證也法當攻裏乃發熱微惡寒支	節煩疼為外證未去不可攻	傷寒五六日已發汗而復
---	-----------------------	-----------------------	----------------	--	-------------	-----------	-----------------------	--------------	--------------------	--------	-----	---	----------------	---------	-----------------------	-------	----------------------------------	-------------	------------



<p>下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來</p>	<p>寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主之<small>傷寒五六</small></p>	<p>日已經汗下之後則邪當解今胸脇滿微結小便不利</p>	<p>渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者即邪氣在半表</p>	<p>半裏之間為未解也胸脇滿微結寒熱心煩者邪在半</p>	<p>表半裏之間也小便不利而渴者汗下後亡津液內燥</p>	<p>也若熱消津液則小便不利而渴者其人必嘔今渴而</p>	<p>不嘔知非裏熱也傷寒汗出則和今但頭汗出而餘處</p>	<p>無汗者津液不足而陽虛於上也與柴胡桂枝</p>	<p>枝乾薑湯以解表裏之邪復津液而助陽也</p>	<p>柴胡桂枝乾薑湯</p>	<p>柴胡 半觔 桂枝 三兩 乾薑 二兩 枳實 四兩 黃芩 三兩 牡蠣</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>二兩 甘草 二兩</p>	<p>內經曰熱淫於內以苦發之柴胡黃芩之苦以解</p>	<p>在裏之邪辛甘發散為陽桂枝甘草之辛甘以散</p>	<p>在表之邪鹹以奠堅牡蠣之鹹以消胸脇之滿辛</p>	<p>以潤之乾薑之辛以固陽虛之汗津液不足而為</p>	<p>渴苦以堅之枳實之</p>	<p>之苦以生津液</p>	<p>右以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服</p>	<p>一升日三服初服微煩復服汗出愈</p>	<p>傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食</p>	<p>大便鞭脈細者此為陽微結必有表復有裏也脈沉亦</p>
------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------



在裏也汗出為陽微假令純陰結不得復有外證悉入
在裏此為半在裏半在外也脉雖沉緊不得為少陰病
所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與
小柴胡湯設不了了者得屎而解傷寒五六日邪當傳
裏之時頭汗出微惡
寒者表仍未解也手足冷心下滿口不欲食大便鞅脉
細者邪結于裏也大便秘為陽結此邪熱雖傳于裏然
以外帶表邪則熱結猶淺故曰陽微結脉沉雖為在裏
若純陰結則便無頭汗惡寒之表證諸陰脉皆至頭胸
中而還不上循頭今頭汗出知非少陰也與小柴胡以
解半表半裏之邪服湯已外證罷而不了了者為裏熱
未除與湯取其微利則愈故云得屎而解傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯
欽定四庫全書
普濟方
證具而醫以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此
雖已下之不為逆必蒸蒸而振怯發熱汗出而解若心
下滿而鞭痛者此為結胸也大陷胸湯主之但滿而不
痛者此為痞柴胡不中與之宜半夏瀉心湯主之傷寒
五六
日邪在半表半裏之時嘔而發熱邪在半表半裏之證
是為柴胡證具以他藥下之柴胡證不能者不為逆却
與柴胡湯則愈若下後邪氣傳裏者邪在半表半裏則
陰陽俱有邪至於下後邪氣傳裏亦有陰陽之異若下
後陽邪傳裏者則結於胸中為結胸為陽受氣之分與
大陷胸湯以下其結陰邪傳裏者則留于心下為痞為
陰受氣之分與半夏瀉心湯以通其痞經曰病發于陽
而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因此作



痞此之謂也

半夏瀉心湯方

半夏半升 黃芩 乾薑 人參已上各三兩 黃連兩大

棗十二枚 甘草三兩

辛入肺而散氣半夏之辛以散結氣苦入心而瀉熱黃連黃芩之苦以瀉痞熱脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以緩之

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服

一升日三服

欽定四庫全書

普濟方

太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞭下利不止水漿不下其人心煩太陽少陽併病為邪氣在半表半裏也而反下之二經之邪乘虛而入太陽表邪入裏結於胸中為結胸心下鞭少陽裏邪乘虛下於腸胃遂利不止若邪結陰分則飲食如故而為藏結此為陽邪內結故水漿不下而煩脈浮而緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳浮而緊浮為傷陽緊為傷陰當發其汗而反下之若浮入裏為陽邪入裏則作結胸浮



不入裏而緊入裏者陰邪入裏則作痞

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其人熱熱汗出

發作有時痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不

惡寒者此表解裏未和也十棗湯主之

下利嘔逆裏受邪也邪在裏可

以下須待表解者乃可攻之其人熱熱汗出發作有時

不惡寒者表已解也頭痛心下痞鞭滿引脇下痛乾嘔短

氣者邪熱內蓄而有伏飲是裏未和也與十棗湯下熱逐飲

十棗湯方
芫花熬 甘遂 大戟 大棗十枚

欽定四庫全書

普濟方

辛以散之芫花之辛以散飲苦以泄之甘遂大戟

之甘以泄水水者腎所主也甘者脾之味也大棗

而勝土
右三味等分各別搗為散以水一升半先煮大棗肥

者十枚取八合去滓內藥末強人服一錢匕羸人服

半錢溫服之平旦服若下少病不除明日更加服半

錢得快下利後米粥自養

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱

虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒針因胸煩面色青



黃膚潤者難治令色微黃手足溫者易愈

太陽病因發汗遂發熱惡

寒外虛陽氣邪復不除因復下之又虛其裏表中虛邪內陷傳於心下為痞發汗表虛為竭陽下之裏虛為竭

陰表證罷為無陽裏有痞為陰獨又加燒針虛不勝火火氣致胸煩也傷寒之病以陽為主其人面色青膚肉

暍動者陽氣大虛故云難治若面色微黃手足溫者即陽氣得復故云易愈

其脈關上浮者大黃黃連瀉心湯主之

心下鞅按之痛脈關沉者實熱

也心下痞按之濡其脈關上浮者為虛熱也大黃黃連瀉心湯以導虛熱

大黃黃連瀉心湯方

大黃 二兩
黃連 一兩

欽定四庫全書

普濟方

內經曰火熱受邪心病生焉苦入心寒除熱大黃黃連之苦寒以導瀉心下之虛熱但以麻沸湯漬

服者取其氣薄而瀉虛熱也

右二味以麻沸湯漬之須臾絞去滓分溫再服

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之

心下痞者虛熱內伏

也惡寒汗出者陽氣外虛也與瀉心湯攻痞加附子以固陽

瀉心湯痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散

主之

本因下後成痞當與瀉心湯除之若服之痞不解其人渴而口燥煩小便不利者為水飲內蓄津液不行非熱痞也與五苓散發汗散水則愈一方忍之一日不飲乃愈者外水不入所停之水得行而痞亦愈也



傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脅下

有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之胃為津液之主陽氣

之根大汗出後亡津液胃中空虛客氣上逆心下鞭痞

金匱要畧曰中焦氣未和不能消穀故令噫乾噫食臭

者胃氣虛而不殺穀也脇下有水氣腹中雷鳴土弱不

能勝水也與瀉心湯以攻痞加生薑以調中益胃也

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中

雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂

不盡復下之其痞愈甚此非結熱但以胃中虛客氣上

逆故使鞭也甘草瀉心湯主之傷寒中風是傷寒或中

風也邪氣在表醫反下

欽定四庫全書 普濟方

之虛其腸胃而氣內陷也下利日數十行穀不化腹中

雷鳴者下後裏虛胃弱也心下痞鞭乾嘔心煩不得安

者胃中空虛客氣上逆也與瀉心湯以攻痞加甘草以

補虛前以汗後胃虛是外傷陽氣故加生薑此以下後

胃虛是內損陰 傷寒服湯藥下後利不止而心

理中者理中焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復

利不止者當利其小便傷寒服湯藥下後利不止而心

下痞鞭者氣虛而客氣上逆也

與瀉心湯攻之則痞已醫復以他藥下之又虛其裏致



約與赤石脂禹餘糧湯以澁洞瀉下焦主分清濁下利者水穀不分也若服澁劑而利不止者當利小便以分其水

赤石脂禹餘糧湯方

赤石脂 一觔碎 味甘溫
禹餘糧 一觔碎 味甘溫

本草云澁可去脫石脂之澁以收斂之重可去怯餘糧之重以鎮固之

右二味以水六升煮取二升去滓日三服

傷寒吐下後發汗虛煩脈甚微八九日心下痞鞭脇下

痛氣上衝咽喉眩冒經脈動惕久而成痿 傷寒吐下後發汗則表裏

欽定四庫全書

普濟方

之氣俱虛其脈甚微為正氣虛邪氣獨在至八九日正氣當復邪氣當罷而心下痞脇下痛氣上衝咽喉眩冒者正氣內虛而不復邪氣留結而不去經脈動惕者經絡之氣虛極久則熱氣還經必成痿弱傷寒發

汗若吐若下解後心下痞鞭噫氣不除者旋覆代赭湯

主之 外邪雖解以曾發汗吐下胃氣弱而未和虛氣上逆故心下痞鞭噫氣不除與旋覆代赭湯鎮虛氣

而和胃

旋覆代赭石湯方

旋覆花 三兩 鹹溫 味
代赭石 一兩 味 苦寒
人參 二兩 味甘溫
甘草 兩 味甘

三兩 炙半夏 半升 味辛溫
五兩 切生薑 大棗 十二枚 擘



鞭則氣堅鹹味可以奠之旋覆之鹹以奠痞鞭怯
則氣浮重則可以鎮之代赭之重以鎮虛逆辛者
散也生薑半夏之辛以散虛痞甘者
緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服
一升日三服

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻

黃杏仁甘草石膏湯

前第三卷十六證云發汗不可更
行桂枝湯汗出而喘無大熱者為

與此證治法同汗下雖殊既不當損正氣則一邪氣所
傳既同遂用一法治之經所謂若發汗若吐若下後者
是也太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利不止心

欽定四庫全書

普濟方

下痞鞭表裏不解者桂枝人參湯主之

外證未除而數
下之為重虛其

裏邪熱乘虛而入裏裏虛協熱遂利不止而心下痞若
表解而下利心下痞者可與瀉心湯若不下利表不解
而心痞可先解表而後攻痞以表裏
不解故與桂枝人參湯和解表裏

桂枝人參湯方

桂枝 四兩去皮

甘草 四兩炙

白朮 三兩

乾薑 三兩

味辛 人參 三兩 味甘 溫

表未解者辛以散之裏不足者甘以緩之比以裏
氣大虛表裏不解故加桂枝甘草於理中湯中也

右五味以水九升先煮四味取五升內桂更煮取三



升溫服一升日再夜一服

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻

痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜大

黃黃連瀉心湯大下後復發汗則表裏之邪當悉已此乃痞而惡寒者表裏之邪俱不解也因

表不解而下之為心下痞先與桂枝湯以解表表解乃與大黃黃連瀉心湯以攻痞內經曰從外之內而盛於

內者先治其外傷寒發熱汗出不解心下痞鞭嘔吐而

而下調其內

下利者大柴胡湯主之傷寒發熱寒已成熱也汗出不解表未和而裏復病也吐利心

腹濡與為裏虛嘔吐而下利心下痞鞭者是裏實也與大柴胡湯以下裏熱病如桂枝證頭

欽定四庫全書普濟方不痛項不强寸脉微浮胸中痞鞭氣上衝咽喉不得息

者此為胸有寒也當吐之宜瓜蒂散病如桂枝證為發熱汗出惡風言邪

在表也頭痛項强為桂枝湯證具若頭不痛項不强則邪不在表而傳裏也浮為在表沉為在裏今寸脉微浮

則邪不在表亦不在裏而在胸中也胸中與表相應故知邪在胸中猶如桂枝證而寸脉微浮也以胸中痞鞭

上衝咽喉不得息知寒邪客於胸中而不在表也千金曰氣浮上部填塞心胸胸中滿者吐之則愈與瓜蒂散以吐胸中之邪

夫盛食填塞於胸中為之窒塞兩寸當王事兩尺脉不

見其理安在胸中有食故以吐出之食者物也物者坤



土也是足太陰之號也胸中者肺也為物所填肺者手
太陰金也金主殺伐與坤土傾在於上而旺於天金能
尅木故肝木生發之氣伏於地下非木鬱而何吐上
焦陰土之物木得舒暢則鬱去矣食塞於上脉絕於下
若不明天地之道無由達此至理水火者陰陽之徵兆
天地之別名也故曰獨陽不生獨陰不長天之用在於
地下則萬物生長矣地之用在於天上則萬物收藏矣
此乃天地交而萬物通也此天地相根之道也故陽火

欽定四庫全書

普濟方

之根本於地下陰水之源本於天上故曰水出高原故
人五藏主有形之物物者陰也陰者水也右三部脉主
之偏見于寸口食塞其上是絕五藏之源源絕則水不
下流兩尺竭絕此其理也何疑之有重明木鬱達之之
理達造化者能此或曰食盛填塞於胸中為窒也今吐
以去所傷之物去則安胸中者太陰肺之分野木鬱者
遏鬱厥陰肝木於下故以吐伸之以舒暢陽和風木之
氣也此吐乃瀉出太陰之塞所謂木鬱請問其說荅曰



此大神靈之間非既演大道不能及於此天地之間六合之內惟水與火耳火者陽也升浮之象也在天為體在地為用水陰土也降沉之象也在地為體在天為用殞殺之收藏之象也其氣上下交則以成八卦矣以醫者言之則是升浮降沉溫涼寒熱四時也以應八卦若天火在上地火在下則是天地不交陰陽不相輔也是萬物之道大易之理絕滅矣故經言獨陽不生獨陰不長天地陰陽不交會矣故曰陽本根於陰陰本根於陽

欽定四庫全書

普濟方

若不明根源是不明道故六陽之氣生於地則曰陽本根於陰以人身言之是六腑之生發長散於胃中上之中也既陽氣鼓舞萬象有形質之物於天為浮散者也物極必反陽極變陰既六陽升浮之力在天其力既盡是陽道終矣所以鼓舞六陰有形之陰水在天在外也上六無外必歸於下此老陽變陰之象也是五藏之源在於天者也天者人之肺以應之故曰陰本根於陽水出高源者是也人之五藏其源在肺肺者背也背在天地



故足太陽膀胱寒水生長其源在中故陰寒自此而降
以成秋收氣寒之漸也降之於成冬藏伏謂六陽在九
泉之下者也故五藏之氣生於死以人身是五藏之氣
收藏沉降之源出於肺氣之上其流下行既陰氣下行
沉墜萬化有形質之物皆收藏於地為沉降者也物極
必反陰極變陽既六陰沉降之力在地其力既盡是陰
道終矣是老陰變陽陽乃和上九無位是一歲四時之氣
終而復始為上下者也莫測其紀如環無端具太陽陰

欽定四庫全書

普濟方

者肺金收降之氣當居下體金反在上抑遏厥陰風木
反居於下是不得上升也故曰木鬱故令其吐出窒塞
有形土化之物使太陰秋肺收於下體浮其木以衰之
始上升手足厥陰之木尤氣以伸其舒暢上升之念得
其所以又沉金能尅木以土伐之則金衰矣金者其道
當降是塞因塞用歸其本矣居於上則遏其木故以吐
伸之乃瀉金以助木也徧考內經中說木鬱則達之之
義止是食傷太陰有形之物窒塞於胸中尅制厥陰木



氣伏潛於下不得舒伸於上此若無異說以六淫有餘
運氣中論之仲景傷寒論云懊惱躁煩不得眠不經汗
下謂之實煩瓜蒂散主之曾經妄汗妄下謂之虛煩梔
子豉湯主之

瓜蒂散方

瓜蒂 一分 熬黃
味苦寒 赤小豆 一分 味
酸温

其高者因而越之越以瓜蒂之苦佐以
赤小豆之酸內經曰酸苦湧瀉為陰

右二味各別搗篩為散已合治之取一錢匕以香豉

欽定四庫全書

普濟方

一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和丸散温頓
服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可

與瓜蒂散

病脇下素有痞連在臍旁通引少腹入陰筋者此名藏

結死 素有宿昔之積結於脇下為痞今因傷寒邪氣入
裏與宿積相併使藏真之氣結而不通致連在臍

旁痛引少腹傷寒病若吐若下後七八日不解熱結在

裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數

升者白虎加人參湯主之 若吐若下後七八日則當解
復不解而熱結在裏表熱者



身熱也裏熱者內熱也今因吐下後邪氣乘虛內陷為結熱若無表熱而純為裏熱則邪熱結而為實此以表熱未罷時時惡風若邪氣純在表則惡風無時若邪氣純在裏則更不惡風以時惡風知表裏俱有熱也邪熱結而為實者則無大渴邪熱散漫則渴今雖結熱在裏表裏俱熱未為結實邪氣散漫熏蒸焦膈故大渴舌上乾慘而煩欲飲數升與白虎湯加人參湯散熱生津	傷寒無大熱口燥渴心煩背	微惡寒者白虎加人參湯主之	陽明病然以背微惡寒為表未罷所以屬太陽也背為陽背惡寒口中和者少陰病也當與附子湯今口燥而渴背雖惡寒此裏熱也其惡寒亦不至甚故云傷寒脈微惡寒與白虎湯和裏散熱加人參止渴生津	浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無	欽定四庫全書	表證者白虎加人參湯主之	者宜五苓散非白虎湯所宜大渴欲飲水無表證者乃可與白虎湯加人參湯以散裏熱臨病之工大宜精別	太陽少陽併病心下鞭頸項強而眩者當刺大椎肺俞	慎勿下之	俠脊故刺肝俞以瀉少陽之邪以膽為肝之府故爾太陽為在表少陽為在裏即是半表半裏證前第八證云不可發汗發汗則譫語是發汗攻太陽而少陽之邪益甚于胃必發譫語此云慎勿下之攻少陽之邪而太陽之邪乘虛入裏必作結胸經曰太陽與少陽併病而反下之成結胸	太陽與少陽合病自	下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之
--	-------------	--------------	---	-----------------------	--------	-------------	--	-----------------------	------	--	----------	----------------------



<p>陽明合病自下利為在表當與葛根湯發汗陽明少陽合病自下利為在裏可與承氣湯下之此太陽少陽合病自下利為在半表半裏非汗下所宜故以黃芩湯以解半表半裏之邪嘔者胃氣逆也故加半夏生薑以散氣逆</p>	<p>黃芩湯方</p>	<p>黃芩 三兩 味苦寒 甘草 三兩 味甘平 芍藥 三兩 味酸平 大棗 二十枚 味甘平</p>	<p>溫味甘 虛而不實者苦以堅之酸以收之黃芩芍藥之苦酸以堅斂腸胃之氣弱而不足者甘以補之甘草大棗之甘以溫補固腸胃之氣</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服若嘔者加半夏半升生薑三兩</p>	<p>傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯</p>	<p>主之 濕家下後舌上如胎者以丹田有熱胸中有寒是邪氣入裏而為下熱上寒也此傷寒邪氣傳裏而為下寒腹中痛上熱也胃中有邪氣使陰陽不交陰不得升而獨治於下為下寒腹中痛陽不降而獨治於上為胸中痛欲嘔吐與黃連湯升降陰陽之氣</p>	<p>黃連湯方</p>	<p>黃連 三兩 甘草 三兩 乾薑 三兩 桂枝 二兩 去皮 人參 二兩 半</p>
---	-------------	---	---	-----------------------	---	------------------------------	---	-------------	---



夏 <small>半</small> 升大棗 <small>十二</small> 枚 <small>十二</small>	<small>上熱者瀉之以苦黃連之苦以降陽下寒者散之以辛桂薑半夏之辛以升陰脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以益胃</small>	右七味以水一斗煮取六升去滓溫服一升日三服	夜二服	傷寒八九日風濕相搏身體煩疼不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而澹者桂枝附子湯主之 <small>傷寒與中風家七八日再經之時則邪氣多在裏身必不苦疼痛今日數雖多身體煩疼不能自轉側者風濕相搏也煩者風也身疼不能自轉側</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	<small>者濕也經曰風則浮虛脈經曰脈來澹者為病寒濕也不嘔不渴裏無邪也脈得浮虛而澹身有煩疼知風濕但在經也與桂枝附子湯以散表中風濕</small> 若其人大便鞭小便自利者去桂枝加白朮湯主之 <small>桂枝發汗走津液此小便利大便鞭為津液不足故去桂加朮</small>	桂枝附子湯方 桂枝 <small>四兩</small> 去皮 <small>味辛熱</small> 附子 <small>二枚</small> 炮 <small>八片</small> 去皮 <small>味辛熱</small> 生薑 <small>三兩</small> 切 <small>味甘溫</small> 甘草	草 <small>二兩</small> 炙 <small>味甘溫</small> 大棗 <small>十二枚</small> 擘 <small>味甘溫</small>	右五味以水六升煮取二升去滓分溫三服	風濕相搏骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出
--	---	----------------------	-----	---	---------------------------	--	--	---	-------------------	-----------------------



短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子

湯主之風則傷衛濕流關節風濕相搏兩邪亂經故骨節煩疼掣痛不得屈伸近之則痛劇也風勝則

衛氣不固汗出短氣惡風不欲去衣為風在表濕勝則水氣不行小便不利或身微腫為濕外搏也與甘草附

子湯散濕固衛氣

甘草附子湯方

甘草 二兩炙 附子 二枚炮去皮 白朮 二兩 桂枝 二兩

味甘平 破味辛熱 甘温 桂枝甘草之辛甘發散風邪而利衛 附子白朮之甘温解濕氣而温經

右四味以水六升煮取三升去滓温服一升日三服

欽定四庫全書

普濟方

初服得微汗則解能食汗出復煩者服五合恐一升

多者宜服六七合為妙

傷寒脉浮滑此表有熱裏有寒白虎湯主之浮為在表滑為在裏

表有熱外有熱也裏有寒邪氣傳裏也以邪未入腑故止言寒如瓜蒂散證云胸中有寒者是也與白虎湯以

解內外之邪

白虎湯方

知母 六兩 石膏 一斤 甘草 一斤 粳米 六合

味苦寒 味甘寒 味甘平 味甘平 散熱熱則傷氣甘以緩之甘草粳米之甘以益氣



右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

傷寒脉結代心动悸炙甘草湯主之 結代之脉動而中

結不能自還者名曰代由血氣虛衰不能相續也心中悸動知真內虛也與炙甘草湯益氣虛補血虛而復脉

炙甘草湯方

甘草 四兩 生薑 三兩 桂枝 三兩 生地黄 一斤 阿膠

炙 兩麥門冬 半升 麻子仁 半升 大棗 十二枚 人參 二兩

補可去弱人參甘草大棗之甘以補不足辛走氣桂枝生薑之辛以益正氣聖濟經曰津液耗散為

欽定四庫全書

普濟方

枯五藏痿弱榮衛澗流溫以潤之麻仁阿膠麥冬生地之甘潤經益血以復脉通心也

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓

內膠烱消盡溫服一升日三服一名復脉湯

脉按之來緩而時一止復來者名曰結又脉來動而中

止更來小數中有還者反動名曰結陰也脉來動而中

止不能自還因而復動名曰代陰也得此脉者必難治

結代之脉一為邪氣留結一為真氣虛衰脉來動而不

止若能自還更來小數止是邪氣留結名曰結陰若動而中止不能自還因其呼吸陰陽相引復動者是真氣衰極名曰代陰為難治之脉經曰脉結者生代者死此



也 之謂	夫太陽病下之不愈其脉浮者為在外汗之則愈宜桂枝湯	夫太陽病發汗已解半日後復煩燥其脉浮散者可復發其汗宜桂枝湯	太陽病脉浮而數者可發其汗宜麻黃湯	太陽與陽明合病而自利宜朮附湯	太陽病發汗後腹脹滿者宜厚樸湯	欽定四庫全書 普濟方	太陽病汗後心下痞滿者宜瀉心湯	太陽病汗出後胃中不和心下痞堅乾噎食臭脇下有	水氣腹中雷鳴而利宜半夏瀉心湯	普濟方卷一百二十七
---------	-------------------------	------------------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------

