

欽定四庫全書

普濟方卷一百二十八 明 周王朱櫛 撰

傷寒門

辨陽明證并治第八

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也

答曰太陽陽明者脾約是也陽明胃也邪自太陽經傳之入府者謂之太陽陽明

經曰太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯即是太陽陽明脾約病也正陽陽明

者胃家實是也邪自陽明經傳入府者謂之正陽陽明經曰陽明病脈遲雖汗出不惡寒其身必重短氣腹滿

欽定四庫全書

普濟方

而喘有朝熱者外欲解可攻裏也手足濇濇然汗出者此大便已鞭也大承氣湯主之即是正陽陽明胃家實也

少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也

邪自少陽經傳之入府者謂之少陽陽明經曰傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語

此屬胃即是少陽陽明病也陽明之為病胃家實也邪傳入胃熱毒

實華佗曰熱毒入胃要須下去之不可留于胃中是知邪在陽明為胃家實也問曰何緣得陽

明病答曰太陽病發汗若下若利小便此亡津液胃中

乾燥因轉屬陽明不更衣內實大便難者此名陽明也本

太陽病不解因汗利小便亡津液胃中乾燥太陽之邪入府轉屬陽明古人登廁必更衣不更衣者通為不大便



<p>不更衣則胃中物不得泄故為內實胃無津液加之畜熱大便則難為陽明裏實也<small>問曰陽明病</small></p>	<p>外證云何<small>答曰身熱汗自出不惡寒反惡熱也</small><small>陽明病為邪入</small></p>	<p>府也邪在表則身熱汗出而惡寒邪既入府則表證已罷故不惡寒但身熱汗出而惡熱也<small>問曰病</small></p>	<p>有得之一日不發熱而惡寒者何也<small>答曰雖得之一日</small></p>	<p>惡寒將自罷即自汗出而惡熱也<small>邪客在陽明當發熱而不惡寒今得之一日</small></p>	<p>猶不發熱而惡寒即邪未全入府尚帶表邪若表邪全入則更無惡寒必自汗出惡熱<small>問曰惡寒何</small></p>	<p>故自罷<small>答曰陽明在中土也萬物所歸無所復傳始雖</small></p>	<p>惡寒二日自止此為陽明病也<small>胃為水穀之海主養四旁四旁有病皆能傳入</small></p>	<p>欽定四庫全書<small>普濟方</small></p>	<p>子胃入胃則更不復傳如太陽之入胃則更不傳陽明病傳之入胃則更不傳少陽少陽病傳之入胃則更不</p>	<p>傳三<small>本太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉屬陽</small></p>	<p>明也<small>傷寒傳經者則一日太陽二日陽</small><small>傷寒發熱無汗</small></p>	<p>嘔不能食而反汗出濇濇然者是轉屬陽明也<small>傷寒發熱無汗</small></p>	<p>者太陽之邪轉屬陽明也經曰陽明病法多汗<small>傷寒三</small></p>	<p>日陽明脈大<small>傷寒三日邪傳陽明之時經曰尺寸俱長者</small></p>	<p>邪併於經是以脈大<small>傷寒脈浮而緩手足自溫者是為繫在太陰</small></p>	<p>太陰身當發黃若小便自利者不能發黃至七八日大</p>
---	---	--	---	--	--	---	--	---------------------------------	---	---	--	--	---	--	---	------------------------------



便鞭者為陽明病也

浮為陽邪緩為脾脈傷寒脈浮緩太陰客熱邪在三陽則手足熱邪

在三陰則手足寒今手足自溫是知繫在太陰也太陰上也為邪蒸之則色見于外當發身黃熱小便自利者

熱不內畜不能發黃至七八日大便傷寒轉繫陽明也傷寒轉繫陽明者

其人澀然微汗出也

傷寒則無汗陽明多汗此以傷寒邪轉繫陽明故澀然微汗出也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊若

下之則腹滿小便難也

脈浮在表緊為裏實陽明中風口苦咽乾腹滿微喘者熱傳於

裏也發熱惡寒者表仍未解若下之裏邪難去陽明病表邪復入于裏又亡津液故使腹滿而小便難

若能食名中風不能食名中寒

陽明病以飲食別受風寒者以胃為水穀之海

欽定四庫全書

普濟方

風為陽邪陽殺殺故中風者能食寒為陰邪不殺殺故傷寒不能食陽明病若中寒不能

食小便不利手足澀然汗出此欲作固瘕必大便初鞭

後澹所以然者胃中冷水穀不別故也

陽明中寒不能食者寒不殺穀

也小便不利者津液不化也陽明病法多汗則周身汗出此手足澀然而汗出而身無汗者陽明中寒也固瘕

者寒氣結積也胃中寒甚欲留結而為固瘕則津液不得通行而大便必鞭者若汗出小便不利者為實也此

以小便不利而水穀不別陽明病欲食小便反不利大

便自調其人骨節疼翁翁如有熱狀奄然發狂澀然汗出

而解者此水不勝穀氣與汗共併脈緊則愈

陽病客熱初傳入胃



<p>胃熱則消穀而欲食陽明病熱為實也則小便當數大便當鞭今小便反不利大便自調者熱氣散漫不為實也欲食則胃中穀多內經曰食入於陰長氣於陽穀多則陽氣勝熱消津液則水少經曰水入於經其血乃成水少則陰弱矣金匱要略曰陰氣不通則骨疼其人陰氣不足也熱甚於表者翕翕發熱熱甚於裏者蒸蒸發熱此熱氣散漫不專著於表裏故翕翕如有熱狀奄忽也忽然發狂者陰不勝陽也內經曰陰不勝其陽者則脈流薄疾并乃狂陽明蘊熱為實者則須下之愈熱氣散漫不為實者必待汗出而愈故云濺然而汗出解也</p>	<p>水穀之等者陰陽氣平也水不勝穀氣是陰不勝陽也汗出則陽氣衰脈繁則陰氣盛陰陽氣平兩無偏勝則愈故云與汗</p>	<p>共脈繁則愈陽明病欲解時從申至戌上四月為陽主戌向旺時是為欲解陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>虛冷故也以其人本虛故其熱必噦不能食胃中本寒虛寒相搏故噦也經曰關脈弱胃氣虛有熱不可大攻之熱去則寒起此之謂也 陽明病脈遲</p>	<p>食難用飽飽則微煩頭眩必小便難此欲作穀疸雖下</p>	<p>之腹滿如故所以然者脈遲故也 陽明病脈遲則邪方入于陰長氣於陽胃中有熱也食難用飽飽則微煩而頭眩者穀氣與熱氣相搏也兩熱相合消損津液必小便難利者不能發黃言熱得泄也小便不利則熱不得泄身必發黃疸黃也以其發於熱故名穀疸熱實者下之則愈脈遲者熱氣未實雖下之腹</p>	<p>滿亦不減也經曰脈遲未可以攻 陽明病法多汗其身如蟲行皮中狀者以此以虛故也 胃為津液之府氣虛津液少病則反</p>
---	--	---	-------------------	---	------------------------------	---	---



無汗胃候身之肌肉其身如 蟲行皮中者知胃氣以虛也	陽明病反無汗而小便利	二三日嘔而欬手足厥者必苦頭痛若不欬不嘔手足	不厥者頭不痛	陽明病法多汗反無汗而小便利者陽	明傷寒而寒氣內攻也至二三日嘔欬支	厥者寒邪發於外也必苦頭痛若不欬不嘔手足	不厥者是寒邪但攻裏而不外發其頭亦不痛也	陽明	病但頭眩不惡寒故能食而欬其人必咽痛若不欬者	咽不痛	陽明病身不重痛但頭眩而不惡寒者陽明中	風而風氣內攻也經曰陽明病若能食名中風風	邪攻胃胃氣上逆則欬咽門者胃之系欬甚則咽	傷故必咽痛若胃氣不逆則不欬其咽亦不痛也	陽明	病無汗小便不利心中懊懣者身必發黃	陽明病無汗	而小便不利	欽定四庫全書	普濟方	者熱蘊於內而不得越心中懊懣	者熱氣鬱蒸欲發於外而為黃也	陽明病被火額上微	汗出小便不利者必發黃	陽明病則為內熱被火熱相	合而甚若遍身汗出而小便	利者熱得泄越不能發黃今額上下汗出而	小便不利則熱不得越鬱蒸於胃必發黃也	陽明病脈	浮而緊者必潮熱發作有時但浮者必盜汗出	浮為在	經緊者	裏實脈浮而緊者表熱裏實也必潮熱發作有時若脈	但浮而不緊者止是表熱也必盜汗者睡而汗出也	陽	明病裏熱者自	汗表熱者盜汗	陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必	明病裏熱者盜汗	陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必	衄	陽明之脈起於鼻絡於口陽明裏熱則渴欲飲水此	衄口燥但欲漱水不欲嚥者是熱在經而裏無熱也	陽	明氣血俱多經中熱甚	陽明病本自汗出醫更重發汗	迫血妄行必作衄也
----------------------------	------------	-----------------------	--------	-----------------	------------------	---------------------	---------------------	----	-----------------------	-----	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----	------------------	-------	-------	--------	-----	---------------	---------------	----------	------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	------	--------------------	-----	-----	-----------------------	----------------------	---	--------	--------	-----------------	---------	-----------------	---	----------------------	----------------------	---	-----------	--------------	----------



病已差尚微煩不了了者此大便必鞭故也以亡津液	胃中乾燥故令大便鞭當問其小便日幾行若本小便	日三四行今日再行故知大便不從出今為小便數少	以津液當還入胃中故知不從必大便也 <small>先亡津液使大便鞭小便</small>	數少津液分則 <small>傷寒嘔多雖有陽明證不可攻也</small> <small>嘔者在</small>	大便必自下也 <small>傷寒嘔多雖有陽明證不可攻也</small> <small>熱在</small>	上焦未全入 <small>陽明病必下鞭滿者不可攻之攻之利遂</small>	腑故不可下 <small>陽明病必下鞭滿者不可攻之攻之利遂</small>	不止者死止者愈 <small>陽明病腹滿者為邪氣入府可下之</small>	可便下之得止者利為邪氣去正氣安 <small>陽明病面合赤</small>	則愈若因下利不止者為正氣脫而死 <small>陽明病面合赤</small>	欽定四庫全書	普濟方	色不可攻之必發熱色黃小便不利也 <small>合通也陽明病面色通赤者熱</small>	在經也不可下之下之虛其胃氣耗其津液 <small>經</small>	中之熱乘虛入胃必發熱色黃小便不利也 <small>陽明病</small>	不吐不下心煩者可與調胃承氣湯 <small>吐後心煩謂之內</small>	虛煩今陽明病不吐不下心煩即是胃 <small>陽明病脈遲雖</small>	煩鬱熱也與調胃承氣湯以下鬱熱 <small>陽明病脈遲雖</small>	汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此	外欲解可攻裏也手足濇然而汗出者此大便已鞭也	大承氣湯主之熱汗多微發熱惡寒者外未解也其熱	不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------	-----	---	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>微和胃氣勿令大泄下<small>陽明病脈遲若脈出多微發熱出而不惡寒表證罷也身重短氣腹滿而喘有潮熱者熱入府也四肢諸陽之本津液足為熱蒸之則周身汗出津液不足為熱蒸之其手足濇然而汗出知大便已鞭也與大承氣湯以下胃熱經曰潮熱者實也其熱不通是熱未成實故不可與大承氣湯雖有腹大滿不通之急亦不可與大承氣湯與小承氣湯微和胃氣</small></p>	<p>大承氣湯方</p>	<p>大黃<small>四兩</small> 厚朴<small>半觔</small> 枳實<small>五枚</small> 芒硝<small>三</small></p>	<p>寒 鹹</p>	<p>內經曰燥淫所勝以苦下之大黃枳實之苦以潤燥除熱又曰燥淫於內治以苦溫厚朴之苦下結</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>燥又曰熱淫所勝治之鹹<small>寒芒硝之鹹以攻蘊熱</small></p>	<p>右四味以水一斗先煮二物取五升去滓內大黃煮</p>	<p>取二升去滓內芒硝更上火微一兩沸再服得下餘</p>	<p>勿服</p>	<p>小承氣湯方</p>	<p>大黃<small>兩</small> 厚朴<small>二兩</small> 枳實<small>三枚</small></p>	<p>大熱結實者大承氣湯小熱微結者與小承氣湯以熱不大其故於大承氣湯去芒硝又以結不至</p>	<p>堅故亦減厚朴枳實也</p>
---	--------------	---	------------	---	---------------	------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------	--------------	---	---	------------------



<p>已上三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之</p>	<p>陽明病潮熱大便微鞭者可與大承氣湯不鞭者不與</p>	<p>之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣</p>	<p>湯入腹中轉失氣者<small>此有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必澹不可攻之</small></p>	<p>攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱</p>	<p>者必大便腹鞭而少也以小承氣湯和之不轉失氣者</p>	<p>慎不可攻也<small>朝熱者實得大便微鞭者便可攻之若不鞭者則熱未成實雖有朝熱亦未可攻也</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>若不大便六七日恐有燥屎當先與小承氣湯順之若無燥屎小承氣湯熱勢緩不能宣泄必轉氣下失若不</p>	<p>轉氣是胃中無燥屎但恐其初頭鞭後必澹攻之則虛其胃氣致腹脹滿不能食也胃中乾燥則欲飲水水入</p>	<p>胃中虛寒相搏氣逆則噦其後却發熱者則熱氣乘虛還腹聚於胃中胃燥得熱必大便復鞭而少與小承湯</p>	<p>微利以和之故又重云不轉<small>夫實則讞語虛則鄭聲重</small></p>	<p>失氣不可攻之謹慎之至</p>	<p>語也<small>內經曰凡邪氣盛則實精氣奪則虛讞語由邪氣盛而神識昏也鄭聲由精氣奪而聲不全也讞語</small></p>	<p>者言語不次也鄭聲者鄭聲不正也論語云惡鄭聲之亂樂又曰放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆言鄭聲不正</p>	<p>也今新差氣虛人聲轉者是所直視讞語喘滿者死下</p>	<p>謂重語也若聲重亦聲轉也直視讞語喘滿者死下</p>	<p>利者亦死<small>直視讞語喘滿者死下</small>發汗多若重</p>
--	------------------------------	------------------------------	--	------------------------------	------------------------------	---	-----------------------	---	---	---	---	-------------------	--	---	------------------------------	-----------------------------	--



發汗者亡其陽譫語脉短者死脉自和者不死	<small>者脉短津液已絕不可復治脉自和為主氣未衰而猶可生也</small> 傷寒若吐若下後不解	不大便五六日上至十餘日日脯所發潮熱不惡寒獨	語見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸牀惕而不安微	喘直視脉弦者生濇者死微而未至於劇而但發熱譫	語者可與大承氣湯主之若下一服利則止後服	<small>若吐皆傷胃氣不大便五六日上至十餘日者亡津液胃氣虛邪熱內結也陽明生於申酉戌日脯所發潮熱者陽明熱甚也不惡寒者表證罷也獨語如見鬼狀者陽明內實也以為熱氣有餘若劇者是熱氣甚大也大熱甚於</small>	欽定四庫全書 普濟方	內昏胃正氣使不識人至於循衣摸床惕怖不安微喘直視傷寒陽勝而陰絕者死陰勝而陽絕者死熱劇者	為陽勝脈弦為陰有餘澁為陰不足陽熱雖劇脈弦知陰未絕即猶可生脈澁則絕陰故不可治其邪熱微而	未至於劇者但發熱譫語可與大承氣湯以下胃中熱經曰凡服下藥中滿即止不必盡劑此以熱未劇故云	若一服利則止後服陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便	必鞭鞭則譫語小承氣湯主之若一服譫語止更莫復	服 <small>亡津液胃燥大便鞭而譫語雖無大熱內結亦須與小承氣湯和其胃氣得一服不譫語則胃燥以潤更</small>	莫復與承氣湯也陽明病譫語發潮熱脈滑而疾者小承	氣湯主之因與承氣湯一升腹中轉氣者更服一升若
--------------------	---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	---------------	--	--	--	---------------------------	-----------------------	---	------------------------	-----------------------



不轉失氣勿更與之明日不大便脈反微澁者裏熱也

為難治不可更與承氣湯也

陽明病讞語發潮熱若脈沉實者內實也則可下若

脈滑之疾為虛熱未實則未可下先與小承氣湯和之湯入腹中轉失氣者中有燥屎可更與小承氣湯一升

以除之若不轉而失氣者是無燥屎不可更與承氣湯至明日邪氣傳時脈得沉實緊牢之類是裏熱也反得

微澁者裏氣大虛也若大便秘利後脈微澁者止為裏虛而尤可此不曾大便脈反微澁是正氣內衰為邪勝故

云難 陽明病讞語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎

五六枚也若能食者但鞭尔宜大承氣湯下之

讞語潮熱為胃

熱當消谷引食反不能食者胃中有燥屎而胃中實也若能食者胃中虛熱雖鞭不得為有燥屎雜病虛為不

欽定四庫全書

普濟方

欲食實為欲食傷寒則胃實熱甚者不能食胃中虛熱甚者能食與雜病為異也大承氣湯以下燥屎逐結熱

陽明病下血讞語者此為熱入血室但汗出者刺期門

隨其實而瀉之澱然汗出則愈

陽明病熱入血室迫血下行使下血讞語陽明

病法多汗以奪血者無汗故但頭汗出也刺期門以散血室之熱隨其實而瀉之以除陽明之邪熱散邪除熱

榮衛得通津液得復澱然汗出而解 汗出讞語者以有燥屎在胃中此為

風也須下之過經乃可下之下之若早語言必亂以表

虛裏實故也下之則愈宜大承氣湯

胃中有燥屎則讞語以汗出為表未

罷故云風也燥屎在胃則當下以表未和則未可下須過太陽經太陽無表證乃可下之若下之早燥屎雖除則



<p>表邪乘虛復陷於裏為表虛裏實胃虛熱甚 語言必亂與大承氣湯却下胃中邪熱則止傷寒四五</p>	<p>日脈沉而喘滿沉在裏而反發其汗津液越出大便為</p>	<p>難表虛裏實久則譫語<small>邪氣入內之時得脈沉而喘滿 裏證具也則當下之反發其汗</small></p>	<p>令津液越出胃中乾燥大便必<small>難</small>三陽合病腹滿身重難</p>	<p>以轉側口不仁而面垢譫語遺尿發汗則譫語下則額</p>	<p>上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之<small>腹滿身重 難以轉側</small></p>	<p>不仁譫語者陽明也針經曰少陽病甚面則微塵此面 垢者少陽也遺尿者太陽也此三者以陽明證多故出</p>	<p>陽明篇中三陽合病為表裏有邪若發汗攻表則燥熱 益甚必愈譫語若下之攻裏表熱乘虛內陷必額上汗</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>出手足逆冷其自汗出者三陽經熱甚也內經曰熱 則腠理開榮衛通汗大泄與白虎湯以解內外之熱二</p>	<p>陽併病太陽證罷但發潮熱手足絳絳汗出大便難即譫</p>	<p>語者下之則愈宜大承氣湯<small>本太陽病併於陽明名曰 併病太陽證罷是無表證</small></p>	<p>但發潮熱是熱併陽明一身汗出為熱越今手足絳絳汗 出是熱聚於胃也必大便難而譫語經曰手足絳絳然</p>	<p>而有汗出者必大便已鞭也<small>陽明病脈浮而緊咽燥口 與大承氣湯以下胃中實熱</small></p>	<p>苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則</p>	<p>燥心憤憤反譫語若加燒針必怵惕煩躁不得眠若下</p>	<p>之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者梔子豉</p>
--	------------------------------	--	--	------------------------------	--	--	--	-----------------------	---	-------------------------------	--	---	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------



湯主之

脈浮發熱為邪在表咽燥口渴為熱在經脈緊腹滿而喘汗出不惡寒反惡熱重身為邪在裏

此表裏俱有邪猶當雙解之若發汗攻表表熱雖除而內熱益甚故躁而憤憤反讞語憤憤也心亂經曰榮氣

微者加燒針血不行更發熱而躁煩此表裏有熱若加燒針則損動陰氣故怵惕煩躁不得眠也若下之裏熱雖

去則胃中空虛表中空邪之氣乘虛陷於上焦煩動於膈使心中懊懣而不了了也舌上胎黃者熱氣客於胃

與梔子豉湯以吐胃中之邪 若渴欲飲水口乾舌燥者

白虎加人參湯主之 此下後邪熱不容於上焦者為虛煩

中焦者是為乾燥煩渴與 若脈浮發熱渴欲飲水小便

不利者猪苓湯主之 此下後客熱客於下焦者也邪氣

自表入裏客於下焦三焦俱帶熱

也脈浮發熱者上焦熱也渴欲飲水者中焦熱也小便

不利者邪客下焦津液不得而通也與猪苓湯利小便

以瀉下焦之熱也

猪苓湯方 猪苓 去皮 茯苓 甘 阿膠 甘 滑石 碎 甘 澤瀉 甘 鹹寒 各一兩

甘甚而 反淡

淡味滲泄為陽猪苓茯苓之甘以行小便鹹味湧泄為陰澤瀉之鹹以泄伏水滑利竅阿膠滑石之

滑以利水道

右四味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿膠



烱消溫服七合日三服

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥

猪苓湯復利其小便故也針經曰水穀入於口輸於腸胃其液別為五天寒衣薄則

為溺天熱衣厚則為汗是汗溺一液也汗多津液外泄胃乾燥故不與猪苓湯也脈浮而遲表

熱裏寒下利清穀者四逆湯主之浮為表熱遲為裏寒下利清穀者裏寒甚

也與四逆溫裏散寒若胃中虛冷不能食者飲水則噦噦者咳逆是也千金

曰咳逆者噦逆之名胃中虛冷得水則水寒相搏胃氣逆而噦脈浮發熱口乾鼻燥能

食者則衄脈浮發熱口乾鼻燥者熱在經也能食者裏和也熱甚於經迫血為衄胃中虛冷陰勝也

欽定四庫全書普濟方

水入於經其血乃成飲水者助陰氣逆為噦噦必發熱口乾陽勝也食入於陰長氣於陽能食者助陽血妄為

衄三者偏陰偏陽之疾也陽明病下之其外有熱手足溫不結胸心

中懊憹饑不能食但頭汗出者梔子豉湯主之表未罷而下之

應邪熱內陷也熱內陷者則外熱而無手足溫者熱雖內陷然而不深故不結胸心中懊憹不能食者熱客胸

中為虛煩也熱自胸中薰蒸於上故但頭汗出而身無汗與梔子豉湯以吐胸中之虛煩也陽明病

發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者小柴胡湯主

之陽明病潮熱為胃實大便鞭而小便數今大便溏而溏者應氣降而胸脇滿去今反不去者邪氣猶陽明病

在半表半裏之間與小柴胡湯以去表裏之邪陽明病



者此為津液內竭雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜	不得盡其命而死	陽明病自汗出若發汗小便自利	黃湯以發其汗若不尿腹滿加噦者關格之疾也故云	不治難經曰關格者	脈但浮而不弦大無諸裏證者是邪但在表也可與麻	大便而嘔舌上白胎者為邪未入腑在表裏之間與小	柴胡湯以和解之上焦既通則嘔止	津液得下則胃氣得和汗出而解	陽明中風脈弦浮	大噓而短氣腹都滿脇下及心痛手按之氣不通鼻乾	不得汗嗜卧一身及面目悉黃小便難有潮熱時時噦	耳前後腫刺之小差外不解病過十日脈續浮者與小	柴胡湯脈但浮無餘證者與麻黃湯若不尿腹滿加噦	欽定四庫全書	普濟方	者不治	浮天為陽風在表也弦則為陰風在裏也短氣	腹滿脇下及心痛風熱壅於腹中而不痛也若	寒客於中而痛者按之則寒氣散而痛止此以風熱內	壅故雖久按而氣亦不通也陽明病鼻乾不得卧自汗	出者邪在表也此鼻乾不得汗而嗜卧者風熱內攻不	在表也一身面目悉黃小便難有潮熱時時噦者風熱	攻於胃也陽明之脈出大迎循頰車上耳前過客主人	熱勝則腫此風熱在經故耳前後腫刺之經氣通腫則	小差如此者外證罷則可攻若外證不解雖過十日脈	續浮者邪氣猶在半表裏與小柴胡湯以和解之若其	脈但浮而不弦大無諸裏證者是邪但在表也可與麻	黃湯以發其汗若不尿腹滿加噦者關格之疾也故云	不治難經曰關格者	陽明病自汗出若發汗小便自利	者此為津液內竭雖鞭不可攻之當須自欲大便宜蜜
-----------------------	---------	---------------	-----------------------	----------	-----------------------	-----------------------	----------------	---------------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----	--------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------	---------------	-----------------------



煎導而通之若土瓜根及與大猪膽汁皆可為導津液內熱
故不可攻宜以藥外治而導引之

蜜煎導方

蜜七合一味內銅器中微火煎之稍凝似飴狀攪之勿令焦着欲可丸併手捻挺令頭銳大如指長二寸許當熱時急作冷則硬以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

猪膽汁方

欽定四庫全書

普濟方

大猪膽一枚瀉汁和醋少許以灌穀道中如一食頃當大便出

陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜桂

枝湯陽明病脈遲汗出多尚有邪在裏以微惡寒知表未解與桂枝湯和表陽明病脈浮

無汗而喘者發汗則愈宜麻黃湯陽明傷寒表實脈而喘也與麻黃湯以

汗發陽明病發熱汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出

身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此為瘵熱在內

身必發黃茵陳湯主之但頭汗出身無汗劑頸而還者熱不得越也小便不利渴引水



漿者熱甚於胃津液內竭也胃為土而色黃胃為熱蒸則色奪於外必發黃也與茵陳湯逐熱退黃

茵陳蒿湯方

茵陳蒿

六兩苦微寒

梔子

十四枚

大黃

二兩去皮苦寒

小熱之氣涼以和之大熱之氣寒以取之茵陳梔子之苦寒以逐胃燥宜下必宜苦以補必以酸大黃之

苦寒以下瘵熱也

右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二升煮取三升去滓分二服小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿復減黃從小便去也

欽定四庫全書

普濟方

陽明證其人喜忘者必有蓄血所以然者本有久瘵血

故令喜忘屎雖鞭大便反易其色必黑宜抵當湯下之

內經曰血并於下亂而喜忘此下本有久瘵血所以喜忘也津液少大便鞭以蓄血在內屎雖鞭大便反易其

色黑也與抵當以下瘵血也陽明病下之心中懊懣而煩胃中有燥

屎者可攻腹微滿初頭鞭後必澹不可攻之若有燥屎

者宜大承氣湯

下後心中懊懣而煩者虛煩也當與梔子豉湯若胃中有燥屎者非虛煩也可與

大承氣湯下之其腹微滿初鞭後澹是無燥屎此熱不在胃而在上也故不可攻病人不大便

五六日繞臍痛煩躁發作有時燥屎故使不大便也

不大



便六七日者則大便必結為燥也胃中燥實不得下通故繞臍痛煩燥發也 病人煩熱汗出	則解又如瘧狀日晡發熱者屬陽明也脈實者宜下之	脈浮虛者宜發汗下之與大承氣湯發汗宜桂枝湯	陽明證未可便為裏寔審脈候以別內外其脈實者熱已入腑為胃實與大承氣湯下之其脈浮虛者是熱未入腑猶在表也可與桂枝湯發汗則愈	大下後六七日不大便煩不解腹	滿痛者此有燥屎也所以然者有宿食故也宜大承氣	湯 大下之後則胃弱不消穀至六七日不大便則宿食已結不消故使煩熱不解而腹滿痛是知有燥屎也	與大承氣湯 病人小便不利大便乍難乍易時有微熱以下除之	欽定四庫全書 普濟方	喘胃不能卧者有燥屎也宜大承氣湯 小便利大便艱此	利而大便或乍難乍易胃熱者發熱喘胃無時及嗜卧也此燥屎在胃故時有微熱喘胃不得卧也與大承氣	湯以下 燥屎 食穀欲嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反	劇者屬上焦也 上焦主內胃為之主食穀欲嘔者胃不受也與吳茱萸湯以溫胃氣得湯反劇	上焦不內也以治 上焦之法治之	吳茱萸湯方	吳茱萸 一升洗 人參 三兩 生薑 六兩切 大棗 十二枚 擘	甘 濕
--------------------------------------	-----------------------	----------------------	---	---------------	-----------------------	--	----------------------------	------------	-------------------------	--	---------------------------	---------------------------------------	----------------	-------	-------------------------------	-----



內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛吳茱萸生姜之辛以溫之

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三服

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復惡寒不嘔但

心下痞者此以醫下之也如其不汗者病人不惡寒而

渴者此轉屬陽明也小便數大便必鞭不更衣十日無

所苦也渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓

散太陽病脈陽浮陰弱為邪在表今寸緩關浮尺弱氣漸傳裏則發熱汗出復惡寒者表未解也傳經之邪入

裏裏不和也不嘔但心下痞者醫下之早邪氣留于心下也如其不汗者必漸不惡寒而渴太陽之邪轉屬陽

欽定四庫全書

普濟方

明也若吐若下若發汗後小便數大便鞭者當與小承

氣湯和之此不因吐下發汗後小便數大便鞭若是無

滿實雖不更衣十日無所苦也俟津液還胃中小便數

少大便必自出也渴飲水者少少與之以潤胃氣但審

邪氣所在以法救之如脈陽微而汗出少者為自和也

渴不止以五苓散是也脈陽微者邪氣少汗出少者為適當故自和汗出多者反損正氣是汗太

汗出多者為太過也陽脈實因發其汗出多者亦為太過太過為陽絕於

裏亡津液大便因鞭也陽脈實者表熱甚也因發汗乘熱虛蒸津液外泄致汗出太過脈浮而芤浮為陽芤為陰

浮芤相搏胃氣生熱其陽則絕浮芤相搏陰陽不諧胃氣獨治鬱而生熱消燥



<p>津液為其 陽絕也 跌陽脈浮而澁浮則胃氣強澁則小便數浮</p>	<p>澁相搏大便則難其脾為約麻仁丸主之 <small>跌陽者脾胃之脈診浮為陽知</small></p>	<p>為氣強澁為陰知脾為約約者儉約之約又約束之約 內經曰飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸</p>	<p>於肺通調水道下輸於膀胱水精四布五經並行是脾 主為胃行其津液者也今胃強脾弱約未津液不得四</p>	<p>布但輸膀胱致小便數大 便難與脾約丸通腸潤燥</p>	<p>麻仁丸</p>	<p>麻子仁 二升 甘平芍藥 半觔 酸平枳實 半觔炙 苦寒 大黃 一觔去 皮苦寒</p>	<p>厚朴 一觔去 皮苦寒杏仁 去 皮尖熬別 作脂甘溫</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>內經曰脾欲緩急食甘以緩之麻子杏仁之甘緩 脾而潤燥津液不足以酸收之芍藥之酸以斂津 液腸燥胃強以苦泄之枳實厚朴 大黃之苦下燥結而泄胃強也</p>	<p>右六味為末煉蜜為丸桐子大飲服十九日二服漸</p>	<p>加之以知為度</p>	<p>太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也調胃承氣</p>	<p>湯下之 <small>蒸蒸者如熱薰言甚熱也太陽病三日發汗 不解則表邪已罷蒸蒸發熱胃熱為甚與調胃</small></p>	<p>承氣湯 <small>內經曰諸</small></p>	<p>下胃熱傷寒吐後腹脹滿者與調胃承氣湯 <small>腹大皆</small></p>	<p>屬於熱熱在上焦則吐後不解復腹脹滿者 邪熱入胃也與調胃承氣湯下其胃熱 太陽病若吐</p>
---------------------------------------	---	--	--	----------------------------------	------------	--	---	-----------------------	---	-----------------------------	---------------	------------------------------	--	------------------------------------	---	--



若下若發汗微煩小便數大便因鞭者與小承氣湯和

之愈 吐下發汗皆損津液表邪乘虛傳裏大煩者邪在表微煩者邪入裏也小便數大便因鞭者其脾約

也小承氣湯 得病二三日脈弱無太陽柴胡證煩躁心

下鞭至四五日雖能食以小承氣湯少少與微和之令

小安至六日與承氣湯一升若不大便六七日小便少

者雖不能食但初頭鞭後必澹未定成鞭攻之必澹須

小便利屎定鞭乃可攻之宜大承氣湯 針經曰脈軟者病將下弱陰脈

當責邪在裏得病二三日脈弱是日數雖淺而邪氣已入裏也無太陽證為表證已罷無柴胡證為無半表半

欽定四庫全書

普濟方

裏之證煩躁心下鞭者邪氣內甚也胃寔熱甚則不能食胃虛熱至四五日雖能食亦當與小承氣湯微和之至

六日則熱甚與大承氣湯一升不大便六七日小便多者為津液內竭大便必鞭則可下之小便少者則胃中

水穀不別必初鞭後澹雖不能食為胃實以其小便少則未定成鞭亦不可攻須小便利屎定鞭乃可攻之

傷寒六七日凡目中不了了睛不和無表裏證大便難

身微熱者此為實也急下之宜大承氣湯 內經曰諸脈者皆屬於目

傷寒六七日正邪氣入裏之時目中不了了睛不和者邪熱內甚上熏於目也無表裏證大便難者裏實也身

大熱者表熱也微熱者裏熱也針經曰熱病目不明熱不已者死此目中不了了睛不和則證近危惡也須急

與大承氣 湯下之 陽明發熱汗多者急下之宜大承氣湯 邪熱入腑



<p>外發熱汗多者熱迫津液將竭急 與大承氣湯以下其腑中之熱也 發汗不解腹滿痛者</p>	<p>急下之宜大承氣湯 <small>發汗不解邪熱傳入腑而成腹滿痛者傳之迅也是須急下之腹</small></p>	<p>滿不減減不足言不當下之宜大承氣湯 <small>腹滿不減邪氣實也經曰</small></p>	<p><small>大滿大實自可除之大承氣湯下其滿實若腹滿時減非內實也則不可下金匱要略曰腹滿時減復如故此</small></p>	<p><small>為寒當與溫藥</small> 陽明少陽合病必下利其脈不負者順</p>	<p>也負者失也互相尅賊名為負也脈滑而數者有宿食</p>	<p>也當下之宜大承氣湯 <small>陽明上少陽水二經合病氣不相敵則必下利少陽脈不勝陽</small></p>	<p><small>明不負是不相尅為順也若少陽脈勝陽明脈負者是鬼賊相尅為正氣失也脈經曰脈滑者為病實也又曰</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p><small>滑數則胃氣實下利者脈當微厥冷脈滑數知胃有宿食大承氣湯以下除之</small> 病人無表裏證</p>	<p>發熱七八日雖脈浮數者可下之假令已下脈數不解</p>	<p>合熱則消穀善飢至六七日不大便者有瘀血宜抵當</p>	<p>湯 <small>七八日邪入腑之時病人無表裏證但發熱雖脈浮數亦可與大承氣湯下之浮為熱客于氣數為熱客於</small></p>	<p><small>血下之邪熱去而其浮數之脈俱當解若下後數脈去而脈但浮則是榮血間熱併於胃氣間也當為邪氣獨</small></p>	<p><small>留心中則飢邪熱不殺穀潮熱發渴之證此下之後浮脈去而數不解則是胃氣間熱合於榮血間也熱氣合</small></p>	<p><small>併迫血下行胃虛協熱消穀喜飢血至下焦若大便利者下血乃愈若六七日不大便則血不得行蓄積於下</small></p>	<p><small>為瘀血與抵當</small> 若脈數不解而下不止必脇熱而便濃</p>	<p><small>湯以下去之</small></p>
--	---	--	--	---	-------------------------------------	---	--	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	---	-----------------------------



血也下後脈數不解而大便者是熱不得泄蓄血於下
得下泄迫血下傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒
行必便濃血要金匱

濕在裏不解故也以為不可下當於寒濕中求之要金匱

曰黃家所起從濕得之汗出熱去則不能發黃發汗已
身目為黃者風氣去濕氣在也脾惡濕濕氣內着脾色
外奪者身目為黃若瘀血在裏發黃者則可下
所以寒濕在裏故不可下當從寒濕法治之 傷寒七八

日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之

當熱甚之時身黃如橘子色是熱毒發泄於外內經曰
膀胱者津液藏焉氣化則能出小便不利小腹滿者熱

氣甚於外而津液不得下行也 傷寒身黃發熱者梔子
與茵陳湯利小便退黃逐熱

欽定四庫全書

普濟方

藥皮湯主之

傷寒身黃胃有瘀熱當須下去之此以
發熱為熱未實與梔子藥皮湯解散之

夫傷寒二日陽明受病陽明病熱者胃中寒宜桂枝湯

太陽病而發汗汗雖出復不解者轉屬陽明也宜麻黃

湯陽明病若小便少者津液當還入胃中故也凡發汗

太過故令大小便難若陽明病當心下緊滿不可汗太

過宜半夏湯

陽明病若汗出多而微惡寒為外未解無潮熱不可與

承氣湯也若復大便難可與小承氣湯和其胃氣勿令



下多

陽明病脇下堅滿大便閉而嘔口燥宜柴胡湯

陽明病脈實者當下脈浮虛者當汗下者宜承氣湯汗

者宜桂枝湯

陽明病發作有時汗不解腹滿痛宜承氣湯

陽明病脈浮發熱無汗表不解渴欲飲水宜白虎湯

梔子蘘皮湯方

梔子 十五個 苦寒
甘草 一兩 甘平
黃蘘 二兩

欽定四庫全書 普濟方

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

傷寒瘵熱在裏身必發黃麻黃黃連軹赤小豆湯主之

濕熱相交民多病瘵瘵黃也傷寒為寒濕在表發黃為瘵熱在裏與麻黃黃連軹赤小豆湯除熱散濕

麻黃黃連軹赤小豆湯方

麻黃 二兩 甘
赤小豆 一升 甘平
連軹 二兩 連翹根也 苦寒
大棗 二十枚 甘

杏仁 四十個 甘
生梓白皮 一升 苦寒
生薑 二兩 辛 溫切

甘草

內經曰濕上甚而熱治以甘溫佐以甘平以汗為度正此之謂也又煎用潦水者亦取其水味薄故不



助濕
氣也

已上八味以潦水一斗先煮麻黃再拂去上沫內諸

藥煮取三升分溫三服半日服盡

辨少陽病脈證并治第九

少陽之病口苦咽乾目眩也

足少陽膽經也內經曰有病口苦者名曰膽痺甲乙

經曰膽者中精之腑五臟取決於膽咽為之使少陽之脈起於目銳眥少陽受邪故口苦咽乾目眩

中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下

則悸而驚

少陽之脈起於目眥走於耳中其支者下胸中貫膈風傷氣壅則為熱少陽中風氣壅而

欽定四庫全書

普濟方

熱故耳聾目赤胸滿而煩邪在少陽為半表半裏以吐除煩吐則傷氣氣虛者悸以下除滿下則亡血血虛者驚

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譫

語此屬胃胃和則愈胃不和則煩悸

經曰三部俱弦者少陽受病脈細者

邪漸傳裏雖頭痛發熱為表未解以邪客少陽為半在表半在裏則不可發汗發汗主津液胃中乾燥少陽之

邪因傳入胃必發譫語當與調胃承氣湯煎服而下之胃和則愈不下則胃為少陽木邪干故煩悸

本太陽病不解轉入少陽者脇下鞭滿乾嘔不能食往

來寒熱尚未吐下脈沉緊者與小柴胡湯

太陽轉入少陽是表邪入

於裏脇下鞭滿不能食往來寒熱者邪在半表半裏之間若已經吐下脈沉緊者邪陷入腑為裏實未可吐下



而脈沉緊為傳裏雖深未全入腑外邪
猶未解也與小柴胡湯以和解之
若已吐下發汗溫

鍼譏語柴胡湯證罷此為壞病知犯何逆以法治之
少陽

之邪在表裏之間若妄吐下發汗溫鍼損耗津液胃中
乾燥木邪干胃必發譏語若柴胡湯證不罷者則不為

逆柴胡湯證罷者壞病也詳
其因何治之逆以法救之
三陽合病脈浮大上關上

但欲眠睡目合則汗
關脈以候夫少陽之氣太陽之脈
浮陽明之脈大脈浮上關上知三

陽合病膽熱則睡少陰症眠睡目合則無汗以陰不得
有汗但欲眠睡目合則汗知二陽合病膽有熱也
傷

寒六七日無大熱其人躁煩者此為陽去入陰故也
表

陽裏為陰邪在于表則外有熱六七日邪
氣入裏內熱有躁煩者表邪傳于裏也
傷寒至四日

欽定四庫全書

普濟方

三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰

不受邪也
傷寒四日表邪傳裏裏不和則不能食而嘔
今反能食而不嘔是邪不傳陰但在陽也

傷寒三日少陽脈小者欲已也
內經曰大則邪至小則
平傷寒三日邪傳少陽

脈當弦緊今脈小
者邪氣欲已也
少陽病欲解時從寅至辰上
內經曰
陽中之

少陽通於春氣寅卯
辰少陽木生之時

辨論太陰脈證并治第十

太陰脈之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛

若下之必胸下結鞭
太陰為病邪傳裏也太陰之脈布
胃中邪氣壅而為腸滿上不得降



<p>者嘔吐而食不下不得上者自利益其時腹自痛陰 寒在內而為腹痛者則為常痛此陽邪卜裏雖痛而亦 不常痛但時時腹自痛也若下之則陰邪留於 胸下為結鞭經曰病發於陰而反下之因作痞 太陰中</p>	<p>風四肢煩疼陽微陰澁而長者為欲愈 <small>太陰脾也主榮 四末太陰中風</small></p>	<p><small>四肢煩疼者風淫末疾也表邪少則微裏向和則澁而 長長者陽也陰病見陽脈則生以陰得陽則解故云欲 愈</small></p>	<p>太陰病欲解時從亥至丑上 <small>脾為陰主土於亥 子向陽故云解時</small> 太陰</p>	<p>病脈浮者可發汗宜桂枝湯 <small>經曰浮為在表沉為在裏 太陰病脈之浮者邪在經</small></p>	<p><small>也故當 汗散之</small> 自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之</p>	<p>宜四逆湯輩 <small>自利而渴者屬少陰為寒在下焦自利不 渴者屬太陰為寒在中焦與四逆等湯以</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>濕</small> 之傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身</p>	<p>黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日</p>	<p>十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也 <small>太陰病七八 日大便鞭者</small></p>	<p><small>為太陰入腑傳於陽明也至七八日暴煩下利十餘行 脾實腐穢去也下利煩燥者死此以脾氣和逐邪下泄 故雖暴煩下利日 十餘行而利自止</small></p>	<p>本太陽病醫反下之因而腹滿痛者屬太陰也桂枝加</p>	<p>芍藥湯主之 <small>表邪未罷反下之邪因乘虛傳於太陰裏 氣不和故腹滿時痛與桂枝湯以解表加</small></p>	<p>芍藥以 太實痛者桂枝加大黃湯主之 <small>太實大滿自可 除下之故加大</small></p>	<p>和裏</p>
--	---	---	--	---	--	--	-----------------------	---	------------------------------	--	---	------------------------------	---	---	-----------



黃以下
太實 太陰為病脈弱其人續自便利設當行大黃芍

藥者宜減之以其人胃氣弱易動故也腹滿痛者太陽病也脈弱其人

續自便利則邪雖在裏未成太實欲與大黃芍藥 夫傷

攻滿痛者宜少與之以胃氣尚弱易為動故也

寒四日太陰受病腹滿吐食下之益甚時時腹痛心胸

堅滿若脈浮者可發其汗沉者宜攻其裏也發汗者宜

桂枝湯攻裏者宜承氣湯

太陰病不解者雖不暴煩下利十餘行而自止所以自止

者脾家實腐穢已去故也宜橘皮湯

欽定四庫全書 普濟方

辨少陰病脈證并治第十一

少陰病脈微細但欲寐也少陰為病脈微細為邪氣傳

於陰則寐邪傳於少陰則氣行 少陰病欲吐不吐心煩

於陰而不行於陽故但欲寐

但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救

若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有

寒不能制水故令白色也欲吐不吐心煩者表邪傳裏

也 欲寐則知屬少陰五六日邪傳少陰之時自利不渴者

寒在中焦屬太陰此自利而渴為寒在下焦屬少陰腎

虛水燥渴欲引水自救下焦虛寒不能制水小便色白

也經曰下利欲飲水者內有熱故也此下利雖渴然以



小便色自明非裏 熱不可不察也 病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也	此屬少陰法當咽痛而復吐利 <small>脈陰陽俱緊為少陰寒法當無汗反汗出者陽</small>	虛不固也故云亡陽亡陽之症是屬少陰內經曰客邪 少陰之絡令人噤痛不可內食少陰寒甚是當咽痛而	腹吐 利 少陰病欬而下利譟語者被火氣劫故也小便必	難以強責少陰汗也 <small>欬而下利裏寒而亡津液也反以火劫強責少陰汗者津液內竭火氣</small>	煩之故譟語 小便難也 少陰病脈細沉數病為在裏不可發汗 <small>少</small>	病始得之反發熱脈浮者為邪在經可與麻黃附子細 辛湯發汗此少陰病脈細沉數為病在裏故不可發汗	少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱瀋者	欽定四庫全書 普濟方	復不可下之 <small>脈微為亡陽表虛不可發汗脈弱瀋為亡陽裏虛復不可下</small> 少陰病脈	緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈緊反去者為	欲解也雖煩下利必自愈 <small>少陰病脈緊者寒甚也至七八日傳經盡欲解之時自下</small>	利脈暴微者寒氣得泄也若陰寒勝正陽虛而泄者則 手足厥而脈緊不去今手足反溫脈緊反去知陽氣復	寒氣去故為欲解下利煩躁者逆 此正勝邪微雖煩下利必自止 少陽病下利若利自	止惡寒而蹇卧手足溫者可治 <small>少陽病下利惡寒蹇卧寒極而陰甚也利自止</small>	手足溫者裏和陽氣 得復故為可治也 少陰病惡寒而蹇時自煩欲去衣	被者可治 <small>惡寒而蹇陰寒甚也時時自煩躁欲去衣被為陽氣得復故云可治</small> 少陰中風
-------------------------------------	---	--	-----------------------------	--	---	--	-----------------------	---------------	--	-----------------------	---	--	--	---	-----------------------------------	--



<p>脈陽微陰浮法為欲愈</p> <p><small>少陰中風陽脈當浮而陰脈微者表邪緩也陰脈當沉而陰脈</small></p>	<p>浮者裏氣和也陽中有陰陰</p> <p><small>中有陽陰陽調和故為欲愈</small></p>	<p>少陰病欲解時從子至寅</p> <p><small>上陽生於子子生一陽丑為二陽寅為三陽少陰解於此者得陽則解也</small></p>	<p>少陰病吐利</p> <p><small>上陽生於子子生一陽丑為二陽寅為三陽少陰解於此者得陽則解也</small></p>	<p>手足不逆冷反發熱者不死脈不至者灸少陰七壯</p> <p><small>經曰少陰病吐利手足不逆冷者則陽氣不衰雖反發熱不死脈不至者吐利暴虛也灸少陰七壯</small></p>	<p>病吐利燥煩四逆者死吐利手足不厥冷者則陽氣不衰雖反發熱不死脈不至者吐利暴虛也灸少陰七壯</p> <p><small>衰雖反發熱不死脈不至者吐利暴虛也灸少陰七壯</small></p>	<p>以通少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必</p> <p><small>其脈</small></p>	<p>便血也</p> <p><small>膀胱太陽也少陰太陽為表裏少陰病至八九日寒邪變熱腹傳太陽太陽為諸陽主氣熱在</small></p>	<p>太陽故一身手足盡熱太陽經多血少</p> <p><small>氣為熱所乘則血散下行必便血也</small></p>	<p>少陽病但厥無</p> <p><small>欽定四庫全書 普濟方</small></p>	<p>汗而強發之者必動其血未知從何道出或從口鼻或</p> <p><small>從目出是名下厥上竭為難治</small></p>	<p>但厥無汗熱行入於裏也</p> <p><small>而強發汗虛其經絡熱乘</small></p>	<p>經虛迫血妄行從虛而出或從口鼻或從目出諸厥者</p> <p><small>皆屬於下但厥血亡於上為上之竭傷氣損血邪甚正</small></p>	<p>虛故為</p> <p><small>難治</small></p>	<p>少陰病惡寒身踈而利手足逆冷者不治</p> <p><small>針經曰多</small></p>	<p>熱者易已多寒者難治此內外</p> <p><small>寒極純陰無陽故云不治也</small></p>	<p>少陰病吐利躁煩四逆</p> <p><small>者死也四逆惡寒而身倦則寒甚脈不至則真氣絕煩熱</small></p>	<p>者死</p> <p><small>四逆惡寒而身倦則寒甚脈不至則真氣絕煩熱</small></p>	<p>者死</p> <p><small>四逆惡寒而身倦則寒甚脈不至則真氣絕煩熱</small></p>
---	--	--	---	--	---	---	---	---	--	---	--	--	-------------------------------------	--	---	---	---	---



<p>沉但欲卧汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不</p>	<p>得卧寐者死<small>陰氣方盛至五六日傳經盡陽氣得復則愈反更自利煩躁不得卧寐則正氣弱陽</small></p>	<p>不得復病<small>勝藏故死</small>少陰病始得之反發熱脈覺沉者麻黃附子</p>	<p>細辛湯主之<small>少陰病當無熱惡寒反發熱者邪在表中雖脈沉以始得而邪氣未深亦當溫劑發</small></p>	<p>汗以散之</p>	<p>麻黃附子細辛湯方</p>	<p>麻黃<small>二兩去節</small>甘熱<small>二兩</small>細辛<small>二兩</small>附子<small>一枚炮去皮</small></p>	<p><small>內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛故用麻黃之甘以解少陰之寒細辛附子之辛以溫少陰之</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮</p>	<p>取三升去滓溫服一升日三服</p>	<p>少陰得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日</p>	<p>無裏証故微發汗也<small>二三日邪未深也既無吐利厥逆諸裏證則可與麻黃附子甘草湯微汗</small></p>	<p>以散之</p>	<p>麻黃附子甘草湯方</p>	<p>麻黃<small>二兩去節</small>甘草<small>二兩</small>附子<small>一枚炮</small></p>
------------------------------	---	---	---	-------------	-----------------	--	--	-----------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------------	--	------------	-----------------	---



麻黃甘草之甘以散表
寒附子之辛以溫寒氣

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥

煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧黃連阿膠湯

主之 脈經曰風傷陽寒傷陰少陰受病則得之於寒二
三日已上寒極變熱之時熱煩於內心中煩不得

卧也與黃連阿膠
湯扶陰散熱邪

黃連阿膠湯方

黃連 四兩 苦寒
黃芩 一兩 苦寒
芍藥 二兩 酸平
鷄子黃 二枚 甘溫
阿膠

欽定四庫全書

普濟方

二兩
甘溫

陽有餘以苦除之黃芩黃連之苦以除熱陰不足
以甘補之雞黃阿膠之甘以補血酸收也泄也芍藥
之酸收陰氣
而泄邪熱

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烱盡

少冷內雞子黃攪合相得溫服七合三服

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子

湯主之 少陰客熱則口燥舌乾而渴口中和者不苦不
燥是無熱也背為陽背惡寒者陽氣弱陰勝也

經曰無熱惡寒者發於陰也灸之
助陽消陰與附子湯溫經散寒



附子湯方

附子 二枚破八片
去皮辛熱 茯苓 三兩
人參 三兩
白朮 四兩
甘 溫

芍藥 三兩
酸平

辛以散之附子之辛以散寒甘以緩之茯苓人參白朮之甘以補陽酸以收之芍藥之酸以扶陰所以然者偏除偏陽則為病火欲實水當平之不欲偏勝也

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之

腎水而主骨節身體疼痛肢冷手足寒脈沉故當與附子湯溫經

欽定四庫全書

普濟方

桃花湯方

赤石脂 一觔一半全用
一半為末甘溫 乾薑 一兩
辛熱 粳米 一升
甘平

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內赤石

脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服

少陰病二三日至四五日腹滿小便不利下利不止便

膿血者桃花湯主之 二三日以至四五日寒邪入裏深也腹痛者裏寒也小便不利者水

穀不別也下利不止便膿血者腸胃虛弱下焦不固也與桃花湯固腸止利也

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之 吐利



手足厥冷則陰寒氣甚煩躁欲死者
陽氣內爭與吳茱萸湯助陽散寒

少陰病下痢咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之

少陽之脈從腎上貫

於肝膈入肺中則循喉嚨其支別者從肺出絡心注胸中邪自陽經傳於少陰陽虛客熱下利咽痛胸滿心煩也與猪膚湯調陰散熱

猪膚湯方

猪膚 一觔
甘寒

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉

五合熬香和相得溫分六服

欽定四庫全書

普濟方

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗湯

陽邪傳與少陰邪熱為咽痛服甘草湯則差若寒熱相傳為咽痛者服甘草湯若不差與桔梗湯以和少陰之氣

甘草湯方

甘草 二兩

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七合日二

服

桔梗湯方



桔梗 一兩 辛
甘草 二兩 甘平
桔梗 辛溫 以散寒 甘草 味甘平
以除熱 甘溫 相合 以調寒熱

右二味以水三升煮取一升去滓分溫再服

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

凡熱傷於絡則經絡乾燥使咽中傷生瘡不能語言聲不能出與苦酒湯以解絡熱愈咽痛

苦酒湯方

半夏 洗破如棗核大 十四枚 辛溫
鷄子 一枚 去黃內上 苦
着鷄子殼中 甘微寒

右二味內半夏着苦酒中以鷄子殼置刀環中安火

欽定四庫全書

普濟方

上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

甘草湯主少陰客熱 咽痛 桔梗湯主少陰寒

熱相搏痛半夏散及湯 主少陰客熱咽痛也

半夏散及湯方

半夏 洗 辛溫
桂枝 去皮 辛熱
甘草 炙 甘平 以上各等分

已上三味各別搗篩已合治之白飲和服方寸匕日

三服若不能散服者以水一升煎七沸內散用一兩

更煎三沸下火令少冷嚥之



少陰病下利白通湯主之少陰者主水也少陰客寒不能制水故自利也白通湯温

白通湯方

葱白四辛 乾薑一兩 附子一枚生用去皮

內經曰腎苦燥急食辛以潤之葱白之辛以通陽氣生薑附子之辛以散陰寒

右三味以水三升煮取一升去滓分温再服

少陰病下利脈微者與白通湯利不止厥逆無脈乾嘔煩

者白通加猪膽汁湯主之服湯脈暴出者死微續者生

欽定四庫全書

普濟方

少陰病下利脈微為寒極陰勝與白通湯復陽散寒服湯利不止厥逆無脈乾嘔煩者寒氣太甚內為格拒陽氣逆亂也與白通湯和猪膽汁湯以和之內經曰逆而從之從而逆之又曰逆者正治從者反治此之謂也服湯脈暴出者正氣因發泄而脫也故死微續者陽氣漸復也故生

白通加猪膽汁方

葱白四 乾薑一兩 附子一枚生去 人尿五合 猪膽汁

一合

內經曰苦調寒熱之逆冷熱必行則熱物冷服下嗌之後冷體既消熱性便發由是病氣隨愈嘔噦皆除情且不違而致大益此和人尿猪膽汁鹹苦寒物於白通湯熱劑中要其氣相從則可以去格



拒之
寒也

已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁人尿
和令相得分溫再服若無膽汁亦可用

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉

重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便利或

下利或嘔者真武湯主之

少陰病二三日則邪氣猶淺至四五日邪氣已深腎主水

腎病不能制水水飲停為水氣腹痛者寒濕內甚也四肢沉重疼痛寒濕外甚也小便不利自下利者濕勝而

水氣不別也內經曰濕勝則濡泄真武湯益陽氣散寒濕

欽定四庫全書

普濟方

真武湯方

茯苓

二兩 甘平

芍藥

三兩 酸平

附子

二枚 炮去皮 破八片 辛熱

生薑

三兩 辛溫

白朮

二兩 甘溫

脾惡濕甘先入脾茯苓白朮之甘以益脾逐水寒淫所勝平以辛熱濕淫所勝佐以酸平附子芍藥

生薑之酸辛 溫經散濕

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合三日服

後加減法若欬者加五味子半升細辛乾薑各一兩

氣逆欬者五味子之酸以收逆氣水寒相搏則欬細辛乾薑之辛以散水寒 若小便利者



<p>去茯苓 <small>小便利則無伏</small> 若下利者去芍藥加乾薑二</p>	<p>兩 <small>芍藥之酸泄氣</small> 乾薑之辛散寒 若嘔者去附子加生薑前成半觔</p>	<p><small>氣逆則嘔附子補氣生薑散氣千金</small> 曰凡嘔家多服生薑此為嘔家聖藥</p>	<p>少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反</p>	<p>不惡寒其人面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈</p>	<p>不出者通脈四逆湯主之 <small>下利清穀手足厥逆脈微欲絕為裏寒身熱不惡寒面色</small></p>	<p><small>赤為外熱此陰甚於內陽格于外不相通也與通脈四逆湯散寒通陽氣</small></p>	<p>通脈四逆湯方</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>甘草 <small>二兩</small> 附子 <small>大者一枚生用</small> 乾薑 <small>三兩強人</small></p>	<p>右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服其</p>	<p>脈即出者愈面色赤者加葱玖條 <small>葱味辛以通陽氣</small> 腹中痛</p>	<p>者去葱加芍藥二兩 <small>芍藥之酸通氣利腹</small> 嘔者加生</p>	<p>薑二兩 <small>辛以散之嘔</small> 咽痛者去芍藥加桔梗一兩 <small>咽</small></p>	<p><small>痛加桔梗</small> 利止脈不出者去桔梗加人參二兩 <small>利止</small></p>	<p><small>則能散之</small> 四逆加人參湯主之脈病皆與方相應乃可服之</p>	<p>少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或</p>
--	---	---	------------------------------	------------------------------	---	--	---------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---	--	--	---	--	------------------------------



泄利下重者四逆散主之四逆者四肢不溫也傷寒邪在三陽則手足必熱傳到太陰手足自溫至少陰則熱邪漸深故四肢逆而不溫也及至厥陰手足厥冷是又其於逆四逆散宣傳陰之熱也

四逆散方

甘草炙甘平枳實破水漬炙乾苦寒柴胡苦寒芍藥

內經曰熱淫於內佐以甘苦以酸收之以苦發之枳實甘草之甘苦以泄裏熱芍藥之酸以收陰氣柴胡之苦以發表熱

右四味各分搗篩白飲和服方寸匕日三服效者加

五味子乾薑各五分并主下痢肺寒氣逆則效五味子之酸收逆氣乾薑

欽定四庫全書

普濟方

之辛散肺寒并主下痢者肺與大腸為表裏上效下痢治則頗同悸者加桂枝五分

茯苓味甘而淡用以滲泄腹中痛者加附子一枚炮令坼裏虛遇邪則痛

以補虛泄利下重者先以水五升煮薤白三升煮取

三升去滓以散三方寸匙內湯煮取一升半分溫再

服泄利下重者下焦氣滯也加薤白以泄氣滯

少陰病下利六七日效而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯

主之下利不渴者裏寒也經曰自利不渴者屬太陰以其藏寒故也此下利嘔渴知非虛寒心煩不得眠

知協熱也與猪苓湯滲泄小便此之謂歟少陰病得之二



<p>三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯</p> <p><small>傷寒傳經五六日邪傳少陰則</small></p>	<p>口燥舌乾而渴為邪漸深也今少陰病得之二三日邪氣未深入之時便作口燥咽乾者是邪熱已甚腎水乾也急與大承氣湯</p>	<p>下之以全腎也 少陰病自利清水色純青心下必痛</p>	<p>口乾燥者急下之宜大承氣湯</p> <p><small>少陰腎水也青肝色也自利色青為肝邪乘腎</small></p>	<p>難經曰從前來者為實邪以腎蘊實邪必心下痛口乾燥也與大承氣湯以下實邪</p>	<p>日腹脹大不便者急下之宜大承氣湯</p> <p><small>此少陰入府也六七日少陰之</small></p>	<p>邪入府之時陽明內熱壅甚腹滿不大便也陽明病土勝腎水則乾急與大承氣湯下之以救腎水</p>	<p>病脈沉者急溫之宜四逆湯</p> <p><small>既吐且利小便復利而大便汗出下利清水內寒外熱</small></p>	<p>欽定四庫全書</p> <p><small>普濟方</small></p>	<p>脈微欲絕者不云急溫此少陰病脈沉而云急溫者彼雖寒甚然而證已形見於外治之則有成法此初頭脈沉未有形證不知邪氣所之將</p>	<p>發何病是急與四逆湯溫之 少陰病飲食入口則吐</p>	<p>心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者胸中實不可下也當吐之若膈上寒飲乾嘔者不可吐也急</p>	<p>溫之宜四逆湯</p> <p><small>傷寒表邪傳裏至于少陰少陰之脈從肺出絡心注於胸中邪既留於胸中而</small></p>	<p>不散者飲食入口則吐心中溫溫欲吐陽受氣於胸中邪既留於胸中則陽氣不得宣發於外是以始得之手</p>	<p>足寒脈弦遲此是胸中實不可下而當吐其膈上有寒飲亦使人心溫溫而手足寒吐則物不出吐</p>	<p>與嘔別焉胸中實則吐而物出若膈上有寒飲則但乾嘔而不吐也此不可吐可與四逆湯以溫其膈也</p>
---	--	------------------------------	--	---	---	---	--	---	---	------------------------------	--	--	---	---	---



陰病下利脈微澁嘔而汗出必數更衣反少者當溫其上灸之脈微為亡陽澁為亡血下利嘔而汗出亡陽亡血也津液不足裏有虛有寒必數更衣反少者溫其上以助其陽也灸之以消其陰少陰病身體痛手足寒脈沉者宜四逆湯

辨厥陰病脈證并治第十二

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食食則

吐虵下之利不止邪傳厥陰則熱已深也邪自太陽傳至少陰者口燥咽乾而渴未成消也至厥陰成消渴者熱甚能消水故也飲水多而小便少者謂知消渴木生

欽定四庫全書

普濟方

於火肝氣通心厥陰容熱陰氣上撞心中疼熱傷寒六日厥陰受病之時為傳經盡則當入腑胃氣虛容熱飢不欲食虵在胃中無食則動聞食嗅而出得食吐虵此熱在厥陰經也若便下之虛其胃氣厥陰木邪相乘必吐下厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈經曰陰病見陽脈而

生浮者陽也厥陰中風脈微浮邪氣還表向汗之時故云欲愈厥陰病欲解時從丑至

卯上邪至厥陰為傳經盡欲厥陰本也厥陰病渴欲飲

水者少少與之愈邪至厥陰為傳經盡欲汗之時渴欲得水者少少與之胃氣得潤則愈

諸四逆厥者不可下之虛家亦然四逆者四肢不溫也厥者手足冷也皆陽

為重虛金匱玉函曰虛者十補勿瀉之也傷寒先厥



後發熱而利者必自止見厥復利陽氣勝則厥逆而利

自止見厥則陰氣還勝而復利也傷寒始發熱六日厥反九日而利凡厥

利者當不能食今反能食者恐為除中食以素餅不發

熱者知胃氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後三日

脈之其熱續在者期之旦日夜半愈所以然者本發熱

六日厥反九日復發熱三日并前六日亦為九日與厥

相應故期之旦日夜半愈後三日脈之而脈數其熱不

罷者此為熱氣有餘必發癰膿也始發熱邪在表也至六日邪傳厥陰陰氣勝

欽定四庫全書普濟方

者作厥而利厥反九日陰寒氣多當不能食而反能食

者恐為除中除去也中胃氣也言邪氣大甚除去胃氣

欲飲食自救故暴能食此欲勝也食以素餅試之若胃氣

絕得麵則必發熱而不發熱者胃氣尚在也恐是寒極

變熱因暴熱來而復去使之能食非除中也金匱要略

曰病人素不能食而反暴思之必發熱後三日脈之其

熱續在陽氣勝也期之旦日夜半而愈若旦日不愈後

三日脈數而熱不罷者為熱氣有餘必發癰膿經曰數

脈不時則傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲

為寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當不能食此名

除中必死傷寒脈遲六七日為寒氣已深反與黃芩湯

寒藥兩寒相傳腹中當冷冷不消穀則不能

食反能食者除中也四時皆以傷寒先厥後發熱下利



必自止而反汗出咽中痛者其候為痺發熱無汗而

利必自止若不止必便膿血便膿血者其候不痺傷寒先厥

而利陰寒氣勝也寒極而變熱後發熱下利必自止而反汗出咽中痛其候為痺者熱氣上行也發熱無汗而

利必自止利不止便膿血者熱氣不行也熱氣下而不止其候亦不痺也傷寒一二日至四

五日而厥者必發熱前熱後厥厥深者熱亦深厥微者熱

亦微應下之而反發汗者必口傷爛赤前厥後發熱者寒極生熱也前

熱後厥者陽氣內陷也厥深熱深厥微熱微隨陷之深淺也熱深必須下洩之反發汗者引熱上行必口傷爛

赤內經曰火氣內發上為口糜傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復

欽定四庫全書

普濟方

厥不厥者自愈厥終不過五日故知自愈陰勝則厥陽勝則熱先厥五日為陰

勝至六日陽復勝熱亦五日後復厥者陰復勝若不厥為陽全勝故自愈經曰發熱四日厥反三日復熱四日

厥少熱多其病為愈凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足

逆冷是也手三陰三陽接於手十指足之三陰三陽接於足十指陽氣內陷陽不與陰相順接故手足

為之厥冷也傷寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安

時者此為藏厥非為蟄厥也蟄厥者其人當吐虵令病

者靜而復時煩此則為藏寒虵上入膈故煩須臾復止

得食而嘔又煩者虵聞食臭出其人當自吐虵虵厥者



烏梅圓主之又主久利方
藏厥者死陽氣絕也虵厥雖厥而躁無暫安時也病人藏寒胃虛虵動上膈聞食臭出因而吐虵烏梅圓溫藏安蟲即愈

烏梅圓方

烏梅 三百個 味酸溫
細辛 六兩 辛熱
乾薑 十兩 溫辛熱
黃連 一觔 苦寒
當歸 四兩 辛溫
附子 六兩 辛熱
蜀椒 四兩 汗辛熱
桂枝 六兩 辛熱
人參 六兩

甘黃蘗 六兩 苦寒
肺主氣肺欲收急食酸以收之烏梅之酸以收陽氣脾氣欲緩急食甘以緩之人參之甘以緩脾氣寒淫於內以辛潤之以苦堅之當歸桂枝細辛之辛以潤內寒寒淫所勝平以辛熱薑附之辛熱以

欽定四庫全書

普濟方

勝寒虵得甘則動得苦則安黃連黃蘗之苦以安虵

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得內白中與蜜杵二千下圓如梧桐子大先食飲服十圓日三服稍加至二十圓禁生冷滑物臭物等

傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便利

色白者此熱除也欲食得其病為愈若厥而嘔胸脇煩

滿者其後必便血
指頭寒者是厥微熱少也默默不欲食煩躁者邪熱初傳裏也數日之後



其人汗出不止者死有陰無陽故也傷寒至七日為邪正爭之時正勝則生

邪勝則死始不下利而暴忽發熱下利傷寒五六日不

汗出不止者邪氣勝正陽氣脫也故死傷寒五六

結胸腹濡脈虛復厥者不可下此為亡血下之死傷寒五六

日邪氣當作裏實之時若不結胸而腹濡者裏無熱也傷寒五六

脈虛者亡血也復厥者陽氣少也不可下下之為裏虛傷寒五六

故死金匱玉函曰虛發熱而厥七日下利者為難治發熱

者重瀉直氣乃絕發熱而厥七日下利者為難治

而厥邪傳裏也至七日傳經盡則正氣勝邪當傷寒脈

汗出而解反下利則邪氣勝裏氣虛則為難治傷寒脈

促手足厥逆者可灸之脈促則為陽虛不相續厥則為

傷寒脈滑而厥者裏有熱也白虎湯主之滑為陽厥氣

也與白虎湯內陷是裏熱

以散裏熱也手足厥寒脈細欲絕者當歸四逆湯主之普濟方

手足厥寒者陽外虛不溫四肢脈細欲絕者陰普濟方

血內弱脈行不利當歸四逆湯助陽生陰也普濟方

當歸四逆湯方
當歸 三兩 桂枝 三兩 芍藥 三兩 細辛 三兩 大棗 十二
五個 甘草 三兩 炙 通草 三兩
甘溫 甘草 甘平
內經曰脈者血之府也諸血者皆屬心通脈者必
先補心益血苦先入於心當歸之苦以助心血心
苦緩急食酸以收之大棗
甘草通草之甘以緩陰血



若其人內有以寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主

之茱萸辛溫以散久寒生薑辛溫以行陽氣大汗出熱不去內拘急四肢疼

又下利厥而惡寒者四逆湯主之大汗出則熱當去熱反不去者亡陽也內

拘急下利者寒甚於裏四肢疼逆而惡寒者寒甚於表與四逆湯復陽散寒大汗若大下利

而厥冷者四逆湯主之大汗若大下利內外雖殊其亡津液損陽氣則一也陽虛陰勝

故生厥逆與四逆湯固陽退陰病人手足厥冷脈乍緊者邪結在胸中

心中滿而煩饑不能食者病在胸中當須吐之宜瓜蒂

散手足厥冷者邪氣內陷也脈緊牢者為實邪氣入府則脈沉今脈乍緊知邪結在胸中為實故心下滿飽

欽定四庫全書普濟方而煩胃中無邪則喜饑以病在胸中雖饑而不能食與瓜蒂散以吐胸中之邪傷寒厥而心下

悸者宜先治水當服茯苓甘草湯却治其厥不汨水漬

入胃必作利也金匱要略以為水停心下甚者則悸厥雖寒勝然以心下悸為水飲內甚先與

茯苓甘草湯治其水而後治其厥若先治厥則水飲漫漬入胃必作下利傷寒六七日大下

後寸脈沉而遲手足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿

血泄利不止者為難治麻黃升麻湯主之傷寒六七日邪傳厥陰之

時大下之後下焦氣虛陽氣內陷寸脈遲而手足厥逆

下部脈不至厥陰之脈本貫膈上注肺循咽喉厥陰隨



故得之若泄利不止者為裏氣虛故云
難治與麻黃升麻湯以調肺肝之氣

麻黃升麻湯方

麻黃 二兩半 去節 甘溫
升麻 一兩二 分 甘溫
當歸 一兩 辛溫
知母 一兩 苦寒

黃芩 寒苦
萎蕤 十八 甘平 各 銖
石膏 碎綿裹 甘寒
白朮 溫甘
乾薑 熱辛

芍藥 平酸
天門冬 去辛 甘平
桂枝 熱辛
茯苓 平甘
甘草 各十 銖

玉函曰大熱之氣寒以取之甚熱之氣以汗發之
麻黃升麻之甘以發浮熱正氣虛者以辛潤之當

歸桂薑之辛以散寒上熱者以苦泄之知母黃芩
苦涼心去熱津液少者以甘潤之茯苓白朮之甘

緩脾生津液肺燥氣熱以酸收之以甘緩之芍藥
之酸以斂逆氣萎蕤門冬石膏甘草之甘潤肺除

欽定四庫全書

普濟方

熱

右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫內諸

藥煮取三升去滓分溫三服相去如炊三斗米頃令

盡汗出愈

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣少腹者此欲自利也

傷寒四五日邪氣傳裏之時腹中痛轉氣下
趣少腹者裏虛過寒寒氣下行欲作自利也 傷寒本自

寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑

黃連黃芩人參湯主之
傷寒邪自傳表為本自寒下醫
反吐下損傷正氣寒氣內格拒



格 經曰格則吐逆食入口即吐謂之寒格更復吐下則重
虛而死是更逆吐下與乾薑黃連黃芩人參湯以通寒

乾薑黃連黃芩人參湯方

乾薑 辛 熱 黃連 苦 寒 黃芩 苦 寒 人參 甘 溫 各 三兩

辛以散之甘以緩之乾薑人參之甘辛以補正氣
苦以泄之黃連黃芩之苦以通其胸中之寒格

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服

下利有微熱而渴脈弱者今自愈 下利陰寒之疾反大
熱者逆有微熱而渴

裏氣方溫也經曰諸弱發熱脈
弱者陽氣得復也今必自愈 下利脈數有微熱汗出

欽定四庫全書

普濟方

令自愈設復緊為未解 下利陰病脈數陽脈也陰病見
陽脈者生微熱汗出陽氣得通

也利必自愈諸緊為寒若復
脈緊陰氣猶勝故云未解 下利手足厥冷無脈者灸

之不溫若脈不還反微喘者死 下利手足厥逆無脈者
陰氣獨勝陽氣大虛也

灸之陽氣復手足溫而脈還為欲愈若手足
不溫脈不還者陽已絕也反微喘者陽脫也 少陰負跌

陽者為順也 少陰腎水跌陽脾土下利為腎邪干
脾水不勝土則為微邪故為順也 下利

寸脈反浮數尺中自濇者必清膿血 人病下利者脈當
沉而遲反浮數者

裏有熱也濇為無血尺中自濇者腸胃血散也 下利清

穀不可攻表汗出必脹滿 下利者脾胃虛也胃為津液
之主發汗亡津液則胃氣愈



<p>虛必脈滿 下利脈沉弦者下重也脈大者為未止脈微弱數者為欲自止雖發熱不死</p>	<p><small>沉為在裏弦為拘急裏氣不足是主下重大則病進此利未止脈微弱數者邪氣微而陽復為欲自止雖發熱止由陽勝非大逆也</small></p>	<p>下利脈沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀者必鬱胃汗出而解病</p>	<p>人必微厥所以然者其面戴陽下虛故也</p>	<p><small>下利清穀脈沉而遲裏有寒也面少赤身有微熱表未解也病人微厥針經曰下虛則厥表熱欲解臨汗之時以裏先虛必鬱胃然後汗出而解也</small></p>	<p>下利脈數而渴者令自愈設不差必清膿血以有熱故也</p>	<p><small>經曰脈數不解而止必協熱而便膿血也</small></p>	<p>下利後脈絕手足厥冷</p>	<p>時脈還手足溫者生脈不還者死</p>	<p><small>下利後脈絕手足厥冷者無陽也時時也周時厥愈脈出為陽氣復則生其手足不溫脈不還者為陽氣絕則見死也</small></p>	<p>傷寒利日十餘行脈反實者死</p>	<p><small>下利者裏也脈當微而反實者病勝藏也故死難經曰脈不應病病不應脈</small></p>	<p>是為死病 下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脈四逆湯主</p>	<p>之 <small>下利清穀為裏寒身熱不解為外熱汗出陽氣通行於外則未當厥其汗出而厥者陽氣太虛也與通脈</small></p>	<p>四逆湯以熱利下重者白頭翁湯主之</p>	<p><small>下利津液少熱則傷氣乘虛下利致後重也與白頭翁湯散熱厚陽</small></p>	<p>白頭翁湯方</p>
---	--	-------------------------------------	-------------------------	--	-------------------------------	--	------------------	----------------------	---	---------------------	---	---------------------------------	--	------------------------	--	--------------



白頭翁 三兩 苦寒
黃連 苦寒
黃栢 苦寒
秦皮 三兩 苦寒各
內經曰：賢欲堅，急食苦以堅之。利則下焦虛，是以純苦之劑堅之。

右四味以水七升，煮取二升，去滓，溫服一升，不愈更服一升。

下利腹脹滿，身體疼痛者，先溫其裏，乃攻其表。溫裏四

逆湯，攻表桂枝湯。下利腹滿者，裏有虛寒，先與四逆湯，溫裏身疼痛為表未解，利止裏和，與

桂枝湯。下利欲飲水者，以有熱故也。白頭翁湯主之。利自

攻表。不渴為藏寒，與四逆湯以溫藏。下利飲水為有熱，與白頭翁湯以涼中。下利譫語者有燥

欽定四庫全書

普濟方

屎也。宜小承氣湯。經曰：實則譫語，有燥屎為胃實。下利為腹虛，與小承氣湯以下燥屎也。

下利後更煩，按之心下濡者為虛也。宜梔子豉湯。下利後

不煩為欲解，若更煩而心下堅者，恐其谷煩。此煩而心下濡者是邪熱乘虛客於胸中為虛煩也。與梔子豉湯

吐之則愈。嘔家有癰膿者不可治，嘔膿盡自愈。胃脘有癰則嘔而吐膿不

可治，嘔得膿盡，嘔亦自愈。嘔而脈弱，小便復利，身有微熱，見厥者難

治四逆湯主之。嘔而脈弱為邪氣傳裏，嘔則氣上逆而

微熱見厥者，陰勝陽也。為難治。與四逆湯溫裏助陽也。乾嘔吐涎沫頭痛者，吳茱

萸湯主之。乾嘔吐涎沫者，裏寒也。頭痛者，寒氣上攻也。與吳茱萸湯溫裏散寒，嘔而發熱



者小柴胡湯主之

經曰嘔而熱者柴胡湯可用

傷寒大吐大下之極

虛復極汗出者以其人外氣怫鬱復與之水以發其汗

因得噦所以然者胃中寒冷故也

大吐大下胃氣極虛復極發汗以亡陽氣

外邪怫鬱於表則身熱醫與之水以發其汗胃虛得水虛寒相搏成噦也

傷寒噦而腹滿視

其前後如何部不利利之則愈

噦而腹滿氣上而不利也視其前後部有不利

者即利之以降其氣前部者小便也後部者大便也

夫傷寒六七日煩滿而囊縮此則毒氣在臟可下而愈

宜小承氣湯

欽定四庫全書

普濟方

傷寒六日身體熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴宜

小柴胡湯

傷寒六日陽脈澁陰脈弦當腹中急痛先與建中湯不

差宜大柴胡湯

傷寒六日發汗吐下後虛煩不得劇者心神顛倒宜服

梔子湯

傷寒六日已發熱及下之其人胸脇滿大腸微結小腸

不利不嘔但頭汗出往來寒熱而煩此為未解宜小柴



胡桂枝湯

傷寒六日發熱微惡寒肢節煩疼心下支滿外證未去

宜柴胡桂枝湯

傷寒六日大下之後身熱不去心中結痛此為欲解宜

梔子湯

傷寒六日之後胸滿煩驚小便不利譫語一身不可轉

側宜柴胡湯

傷寒六日不解結胸在裏但熱時時惡風大渴舌乾煩

欽定四庫全書

普濟方

燥宜白虎湯

傷寒六日風濕相搏身體疼痛不能轉側脈浮虛而濇

宜朮附湯

傷寒病六日後八日九日如瘧熱多寒少一日再發其

脈微緩者為欲愈脈微而惡寒者為陰陽俱虛不可復

吐下也發汗面色赤有熱者為欲解宜服桂枝麻黃湯

普濟方卷一百二十八

