

欽定四庫全書

普濟方卷一百四十七 明 周王朱櫨 撰

傷寒門

傷寒雜治 附論

夫風寒暑濕飲食勞倦皆能為病是謂五邪冬傷於寒
春必病溫春傷於風夏必飧泄夏傷於暑秋必痃瘕秋
傷於濕冬必欬嗽是乃四時之氣然五邪所中雖不同
本皆外邪大率同類惟冬時嚴寒其毒厲尤甚人或中

欽定四庫全書

普濟方

之病在冬時正名傷寒若邪毒藏於肌膚至春時乘盛
暑而發為暑病所謂先夏至日為病溫後夏至日為病暑
是也其病傳之次先客於太陽其病令人頭頂痛腰脊
強其脉尺寸皆浮太陽不已傳於陽明其病體熱目疼
鼻乾不得卧其脉尺寸皆長陽明不已傳於少陽其病
脅脅痛而耳聾其脉尺寸皆弦少陽不已太陰受之其
病腹滿體重其脉尺寸俱微太陰不已少陰受之其病
口燥舌乾而渴或背微惡寒其脉尺寸俱沉少陰不已



厥陰受之其病煩舌囊縮其脉尺寸俱緩病之所傳不
過三陽三陰而已其未滿三日者邪在陽經未入於裏
其病在表宜汗之而愈若經四日者邪入陰經其病在
裏宜下之而愈特其大略爾蓋有一日而傳至數經者
亦有數日而尚在太陽者陽病雖宜發汗陽明之病或
宜下之陰病雖宜下之少陰之病或宜溫之由人之稟
受虛盛其傳有遲速又不傳經者當審其脉證凡此五
經受病五邪脉證各不同傷風者必惡風其脉浮緩傷

欽定四庫全書

普濟方

寒者必惡寒其脉浮緊以至傷暑脉虛傷濕脉緩於人
迎緊盛為傷寒氣口急盛為傷食診得五邪之症知其
本也診得六經知其標也有病雖在表而不可汗者或
在裏而不可下者或若汗之太多則津液燥竭遂至亡
陽下之太早則邪氣動膈乃或成結胃清濁相干則變
為霍亂熱毒內瘀則變為瘀血又或為發黃者濕熱相
蒸也或為發斑者陽毒太盛陽盛之人得之於熱乃為
陽毒陰盛之人得之於寒乃為陰毒蠱動則為狐惑壞



病之甚則為百合若勞動復傷陰陽易之類雖瘥猶宜
節慎變態多端不可備舉當以類推皆以適當為良唯
二感之病表裏皆受邪難治其他或陰證似陽陽證似
陰或陰盛隔陽陽盛隔陰者在診病者以意詳之 夫
人生天地間以氣血籍其真是故天無一歲不寒暑人
無一日不憂苦故有傷寒天行溫疫之病蓋冬令為殺
厲之氣君子善攝生者當嚴寒之時行住坐卧護身周
密不受寒毒彼奔馳荷重房勞之人皆辛苦之徒耳當

欽定四庫全書

普濟方

閉藏而反擾動之則鬱結臟腑津液強耗為寒所搏則
腠理不密寒毒與榮衛相渾當是之時壯者氣行則已
怯者則著而成病矣不即病者寒氣藏於肌膚之間春
則病溫夏則病熱此皆一氣使然也古之治法一日在
皮當摩膏而火灸之二日在顱依法鍼解而發散之汗出
愈三日在肌亦發汗愈四日在胃宜吐之五日在腹
六日在胃宜下此華陀之治法也若按三陰三陽之法
傳變無出仲景之論蓋治傷寒有傷寒之法治雜病有



雜病之方豈能異其傳者同其治調理陰陽當按定法也至初得病者頭旋惡心振寒此即素問所謂時欲作嘔起居如驚神氣乃浮者是也傷寒如仲景明六經受病轉變者及素問所謂熱病也若病作無次第初得病表裏不明或先熱而渴不惡寒此即江南謂之黃病北方謂之汗病或長幼遞相染著又是天行時氣新傷寒以輕劑散之如葱白散和解毒散皆可用如六經傳變者當如仲景法有表證者麻黃湯桂枝湯有寒證互見者

欽定四庫全書

普濟方

各半湯見裏證者小承氣湯十棗湯深者大承氣湯半表半裏小柴胡湯見痞及結胸者小陷胸湯皆可用腹滿者理中丸此遇太陰者傳少陰便見厥逆脉浮細即當投四逆湯若見厥陰證用藥不可造次大凡仲景法皆可間用發表則用防風通聖散雙解散入腑三乙承氣湯大柴胡湯結胸痞滿大陷胸湯寒入陰經附子四逆湯半表半裏和解毒多用涼膈益元散傷暑亦依仲景用白虎湯桂苓甘露飲益元散備見真格方子和法發



表勝黃湯青龍湯和鮮涼膈散當發表用通聖散逐去 水腫必須禹切散舟車丸如大水中滿用之極驗		方		人參輕骨散 治傷寒頭痛壯熱項背拘急百節煩疼 增寒惡風肢體困倦大便不調小便赤澀嘔逆煩渴 傷風頭痛體熱鼻塞聲重欬傷山嵐瘴氣潮熱往 來及五勞七傷心腹痞滿冷氣奔冲攻注刺痛又婦 人血傷撮痛經候不調		欽定四庫全書 普濟方		貝母去心 白茯苓焙 半夏煮各一兩 枳殼去穰炒二兩五錢 蒼朮 泔浸一宿六兩 人參 白朮焙 白芷不見火 陳皮去白 秦艽去蘆		赤芍藥各二兩 川芎 當歸去蘆焙 肉桂去麋皮 乾薑		柴胡去蘆 麻黃去根節 桔梗去蘆 甘草炙各四兩 厚朴薑製四兩		右細末每服三錢水一盞薑三片同煎七分通口熱 服身體倦加烏梅一箇咳嗽加棗子二枚同煎不拘 時服		葱白散 鮮四時傷寒頭痛壯熱項背拘急骨節煩疼	
---	--	----------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	---	--	---	--	------------------------------	--



憎寒惡風肢體困倦大便不調小便赤澁嘔逆煩渴
不思飲食及傷寒頭痛體熱鼻塞聲重咳嗽痰涎山
嵐瘴氣時行疫癘並皆治之

川芎 蒼朮 米泔浸 白朮 各二兩 甘草 炙 石膏 煨 甘藷

焙各一兩 麻黃 去根節三兩

右細末每服三錢水一盞薑三片葱白二寸煎至七分熱服不拘時候要出汗併三服厚蓋取汗

神仙百解散 一名神仙四季加減百解散 治傷寒無問陰陽二易

欽定四庫全書

普濟方

證其間所用藥味各隨經絡治病如傷寒在表未傳入經發熱惡寒腰痛連進二服汗出而愈若已傳經絡胃滿頭痛肢體煩疼目睛微痛耳聾口燥咽乾或渴手足自溫或肢厥自利或不自利小便反快服之則調中順氣祛逐寒邪如頭面感寒風傷腠理頭痛項強發熱增寒鼻流清涕咳嗽涎痰及治風濕相搏骨節煩疼肢體沉重洒淅惡風時自汗出此藥大能調順三焦解表攻裏溫潤肺經正四時之氣昇降陰



陽能進飲食不問傷風傷寒中暑中寒骨蒸頭疼氣		逆胃滿吐逆眩暈惡心及已經汗後不解下之不當		吐之不中此藥清而不涼溫而不壅無問老年虛弱		男婦人並皆服之如連進數服無不取効常服免瘟		疫之疾不中暑寒之病秋服之即無瘧痢冬服之不		致傷寒毒真神仙衛生妙藥也功效不可盡述		山茵皮 一兩 柴胡 去蘆 前胡 去蘆 人參 去 羌活 去 獨活 去		甘草 一兩 蒼朮 米泔浸 藿香 去梗 白朮 去 半夏 薑汁		欽定四庫全書		普濟方		製各 一兩 乾葛 去 白芍藥 去 升麻 去 防風 去 藁本 去		蘆 去		立春以後不加減立夏以後一料加		柴胡 一分 赤茯苓 去 當歸 去 酪		立秋以後酌減柴胡一分不用當歸茯苓只加		乾薑 炮 肉桂 去 麻黃 去		立冬以後並無加減一方無當歸有黃茯苓去蘆半		兩	
----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	--------------------	--	---	--	--	--	--------	--	-----	--	---	--	--------------------	--	----------------	--	---	--	--------------------	--	---	--	----------------------	--	---	--



右為細末每服三錢水一盞半薑三片棗三枚煎至一盞熱服不計時候併進二服如要表散加葱白三寸淡豆豉三粒同煎服以衣被厚蓋出汗而愈一方	無山茵陳前胡	八鮮散 出和濟方 治四時傷寒頭疼壯熱傷風多汗及療	勞傷過度骨節酸疼飲食無味四肢疼痛行步喘乏面色痿黃怠惰少力咳嗽寒熱羸弱自汗胃膈不快	嘔逆惡心	欽定四庫全書 普濟方	人參 去蘆 茯苓 甘草 炙 陳皮 去白 白朮 藿香 去上各一	兩 厚朴 去麁皮剉生薑自然汁浸一宿炒紫色二兩 半夏 湯洗七次一兩	右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗子一枚葱	白三寸同煎七分溫服不拘時候	白朮散 出危氏方 治傷寒氣脉不和憎寒壯熱鼻塞腦悶	涕唾稠粘痰嗽壅滯或冒涉風濕憎寒發熱骨節疼痛或中暑嘔吐眩暈及大病後調理失宜飲食勞復	病證如初又治五勞七傷氣血虛損面色痿黃精神
---	---------------	--	---	-------------	----------------------------------	---	--	-----------------------------	----------------------	--	---	-----------------------------



恍惚睡卧不寧肢體倦怠潮熱盜汗脾胃虛弱面色
 痿黃飲食不美口吐酸水臟腑滑泄腹內虛鳴反胃
 吐逆心復絞痛久瘧久痢及膈氣咽塞上氣喘促坐
 卧不安或飲食所傷胸膈痞悶腹脇膨脹婦人胎前
 產後血氣不和霍亂吐瀉氣厥不省人事常服辟四
 時不正之氣及山嵐瘴疫神效不可盡述

山藥 桔梗 茯苓 甘草 白芷 陳皮 白青

皮 去 白 香附子 各三 錢 白朮 四 兩 乾薑 炮三 兩

欽定四庫全書

普濟方

右為細末每服二錢水一盞薑三片棗一枚木瓜乾
 一片紫蘇葉三片煎七分食前服若吐瀉入白梅煎
 喘入桑白皮杏仁煎傷寒再復入薄荷膈氣入木通
 三寸麝香少許中暑嘔逆入香薷產前產後氣血不
 和入荊芥霍亂入藿香氣厥入塩湯調下一方無陳
 皮嗽入粟殼烏梅煎

藿香正氣散 出德生方 治傷寒頭疼憎寒壯熱上喘咳嗽

五勞七傷八般風痰五般膈氣心腹冷痛反胃嘔惡



氣瀉霍亂臟腑虛鳴山嵐瘴癘遍身虛腫婦人產後 血氣刺痛小兒疳傷並宜服之	大腹皮 白芷 紫蘇 茯苓 去皮各一兩 半夏麴	白朮 陳皮 去白厚朴 去麴皮用薑汁炙 苦梗 各二兩 藿香 去土	三 炙二 兩 甘草 兩半	右為細末每服二錢水一盞薑三片棗三枚同煎至 七分熱服如欲出汗衣被蓋如再汗不出加葱白根 煎服冷嗽喘滿每服加人參一錢塩梅一箇杏仁七	欽定四庫全書 普濟方	粒去皮尖北五味子十粒就吞青州白丸三十五粒效 氣促氣壅加人參一錢沉香五錢心腹痛加木香半 錢玄胡索七粒切焙嘔惡甚加生薑三片木瓜二片 痰嘔加烏梅一箇寒濕腰痛心腹膨滿加生薑三片 木瓜二片蒼朮功砂枳殼煨去穰各半錢檳榔半箇 切片 一方治憂鬱血氣流注偏體刺痛緊滿加木 香一錢縮砂五粒增減順氣木香丸	荊芥散 出和劑方 治傷寒頭疼鼻塞寒流涕聲重咽乾胸膈
---	--	---	--	---	--	--	---



芍藥 兩各四 人參 兩三 石膏 兩五 生薑 兩二 大棗 枚三十		取汁二 半夏 升各一 麥門冬 升各一 白薇 升各一 黃芩 升各一 甘草 升各一		黃鐵 三十斤以流水淘二三千遍 炭 五十斤燒鐵令赤投冷水中又以燒七遍如此澄清		輒飛颺虛損		言氣滿肩息四肢時寒時熱喘悸煩亂吸吸少氣言		鐵青湯 出千金方 治三陰三陽厥逆寒食胸脇支滿不能		右製下篩先食酒服一錢		荳 兩各一 附子 兩二		欽定四庫全書 普濟方		椒 茯苓 麻黃 黃芩 代赭 桔梗 吳茱		乾薑 防風 沙參 細辛 白朮 人參 蜀		赤散 出千金方 治傷寒頭痛項強身熱腰脊痛往來有時		薄荷三葉水二盞同煎八分通口服		右為細末每服二錢陳茶末一錢生薑自然汁半呷		石膏 兩研一		天南星 湯浸生薑自然汁炙輕切培乾 草烏頭 炮去皮 荊芥穗 兩各半		滿悶頭疼如破	
--	--	--	--	--	--	--------------	--	-----------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------	--	------------------------	--	-----------------------	--	----------------------------	--	----------------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------	--	---------------	--	---	--	---------------	--



右咬咀內前沖中煮取六升服一升日三服兩日令盡	百解散 出百選方 治傷寒頭痛肢體沉重惡寒發熱痰逆咳嗽困倦少力及偏正頭痛此藥專解四時傷寒常服清神爽氣瘟疫瘴癘不生	防風 去蘆三兩半 麻黃 去蘆根三兩半 白芷 各二兩 白芍藥 各二兩 川	烏梅 五錢炮 甘草 去皮尖 荊芥穗 乾薑 各三兩	右為細末每服二錢葱茶或蠟茶點服不拘時候煎服亦可	正氣散 出和劑方 治傷寒陰證增寒惡風正氣虛冷胸膈噎悶脇肋膨脹痞滿吐利嘔逆酸水欬逆怠惰嗜卧不思飲食	甘草 皮七錢 陳皮 藿香葉 白朮 各一兩 厚朴 半	夏 同厚朴各三兩為末生薑四兩研爛為餅子微炒	右為細末每服二錢薑三片棗一枚水一盞煎至七分食前熱服又治久患瘧疾膈氣心痛日三服常服
------------------------------	---	--	--	--------------------------------	--	--	---	---



寬中辟除瘟疫	辰砂五苓散 出和劑方 治傷寒表裏未解頭疼發熱心胸	鬱悶唇口乾焦神思昏沉狂言譫語如見神鬼又治	癰瘡煩悶未省等症	辰砂 研 白朮 去蘆 木猪苓 去黑皮 澤瀉 先剉 赤茯苓 去皮各十	二兩 肉桂 去麤皮八兩	右為細末每服二錢沸湯點服不拘時如中暑作渴	小便赤澁新汲水調下小兒惡心煩熱焦燥多哭咬	欽定四庫全書 普濟方	牙上攢欲為驚風狀服半錢熱水調	李子湯 出危氏方 治陽明傷風能食口苦咽乾腹滿微喘	發熱惡風自汗嗜卧身重小便難潮熱而噦其脉浮	弦長而數悉主之	杏仁 去皮尖 半夏 湯去滑 五味子 各二錢半 芍藥 桂心	細辛 乾薑 炮 大黃 蒸 甘草 各二錢炙 茯苓	右咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服	白朮散 出仙明論 治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損
--------	---	----------------------	----------	--	---	----------------------	----------------------	---------------	----------------	---	----------------------	---------	---	--	----------------------	---



氣弱衰老保養又治酒積嘔噦等證	
白朮	茯苓
去皮	人參
各半	甘草
一兩	木香
一分	藿香
半	葛根
兩	右為細末白湯調下二錢煩渴者加滑石二兩甚者
加薑汁續飲	
茯苓半夏湯	出宣明論
治傷寒雜病一切嘔吐或喘咳疼	
痛痞滿痛者	
茯苓	一分
去皮	半夏
錢一	生薑
取汁	一分
欽定四庫全書	
普濟方	
右剉如麻豆大水一盞煎至四分絞汁下生薑汁溫	
服不計時候一方加黃芩去腐甘草陳皮去穰各一	
分治風痰	
解肌湯	出經驗良方
治大人小兒傷寒病大人全服	
麻黃	去節半兩各
用七錢半	人參
川芎	芍藥
獨活	各半
兩	前胡
二錢半	右咬咀每服四錢水半盞生薑一片薄荷二葉煎至
三分去滓三歲已下小兒一服分作三服口乾加乾	





右切以水六升煮取二升分再服不差復服甚良若 下而腹痛加當歸二兩嘔者加橘皮一兩忌海藻菘 菜猪肉冷水		陟釐丸 出浩 治少陰病二十日後下不止		陟厘 四兩不 當歸 四兩 汗防己 三兩 黃連 三兩 紫石英 三兩		煨研 厚朴 三兩 苦酒 五升		右切以二升苦酒漬防己一宿出切炙燥復入苦酒 中浸又以三升苦酒漬鼓一宿小蒸之研絞取汁搗		欽定四庫全書 普濟方		下篩諸藥以酒鼓和丸如梧桐子大冷漿水服二十 丸忌猪肉冷水		通氣丸 治少陰不足腎氣微少忽為寒熱太陽下陷 入腎中腎氣奔迫內動三焦或發熱頭疼咳嗽痰促 或右脇牽痛或傳為疹子等證不一其脉左尺沉而 弦按之則虛大而澁此方主之又治上氣神驗		葫蘆巴 一兩 炒 補骨脂 七錢 半 玄參 五錢 杜仲 一兩 炒 川		練子 一兩 半 三稜 五錢 羌活 茴香 各五錢 麻黃 去節 二錢	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--



春夏 三錢	右為細末麪為丸空心薑湯下五七十九丸塩酒下亦可	順解散	出宣 遮方 治傷寒九初受疾未分陰陽表裏皆可服之	蒼朮	半 觔 藁本 水 浸 桔梗 甘草 防風 獨活 各 四 兩	厚朴	姜汁 炒 右為細末每服二錢薑七片水一盞半煎至八分去	欽定四庫全書	普濟方	滓溫服祭酒朴謙之說韶州醫人劉公從周言盛夏熱證有傷寒冒暑二證若熱有進退則為暑若一熱而不間斷者則為傷寒但當以此別之	普救散	出經效濟世方 一名不傳散 治解四時傷寒肌熱惡寒頭	疼身痛汗與未汗但是陰陽二證皆可服	蒼朮	半斤去 皮淨炒 葛根 四 兩 甘草 二 兩	右為細末每服二錢水一盞半煎至七分去滓溫服或加葱白三寸一方蒼朮米泔浸炒甘草生用或只
------------------	-------------------------------	------------	---	-----------	--	-----------	---	---------------	------------	--	------------	--	-------------------------	-----------	---	---



入山茶葱湯調下亦可服藥訖欲出汗者須衣被蓋之酒調亦妙	萬安散 出經驗良方 治傷寒輕清發散	紫蘇葉 陳皮 香附 去毛 桔梗 白芷 半夏	湯炮製 甘草 前胡 去頭 藁本 各一兩 乾薑 二兩	右為粗末每服五錢水一大盞生薑五片棗一枚煎	八分去滓食前服加乾薑少許嗽加桑白皮少許欲	出汗極熱服無汗用麻黃去節加減法如熱多口渴	欽定四庫全書 普濟方	心煩臟腑堅硬再加前胡臟腑單弱體虛不出汗加	桂少許風赤眼目羞明不開再加前胡半兩無熱出	汗太過加麻黃根少許	六君子湯 出德生堂 治傷寒汗下之後將見平復宜服此	調理助脾進食辟邪大妙	人參 白朮 黃耆 白茯苓 甘草 山藥 各等分	右咬咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚同煎
----------------------------------	---	---	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------	--	-------------------	--	-----------------------------



至七分去滓溫服不拘時候此溫輕之劑如渴加乾薑烏梅煎大便自利加陳皮厚朴砂仁肉豆蔻煎餘熱加銀州柴胡煎		對金飲子	出德生堂	治諸疾無不愈者然傷寒後病退調理大宜時常服固元陽益氣血健脾進食和胃祛痰自然榮衛調暢寒暑不侵此藥療四時傷寒極有功效	效	厚朴 甘草 蒼朮 各二兩 陳皮 四兩一方 炒黃半觔	欽定四庫全書 普濟方	一治四時瘟疫之氣二毒傷寒頭疼發熱加淡豆豉三十多粒葱白三根同煎	一治五勞七傷手足心熱煩燥不安肢節疼痛加柴胡半兩槌碎或猪骨亦可煎服	一治痰嗽瘧疾寒熱之證加草薢檳榔烏梅半夏同煎	煎	一治小腸疝氣疼痛發寒熱者加塩炒小茴香同煎	一治大便虛滑頻見加肉豆蔻一兩用麪裹煨過白
---	--	------	------	---	---	---------------------------	------------	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---	----------------------	----------------------



木一錢同煎

一治發熱口渴加地骨皮銀州柴胡烏梅同煎

一治赤白痢赤痢加黃連白痢加吳茱萸煎

一治服固陽益氣健脾和氣祛痰自然寒暑外邪不

侵加人參白朮黃耆同煎有虛汗加浮麥煎

一治病後體虛加羊骨髓或猪骨髓其骨髓碎同煎

服數劑汗出得安如未得汗以稀粥投之厚蓋衣服

取汗立愈如水氣腫滿加桑白皮煎婦人帶下加黃

欽定四庫全書

普濟方

耆煎酒傷加丁香食傷加良薑四時泄瀉加肉豆蔻

風疾加荊芥穗腿膝冷疾加牛膝其拘急及虛壅加

地骨皮腿膝加兔絲子頭風加藁本轉筋霍亂加南

木皮 以上助使止加一銖此藥無論老少胎前產

後五勞七傷耳鳴目昏夢泄盜汗四肢沉重腿膝酸

疼婦人宮臟以冷月水不調若能每日一服即美容

顏豐肌體調三焦壯筋骨祛冷氣快心胸神效莫述

右咬咀每服五錢水一盞半生薑三片棗一枚同



煎至七分去滓溫服不拘時候其滓再煎日進二三服		雙解散 出經驗良方 治傷寒渾身壯熱氣竈煩渴多汗		升麻 乾葛 甘草 荊芥 蔓荊子 薄荷	天麻 殭蠶 知母 貝母 各半兩	右為細末每服四錢水一大盞薑二片葱白一寸煎至五分去滓溫服小兒作三服	通關散 出活劑方 治中風傷寒發熱惡心頭疼目眩鼻塞	欽定四庫全書 普濟方	聲重肩背拘急身體酸疼肌肉瞤動牙關緊急久新頭風痼疾眼暗並宜服之	撫芎 二兩 川芎 一兩 川烏 二兩 薄荷 一兩 白芷 甘草 各二兩	細辛 半兩	右為細末每服一錢葱白茶清調下薄荷湯亦可不拘時候	破證奪命散 出百選方 治陰陽二證不明或投藥錯誤以致患人困重垂危七日以後皆可服傳者云千不失
-----------------------	--	--	--	--------------------	--------------------------------	----------------------------------	---	------------	--------------------------------	--	----------------------	-------------------------	---



欽定四庫全書									
普濟方									
一									
右用人參一兩去蘆薄切水一大升銀石器內煎至									
一盞新水澄之取冷一服而進汗不自出只在鼻梁									
尖上消如水是其應也妙慧蘇軾光云侍郎方公曾									
救數十餘人申屠行父子之婦產後病時疫二十餘									
日已成壞證偶見問因勸其服一味人參遂安是時									
方知與此方偶然暗合耳一方有生薑									
桂附湯									
出危氏方									
治足少陰腎經傷風胸滿心煩咽痛自									
汗腰連脰骨酸痛嘔逆吐涎沫頭痛其脉沉弦者									
附子									
生去皮劑									
桂心 乾薑 芍藥 甘草 茯苓									
桃仁									
去皮尖麩炒各一兩									
右為散每服四錢水二盞煎至七分去滓食前服或									
咽痛加桔梗半兩									
八物湯									
出危氏方									
治足厥陰肝經傷風惡風而倦自汗小									
腹急痛寒熱如癰骨節煩疼其脉尺寸俱微而遲者									
桂心 當歸 川芎 前胡 防風									
各二兩									
芍藥									
一兩									



半 甘草 炙 茯苓 各半	右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗三枚煎八分	去滓空心溫服	青膏方 出千金方 治傷寒頭疼項強四肢煩疼者	當歸 芎藭 蜀椒 白芷 吳茱萸 附子	烏頭 甘草 各三兩	右咬咀以醇苦酒漬之再宿以猪脂四觔煎令藥色	黃絞去滓以溫酒服棗核大三枚日三服取汗不效	欽定四庫全書 普濟方	稍增加服	黃高方 出千金方 治傷寒頭痛項強四肢煩疼者	大黃 附子 細辛 乾薑 蜀椒 桂心 各半兩	巴豆 五十枚	右咬咀以醇苦酒漬一宿以臘月猪脂一觔煎之調 適其火下藥成赤色熱酒服梧桐子大一枚又以火 摩身數百遍兼治賊風遊走肌膚患處更宜摩之神	效
-------------------------	-----------------------------	---------------	---	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------	---	---	------------------------------	---	----------



白膏 出千金方 治傷寒頭痛向火摩身體酒服如杏核一枚溫服取汗摩身當千遍藥力及行并治惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍皆治之先以塩湯洗瘡以布拭之傅膏癰腫火灸摩千下自消									
天雄	烏頭	莽草	羊躑躅	各三兩					
右呔咀以苦酒三升漬一夕作東向露竈煎藥令沸下著土聚上沸定復上如是數遍藥成去滓傷寒咽喉痛含如棗核大一枚日三摩用時令勿近目									
欽定四庫全書									
普濟方									
葱豉湯 出肘後方 治傷寒有脉數腫痛人不能分別令取一藥兼療者若初覺頭痛肉熱脉洪起一二日便服此方									
葱白	一升								
豉	一升								
右以水三升煮取一升頓服取汗若汗不出更加乾葛根三兩一方更加升麻三兩水五升煮取二升分溫再服徐徐服亦可必得汗即差若不得汗更加麻黃三兩去節以葱白湯研米三合水五升煮之少時									



下淡豆豉葱白四根令火煎取三升分服出汗為妙									
又方 出肘後方									
用豉一升綿裹以童便三升煮取二升分溫再服汗									
出為效									
五積散 出濟生 調中順氣除風冷化痰治脾胃宿冷									
腹脇脹痛肩背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進									
及婦人血氣不順心腹撮痛經候不調									
白芷 川芎 甘草 茯苓 去皮 當歸 去蘆 肉桂 去麋皮									
欽定四庫全書 普濟方									
芍藥 半夏 洗七次 陳皮 去白 枳殼 去穰 麻黃 去根									
六兩 蒼朮 米泔浸去皮 厚朴 去麋皮 人參 二兩一方									
右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片葱白連根三									
寸煎至六分去滓食前熱服尋常皮風濕氣交互為									
病頸項強直或半身偏疼或肢體麻痺宜用此藥加									
麝香少許煎服婦人經候不調寒濕腰疼每服加桃									
仁七枚去皮尖微炒碎同煎婦人經候不調心腹撮									
痛加白膠香太陰經傷寒手足逆冷或積聚腹痛及									



虛汗不止脉細面青嘔吐加熟附子數片炒茴香一
捻冷氣煨薑三片塩少許煎脚氣下疰焮然赤腫增
寒壯熱亦加大黃一錢利之久虛脾瀉傷食腹痛冷
瀉不止加用炒陳米一撮烏梅一箇煎名和氣散心
腹膨脹不食亦效乳癰初起加川牛膝生地黃各二
根產後或尋常血氣痛加木香玄胡索半錢醋炒陳
艾葉七片烏藥半錢婦人體虛脚疼加川烏去皮臍
夏令熱寒氣折之秋發寒疫大效一治感冒四時傷

欽定四庫全書

普濟方

寒之病先服前方發散諸藥不效者二三日後汗不
出表裏未解此乃汗證傳經必先問其患者渴與不
渴大便虛實熱與不熱身上有無紅靨或有自利者
有嘔逆者有狂言譫語者變證不一須要詳審是何
病證以方對症服藥宜以小柴胡湯服之如有後證
加減依方用藥如後方五積散性溫敗毒散性涼九
人偶小感冒對半析和煎服名交加散亦多驗小小
感冒因風寒冷所襲猝然劇之正氣未耗邪氣未深



用此前數方先以助其氣使正旺則邪氣自散若倉卒未能辨只以葱白鬚數莖淡豆豉一捻生薑數片水煎熱啜連進三兩盞亦能發散邪氣已入經絡及時行疫癘則須依經按法表裏汗下不可差殊									
喝起散									
蒼朮		浸		麻黃		去節		荊芥	
兩		各二		兩		石膏		煨三	
兩		兩		兩		大黃		半一兩	
芩根		乾葛		芍藥		白芷		甘草	
兩		各一		兩		各一		兩	
右為細末每服二錢水一盞半生薑三片葱白三寸									
欽定四庫全書									
普濟方									
煎至七分食前服									
川芎湯		出神		解利一切傷寒					
效方		兩		川芎 藁本 蒼朮					
右件各等分為細末沸湯點三錢須臾覺嘔逆便解									
如不解再服									
不卧散		出神		效方					
川芎		一兩		石膏		七錢		藜蘆	
半		兩		半		兩		去土	
甘草		二兩		半生					
右為細末口噙水鼻內各嚙之少許喫白湯半碗汗									



出鮮	白芷散 出百選方 治傷寒鼻塞出清涕不已	香白芷 一兩 荆芥 一錢	右為細末，臈茶清調服。如不用荆芥薄荷，一錢亦佳。	清膈湯 治發散四時不正之氣，又傷寒未分證候癰疹欲出而未出，並宜服之。又療脾寒瘧疾潮熱往來。	狀如骨蒸，以而耳黯唇青，面色黧黑，舌苦咽乾，四肢倦怠，飲食無味。	欽定四庫全書	普濟方	苦桔梗 荆芥穗 薄荷葉 紫蘇葉 甘草節	栝樓根 牛蒡子 乾葛 各等分	右各無炮製，為粗末，每服三錢，水一盞，煎至七分，去滓，不拘時溫服，日進三五服。	解肌湯 出千金方 治傷寒天行頭痛壯熱	葛根 四兩 麻黃 三兩 黃芩 芍藥 甘草 各二兩 大棗 二十枚	右咬咀，水一斗，煮取三升，飲一升，日三服，三四日不
----	------------------------------------	--	--------------------------	---	----------------------------------	--------	-----	---------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	---	---------------------------



鮮脉浮者宜重服發汗脉沉實者宜以駛鼓丸下之 延年秘錄有桂心一兩一方無麻黃	治中風傷寒及時氣溫病頭疼壯熱脉盛始得用真丹塗身 令遍向火令汗出不拘時萬勿見風使汗出而又	閉盖汗透而邪氣出則愈矣	桂枝湯 治初得傷寒時氣	桂去麤皮 甘草炙 芍藥各半兩 杏仁去皮尖炒黃 乾薑	炮半兩 麻黃去根節 一兩	欽定四庫全書 普濟方	右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓併兩 服以衣被盖令汗透	涼膈散出濟生 治傷寒表不解半入於裏下證未全	下後燥熱怫結於內煩心懊懷不得卧臟腑積熱煩 渴頭昏唇焦咽燥目赤煩渴口舌生瘡欬唾稠粘澹	語狂言腸胃燥澀便溺悶結風熱壅滯瘡癰發癰驚	風熱極黑陷將死一名連翹飲子亦有加減法	連翹一兩 山梔 大黃 薄荷 甘草半兩 朴硝
---	---	--------------------	--------------------	--	---	--	---	---	---	-----------------------------	---------------------------	--



黃芩 各半兩	右為末每服二錢水一盞蜜少許同煎至七分去滓 溫服諒虛實加之咽喉痛涎嗽加桔梗一兩荊芥穗 半兩咳而嘔者加半夏半兩每服加生薑三片同煎 血衄嘔血加當歸芍藥各半兩生地黃一兩淋者加 滑石四兩茯苓一兩去皮風眩加川芎防風各半兩 石膏三兩酒毒加葛根一兩癰疹加葛根一兩荊芥 穗赤芍藥川芎防風桔梗各半兩三歲小兒可服七	欽定四庫全書 普濟方	八分或熱甚黑陷復滿喘急小便赤澁而將死者更 加大承氣湯約以一錢下之得利者亦便效凡言加 者皆自本方加也以意加減之退表裏熱加益元散 一方用竹葉七片同煎錢氏去連翹加藿香石膏為	瀉黃散	雙解散 出神效方	巴豆 六箇去皮 天麻 二兩 胭脂 錢許	右將巴豆天麻為末酒水丸如秣米大胭脂為衣一
---------------	---	------------------------------------	---	------------	-----------------	--	-----------------------------



日一丸二日二丸三日三丸已外不鮮先喫冷水一	口後用熱水下如人行十里以熱湯投之	太和湯 百沸湯是也 治無藥處初覺傷寒傷食傷酒風便	服	右避風處先飲半碗或以酸薑汁亦妙以手揉肚覺	恍惚更服半碗又用手揉至恍惚更服以至厭心腹	無所容探吐汗出則已	普救散 出百選方 治傷寒不問陰陽表裏但三日以前皆	欽定四庫全書 普濟方	可服	甘草 四兩生薑二觔切 蒼朮 一觔剉	右三味淹拌罨一宿次日焙乾碾為麤末每服不拘	時候如頭痛加白芷腹痛加香附汗出即愈	桂枝石膏湯 出千金方 治傷寒三日外與藥不差脉勢仍	數者陽猶在經絡未入臟腑者	桂枝 黃芩 甘草 各二兩 升麻 葛根 生薑 各三兩	芍藥 六兩 石膏 八兩 梔子 二十枚
-----------------------------	-------------------------	--	----------	-----------------------------	-----------------------------	------------------	--	-------------------	-----------	--	-----------------------------	--------------------------	--	---------------------	--	--



右咬咀以水九升煮二升七合分三服相去十里以
若前兩服訖即得汗後服即停不得汗更進一服得
汗即止如不得汗者至明日於內去梔子却加麻黃
足水二升再依前方煮服之得汗即止一方用白藥
子無芍藥

還魂丸 治傷寒四五日及數年諸癖結堅心下飲食

不消目眩四肢疼痛咽喉不利壯熱脾胃逆滿腸鳴

兩脇裏急痞石尸鬼注邪氣或為驚恐傷瘦背痛手

欽定四庫全書

普濟方

足不仁口舌乾燥天行發作有時風溫不能久住吐

惡水方

巴豆去心皮熬甘草炙硃砂 芍藥 麥門冬二兩去心

右五味各搗下篩合以搗三千下丸如梧桐子大每

服二丸葱棗湯下小兒二歲以上服如麻子大二丸

日二服忌海藻菰菜野猪肉蘆笋生血物

神朮煮散出百選方 治感寒凡人寒則傷榮血為榮風則

傷衛氣為衛故治傷寒當用當歸數藥



蒼朮 六兩 當歸 薑汁製 厚朴 薑製各二兩 人參 一兩 白芍藥	川芎 陳皮 各半兩	右咬咀每服三錢水一盞半薑五片棗二枚煎八分	食前去滓熱服一方無厚朴	不傳散 出百選方 治傷寒感冒風邪	蒼朮 七兩以竹蓋水中洗淨不須去皮 乾葛 三兩半 甘草 二兩七錢半	右為細末每服三錢水一盞煎八分服若細切葱頭	與茶同點見效尤速酒調亦可	欽定四庫全書 普濟方	治一切傷寒感冒不問陰陽證初覺即服甚效 出百選方	蒼朮 米泔浸一宿焙乾秤一兩 大菖蒲 半兩 甘草 四錢半炙	右咬咀每服五錢葱白三寸水一盞半煎七分熱服	微汗乃效濟生方名中和散用石菖蒲不用葱白煎	生薑橘皮飲子 出經驗良方 治患有傷寒者不辨陰陽咳	噎而大小便不通勢極危殆及夾食傷寒諸證	生薑 四兩切片 陳皮 四兩去白	右二味剉碎水三大碗煎取兩碗去滓分三服喫良
--	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	--	--	-----------------------------	---------------------	-------------------	---	--	-----------------------------	-----------------------------	--	---------------------------	--	-----------------------------



久上下氣皆通遂出汗而愈

保真湯

出和濟方

治四時傷寒疫氣不問陰陽二證纔覺

疾作痛服此方立效

藁本

去蘆

川芎

各四兩

甘草

二兩炒

蒼朮

十六兩洗剉炒

右咬咀每服三錢水一盞半薑三片同煎至七分去

滓熱服不拘時候一方加棗一枚煎如久傷風不解

加葱白三寸同煎尋常感冒只一二服立愈

消風百解散 治四時傷寒頭疼項強壯熱惡寒身體

欽定四庫全書

普濟方

煩疼四肢倦怠行步喘乏及塞壅咳嗽鼻塞聲重涕

唾稠粘痰涎壅盛氣急滿悶並宜服之

荊芥

白芷

陳皮

洗去白

蒼朮

麻黃

去節各四兩

甘

草

右為細末每服二錢水一大盞薑三片烏梅一箇同

煎七分不拘時溫服或茶酒調下欲發散風邪入蓮

鬚葱白三寸同煎

截傷寒不問陰陽決有神效



乾薑 乾葛 白芷 甘草

右等分為末若藥減少不效須每服三錢水一盞半煎
八分入生薑棗同煎不拘時候服了被蓋睡少時汗
出即愈

雙解散 治風寒暑濕飢飽勞疫內外諸邪所傷無問

自汗後雜病但覺不快便可通解愈小兒生瘡疹使

利出邪毒亦能宣通而愈

益元散 七兩 防風通神散 七兩

欽定四庫全書

普濟方

右二藥一處相和名為雙解散各七兩攪勻每服三

錢水一盞半葱白五寸塩豉五十粒生薑三片煎至

一盞溫服

防己黃芪湯

防己 一兩 黃芪 一兩 白朮 三分 甘草 半兩

右剉每服五錢生薑四片棗一枚水一盞半煎至八

分去滓溫服良久再服喘者加麻黃半兩胃中不和

者加芍藥三分氣上衝者加桂枝三分有陳寒者加



細辛三分服後當如蟲行皮中從腰下如米後坐被	上又以被繞腰以下溫令微汗瘥	甘草麻黃湯 治四肢腫水氣在皮膚	甘草 ^{二兩} 麻黃 ^{四兩}	右以水五升先煮麻黃去上沫內甘草煮取二升溫	服一升重復汗出不汗再服慎風寒	麻黃附子湯 治水病發汗已其脉沉小	麻黃 ^{三兩} 甘草 ^{三兩} 附子 ^{一枚}	欽定四庫全書 普濟方	右以水七升先煮麻黃去上沫內諸藥取二升半溫	服八分日三服	華陀赤散 治傷寒頭痛身熱腰背強引頸及風口噤	瘧婦人產後中風寒經閉腹大	丹砂 ^{十二兩} 蜀椒 蜀漆 乾薑 細辛 黃芩	防己 桂心 茯苓 人參 沙參 桔梗	女萎 烏頭 ^{各十銖} 雄黃 ^{一十銖} 吳茱萸 ^{三十銖} 麻	黃 代赭 ^{各三兩半}
----------------------	---------------	-----------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	------------------	--	---------------	----------------------	--------	-----------------------	--------------	----------------------------------	-------------------	---	----------------------



右治下篩酒服方寸匕日三耐藥者倍覆令汗出欲	治瘧不發一時併服藥二匕半以意消息之細辛丹	桂丹砂雄黃不熬餘者皆熬之	實表散 治腠理不密易致感冒先服此藥則感冒自	然鮮散	附子 炮去皮 茯苓 酒浸一宿焙乾 細辛 去葉 五味子 各等分	右為粗末以四味黃芪建中湯相對合和令停如本	方煎服不過三四即安妙甚有理	欽定四庫全書 普濟方	治傷寒	用梅實三十枚 去核 豉一升苦酒三升煮取一升半	去滓服	治傷寒有數種庸人不能分別今復取一藥兼治天	行內熱脉洪起至二日	用葛根四兩水三升內豆豉一升煮取半升服搗	生葛根	主一切傷寒
----------------------	----------------------	--------------	-----------------------	-----	--	----------------------	---------------	---------------	-----	---------------------------------------	-----	----------------------	-----------	---------------------	-----	-------



用甘草如中指長炙剉取童便一升煎七合空心服日再服	治老少晚發傷寒三月至年末為晚發名梔子升麻湯	生地黄 一觔打碎 梔子 三十枚 升麻 三兩 柴胡 各五兩 石膏	右五味切以水八升煮取三升分五服頻頻服若不鮮更若頭面赤去石膏用乾葛四兩無地黄用豉一升煮取三升分三服忌蕪荑	雪煎 治傷寒	欽定四庫全書	普濟方	麻黃 十觔 杏仁 三斗 四升 一觔十二兩 如金色者	右三味呔咀以雪水五斛四斗漬麻黃入東向竈釜	中三宿內大黃攪勻調炊以桑薪煮得二斛汁去滓	復內釜中搗杏仁內汁中復炊之可餘六七斗汁絞	去滓置銅器中又以雪水三斗合煎之攪令調得二	斗四升藥成可丸冷凝丸如彈子大病者以三服白	湯五合研一九入湯中適寒溫服之立汗出若不愈	者復服一九密盛藥勿令泄氣
-------------------------	-----------------------	---	---	--------	--------	-----	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------



神仙百解散 出衛生家保方 治男子婦人四時傷寒八般痞	氣山嵐瘴癘渾身壯熱憎寒或中暑或風疾曲攣手	足咽喉噎塞十種膈氣不思飲食無論百病初覺意	思不快便先進一二服無不效驗婦人產前產後及小	兒一歲有病皆可服之	白朮 茯苓 各二兩 藿香葉 去土 橘皮 去穰 甘草 炙 半夏	擘破生薑汁製 厚朴 薑汁蘸炙各三兩	右先將厚朴半夏為粗末用生薑四兩爛研同厚朴	欽定四庫全書 普濟方	半夏一處拌勻淨器中淹一宿次日焙乾却入前五	味藥拌和勻並搗為粗末每服四錢水一盞半生薑	五片或七片煎七分去滓熱服傷寒併喫二服常服	寬中進食或冷物傷脾臟腑不調並皆神效	柴胡散 出十便良方 治邪入經絡體瘦肌熱推陳致新鮮	利邪傷寒時疾中膈伏暑	柴胡 四兩 甘草 一兩	右為細末每服二錢水一盞同煎至八分食後熱服
---	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------	---	--	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	-------------------	--	-----------------------------



此藥冬月可以潤心肺止咳嗽除壅熱春夏可以禦傷寒時氣解暑毒常不可闕兼不以長幼皆可服之	倉卒可以便得	一方治急傷寒	急傷寒氣不能言 斯病難醫永無傳	半夏研末熱酒飲 時間免得赴黃泉	一方治傷寒	傷寒不覺甚 半錢好茱萸	欽定四庫全書 普濟方	水煎空心服 所患即消除	發汗散治傷寒	一米二芎四草麻 諸般發汗不如他	依方修合休交錯 強如神仙聖手拿	神仙不卧散 出德生堂 鮮利四時傷寒併一切風疾	細辛 甘草 人參 藜蘆 川芎 等分 石膏 半兩	為末詞曰管甚傷寒壯熱徧醫夾腦頭風若噉一字	在鼻中噉下教賢無病
--	--------	--------	--------------------	--------------------	-------	----------------	---------------	----------------	--------	--------------------	--------------------	--	---	----------------------	-----------



五苓散

方 出 醫

治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口

燥咽乾煩渴飲水水入即吐或小便不利及汗出表

解煩渴不止者宜服之亦治霍亂吐利傷暑門以五

苓散加甘草一兩炙夫疫雖以五種而成若天行時

症多假六淫及錯悶鬱折而致之者既有溫寒兩疫

風濕豈可不辨但證傷濕而脈色不同與夫一方相

染長幼同病即當作疫治除辟法外治濕五苓散加

炙甘草治風用桂枝湯加黃芩無不愈者其如淫邪

欽定四庫全書

普濟方

交結互織當以類推之

治主一切天行病

右取白藥研如麪漿水一大盞空腹服之便仰卧一

飯頃時候心頭悶亂或惡心腹內如車鳴疔刺痛良

久當有吐利數行勿怪欲服藥時先令煮漿水粥於

井中懸著待令若吐利過度即喫冷粥一碗止之不

喫即困人

治天時行熱病亦堪發汗甚有功



右用浮萍草一兩四月十五日者麻黃去節根桂心
附子炮裂去皮臍各半兩四物搗細篩每服二錢以
水二中盞入生薑半分煎至六分不計時候去滓熱
服汗出及差又治惡疾遍身瘡者取水中浮萍濃煮
汁清浴半日多效此方甚可也

火焰散

出永類
鈴方

治傷寒惡候

舶上硫黃

附子

去皮
剉用

新臘茶

各一
錢

右為細末先將好酒一升調藥入大新碗口中加火

欽定四庫全書

普濟方

攤蕩令乾合於瓦上每一碗下燒熱艾一拳大以瓦
撐起無令火著直至烟盡冷即刮取細研入磁合盛
每服二錢酒一盞共煎七分有火焰起勿訝傷寒陰
毒者四肢冷脉沉細或吐瀉惡心煩燥胃中結鞭或
傳作伏陽在內湯水不下先喫一服如吐却更進一
服服後心中熱其病已瘥如表未解渾身壯熱脉氣
洪大宜用發表藥或表解者更不發熱使得眠卧渾
身有汗若少有痞結脉實方可下之漸用調和脾胃補



治元氣之藥也

急提盆散

出千金方

雜病非陰候者主之

右用草烏頭不以多少生研極細為末葱一枝肥者
削去鬚頭圓上有葱汁濕蘸之從穀道中

治病後鬚亂不可理通

右生麻油二升將髮解開安淨銅器中用油淹漬之

細將釵子領髮斯須並自通

一方

出肘後方

治傷寒手足疼痛欲死

欽定四庫全書

普濟方

右取羊屎煮汁以灌之差止亦療時疾陰囊及莖熱
腫亦可煮黃蘗洗之

無憂散

出危氏方

治傷寒調理失序毒氣內結胃腹脹滿

坐卧不安日久不瘥狂言妄語大小便不通或復吐
逆

腦月黃牛膽

以天南星為末置膽內縛令
緊當風避日懸之候乾取用

右為末以人參半兩煎湯七分盞調末二錢乘熱服
遲頃更以熱人參湯投之或唾便溺下黃黑惡物是



效	治傷寒阮和南蒸法	右以薪火燒地良久掃除去火可以水小灑取蠶砂 若桃葉桑柏諸米糠及麥麩皆可趣用易得者牛馬 糞亦可用但臭耳桃葉欲落時可益收取乾之以此 等物著火令厚二三寸布席卧上溫復用此發汗汗 皆出若過熱當審細消息大熱者可重席汗出周身 輒使止當厚衣覆身勿令遇風	欽定四庫全書 普濟方	治暴傷寒	用荊芥豉汗煎服之	治傷寒無論陰陽神驗方	用皂角一挺肥者燒令赤為末以水五合和頓服 陰陽傷寒以酒和服	治太陽傷寒	用栝樓根二兩水五升煮取一升半分二服小便 利即差
---	----------	--	---------------	------	----------	------------	---------------------------------	-------	----------------------------



神丹丸 出聖 惠方 治傷寒脉瀉惡寒發熱體痛		硃砂 二兩 細研 水飛過 附子 一兩 半炮 裂去皮臍 赤茯苓 一兩 川烏頭		一兩 半炮 裂去皮臍 半夏 一兩 湯洗 七次去滑 人參 一兩 去蘆頭		右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服生薑湯下五		丸良久喫熱粥一盞投之得汗為度若不汗汗少不		解復服如前法若得汗足應解而不解者當服桂枝		湯此藥多毒熱者令飲水寒者溫飲解之治瘧初發		服二丸要略用細辛不用人參別有射干棗一枚名		欽定四庫全書 普濟方		赤丸治寒氣厥逆		六味清散方 出聖 惠方		川烏頭 一兩 炮裂 去皮臍 桔梗 一兩 去蘆 白朮 一兩 附子 一兩 炮裂 去皮		臍 防風 一兩 去蘆 細辛 一兩		右為散每服二錢以生薑湯調服服藥後食頃不汗		出者飲稀粥一盞以發之暖復汗出熱熱可也勿令		流離汗出若汗大出不止者薄衣覆之如未得汗者		當更服之以得汗為度	
--------------------------------------	--	--	--	---	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	------------	--	---------	--	----------------------------	--	--	--	---	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	-----------	--



橘皮湯 出聖 惠方 治太陰病不鮮雖暴煩下利十餘行而 自止所以自止者脾家實腐穢已去故也	陳皮 一兩湯浸 去白穢焙 生薑 一兩	右細剉和勻分為四服每服以水一中盞煎至六分去滓 不計時候溫服	桂枝芍藥湯 出聖 惠方 治太陰病下之後腹滿時痛	桂枝 赤芍藥 人參 去蘆各 一兩 甘草 半兩炙 微赤剉	右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚 欽定四庫全書 普濟方	煎至五分去滓不計時候熱服一方無甘草	術附子湯 出脉類 鈐方 治風虛頭重眩苦極不知食味暖	肌補中益精氣	白朮 二兩 附子 一枚半 炮去皮 甘草 一兩 炙	右剉每五錢匕薑五片棗三枚水一盞半煎至七分 去滓溫服	七物黃連湯 治夏月傷寒四肢煩疼發熱其人善煩 嘔逆支滿劇如遇崇寒熱相搏故令善煩
---	---	---	---	--	--	--------------------------	---	---------------	--	---	--



黃連十八銖 茯苓十八銖 黃芩十八銖 芍藥 葛根各一兩	甘草一兩六銖 小麥三合	右呖咀以水七升煮取三升冷分三服不能一升者可以稍服之病勢安乃卧藥主解毒氣服後胸中熱及咽喉痛皆差其明日復煮劑如法服之此湯無毒但除熱下氣安病人小兒服者三分之一以水四升煮得二升稍稍服	柴胡飲子 解利大小人傷寒餘熱不已	欽定四庫全書 普濟方	柴胡 黃芩 人參 甘草 升麻 地骨皮	赤茯苓 赤芍藥 龍膽草各半兩	右呖咀每服四錢水一盞加薄荷沙糖同煎七分溫服無時小兒分作三服	加減五苓散	藥中之寶五苓散 專治傷寒有大功	陽證見時須去桂 陰加附子水煎澄	狂言亂語辰砂末 頭目疼痛入川芎
---	--	--	-------------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------	------------------------	------------------------	------------------------



芩 去腐心 各一分 厚朴 兩半 一分	半夏 法炮如 湯浸洗 去穢 甘草 炙 人參 茯苓 黃	痛并風熱反胃吐食諸證	半夏橘皮湯 治傷寒病雜病嘔噦風眩痰逆欬喘頭	二十四證真如決 專心盡救效無窮	急醫水氣甜葶藶 伏暑燈心浸水中	眼目肉赤石膏末 陳皮止瀉又參同	目赤令添赤芍藥 茵陳退腫又相逢	欽定四庫全書 普濟方	眼中黃色茵陳炒 勞復桔梗有神功	飲水煩渴加乾葛 鼻衄烏藥却為功	麻黃用根除盜汗 下部赤腫便椒紅	腹中氣塊三稜末 青皮能退熱如烘	小便閉澀加瞿麥 黃芩能使大便通	定喘馬兜苓最好 蒼朮去濕腹中空	胃中嘔逆人參炒 痰多半夏喜相逢	咳嗽多加五味子 心氣不定麥門冬
---	---	-------------------	------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------



右剉如麻豆大用水三盞生薑一分煎至一盞半絞
 取汁分四服作日食後溫服

真方金不換正氣散 治四時傷寒五種膈氣和脾胃

止吐瀉溫中下痰飲止腹痛脹滿吞酸噎痞噎塞乾

嘔惡心內受寒濕外感風邪身體沉重肢節酸疼頭

昏鼻塞未分陰陽之間尤宜服之則氣自正而邪氣

退又能止汗解山嵐瘴氣八般癰疾遍身浮腫五勞

七傷或風氣所灌手足腫痛全不思飲食孕婦產後

欽定四庫全書

普濟方

產前皆可服餌霍亂吐瀉心腹疼痛又治脾氣虛弱

臟腑時鳴小兒脾胃不和時氣諸疾及治四方不伏

水土凡過嶺南北藥不可闕

厚朴

二兩去麤皮剉如菲葉濶長
 半寸以生薑自然汁卷一宿

半夏

二兩湯洗
 七次以生

薑四兩取
 汁浸旬日

橘紅

二兩

甘草

二兩剉
 炒過用

藿香

二兩洗

蒼朮

水

二兩去皮尖
 米泔浸一宿

甘果子

二兩取

葉水洗

右先用砂鍋炒厚朴令香次入蒼朮炒令紫色又半

夏炒香熱又入甘草炒黃又入橘紅炒破方始將藿



香葉二兩幹開衆藥安藿香葉在中心用藥遍蓋罨	定少時約藿香葉乾方可用取出同為麤末每服二	大錢水一大盞生薑五片棗一枚煎至七分去滓空	心服食前亦可常服和一切氣亦無瘟疫此乃不換	金真方也煎時不得犯銅鐵器	黃連龍骨湯 治少陰脉沉腹痛咽痛苦煩體猶有熱	黃連 一兩 黃芩 一兩 芍藥 各一分 龍骨 半兩	右分三服每服水一盞半煎至八分去滓服	欽定四庫全書 普濟方	葛根湯	葛根 一兩 麻黃 三分 湯 炮 甘草 半兩 桂枝 去 芍藥 去	各半 兩	右煎煮服餌如桂枝湯	小青龍湯	麻黃 去節 半夏 湯洗 芍藥 細辛 乾薑 甘草 炙 桂	枝 去麤皮 五味子 二錢	右剉如麻豆大每用八錢水一盞半生薑四片煎至
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	-----------------------	--	-------------------	---------------	-----	---	---------	-----------	------	--	--	----------------------



七分絞汁溫服		木香檳榔丸		木香 檳榔 青皮 陳皮 白商枳殼 麩炒廣茂		溫黃連 各一 黃蘗皮 香附子 炒大黃 麩炒各 黑		牽牛 半觔生取 頭末四兩		右為細末滴水丸如梧桐子大每服三十丸或五		十丸至微利為度食後生薑湯送下		化鐵丹		欽定四庫全書 普濟方		烏梅 八觔不 巴豆 十六粒不 胡椒 四十粒 陳皮 五錢		右為細末醋煮麪糊為丸如菉豆大每服五丸至七		丸食後溫生薑湯送下		枳殼丸		京三稜 二錢 蓬莪朮 二錢 白朮 半兩 青皮 去		一兩 陳皮 去白 木香 一兩 枳殼 麩炒去 白茯苓 去		五錢 陳皮 去白 木香 一兩 枳殼 麩炒去 白茯苓 去		一兩 半夏 湯洗七 黑牽牛 炮二		半 右為細末水麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸溫	
--------	--	-------	--	-----------------------	--	--------------------------	--	--------------	--	---------------------	--	----------------	--	-----	--	------------	--	-----------------------------	--	----------------------	--	-----------	--	-----	--	--------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	------------------	--	------------------------	--



欽定四庫全書		普濟方		生薑湯送下食後服之又方無牽牛 一名導飯丸	
木香三稜丸 出集書		木香 一兩 荆三稜 二兩 蓬莪朮 三兩 大麥葉 六兩 微炒 黑牽牛 六兩		右為細末薑汁麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸	
食後薑湯送下		木附湯 出十便良方		若但寒頭重則眩暈肌肉酸疼牽急	
不得轉側熱汗出惡寒小便不利大便反快短氣		眩暈足寒或時咽痛發熱此由寒濕之邪客搏經絡		陽氣不得發洩蘊於肌肉之間謂之寒濕之邪其脉	
遲而小弦		蒼朮 四兩 芍藥 各三錢 茯苓 各三錢 人參 各一兩 甘草 各一兩 附子 半一兩		右為麤散每服五錢水二盞煎一盞去滓溫服	
通解散 出直指方		治四時傷寒內外一功所傷		蒼朮 四兩 輕杵 去麤皮 甘草 二兩 滑石 六兩 黃芩 二兩 石膏 四兩	



右杵同為麤末每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服日進四服如發汗用葱白塩豉同煎熱服如和鮮用生薑五片棗五枚去核同煎去滓熱服食前進三服

三一承氣湯

出宣明方

治傷寒雜病內外所傷日數遠近

腹滿咽乾煩渴譫妄心下按之硬痛小便赤澀大便反快或濕熱內攻而為滑泄熱甚喘咳悶亂驚悸狂顛目痛口瘡舌腫喉痺癰腫陽明胃熱發癰脉沉可

欽定四庫全書

普濟方

下者小兒熱極驚風搐搦喘塞并癰疹黑陷小便不通腹滿欲死或癰疹後熱不退久不作痂或作癰癰瘡癰久不已者怫熱內成疹癰堅積黃瘦疳積新久卒暴心痛風痰酒膈積滯痰壅風熱暴傷酒食煩心悶亂脉數沉實或腎水陰虧虛熱獨甚而僵仆卒中一切暴病不語一名失音畜熱甚陽厥極深脉反沉細欲絕或表乏冲和正氣與邪熱并之於裏則熱亢極似陰反為寒症或產婦死胎不下及兩感表裏熱甚可



下者	大黃半兩 芒硝半兩 厚朴半兩 枳實半兩 甘草一兩	右剉如麻豆大每服水一盞半生薑三片煎至七分	內硝煎二服去滓服	黃連解毒湯出宣明論 治傷寒煩燥熱毒煩悶乾嘔口燥	吟呻喘滿陽厥極深畜熱內甚俗妄傳為陰毒者及	汗下吐後寒涼諸藥不能退熱勢並兩感證者	黃連去鬚 黃蘗 黃芩 大梔子各半兩	欽定四庫全書 普濟方	右剉如麻豆大每服秤半兩水一茶盞煎至四分絞	去滓溫服後或腹滿嘔吐或欲作利者每服加半夏三箇生 厚朴二錢去皮 茯苓三錢去皮 用水一盞半生薑合用	三片煎至半盞絞汁溫服名曰半夏黃連解毒湯	一笑散出德生堂方 治傷寒感冒	葱白七根漿水二碗煎一碗去葱先喫後用帶拴	繫腰再服酸漿水一碗即吐	羌活湯出保命集方 通解利傷寒不問何經中受病皆能
-----------	--	-----------------------------	-----------------	---	-----------------------------	---------------------------	--	-------------------	-----------------------------	--	----------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------	---



釋然解之即或於各經受病雖不盡解亦無壞證 羌活 二兩 防風 一兩 川芎 一兩 黃芩 一兩 細辛 二錢 甘草 一兩 灸 黑地黄 一兩 白朮 二兩 如用蒼朮 加一兩 右咬咀每服五錢水二盞煎至一盞無時溫服清如 覺發熱引飲加黃芩甘草 各一兩 更隨證加頭痛惡風 於白朮湯一兩內加羌活散 三錢 都作一服 羌活散 出保命集方	羌活 一兩 川芎 七錢 細辛根 一錢半 欽定四庫全書 普濟方	如身熱依前加石膏湯四錢	石膏湯 出保命集方	石膏 二兩 知母 半兩 白芷 七錢	如腹中痛者加芍藥散三錢	芍藥散 出保命集方	芍藥 二錢 桂枝 五錢	如往來寒熱而嘔加柴胡散二錢半	柴胡散 出保命集方
---	--	--------------------	------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------------	------------------



柴胡根一兩半夏五錢	右加生薑煎如心下痞加枳實一錢如有裏證加大	黃初服一錢次二錢又三錢	論曰有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝然春夏汗孔	疎雖有汗不當用桂枝宜用黃耆湯和鮮秋冬汗孔閉	雖無汗不當用麻黃宜用川芎湯和鮮春夏有汗脉乃	微而弱惡風惡寒者太陽證冬之脉也亦宜黃耆湯無	汗亦宜川芎湯秋冬有汗脉盛而浮發寒身熱者乃陽	欽定四庫全書 普濟方	明證春夏之脉也亦宜黃耆湯無汗亦宜川芎湯大抵	有汗者皆可用黃耆湯無汗者亦可用川芎湯	黃耆湯出保命集方有汗則止也	黃耆 白朮 防風各等分	右呖咀每服五錢至十餘錢或半兩水煎溫服清汗	多惡風甚者加桂	川芎湯出保命集方無汗則發也 川芎 白朮 羌活各等分
--	-----------------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------------	--



右咬咀同黃耆湯稍熱服惡寒甚則反脉大浮半加 麻黄法云五臟之脉寸關尺也今止言尺寸陰陽也 如陽緩而陰急表和而裏病陰緩而陽急裏和而表 病	若傷寒食少發渴只可和胃止渴不可以太凉藥止之 恐凉藥止之損着元氣必不能食也	和胃白朮湯 出保命集方	白朮 茯苓	欽定四庫全書 普濟方	起卧不能謂之濕身重是也小柴胡湯黄芩芍藥湯 起卧不安眠睡不穩謂之煩梔豉湯竹葉石膏湯解 利四時傷寒能解六經邪氣	大白朮湯 出保命集方	白朮 二兩 防風 一兩 羌活 一兩 川芎 一兩 黄芩 五錢 細辛 三錢 白 芷 半兩 石膏 二兩 知母 七錢 甘草 二錢 枳實 五錢 去穢	右為麤末每服半兩水一盞半煎至一盞大温服清 未鮮更一服兩服藥滓又作一服春倍防風羌活夏
--	--	-----------------------------------	--------------	----------------------------------	--	----------------------------------	--	---



倍黃芩知母季夏雨淫倍白朮白芷秋加桂五錢冬	桂八錢或一兩立夏之後至立秋處暑之間傷寒者	身多微涼有自汗四肢沉重謂之濕溫又謂濕淫宜	蒼朮石膏湯 出保命集方	蒼朮 細剉半兩 石膏末 三錢 知母 剉一錢半 甘草 剉一錢	右同和勻都作一服水兩盞煎至一盞溫服清謂內	有濕熱也多不欲飲食如身熱脉洪無汗多渴者是	熱在上焦積於胸中宜	欽定四庫全書 普濟方	桔梗散 出保命集方	薄荷 一錢 黃芩 一錢 甘草 一錢 桔梗 半兩 連翹 二錢 山梔子	錢二	右剉每服五錢或七錢秤半兩水煎加竹葉如大便	秘結加大黃	太乙丹 出楊氏家藏方 治傷寒傷風肢節煩痛如破服之解	寒清熱或發熱惡寒似瘧非瘧煩燥迷悶面色紅赤	頭痛如破服之微汗出立愈
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	---	----------------------	----------------------	-----------	---------------	--------------------------	--	----	----------------------	-------	--	----------------------	-------------



天南星 四兩剉炒 石膏 四兩 甘草 取粉秤三兩半 前胡 二兩 芎 二兩 白殭蠶 炒去絲嘴 白附子 炮 防風 去蘆頭各一兩 右件為細末用生薑自然汁煮麪糊和丸每一兩作十九丸陰乾每服一丸細嚼用葱白薄荷茶清送下不拘時候	祛毒散 出楊氏家藏方 鮮風邪截傷寒	蒼朮 四兩米泔浸一宿 甘草 炙 黃芩 赤芍藥 各一兩 赤茯苓 半兩	苓 半兩 麻黃 去根節半兩	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服三錢水一盞半生薑五片黑豆十五粒同煎至一盞熱服不拘時候	祛寒湯 出楊氏家藏方 祛逐寒邪鮮利傷寒時行瘟疫	青橘皮 二兩不去白 陳橘皮 二兩半 丁香皮 甘草 炙	乾薑 炮各一兩	右為細末如覺身熱頭疼即抄藥一錢沸湯點下不拘時候	順氣散 出王氏傳濟方 調順冷氣鮮利傷寒
---	---	--	--	-------------------	---	---	--	-------------------------------	--------------------------------	---



吳茱萸 洗令淨春夏用一兩 秋冬用半兩 麻黃 去節一兩 人參 半兩 訶子	半兩炒 大黃 三分 官桂 一兩 去皮 厚朴 一兩 去皮 乾薑 半兩 炮	兩 陳橘皮 一兩 去白 甘草 二兩 炙	右為末每服一錢水一盞入薑棗煎六分通口服如	外傷邪即先服此三服次服發汗丸散效	益元散 出直指方 治身熱嘔吐泄瀉腸澼下利赤白淋漓	癰閉悶痛小腑不利胸中積聚寒熱失宜大益精氣	通九竅六腑生津液去鬱結消畜水止渴利中除煩	欽定四庫全書 普濟方	熱心燥胸腹脹痛益五臟大養脾腎之氣或腎水不	足胃土衰弱風寒外感七情內傷陰痿陽衰安魂定	魄五勞七傷一切虛損並皆治之	滑石 六兩 膩好者 甘草	右為細末每服三錢蜜少許溫水調下或無蜜亦可	無論時日三服或欲冷新水調下亦得解利發汗煎	葱白豆豉湯下四錢每水一盞葱白五寸豆豉五十	粒煮取汁七分調下併三服以效為度此藥治寒涼
---	---	---	-----------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



解散鬱熱設病甚不解多服無害但有益爾本世傳
名大白散俗惡性寒兼易得之賤物而又不明素問
造化之理故不取本草神驗之言而多不用焉若以
隨證驗之乃凡人之仙藥不可闕也夫傷寒當汗則
不可下當下亦不當汗者若能急服此藥則汗自不
出而裏熱亦獲小效即有裏熱便得宣通而愈者或
半在表半在裏可解和而不可吐下發汗者若服此
藥多愈或不愈再服加減涼膈散和解尤妙或必當

欽定四庫全書

普濟方

汗解者更加蒼朮麤末三錢同煎葱豉湯調服尤良
或孕婦不宜滑石麻黃桂枝單發汗即用甘草一兩
蒼朮二兩同為麤末每服四錢水一盞葱白五寸豉
五十粒同煎至六分去滓熱服併二三服取微汗是
名逼毒散非孕婦皆可服或大白散加麻黃去節二
兩如前法煎服世云神白散更加滑石末與蒼朮末
二味最為發汗之妙藥乃此方唯正可汗者即用誤
服之則轉加熱也名曰大逼毒散或解利兩感煎涼



膈散調下益元散四錢或下乳用猪肉麪羹或酒之
類調下四錢不拘時候日三服又宜食肉麪羹粥催
產溫油漿調下五錢併二三服以產為度或死胎不
下者三一承氣湯一服調下五錢須臾更頻用溫油
漿調服前藥數服而胎出可活產母也難產或死胎
不下皆由風燥澁熱聚斂結而不能舒緩故產戶不
得自然開通也藥力至則結熱頓開而產矣後慎不
可溫補而反生燥熱也俗未知產後已損血液疼痛

欽定四庫全書

普濟方

怖懼以致神狂氣亂則陰氣損虛邪熱大甚而為諸
熱證由不明素問造化故不識陰陽反以謂產後諸
虛百損便為虛冷而無熱也誤以熱味藥溫補或煩
渴者不令飲水本雖善心為害多矣豈知治病之道
但以臨時審其臟腑六氣虛實名其標本如法治之
而已矣此藥泛常無竒然為效至大而俗以為小
使忽之此所以反招侮也今以加黃丹桃紅名曰經
玉散加青黛令輕碧色名碧玉散加薄荷葉一分細



羅同為末名曰鷄蘇散治療並同但以迴避愚俗之	妄侮爾	柴胡飲子退五臟虛熱四時加減 出金方	冬三月加柴胡 八分 白朮 八分 大腹檳榔 四枚并支子用 陳皮 五分	生薑 五分 桔梗 七分	春三月加枳殼 三分 減白朮 共六味	夏三月加生薑 三分 枳實 五分 甘草 三分共八味	秋三月加陳皮 三分共六味	欽定四庫全書 普濟方	右各咬咀分為三貼一貼以水三升煮取二升分溫	三服如人行四五里進一服如四體壅滯甘草少許	每貼分作三小貼每小貼以水一升煮取七合溫服	再合滓為一服重煮都成四服	訶梨勒丸長服 出金方	訶梨散 煨 陳皮厚朴 各三兩	右末之煉蜜丸如梧桐子大酒飲服二十九加至三	十九
----------------------	-----	----------------------------------	---	---	---	---	-----------------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------------	--	----------------------	----



右為末同前法煎此藥治內外感寒脉沉伏遲細手足冷毛髮恟慄傷寒陰證大啜一二盞氣和汗出即愈	和氣治中湯 治傷寒初受病服散吐後宜服	藿香 人參 各半兩 白朮 陳橘皮 各三兩 甘草 乾薑 白茯苓 各一兩	右件藥擣羅為散每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至五分即去生薑和滓不計時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	小柴胡湯 治傷寒後肺萎勞 出如宜方 黃芩 人參 甘草 各三兩 半夏 製二兩半 柴胡 八兩	右呔咀薑五片棗一枚煎 如譫語潮熱胃實大便利脉洪數宜服 亡陽譫語不可下宜加桂枝芍藥湯 如自利挾熱或垢赤煩渴寒熱往來宜加茯苓	如傷寒喜睡脅痛胃滿有熱脉數宜服不煩渴身冷脉遲宜四逆湯 如傷寒瘥後寒熱往來似瘧又治乾嘔日晡發熱宜服 如勞復宜服 如腹色青	治乾嘔日晡發熱宜服 如勞復宜服 如腹色青
--	---------------------------	--	--	-----------------------	--	---	--	-----------------------------



難治死必吐舌 如嘔逆煩躁作渴有寒熱脉數喜
冷加竹茹湯

靈壽縣董監軍癸丑年冬十二月間雪霽因事至真定
忽覺有風氣暴至診候六脉俱弦甚按之洪實有力其
證手攣急大便秘澁不通面赤而熱此風寒客加於身
也四肢者脾也以風寒之邪傷之作搐急而攣痺乃風
淫末疾而寒在外也內經云寒則筋攣正謂此也本人
素飲酒近日為覺風氣不飲內有實熱乘於腸胃之間

欽定四庫全書

普濟方

故大便秘澁而面赤熱手足陽明受邪外則足太陰脾
之經受風寒之邪用桂枝甘草炙以却其寒邪而緩其
急搐用黃蘗之苦寒滑以瀉實而潤燥急救腎水用升
麻葛根以升陽氣行手足陽明之經不令遏絕便以桂
枝性熱入手陽明之經為引用潤燥復以芍藥甘草專
補脾氣使不受風寒之邪而退本邪專益肺也加人參
以補元氣為之輔佐當歸身去裏急而潤燥和血名活
血通經湯



升麻 葛根 各一錢 桂枝 二錢 當歸 二錢 人參 一錢 芍藥 半錢 甘草 炙 一錢 黃蘗 二錢 酒製	右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服 令暖房中近火摩搓其手一服而愈	木桂湯 東垣蘭室秘藏 治寒溫所客身體沉重胃脘痛面色	痿黃	麻黃 一錢 桂枝 半錢 杏仁 十箇 草薢仁 半夏 各半 炒麴	錢半 蒼朮 二錢 橘皮 一錢 澤瀉 一錢 白茯苓 一錢 猪苓 半錢 黃	欽定四庫全書 普濟方	著 三錢 甘草 二分 炙	右都作一服煎法如常	治傷寒熱病服轉藥後病已效可臟腑仍兩三日不出	後喫食減少仍覺精神不快 出護命方	柴胡 去毛 桔梗 去根 麻黃 去根 杏仁 黃芩 荊芥穗	大黃 炮熱 牡丹皮 去心 羌活 沉香 木香 獨活 各一	分 升麻 兩半 右為細末每服二錢水一盞煎一沸急瀉出食後和
--	---	----------------------------------	-----------	---------------------------------------	--	-------------------	---------------------	------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--



滓熱服	治傷寒熱服傷脾渾身肌肉辟痛聞食即惡心思嘔吐 徧身發熱兩唇乾焦診其脉即右手關上脾脉一指 徧洪緊如衆脉此即為病氣在脾宜服此方	桔梗 羌活 杏仁 麻黃去根 麥門冬去心 大黃	荊芥穗各一分 半夏二銖 牽牛兩 青橘皮四兩	右先杵牽牛半夏二味為末所餘衆藥只作一處杵 為末每服五錢水一盞半生薑三片葱三枝煎衆藥	欽定四庫全書 普濟方	末三錢沸一兩沸瀉出取汁一盞用調下牽牛半夏 等末二錢食後服	交加散出如宜方 治憎寒壯熱或外感風寒內傷生冷及	風寒二證	敗毒散 五積散	右等分薑棗煎如體虛宜養胃湯	三建湯出危氏方 治脉微身體冷重自然汗嘔吐加丁香	胡椒各半兩方見積熱痢冷門痢冷類
------------	---	---	--	---	--	--	---	-------------	----------------	----------------------	---	---------------------------------------



不卧散截傷寒 出十便良方		蒼朮 川芎 甘草 藁本 各一兩	右為麤末每服三錢水一盞葱白三寸同煎至八分	去滓熱服不以時	茯苓利膈湯 出保生回車論	茯苓 一兩 牛蒡子 二兩 荆芥穗 一兩 桔梗 一兩 甘草 半兩	炙紫 色	右為麤散每服三錢水一盞薑三片同煎六分去滓	欽定四庫全書 普濟方	溫服日二三服不拘時候	解肌湯 出保生回車論	麻黃 一兩 蒼朮 四兩 羌活 半兩 甘草 半兩 荆芥穗 半兩	兩半	右為麤末每服三錢水一盞薑三片煎至六分去滓	溫服續續二三服微汗出即解	千金不傳散 出澹察方 治傷寒兼主感風	蒼朮 七兩 竹籃盛水 三兩 乾葛 半兩 甘草 七錢
-----------------------------	--	--------------------------------	----------------------	---------	-----------------------------	--	---------	----------------------	---------------	------------	---------------------------	---	----	----------------------	--------------	-----------------------------------	---



右為細末每服三錢加葱煎茶調亦可

桂枝湯 出鮑氏方 治傷風頭痛鼻鳴乾嘔發熱自汗惡風

或寒熱汗出則少解如瘧狀脉浮洪虛大

桂枝 一兩 白芍藥 一兩 甘草 一兩

右為散每服五錢煎八分食前服訖蓋被取微汗

或發滯漏不止小便難四肢拘急加炮附一分或項

強繫繫反汗出惡風加乾葛一兩半或汗後身痛脉

沉遲加芍藥生薑各半兩人參一兩半或嘔逆更加

欽定四庫全書

普濟方

茯苓半夏人參陳皮冬末春初宜桂枝湯五積散盛

夏時及淋家酒家衄家於桂枝湯加黃芩或夏日只

用本方增芍藥名建中湯治氣痛等疾加烏藥香附

炒

加減香蘇葉 出醫方大成

香附子 一兩 紫蘇梗 二兩 陳皮 一兩 甘草 半兩

右為末剉散每服四錢水一盞半煎至一盞生薑三片

連根葱白二莖同煎熱服 頭痛加川芎白芷 頭



痛如斧劈加石膏連鬚葱頭 偏正頭風加細辛	石膏薄荷 太陽穴痛加荊芥穗石膏 傷風自汗	加桂枝 傷風無汗加麻黃 去節 并乾薑 傷風惡寒	蒼朮 傷風發熱不退加柴胡黃芩 傷風咳嗽不	止加半夏杏仁 去皮尖 傷風胸膈痞塞加製枳殼	傷風鼻聲風重咽鬲不和加苦梗旋覆花 傷風痰	涎壅盛加白附子天南星 傷寒鼻內出血加茅花	傷寒氣促不安加大腹皮桑白皮 傷風鼻塞不	欽定四庫全書 普濟方	通頭昏加羌活荊芥 傷風不解咽喉腫痛加苦梗	傷風中脘寒不思飲食加去白青皮枳殼 傷寒	嘔吐惡心不止加丁香半夏 傷寒後時作虛熱不	退加人參 傷風飲食不能消化加縮砂仁青皮	傷風一向不解作潮熱白日至日中不退日日如是	加地骨皮柴胡人參蒼朮 初感風寒頭疼作熱鼻	塞聲重加羌活川芎 感風腰痛不能伸屈加官桂	桃仁 感風渾身痛不止加赤芍藥紫金皮 感風
---------------------	----------------------	--	----------------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



熱惡寒身痛不能轉動加料五積散 飲食不進欲	感風寒發熱頭疼加不換金正氣散 感寒頭痛壯	果 脚氣加木香木瓜牛膝紫金皮茱萸川練子	嗽不已加乾薑五味子杏仁 脾寒加良薑青皮草	不退加人參黃耆 產後腰疼不止加當歸官桂冷	人產後作虛熱不退煩渴加人參地黃 產後發熱	丁香 婦人經水將行先期發熱加蘇木紅花 婦	或兩目昏黃加山茵陳山梔子 中酒吐惡加烏梅	欽定四庫全書	普濟方	卒痛者加延胡索酒一盞 飲酒太過忽遍身發痘	谷茅神麴 傷食吐嘔泄瀉腹痛加乾薑木香 心	氣疼所苦加木香縮砂仁 脾胃不和中脘不快加	胸膈痞疼脇肋痛小便急疼加木香枳殼 婦人被	痛不能下地加木香木瓜吳茱萸 婦人被性所苦	疼痛時刻不可忍加木香薑棗 婦人忽然大便疼	香 腹肚疼刺不可忍加薑製吳茱萸七粒 小腹	脛項強急不能轉動加羌活官桂 腹肚疼痛加木
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



吐不吐加丁香與蘿蔔子 感寒頭痛發熱身疼分	陰陽加敗毒石膏 婦人產後風脚手疼痛生料五	積散人參敗毒散加木瓜不換金正氣散加地黃川	芎同煎	木附湯 出保生 回車論	白朮 二兩剉 如麥豆 附子 一枚以半兩為率炮裂 去皮臍剉如麥豆粒	右如法製一處於杵臼中良時治之勿令作末每四	錢以水一盞半煎及七分去滓溫服日三服不拘時	欽定四庫全書 普濟方	後凡言日進三服者疾勢稍重當促數服而未痊當	作湯劑	半夏中和湯 出保生 回車論	半夏 二兩湯浸七 次切片焙乾 厚朴 四兩剉去 麁皮剉碎 蒼朮 四兩剉去 麁皮剉令	極獨活 二兩剉碎 草豆蔻 十五箇去殼剉碎以上四味 一處杵碎生薑屑一觔同杵	摩瀾又慢 甘草 三兩炒 令紫色	右如法製一處杵為麁散每服炒四錢水一盞半生	薑三片棗二枚同煎至七分去滓溫服食前日進三
----------------------	----------------------	----------------------	-----	--------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	-----	----------------------------------	---	--	------------------------------------	----------------------	----------------------



服胃損人可常服嵐瘴諸邪皆不能為害									
茯苓茱萸丸 出保生回車論									
茯苓 吳茱萸 浸五次焙乾 芍藥 不問赤白皆可用 黃連 去鬚									
右等分為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸									
二十丸溫熱水下如無蜜即用飯丸量大小加減不									
計時候									
升麻葛根湯 出保生回車論									
麻黃 二兩剉 葛根 二兩細剉 芍藥 四兩剉 甘草 一兩炙紫色剉									
欽定四庫全書 普濟方									
右件篩為麤末每服四錢水一盞半生薑五片同煎									
至六分去滓溫服日三服不拘時候									
麻黃桂枝湯 出保生回車論									
麻黃 二兩去根節 桂枝 一兩 葛根 三兩 芍藥 三兩 甘草 一兩炙紫色									
右為麤散每服四錢水一盞半生薑五片棗二枚同									
煎至七分去滓溫服日三服夜一服									
三苓散 出保生回車論									
茯苓 一兩 桂 一分 白朮 二兩									



右為細末每服二錢匕粥飲調下日二三服不計時候	桂苓散 出保生回車論	茯苓 二兩 桂 一分	右為細末每服二錢粥飲調下日二三服不計時候 每服藥後飲沸湯或粥飲一盞或半盞為佳	猪苓散 出保生回車論	猪苓 茯苓 澤瀉 白朮 阿膠 先杵碎炒為末	欽定四庫全書 普濟方	右四味等分如法製為麤末每服四錢水一盞半煎八分去滓入阿膠末二錢再上火沸溫服日二三服	朮桂湯 出保生回車論	白朮 三兩 桂 一分	右為細末每服二錢粥飲調下日二三服不計時候 以上三藥服餌主療並與五苓同	聖僧散 出衛家寶 治時行一切傷寒不論陰陽不拘輕重	應老幼及孕婦皆可服
------------------------------	----------------------------------	---	--	----------------------------------	---	--	---	----------------------------------	---	--	--	------------------



香白芷 生一劬 甘草 生半兩	右二味焙乾碾為麤末每服二錢水一盞棗二枚生	薑三片葱白三寸同煎至七分熱服用衣被蓋覆如	人行五六里更進一服汗出即愈此藥可卜病之好	惡如煎得黑色或悞打翻即難愈如煎得黃色無不	愈者煎藥之時要在志誠	加減正氣散 出衛生家寶 治傷寒傷風不論表裏但連進	二服立效	欽定四庫全書 普濟方	藿香葉 半夏 研細用薑汁搜和炙黃色 厚朴 去皮 陳皮 去白 甘	草 研以上味乃局方正氣散 再加白茯苓草菓仁	右各等分細末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎	七分食前稍熱服	和中益胃湯 出誠效方 治太陰陽明腹痛大便常泄若不	泄却秘而難見在後傳作濕毒下鮮紅血腹中微痛	脇下急縮脉緩而洪弦輕之可得按之空虛	熟地黄 三分 當歸 酒製四分 升麻 半錢 蘇木 一分 藁本 二分 炙甘
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	--	-------------	-------------------	---	---	-----------------------------	----------------	--	-----------------------------	--------------------------	---



草三分柴胡半錢益智仁二分

右件都作一服水三盞煎至一盞去滓溫服食前一服而愈

茯苓白朮湯良方治傷寒服桂枝湯或下之仍頭

項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂

枝加此方

芍藥 生薑 白朮 茯苓各三兩甘草二兩大棗十二

箇

欽定四庫全書

普濟方

右切每服半兩以水二大盞煎取一盞溫服小便利則愈忌海藻菘菜酢桃李雀肉等

陰陽應象論曰人之汗以天地之雨名之又曰濕盛則霖霪驟注蓋以真氣已虧胃中火盛汗出不休胃中真氣已竭若陰火亦衰無汗皮燥乃陰中之陽陽中之陰俱衰四時無汗其形不久濕衰燥旺理之常也其形不久者秋氣主殺生氣者胃之穀氣也乃春少陽生化之氣也張耘夫因閏二月盡天陰雨陰寒濕相雜緣官事



飲食失節勞役所傷病解之後汗出不止沾濡數日惡寒重添厚衣心胸間時作煩熱頭目昏憤上壅食少此乃胃中陰火熾盛與外天雨之濕氣峻熱兩氣相合令濕熱大作汗出不休兼見風邪以助東方甲乙之風藥去其濕以甘寒藥瀉其熱羌活勝濕湯主之									
炙甘草	三	黃耆	七	生甘草	五	生黃芩	酒黃芩	各	三
分 人參 羌活 防風 藁本 獨活 細辛									
蔓荊子	川芎	各	三	升麻	柴胡	各	半	薄荷	一
欽定四庫全書 普濟方									
右件都作一服水二大盞煎至一盞半細辛以下入輕清四味再上火煎至一盞去滓熱服之一服而止諸證悉去									
胡洽大露宿丸	草	出	本	主寒冷百病方					
礬石	煉	乾薑	桂心	皂莢	桔梗	各	二	附子	三
右擣篩蜜丸服如梧桐子大五九日三漸增以知為度									
治傷寒方									



右用半夏一升洗滑焙乾搗末小麥麪一升合和以	水搜令熱丸如彈子大以水煮令麪熟則藥成初吞	四五枚日二稍增至五十枚旋合旋服覺病減欲更	重合亦佳禁食錫與羊肉	治傷寒汗不出搐攣手脚 出本草	右用海蛤川烏頭各一兩川山甲二兩為末酒糊和	丸大一寸許捏扁置所患足心下劈葱白蓋藥以帛	纏定於暖室中取熱水浸脚至膝上久則水寒又添	欽定四庫全書 普濟方	熱水候遍身汗出為度丸一二日一次浸脚以愈為	度	治傷寒熱壯在臟腑狂躁煩滿大小便閉塞 出本草	取苦棗肉蜜為丸服佳	治傷風寒熱骨節碎痛出汗治中風面目浮腫咽喉不	通安胎婦目除肝穢邪氣安中利五臟益目睛殺百	藥 出本草	以葱葉作羹粥燂作齏食之良
----------------------	----------------------	----------------------	------------	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	---	--------------------------------------	-----------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------



治傷寒大毒嗽出本	以飴糖於蔓菁薤汁中煮一服頓服之	治傷寒熱毒出本	以人尿水漬飲彌善	病人兩手脉浮數而緊名曰傷寒若關前寸脉力小關	後尺脉力大雖不惡風不自汗此乃降氣已盛先見乎	脉也宜投藥和之表之也	調脉湯 陽明少陽也	欽定四庫全書 普濟方	葛根一兩 防風半兩 前胡七錢 炙甘草半兩	右為末每服五錢水二盞生薑一塊如棗大拍碎同	煎如寸脉依前力小加棗三枚同煎服	葛根柴胡湯 陽明少陽也	葛根一兩 柴胡一兩 芍藥 桔梗 甘草各五錢	右為末每服五錢生薑一塊葱白三寸同煎服	薄荷湯 陽明也	薄荷一兩 炙甘草 防風各半兩 人參七錢
--------------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------	------------------------------	------------------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---	-----------------------------	------------------------	--------------------	---	---------------------------	----------------	---



右為末水煎服	防風湯 陽明也	防風 _{兩一} 炙甘草 _{錢四} 旋覆花 桔梗 _{兩各半} 製厚朴 _{錢七}	半	右為末生薑一塊加荊芥穗五錢同煎	六物麻黃湯 太陽陽明也	麻黃 _{去節一兩} 葛根 _{半七錢} 人參 _{兩半} 炙甘草 _{兩半} 蒼朮 _{去皮七錢}	半	欽定四庫全書 普濟方	右為末棗二枚同煎服後猶惡風加荊芥穗七錢丁	香皮半兩	七物柴胡湯 太陽少陽也	柴胡 _{兩三} 蒼朮 荊芥穗 麻黃 _{去節各一兩} 炙甘草 _{錢七}	加當歸 _{兩一}	右為末生薑一塊棗三枚葱白三寸同煎	太陽證頭項痛腰脊強發熱惡風自汗脉尺寸俱浮緩者是勞也桂枝湯主之是陰經榮藥也閑衛氣使陰氣
--------	---------	--	---	-----------------	-------------	--	---	---------------	----------------------	------	-------------	---	-------------------	------------------	--



不泄此藥為衛虛而設也 若發汗過多發熱頭面搖 卒口噤反背張反背張者太陽兼陽明也去風養血防風 當歸散主之	防風 當歸 川芎 地黃 各一兩	右剉每服一兩水三盞煮至二盞去滓溫服 如無	汗者葛根湯主之 如有汗者桂枝加葛根	白朮湯 治傷風寒上解三陽下安太陽神方	白朮 二兩 如汗之改蒼朮	欽定四庫全書 普濟方	右呿咀煎服若發熱引飲加黃芩 生一兩 若頭痛惡風	加羌活散三錢半	太陽證頭項痛腰脊強發熱惡寒無汗脉尺寸俱浮而緊	是病發於陽陽者衛也麻黃湯主之是陽經衛藥也開	腠理使陽氣伸泄此藥為衛實也	傷寒見風脉傷風見寒脉二證大青龍湯主之老用桂	枝麻黃各半湯後改用九味羌活湯	黃耆建中加當歸湯
---	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---	----------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------



發表湯 太陽也		一劑		右麤末每服五錢生薑三片棗二枚水一盞半煎至八分去滓取七分清汁日三夜二服尺脉尚遲再作		黃蓍 當歸 各一兩 白芍藥 三兩 桂 一分 甘草 一兩	
麻黃 去節一兩半 蒼朮 舶上丁香皮 各七分 炙甘草 半兩		人參 半兩 當歸 半兩 加桂枝 五錢 細辛 半兩 如多減半		右為末生薑一塊棗三枚同煎		欽定四庫全書 普濟方	
經云有汗不得服麻黃無汗不得服桂枝若差則其變不可勝言故立此法使不犯三陽禁忌解表神方		羌活 一兩半 治太陽支節痛君主之藥也然非此無主也却亂反正之主也故大無不通小無不入關節痛		防風 一兩半 治一身盡痛卒伍卑下之職一聽君命將而行隨所使所引而至		蒼朮 一兩半 別有雄壯上行之氣能除濕下安太陰使邪氣不內傳之于足太陰脾	
細辛 五錢 治足少陰腎苦頭痛		川芎 一兩 治厥陰頭痛在腦		白芷 一兩 治陽明頭痛在額		生地黃 一兩 治少陰心熱在內	



黃芩 一兩治太陰肺熱在胸 甘草 一兩能緩裏急調和諸藥故有國老之稱	以上九味雖為一方然一不可執中無權猶執一也 當視其經絡前後左右之不同從其多少大小輕重 之不一增損用之其效如神呔咀水煎服若急汗熱 服以羹投之若緩汗溫服而不用湯投之也 脉浮而不解者先急後緩 脉沉而不解者先緩後 急	九味羌活湯不獨解利治雜病有神中風行經者加	欽定四庫全書 普濟方	附子中風秘澀者加大黃中風并三者合而成痺等 證隨十二經上下内外地寒熱溫涼四時邪氣加減 補瀉用之煉蜜作丸亦可加生地黃各半治兩感傷 寒如神用豆淋酒煎治破傷風	太陽經傷寒得裏胸中有熱胃有邪氣傳陽明本也腹 痛欲嘔者熱在內也宜黃連湯	甘草 黃連 乾薑 人參 各七錢半 大棗 三枚	右剉細每服五錢水煎服
--	---	-----------------------------	--------------------------	---	--	---	-------------------



發熱惡寒自汗脉緩發熱惡風無汗脉緩此二證易老 原用桂枝二麻黃一湯後亦改用九味羌活湯無論有 汗無汗並宜服之	易老利發九味羌活湯	治傷寒唇緊	右用鼈甲及頭燒灰作末傳之	治傷寒大熱心悶	右用槐子燒存性為末酒服方寸	欽定四庫全書 普濟方	治汗不出拘攣腰脚并耳聾	右用荆三稜茯苓米醋浸夏月浸四日冬月浸六日杵 為末醋湯調下三錢	治汗後霍亂者	右用敗扇燒為末和粉粉身上	發汗法 出活人書	凡發汗欲令手足俱能灑灑然一時許為佳不欲如 水淋漓服湯中病即已不必盡劑然發汗須如常服
---	-----------	-------	--------------	---------	---------------	---------------	-------------	-----------------------------------	--------	--------------	----------------------------	--



普濟方卷一百四十七									
欽定四庫全書									
普濟方									
禮百餘拜汗出自解									
效方									
一法無藥處可用兩手指相交緊叩腦後風府穴向前									
三汗之令腰脚周遍為度									
至足心覺微潤病即可解若病證仍在者三日內可									
須腰以上厚衣覆之令腰以上汗出淋漓而腰以下									

