

欽定四庫全書									
普濟方卷一百七十三 明 周王朱櫛 撰									
積聚門									
久積癥癖 附論									
癥之為病雖有形證推之不動癖之為病僻在脇肋按之水鳴此皆飲食留滯所致也不即治日漸增長盤結牢固邪氣日盛令人正氣衰微累歲不已甚則身瘦腹大名曰久積癥癖									
欽定四庫全書					普濟方				
方									
五石烏頭丸 治男子女人百病虛弱勞冷宿寒久癖及癥瘕積聚或嘔逆不下食并風濕諸病無不治之者									
鐘乳鍊		硫黃		礬石		紫金英		一作紫石英	
赤石脂		甘草		白朮		紫苑		防風	
山茱萸		桔梗		天雄		皂莢		細辛	
人參		附子		去皮		蘆薈		六銖	
						麥門冬		乾薑	
								吳茱萸	



芎 蜀椒 桂心 各二兩 烏頭 三兩 厚朴 遠志 茯苓	苓 各一兩 當歸 二兩 棗膏 五合 乾地黄 一兩 十株	右為末鍊蜜和擣五千杵如梧子大酒服丸日三稍	加之	夾食丸 一名丁香丸 治癥癖食氣食勞五隔痰逆并	夾食血氣疼痛	乳香 別研 木香 丁香 肉豆蔻 去殼 當歸 切焙 青橘	皮 去白 京三稜 炮剉各半兩 紫苑 去苗 乾薑 炮剉細 附子	欽定四庫全書 普濟方	炮裂去 巴豆 去皮心別研紙裹 鱉甲 去裙襖用醋	黃色 丹砂 一分 研如粉	右除乳香丹砂巴豆外擣羅為末然後乳香等三味	同研令勻都入臼中用蕎麥麪與藥末臨時以意看	多少如麪擣徐徐入新汲水擣候可丸即止丸如菽	豆大煎淡漿水令沸旋旋入藥煮三五沸漉出於日	中曝乾每服五丸食後用茶酒溫水下要轉時只以 冷茶下熱茶投即行也
----------------------------	-----------------------------	----------------------	----	------------------------	--------	-----------------------------	--------------------------------	------------	-------------------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------------



紫金丹 出聖濟
總錄

治男子婦人久氣塊癥癖兩脇下積

冷胸腹氣刺痛

鐵滓 一斤淘
淨控乾 硫黃 半斤水
飛過 硃砂 二兩

右三味先取鐵滓硫黃二味於瓷器內用米醋一斗

慢火煎硫黃火上無焰即燂乾刮此二味入瓷合內

固濟了用大火煨三度畢取合內藥再用水飛不用

鐵滓控硫黃令乾入細瓷合內坐在平地別用火一

秤煨至火盡取出入硃砂二兩同研令細再入合內

欽定四庫全書

普濟方

用火一斤就灰池中養三日放冷取二兩再入下項

藥

硃砂 半兩 木香 末 丁香 末 膩粉 丹砂 研 肉豆蔻 去殼

乾漆 末 炒煙 胡椒 末 阿魏 用醋化麪和作餅子
燒熟為末各一錢 砒

霜 末一
分半

右一十味研細再同硫黃研勻用酒醋鍾半煎五靈

脂薄麪糊丸如梧桐子大每服從五丸漸加至二十

丸以意加減服若取積滯癥癖及酒食積急氣冷氣



一切滯氣等疾更入後藥		巴豆仁 研一兩 大戟末 半兩 芫花末 半兩 草烏頭 一分 五靈		脂末 一兩 膩粉 二錢 硃砂 研半兩		右七味以米釀醋二升入銚子內熬成膏便與前藥		末搗為丸如梧桐子大量虛實加減服送一九加用		醋湯或茶清下		礞石丸 出華陀中藏經方 治男子婦人遠年積氣消磨癥塊		取虛中積脇肋堅硬腹刺痛及治脾滯氣酒食所傷		欽定四庫全書		普濟方		飲食不化惡心嘔逆胸膈不快不思飲食胸腹脹滿		臍脇有塊心脾冷痛口吐酸水停飲冷痰痞癥瘕		發痛無度翻胃轉食面黃瘦乏四肢頭面浮腫臟腑		不調裏急後重及十隔氣虛中有積婦人血氣塊硬		悉主之		礞石 半兩青色者生用 擣羅為細末 硃砂 丁香 桂 去麤皮 乾薑		炮各二兩 木香 京三稜 煨 蓬莪茂 煨 芫花 醋浸一宿炒 檳		榔 煨剉 猪牙皂夾 去皮 肉豆蔻仁 各一兩 青橘皮 湯浸去白	
------------	--	---	--	---	--	----------------------	--	----------------------	--	--------	--	--	--	----------------------	--	--------	--	-----	--	----------------------	--	---------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	-----	--	---	--	---	--	--	--



焙 白豆蔻仁 墨 燒八分熟 巴豆 一兩半去皮 椒 分一兩半兩生用半 粉霜 細研一分	右為末用醋三升飛礪砂於銀石器中文武火熬二十沸次入巴豆又熬五七沸次入礪石京三稜末又	熬三五沸次取白麵二兩以無灰酒半升調入藥中又熬一兩沸次入大黃末又熬三兩沸次下諸藥末	不住用柳木杖子攪勻候稠擣千杵丸如菉豆大每服三丸不問男女長幼心痛醋湯下左脇下疼煎薑	欽定四庫全書 普濟方	棗湯下右脇下疼煎木香湯下婦人血癖血氣炒生薑醋湯下以患冷痢煎黃連湯下小兒常服冷水下	有姪者不得服小兒以意減丸數	陳橘皮煎丸 出聖濟 治以積冷氣攻心腹疼痛痰癖	嘔逆腹脹滿不思飲食肌膚瘦瘁腰膝倦痛下痢洩瀉瘧疾腸風并婦人血海以冷無子	陳橘皮 湯浸去白焙十 巴戟天 去心 石斛 去根 牛膝 酒浸	切 草薺 各三 肉蓯蓉 酒浸 鹿茸 去毛 杜仲 去麋皮
--	---	---	---	-----------------------	---	----------------------	-----------------------------------	---	--	--



菟絲子 酒浸三日 附子 炮裂去 陽起石 酒浸研 厚	朴 去麤皮生 甘草 炙剉 吳茱萸 湯洗焙 當歸 切乾	薑 炮 京三稜 煨	右為末先以好酒五椀於銀石器內煎橘皮末令如 錫入藥攪勻再擣三五百杵稍乾更入酒少許和丸 如小菴豆大每服二十九至三十九丸空心溫酒下塩 湯下亦得	治一切塊癖積氣血聚等一二十年疾	欽定四庫全書 普濟方	細墨 半兩 芫花 醋浸炒 青礞石 大戟子 乾漆	炒 五靈脂 荊三稜 蓬莪茂 蜜陀僧 陳皮	牡蠣 各半 巴豆 一兩去皮濕紙三四重裹燒 白丁	香 硃砂 研 蜜蟲 去翅 班蝥 去翅頭 各一分	右為細末酒醋煮糊為餅子每服十餅用煮麵湯送 下宜食前服	溫白丸 出鮑氏方 治心腹積聚久癥癖塊腹脹心下堅結	大如杯椀傍攻兩脇心痛積年食不消化等病並治
---	---	--	---	-----------------	---------------	---	-------------------------------------	---	--	-------------------------------	--	----------------------



之									
紫苑	二分	淨洗	吳茱萸	二分	淨擇	葛蒲	一分	去蘆米泔	
柴胡	二分	去蘆	厚朴	二分	去皮生自然	桔梗		皂莢	去
尖茯苓	各二分	水洗過	桂心	三分	生用	乾薑	炮	黃連	各二分
子	各二分		生	三分		乾薑	炮	黃連	各二分
用紙襯於銚內			巴豆	稍焦為度	爛研	巴豆	以紙裹		
出汗去根枝			度換						
壓出油如此			人參	各三分	本	烏頭	十分	炮	
新紙然後入衆藥			方	各二分		烏頭	裂後掘		
地坑內之用蠶子蓋一饌間									
却出烏頭去尖皮再切用									
右搗篩以白蜜和更搗二千五杵丸如梧子大有病									
欽定四庫全書									
普濟方									
服一丸至二丸不知稍增至三丸五丸以知為度主									
心腹積聚久癥癖塊大如杯椀黃疸宿食朝起嘔吐									
肢滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻脇徹									
背連胸痛無常處繞臍攪痛狀如蟲咬又療十種水									
病八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五淋九種心痛積									
年食不消化或婦人諸疾斷緒不生帶下淋瀝或痰									
癰連年不差又療一切諸風身體頑痺不知痛癢或									
半身不遂或疼痛或眉髮墮落又療七十二種風三									



欽定四庫全書		普濟方		十六種遁尸症或癰癤或婦人五邪失心夢與鬼神 交通四肢沉重不能飲食昏昏默默口欲取死終日 憂愁心中不樂或恐懼悲啼飲食無味月水不調直 似懷孕連年累月羸瘦困敝遂至於死或歌或哭為 鬼所亂莫之知也但服此藥者莫不除愈臣之方驗 便合藥與婦人服之十日下出癰癰蟲長二尺五寸 三十枚下膿二升黑血一升青黃汁五升所苦悉除 當日有子臣兄墮馬被傷腹內有積血天陰即發羸											
木香丸		治遠年癰塊積聚		瘦異常命在旦夕與藥服下如鷄肝黑血如手者二 百餘片白膿二升赤黃水一升其病即除臣之方驗 敢不獻上忌生冷酥滑猪鷄魚犬牛馬鵝肉五辛油 麵豆糯米陳臭等物一方無肉桂用生薑湯下											
木香		硃砂		出聖濟 總錄 當歸 研 一兩 炒各 礞石 研三 分 大黃 煨 陳											
麵者		麥蘖		不炒 墨 研 白麪 各半 大戟 炒 乾漆 炒煙											
鼓許		膩粉		少 分 各一 巴豆仁 一錢一分 不出油研											



右為末以臈月雪水同搗三二百杵丸如菴豆大每服一丸空心用乾柿爛嚼裹藥隨所傷物煎湯下不得吐津		得吐津		蟹甲丸 出聖濟總錄 治久積癥瘕		蟹甲 大者一枚淨洗去筋膜麵裏外面二三分厚上面用紙固濟泥一風爐子安蟹甲在上面別入桃仁半斤去尖皮雙仁研以米醋四升無灰酒三斤礪砂三兩同攪拌旋入向蟹甲中煎為膏取出用合盛却將蟹甲去紙泥炙令黃色 青橘皮去白 麥藥炒 沉香剉		肉豆蔻去殼各 丁香 木香 檳榔半生 陳麴炒		欽定四庫全書 普濟方		京三稜煨 大黃生 厚朴去粗皮生薑拌 柴胡去苗		桂去粗皮 二兩		右為末再研令勻用桃仁煎并熟蜜和丸如梧桐子大空心米飲下二十九		水銀丸 治久虛損癥瘕		水銀 鼓研 礞石末滴酒和勻瓷合內 膩粉 京		三稜末 石三稜末 鷄爪三稜末 粉霜 白		丁香末 礪砂研各三錢 肉豆蔻去殼 檳榔各二枚 丹	
--	--	------------	--	---	--	--	--	---	--	-----------------------	--	---	--	-----------------------------------	--	--------------------------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--



砂 三錢 研	右合研勻細用棗肉和丸如菜豆大每服五丸溫水下又一方治丈夫病入懷香補骨脂各一分治婦人病入血竭沒藥各一分	三稜丸 治多年積氣癥癖	京三稜 剉 煨 鷄爪三稜 剉 煨 陳橘皮 青橘皮 各湯浸 去白焙	巴豆 去皮心 膜出油 石三稜 煨 剉 各 檳榔 十枚半生 半熟剉 肉豆	蔻 十枚去殼 醋浸二宿 丁香 益智 去皮各 木香 二兩 硃砂 一兩	欽定四庫全書 普濟方	過 半飛	右為末醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服三丸如當	心氣塊茱萸湯下左右氣塊木香湯下本臟氣塊懷	香子湯下	人參丸 治久癖塊聚心腹脹滿	人參 元參 沙參 丹參 防風 去 苦參 附	子 炮裂去皮 臍各一兩 巴豆 去皮心 煮研 蜀椒 去目并閉口 炒出汗一分乾	薑 炮半 廔蟲 三枚 熬 葶藶 一合 炮炒研
--------------------------	---	-------------	---	--	---	---------------	---------------------	----------------------	----------------------	------	---------------	--------------------------------------	--	---



右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每食後米飲下一丸 未利再服一方用大黃四兩	蓬莪茂散 治久積癥癖氣不散脇下似覆杯多吐酸 水面目萎黃或腹中疼痛	蓬莪茂 一兩 鱉甲 二兩 醋炙 赤芍藥 兩半 肉桂 一兩 去皺 皮 枳殼 一兩 當歸 一兩 乾薑 兩半 京三稜 一兩 泡 川大	黃 一兩 劉 木香 一兩 柴胡 一兩 半 檳榔 一兩 碎 微炒 兩 柴胡 去苗 檳榔 兩	右件為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六 分去滓不計時候溫服	三稜沒藥丸 治遠久沉積塊疼悶 京三稜 泡 廣茂 煨 檳榔 鱉甲 醋炙 石礬 燒 赤青皮 去油	乾漆 炒煙 雷丸 各半 丁皮 硃砂 沒藥 各二錢 右為細末醋糊為末如菉豆大每服五七丸白湯下	食前日進四服	丁香丸 治久積食癖心腹時發疼痛胸膈不快痰逆 惡心臟腑不調不思飲食或下痢膿血裏急後重穀
-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	-----------------------------------	---	--	--------	---



惡氣逐滯結		丁香 木香 桂 去粗皮 阿魏 麝裏煨 麝香 研 硫黃		研水銀 二味於盞內結成 硃砂 研 粉霜 胡粉 研明 巴豆 去皮 心		右十一味搗羅三味為末與八味合研勻用安息香半兩酒化濾過入蜜少許重湯同熬和劑旋丸如梧桐子大每服三丸至五丸臨時煎生薑棗湯下更看虛實加減取下積聚惡物為効		欽定四庫全書 普濟方		三稜湯 治久積癥癖不散心下結成狀如伏梁		京三稜 炒 鱉甲 醋炙去裙襴 大腹 剉炒各一兩 桂 去粗皮 白芍		藥 陳橘皮 去白焙 當歸 切培 枳殼 去瓢 高良薑 各三分		木香 訶梨勒 煨去核半兩		右細剉每服五錢水一盞半煎取八分去滓溫服		鱉甲丸 治久癖結兩脇臍下堅如石按之痛劇食飲不下		鱉甲 去裙襴醋炙二兩 牛膝 酒浸切焙 芎藭 防葵 當歸 切焙	
-------	--	---	--	---	--	--	--	------------	--	---------------------	--	--	--	---	--	-----------------------------	--	---------------------	--	-------------------------	--	---	--



乾薑炮 桂皮去粗 附子炮 甘草炙各一兩 大黃剉一兩半 巴豆一枚	右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心溫酒下三丸加至五丸日一服以利為度一方用細辛四分粥	飲下	大黃丸 治久積癥癖堅牢羸瘦不能飲食宜服	川大黃剉一兩 乾薑炮一兩 川芒硝一兩 桔梗一兩 石膏半兩	甜葶藶半一兩 赤茯苓半兩 附子半兩 杏仁湯浸半兩 川烏	欽定四庫全書 普濟方	頭半兩 川椒半兩 去膜	右件藥為末入研了藥令勻鍊蜜和搗三二百杵丸	如菉豆大每服不計時候溫酒下二十丸	蓬莪茂丸 治久積癥癖氣攻左脇如覆杯及婦人血	瘕	蓬莪茂兩炒一 桂去粗皮三分 芍藥 檳榔剉 枳殼去瓢 當	歸切 木香 昆布洗去鹹汁 沉香剉 白芷炒各半兩	右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸煨薑木
--	---	-----------	----------------------------	--	--	-----------------------	--	-----------------------------	-------------------------	------------------------------	----------	--	--	-----------------------------



瓜湯下	木香丸 出聖濟總錄 治五毒五積五勞并一切氣疾癥癖	塊及遠年積	丁香 半兩 附子 泡裂 烏頭 去皮 檳榔 剉 芫花 醋炒 大戟 炒 甘	遂 炒 紫苑 去苗各一分 硃砂 醋飛過焙 膩粉 研一分半	右一十味先將八味搗羅為細末入藥研和勻麪糊	丸如梧桐子大每服七丸至十丸醋湯下	消積丸 出聖濟總錄 治久積癥癖冷熱不調痰逆否悶心	欽定四庫全書 普濟方	腹刺痛喘滿膨脹泄利羸困不思飲食	代赭 煨醋三遍 礞石 研各一兩 白茯苓 去皮黑 桂 去粗皮 青橘	皮 湯洗 巴豆 去皮心 京三稜 煨 棟實肉 各一分 硃砂 研三分	右為末拌勻酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服二丸	木香湯下看虛實加減	桃仁散 出聖惠方 治久積癥癖氣結不散面色萎黃羸瘦	食少宜服	桃仁 一兩湯浸去皮尖雙仁 鱉甲 二兩半塗醋炙令黃 京三稜 一兩 泡 剉 當
------------	--	--------------	--	---	-----------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	------------------------	---	--	-----------------------------	------------------	--	-------------	--



歸 劉 三分 肉桂 一兩 枳實 一兩 木香 半兩 檳榔 三分 川大	黃 劉 三分	右件藥為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服	麝香丸 出聖 惠方 治久積癥癖氣不差或於脇肋作塊形大如杯或如鷄子大透隱皮膚或時疼痛堅硬如石	宜服	麝香 一兩 蓬莪茂 三兩 草薢 二兩 芫花 二兩 神麴 二兩	欽定四庫全書 普濟方	炒 一兩 鱉甲 二兩 大麥蘖 一兩 乾漆 一兩 京三稜 二兩	右件藥為末入麝香研令勻用醋煮麪和丸如梧桐子大每服食前溫酒下十丸	附子丸 治久積癥癖腹滿不能食	附子 一兩 巴豆 三十枚 廬蟲 五十枚 川椒 一合 乾薑 半兩	防葵 一兩 甜葶藶 一兩 合川大黃 一兩	右件為末研入巴豆令鍊蜜和搗三二百杵丸如梧
---	------------------------------	---------------------------------------	---	-----------	--	-------------------	--	--	-----------------------	---	--	-----------------------------



欽定四庫全書		普濟方		比金丸		產後敗血不行兒枕刺痛小兒如癖常服利胸膈除		傷滯		沒藥		硃砂		右為細末用大棗十枚去核刮巴豆膏入在棗內線		纏了慢火炙熟去線搗爛與前項藥末合勻搗成泥		丸如菉豆大大人臟腑實者五丸虛者三丸小兒芥	
出聖濟		總錄		治久積伏滯成塊婦人血癖血塊及		傷滯		沒藥		硃砂		右為細末用大棗十枚去核刮巴豆膏入在棗內線		纏了慢火炙熟去線搗爛與前項藥末合勻搗成泥		丸如菉豆大大人臟腑實者五丸虛者三丸小兒芥		丸如菉豆大大人臟腑實者五丸虛者三丸小兒芥	
巴豆丸		巴豆		右件藥京三稜乾漆為末入在巴豆醋內同熬及一		半次入硃砂更熬令稠後下大黃青橘皮附子香墨		等和搗三二百杵丸如菉豆大每服空心煎橘皮湯		下三丸血癥塊即用當歸酒下一切惡物溫酒下		湯浸附子		巴豆		巴豆		巴豆	
治久積癥癖及一切惡氣並服		去一兩		京三稜		乾漆		川大黃		香墨		青橘皮		去一兩		去一兩		去一兩	
巴豆丸		巴豆		巴豆		巴豆		巴豆		巴豆		巴豆		巴豆		巴豆		巴豆	



子大一歲三丸五七歲以上七丸十歲以上十丸取 積用燒皂子膿煎湯放冷下利胸膈用棗二枚爛嚼 裹藥乾嚥不得嚼藥並臨卧服急患不拘時一方粥 飲下		硃砂丸 出王氏 博濟方 治久積癥癖塊心腹脹滿胸膈不利		痰實胃脹喧		硃砂 好者 二錢 狼毒 剉醋 炒乾 芫花 醋浸 一宿 乾漆 炒煙 出 鰲甲 炙 各		一 兩 雄黃 好者 一分 巴豆 三七 粒		欽定四庫全書 普濟方		右為末和勻煮麪糊丸如豌豆大每服三丸食後臨 卧溫生薑湯下		京蓬煎丸 出聖生 拔萃方 治痰癖消癥塊冷熱積聚胃膈症		悶通利三焦升降陰陽順一切氣消化宿穀		京三稜 二兩酒浸 冬三日 枳殼 麸炒 去瓢 廣茂 二兩醋浸 冬二日 木香		末 青皮 去 油 茴香 微 炒 檳榔 各一 兩		右為細末水糊為丸豌豆大每服三十丸生薑湯下		加硃砂水銀治肉積 神麴麥蘖治酒積 水蛭	
--	--	---	--	-------	--	--	--	---	--	---------------	--	--------------------------------	--	---	--	-------------------	--	---	--	---	--	----------------------	--	---------------------	--



蜜虫治積血 木香檳榔治氣積 甘遂牽牛治水積	雄黃膩粉治涎積 礞石巴豆治食積要在臨時	通變也	療腹中癥癖兼虛熱者不用純冷專瀉藥宣羈縻攻之	方	鱉甲炙 龜甲炙 桑耳金色 大黃 吳茱萸 防葵	各八分 附子泡四	右搗篩蜜和為丸如梧桐子大酒服十丸日再服漸	欽定四庫全書 普濟方	加一丸以微洩為度無所忌日晚服馬莧汁三四合	以差為期馬齒菜即馬莧也忌猪肉冷水	京三稜丸出聖 治久積癥癖氣不差令人羸瘦不思	飲食	京三稜二兩 川烏頭一兩 礞砂一兩 陳橘皮二兩 乾薑一兩	雄雀糞一兩 微炒	右件藥為末入礞砂研令勻以醋煮麪糊和丸如梧	桐子大每於食前以酒下十丸
------------------------------	----------------------------	------------	------------------------------	----------	--	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------	---	-----------	---	--------------------------------	-----------------------------	---------------------



沉香三稜煎丸 出聖濟總錄 治臟腑久積氣塊冷痞不思飲食	沉香 人參 各一兩 青橘皮 湯浸去白焙一兩半 京三稜 三兩搗末	右以三味為入三稜礱砂煎內和丸成劑有餘煎更於火上慢熬搗千百杵丸如桐子大每服三十丸食前米飲下婦人醋湯下日再	三稜草煎方 出本 治癥癖又主鼓脹滿	右以京三稜切一石水五石去滓更煎三斗汁銅器	欽定四庫全書 普濟方	中重釜煎如稠糖出內蜜器中每服一匙用酒一盞服之日二每服常令酒氣相續	熨癥癖方 出聖惠方	吳茱萸 一升 川烏頭 三兩	右件藥搗碎用醋拌炒令熱分作二包更番熨之	治久積癥癖及元氣急痛方 出聖惠方	川烏頭 二兩 川椒 一兩去目	右件藥為末用鷄子白和丸如麻子大每服不計時
---	--	---	----------------------------------	----------------------	---------------	----------------------------------	--------------------------	---	---------------------	---------------------------------	--	----------------------



欽定四庫全書		普濟方		防葵		能飲食		防葵丸		更服		治久積癥瘕及心腹鼓脹並宜服此方		候溫酒下十九	
出聖濟		出聖濟		出聖濟		出聖濟		出聖濟		出聖濟		出聖濟		出聖濟	
總錄		總錄		總錄		總錄		總錄		總錄		總錄		總錄	
治癥瘕氣塊		治癥瘕氣塊		治癥瘕氣塊		治癥瘕氣塊		治癥瘕氣塊		治癥瘕氣塊		治癥瘕氣塊		治癥瘕氣塊	
右除研外搗羅為末入郁李仁同研勻鍊蜜丸如梧		右除研外搗羅為末入郁李仁同研勻鍊蜜丸如梧		右除研外搗羅為末入郁李仁同研勻鍊蜜丸如梧		右除研外搗羅為末入郁李仁同研勻鍊蜜丸如梧		右除研外搗羅為末入郁李仁同研勻鍊蜜丸如梧		右除研外搗羅為末入郁李仁同研勻鍊蜜丸如梧		右除研外搗羅為末入郁李仁同研勻鍊蜜丸如梧		右除研外搗羅為末入郁李仁同研勻鍊蜜丸如梧	
桐子大空腹溫酒下二十九方有赤芍藥無赤茯		桐子大空腹溫酒下二十九方有赤芍藥無赤茯		桐子大空腹溫酒下二十九方有赤芍藥無赤茯		桐子大空腹溫酒下二十九方有赤芍藥無赤茯		桐子大空腹溫酒下二十九方有赤芍藥無赤茯		桐子大空腹溫酒下二十九方有赤芍藥無赤茯		桐子大空腹溫酒下二十九方有赤芍藥無赤茯		桐子大空腹溫酒下二十九方有赤芍藥無赤茯	
苓		苓		苓		苓		苓		苓		苓		苓	
鱉甲丸		鱉甲丸		鱉甲丸		鱉甲丸		鱉甲丸		鱉甲丸		鱉甲丸		鱉甲丸	
鱉甲		鱉甲		鱉甲		鱉甲		鱉甲		鱉甲		鱉甲		鱉甲	
炙黃芩		炙黃芩		炙黃芩		炙黃芩		炙黃芩		炙黃芩		炙黃芩		炙黃芩	
木香		木香		木香		木香		木香		木香		木香		木香	
烏頭		烏頭		烏頭		烏頭		烏頭		烏頭		烏頭		烏頭	
柴胡		柴胡		柴胡		柴胡		柴胡		柴胡		柴胡		柴胡	
當歸		當歸		當歸		當歸		當歸		當歸		當歸		當歸	
京三稜		京三稜		京三稜		京三稜		京三稜		京三稜		京三稜		京三稜	
桂皮		桂皮		桂皮		桂皮		桂皮		桂皮		桂皮		桂皮	
厚朴		厚朴		厚朴		厚朴		厚朴		厚朴		厚朴		厚朴	
陳橘皮		陳橘皮		陳橘皮		陳橘皮		陳橘皮		陳橘皮		陳橘皮		陳橘皮	
甘草		甘草		甘草		甘草		甘草		甘草		甘草		甘草	



灸 劉檳榔對各半兩 大黃對碎炒 朴硝研如粉各三兩	右除朴硝擣羅為末同研令勻煉蜜和丸如梧桐子 大空心服用溫酒下十丸米飲下亦得	大戟丸出聖濟總錄 治癥癖化氣取食積及本臟氣水痰	蟲脹	大戟半兩 芫花醋炒一兩 巴豆一百粒去皮油 甘遂 乾薑炮 陳	橘皮去白焙 硃砂 姜黃 桂去粗皮各一分	右為末於銀器內炒令極熱勿令焦鍊蜜丸梧桐子	欽定四庫全書 普濟方	大常服生薑湯下一丸如取轉量臟腑虛實加減	檳榔湯出聖濟總錄 治癥癖腹滿如鼓坐卧不安食即欲	吐氣悶喘急	檳榔二兩 赤茯苓去黑皮 芍藥 京三稜 陳橘皮湯浸	各一兩湯浸退 郁李仁皮一兩 食茱萸三分	右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服空	心午後用	柴胡湯出聖濟總錄 治癥癖氣腹痛脇肋脹滿不思飲食
--	--	---	-----------	--	--	-----------------------------	--	----------------------------	---	--------------	--	---	-----------------------------	-------------	---



柴胡去苗 赤茯苓去黑皮 桔梗炒 木通炙 芍藥 鱉甲去裙襴 郁李仁湯浸各半兩	右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服 空腹午後用	五食丸 治虛積食氣蠱脹水氣年深癥癖 大戟刮去皮 甘遂各半兩 猪牙皂莢生去皮 胡椒一分 芫花半兩醋浸一宿炒乾 巴豆半兩去皮	右為末合研勻水煮麪糊和丸如菉豆大每服五丸	欽定四庫全書 普濟方	用米麪菜肉豆煎湯放溫下量病人大小加至七丸 婦人有胎不可服	牛膝丸出聖濟總錄 治癥癖積聚	牛膝酒浸 芍藥 桔梗 赤茯苓去黑皮 厚朴去粗皮 大黃剉 芫胡去苗 訶梨勒各三兩 陳橘皮去白 檳榔剉 枳實各一兩	殼炒一兩	右末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心棗湯下加至三十九通利為度
--	--	--	-----------------------------	--	--	--------------------------------------	---	----------------------------	---------------------------------------



消癖丸 出危氏方 治彌年經吐汗下營衛虧損邪氣伏藏	脇間結為癥癖腹脇疼痛	芫花 炒 硃砂 各等分	右為末鍊蜜丸如小豆大每服十丸濃煎棗湯下去	癖須用芫花大戟破水之劑下後即與養胃湯	治癥癖 出本草	右用馬薊汁飲之小兒服尤良	金寶神丹 楊氏家藏方 治諸積癖塊血刺心腹下痢赤白	欽定四庫全書 普濟方	及婦人崩中痛下一切虛冷之疾尤治飲食過多臟腑滑泄久積久痢並皆治之	青礞石 半斤細羅過將消石二兩細研	右件滴水圓如小鷄頭大候乾再入乾鍋內少火煨	火紅收之每有虛冷病服一九至二三丸空心溫水	送下少食壓之以病泄痢加至五七圓或十丸不妨	烏金餅子 治堅癥積塊狀如覆杯腹不下食及至婦	人血氣刺痛
---	------------	---	----------------------	--------------------	------------------------	--------------	---	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------



乾漆一兩炒焙 出為末 沒藥一分 硃砂一錢	右為細末棗肉和圓如桐子大作餅子每服三餅子	男子塩湯婦人醋湯食後服	治癰癖血瘕破血出本	右用馬鞭草作煎如糖酒服	治風冷癰癖出本	右用木天苓苗藤切以酒浸服或以釀服大効	治癰癖病又治瘰癧氣	欽定四庫全書 普濟方	鱉甲 訶梨勒皮 乾薑	右各等分細末為丸空心下三十丸日再服如專治	瘰癧氣可醋炙鱉甲大黃為末以牛乳一合和一匙	可朝朝服之又和琥珀大黃作散酒服二錢少時惡	血即下若婦人小腸中血下盡即休服	療癖令人肥悅出本	右用理石漬酒服之	治老癖能為寒熱者出本
--	-----------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------------	-----------------	----------------------------------



右用蛤蜊煮食之

治積塊

用山中生小蒜以醋服之甚効

癥瘕

附論

夫癥瘕者皆由寒濕不調飲食不化與臟氣虛冷所生也其病不動者直名為癥若病雖有結瘕而可推移者名為瘕瘕者假也謂虛假也脉動可候其人發語聲嘶澀舌語而不出此人食結在腹其病寒口中常有水出

欽定四庫全書

普濟方

四體灑灑常如發瘧飲食不能常自鬱鬱而痛此食瘕病也診其脉沉而中散者寒食瘕也脉絃緊而細瘕也若在心下則寸口脉絃緊在胃管則關上絃緊在臍下則尺中絃緊診脉瘕法左手脉橫瘕在右手脉橫瘕在右又脉頭大在上頭小在下脉來遲而牢者為病瘕也腎脉小急肝脉小急心脉若數皆為瘕寸口脉結而伏者腹中有瘕不可轉動必死不治

方



硃砂丸 治血氣癥瘕氣塊黃瘦者肚痛不忍	硃砂 錢三 全蝎 錢二 丁香 錢二 蓬朮 兩半 三稜 兩半 沒藥 兩半 芫	青 錢二 紅娘子 錢二 蛇蛻 錢二 水蛭 錢二 阿魏 兩半 乾漆 兩半 炒四錢	地膽 炒半兩 斑蝥 炒二錢 海馬 醋一對 甘草 兩半 人參 兩半 當	歸 兩一 狗脊 兩半 穿山甲 錢三 蛤粉 麝香 許少	右為細末醋糊為丸梧子大每服二三十丸空心醋	湯送下	如意丸 治積聚塊痛疝瘕癥癖等疾	欽定四庫全書 普濟方	沉香 木香 大丁香 草澄茄 使君子 辣	桂 川白薑 桃仁 五靈脂 硃砂 醋浸半兩 雄黃	好 沒藥 大戟 牽牛 炒取末 巴豆 去油各一分 荆三稜	末 蓬朮 肉豆蔻 兩各半	右為末水煮麪糊丸如麻子大每服二九加至三九	止溫酒下	化癥丸 治丈夫婦人小兒年深日近沉積瘕塊面色青黃時上搶心吐水吞醋舌生白沫婦人積年月經
---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-----------------------------	------------	------------------------	-------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------	--



不調漸成血氣或血蠱塊中焦之間覆如杯碗連年
 累月漸至瘦瘠寒熱往來一切脾胃受寒久不痊愈
 之疾並皆治之

巴豆五兩 丁香二兩 木香一兩 蓬莪茂三兩 荊三稜三兩 丁

香兩 厚朴三兩 石菖蒲二兩 良姜一兩 蜜蟲一兩 川牛

膝一兩 石蓮子二兩 薏苡仁一兩 使君子三兩 香附子四兩

右為末稀麪糊為丸如菉豆大積年癥瘕成塊第一

服用熟水下二十九丸自後每日三丸更量虛實加減

欽定四庫全書

普濟方

五日去盡積塊日近脾胃有積者每服五丸飯飲吞

下婦人血氣成塊及血瘕每服二十九丸蘓木用酒童

子小便各一半煎五七沸溫酒空心吞下自後每日

用溫酒下三丸其血塊逐旋消從大小二便去盡自

知小兒蛔蟲腹痛不能忍日夜叫喚橘皮湯下七丸

諸蟲皆宣下常服白湯或薑湯下三五丸中酒及酒

積大便鮮臭者白湯舊酒各半吞下七丸一切噎塞

心下硬痛加棗湯下五丸不拘時候



大黃丸 治久積癥瘕發動心腹疼痛不可忍	大黃^{二兩}雄黃^{兩半}麝香^{錢二}天雄^{炮一兩}硃砂^{分一}胡椒^{兩半}	巴豆^{枚十四}檳榔^{兩四}當歸^{兩一}桂心^{兩一}木香^{兩半}京三稜	二犀角屑^{兩一}乾薑^{炮半兩}	右件藥為末入研了藥令勻鍊蜜和搗三二百杵丸	如小豆大每服空心以酒粥飲下七丸	防葵丸 治癥瘕喘嗽腹中疼痛喫食減少四肢乏力	防葵^{分三}桂心^{兩半}木香^{兩半}桔梗^{分三}吳茱萸^{兩半}鱉甲^{兩一}	欽定四庫全書 普濟方	半川大黃^{劉一兩}京三稜^{分三}當歸^{兩半}赤芍藥^{分三}五味	子^{兩半}檳榔^{半一兩}郁李仁^{湯浸一兩}	右搗藥為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每	服不計時候以酒下二十丸	三聖丸 治積年癥瘕瘕塊諸藥療理不瘥至效	舶上硫黃^{兩一}水銀^{兩半}硃砂^{分一}	右三物乳鉢內研如粉却以生鏤銚內用文武火熬	鎔成汁以火筋攪令勻停冷刀剗下以紙裹置地坑
---------------------------	--	--	--	-----------------------------	------------------------	------------------------------	--	-----------------------	--	---	-----------------------------	--------------------	----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------



內埋一宿取出再研細次以									
赤芍藥 當歸 京三稜 蓬莪茂 紅花 各一分									
並細剉以法酒一升煎及一半漉出砂盆內研生布									
袋取汁再熬令冷入飛羅麪為糊搗丸如菴豆大治									
因產後傷於飲食結伏在腹脇特發疼痛不可忍者									
當歸酒浸一升逐旋一升煖每服磨癖塊空心溫酒									
下三丸至五丸所有藥渣瀝了焙乾為末別入									
乾地黄 半兩 真蒲黃 芫花 各一兩									
欽定四庫全書 普濟方									
右為末以前一般糊丸如菴豆大治婦人血臟冷氣									
攻心疼一切血疾溫酒十丸									
木香丸 治癥瘕心腹脹痛胃膈煩悶不欲飲食四肢									
少力									
木香 三分 肉桂 三分 砒霜 一分 大戟 一分 京三稜 半兩 附子									
半兩 焙 乾薑 半兩 乾漆 半兩 膩粉 青橘皮 半兩 巴豆									
半兩 皮心 去									
右件藥為末入膩粉巴豆更研令勻用軟糯米飲和									



丸如小豆大每服空心以粥飲下三丸	硃砂丸 出聖方 治癥瘕腹內疼痛	硃砂 一兩 鱉甲 一兩 川大黃 一兩 木香 三分 肉桂 三分 附子	三分 巴豆 半兩 檳榔 三分 京三稜 二兩 乾薑 三分 皂莢 五挺	取汁為膏	右件藥為末入研了藥令勻以皂莢膏和丸如菴豆大每服空心以生薑湯下三丸	京三稜散 治癥瘕氣腹脹痛	欽定四庫全書 普濟方	京三稜 一兩 柴胡 三分 桔梗 一兩 木通 一兩 當歸 三分 赤茯苓 三分	苓 三分 赤芍藥 半兩 陳橘皮 半兩 鱉甲 半兩 郁李仁 三分 湯浸	右件藥為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎五分去滓溫服日三四服	鱉甲丸 治癥瘕或寒或熱羸瘦不欲飲食	鱉甲 一兩 桑耳 二兩 吳茱萸 三分 龜甲 一兩 附子 半兩 防葵	三分 白朮 半兩 川大黃 一兩 京三稜 一兩	右件藥為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每
-----------------	--------------------------------	--	---	---------------------	----------------------------------	--------------	---------------	---	---	--------------------------------	-------------------	--	--	----------------------



服以溫酒下二十九日三服	大通丸 治癥瘕神効	川烏頭 二兩 硫黃 一分 芫花 一兩 巴豆 一兩 杏仁 一兩	麝香 一分 黃丹 一分 猪牙皂莢 一兩 自然銅 一兩	研細	右件藥為末入研了藥令勻用黑豆麪和丸如菉豆	大以研了自然銅末滾過服空心煎生薑橘皮湯下	三丸	欽定四庫全書 普濟方	元胡丸 解化傷滯內消飲食治吐利腹脹心腹刺痛	癥瘕結氣蟲煩不安調順三焦安和脾胃	元胡 當歸 青皮 去白 雄黃 蓬莪茂 檳榔	木香 各四兩 荊三稜 六分	右為細末入雄黃勻水麪糊丸如梧桐子大每服三	十丸生薑湯下不拘時候	三稜湯 治癥瘕痞積聚不散堅滿痞隔食不下腹	脹
-------------	-----------	---	--	----	----------------------	----------------------	----	---------------	-----------------------	------------------	--------------------------------------	---	----------------------	------------	----------------------	---



荆三稜 二兩 白朮 一兩 蓬莪茂 半兩 當歸 半兩 檳榔 木香 分三	右為末每服三錢沸湯點服食後一日三服薑湯調服亦可	頂珠丸 治積氣塊痛久年脾積癖瘕之疾	丁香 木香 淡鼓 硃砂 各一分 巴豆 一錢半	右為末陳米飯為丸如梧桐子大輕者一丸重者二丸 欽定四庫全書 普濟方	丸臨卧先嚼煨薑如指許嚥下次以冷熟水吞藥不得嚼破上項一兩丸子請酌量用	芎藭散 治癥瘕久不瘥令人不能食羸瘦少力	芎藭 一兩 桂心 一兩 鰲甲 二兩 川大黃 二兩 檳榔 一兩 京三稜 一兩 一兩 微炒	右件藥為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓溫服日三	治癥瘕不消宜服此方 出聖惠方
---	-------------------------	-------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	--	-------------------------------	-------------------------------



川大黃 三兩 剉 鱉甲 二兩 檳榔 二兩 桃仁 一兩 湯浸枳殼 二兩 麸炒	右件藥為末用礬醋三升和攪令勻以慢火熬候可 丸如梧桐子大每服空心以溫酒下二十丸以通轉 為度	消石大丸 治二十癥瘕及婦人帶下絕產無子并欲 服寒濕散而腹中有癥瘕實者當先服之大丸下之 後與寒食散大丸不下水穀但下病其不令人困	硝石 六兩 人參 甘草 各二兩 大黃 半兩	欽定四庫全書 普濟方	右為末以三年苦酒三升置銅器中以竹筴柱器中 一升作一刻凡三升作三刻以置火上先內大黃常 攪不息手使微沸盡一刻乃內餘藥又盡刻餘一刻 極微火使可丸如鷄子大中黃凡合藥當先齋戒一 宿勿令小兒女奴婢人等見之欲下病者用二丸若 不能服大丸者可分作小丸然亦不可過四丸也丸 欲令大不欲令細能不分為善若人羸者可少與強 者可二十日五服和調半日乃下若婦人服之下者
--	---	---	---	--	---



或如鷄肝或如米汁正赤黑或一升或三升下後慎風冷作一杯粥飲之後作弄臍自養如產婦法六月則有子禁生猪肉辛菜若寒食散者自如藥法不與此同日一服	治癥瘕久不瘥令人不食羸瘦少力 鱉甲_{三兩}京三稜_{三兩}桃仁_{二百枚}	右件藥鱉甲三稜為末先將桃仁水入鐺中煎三五沸次下藥末同煎至一升漸漸入酒二升熬如錫收	欽定四庫全書 普濟方	瓷合中於食前以溫酒調下一匙	治癥瘕方 右用槲樹白皮煎令可丸服之取知病若不動減之	療癥瘕久瘕冷病 右以雄雀屎蜜和丸飲服或和少乾薑服之大肥悅人	療癥瘕瘕瘕并治五痔陰蝕濕痺女子陰隱瘡及骨節中寒熱
--	--	---	--------------------------	----------------------	---	---	---------------------------------



右以鱉甲水煮作浴漬之甚良	積氣丹 治一切新久沉積氣塊面黃黑瘦有氣無力	癥瘕積聚口吐酸水	檳榔 二枚 芫花 一兩 荆三稜 鷄爪黃連 牛膝 章	柳根 各一兩 青皮 陳皮 石菖蒲 各三錢 巴豆 木	香 各二錢半 大戟 川大黃 甘遂 白牽牛 乾薑	炮 青礞石 乾漆 各半兩 蓬莪茂 一兩 硃砂 二兩 肉豆蔻	二枚	欽定四庫全書 普濟方	右為末醋麪糊丸如梧子大每服一丸臨卧燒棗湯	下每夜一丸有積者肚內作聲病退為度	元胡丸 治積聚癥瘕解中外諸邪所傷	元胡 青皮 陳皮 當歸 木香 雄黃 荆	三稜 生薑 各一兩	右為末酒麪糊為丸如小豆大每服五七丸生薑湯	下	一握七丸 治臟腑宿蘊風冷氣血不和停滯宿飲結
--------------	-----------------------	----------	---	---	--	--	-------------------	---------------	----------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------------------	----------------------	---	-----------------------



右為細末先將乾漆鱉甲京三稜三味用粟米一盞 不淘洗釀醋五升同熬成粥入衆藥拌和丸如豌豆 大每服三丸爛嚼乾柿裏藥臨卧温下 黑神丸 消化癥瘕積聚酒食毒及冷氣膨脹五隔噎 氣婦人血氣	木香一兩 官桂二兩 附子一兩 當歸二兩 乾薑二兩 細墨一兩 白 朮二兩 荆三稜二兩 陳橘皮四兩 芫花四兩 巴豆二兩 檳榔半兩	硃砂半兩 大黃半兩	欽定四庫全書 普濟方	右十四味杵為末用醋麪糊為丸如麻子大如常服 化酒食茶湯下三五丸醋心腹脹橘皮湯下治癥瘕 生薑湯下婦人血氣紅花酒下多年饜食乾柿裏十 丸生薑湯下臨卧服	順氣丸 治積聚癥瘕積年氣塊發則大腸閉得通利 則病甦閉則復作	大黃五兩半 車前子 檳榔 麻仁 牛膝 郁李	仁 兔絲 山藥各二兩 山茱萸 防風 枳殼
--	--	--	--	---	---	---	--



獨活
各一
兩

右為末蜜丸如梧桐子大茶酒米湯任下此藥補益
通利疏風順氣

治癥瘕癖氣痞積聚冷氣血塊宿食吐痰水

用青黑大巴豆勿令白膜破但去其殼作兩片清麻
油略潤之空心溫水吞下一枚以飲壓少時腹內如
火利出惡物雖利不虛人若以服亦不利膜破者不
用全而一兩頭尖如棗核者名剛字能殺人

欽定四庫全書

普濟方

治癥瘕積聚去三尸益氣延年却老

右雄黃二兩細研為末九度水飛過却入新淨竹筒
內盛以蒸餅子一塊塞筒口蒸七度用好粉脂一兩
為丸如菉豆大日三服酒下七丸十丸

療癥瘕
出本
草

右羊脂同蒜齏食一升良

治腹內癥瘕
出本
草

右取鮫魚甲炙浸酒服之



治癥瘕積聚去三尸輕身益氣延年却老百病不侵甚

益人
草 出本

右用天門冬不計多少去心皮為末每服方寸匕日
三四服以酒飲之不絕

治瘕
草 出本

右用藕豆葉和醋煮服之

治鷄瘕
草 出本

以蘓木一升煮服昔南齊褚澄善醫為吳郡太守百

欽定四庫全書

普濟方

姓李道念以公事到郡澄見謂曰汝有重病荅曰舊
有冷病至今五年衆醫不瘥澄為診曰汝病非冷非
熱當時食白淪鷄子過多所致令取紫蘓一升煮服
乃吐一物如斤涎裏之能動開看是鷄雛羽翅爪距
具足能行走澄曰此未盡更服所餘藥又吐得如向
者鷄十三頭而病都差當時稱妙一說乃是用蒜煮
服之

治瘕瘕氣塊



琥珀一兩 鱉甲一兩 京三稜一兩 延胡索半兩 沒藥半兩 大黃	六銖	右六味一處為末空心酒調服三錢每日二服神効莫及	治癥瘕腰痛	用淡菜先煮熱漉出除去半邊鑊殼及毛將汁澄清再將淡菜半邊殼肉入內却入蘿蔔或紫蘇冬瓜同	煮食之妙	欽定四庫全書 普濟方	治癥瘕	用魚脂二升盛銅器中作大火炆脂上撚之令煖徹於癥上熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良	治蛟龍病誤食蛟龍子入腹中堅痞如石	用寒食錫三升每服五合一日三服遂吐出蛟龍有兩頭及尾寒食錫即寒食節日錫是也	昔開皇六年有人正月食芹得之其病發似癰面色青黃服寒食錫二升日吐出蛟龍有兩頭大驗
---	-----------	-------------------------------	--------------	---	-------------	-----------------------	------------	---	-------------------------	--	---



諸癥

積氣在腹中久不瘥牢固推之不移者癥也皆由寒溫失宜飲食不節致臟腑氣虛弱飲食不息按之其壯如盃盤牢結久不已令人身瘦而腹大至死不消診其脉弦而伏其堅不轉動者死之候也

方

蜥蜴丸 治癥堅水腫蜚尸遁尸百注骨血相惡氣鬼

忤蠱毒邪氣往來夢寤存亡留隱結積虎狼所噬獠

欽定四庫全書

普濟方

犬所咋鵠毒入人五臟服藥已消殺其毒食不消婦

人邪鬼忤亦能遣之

蜥蜴 蜈蚣 各二枚 地膽 五十枚 廔蟲 蜜蟲 杏仁

各三枚 蜣螂 十四枚 朴硝 巴豆 各一兩 欵冬花 犀角

切桃奴 澤瀉 桑赤鷄 鬼督郵 各十銖 芍藥 虎

骨 各兩半 甘草 乾薑 各一兩 甘遂 一兩

右為末別治巴豆杏仁如膏內藥末研調下蜜搗二

萬杵丸如麻子先食飲服三丸旦不知加知不敢吐



下者一丸有人風冷注癖堅二十年者差		乾漆丸 出聖濟總錄 破癥塊消積氣		乾漆 四兩 懷香子 炒令香 木香 檳榔 桂皮 去粗 附子		泡 青橘皮 白牽牛 陳橘皮 大黃 蓬莪茂		京三稜 芫花 各二兩 五靈脂 取灰二兩 皂角 長五寸		右為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服生薑湯下二十		丸至三十丸忌猪魚熱麪等物		半夏礞石丸 出聖濟總錄 治癥塊氣積下結胸一切積滯		欽定四庫全書 普濟方		半夏 四十枚 巴豆 四十粒 杏仁 去皮 猪牙皂莢 去皮四十挺 礞		石 研 丁香 木香 沉香 各二錢 檳榔 半兩 膩粉 硃		砂 粉霜 各一分		右將後八味搗研為末入在前膏子內一處再搗約		令均丸小豆大看虛實煎棗湯下二丸爛嚼乾柿乾		嚼下亦得		硃砂丸 治癥病不消四肢羸困不欲飲食久不差		硃砂 一兩 硫黃 一兩 木香 半兩 檳榔 一兩 川大黃 三兩 牽牛子	
------------------	--	---------------------------------	--	---	--	----------------------	--	---	--	----------------------	--	--------------	--	---	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	------	--	----------------------	--	---	--



一兩 吳茱萸 半兩 京三稜 一兩 當歸 一兩 肉桂 一兩 青橘	皮 一兩 鼈甲 一兩	右件藥為末入研了藥令勻鍊蜜和擣三二百杵丸	如梧桐子大每日空心及晚食前以溫酒下三十丸	巴豆丸 出聖 治癥病久不消令人萎黃羸瘦不欲飲	食	巴豆 一兩 硫黃 細研 附子 泡 五靈脂 乾薑 丁香	木香 肉豆蔻 檳榔 硃砂 乾漆 已上各半兩	欽定四庫全書 普濟方	右件藥為末入諸藥研令勻以麪糊和丸如黃米大	每服空心以酒湯下五丸得下惡物為効	大黃丸 治癥病心腹妨悶不欲飲食四肢不知	川大黃 半兩 木香 半兩 肉豆蔻 半兩 硃砂 半兩 乾薑 半兩 青橘皮 三分 吳茱萸 一兩 檳榔 半兩 桂心 半兩 蓬莪茂 一兩 巴豆 一分 去皮	右為末入巴豆硃砂研令勻以醋熬成膏和丸如梧	桐子大每服空心以粥飲下三丸
--	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	----------------------



驚甲丸 治癥塊衝心氣滿食不下手足煩悶	驚甲去裙襴 訶梨勒各二兩 防葵 甘草炙 人參 大	黃各一兩半 白朮 郁李仁去皮 桂皮去粗 杏仁去皮尖 各一兩	右除研外搗羅為末入郁李仁杏仁同研勻鍊蜜丸	如梧桐子大空腹溫酒下二十九丸漸加至三十丸以	微利為度	沒藥丸 治癥積五積食氣諸藥無効者	沒藥 硫黃 白丁香 當歸 芫花浸半日 硃砂	欽定四庫全書 普濟方	乳香 丹砂各一兩 巴豆四十粒	右為末合研勻用水浸炊餅和劑搗一千杵丸梧桐	子大豆麻子三等大每一丸婦人血氣童子小便和	酒下心頭高鞭當歸酒下遠癥積氣生薑湯下小兒	脾積癥氣臘茶清下大人與大丸十五以下與中等	十歲以下與第三等者	取積一塊氣丸 治男子婦人氣積	牽牛末二兩 檳榔末一兩 杏仁末一兩 羌活末一兩 神麴半兩
---------------------------	--	--	-----------------------------	------------------------------	-------------	-------------------------	---	-------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------	--



麥蘖兩半 雷丸肉兩半 江子兩一 黃岑兩一	右為細末湯浸蒸餅丸如梧桐子大硃砂為衣每服三歲服三丸五歲服五丸大人服十丸快利為度臨	睡溫水服	烏頭丸出聖 治食不消結成癥病	川烏頭兩半 京三稜兩半 芫花兩半 巴豆兩半 硃砂湯化	石兩半 川大黃兩半 青橘皮湯浸	右件藥搗羅為末入巴豆研令勻以酒一升相和以 欽定四庫全書 普濟方	慢火煎如稀餡火住後用丁香一分肉豆蔻半兩搗羅為末硃砂一分細研與前藥同和丸如菉豆大每	日早晨以生薑橘皮湯下三丸夜臨卧時服	京三稜丸出聖 治癥病結鞭心腹疼痛	京三稜兩半 檳榔兩一 木香兩一 乾薑炮一兩 陳橘皮兩一	桂心兩半 當歸剉一兩 巴豆兩半	右件藥為末用醋熬巴豆成膏入前藥末和丸如梧	桐子大每服空心以生薑橘皮湯下五丸
---	---	-------------	--------------------------------------	--	---	--	---	--------------------------	--	---	---	-----------------------------	-------------------------



當歸黃散 治諸癥結痛起於脇下按之而堅妨痛不能飲食漸加羸瘦	當歸 鱉甲 桂皮 木香 桔梗 桃仁 研如膏各	右除桃仁外搗羅為末入桃仁同研令勻每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服逐日空腹日一服夜半一服	保命丸 治積年血氣癥塊往來疼痛吐逆不納飲食	欽定四庫全書 普濟方	當歸 烏頭 芍藥 桂 各半兩 大黃 一兩 乾薑 半兩 班	右為末醋煮麪糊丸梧桐子大空心服食前溫酒下一丸	木香編丸 治癥塊消食積止心腹疼	木香 硃砂 各一錢 半夏 十枚 桂皮 去粗 華撥 四十粒 巴豆 二十粒 杏仁 二十粒	右為末先將杏仁巴豆同研入泥以好米醋八分一
-------------------------------------	---	---	------------------------------	-------------------	---	-------------------------------	------------------------	---	-----------------------------



盞熬至二分以下成稠膏入前藥末和勻再入棗肉	丸棗豆大捏徧丸常服食後良久一丸生薑湯下要	轉三丸男子婦人心痛炒棗服醋湯下	破積丸 療積聚堅癥	大黃一斤牡蠣三兩凝水石 石膏 石鐘乳 理石	各一兩	右搗合下篩如蜜丸如梧桐子大先食酒服飲任下	三丸日三不知稍增之以知為度	欽定四庫全書 普濟方	治腹中積癥方出千金方	右葶藶子一升炒以酒五升浸七日每服三合日三	服	粉砂餅出聖濟總錄 治癥塊	輕粉 胡粉各一兩 硃砂 丹砂 白丁香 膩粉	各半兩	右研為末入麪一兩水捏作餅如棗子大慢火燒熟	每服一餅麝香米飲嚼破服
-----------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------	--	---------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------	------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------------	--------------------



五靈脂丸 出聖 惠方 治癥病腹中結便	五靈脂 一兩 防葵 半兩 桂心 半兩 猪牙皂莢 半兩 木香 半兩	右件藥為末入巴豆更研令勻用醋煮麪糊和丸如	黍米大每服空心臨卧時以生薑酒下三丸	木香丸治積年癥塊血氣凝滯	吳茱萸 木香 青橘皮 各半兩 巴豆 去皮十粒 硃砂 一兩	分	右除硃砂外搗羅為末入巴豆硃砂研令勻於搪火	欽定四庫全書 普濟方	中煨粟米飯丸菴豆大每服溫酒下三丸至五丸食	後服瘡痢勿怪老小減服	硃砂丸 治癥病腹中硬痛不欲食經久不差羸弱無	力	硃砂 一兩 肉桂 一兩 巴豆 二十枚 禹餘糧 一兩 紫石英 一兩 細研	右件藥都研令勻以湯浸蒸餅和丸如菴豆大每服	食前以溫酒下五丸	治積年癥塊及血塊方 出聖 惠方
--	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------	--	----------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------	---	-----------------------------	-----------------	---------------------------------------





爛嚼取藥一九錐破并棗用同冷臈茶清下服後便 卧並不攪至中夜後取下積聚惡物為効 治癥堅心下有物大如杯不得食食則腹滿心腹絞痛 方	葶藶子 大黃 各二兩 澤瀉 四兩	右別研葶藶為膏其二味搗五百杵入蜜更搗千杵 和丸如梧桐子大每服五丸不知加之日三服	治脇下有氣結者	欽定四庫全書 普濟方	狼毒 二兩 旋覆花 一兩 附子 二兩 兩 泡	右搗篩蜜和丸如梧桐子大二丸稍加至三丸服之	療癥病丸	射蔴 二兩 蜀椒 三百枚 熬	右搗末細篩以鷄子白和丸半如麻子大半如赤小 豆先服如麻子漸服如小豆二丸不知稍增之以知 為度	熨癥方
---	---	---	----------------	--	--	-----------------------------	-------------	---	---	------------



竈中黃土

一斤 生葫 一斤

右先搗葫熟納土復搗以好苦酒澆冷浥浥先以塗布一面仍揜病上又塗布上乾復易之取冷消止一方有桂

熨癰方

右以吳茱萸三升碎之酒和煮熱布裹以熨癰上冷更炒更番用癰之移走逐熨都消乃止也肘後方云亦可用茵五兩茱萸末以鷄子白和塗上癰

欽定四庫全書

普濟方

熨癰法

右銅器受二升許貯魚膏令深三二寸作大火炆六七枚燃之令膏煖重紙覆癰上以器熨之盡夜勿息膏盡更益也

凡癰堅之起多以漸生而有覺便年大者自難療也腹中微有結積便害飲食轉羸瘦療多用陷水王壺八毒諸大藥令止取小小易得者方

右取虎杖根勿令影臨水上者可得石餘淨洗乾之



擣作末以秫米五升炊飯內攪之好酒五斤漬封藥
消飯浮可飲一斤半勿食他鮓鹽癥當出亦可取其
根一斤乾搗千杵酒漬飲之從少起日三亦佳此酒
療癥乃勝諸大藥

又方

大黃^{半斤}朴硝^{三兩}蜜^{一斤}

右合於湯上煎可丸如梧桐子大服十九日三脩急
文仲崔氏同惟崔氏用朴硝半斤蜜一斤半服二十

欽定四庫全書

普濟方

丸日再服

破癥散 治心腹宿癥及卒得癥并治久積癥癖不差
漸至羸弱宜服此方

右以硃砂細研搜飯令硃多以雄鷄一隻先餓二日
後以硃飯飼之却置雞於板上收取糞曝燥為末溫
清酒服五分七可至方寸匕日三服若病困急者盡
夜可五六服一鷄少更飼餘鷄取足鷄末食硃飯先
飼令肥



治癥積滿腹諸藥不差者人尿服之皆下血片塊二十日即出也

椒熨方 治患癥結病及瓜病似瓜形日月形或在臍傍左右或在臍上下或若別在左右肋下或當心合子大法先針其足以椒熨之

右取新盆子受一斗者鑽一百二十孔上著一重紙上著冷灰上著熱灰半升上著則灰火一升經一食頃盆底熱徹當病上初安氈一重即安火盆火盤大

欽定四庫全書

普濟方

熱以漸更加一重若火更熱不可忍加至三重暫歇進一冷日飲還上火硝二分許即停止經止日勿着令至七日決得稍瘥然後食美食自補若小不瘥作露宿丸服之

保安丸 治癥積心腹內結如拳漸上不止搶心疼痛以不止及遶臍腹痛不可忍者

川大黃 三兩 乾薑 一兩 大附子 半兩 鱉甲 一兩

右為末取三年米醋一大升先煎四五合然後合藥



丸如梧桐子大每服十九丸空心或醋或酒米飲下後 取疾如魚腸膿血爛肉汁青泥當下	京三稜湯 治積年癥塊	京三稜一兩 青橘皮半兩 桂去粗皮 大黃半兩 木香一分 檳	榔剉半兩	右粗搗篩每服五錢七分水一盞半煎至七分去滓 溫服空腹日午夜卧各一服	治諸癥結氣出本	欽定四庫全書 普濟方	右取赤龍浴水服之	枳朮湯出衛生寶鑑 治心下堅如大盤飲水所作	枳實 白朮各三兩	右以水一斗煎至三升分三服腹中軟即消滅之對	病增損	治癥結出本草	右用磨石澆赤熱投酒中飲之	暴癥附論
--	-------------------	--	----------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------	--	--------------------------------	-----------------------------	------------	------------------------------	---------------------	----------------------------



病源云暴癰者中藏氣虛弱食生冷之物藏既本弱不能消之結聚成塊卒然而無漸之暴癰也本中藏弱其癰暴生至於成病斃人最速									
方									
蜥蜴丸 出聖方 治暴癰堅結四肢瘦軟身無力 蜥蜴 一枚 蜈蚣 一枚 鬼白 漢防己 半兩 當歸 二兩 川 大黃 二兩 川芒硝 赤芍藥 二兩 右件藥為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候溫酒下十丸為度									
野葛丸 出千金方 治卒暴癰 野葛 一尺 當歸 附子 雄黃 細辛 各一兩 蜀椒 半兩 烏頭 二兩 巴豆 右咬咀以醋浸一宿猪膏一半斤煎附子色黃去滓內雄黃粉攪至凝傅布上以掩癰處復以油重布上復著紙重以熨斗盛火著其上常令熱日三夜二猪膏乾為度									



巴豆丸 出聖方 治暴癥氣攻心腹脹痛不欲飲食	巴豆 一分去皮心 川大黃 半兩 乾薑 半兩 木香 半兩 蓬莪	茂 兩半	右件藥為末入巴豆同研令勻鍊蜜和丸搗三二百	杵丸如小豆大每服空心以生薑湯下五丸	治卒暴癥腹中有物如石痛如刀刺晝夜啼呼宜服此	方 出聖方	右牛膝三斤去苗剉以酒一斗漬密封於熱灰中燒	欽定四庫全書 普濟方	令味出每於食前量力頻服以差為度便吐去宿食	神効	又方 出聖方	右用商陸根不限多少剉搗蒸之以新綿裹熨病上冷	即換之以衣物覆其上數日用旦夕勿息	又方 出聖方	右蒴藿根二箇細剉以酒一斗浸三五日每於食前	煖一小盞服之
---	---	----------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------



治卒暴癥腹中有物

出聖
惠方

右以五月五日蒜十片去皮桂一尺二寸竈中黃土

如鴨子一枚合搗以苦酒和塗以布搗病不過三次

又方

出肘
後方

右取檮木燒為灰淋取汁八升以釀一斛米酒成服

之從半合始不知稍稍增至二升不盡一劑皆愈此

灰入染絳用葉中釀酒也

又方

出聖
惠方

欽定四庫全書

普濟方

右以蠶沙一年桑柴燒灰一斗以水淋之五度取生

鱉長一尺者內中煮之爛熟去骨細擘剉更煎令可

丸丸如梧桐子大一服七丸日三食前以溫酒下

又方

出肘
後方

右以大猪心一枚破頭去血搗末雄黃麝香當門子

五枚巴豆百枚去心皮生用心縫以好酒於小銅器

中煎之看心沒欲歇隨益盡三升當糜爛煎令可丸

如麻子服三丸日三服酒盡不糜者出搗蜜丸之良



久大黃末半斤朴硝三兩蜜一斤合於湯上煎丸如	梧子服十丸日三服之	治卒暴癥腹中有物硬如石痛刺晝夜若不治之百日	內死 方見本門	主暴癥	用虎杖根酒漬服之	食癥 附論	夫脾胃虛弱飲食類傷積久不去結在腹內與正氣交	欽定四庫全書 普濟方	爭則心復鞭痛妨害飲食肢體消瘦以手按之積塊有	形謂之食癥	方	木香散 治食癥冷氣及傷寒後一切氣疾食物不消	木香 檳榔 青橘皮 肉豆蔻 食茱萸 紅	豆蔻 乾薑 白朮 葛根 草豆蔻 虎杖	麻黃 厚朴 桔梗 桂皮 去粗 羌活 人參 芎	藟 已上各等分
----------------------	-----------	-----------------------	---------------------------	-----	----------	-------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-------	---	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------------------------------	---------------------------



右為細末每服三錢空心炒薑鹽湯調下	京三稜丸 治食癥癖氣食勞宿食不消痰逆	京三稜 兩半 乳香 兩半 木香 兩半 丁香 兩半 肉豆蔻 兩半 當歸 兩半	兩半 紫苑 兩一 五靈脂 兩半 青橘皮 兩半 乾薑 兩一 附子 兩一	炮 硃砂 分半 硃砂 兩一 巴豆 去皮 兩半 猪牙莢 兩一 鱉甲 兩二	右件藥以乳香巴豆同搗如泥餘藥搗羅為末先以	醋一斤化硃砂去石滓熬令稠入麪煑為糊和諸	藥末令軟硬得所搗三五百杵丸如菉豆大每服以	欽定四庫全書 普濟方	溫酒下三丸至五丸	化積丸 治食癥積氣成塊胃膈痞悶腹脇脹滿宿食	不消心腹疼痛不能飲食 一名五積丸	硃砂 芫花 巴豆 各半 乾漆 兩一 烏頭 猪牙皂	芫花 去尖各三分 大黃 兩一 鱉甲 青橘皮 京三稜 當	歸 陳麴 炒各一兩 木香 桂 去粗皮 各三分	右十四味搗羅八味用前藥和丸如菉豆大每服二	丸至三丸茶酒任下如取積量虛實加減
-------------------------	---------------------------	--	---	--	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------	---	--	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------



三稜丸 治食癥勞氣五積五隔脾胃以冷喫食無味 飲食不化四肢少力痰毒氣脹胸膈不利	京三稜 石三稜 鷄爪三稜 黑三稜 各煨巴	豆 乾薑 蓬莪茂 附子 泡各一兩 丁香 木香	桂 檳榔 青橘皮 肉豆蔻 各半兩	右為末每秤一兩末別用巴豆七枚去皮心膜出油 細研拌勻更用硃砂一分醋化煮麪糊和丸如麻子 大丹砂為衣每服三丸至五丸生薑湯下	欽定四庫全書 普濟方	黑金丸 治食癥瘕癖聚血結刺痛一切疾	沉香 附子 各半兩 木香 乾薑 青橘皮 炒 細墨	炒 桂 去粗皮 京三稜 蓬莪茂 各一分 大黃 乾漆	麝香 各半兩 硃砂 研一兩	右為末將京三稜蓬莪茂大黃硃砂四味用米醋煮 爛研作糊入衆藥末和丸如梧桐子大每服十丸至 十五丸薑鹽湯下不拘時	丁香丸 治食癥氣堅腹中疼痛 方見以積類
--	--	--	--	---	--	--------------------------	---	---	--	---	---



木香丸三稜丸 治遠年食癥積氣并酒食所傷胸膈 脹滿及婦人血塊	木香 京三稜 補骨脂 牽牛子 丁香皮	乾漆 各一兩 烏梅肉 陳橘皮 五靈脂末 各二兩 沉	香 兩半 巴豆霜 一分	右搗羅九味為末入二味膏子和丸如菉豆大每服 五丸至七丸食後臨卧生薑湯下	檳榔丸 治食癥氣	欽定四庫全書 普濟方	檳榔 木香 郁李仁 茈胡 大黃 枳殼	桂 訶梨勒 草豆蔻 乾薑	右搗羅九味為末入郁李仁同研令勻鍊蜜和丸如 梧桐子大每服十五丸空心溫酒下日晚再服	穿山甲丸 治食癥破結塊取積年食及積惡血氣並 宜服此	穿山甲 乾薑 硃砂 分一半夏 分一葳靈仙 兩半班蝥	分一肉桂 分一川烏頭 芫花 巴豆
----------------------------------	--------------------	---------------------------	-------------	---------------------------------------	----------	------------	--------------------	--------------	--	------------------------------	---------------------------	------------------



右件藥為末入巴豆硃砂令勻用糯米飯和丸如豆	大每服食前煎橘皮湯放冷下三丸	硃砂丸 治食癥結塊疼痛發渴化氣消酒食	硃砂 乾漆 各一分 木香 蓬莪茂 丁香 京三	稜 青橘皮 芫花 各半 肉豆蔻 五枚 巴豆 一分	右將米醋一椀浸蓬莪茂芫花三稜一宿後焙乾與	五味同搗羅為末入硃砂巴豆拌勻醋煮麪糊和丸	如麻子大每服三二丸如要取轉看虛實加減生薑	欽定四庫全書 普濟方	湯下婦人血氣醋湯下小兒疳氣甘草湯下男子膈	氣龍腦湯下瀉痢甘薑湯下	澤漆丸 出聖 治食癥癖氣脾胃虛弱頭面四肢浮腫	欲變成水病者	澤漆 兩半 檳榔 兩一 附子 兩一 木香 兩半 肉桂 兩半 陳橘皮 兩半	湯浸澤瀉 兩半 川大黃 兩半 郁李仁 兩半 厚朴 兩半 粗皮 兩去	右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子	大每服以溫水下二十九日三四服
----------------------	----------------	--------------------	------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	----------------------	-------------	------------------------	--------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------



麥蘖丸 出聖濟總錄 治食癥嘔酸吐津胃膈疼痛氣噎食	飲進退	麥蘖 炒 陳麴 炒 厚朴 檳榔 紫苑 鱉甲 當	歸 大黃 各半兩	右麤搗篩每服五錢用水一盞半煎至七分去滓溫	服空心午時臨卧各一服	八靈丸 治食癥氣塊痞癖等疾	京三稜 石三稜 鷄爪大連 木香 檳榔 各一	欽定四庫全書 普濟方	兩 肉豆蔻 兩半 巴豆 硃砂 研各一分	右搗羅六味為末入巴豆霜硃砂末拌勻醋煮麪糊	和丸如小豆大每服五七丸男子生薑湯下婦人醋	湯下痞癖氣煎木香湯下	硃砂丸 出聖惠方 治食癥及氣塊攻刺心腹疼痛不可忍	硃砂 兩半 巴豆 兩半 乾薑 兩一 附子 炮一兩 青橘皮 湯浸一兩 京	三稜 兩一 乾漆 兩一 香墨 錠半	右件藥各別搗細羅為散內取硃砂巴豆細研用頭
--	------------	--	--------------------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------	---	----------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	--	---	---	-----------------------------



醋兩碗煎為膏然後摠入諸藥末相和丸如菴豆大	每服食前以溫酒下三丸	通靈丸 出聖 惠方 治食癥及惡血氣	五靈脂 一兩 巴豆 一兩 硫黃 一兩 杏仁 一兩 川烏頭 一兩 芫花	半兩 皂莢 一兩 自然銅 一兩	右件藥搗為末入巴豆研令勻別入生薑黑豆麪二	兩拌和令勻滴水為丸如菴豆大每服以生薑湯下	二丸膈上有涎即吐有滯食血氣即轉下	欽定四庫全書 普濟方	礞石丸 出聖 惠方 治食癥久不消	礞石 半兩 硃砂 半兩 乾漆 一兩 附子 一兩 泡 京三稜 一兩 青橘	皮 一兩 香墨 半兩 巴豆 一兩 去皮	右件為末以頭醋三升化硃砂研巴豆大銀鍋子內	微火煎成膏入諸藥末和丸如菴豆大每服三丸宿	食不消茶下婦人血癥當歸酒下心痛橘皮生薑湯	下	治食癥心腹疼痛脹滿面色萎黃不下食宜服此方 出聖
----------------------	------------	----------------------------------	---	--	----------------------	----------------------	------------------	---------------	---------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---	--



方 惠	巴豆 兩半 京三稜 兩二 乾漆 兩半 川大黃 兩半 青橘皮 兩一 附
子 半兩 砲砂 一分 香墨 兩半	右件藥搗羅都細研為末以醋煮麪糊和丸如梧桐
子大每服食前以醋湯下五丸當下惡物即差	如聖散 治男子婦人飲食所傷結成積塊痞痛
陳皮 乾薑 各三錢 巴豆 一錢 甘草 半錢 三稜 莪朮	芫花 各半
欽定四庫全書 普濟方	
右為末和勻餘醋煮糊為丸如菉豆大每服六七丸	淡薑湯下
木香丸 出聖方 治食癥及喫食不著	木香 兩一 桂心 兩一 五靈脂 兩一 乾薑 一兩 乾墨 兩一 猪牙
皂莢 一兩去黑皮 巴豆 半兩去心	右研為末入巴豆研勻用軟糯米飲和丸如菉豆大
每服食前以生薑橘皮湯下五丸	治年積食癥方 出聖方



青礞石一兩 硃砂半兩 芫花半兩 木香一分 丁香一分 巴豆十三 枚去 皮 川大黃三兩	右件為末入諸藥同研令勻以頭醋二升熬藥令稠可丸即如菉豆每服食前以生薑湯下三丸	治食癥結塊在腹內不能飲食面色萎黃宜服此方出聖	方 患 硃砂半兩 芫花一兩 麥蘖半兩 青橘皮半兩 猪牙皂莢五挺	巴豆半兩 去皮	欽定四庫全書 普濟方	右件為末入巴豆都研令勻先將皂莢汁於鍋子內慢火煎成膏然後取藥末一半更入米醋一大盞同煎令稀稠得所其餘藥為末丸如梧子大每服以生薑橘皮湯下三丸	萬金丸出聖 治食癥氣聚不消	檳榔 肉豆蔻 青橘皮 乾薑 木香各一兩 巴	豆去皮心五十粒	右搗羅五味為末入巴豆同研令勻浸鹽豉和丸如
--	--	--	--	-------------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	---	-------------------------------	-----------------------------



梧桐子大每服一二丸煎生薑橘皮湯下良久以粥飲投之以利為度	麝香丸 出聖方 治積年食癥	麝香 一分 硃砂 半兩 川大黃 半兩 神麴 一兩 巴豆 三十粒 寒食	白麪 生用 一兩	右件為末入研了藥令勻用易州墨汁和丸如梧子大如是十年至十五年食癥即先嚼乾柿半枚裹藥一丸同嚥之如尋常食癥即丸如豌豆大茶酒任下	欽定四庫全書 普濟方	一丸	治卒食不消欲成癥積方 出千金方	右用煎艾汁如飴取半升作一服便盡吐出宿食一方用艾五尺圍一束苡薏根一大把二味同煎	治雜食瘀滯不消心腹堅痛方 出千金方	右用水三升煮白塩一升令消分三服吐去所食并	治暴癥	巴豆丸 出聖方 治積年食癥
------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------	---	-----------------------	-----------	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	------------	-------------------------------------



巴豆十枚 陳橘一兩 川大黃三錢 硃砂一錢 神麴三錢 芫花二錢	右件藥為末入巴豆等同令研勻磨香墨濃汁和搗令勻丸如梧桐子大每臨卧時用乾柿一枚分為三分爛嚼破裏藥一丸嚥之如此服三丸後喫湯飲下	之至明當利下宿食隔日再服取差為度	五通丸出聖濟總錄 治食癥氣	乾薑二兩 巴豆半 陳橘皮 黃連 白朮各一分	白皮煎湯下或塩湯下婦人醋湯下	欽定四庫全書 普濟方	進食方出儒門	川牛一兩 巴豆三箇	右為末水丸每服二三十九食後隨所傷物送下	療凡所食不消方方見本門	療食癥病取生葱食之瘥○昔有人每食飲七升并羊脂餅不論數因道中過饑食生葱須臾吐出一虫薄而	圓繞畔有口試以食投之立消盡自吐此物後其人病便愈此名食癥無疑人有思肉不已食訖復思者為肉
---	---	-------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------	-------------------	------------------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	---	---



癰治之方 出千金方 右空腹飲白馬尿三升吐出肉不出必死	治蠱食癰方 出聖惠方 右綠礬二兩搗研如粉以米醋一大碗於瓷器內煎	之用柳木篾攪成膏入赤烏脚一兩細研和丸如菉豆大每服空心溫酒下五丸	治食癰方 出聖惠方 右以青州棗三枚去核每箇入膩粉一錢以白麪裹	欽定四庫全書 普濟方	燒熟即去麪空心以棗爛嚼嚥水下之即瀉下癰塊	白銀透羅丹 治積塊食積大便不行疼痛難忍	寒食麪 七錢 巴豆 三錢 天南星 半夏 各一錢半 右為末滴水為丸搗作餅子如桐子大每服七丸食	後熬煮二服冷漿淘過冷水送下忌熱物等	積氣丸 治積年食氣癰塊消酒食利噎塞	木香 半兩 乾薑 炮一兩 硃砂 半兩 巴豆 半兩 川大黃 一兩 附子 半兩 一兩 官桂 半兩 筒子漆 一兩 荆三稜 一兩 蓬莪茂 一兩 芫花 半兩
---	--	--	---	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--



青橘兩半 細墨兩半 檳榔兩半 大戟兩半 肉豆蔻五箇 右一十六味先將荆三稜大黃二味為末研巴豆令細入醋一升半煎此二味至半碗許入硃砂又同研入醋麪一匙成膏加諸藥末合和得所再入白杵三五百下丸如菉豆大每服五丸如食癥氣用生薑橘皮湯下本臟氣茴香湯下赤白痢二宜湯下婦人氣當歸酒下常服任下	欽定四庫全書 普濟方	普濟方卷一百七十三
---	--------------------------	------------------

