

欽定四庫全書

普濟方卷一百七十六 明 周王朱橚 撰

瘡渴門

總論

夫三瘡者本起腎虛或食肥美之所發也腎為少陰膀胱為太陽膀胱者津液之府宣行陽氣上蒸入肺流化水液液達五臟調陽養髓其次為脂膚為血肉上餘為涕淚經循五臟百脈餘為小便黃者血之餘也臊者五

欽定四庫全書

普濟方

臟之氣鹹者潤下之味也腰腎冷者陽氣已衰不能蒸上穀氣盡下而為小便陰陽阻隔氣不相榮故陽阻陰而不降陰無陽而不昇上下不交故成疾矣夫瘡者瘡渴瘡中瘡腎也此由少年服乳石熱藥耽嗜酒肉葷辛熱麵炙博荒淫色慾不能將理致使津液耗竭元氣受克熱毒積聚於心肺腥羶并傷於胃腑脾中受熱水臟乾枯四體尫羸精神恍惚口苦舌乾日加躁渴飲水多而小便少者瘡渴也喫食多而飲水少小便赤黃者瘡



中也飲水味甘隨飲便下小便而白濁腰腿痛瘦者痛
腎也斯皆五臟精液枯竭經絡血澁榮衛不行熱氣留
滯遂成斯疾矣 渴病有三曰消渴消中消腎消渴屬
心故煩必致心火散漫渴而引飲經云脈軟散者當病
消渴諸脈軟散皆氣實血虛也消中屬脾脾熱則成為
消中復有三中寒中熱中強中寒中陰勝陽鬱久必為
熱中經云脈洪大陰不足陽有餘則為熱中多食數洩
為寒中陰狂興盛不交精泄則為強中三消病至強中
危矣消腎屬腎盛壯之時快情縱慾年長腎衰多服丹
石之所致經云腎實則消不渴而小便自利名曰消腎
亦名內消 消渴以渴而不利引飲過甚言之消中以
不渴而利熱氣內消言之消腎以渴而復利腎燥不能
制約言之蓋以上盛下虛心脈多浮腎脈必弱故經云
脈洪大陰不足陽有餘則為熱中即消熱氣上騰心虛
受之病屬上焦謂之消渴熱蓄於中脾虛受之病熱中
焦謂之消中熱伏於下腎虛受之病屬下焦謂之消腎

欽定四庫全書

普濟方



凡三疝肺疝腎疝可治惟有脾疝不可治肺疝熱在上
焦可用涼藥如黃連等皆可用此疾多出於飲酒人冬
月盛寒多以葱椒鳩鴿煮酒或加食熱麵遂得此疾故
可用涼藥解之如脾疝則飲食入腹如湯澆雪隨小便
出落於溷僻清渠中凝結如脂日可倍食數餐膚腹日
益瘠瘦用熱藥則熱愈甚用涼藥則愈見虛羸故無治
腎疝者渴而多飲水小便白濁肌膚雖日瘠瘦然小便
不如脾疝之凝結堅硬飲食亦不倍多是腎虛弱心氣

欽定四庫全書

普濟方

渙散所致故可補心腎去煩熱則其疾可愈 天地自
太虛至黃泉有六位人身自頭至足亦有六位人胷腹
之間自肺至腎又有六位故立天之氣曰金與火立地
之氣曰土與水立人之氣曰風與火故金火合則熱而
清水土合則濕而寒風火合則溫而炎肺最在上為金
主燥清心次為君火主熱肝又次之為風主溫膽又
次之為相火主極熱又次之為濕土主涼腎又次之黃
泉為寒水主寒故肺象天脾腎象地肝膽象人夫土為



萬物之本水為萬物之元水土合德以陰居陰同處乎
下以立地萬物根於地是故水土濕寒若燥熱陽實則
地之氣不立萬物之根索澤而枝葉為枯由是觀之則
五臟六腑四脉百體皆稟受於脾胃行其津液相與濡
潤滋養今醫者故以燥熱之劑養脾胃濕土之氣不亦
舛乎疇渴本濕寒之陰氣極衰燥熱之陽氣太甚更服
燥熱之藥則脾胃之氣竭矣叔世不分五運六氣之虛
實而一槩執熱為實而寒為虛彼但知心火陽熱一氣

欽定四庫全書

普濟方

之虛實而非臟腑六氣之虛實也蓋肺本清虛則溫心
本熱虛則寒肝本溫虛則清脾本濕虛則燥腎本寒虛
則熱假若胃冷虛者乃胃中陰水寒氣濕甚而陽火熱
氣衰虛也非胃土溫氣之本衰故當溫補胃中陽火之
衰退其陰水寒氣之甚又如胃熱為實者乃胃中陽火
實而陰水虛也故當以寒藥瀉胃中之實火而養其虛
水然此皆補瀉胃中虛熱水火所乘之邪非胃為實者
之本也夫補瀉脾胃濕土之本氣者潤其溫是補燥



其溫是瀉土本濕故也凡臟腑諸氣不必腎水獨當寒
心火獨當熱要知每臟諸氣和同宣而平之可也是故
水少火多為陽實陰虛而病熱也水多火少為陰實陽
虛而病寒也其為治者瀉實補虛以平為其道可矣故
治消渴者補腎水之陰虛而瀉心火之陽熱除腸

胃燥熱之甚漸使津液生而不枯氣血利而不澁則病
日已矣 三消者其燥熱一也但有微甚耳余聞古之
方多一方而通治三消消者以其善消水穀而喜渴也

欽定四庫全書

普濟方

然叔世論消渴者多不知本其言消渴者上實熱而下
虛冷上熱故煩渴多飲下寒故小便多出本因下部腎
水虛而不能制其上焦心火故上實熱而下虛冷又曰
水數一為物之本五行之先故腎水者人之本命之元
不可使之衰弱本不堅則枝葉不茂元氣不固則形體
不容消渴病下部腎水極虛冷者更服寒藥則元氣轉
虛而下部腎水轉衰則上焦心火尤甚而難治也但以
暖藥補養元氣若下部腎水得實而勝退上焦心火則



自然心渴止小便如常而病愈也巧言似是於理實違者也誤已久矣或又謂腎與膀胱屬水虛則不能制火故小便多者愈失之遠矣彼謂水氣實者乃能制火虛則不能制火故陰虛而熱燥其液小便淋而常少陰實陽虛不能制水小便利而常多豈知脘渴小便多者非謂此也蓋燥熱太甚而三焦腸胃之腠理怫鬱結滯緻密塞壅而水液不能滲泄浸潤於外榮養百骸故腸胃之外燥熱太甚雖復多飲於中終不能浸潤於外故

欽定四庫全書

普濟方

渴不止小便多出者知其多飲不能滲泄於腸胃之外故數洩也 內經有言心肺氣厥而渴者有言肝痺而渴者有言脾熱而渴者有言腎熱而渴者有言胃與大腸熱結而渴者有言小腸痺熱而渴者有因病瘧而渴者有因肥甘石藥而渴者有因醉入房而渴者有因遠行勞倦逼而大熱而渴者有因傷害為胃乾而渴者有因病風而渴者雖五臟之部分不同而病之所過各異其為燥熱一也夫有謂心肺氣厥而渴者論曰心於



熱移肺傳為隔痛注曰心熱入肺以而傳化內為隔熱
痛渴多飲也所謂肝痺而渴者痺論曰肝痺者夜以多
驚多飲數小便如脾熱而渴者痿論曰脾氣熱則胃乾
而渴肌肉不仁發為肉痿所謂腎熱而渴者刺熱論曰
熱病者先腰痛肝酸苦渴數飲身熱熱論曰少陰脈實
腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴叔世惟言腎虛不
能制心火為上實熱而下虛冷以熱藥溫補腎欲令勝
退心火者未明陰陽虛實之道也夫腎水為陰而本寒

欽定四庫全書

普濟方

虛則為熱心火屬陽而本熱虛則為寒若腎陰虛則心
火陽實是謂陽實陰虛而上下俱熱明已故氣厥論曰
腎氣衰陽獨宣明五氣論曰腎惡燥由腎枯水涸臟氣
時發論曰腎苦燥急食辛以潤之夫寒物屬陰能養水
而瀉心熱物屬陽能養火而耗水今腎水既不勝心火
則上下俱熱柰何以熱藥養腎水欲令勝心火豈不聞
哉又如胃與大腸熱結而渴者陰陽別論二陽結為之
痛注曰二陽結胃及大腸俱熱結也腸胃藏熱善消水



穀又氣厥論曰大腸移熱於胃善食而瘦而脈要精微
論曰痺成為瘠中善食而瘦如脾痺而渴者數飲而不
得中氣喘而終時發飡泄夫數飲而不得中其大便必
不停留然則瘠渴數飲而小便多者止是三焦燥熱怫
鬱而氣衰也明矣豈可以燥熱毒藥助其強以伐衰陰
乎此真實實虛虛之罪也夫瘠渴者多變聲音瘡癰瘰
癧之數皆腸胃燥熱怫鬱水液不能浸潤於周身故也
或熱而膀胱怫鬱不能滲泄水以妄行而面上腫也如

欽定四庫全書

普濟方

小腸痺熱而渴者舉痛論曰熱氣留於小腸腸中痛痺
熱焦渴則便堅不得出矣注曰熱滲津液而小便堅矣
如言病瘧而渴者瘧論曰陽實則外熱陰虛則內熱外
內皆熱則喘渴故致飲冷也然陽實陰虛而為病熱法當
用寒藥養陰瀉陽是謂瀉實補衰之道也如因肥甘石
藥而渴者脾病論曰有口乾者病名為何岐伯曰此五
衰氣之所病溢名脾痺痺為熱也脾熱則四臟不稟故
五氣上因也先溢脾熱故脾痺又經曰五味入口藏於



內脾胃為之其精氣津液在脾故令人口甘也此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥肥者令人內熱甘者令人中滿故其氣上溢轉而為痞渴通許虛實論曰痞痺仆擊偏枯痰厥滿發逆肥實之人膏粱之疾也或言人惟胃氣為本脾胃合為表裏脾胃中州當受溫補以調飲食今渴痞者脾胃極虛溢宜溫補若用寒藥耗損脾胃本氣虛乏而難治也此言乃不明陰陽寒熱虛實補瀉之道故妄言也豈知腹中論曰帝云夫子數

欽定四庫全書

普濟方

言熱中痞中不可服芳草石藥發癰芳草發狂注言多飲數澍謂之熱中多喜曰癰多怒曰狂芳美味也石謂英乳及發熱之藥經又曰熱中痞中皆富貴人也今禁膏粱是不合其心禁草石藥是病不愈願聞其說岐伯曰芳草之味美石藥之氣悍二者之氣急疾堅致故非緩心和人不可服此二者帝曰何以然岐伯曰夫石氣慄悍熱氣亦然所謂飲一而澍二者當肺氣從水而出也其水穀海竭矣凡痞渴便用熱藥誤人多矣故內經



應言渴者皆如是豈不昭晰歟然而猶有惑者諸氣過極反勝己者是以人多誤也如陽極反似陰者是也若不明標本為認似是始終乖矣故凡見下部覺冷兩腋如冰此皆心火不降狀類寒水宜加寒藥下之三五次則火降水升寒化則退然而舉世皆同執迷故處其方必明病之標本達藥之所能通氣之所宜治而無害者可以治其病也以所為標本者先病而為本後病而為標此為病之本末也標本相傳先當救其急也又云

欽定四庫全書

普濟方

六氣為本三陰三陽為標蓋為標病藏病最急也又云六氣為胃之本假若胃熱者胃為標熱為本也處其方者當除胃中之熱是治其本也故六氣乃以甚者為邪病衰者為正法當瀉甚補衰以平為其養正除邪之道也酸能收甘能緩辛能散苦能堅鹹能軟酸屬木也燥金注於散落而木反之溫土主於緩而木勝之故能然也苦能燥濕而堅熯者蓋以凡物燥則堅也甘能緩苦急而散結甘者土也燥能急結故緩則散也辛能



散主散結潤燥辛者金也金主散落金生水故也況抑
結散則氣液宣行而津液生也臟氣發特論曰腎苦燥
急食辛以潤之開腠理致津液通氣也鹹能軟堅鹹者
水也水潤而柔故勝火之堅矣此五臟之味也其為五
味之本者淡也淡胃土之味也胃土屬地土者地為萬物
之本胃為一身之本澹能滲泄利竅夫燥能急結甘而
能緩之淡為剛土其能潤燥緩其急結令氣通行而致
津液滲泄也故瘠渴之人其藥與食皆宜淡齊至真大

欽定四庫全書

普濟方

要論曰辛甘發散為陽酸苦漏泄為陰淡味滲泄為陽
五者或散或收或緩或急或燥或潤或堅或軟所以利
而行之調其氣也 凡三瘠者內經所謂腎瘠也瘠渴
等可取生藕汁服之則愈夏月暑毒入心心旺不受邪
熱移於肺肺葉焦津液乾好飲水名曰膈瘠宜以冷參
湯進玉壺丸之類效 寒暑之交氣壅不調鼻塞聲重
咽乾煩渴二腑癰閉法當洗心滌其熱去而肺經清潤
渴自止矣宜用洗心散之類 飲酒無度食炎熱過多



邪熱蓄積於胃腑多令煩渴當用龍腦飲之類制其脾
化其滯導其熱也 色欲無節耗損腎元水火不交火
必炎上熏蒸於肺金與火燥渴生飲冷當因其本宜腎
氣八味丸之類若不先固其本又將何以禦其渴哉

診其脉數大者生細小浮者死又沉小者生實牢大者
死有病口乾此病何以得之蓋五氣之溢也名曰脾疸
夫五味入於口藏於脾為之行其精氣溢在於脾令人
口乾此肥美之所發也此人飲不欲食甚者則欲吐下肥

欽定四庫全書

普濟方

人內熱甘者令人中滿故其氣上溢為瘖渴也厥陰之
為病瘖渴氣上衝心中疼熱欲必數食甘美而多肥者令
之不肯止養氣法云人睡眠合卧勿張口久成瘖渴反
失血色 凡積久飲酒未有不成瘖渴然則太寒凝酒
而海不凍明其酒性酷熱物無以加鬱炙鹽鹹之味酒
客耽嗜不離其口入腸之後制不由己飲噉無度咀嚼
將不擇酸鹹積年長夜酣飲不懈遂使三焦猛熱五臟
乾燥木石猶且枯焦在人何能不渴治之安可緩在病



者若能如方節慎旬月可瘳如不愛惜死不旋踵其所
慎者有三一飲酒二房室三鹹食及麵能慎此者雖不
服藥而自可無他不知此者縱有金丹亦不可救瘳渴
之人愈與未愈常須慮有大癰也當預備癰藥以防
之有人病渴利始發於春經一夏服栝樓汁得其力
渴漸瘳然小便猶數甚晝夜二十餘行常至三四升極
瘳不減二升也轉以便止漸食肥膩日就羸瘦咽喉唇
口焦燥呼吸少氣不得多語心煩熱兩脚酸食乃兼倍

欽定四庫全書

普濟方

於常而不為氣力者當知病皆由虛熱所致治法可常
服栝樓汁以除熱牛乳杏酪善於補此治最有益 瘳
渴之疾或服五石而致者又有疾以飲酒而致者如解
五石毒者飲罌粟粥而能止渴並宜服兔絲圓大渴而
加煩熱者栝樓根湯馬通散之數 凡病人兼有燥渴
之證用烏梅栝樓根乾葛甘草宣補丸 凡人生放恣
者衆盛壯之時不自慎惜快情縱慾極意房中稍至年
長腎氣虛竭百病滋生又年少懼不能房多服食石散



真氣既盡石氣孤立日惟虛耗唇口乾燥精液自洩或
小便赤黃大便堅實或渴而且利日夜一石或渴而不
利所食之物皆作小便此皆由房室不節之所致也凡
平人夏月喜渴者由心熱也心熱便汗汗則腎中虛燥
故渴而小便少也冬月不汗故小便多而數也此為平
人之證也名為瘖渴但小便利而不飲水者腎實也經
云腎實則消消者不渴而利是也所以服石之人於小
便利也石性歸腎歸腎則實實則能消水漿故利利多

欽定四庫全書

普濟方

則不得潤養五臟五臟衰則生諸病張仲景云熱結中
焦則為腎熱結下焦則為溺血亦令人淋閉不通明知
必有患小便利信矣內有熱者則喜渴除熱則止渴熱
虛者須除熱補虛則瘖矣

瘖渴

附論

夫瘖渴者雖為渴而不小便是由少年服五石諸圓經
年歲石勢結於腎中使人下焦虛熱及至年衰血氣減
少不復能制於石石勢獨盛則腎為之燥故引水而小



便少也其病變者多發癰疽此由滯於血氣留於經絡不能通行血氣壅澁故成膿也診其脉數大者生細小浮者死又沉小者生實大者死病有口甘者名之為何何以得之此氣之溢也名曰脾痺夫五味入於口藏於胃脾之所為行其氣液在於脾令人口甘此肥美之所發此人必數食甘美上溢為瘠渴也

辨六經渴并治

少衛生寶鑑

大陽渴脉浮無汗者五苓散滑石之類皆不作效遂至

欽定四庫全書

普濟方

引飲過多兩脚浮腫此證不可以為裏熱蓋腎水不上升心火不降故也須用交感丹為主却以烏梅濃蜜生薑甘草煎湯嚥之腎水一升心火一降其渴止脚亦不腫治上焦膏痛而不欲多食小便清利宜小柴胡白虎湯或錢氏地骨皮散加芍藥黃芪石膏黃芩桔梗之類是也若瘠渴者倍黃連痛中者倍枳樓腎痛者加芒硝六分服鉉丹丸得小便鹹苦如常後恐虛憊者並宜服肉蓯蓉丸足太陽者是膀胱之經也膀胱者是



腎之腑也而小便數此為氣盛則消穀大便硬實則為
瘠渴也宜八味腎氣此主之 凡瘠渴者經百日以上
者不得灸刺恐於瘡上漏膿水不歇遂成癰疽羸瘦而
死亦忌有誤傷皮肉若作鍼孔許大瘡者所飲之水皆
於瘡中變成膿水而出不止者必死慎之初得瘠渴者
可依後方灸刺之為佳孫氏云瘠渴者百日外概不許
鍼刺所飲之水皆化為膿水不止者皆死特須慎之又
云仍不誤傷皮肉若小有瘡亦能致死今者既得瘠渴

欽定四庫全書

普濟方

且未免飲水水入瘡即損人今初得日豈得令其 刺
致此誤傷之禍輒將未順其理且俟百日以上或能未
誤初灸之說故不錄灸刺凡灸刺則外脫其氣瘠渴皆
是虛疾灸刺特不相宜唯脚氣宜即灸之 夫內瘠之
為病當由熱中所致小便多於所飲令人虛極短氣夫
內瘠者食物皆消作小便也而又不渴正觀十年梓州
刺史李文博先服白石英既久忽陽道強盛經月餘漸
患渴經數日小便大利日夜百行以來百方治之漸以



增劇四體羸憊不能起止精神惚慌口舌焦乾而卒此
病雖稀甚可畏也利時脉沉細微弱服枸杞湯即效但
不能長愈服鉛丹散亦即減其間將復除熱陽明渴脉
長有汗者白虎涼膈散之類少陽渴脉弦而嘔者小柴
胡加枳椇湯太陰渴脉細不欲飲水思湯不思水者四
君子理中湯主之少陰渴脉沉自利者猪苓湯三黃湯
之類厥陰渴脉微引飲者少少與之滑石治渴本為竅
不利而用之以其燥而能亡津液也天令溫氣太過者

欽定四庫全書

普濟方

當用之是為犯禁假令小便利或渴或不渴內有濕熱
也小便自利而渴者內有禁燥也濕宜滲泄之燥則潤
澤之可矣維證有汗而渴者以辛潤之無汗而渴者以
苦堅之傷寒食少而渴者當以和胃之藥止之不可用
涼藥止之恐復損胃氣不能食也白朮茯苓即是和胃
之藥也大陽無汗而渴者不宜白虎湯若汗後脉洪大
而渴者宜與之陽明有汗而渴者不宜與五苓散若小
便不利汗少脉浮而渴者宜與之人病心肺熱而不渴



者知不在太陽少陰之卒而只在標也在標則不渴矣
 是在本也

爛金圓 出三因方 治熱中瘳渴止後將補精血益諸虛解

勞倦去骨節間熱寧心強志安神定魄固臟腑進飲

食免生瘡瘍

大猪肚 一箇 黃連 三兩 蜜 生薑各二兩

右先將猪肚淨洗復以葱麵醋椒等洗烘乾用藥同

水酒入銀石器內煮半日漉出黃連洗去蜜酒令盡

欽定四庫全書

普濟方

剉研為細末再酒調成膏入先洗猪肚內縫定入銀

石器內水熬爛研為膏搜下項藥

人參 二兩 黃耆 四兩 五味子 山藥 山茱萸 杜仲

去皮剉薑汁拌炒絲斷 石斛 車前子 鼈甲 醋炙 熟地黃

新蓮肉 去皮 當歸 各三兩 槐角子 炒 白茯苓 磁石 各一

兩煨 川芎 一兩 沉香 半兩 兔絲子 五兩 麝香 一錢
入碎 不焙 浸溫研 別研

右為末用猪肚膏搜和得所膏少則添熟蜜杵數千



下丸如梧桐子大食前溫酒糯米湯任下五十丸一		法有白朮 二兩 陽起石 一兩		茯苓丸 出三因方 治心虛煩悶或外傷暑熱內積愁煩酣		飲過多皆致煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或		不利		茯苓 酒浸 磁石 煨碎 熟地黄 山茱萸 桂心 山藥		炒牛膝 酒浸 茯苓 黃耆 湯浸 澤瀉 鹿茸 去毛塗酥炙		遠志 去心炒 石斛 覆盆子 五味子 華撥 破		欽定四庫全書 普濟方		故紙 炒 巴戟 酒浸 兔絲子 酒浸 龍骨 杜仲 去皮剉姜汁製炒斷		絲各半兩附子 炮去皮臍重六錢		右為末蜜為丸如梧桐子大每服五十丸空心米湯		飲下		丹砂散 出聖濟總錄 治三疳病小便頻數皮燥毛焦飲食		雖多肌肉疳瘦渴燥引飲		丹砂 飛研水 黃連 去鬚 鐵粉 研 枯樓 各一分 赤石脂		蘆薈 研 龍齒 澤瀉 各三分 胡粉 研 鉛 半兩 牡蠣 一煨	
----------------------	--	--	--	---	--	----------------------	--	----	--	---	--	--	--	---------------------------------------	--	------------	--	--	--	-------------------------------	--	----------------------	--	----	--	---	--	------------	--	--	--	---	--



分 桑螵蛸炙 十個 雞肫胗炙 五枚 蜜 甘草一兩 半炙		右除別研外搗羅為散再和勻每服二錢用水煎小		麥湯調下每日三服		白朮散出千 金方 治瘡渴陰脉絕胃反而吐食		生白朮 乾地黄 生薑各二兩 橘皮 人參 甘		草 黃蓍 遠志各三兩 桂心 當歸 芍藥各三兩		大棗三枚		右咬咀先取屋上瓦三十年者碎如雀腦三升東流		欽定四庫全書 普濟方		水二石煮取二斗納藥瓦汁中煮三升分四服或單		飲瓦汁亦佳		真珠丸出仁 存方 治心虛煩悶或外傷暑熱內積煩悶酣		飲過多皆致煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或		不利		知母一法一兩 一分一兩 川黃連去毛 一法一兩 苦參一法一兩 鐵鐸粉一兩		研一分 元參無一法 牡蠣煨一分一兩 硃砂別研二兩 麥門冬去心		天花粉分各半 八兩 金箔 銀箔二百片 煮去皮一兩	
---	--	-----------------------------	--	-----------------	--	--	--	---	--	---	--	----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------	--	--------------	--	--	--	-----------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	---	--



右為末煉蜜入生栝樓根汁少許丸如梧桐子大用金銀箔為衣每服二十九丸先用栝樓根汁下一服次用麥門冬熟水下病退日二服忌燂酒色次投蓯蓉丸補一方有蘆薈二錢半白扁豆二兩炒	天花丸 出經驗良方 治渴通用	消渴數中消腎病 三焦五臟生虛熱	唯有膀胱冷似冰 嘗思飲水無休歇	小便晝夜不停行 骨冷皮焦心肺裂	欽定四庫全書 普濟方	本因飲酒炙燂多 四體肌膚淋轉渴	莫教便利白如泔 口苦咽乾舌如血	若如此狀病須危 幸遇神仙談妙訣	黃連 淨三兩童便浸三宿焙 白扁豆 姜製去皮炒二兩 辰砂 白茯苓	苓 牡蠣粉 知母 苦參 天花粉 鐵粉 各半	兩 蘆薈 分一 金銀箔 各二片	右為末取栝樓根生汁和生蜜丸如梧桐子大每服三十丸麥門冬湯送下一方無白茯苓
--	--------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--	---	---	--



鐵粉丸 出聖方 治瘡渴不問年月深淺困篤者宜服此	鐵粉 二兩 雞肫脰 一兩 土瓜根 一兩 苦參 三分 黃連 三分	麥門冬 一兩 牡蠣 三分 桑螵蛸 三分 金箔 五十片	銀箔 五十片 栝樓根 三分	右為末入研了藥更研令勻煉蜜和搗三五百杵丸	如梧桐子大每服不計時候以清粥送下三十丸	降心湯 出直指方 治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血	日消	欽定四庫全書 普濟方	人參 去蘆 遠志 取肉薑汁炒 當歸 去毛 川芎 熟地 去土 白茯苓	苓 去皮 黃耆 蜜炙 五味子 去梗 甘草 微炙各半兩 天花粉 一兩	右剉細每服三錢薑棗煎食前服	金英丸 出聖濟總錄 治瘡渴	鉛丹 麥門冬 去心焙 牡蠣 煨研如粉 知母 焙各一兩 黃連 去皮	栝樓根 苦參 各二兩 金箔 一百片 生栝樓 二兩研如膏	銀箔 一百片	右搗羅為末用生栝樓根和為丸如梧桐子大每服
---	---	---	--	-----------------------------	----------------------------	--	-----------	-------------------	--	---	----------------------	-------------------------------------	---	---	------------------------------	-----------------------------



四十丸食後米湯飲下日夜再當服渴止十日已來	漸覺減即日兩服服三十五丸一月外每日一服服	三十九夏月即用蜜為丸服藥之次腹中忽冷痛即	取厚朴二兩去粗皮姜汁炙陳橘皮三分去白焙生	姜二兩切水二升煎取半升去滓分溫二服食以飯	壓之如腹中不痛即止	梅花取香湯 出得生 又名斬龍創子手消渴飲水至	石斗病極者可服之即瘥	欽定四庫全書 普濟方	天花粉 烏梅肉 人參 乾葛 枇杷葉 黃	蓍 栝樓子 麥門冬 五味子 各一兩 檀香 五錢	右為細末隨意不時水調服之	猪肚丸 出千金方 治諸渴疾	川黃連 五兩 淨白乾葛 知母 茯神 麥門冬 去心	大熟地 洗焙各二兩 栝樓根 粟米 各一兩 人參 半兩	右木白中同搗為散入淨猪肚內縫密置甑內蒸極	爛乘熱再杵細若硬加少蜜為丸如梧桐子大蒸汁
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	---------------------------------------	------------	---------------	---------------------	---	--------------	------------------------------	--	---	----------------------	----------------------



下五十丸或粥飲下		麥門冬散 出聖方 治瘡渴體熱煩悶頭痛不能食		草 一兩微炙赤剉		右為散每服四錢以水一中盞入小麥一百粒煎至		六分去滓不計早晚時候溫服		鐵粉散 出聖方 治瘡渴不止心神煩亂宜服此		鐵粉 一兩細研 麥門冬 二兩去心焙 牡蠣 一兩研為粉 知母 一兩黃		欽定四庫全書 普濟方		連 二兩去鬚 苦參 二兩剉 栝樓根 二兩 金箔 一百片細研 銀箔 二百		研片細		右件藥搗細羅為散入鐵粉等同研令勻每服不計		時候以清粥飲調下一錢		鉛丹散 一名胡粉散 治瘡渴不止小便數兼瘡中心神悶		煩頭痛 出千金方		鉛丹 胡粉 各二兩 甘草 栝樓根 各十分 澤瀉 白		石脂 貝母 尉後作 石膏 赤石脂 各五分	
----------	--	--------------------------------------	--	-------------------------	--	----------------------	--	--------------	--	-------------------------------------	--	---	--	------------	--	--	--	-----	--	----------------------	--	------------	--	---	--	-------------------------	--	---	--	--	--



右為細末每服一錢用米湯調熱水調亦可量人羸壯服之食後臨卧如肚疼以漿水調或作丸一年病者一日愈二年病者二日愈渴甚者夜二服腹痛者減之丸服亦佳每服十丸備急方云不宜酒不用麥汁下之古今錄驗云服此藥了經三兩日宜爛煮羊肚腹服之或作羹亦得宜湯淡食之候小便數鹹苦即宜服茯苓丸兼煮散將息亦治渴利患十年者菝

葵調下

欽定四庫全書

普濟方

童子桑白皮湯

出三因方

治三疳渴病或飲多利少或不

飲自利肌膚瘦削四肢倦怠常服補虛止渴利渴

有三疳渴屬心內積煩愁心火炎上與暑熱或飲食

相挺而動疳者屬脾有陰勝陽致成寒中者有陰不

勝陽成熟中者有狂陰興盛不交精泄成強中者疳

腎屬腎少不謹惜壯乃腎衰多服丹石以致發唇焦

咽竭精益自泄不飲而利亦曰內疳病亦危矣

童根桑白皮

即新種者去粗皮晒乾不焙

茯苓

人參

麥門



冬去心乾葛 乾山藥 桂心各一兩 甘草半兩生用	右剉散水一盞半煎至七分去滓溫服	麥門冬煎出三方 治諸渴病	麥門冬去心 人參 黃耆各二兩 白茯苓 山茱萸	山藥 桂心各一兩半 黑豆三分煮去皮別研	右為末地黄自然汁二碗牛乳二盞熬為膏丸如梧	桐子大大麥煮飲下五十丸	縮冰丸出楊氏家藏方 治瘡渴	欽定四庫全書 普濟方	甘遂半兩用鉄炒透裏黃褐色 黃連去鬚一兩	右為細末水浸蒸餅為丸如菉豆大每服二丸薄荷	湯送下不拘時候忌甘草三日	八味腎氣丸一名八味丸出三方 治瘡渴小便多以飲水一	斗利小便反倍亦主婦人病飲食如故煩熱不得卧而反倚息者如胞轉不得溺也以胞系反戾故致此病但利小便則愈	乾熟地半斤 山藥四兩 茯苓 牡丹皮 附子 桂心
--	------------------------	------------------------------------	---	--	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------------	--	-----------------------------	---------------------	--	--	--



各三 兩 澤瀉 四 兩 山茱萸 五	右為細末煉蜜丸如梧桐子大酒送下二三十丸忌	猪肉冷水蕪荑胡荽千金地黃丸亦佳仲景云常服	去附子加五味子桃公云加五味子三兩菴蓉四兩	張文云五味子菴蓉各四兩肘後方云地黃四兩附	子澤瀉各一兩餘各二兩	先服八味腎氣丸訖後服此藥壓之	黃連 蜀者二 苦參粉 乾地黃 知母 各十 牡蠣	欽定四庫全書 普濟方	煨八 吳麥門冬 去心十 栝樓 七分	右為細末搗篩牛乳和為丸如梧桐子大併手作丸	曝乾油袋盛用漿水或牛乳下日再服二十丸一方	服十五丸患重者渴瘥後更服一年以來此病特慎	麋鹿肉須慎酒炙肉鹹物喫素餅五日一頓細切精	羊肉勿著脂胞凡喫羊肉須着桑根白皮食一方云	瘥後須服此丸一載以上即永絕根源此病特忌房	室熱麵并乾補一切熱肉粳米飯李子等若覺渴熱
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------	--	-------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



加至二十五丸亦得定後還依前減其方神效無比
餘並准前十方忌猪肉蕪荑

家寶方大救生丸

一名豬肚丸
出三因方

治理三消渴病日夜

飲水百盃不歇若飲酒則渴愈甚者專心服餌之數
日後見酒與水若仇頓爾口中津潤小便縮減五日
後小便赤色是病毒歸於下也或令人吐或腰背脚
膝疼痛或嘔逆惡心精神昏困此乃藥驗使病毒消
散也或有不傳於下者主生子母瘡或生於背或生

欽定四庫全書

普濟方

發鬚間五漏瘡並能致命俱服此藥至八九服其病
自除患人大忌酒色熱麵鹹物豚魚葱蒜炙燂等物
一百日病根永除三焦之疾自風毒酒色所傷於上
焦以則其病變為小便頻數其色如濃油上有浮膜
味甘甜如蜜淹浸之以諸虫聚食是惡候也此名瘖
渴中焦得此病謂之脾瘖喫食倍常徃徃加三兩倍
只好飲冷入口甚美早夜小便頻數腰膝無力小便
如泔日漸瘦弱此名瘖中也下焦得此病謂之瘖腎



腎宮日耗飲不多喫食漸少腰脚細瘦遺泄散盡手 足以如柴形其疾已牢矣庸醫不識義理呼為癆疾 或云下冷日久不見其痊病之以或變為水腫或發 背瘡或足膝發為惡瘡至死不救									
牡蠣 生用 苦參 生為末 栝樓 生為末 知母 生為末 蜜陀僧 生用各一									
兩 白蠟 研 水銀 分 八 黃丹 研 半斤									
右為末男子患用未生子牡猪肚女人患用獐猪肚 一箇貯藥以線縫合用繩子繫在新瓦磚上不令走									
欽定四庫全書 普濟方									
轉更用栝樓根半斤細切入在水中一處和磚煮早 辰至午取猪肚細切與諸藥末杵丸梧桐子大陰乾 空心米飲下三十九日三服家藏方用黑鉛與水銀 結砂不用蠟一方有天花粉半兩一方有灰坯無蜜 陀僧									
參耆湯 出危氏方 治痼渴									
人參 去蘆 桔梗 去蘆 天花粉 甘草 各一兩 綿黃耆 鹽湯浸炙									
白芍藥 各三兩 白茯苓 去皮 北五味子 各一兩半									



右剉散每服四大錢水盞半煎八分日進四服留滓 合煎一方有木瓜乾葛烏梅三味	猪肚兒丸 一名黃連猪肚丸出如宜方 治痢渴	猪肚 一具治如倉方 黃連 梁米 各五兩 栝樓根 白茯苓	各四兩 知母 二兩 麥門冬 二兩	右為末納猪肚中縫好安甌中蒸極爛乘熱入藥木	白中搗可丸若硬加密和丸如梧桐子大每服三十	丸日二加至五十丸渴即服一方加人參熟地黃乾	欽定四庫全書 普濟方	葛直指方用雄猪肚	黃耆湯 出直指方 治痢渴	黃耆 茯神 栝樓根 麥門冬 去心各一兩 北五味	甘草 炙各半兩 生乾地黃 一兩半	右剉細每服四錢新水煎服	澄源丹 出三因方 治氣實血虛熱在上焦心煩燥渴引飲	無度小便數晝夜乃至一二十行有麩片狀者此疾	多得之飲啖炙煇日就羸瘦咽喉唇口焦燥呼吸少
--	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------	------------------------------------	---	---	--------------------	--	-----------------------------	-----------------------------



氣不能多語兩脚痠食倍於常不為氣力									
牡蠣粉 苦參 蜜陀僧 知母 水銀 以白燬半錢結									
砂五味 各一兩 枯樓根 半 一兩 黃丹 一兩 與水 銀同研									
右為末男用牡猪肚一箇女人用雌猪肚一箇入藥									
在內以線縫定用繩縛在新磚別用生枯樓半斤切									
碎同煮早辰至午時取藥出不用枯樓根只爛研猪									
肚和藥為丸如梧桐子大每服三十粒食前米湯下									
日三服十日可去病根									
欽定四庫全書 普濟方									
麥門冬湯 治瘖渴									
生麥門冬 去心 苧根 切 小麥 各二升 蘆薈 切 枯婁									
生薑 各五錢 石膏 研六分									
右水二斗煮取六升去滓每服一升渴時任意飲未									
瘖更作取利									
茯苓湯 出千金方 治瘖渴陰脉絕胃反而吐食者									
茯苓 八兩 澤瀉 四兩 白朮 生姜 桂心 各三兩 甘草 一兩									
右呖咀水一斗煮小麥三升取汁三升去麥下藥煮									



取二升半每服二合日再		六神湯		蓮房		右剉為散每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服小		天		天		味		殊		海		右		時		參		桃	
		存		乾		便		花		花		子		勝		浮		為		各		無		紅	
		方		葛		利		散		粉		兩		散		石		末		進		葛		散	
		治		枇		加		指		生		各		一		烏		每		一		根		總	
		三		杷		茯		方		乾		半		名		賊		服		服				錄	
		瘡		葉		苓		治		地		二		殊		魚		三		忌					
		渴		去				瘡		黃		分		砂		骨		錢		酒					
				毛						一				散		去		粳		色					
				甘						兩				出		甲		米		濕					
				草						乾						丹		百		麵					
				炙						葛						砂		粒		油					
				梔						麥						飛		同		煎					
				樓						門						虎		煎		生					
				根						冬						杖		服		冷					
				黃						心						一				鮓					
				耆						北						兩				醬					
										五						各				一					



赤石脂 石膏各一 栝樓根剉 白赤脂 鉛丹各一	甘草炙半兩	右為細散冷水調下二錢	黃連丸 治瘡渴療中焦熱渴	苦參一大斤 黃連七分 栝樓 知母 牡蠣粉 麥門	冬去心各五兩	右搗篩攪使勻以牛乳和併手捻丸如梧桐子大曝	乾日再服飽食訖以漿水下之服二十丸如微利減	欽定四庫全書 普濟方	十丸如食熱麵酒等即加服五丸忌猪肉	六物丸出聖惠方 治瘡渴熱中加減	栝樓根八分 麥門冬去心六分 知母五分 人參 苦參粉	土瓜根各四分	右為末牛膽和為丸如梧子大每服二十丸日三服	麥粥汁下未知稍加至三十丸咽乾者加麥門冬舌	乾加知母脇下滿加人參小便數加土瓜根隨患加之	各一分
--	-----------------------------	-------------------	---------------------	--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------



易老門冬飲子 出援 治老弱虛人大渴	人參 枸杞 白茯苓 甘草 各三兩 五味子 半兩	門冬 去心五錢	右咬咀每服一兩一錢水一盞半生姜三片煎至七	分去滓溫服不拘時	瓜蒌散 出危氏方 治盛壯之時不自謹惜恣情縱慾年長	腎氣虛弱因不能房事多服丹石真氣既孤舌唇乾	焦發渴精液洩小便赤黃大便乾實小便晝夜百十	欽定四庫全書 普濟方	行須當除熱補虛	白茯苓 去皮 天花粉 宣連 白扁豆 人參 去皮 石	膏 甘草節 寒水石 白朮 去皮 猪苓 各等分	右為末每服二錢熱湯調服立效	栝樓根散 出千金方 治瘖渴	栝樓根 麥門冬 鉛丹 各八分 茯苓 一作茯神 甘草 各六分	右為細末漿水服方寸匕日三外臺方無茯苓
---	--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	----------------	--	---	----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------



烏梅木瓜湯 出三因方 治食過度中焦蘊熱煩渴枯燥小便併多遂成疝中兼治瘴渴所謂瘴渴者北人往南方受瘴多有此疾	木瓜乾 烏梅 打破不去仁 麥蘖 炒 甘草 草蓰 去皮各半	右剉散每服四大錢水盞半姜五片煎七分去滓不拘時服	烏梅五味湯 出聖惠方 治瘠渴生津液	欽定四庫全書 普濟方	五味子 巴戟 酒浸去心 百藥煎 烏梅 甘草 各等分	右咬咀每服四錢水一盞空心煎服	茯苓丸 出聖惠方 治三瘠渴疾果有效	五倍子 去瓢四兩 蓮肉 一兩 龍腦 半兩 左顧牡蠣 煨二兩	右用茯苓二兩為末煮糊丸如梧桐子大每服五十	丸空心鹽湯下仍兼服靈砂黑錫	黃連牛乳丸 出聖濟總錄 治瘠渴	黃連 去鬚一斤為末 麥門冬 去心二兩研爛 牛乳 地黃汁 葛
--	---	-------------------------	----------------------------------	------------	---	----------------	----------------------------------	---	----------------------	---------------	--------------------------------	---



根汁 並一合	右合研衆手丸如梧桐子大每服二十九丸空心粥飲 下日漸再加至四十丸	麥門冬散 出聖惠方 治瘡渴不止宜服此	黃連 一兩炒 枯樓根 一兩 麥門冬 一兩去心焙 甘草 一兩炙微	赤茯苓 剉	右為散入黃丹研令勻每服不計時候以溫水調下	一盞	欽定四庫全書 普濟方	人參散 出聖惠方 治瘡渴	鉛霜 半兩細研 黃連 半兩去鬚 枯樓根 半兩 人參 半兩去蘆頭 黃丹	半兩炒 令紫色	右為散入研了藥令勻不計時候以溫水半盞下	枯樓丸 治瘡渴四肢煩熱口乾心燥宜服此	枯樓根 三兩 麥門冬 二兩去心焙 苦參 三兩分焙剉 人參 三分去蘆	知母 頭三分	右為末用牛膽汁和丸如小豆大不計時候清粥飲
------------------------------	---	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------	--	------------------------------------	---	-------------------------------	----------------------------	---------------------------	--	------------------------------	-----------------------------



下二十九	銀寶丸 一名澄源丹 治痢渴 方在本類	猪脊湯 出三方 治三痢渴疾	大棗 四十枚 新蓮肉 四十粒 西木香 一錢 甘草 二兩	炙	右用雄猪脊骨一尺二寸同煎藥用水五碗於銀器	煮去肉骨濾滓取汁一碗空心任意呷服忌生冷塩	等物以滓減去甘草一半焙乾為末米湯調服不以	欽定四庫全書 普濟方	時	人參散 一名參梅出 治痢渴	牛鼻木 二箇洗淨細剉男患用雌女患用雄 甘草 人參 各半 白梅	大者十箇	右用水四碗煎至三碗濾去滓熱服為妙	化水丹 出濟生 治手足少陰渴飲不止或心疼痛者	及消化水飲	川烏頭 大者四箇 甘草 炙三兩 牡蠣 生用三兩 蛤粉 六兩
-------------	---	-------------------------------------	--	----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	----------	-------------------------------------	---	----------------------------	-------------------------	--	--------------	--



炮者	右為細末醋浸蒸餅少糊為丸如梧桐子大每服十丸十五丸心痛者醋湯下其疾立愈	黃連膏出濟生 援粹 治瘡渴病	黃連末一斤 生地黃自然 白蓮花藕汁各一斤 牛乳一斤	右將汁熬成膏子搗黃連末為丸桐子大每服二十丸少呷溫水送下進十服渴病立止	元骨飲出聖濟 總錄 治瘡渴	欽定四庫全書 普濟方	猪脊骨五寸 棗二十枚 甘草微炙 乾姜炮各半	右呷咀水三升同煎至二升若發時量意加熱水服	生地黄膏出危 氏方 治渴證通用	生地黄東如常椀 冬蜜一椀 人參半 白茯苓去皮一兩	右將地黄洗切研細新水一碗調開同蜜煎至半次入參茯苓末拌和磁器密封匙挑服	清脾湯出如 宜方 治煩渴飲水小便赤	黃蓍 白芷 升麻 人參 甘草炙 半夏製各半
-----------	---	--	--	---	---	---------------------------------------	--	-----------------------------	---	---	---	---	--



右咬咀每服四錢姜五片棗二枚煎食後服	猪苓散 此即五苓散 治痼渴脉浮小便不利微熱者及病	欲水而復吐之為水逆冬時寒慄如瘧狀	猪苓 白朮 茯苓 各三分 澤瀉 五分 桂心 二分	右細搗篩水服方寸匕日三多飲暖水汗出即愈	滑石散 出聖惠方 治痼渴喫水漸多小便澁少皮膚乾燥	心神煩熱宜服此	蜜陀僧 半兩 黃連 半兩 滑石 半兩 栝樓根 半兩	欽定四庫全書 普濟方	右為細末入研了藥不計時候用清粥飲調下一錢	黃連散 出聖惠方 治渴潤肺心	黃連 三兩 生地黃汁 三分 栝樓汁 三分 牛乳 三分	右用三味汁相和每服三合不計時候調下黃連末	一錢	三黃丸 出千金方 治男子五勞七傷痼渴不生肌肉婦人	帶下手足寒熱者治丹石毒及熱渴以意測度須大實者方用
--------------------------	--	-------------------------	--	----------------------------	--	----------------	--	-------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------	-----------	--	---------------------------------



春三月 黃芩兩四 大黃兩三 黃連兩四	夏三月 黃芩兩六 大黃兩一 黃連兩七	秋三月 黃芩兩六 大黃兩二 黃連兩三	冬三月 黃芩兩三 大黃兩五 黃連兩二	右隨時加減搗為末以蜜為丸如大豆大米飲服五	丸日二稍加至七丸取下為已服一月病愈以服走	逐奔馬常試有驗效一本云夏三月不服	大黃甘草飲子出宣明論 治男子婦人一切瘡渴不能止	欽定四庫全書 普濟方	者	大豆五升先煮三沸 大黃一兩 甘草大粗者四兩	右用水一桶將前藥同煮三五時如稠糲水少更添	煮豆軟盛於盆中俟冷令病人食豆渴食湯汁無時候	服食盡如渴止即已不止再煮前藥不三次病悉去	矣	川黃連一名麥門冬 治諸渴	川黃連淨五兩 白天花粉 麥門冬去心各三錢半
---	---	---	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	--------------------------	----------	---	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------	---	--



右為末以生地黄汁并牛乳汁夾和搗丸如梧桐子大 每服三十丸粳米湯飲下一方無生地黄汁牛乳用 麥門冬搗勻為丸食後煎麥門冬湯下	硝石散 出聖濟總錄 治三疳渴疾	硝石 葛根 鉛霜 各一兩	右為細末每服一錢冷水調下	澄水飲 出聖濟總錄 治疳渴	銀餅內湯 兼 水萍 焙 葛根 劉各等分	欽定四庫全書 普濟方	右各件粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一半去滓	溫服	鉛黃散 出聖惠方 治疳渴不止	水銀 三兩先鎔鉛旋入水銀候鉛面上有花罩 皂莢 一挺	不蛀者塗酥炙令黃去皮 鉛 一斤	右為散每抄皂莢末一錢水一中盞煎至六分去滓	飲食後調下鉛黃散半錢服之	浮石散 出本 治疳渴
---	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------	-----------	--------------------------------------	--	--	-----------------------------	---------------------	----------------------------------



浮石 舶上青黛 各等分 麝香 少許	右為細末每服一錢溫湯調下	枳椇子丸 出危氏方 治飲酒多發積為酷熱蒸薰五臟津	液枯燥血泣小便併多肌肉消鑠專嗜冷物寒漿	枳椇子 二兩 麝香 一錢	右為末麵糊丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽湯	吞下	三神湯 出危氏方 治證同前	欽定四庫全書 普濟方	烏梅肉 遠志 去心甘草水煮過却以姜汁拌炒各一兩 枳實 去瓢一兩	夏加黃連 五錢 春秋冬不用	右剉散每服四錢水二盞糯禾根一握煎至七分去	滓不拘時候溫服若無糯禾白茅根亦可如無白茅	稈繩代之亦可	牡蠣散 出聖惠方 治瘡渴潤肺	白羊肚 一具切熬乾 牡蠣 三兩燒為粉 胡燕窩中草 燒灰一兩	右為散每服於食後以新汲水調下三錢
--	---------------------	--	----------------------------	---	-----------------------------	-----------	-------------------------------------	-------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	--------------------------------------	---	-------------------------



龍鳳丸 出危氏方 治瘡渴	鹿茸 火燎去毛一兩酒浸炙 山藥 兔絲子 酒浸各二兩	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸食前米飲下濃煎人參湯亦可一方麵糊丸塩酒湯下名龍肝	鳳髓丸	浮萍丸 出千金方 治瘡渴	乾浮萍 栝樓根 各等分	右為末以人乳汁為丸如梧桐子大空腹飲服三十丸日三三年病者三日愈治虛熱大佳	欽定四庫全書 普濟方	百日還丹 出儒門事親 治瘡渴	佛茄子 樟柳根 各等分	右為末枸杞汁和為丸如雞頭大每服丸數加減新水送下	烏金散 出三因方 治熱中多因外傷燥熱內用意傷脾飲	啖肥膩熱積胸中致多食數溲小便過於所飲亦有不渴而飲食自消為小便者
------------------------------------	--	---	------------	------------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--	--



黃丹 炒 細墨 燒各一兩	右研勻每服三錢食後先用水一兩碗漱口待心中熱索水便以冷水調下	止渴丸 專止渴	黃連 二兩 無名異 一兩	右為細末用蒸餅打糊為丸菴豆大每服百丸用茄根鹽殼煎湯送下姜湯亦得	竹龍散 出三因方 治瘖渴	欽定四庫全書 普濟方	五靈脂 黑豆 生去皮各半兩	右為散每服二錢煎冬瓜湯調下無冬瓜即用冬瓜苗葉子煎湯俱可一日二服小渴只一服差渴定後不可服熱藥唯宜服八味丸仍更宜用五味子代附子	冬瓜飲 一名黃瓜湯出十便良方 治瘖渴熱盛心神煩亂及飲水	小便如脂日夜無度	大冬瓜 一枚 黃連 去鬚半斤
---	--------------------------------------	----------------	---	--	------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	--	---	-----------------	---



右先搗黃連為末將冬瓜三停中截去一停取二停
淨去瓢子納黃連末於冬瓜中取截下一頭蓋却搜
白麵厚裹冬瓜令徧即更以黃土破泥裹一重候微
乾坐瓜在炭火中四面簇炭火燒令泥赤即止候冷
打去泥并剥去麵搗開瓜頭裏面有黃連汁不限多
少濾過每服一盞渴即飲之立瘥未瘥更作一服冬
瓜皮肉晒乾兼治骨蒸勞及酒黃多年者為散每於
食後溫水調下二錢甚效

欽定四庫全書

普濟方

栝樓根

出聖濟
總錄

治因好食熱麵炙肉及服補治熱藥

并乳石三焦氣隔心肺乾熱口乾舌焦飲水無度小
便日夜不知抖數心欲狂亂服此救急止渴

栝樓

一枚黃熟者去
皮用瓢并子

冬瓜

一枚中樣者割破頭納
栝樓瓢子在冬瓜心內

右用黃土泥裹冬瓜令勻可半指厚候乾簇炭火燒令
泥通赤即止去泥取瓜就熱切碎爛研布絞取汁約
七八合更入白蜜兩匙頭攪令調勻候稍冷即分三
度臍熱歇即不思水自無小便如不是栝樓熟時



節燒冬瓜令服	人參煎出聖濟總錄 治瘡渴	人參一兩 葛根二兩	右為末每發時須得燂猪湯一升已來入藥末三錢	又入蜜二兩同一處於鐺子內慢火熬之至三合以	來似稠黑錫便取出於新磁器內每夜飲後取一匙	頭含化嚥津重者不過三服	硃砂黃連丸出醫方集成 治心虛蘊熱或因飲酒過多發	欽定四庫全書 普濟方	為瘡渴	硃砂一兩 宣連二兩 生地黃三兩	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十九丸燈心棗湯	下	神白散出儒門事親 治真陰素被損虛多服金石燥熱之	藥或嗜燂炙鹹物遂成瘡渴之疾	桂府滑石六兩 甘草一兩 生用	右為末每服三錢溫水調下或大渴欲飲冷者以新
---------------	------------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	---	-----------------------	------------	---	------------------------------	----------	---	----------------------	---	-----------------------------



汲水調	雙補丸 出仁存方 治渴補養氣血	五味子 兔絲子 酒浸炒	右等分為末煉蜜丸如梧桐子大每服三四十九空	心米湯飲吞下	茯神湯 一名黃蓍湯 治瘖渴 方見本門胃熱渴類	人參湯 出聖濟總錄 治瘖渴初因酒得	人參 甘草 半生半炙各一兩	欽定四庫全書 普濟方	右粗搗篩用燂猪水去滓澄清取五升同煎至二升半	去滓渴即飲之永瘥	麵餅丸 一名神效丸又名神授丸出楊氏家藏方 治瘖渴有驗	蜜陀僧 一兩別研極細 川黃連 一兩為細末	右用蒸餅丸如梧桐子大每服五丸煎重殼茄根湯	下卧時服次日加至十丸以後每日五丸至三十丸	止服藥後以見水惡心為度即住服不過五六服必	效若覺惡阻每日食乾物壓之旬日後自定奇甚奇
-----	--------------------------------	----------------------------	----------------------	--------	--	----------------------------------	------------------------------	------------	-----------------------	----------	---	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



甚靈空是出蠶蛾子空靈殼一方為細末每遇渴時抄一字於舌上以水下之經驗方陳氏云昔沈德和帥西蜀時得此方偶然其壻章木苦斯疾服之數日頓愈余得於章屢試有效記得向有一客病此疾宿疾逆旅終夜求水不得偶釜中有湯酌而沃其渴即止旦起視之乃縲靈湯也近授閬州權軍任忠裕即日而差									
內金散 出經驗良方		治瘡渴日飲水一石小便不禁		欽定四庫全書 普濟方		雞內金 即雞肚內黃 菠薐根 各等分		右為末米飲調服二錢	
黃連丸 一名熱瘡丸出十便方		治患熱瘡渴常服有驗		豉心 二兩以塩醋拌蒸晒乾如此者三熬微黃 川黃連 三兩		右為細末蜜和為丸每日空腹服二十五丸食後服		二十九取烏梅十顆水二小升煎之數沸取湯下前件丸藥如無烏梅以小麥子二升煮取汁替亦得一方忌猪肉一方用胡黃連	





小豆藿一把	右搗取汁頓服三升	治瘡渴熱或心神煩亂出聖方	黍米泔	右用一大盞溫服之	水火既濟丸出符生堂經驗方	治上盛下虛心火炎燥腎水	枯竭不能交濟而成渴證此藥主之	黃連一斤 白茯苓一斤	欽定四庫全書 普濟方	右為細末熬天花粉水作麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸溫湯送下不拘時候	黃瓜根丸出聖方	治瘡渴熱或心神煩亂宜服此藥	黃瓜根三兩 黃連三兩	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服於食後以溫水送下二十丸	兔骨飲出仁存方	治瘡渴羸瘦小便不禁	兔骨一具微炙 大麥苗二斤
-----------------------------	-----------------	------------------------------------	------------	-----------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	-------------------------------	----------------------	---	---------------------------------	-------------------------------	------------------	---



右以水一斗煮取汁五升每服一小盞日三兩服又
宜食兔肉

棘枸子散

出百一
選方

治瘡渴

眉山楊穎臣長七尺健飲啖倖人也忽得瘡渴疾
日飲水數斗食倍常而數溺渴藥服之逾年疾日甚
自度必死治棺余囑其子延良醫張肱隱之子不記
其名為診脉笑曰君幾誤死取麝香當門子以酒濡
之十許丸用棘枸子作湯吞之遂愈問其故張云瘡

欽定四庫全書

普濟方

渴瘡中皆脾弱腎敗上不節陽水腎水不上升乃成
此疾今穎臣脾脉極熱下腎不衰當由果實與酒過
度熱在脾所以飲食過人而多飲水飲水既多不得
不多溺非瘡渴也麝香能敗酒果爪花棘枸亦勝酒
屋外有此木屋內釀酒不熟以木為屋屋下亦不成
釀故以此二物為藥以去果酒之毒也以其實如雞
距別鷄來巢今俗謂之雞距亦謂之癩漢指頭蓋取
其似也食之如牛乳小兒喜食之本草木部作枳椇



普濟方卷一百七十六														欽定四庫全書											
														普濟方											

