

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十一 明 周王朱櫛 撰

水病門

總論

黃帝問岐伯曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕何以別之岐  
伯曰水之始起也目窠上微腫如新睡起之狀頸脉動  
時欬陰股間寒足脛腫腹乃大其水之盛也以手按其  
腹隨手而起如裹水之狀轉動有聲此其候也膚脹何候

欽定四庫全書

普濟方

之膚脹者寒氣客於皮膚之間敦敦然而堅腹大身盡  
腫皮厚按之其腹陷而不起腹色不變此其候也鼓脹  
如何鼓脹者腹脹身腫大大與膚脹等其色蒼黃腹筋  
起此其候也腸覃如何腸覃者寒氣客於腸外與胃氣  
相傳正氣不得榮因有所繫瘕而內著惡氣乃起息肉  
乃生始也如雞卵稍以益大及其成也若懷子之狀以  
者離歲月按之即堅推之則移月事時下此其候也石  
瘕如何石瘕者生於胞中寒氣客於子門子宮閉塞氣



|                         |
|-------------------------|
| 不得通惡血當瀉不瀉衄以留止日益大狀如懷子月   |
| 事不以時下皆生於女子可導而下之曰膚脹鼓脹可   |
| 刺耶曰先瀉其脹之血絡後調其經刺去其血脉師曰   |
| 病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脈自浮外 |
| 證骨節疼痛其人惡風皮水其脈亦浮外證浮腫按之沒  |
| 指不惡風其腹如鼓不滿不渴當發其汗正水其脈沉   |
| 遲外證自喘石水其脈自沉外證腹滿不喘黃汗其脈   |
| 沉遲身體發熱胸滿四肢頭面普腫久不愈必致癰膿   |
| 欽定四庫全書                  |
| 普濟方                     |
| 心水者其人身體重而少氣不得臥煩而躁其人陰大   |
| 腫肝水者其人腹大不能自轉側而脇下腹中痛時時   |
| 津液微生小便續通脾水者其人腹大四肢若重津液   |
| 不生但若少氣小便難也肺水者其人身體腫而小便   |
| 難時時鴨澹腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺陰下   |
| 濕如牛鼻上汗足為逆冷其面反瘦師曰治水者腰以   |
| 下腫當利小便腰以上腫當發汗即愈問曰有病不利   |
| 利後渴飲水小便不利腹滿因腫何故師曰此法當病   |



水若小便自利及汗出者自當愈內外傷辯云金匱要  
畧腰已上腫者發汗腰已下腫者一利小便又云治濕不  
利小便非其治也大病后腰下有水氣牡蠣澤瀉散主  
之治濕則五苓散主之孫真人治皮膚腫以五皮散主  
之又述類象形之故也若果有水則小青龍加芫花湯  
主之病人乾嘔微利發熱而咳此為表有水表證罷咳  
而脇下痛為裏有水十棗湯主之於病又當詳審此病  
皆從虛損所致大病或下利後婦人產後飲水不即消

欽定四庫全書

普濟方

三焦決滿小便不利仍相結漸漸生聚遂流諸經絡故  
也水有十腫不可治者有五第一唇黑傷肝第二缺盆  
平傷心第三臍出傷脾第四背平傷肺第五足下平滿  
傷腎此五傷必不可治凡水病忌腹上出水出水者一  
月死大忌之夫腎主元氣天一之水生焉肺主沖化地  
四之金屬焉元氣乃水中之火所以太陽合少陰主精  
髓以滋血沖化乃土中之金所以太陽合陽明主肌肉  
以養氣今腎虛則大虧致傷陽水凝滯肺滿則土隘使



陰金沉潛衛氣凝滯而不理血淖經絡而不通上為喘  
急下為腫滿故經云腎為少陰肺為太陰其本在腎其  
末在肺皆至陰以精水也所以能聚水而生病者蓋腎  
為關鍵關鍵不利樞機不轉水不運行滲透經絡皮膚浮  
腫諸證不同以短氣不得臥為心水兩脇疼痛為肝水  
大便鴨澹為肺水四肢若重為脾水腰痛足冷為腎水  
口苦咽乾為膽水乍虛乍實為大腸水腹急肢瘦為膀胱  
水大小便秘澀為胃水小腹急滿為小腸水惟腎水

欽定四庫全書

普濟方

謂之正水又有風水皮水石水黃汗以義考之風合歸  
肝皮合歸肺黃汗歸脾石水歸腎雖名理不踰證候少  
異如風水脉必浮惡風皮水脉浮按不沒指石水脉沉  
腹滿不喘黃汗脉沉遲致發熱多涎治療之法當辨其  
陰陽脉證若陰水為病者脉來沉遲色多青白不煩不  
渴小便澀少而清大腑多泄陽水為病者脉來沉數色  
多黃赤或煩或渴小便赤澀大腑多秘腰已上腫者宜  
發汗腰已下腫者宜利小便然後實其脾土土盛自能



攝養腎水其腫自消虛弱者又當溫補下元又有內挾  
七情之氣停滯涎飲腹滿脇脹名為氣分及少血血熱生  
瘡變為腫痛名為內熱又當隨證施治不可一塗而取要  
知此證浮大者生沉細者死臨證施治宜詳審焉治法  
大要身有熱者水氣在表可汗身無熱者水氣在裏可  
下其間通利小便順氣和脾胃俱不可緩耳然而證雖  
可下又當推其重輕不可過用芫花大戟甘遂猛烈之  
劑一發不收吾恐峻決者易固閉者難水氣復來而無

欽定四庫全書

普濟方

以治之也然水之為腫特一目曰風曰氣曰血合而有  
三焉風腫者皮癢麻木不仁走注疼痛氣腫者皮厚四  
肢瘦弱腹脇脹膨或煩躁漱水迷忘驚狂嘔逆煩悶皮  
間有紅縷赤痕者是血腫者婦人經脈壅閉敗血停腐  
尤多見之然婦人懷胎亦有氣遏水道而虛腫此但順  
氣安脾飲食無阻既產而腫自消若產後發虛則虛退  
而告殂矣大凡虛腫先起於腹而後散於四肢者可治  
先起於四肢而後歸於腹者不治至若蠱脹而肚上有



筋腹滿而大便滑泄以瘧而轉作虛浮男從脚下腫而  
上女從身上腫而下或肉硬或手掌平並不治當審而  
察之也大凡水病難治產後特須於口味又復病水人  
多嗜食不廉所以此病難愈也代有醫者隨逐時情意  
在財物不理本性病人欲食而於貴勝之處勸全食羊頭  
蹄肉如此者未見有一愈者又此病百脉之中氣水俱  
實治者皆欲令瀉之使虛羊頭蹄極補那得瘳愈所以  
治水藥多用葶藶子等諸藥本草云葶藶以服令人大

欽定四庫全書

普濟方

虛故水病非以虛不得絕其根本有蠱脹但腹滿不腫  
水脹脹而四肢面目俱腫大在醫者以不善診候治蠱  
以水藥治水脹以蠱藥或但見脹滿皆以水藥如此者  
仲景所云愚醫殺之此疾所忌者喪孝產乳音樂一切  
生冷一切魚蒜房室誼戲酢滑一切肉粘食米豆油膩  
並禁不得食及不得用心其房室等當三年慎之永不  
復發不爾者雖瘳復發發後更不可治也古方有十水  
丸歷驗多利小便所以不能述錄也



水腫 附論

夫水腫之病以脾腎氣虛不能制於水水氣妄行溢於皮膚其證股冷膚腫時作欬嗽不得安臥小便黃澁以手按腫處隨手而起是也

又方

徐王煑散 出千金方 治水腫利小便

牛角鯁 防己 羌活 人參 丹參 牛膝

升麻 防風 秦艽 生薑屑 榆皮 紫苑

欽定四庫全書

普濟方

杏仁 附子 石斛

各三兩

桑白皮

六兩

橘皮

二兩

白朮 澤瀉 茯苓 郁李仁 猪苓 黃連

兩

各一兩

右為末篩為麤散以水五升煮三升取一升頓服日再不能者但一服二三日以前可服主利多而小便

澁者用之大驗

檳榔丸

出聖濟總錄

治水腫及療老小虛腫大病後客腫

作喘



|   |  |   |   |   |  |  |                          |   |   |  |                             |                   |   |                             |
|---|--|---|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-------------------|---|-----------------------------|
| <p>欖榔<small>微煨</small> 附子<small>炮去皮臍</small> 吳茱萸<small>水浸暴乾炒</small> 乾薑<small>炮</small></p> | <p>防己 厚朴<small>去麤皮塗薑汁炙</small> 甘草<small>炙各一兩</small> 葶藶<small>紙上炒紫</small></p> | <p><small>色</small>杏仁<small>浸去皮尖雙仁炒</small> 椒目<small>微炒</small> 赤茯苓<small>去皮去黑皮</small></p> | <p>黃耆<small>剉炒</small> 麻黃<small>去根節炒</small> 桂<small>去皮去麤皮</small> 栝萋<small>去皮</small> 白朮</p> | <p><small>剉微炒</small> 海藻<small>洗去鹹汁各一兩半</small></p> | <p>右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服米飲下十九日三稍加至十五丸未知加至二十五丸得小便利為度</p> | <p>欽定四庫全書<br/>                 普濟方</p> | <p>丁香散 治腹脹硬滿水腫遍身小便澀少</p> | <p>丁香<small>一錢</small> 胡椒 益智<small>各一錢半</small> 青皮<small>去白</small> 陳皮<small>去白</small></p> | <p>甘草<small>三錢各炒</small> 茯苓 白朮 連翹 桑白皮<small>炒</small></p> | <p>木香 枳殼<small>去瓢炒</small> 木通 車前子<small>炒各二錢</small></p> | <p>右為細末每服三錢水一盞半生薑五片煎至七分</p> | <p>和滓溫服食前日進三服</p> | <p>復元丹<small>出醫方大成</small> 治水腫夫心腎真火能生脾肺真土</p> | <p>今真火氣虧不能滋養真土故土不能制水水液妄</p> |
|---|--|---|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|-----------------------------|-------------------|---|-----------------------------|





|                       |                    |     |                    |
|-----------------------|--------------------|-----|--------------------|
| 欽定四庫全書                |                    | 普濟方 |                    |
| 右為末麵糊丸如梧桐子大每服五十九丸紫蘇湯下 |                    |     |                    |
| 不以時空心食前服此藥世傳屢驗其君臣佐使與  |                    |     |                    |
| 造物同妙一日三服先次旋利頃次乃腫消喘止蓋  |                    |     |                    |
| 藥能助真火以養真土運動樞機安平必矣法當禁  |                    |     |                    |
| 絕鹹半年乃不再作              |                    |     |                    |
| 當歸散                   |                    | 治如前 |                    |
| <small>出醫方集成</small>  |                    |     |                    |
| 當歸                    | 洗                  | 木香  | 煨                  |
| 赤芍藥                   |                    | 赤茯苓 |                    |
| 牡丹皮                   |                    | 桂心  |                    |
| 陳皮                    |                    | 檳榔  |                    |
| 木通                    |                    |     |                    |
| 白朮                    | <small>各剉炒</small> |     |                    |
|                       | <small>乾等分</small> |     |                    |
| 附子                    | <small>炮二兩</small> | 南木香 | <small>煨</small>   |
| 獨活                    | <small>一方用</small> | 茴香  | <small>炒</small>   |
|                       | <small>羌活</small>  | 川椒  | <small>炒去汗</small> |
| 厚朴                    | <small>去皮剉</small> | 陳橘皮 |                    |
|                       | <small>薑製炒</small> |     |                    |
| 吳茱萸                   | <small>炒</small>   | 肉豆蔻 | <small>煨半兩</small> |
|                       |                    |     |                    |
| 桂                     | <small>各一兩</small> |     |                    |
|                       |                    |     |                    |
| 澤瀉                    | <small>一兩半</small> |     |                    |
|                       |                    |     |                    |
| 檳榔                    | <small>半兩</small>  |     |                    |



|  |                                  |   |  |                   |                                      |  |   |  |  |                                  |                             |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------|--------------------------------------|--|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| <p>右為末脚膝頭面腫大小便不快每服二錢水一盞<br/>                 紫蘇淡竹葉淡木瓜一片如指大同煎八分溫服日<br/>                 三如已愈常服早晚二覺氣下或小便快是效臟寒<br/>                 去檳榔臍已凸添大腹皮木通猪苓各一兩忌烏雞<br/>                 肉醎酸海味物一方無白朮</p> | <p>茯苓丸 <small>出千</small> 治水腫</p> | <p>茯苓 白朮 椒目 <small>各四分</small> 木防己 葶藶</p> | <p>桂心 <small>各二兩</small> 澤瀉 <small>各五分</small> 甘遂 <small>十二分</small> 赤小豆</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>前胡 芫花 芒硝 <small>七分</small> 別研</p> | <p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大蜜湯下五丸日一稍<br/>                 加以知為度</p> | <p>消腫丸 <small>出醫方大成</small> 治水腫喘滿小便不利</p> | <p>滑石 木通 白朮 黑牽牛 <small>炒</small> 通脫木</p> | <p>赤茯苓 茯神 半夏 <small>洗各一分</small> 陳皮 <small>一分</small> 木香 <small>半分</small></p> | <p>瞿麥穗 丁香 <small>各一錢</small></p> | <p>右為末以酒糊為丸如梧桐子大每服四五十九燈</p> |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------|--------------------------------------|--|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------|



心麥門冬湯下

導水茯苓湯

出聖  
生堂

治水腫頭面手足徧身腫如爛瓜

之狀手按而塌陷手起隨手而高突喘滿倚不息不能轉側不能着床而睡飲食不下小便塞澀溺出如割便絕少雖有而如黑豆汁煮服喘嗽氣逆諸藥不効本堂用此即愈亦嘗驗其病重之人服此藥時要如熬阿刺吉酒相似藥水一斗止取藥一錢服後小水行時即漸添多直至小便變清白色方為全愈

欽定四庫全書

普濟方

澤瀉

赤茯苓

白朮

麥門冬

去心各  
三兩

紫蘇

木瓜

檳榔

各一  
兩

陳皮

砂仁

木香

大腹

皮

各七  
錢半

如病重者前藥計一十九兩重可均作三大服每服再加去心麥門冬二兩重燈草一大把均半兩重水一斗於砂鍋內下藥五兩重熬一大碗再下小銚內煎至一大盞五更空心服滓再煎服連進三服自然利

小便



|                             |                             |                |   |  |   |  |                             |                       |                             |                 |                                       |   |  |   |           |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---|--|---|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|--|---|-----------|-----------------------------|
| <p>右咬咀五錢重水二盞燈心二十五根煎八分去滓</p> | <p>空心服後一方沉香琥珀丸與導水茯苓湯是一對</p> | <p>藥服之自見其効</p> | <p>沉香琥珀丸<small>出德生堂</small> 治水腫一切急難證小便不通者</p> | <p>琥珀 杏仁<small>去皮</small> 赤茯苓<small>各半</small> 澤瀉<small>兩半</small></p> | <p>紫蘇<small>真者</small> 沉香 葶藶<small>炒</small> 郁李仁<small>去皮殼各</small></p> | <p>橘皮<small>白去</small> 防己<small>各七錢半</small></p> | <p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大以麝香半錢為衣每</p> | <p>欽定四庫全書<br/>普濟方</p> | <p>服二十五丸加三十至五十丸煎人參湯送下空心</p> | <p>量稟氣虛實加減用</p> | <p>藁本丸<small>出聖濟總錄</small> 治水腫久不瘥</p> | <p>藁本<small>去苗</small> 葶藶<small>炒紫色</small> 大戟<small>炒微</small> 蜀椒<small>去目及閉口者</small></p> | <p>汗<small>炒出</small> 澤漆<small>微炒</small> 巴豆<small>去皮心數</small> 赤小豆<small>微炒</small></p> | <p>澤瀉<small>各半</small> 甘遂<small>微炒</small> 牽牛子<small>炒熱</small> 連翹<small>微炒</small></p> | <p>兩半</p> | <p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每日空心温酒下一丸</p> |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---|--|---|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|--|---|-----------|-----------------------------|



|             |                      |  |  |              |                              |       |               |                      |                             |                         |            |                      |                      |                |            |               |
|-------------|----------------------|--|--|--------------|------------------------------|-------|---------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|
| 便秘澁先服十棗湯後服此 | 右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎六分溫服大小 | 白朮 兩 一<br>茯苓 一兩 去皮<br>木猪苓 去皮<br>澤瀉<br>肉桂 | 橘皮 兩 去白一<br>木香 半 二錢<br>滑石 兩 六<br>檳榔 三錢 | 小便不利大便滑泄並宜服之 | 大腹皮湯 大成 出醫方<br>治濕氣熱內攻心腹脹滿并水腫 | 量加漸加之 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 右咬咀以酒三斗浸五日服五日服五合日三任性 | 猪苓 兩 各三<br>知母 海藻 茯苓 桂心 兩 各二 | 鬼箭羽 丹參 白朮 獨活 兩 各五<br>秦艽 | 之乃可得力瘥後可常服 | 瘥者宜服此藥將以微除風濕利小便消穀歲久服 | 小勞苦足脛腫飲食便氣急此終身疾服利下藥不 | 有人患水腫腹大其堅如石四肢細 | 鬼箭羽散 出千 金方 | 加至二丸服後小便多白水即住 |
|-------------|----------------------|--|--|--------------|------------------------------|-------|---------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|



葶藶丸 出醫方  
集成

治腹中有濕熱氣自下作腫如新臥

起之狀兩足脛腫病在腎少陰故也標在肺肺太陽

也故腹滿氣急欬喘息有音每就臥則右脇有氣上

衝肩腋與血盆相牽引不快少思飲食

甜葶藶 兩半 郁李仁 湯去皮熬紫色秤三分將  
二味別研如膏令極勻

白朮 兩半 牽牛子 半兩一分半熟 桑白皮 赤茯苓

漢防己 羌活 陳橘皮 澤瀉

右為細末與上二味同研煉蜜和入白內杵之丸如

欽定四庫全書

普濟方

梧桐子大初服十丸空心晚食前日二服生薑皮湯

下不知加至二三十九丸以知為度

葶藶木香湯 出醫方  
集成 治水腫腹脹小便滑泄

葶藶 炒香 白朮 猪苓 去皮各一分 茯苓 三分 桂枝

二錢 滑石 三兩 澤瀉 木通 甘草 炒各三錢 木香

半錢一方  
無白朮

右為細末白湯調二三錢食前日夜四服若小便不

得通而返滑者此濕熱痞悶極深而攻之不開是能



|  |  |
|--|--|
| 反為注泄此正氣已衰而多難救也不可強攻之恐<br>無益爾勉以救之則少少與服之使稍稍導散微以<br>得所漸以加之以意消息 |  |
| 木通散  | <small>出儒門<br/>事親</small> 治水腫                  |
| 海金沙  | 舶上茴香 巴戟 大戟 甘遂                                  |
| 芫花   | 木通 滑石 通草                                       |
| 右各等分為細末每服三錢大麥麵和作餅子如常                                       |  |
| 二錢大爛嚼生薑湯送下   |  |
| 欽定四庫全書   |  |
| 普濟方  |  |
| 郁李仁圓   | 治水腫利小便   |
| 郁李仁  | <small>湯浸去皮尖<br/>微炒三分</small>                  |
| 海藻   | <small>洗去鹹<br/>水炒</small>                      |
| 桂  | <small>去麤皮<br/>各半兩</small>                     |
| 大黃   | <small>剉碎<br/>醋炒</small>                       |
| 葶藶   | <small>紙上炒紫色<br/>各一兩一分</small>                 |
| 川黃連  | <small>半兩<br/>去鬚</small>                       |
| 木通   | <small>剉<br/>各一分去<br/>毛微炒</small>              |
| 石葦   | <small>各一分去<br/>毛微炒</small>                    |
| 松羅   | <small>三分</small>                              |
| 右為末煉蜜丸梧桐子大每服米飲下十五丸日三<br>稍增以知為度                             |  |
| 白粉霜丸   | <small>出宣<br/>明論</small> 治病水鼓滿不食四肢脬腫大便閉<br>不進食 |



|  |  |                      |       |                               |   |               |  |  |                   |                                  |  |  |                      |                      |
|--|--|----------------------|-------|-------------------------------|---|---------------|--|--|-------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 粉霜 硃砂 海蛤 玄精石 寒水石<br><small>燒研</small><br>白丁香 頭白麵 <small>各二錢</small> 輕粉 <small>三錢</small> 海金砂 <small>一錢</small> | 右研勻着紙褱數重便麵裹又紙裹又冷酒蘸了桑柴火燒麵熟為度宿餛餅和丸如梧桐子大每服三 | 丸生薑湯下一日三服二日加一九至六日不加即 | 止以粥補之 | 行水圓 <small>出直指方</small> 治水腫氣腫 | 葫蘆巴 <small>炒</small> 破故紙 <small>炒</small> 縮砂仁 華澄茄 <small>各二錢半</small> | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 木香 <small>兩半</small> 真川椒 <small>去目紙炒出汗</small> 烏梅肉 <small>焙乾各二錢半</small> | 牽牛 <small>兩炒半</small> 巴豆 <small>畧去油一錢半</small> | 右為末麵糊丸菴豆大每服五丸食薑湯下 | 水銀葶蘆圓 <small>出聖急方</small> 治水腫利小便 | 水銀 <small>三兩煮三日三夜</small> 葶蘆子 椒目 <small>各一升</small> 衣魚 <small>二枚</small> | 水萍 瓜蒂 滑石 <small>各二兩</small> 芒硝 <small>五兩</small> | 右搗葶蘆令細下水銀更搗令不見水銀止別搗椒 | 目令細搗瓜蒂水萍下篩合和餘藥以蜜和更搗三 |
|--|--|----------------------|-------|-------------------------------|---|---------------|--|--|-------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|





|   |                           |
|---|---------------------------|
| 商陸圓 <small>出聖 惠方</small> 治水腫                    |                           |
| 商陸 <small>兩 微 灸 半 一</small>                     | 芒硝 <small>兩 研 一</small>   |
| 甘遂 <small>炒 微</small>                           | 大黃 <small>醋 剉 炒 碎</small> |
| 水腫  |                           |
| 右為細末水煮棗肉為丸如小豆大每服五七十九                            |                           |
| 水腫  |                           |
| 大戟 芫花 甘遂 海帶 海藻 郁李仁                              |                           |
| 續隨子 <small>兩 各 半</small> 章柳根 <small>兩 一</small> |                           |
| 泄水丸 <small>出 儒 門 事 親</small> 治水腫                |                           |
| 滑石  |                           |
| 悉生之漆師集驗陶氏古今錄驗無衣魚水萍瓜蒂                            |                           |
| 欽定四庫全書  |                           |
| 普濟方   |                           |
| 藥以止利藥五下止病未瘥更服病瘥止此治諸體                            |                           |
| 肉肥按之不陷甚者臂粗著之油不受及千里大水                            |                           |
| 怪也不經三五日即消苦皆瘥以上服藥若下多停                            |                           |
| 咽喉上有瘰子腫起頰車腫滿齒斷皆浮唾碎血出物                           |                           |
| 起次服二丸如是每至六丸還從一丸起如服藥當                            |                           |
| 次服四丸次服五丸次服六丸至七丸還從一丸始                            |                           |
| 萬杵成丸初服一丸如梧桐子次服二丸次服三丸                            |                           |



|   |                               |                            |                          |                           |     |
|---|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----|
| 兩 | 芫花<br><small>微炒</small>       | 薹花<br><small>微炒各三分</small> | 麝香<br><small>研四錢</small> | 猪苓<br><small>去黑皮一</small> |     |
|   | 右為末煉蜜丸梧桐子大每服米飲下五丸日三服          |                            |                          |                           |     |
|   | 以微利為度華陀方酒客虛熱當風飲冷腹冷脹加          |                            |                          |                           |     |
|   | 麝香猪苓各一兩一方無大黃                  |                            |                          |                           |     |
|   | 牡蠣澤瀉散<br><small>出衛生寶鑑</small> | 治脾胃氣虛不能制約腎水水               |                          |                           |     |
|   | 溢下焦腰以下有腫也金匱要畧曰腰以下有腫當          |                            |                          |                           |     |
|   | 利小便                           |                            |                          |                           |     |
|   | 欽定四庫全書                        |                            |                          |                           |     |
|   | 普濟方                           |                            |                          |                           |     |
|   | 牡蠣                            | 澤瀉                         | 栝萋根                      | 蜀漆<br><small>洗去腥</small>  | 葶藶子 |
|   | 商陸<br><small>已上各等分</small>    | 右為末白飲和服方寸匕小便利止後服鹹味漏泄       |                          |                           |     |
|   | 牡蠣澤瀉海藻之鹹以瀉水氣內經曰濕淫於內平          |                            |                          |                           |     |
|   | 以苦佐以鹹辛以苦泄之蜀漆葶藶根商陸之            |                            |                          |                           |     |
|   | 酸辛與苦以導腫泄小便以散水                 |                            |                          |                           |     |
|   | 實脾散<br><small>出醫方集成</small>   | 治陰水先實脾土為病腫脉沉遲不             |                          |                           |     |
|   | 煩渴小便澁清大便多泄                    |                            |                          |                           |     |



|                                     |                                  |                       |                      |     |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|
| 厚朴 <small>皮去</small>                | 白朮                               | 木瓜 <small>去</small>   | 木香 <small>不見</small> | 草薺仁 |
| 大腹子                                 | 附子 <small>炮去</small>             | 白茯苓 <small>皮去</small> | 乾薑 <small>炮各</small> | 二兩  |
| 甘草 <small>炙半</small>                | 兩                                |                       |                      |     |
| 右咬咀每服四錢水一盞半薑五片棗二枚煎至七分去滓溫服不拘時候       |                                  |                       |                      |     |
| 一方 治脾元虛浮腫                           |                                  |                       |                      |     |
| 附子 <small>筒一</small>                | 草薺                               | 乾薑 <small>各一</small>  | 甘草 <small>一</small>  | 大腹皮 |
| 遠皮 <small>六兩</small>                | 木瓜 <small>一筒去穰切片入水砂器內同煮乾</small> |                       |                      |     |
| 欽定四庫全書                              | 普濟方                              |                       |                      |     |
| 恐近焦                                 |                                  |                       |                      |     |
| 焙乾                                  |                                  |                       |                      |     |
| 右為末空心日午用沸湯點服                        |                                  |                       |                      |     |
| 治大腸水乍虛乍實上下來去 <small>出千</small>      |                                  |                       |                      |     |
| 赤小豆 <small>升五</small>               | 桑白皮 <small>升切二</small>           | 鯉魚 <small>筒四</small>  | 白朮 <small>兩八</small> |     |
| 右為末空心日午用沸湯點服以水三斗煮魚取爛勿鹽去魚盡食并取汁四升許細飲下 |                                  |                       |                      |     |
| 葶藶丸 治內虛外實久有積聚榮衛不通甚者變水               |                                  |                       |                      |     |
| 此為病從心起入於皮膚腫滿皮厚體重上氣不卧                |                                  |                       |                      |     |



|                                |                              |                                     |    |                                 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----|---------------------------------|
| 煩布而躁                           | 葶蘆 <small>炒令紫<br/>半合</small> | 防己                                  | 椒目 | 大黃 <small>剉碎醋炒<br/>各一兩半</small> |
|                                | 蓖麻子 <small>去皮<br/>半合</small> | 郁李仁 <small>湯浸去壳<br/>炒一兩</small>     |    |                                 |
| 右為末煉蜜同棗肉和丸如小豆大每服十丸空心           |                              |                                     |    |                                 |
| 溫酒下如不動加至十五二十九                  |                              |                                     |    |                                 |
| 牽牛子丸 治水腫上氣大便澀                  |                              |                                     |    |                                 |
| 牽牛 <small>炒一兩半</small>         | 葶蘆 <small>炒熟<br/>二兩</small>  | 杏仁 <small>去皮尖雙仁麩<br/>炒一百枚別研</small> |    |                                 |
| 芒硝 <small>半兩<br/>研</small>     | 牛酥 <small>半合<br/>炙</small>   | 大棗 <small>煑去皮核<br/>十枚研</small>      |    |                                 |
| 欽定四庫全書                         |                              | 普濟方                                 |    |                                 |
| 右為先搗前二味為末入杏仁等研勻次入牛酥搗           |                              |                                     |    |                                 |
| 萬杵丸如菘豆大每丸至十丸空心粥飲下              |                              |                                     |    |                                 |
| 澤漆根湯 治水在肺令人咳喘上氣腹大脚腫目下          |                              |                                     |    |                                 |
| 如臥蠶衛渴不得臥有頃及復小便難少而數胸滿           |                              |                                     |    |                                 |
| 隱痛此水氣迫肺氣也宜利小便                  |                              |                                     |    |                                 |
| 澤漆根 <small>生四兩</small>         | 麥門冬 <small>去心<br/>焙</small>  | 甘草 <small>炙</small>                 | 人參 |                                 |
| 赤茯苓 <small>去黑皮<br/>各一兩</small> | 鯉魚 <small>一斤者<br/>去頭</small> |                                     |    |                                 |
| 右將五味粗搗篩先用水三升煮取汁一升去魚每           |                              |                                     |    |                                 |



|  |                   |                                  |  |                      |                                    |  |                                  |               |     |                       |                          |                                   |  |   |
|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|-----|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|---|
| 第一退水圓<br><small>出三方</small><br>化氣退水腫去呃逆利濕通小便 | 右為末每服一大錢米飲調下忌生冷油麵 | 茯苓散<br><small>出危氏方</small><br>用補 | 木香<br><small>錢五</small><br>肉豆蔻<br><small>煨</small><br>肉蓯蓉<br><small>酒洗炙各二兩</small> | 右為末用大戟葶藶子煎湯調下五更初喫下水効 | 青皮<br>黑牽牛<br><small>取頭末各一兩</small> | 巴豆<br>甘遂<br><small>各二錢</small><br>檳榔<br>大戟<br>當歸<br><small>各五錢</small> | 牽牛湯<br><small>出危氏方</small><br>催發 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 下水効 | 右為末米糊丸每服五十九丸空心溫酒吞五更早喫 | 杏仁<br><small>各等分</small> | 芫花圓<br><small>出危氏方</small><br>消水腫 | 大巴豆<br><small>二十五枚去壳</small><br>葶藶<br>大黃<br>桂皮<br>芫花 | 服三錢汁一盞煎至七分去滓溫服日三以小便利為度不利增服如大便利小便未利者增至四合初服一日氣即下得安臥有寒可加生薑三兩切焙 |
|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------|-----|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|---|



|  |                     |                     |                      |                      |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 蓬朮 <small>炮</small>  | 三稜 <small>煨</small> | 桂心                  | 青皮                   | 益智 <small>各半</small> |
| 巴豆 <small>二兩去皮<br/>出油別研</small>                              |                     |                     |                      |                      |
| 右為末麵糊丸如梧桐子大用黃梔子十箇劈破荆芥黑牽牛酸漿草各少許煎湯空心下二三十丸                      |                     |                     |                      |                      |
| 第二退水餅 <small>出三<br/>因方</small>                               | 服前藥未効即服此方           |                     |                      |                      |
| 甘遂 <small>大戟<br/>各等分</small>                                 |                     |                     |                      |                      |
| 右為末入麵打水調為餅如碁子大火煨熟五更淡茶湯下一錢餅可用大麥麵不用白麵五更後服至                     |                     |                     |                      |                      |
| 欽定四庫全書   | 普濟方                 |                     |                      |                      |
| 曉下極多如病未退隔日再服   |                     |                     |                      |                      |
| 第三大腹子散 <small>出三<br/>因方</small>                              | 取轉後調正胃氣進食           |                     |                      |                      |
| 大腹子 <small>炒</small>   | 桂心                  | 茴香 <small>炒</small> | 陳皮 <small>各半</small> |                      |
| 右為末每服二錢米飲調下  |                     |                     |                      |                      |
| 三花神佑圓 <small>出衛生<br/>寶鑑</small>                              | 治中滿腹脹喘嗽淋瀝水濕腫        |                     |                      |                      |
| 滿變生疾以病不已黃瘦困倦氣血壅住不得宣通或風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛瘧疾不已癥瘕積聚堅滿痞悶酒積食積一切痰飲嘔逆及婦女經病 |                     |                     |                      |                      |



不快帶下淋瀝無問赤白并男子婦人濕熱腹滿實  
痛兼瀉以新腰痛一切痢疾及小兒驚疳積熱乳癖  
並宜服之

甘遂

大戟

芫花

醋伴濕炒  
各半兩

大黃

一兩

輕粉

一錢

黑牽牛

二兩  
頭末

右為細末滴水為丸如小豆大初服五丸後服五丸  
溫水下每日三服加至快利利後却當服病去為度  
設病安後老弱虛人平人常服保養宣通氣血消進

欽定四庫全書

普濟方

飲食病痞滿極甚者更多服則頓攻不開轉如痛悶  
初服二丸每服如二丸至快利為度以意消息小兒  
丸如麻子大隨弱壯增減二錢四歲者三五丸依前  
法

大黃湯

出聖濟  
總錄

治水腫

大黃

剉碎醋  
炒二兩

桂

去粗  
皮

甘草

炙  
剉

人參

細辛

去苗葉  
各一兩

桑根白皮

炒黃色  
剉二兩

右粗搗篩每服用水三盞藥五錢匕入棗二枚劈破



|                      |   |                            |                    |                      |   |                                     |               |        |                       |   |   |          |        |                      |
|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------|-----------------------|---|---|----------|--------|----------------------|
| 右為末入銀硃研勻以木瓜膏丸如梧桐子大每服 | 宣木瓜乾 <small>四兩濕者一箇剉童子小便法酒各一升煮爛絞汁</small> 大豆 <small>煮去皮乾</small> | 正陽丹 <small>出三方</small> 治水腫 | 右用水三碗同煮不見愈入鹽先喫魚後服藥 | 葱白 <small>五根</small> | 烏鯉魚 <small>一箇</small> 赤豆 桑白皮 白朮 陳皮 <small>各一兩</small> | 烏鯉魚湯 <small>出危氏方</small> 治水腫消腫又治四肢腫 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 五行見効即止 | 右為末煉蜜丸梧桐子大每服茶湯下十五丸利三五 | 商陸 <small>微炙</small> 葶藶 <small>紙上炒</small> 牽牛子 <small>炒熟</small> 巴豆 <small>清水煮一</small> | 桑根白皮 <small>取上有白槲者北陰下根白皮剉炙黃二兩</small> 郁李仁 <small>湯去皮炒</small> | 桑白皮圓 治水腫 | 日三利小便瘥 | 同煎至九分去滓入葱白錫一匙頭更煎一沸溫服 |
|----------------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------|---|-------------------------------------|---------------|--------|-----------------------|---|---|----------|--------|----------------------|





|  |                                   |                                   |                                |                                |                                |                                       |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 五十九丸米湯下                                  | 牽牛子湯<br><small>出聖濟<br/>總錄</small> | 牽牛子<br><small>去白炒<br/>各一兩</small> | 檳榔<br><small>煨</small>         | 木香                             | 赤茯苓<br><small>去黑皮</small>      | 陳皮                                    |
| 此藥不獨療水病凡肺氣脚氣賁豚氣上築心胸不可忍皆治之                | 芫花湯<br><small>出聖濟<br/>總錄</small>  | 芫花<br><small>炒黃<br/>色</small>     | 大黃<br><small>剉碎<br/>醋炒</small> | 甘遂<br><small>微炒</small>        | 甘草<br><small>微炙<br/>剉</small>  | 大戟<br><small>去皮微炒<br/>各一兩</small>     |
| 右粗搗篩每服三錢匕水二盞棗二枚擘破同煎至九分下芒硝半錢匕更煎一沸去滓溫服以利為度 | 防己丸<br><small>出聖濟<br/>總錄</small>  | 防己                                | 海蛤<br><small>研各一兩</small>      | 葶藶<br><small>一升<br/>蒸熟</small> | 甘遂<br><small>微炒<br/>一分</small> | 杏仁<br><small>十枚湯去皮尖<br/>雙仁炒碎研</small> |
| 右先將以葶藶杏仁一處拌和後以三味為末再研                     |                                   |                                   |                                |                                |                                |                                       |



|                               |   |  |  |               |  |          |   |                                 |  |
|-------------------------------|---|--|--|---------------|--|----------|---|---------------------------------|--|
| 勻然後入棗肉和丸梧桐子大每服米飲下漸加至二十五丸以微利為度 | 青木香丸<br><small>指出直指方</small><br>通水寬中利膈行滯氣消飲食治胸噎食塞腹脇脹痛心下痞悶腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食 | 青木香 <small>五兩</small><br>華澄茄<br>補骨脂 <small>炒</small><br>檳榔 <small>炒各十兩</small> | 牽牛子 <small>六十兩炒香搗取末三十兩</small><br>右為末入牽牛末令勻漸入清水和令得所丸如棗 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 豆大每服二十九茶湯熟水任下食後服每酒食後可服五丸或七丸小兒一歲一丸妊婦不可服 | 木防己丸 療水病 | 木防 <small>八分</small><br>蜀大黃 <small>八分如錦紋者別搗</small><br>人參 <small>八分</small><br>葶藶 <small>十分</small> | 熬杏仁 <small>八分去皮尖雙仁紫紫色別搗</small> | 右搗篩蜜和丸先食後初服七丸如梧桐子大日再日加一九至十二丸還日減一九至七丸復漸加至十二丸循環服之以白飲服若病人熱多加黃芩各 |
|-------------------------------|---|--|--|---------------|--|----------|---|---------------------------------|--|



|                |                                 |                     |                           |          |                 |     |     |                         |                 |          |          |          |                   |                                   |               |        |                      |               |         |                     |          |   |               |        |               |        |           |                 |                      |                      |
|----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|-----------------|-----|-----|-------------------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|---------------|--------|----------------------|---------------|---------|---------------------|----------|---|---------------|--------|---------------|--------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 去研<br>石細<br>灰飛 | 牽牛<br>四兩<br>炒香<br>取頭<br>末四<br>兩 | 黃芩<br>二兩<br>去粗<br>皮 | 大黃<br>二兩<br>去粗<br>皮酒<br>浸 | 滑石<br>四兩 | 導水圓<br>出瑞<br>竹堂 | 治水腫 | 以時候 | 右咬咀為末四錢用水一盞半煎至七分去滓服不以時候 | 麻黃<br>去節<br>一兩半 | 石膏<br>三兩 | 甘草<br>半兩 | 白朮<br>一兩 | 越婢如木湯<br>出指<br>南方 | 治水腫從腰以上俱腫惡風小便不利腎水上溢其狀大腹喘滿不得臥宜此湯發汗 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 利為度忌生葱 | 右搗篩蜜和丸如梧桐子大米飲服七丸日再小便 | 椒目<br>十二<br>銖 | 一方<br>泡 | 葶蘆<br>半升<br>煮一<br>方 | 牛黃<br>六銖 | 研 | 桂枝<br>十二<br>銖 | 又<br>一 | 牡蠣<br>十二<br>銖 | 煮<br>研 | 牛黃桂枝湯 療水腫 | 禁食酢物并鵝鴨獐兔鯉魚鱧魚等肉 | 藤八分忌酒麵羊肉其牛肉一色永斷不得食多外 | 八分如病人冷多加厚朴八分如病人以心驚加鈎 |
|----------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|-----------------|-----|-----|-------------------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------------------------------|---------------|--------|----------------------|---------------|---------|---------------------|----------|---|---------------|--------|---------------|--------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|



|  |  |                                   |                                   |                                     |                                    |               |                      |                      |                              |                       |               |                      |             |                                 |                       |                      |    |  |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----|--|
| 右為細末滴水為丸如桐子大每服五七十九丸臨臥<br>溫水送下如加黃連薄荷葉川芎各二錢半即神芎<br>丸也詳證加後藥 | 甘遂 <small>一兩以雨則加除濕<br/>熱腰痛泄水濕腫</small> | 白芥子 <small>一兩除通身<br/>走注疼痛</small> | 朴硝 <small>退熱散腫止<br/>痛以旱則加</small> | 郁李仁 <small>散滯結通關節<br/>行腸胃通滯</small> | 樟柳根 <small>去腰疼沉重<br/>已上各一兩</small> | 妙香湯 治一切水氣四肢腫滿 | 懷香子 <small>炒</small> | 烏藥 <small>生用</small> | 高良薑 <small>湯浸<br/>焙乾</small> | 青橘皮 <small>去白</small> | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 右粗搗篩每服二錢匕酒半盞煎數沸去滓稍熱服 | 逐氣散 治水氣兼治水腫 | 白商陸 <small>去粗皮薄<br/>切暴乾</small> | 黃蘗魚 <small>三枚</small> | 大蒜 <small>三莖</small> | 菘豆 | 右搗羅為散用水一升同煮以豆爛為度先食豆汁<br>送下又以汁調下藥散二錢匕水氣內消一方以商<br>陸根煮菘豆令熟去商陸取菘豆任意食之不用大 |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----|--|



|   |                               |   |  |            |   |               |                              |                |   |                                |    |
|---|-------------------------------|---|--|------------|---|---------------|------------------------------|----------------|---|--------------------------------|----|
| 蒜 | 大麝香圓 療三焦決滿水在脇外名曰水病腹獨腫<br>大在腹表 | 麝香 <small>三銖 研</small> 雄黃 <small>六銖 研</small> 甘遂 <small>十二銖 熬</small> 芫花 <small>十二銖 熬</small> | 右搗合下篩和以白蜜丸如大豆二丸酒下日三服<br>可至四丸節飲食禁肥肉生菜之類 | 大黃圓 治水腫利小便 | 大黃 白朮 <small>一作 葶藶</small> 木防己 <small>各等分</small> | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 右為末蜜丸如梧桐子大米飲下十丸利小便為度<br>不知增之 | 三仁圓 治水腫喘急大小便不利 | 郁李仁 杏仁 <small>炮去 皮尖</small> 薏苡仁 <small>已上各 一兩</small> | 右為細末用米糊為丸如桐子大每服四十九丸不拘<br>時候米飲下 | 原闕 |
|---|-------------------------------|---|--|------------|---|---------------|------------------------------|----------------|---|--------------------------------|----|



|     |   |                      |                      |     |     |                  |  |        |         |                      |             |            |   |            |
|-----|---|----------------------|----------------------|-----|-----|------------------|--|--------|---------|----------------------|-------------|------------|---|------------|
| 玉并散 | 服 | 物淹透爛切摻參藥在內以荷葉裹燒鹽溫酒調下 | 右為細末每服三錢以獐猪腰子細批破以椒鹽等 | 益腎散 | 益腎散 | 右為細末每服三錢溫淡酒調下臨卧服 | 陳皮 <small>去白</small> 當歸 <small>各一兩</small> 甘遂 <small>以麪包不令透水煮百餘番取出用冷水浸過去麪焙乾一兩用</small> | 欽定四庫全書 | 通經散 治水腫 | 右為末每服一錢以樟柳根菘豆桑白皮煎湯調下 | 歸表湯 治水氣四肢俱腫 | 吳茱萸丸 治水腫腹脹 | 吳茱萸 <small>四兩</small> 葶藶 <small>二兩</small> 甘遂 <small>一兩</small> | 吳茱萸丸 治水腫腹脹 |
|-----|---|----------------------|----------------------|-----|-----|------------------|--|--------|---------|----------------------|-------------|------------|---|------------|



|           |                   |   |      |                      |                      |                       |                                   |                              |                  |                   |                      |                      |   |                |  |
|-----------|-------------------|---|------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---|----------------|--|
| 如因熱為腫者八正散 | 如因水為濕腫者煎防己黃耆湯調五苓散 | 如腫因氣水氣為腫者加橘皮<br><small>前白茯苓湯內加之</small> | 其腫盡去 | 如腫不能全去於腹遠臍塗生甘遂末甘草水少許 | 燒熟空心食之如食左腰子搨左臂右腰子搨右臂 | 右為細末每服用三錢以猪腰子一付批開摻藥在內 | 大戟 木香 白牽牛<br><small>頭末各等分</small> | 欽定四庫全書<br><small>普濟方</small> | 大戟散 治水腫腫大如鼓或遍身皆腫 | 飯作常食五七日後覺脹下再益以白朮散 | 多服或煎得澄入生薑自然汁在內和麵麵或做粥 | 右呔咀作一服水一碗煎至一半常服無時從少至 | 白茯苓湯 治水腫<br>白茯苓 澤瀉<br><small>兩各二</small> 郁李仁<br><small>錢五</small> | 右為細末以麝香湯調下三錢臨臥 | 芫荽根<br><small>兩二</small> 甘遂<br><small>一兩治用</small> |
|-----------|-------------------|---|------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---|----------------|--|



|         |     |                      |         |        |         |           |        |                      |    |        |     |      |            |                 |            |                |         |               |          |                       |              |                       |
|---------|-----|----------------------|---------|--------|---------|-----------|--------|----------------------|----|--------|-----|------|------------|-----------------|------------|----------------|---------|---------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 桃皮酒 療水腫 | 人十九 | 右為末煉蜜丸桐子大強壯人酒下一十五丸老弱 | 麝香丸 治水腫 | 麝香 研半分 | 芫花 炒黃三分 | 甘遂 微炒去皮半兩 | 下空心日晚服 | 右為末用大麥麵糊丸如桐子大每服三丸生薑湯 | 大麥 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 大戟 炒 | 陳橘皮 去白焙各一分 | 巴豆 一粒去皮大麥內微炒熟不用 | 大戟丸 治水腫以不差 | 如水脹之病當開鬼門決潔淨府也 | 前白茯苓湯主之 | 如鼓脹之病治之以鷄屎醴酒調 | 黃藥內加黃連是也 | 如熱在下焦陰消使氣不得化者當抑陰而陽氣自化 | 自去矣於梔子豉湯中加黃芩 | 如以熱燥於肺為腫者乃絕水之源也當清肺除濕水 |
|---------|-----|----------------------|---------|--------|---------|-----------|--------|----------------------|----|--------|-----|------|------------|-----------------|------------|----------------|---------|---------------|----------|-----------------------|--------------|-----------------------|





|                      |  |                 |                |                 |        |                             |               |                      |                              |                      |  |
|----------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|--------|-----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--|
| 右和作餅子七枚燒熟空心服熱食四枚不知加一 | 郁李仁 <small>末</small><br>麵 <small>各一升</small> | 又方 亦療身體腫滿水氣急臥不得 | 右為末蜜丸桐子大米飲下凡日三 | 又方 亦療身體腫滿水氣急臥不得 | 治水腫利小便 | 至重不過再服便瘥禁毒食一年水下後更服永不作此方出張尚谷 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 大戟湯 療水病無問半月深淺雖復脉惡亦主之 | 大戟 當歸 橘皮 <small>各一大兩</small> | 右切以水一大升煮取七合頓服利水二三斗而怪 | 桃皮 <small>三斤削去上黑取裏黃皮</small><br>麥麩 <small>一升</small><br>秫米 <small>一升</small> |
|----------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|--------|-----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--|



枚以至七枚大便通利氣便瘥

麻黃甘草湯 治水腫從腰上俱腫以此湯發汗

麻黃 四兩去根節 甘草 二兩

右咬咀每服三錢水一盞半煮麻黃再沸內甘草煎

至八分取汁慎風冷有患氣促積久不得瘥遂成水

腫之病服之有效但此藥發表老人虛人不可輕用

宜詳審

桃紅散 治正水脹急大小便不利逆欲死方

欽定四庫全書

普濟方

甘遂 半兩半生半炒用

坭 十文研

右為末研勻每用一錢以白麵四兩水調入藥搜和

切作碁子白水煮浮更不得使鹽料物只淡飲候大

小便利去五六分却用後藥調補

平胃散 一兩 附子 炮 白朮 各一兩 丁香 半兩

右為末和勻每服二錢水一盞薑七片棗三枚煎七

分不拘時候日三五服若腫未退可灸三陰穴及風

門穴腫退必矣



|         |                           |                      |                          |  |           |                            |               |                            |                  |   |   |
|---------|---------------------------|----------------------|--------------------------|--|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------|---|---|
| 治大小便閉水腫 | 大黃 防己 <small>各二錢半</small> | 右為末蜜丸梧桐子大米飲下十九丸利小便為度 | 白朮 澤瀉 <small>各等分</small> | 右為細末煎服或為丸煎茯苓湯下之末治之法黃耆芍藥建中之類以調養之忌房室魚酒等物 | 二氣湯 治水腫腹滿 | 牽牛子 甘遂 <small>一分微炒</small> | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 右粗搗篩分作二服每服水二盞煎至五分放溫細細呷不拘時候 | 又方 治水腫及暴腫河水裴氏傳經効 | 葶藶 <small>三兩</small> 漢防己 <small>末四兩</small> | 右葶藶杵六千下令如泥即下防己取綠頭鴨就藥白中截頭瀝血白中血盡和鴨頭更搗五千下丸如桐子患甚者空腹白湯下十九丸稍可者五丸頻服五日此藥利小便有効 |
|---------|---------------------------|----------------------|--------------------------|--|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------|---|---|



右各別搗節令以蜜和更搗二萬杵藥成飲服二丸  
如梧實不知增之當以小便利及下為候若下者但  
可清旦一服若不下但小便利者日再三服常將服  
腫消耳

療水腫方

皂莢 一挺去皮子焙 烏錫 五兩

右以酒二升煮取六沸絞去滓頓服之須臾即小便  
二三升腫消忌一切肉麵生冷醃酢食一年

欽定四庫全書

普濟方

療水病方

烏頭 一大升粒小者 桑根白皮 五大升細切

右為末以水五升和煮可有一大斗汁濾去滓於銅  
器中重湯煎如錫可作丸即成所患人每服取利小  
便復舊色身上腫除體中熱煩即服之禁房室及生  
死馬肉油膩麵酒等經數日得食羊頭肉兔肉永忌食  
羊頭蹄此云得食恐悞也

治水腫

出千金方



商陸

一斤白者炒

羊肉

六兩

右以水一斗煮取六升去滓和肉葱豉作腫如常法食之加鹽亦可一方雜生鯉魚作湯煮服

治水腫利小便

出千金方

用牽牛子末水服方寸匕日一以小便利為度

治水腫

出保命集方

用螻蛄去頭尾與蒲萄心同研露七日曝乾為末淡

酒調下暑月用佳

欽定四庫全書

普濟方

治水腫

出保命集方

用棗一斗鍋內入水止有四指用大戟并根苗蓋之

遍身盆合之煮熟為度去皮尖大戟大用旋喫無時

盡棗決愈

治水腫

出經驗良方

用椒目茯苓皮二味不以多少煎湯水飲

治水氣虛浮脹

昔滁州公候使酒庫攢司陳通此一病垂死醫者已





取芫花桑枝燒灰淋汁煮赤小豆空心食冷飽飢即

食盡不得飲

葛氏方取  
東引者

黃雌鷄方 治腹腫水癖水腫

用雌鷄一隻理加赤小豆一升同煮候豆爛即出食

之其汁日二夜一每服四合補腎扶陽氣治冷氣若

瘦者休漸食之良先患骨熱者不可食也

鯉魚方

出肘  
後方

用鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取肉以水二斗赤

欽定四庫全書

普濟方

小豆一大升和魚肉煮可二者已上汁生布絞汁去

滓頓服盡如不能盡分為二服後溫冷煖服訖當下

利利盡即瘥一方療腫脚滿下氣用鯉魚白煮食之

腹有宿石瘕可食

治卒刺手水腫

用搗葑及藍置上以火灸熱即差

香薷方

出十便  
良方

治水病腫脹不消食

用香薷乾者五十斤剉內釜中以水淹之水出香薷



上寸煑使氣力都盡清澄之微火煎令可丸一服五  
丸如梧桐子大日漸增之以小便利一方用香薷剉  
煑令濃及熱以漬並服之

治頭上皮膚腫薄如蒸餅狀如裹水

用口嚼小麵麥傳之瘥

大豆酒 療水腫兼治風虛水氣

用大豆三升以水六升煑令熟出豆澄汁更內美酒

五升微火煎如錫服一升漸增之令小便利則腫歇也

欽定四庫全書

普濟方

療水腫

用黃連末以蜜和搗萬杵丸如梧桐子大米飲服二

丸可至三四丸禁飲水并冷物

又方 出絕  
氏方

用苦酒一升飲之一方取鹽豉各一撮以飲之一方

取用木蒂滿虎口搗取汁飲之

散腫丸 治水腫小便澀

用葶藶二兩微炒為末棗肉丸如桐子大桑白皮湯





|  |   |
|--|---|
| 下每服三十九日進二服一方用甜葶藶   |   |
| 甘遂散 治水腫  | 甘遂 炒<br>蓬莪茂 炮<br>青橘皮 湯浸去白<br>焙各一兩<br>大戟         |
| 右為散每服用葱湯下一錢空腹服漸加至二錢微<br>吐瀉為度亦治脚氣                             | 微 煨 桂 去粗皮<br>各二分<br>石菖蒲 米泔浸<br>炒乾<br>木香 各半<br>兩 |
| 治水瘡  | 海蛤 二兩先<br>研三日<br>漢防己 二兩<br>棗肉 二兩<br>杏仁 二兩       |
| 欽定四庫全書<br>普濟方  |   |
| 葶藶子 六兩   | 加料五加皮散 出朱氏<br>集驗方 治水腫                           |
| 先用五加皮飲加澤瀉薑棗煎可先服三服次用大<br>戟甘遂等分為末麵糊為丸如彈子大用樟柳根桑<br>白皮菜豆濃煎湯細嚼空心下 |   |
| 赤小豆粥 出朱氏<br>集驗方 治水腫屢効  | 赤小豆 加炒焙<br>樟柳根頭 細切<br>黃魚 生細切                    |
| 猪腰 一對生<br>細切 燒鹽 許少   |   |



|  |   |               |                                |             |                    |                        |           |                        |                |                            |
|--|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-----------|------------------------|----------------|----------------------------|
| 治腫疾 安後多不絕痕跡或以病未除方乙復作又<br>難以更用去水茶宜此方以防之 <small>出澹療方</small> | 右以子烏為末先用酒調一服仍用醋調遍塗腫<br>處二三次自不作矣 <small>子烏恐麻人服時只一錢</small> | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 分水散 <small>出楊氏家藏方</small> 治面浮腫 | 土狗 一枚 輕粉 一字 | 右作細末每服少許搐鼻中其黃水盡從鼻出 | 一方 <small>出鮑氏方</small> | 商陸煑菘豆任意食之 | 一方 <small>出鮑氏方</small> | 白茯苓棗核仁等分米飲下二錢末 | 治水病初得危急 <small>出本草</small> |
|--|---|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-----------|------------------------|----------------|----------------------------|



|                               |           |                            |         |                            |               |                                 |           |                   |                                |        |                               |        |                            |          |                                       |               |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|---------|----------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|--------|----------------------------|----------|---------------------------------------|---------------|
| 治水腫利小便<br><small>草 出本</small> | 以水松蒂食之生海底 | 治水腫<br><small>草 出本</small> | 以綠鴨頭煮服之 | 治水腫<br><small>草 出本</small> | 以瓶香土薑芥子等煎浴湯洗之 | 治水腫浮氣及風癰<br><small>草 出本</small> | 以烏牛尿每服一合瘥 | 欽定四庫全書<br><br>普濟方 | 治水病初得危急<br><small>草 出本</small> | 以楓香煮汁服 | 治水腫下水氣<br><small>草 出本</small> | 以椰子漿飲之 | 治水腫<br><small>草 出本</small> | 以越王餘等煮服之 | 治水腫浮氣結聚宿滯消腹中虛鳴<br><small>草 出本</small> | 即用冬瓜不限多少喫神効無比 |
|-------------------------------|-----------|----------------------------|---------|----------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|-------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------|--------|----------------------------|----------|---------------------------------------|---------------|



以水萍搗汁服之

壓用石消水腫

出本草

以榆嫩葉作羹食之

凡治水病也若脉先當觀其病證診其脉氣察其大便小便赤色小便黃赤即是肝熱相刑於脾遂生水病也若脉氣滯絃屑皮焦赤小豆小便赤色小便黃赤是肝刑於脾宜喫此方若無此病證不是肝熱只因飽食忽生忽頑硬所傷即便不須喫此藥蓋恐因脾氣虛弱不能製水也

欽定四庫全書

普濟方

楊子建獲命方 治肝臟實熱相刑於脾遂生浮腫漸欲成水病並宜喫此方

川芎 羌活 獨活 細辛 荆芥穗 防己

連翹 各一分 木香 三銖 半夏 三銖

右為細末每服二錢食後熱湯下空心喫下

藿香散方

草豆蔻 黃橘皮 藿香 川芎 甘草 乾薑



赤小豆

煑熟焙乾  
杵為末秤

牽牛

各半  
兩

右為細末每服三錢空心熱調下和滓喫但初患水病之有肝熱證候常將此病兩方藥對當服餌以取平安若無肝熱證候只喫此方也

但一切水病之及不可暴取使踈藥過度即傷損正氣在徐徐取之一度盡取未盡停待一兩日更取一度莫令傷正氣治初受水之人腹肋脹滿頭面兩足皆腫宜喫此方浮氣亦可喫

欽定四庫全書

普濟方

乾薑

三分

半夏

羌活

牽牛

各二  
兩

又腫藥  
右為細末每服四錢用白麵一兩與藥末相衮和作麵羹入水一碗葱五根煑麵熟和汁盡喫取輕一行

用針砂鉄蛾即鉄匠家打下氣飛落者以入元子一生須斷鹽性濡潤腫再作可不為炙製法用上等醋煑半日去鉄蛾取醋和蒸餅為丸薑湯服三十四丸以効為度亦得借鉄蛾氣耳

出類  
鈴方

日華子云煎汁



|  |
|--|
| <p>服之不留滯於臟腑借鉄蛾之氣以制肝木弱不能克脾土伐其土之邪而水腫自消矣</p>        |
| <p>治水腫坐臥不得頭面身體悉腫</p>                             |
| <p>用蒴藿根刮去皮搗汁一合酒一合煖空心服當微吐利</p>                    |
| <p>治水腫水氣</p>                                     |
| <p>用樟木煎汁服之</p>                                   |
| <p>導引法</p>                                       |
| <p>欽定四庫全書</p>                                    |
| <p>普濟方</p>                                       |
| <p>養生方法十一月勿食經夏自死肉脯內動於喜成水病其湯熨鍼石正方補食養宣導今附于後</p>    |
| <p>又法</p>  |
| <p>蝦蟇行氣正坐動搖兩臂不息十二通以治五勞水腫之病也又云人臥勿以脚懸踰高處不以此成腎水</p> |
| <p>十水 附論</p>                                     |
| <p>夫十水之病腫從脚起上氣而效名為白水其根在肺</p>                     |



腫從面目起名為青水其根在肝腫從胞起名為黃水  
其根在脾腫從股起名為黑水其根在腎腫從心起名  
為赤水其根在心腫從腹起名為氣水乍實乍虛乍去  
乍來其根在大腸腫從頭面起至足名為懸水其根在膽  
腫從內起堅塊四肢小腫名為石水其根在膀胱腫從  
四肢起腹大名為風水其根在胸腫從腹起名為裹水  
其根在小腸凡此十水生於臟腑各從其根究其所本  
肺與腎而已故內經曰其本在腎其末在肺皆積水也

欽定四庫全書

普濟方

又曰津液充廓其魄獨居精孤於內氣耗於外形不可  
與衣相保蓋腎氣虛弱水氣脹滿上攻於肺肺氣孤危  
腎為水害子不救母故陰精損於內陽減於外三焦閉  
溢水道不通水滿皮膚身體否腫治之之法備見於內  
經云故曰平治權衡去菀陳剋微動四極溫衣繆刺其  
處以腹其刑開鬼門潔淨府以時服五陽以布疏滌五  
臟故精自生形自成骨肉相保巨氣乃平也

紫金膏

出傳信  
適用方

治十腫水氣



|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| <p>蛇含石 二兩用炭一秤蛇含石用辛鉄定盛內入<br/>                 炭通紅用米醋二升搗蛇含石入醋中</p> <p>赤石脂 一兩研<br/>                 針砂 五兩水淘洗焙乾用米醋<br/>                 煑乾為度再入鉄銚內於炭中<br/>                 煑紅取出冷吹灰研細至無聲</p> <p>肉豆蔻 二兩洗紙<br/>                 禹餘糧 三兩<br/>                 羌活 一兩去<br/>                 木香 一兩切作</p> | <p>川白薑 一兩<br/>                 川芎 一兩<br/>                 白茯苓 一兩<br/>                 當歸 一兩<br/>                 頭切片子<br/>                 酒浸一宿<br/>                 杜茴香 一兩<br/>                 白蒺藜 一兩<br/>                 川附子 一兩<br/>                 一隻重七錢<br/>                 者炮去皮尖<br/>                 三稜 一兩<br/>                 青皮 一兩<br/>                 陳皮 二兩<br/>                 去穢<br/>                 牛膝 一兩切酒<br/>                 官桂 一兩<br/>                 蓬朮 一兩</p> | <p>欽定四庫全書<br/>                 普濟方</p> <p>右為細末用無鹽蒸餅湯泡為糊丸如梧桐子大每<br/>                 服三十九至五十九丸温酒吞下空心食前如不食酒<br/>                 白鹽亦得忌鹽三月房室一年患人若介甲眼黑臍<br/>                 凸肚皮光有青筋起或灸並可下藥患人所食之物<br/>                 精作猪肉肚尖肚子白魚蘆魚白菘菜只用葱椒醋<br/>                 食切不宜用鹽除此外食</p> | <p>大海藻湯 出聖濟<br/>                 治十種水病</p> | <p>海藻 洗去<br/>                 芫花 炒<br/>                 猪苓 去黑<br/>                 連翹<br/>                 澤漆</p> |
|---|---|---|--|---|





|   |  |  |  |   |  |                             |                       |   |   |   |  |
|---|--|--|--|---|--|-----------------------------|-----------------------|---|---|---|--|
| <p>炒<br/>郁李仁<small>去皮尖<br/>雙仁研</small><br/>陳橘皮<small>湯浸去<br/>白瓢</small><br/>桑根白</p> | <p>皮<small>剉</small><br/>炒<br/>白蒺藜<small>炒各<br/>一兩</small><br/>藁本<small>去苗<br/>土</small><br/>昆布<small>洗去<br/>鹹</small></p> | <p>大戟<small>炒</small><br/>防己<br/>葶藶<small>炒</small><br/>朴硝<br/>甘遂<small>炒微<br/>黃</small></p> | <p>杏仁<small>去皮尖<br/>雙仁<br/>炒各半兩</small><br/>檳榔<small>煨剉<br/>七枚</small></p> | <p>右粗搗篩每服四錢匕水一盞半生薑棗大拍碎同煎至八分去滓空腹溫服日一以利為度</p> | <p>神仙萬金丸<small>出醫方<br/>大成</small><br/>專治十種水氣逐陰固陽扶危</p> | <p>正命足膝微腫上氣喘滿小便不利便是水氣證速</p> | <p>欽定四庫全書<br/>普濟方</p> | <p>服此藥取全効耳此藥効神功取水藥不同用蛇黃大而圓者三兩以新乾鍋子盛用炭火一秤煨過赤</p> | <p>鉗鍋子出火急傾入釀米醋二升內候冷取出研至無聲上用針砂真者五兩賣者多雜鉄屑宜精揀擇</p> | <p>水淘極淨磚上候冷一處研至無聲如粉即止以上三物為主其次量人虛實入後藥治水氣多是冷藥</p> | <p>惟有此方上三物既非甘遂葶藶芫花之比有下項藥輔佐故老人虛人皆可服次入後藥</p> |
|---|--|--|--|---|--|-----------------------------|-----------------------|---|---|---|--|



|   |   |   |   |                            |                      |                      |                      |            |                      |                      |                                       |      |   |    |                                       |                                       |
|---|---|---|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------|---|----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 羌活 川芎 牛膝 <small>酒浸一宿</small> 木香 <small>炒黃</small> 白茯苓 | 肉豆蔻 <small>炮</small> 桂心 <small>去粗皮</small> 杜茴香 <small>炒畧</small> 蓬莪朮 <small>炮</small> | 乾薑 <small>炮</small> 白蒺藜 <small>已上各半兩更量虛實老人斟酌入三服內虛人老人全用實</small> | 人減 <small>半用</small> 青橘皮 <small>去白</small> 附子 <small>炮去皮</small> 京三稜 <small>煨</small> | 當歸 <small>酒浸一宿炒</small> 陳皮 | 右為細末拌極勻湯浸蒸餅握去水和藥再搗極勻 | 丸如桐子大空心酒或白湯下三五丸忌鹽三箇月 | 圭撮不可入口淡且以醋少許調和飲食病者不能 | 欽定四庫全書 普濟方 | 忌服藥後徒勞無功果欲救病即須忌鹽至誠服藥 | 只於小便內旋去並不動臟腑病已即服此藥每服 | 一二服兼以溫和調補元血氣藥將理此神方也 <small>又名</small> | 禹餘糧丸 | 溫白圓 <small>出直指方</small> 治十種水病積聚脹滿癥癖塊痛久瘧 | 諸風 | 吳茱萸 <small>湯浸七次炒</small> 柴胡 桔梗 石菖蒲 乾薑 | 肉桂 黃連 茯苓 人參 川椒 <small>去目隔紙炒出汗</small> |
|---|---|---|---|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------|---|----|---------------------------------------|---------------------------------------|



|  |   |                 |            |  |   |                   |                                |  |            |  |   |                             |                             |
|--|---|-----------------|------------|--|---|-------------------|--------------------------------|--|------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <p>厚朴 <small>製</small> 皂莢 <small>去皮</small> 巴豆 <small>去皮膜</small> 紫苑茸 <small>各半</small></p> <p>川烏頭 <small>炮去皮臍</small> 一兩半</p> | <p>右為細末和勻煉蜜丸桐子大每服三丸食後薑湯下加至五七丸止治水腫溫白丸五苓散加炒牽牛</p> | <p>入比薑汁畧煎送下</p> | <p>集香湯</p> | <p>沉香 丁香 <small>各二錢</small> 木香 青木香 藿香葉</p> | <p>川芎 赤茯苓 檳榔 枳殼 甘草 乳香 <small>一錢</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>麝香 <small>一字</small> 別研</p> | <p>右為細粗末每服二錢生薑三片紫蘇三葉煎服 <small>凡</small></p> <p><small>腫先用諸香以透其關絡然後審察證療</small></p> | <p>補藥方</p> | <p>肉桂 <small>去粗皮</small> 青皮 <small>去白</small> 乾薑 <small>炮</small> 蓬朮 <small>醋煑</small></p> | <p>肉豆蔻 鷄心檳榔 桔梗 <small>各等分</small> 依法治</p> | <p>右為末每服三錢百沸湯點服空心日午晚食前項</p> | <p>二方治水腫病余見鄉人有患水疫半年後得名醫</p> |
|--|---|-----------------|------------|--|---|-------------------|--------------------------------|--|------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|



|  |   |
|--|---|
| 獲瘥余遂百計求得此醫人多耐黃白之物遂得此<br>二方余試用之百發百中獲濟者可無數世間所有<br>水病方藥無出此二方之上者余初出本事方前集<br>尚有此集後二三帙初深秘之今有所前集已盛行<br>世余此後集今亦畧傳其一二人者使天下皆得躋<br>盡天年毋慎枉斃云方無川芎 |   |
| 欽定四庫全書<br>普濟方  | 檳榔圓 治水十種氣腹喘嗽大小便澁<br>檳榔 兩一<br>甜葶藶 隔紙炒 一兩微<br>甘遂 微黃 半兩煨<br>木通 |
| 漢防己 兩半<br>川椒目 兩一<br>當歸 微炒 一兩<br>滑石   | 川大黃 微炒 一兩<br>澤瀉 兩半<br>商陸 兩一<br>牽牛子                          |
| 陳橘皮 浸去白 一兩湯<br>猪牙皂角 皮微炒 半兩去  | 右為末醋飯和搗三五百杵為丸桐子大每服空心<br>粥飲下二十九以利為度未得快利再服之                   |
| 芫花散 治十種水氣證候極惡諸醫不療<br>芫花 醋拌 炒乾<br>澤瀉<br>郁李仁 湯浸去皮 微炒<br>牽牛子 微炒   | 甜葶藶 色炒紫<br>漢防己 分各一<br>滑石 分三<br>海蛤 兩半                        |



|                       |                  |                    |                  |                                |                     |                      |  |                           |   |   |    |   |                     |                      |  |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---|----|---|---------------------|----------------------|--|
| 腫從腹起名為氣水乍實乍虛其根在大腸芫花主之 | 腫從胞起名為黃水其根在脾甘遂主之 | 腫從面起名為青水其根在肝甘遂大戟主之 | 腫從頭起名為白水其根在肺椒目主之 | 十水圓 <small>出聖濟總錄</small> 療十種水腫 | 心湯下二十九丸以利為度未得快利即再服之 | 右為末煉蜜和丸桐子大每服空心煎木瓜木通燈 | 桑白皮 <small>兩半</small> 甜葶藶 <small>半兩炒紫色</small> 郁李仁 <small>一兩湯浸去皮微炒</small> | 欽定四庫全書 <small>普濟方</small> | 兩半 <small>蓮麥</small> 兩半 <small>椒目</small> 兩半 <small>檳榔</small> 一分 <small>澤漆</small> | 牽牛子 <small>三分微炒</small> 甘遂 <small>一分微黃</small> 漢防己 <small>一分</small> 滑石 | 不止 | 牽牛子圓 <small>出聖惠方</small> 治十種水氣徧身浮腫小便澀喘促 | 碧綠水後下如爛羊脂即差如末羊脂日再服之 | 右為細末每服一錢空心煎橘皮湯調下當先瀉下 | 炒微 <small>研細</small> 甘遂 <small>半兩微黃</small> 蓮麥 <small>兩半</small> 檳榔 <small>兩半</small> 大戟 <small>一分</small> |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--|---------------------------|---|---|----|---|---------------------|----------------------|--|



|                                    |                           |                           |                           |                      |                            |  |                              |  |                   |                     |                   |                  |                      |                      |      |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|--|------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|------|
| 又十水圓<br><small>草出本方</small><br>治水腫 | 服如法再服病愈節禁飲但得乾物耳           | 為度不下日三亦可散末食服半錢匕便利明朝復      | 四分去心皮搗末下篩蜜和丸服桐子大三丸得下      | 右等分隨其病始所在增其所主藥皆自一分巴豆 | 研出油<br><small>去心皮膜</small> | 芫花<br><small>炒醋</small><br>赤小豆<br>桑根白皮<br><small>炙</small><br>澤瀉<br>巴豆 | 欽定四庫全書<br><small>普濟方</small> | 椒目<br><small>炒</small><br>大戟<br><small>炒</small><br>甘遂<br><small>炒</small><br>玄參<br>葶藶<br><small>炒</small> | 腫從胞中起名為赤水其根在心葶藶主之 | 腫從四肢起腹大名為風水其根在胸巴豆主之 | 腫從腹起名為裹水其根在小腸澤瀉主之 | 腫從股起名為黑水其根在腎玄參主之 | 腫從頭面起至足名為懸水其根在膽赤小豆主之 | 腫從內起堅塊四肢腫名為石水其根在膀胱桑根 | 白皮主之 |
| 大戟<br><small>炒青水治</small>          | 葶藶<br><small>炒赤水治</small> | 甘遂<br><small>炒黃水治</small> | 藁本<br><small>去苗土治</small> |                      |                            |  |                              |  |                   |                     |                   |                  |                      |                      |      |



|   |   |                  |  |                           |                                |   |  |  |             |
|---|---|------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------|
| <p>白連翹<small>去心治</small><br/> <small>水</small> 連翹<small>黑水</small><br/> <small>治泥</small> 赤小豆<small>治懸</small><br/> <small>水</small> 赤小豆<small>水</small><br/> <small>水</small> 巴豆<small>去皮心炒油</small><br/> <small>出治裏水</small> 巴豆</p> | <p>右等分隨證所主倍之搗羅為末煉蜜丸如菉豆大<br/>         每服三丸至五丸米飲日三人弱者以意節之</p> | <p>萬勝散 治十種水氣</p> | <p>海帶 海藻 海蛤 芫花<small>炒醋</small><br/> <small>浸</small> 甘遂 大戟<br/>         甜葶藶 樟柳根 續隨子 巴戟<small>去心各</small><br/> <small>等分</small></p> | <p>右為末每服三錢至五盞溫調下臥間日再服</p> | <p>欽定四庫全書<br/>         普濟方</p> | <p>大戟<small>出聖</small> 治十種水氣徧身腫滿喘急煩悶心腹<br/> <small>患方</small> 壅滯大小便不利又用赤茯苓湯下忌鹽一百二十<br/>         日緣鹽能化水故也外忌魚鮓麵食一切毒物及生<br/>         冷等物此方千金難用此藥獲瘥之後更用後藥補<br/>         之</p> | <p>大戟<small>炒</small> 甜葶藶<small>炒紫</small><br/> <small>色</small> 芫花<small>炒醋</small><br/> <small>令乾</small> 甘遂<small>煨</small></p> | <p>微黃 澤瀉 桑根白皮 赤小豆<small>炒</small><br/> <small>熟</small> 巴豆<small>去皮</small><br/> <small>心出</small></p> | <p>油 澤漆</p> |
|---|---|------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|--|--|-------------|



|   |   |  |   |                       |                                       |  |                             |  |  |   |                                    |
|---|---|--|---|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|---|------------------------------------|
| <p>右為末入巴豆研勻煉蜜和丸桐子大每服三丸空<br/>                 心粥飲下</p> | <p>檳榔圓 <small>出聖濟</small> 治十種水氣<br/> <small>總錄</small><br/>                 檳榔 <small>三箇</small> 炮<br/>                 大戟 <small>炒半</small> 兩<br/>                 牽牛子 <small>炒</small><br/>                 滑石 <small>碎</small></p> | <p>海蛤 瞿麥穗 旋復花 甘遂 <small>炒各一兩</small></p> | <p>右為末用軟飯和丸菘豆大每服七丸至十丸煎商<br/>                 陸湯下若作散每服一錢匕亦煎商陸湯調下如躁</p> | <p>米飲食調下如取利動維服葶藶丸</p> | <p>欽定四庫全書<br/> <small>普濟方</small></p> | <p>葶藶圓 <small>出聖濟</small><br/> <small>總錄</small><br/>                 葶藶 <small>炒</small><br/>                 杏仁 <small>不去皮</small> 各一分</p> | <p>右為末糊和丸如小豆大每服十五丸煎杏仁湯下</p> | <p>三消圓 <small>出聖濟</small> 治十種水病<br/> <small>總錄</small></p> | <p>朴硝 <small>色青白者</small> 鍊熟二兩<br/>                 芒硝 <small>色青</small> 白者<br/>                 硝石 <small>色青白燒之</small> 有金色者各<br/>                 一兩 同上火二<br/>                 椒目 <small>微炒各一兩</small> 搗羅為<br/>                 末研令勻去三消腫<br/>                 葶藶</p> | <p>炒紙 葶藶子 <small>炒各一兩</small> 杏仁 <small>二兩</small> 去皮尖<br/>                 雙仁以</p> | <p>各搗一<br/>                 千杵</p> |
|---|---|--|---|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|---|------------------------------------|





|           |  |                      |  |   |  |                     |  |                     |  |      |  |  |  |  |  |            |  |   |  |      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |                      |  |
|-----------|--|----------------------|--|---|--|---------------------|--|---------------------|--|------|--|--|--|--|--|------------|--|---|--|------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| 澹泄不能坐臥并急喘 |  | 悶背項拘急膀胱緊腫於小腹小便不通反轉大便 |  | 大戟圓 <small>出宣明論</small> 治十種水氣腫脹滿熱寒咳嗽心胞痞 |  | 同煎至一盞去滓溫服空心日日三服以利為度 |  | 右粗搗篩每服五錢匕水二盞生薑一棗大拍碎 |  | 錢去黑皮 |  | 赤小豆 <small>炒半兩</small> 郁李仁 <small>一兩炒去皮尖</small> 防己 猪苓 <small>各三</small> |  | 檳榔 <small>三枚</small> 牽牛子 <small>炒</small> 葶藶 <small>炒</small> 桑根白皮 <small>一兩</small> |  | 欽定四庫全書 普濟方 |  | 檳榔湯 <small>出聖濟總錄</small> 治十種水氣徧身洪腫氣喘小便澀 |  | 永不發動 |  | 生產房室等事惟宜喫粳米葱薤生薑橘皮禁鹽年 |  | 就溫禁食鹹味難消之物不宜悲喜憂勞兼不得近 |  | 度不宜食飽衝胃霜寒并單衣受風冷雖夏中亦宜 |  | 每服十五丸空心煎生薑湯下加至二十丸以利為 |  | 和為劑或鞭即添少許熟蜜杵千下為丸如小豆大 |  | 右用大棗二十一枚煑熟去皮核炒食令水氣瀝盡 |  |
|-----------|--|----------------------|--|---|--|---------------------|--|---------------------|--|------|--|--|--|--|--|------------|--|---|--|------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|



|   |  |                                    |  |   |               |  |                               |   |  |
|---|--|------------------------------------|--|---|---------------|--|-------------------------------|---|--|
| <p>大戟 芫花<small>醋炒</small> 甘遂 海帶 海藻 郁李仁<br/>                 續隨子<small>各半</small> 樟柳根<small>一兩</small></p> | <p>右以上八味為末每料抄藥末十五錢匕便入後藥<br/>                 硃砂 輕粉 粉霜<small>各一錢</small> 龍腦<small>半錢</small> 水銀砂珠</p> | <p>一皂 巴豆<small>二十粒去皮生用</small></p> | <p>右八味已下同研勻用棗肉為丸如菉豆大每服五丸至七丸龍腦腦茶送下食後臥虛實加減</p> | <p>陳橘皮散<small>出聖惠方</small> 治十種水腫氣皮膚脹滿三焦壅閉<br/>                 欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>上喘大便不通</p> | <p>陳橘皮<small>一兩</small> 木香<small>半兩</small> 牽牛子<small>一兩</small> 川大黃<small>一兩</small><br/>                 枳實<small>半兩</small> 羌活<small>半兩</small> 烏柏皮<small>半兩</small> 漢防己<small>一兩</small></p> | <p>右為末每日空心濃煎桑根白皮湯調下三錢以利為度</p> | <p>大戟<small>出聖惠方</small> 治十腫水氣徧身腫滿上氣喘促小便澁</p> | <p>大戟<small>一兩微炒</small> 牽牛子<small>一兩微炒</small> 白莢<small>一兩去皮塗酥炙黃焦去子</small></p> |
|---|--|------------------------------------|--|---|---------------|--|-------------------------------|---|--|



|                      |                      |                      |                      |                      |   |              |                      |               |  |   |  |           |                      |  |  |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------|----------------------|---------------|--|---|--|-----------|----------------------|--|--|
| 驗有人先患脚氣十餘年發盛便成水病四時之中 | 得鹹物無不効者此是先得之石壁金壇所記有靈 | 水氣有十種此方俱療一瘥已後永不再發但能斷 | 緣得傳療諸疾自行此方二十餘年得効者甚多凡 | 間無本因鄭鍊師向天台金壇上石壁所記有數本 | 川朴硝圓 <small>出聖惠方</small> 治十種風氣此方出神仙密藏經人 | 當得快利如未利晚食前再服 | 右為末煉蜜和丸如桐子大每日空心粥飲下七丸 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 黃 郁李仁 <small>湯浸一兩去皮微炒</small> 滑石 <small>半兩已上各</small> 膩粉 <small>一分</small> | 續隨子 海蛤 <small>研細</small> 甜葶藶 漢防己 甘遂 <small>微煨</small> | 續隨子圓 <small>出聖惠方</small> 治十種風氣喘促腹脇鼓脹小便不通 | 下一十九丸以利為度 | 右為末煉蜜和丸搗百杵如桐子大每日空心温酒 | 海蛤 <small>一兩細研</small> 甜葶藶 <small>一兩紫色炒</small> 川大黃 <small>一兩剉微炒</small> | 桑根白皮 <small>一兩</small> 郁李仁 <small>一兩湯浸去皮微炒</small> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------|----------------------|---------------|--|---|--|-----------|----------------------|--|--|



|                 |                      |          |  |   |               |                      |               |                      |  |  |   |                 |                      |                      |                      |
|-----------------|----------------------|----------|--|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--|--|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 湯下日再漸增以知為度一方粥飲下 | 右為末煉蜜為丸如小豆大每服一九空心桑白皮 | 三焦壅滯坐臥喘急 | 大黃 <small>剉</small> 消石 大戟 <small>去皮</small> 甘遂 <small>炒</small> 芫花 <small>醋炒</small> | 大黃圓 <small>出聖惠方</small> 治十種水氣面目四肢滿腫心腹虛脹 | 十七丸煎桑根白皮湯下空心服 | 枚藥與上件藥細研勻煉蜜和丸如桐子大每服二 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 右件葶藶杏仁葶藶等相和先搗一千杵取大棗十 | 葶藶子 <small>各一兩去浮着水者芽出候炒黃色</small> 杏仁 <small>二兩湯浸去皮尖雙仁麩炒黃</small> | 川烏頭 <small>去皮臍為末</small> 椒目 <small>微炒為末</small> 甜葶藶 <small>炒紫色</small> | 川朴硝 <small>二兩微研</small> 川芒硝 <small>一兩細研</small> 馬牙硝 <small>半兩細研</small> | 肚硬盡二十餘日後氣力如舊甚神効 | 須倚物而生羸弱異常因服此藥當日氣散十日後 | 得睡臥頭不著枕二百餘日無問晝夜即呷粥食常 | 徧身腫滿腹硬如石水飲難下靡覺飢渴但喘粗不 |
|-----------------|----------------------|----------|--|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--|--|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|



|   |  |     |                      |   |  |  |                    |               |                                      |   |      |                      |                      |                                      |  |   |
|---|--|-----|----------------------|---|--|--|--------------------|---------------|--------------------------------------|---|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|
| 巴戟圓<br><small>出聖方</small><br>治十種水氣通身不消化心腹脹滿 | 巴豆<br><small>十枚去油</small><br>大戟<br><small>半兩微炒</small><br>甜葶藶<br><small>半兩生用</small> | 利為度 | 右為末煉蜜丸如小豆大每服十九空心茶清下以 | 乾薑<br><small>炮</small><br>桂心<br><small>去皮</small><br>大黃<br><small>剉炒各半兩</small> | 再蘇圓<br><small>出聖濟總錄</small><br>治十種風氣大通三焦 | 大戟<br><small>炒</small><br>甘遂<br><small>炒</small><br>春麥麵<br><small>炒</small><br>巴豆<br><small>去心膜麩炒去油盡</small> | 右為末麵糊為丸如菉豆大每服十丸白湯下 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 木香<br><small>出聖濟總錄</small><br>取下水氣補藥 | 木香<br><small>湯浸去白</small><br>青橘皮<br><small>焙各一錢</small><br>蓬莪朮<br><small>二錢</small> | 次藥補之 | 日三服第二日四服第三日五服以利為度利已用 | 右為末麵糊丸如桐子大每服五丸生薑湯下第一 | 四石圓<br><small>出聖濟總錄</small><br>治十種風氣 | 滑石<br>甘泉石<br>白石英<br>續子仁<br>寒水石<br><small>研</small> | 硃砂<br><small>研細和作餅子用濕麵四兩裹藥餅燒紫色去麵各二兩</small><br>白丁香<br><small>半兩</small> |
|---|--|-----|----------------------|---|--|--|--------------------|---------------|--------------------------------------|---|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|



|                    |                      |                      |                      |                      |                      |               |             |    |            |            |                |     |        |              |                      |                     |             |   |                      |                      |              |       |              |       |             |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|----|------------|------------|----------------|-----|--------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------|--------------|-------|-------------|
| 必須大將息及斷鹽房室等二年一方無木香 | 四升或大便利喘定腫減七分隔日再服既平之後 | 少須一升許不得喫鹽并麵自早至午當利小便三 | 漿水葱白粥稀粥至葱爛入酒五合熱啜量人啜多 | 半盞調藥三錢絕早面向東服本事方人行十里以 | 右為末每服以葱白三莖漿水一盞煎至半盞入酒 | 葶藶 二兩炒<br>香別研 | 椒目 一兩<br>炒香 | 木香 | 澤瀉 二兩<br>兩 | 猪苓 二兩<br>去 | 黑牽牛 二兩半<br>炒去末 | 普濟方 | 欽定四庫全書 | 口苦舌乾小便赤澀大便秘利 | 俱腫以手按之隨手而起效嗽喘急不得安臥腹脹 | 神助散 一名葶藶散出<br>醫方集成方 | 治十種水氣面目四肢遍身 | 効 | 心溫茶下七丸如人行五里熱茶投利下粘滑物者 | 右為末入巴豆杏仁研勻煉蜜和丸桐子大每服空 | 川大黃 半兩<br>剉炒 | 桂心 半兩 | 芫花 半兩<br>伴炒乾 | 杏仁 半兩 | 去皮尖雙<br>仁炒黃 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|----|------------|------------|----------------|-----|--------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------|--------------|-------|-------------|



|   |   |  |   |                   |  |  |                                     |                                  |   |  |
|---|---|--|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| <p>本香湯 <small>出聖濟 總錄</small> 治十種水腫氣</p> | <p>木香 陳橘皮 <small>焙湯浸 去白</small> 白朮 桑根白皮 <small>炙剉</small></p> | <p>桂 <small>去皮各 半兩</small> 木通 <small>炒三分</small></p> | <p>右粗搗篩別用牽牛子二兩於鉄銚內以紙襯手攪乘熱搗羅為末每服以前藥末三錢匕同牽牛末一錢半匕水一盞半煎至八分去滓五更溫服平明時喫冷生薑茶粥次用蕪荑桑根白皮各一分煑白羯羊肉半斤爛熟與喫</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>檳榔丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治十種水氣</p> | <p>防己 檳榔 <small>煨剉</small> 郁李仁 <small>去皮尖各 研炒三分</small> 葶藶</p> | <p>右為末煉蜜丸如小豆大每服十九至二十九空心服用後方葶藶湯下</p> | <p>葶藶湯 <small>出聖濟 總錄</small></p> | <p>葶藶 <small>炒</small> 桑根白皮 <small>炙剉</small> 百合 <small>各一兩</small></p> | <p>右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分前藥日三以便利為度若鼓氣微結加甘遂一兩</p> |
|---|---|--|---|-------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|



|  |  |    |                            |   |  |                                |               |   |  |   |  |
|--|--|----|----------------------------|---|--|--------------------------------|---------------|---|--|---|--|
| 防己丸<br><small>出聖濟<br/>總錄</small><br>治十水定喘急 | 防己<br><small>湯浸去<br/>白焙</small><br>陳橘皮<br><small>湯浸去<br/>白焙</small><br>大戟<br><small>炒</small><br>苦葶藶<br><small>紙上<br/>炒各</small> | 兩半 | 右為末棗肉為丸如桐子大每服二十九溫水下不<br>拘時 | 大戟芫花散<br><small>出聖<br/>惠方</small><br>治十種水病腫滿喘急不得臥 | 大戟<br><small>一兩<br/>微炒</small><br>芫花<br><small>一兩<br/>醋半炒</small><br>苦葫蘆子<br><small>二兩<br/>炒</small> | 苦葶藶<br><small>一兩<br/>炒</small> | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 右為散末每服一錢陳大麥麵二錢水一盞煎至四<br>分每日空心和水溫服良以腹內作雷聲更喫熱茶<br>投之使大小腸通利不過三服効 | 胡椒丸<br><small>出海上<br/>名方</small><br>治十種水氣脚腫脹上氣喘滿 | 巴豆<br><small>十粒去皮膜用竹紙數<br/>重出油盡為度頻換紙</small><br>胡椒<br><small>二百粒<br/>生用</small> | 右為末醋糊為丸如菉豆大每日一丸淡薑湯下食<br>後實者日二服虛者一服如小便頻數為効服一兩<br>月不効忌麵食鹽物淹藏大忌濕麵 |
|--|--|----|----------------------------|---|--|--------------------------------|---------------|---|--|---|--|





|  |  |                             |                             |                             |                   |   |  |                                  |                              |          |   |   |                             |                     |   |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------|----------|---|---|-----------------------------|---------------------|---|
| <p>虛寶丸 <small>出聖濟 總錄</small> 治十種水氣</p> | <p>滑石 <small>好白者 二兩</small> 膩粉 <small>一兩</small></p> | <p>右先搗研滑石令極細次入膩粉和勻熬木瓜濃汁</p> | <p>成膏丸如菘豆大每服七丸五更空心溫米飲下日</p> | <p>只一服至五七丸覺腹撮痛小便多為効忌鹽一百</p> | <p>日以見効便服補脾胃藥</p> | <p>此水病瘥後常服此藥永不發方 <small>出聖 惠方</small></p> | <p>大麻仁 <small>二兩微炒 研如膏</small> 黑豆 <small>三兩炒 熟去皮</small></p> | <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p> | <p>右為末煉蜜和丸如桐子大每日三十九丸空腹粥飲</p> | <p>下</p> | <p>治十種水氣腫水病腫滿喘促不得臥 <small>出聖 惠方</small></p> | <p>生戟 <small>一錢</small> 蕎麥麵 <small>二錢</small></p> | <p>右件藥水和作餅子慢火燒令黃熟碾為末空心茶</p> | <p>清調下相次以大小腸利為度</p> | <p>治十種水氣不瘥垂死 <small>出 氏方</small> 用青頭鴨一隻治如食法細切米并五味煮令極熟</p> |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---|--|----------------------------------|------------------------------|----------|---|---|-----------------------------|---------------------|---|



作空腹食之

治十種水病腫滿喘促不得臥出肘後方

用螻蛄五枚乾為末食前湯調半錢匕至一錢小便

通効

治十種水病不瘥垂死出鮑氏方

用鯉魚一頭重一斤煮熟取汁和之瓜葱白作羹食

之効

澤漆方出聖惠方 治十種水氣

欽定四庫全書

普濟方

用澤漆十斤于夏間採取嫩葉入酒一斗研令汁二斗於銀鍋內慢火熬如錫止甕器內收每日空心温酒調下一茶匙以愈為度

治十種水不瘥垂死出肘後方

用獐肉半斤切粳米三合水三升葱椒豉作粥食亦

可

十水圓出楊氏家藏方 治十種水氣四肢腫滿面目虛以手

按之少時方起喘急不得安臥小便赤澁



|                                  |                    |                      |  |   |               |                      |                                   |               |                     |                     |  |   |             |                      |  |   |   |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|--|---|---------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--|---|-------------|----------------------|--|---|---|
| 製菘豆<br><small>出朱氏<br/>集成</small> | 心服日午水下忌食鹽一百日忌食甘草三日 | 右用土狗一枚自死者細研同調上藥只作一服空 | 商陸散<br><small>出楊氏<br/>家藏方</small><br>治十種水氣取水 | 商陸根<br><small>取自然<br/>汁一盞</small><br>甘遂末<br><small>一錢</small> | 子湯送下不拘時候小便利為度 | 右為末煑麵糊為丸如桐子大每服五十九煎冬瓜 | 以火炙著糠內煨熟之俟火氣盡取出<br>泥刮冬瓜令盡薄切片子并豆焙乾 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 濟陰乾用糯米穀破取糠片兩大蘿甘冬瓜在內 | 子合定用竹簽簽定以麻線繫紙筋黃泥通身固 | 大冬瓜<br><small>赤小豆水淘淨增淨填滿冬瓜中再用蓋</small> | 冬瓜圓<br><small>出聖家<br/>藏方</small><br>治十種水氣浮腫喘滿 | 十九溫米飲送下空心食前 | 右件為末麵糊為丸如桐子大每服二十九加至三 | 木猪苓<br><small>去皮</small><br>白牽牛<br><small>炒黃各<br/>半兩</small> | 巴戟<br>肉豆蔻<br><small>麵裹煨六<br/>味各一兩</small><br>澤瀉<br>甜葶藶<br><small>研炒<br/>黃</small> | 遠志<br><small>去心</small><br>石菖蒲<br><small>寸九<br/>節者</small><br>椒目<br><small>炒</small><br>羌活<br><small>去頭<br/>蘆</small> |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|--|---|---------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--|---|-------------|----------------------|--|---|---|



|   |                             |                              |                             |                             |                             |                             |                  |                       |               |                            |   |                             |          |  |   |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|---|-----------------------------|----------|--|---|
| <p>菘豆 <small>二合半水三碗半入<br/>甞器瓶內煮候乾熟</small> 大附子 <small>一雙去皮臍<br/>切作兩片用</small></p> | <p>右取出乘熟空心只喫菘豆其附子留住次日將附</p> | <p>子兩片分四片再用菘豆三合半水三碗半同煮乾熟</p> | <p>乘熟空心喫菘豆第三日再別用附子菘豆二合半</p> | <p>如前過度服之又第四日亦如前第二日法度服之</p> | <p>每一日臨臥時喫豆但依此製為丸服四日其水從</p> | <p>小便下腫自消退如未退以前藥服之忌生冷毒物</p> | <p>鹽酒六十日無不効者</p> | <p>欽定四庫全書<br/>普濟方</p> | <p>治十種水氣方</p> | <p>大戟 芫花 甘遂 續隨子 大黃 牽牛末</p> | <p><small>各一兩</small> 肉蓯 <small>二錢</small> 礪砂 <small>一錢</small></p> | <p>右為散子作三服水調下或作丸子末消再服忌房</p> | <p>事</p> | <p>又方 治十種水氣并根源證狀方法 <small>出存仁方</small></p> | <p>一蒸水先從左右肋腫起根在肝 大戟 <small>炒黃</small><br/>二赤水從舌根腫起根在心 葶藶 <small>炒隔紙</small></p> |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|---|-----------------------------|----------|--|---|



|  |
|--|
| 三黃水從腹腫起根在脾 甘遂 <small>炒黃</small>  |
| 四白水從脚腫起根在肺 藁本  |
| 五黑水從陰腫起根在腎 連翹  |
| 六玄水從面腫起根在外腎 芫花 <small>醋炒</small>   |
| 七風水從四肢腫起根在胃 澤瀉   |
| 八石水從腎腫起根在膀胱 桑白皮  |
| 九蒿水從腹滿腫起根在小腸 巴豆 <small>去油</small>  |
| 十氣水或盛或衰根在腹 赤小豆   |
| 欽定四庫全書 普濟方   |
| 右十種水病各有根苗種種不同看十種病根除一味將九味等分遂製者依法脩合為末煉蜜為丸如桐子大每服二十九赤茯苓湯下不拘時候日三服忌鹽一百二十日及魚鮓麵食一切毒物忌房事此病去生甚遠取死將近甚勿忽 |
| 涌水 附論  |
| 夫內經言肺移寒於腎為涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水然也夫腎為肺之子   |



|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 而住水大腸為肺之附而為傳道之官肺受寒邪宜傳<br>入腎皆受寒邪則水閉鬱而不流且無所歸故客於太<br>陽而不下夫水腫流下令及倉於大腸不得宣通宜其<br>證滿溢如囊裹漿也 |                                       |
| 旋復花丸<br><small>出聖濟<br/>總錄</small>   | 治涌水腹中動揮作水聲兼痰飲<br>助脹滿                  |
| 旋復花<br><small>炮</small>   | 乾薑<br><small>炮</small>                |
| 桂心<br><small>去粗皮</small>  | 芍藥<br><small>各一兩半</small>             |
| 枳實<br><small>去穢炒</small>  | 白朮<br><small>各一兩半</small>             |
| 人參<br><small>各一錢</small>  | 赤茯苓<br><small>去黑皮<br/>三兩</small>      |
| 欽定四庫全書<br>普濟方   |                                       |
| 烏頭<br><small>炮去<br/>皮臍</small>  | 毒狼礬石<br><small>各三兩</small>            |
| 細辛<br><small>去蘆頭<br/>土焙</small>   | 厚朴<br><small>去粗皮</small>              |
| 大黃<br><small>炒</small>  | 黃芩<br><small>去黑心</small>              |
| 葶藶<br><small>隔紙炒</small>  | 陳橘皮<br><small>焙去白<br/>各一兩</small>     |
| 吳茱萸<br><small>炒湯<br/>浸</small>  | 芫花<br><small>炒焦醋<br/>浸半日</small>      |
| 甘遂<br><small>炒三<br/>分</small>   | 右為末煉蜜丸桐子大每服五丸酒下二日不知稍<br>加丸數以知為度       |
| 大黃附子丸<br><small>出聖濟<br/>總錄</small>  | 治涌水腹滿                                 |
| 大黃<br><small>炒剉</small>   | 旋復花<br>附子<br><small>炮去<br/>皮臍</small> |
| 赤茯苓<br><small>去黑皮</small>   |                                       |



|  |                                     |  |  |   |                                   |   |  |                                     |
|--|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| <p>椒目 桂心<small>去皮</small> 芫花<small>炒焦 醋浸</small> 狼毒 乾薑<small>炮</small></p> <p>芍藥 枳實<small>炒</small> 細辛<small>去苗葉 各二兩</small></p> | <p>右為末煉蜜丸桐子大每服三丸熟水下漸增之早晚食前臨臥各一服</p> | <p>猪苓丸<small>出聖濟 總錄</small> 治涌水</p> <p>猪苓<small>去皮 三分</small> 牽牛<small>炒一兩</small> 葶藶<small>炒半兩</small> 桑根白皮</p> | <p>赤小豆<small>炒半兩</small> 郁李仁<small>去皮炒 湯浸</small> 防己<small>各二兩</small></p> | <p>大腹皮<small>三箇 去皮</small> 生薑<small>焙一兩</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>右為末煉蜜丸小豆大每服十五丸米湯下未効加至二十九日三</p> | <p>葶藶丸 治涌水腹滿不堅疾行則濯濯有聲</p> <p>葶藶<small>炒</small> 澤瀉<small>各一兩</small> 猪苓<small>去皮</small> 椒目 桑根白</p> | <p>皮 杏仁<small>去皮尖 雙仁 炒</small> 大戟<small>炒</small> 甘遂<small>炒</small> 大黃</p> <p>炒 黃芩<small>各一兩 去黑心</small> 芫花<small>炒焦一兩 酒浸</small> 薏花<small>半兩</small></p> | <p>右咬咀如麻豆大每服五分匕水一盞煎七分早晚食前溫服以利為度</p> |
|--|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|



|                |   |  |                            |                       |   |   |  |                             |                  |                    |   |   |                             |                   |                |
|----------------|---|--|----------------------------|-----------------------|---|---|--|-----------------------------|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|----------------|
| <p>檳榔丸 治涌水</p> | <p>檳榔 煨<br/>                 牽牛子 炒<br/>                 赤小豆 炒<br/>                 郁李仁 浸炒湯去</p> | <p>皮 桑根白皮 剉<br/>                 肉豆蔻 去殼<br/>                 杏仁 去皮尖雙仁 炒各</p> | <p>右為末煉蜜丸小豆大每服十丸以溫水下日再</p> | <p>猪苓飲 治涌水小便澁臥即喘急</p> | <p>猪苓 皮去<br/>                 桑根白皮 炒<br/>                 防己<br/>                 百合<br/>                 郁李仁</p> | <p>各一兩<br/>                 半研 瞿麥 一兩<br/>                 木通 二兩</p> | <p>欽定四庫全書<br/>                 普濟方</p> | <p>右粗搗篩每服三錢水一盞半煎至一盞去滓食前</p> | <p>溫服如人行五里再服</p> | <p>通草飲 治涌水腸鳴腹大</p> | <p>木通 二兩 剉<br/>                 桑根白皮 炒<br/>                 石葦 去毛<br/>                 赤茯苓 皮去</p> | <p>防己 澤瀉 各一兩 剉<br/>                 大腹子 炮四枚</p> | <p>右粗搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去滓食</p> | <p>食溫服如人行五里再服</p> | <p>海蛤湯 治涌水</p> |
|----------------|---|--|----------------------------|-----------------------|---|---|--|-----------------------------|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|-------------------|----------------|





|  |   |              |                    |  |                           |                   |                               |  |   |   |                               |   |
|--|---|--------------|--------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|---|-------------------------------|---|
| <p>海蛤 紫苑<small>去苗</small> 遠志<small>去心各一兩</small> 大戟 木香</p> | <p>防己<small>各半兩</small></p> <p>右粗搗篩每服二錢匕水一盞半煎至八分熱服若取惡水即以白粥補之禁鹽一百二十日再不得服</p> | <p>芫花甘遂藥</p> | <p>商陸丸 治涌水諸般水腫</p> | <p>商陸<small>一斤</small> 陳橘皮<small>二兩湯浸焙</small> 木香<small>一兩</small> 赤小豆</p> | <p>麵<small>四兩</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>右為末以汲水和丸如菘豆大每服二十九丸橘皮湯下</p> | <p>椒目丸<small>一名防己丸</small> 治涌水腹滿腸間有水聲<small>方見本大腹水腫類</small></p> | <p>葶藶丸<small>出聖濟總錄</small> 治涌水腹滿小便難</p> | <p>葶藶<small>炒一兩半</small> 硝石<small>二兩</small> 杏仁<small>湯浸去皮尖雙仁二兩半研</small></p> | <p>服 右為末棗肉和丸桐子大食前木通湯下十九日二</p> | <p>芫麻單方<small>出聖濟總錄</small> 治涌水心下如數升油囊□□作</p> |
|--|---|--------------|--------------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|---|-------------------------------|---|



|  |               |           |
|--|---------------|-----------|
| 聲日不用食但欲飲水則成瘕<br>用蓖麻子去皮二十枚服如上法以病盡為度五日<br>內只喫白糜粥 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 普濟方卷一百九十一 |
|--|---------------|-----------|

