

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十七 明 周王朱橚 撰

諸瘧門

總論

夫夏傷於暑秋必病瘧蓋傷之淺者近而暴傷之重者遠而疾瘧瘧者以瘧也是知夏傷於暑溫熱閉藏而不能發泄於外邪氣內行至秋而發為瘧也經受之隨其動而取之有中三陽有中三陰者經中邪氣其證各殊

欽定四庫全書

普濟方

同傷寒論之也五臟皆有瘧其治各異在太陽經謂之風瘧治多汗之在陽明經謂之熱瘧治多下之在少陽經謂之風熱瘧治多和之在陰經則不分三經總謂之濕瘧當從太陰經論之 瘧病所謂因者病當先寒後熱寒則湯火不能溫熱則冰水不能寒以先傷寒後傷風故先寒而後熱名曰寒瘧病者先熱後寒躁煩自汗惡風以先傷風後傷寒風為陽寒為陰故先熱而後寒名曰溫瘧病者但熱不寒陰氣孤絕陽氣獨發心氣煩



挽手足而欲嘔必渴以傷於暑熱名曰瘧瘧病者寒熱
身重骨節煩疼脹滿澀澀自汗善嘔因汗出復浴濕舍
皮膚及冒雨濕名曰濕瘧病者寒多不熱但慘戚振慄
病以時作此以陽虛陰盛多感陰濕陽不能制陰名曰
牡瘧五種瘧疾以外感風寒暑濕與衛氣相并而成也
瘧病內所因者病者寒熱顏色蒼蒼然善太息如死狀
以蓄怒傷肝氣鬱所致名曰肝瘧病者必煩欲飲清水
反寒多不甚熱乍來乍去以喜傷心氣耗散所致名曰

欽定四庫全書

普濟方

心瘧病者寒多腹中熱痛或渴不渴不熱不泄腸鳴汗
出以思傷脾氣鬱澀結所致名曰脾瘧病者心寒甚發
熱間善驚而有所見以憂傷肺氣凝痰以致名曰肺瘧
病者手足寒洒然腰脊痛發熱大便難目眴以失志傷
腎所致名曰腎瘧五種瘧疾以臟氣不和鬱結澀飲而
成也瘧不內外因者病者發寒熱一歲之間長幼強弱
或染時行變成寒熱名曰疫瘧以歲運推之病者寒熱
不作夢寐不祥多生恐怖名曰鬼瘧宜用禁避厭禳之



法病者乍寒乍熱乍有乍無商方多病此名曰痺瘧當
隨方上所宜治之病者寒善飢而不能實已之滿腹急
病痛以日作名曰胃瘧六腑無瘧唯胃有者蓋飲食飢
飽所傷胃氣而成世之謂食瘧或因諸瘧飲食不節變
為此證也病者經年不差差復再發遠行以立不至微
勞力皆不任蓋因表裏俱虛客邪未散真氣不復疾雖
暫間少勞便發名曰勞瘧亦有數年不差百藥不斷結
成瘕癖腸脇名曰老瘧亦曰母瘧備內外不內外三因

欽定四庫全書

普濟方

外則感四氣內則動七情飲食飢飽勞逸皆能致瘧經
中所謂夏傷暑秋痰瘧者此則因時而序耳不可專隅
以此論之則知溫病飧泄欬嗽不可拘也夫瘧之始發
先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓領腰背俱痛寒去則內
外皆熱頭痛而渴欲飲冷者以陰陽上下交爭虛實更
作若陽並於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓領太
陽虛則腰背頭項俱痛少陽虛則心體解倦心惕惕然
三陽俱虛則陰氣勝骨寒而痛病於陽則陽實而陰虛



太陽虛則不嗜食善嘔嘔已乃衰少陰虛則熱多寒少
嘔甚其病難已厥陰虛則腰腹痛小便不利如癰三陰
俱虛則陽氣勝熱勝悒悒不樂陰盛則內寒陽虛則外
寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱一生
於外故中外皆熱此皆因外感寒暑風濕內鬱喜怒憂
驚蘊積痰飲所至飲食飢飽勞逸之所為也病氣與衛
氣并居故病作衛氣晝行陽夜行陰得陽而外出得陰
而內薄所以日作其氣內內薄於五臟橫連於募原其

欽定四庫全書

普濟方

道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱出故間作以衛氣
一日一夜大會於風府日下以節以此日作稍晏至二
十五日至骶骨二十六日入脊內其氣上行故作日益
早也瘧氣所以更盛更虛當氣之所在者在陽則熱躁
在陰則寒靜極則陰陽俱衰衛氣相離則病休衛氣集
則腹痛也於是有日作間日作早晏不同又邪氣中於
頭項者氣至頭項則作中於外者氣至背則作中於腰
脊者至腰脊即作各隨其所中而作但衛氣之所在與



邪氣相合則病作也更有疫癘鬼瘴等癘亦以邪氣中外氣之所為也除瘴癘純熱寒癘先熱牝癘無熱外諸熱皆先寒而後熱又經曰無刺熇熇之熱無刺渾渾之脈無刺漉漉之汗為其病逆未可治也知此則病方來與正作與將過皆不可治以反傷真氣不可不知也

夫肺病為癘者乍來乍去令人必寒甚則熱發善驚如有所見此肺癘證也若人本來語聲清雄忽爾不亮拖氣用力方得出言反於常人呼共語真親不應雖曰未

欽定四庫全書

普濟方

病勢當不以此則肺病聲之候也察病觀疾表裏相應依源審療乃不失也心病為癘者令人心煩甚欲飲清水多寒少熱若人本來心性和雅而忽卒急反於常倫或言未訖便住以手剔腳爪此人必死禍雖未及呼曰行尸此心病聲之候也虛則補之實則瀉之不可療者明而察之肺病為癘者令人色蒼蒼然氣息喘悶戰掉如死者若人本來少於悲恚忽爾嗔怒出言反常乍寬乍急言未訖以手向眼如有所思若下節病禍必至矣



此則肺病聲之飲也其人若虛則為寒風所傷若實則
熱氣所損陽則瀉之陰則補之脾病為瘧者令人寒則
腹中痛熱則腸中鳴鳴已則汗出若其人本來少於喜
怒而忽反常嗔喜無多言自笑不答於人此是脾病聲
之候也不盈旬日禍必至腎病為瘧者令人淒淒然腰
脊痛而宛轉大便澀身掉不定素問作目手足寒熱人
本來不喜不怒忽然蹇而好喜怒反於常性此腎已傷
雖未發覺聲其候也見人未言而前開口還開口不聲

欽定四庫全書

普濟方

舉手爪柵腹此腎病聲之候也虛實表裏浮沉清濁宜
以察之逐而療之夫瘧脈者自弦弦數者多熱弦遲者
多寒弦小緊者可下之弦遲者溫藥已若脈數而緊者
可發汗針灸之脈浮大者不可針灸之凡瘧先發食頃
乃可以療之過之則失時足太陽之瘧令人腰痛頭重
寒從背起先寒後熱熇熇虛矯切暍暍然熱止汗出難已
刺□中出血足少陰之瘧令人聲體解休寒不甚熱不
甚以惡見人見人心惕惕然若多汗出甚刺足少陰足



陽明之瘧令人先寒洒洒淅淅寒甚以乃熱熱去汗出 喜見日月光火氣乃快然刺足陽明附上足太陰之瘧 令人不樂好太息不睡多寒熱汗出病至則善嘔嘔已 乃衰則取之則善足少陰之瘧令人悶吐嘔甚多寒熱 熱多寒者欲閉戶而處其病難已足厥陰之瘧令人腰 痛小腹滿小便不利如瘧狀非瘧也數小便意恐懼氣 不足腸嘔嘔刺足厥陰腰瘧者刺手太陰陽明心瘧者 刺足厥陰肝瘧者刺足厥陰見血脾瘧者刺足太陰腎 刺足太陰	欽定四庫全書 普濟方	瘧者刺足太陰少陰胃瘧者刺足陽明太陰橫脉見血 足經太陽瘧羗活加生地黄湯小柴胡加桂湯陽明 瘧桂枝及白虎二湯黃芩芍藥加桂枝湯少陽瘧小柴 胡湯主之太陰瘧小建中湯異共湯少陽瘧小柴胡加 半夏湯厥陰瘧四物元胡苦練附子湯肝瘧四逆湯通 脉四逆湯胃瘧理中湯理中丸心瘧桂枝加黃芩湯腎 瘧桂枝加當歸芍藥湯 肝病面青脉弦皮急多青則 痛形盛胸脇痛耳聾口苦舌乾往來寒熱而嘔以上是
--	---------------	---



形盛當和之以小柴胡湯如形衰骨搖而不能安於地
乃膝筋治之以羌活湯本草云羌活為君也瘧證取以
少陽如久者發為痺瘧宜以鉅針刺絕骨血復以小柴
胡湯治之心病面赤脉洪身熱赤多則熱暴病壯熱惡
寒麻黃加知母石膏黃芩湯主之此如不發汗久不愈
為瘧也淹疾項腫面赤身熱脉洪緊而消瘦婦人則亡
血男子則失精脾病面黃脉緩皮膚亦緩黃多則熱形
盛依傷寒說是為温温其脉陽浮而若陰小而即治太

欽定四庫全書

普濟方

陰濕温自汗白虎湯加蒼朮主之如久不愈為温瘧重
膈白虎加桂枝主之淹疾內消食少無力故曰熱消飢
肉宜以養血凉藥內經曰血生肉肺病面白皮濇脉亦
濇多白則寒暴病濇痒氣虛麻黃加桂枝令少汗則去
也傷寒論云夏傷於暑汗不得出為痒若久不痊為風
瘧形衰面白脉濇皮膚亦濇形羸氣弱形淹衛氣不足
腎病面黑身凉脉沉而滑多黑則痺暴病形冷惡寒三
焦傷也治之以薑附湯或四逆湯久不愈為瘧暴氣衝



上吐食夜發俗呼為之夜癰太陽經桂枝湯證形衰淹疾
羸瘦風痺痿厥不能行也 夫癰脉自弦弦數者多熱
弦遲者多寒弦而小緊者宜下弦遲者宜溫浮大者宜
吐治療之法當先發散寒邪不可驟用截補之藥若截
則補住邪氣其證變異不能即愈致成癆瘵者有之發
散之藥熱多宜小柴胡湯參蘇飲清脾湯之類寒多者
宜養胃湯四獸飲發散不退然後以常山飲勝金丸截
而不愈以則脾氣虛敗唯宜多進養脾驅痰之藥脾氣

欽定四庫全書

普濟方

一盛自然平復此證既愈尤當節飲食謹勞傷妨其再
作如烟瘴之地居人常患瘧疾者又當隨其方土所宜
藥性施以治法客旅往來瘴地當宜服平胃散草菓飲
先以妨之 凡富貴膏粱之家病瘧或間日或頻日發
或熱多寒少宜大柴胡湯下過三五行次服白虎湯或
玉露散桂苓甘露散之類如不愈者是積太甚以神芎
三花神祐丸調胃承氣湯等劑大作料下之后以長流
煎五苓散服之或服小柴胡亦可或以先恒散吐之後



服涼膈白虎之類必愈矣大忌發熱之物雞猪魚兔五
辛之物犯之則再發也凡田野貧寒之家病瘧為飲食
麤糲衣服寒薄勞力動作不與膏粱法同臨發日可用
野多効方中溫脾散治之如不愈服辰砂丹治之必愈
矣喫罷此藥以長流煎白虎湯服之不宜食熱物 夫
先熱後寒可與解散風邪如川芎白芷青皮紫蘇之類
或細辛檳榔佐之溫一證先熱後寒此為傷寒壞病與
瘧大畧則同熱多寒少小柴胡湯熱少寒多小柴胡湯
欽定四庫全書
普濟方
內加官桂寒瘧自感寒而得無汗惡攣痛面慘轉而為
瘧寒陰氣也故先寒後熱可與發散寒邪生料五積散
增桂養胃湯或良薑乾薑官桂草菓之類甚則薑附湯
附子理中湯暑瘧者暑勝熱多得之一名瘧瘧陰氣獨
微陽氣獨發但熱不寒裏實不泄煩渴且嘔肌肉消鑠
當用小柴胡湯香薷飲嘔者縮脾飲加生薑溫服下消
暑圓多躁甚者少與竹葉湯恒山柴胡於暑證最便濕
瘧者冒襲雨濕出汗澡浴得之身體痛重肢節煩疼嘔



逆脹滿盡用五苓散除濕湯加蒼朮茯苓輩寒多者木
附湯最良牝瘧者以受陰濕陰盛陽虛陽不能制陰所
以寒多不熱氣虛而泄淒慘振振柴胡桂薑湯減半黃
芩加以半夏施之為當食瘧一名胃瘧飲食無節飢飽
有傷致然也凡食啖生冷鹹藏魚塩肥膩中脘生痰皆
為食瘧其狀若飢不能食食則中滿嘔逆腹痛青皮陳
皮草菓半夏縮砂白苳蔻作劑或四獸湯下紅圓子自
有竒功瘧瘧挾嵐瘧溪源蒸毒之氣致然也白嶺以南

欽定四庫全書

普濟方

地毒苦炎躁濕不常人多瘧瘧其狀血來上焦病欲來
時令人迷困甚則發燥狂心亦有啞不能言者皆由敗
血於心毒涎聚於脾坡仙指脾胃為實熱所致又有甚
於傷暑之瘧耳治之須用涼膈疏通大腸小柴胡加大
黃治瘧木香圓觀音圓皆為要藥如前數證經久不瘥
真氣已耗邪氣猶存則有所謂勞瘧瘧母者焉表裏俱
虛真元未復雖暫止小勞復勞謂之勞瘧發當調養氣
血川芎當歸官桂芍藥輩所不可無彌年閱歲經吐汗



下榮衛虧損邪氣伏藏脇間結為癥瘕謂之瘧母此證未可直攻急作烏梅七棗湯以扶其裏候其內氣已充繼此經効瘧丹消癥圓下之取愈大抵瘧之初得三數日間如火療原不可嚮適波濤洶湧未易回瀾當俟其稍定而圖之經所謂其盛者可待衰而已瘧方來與正發及將解不可投藥耗其真氣投藥當於未發以前兩時之先或遲發日凌晨空心與之諸瘧之脉大約尺寸俱弦或浮數或緊實或緩濇或虛遲或左手濡而右手盛

欽定四庫全書

普濟方

或尺寸盛而關中不可定名已為弦也總前治法弦數多熱者寒之弦遲多寒者溫之浮弦浮緊浮數其邪在表者可汗弦實沉實數實其邪在裏者可下若夫調胃氣利痰水分陰陽行三焦是又治法之綱領也渴亦水漿藥入輒吐人參煎湯効亦猶有說焉嘗讀二廣攝生見其論議若瘧瘧若暑毒每用踈轉之劑取下根源果有先傷暑後發瘧涉年餘者度其腹中有瘕水磨沉香下解毒雄黃圓黑血如泥泄下極臭由是獲愈因知諸



瘧皆有根在治法之外又當隨輕重而利導之實者與
巴豆大黃虛者用養正丹輩不然恒山於瘧每每作効
何耶蓋瘧家多蓄黃水恒山為能破其癖而下其水也
恒山治瘧嬰粟殼治痢人皆薄之故也然其痢日久腹
中無痛當澀腸則豈容下澀瘧以痰水作恙法當吐痰
逐水豈容不為吐下於斯時也不有嬰殼恒山之劑其
何以為對治乎但中間有藥補之耳凡瘧皆因停中腹
蓄黃水惟水不行所以寒熱不歇此瘧家受病之處治
欽定四庫全書
普濟方

暑瘧純熱以香薷散加青皮北大黃兩箇烏梅同煎侵
晨溫服寒瘧多寒以二陳湯加青皮良薑多用薑同煎
侵晨吞神保圓五粒並欲取下毒水以去其病根寒熱
自解發瘧嘔吐勿用恒山有中年人臟腑久虛大便常
滑忽得瘧疾嘔吐異常惟專用人參為能止嘔其
他瘧劑並不可施遂以茯苓二陳湯人參縮砂而並用
白芷蔻進一二服病人自覺氣脈頗消於是寒熱不作
蓋白芷蔻能消能磨流行三焦榮衛一轉寒熱自平繼
今遇有嘔吐發瘧之證或其人素嘔而發瘧謹勿用恒
山惟以生蘿蔔生薑各研自然汁半盞入蜜三四匙烏
梅兩箇同煎吞局方雄黃圓三四粒候其利下惡血痰
水即以人參川芎茯苓半夏縮砂甘草調和之萬一嘔
不止而熱不退却用真料小柴胡湯多加生薑主治其



厲	若	身	可	復	法	輩	通	香	者	肝	為	來	巴	後	便	欽	故	瘧	血	挾	飲	在	見	下	不	臍	血	家	苟	飲	胡	或		
大	作	也	也	再	當	與	利	鶯	多	脉	深	與	豆	獲	點	定	然	須	暑	水	與	于	或	或	不	桃	證	或	無	所	湯	或		
抵	吐	當	汗	泄	下	之	不	入	用	浮	害	正	工	愈	滴	四	爾	用	毒	飲	水	水	吐	歇	仁	當	或	行	以	繼	嘔			
連	劑	汗	而	但	而	亦	能	生	生	盛	寒	發	於	或	而	庫	其	隨	者	皆	以	經	不	為	以	血	血	所	之	吐	大			
綿	常	而	下	時	下	先	除	姜	姜	頭	熱	不	下	用	下	全	有	證	為	生	積	以	活	入	恒	唾	藥	寒	作	之	大			
有	山	不	不	時	不	解	也	烏	渴	痛	此	可	積	巴	似	書	純	而	逐	寒	積	而	凡	山	血	品	熱	瘧	而	又				
病	豈	匝	盡	點	盡	後	萬	梅	者	怯	瘧	服	苟	豆	泄	普	熱	利	水	熱	則	瘧	生	草	或	佐	惟	有	發	而				
差	容	頭	腹	滴	腹	攻	一	同	加	風	此	藥	血	圓	不	濟	發	之	消	故	為	固	薏	大	即	瘧	水	熱	但	先				
以	移	汗	中	而	尚	之	其	煎	烏	大	傷	在	湯	子	須	方	瘧	飲	暑	瘧	瘧	當	濃	便	其	血	所以	增	為	治				
後	哉	至	有	者	餘	意	未	可	梅	抵	寒	於	滌	相	用	普	瘧	結	不	瘧	母	以	蜜	血	何	收	十	寒	熱	恒	山			
或	究	胸	須	須	痛	治	鋤	抑	或	小	一	未	血	依	比	濟	瘧	瘧	隨	惟	風	同	絲	收	全	之	効	耶	斷	自	今			
飲	焉	而	再	下	或	瘧	又	猶	傷	柴	證	發	熱	而	行	方	故	者	敗	寒	暑	煎	或	十	効	効	耶	斷	自	今	瘧			
食	收	手	下	之	大	要	當	有	暑	胡	而	兩	不	亦	大	普	也	歇	血	未	濕	以	瘧	効	効	耶	斷	自	今	瘧				
失	節	足	大	大	便	不	以	說	之	皮	實	時	以	能	佐	濟	吾	必	為	信	而	之	瘧	効	効	耶	斷	自	今	瘧				
節	或	汗	黃	黃	一	過	麻	焉	小	紫	非	先	瘧	也	是	方	未	痛	之	之	瘧	瘧	瘧	効	効	耶	斷	自	今	瘧				
或	患	者	以	以	泄	吐	仁	寒	柴	蘇	瘧	瘧	病	也	又	然	之	瘧	瘧	瘧	瘧	瘧	瘧	瘧	効	効	耶	斷	自	今	瘧			
傷	怒	須	汗	汗	者	者	圓	熱	胡	之	也	交	爭	轉	然	然	之	瘧	瘧	瘧	瘧	瘧	瘧	瘧	効	効	耶	斷	自	今	瘧			
中	之	出	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	
或	為	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者	者



<p>桃仁 三七枚 炒微黃色 川大黃 碎一兩 炒射香 細研</p>	<p>虎骨頭 酥炙黃 朱砂 細研 常山 剉半兩 甘草 微赤剉</p>	<p>虎骨頭丸 治一切瘧疾</p>	<p>方</p>	<p>而主治小異大同今以一方俱療之故曰諸瘧也</p>	<p>皆因調攝失宜陰陽交爭寒熱競作雖名目淺深各異</p>	<p>夫人五臟瘧有寒熱痰鬼及山嵐瘴氣諸瘧原其受病</p>	<p>諸瘧論附</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>生燈芎柴濟一眩收方去解服巴藥皮梳 地心胡繼輩厥歛多不諸過豆並甘洗 黃一草胡令則疾啓必諸多丸並用草感 皆捻草黃黃則指弗陽必毒多以子用草 能主烏芩芩退弗陽關藥致藥子生薑熱 調之梅大芩而為陽心藥致藥子生薑熱 血其劑作黃解熱而為陽心藥致藥子生 一調黃劑用利之熱而為陽心藥致藥子 其效亦連之其熱乍輕而不退盡用黃芩 遠益生地黃赤茯苓同煎臨熟入 蓋川芎 自退 普濟方</p>
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------	----------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------	-------------------	---



右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空腹飲下	鼓 <small>一升</small> 炒麝香 <small>分一</small> 附子 <small>炮製一枚</small>	常山 <small>酒浸切焙</small> 肉蓯蓉 <small>各三兩</small> 桃仁 <small>去皮炙雙</small> 升麻 <small>一兩</small>	烏梅肉 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small> 虎頭骨 <small>各二兩</small> 人參 <small>炙</small> 肉桂 <small>去麤皮</small>	烏梅丸 治一切瘧無問遠近	澤當發日空心一服臨發一服亦治時疫	右為剉散服四錢水三盞薑三片棗二枚煎七分去	半夏 烏梅 <small>各三分</small>	欽定四庫全書 普濟方	陳皮 青皮 <small>去</small> 桔梗 <small>去</small> 白芷 甘草 紫蘇葉	麻黃 <small>去節</small> 白朮 <small>去</small> 茯苓 桂心 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>半一兩</small>	麻黃白朮散 治傷寒溫暑濕滯留經絡與衛相并病	以日作寒熱交煎	不從自愈忌海藥菘菜大酢生葱生菜菹菜	一碗欲發時亦服三十九丸三日內慎生冷萬不可犯	服二十九丸至日平旦服四十九丸如人行十里食白粥	右各等分合搗蜜和丸如梧子大未發前日晚空肚
-----------------------	--	---	---	--------------	------------------	----------------------	--------------------------	---------------	--	---	-----------------------	---------	-------------------	-----------------------	------------------------	----------------------



如虛勞加鼈甲三兩

常山丸 延年療瘧

常山四分 青木香四分 蜀潦一分 牡蠣二分 烏梅肉一分

大黃二分 丹砂二分 知母二分 麻黃一分 鼈甲二分 豉一分

熬

右搗篩蜜和丸如桐子大未發前粥飲下五丸訖微

吐後須臾任食至欲發更服十丸忌菹菜生血物生

葱菜油膩

欽定四庫全書

普濟方

雄黃丸 治一切 寒熱發歇不定痰逆不下飲食

雄黃一分 虎脂一分 砒霜一分 狗獾頭骨一分

硃砂一分 安息香一分 鼠糞一分 白芥子一分 黃丹一分

天靈蓋一分 菜豆粉一分

右為末入研藥勻入虎脂并煉蜜為丸如皂莢子大

男左女右以緋帛繫一丸於中指上時時嗅之

鼈甲煎丸 治瘧疾

方見瘧母類

烏梅丸 療瘧無問溫瘴痰瘧悉皆主之



烏梅肉 二兩 常山 二兩 鼈甲 二兩 香豉 二兩 蜀漆 二兩	川椒 二兩 人參 二兩 桂心 二兩 知母 二兩 桃仁 二兩 別搗如稀錫	肉蓯蓉 二兩	右搗篩為末蜜和丸如梧桐大空心以酒飲任下三	十九忌生葱芻菜海藻菘菜 <small>一方有升麻甘草各二兩為十三味</small>	尅効餅子 <small>出和劑方</small> 治一切癰疾發作有時先覺身欠乃	作寒慄鼓振頤額中外皆寒腰脊俱痛寒戰既已內	外皆熱頭疼如破渴欲飲冷或痰聚胸中煩悶滿欲	欽定四庫全書 普濟方	嘔或先熱後寒或先寒後熱或寒多熱少或熱多寒	少或寒熱相半或但熱不寒或但寒不熱或一日發	或隔日發或一發六七日再發並能主之	金箔 <small>三十五片為衣</small> 信砒 <small>醋煮二兩半</small> 甘草 <small>燻</small> 荷葉 <small>燻</small> 定粉 <small>研</small>	龍腦 <small>研</small> 菴豆末 麝香 <small>研各半兩</small> 硃砂 <small>研飛一兩</small>	右為末煉蜜搜和每兩作二十九捏匾以金箔為衣	每服一餅子以新汲水磨化日發者未發前服之間	日者不發夜服隔數日發者前一日夜服連日臨晨
--	--	--------	----------------------	--	---	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------



服	驅瘧飲子 <small>出三方</small>	前胡 <small>各四</small> 柴胡 <small>兩</small> 桂心 桔梗 厚朴 <small>製</small> 半夏 <small>湯洗</small>	去滑各 <small>三兩</small> 黃耆 乾薑 <small>炮</small> 甘草 <small>各二兩</small>	右剉散每服四錢水盞半生薑三片棗二枚煎七分	去滓溫服	草菓飲 <small>出百一選方</small> 治瘧	大棗 <small>十箇</small> 草菓 <small>五箇</small> 半夏 <small>十枚</small> 青橘皮 <small>四箇湯浸連白用</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	生薑 <small>三十塊</small> 烏梅 <small>十箇</small> 甘草 <small>三寸</small> 厚朴 <small>三寸去麤皮薑汁製</small>	陳橘皮 <small>四箇湯浸連白用</small>	右為麤末以水三大碗煎碗半去滓當發日五更初	服一盞五更五點又服一盞平明服一盞比至飯前	要分服令盡再將滓以水碗半煎七分慢呷喫	恒山酒 治瘧	恒山 鼈甲 <small>醋炙去裙</small> 桃仁 <small>三七枚去皮</small> 豉 <small>炒半</small> 虎頭骨 <small>兩炙半</small> 桃枝 <small>一握</small> 柳枝 <small>一握</small> 乾棗 <small>三枚</small> 烏梅 <small>七枚</small>
---	-------------------------	---	--	----------------------	------	-----------------------------	---	---------------------------	--	----------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------	---



右細剉以酒一升浸一宿明日入生薑五片煎取五合去滓空心分為二服

桂枝黃芩湯 出醫方大成 治瘧服藥寒熱轉大者知太陽

陽明少陽三陽合病也

甘草 黃芩 人參 各四錢半 半夏 四錢 桂枝 二錢 石膏

知母 各五錢 柴胡 一兩二錢

右為麤末水煎從卯至午時發者宜大柴胡湯下之從午時至酉發者知其邪氣在內也宜用大承氣湯

欽定四庫全書

普濟方

下之從酉至子時發者或至寅時知其邪氣在血也宜桃仁承氣湯下之微利後更以小柴胡湯制其邪氣可也立秋以後及處暑前發瘧漸瘦不能食者謂之瘧瘧此邪氣深遠而中陰經為以瘧也

加減七寶飲 治一切瘧疾熱多寒少者

恒山 醋製 檳榔 甘草 厚朴 姜製 烏梅 青蒿

草薺仁 知母

右等分咬咀每服半兩水一碗酒一盞同煎至一大



蓋露一宿來日早晨盪溫去滓面東服	截瘧飲 專治諸瘧疾	恒山 草萊 檳榔 柴胡 黃耆 甘草	鼈甲 烏梅 <small>少許用二筒</small>	右等分酒一盞煎至半盞隔宿露至五更復溫朝東服	知母丸 治瘧疾	知母 <small>焙</small> 烏梅肉 <small>炒各一兩半</small> 肉蓯蓉 <small>切焙</small> 恒山 豉 <small>炒各二兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	甘草 <small>炙</small> 人參 桂 <small>去麤皮各一兩半</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下	烏梅飲子 治溫瘧勞瘧	烏梅 <small>七顆</small> 桃柳心 <small>各七莖</small> 葱白 <small>七莖</small> 豉 <small>一合</small> 甘草 <small>四分</small> 柴胡 <small>四分</small>	知母 <small>四分</small> 大黃 <small>三分</small>	右各細剉以童子小便兩茶碗宿浸明日早煎三兩沸去滓頓服瘧未瘥更作三服永瘥忌海藻菘菜
-----------------	-----------	-------------------	----------------------------	-----------------------	---------	---	------------	---	-----------------------	------------	--	---	---



療膈湯 治癰

恒山 三兩 松蘿 二兩 黃芩 二兩 瓜蒂 十四枚 梔子仁 十四粒

甘草 二兩 烏梅 十四枚

右切以酒二升漬一宿明旦以水四升煮取三升分

三服忌海藻生葱生菜菘菜等

七珍散

出衛氏家寶方

治癰後及傷中暑後宜服此壯胃養

氣進食溫平每日服之十日外飲食倍常

人參 去蘆頭

白朮 黃芪 山芋 粟米 微炒 甘草

欽定四庫全書

普濟方

白茯苓 去皮各半兩

右為末每服二錢水一盞生薑三片棗二枚同煎至

七分去滓食前溫服一方加白匾豆一兩蒸用名八

珍散

七寶散

出楊氏家藏方

治男女婦人一切癰疾或先寒後熱

或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或多寒但寒

或多熱但熱或一日發或一日二三發或連日發或

間日發或三四日一發不問鬼癰食癰不服水土山



嵐瘴氣似癰者亦皆治之

恒山 厚朴製 薑 青皮 陳皮並 不 去 白 甘草 檳榔

草菓仁各 等 分

右咬咀每服半兩於未發隔日夜用水一碗酒一盞煎至一大盞濾出露一宿却將滓再用酒水更依前煎一次去滓別一碗盛亦露一宿來日當發之早盪溫面東先服頭藥少歇再服藥滓一方用生薑烏梅水煎如熱多加柴胡寒多加酒熱多加水忌熱物

欽定四庫全書

普濟方

又方

用烏梅良薑無陳青皮寒者如本方熱多者去陳青皮用烏梅青蒿或加知母等分煎尤好

草菓飲出 德 生 堂 方 諸癰通用加乾薑治寒癰脾疾初愈

服此進食理脾

草菓 白芷 良薑 青皮 川芎 紫蘇葉

甘草炒 等 分

右剉散每服三錢用水一盞半煎至八分去滓熱服



當發日連進三服一方有陳皮一方生薑煎

柴胡桂薑湯 一名薑桂飲子 治瘧或有寒者但寒不熱者并

治癆瘵亦治久不愈者

北柴胡 四錢 括蔞根 二錢 牡蠣 打碎 甘草 乾薑 各一錢

黃芩 桂 各一錢半

右為麤末每服五錢水一盞半煎至八分溫服一方

加半夏麪半兩如先寒後熱者於未發之日先服柴

胡桂薑湯二服却繼以白虎加桂湯二服然後夜間

欽定四庫全書

普濟方

服截藥以達夫肝鬱

七聖散 出續易簡方 專治諸瘧疾重者不過三服

檳榔 二箇最 烏梅 七箇 杏仁 十箇去 薑片 十 小棗 七箇

草菓 二箇大 恒山 一錢

右咬咀用汲水二盞煎至一大盞不犯紅日空心面

東正坐通口服之

人參養胃湯 出醫方大成 治瘧疾寒多熱少者必須先用

此藥發散然後用四獸飲之類截之因食倍加草菓



方見時氣
門瘦癯類

四獸飲

出如
宜方

治五臟氣虛喜怒不節勞逸兼并致陰

陽相勝結聚涎飲與衛氣相搏發為瘧疾兼治瘴瘧

常服溫中快膈最有神効

茯苓

人參

白朮

草菓

半夏

湯去
滑

橘紅

各
等

分
甘草
半減

右同棗子烏梅生薑並等分咬咀以鹽少許淹食頃

厚皮紙裏用水濕之慢火炮令香熟焙乾每服半兩

欽定四庫全書

普濟方

水二盞煎至六分去滓未發前併進數服 一方治

脾寒名快脾飲用草菓人參白朮橘紅半夏厚朴縮

砂仁附子等分甘草減半每服四錢水二盞薑十片

烏梅二箇棗子一枚煎至六分去滓不以時服用此

藥下紅圓子尤佳兼治脾胃虛弱腕停寒不進飲食

四肢無力 治熱多者宜服驅瘧飲用前胡柴胡各

一兩官桂厚朴桔梗各三分黃芪乾薑甘草各半兩

每服四錢水一盞半薑五片棗二枚煎六分去滓熱



服 治寒多者宜服七棗湯用附子一隻鹽泡以水
再炮再浸如此七次去皮切片分作二服用水二盞
薑十四片棗七箇煎七分發日空心溫服 一方名
七寶湯用恒山陳皮青皮檳榔草萊仁甘草各等分
每服半兩水酒各一盞煎六分當發侵晨服之此藥
既有恒山必須吐而後愈當日或大作世謂鬪藥是
也虛怯人不宜服此脾胃素虛寒者亦不宜服瘧疾
多因中脘有飲用恒山作効者以其能吐之若用辰

欽定四庫全書

普濟方

砂黃丹輩墜之為穩 其方用黃丹一兩煨大蒜去
皮研膏作三丸當發日早晨嚼一丸并水或熱嚥下
畏蒜氣者白水為丸一法用生硫黃辰砂各為細末
寒多倍硫黃熱多倍辰砂寒熱者勻用每服三錢臘
茶青調臨發日早晨進之當日或大作或不作皆是
其効須早用之為佳不然恐連綿不已遂致因頸若
積日既久變成勞瘵者宜灸膏肓

人參木香湯 治脾胃有積以不尅化或原有此證遂



成寒瘧之疾或先寒後熱或先熱後寒或但熱不寒 或但寒不熱或頭疼譫語除傷寒之外是瘧疾者並 皆治之	
人參	木香 官桂 白朮 白茯苓 黃連
附子	柴胡 黃芪 厚樸 甘草 麻黃 各三錢
肉荳蔻	十箇 檳榔 五箇
右咬咀每服三錢水一盞生薑三片烏梅一枚同煎 至七分入酒少許又煎三四五沸溫服兼治虛弱之 人	
欽定四庫全書 普濟方	
知母飲	出聖方 治瘧
烏梅	一枚 去核
鼈甲	醋炙去
桃仁	雙仁炒 去皮尖
附子	炮製去
知母	焙
恒山	各半
狼牙	分
右剉如麻豆每服五錢用酒一大盞半糯米四十九 粒隔夜浸一宿至五更初同煎取七分去滓乘熱分 作二服未發一服發時一服	
虎頭骨丸	出聖方 治一切瘧



虎頭骨 <small>一兩半塗</small> <small>酥炙黃</small>	臘月猪血 <small>半</small>	合桃奴 <small>七</small>	寒食麵 <small>半</small>
砒霜 <small>一分</small>	桃心 <small>一百二十</small>	端午糗子尖 <small>九</small>	
<small>細研</small>	<small>乾者</small>	<small>枚</small>	
右將桃心虎骨桃奴為末研上藥一處令勻於五月五日未出時合用粟米飯和丸如菘豆大欲發前新汲水下二丸忌食熱物			
恒山飲 <small>一名截癰鬼哭恒</small>	治瘧疾丸瘧疾之疾蓋因		
<small>山飲出德生堂方</small>			
外邪客於風府生冷之物內傷脾胃或先寒後熱或先熱後寒或寒熱獨作或連日併發或間日一發寒			
欽定四庫全書	普濟方		
則肢體顫掉熱則舉身如燒頭疼惡心煩渴引飲氣息喘急口苦咽乾脊腰酸腸鳴腹痛諸藥不治及發散不愈漸成勞瘵者此藥治之五月五日修合者極佳			
知母	川恒山	草薺	甘草 <small>炙各</small>
烏梅 <small>去仁</small>			良薑 <small>二十</small>
<small>一斤</small>			<small>兩</small>
右為散每服三錢水一盞薑五片棗二枚煎至七分去滓溫服當發日隔夜煎濾出滓桌子置虛空處將			



藥露天一宿次早五更病者起向東冷服此藥煎時
勿令婦人鷄犬得見病者宜暫離家否則移房妙

荔枝膏 出御藥院方

治瘧疾

烏梅 八兩 乳糖 二十兩 生薑 五兩 麝香 半錢 熟蜜 十四兩

桂 十兩

右用水一斗熬至一半濾去滓下乳糖再熬候糖鎔
化開入薑汁再熬濾去滓候少時入麝香用如常法

青皮飲 出百一選方

治遠近瘧疾如神

欽定四庫全書

普濟方

恒山 雞骨者 青皮 去穰 烏梅 去核 草菓 去皮 甘草 炙 檳榔 雞心者

右等分為麤末每服二錢水酒各七分同煎至七分
去滓當發日五更初溫服了睡片時忌熱物半日寒
多加酒退水熱多退酒加水須慢火煎冷熱不吐不
瀉甚有功效余於親友間每用之一服即效甚妙廬
陵袁司戶方無烏梅草菓不用酒煎却加神麩麥
藥白薑三味恒山日乾不見火每藥一兩作二劑水



三升炒餅文武火煎取一升當發日五更點心後早
食後各一服紹興張醫名升之方不用烏梅檳榔二
味熱多柴胡知母陳皮寒多加良薑餘與秦醫方同
却用薑棗烏梅煎

五行神驗丸 治一切瘧疾

澱花 二兩 東方桂 南方乾薑 西方巴豆 北方硫黃 中央

麝香 少許

右將五般藥於盤內據五方排定取四月二十八日

欽定四庫全書

普濟方

夜安桌子上於中庭露以香一爐當虔心如是露七
夜至端午日早修合將巴豆去殼湯五沸細擣研餘
藥為散入麝香以薄麵糊調澱花末為丸如櫻桃大
合時忌女子等見丸了焙乾於盒內盛發日淨手取
以綿裹香火炙令熱男左女右預前帶安耳中便利
時除去淨手後再安耳中不得女子捻觸女子患男
子與安日忌一切葷腥果子一方無麝香

醇醪湯 療瘧



<p>生薑 <small>三兩</small> 烏梅 <small>三七枚 擘一</small> 甘草 <small>二兩 尖</small> 河根 <small>三兩</small></p> <p>桂心 <small>三兩</small> 恒山 <small>三兩</small></p>	<p>右切以水六升煮汁取一升曰醇未發時須頓服更以水三升煮取一升曰醱至發斷復頓服甚良別方</p>	<p>說發日平旦服醱一升以醇著頭邊若欲發便服醇神良二說不同也忌海藻菘菜生蒜生菜</p>	<p>硃砂丸 <small>出聖惠方</small> 治一切瘧疾以不瘥</p> <p>硃砂 阿魏 乳香 砒霜 <small>各半兩</small> 麝香 <small>一分</small> 鼓 <small>一兩 別研</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>膏如</p> <p>右研令細以豉并軟飯和丸如棗豆大每服煎桃枝湯下四丸未發前二服以吐為効</p>	<p>恒山烏梅湯 <small>出肘後方</small> 療瘧膈痰不得吐宜吐之</p> <p>烏梅 桂心 芫花 半夏 恒山 <small>各半兩</small> 鼓 <small>五合 綿裹</small></p>	<p>右切以酒三升水四升合煮取二升分三服必得吐忌生葱羊肉錫生菜一方取三升無半夏恒山</p>	<p>大黃丸 治瘧</p>
---	---	---	---	--	---	---	---------------



右為末水煎服桃仁味苦甘辛肝者血之海血聚則	麻黃 一兩 去節 甘草 三錢 黃芩 五錢 桂 二錢 桃仁 三十枚 去皮尖	麻黃桂枝湯 出醫方大成 治瘧如夜發者	有雄黃	去也當發日服忌葷腥三日一服孕婦不可服一方	五月患者只一丸服後大段者只微寒若小可便絕	晨日欲出未出時吞之醋湯亦得其驗不具言經三	粒每服一粒用東南桃心取七枝研汁將井花水早	右為末於端午日同入乳鉢內滴水為丸分作三十	欽定四庫全書 普濟方	硃砂 二粒	菘豆 雄黑豆 各四十九粒 一作小豆 信砒 半錢 另研 黃丹 一錢 為衣	辟邪丹 出宣明論 治嵐瘴鬼瘧食瘧併平日者及瘧疾等	日內忌油	右為末蜜丸如梧桐子大發日平旦冷水服二丸七	雄黃 一分	白驢蹄 二分 熬 大黃 四分 菘豆 三分 砒霜 三分 光明砂 半分
----------------------	--	-----------------------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	-------	---	-----------------------------	------	----------------------	-------	---



肝氣燥經所謂肝若急急食甘以緩之故桃仁散血
緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發及陰經有邪此湯
發散血中風寒之劑

妙應丹 出三方 專治諸瘧無問寒溫久近悉主之

黃丹 三分炒 木香 為細末 青皮 陳皮 吳茱萸 各半兩

醋二升蒸青皮以三味至一升去滓再熬醋成膏

右將黃丹木香末入膏內搜和為丸如梧桐子大辰
砂為衣每服十丸未發前一食頃白湯下再將前三

欽定四庫全書

普濟方

件滓添木香半兩為末別研入黃丹三分和勻以醋
糊為丸如梧桐子大每服三五丸治瘧亦名妙槌
丹

趁鬼丹 出宣明論 治一切瘧

信砒 一錢 大豆 七錢 雄黃 輕粉 荷葉 各半 甘草 一寸

右為末酒水為丸如小豆大重五日未出不見雞犬
婦人脩合每服一丸無根水下平日夜視北斗來日

服忌熱物



萬安散

出濟生方

治一切瘧疾得病之初以其氣壯進此

藥以取效氣虛胃弱及妊婦不宜服之

蒼朮

泔水浸去黑皮剉炒

厚朴

薑製炒

陳皮

去白

檳榔

恒山

酒浸

一宿

右各一錢半重和勻用水二盞酒一盞煎至一盞半

去滓夜露一宿當發日分作二服盪溫早晨進一服

候其發時再進一服忌食熱物片時一方有甘草炙

用

欽定四庫全書

普濟方

加減柴胡湯

出衛生方

治瘧寒熱頭疼胸滿咽乾休作有

時臨時加減

柴胡

剉二兩

黃芩

甘草

人參

半夏

湯洗各切三分

右咬咀每服四錢水一盞半生薑六片棗一枚同煎

至七分去滓溫服未發前進日二服發即止之如日

尤宜服之先寒加桂三分一名小柴胡湯

辰砂丹 治大人小兒諸種瘧疾須端午日侵晨於淨

室焚香齋戒沐浴淨心修合



<p>明砒 <small>五錢同</small> 研極細 菘豆粉 黑豆麪 <small>各一</small> 硃砂 <small>二錢留</small> 半為衣</p> <p>明雄黃 <small>兩半</small></p>	<p>右為細末滴水為丸如大豆子大硃砂為衣每服一丸未發前如夜向北斗新汲水下忌熱物食一時辰小兒黃米大忌葷腥酒菓硬物凡治瘧病但熱不寒者勿服只先可以白虎加桂湯三服而愈</p>	<p>不二散 治瘧疾</p>	<p>紫河車 <small>二錢</small> 菘豆粉 <small>兩半</small> 甘草 <small>一錢</small> 薄荷 <small>二錢</small> 信 <small>一錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右一處為末星月上時用無根井水調大人一錢小兒半錢忌毒物</p>	<p>一字散 治男子婦人小兒日近瘧疾寒熱或隔日發於未發日臨夜服朝日發於未發時臨卧服大人作一服小兒作二服先淨手然後安藥在手心內用新汲水三點調藥舌頭舐喫了便睡</p>	<p>管仲 <small>一兩</small> 半 黑豆 <small>一兩</small> 半 甘草 <small>兩半</small> 菘豆 <small>一兩</small> 半 信 <small>七錢</small></p>	<p>右為細末每服抄一字依先服之</p>
---	---	----------------	--	-----------------------	-----------------------------------	---	--	----------------------



恒山散

出經效
濟世方

治瘧疾

真恒山 乾青蒿 烏梅 赤芍藥 甘草

炙

右等分為末每服五錢水一盞半煎至八分去滓露
一宿以刀一柄置所露盞上於發日五更服如虛日

溫過

白虎加桂湯 治瘧疾必多於熱方

見本門
瘴瘧類

鼈甲散 治瘧疾此病之候乃有類種亦有宿患瘵癖

飲食失宜因節氣初交亦生此病亦有痰癖積聚久

欽定四庫全書

普濟方

不通散冷熱相攻亦生此疾亦有地居卑濕或時屬

暑熱內有宿病外感惡氣亦生此疾亦有盛夏蒸熱

飲冷冷熱間隔秋夏氣交亦生此疾以要言之終有

飲食失常寒暑忤宜上熱下擊將療之方吐下為本

人有強羸病有輕重自須臨時斟酌不可一槩言之

此病之始與天行不多別有頭痛骨肉酸楚手足逆

冷口鼻喉舌乾好飲水毛聳腰脊強欲反拘小便赤

但先寒後熱發作有時可不省察其發作日有準凡



經七日以後先服此藥取快吐

鼈甲三兩 恒山二兩 甘草二兩 松蘿二兩 桂心二兩

右為散煮烏梅湯下初服一方寸日二服稍加以得吐為限忌葑苽生葱生菜海藻菘菜

當歸散 治瘧又審自候若體力全強日再服每服皆

取吐自覺氣力不甚強則每服取吐後不須服如全未愈必須取吐則三兩日一服經五六度吐訖但適寒溫將息并飲食使體漸強若知病雖輕而氣力尚

欽定四庫全書

普濟方

覺強盛不妨用此以減病勢宜合服之取利

當歸五兩 白朮五兩 細辛四兩 桂心三兩 大黃五兩 朴硝四兩

右為散平旦空肚以酒飲下初服一方寸日再服稍加之得利為度候氣力強羸取利多少亦忌桃李雀肉生葱生菜

鬼箭羽丸 治瘧又依前鼈甲散取吐當歸散利後雖

經吐下病源尚在如更吐利又慮虺羸宜合服之

細辛四兩 橘紅四兩 鬼箭羽拆者如金 白朮五兩 桂心四兩



葱	良以任食粥三兩口壓之忌海藻菘菜桃李雀肉生	再稍加三十九丸服經三五日後若覺熱上每服藥後	右搗篩蜜丸如梧子大煮烏梅飲下之初服十五丸	地骨皮 <small>四兩</small> 蜀漆 <small>二兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 當歸 <small>五兩</small> 丁香 <small>三兩</small>
療癰丸	出肘後方	恒山 <small>三兩</small> 甘草 <small>二分</small> 知母 <small>四分</small>	右搗篩蜜和丸如梧子大未發前服十五丸臨發服	欽定四庫全書 普濟方
小柴胡加桂湯	出醫方集成	治瘧疾先寒後熱兼治之	減七八丸後五六丸即瘥	十五丸得快吐則愈忌海藻菘菜生菜又次服
柴胡 <small>八兩</small> 桂 <small>皮去粗</small> 人參甘草 <small>炙</small> 半夏 <small>洗七次切</small> 黃芩 <small>各三</small>	兩	右剉如麻豆每服抄五錢水一盞半薑七片棗二枚煎至八分去滓取六分清汁溫服日三夜二若湯者去半夏加人參括蕪根同煎服一方加芍藥		



桂枝羌活湯

出醫方大成

治瘧疾處暑前發頭疼項強脉

浮惡寒有汗

桂枝 羌活 防風

甘草

各半兩

右為粗末每服半兩水盞半煎至一盞溫服迎發而

服之如吐者加半夏麴等分

桂枝石膏湯

出濟生拔萃方

治瘧先寒後熱熱多寒少

桂枝 石膏

知母

各兩半 黃芩

一兩

右為末分三服每服水一盞同煎服間日者邪氣所

欽定四庫全書

普濟方

合深也

加減四逆湯

治瘧疾瀉痢並作合潮者非時邪疫之

氣流運之所變之致也春傷於風夏生飧泄夏傷於

暑秋必病瘧須傷寒溫瘧流變法中主之

柴胡 芍藥

甘草

枳實

麵炒黃各等分

小便澁加茯苓 痢後重加薤白十寸

右咬咀每服五錢水二盞粟米一捻煎至一盞去滓

溫服脇熱利不止一方用葛根黃連黃芩湯若同雜



病治利之方以熱藥治之反致夭殃傷人甚衆

麻黃羌活湯 治瘧病頭痛項強脉浮惡風無汗者

麻黃去節羌活 防風 甘草各半兩

右為粗末水煎如吐加半夏麴等分

節金飲子 治瘧疾寒熱愈後調理脾胃

厚朴去皮薑汁炙 蒼木浸 甘草炙各三分 陳皮去白炒黃色半

右咬咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎服一方

加草菓倍用蒼朮名草菓平胃散

欽定四庫全書

普濟方

黑虎散 治瘧

片子薑黃 良薑 乾薑各一兩 巴豆三十粒新者二十五去殼

右將上三藥剉如巴豆一處炒令焦黑豆色去巴豆

不用將餘藥為細末每服三錢於未發前一時辰熱

酒調下臨發時再進一服炒藥須是焦黑生即令人

瀉

四將軍飲 治瘧作時仆厥手足俱冷昏不知人一時

救急用之有驗撼掖不醒是中心抑鬱陰陽交戰所



致先依灸法見發仍服此藥

附子

一兩泡
去皮

訶子

四箇
去核

陳皮

四箇全
者洗

甘草

四寸
炙

右為剉散每服四錢水二鍾薑七片棗七枚煎至七分服昔有人與客聚話之際瘧作而仆厥手足俱冷昏不知人盡室駭懼客曰無傷正四將軍飲證也先令灼艾灸至四百壯了無蘇意於是急製前藥初一盃灌之不納至再稍若吞嚥三則倏起坐四服盡頓愈更不復發一時救急有驗凡病臨發前逐杯併服

欽定四庫全書

普濟方

無不神效

如聖飲 治瘧及有孕婦人患者無不愈

甘草

炙

柴胡

去苗

常山

烏梅

烏梅

各等分

右剉碎用銀器或砂石銚當發日絕早以好酒二升慢火熬至一盞瀘出滓放溫作一服飲盡良久吐涎即愈如尚覺有寒氣未退候五七日再服

溫脾散 治瘧發熱不退

紫河車

菘豆

各一兩

甘草

半兩

砒

一錢半
別研



右為細末後入砒研勻每服半錢新汲水半盞調如 是隔日發直待臨睡服藥如頻日發只夜深服忌葷 酒魚兔等物衛生寶鑑方羅謙甫云如受得寒邪氣 深只一服便定如十歲以上服一字十歲以下至五 三歲用水少許服半字婦人有胎不可服但合此藥 與人服並不吐親用此藥三五十年救人甚多雖砒 一味大熱有毒紫河車甘草菘豆三味性涼解得假令 新汲水亦解得金液丹用硫黃小兒紫霜丸用巴豆杏仁本	欽定四庫全書	普濟方
草云巴豆杏仁有大毒有小毒製了服之皆有效小 兒亦可服恐人不合此藥故論及此一方滴水為丸 水服名溫脾丸		
常山大黃湯 瘧結實積熱煩擾逆胃寒熱但多綿懈 困篤		
常山 甘草 <small>炙</small> 前胡 大黃 <small>各三兩</small>		
右切以水一斗煮取三升半下大黃煎取三升分澄 令冷初服七合中服八合比欲發服九合忌海藻菘		



菜生葱菜

豉心丸 療瘧

香豉 五合 熬 常山 三兩 大黃 三分 附子 三分 炮

右搗篩蜜和丸如豆大服十丸勿食物比至發時令

服三十九瘧不止亦可至四十九瘧必止若膈上有

停痰欲吐聽之若腹中實欲下亦無妨忌生葱菜等

物

常山檳榔飲 治瘧

欽定四庫全書

普濟方

常山 一丈 檳榔 一筒 草菓 半筒 甘草 三寸

右水一盞半酒半盞或加烏梅一箇煎至八分濾滓

碗盛紗罩露過臨發日五更面北溫服

神聖藥師餅 治瘧疾等證

人言 錢半 雄黃 錢半 白麵 七錢半 乾胭脂

右各研極細滴水丸為餅子如棊子大每服三餅臨

卧細嚼冷水送下忌濕面葷腥生硬冷物生作三十

服虛實大小加減服之計九十餅



仙靈散 治瘧疾

常山 二錢 甘草 半錢 檳榔 二筒 黑豆 九粒 四十

右為末先用酒一小盞煎乾後用水大盞煎八分露一宿早晨溫服雞魚忌吐不妨

麝香丸 治一切瘧疾

梟黃 一兩 黃丹 一兩 硃砂 半兩 麝香 半兩

右細研用粟米和丸如菘豆大陰乾當發日早晨以溫茶下五丸即吐痰水惡涎吐後過時煮菘豆粥服

欽定四庫全書

普濟方

之孕婦勿服

胡粉丸 治一切瘧

豉 一分 研如膏 黃丹 半兩 胡粉 半兩 砒霜 一分

右同研令細以軟飯并豉膏同丸如梧桐子大臨發前以冷醋湯下三丸忌食熱物

硫黃丸 治一切瘧疾

砒霜 半兩 硫黃 半兩 雄黃 半兩 雌黃 半兩

右研細於銚鍋內先布鹽末於中節下諸藥於鹽上



以瓷碗盖用六一泥封勿洩氣以灰火三斤養半日
候冷以甘草湯煮半日出火細研用飯和丸如菘豆
大大人患醋湯服三丸青帶繫三丸於臂上男左女
右小兒服一丸繫一丸

牡蠣湯 治牡瘡者多寒

牡蠣 麻黃 各四兩 蜀漆 三兩無常山代 甘草 二兩

右先洗漆三過去腥呔咀以水八升煮蜀漆麻黃得
六升去沫內餘藥煮取二升飲一升即吐之復飲

欽定四庫全書

普濟方

麻黃湯 專治瘧瀕發汗

麻黃 括蕒根 大黃 各四兩 甘草 一兩

右呔咀以水七升煮取二升半分三服未發前食頃
一服臨發一服服後厚覆取汗

斷魔如聖丹 治瘧疾

信 一錢 蜘蛛 大者三枚 雄黑豆 四十九粒

右為末同研細滴水丸如菀豆大來日今夜北斗下
獻早晨紙裹一丸塞耳中一粒可治三人立愈如聖



神	白芷湯 治瘧身熱目疼熱多寒少脉長睡卧不安先 以大柴胡湯下之微利為度如下過愈邪不盡當服 此以盡其邪	白芷 知母 <small>一兩 七錢</small> 石膏 <small>四錢</small>	右為末水煎	地黄丸 治一切瘧疾	地黄汁 <small>一斤</small> 砒霜 <small>研半斤</small> 蠟 <small>少許</small>	欽定四庫全書 普濟方	右將地黄汁於磁器中煖候沸入砒霜不住手攪煎 令稠次入蠟相和丸如菉豆大每發時井花水下一 丸未瘥發前更一丸忌熱物	麻黃白朮湯 治感風發瘧	麻黃 <small>去蘆</small> 官桂 青皮 陳皮 川芎 半夏 麩	白芷 紫蘇 茯苓 白朮 桔梗 甘草 <small>炙各 等分</small>	細辛 檳榔	右剉為細末每服三錢水二盞生薑四片棗二枚煎
---	--	---	-------	-----------	---	---------------	---	-------------	---------------------------------------	--	-------	----------------------



至八分去滓空心服

大黃丸 治一切瘧

大黃 二兩 巴豆 一兩 去皮熬令
黑色研如泥 朴硝

右搗篩大黃巴豆然後內巴豆以蜜搗二千杵丸如

梧桐子大米飲下二丸二服不斷再服忌蘆笋野猪

肉等物

桃仁常山丸 療一切瘧疾

桃仁 二兩 生用 常山 二兩 豆豉 三兩

欽定四庫全書

普濟方

右各搗五六百杵又和搗六七百杵後點好酒如黑

泥自成丸不飲酒者少酒下三十丸如梧子大未發

前服臨發更服三十丸以手捧之於鼻下嗅取氣便

定如不得平復更服三十丸或吐或微利亦有不吐

利瘧者吐了不得嗽口不得吃生葱菜菓甜物油膩

等若已瘧而忽又發者不過再三服瘧或一服瘧者

其常山蜀者桃仁須要毛桃仁豉須新美者如渴取

烏梅三枚作漿稍咽三五口其藥味一人患則少合



不堪預合以則無力不効

巴豆丸 治瘧疾

巴豆 一枚去心皮 射 如巴豆大棗去皮

右各搗成丸如梧子大先熱發各服一丸

如聖散 治瘧疾 一名辰砂丹

人言 雄黃 黃丹 各等分

右為末每服一字早晨空心服一方用雄黑豆九十

八粒水浸一宿去皮同藥搗為丸分作二十六丸硃

欽定四庫全書

普濟方

砂為衣發時新汲水面東服一丸忌雞猪魚兔等物

砒霜丸 治一切瘧疾

砒霜 一分細研 桃仁 半兩湯浸去皮尖雙仁 豉 半兩炒乾

右為末入砒霜以軟飯和丸如梧桐子大臨發前以

冷生薑湯下三丸忌食熱物

蜀漆散 治瘧多寒者牡瘧也

蜀漆 雲母 龍骨 各等分

右搗篩為末未發之時先以酸漿服半錢臨發服一



錢溫瘧者加搗蜀漆半錢雲母取火燒三日三夜一方不用雲母用雲實

白扁豆丸 治瘧疾

白扁豆 炒一兩 菘豆 炒一兩 好信 五錢 醋煮

右為末入白麵四兩水和丸如梧子大臨發日五更用涼水送下忌熱物

白薑散 治瘧疾

白薑 良薑 半生半熟 各半兩 穿山甲 三錢 炮

欽定四庫全書

普濟方

右為末每服二錢猪腎酒調下

治瘧無問新久方

鼠尾子 車前子 各一虎口

右咬咀以水五升煮取二升未發前服盡

勝金散 治一切瘧病發作有時蓋因外邪密於臟腑

生冷之物內傷脾外或先寒後熱或後寒先熱或寒

多熱少或寒少熱多或但寒不熱或但熱不寒或連

日併發或間日而發或發後三五日再發寒則肢體



顫掉熱則舉身如火頭疼惡心煩渴引飲氣息喘急
口乾咽苦背脊痠痛或痰聚胸中煩滿欲嘔腸鳴腹
痛並皆治之

檳榔

常山

酒浸蒸
焙一斤

右為末水麵糊為丸如梧子大每服三十九丸於發前
一夜時臨卧用冷酒下便睡不得食熱物茶湯之類
至四更盡再用冷酒下十五丸忌食一切熱羹湯粥
食下間可食溫粥至晚方可食熱忌一切生冷魚腥
等物數日如夜發者却於當晨午後二次依前服之
一方用鷄子清為丸

欽定四庫全書

普濟方

常山丸

常山

十六兩
為末

鷄卵

十五
隻

右用鷄卵清和末為丸治證服餌一如前法名勝金
丸同常山一兩半酒煮焙末鷄子清蜜一匙米糊丸
每服十五丸酒送下

瘧神丹

治諸般瘧疾



<p>信砒<small>一兩</small>雄黃<small>一錢</small></p>	<p>右以五月五日用糴子尖左右三千下日未出不令雞犬婦人見丸如桐子大未發前一日面東冷水下一丸</p>	<p>紅散子 治瘡須當發日早晨服</p>	<p>黃丹<small>炒色</small>建茶<small>各等分</small></p>	<p>右各和二錢白湯調下或溫酒調下入茶</p>	<p>瘡丹</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>雄黑豆<small>四十九粒</small>重午日井水浸次<small>日取起去皮我乾研為膏</small>真砒<small>一錢</small>研<small>細入豆</small></p>	<p>膏內 研勻</p>	<p>右五月五日午時丸如菘豆大控乾辰砂為衣密器封之發日空心井花水下一丸忌見雞犬若女人病令女閉目男送入口忌食熱一日孕婦不得服於發日以絳錦繫一丸於右臂上小兒不得吞隨男左女右以繫之一方用雄黃為衣一法以醋煎黑豆</p>	<p>膽仰丸 治一切瘡疾</p>
---	---	----------------------	--	-------------------------	-----------	-----------------------	---	------------------	---	------------------



吐即止	右為細末米飲調下二錢先喫少飲食了歇定服微	白附子 陳皮 <small>去白各等分</small>	治瘧疾方 <small>出百一選方</small>	右水煎空心服	恒山 <small>二兩水 煮曝乾</small> 甘草 <small>一兩半</small>	恒山散 <small>出楊氏家藏方</small> 吐瘧	右為末欲發前男左女右鼻內搗一豆許	瓜蒂 <small>一片瓦 上焙乾</small> 穿山甲	瓜蒂散 <small>出仁存方</small> 治瘧疾	桂一兩末和勻每服二錢發前酒調下	五月五日天未明時採青蒿陰乾後日晒為末四兩	截瘧方 <small>出仁存</small>	更時再服三十九丸忌熱物	右為末薄糊為丸如梧子大臨卧冷酒下四十九丸	常山 <small>四兩 二兩各 燒存性</small> 草薺
-----	----------------------	--------------------------------	------------------------------	--------	---	---------------------------------	------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------	----------------------	---------------------------	-------------	----------------------	--



怯邪丹

出百一
選方

治瘧

五月初四日揀黑豆冷水浸至端午日早用好砒霜一兩一順手研極細入生黃丹二兩相和取黑豆去皮細研成膏和藥丸時便分大小丸了用硃砂為衣當發日五更初井花水送下一丸忌熱物半日次忌魚菜油膩腥冷等物不禁冷水老弱孕婦不可服藥分十數等丸大者如桐子止

治瘧方

出直
指方

欽定四庫全書

普濟方

用二陳湯二貼加恒山二錢分作兩服每服薑七片棗二枚烏梅二枚水一碗煎至六分候微溫冷吞脾積丸七丸次日吞三丸

治瘧疾如神方

出經驗
良方

黃丹

大蒜

小者
亦可

右二味先將大蒜搗碎後入黃丹為丸朝東吞一方去熱蒜皮再入大蒜五箇入辰砂一錢宿蒸餅丸如梧桐子大空心井花水一九十歲以下丸如麻子大



忌生冷油膩熱湯合藥宜端午日

神聖丹 出聖
惠方 治瘧疾

用大蒜一頭分開四片內巴豆肉一粒濕紙裹煨熟
去巴豆入黃丹為丸如雞頭大每服一丸先發寒用
東南桃枝七寸煎湯發日五更面北服如發熱用冷
水送下未全安次發又可進一服

鬼哭丹 出本
事方 治瘧疾不問一日一發間日一發或三日

者多寒少寒多熱少熱頭疼渴欲飲冷者

欽定四庫全書

普濟方

人言 一錢
研末 新菘豆 一兩
為末

二味攪勻以無根水搜為一丸如皂莢子大却將黃
丹為衣陰乾小兒丸如菘豆大臨發日五更用桃柳
枝露水送下忌熱物半日

神惠方 出經
良方 治瘧

青蒿葉 端午日
採陰乾 香薷 各等
分

右為細末如先寒用酒熱服先熱用冷酒服遇發日
五更早服宜至誠齋戒忌雞魚麪生物



治瘧方 出肘後方

用桃仁一百箇去皮尖於乳鉢中細研成膏不得犯生水候成膏入黃丹三錢如梧子大每服三丸當發日面東溫酒吞下如不飲酒并花水下亦得五月五日午時合鷄犬婦人忌見

治瘧不痊方 出朱氏傳濟方

乾薑 高良薑

右等分為末每服一錢水一鍾煎至七分服一方炒

欽定四庫全書

普濟方

令黑色為末發時調服

治瘧 出十便良方

用麝香少許研黑書額上去邪辟魔

硃砂丸 出聖惠方 療一切瘧

硃砂 一兩 蜀常山 三兩並須精上大秤

右各搗篩畢別取硃砂瓷器中研細可一日研如麵煉蜜和童便搗計一萬七千杵訖作丸如梧桐子大一服三丸清酒下行五十餘步隨意坐卧無酒飲下



亦得唯須得暖將息病人氣力強仍不廢行動者則
須於當發日服之如似日西發者臨發之日勿食平
旦服三丸巳時服三丸午時服三丸則瘥若不瘥必
定輕微更服則瘥餘時發者準皆服之時任意消息
其病人氣微弱者不得臨發日服應預前一日服之
如似明日發者今日平旦空腹服三丸至齋時食一
碗粥至日四更服三丸至日暮復食一碗淡粥並不
得飽食至一更盡服三丸至平明食一碗粥至齋前

欽定四庫全書

普濟方

更進三丸不得食至午時更進三丸必瘥瘥後三日
以來唯得食甜粥飲漿忌生冷腥滑膩麵及飽食七
日以來特忌生血物生葱菜若謂愈已七日漸食生
冷二種瘥必復發不若于患瘥以後還須百日禁忌
生冷乃為萬無一失倘不自愛惜致復發不可救者
多矣但得百來日禁生冷過百日後得食無妨此在
患者自己鄭重耳日久極重者不過十服瘥重者三
五服則瘥病人五十以上者一服三五十九以下者



又方 後出 方肘	大一服用一丸	用皂莢三兩去皮炙巴豆二兩去心皮搗丸如大豆	又方 後出 方肘	一丸	用鼠婦豆豉二枚合搗令相和未發時二丸欲發時	治病瘡方 後出 方肘	散二錢入草菓一枚水二盞同煎七分去滓通口服	欽定四庫全書 普濟方	用草菓子以麪裹煨香熟取麪并皮爛槌碎每平胃	治瘡自汗不止者 出經 濟世 方効	東取氣一口以井花水吞下一丸默想藥至丹田	右為末和勻以半夏麪末為糊丸如桐子大發日面	附子 一兩炮 去皮炙 硃砂 兩半	既濟丹 出經 濟世 方効	治瘡	者分此一丸作二丸服之或米飲下	七歲以上者一服三丸七歲以下者一服 丸如小
----------------	--------	----------------------	----------------	----	----------------------	------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------------	---------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	----	----------------	----------------------



用恒山三兩秋米三百粒以水六升煮取三升分之
服至發時令盡

又方 出肘
後方

用鼠婦兔子四枚各一以糝糖裹之丸服

治瘧症方 出肘
後方

用黃丹新瓦焙乾麪糊為丸如桐子大棗一枚去核

放藥在內用草紙包煨服

治一切瘧方 出聖
惠方

欽定四庫全書

普濟方

用硫黃半兩細研取五月五日午時爛嚼四十九粒

鼓和津唾於砒針內兼吸取日光吐入藥中和研為

丸如菘豆大當發日空心并花水下一丸忌食熱物

一方煉蜜丸用溫鼓湯下醋浸鼓一宿搗為丸以葱

酒下亦可

瘧丹 出朱氏
集驗方 治瘧疾

茶 一錢或
臘茶 硫黃 一錢

右發日早起服或寒多加硫黃少許熱多加臘茶少



許臨發時冷水調下甚者兩服即愈用之屢驗	奪命丹 <small>出經驗良方</small> 治寒瘧	常山 <small>一兩細研對先炒次用</small> 前胡 <small>半兩同炒各為末</small>	右酒糊為丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下三服	治諸瘧無問新久方 <small>出三因方</small>	取黃丹不拘多少於五月五日用獨頭蒜煨熟研細	搜丸如梧桐子大每服五丸當發前一食頃桃柳枝煎湯送下	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	白蜜湯 <small>出千金方</small> 治瘧無問新久方 <small>方見本門瘴瘧類</small>	鬼哭散 <small>出聖惠方</small> 治瘧疾 <small>方見本門瘴瘧類</small>	治瘧無問新久者	取馬鞭草汁五合酒三合分三服	又方 <small>出千金方</small>	取瓜蒂二七枚搗水漬一宿服之吐即効	又方 <small>出千金方</small>	以七月上寅日採花為末酒服一方寸
--------------------	------------------------------	---	-----------------------	------------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	--	--	---------	---------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------



又方 <small>出千 金方</small>	八月上寅日採麻花故鞋底去兩頭燒作灰井花水服之
又方 <small>出千 金方</small>	服翹搖汁
又方 <small>出千 金方</small>	取桃花末水服一方寸日三服
又方	
欽定四庫全書	
普濟方	
如合時具冠帶向神堂前旋看咒曰弟子不為自身為取白殭蚕一箇直者切作七段用綿裹定撚為丸硃砂為衣作一服日未出面向東左手掐寅文用桃柳枝煎湯送下	
縛瘡方	
用石龍芮葉小者皆得搗細一指大男左女右於掌中後紋橫二寸當中用一銅錢在上安藥在錢孔中以油紙蓋白緊縛定發日早晨未發時先縛	



治瘡方

用狗蠅一隻去翅足以蠟丸之當發日冷酒吞下

露星散 治瘡

取常山一味細剉每用五錢半酒半水煎去滓於當

空以薄綿封蓋碗露至天明時取盪溫服些少嘔瀉

無妨

治瘡方

以蛇蛻皮於發瘡之日塞兩耳臨發又以手指少許

欽定四庫全書

普濟方

却鹽醋汁服之令吐痰

又方

用常山三兩切以漿水三升浸濕一宿煎取一升欲

發前頓服然後微吐一方直於中庭上安刀一柄至

明煎分為二服空心一服發時一服酒浸二三日服

之佳

又方

用乾薑炒令黑色搗末臨發時以溫酒調三錢服發



則再服之

又方

用蒴藿一大把炙令黃色以水濃煎一盞欲發前服

治五癰方

用夜明砂搗為末每服一錢用冷茶調下

療諸癰方

取青蒿一把水一升漬絞取汁盡服之

牛膝酒 治癰疾

欽定四庫全書

普濟方

用牛膝莖葉一把切以酒三升漬一宿分三服令微
有酒氣不即斷更作不過三服止

黃連散 療溫癰痰癰久不瘥

用宣州黃連一兩搗篩為末以濃酒一盞調三錢空
心頓服相次更服三錢更飲三兩盞酒任意醉却睡
過時方得食如渴枳實煎湯併三日服瘥忌猪肉冷
水

治癰疾方



用獨蒜於白灰上燒之末服一方寸 又方	豉用多煮湯飲數升令得大吐便瘥 龍華散 治諸瘧疾	用蛇蛻皮一條或三五條用著捲灰火燒存性為末 每服一字無根水下未發前一時服忌鷄魚冷物一 方用生皮塞耳臨發服少許鹽醋令吐	治諸瘧疾	欽定四庫全書 普濟方	用天靈蓋不拘多少煨過為末每服一字水調服 又方	用蒼耳用水播濾研發日前服冬用根實預收葉陰 乾亦可	治瘧疾方	取赤脚馬藺研細真汁加水少許調臨發日早服須 用無根水取調着沙糖少許在中	又方
----------------------	----------------------------	---	------	---------------	---------------------------	-----------------------------	------	---------------------------------------	----



用竹紙包犬毛燒過為白湯送下
又方

取鷲屎一方寸令患者發日平旦和酒服及使病人
兩手捧碗當鼻下承取氣忌一切食毒瘡後未得飲
水

治瘡方

用火麻葉不問榮枯入鍋內文武火慢慢炒香連鍋
取下以紙蓋其上令出汗盡然後碾為細末臨發時

欽定四庫全書

普濟方

以前兩時辰用茶湯或溫酒濃調下移患人原睡處
其狀如醉醒即愈矣 前項火麻葉依前法為末加
入碯砂丁香木香陳皮為末比麻葉分兩減半酒糊
為丸蜜丸亦可常以茶酒送下五七丸能治諸疾壯
元氣又方加蛇床子兔絲子同頭酒帶浮子者浸之
入飯甑蒸二七次新瓦文武火焙乾為末入前藥內
酒糊丸如桐子大以少漸加至五十九丸常常服助陽
壯氣去風空心溫酒下



加減清脾湯 治瘧疾

用小柴胡湯合和養胃湯加生薑桃柳枝地骨皮紅棗煎多服取效若寒多熱少多用養胃湯熱多寒少多用柴胡湯寒熱均者別平

療十二瘧 昔黃帝問岐伯曰瘧多方少愈者何岐伯答曰瘧有十二種帝曰瘧鬼字何可得聞乎岐伯曰但得瘧鬼字便愈不得其字百方不愈曰願聞之

寅時發者獄死鬼所為療之以瘧人着窰土灰木一

欽定四庫全書

普濟方

周莫令火滅即瘧卯時發者鞭死鬼所為療之用五色衣燒灰三指撮諸酒中無酒用清水服之辰時發者墮木死鬼所為療之令瘧人上木高危處以棗子塞木竒間巳時發者燒死鬼所為療之令瘧人坐篩以圍匝燃火

右麤搗篩每服五錢水一盞煎至七分去滓食後溫服

凌馬黃第二十五



病人眼黃面赤狂言為詈努目高肩起卧不安發作狂
走先烙髮際次烙風門上皖關元又烙下廉并兩手足
心即瘥更宜服

竹葉湯

出聖濟
總錄

竹葉 細切 小麥 二合 生薑 兩切一 白馬通 新者收搗汁

右用水三盞先煮麥取二盞去麥下竹葉生薑煎至
一盞半去入白馬通汁一合和勻分溫二服

方黃第二十六

欽定四庫全書

普濟方

病人身體沉重狀似着熱不得睡卧小便黃色眼赤如
朱心下堆起狀若癡人如此證候十無一生先加上皖
及心愈次烙舌下灸關元下廉百壯宜服

燒衣灰方

出聖濟
總錄

取婦人肉衣燒灰細研每服二錢溫酒調下

黑黃第二十七

病人身面黑黃口唇兩頰上有青脉起出於口角者十
無一生亦有脉息沉細食喫不妨身如土色宜先烙口



中黑脉次烙一會穴又烙玉泉足陽明穴章門穴及下
廉不差宜服後

鬼白方 出聖濟
總錄

用生鬼白一兩搗絞取汁一小盞服之即瘥如無生
鬼白即用乾者搗為末每服二錢以新汲水調下不
拘時

厭黃第二十八

病人四肢煩疼手足無力吐逆不下飲食漸漸瘦弱先

欽定四庫全書

普濟方

烙玉泉及灸三十壯次烙口中黑并曲池灸裏廉後心

百壯如未瘥宜服

大黃湯 出聖濟
總錄

大黃 剉炒 木香 枳殼 去白麩炒
各一兩

右麤搗篩每服五錢水一盞米煎至七分去滓食前

溫服

水黃第二十九

水黃之狀面目俱青狂言妄語聲不出先烙關元次烙



下賺百會髮際不瘥灸後心氣海百壯及宜服

大黃甘草湯 出聖濟
總錄

大黃 剉 甘草 灸各
半兩

右剉如麻豆大分為二服每服水一盞煎至六分去

滓食後溫服

又方 出聖濟
總錄

乾木瓜 一兩 芥子 半 陳橘皮 湯浸半兩
去白切炒

右剉如麻豆大作三服每服水一盞半煎八分食前

欽定四庫全書 普濟方

溫服

瓜黃第三十

瓜黃之病口苦舌乾身體急強面目俱黃行履不得言

語狂亂四肢疼痛發即便走宜先烙後心次烙氣海次

陽明足烙百會灸五心穴各二七壯如未瘥宜服

瓜蒂散 出聖濟
總錄

用瓜蒂一兩為末每服半錢以新汲水調下不拘時

以吐利為度



腸黃第三十一

治腸黃心中悶絕腸內□痛狀如刀刺先烙大腸俞次
烙小腸俞氣海如未瘥宜服

四味黃芩湯

出聖濟
總錄

黃芩

去黑
心

當歸

各一
兩

黑豆

半
合

茅根

半
兩

右各細剉作三服每服水一盞半煎八分去滓食前
溫服

犢黃第三十二

欽定四庫全書

普濟方

治犢黃舌兩邊先從後起次生向前兩傍有赤脉壯如
蚯蚓宜急各斷毒貫舌其狀紫色次灸兩口角及水人

中承漿各二十壯

出聖濟
總錄

氣黃第三十三

治氣黃先從脚膝浮腫大小便難心寒顫掉宜烙百會
及兩口角次灸中腕穴二七壯此黃亦令人多笑七日

堪治八日病過不治

出聖濟
總錄

猪黃第三十四



治猪黃口嚼涎從口角出九日可治十日病勢已過宜不可治也芳闕二七壯次灸承漿二七壯	<small>出聖濟總錄</small>
土黃第三十五	
治土黃身體冷面色青宜灸大衝及百會後心髮際數壯若面目及十指俱青不治也	<small>出聖濟總錄</small>
調大人每服只用一字錢小兒每服半字錢臨發日服之更請莫喫熱物只用溫湯淘飯止飢粥食一列放冷恐熱觸犯藥性	
真實藥料至誠脩合過五六服自然而愈後服	
欽定四庫全書	
普濟方	
草菓	
半夏	<small>湯泡七次</small>
製厚朴	
青皮	
良薑	<small>壁土炒</small>
甘	
草	
右等分咬咀每服三錢水一盞烏梅煎空心服	
斬邪丹	<small>出宣明論</small>
治諸般癰疾無時不止者	
菘苳	
小豆	<small>三十粒退皮再入</small>
硃砂	
信砒	<small>各一錢</small>
右為末同研細滴水丸勻分作十丸每服一丸早晨服夜間於北斗下香水厭至早晨用新倒流水下	
露星散	<small>出朱氏集驗方</small>
治癰真方天下無二	



聖餅子 <small>出楊氏家藏方</small> 治一切瘧疾	右咬咀每服四錢半半水酒生薑一塊烏梅一枚煎未發前服再發再服不過三服愈	草菓飲子 <small>出朱氏集驗方</small> 療實瘧	常山 <small>各一兩</small> 柴胡 <small>各一兩</small> 甘草 <small>各半兩</small> 檳榔 <small>各半兩</small> 白薑 <small>七錢</small> 烏梅	加官桂川薑去青皮如嘔吐加丁香附子去半夏木香	欽定四庫全書 普濟方	前再煎服如熱多寒少加柴胡去半夏如寒多熱少	滓煎至七八分去滓空心通口服滓再煎下於未發入酒一呷同煎五沸和滓露一宿至天明取入再同	右咬咀每服五錢水二盞薑五片烏梅棗子各二枚	陳皮 <small>六兩</small> 蒼朮 <small>四兩</small> 米泔水內入生甘草 <small>三兩</small> 厚朴 <small>以</small>	壁土生薑二片酒一盞和水五 草菓 <small>三兩</small> 木香 <small>檳</small>	生薑 <small>湯泡</small> 砂仁 <small>七次</small> 青皮 <small>二兩</small> 去穢剉碎以 巴豆 <small>三四粒</small> 去皮	膜錦穿定子青皮內 炒巴豆黑去皮豆
---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------	---------------	----------------------	--	----------------------	---	---	--	---------------------



黃丹 火飛過研
細一錢

寒水石 研細
一錢

右件同研細用末入油穰餅子劑如櫻桃大二十塊
搜藥令勻却分作二十餅子用炭火燒茶煎煉麻油
漆熟每服一餅臨卧細嚼冷茶清送下忌熱物一時
辰如隔日發即於不發日臨卧服次日毒發一次即
愈合時忌婦人猫犬見

截瘡散 出澹
療方

常山 雞骨樣
者良 茯神 去皮
木 肉桂 去麤皮
等分 甘草 減半熱
多加之

欽定四庫全書

普濟方

右石槌不犯鉄器也為粗散每服半兩用常酒大半
碗浸一宿於當發時早晨空心去滓冷服服後未須
食熱湯滓再浸或略煎近發時再服一方不用肉桂
茯神却用檳榔烏梅要之在人增損也凡瘡須是發
作三五次後截之為妙

治瘡以馬鞭草莖葉煎一盞露一宿早服寒多加薑汁

出永類
鈴方

紅散子 須當發日早晨服 出三
因方



黃連 炒色 變

右入好建茶合和二錢以白湯調下或溫酒調不入

茶

杏仁膏 出十便 良方 治積年酒瘡并主面上風瘡方

硫黃 研細 為上淘去泥土 杏仁 去皮尖 研如膏 木香

米粉

右件藥搗羅為末入杏仁米粉硫黃都研令勻以膽

汁面脂調如稀膏每夜欲卧時以淡漿水淨洗面拭

欽定四庫全書

普濟方

乾塗所患處平明即以溫水洗之溫癬以米泔洗藥

三五上瘡

瘡丹 出廣南四 時攝生論

砒霜 黃丹 砒黃 各一錢 阿魏 一皂子大 赤小豆 三十粒

豆豉 七箇 菘豆 五十粒 皂麪 三錢七分

右先洗豆軟後於乳鉢內爛研便入諸藥更研二三

十遍令勻旋滴水丸得為度每一料藥可以丸作五

十九以來臨欲發時猪肉湯下一粒



瘧丹

出廣南四時攝生論

雄黑豆

二百粒細小者是諸浸三日候軟爛研如粥砒霜一錢細研如麵

右合丸如梧桐子大取重五日合最好不及即四時

八節日皆可以硃砂為衣切須珍惜不可令師僧女

人雞犬貓兒見合成又須淨潔處功德堂收掌如有

患者不計年月只消兩丸其藥慎不可早服須候發

日晨取井花水面東吞下一丸訖更候將欲發時前

再用新汲水吞下一丸並不嚼破如女人患即令丈

欽定四庫全書

普濟方

夫與安藥口內吞之

常山飲

出鮑氏方

治諸瘧不問久近寒熱多少一服效

常山

真好者一兩半

川山甲

一兩一分

右散每服四錢怯弱人三錢當欲發五更酒水各一

盞煎一酒盞許溫服訖正臥勿動乃不吐以常山好

嘔故也是日即不發

青蒿散

出朱氏集驗方

治瘧

甘草

秦艽

柴胡

草薺子

青皮

常山



知母散	出朱氏 集驗方	治一切瘧疾不問先寒後熱先熱後寒
發又一丸立効		
為丸彈子大隔先一日塩湯下一丸臨發又一丸狂		
右各等分用白酒餅一箇小者兩箇同為細末生蜜		
北常山 草菓 甘草		
三虎丸	出朱氏 集驗方	治瘧疾
或十丸亦可愈度大槩積瘧有驗		
用蒜元酒餅子如梧桐子大每服一丸五更熱酒下		
蒜餅丸	出朱氏 集驗方	治瘧疾經驗
許薑棗半水半酒二盞同煎二盞去滓五更放冷服		
金不換正氣散	出朱氏 集驗方	治瘧疾經驗
一服半夜一服只是預先一夜一服		
水盞半入桃柳枝青蒿子加烏梅一枚煎八分放冷		
右以常山秦苳柴胡草菓子青皮甘草為末每服用		
檀榔 青蒿子 桃柳枝	各等分 各七寸	



多寒少寒多熱少熱久瘧者一服取効贛州羅監稅
傳方大有功效

知母真者貝母 常山 檳榔

右等分為呿咀酒水各一盞煎至一盞用綿蓋定露
一宿五更乘冷望東服值到巳時食乾物若吃水便
吐煎時不得婦人手

川烏散出朱氏集驗方治虛癰

大川烏 草薺子 乾薑 良薑各等分

欽定四庫全書

普濟方

右剉棗七枚薑七片煎服南康劉立之用之常服有
驗

檳榔散出朱氏集驗方治瘧疾不問寒熱無不愈之

檳榔 草薺子 烏梅各一箇 常山 柴胡 乾葛
厚朴 甘草

右先剉草薺子烏梅之外其餘五味只以檳榔為則
作一服常山多些少有熱多乾葛加些小生薑一大
塊擘破用大湯盞作酒一盞半於未發之間前一日



<p>煎取一盞半臨卧取一盞服之留滓半盞又添起水 酒共一盞半浸藥滓藥到天明再取一盞服之只可 作一服便愈好後却忌口三日方佳如熱多則加水 寒多則加酒直要慢火煎生則吐人</p>
<p>常山飲 <small>出朱氏 集驗方</small> 治瘧余嘗服之取効</p>
<p>常山 檳榔 烏梅 甘草 北柴胡 草薺子 各等分</p>
<p>右咬咀為末薑棗前一日煎下露一宿遇發日早晨 欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>温服仙授散加麻黃</p>
<p>蜀添湯 <small>出朱氏 集驗方</small> 治一切瘧疾</p>
<p>蜀添 <small>即常山子若 用葉尤佳</small> 桂心 甘草 茯苓 黃耆 <small>五兩</small></p>
<p>生地黄 <small>一箇</small> 知母 芍藥 <small>各二兩</small></p>
<p>右咬咀每服三錢水煎不拘時服此方出活人書治 婦人產後寒熱其狀似瘧相中名醫黃槐鄉用之治 瘧屢有功效</p>
<p>檳榔散 <small>出朱氏 集驗方</small> 治瘧疾</p>



大檳榔 <small>三箇</small> 常山 <small>一錢</small> 烏梅 <small>一箇</small> 鼈甲 <small>一錢</small>
右剉散雞鳴時一盃水一盃酒煎至半盃候十分冷服飯食茶湯亦要冷喫
加味生料五苓散 <small>出德生堂</small> 治陰陽不分發成瘧疾 <small>方見中暑門中</small>
類暑
加味小柴胡湯 <small>出德生堂</small> 治表裏不分發為瘧疾午後服
小柴胡 <small>五錢</small> 草菓 檳榔 加官桂 <small>各一錢</small> 夏月加香
蒿 <small>一錢</small>
欽定四庫全書
普濟方
右咬咀加本方修製每服水二盃生薑三片棗一枚同煎一盞去滓溫服滓再煎不拘時候
前瘧須進十餘服後於當發日隔夜煎下常山飲子露一宿五更向東方服之病人更八於其日潛至別處離家權避則病不復作却不可勞涉色慾損神防有復證先寒後熱寒多熱少脉弱而渴者柴胡桂薑湯主之用此而駢之不散薑附湯主之先熱後寒熱多寒少小柴胡湯主之用此而駢之不散竹葉石膏



主之如用常山飲怯瘧神應丸如服前藥未効再用	
川常山	<small>半斤好醋五升 早晨至晚焙乾</small>
右為末水糊丸梧桐子大每服二十九丸空心五更茶	
清吞下五十九丸早晨且休喫熱水吐人故也服五日	
即安	
大蒜平胃散	<small>出朱氏 集驗方</small>
治一切瘧	
平胃散一貼大蒜一箇搗爛用一大椀井水調蒜澄	
清以半調平胃散飲盡又以餘蒜水再飲用厚被蓋	
欽定四庫全書	
普濟方	
卧汗出即愈友人鄧羸叟再赴監試感此遇道人授	
此方服之遂安	
恒山湯	<small>出指 南方</small>
治瘧熱多宜發汗	
恒山	知母
甘草	<small>各二分</small>
麻黃	<small>一兩 去節</small>
右為麤末每服五錢水二盞煎一盞去滓服助以糜	
粥發汗後服藥	
括萋湯	<small>出指 南方</small>
治瘧	
柴胡	<small>八兩</small>
人參	
黃芩	
甘草	
括萋根	<small>各四兩</small>



右為末每服五錢水二盞薑五片棗一箇煎一盞去滓服	參附大正氣散 治男子婦人虛弱及瘧安後體虛如虛眼昏暗加淨枸杞子鍊菊花蕊各半兩常服順氣	快脾進美飲食	附子 <small>一箇炮 去皮臍</small> 人參 <small>去蘆不 用北參</small> 藿香葉 礞砂仁 檳榔 白朮 白茯苓 木香 <small>不見火</small> 益智仁 草菓	仁 <small>煨去 殼</small> 丁香 <small>不見火 各半兩</small> 陳皮 <small>去 白</small> 粉草 沉香 <small>不見火 半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	香附子 <small>炒去 毛</small> 肉桂 <small>不見火</small> 烏藥 <small>炒 黃</small> 枳殼 <small>麪炒 去穰</small> 青皮 <small>去 皮</small>	黃耆 <small>擘開 浸一宿</small> 厚朴 <small>薑製 各一兩</small>	右細末羅過每二錢水一盞薑三片棗一枚煎空心服	三虎丹 <small>出草 藏終方</small> 治瘧	辰砂 硫黃	右熱多加辰砂寒多加硫黃并研細棗肉為丸如龍眼大當發日新汲水七分一盞化下
------------------------	---	--------	--	---	------------	---	---	-----------------------	------------------------------	-------	------------------------------------



<p>通神丸 <small>出衛生家臂方</small> 治五種瘧疾熱多寒少諸瘧不効者</p>	<p>神桃 <small>二七個桃木上自乾經不落者</small> 黑豆 <small>一兩</small> 巴豆 <small>七粒去殼并心膜研細</small></p>	<p>右為末以冷水和丸梧桐子大以硃砂為衣侵晨面</p>	<p>東念藥王菩薩七遍以井花水吞下立瘥</p>	<p>辰砂丹 <small>出未生濟鑑</small> 治瘧疾大有神効</p>	<p>硃砂 <small>五錢半入藥半為衣</small> 信雄黃 <small>各五錢</small></p>	<p>右件為細末入白麪六錢研勻滴水<small>和丸</small>梧桐子大硃砂為衣每服一丸星宿全無根水送下忌濕麪熱</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>物</p>	<p>五獸飲子 <small>出大方衍</small> 治脾寒如瘧發寒熱無時</p>	<p>草菓蔻 <small>七箇和皮青剉用</small> 厚朴 <small>半兩去皮剉</small> 烏梅 <small>十箇連核去仁剉</small> 甘</p>	<p>草人參 <small>剉各一方</small> 大棗 <small>十箇連核剉</small> 肥生薑 <small>一分剉</small> 橘皮 <small>七箇</small></p>	<p><small>去白細剉</small></p>	<p>右細剉了拌勻分作裹先以鹽水蘸濕紙裹藥煨香</p>	<p>熱第一服用一裹水一碗煎一盞溫服第二服用</p>	<p>二裹并前滓以水二碗煎一大盞溫服第三服用二</p>
---	--	-----------------------------	-------------------------	---	--	--	-----------------------	----------	--	---	--	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------



裹并前滓以水三碗作兩服空心食前一方有草菓
子無草豆蔻

草荳蔻散 出衛生方 治一切瘧

草荳蔻 當歸 杏仁 厚朴 木香 麻黃

猪苓 半夏 良薑 藿香 甘草 吳茱萸 各一

兩

右為飲子分一半麪裹炮之炮了仍裹每劑七煉薑
三煉同煉寒時熱喫熱時放冷喫

欽定四庫全書

普濟方

鹽津丸 出澹療方 治五瘧八痞

獨頭蒜 不拘多少每筒開七竅入去皮紅子 橘紅

丁香 不火 木香 不火 華撥 胡椒

右等分為細末用蒜膏為丸如梧桐子大先嚼鹽少
許令生津液嚥二粒漸加至三五粒臨卧服

瓜萋實丸 治澹療方 治胃痞中痛徹背喘急妨悶

瓜萋實 枳殼 去穰麪炒 半夏 湯炮七次 桔梗 各一兩

右細末薑汁打糊為丸如梧桐子大每服五十丸淡



薑湯下	治瘡病方 <small>出肘 後方</small>	用五月五日蒜一片去皮去中破之刀破令容巴豆一粒去心皮內蒜中令合以竹挾以火炙之取可熱	搗為三丸未發前服一丸不止復與一丸	又方 <small>出肘 後方</small>	臨發時搗大附子下篩以苦酒和之塗背上	又方 <small>出肘 後方</small>	欽定四庫全書 普濟方	常山 <small>搗下篩成 末三兩</small> 真丹 <small>一兩</small>	右白蜜和搗百杵丸如梧桐子大先發服三丸中服三丸卧服三丸無不效者常用効	又方 <small>出肘 後方</small>	先炙鼈甲搗末方寸至時令三服盡火炙無不斷	又方 <small>出肘 後方</small>	常山三兩搗下篩雞子白和之空服三十九丸去發食	以三十九丸發時三十九丸或吐否也從服藥至過發時
-----	----------------------------------	--	------------------	--------------------------------	-------------------	--------------------------------	---------------	---	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------------



勿飲食

一剪金

出衛生寶鑑

治瘧疾寒熱乃聖藥也

信

硫黃

各等分

右同研末用緋紅綃子手捻一撮於絹上裹如豆大細絲綿繫纏數遭繫定用剪子剪下勿得不繫緊恐藥有失每服一九星全新汲水送下空心無得人知如服藥先一日夜服至天明正發日早晨不令人知於淨處無人處避之或廟宇亦得

欽定四庫全書

普濟方

治瘧

出本草

用蒜不拘多少研極細和黃丹少許以聚為度丸如雞頭子大候乾每服一九新汲水下面東服至妙

三味湯

出大方衍方

治脾瘧

厚朴

三方寸

草薹仁

三箇

甘草

二寸

右三味咬咀以生薑二兩切作片子水一碗未發前作二服盡

蜀添散

出本草

治瘧



用蜀添雲母龍骨等分杵末患者至發前以漿水和
半錢服之溫瘧加蜀添半分臨發時服一錢

治瘧出本

用百草霜黃丹等分細研每服二錢於發日空心米
飲調服不過兩服愈

金不換正氣散出傳倍常用方常服進飲食調榮衛逐冷避山

嵐瘴氣治陰陽不和往來寒熱諸般瘧疾解利四時

傷寒治五種隔氣惡心痰逆或吐或瀉復食脾胃虛

欽定四庫全書

普濟方

弱悉宜服之

藿香去沙土半夏湯泡洗甘草炒陳皮去厚朴去

皮薑製草薺子煨去蒼朮米泔水白茯苓浸一宿白朮

陳麩炒

右並等分為粗末每服四錢水一盞半生薑五片棗
一枚同煎至七分去滓放溫服不拘時候

斬邪丹出如治脾寒

雄黃錢一人言分半黑豆 菘豆各四硃砂十黃丹粒二



錢二	右為細末滴水為丸分作三十九丸每服一丸五更并 花水送下忌熱物	養胃湯 <small>出如</small> 治飲食傷脾成瘧不問先寒後熱 <small>宜方</small>	半夏 <small>製</small> 厚朴 <small>製</small> 蒼朮 <small>各一</small> 藿香 草菓 茯苓 <small>兩 各一</small>	人參 <small>各一</small> 陳皮 <small>七分</small> 甘草 <small>二錢</small> <small>兩 半</small>	右咬咀薑七片烏梅一枚煎服	又方 <small>出如</small> <small>宜方</small>	欽定四庫全書 普濟方	先發二時次炭火床下令脊脚極熱被覆過時乃止 此治先寒後熱	神聖丹 <small>出本</small> 治瘧 <small>草</small>	以砒霜半錢研黑豆麪一錢右件二味細研滴水丸 小豆大雄黃為衣未發時空心面東新汲水下一丸	治瘧病 <small>出肘</small> <small>後方</small>	以常山三兩搗末以雞子白和丸如桐子大空心三 十九溫水下
----	----------------------------------	--	--	--	--------------	---	---------------	--------------------------------	--	--	--	-------------------------------



治諸瘧

出本
草

吐瘧痰去寒熱

以常山小麥竹葉三味和煮服之

治瘧疾

出本
草

信砒二兩別研如粉寒水石三兩別搗為末右用生鐵銚子先鋪石末一半後堆砒末在上又以砒末蓋頭然後取厚盞蓋之用麪醋糊紙條子密封約十重以炭火一斤已來安銚子在上候紙條子黑取出置冷地上候冷取之冊之潔淨刮取皮石末一等以借

欽定四庫全書

普濟方

小兒服以飛過辰砂為衣候乾入磁盒收每人服時於發日早臘茶清下一丸一日內不得熱物合時先洒掃淨室中合之不得令婦人犬猫雞鼠等見收得亦如然若婦人患則男着在口中男子患亦然

治瘧疾

用桃東引枝上葉不拘多少每葉一片用豆豉七粒一處搗極勻丸如梧桐子大湏五月五日午時合忌雞犬婦人見每服七丸絕早面東冷水吞下



治瘧冷病者	取毛建草一握微碎縛臂上男左女右勿令近肉便	成瘡子	欽定四庫全書	普濟方	普濟方卷一百九十七
-------	----------------------	-----	--------	-----	-----------

