

欽定四庫全書

普濟方卷二百一

明 周王朱櫨 撰

霍亂門

總論

霍亂有三名一名胃反言其胃氣虛逆反吐飲食也二
名霍亂言其病揮霍之間便致撩亂也三名走哺言其
哺食變逆者也診其脉來代者霍亂之脉代而絕者亦
霍亂而轉筋蓋由冷氣入於筋故也足三陰三陽之筋

欽定四庫全書

普濟方

起於足指手之三陰三陽之筋起於手指並循絡於身
夫霍亂大吐下之後陰陽俱虛血氣虛極則手足逆冷
而榮衛不理冷搏於筋則筋為之轉冷入於足之三陰
三陽則脚筋轉入於手之三陰三陽則手筋轉隨冷所
入之筋而轉由邪冷之氣擊動其筋而移轉也經曰足太
陽下血氣以日少則善轉筋善踵下痛者是氣少則易
虛虛而風冷乘之故也診其左手關上脉肝也沉為陰
陽實者肝實也實由擊動轉筋左手尺中名神門以後脉



足少陰經也浮為陰陽虛者病若轉筋霍亂之後煩躁
卧不安者由吐下之後腑臟虛極陰陽未理血虛氣亂
故血氣之行未復常度內乘於腑臟故煩躁而不得安
卧也 人生稟命以五臟為主夫臟者即是五行內為
五行外為五味五行五味便宜扶抑所以春夏秋冬逆
調理之食啖不可過度凡飲食於五臟相尅者為病相
生者無他經曰春不食辛夏無食鹹季夏無食酸秋無
食苦冬無食甜此不必全不食但慎其太甚耳諺曰百

欽定四庫全書

普濟方

病從口生蓋不虛也四時昏食不得太飽皆能生病從
夏至秋分忌食肥濃然熱月人自好冷食更無肥濃無
食菓菜無節及逐食眠卧冷水洗浴五味更相尅臟雖
欲無病不可得也所以病故人自作之非關運也書曰
非天天人人中自絕命此之謂也 陰陽二氣擁而反
戾揮霍之間變成吐利此名霍亂輕者脚多轉筋甚者
遍體轉筋夏月伏暑亦令人吐痢傷寒亦令人吐痢當
察其由施以治法大抵霍亂脉表浮洪者可治脉表微



而遲氣少不語者不可治 乾上坤下其卦為否陽隔
陰而不降陰無陽而不升此否之所以痞而不通也人
具此陰陽揮霍亂變結搏於中卒然或瀉而不吐或吐
而不瀉大抵心腹攪悶煩痛其視天地不交之否異乎
否乎霍亂之證心腹卒痛嘔吐下痢發熱憎寒頭痛眩
暈先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛則吐瀉俱
作甚則轉筋頽頓特反掌間蓋陽明屬胃以養宗筋暴
吐暴下津液驟亡宗筋失其所養故亦手急甚則舌卷

欽定四庫全書

普濟方

縮囊危甚風燭矣然亦何以致此哉曰胃伏暑毒露卧
早濕當風取涼風冷邪氣入於腸胃加以嗜好肥腥飲
啖生冷居處不節激而發焉於是邪正相干中脘節閉
氣不得通吐痢暴作所謂脾受賊邪水來勝土者此也
治法藿香正氣散加藿香生薑為主不惟可以溫散風
邪亦可以調理吐瀉其若傷暑所致未可遽投香薷散
沉冷之劑自合先治中脘如二陳湯橘皮半夏湯等次
則以香薷溫服散暑解煩昧者渾為脾胃虛冷遽用人



參白朮訶子肉豆蔻之屬以壯胃澁腸不思風冷未散
輒以參朮訶蔻攔補寒邪邪氣得之愈盛愈作縱得淹
延或下痢或久瀉或腹脹虛浮或中滿不食變證將百
出矣抑猶有說焉濕霍亂死者少乾霍亂死者多許仁
則嘗有是言矣蓋謂所傷之物因吐痢而出泄泄盡則
止猶可幸免若上不得吐下不得痢所傷之物擁閉正
氣闕隔陰陽燥攪喘脹其能生乎則知揮霍逆亂如人
被髮交爭必有以俟之可也古方用來復丹正取踈利

欽定四庫全書

普濟方

之意但多則太溫莫若薑湯下蘇感丸為愈霍亂氣息
少力不欲言者不治 又曰治嘔吐莫先於助胃既助
胃而復嘔吐者中脘挾風寒也治喘嗽莫先於調肺既
調肺而復喘嗽者風寒在表或在裏也瀉痢之疾固腸
澁下終不作效非腸胃間留畜風寒邪氣之所致乎故必
隨其感受解散於其先則某病某藥庶乎其對證矣解
散風寒不換金正氣散為上其間增益則青皮官桂良
薑乾薑撮用最良若欲其清解則紫蘇荊芥柴胡乾葛



等藥酌量可也惟暑亦然每每隱伏作病或為焦煩或
為腸痛或泄痢不止暑中類多有之 治霍亂倉卒之
症宜於臍中灼艾及用蓼花一把煎湯泡洗次投以薑附
理中湯之類其脉洪大者易治脉微腎縮舌捲者難治
又有霍亂而不吐者類吐不吐類痢不痢頃刻之間便致
悶絕當多灌鹽湯引其必吐宿食殮盡然後以嚴氏加
減理中湯治中湯欸調之既愈之後煩熱多渴者以麥
門冬湯調之 凡諸霍亂忌與米食飲胃中得米即吐

欽定四庫全書

普濟方

不止但與厚朴葛根飲若冬瓜葉飲但沾漬咽喉而不
可多與若服湯時隨服吐者候吐定乃止診脉絕不通
以桂合葛根為飲吐下心煩內熱汗出不轉筋脉急
數者可犀角葛根為飲吐下不止發熱心煩欲水可以
飲米粉汗出為佳若不止可以葛根薺芎飲服之 問曰
病者發熱頭疼身體痛惡寒而復吐痢當屬何病師曰
當為霍亂霍亂吐痢止而復發熱也傷寒其脉微澁本
是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必痢今



反不痢者不可治也霍亂吐痢者多必轉筋不渴即臍上
築霍亂而臍上築者為腎氣動當先治其築治中湯主
之去朮加桂去朮者虛故也加桂者恐作賁也霍亂
而臍上築吐多者若下多者霍亂而驚悸霍亂而渴霍
亂而腹中痛嘔而吐痢欲得水者皆用治中湯主之

霍亂吐痢
附論

夫霍亂吐痢者以三焦氣不升降而清濁相干於腸胃
間若先心痛則吐先腹痛則痢先心腹並痛則吐痢俱發

欽定四庫全書

普濟方

治此者多以中焦為本中焦既和則清濁自分而吐痢
止矣 諸惡風惡寒者有汗無汗重暑煩毒皆外所因
蓋傷風則惡風有汗傷寒則惡寒無汗胃濕則重暑則
熱煩此雖常論揮霍之間倉卒不辨遂致錯誤亂經反
常為害不淺 諸大喜傷心則氣散大怒傷肝則氣上
憂傷肺則氣怯驚傷膽則氣亂涎氣槩鬱聚結臍飲
痞隔不通遂致滿悶隨其勝復必作吐痢當從內所因
治之 諸飽食膾炙恣飧乳酪水陸珍品哺鹽雜穀快



飲寒漿強進石酒耽縱情慾不節以胃為五臟海因脾
氣以運行胃既膜脹臟復停凝藏氣不行必致鬱發遂成
吐痢當從不外內因治之 霍亂轉筋者以陽明養宗
筋屬胃於大腸今暴吐津液頓亡外傷四氣內積七情
飲甘膩致閉諸脉枯削於筋宗筋失養必致攣急甚則
卵縮舌捲為難治又云霍亂吐痢後煩渴者以陰陽反
戾清氣干濁水與穀併小便閉澀既走津液腎必枯燥引
水自救煩渴必矣又云凡外所因必自經絡傳入臟腑

欽定四庫全書

普濟方

須以脉證推其所因隨經絡調之則盡善矣假如傷寒
在太陰經當用四逆湯少陰經當用麻黃附子湯厥陰
經當用理中湯若在太陽經還用麻黃湯陽明經養胃
湯少陽經小柴胡湯風暑濕亦然風則桂枝湯暑則香
薷飲五苓散濕則苓朮湯滲濕 儒門事親云凡嘔吐
而瀉病名曰何也內經熱論云此乃轉筋霍亂之證也
何氣使然此乃邪氣在於中焦使陰陽二氣不能升降
其證心痛則吐先腹痛則瀉先如心腹俱痛則吐瀉並



作致使揮霍之間自然撩亂此證喜氣涼之物可用冰
 水調苓益元則愈矣大忌熱物轉筋之病治之奈何經
 曰勞者溫之溫者溫存之意也又一法生姜湯益元散
 白朮散禹功散加水沉細細呷之渴未止者頻頻飲之
 如無冰新汲水亦得用之大忌白粥米湯桂附種種之
 燥藥不可服之若一味用燥藥服之必死如無藥處可
 服地漿者掘地作坑注新水於其中間渾旋旋取澄清
 者飲三五盞立愈

欽定四庫全書

普濟方

方

杜若丸 出千金方 治霍亂久將遠行預備

杜若 藿香 白朮 橘皮 吳茱萸 乾薑

人參 厚朴 木香 雞舌香 瞿麥 桂心

薄荷 女苑 茴香

右等分為末煉蜜為丸如梧桐子大酒下二十九

齊芘飲 出千金方 因霍亂吐下服諸熱藥吐下得止因即變

虛心煩手足熱口燥欲得水嘔逆迷悶脉急數者及



時行熱病後毒未盡因霍亂吐下仍發熱心腦欲裂者以此解之	
薺芩	人參
厚朴	知母
枯蘂根	茯苓
犀角	藍子
枳實	桔梗
橘皮	葛根
黃	
芩	甘草
各二兩	
右呶咀以水一斗煮取三升分三服	
竹葉湯治霍亂吐痢已服理中四順等湯不解者	
竹葉	握一
小麥	一升
生薑	十塊
甘草	
人參	
附子	
芍	
欽定四庫全書	
普濟方	
藥	各一兩
橘皮	
當歸	
桂心	各二兩
白朮	三兩
右呶咀以水一斗半煮竹葉小麥取八升去滓下藥	
煮取三升分三服上氣加茱萸半升即瘥理中四順	
湯皆大熱若有熱宜竹葉湯	
木瓜散	出聖方
治霍亂吐痢冷氣攻心腹	
木瓜	乾一兩
艾葉	五錢
當歸	半兩
剉	
木香	半兩
桂心	半兩
訶梨勒	三分
煨	
肉蔻	半兩
去殼	
人參	半兩
去頭	
白朮	三分
陳橘	
皮	一兩
湯浸	
厚朴	三分
去粗皮	
塗	
生薑汁炙香熟	



右為散每服三錢以水一鐘煎至五分去渣不計時 稍熱服之	人參湯 出聖 治毒冷霍亂吐痢煩嘔轉筋肉冷汗出手 足指皆腫喘垂死絕音不出百方不效脉不通者服	此湯取瘥乃止隨吐續服勿止併灸	人參 附子 炮裂去皮 茯苓 去黑皮 厚朴 去粗皮 甘草	橘皮 湯泡去白穰 當歸 切焙 葛根 剉 桂心 去粗皮 乾薑	各三兩 炮過	欽定四庫全書 普濟方	右呔咀以水七升煮取汁二升半分三服不拘時一 方有生薑	虎掌丸 出千 治霍亂永不發	虎掌 薇銜 各二兩 枳實 附子 人參 檳榔	乾薑 各二兩 厚朴 六兩 皂莢 三寸 白朮 五兩	右為末蜜丸如梧桐子大每服二丸酒下日三服一 方用枳壳去枳實武德行尼名淨明患此已久或一 月一發或一月再發將至死時在朝太醫院許甘巢
------------------------------	--	----------------	--	---	-----------	---------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--	--



之徒亦不能識余以此治之		丁香丸 出聖濟總錄 治飲食過傷吐瀉		丁香 白朮 縮砂仁 木香 肉荳蔻 皮去 乾薑		炮 桂 去粗皮 陳橘皮 去白焙 紅荳蔻 去皮 枳殼 去		麸炒 半兩		右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九煎生薑		木瓜湯嚼下		丁香散 出十便良方 治霍亂吐痢不止		欽定四庫全書 普濟方		丁香 桂心 白朮 各半 訶梨勒 煨用 厚朴 去粗皮生		薑 高良薑 剉 附子 炮裂去皮 陳橘皮 湯浸去 木瓜		乾者各 一兩		右為細散不計時分粥飲調下二錢		乾薑湯 出聖濟總錄 治霍亂吐痢心腹痛疼氣逆手足冷		乾薑 炮 甘草 炙 桂 去粗皮 附子 炮裂去皮 草荳蔻 去 木		香 高良薑 炮 肉荳蔻 去壳 乾木瓜 各半		右剉如麻豆每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服	
-------------	--	----------------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------------	--	----------------------	--	-------	--	----------------------------------	--	---------------------------	--	---	--	--	--	-----------------------	--	----------------	--	---	--	--	--	--	--	-----------------------	--





煎取一盞去滓溫服	香薷丸 出聖濟總錄 治冷熱不調霍亂吐瀉	香薷 一兩 白扁豆 炒一兩 丁香皮 三兩 藿香 去梗 零陵香 各半	兩 益智仁 一分 木香 一兩	右為末麵糊為丸如梧桐子大每服二十九食前溫	紫蘇湯下	治要除濕湯 出直指方	半夏 新製 川厚朴 製 蒼朮 炒各二兩 藿香葉 陳皮 茯苓	欽定四庫全書 普濟方	苓 赤者各一兩 甘草 炙七錢	右剉散每服四錢薑七片棗二枚煎服霍亂而不吐	者加桂吐而不瀉者去蒼朮加丁香吐瀉俱作兼腹	痛者只加桂一方無茯苓散利其小水一方有木香	酸棗仁湯 出危氏方 治霍亂吐下增劇虛勞煩擾奔氣在胸	中不得眠發寒熱頭疼暈悶	酸棗仁 炒一分 人參 桂心 知母 茯苓 各三錢	石膏 煨半兩 甘草 炙二錢
----------	------------------------------------	--	---	----------------------	------	---------------------------	--	---------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	-------------	---	---



右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗二枚煎七分	去滓食前服	理中散 出十便良方 治霍亂轉筋吐痢不止	青木香 六分 桂心 八分 厚朴 八分 白朮 八分 乾薑 十分 甘草	草 八分 附子 六分	右搗篩為散每服四錢匕人行六里不定更服一	錢匕瘥忌海藻粉菜生葱	理中丸 出聖濟總錄 治冷熱不調霍亂吐痢宿食不消	欽定四庫全書 普濟方	人參 白朮 高良薑 乾薑 桂 去粗皮各六兩	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心米	飲下日再服一方有甘草無白朮	除濕湯 出危氏方 治滿身腫者或多食生冷揮霍之間吐瀉	俱作	半夏 湯洗一兩 藿香葉 五錢 厚朴 去粗皮切薑汁炒用一兩 陳皮 五錢	白甘草 三錢 蒼朮 米泔浸一兩切炒赤	右剉散每服四錢水一盞半生薑七片紅棗二枚煎
----------------------	-------	------------------------------------	--	--	---------------------	------------	--	---------------	--------------------------------------	----------------------	---------------	--	----	--	--	----------------------



熱服不拘時候	人參湯療霍亂卒吐下不禁脉暴數者	人參 茯苓 葛根 橘皮 甘草 炙 麥門冬 去心 各二兩	右切以水五升煮取二升去滓溫服分三次服忌海	藻菰菜醋等	高良薑散治霍亂冷熱不調吐痢不止	高良薑 剉 木瓜 乾 香薷 已上各一兩 梨枝葉 一兩 人參 五錢	欽定四庫全書 三分去 普濟方	右為散每服三錢以水一盞煎七分溫頻服	胃氣丸 出危氏方 治憂思過度脾肺氣閉聚結涎飲留滯腸胃	氣鬱於陰寒凝於陽陰陽反戾吐痢交作四肢厥冷頭	目眩暈或復發熱兼治老人胃寒大便反秘妊娠惡	阻全不納食	硫黃 不拘多少猪臟內縛兩頭以米泔酒童子小便各一碗煮乾一半取出洗穢氣擦乾秤十兩	半夏 湯洗去滑 白茯苓 人參 各一兩 石膏 一分煨
--------	-----------------	--	----------------------	-------	-----------------	---	----------------------	-------------------	---	-----------------------	----------------------	-------	---	--



煮 硫黃	右為末生薑自然汁炊餅糊丸如梧桐子大每服五	十丸至百丸空心米湯入少生薑汁下	紅丸子出三方治脾胃虛冷飲食不節宿食留飲聚癖腸	胃或因氣不調衝冒寒濕忽作霍亂吐痢併作心腹	絞痛腸胃纏刺疲茶不勝	蓬朮剉二兩胡椒一兩三稜剉秤二兩同米醋煮一伏時青皮炒三兩	阿魏一分	欽定四庫全書 普濟方	右為末醋化阿魏陳米粉糊為丸如梧子大礬硃為衣	每服百丸二百丸煎生薑甘草湯下	太白丸出指南方治霍亂吐痢分利陰陽	玄明石或云玄精石半夏各一兩硫黃三錢	右為末麪糊丸如梧子大每服三十丸米飲下	脾厥吐瀉霍亂出指南方	附子炮裂去皮臍薑甘草炮等分	右用水一升藥末二錢棗七枚薑一錢煎一盞溫服
-------------	-----------------------------	------------------------	--	-----------------------------	-------------------	--	----------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------	--	---	---------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------



草荳蔻散治霍亂水痢不止吐不下食兼煩渴	草荳蔻去皮丁香各半兩黃連一兩去鬚炒	右為散每服三錢以清水一鍾入黑豆五十粒生薑	半分煎至六分去滓不計時候溫服	人參湯出聖濟總錄治霍亂吐下	人參 乾薑炮 陳橘皮去白焙 桂去粗皮 甘草炙半兩	右搗篩每服三錢用水二盞入棗三枚擘煎取一盞	去滓熱服連進三服立止	欽定四庫全書 普濟方	葛蒲飲出聖濟總錄治霍亂吐瀉不止	葛蒲切焙 高良薑各一兩 甘草炙半兩 白朮半兩 青橘皮去白	兩焙一	右為粗末每服三錢以水一盞煎十數沸傾出放溫	頓服	白丸療霍亂嘔吐及暴痢	半夏洗三兩 附子炮四兩 乾薑炮四兩 人參三兩 桔梗二兩	右作散臨病和之若吐痢不止者以苦酒和之飲服
---------------------------	---	-----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------	---	-----------------------------



二九如梧子不瘥復耐藥者加之以意下者以蜜和
丸忌猪羊肉錫

霍亂證

出拔
萃方

本自胃經或因寒飲或因飲水或寒暑毒

或濕氣冷熱不調水火相干陰陽相搏故轉筋攣痛
經絡亂行暴熱吐瀉中焦胃氣所主也察其色脉隨
經標本此治霍亂吐瀉之法也 如頭痛發熱邪自
風寒而來中焦為熱相乘之分邪稍高者居陽分則
熱熱多飲水者五苓散以散之 如邪稍下者居陰

欽定四庫全書

普濟方

分則為寒寒多不用水者理中丸以溫之 如吐痢
後有表者解之汗出厥逆者溫之如既吐且痢小便
利大汗出內外熱者亦溫之 如此下後汗出厥逆
不解脉欲絕者四逆等湯治之 如吐瀉轉筋身熱
脉長陽明本病也宜和中四君子湯平胃散建中湯
四君子湯

茯苓

白朮

人參

黃耆

各一
兩

右剉如麻豆大每服一兩水三盞薑五片煎至一盞



去滓溫服 如吐瀉轉筋頭痛自汗脉浮者四君子湯加桂五錢主之 如吐瀉轉筋頭痛無汗脉浮者四君子湯加麻黃五錢主之 如吐瀉轉筋脇下痛脉弦者宜	建中加木瓜柴胡湯 平胃加木瓜五錢亦可也	桂枝三兩 芍藥二兩 甘草一兩 膠飴半升 生薑三兩 大棗六枚	木瓜五錢 柴胡五錢	右剉如麻豆大每服一兩水三盞半去滓下膠飴兩	欽定四庫全書 普濟方	匙煎化服 吐瀉轉筋眼中痛體重脉浮而細者宜	四君子加芍藥高良薑湯	四君子四味各一兩 芍藥 良薑各五錢 同前煎服 如	吐瀉霍亂四肢拘急脉沉而遲者宜	四君子加薑附子厚朴湯	四君子四味各一兩 生薑 附子 厚朴炮製各三錢	如吐瀉轉筋四肢厥冷	建中加附子當歸湯
---	----------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------	---	-----------------------	-------------------	---	------------------	-----------------



桂枝一兩 當歸三錢 芍藥二兩 甘草五錢 膠飴半兩 生薑一兩 附	子三錢 大棗六枚 同前煎服	理中丸出方 療霍亂吐痢宿食不消	白朮 乾薑炮 甘草炙 人參 大麥蘖熬令黃	右搗篩蜜和丸以水飲服十五丸如梧子大日再服	稍加至二十丸忌海藻桃李雀肉等物	亂髮湯出聖濟 療霍亂諸藥不能療	亂髮一握如雞 小蒜十四枚 附子一兩 甘草	欽定四庫全書 普濟方	三兩 炙	右切以水六升煮取三升去滓溫分三服忌猪肉海	藻菰菜	丁香散出聖濟 治霍亂不止	丁香 木香 肉豆蔻去壳各一兩	右為細散每服二錢以白粥飲調下熱服	和氣煎出聖濟 治霍亂吐瀉冷熱不調	胡椒 菴豆各一兩 人參一分
--	--	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------	---------------------------------------	--	-------------------	-------------	-----------------------------	------------	------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--	--



右生搗羅為散每服三錢以水一盞煎五六沸去滓 熱服	厚朴散出聖方治霍亂吐瀉不止	厚朴一兩半去粗皮塗生薑汁炙香熟甘草半兩炙肉豆蔻三分去壳	黃連三分去鬚	右件為散每服三錢以水一鍾煎至五分去滓溫頻服	治霍亂下痢吐方出聖方	欽定四庫全書 普濟方	人參去蘆頭三分厚朴半兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟兔骨一兩炙令黃	陳橘皮二分去白湯浸焙	右搗篩為散每服三錢以水一中盞生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服	霍香烏藥散出百一選方治霍亂	霍香葉 烏藥 香附子炒各半兩甘草二錢半炙	右為粗末水一大鐘煎至七分溫服	霍香湯出聖濟總錄治霍亂吐痢不止
--	-------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------	---------------------------------------



藿香去梗半兩 丁香一分 白芷 縮沙去皮各一兩	右粗搗篩每服二錢匕水一中盞煎至六分去滓熱呷不計時候	正胃湯出聖濟總錄 治霍亂不止	枇杷葉去毛炙 桂去粗皮 厚朴去粗皮薑汁炙 陳橘皮去白焙各半兩	右為粗末每服二錢用水一盞入生薑三片煎至六分去滓熱服不拘時	金液丹治霍亂吐瀉	欽定四庫全書 普濟方	硫黃二兩 胡椒五錢 黃蠟一兩	右為末鎔黃蠟為丸如白豆大每服一丸涼水送下不止再服一丸	香薷丸一名香薷湯出如宜方 治陰陽不順清濁相干氣射中焦	名霍亂因飽食所傷然也	香薷一兩半 厚朴二兩 黃連二兩 同厚朴入生薑四兩同拌勻炒令紫色	右為末每服三錢水一盞酒一盞同煎去滓井水沉冷頓服不犯鐵器兼治吐痢腹中痛大渴煩躁四肢
--	----------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------	-------------------	--	-----------------------------------	--	-------------------	---	---



逆冷汗自出筋轉痛不可忍者

高良薑湯治霍亂冷熱不調吐痢瀉

杜梨枝葉
三兩良薑五
兩木瓜一
枚

右為末水六升煮取二升絞出滓空腹溫三服一方

有藿香葉無杜梨

理中丸

出聖
惠方

治惡寒無汗過食生冷或飲寒漿霍亂吐

下脹滿飲食不消心腹疼痛胸膈痞塞或暈緩弱脉

微卧起不安手足躁擾水漿不下此由冷熱失和邪

欽定四庫全書

普濟方

正相干清濁不分陰陽錯亂喜冷者因熱惡冷者因

寒其脉弦大一名理
中湯

人參去
蘆乾薑炮白朮去
蘆甘草炙各
三兩

右剉散每服四大錢水一盞煎至七分去滓食前服

遠行防霍亂煉蜜為丸如梧子大每服三五十丸如

作末每服方寸匕酒調下亦得若轉筋者加石膏煨

三兩若臍上築者腎氣動也去朮加桂心四兩腎惡

燥故去朮恐作奔豚故加桂吐多者去朮加生薑三



兩下多者復用木悸者加茯苓二兩渴欲得水加木									
合煎成四兩半腹滿加人參合煎成四兩半若寒者									
加乾薑合煎四兩半腹滿去木加厚朴附子各半兩									
病退而不食者加白荳蔻橘紅麥蘖各半兩服藥後									
服熱粥一盃微自溫腹勿發揭衣被噦則加丁香吐									
痢止身體痛不休者審其元因以和解之如初因傷									
風用桂枝之類所謂治其本也香蘇散治身熱無汗									
霍亂吐下臉赤多痰加霍香葉生烏藥烏梅生薑煎									
欽定四庫全書									
普濟方									
甚妙一方吐瀉不止身冷汗出無脉者可服漿水散									
兼桂枝湯白朮湯									
木瓜湯									
出危氏方 治霍亂吐下已舉體轉筋入腹則悶絕									
木瓜									
乾一兩去瓢 吳茱萸									
半兩湯洗 茴香									
二錢 甘草									
炙一錢									
右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紫蘇十葉食									
鹽一撮煎至七分去滓食前服仍研生蒜貼心下脚									
心上又用薑一附湯清煎沉冷服之效熱因寒用之									
法也訶子散治幼老霍亂吐痢一服效一方無鹽煎									



良薑飲治霍亂神效

良薑 藿香 陳皮 各一兩 炙甘草 三分

右剉細末每服三錢水煎服

白龍骨丸治吐瀉

白龍骨 白礞 白石膏 白礬 各等分

右為末滴水丸梧子大入乾鍋火煨紅為度每服五丸至十丸米飲湯下石膏是軟者北人謂之寒水石

故可煨 韓御帶施此藥即驗

欽定四庫全書

普濟方

四逆加猪膽湯 出肘後方 療霍亂吐痢而汗小便復利或下

利清穀裏外無熱脉微欲絕或惡寒四肢拘急手足

厥逆

甘草 二兩乾炙 薑 半兩炮 附子 一枚生去皮破八片 猪膽汁 半合

右切以水二升煮取一升四合溫分再服無猪膽以羊膽代之刪繁千金經心錄同強人可與大附子一枚乾薑至三兩若吐之後吸吸少氣者及下而腹滿者加人參一兩諸藥皆減為一兩如証者亦宜與理



厥逆人參湯佳忌海藻菰菜猪肉等	豆湯療霍亂吐痢	扁豆葉 升切一 香藿葉 升切一 木瓜 枚切一 乾薑 兩切一	右以水六升煮取二升五合絞去滓分溫三服服後	相去如人行六七里並無忌	四神丸主霍亂冷實不除及痰飲百病無所不主	乾薑 桂心 附子 炮各一兩 巴豆 六十枚去心皮熬研如膏	右為末蜜和為丸如小豆大飲服二丸取快不下又	欽定四庫全書 普濟方	服一丸忌生葱野猪肉蘆笋	治霍亂初覺吐痢方 出聖急方	香薷 兩一 小蒜 兩一 厚朴 一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟	右細剉令勻每服半兩以水一大盞入生薑半分煎	至七分去滓溫服不計時服之	厚朴散 出仁存方 治霍亂吐痢	厚朴 二兩炙製 肉豆蔻 兩半 草豆蔻仁 兩半	右為散每服三錢以水一盞鹽一捻煎至八分去滓
----------------	---------	---	----------------------	-------------	---------------------	---	----------------------	---------------	-------------	------------------------------	---	----------------------	--------------	-------------------------------	---	----------------------



熱呷再服立止婦人不用鹽薑二片煎	陳橘皮湯 出聖濟總錄 治霍亂吐痢	陳橘皮 甘草 炙一兩 白朮 三兩	右搗篩每服五錢以水一盞半竹葉十片生薑半分	小麥汁半盞煎至八分去滓溫服日三	胡椒湯 一名豆椒散出危氏方 治霍亂吐痢諸藥不納兼治中暑	暴下	胡椒 七粒 生菜豆 二十粒	欽定四庫全書 普濟方	右為末煎木瓜溫鹽湯調下一錢一方無木瓜用新汲	水煎湯下治中湯治飲食居處不節以致霍亂本方	青皮陳皮乾薑能散風寒蘇合香丸用枳殼一方木	瓜半分煎湯調下治乾霍亂不吐不瀉氣痞于中心	腹絞痛此證最惡	青金丹 一名的寄丹出十便良方 治霍亂吐瀉不止及轉筋諸藥不	效者一粒治一人及治一切吐逆翻胃不問虛冷熱	並皆治之
------------------------	--	---	-----------------------------	------------------------	---	-----------	--	-----------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	--	-----------------------------	-------------



硫黃一兩
研 水銀八錢

以銚子內炒柳木篋不住手攪更以柳蘸以候頻頻
洒候如鐵色法如青金塊方成刮下再如粉留少半
為散餘以粽子尖三個醋約半盞研稀稠得所成膏
和丸如鷄頭大朱砂為衣每服一丸丁香湯磨化下
伏熱丁香湯調下一錢傷寒陰陽乘伏用龍腦冷水
磨日三二服或云以木瓜湯調散并米飲亦得

吳茱萸湯一名四片金出
衛生寶鑑方 治冒暑伏熱腹痛作瀉或痢

欽定四庫全書

普濟方

并飲水過度霍亂吐瀉其證始因飲冷或胃寒或忍
飢或大怒或乘舟車傷動胃氣令人上吐下瀉吐瀉
併行頭足轉筋四肢逆冷用藥遲慢須臾不救命在
頃刻之間

吳茱萸 木瓜 食鹽各半兩

右同炒令焦先用磁瓶盛水三升煮令百沸入藥煎
至二升已下傾一盞冷熱隨病人服之卒無前藥用
苦白礬為末每服一大錢沸湯調服更無前藥用鹽



一撮醋一盞煎至八分溫服或鹽梅醎酸等物皆可 服 劇方本以醎 酸二物煮	香瓜湯 出百一 選方	木瓜 藿香 良薑	右等分為散每服三錢以水一盞煎去滓熱服	訶子丸 出楊氏 家藏方 治大人小兒瀉	訶子 一兩 藿香 一兩 肉豆蔻 二箇	右為末蜜丸隨大小米飲下	欽定四庫全書	豌豆香薷散 出聖 惠方 治霍亂吐痢	豌豆 三合 香薷 三兩	右為末以水三大盞煎至一盞半去滓溫服三服	藕豆散 出千 金方 治霍亂	藕豆 香薷 各一 升	右以水六升煮取二升分服單用亦得	桑葉湯 出聖 惠方 治霍亂吐瀉不定	桑葉 扁竹 各一握
--	--------------------------------------	-----------------	---------------------------	--	--	--------------------	---------------	---	--	----------------------------	---	--------------------------------------	------------------------	---	---------------------------------



右剉以水二大盞煎至一大盞去滓溫服分為三服	如人行三里再服	水浸丹出三因方治伏暑傷冷冷熱不調霍亂吐痢口乾煩	渴	黃丹一兩分炒巴豆二十五箇去皮心	右同研勻用黃蠟鎔作汁和為丸如梧子大每服五	錢以水浸少頃以新水吞	回生散出百一選方治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之無不	欽定四庫全書 普濟方	回生	陳皮去白藿香葉去土	右等分粗末每服五錢水一盞半煎至七分溫服不	拘時候	人參丸出聖濟總錄治飲食過多當風履濕薄衣露坐或夜	卧失覆霍亂吐痢	人參 高良薑炮各一兩	右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸溫米飲嚼下
-----------------------------	----------------	---	----------	--	-----------------------------	-------------------	--	-----------------------	-----------	--	-----------------------------	------------	---	----------------	----------------------------------	-----------------------------



不拘時	硫黃丸 出仁存方 治邪正相干清濁不分有寒者服此	硫黃 研 半夏 湯浸七次為末	右等分研令勻以薑煑翻為丸如梧桐子大用米飲	下三十丸不拘時候	防已丸治伏暑吐瀉陰陽不分	防已 白芷 各等分	右為細末每服一錢新水調下不拘時候	欽定四庫全書 普濟方	治霍亂吐瀉如神方 出聖惠方	右厚朴去粗皮塗生薑汁炙香熟為散不計時候以	新汲水調下二錢	治霍亂病重	用烏木稍為末煎酒服	治霍亂吐瀉臨時無藥 出直指方	用生蒜研細塗心下及脚心即止	主霍亂大善用有驗 出肘後方
-----	--	--	----------------------	----------	--------------	--------------------------	------------------	---------------	------------------------------	----------------------	---------	-------	-----------	-------------------------------	---------------	------------------------------



用蘆根其花名蓬蓽水煮汁服之

治霍亂

出肘
後方

用胡椒三十四粒以飲吞之

治霍亂吐瀉服藥即吐無法可治者

用井泉水半碗百沸湯半碗共和勻服之即止

冰壺散

出十便
良方

治備急霍亂吐痢不止

用良薑火炙令焦香三兩打破以酒一升煮三四沸

頓服亦治腹痛氣惡一方加粳米煮良薑粥食之一

欽定四庫全書

普濟方

方用水煎服

救人霍亂吐痢頗有神效

出肘
後方

用漿水稍醋味者煮煎乾薑原用呷之夏月腹痛不

調煎呷之

療霍亂吐痢不止轉筋

出本
草

用菹豆為末和醋服之下氣一方用葉醋浸取服之

訶梨勒散療一切風氣痰冷霍亂食不消大便澁

用訶梨勒三顆搗取皮和酒頓服三五度即瘥



艾熨方治霍亂吐瀉	令患人仰卧揉艾鋪臍上如楮子大一指厚熨斗盛火	熨斗以鏹	治吐瀉 出本	用鐺下墨少許只半錢已下又於竈額上取少許以	百沸湯一盞投煤其中急攪數十下用碗蓋之汗出	通口微呷一兩口吐瀉即止	治霍亂吐痢不止 出本	欽定四庫全書 普濟方	用藕薑豉汁中以五味調和煮羹食之佳	療霍亂不止 出本	用酢漿水三升煮取一升五合內米粉一抄攪調分	二服別去如人行三四里	治霍亂 出肘	用黃杉木劈開作片一握以水濃煎一盞服之瘥	又方 出本	用肉豆蔻以薑湯服之良
----------	-----------------------	------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------	---------------------------	-------------------	------------------	-------------------------	----------------------	------------	-----------------------	---------------------	----------------------	------------



又方 出本	用樟木根磨服之取莖葉置門上辟天行時疾	又方 出本	用懷香子煑羹及生食并得辟熱除口氣臭	治霍亂氣併 出本	用肉豆蔻以薑湯服之良如霍亂山源無藥宜舊尿	桶板煎水服 又鹽醋煎服 出如 又鹽梅酸醃物宜	煎服	欽定四庫全書	普濟方	治霍亂吐下不止	以故麻鞋底水煑汁服之	治霍亂吐痢不止心煩四肢逆冷	以黃牛屎一升以水二升煎取一升以綿濾傾去滓	服一方用尿	治霍亂 出本	以梅根葉煎濃湯服之	卻暑飲 出如 治暑月傷生冷吐下脚轉筋
-------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------	----------------------------	----------------------	--	----	--------	-----	---------	------------	---------------	----------------------	-------	--------------------------	-----------	--------------------------------------



良薑 藿香 檳榔 木瓜 紫蘇 赤茯苓 各二兩	生薑棗子煎服	小藿香散 方指迷 若熱者其脉疾數宜	丁香 枇杷葉 乾薑 藿香葉 赤茯苓 甘	草 分等	右為末每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服若	不止者宜青金散方與上項方為一副當備載於此	欽定四庫全書 普濟方	出指迷方方見用藥本門本類青金類同 右二味同研不見水銀為度生	薑汁調少許溫米飲下	主霍亂 草出本	以桫木枝葉煎汁服之	主霍亂 草出本	以蓮藕生研服之	止霍亂 草出本	以青布浸汁和生薑煮服
-------------------------------	---------------	---	----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	---	------------------	-------------------------------	------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------	-------------------



治霍亂	出本 草
以木瓜枝葉煮飲服之良	
止霍亂後吐逆不止	出本 草
取糯米一合水研服亦煮粥服	
主霍亂吐痢不止	出本 方
以梨枝煮汁服之	
治霍亂吐下不止	出本 草
以楠材削作梯煮服之窮無他藥用此	
欽定四庫全書	
普濟方	
治霍亂吐下	出本 草
取菹豆葉搗絞汁和少醋溫服	
治霍亂刺風冷風	出本 草
用楓皮煎湯浴之	
治風毒賁豚	出本 草
以杉木煎湯淋之	
日華子云	
治霍亂厚朴湯	
厚朴	四兩
桂心	五兩
生薑	三四兩



以水六升煎二升分三服

治霍亂吐痢不止

用劉寄奴草煎汁服之

導引法

偃卧展兩脛兩手外踵皆相向令鼻內氣自極七息
除兩膝寒脛骨疼轉筋又云覆卧旁視立兩踵生腰
鼻內氣去轉筋又云張脛兩足指號五息止令人不
轉筋極自用力張脚痛挽兩足指號令寬大去轉筋

欽定四庫全書

普濟方

筋節急攣臂痛久行身開張又云覆卧旁視兩腫生
腰以鼻內氣自極七息除脚中弦痛轉筋酸痛一本
云療脚弱

霍亂嘔吐

附論

夫冷熱不調飲食不節則使人陰陽之氣清濁相干
而變亂於腸胃之間則成霍亂而嘔吐者是冷氣客
于肺腑之間或上攻于心則心痛或下攻於腹則腹
痛



方		訶梨勒散 出聖方 治霍亂嘔吐脾胃虛冷氣隔不思飲食	訶梨勒 皮三分 桂心 半兩 白朮 一兩 澤瀉 半兩 人參 半兩 蘆頭 去	乾薑 半兩 炮製 甘草 一分 炙微赤 陳橘皮 一兩 湯浸 赤芍	藥 半兩 厚朴 一兩 去粗皮 薑汁炙令香熟	右為散每服四錢以水薑半分煎至六分去滓溫服		陳橘皮丸 出聖方 治霍亂脾胃虛冷氣逆嘔吐不止	陳橘皮 一兩 湯浸 乾薑 半兩 炮製 華菱 三兩 桂心 半兩 人參	欽定四庫全書 普濟方		甘草 半兩 炙 白朮 一兩 神麴 一兩 炒微黃 附子 一兩 炮製	蘆頭 半兩 去皮	臍	右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧子大不計時候以粥飲下三十丸	人參湯治霍亂下焦熱氣逆上嘔吐不止名曰走哺	人參 梔子仁 萎蕤 黃芩 去黑心 知母 各一兩 白	茯苓 去黑皮 白朮 陳橘皮 湯浸去白焙 石膏 碎各一兩	右搗篩每服三錢匕生薑三片水一盞煎至七分去
---	--	---	--	--	---	----------------------	--	---------------------------------------	---	------------	--	--	-------------------------	---	-------------------------------	----------------------	---	--	----------------------



滓溫服日三服	桔梗散出聖惠方治霍亂食不消化嘔吐不止	桔梗去蘆頭 白朮 陳橘皮湯浸去白 乾薑炮製 枳	枳葉去毛炙 高良薑	右搗羅為散每服三錢以水一鍾入陳粳米五十粒棗	三枚煎至六分去滓不拘時候溫服	肉豆蔻丸出聖惠方治霍亂冷氣逆不止	肉豆蔻去殼 人參去蘆頭 白朮 陳橘皮湯浸去白 高	欽定四庫全書 普濟方	良薑剉 桂心各三分 胡椒 甘草炙微赤剉	右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧子大不計	時候粥飲下三十丸	芒硝湯出聖濟總錄治霍亂走嘔吐不止噎塞滿悶	芒硝別研 生乾地黄洗切 白朮 甘草炙各一兩 豉炒 白	茯苓去黑皮各一兩半 石膏碎二兩	右搗篩每服五錢以水一盞半竹葉十片葱白二寸煎至一盞去滓溫服日三
---------------	--	---	---------------------------------	------------------------------	-----------------------	--	--	-----------------------	---	-----------------------------	-----------------	--	---	--	---------------------------------------



藿香散治霍亂吐逆開胃和氣	藿香葉焙一兩 訶梨勒火焙十枚 人參 丁香各半兩 糯米	三百粒 石蓮心二枚	右為散每服二錢匕煨和皮生薑一塊棗二枚同煎	濃湯調下食前空心	厚朴散出聖惠方治霍亂嘔吐	厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟 白朮各一兩 桂心 枳實麩炒微黃 人參去蘆頭 半夏湯洗七遍去滑 各半兩	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服三錢以水一鍾入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服	人參散出聖惠方治嘔吐不止	人參去蘆頭 白朮 厚朴去粗皮塗生薑汁炙令香熟 陳橘皮湯浸去白	焙各一兩 半夏湯洗七遍去滑	右為散每服三錢以水一中盞入棗三枚生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服	香豉湯出聖惠方治霍亂走哺嘔吐不止或噎塞心熱滿悶
---------------------	--	--	-----------------------------	-----------------	------------------------------------	--	-----------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	--	---	---



豉炒二兩 白木二兩 甘草炙一兩 石膏碎二兩 白茯苓去皮一兩	半生乾地黄洗切焙一兩	右搗篩每服五錢匕水一盞半竹葉十片葱白三寸	煎一盞去滓溫服日三	白朮散出聖惠方 治霍亂嘔吐	白朮 肉豆蔻去粗皮塗生薑汁炙令香熟 人參去蘆半兩 陳橘皮湯浸去白焙 厚朴	右搗篩為散每服三錢以水一盞入生薑五分棗三枚	欽定四庫全書 普濟方	煎至六分去滓不計時候溫服	正氣丹出聖濟總錄 治下虛陰陽錯逆霍亂吐逆粥食不下	硫黃盞內鎔化 半夏為末薑汁作餅晒干 藿香葉各一兩 附子	炮製去皮 臍半兩	右為細末酒煮麵糊丸如梧子大以丹砂為衣每服	二十九至三十丸米飲下不計時	厚朴湯出聖濟總錄 治霍亂嘔吐不思飲食	厚朴去粗皮薑汁炙二兩 人參 半夏為末生薑汁調作餅晒干 白朮各二
---	----------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------	---------------------	--	---	--------------------------------	-----------------------------	----------------------	--	---



兩 陳橘皮湯浸去皮白 焙各一兩	右搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗三枚去核	煎至七分去滓溫服	乾薑散出聖濟 總錄治脾臟有積霍亂吐逆	乾薑炮訶梨勒去核白礬燒汁用丁香甘草炙各半兩	右為細散每服一錢以飯飲調下不拘時	厚朴湯出聖 急方治霍亂後胃弱嘔吐不止	厚朴去粗皮薑汁炙四兩白朮五錢乾藕豆葉三人人參白茯苓	欽定四庫全書 普濟方	苓去黑皮 各三兩	右搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分不拘時溫服	厚朴散出聖 急方治霍亂嘔吐腹脹	厚朴一兩去粗皮以生薑汁炙令香熟桂心半兩枳實半兩微黃	右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至六	分去滓不計時溫服	高良薑湯出聖濟 總錄治冷熱氣不調霍亂吐逆不定腹脇
---	-----------------------------	-----------------	--	--	-------------------------	--	---	-----------------------	------------------------------------	------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------	--



脹滿	高良薑 桂皮 去粗 人參 各一兩 甘草 炙半兩	右搗篩每服三錢匕水一盞棗三枚去核煎至七分	溫服不拘時	四汁煎 出聖濟總錄 治霍亂嘔吐	生藕 汁 生葛 汁 一合 木瓜 汁 生薑 汁半	右銀器中慢火熬如飴每服兩匙含化徐徐嚥津	梔子湯 出肘後方 治霍亂吐下後心腹煩滿或未得吐下若	欽定四庫全書 普濟方	轉筋不安熱渴者	用梔子十四枚水三升煮取二升淡豉七合煮取一	升頓服之嘔者加橘皮二兩若煩悶加豉一升甘草	一兩蜜一匙增水二升煮取二升分為三服三服用	梔子二十七枚細末熱水調下	肉豆蔻散 出聖惠方 治霍亂嘔吐不止	肉豆蔻 去殼 人參 去蘆 厚朴 去粗皮塗生薑汁 炙 令香熟 各一兩	右搗羅為散每服三錢以水一大盞生薑半分粟米
----	--	----------------------	-------	--------------------------------	---	---------------------	--	------------	---------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------------------	---	----------------------



二撮煎至五分去滓不拘時服	附子散 一名定嘔湯 出聖惠方 治霍亂吐少嘔多	附子 一兩炮製 去皮臍 半夏 三兩湯浸七 遍洗去滑 乾薑 一兩炮 製剉	右粗羅為散每服三錢水一中盞入粟米五十粒棗	三枚煎至六分不拘時	丁香散 出海上 名方 治霍亂吐不止	丁香 藿香 去 毛 枇杷葉 去 毛炙 各一兩	右剉碎用水一盞生薑半錢同煎至七分去滓熱服	欽定四庫全書 普濟方		冰壺湯 出聖濟 總錄 治霍亂嘔吐不止飲食輒嘔	高良薑 生 剉 棗 一枚 去核	右搗篩每服三錢匕水一盞煎至五分去滓用水沉	冷頓服立定一方用生薑	鷄子湯 出聖濟 總錄 治嘔吐煩悶及霍亂	鷄子 一枚 人參 一兩	右粗搗篩用水三升煎至半盞去滓重煎令沸入鷄	子白打轉掠去沫頓服
---------------------	--	---	-----------------------------	------------------	---	---	-----------------------------	-------------------	--	--	--	-----------------------------	-------------------	---	--	-----------------------------	------------------



青金散治霍亂吐逆不定手足冷面青不藥 方見本門	類一名 青金丹	返魂湯 一名薑鹽湯 治一切霍亂嘔逆手足厥冷 方見本門	昏塞下 痢類	訶梨勒丸治脾虛冷嘔逆霍亂瀉痢脹滿 方見本門	昏塞下 痢類	六和湯 出醫方集成 治心脾不調氣不升降霍亂嘔吐或致	泄瀉寒熱交作小便赤澀	欽定四庫全書 普濟方	縮砂仁 炮七次 杏仁 去皮 人參 甘草 赤茯苓	苓 藿香葉 白扁豆 木瓜 香薷 各二兩 厚朴	薑製各四兩	右咬咀每服四錢水一盞薑三片棗二枚煎服不拘時	小半夏湯治霍亂嘔吐涎沫醫返下之心下作痛	用半夏湯洗七遍去滑切焙咬咀每服三錢匕水一	盞薑三片煎至六分去滓服	主霍亂嘔吐不止 出本草
---	--------------------	--	-------------------	--	-------------------	---	-------------------	---	--	--	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------	--



以乾薑用冷水研泥飲之即止	
治霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋	出本
用好井水及土石間新出泉水多服之名曰洗腸常	
試有效不令腹空空則便服	
如遇力弱身冷則空臟胃悉寒寒則不能支持當以	
意消息兼及當時橫量灸脊骨三十五壯令煖氣徹	
內補胃氣間不然則危	
霍亂下痢	附論
欽定四庫全書	
普濟方	
夫霍亂者冷熱之氣變亂於腸胃之間搏於陰經則腹	
痛而腸鳴故為霍亂下痢之病然赤為熱寒冷熱相	
搏赤白交下寒甚則青黑不已則轉筋之症生焉	
方	
木瓜丸	出聖
治霍亂腹中冷氣下痢	
木瓜	切
當歸	焙
熟艾	炒
桂	微
赤石脂	二
陳橘	皮
皮	湯洗去白
木香	各半
人參	各半
白朮	去粗
厚朴	去粗
訶梨勒	各三
高良薑	分
劉汁	炙



欽定四庫全書		普濟方	
烏梅湯	出聖惠方	治霍亂後痢不止冷汗出腹脇脹	
烏梅肉	微炒	黃連	去鬚微炒
熟艾	微炒	當歸	剉微炒
附子	炮製去皮		
臍已上	甘草	半兩炙	阿膠
各三兩	微赤剉	令黃色	肉豆蔻
			去壳各一兩
赤石脂	二兩		
右搗羅為散不計時候以粥飲調下二錢			
升麻湯治霍亂下焦熱毒利血如鵝鴨肝片不止			
升麻	三分	犀角稍	地榆
		去苗各一分	紫草
			去苗三分
			蘘荷根
仁			
一兩	剉碎	黃芩	去黑心三分
		芭蕉根	剉碎焙乾一兩
		桔梗	炒三分
		梔子	
右搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日			
三夜一服之			
黃蘗皮湯	出聖惠方	治霍亂下焦大便洞泄小便自利	
黃蘗	去粗皮一兩半	黃連	去鬚二兩半
人參	半兩	艾葉	炒一兩
赤			
茯苓	去黑皮二兩	厚朴	去粗皮薑汁炙二兩
地榆		阿膠	炙令燥一兩半
櫟木白皮	剉碎焙乾一兩		



右搗篩每服三錢匕水煎至七分去滓空心溫服日 三	人參散出聖方治霍亂後下痢	人參去蘆頭甘草炙微赤剉黃芩各一兩芎藭剉微當歸剉微	白茯苓一兩乾薑炮製剉厚朴去粗皮塗生薑汁	右搗篩為散每服五錢以水一大盞入粟米半合煎	至五分去滓不拘時熱服	黃連丸出聖方治霍亂後下痢無度腹中疝痛	欽定四庫全書 普濟方	黃連去鬚微炒厚朴薑汁炙三分黃蘗一分微炙剉阿膠一兩搗碎炒令	色黃當歸剉碎微炒乾薑炮製剉木香剉各半兩地榆剉各半兩	右搗篩為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不	拘時粥飲下二十丸	止血湯治霍亂下焦虛寒或便利後見血	續斷切焙各三兩當歸炮製四兩蒲黃二兩生乾地黃	焙四兩桂去粗皮三兩阿膠炙令燥二兩	右搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服日
-----------------------------------	------------------------------------	--	---	-----------------------------	-------------------	--	-----------------------	---	---	-----------------------------	-----------------	-------------------------	---	--	-----------------------------



三		烏梅黃連散		出聖濟總錄		療霍亂水痢腹中雷鳴無不瘥病		緣霍亂而下痢者是冷氣入於腸胃腸胃之氣得冷則交擊而痛也		烏梅肉 黃連 熟艾葉 當歸 甘草 阿膠		碎熬令黃然後為末三兩 赤石脂 細研 附子 炮二兩		右搗篩為散有患者每服二方寸米飲下凝冷則酒下忌海藻菰菜猪肉冷水		欽定四庫全書		普濟方		黃連散治霍亂後下痢赤白不定		黃連 去鬚微炒 黃蘗 酸石榴皮 地榆 剉 乾薑 炮製		阿膠 打碎炒 厚朴 去粗皮塗生薑汁炙		右搗篩為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不拘時候熱服		伏龍肝湯治霍亂下焦虛寒或先便血此為遠血成痢		伏龍肝 淨揀篩 甘草 炙一兩 乾薑 炮製二兩半 黃芩 去黑心一兩		兩半 生乾地黃 焙二兩半 牛膝 酒浸焙 亂髮 燒灰一分	
---	--	-------	--	----------------------	--	---------------	--	----------------------------	--	---------------------	--	---	--	--------------------------------	--	--------	--	--------------------	--	---------------	--	---	--	--	--	---------------------------	--	-----------------------	--	--	--	---	--



右搗篩每服三錢匕生薑一分拍碎水一盞煎至七分去滓溫服日三	赤石脂湯治霍亂下焦熱結或痢下膿血煩痛 赤石脂 兩四 烏梅 去核炒 梔子仁 兩半 白朮 兩半 乾薑 兩	炮製 一兩升麻 陳廩米 微炒 右搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去滓空腹	日三服 龍骨湯治霍亂後虛冷腹痛下痢不止	欽定四庫全書 普濟方 龍骨 焙切 當歸 焙 乾薑 製 甘草 微炙 人參 各一兩 附子 炮製 去皮臍 半兩	右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至八分去滓熱	服日三	白朮湯治霍亂下痢不止而渴者 白朮 去粗皮薑汁炙三次 厚朴 切 當歸 焙 人參 切 乾薑 炮製 甘	草 微炒各三兩 右粗篩每服五錢匕水一盞半煎至七八分去滓溫
-----------------------------	--	--	------------------------	--	----------------------	-----	--	--



服如人行五六里再服	香豉湯治霍亂下焦熱毒痢如魚腦雜赤血併下臍腹	疔痛不可忍裡急後重	香豉 微炒二兩 梔子仁 三兩 黃蘗 去粗皮半兩 地榆 剉半兩 白朮	茜根 揀淨剉碎各三兩	右搗篩每服三錢用薤白四寸水一盞同煎至七分	去滓溫服日三	理中丸主霍亂下氣能食止洩痢	欽定四庫全書 普濟方	人參 白朮 厚朴 炙 茯苓 各六分 薑屑 二分	右搗篩蜜丸如梧子大一服十丸米飲下酒下亦得加	至十五丸二十丸忌生冷海藻菰菜桃李	白茯苓 出聖惠方 治霍亂後水痢不止	白茯苓 黃蘗 微炙剉 乾薑 炮製剉各一兩 木瓜 乾者一兩半 白	石脂 二兩	右搗羅為末煮粟米飲和丸如梧子大不計時候以	粥飲下三十丸日四五服
-----------	-----------------------	-----------	---	---------------------------	----------------------	--------	---------------	---------------	--	-----------------------	------------------	----------------------------------	--	----------------------	----------------------	------------



白木丸 出聖 治霍亂下痢	白朮 炙微 人參 去蘆 厚朴 去粗皮塗薑汁炙 甘草 兩半	赤劉	右搗羅為末煉蜜和丸如梧子大每服以粥飲下三	十九日四五服	訶梨勒丸治霍亂水瀉腸胃冷滑	乾薑 炮 龍骨 赤石脂 各一兩 訶梨勒 三兩以麵裹煨取皮并麵	末為	欽定四庫全書 普濟方	右為末以麵糊為丸如梧子大每服空心用米飲下三十丸	藜蘆丸治霍亂赤白冷熱等疾及暴瀉病勢初發吐瀉不止出入不得並宜服	藜蘆 炙去苗 皂莢 酥炙去皮子 巴豆 去心皮膜炒	右先搗前二味細羅為末與巴豆同研令勻煉蜜和丸如小豆大每日米飲下一丸取利為度未利再服	陳橘皮湯治霍亂下痢
------------------------------------	---	-----------	-----------------------------	---------------	----------------------	--	-----------	-------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--	---	------------------



陳橘皮浸去白 高良薑剉各三分 厚朴去粗皮薑汁塗炙三遍一兩	右搗篩每服三錢以生薑半分拍碎水一盞煎至七分去滓溫服日三四服	艾葉湯出聖惠方 治霍亂後泄下不止	艾葉一兩 訶梨勒一兩煨去皮	右以水二盞煎去滓分溫三服如人行五六里溫再服	又方出千金方	用艾葉一把水三升煮取一升頻服良如無新者舊	欽定四庫全書 普濟方	葉濃煎湯服亦治霍亂轉筋	又方出千金方	用香薷一把水四升煮取一升頻服之良青木香亦	佳	治久瀉霍亂不止出肘後方	用附子重七錢炮去皮臍為末每四錢水二盞鹽半	錢煎取一盞溫服立止	治霍亂下痢無汗出肘後方
--	--------------------------------------	--	--	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------	----------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------



用梨葉枝一大握水二升煎取一升凡正二月勿食梨	治霍亂唯痢不一吐方 出聖惠方	人參 半兩去蘆頭 烏牛齒 一團并草 生薑 三分切	右細剉拌勻以淡漿水一大盞煎至六分去滓分二	服稍熱服之如人行五里再服	治初得痢冷熱赤白及霍亂 出海師方	甘草 一兩炙 草豆蔻 七箇剉	以水三升煎取一升分服	欽定四庫全書 普濟方	霍亂四逆 附論	夫四肢為諸陽之本陽氣之所通也霍亂吐痢陽氣暴	逆冷而脉微欲絕也古法治四逆專於通脉蓋榮衛流	行氣道升降則手足自和逆者順矣	方	四逆湯 出千金方 治寒多手足厥冷脉絕	生薑 八兩 芍藥當歸細辛桂心 各三兩 大棗 二十枚	通草甘草 各二兩 吳茱萸 二升
-----------------------	-------------------------------	---	----------------------	--------------	---------------------------------	--	------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	---	-----------------------------------	--	---



右咬咀以水六升酒六升合煮五升分五服舊方用 棗三十枚以霍亂病法多痞故除之如退棗加葛根 二兩惟霍亂四逆加半夏一合附子小者一枚惡寒 與大附子	通脉四逆湯出醫方集成治霍亂多寒肉冷脉絕暴虛氣少	吳茱萸炒二兩附子去皮臍一兩桂心去皮不見火細辛洗去蘆土	通草一作木通白芍藥甘草炙以上各半兩當歸去蘆三錢	右咬咀每服四錢以水一盞酒半盞生薑七片棗一	欽定四庫全書 普濟方	枚煎至七分去滓溫服不拘時候	人參散出聖惠方治霍亂身體疼痛四肢逆冷服理中四逆	不效者	人參一兩去蘆頭附子二兩炮去臍白芍藥一兩桂心二兩當歸	一兩剉碎微炒陳橘皮二兩湯浸去白焙白朮二兩高良薑一兩剉	右搗篩為散每服四錢以水一中盞入棗三枚煎至	六分去滓不計時候熱服	吳茱萸湯出聖惠方治霍亂多寒手足厥冷脉絕
---	---	---	---	-----------------------------	--	----------------------	---	------------	--	---	-----------------------------	-------------------	---



吳茱萸 半升洗 焙乾 當歸 切去粗皮 各三 芍藥 分 去 細辛 苗	木通 剉 炙 甘草 半兩	右咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞酒半盞入生薑	一棗大拍碎棗二枚煎至一盞去滓溫服如氣痞加	葛根半兩去棗一方有木香無木通無酒	附子散 出聖惠方 治霍亂腹滿虛鳴氣逆手足俱冷	附子 炮去皮 草豆蔻 去皮 桂心 陳橘皮 湯浸去白 高良薑	剉各半兩 甘草 炙微赤剉	欽定四庫全書 普濟方	右搗篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎	至六分不拘時候溫服	人參散治霍亂吐瀉不定四肢逆冷大渴欲水 出聖惠方	人參 三兩去蘆頭 附子 炮製去皮 甘草 炙微赤剉 白朮 乾薑	炮製剉 麥門冬 去心各二兩	右搗篩為散每服三錢匕水一中盞煎至六分去滓	不計時候熱服	附子粳米湯 出千金方 治霍亂四逆吐少嘔多者
--	---	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	---	---	---------------------------------------	-----------------------------	------------------	---	--	--	-----------------------------	---------------	---



中附子一枚 粳米五合 半夏半升 大棗十枚 乾薑 甘草各一兩	右咬咀以水八升煮藥取米熟去滓分三服	當歸散治霍亂嘔吐及下後腹中乾痛手足逆冷	當歸微炒 人參去蘆頭 附子炮製去皮臍 乾薑 甘草	炙微赤剉 各半兩	右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓	不拘時熱服	欽定四庫全書 普濟方	甘草飲治主脾腎冷氣乘心痛煩吐痢四肢逆冷或則煩痛病源云霍亂而吐大下後其腸胃俱虛乃至汗出其脉欲絕手足皆冷為四逆四逆者謂陰陽絕也	甘草炙 人參 乾薑 厚朴炙 白朮各三兩	右切以水五升煮取一升五合去滓分溫三四服如人行八九里忌海藻菰菜桃李雀肉等	桔梗湯出聖濟總錄 治霍亂吐痢已定汗出厥冷四肢拘急	腹中痛不解脉欲絕
---	--------------------------	----------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------	--	---	--	--	-----------------



桔梗剉 乾薑炮各 甘草炙 附子炮製去皮	右剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至八分去滓溫服	四順附子湯出聖惠方一名 治吐瀉過多手足逆冷脉	沉細氣小不語急服及霍亂轉筋肉冷汗出嘔呃	生附子 白薑炮 人參 甘草炒各	右剉每服四錢水一盞空腹服腹痛加桂小便不利	加茯苓仍用炒鹽熨臍或用薑附湯一方附子炮去	皮臍下甚加龍骨腹痛不止加當歸	欽定四庫全書 普濟方	香薷飲一名青連飲子 治霍亂吐瀉四肢厥冷	香薷去根二 藿香去根焙 草烏頭浸切去皮臍晒	兩同炒烏頭黃 黃連去鬚吳茱萸同炒二兩黃	以水煎服驗	通脉四逆湯一名薑附湯 治霍亂脉微欲絕或惡寒四	肢拘急手足厥逆或吐痢已定汗出而絕四逆不解	甘草炙二 乾薑炮二 附子炮去皮	右剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓
--	------------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------	---	---	---	--------------	--	-----------------------------	---	-----------------------------



溫服脉出即愈而赤者加葱白一莖同煎腹痛去葱		白加芍藥二兩嘔加生薑一分切同煎咽痛去芍藥		加桔梗并人參二兩吐痢止為度若身疼痛不休者		消息和其脉外傷寒論中又有療諸發熱霍亂者審		取之忌海藻菰菜猪肉		天南星散		一名回陽散		治吐下四肢逆冷不省人事		南星		末二		棗五		薑五		右水煎極熱服之一方無生薑		欽定四庫全書		普濟方		半夏湯		出危		治吐下四肢逆冷不省人事		半夏		末三		生薑		汁少		右以熱湯點一服可效白礬末點服亦驗		治霍亂吐瀉冷氣攻心腹痛四肢逆冷汗出		出聖		用硫黃一兩細研如麵以熱酒調下一錢		回陽散		出本		治吐瀉不止或致轉筋四肢發厥虛風不		省人事服此四肢漸煖神識便省		用天南星為末每服三錢入京棗三枚同煎八分	
----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	-----------	--	------	--	-------	--	-------------	--	----	--	----	--	----	--	----	--	--------------	--	--------	--	-----	--	-----	--	----	--	-------------	--	----	--	----	--	----	--	----	--	------------------	--	-------------------	--	----	--	------------------	--	-----	--	----	--	------------------	--	---------------	--	---------------------	--



普濟方卷二百一										欽定四庫全書		溫服未省再服									
										普濟方											

