

欽定四庫全書	
普濟方卷二百九	
明 周王朱櫨 撰	
泄痢門	
濡泄	
夫內經曰濕勝則濡泄甲乙經曰寒客下焦傳為濡瀉	
夫脾為五藏之至陰其性惡寒濕今寒濕之氣而客於	
脾則不能裨助胃氣腐熟水穀致清濁不分水入腸間	
虛莫能制故洞泄如水隨氣而下謂之濡泄	
欽定四庫全書	普濟方
方	
堅中丸 治脾胃受濕滑泄注下	
黃連	去鬚 黃蘗
赤茯苓	去皮 白朮
澤瀉	各一兩 陳皮
人參	肉苳蔻
白芍藥	半夏
桂	各半兩
右為細末水浸餛餅和丸如梧桐子大每服五七十	
丸食前溫米飲下	
肉苳蔻散 治腸胃受濕濡泄不止兼治暴瀉	
肉苳蔻	去殼 黃連
去鬚 訶梨勒	去核 甘草
赤茯苓	各三分



欽定四庫全書		普濟方	
加味五苓散 治伏暑熱二氣及胃濕泄瀉注下或煩渴小便不利		赤茯苓 皮去 澤瀉 木猪苓 皮去 肉桂 火不見 白朮 各一兩	
車前子 兩半		右呖咀每服四錢水一盞半薑五片煎八分去滓溫服不拘時或進來復丹亦可	
炙肝散 治飲食生冷內受風寒泄瀉無度		川麵乾薑 兩炮半 大附子 兩炮半 縮砂仁 兩半 肉荳蔻 二箇	
當歸散 治腸胃寒濕濡泄腹內痞刺疼痛		當歸 切 木香 乾薑 炮 肉荳蔻 去殼炮 訶梨勒 炮	
黃連 核 各三分		右為散先用水四盞入甘草生薑各一分黑豆半合並半生半炒同煎至二盞去滓分作二服每服用調散三錢空心日午服之	
苓 皮去黑 乾薑 炮 白朮 各半兩 厚朴 去粗皮生薑汁炙一兩		右為散每服二錢空心食前米飲調下日三	



小茴香四錢 炒 川小椒四兩	右為末每三四錢用白羊肝三二兩或獐猪肝或猪 羊腰子批開放藥在內鹽末一錢葱白二根同肝一 處紙裹潤濕燒香熟為度細嚼生薑湯下或米湯酒	送下食前空心服之	阿梨勒散 治寒溫傷脾濡瀉	阿梨勒炮去核 吳茱萸湯浸焙炒 木香 蕪荑各半兩 黃連	去鬚炒 一兩	欽定四庫全書 普濟方	右為細散每服二錢空心米飲調下	白荳蔻湯出聖濟總錄 治腸胃虛濕濡瀉無度腸痛飲食	不化	白荳蔻去皮 訶梨勒炮去核 乾薑炮 陳橘皮湯浸去白焙炒各半	兩 厚朴生薑汁炙三分	右搗篩每服五錢切薤白三寸水一盞半煎七分去	滓空心溫服日午再服	枳殼湯出聖濟總錄 治濡泄暴下不止
--	---	-----------------	---------------------	--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	---	-----------	---	---	-----------------------------	------------------	--



甘草炙 剉 阿膠炙 半兩 黃連去鬚 枳殼去穰 厚朴炒 汁炙 秤一兩	右搗篩每服五錢水一盞半煎一盞去滓空心溫服	日再	桂附丸出聖濟 治濡泄水痢久不止	桂去粗 附子炮裂去 乾薑炮 赤石脂各一兩	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心日午	米飲下日三	欽定四庫全書 普濟方	附子湯出聖濟 治腸胃寒濕濡瀉不止及冷痢色白	食不消化	附子炮裂 甘草炙 剉 阿膠炙 半兩 黃連三	右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞空心	溫服日再一名甘草湯	白朮丸出聖濟 治脾胃受濕濡瀉不止健脾	白朮 乾薑炮 各三分 人參 厚朴去粗皮生薑	右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心米飲下
---	-----------------------------	-----------	---------------------------------------	---	-----------------------------	--------------	-------------------	---	-------------	--	-----------------------------	------------------	--	--	-----------------------------



日再	荳蔻散 出宣明論 治脾胃受濕濡泄不止而腸痛滑利	肉荳蔻 去殼炮五枚 甘草 炙剉一兩 厚朴 去粗皮薑汁炙一兩半	右為散每服二錢米飲下或湯調下食前溫服	猪苓丸 出聖濟總錄 治腸胃寒濕濡泄無度嗜困不食	猪苓 去黑皮半兩 肉荳蔻 去殼炮二枚 黃蘗 去粗皮炙一兩	右為末米飲丸菴豆大每服十丸食前熟水下	附子丸 出聖濟總錄 治濡泄不止或冷痢無度	欽定四庫全書 普濟方	附子 炮裂去皮臍 高良薑 各一兩 甘草 炙剉一分	右為末陳米煮糊丸如桐子大每服二十九米飲下	不拘時候	樗根丸 出聖濟總錄 治濡瀉裏急後重數走圜	樗根皮 剉一兩 甘草 炙剉一兩 枳殼 去穰麩炒半兩	右為散每服二錢粥飲調下食前一服止	戊巳丸 出濟生方 治脾胃不定濕熱乘之泄瀉不止米穀	腸鳴腹痛 方見本門諸瀉類
-----------	---	--	---------------------------	---	--	---------------------------	--	-------------------	--	-----------------------------	-------------	--	---	-------------------------	--	------------------------------------



對金飲子 出濟生 拔萃方 治瀉泄	平胃散 錢五 錢五 五苓散 二錢 半 草薺 熟半兩	右相和勻作四服生薑三片棗二枚水煮	白朮芍藥湯 出保 命集 治太陰脾經受濕水泄注下體重	微滿困弱無力不欲飲食暴泄無數水穀不化宜此	和之	白朮 芍藥 各一兩 甘草 錢五	右剉每服一兩水二盞煎至一盞溫服清如痛甚者	欽定四庫全書 普濟方	宜蒼朮 芍藥湯	蒼朮芍藥湯 出保 命集	蒼朮 一兩 芍藥 一兩 黃芩 半兩	右剉每服一兩加淡味桂半錢水一盞半煎一盞溫	服清如脉弦頭微痛者宜蒼朮防風湯	蒼朮防風湯 出保 命集	蒼朮 防風 各二兩	右剉同前煎服如下血者宜
--	---	-------------------------	---	-----------------------------	-----------	--	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	-----------------------------	------------------------	---	---------------------------------	--------------------



蒼朮地榆湯 出保命集	蒼朮 二兩 地榆 一兩	右剉同前煎服	已上証如心下痞每服各加枳實一錢如茯苓加	二錢由小便不利用如腹痛漸已瀉下微少宜訶子	散止之法云大勢已去而宜止之	附子丸 出聖濟總錄 治寒濕濡泄久不瘥	附子 一兩炮裂去皮臍 甘草 炙剉二兩	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸空心生薑	湯下日再	厚朴湯 一名黃連丸出聖濟總錄 治傷濕濡泄不定亦治水穀痢	久不瘥	吳茱萸 湯洗三五遍一分 赤芍藥 半兩 肉苳蔻 四枚 檳榔 剉四	枚	右搗羅為散每服三錢用不經水猪肝四兩去筋膜	批為薄片重摻藥置一鼎中入漿水一椀□半合蓋
----------------------------------	--	---------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------	--	---	-------------------	------------------------------	-------------	---	------------	--	----------	-----------------------------	-----------------------------



人參湯 療中焦虛寒洞泄補虛		人參 三兩 甘草 三兩 黃芩 二兩 當歸 三兩 茯苓 四兩 芎藭 三兩 厚	
所為丸梧桐子大每服五十丸空心米飲下		川椒茴香大麴焙乾為末均和煎藥以猪肚杵和得	
一兩大麴二兩入猪肝內用線縫定酒醋煮爛取出		右為末用猪肝一隻淨洗以川椒一兩去目茴香	
桂心 各一兩		肉苳蔻 煨 華撥 禹餘糧 火煨 醋汁 丁香 礞砂仁	
川烏 炮 附子 炮 各二兩 乾薑 炮 白朮 厚朴 各一兩 半 良薑		生薑棗煎服空心仍服此猪肚丸	
猪肚丸 出危氏方 治臟寒泄瀉先用製成厚朴附子二味		即補骨脂	
一方為丸桐子大每服十丸粥飲下一方用破故紙		瀉不效此是逐下冷氣少時自止渴即以粥湯飲之	
許拍破同煮水欲盡空心為一服如服令食之初微		覆煑肝熟入鹽秤用一錢葱白三莖細切生薑彈子	



朴四兩 乾薑四兩 粟米二升	右切以水一斗五升煮米取熟去米澄取七升下諸藥煎取三升分三服忌海藻菘菜大酢等物	訶梨勒丸出和劑方 治腸胃虛冷內受風冷水穀不化泄瀉注下腹痛腸鳴胸滿氣短又治腸胃積寒及冷純白或有青黑日夜無度及脾胃傷冷暴瀉手足逆冷脉欲絕並宜服之	訶梨勒皮 川烏頭炮去皮臍 硝砂仁 白礬煨各四兩	欽定四庫全書 普濟方	木香 肉荳蔻炮去皮 乾薑炮各二兩 龍骨洗 赤石脂各八兩	右為末用粟米飲為丸梧桐子大每服二十丸至三十丸溫粟飲下食前服甚者加倍丸數一方有附子	無砂仁	木香散出和劑方 治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下米穀不化臍下痞痛腹中雷鳴胸膈痞悶脇肋虛脹及積寒久痢腸滑不禁肢體羸困不進飲食	寒久痢腸滑不禁肢體羸困不進飲食
---	--	--	--	-------------------	--	---	------------	--	------------------------



木香 當歸去蘆 肉荳蔻仁 炮甘草 丁香各二兩 赤石脂十兩 附子去皮臍醋炙切作片 焙乾十兩 藿香葉先焙四兩 訶梨子皮十五兩 右為末每服一大錢水一盞半生薑三片棗一箇煎六分空心溫服	木香訶梨勒丸出聖濟總錄 治洞泄大腸切痛腸鳴不化食 訶梨勒煨生核三分 木香半生半炒 白朮 桂去粗皮 蕪	荑炒各一兩半 附子炮裂去皮臍 厚朴去粗皮生薑汁炙焦各二兩 良薑	欽定四庫全書 普濟方	甘草炙剉半兩 乾薑炮一分 肉荳蔻去殼一兩	右為末陳麴末煑糊為丸梧桐子大每服三十九煨	生薑鹽湯下	肉荳蔻出聖濟總錄 治脾胃虛寒洞泄注下腹脹腸鳴	肉荳蔻五枚去殼 木香一分 蠋稍炒一錢 橘皮去白炒 乾薑炮	附子炮裂去皮臍 胡椒各半兩	右為末麵糊丸豌豆大每服十五丸米飲下	黃連飲出聖濟總錄 治脾寒洞泄
---	--	---	-------------------	--	-----------------------------	--------------	--	--	--	--------------------------	--------------------------------------



黃連去鬚炒 訶梨勒煨去核 地榆 芍藥炒各半兩 木香	當歸切焙各三分 甘草炙二分	右細剉每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服日	三	七棗湯出和劑方 治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀	不化腹脇脹滿臍腹痞痛心下氣逆腹中虛鳴嘔吐	惡心胸膈痞悶困倦少力不思飲食	茴香去皮炒 川烏炮去皮臍 縮砂取仁各八兩 益智去皮一斤 乾薑	欽定四庫全書 普濟方	炮四兩 厚朴去粗皮薑製一斤	右為粗末每服五錢水一盞大棗七枚同煎七分去	滓溫服空心食前	豆附丸一名桂香丸出和劑方 治男婦腸胃虛弱內受風冷水	穀不化泄瀉注下腹痛腸鳴手足逆冷服諸藥不効	亦治臟腑虛為風濕寒所搏冷滑注下不禁老人虛	人危篤服之	肉苳蔻炮 白茯苓焙 附子炮去皮各四兩 木香不見火 乾薑
---	--	-----------------------------	----------	---	-----------------------------	-----------------------	---	-------------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------	---	-----------------------------	-----------------------------	--------------	--



炮 肉桂去粗皮 各二兩 丁香不見火 一兩	右為細末薑汁麵糊丸梧桐子大每服五十丸至一百丸用薑湯下粥飲亦得空心食前一方或加訶子半兩一方不用木香	茱萸斷下丸出危氏方 治臟腑寒腹痛泄瀉不止甚效	艾葉炒 赤石脂 川薑各半兩 吳茱萸二兩半炒 縮砂仁	肉荳蔻 附子炮去皮臍各一分	右為末麵糊丸梧桐子大每服五七十丸米飲食前	欽定四庫全書 普濟方	下昔趙通判名從簡甲辰年丁母憂食素之久苦瀉日七行首尾幾年每服他藥不過三兩日復作後得此方而愈又數年間遇瀉服之再効	二黃丸出聖濟總錄 治洞泄寒中	黃連去鬚炒 黃蘗去粗皮炙剉 附子炮裂皮臍 烏梅肉炒 乾薑	炮各 甘草炙剉 半兩一分	右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九至五十丸空心米飲下	心米飲下
---	---	--	---	---	-----------------------------	-----------------------	---	--	---	--	---------------------------------	-------------



固腸散 出直指方 治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀	不分冷熱不調下痢膿血赤少白多或如魚腦腸滑	腹痛遍數頻併心腹脹滿食減少力並宜服之	陳米 炒二兩 木香 不見火一兩 肉荳蔻 生用 罌粟殼 去蒂蓋蜜炙二	兩 乾薑 炮 甘草 炙各二兩半	右為細末每服二錢酒一盞生薑二片棗一枚煎至	七分溫服不計時如不飲酒水煎亦得忌酒麵魚鮮	等物	欽定四庫全書 普濟方	加味三建湯 出危氏方 治洞泄不止	大川烏 綿附 天雄 三味並炮鹽水浸去皮臍 木香 肉荳	蔻 炮裂訶子一兩 去核各	右剉散每服三錢生薑十片紅棗二枚鹽梅一箇陳	米一撮同煎空心熱服未效仍服來復丹	溫中丸 出聖濟總錄 治脾胃虛寒洞泄不止四肢逆冷心	腹疝痛	肉荳蔻仁 硫黃 研 乾薑 生用 附子 炮裂皮臍 龍骨
--	-----------------------------	---------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------	--	--	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	------------	--



右為細末麵糊丸梧桐子大每服三十丸食前艾葉湯下	厚朴乾薑丸 出聖濟總錄 治脾胃虛冷洞泄不止 厚朴 去粗皮生薑汁炙三兩 乾薑 附子 炮去皮臍 白朮 各一兩	訶梨勒皮 三分 右為細末醋煮麵糊丸梧桐子大每服二十丸至三十丸空心食前熱米飲下日三	烏梅丸 出聖濟總錄 治大腸洞泄水穀入即注下	欽定四庫全書 普濟方 烏梅肉 炒四兩 附子 炮去皮臍 黃連 去鬚炒五兩 乾薑 炮二兩 肉	荳蔻 去殼五枚 右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸米飲下	黃連阿金湯 出千金方 治洞泄水穀注下亦治熱痢 黃連 去鬚 阿膠 炙燥 烏梅肉 炒各二兩 山梔子仁 三十枚 黃蘗	去粗皮剉一兩 右搗篩每服五錢水一盞半煎八分空心食前溫服	日二
-------------------------------	--	---	---	--	---	--	--	-----------



附子丸 出聖濟總錄 治洞泄寒中注下水穀或痢赤白食	入即出不消兼治膿血痢	附子 炮裂皮臍 烏梅肉 炮乾各一兩 乾薑 炮一兩 黃連 去鬚炒二兩	右為末蜜煉丸梧桐子大每服五十丸空心米飲下	日晚再服	如神散 出聖濟總錄 治洞泄不拘冷熱注下不止	附子 炮去皮臍 白朮 椎碎用漿水煮半日焙乾各一兩 甘草 炙 乾薑 炮各	兩半	欽定四庫全書 普濟方	右為散每服一錢空心米飲調下如熱瀉新汲水調	下	天仙子丸 出聖濟總錄 治大腸洞泄不止	天仙子 乾薑 炮 陳橘皮 湯浸去白焙各一兩 訶梨勒 一兩	右為粗末用醋拌勻一宿炒令黃色再為細末醋煮	麵糊和丸桐子大每服二十九丸食前米飲下	紅豆散 一名玉粉散衛生寶鑑方 治洞泄寒中注下不禁不思	飲食
--	-------------------	--	-----------------------------	-------------	---	--	--------------------------	-------------------	-----------------------------	----------	--	--	-----------------------------	---------------------------	--	-----------



紅豆揀 乾薑炮 硫黃細研 附子大者炮去皮	右為散每服一錢空心溫粥飲下再服當愈	荳蔻附子散出聖濟總錄 治脾胃久寒大腸虛滑洞泄	肉荳蔻仁麵炮熟 附子去皮臍剉鹽炒 縮砂去皮各半兩 木香半	右為散每服一錢食前米飲調下	丁香散出王氏博濟方 治脾胃冷洞泄	丁香二錢 厚朴去粗皮生薑汁炙半兩 檳榔一枚剉 肉荳蔻去殼二枚	煨麵包	欽定四庫全書 普濟方	右為末每服二錢熱粥飲調下一方粥飲煎三兩沸	溫服以少許清粥飲衝下	黃連當歸湯出聖濟總錄 治洞泄中水穀不化	黃連去鬚 當歸切焙 甘草炙剉各二兩 酸石榴皮剉炒四兩	右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓空心食前	溫服	荳蔻湯出聖濟總錄 治洞泄不止	肉荳蔻七枚去殼 烏豆 白朮各一兩
---	--------------------------	--	---	----------------------	--	---	---------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------	---	---	-----------------------------	-----------	--------------------------------------	---



右用油四兩先煎後三味後白朮黃色烏頭外裂裏	黃取出烏頭去皮臍入肉荳蔻三味剉如麻豆每服	三錢水一盞煎八分去滓空心食前稍熱服	火輪散 出聖濟總錄 治脾胃氣寒大腸虛滑日夜不止 見方	本門冷痢類	木香丸 出本草方 治氣冷下瀉	木香 半兩 川烏 一兩生	右為末醋糊丸桐子大陳皮湯下三五十丸	欽定四庫全書 普濟方	來復丹 出德生堂 治配類二氣均調陰陽奪天地冲和之	氣乃水火既濟之功可冷可熱可急可緩補損扶虛	善理榮衛養心腎上實下虛氣悶痰心腹疼冷臟腑	虛滑不拘男女老幼危急但有胃氣無不獲安	硫黃 用甘草熬水酒潤細研 硝石 細研用厚朴水酒潤各半兩	右和勻一處同淹少時用砂銚於文武火上炒令交	搗氤氳相結取去埋土中去毒氣却碾為末用糯米	糊為丸如黃豆大每服三五十丸濃米湯空心服
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---	-----------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------	-------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------



治卒暴冷下下部疼痛	用燒磚令熱大酢沃之三重布覆坐上即瘥	附子湯 出聖濟總錄 治洞泄不止兼治霍亂	用附子一枚重七錢炮去皮臍細切分二服每服水	一盞鹽半錢煎至六分去滓溫服	建脾湯 一名建脾散出聖濟總錄 治寒中洞泄不止及年高久瀉	方見諸瀉痢於本門	洞泄方 出直指方	欽定四庫全書 普濟方	用車前子末米飲下	木附湯 出直指方 治洞泄	白朮 兩 蒼朮 各二兩 芍藥 三兩 茯苓 四兩 附子 一各 乾薑 一各	兩	右為粗末每服五錢水二盞煎一盞去滓溫服	木附丸 出指南方	白朮 兩 附子 各一兩 橘皮 二兩	右為粗末煉蜜丸梧桐子大每服三十九米飲下
-----------	-------------------	------------------------------------	----------------------	---------------	--	-------------------------	-------------------------	---------------	----------	-----------------------------	---	------------------	--------------------	-------------------------	--	---------------------



薑附湯 出指 南方 治陰寒暴下	乾薑 三兩 附子 三分 甘草 一兩	右咬咀每服五錢水二盞煎一盞去滓溫服	金液丹 出指 南方	用好硫黃一斤研用一甕瓶內盛令七分滿以瓦子	蓋口通用鹽泥固濟日乾用磚砌作爐中心掘地安	一罐子合口與瓶底相當滿盛水去口一指許坐藥	瓶在上將熱炭火下在爐內蓋藥罐子可厚三五寸	欽定四庫全書 普濟方	每日用熟炭一斤簇著瓶却以熟炭連大蓋子更用	磚蓋爐子如此七伏時撥去候打開色赤黃為上其	滓石盡澄在下刮去細研為末以浸蒸餅丸如梧桐	子大每服五十丸至百丸空心米飲下	白食不消者為寒不療方 出肘 後方	黃連 一兩 甘草 炙 附子 炮 阿膠 炙各 半兩	右水三升煮一分為再服	附子赤石脂丸 出楊氏 家藏方 治老人虛人腸胃虛寒洞泄
---------------------------------------	---	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--	---	-------------------	--



不禁	附子炮去皮臍取末一兩赤石脂研細一兩	右件拌勻醋煮麵糊為丸梧桐子大每服五十丸食	前溫米飲下	薑朴丸出鮑氏方治中寒洞泄	乾薑 厚朴等分	右為末蜜丸任下三十丸	朴附丸出朱氏集驗方厚腸胃止寒泄助元氣進飲食兼治	欽定四庫全書 普濟方	脾腎氣弱手足浮腫	川椒去目茴香各二兩青鹽一兩附子四兩去皮生用切作片子生厚	朴 生薑各四兩	右用水三升於銀器內慢火煮水盡為度焙乾為末	煮糊為丸	蒜黃壯脾丸出朱氏集驗方	厚朴 蒼朮 白茯苓各二兩陳皮七錢甘草二錢半訶	子一兩附子 川烏各一兩生薑半斤棗子五十枚大蒜十箇
-----------	--	-----------------------------	--------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------	---	-----------------------	-----------------	--	-------------------------------	-----------------------------	-------------	-----------------------------------	--	--



去皮
糞爛

右細末神麴和丸每服百十九丸空心米飲鹽湯任下

諸痢
附論

夫一切痢者謂痢無定或米穀或膿或血或青或黃或赤或白變雜無常或雜色相兼而痢也夾熱則黃赤熱甚則變膿血也冷則白冷甚則青黑皆由飲食不節冷熱不調胃氣虛弱故變色也 治痢要訣痢出於積滯積物積也滯氣滯也物積欲出氣滯而不與之出所以

欽定四庫全書

普濟方

下墜裏急乍起乍止日夜凡百餘度病家所請莫不求其止孰知物積氣滯有如是之証耶世人但見有上項証候不論色之赤白脉之大小一皆通利行之物即用巴豆大黃輩氣滯用枳殼桔梗青皮蓬朮輩二者兼濟必能收功其間佐以黃連阿膠丸效驗尤著者蓋痢疾多因伏暑食熱酒麵炙煇醞釀而成其阿膠尤大腸之要藥有熱毒流滯則能疎導無熱毒流滯則能平胃市肆或無丸子即以阿膠當歸青皮赤茯苓黃連作劑



入烏梅濃蜜同煎最能蕩滌惡穢積滯既去遍數自踈 嗣是却以木香茯苓礪砂白荳蔻陳皮甘草調之自然 喜食食則糟粕入於大腸然後真人養臟湯易簡斷下 湯可止	方	增損建脾丸 出千金方 治丈夫虛勞五臟六腑傷敗受冷	初作滯下以則變五色赤黑如爛腸極臭穢者羸瘦	身重胃冷飲食不消洩瀉不止	欽定四庫全書 普濟方	鍾乳粉 三兩 赤石脂 三兩 礪石 乾薑 茯苓 桂心	五味子 澤瀉 遠志 寄生 栝子仁 白	頭翁 人參 天雄 當歸 石斛 石榴皮	牡蠣 龍骨 甘草 各二兩	右為末蜜丸酒服二十丸加至三四十丸此一方止	痢神効	水煑木香丸 出御藥防方 治脾胃受濕臟腑滑瀉腹痛	日夜無度腸鳴水聲每欲利時裏急後重或下赤黃
---	----------	--	-----------------------------	---------------------	--	--	---------------------------	---------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------	---	-----------------------------



或便膿血也並宜服之	木香 去鬚 丁香 訶子皮 當歸 藿香葉 黃連	生薑製各一兩 厚朴 青皮 去白 白芍藥 陳皮 去白 甘草 炙	枳實 炒 乾薑 炮 乳香 肉苳蔻 砂仁 各一兩 御	米穀 蜜水拌炒 黃色六兩	右為細末煉蜜丸彈子大每一丸水一大盞煎至七	分和滓稍熱食前服	治痢仙方 調曰八利臨終事可危仙方等分與君醫	欽定四庫全書 普濟方	三香止痛尤為妙四白和中不可虧甘枳更加罌粟	殼訶榆全藉石榴皮半夏厚朴黃連橘救苦端教在	片時	丁香 沉香 木香 白朮 白芷 白茯苓	白芍藥 甘草 枳殼 訶子 地榆 酸石榴	皮 半夏 厚朴 黃連 陳皮 罌粟殼 蜜炙	右等分一錢作五服白加生薑煎赤加烏梅煎	諸痢患無新舊如藥療之暫瘥還發此即縱以新藥止
-----------	---------------------------------------	---	--	-----------------------------	----------------------	----------	-----------------------	------------	----------------------	----------------------	----	--------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------



之終存其根本由腸胃中冷熱不調病根固結必須湯藥滌之以洩病勢痢後更以藥物補助之有此候者依後附子等六味湯以利之後服高良薑十味散以補之										
附子	炮	細辛	甘草	炙	人參	各二兩	乾薑	三兩	大黃	五兩
右切以水七升煮取二升四合去滓分三服溫服如人行十里以服此湯當得快利痢中有惡物如魚腦狀或如桃李但異於常利勿怪之將息經三四日										
欽定四庫全書										
普濟方										
宜合後高良薑等十味散之										
高良薑		細辛	黃耆		白朮		苦參	各五兩	丁香	
二人參	二兩	乾薑	各四兩	荳蔻子	三兩	赤石脂	六兩			
右藥為散以飲下之初服一方寸日再服之稍加至二三忌生菜桃李雀肉等										
神應散	出危氏方	治痢緊嚴絕妙								
金罌草	梗	肉荳蔻	訶子	地榆	甘草	罌粟				
殼	去蒂	當歸	去尾	茯苓	白朮	枳殼	去穢	烏梅	各一兩	



丁皮 木香 住痛各五錢 陳皮 一兩取紅生血若紅痢不用	右為丸或末五色痢用春茶陳皮煎湯下如是末用蜜一匙春茶烏梅煎服	加減木香煑散 出危氏方 治一切痢神效	木香 甘草 當歸 肉荳蔻 人參 官桂	楊芍藥 訶子 烏梅 去核 阿膠 碎粉炒 白茯苓 各五錢	罌粟殼 一兩半去蒂蜜炒	右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚同	欽定四庫全書 普濟方	煎去滓空心服	大斷下丸 治下痢滑數肌肉消瘦飲食不入脉細皮	寒氣少不能言有時發虛汗由脾胃虛耗耗則氣奪	由穀氣不入胃胃無主以養故形氣消索五臟之液	不收謂之五虛此為難治要能食者生及臟腑停寒	臍腹痞痛	附子 炮 肉荳蔻 麵包煨 牡蠣 煨秤各一兩 細辛 去土蒂七錢半乾	薑 炮 白龍骨 研 赤石脂 研 酸石榴皮 醋煑乾各一兩
---	--------------------------------------	--	---------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------	---	--



半 良薑去蘆一兩半 白礬枯訶子一兩 各	右為末醋糊丸梧桐子大每服三十丸粟米湯下一方白湯下無白礬訶子	加減平胃散	白朮 厚朴 陳皮各一兩 甘草七錢 檳榔 木香各一兩	兩半 桃仁 黃連 人參 阿膠 白茯苓各半兩	右為細末同平胃散煎服如血多加桃仁如熱泄加黃連如小便澀加茯苓如氣不下後重加檳榔如膿	欽定四庫全書 普濟方	加阿膠如腹痛加芍藥甘草如濕多加白朮如脉洪加大黃四時以胃氣為本以下血則脾胃虛損血不流於四肢入於胃以致血痢	治痢如聖散 治一切痢疾無問久新或赤白或赤白相雜日夜無度悉能治之紹熙壬子浙東提舉黃郎中施此藥頗有效驗	當歸 地榆 縮砂仁 赤石脂 陳皮 甘草	乾薑 訶子肉 石榴皮 罌粟殼各等分
--	--------------------------------------	--------------	---	---	---	-----------------------	--	--	----------------------------	---



右為麤末三錢重作一服水一盞入烏梅一箇煎至	七分去滓赤痢冷服白痢熱服赤白痢溫服年高娠	婦小兒皆可服忌生冷油膩物	斷痢湯 治胸心下伏水	半夏 升一 生薑 兩五 茯苓 甘草 龍骨 兩各一 附子 兩一	人參 黃連 兩各三 大棗 枚十二	右咬咀以水八升煮取三升分三服	治諸痢及赤白痢不瘥羸瘦	欽定四庫全書 普濟方	用鼠尾草煮汁服亦末服粥飲調下一方赤下用赤	花白下用白花尤佳	治痢方	用生鷄子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取鷄子	白攤徧連紙日乾摺作四重包撮烏梅安熨斗中用	白炭火燒乘烟將盡時以碗蓋覆候冷研令極細入	水銀粉少許和勻如大人患分為二服小兒分為三	服不拘赤白痢空心井花水調服如覺臟腑微有疎
----------------------	----------------------	--------------	------------	--	--	----------------	-------------	---------------	----------------------	----------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



利更不要須再服		玄青丸 治下痢勢惡頻併窘痛或以不愈諸藥不能		止須可下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣液宣行		者宜以通之兼宣利積熱酒食積黃瘦中滿水腫腹		脹兼治小兒驚疳積熱乳癖諸証唯洩瀉者勿服		黃連 去 黃蘗 大黃 甘遂 芫花 醋拌 大戟 各		兩 牽牛 四兩取末二兩 輕粉 二錢 青黛 一兩		右為末勻水丸小豆大初服十丸後每服加十丸空		欽定四庫全書 普濟方		腹日午臨卧三服以通利為度後常服十五二十九		數日後得食以病未瘥除者再加取痢痢後却常服		以意消息病去為度後隨証用之小兒丸如黍米大		或麻子大退疳驚熱積不須下者常服十丸 昔一人		能清利頭目寬膈美食使鬚髮遲白以用亦能黑鬚		髮固牙齒使衰老氣革於面而手足陽明經絡貫注		之憂思則氣結而血液不行燥熱拂鬱而血衰不能		榮養故早蒼黃鬢白此藥能使陽明氣血宣通效		輕粉 粉霜 礪砂 研 雄黃 研 硃砂 信砒 巴		豆 去皮各 黃丹 三錢 蠟 三錢	
---------	--	-----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	---------------------	--	---	--	---	--	----------------------	--	------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	--------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--	------------------------------------	--	---	--	---	--



右先研粉霜次旋入礪砂研細下雄黃硃砂信砒再 研下丹粉研勻別研巴豆爛為油與前藥研勻近火 上炙控熱別研蠟軟入藥勻搓作劑旋丸小豆大新 水下一丸小兒黍米大或止吐瀉痢疾調桂苓甘露 散或益元散亦得	秘方養臟湯 治五色痢經驗	陳皮去白枳殼去穰黃連去鬚南木香 烏梅去核 嬰	粟殼去蒂膜蜜炙一兩厚朴去粗皮薑汁炙杏仁去皮尖甘草各五錢	欽定四庫全書 普濟方	右剉散五色黑豆棗子煎紅痢生地黃春茶甘草節 煎服五色以不效加龍骨赤石脂人參楊芍藥一兩 為末蜜丸烏梅甘草湯下粟米飲亦可	乳香散 治痢疾重者數服止	人參 白朮 當歸 地榆 阿膠各一兩 蚌粉炒黃	甘草各一錢 乳香 肉苳蔻二箇麵煨	右剉散每服三錢以水一盞煎七分去滓溫服仍兼 服來復丹
--	---------------------	---	--	-------------------	--	---------------------	---	---	---



地榆散 治大人小兒脾胃氣虛冷熱不調下痢膿血	赤多白少或因腸胃乘虛為熱毒所滲下痢純血臍	腹疼痛裏急後重口燥煩渴小便不利純下鮮血或	先經下痢不應服熱藥誤服熱藥蘊毒不散積於腸	間滲而成血者並宜服之	地榆 炒 乾葛 各半 茯苓 去 赤茯苓 各六 乾薑 炮二	當歸 去苗 甘草 炙四 罌粟殼 蜜炙十	右為末每服二錢用溫熱水調下不拘時小兒三歲	欽定四庫全書 普濟方	可服半錢更量歲數加減與之若下痢純白或下紫	黑血腸滑不禁者不可服	黑虎丹 治痢疾不止者	用十二月殺的猪膽可收一百之上將雄黃豆裝入	膽內麝香少許陰乾看人大小每服五七粒為細末	如紅痢甘草湯下如白痢生薑湯下	獨神丸 治一切赤白痢不問新久百藥不效者 一名獨聖	丸
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	---	--	----------------------	---------------	----------------------	------------	------------	----------------------	----------------------	----------------	---	---



用罌粟殼十兩分作三分一分生用去蒂萼及穰一分醋炒一分蜜炙為末用蜜丸小指頭大紅痢生地黃春茶煎湯嚼下白痢烏梅甘草節但為末二錢陳米鹽梅湯亦効一方薑煎一方用米醋一盞且炙且蘸候盡色黃為度焙乾研為末煉蜜丸彈子大每服一丸水一盞入生薑如指面大一塊搥破煎八分通口服

檮白皮散 治下痢諸藥不效

欽定四庫全書

普濟方

用檮白皮一握粳米五十粒葱白一握甘草一二寸豉二合水一升取半升頓服小兒量大小加減

陟釐丸 治百病下痢及傷寒身熱頭痛目赤四肢煩疼不解協熱下痢或醫已吐下之腹內虛熱煩欲得冷飲食不能消腹中急痛溫食則吐乍熱乍冷狀如瘟疫或小便不利氣滿嘔逆下痢不止

水中陟釐兩五厚朴兩一漢中木防已兩六黃連兩三隴西

當歸兩四紫石英兩三三歲醇苦酒升五上好豉升三



右皆取真新者以苦酒二升漬防已極令潤出之留
苦酒置以利刀切防已厚令一分使厚薄悉等以板
瓦覆着炭火上以厚紙藉瓦上布滿取防已以着紙
上訖從頭依次翻周而復始令色槁燥復投向餘苦
酒中更出着瓦上焙之如此盡苦酒止勿令火猛徐
徐焙冷極燥各搗下篩畢都合搗千杵以餘三升苦
酒漬鼓一宿明旦以瓦盆盛之以一盆覆之蒸五升
上下湏土氣通流熱出之於盆中研鼓以新布絞取

欽定四庫全書

普濟方

濃汁如棗膏法以和藥搗三千杵頓為丸皆如水中
鷄頭子大分着數囊中懸令陰乾取燥乃更盛着函
以蠟密封其際勿令見風塵此藥三丸為一劑平旦
井花水服一劑晝服一劑暮服一劑皆水服之初服
寧少食當於未食前服藥若飲食消腹中調和者日
可一服若已瘥三二日可一服消息以意若病重藥
力未行者但益服之日可四五劑或時下不止者當
復更增令腹中有藥力飲食消是其效也新服藥未



安調當水飧助藥力心中了然後可作羹臠但當冷
食之耳若有時不喜冷食者正是藥力盡耳復益服
藥至一宿許則復欲盡冷也若欲不復藥者但稍溫
食藥力自盡矣服藥不必強多飲水自隨體調耳从
虛服之如法禁熱食生魚肉蒜生菜酒緣酒力發藥
力令病者煩熱也又禁腥物及諸肥膩難消物皆莫
食若有風病加防風一兩人虛可加石斛一兩若宿
有下痢脾胃損弱者可加太一餘糧二兩半取石中

欽定四庫全書

普濟方

黃軟者若婦人產後疾加石硫黃二兩小便黃赤不
利加蒲黃一兩依方消息之無不得效 胡治云舊
有五石赤石脂白石英鍾乳礬石并禹餘糧石各
四兩常以二目合之泊宅編云姚祐自殿監遷入座
母夫人病痢諸藥不效令李昂筮甄革有真人指靈
草語之一日登對上訝其色悴具以寔奏詔賜一散
子數服而愈久乃知椿莢子一味為末耳余檢本草
椿莢主大便下血今處處有之夏中生莢樗之有花



者無莢有莢者無花常見生樗上未見椿有莢者然 世俗不辨椿樗之異故俗皆以此為椿莢其寔樗莢 耳注云樗皮主再痢日華子云樗皮溫無毒止瀉及 脚風入藥時用蜜炙藥性論云樗白皮之性號微熱 無毒能治赤白痢腸滑痔疾瀉血不止下白利成血 後不行足	治大人丹痢出本	用紅蜀葵葉搗汁服之可恐腹痛即煖飲之	欽定四庫全書 普濟方	白馬骨出本 治水痢	以白馬骨莖葉煮汁服	主水痢不問冷熱出本	取松楊皮濃煎令黑冷服一升瘥	治水痢出本 方見本門冷痢類	止水痢後渴不止出本	以赤瓜實汁服之	治水痢出本
---	-------------------------------	--------------------------	--	--	------------------	---------------------------------	----------------------	--	---------------------------------	----------------	-----------------------------



以葎草煮汁及生汁服之	瀉腹止瀉 草 出本	以橡斗子煮食之亦可止飢	主水痢 草 出本	以探子生食之	九盞湯 草 出本 主下痢不問冷熱赤白畧帶休息久下	悉主之	以黃連長三寸三十枚秤重一兩半龍骨如棊子四	欽定四庫全書 普濟方	枚重四分附子大者一枚薑一兩半並切先以水五	合着銅器中去火三寸煎沸便下著土上沸止又添	水五合如此九上九下內諸藥著火上沸轍下著土	上沸止又復九上九下度可得一升頓服即止	張仲景治痢紫參湯 草 出本	用紫參半升甘草二兩以水五升內甘草煎取半升	分溫作三服	斷下藥
------------	--------------------------	-------------	-------------------------	--------	--	-----	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------------------------	----------------------	-------	-----



以酸石榴皮須老木所結及陳久者微炙為末以燒粟米飯為丸梧桐子大食前熱米飲下三十至五十丸以知為度如寒滑加附子赤石脂各一倍	治下痢心胸滿腹不快腹中雷鳴或嘔吐 黃連 橘皮 甘草 龍骨 生薑 半夏 各二兩 人參 大棗 十五枚	右呖咀以水一斗先煮一大沸內藥煮取三升分四服並妊娠良	欽定四庫全書 普濟方	阿膠梅連丸 治下痢不問久新赤白青黑疼痛諸症 金井阿膠 淨草灰炒透明白別 研不細者再炒研細 烏梅肉 去核 炒 黃蘗 黃連 當歸 赤芍藥 乾薑 赤茯苓 劉炒 焙 各等分	右為末入阿膠研勻水丸桐子大溫米飲下十九食前夜五六服小兒如菴荳大忌油膩物	痢藥乳香散	白梅 灰 一兩 燒 棗子 灰 一兩 燒 罌粟殼 灰 一兩 燒 訶子 灰 半兩 燒
--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---	--	--------------	---



右為細末每服一二錢水一小盞乳香黑豆大一塊
同煎七分不拘時溫服

治痢方

用蠟茶細末不拘多少白梅和丸赤甘草湯下白痢
烏梅湯下泄瀉不止陳米飲下每服二十九團茶尤
佳大凡痢疾不問赤白當先辨冷熱之異若手足和
暖則為陽當先服五苓散粟米飲調下次服感應丸
二十粒即愈若手足厥冷則為陰當服暖藥如已寒

欽定四庫全書

普濟方

丸附子之類如此治痢無不效有人夏月患痢一日
六七十行用五苓散立效

木香散 治痢疾腹痛

南木香錢五地榆兩一黃連錢七青皮去穢赤芍藥 枳殼
煨去乳香 甘草各五錢

右為末每服二錢熱湯調服

酸石榴皮散 治一切痢不問赤白或一日之間一二

百行一服便踈再二三服即愈



石榴皮 陳皮 甘草 川當歸 罌粟殼去蒂 各	兩半	劉散用水十盞煎取三盞次用下藥	茯苓七錢 粉草七錢 北五味子七錢筒作	右為末將前藥汁入此三味再煎五七沸去滓空心服甚者不過兩劑輕者一劑立效	治痢如神	烏梅七筒 楮實子七筒 甘草七寸 杏仁七枚 米殼七筒 雄黃豆	欽定四庫全書 普濟方	粒四十 棗七筒 生薑七片	右咬咀水煎無時服之	治一切痢無效宜服此藥	巴豆五七枚去皮心 桃仁二十枚去皮尖熬炒令黃 硃砂一分 硫黃一分 砒霜一分 麝香一分	二十枚去雙仁湯浸	錢半	右同研令細用軟飯和丸菴豆大每服以粥飲下三	丸忌食熱物
---	-----------	-----------------------	--	--	-------------	---	-------------------	---	------------------	-------------------	--	-----------------	-----------	-----------------------------	--------------



遇仙立效散 治諸般惡痢或赤或白或濃淡相雜裏	急後重臍腹絞痛或下五色或如魚腦日夜無度或	噤口不食未問大人小兒虛弱老人產婦並宜服此	御米殼 去蒂蓋 川當歸 洗 甘草 各二兩 赤芍藥 酸	石榴皮 地榆 闕	右為粗散每服三錢水一盞半煎七分去滓空心溫服小兒量歲數加減以瘥為度忌生冷油膩腥臊等物一方赤茯苓北棗等分	欽定四庫全書 普濟方	黑豆散	小黑豆 炒 川棟子 烏梅 甘草 乾薑 罌粟	殼 三箇去蒂穰	右剉散煎七分將紗濾過澄自然汁空腹服	治大人小兒痢疾	胡椒 甘草 米殼 葱白 乾棗 杏仁 竹	葉 七片	右咬咀水煎服之神效
-----------------------	----------------------	----------------------	---	-------------------------	--	---------------	-----	--------------------------------------	------------------------	-------------------	---------	---------------------	---------------------	-----------



又方 治暑毒濕氣下痢	右用雄黃一味乾蒸研為末甘草調服即效	如聖飲 治痢	檳榔 兩半 大附子 兩半 甘草 兩半 地榆 兩半 陳橘皮 二錢去白	右為粗末每服半兩作一服水一盞半紫蘊莖舊者	一二寸煎至一盞空心食前熱服留滓再煎如瀉不	止必多服屢試皆效	救命延年男婦一切重痢	欽定四庫全書 普濟方	黃連 兩六 乾薑 川當歸 阿膠 兩各三	右為末米醋煮阿膠令消盡量藥多少令醋恰好不	可剉將藥末搜醋丸梧桐子大每服二十九飯飲吞	下	駐馬丸 主救命延年治男婦一切重痢 方見本門合痢類	消食止痢令人強健及服食未能斷穀者	以橡斗子啖之蓋橡斗子非果穀而最益人氣無氣	而受氣無味而受味常服最有益
------------	-------------------	--------	--	----------------------	----------------------	----------	------------	---------------	---	----------------------	----------------------	---	---	------------------	----------------------	---------------



平補散 治痢後不止手足冷此藥補之溫脾正氣 白朮 甘草 白薑 陳皮 各二錢 茯苓 木香 各一錢	肉荳蔻 三箇 煨	右為末食前空心乃可服鹽湯下一錢日三四服痢	止手足溫食進却住服	金粟湯 治男婦室女小兒一切下痢不問新久冷熱	不調日夜無度臍腹絞痛即痢肢體困倦小便閉澀	不思飲食漸瘦又治傷生冷脾胃虛弱飲食不消腹	欽定四庫全書 普濟方	脹腸鳴泄瀉不止連月不瘥並宜服之	陳皮 去白一分 車前子 炒四兩 乾薑 炮二兩 甘草 炒 嬰粟	殼 去穰蒂蜜 炒各半斤	右為末每服二錢水一盞棗一箇薑二片煎七分空	心食前稍熱服或飯飲調下亦得忌生冷油膩魚鮓	醬等物	治痢疾	黃連 巴豆 去殼各二兩
--	-----------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------	------------------------	---------------------------------------	--------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------	------------	--------------------



右和炒赤色分揀各另研為末以菴豆打糊為丸粟	米大作記認二處各自安頓巴豆末作一處為丸黃	連末別作為丸白痢黃連丸二十粒米湯米泔下赤	痢用巴豆丸二十粒井水下	黃連丸 療痢無問冷熱並主之 一名黃連阿膠丸方見本門白痢類	犀角丸 但是痢服之無不瘥	犀角 屑取黑色文理粗者產后稱佳 宣府黃連 金州黃蘗 赤色緊薄	者 苦參 多買輕搗 川當歸 五物取粉	欽定四庫全書 普濟方	右等分別搗搗了秤和為散空腹爛煮糯米飲和一	錢服之日再忌粘滑生菜油膩	腸風黑散 治榮衛氣虛風邪冷氣進襲臟腑之內或	食生冷或啖炙燂或飲酒過度積熱腸間致使腸胃	虛弱糟粕不聚大便鮮血臍腹疼痛裏急後重或肛	門脫出或以患酒痢大便頻併並皆療之	敗櫟 燒 木饅頭 燒 烏梅 去核 甘草 炙各二兩	右為細末每服二錢水一盞煎至一盞空心溫服
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	--	---------------------	---	--	-------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	---	----------------------------



治痢	紫苑 桔梗 赤芍藥 白朮 已上各等分	右為細末每服三五錢細切羊肝拌之作麵角兒燒服之白湯送下	食前蒼朮芍藥湯 治痢疾痛甚者	蒼朮 一兩 芍藥 一兩 黃芩 桂 各五錢	右剉每服一兩水煎	訶子散 如腹痛漸已泄下微少宜止之	欽定四庫全書	普濟方	訶子皮 一兩生熟各半 木香 半兩 黃連 三錢 甘草 炙各二錢	右為細末每服二錢以白朮芍藥湯調下如止之不	已乃內有餘邪訶子散內加厚朴一兩竭其邪氣也	若泄久不愈者多傳變為痢疾太陰傳至少陰是為	鬼邪先以厚朴枳實湯防其大變	黃連阿膠湯 治毒痢及腸蠱注下血如豚肝心煩腹	痛又脉或大或小浮熖而起下血如豚肝五內切痛	此或因服五石湯丸逼損氣甚則血自百脉經絡而
----	-----------------------------------	----------------------------	----------------	---	----------	------------------	--------	-----	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------------------	----------------------	----------------------



末注下甚蠱毒此為難治	阿膠炒一兩 黃連二兩 黃栢炒一兩 梔子仁半兩	右為粗末每服四錢用水一盞煎七分去滓服不拘	時	聖棗子出醫方集成 治一切下痢臍腹痞痛	木香二錢半 乳香別研各一錢 沒藥別研各一錢 肉荳蔻二枚 麝二枚	右為末每服一錢大乾棗一枚去核先入一半藥末	在內次用水浸巴豆半粒再入藥末半錢合定用油	欽定四庫全書 普濟方	餅紙裹一指厚火煨麵熟為度去麵巴豆不用只細	嚼棗藥空心米飲下一方用乳香一兩研肉荳蔻二	兩煨作末陳米糊丸效	猪肝丸出千金方 治下痢腸滑飲食及服藥俱完出者	猪肝一斤 黃連 烏梅肉 阿膠各二兩 胡粉七 棗大	右為末蜜丸梧桐子大酒服二十九日三亦可為散	服方寸匕	郁子丸出危氏方 治痢後風手足不能屈伸或麻痘証變
-------------------	---	-----------------------------	----------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------	--	---	-----------------------------	-------------	---



手足筋急亦能治之	郁李仁 枳殼 川獨活 鼈甲 醋炙	右等分為末木瓜湯調下	治一切痢有效 出聖	寒水石 一分炮去 附子 一分炮去 砒霜 一分 定粉 一分	右都研粉以水浸蒸餅和丸如黍米大每服三九不	拘時以新汲水下忌食熱物	又方 出聖	欽定四庫全書	硃砂 二兩 硫黃 一兩 砒霜 半兩 黃丹 一兩 微炒	右和細研如粉水浸蒸餅和丸桐子大每服以冷飲	下一丸忌食熱物	又方 出聖	巴豆 十枚去皮 硫黃 三分 硃砂 三分	右為細末研如粉以麵糊和丸菉豆大每服以新汲水	下二丸忌食熱物	又方 出聖
----------	---------------------------------	------------	--------------------------	--	----------------------	-------------	----------------------	--------	---	----------------------	---------	----------------------	--	-----------------------	---------	----------------------



白礬一兩 燒灰 硃砂半兩 麝香 錢半	右都研如粉糯米飯和丸如黃米大每服不計時以	二宜湯下十丸	又方出聖惠方	巴豆七枚去皮 心出油 深色臘脂二錢	右先研巴豆末次入臘脂同研令細煮棗肉和丸	黍米大每服以冷飲下三丸小兒一丸忌食熱物	黃丸子出醫方大成 止諸痢	欽定四庫全書 普濟方	黃連八兩 枳殼四兩 大黃四兩 栝皮四兩	右為末麵糊為丸空心飲湯下如裏急後重加枳殼湯	下	參附湯出危氏方	人參 綿附炮去皮 肉苳蔻微火煨裂	右剉散每服二錢水一盞半生薑七片棗二枚煎食	前服	治痢緊嚴絕妙
--	-----------------------------	---------------	------------------------------	--	----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------------	--	------------------------------	----------	-------------------------------	---	-----------------------------	-----------	---------------



金櫻花葉及子 罌粟殼去穰及蒂 醋炒	右為未用蜜丸手指頭大五花痢用春茶陳皮煎湯	如痢用蜜一匙春茶烏梅煎湯服下	香茸丸出危 氏方 治下痢危困氣血衰弱	麝香半錢別研 臨時入 鹿茸刮去皮毛 酥炙一兩	右鹿茸為末方入麝香以燈心煑棗肉為丸梧桐子	大每服五十丸空心食前用米飲下若再添入乳香	半兩尤有效	欽定四庫全書 普濟方	楊梅方 和五臟能滌腸胃除熱潰氣切不可多食甚	能損齒及筋亦能治痢用楊梅燒灰服之	獨聖丸 治痢	用川烏頭一箇好者柴灰火燒烟令盡放地上盞子	合良久細研用酒蠟丸大如麻子每服三丸亦痢用	黃連甘草黑豆煎湯冷吞下如白用黑豆甘草煎湯	放冷吞下如瀉及肚疼水吞下每於空心服之忌熱	物
---	-----------------------------	-----------------------	--	---	-----------------------------	-----------------------------	--------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------



治癆痢及癥瘕甚効 用羊腎合脂為羹以蒜齏食脂一升甚驗	治下痢	用小麥炒粉一合和服斷	治痢藥 出百一 選方	用罌粟殼并去核鼠查子各數枚焙乾末米飲下治	噤口痢鼠查子即糖毬	百水散 出百一 選方 治一切痢不問赤白或一日之間一	欽定四庫全書 普濟方	二百行只一服便踈再三服即愈魏不伐方	罌粟殼 三斤去皮上下蒂頂隔剉 成片子蜜炒令赤色淨秤厚朴 三斤去粗皮淨炒用	生薑汁淹一宿炙 令薑汁盡為度	右為細末每服二三錢米飲調下忌生冷油膩魚酥	毒物三日	三神丹 治痢疾 方見本門 赤白痢類	濟泄丹 治痢疾	巴豆 七粒去 殼膜 丁香 四十箇 二箇 胡椒 四十箇 二箇
---	------------	-------------------	---	-----------------------------	------------------	---	--------------------------	--------------------------	---	--	-----------------------------	-------------	---	-----------------------	--



右藥為末糯米和丸菴荳大每服一丸赤米飲下白	薑湯下赤白薑飲湯送下男婦皆可小者小丸一方	各用一百三十三箇赤痢蜜湯下白痢砂糖湯下	痢疾藥	黃栢 一兩用蜜炙透 巴豆 三錢不去油	右為末滴水為丸梧子大每服三丸赤甘草湯下白	薑湯下小兒一丸心痛艾醋湯熱服氣噎薄荷湯下	治千百種雜下 出肘後方	欽定四庫全書 普濟方	黃連 三兩 烏梅 四十枚	右以水八升煮取四升停冷內鷄子白一枚攪調又	煎取二升分為三服一方下痢熱諸治不瘥為末蜜	丸桐子大每服二十九三夜	薑茶治痢法 出危氏方 治赤白冷熱諸痢及暑毒食毒治	痢下腹痛肚皮熱手不可近	用老生薑切如豆許與茶葉等分用新水煎一服一	方如白痢用蜜赤痢用薑末効服真人養臟湯再加
----------------------	----------------------	---------------------	-----	--	----------------------	----------------------	----------------------------	---------------	--	----------------------	----------------------	-------------	---	-------------	----------------------	----------------------



芍藥當歸立止若熱痢即留薑皮冷即去皮大炒薑能助陽茶能助陰二者能調陰陽失宜	治痢 一名沙調散 出經驗良方	用臘茶不拘多少新舊細研如赤痢用蜜同水煎白痢用連皮薑研自然汁同水煎每水一盞煎半盞空心服二服即愈經驗方用臘茶二錢湯點七分傾一蛤蜊生麻油在內攪勻空心服之須臾腹痛大下即止予少年親服之作效	欽定四庫全書 普濟方	真方聖散子 治男婦脾胃受濕中脘停寒吃物頻傷心胸滿悶脇肋膨脹腸鳴虛痞小腹堅痛臍下強急或大便不調水穀遲化裏急後重下痢膿血或五色或便如魚腦或如豆汁或有鮮血或如爛肉日夜無度久不愈嗜卧怠惰虛瘦肢體沉重寒熱不時此藥固養脾胃溫中止腹痛服之有效	御米殼 五兩搗碎 醋炙黃色 甘草 炙 赤石脂 烏魚骨 去皮肉	荳蔻 麵裹煨 去麵 棟丁香 訶子皮 乾薑 炮各二兩
--	--	--	-----------------------	---	--	--



右為末每服先用水一盞入如乳香少許煎七分沸
調藥末二錢和滓食前熱服

治痢疾

用臘月雀兒割開腸肚去皮毛用去皮巴豆一箇放
在內入沙石罐內盛頓炭火燒作黑研細另用好酒
煮黃蠟百十沸將蠟取出磁盞內化開黃蠟却將雀
兒末一處為丸每服一二十九不拘時候如紅痢甘
草湯下白痢乾薑湯下花紅痢甘草乾薑湯下

欽定四庫全書

普濟方

懷香子方 治瘴痢渾身熱連背項

用茴香子搗取汁服

治痢亦治瀉血

用芫荽子一合搗碎赤者用糖水調白者用生薑自
然汁調水服一方酒調服

又方 用砂糖水作雜椒料等物將烏龜去殼爛煮食
之以多為度即愈

交和散 治痢



用御米殼去隔蒂乾淨安排新瓦上炙焦黃為末次入平胃散如赤則用御米殼末二錢白則用平胃散二分次飲湯調下	治暑痢	用五苓散粳米煎湯送下消暑丸	治痢	用杜蒺藜炒為末酒調二三服	楮實方 治瘴痢無問老少日夜百餘度者	欽定四庫全書 普濟方	取乾楮葉三兩熬搗為末煎烏梅湯服方寸兼取羊猪裏膜內穀道痢出即止	治痢方 取檮根搗絞汁一鷄子殼許和粟米泔一鷄子許服以知為度即瘥甚驗如神小兒加減用之	治痢	用黃丹不拘多少熔黃蠟和劑為丸豌豆大每服三丸赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾薑
---	-----	---------------	----	--------------	-------------------	---------------	--------------------------------	---	----	--



兼用之	一方治痢	東榆西柳樹南桃 塞北雲桑節節高	此是周公出行法 萬兩黃金也不消	治卒下痢多驗方	用韭葉煮鯽魚鮓食之	治暴痢方	用小鯉魚一枚燒為末米飲服之大人小兒俱服得	欽定四庫全書 普濟方	一方四兩去鱗紙裹火煨煮粥飲下	又方 用搗蒜兩足下貼之	治卒下痢湯方 方見本門 諸瀉類	普濟方卷二百九
-----	------	-----------------	-----------------	---------	-----------	------	----------------------	---------------	----------------	-------------	---------------------------------------	---------

