

|        |         |          |     |    |                       |                      |                   |     |        |     |                  |      |       |                      |                     |    |                      |                      |
|--------|---------|----------|-----|----|-----------------------|----------------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|------|-------|----------------------|---------------------|----|----------------------|----------------------|
| 欽定四庫全書 | 普濟方卷二百十 | 明 周王朱櫛 撰 | 泄痢門 | 諸痢 | 真人養臟湯 治脾胃虛弱冷熱不調臟腑受寒下痢 | 赤白或便膿血有如魚腦裏急後重臍腹疼痛日夜 | 無度胸膈痞滿全不思食及脫肛酒毒便血 | 類 痢 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 水菴木香丸 治純下白痢及淡紅黑痢 | 治一切痢 | 砒霜 黃丹 | 右同研細用黃蠟溶和藥末為膏旋丸如菉豆大每 | 服三丸飯飲下小兒丸如粟米大亦飲下忌葷腥 | 治痢 | 因腸胃間有酒食生冷積滯而成即古方所謂滯下 | 者用加巴感應丸十餘粒白梅煎茶或薑湯嚥下如 |
|--------|---------|----------|-----|----|-----------------------|----------------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|------|-------|----------------------|---------------------|----|----------------------|----------------------|



小便少五心煩熱煎生料五苓散吞下先令大便利  
去積滯却服斷下湯之類即愈

治痢

以嬰粟古方未聞今人所用雖其法小異而皆有奇  
功或用數顆慢火炙黃為末米飲下或去粟用殼如  
上法或以殼五七枚甘草一寸半生半炙大椀水煎  
取半椀溫溫呷服蜀人山叟但用殼并去核鼠杏子  
各數枚焙乾為末飲下尤治噤口痢

欽定四庫全書

普濟方

厚朴枳實湯

出保  
命集

厚朴

兩

剉一

枳實

兩

剉一

訶子

一兩半

生半熟

木香

兩半

黃連

二錢

甘草

錢二

炙二

大黃

錢三

右為末每服三五錢水一盞半煎一盞去滓溫服

太陽經動下痢為驚澹大腸不能禁固卒然而下成小  
泊光色其中或有硬物欲起而又下欲子而不水小便  
多清此乃寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬白朮湯

桂枝湯

出保  
命集



|  |         |                      |                      |   |   |                   |               |   |                |                       |                     |                              |  |                  |   |
|--|---------|----------------------|----------------------|---|---|-------------------|---------------|---|----------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------|---|
| 瓜蒞散<br><small>出朱氏<br/>集驗方</small><br>治五色痢疾久不愈者 | 丸小便利則愈矣 | 丸立愈如小便澁少以五苓散下桃花丸或赤石脂 | 右剉細用水一椀煎一大盞絞清汁下桃花丸八十 | 蒼朮 <small>二兩</small> 防風 <small>一兩</small> | <small>出保<br/>命集</small><br>治瀉痢 治臟腑不和虛滑穀不化用蒼朮湯桃花丸 | 右和勻服每三錢米飲或酒調下其痛立効 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 大梔子 <small>三錢</small> 高良薑 <small>三錢</small> | 可忍者此謂陰陽交錯不和之甚也 | 神效越桃散 治諸下痢之後小便利而腹中虛痛不 | 右剉為粗末水煎服之甚則去乾薑加附子三錢 | 白朮湯 <small>出保<br/>命集</small> | 白朮 芍藥 <small>各二錢</small> 乾薑 <small>半兩</small> 甘草 <small>二錢</small> | 右剉每服半兩水一盞煎七分去滓溫服 | 桂 白朮 芍藥 <small>各半兩</small> 甘草 <small>二錢</small> |
|--|---------|----------------------|----------------------|---|---|-------------------|---------------|---|----------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------|---|



瓜萋 一箇黃色者以炭火炙存性  
用碗蓋定地上一宿出火毒

右研為細末作一服用溫酒調服胡大卿有一僕人  
患痢半年至杭州遇一道人傳此方而愈

堅腸丸 出楊氏家藏方 治一切痢不問赤白膿血並主之

黃連 半兩去鬚 龍骨 赤石脂 厚朴 薑汁塗各三錢已上各二分

烏梅肉 一分 甘草 一分 阿膠 二錢蛤粉炒

右件為末用湯浸蒸餅丸如梧桐子大每服五十丸

空心米飲送下

欽定四庫全書

普濟方

天漿散 出楊氏家藏方 治下痢腹中痛膿血相雜

嬰粟殼 五箇蜜炒 烏梅 半箇 甘草 半寸 乾薑 一塊煨 酸石榴皮

片一小

右作一服水二盞煎盡半溫服不拘時白痢不用甘草赤痢不用乾薑赤白痢依此方服之

治酒痢 痢至骨立不食但飲酒有年矣與麝香一兩

止蓋麝能去酒毒

真人養臟湯 出百一選方 治一切痢



|  |                             |   |                   |   |  |                                  |
|--|-----------------------------|---|-------------------|---|--|----------------------------------|
| <p>丁香 肉荳蔻<small>麵裹煨</small> 木香 當歸<small>洗去蘆</small> 白茯苓</p> <p>去黑皮 罌粟<small>去蒂</small> 人參<small>去蘆各一兩二錢半</small> 甘草<small>炙一兩</small> 烏梅肉</p> <p>藥 厚朴<small>去粗皮薑汁製炒</small> 乾薑<small>炮裂</small> 阿膠<small>蛤粉炒</small> 地榆 訶</p> <p>子<small>炮去核</small> 七錢半</p> | <p>右碾粗末每服五錢水一盞半煎八分去滓通口服</p> | <p>神應丸<small>余居士選奇方</small> 治脾胃氣虛冷痛下痢不止</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>厚朴<small>汁三分</small> 川當歸<small>四分</small> 枳殼<small>煨八分</small> 乾薑<small>十分</small> 縮砂</p> <p>六分 赤石脂<small>五分</small> 黃連<small>四分</small> 龍骨<small>十分</small> 附子<small>十分去皮臍尖</small> 訶子<small>七分</small></p> <p>五味子<small>七分</small> 茯苓<small>六分</small> 人參<small>六分</small></p> | <p>右搗末醋醪丸梧桐子大空心橘皮湯下三十九日</p> <p>可三服凡食粘物及冷物酒麵則瀉痢徃徃氣膨胸</p> <p>膈滿悶微痛則澹瀉或五更初則下泄旦則有此狀</p> <p>者並宜依此方服立效</p> | <p>止痢法<small>廣南四時攝生方</small></p> |
|--|-----------------------------|---|-------------------|---|--|----------------------------------|



|  |                                      |   |   |                             |                  |                                    |                                  |                   |                             |                             |                             |                             |                              |                             |           |   |
|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|---|
| <p>肉荳蔻 <small>一箇</small> 訶子 <small>二箇</small> 炮<br/>去核</p> | <p>不換金散 <small>出十便</small> 良方 治痢</p> | <p>新嬰粟殼 <small>一兩</small> 白痢灸赤痢蜜塗灸<br/>赤白痢半灸半蜜灸 甘草 <small>一錢</small> 白痢灸赤</p> | <p>痢生赤白痢 陳橘皮 <small>半兩</small> 不去穰白痢灸赤<br/>半灸半生 痢焙赤白痢半灸半焙</p> | <p>右為細末每服三錢用百沸湯調去滓熱服赤痢血</p> | <p>多用烏梅一箇入藥妙</p> | <p>治痢連萸丸 <small>出十便</small> 良方</p> | <p>黃連 吳茱萸 <small>各二兩</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>右如常法揀洗焙乾黃連剉如寸斷同一處炒候香</p> | <p>熟分為三各用醋糊為丸梧桐子大若小兒則菘豆</p> | <p>大患赤痢則服黃連白痢服茱萸赤白則并服赤先</p> | <p>白後則先黃連而後茱萸赤多白少則三分黃連一</p> | <p>分茱萸反是亦如之每服五七十粒至百粒服之以愈</p> | <p>為度陳米飲下大率茱萸治白黃連治赤黃連用鷹</p> | <p>爪者</p> | <p>鹿角散 <small>出十便</small> 良方 治七八十老人患積痢不斷兼不能</p> |
|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|---|



飲食方

上黨人參四分 鹿角去上皮取白處作末炒令黃秤二分

右二味搗篩為散平旦粥清服方寸匕日再

觀音散

出十便良方

治男婦小兒痢

木香一塊方一寸 黃連半兩

右二味用水半升同煎乾去黃連只薄切末木香焙

乾為末三服第一橘皮湯下第二陳米飲下第三甘

草湯下此方徐君景純傳夫人患痢將死夢中觀音

欽定四庫全書

普濟方

受此方服之遂愈

治痢疾神效粟飲子

出華陀中藏經

丁香五枚 嬰粟殼五箇 甘草一寸 肉苳蔻仁一枚 乳香一皂子大

子大

右咬咀以水一碗煎半碗溫服

治味除濕湯

出危氏方

治一身盡痛重著浮黃下痢如豆

汁

半夏麩 厚朴去粗皮 蒼朮各一兩 藿香葉五錢 陳



|   |                                  |   |   |  |               |                           |  |   |                      |                      |
|---|----------------------------------|---|---|--|---------------|---------------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| 皮 <small>炒</small> 茯苓 <small>各五錢</small> 粉草 <small>五錢</small> 官桂 <small>各三錢</small> 木香 <small>各三錢</small> | 右剉散每服四錢水一盞半薑三片棗二枚煎服空心仍以五苓散兼服利其小水 | 頂禮散 <small>出衛生寶鑑方</small> 治陰陽相薄真氣失守上盛下寒便秘不禁先宜固其腸胃 | 草果子 <small>一分</small> 白木 <small>一分</small> 白茯苓 <small>兩半</small> 訶子 <small>一分</small> 陳皮 <small>一分</small> 木香 <small>一分</small> | <small>一分濕紙裨煨</small> 白扁豆 <small>生薑自然汁煮去皮炒一分</small> 罌粟殼 <small>蜜蘸慢火炙七次一</small> | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 右同為末每服五錢濃煎粟米飲一大盞同藥煎七分空心溫服 | 茱萸如聖丸 <small>出衛生寶鑑</small> 治脾寒臟寒腹疼腸滑下痢 | 吳茱萸 <small>一兩去梗</small> 黃連 <small>七錢半微炒</small> 罌粟殼 <small>去蒂穰淨用一兩火炙</small> 訶子 <small>去核半兩</small> 川厚朴 <small>去皮半兩薑製微炒</small> 白芍藥 <small>兩半</small> 肉苳蔻 <small>兩半用濕紙裨煨熟</small> | 右為末醋糊為丸梧桐子大每服五十粒用米飲下 | 如白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白痢甘草乾薑 |
|---|----------------------------------|---|---|--|---------------|---------------------------|--|---|----------------------|----------------------|





|               |  |   |                            |                             |                             |                         |   |                                  |   |                          |                             |               |  |   |                         |                                    |
|---------------|--|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|---------------|--|---|-------------------------|------------------------------------|
| <p>湯下俱食前服</p> | <p>百歲丸 <small>出衛生寶鑑</small> 治一切惡痢雜下赤白及脾泄等痢</p> | <p>漏蘭子 <small>一箇大者</small> 阿膠 <small>兩半</small> 木香 <small>兩半</small> 黃連 <small>兩半</small> 罌粟 <small>兩半</small> 乳香 <small>兩半</small></p> | <p><small>少許別研</small></p> | <p>右除乳香外將其餘五味剉成小塊炒令焦黑色存</p> | <p>性不令烟絕為末乳香和勻麵糊丸桐子大每服一</p> | <p>歲一丸因其年數服之不拘時候米飲下</p> | <p>神應丸 <small>出衛生寶鑑</small> 治禁口痢全不進飲食痢下不時</p> | <p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p> | <p>罌粟殼 <small>兩半</small> 乳香 <small>四錢</small> 木香 <small>兩半</small> 檳榔 <small>五箇</small> 肉荳蔻 <small>一分</small></p> | <p><small>麵煨</small></p> | <p>右為末煉蜜丸梧桐子大大人每服二十九小兒十</p> | <p>丸煎罌粟湯下</p> | <p>治中湯 <small>出如宜方</small> 治臟寒冷氣腹痛腸鳴下痢青黑</p> | <p>人參 乾薑 白朮 青皮 陳皮 甘草 <small>各等分</small></p> | <p>右咬咀每四錢水煎服又服附子理中湯</p> | <p>對金散 <small>出如宜方</small> 治脾泄</p> |
|---------------|--|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|---------------|--|---|-------------------------|------------------------------------|



|   |                   |   |  |                                |   |                   |             |  |   |                                   |  |  |
|---|-------------------|---|--|--------------------------------|---|-------------------|-------------|--|---|-----------------------------------|--|--|
| <p>陳皮<small>八兩</small> 蒼木厚朴<small>各二兩</small></p> | <p>右為末薑棗煎加肉荳蔻</p> | <p>四神丸<small>出楊氏家藏方</small> 治脾胃受濕腸虛下痢頻併不止</p> | <p>附子<small>炮去皮一兩</small> 肉荳蔻<small>麵裹二兩</small> 訶子<small>煨去核半兩</small> 乾薑<small>炮半兩</small></p> | <p>右為細末蒸棗肉搜和丸梧桐子大每服五十九陳米飲下</p> | <p>養臟湯<small>出續易簡方</small> 治濕毒痢所下如豆羹汁心腹刺痛</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>腰腿沉重</p> | <p>厚朴<small>去皮乾製</small> 肉荳蔻<small>麵裹</small> 蒼朮<small>米泔浸剉炒</small> 木香 橘紅</p> | <p>各二錢 赤茯苓<small>半</small> 甘草<small>炙一錢</small></p> | <p>右剉散每服四錢水一盞半薑五片棗一枚煎八分去滓食前溫服</p> | <p>萬應丸<small>出續易簡方</small> 治以挾積滯因傷生冷遂作痢疾或赤或白經久不瘥</p> | <p>白牽牛 肉荳蔻<small>麵裹</small> 檳榔<small>各等分</small></p> |
|---|-------------------|---|--|--------------------------------|---|-------------------|-------------|--|---|-----------------------------------|--|--|



|   |
|---|
| <p>右為末煉蜜丸如菉豆大每服五十九丸赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢甘草乾薑湯下空心食前服</p>   |
| <p>米粉丹 <small>出同</small> 治痢瘧及積痢</p>   |
| <p>巴豆 <small>去心皮</small> 粉霜 礪砂 硃砂 <small>各一錢</small> 砒霜 <small>研半錢</small></p>                        |
| <p>右研勻黃蠟二錢溶成汁下藥攪勻菉豆大米飲下一丸未瘥再進</p>   |
| <p>育腸湯 <small>出楊氏家藏方</small> 治脾胃虛冷或挾風冷臍腹撮痛下</p>   |
| <p>欽定四庫全書 普濟方</p>   |
| <p>痢虛滑或變膿血</p>  |
| <p>人參 <small>去蘆頭</small> 白朮 高良薑 赤石脂 <small>煨過</small> 肉桂 <small>去粗皮</small></p>                       |
| <p>當歸 <small>洗焙</small> 附子 <small>炮去皮臍</small> 甘草 <small>炙</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁浸炒</small> 肉苳蔻</p> |
| <p><small>麩裹煨香</small></p>  |
| <p>右各等分為粗末每服五錢水二盞入粳米二粒同煎一盞去滓溫服</p>  |
| <p>治痢</p>   |
| <p>欲投補藥必擇溫通之臍如四君理中須用木香白</p>   |



|               |                                   |               |                                    |                         |   |                     |  |                                      |                      |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|---|---------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <p>以楂子煨食之</p> | <p>止痢<br/><small>草 出本</small></p> | <p>以楓香水煎服</p> | <p>止下痢<br/><small>草 出本</small></p> | <p>以訶梨勒和臘燒薰及熱煎湯通手後洗</p> | <p>治患痢久後分急痛<br/><small>草 出本</small></p> | <p>以艾葉和蠟并訶子燒薰神驗</p> | <p>治患痢疾久後分寒熱急痛<br/><small>章 出本</small></p> | <p>欽定四庫全書<br/><small>普濟方</small></p> | <p>料不致閉悶妨食本事用生薑炒</p> | <p>易簡斷下湯罌粟殼用醋炙加烏梅得法且有四君</p> | <p>止澁非惟養痾必胃管閉而不通噤口不食急矣又</p> | <p>白黑凡薑附皆可用治痢當以開胃進食為急若行</p> | <p>四順附子湯參附二建之類若厥而有痰所下或純</p> | <p>六脉沉絕不可拘當重補兼助氣守而不攻可也宜</p> | <p>腕治纏擾利閉澁此攻守之意兩全矣若虛損厥逆</p> | <p>荳蔻茯苓肉桂厚朴之類可以散風邪分水道開胃</p> |
|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------|---|---------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|



|                                  |             |                           |        |  |            |                              |             |                              |                              |           |                           |              |                              |             |                                |                      |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|--------|--|------------|------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| 治下痢後腸胃肥健人<br><small>草 出本</small> | 以橡實殼為散及煮汁服之 | 止痢<br><small>草 出本</small> | 以楓柳水煎服 | 止痢補中益氣堅筋骨通血脉起陽道<br><small>草 出本</small> | 用陳廩米炊作乾飯食之 | 治痢後熱渴<br><small>草 出本</small> | 以木槿作飲服之令人得睡 | 欽定四庫全書<br><small>普濟方</small> | 止痢及霍亂<br><small>草 出本</small> | 以高良薑煮作飲服之 | 治痢<br><small>草 出本</small> | 以桑葉炙令微乾和桑皮煎服 | 止痢治腹痛<br><small>草 出本</small> | 以馬齒莧可細切煮粥食之 | 治大人小兒下痢<br><small>前 出同</small> | 以烏賊魚骨炙令黃去皮細研成粉粥中調服食之 |
|----------------------------------|-------------|---------------------------|--------|--|------------|------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|



治暴痢後氣滿不能食

出同前

用赤小豆煮飯一頓服之即愈

治下痢臍下切痛

出本草

以狗肝一具洗細切米一升稀調煮粥空腹點三兩

合吃蒜椒葱鹽醋任性

止煩斷下痢平胃氣溫中長肌

出本草

用粳米飯及粥食之

止痢

出本草

欽定四庫全書

普濟方

以五月五日取鱒魚頭骨燒灰服之

治人取葛根誤得黃環吐痢不止

用土漿解之乃愈

氣痢

附論

夫氣痢者由表裏不足腸胃虛弱積痢之氣客於腸間  
臟腑不和因虛則洩故為氣痢也 氣痢者由冷氣停  
於腸胃間致冷熱不調脾胃不和腹脇虛滿腸鳴腹痛  
便痢赤白名氣痢治法宜厚腸胃調冷熱補脾氣則痢



|  |  |   |  |                         |  |  |  |   |  |   |  |                       |  |             |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |            |  |
|--|--|---|--|-------------------------|--|--|--|---|--|---|--|-----------------------|--|-------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| <p>草<small>一分</small>灸剉<br/>厚朴<small>汁灸一兩</small><br/>訶梨勒皮<small>炒三分</small><br/>肉荳蔻</p> |  | <p>烏梅丸<small>前出同</small><br/>烏梅肉<small>炒一兩</small><br/>猪肝<small>一大葉以醋羹</small><br/>草荳蔻<small>去皮一兩</small><br/>甘</p> |  | <p>右搗羅為散每服一錢米飲調下食前服</p> |  | <p>寇仁<small>一枚</small><br/>赤石脂<small>兩半</small><br/>蜜陀僧<small>一分</small></p> |  | <p>龍骨<small>一分</small><br/>乾薑<small>兩半</small><br/>甘草<small>一分</small><br/>附子<small>炮裂去皮一分</small><br/>肉荳</p> |  | <p>木香散<small>出聖濟總錄</small><br/>木香<br/>沉香<small>剉</small><br/>桂<small>去粗皮</small><br/>沒藥<small>各一分</small><br/>胡椒<small>一分</small><br/>當歸<small>焙切</small></p> |  | <p>欽定四庫全書<br/>普濟方</p> |  | <p>空心頓服</p> |  | <p>右搗篩每服五錢水盞半薑一片棗大煎八分去滓</p> |  | <p>甘草<small>灸剉</small><br/>枳殼<small>去穢炒</small><br/>桂<small>去粗皮</small><br/>大腹子<small>剉各一兩</small></p> |  | <p>皮地榆<br/>當歸<small>焙切</small><br/>五味子<br/>黃芩<small>去黑心</small><br/>白朮<small>炒</small></p> |  | <p>人參湯<small>出聖濟總錄</small><br/>人參<br/>陳橘皮<small>湯浸去白炒</small><br/>黃連<small>去鬚炒</small><br/>赤茯苓<small>去黑皮</small><br/>樗</p> |  | <p>當自愈</p> |  |
|--|--|---|--|-------------------------|--|--|--|---|--|---|--|-----------------------|--|-------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|



|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 華撥丸<br>前出同<br>治脾胃虛冷兼腸間冷瀉變成氣痢  | 華撥 一兩<br>檳榔 一分<br>附子 一兩<br>阿魏 三兩    |
| 心服                            |                                     |
| 右搗篩每服五錢水盞半薑一棗大煎八分去滓空          |                                     |
| 地榆散<br>出聖濟<br>治氣痢腹脇虛滿腸鳴腹痛便下赤白 | 地榆 樗皮 當歸 黃連 枳殼 桔梗<br>桂皮 陳橘皮 大腹 甘草   |
| 薑湯下                           |                                     |
| 欽定四庫全書<br>普濟方                 |                                     |
| 右為末米飲和衆手丸桐子大每服三十九丸食前生         |                                     |
| 蒼朮丸<br>出聖濟<br>治氣痢瘦弱諸藥不效者      | 蒼朮 厚朴 黃連 當歸 龍骨<br>艾葉 訶梨勒皮 吳茱萸 乾薑 附子 |
| 丸米飲下陳麩湯下亦得                    |                                     |
| 殼 當歸 乾薑 華撥 桂                  |                                     |
| 右搗羅十味為末用猪肝煎丸梧桐子大每服二十          |                                     |





|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 地榆湯<br><small>出同</small><br>治脾毒氣痢下血如鷺鴨肝腹痛不止 | 地榆<br>訶梨皮<br>甘草<br>當歸<br>栝葉        |
| 右為散每服三錢空心米飲下日晚再服                            |                                    |
| 赤石脂散<br><small>出聖濟</small><br>治氣痢不止氣力困弱     | 赤石脂<br>乾薑<br>厚朴<br>無食子<br>龍骨<br>黃連 |
| 漿水下日午再服                                     |                                    |
| 右為末麵糊丸梧桐子大每服二十五丸空心以溫                        |                                    |
| 欽定四庫全書                                      | 普濟方                                |
| 酸石榴皮  | 白石脂<br>赤白石脂<br>無食子<br>龍骨           |
| 陳橘皮丸<br><small>出聖濟</small><br>治氣痢年深不瘥       | 陳橘皮<br>白茯苓<br>陟釐<br>麥蘖             |
| 下日再漸加至四十九                                   |                                    |
| 右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九丸空心生薑湯                       |                                    |
| 黃連<br>枳殼                                    | 燕薹仁<br>白朮                          |
| 以水四合煎五<br>六沸同蜜和藥訶梨勒皮                        |                                    |



|      |                       |                        |  |     |                |                              |  |               |   |   |                      |                                |  |                                 |                      |                                       |
|------|-----------------------|------------------------|--|-----|----------------|------------------------------|--|---------------|---|---|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 湯下日再 | 右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九丸空腹煎生薑 | 兩各三桂皮去粗皮<br>兩各一<br>大黃兩 | 陳橘皮 <small>湯浸去白</small><br>乾薑<br>木香<br>枳殼 <small>去穢炒</small><br>芍藥 | 橘皮丸 | 右為散每服二錢空心米飲下日再 | 厚朴 <small>生薑汁炙去粗皮各二兩</small> | 龍骨<br>黃連 <small>去鬚</small><br>黃蘗 <small>去粗皮</small><br>乾薑 <small>炮</small><br>阿膠<br>人參 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 龍骨散 <small>出聖濟總錄</small><br>治氣痢腹內虛鳴日久不瘥 | 丸 | 右為末用麵糊丸梧桐子大空心食前米飲下十五 | 赤石脂<br>訶梨勒皮 <small>各半兩</small> | 木香<br>丁香<br>縮砂仁<br>肉荳蔻 <small>去殼各一兩</small><br>藿香葉 | 木香丸 <small>出同前</small><br>治氣瀉不止 | 右剉細每服三錢水一盞煎取六分去滓溫服食前 | 茜根<br>芍藥<br>赤茯苓 <small>去黑皮各三分</small> |
|------|-----------------------|------------------------|--|-----|----------------|------------------------------|--|---------------|---|---|----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|



|                   |                         |  |                           |             |                      |                          |  |               |                         |                |                      |                       |  |    |                      |                               |
|-------------------|-------------------------|--|---------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|--|---------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--|----|----------------------|-------------------------------|
| 用細羅為散每服不拘時以粥飲調下二錢 | 石脂 一兩<br>訶梨勒 一兩<br>用皮 煨 | 木香 三分<br>紅荳蔻 一兩<br>去皮 乾薑 半兩<br>炮裂剉 當歸 三分<br>剉炒 赤 | 木香散 出同<br>治氣痢腹內疼痛四肢不和少欲飲食 | 煎六分去滓不拘時稍熱服 | 右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗二枚 | 黃 一分<br>湯浸七<br>遍焙乾<br>微炒 | 白朮 三分<br>白芍藥 兩<br>甘草 一分<br>炙微赤剉 當歸 半兩<br>剉炒 吳茱 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 溫中散 出聖<br>惠方 治氣痢腹內疼痛不欲食 | 漿水下日晚再服老人娠婦並可服 | 右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九空心溫 | 脂 陳橘皮 去白酒浸一宿<br>炒乾各一兩 | 確砂蜜 去皮 肉荳蔻 半兩<br>去殼 黃連 二兩<br>去鬚 當歸 切<br>焙 赤石 | 不愈 | 漸令人黃瘦食不為肌肉困重無力眼目多澁十年 | 確砂蜜丸 出聖濟<br>總錄 治氣痢胃大腸虛不能制晝夜無度 |
|-------------------|-------------------------|--|---------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|--|---------------|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--|----|----------------------|-------------------------------|



|   |  |                             |                           |                                      |  |                                 |                             |                   |             |   |   |                             |             |  |  |                             |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---|---|-----------------------------|-------------|--|--|-----------------------------|
| <p>訶梨勒散 <small>出聖方</small> 治氣痢心腹痛不欲飲食</p> | <p>訶梨勒 <small>一兩煨</small> 當歸 <small>三分剉</small> 紅荳蔻 <small>三分</small> 木香 <small>半兩</small></p> | <p>龍骨 <small>三兩</small></p> | <p>右搗細羅為散每服不計時以粥飲調下二錢</p> | <p>白朮丸 <small>出同</small> 治氣痢心腹疼痛</p> | <p>白朮 <small>三分</small> 枳殼 <small>半兩</small> 微黃去穢炒 黃連 <small>半兩</small> 去鬚微炒 當歸 <small>三分</small> 剉炒</p> | <p>蕪荑仁 <small>二兩</small> 微炒</p> | <p>右搗羅為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十九不拘</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>時粥飲下</p> | <p>木香丸 <small>出同</small> 治以氣痢不瘥腹內冷痛</p> | <p>木香 <small>半兩</small> 白礬 <small>二兩</small> 燒令汁盡 黃丹 <small>一兩</small> 微炒 礪砂 <small>一兩</small> 龍骨 <small>一兩</small></p> | <p>右搗羅為末用軟飯和丸梧桐子大每服十丸不拘</p> | <p>時粥飲下</p> | <p>黃連丸 <small>出聖濟</small> 治以氣痢不止或劇</p> | <p>黃連 <small>去鬚</small> 當歸 <small>切</small> 烏梅肉 <small>微炒</small> 訶梨勒 <small>炮去核</small></p> | <p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心薑製</p> |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---|---|-----------------------------|-------------|--|--|-----------------------------|



|           |                                    |  |   |                   |               |  |                       |                                       |  |                            |  |
|-----------|------------------------------------|--|---|-------------------|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|--|
| 過厚朴煎湯下日再服 | 桃仁丸<br><small>出同</small><br>治氣痢久不瘥 | 安息香<br><small>半兩別研入</small><br>桃仁<br><small>去皮尖雙仁炒</small><br>木香<br><small>半兩</small><br>訶梨勒<br><small>炮去核</small> | 右將木香訶梨勒為末與二味研了藥相和重細研入少許米飲丸梧桐子大每服三十九丸空心用煖漿水下日晚再服 | 神驗丸 治冷癆氣痢腹脇疼痛水穀不消 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 陳麴<br><small>炒</small><br>吳茱萸<br><small>湯浸焙乾</small><br>黃連<br><small>去鬚炒</small><br>蕪荑<br><small>炒</small> | 右為末薑汁和丸桐子大每服十五丸温米飲食前服 | 木香丸<br><small>出聖濟總錄</small><br>治諸氣痢不止 | 木香<br>肉荳蔻仁<br>礞砂仁<br>赤石脂<br><small>各半兩</small> | 右為末以棗肉和丸梧桐子大每服二十九丸温米飲下食前服之 | 木香礞砂散<br><small>出同</small><br>治氣痢腹脹中虛鳴 |
|-----------|------------------------------------|--|---|-------------------|---------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|--|



|                              |    |                      |   |                                 |       |                      |   |               |                                 |     |                      |   |                               |    |                      |  |
|------------------------------|----|----------------------|---|---------------------------------|-------|----------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|----------------------|---|-------------------------------|----|----------------------|--|
| 治氣痢久不止<br><small>出聖方</small> | 湯下 | 右為末酒煮爛飯丸梧桐子大每服二十九空心鹽 | 艾葉 <small>炒</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白焙各等分</small> | 香艾丸 <small>出同前</small> 治氣痢腹痛睡不安 | 下日午再服 | 右為末用粥飲丸桐子大每服二十九空心溫漿水 | 木香 <small>一兩</small> 訶梨勒 <small>炮去核二兩</small> | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 木香丸 <small>出聖濟總錄</small> 治氣痢久不止 | 三十丸 | 右搗羅為末軟飯和丸桐子大每服食前以米飲下 | 枳殼 <small>一兩</small> 微黃去穢 <small>炒</small> 黃連 <small>去鬚炒一兩</small> 蕪荑仁 <small>一兩</small> 微炒 | 枳殼丸 <small>出聖方</small> 治氣痢久不止 | 壓之 | 右為細末每服一錢空心以陳米飲調下良久以食 | 木香 <small>二兩</small> 確砂仁 <small>一兩</small> 枳殼 <small>去穢炒</small> 訶梨勒皮 <small>各三兩</small> |
|------------------------------|----|----------------------|---|---------------------------------|-------|----------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|----------------------|---|-------------------------------|----|----------------------|--|



用寒食一百五日預採木蓼曝乾用時搗羅為末食  
前粥飲調下一錢

牛乳香

一名華撥煎  
出聖濟總錄

治氣痢衆醫不效久不愈諸痢

困弱者

以牛乳汁煎華撥服立愈唐貞觀中太宗苦於氣痢

詔問左右有能治其疾者重賞忽有術士張寶藏進

此方時賞官三品一方牛乳半斤華撥末二錢同煎

減半空心服

欽定四庫全書

普濟方

巴石丸

出肘  
後方

治氣痢

以白礬飛令霜白謂之巴石以熟猪肝作丸空心米

飲下數丸隨人力氣加減若得水牛肝更好素食人

□餅丸之亦通或云白礬中青黑者名巴石一方白

礬不拘多少用炭火於淨地上燒令汁盡使其色如雪

名之巴石一兩研

治氣痢

用巴豆一兩去皮心熬細研取熟猪肝和丸空心米



飲下量力加減服之牛肝尤佳如食素人以□餅丸服

治脾毒氣痢下血如鷺鴨肝腹痛不止

出聖濟總錄

取胡黃連末用鷄子白調作餅子炙令黃研為末入樗皮汁和再作餅用蜜塗炙黃不拘多少搗為散米

飲調下二錢

肉苳蔻散

出聖濟錄

治氣痢腹脹不下食

方見本門瀉泄類

治氣痢裏急後重神驗方

欽定四庫全書

普濟方

以宣連一兩乾薑半兩各為末每用連二錢薑半錢和勻空心溫酒下

治氣痢長服方

以訶梨勒陳橘皮厚朴各三大兩搗篩蜜丸梧桐子大每服二三十丸米飲送下

水穀痢

附論

夫水穀痢者由體虛腠理開血氣虛春傷於風邪氣留連在肌肉之內後遇脾胃大腸虛弱而邪氣乘之故為





水穀痢也脾與胃為表裏胃者脾之腑也為水谷之海  
脾者胃之臟也其候身之肌肉而脾氣主消水穀水穀  
消其精化為榮衛以養臟腑充實肌膚大腸肺之腑也  
為傳道之官化物出焉水穀之精化為血氣者行於經  
脉其糟粕行於大腸也肺與大腸為表裏而肺主氣其  
候身之皮毛春陽氣雖在表而血氣尚弱其飲食居處  
運動勞役血氣虛者則為風邪所傷害客於肌肉之間後  
因脾胃氣虛風邪又乘虛而進入於腸胃其脾氣弱者

欽定四庫全書

普濟方

不能剋制水穀故糟粕不結聚而變為痢也又新食竟  
取風名為胃氣其狀惡風頭多汗膈下塞不通飲食不  
下腹脹形瘦腹大食物則脹滿食寒則洞泄洞泄者痢  
無度也若胃氣竭者痢絕即死診其脉小手足寒難療  
脉大手足溫易療也下白沫脉沉則生浮則死身不熱  
脉不懸絕滑大者生懸濇者死以藏期之也脉絕而手  
足寒晬時脉還手足溫者生脉不還者死脉緩時小結  
者生洪大數者死懸絕而澁者死細微而濇者生緊大



而滑者死得大絕脉者不死

方

廣濟療赤白水穀冷熱等痢

地榆六分 白朮五分 厚朴六分 乾薑六分 熟艾四分 赤石脂

研七分 龍骨七分 甘草四分 黃連十分 烏梅六分 人參六分

當歸五分

右為末蜜丸桐子大米飲汁服三十九日三服加至

三十九丸忌海藻菘菜肉生冷等

欽定四庫全書

普濟方

厚朴散出聖惠方 治水穀痢腹內疼痛兩脇虛脹不思飲

食

厚朴一兩 去粗皮塗生薑汁炙令熟 木香半兩 人參去蘆頭 訶梨勒

三分煨 乾薑半兩 炮 陳橘皮一兩 浸 當歸半兩 剉炒地

用皮 附子一兩 炮 去皮臍

右為散每服三錢水一中盞煎五分去滓不拘時稍

熱服

藍青丸 治中焦熱水穀下痢



|                         |                          |                       |                       |     |                                    |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------------------------------------|
| 藍青 <small>升 汁 三</small> | 黃連 <small>兩 八</small>    | 黃蘗 <small>兩 四</small> | 阿膠 <small>兩 五</small> | 白朮  | 地榆                                 |
| 地膚子                     | 烏梅肉 <small>三 兩 各</small> |                       |                       |     |                                    |
| 右為散用藍汁和微火上煎取可為丸如杏子清白    |                          |                       |                       |     |                                    |
| 飲進二丸亦不得停留忌猪肉冷水菹李雀肉等     |                          |                       |                       |     |                                    |
| 訶梨勒丸                    | 治水穀痢腹脇虛脹時復疼痛不欲飲食         |                       |                       |     |                                    |
| 訶梨勒                     | <small>一 兩 煨</small>     | 乾薑                    | <small>三 分</small>    | 當歸  | <small>一 兩</small>                 |
|                         | <small>用皮</small>        |                       | <small>炮 剉</small>    |     | <small>炒 黃連</small>                |
|                         |                          |                       |                       |     | <small>去 鬚 微 炒</small>             |
| 白                       |                          |                       |                       |     |                                    |
| 朮                       | <small>一 兩</small>       | 木香                    | <small>三 分</small>    | 厚朴  | <small>一 兩</small>                 |
|                         | <small>兩</small>         |                       |                       |     | <small>去 粗 皮 塗 生 薑 汁 炙 香 熟</small> |
| 右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服不    |                          |                       |                       |     |                                    |
| 拘時粥飲下三十九                |                          |                       |                       |     |                                    |
| 龍骨丸 治水穀痢日夜數腹內疼痛         |                          |                       |                       |     |                                    |
| 龍骨                      | <small>三 分</small>       | 艾葉                    | <small>一 兩</small>    | 赤石脂 | <small>三 分</small>                 |
|                         | <small>去 鬚 分</small>     |                       | <small>微 炒</small>    |     | <small>白 礬</small>                 |
|                         |                          |                       |                       |     | <small>一 兩 焙 令 汁 盡</small>         |
|                         |                          |                       |                       |     | <small>黃 連</small>                 |
|                         |                          |                       |                       |     | <small>三 分</small>                 |
|                         | <small>微 炒</small>       | 當歸                    | <small>三 分</small>    | 附子  | <small>一 兩</small>                 |
|                         | <small>碎 微 炒</small>     |                       |                       |     | <small>炮 去 皮 臍</small>             |
| 右為末煉蜜和搗三二百杵丸桐子大每於食前以    |                          |                       |                       |     |                                    |
| 粥飲下三十九                  |                          |                       |                       |     |                                    |
| 瀉心湯                     | 治老小下痢水穀不分腸中雷鳴心下痞滿        |                       |                       |     |                                    |
| 乾嘔不安                    |                          |                       |                       |     |                                    |



|                      |                      |                       |                 |                   |        |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------|
| 人參                   | 黃芩                   | 甘草                    | 乾薑              | 黃連                | 半夏     |
| 各一兩                  | 各一兩                  | 各一兩                   | 各一兩             | 各一兩               | 各一兩    |
| 三兩                   | 十二枚                  | 三兩                    | 十二枚             | 三兩                | 十二枚    |
| 右咬咀以水八升煮二升半分三服并治霍亂若寒 | 加附子一枚渴加栝萐一枚二兩嘔加橘皮一兩痛 | 加當歸一兩渴熱以生薑代乾薑         | 胃風湯 治胸結下痢風冷水穀不化 | 肉荳蔻散 治水穀痢心腹脹滿不能飲食 | 肉荳蔻 一兩 |
| 去殼                   | 木香 一兩                | 甘草 半兩                 | 乾薑 一兩           | 厚                 |        |
| 微赤剉                  | 乾薑 一兩                | 炮                     | 厚               |                   |        |
| 欽定四庫全書               | 普濟方                  |                       |                 |                   |        |
| 朴 一兩                 | 去皮塗生                 |                       |                 |                   |        |
| 薑汁炙香熟                |                      |                       |                 |                   |        |
| 右為散每服三錢水一中盞入棗三枚煎六分不拘 | 時稍熱服                 | 附子五味散 穀痢久候痢無期度食不消化腹痛每 | 遇冷便發有此疾候者       | 附子 炮              | 細辛     |
| 白朮                   | 乾薑                   | 神麴                    |                 |                   |        |
| 各五兩                  | 四兩                   | 一升                    |                 |                   |        |
| 右為散以飲下之初服一方寸匕日再服稍加至二 | 三匕良忌猪肉冷生桃李雀肉等        |                       |                 |                   |        |



草荳蔻散 治水穀痢不止腹內疼痛

草荳蔻 一兩 去皮 白石脂 一兩 當歸 一兩 剉 微炒 乾薑 一兩 炮

右羅為散每服不計時以粥飲調下二錢

四白丸 治水穀痢臍腹疼痛日夜數行

白石脂 二兩 白礬 一兩 燒灰 白龍骨 二兩 胡粉 二兩 炒黃

右研為末用粳米飯和搗一二百杵丸如梧桐子大  
每服食前粥飲下三十丸

療水穀痢方

欽定四庫全書

普濟方

乾薑 三分 鷄子 二枚 小豆 二百粒 炒 令香中食 黃連 二分

右搗篩三物內鷄子黃白中攪勻微火上炒令可丸  
一服五十丸如小豆大旦以飲服即瘥忌食脂膩生

冷猪魚蒜葱

療熱水穀下痢方

黃連 兩 阿膠 各二兩 梔子 二十枚

右切以水七升煮二升分為三服忌猪肉冷水

馬蘭散 出聖方 治水穀痢日夜百度及水痢百起



|   |  |
|---|--|
| 又方  | 馬蘭子 <small>一兩<br/>微炒</small> 乾薑 <small>一兩<br/>炮剉</small> 黃連 <small>一兩<br/>去鬚<br/>剉微炒</small> |
| 右羅為散不拘時以粥飲調下二錢一方熟煮湯取一   |  |
| 合許和二方寸匕入腹即斷冷熱皆治常服神効不  |  |
| 得輕之忌猪肉冷水  |  |
| 又方  |  |
| 橡斗 <small>五枚<br/>盛菘若<br/>子炒令黑</small> 龍骨 <small>半<br/>兩</small> 柿蒂 <small>七<br/>枚</small>                 |  |
| 右羅為散不拘時以粥飲下一錢   |  |
| 神妙橡實散 治水穀痢無問老小日夜百餘行   |  |
| 欽定四庫全書  | 普濟方  |
| 橡實 <small>二<br/>兩</small> 乾楮葉 <small>一<br/>兩</small>  |  |
| 右羅為散每服不計時煎烏梅湯調下一錢   |  |
| 葛蒲丸 治水穀痢及冷氣腹痛虛鳴   |  |
| 葛蒲 <small>三<br/>兩</small> 乾薑 <small>一<br/>兩半<br/>炮剉</small>   |  |
| 右羅為散用粳米飯和丸梧桐子大每服食前粥飲  |  |
| 下三十丸  |  |
| 又方  |  |
| 龍骨 <small>末<br/>三<br/>兩</small> 巴豆 <small>二<br/>七<br/>枚<br/>去<br/>心<br/>皮<br/>研<br/>壓<br/>出<br/>油</small> |  |



|                                     |  |            |                |   |                       |                                     |                  |           |                     |              |                        |  |
|-------------------------------------|--|------------|----------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|------------------------|--|
| <p>右以粟米稠粥和丸麻子大每服以陳米粥下三丸如微轉以井花水下</p> | <p>荳蔻散 治水穀痢久不止腹脇脹悶不思飲食<br/><small>方見本門</small></p> | <p>諸痢類</p> | <p>治水穀痢久不止</p> | <p>以胡粉二兩棗肉和搗作餅子急火中燒令赤即出地上以碗合之勿令風入待冷細研食前粥飲調下半錢</p> | <p>欽定四庫全書<br/>普濟方</p> | <p>治水穀痢<br/><small>出肘後方</small></p> | <p>用韭作羹微炒任食之</p> | <p>又方</p> | <p>用小豆一合和蠟三兩頓服愈</p> | <p>療水穀痢方</p> | <p>用椶櫚皮燒灰研以水和服三方寸匕</p> | <p>廣濟療水痢及霍亂冷痢及食不化有白膿日夜無節度但疑是冷悉主之兼治瀉痢</p> |
|-------------------------------------|--|------------|----------------|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|------------------------|--|



|  |  |
|--|--|
| 白石脂 乾薑 各八兩                                 | 右為末以沸湯和少許麵薄糊和藥并手捻作丸如常法下不止加乾薑八兩忌如常法一方米飲空心下霍亂吐瀉漿水下   |
| 療水痢腹中氣方                                    | 茯苓 <sup>八分</sup> 白龍骨 <sup>八分</sup> 訶梨勒 <sup>八分</sup> 黃連 <sup>八分</sup> 酸石榴皮 <sup>八分</sup> |
| 右為末蜜丸梧桐子大空心以飲服每服二十九日                       | 欽定四庫全書 普濟方   |
| 二服止忌肉油膩生冷等                                 | 療水穀痢方  |
| 狗骨灰 <sup>牛骨灰亦得</sup> 麩 <sup>六月六日造熬令黃</sup> | 右等分為散空腹飲服一方寸七無六月六日麩即常麵亦得   |
| 主水痢方                                       | 鷄子 <sup>二枚</sup> 黃蠟 <sup>一兩</sup>  |
| 右熬熟食之宜空肚食之日三服佳                             |  |





又方 主水痢及療熱水穀下痢

黃連 蒼朮 各三兩

右作散和鷄子七枚同煮并捻作丸煮赤豆作漿粥

服下三十九日三服若渴但飲豆漿粥一方以水七

升煮二升分服忌猪肉冷水

黃芩五味散 水穀之候必腹甚痛食無妨但食後即

痢食皆化盡唯變作水痢無期度多食多下少食少

下有此狀者宜服

欽定四庫全書

普濟方

黃芩 黃連 黃蘗 各五兩 黃耆 四兩 龍骨 六兩

右為散以飲下之初服一方寸匕日二稍加至二三匕

服瘥乃止忌猪肉冷水等

治水穀痢

黃連 二兩 黃蘗 二兩 阿膠 二兩

右為散以苦酒蜜各半升煎阿膠令洋入內諸藥令

可丸飲服三丸日四

白蒿方 治夏日暴水痢



用白蒿葉乾為末以米和一匙空腹服之  
療水穀下痢方

用黃連一升金色者打碎陳米五合二物以水七升  
煮二升分為二服

安石榴湯 療水痢及赤白痢篤困欲死腸已滑醫不  
能療者

乾薑 黃蘗 各二兩 石榴 一枚殼小 阿膠 二兩半炙切

右以水三升煮一升二合去滓內膠令鎔頓服即瘥

欽定四庫全書

普濟方

更治老小亦良羸瘦者稍服一方無黃蘗用黃連

治水穀痢 所下之痢並無赤色只下黃沫忽時下白

沫飲食減少肌體黃瘦宜服此方

訶子 麩裹炮去核用皮 舶上黃 研細各一兩 黃橘皮 白朮

川芎 各半兩 甘草 炮四 肉苳蔻 一筒

右件細杵羅為末用舶上黃末相滾令均用薏苡仁

杵作粉煮粥丸如梧桐子大急焙乾每服五十九空

心米湯下須是焙乾莫令損藥氣



治水穀痢久不瘥

厚朴<sup>三</sup>  
兩 黃連<sup>三</sup>  
兩

右剉以水三升煎取一升空心服

蠱痢 附論

凡下痢膿血間雜瘀黑有片如鷄鴨肝與血皆下者蠱痢也此由歲時寒暑不調濕毒之氣襲人經脈漸至臟腑毒氣挾熱與血相搏客於腸間如病蠱注之狀故名蠱痢也

欽定四庫全書

普濟方

方

療三十歲以下痢及霍亂諸藥不能療并腸滑若是蠱

注所中

蓼子 艾屑<sup>各二</sup>  
升 龍膽 續斷 白朮<sup>各</sup>  
兩 蜀椒

去目 汗 附子<sup>炮</sup> 桂心 苦參 乾薑 甘草<sup>炙</sup> 鼠尾

草<sup>各二</sup>  
兩

右搗篩蜜和丸如梧桐子大一歲兒服一九三歲兒服

二丸五歲兒服三丸大人服五丸飲下療寒熱氣埶



|  |   |  |  |  |   |   |   |   |                      |                       |  |                              |  |
|--|---|--|--|--|---|---|---|---|----------------------|-----------------------|--|------------------------------|--|
| 地榆湯 治蠱痢下血如鷄鴨肝片腹痛煩悶<br><small>一名犀角散</small>   |   | 地榆散 治蠱注痢下血如鷄鴨肝腹痛不止   |  | 欽定四庫全書<br>普濟方  |   | 前米飲下<br>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九丸空心食                         |   | 大便下血瘀黑有片或五痔腫痛以下膿血者<br>蝟皮 <small>一具切</small> 當歸 <small>焙</small> 續斷 黃耆 連翹 槐寔 |                      | 蝟皮丸 治臟腑傷動腸胃虛弱血滲腸間風冷相乘 |  | 海藻菘菜<br>塶在胸中卒氣痛繞臍忌桃李雀肉生葱猪肉冷水 |  |
| 地榆 <small>剉</small> 犀角 <small>鎊</small> 黃連 <small>去鬚</small> 栝葉 <small>微炒</small> 當歸 <small>剉</small> 黃蘗 | 乾薑 <small>炒</small> 附子 <small>炮</small> 白礬 <small>飛各五兩</small> 生乾地黃 <small>五兩</small> | 地榆 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 栝葉 <small>一兩</small> 茜根 | 當歸 <small>一兩</small> 訶梨勒 <small>一兩煨</small> 黃連 <small>一兩去鬚</small> | 地榆 <small>一兩</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 栝葉 <small>一兩</small> 茜根 | 乾薑 <small>炒</small> 附子 <small>炮</small> 白礬 <small>飛各五兩</small> 生乾地黃 <small>五兩</small> | 蝟皮 <small>一具切</small> 當歸 <small>焙</small> 續斷 黃耆 連翹 槐寔 | 蝟皮 <small>一具切</small> 當歸 <small>焙</small> 續斷 黃耆 連翹 槐寔 | 海藻菘菜  | 塶在胸中卒氣痛繞臍忌桃李雀肉生葱猪肉冷水 |                       |  |                              |  |



右搗篩每服三錢以水一盞煎七分去滓溫服不計時粥飲調亦得

黃芩散 治蠱注痢下血心中煩悶腹中疔痛

黃芩一兩地榆一兩犀角屑一兩茜根一兩栝葉二兩甘草二兩

草一兩剉一兩訶梨勒一兩煨一兩牛角鯁一兩當歸一兩剉一兩微

炒 炙

右為散每服四錢以水一中盞煎六分去滓不計時

溫服

欽定四庫全書

普濟方

茜根飲 治蠱痢下血如鷄鴨肝腹中疔痛難忍心中

煩悶不欲飲食一名升麻散

茜根 升麻 犀角鎊 桔梗去蘆頭 黃芩去黑心 黃

蘗去粗皮 地榆 白蘘荷各一兩

右為粗散每服五錢水一盞半煎七分去滓日午空

心服一方酒調服

茜根丸 治毒痢及蠱注下血如豚肝心煩腹痛又脉

或大或小浮陷而起下血如豚肝五內切痛此因服



五石湯丸逼損陰氣甚則其血自百脉經絡而來注  
下成蠱毒此為難治

茜根洗 川升麻去蘆 犀角鎊 地榆洗 黃連去鬚 當歸去蘆

洗 枳殼去穰 白芍藥

右等分為末醋糊丸梧桐子大每服五十九粒空心米

飲下

茜根散 治蠱注下血如鷄肝體熱心腹中煩悶

茜根剉 一兩 川升麻兩 犀角屑兩 地榆剉 一兩 黃連兩 一

欽定四庫全書

普濟方

去鬚 黃芩一兩 微炒

右為散每服四錢以水一中盞煎六分去滓不拘時

溫服

升麻湯 治蠱痢下血片臍下疔刺痛

升麻 地榆 茜根 黃芩去黑心各一兩半 犀角鎊一兩

山梔子兩半

右搗篩每服五錢水一盞半入生地黃一升切薤白

三莖切豉三十粒同煎八分去滓空心溫服日晚再



煎服

治中蠱下痢日數十行

巴豆

十四枚去皮心出油

藜蘆

去蘆頭

芫青

去翅足炒

附子

炮去皮臍

白

礬

熬枯各半兩

右為末和勻以綿裹藥一大豆許內下部日三

治蠱注痢血如鷄肝者心神煩躁宜服

犀角屑

一兩地榆

三分

藜荷根

一兩

馬兜鈴根

一兩

右為散每服四錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫

欽定四庫全書

普濟方

服

玉連丸 治脾積下痢蠱痢同

木香

訶子

遠核各半兩

黃連

一斤炒紫色

右為細末研粳米飲糊丸桐子大每服一百丸空心

食前米飲下日進一服

黃蘗丸 治歲時蠱痢

黃蘗

去粗皮

黃連

去鬚各一兩

右為末飯飲為丸桐子大每服二十九丸空心米飲下



日午再服

黃芩湯 治蠱毒痢如鷺鴨肝腹痛不可忍

黃芩 去黑心 黃連 去鬚各半兩炒

右細剉以水二盞煎一盞去滓空心日晚乘熱服冷

即凝

黃連散 治痔漏蠱毒下痢

黃連 去鬚一兩 白礬 燒令汁盡 乾薑 炮 附子 炮裂去皮臍各三分

右為細散每服一錢半溫酒調下空心日午服方寸

欽定四庫全書

普濟方

匕不止更服之日三

桔梗散 出聖濟總錄 治蠱痢下血如鷄肝疼痛

桔梗 去蘆頭剉炒 犀角 鎊各等分

右為散酒服一錢日三不能自服者即灌之藥下心

中煩須臾自靜七日廼止可食猪脾以補養之

治蠱注下血如鷄肝體熱心腹中煩悶 出聖急方

黑豆 一合 毛桃膠 半兩

右以水一大盞煎六分去滓食前分溫二服





治蠱注熱毒痢痢血或如小豆汁腹痛煩悶

出聖  
惠方

用扁竹葉一兩剉以水一大盞煎六分去滓入吳鹽

汁二合更煎三五沸食前分溫二次服

治腸蠱先下赤後下白黃沫連年不瘥兼治痢下先白

後赤若先赤後白為腸蠱

出聖  
惠方

用牛膝一兩切槌碎以醇酒一升漬一宿平旦空心

服之再服愈

羚羊角散

一名黃連丸  
出危氏方

治下血黑如鷄肝色相似時

欽定四庫全書

普濟方

發渴者

方見本門  
熱痢類

治男子婦人小兒大腸下血黑茶脚色或膿血如靛色

所謂蠱痢者也治之有殊效又能殺五臟蠱

出圓  
經

取側栢葉焙乾為末與川廣黃連二味為汁服

普濟方卷二百十

