

欽定四庫全書

普濟方卷二百十一 明 周王朱櫛 撰

泄痢門

冷熱痢

附論

夫冷熱痢者由脾胃虛弱宿有寒而為客熱所傷冷熱相成其痢乍黃乍白是也若熱搏于血血滲腸間則變為血痢也冷氣入腸內搏津液則津液變化隨氣滯下變成白痢也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附于

欽定四庫全書

普濟方

後養生方導引法云泄下有寒者微噓作引氣以息內腹徐吹息以鼻引氣氣足腹間即愈其有熱者微呼以去之也

黃連散 出聖 專治冷熱痢心腹疴痛不止

黃連 一兩 龍骨 二兩 木香 五錢 當歸 一兩 赤芍藥 一兩

訶梨勒 一兩 赤石脂 五錢 乾薑 一兩 甘草 五錢

右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

阿膠丸 出聖 專治冷熱不調痢下膿血不止腹痛不可



忍	阿膠 一兩 搗碎 乾薑 一兩 炮 木香 一兩 龍骨 二兩 赤石脂 二兩	黃連 一兩 去皮 當歸 一兩 黃芩 一兩 厚朴 一兩 去粗皮	右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候	以粥飲下三十丸	木香散 <small>出聖惠方</small> 專治冷熱痢虛損腹痛不能飲者日漸進之	木香 半兩 甘草 半兩 乾薑 半兩 炮 白朮 三分 黃芩 半兩	欽定四庫全書 普濟方	白朮 三分 當歸 三分 黃連 三分 乾熟地黃 三分	右為散每服三錢以水一盞煎至五分去滓不計時候溫服	二黃丸 治無問冷熱新舊痢	黃連 黃蘗 乾薑 甘草 艾 三月三日者 熟各八分	附子 三枚 蠟子 一雞 大烏梅肉 八分	右搗篩為末以蜜和蠟於鐺中熬再入黃蜜須候蠟鎔盡如乾益蜜丸空腹以飲服四十九日二漸加至
---	---	--	----------------------	---------	--	---	---------------	------------------------------------	-------------------------	--------------	--------------------------------	---------------------------	--



五六十九丸忌海藻菘菜猪肉冷水

歸連丸 治痢無問冷熱及五色痢入口即定

黃連四分 黃蘗 當歸 黃芩各二兩 阿膠二兩

熟艾一兩

右搗羅為散以醇醋二升煮膠烱下藥煮令可丸如

大豆飲服七八分日二夜一服若產婦痢加蒲黃一

兩蜜和為丸

犀角散出聖惠方 主治冷熱痢不止腹肚疼痛心神煩悶

欽定四庫全書

普濟方

犀角屑一兩 白朮一兩 黃連一兩 去鬚當歸一兩 地榆一兩

木香半兩

右搗麤羅為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓

不計時候服

訶梨勒散出聖惠方 主治冷熱痢煩悶不欲飲食

訶梨勒煨用 當歸剉微炒 黃連各一兩 甘草半兩

木香半兩 乾薑半兩

右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓不計時



香豉湯 <small>出聖方</small> 治療下焦冷熱不調暴下赤白痢	計時候以粥飲下三十丸	右搗羅為末煉蜜和搗百餘杵丸如梧桐子每服不	龍骨 <small>兩半</small> 赤石脂 <small>兩半</small>	厚朴 <small>一兩半</small> 去粗皮 黃連 <small>一兩</small> 去鬚 乾薑 <small>半兩</small> 炮 甘草 <small>半兩</small> 炙	厚朴丸 <small>出聖方</small> 主治冷熱不調下痢不止	服不計時候以粥飲下三十丸	右搗羅為末煉蜜和搗三二萬杵丸如梧桐子大每	欽定四庫全書 普濟方	羚羊角 <small>兩</small> 屑一	黃連 <small>去鬚</small> 黃蘗 <small>炒</small> 艾葉 <small>炒</small> 赤芍藥 <small>各二兩</small> 當歸 <small>二兩</small> 剉	黃連丸 <small>出聖方</small> 專治冷熱痢心神煩悶腹中疴痛	右細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢	木香 <small>兩半</small>	附子散 <small>出聖方</small> 主治冷熱痢腹痛不能飲食	附子 <small>炮裂</small> 黃連 <small>去鬚</small> 龍骨 <small>微炒</small> 地榆 <small>各一兩</small> 剉 當歸 <small>三分</small> 剉	候溫服
--	------------	----------------------	--	---	-----------------------------------	--------------	----------------------	---------------	-------------------------	--	--------------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------------------	---	-----



香鼓 <small>一升</small> 白朮 <small>六兩</small> 薤白 <small>一升</small> 蜀升麻 <small>二兩</small>	右以水七升煮取二升半為二服忌桃李雀肉等
生犀散 治無問生冷熱及膿血痢	
生犀角屑 黃蘗 黃連 苦參 <small>各二兩</small>	
右為散以糯米煮作飲莫令生每日空腹服一方寸	
日再服便瘥勿輕之肘後方有當歸產後有當	
膠連丸 治痢無問冷熱赤白以新疳温	
阿膠 <small>三兩一兩炙一兩入藥一兩銷清作膠</small> 胡黃連 <small>一兩</small> 乾薑 <small>二兩</small>	
欽定四庫全書 普濟方	
入黃無食子 <small>一枚以痢腸滑甚者加至三四枚</small>	
右為末以醋鎔膠清丸如梧桐子大飲服二十五丸	
日再漸加三十丸老小者以意斟酌禁加常法若冷	
痢以酒下熱痢以粥飲下	
內補丸 <small>一名黃連丸</small> 主治冷熱氣不和腹痛下痢不止及通	
血氣五百七十九	
黃連 <small>一兩去鬚炒</small> 當歸 <small>三分剉炒</small> 乾薑 <small>半兩炮</small> 阿膠 <small>三分搗碎炒</small>	
右為末煉蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大每服不計	



時候以粥飲下三十九日再服一方以醋煮膠令消 衆手撚圓又療產婦下痢不止者服之甚驗忌生冷	粘膩 <small>出十便 良方</small>	甘草湯 <small>一名三 神湯</small> 治冷熱痢心神煩渴腹痛脅膈滯悶 <small>出</small>	<small>方便良方</small>	甘草 <small>二寸 炙</small> 烏梅肉 <small>五枚 微炒</small> 訶梨勒 <small>五枚 用皮 煨</small>	右剉以水一大盞煎至六分去滓食前溫二服	當歸湯 <small>出聖 惠方</small> 治冷熱氣不和腹痛下痢不止	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	當歸 <small>一兩 剉 微炒</small> 黃連 <small>一兩 去 鬚炒</small>	右細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢	加減當歸地榆散 治冷熱不調氣毒惡毒溫熱傷候	毒痢休息宿痢腥穢乾嘔不食肌熱小便澁	御米殼 <small>二兩 蜜炒</small> 當歸 <small>一兩 焙</small> 地榆 黃連 <small>揀 淨</small> 芍藥	甘草 <small>炒各 半兩</small>	右咬咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服食 前進二服氣毒痢加黃連當歸一倍
--	------------------------------	---	---------------------	--	--------------------	---	---------------------------	---	--------------------	-----------------------	-------------------	---	-----------------------------	--



治冷熱痢疾

出本
事方

嬰粟殼

二十
個

白薑

三
錢

甘草

五
錢

艾葉

半
兩

右咬咀分作三服每服入蜜用水一盞煎至七分空
心溫服

和中散

治冷熱痢腹痛裏急

附子

炮七度水浸
去皮為末

黃連

去鬚各一
兩為末

乳香

研一
分

右如患冷熱痢取黃連附子各半錢乳香一字以陳
米飲調下未止再服以青橘皮湯調下如患赤痢附

欽定四庫全書

普濟方

子末半錢黃連末一錢乳香一錢如患白痢黃連末
半錢附子末一錢乳香一字米飲調下未止加黑豆
七粒煎湯止之

治冷熱不調或水或膿或五色血者

出千
金方

用酸石榴五枚合殼子搗絞取二升汁服五合差又
一方糞前有血令人面黃色用皮搗為末加梔子湯
下小兒以意服之治冷熱痢用甜菜搗絞汁服之

堅腸丸

出十
良方

治一切痢疾不問赤白膿血並治

方見
本門



楊子建萬金護命方通建一十四方今有人患痢其脉微小再再尋之又沉而濇此之一候若下白痢其勢雖重庶幾可治若是下血切忌發熱通身發熱者死熱見七日死已上所陳雖未足以達痢之淵源亦足以明其粗迹議者謂如子所言以明自甲子至于癸亥每六十年中未嘗有一年不生痢疾今世人所患痢疾于數年中間忽止有一年其故何也荅曰六十年中未嘗有一年無木土相攻未嘗無土火相鬱未嘗無水火相犯但五運之政譬如權衡一年間五行氣數更相承制得其平等則其疾自然不作忽一氣太過一臟有餘痢疾之生應不旋踵予故脩陳粗畧以開後學之未悟庶幾診療之間無差悞之過者矣但毒痢傷人不一惟水邪犯心為重世人初患痢時先發寒熱投藥治之其熱不退發熱甚大食則嘔逆下痢不止心熱如火只要入涼處只思吃冷水忽思狂走渾走肌肉疼痛着手不得此候十難治其三四也治疫毒痢方須是仔細首尾讀此方論分明

欽定四庫全書

普濟方



識病根原然後喫藥但毒痢初得時先發寒熱忽頭痛
忽壯熱忽轉數行便下赤痢忽赤白相雜忽止下白痢
忽先下白痢後變成赤痢忽先下赤痢後却成白痢並
宜喫此方但初下痢時先發寒熱頭痛即是寒邪犯心
水火相戰故初病時先發寒熱水火相犯血變于中所
以多下赤痢如紫草水如菟菜水無色澤者寒邪犯心
之重或先發寒熱而所下之痢止白色者寒邪犯心之
未動也先下白痢而後有赤痢之變者寒邪犯心其勢

欽定四庫全書

普濟方

漸加也先下赤痢而後變成白痢者寒邪犯心其勢漸
減也赤白相等者水火相犯其氣相等寒溫之氣相傳
也忽有赤多而白少忽有赤少而白多此寒邪之勢有
多少毒痢之病有輕重以白多為輕以赤多為重治之
之法先奪其寒則其所下之藥一也以太歲分之則丙
子丙午甲子甲午庚午庚子丙寅丙申年甲寅甲申年
庚寅庚申并辰戌之年運遇丙申及庚運所臨其害尤
甚及丑未之年宜有此候又更無問太歲蓋天地變化



其候多端難可窮盡今此方在世人亦不必撞定太歲									
但看一年中春之下其內多有寒肅之化陽光少見忽									
寒熱二氣更相交爭忽于夏月多寒溫之化寒邪犯心									
所受之痢先發寒熱忽頭痛忽先轉數行後有赤痢忽									
赤白相雜忽上下痢並宜喫此通神散喫後取壯熱便									
退若兩三盞後壯熱不退更不喫此方自別有方論在									
下									
麻黃 官桂 <small>各三分</small> 大芎 白朮 <small>各二兩</small> 獨活 桔梗									
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>									
防風 芍藥 白芷 <small>各半兩</small> 牡丹皮 甘草 <small>各一分</small>									
細辛 <small>八錢</small> 牽牛 <small>四錢</small> 藁本 <small>五錢</small>									
右為細末每服二錢非時熱湯調下和滓熱喫若服									
兩三盞後寒熱不退更不請喫自別有方論在下○									
若喫此藥後寒熱已退赤痢已消減便修合第二方									
藥喫取安效若寒熱已退赤痢未消減便服兩三盞									
然不可多喫一日只兩盞後赤痢消減忽變成白痢									
漸次修合第二方喫候出候度數減少便修合第三									



方喫取安平但六丙之年六庚之歲春夏之內時氣
多寒人得痢疾此藥通神若是六甲之年丑未之歲
溫化便多人得痢疾先發寒熱即于方內添草豆蔻
一兩同修合也又不問太歲但一年春夏之內多寒
人有痢疾先發寒熱並宜喫此方

治毒痢初得時先發寒熱喫前方寒熱已退赤痢已消
減宜進退真散若喫前方藥寒熱未退赤痢未消減
更不進此藥但天地變化其候非常痢疾証候多端

欽定四庫全書

普濟方

此不得不進須仔細

訶子

五觔用麵裹炮熱不要生亦不要焦去麵不用就熟吃破訶子破去核不用只使皮焙乾

右細杵羅為末每服二錢匕以米湯一盞半同藥煉
取一盞空心和水滓喫若吐出一兩口涎更加如此喫
經數盞大腑漸安出後減少便修合第三方藥喫以
牢固大腸若喫前方藥壯熱未退血痢者未減不消
進此藥

治疫毒痢喫前面兩方藥病勢已減所下之痢止餘些



小忽下清糞如鴨糞忽如茶湯如濁油忽只餘些小
淺紅色宜喫此方以牢固大腸還復其氣

舶上黃丸

舶上黃

去沙石用二兩
細研如飛塵

右以薏苡仁二兩炒熟杵為末與舶上黃末相和令
勻滴熱水相和丸如梧桐子大空心米湯下五十九
凡毒痢初得痢時先發寒熱喫前面毒痢方通神散三
兩蓋經一日忽隔一夜寒熱不退赤痢不減分數通

欽定四庫全書

普濟方

身發熱所下之痢多是膿涕忽如桃花急如紅米膠每
一次忽下一蓋半蓋已未吃後藥二蓋至三蓋經一日
忽一夜寒熱不退赤痢不減分數便不進後藥若依法
進藥兩蓋後壯熱便退赤痢少減分數即請漸漸進後
藥每日只兩蓋候赤痢消滅忽變成白痢却修合上面
還真散吃取平安且痢有寒熱其証一也前方以暖藥
解之此方以涼藥投之其說何也答曰水邪犯心身能
發熱土濕鬱火身亦發熱肝熱刑脾身亦發熱惟至精



者識其秋毫之變竊恐世人未能通其妙旨于此設此
兩方以救其失然毒痢之傷人惟水邪犯心最為極重
但患痢疾之人有憎寒壯熱先喫上面通神散三兩服
寒熱不退下痢不止然後進後藥以太歲分之惟六壬
六戌寅申己亥之年宜用後藥而六戌之年尚有差
池蓋火盛之年必有寒濕相犯故也然以六氣推遷
不定又不可局定年辰但一年之間春夏之內熱氣
偏多濕化不舉人有痢疾肝脉弦心脉洪喫後藥若喫

欽定四庫全書

普濟方

兩蓋後不見效驗不進服蓋痢之初起切記水之犯
心不可妄投涼藥故此方兩蓋無驗更不可進服

荊芥穗 牡丹皮去心 牽牛炒 木香 芍藥 桔梗

白頭翁 防風 獨活 地榆各一分 黃連蜜浸

右為細末每服二錢水一盞煎一兩沸急瀉出食後
溫和喫此藥後少見效驗更可進服以安為期然不
可多喫一日只兩蓋痢纔住便止藥

治毒痢初得病時先發熱所下之痢皆是白涕並宜喫



上面通神散若人患痢經一兩日寒熱自退却只下
白痢未效宜服此方

黃橘皮

防風

各一分

甘草

四銖

細辛

三銖

白朮

二分

草豆蔻

一個

大芎

半兩

藁本

一兩

右為細末每服二錢水一盞煎取八分空心去滓喫

治毒痢初得病時微有些小寒熱忽止腹痛出後時糞

後有些小膠涎與赤痢相雜却因悞喫涼藥漸漸下

痢極多從早至暮但只思睡早朝即顏色枯瘁身體

欽定四庫全書

普濟方

稍涼近晚至夜即面赤顏色先潤下痢極多皆是清

涎與赤痢相雜通身發熱不思飲食渾身肌肉着手

則痛據此候宜當喫此藥但身體大發熱如火與人

相近則熱氣逼人其脉浮散輕手取之散鋪指下不

分部位全無骨力指下如風如氣重手取之指下全

無急用訶子五個炮製如下面法杵羅為末一服先

用米湯調和滓熱喫候吐出涎脉氣生方可進下面

方



白朮 兩半 白芷 芍藥 大芎 各一分 甘草 四銖
訶子 五個

右細杵羅為末每服三錢煎陳米湯調下和滓喫

治毒痢初得病時並無寒熱所下之痢全是膿血忽黯

血左右三部脉氣皆微細宜喫此方

桑寄生 二兩 防風 芎 各一分 甘草 三銖

右杵為細末每服二錢水一盞煎取八分空腹和滓喫

治赤白痢初得時並無寒熱患赤白痢經久未效別無

欽定四庫全書

普濟方

憎寒壯熱宜喫此方

鹽梅 七個 黃連 四十枝

右件藥用新埴瓶一箇安藥在內以新瓦片蓋瓶口

火煨通赤後煙絕取出就熱研如飛塵每服二錢鹽

調米湯下和滓服應是赤白痢無問赤多白少白多

赤少但身體無憎寒壯熱者皆可喫此方

治赤痢忽赤白相雜初得病時並無憎寒壯熱經及數

日身體不熱只聞小腹內躁熱下血不止忽止血便



喫暖藥不見效驗宜服此方寅申己亥年六壬之年
宜有此候但喫兩盞後不見效驗更不請喫此藥但
唇皮赤忽黯色小便黃白日身體涼夜間則發熱如
此即肝熱刑脾之証也

荊芥穗 牡丹皮 白頭翁 地榆 芍藥

防風 黃連 桔梗 各一分 牽牛 炒 木香 各三銖

右細杵羅為末每服二錢水二盞煎兩沸食後和滓
溫和喫須是一年之間春夏之內風熱大甚分明識

欽定四庫全書

普濟方

其痢疾定是熱後方可進此藥

治下赤痢身體並無憎寒壯熱此名肝心雙滯宜喫此

方

黃連 一兩 蜜浸 木香 三銖

右細杵羅為末濃煎陳米湯調二錢七食後和滓喫
治赤痢不止脉反為小沉而又澁其身熱者死熱見七
日死此候極危困但喫上面通神散兩盞發熱便退亦
庶幾可治便修合上面還真散舶上黃丸喫取安效若



喫通神散後發熱不退即治之難也治患赤痢赤白痢
白痢忽因先得寒瘧後便成痢忽因患痢後却變成瘧
但患痢時無問赤白若有憎寒壯熱並宜喫上面通神
散喫了壯熱已退便修合還真散舶上黃丸喫取安效
緣此證候水邪犯心治之不可輕易也

治脾胃虛冷停水滯氣凝而成涕所下之痢渾是白涕

宜喫此方初得痢時並無壯熱頭痛方可喫此藥

舶上黃

一兩細
研如塵

欽定四庫全書

普濟方

右以白麵一分鐺內炒令熟于冷乳鉢內與舶上黃
末同研令勻滴冷熟湯丸如梧桐子大每服五十九
以止為度空心米湯下若是初得痢時先壯熱頭痛
即不可喫此藥

治脾氣傷冷相刑于腎水土相攻寒溫相爭寒溫所下
之痢全是清涎有如鷄卵清之類宜喫此方將舶上
黃丸相間服

石斛 吳茱萸 芎 續斷 草豆蔻 白朮



芙蓉	防風	牡蠣	<small>火煨通赤</small>	乾薑	<small>各一分</small>
訶梨勒	<small>逐個麵</small>				
<small>裹火炮</small>					
右細杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大每早朝空心米湯下五十丸但空即服有壯熱不請喫					
冷痢	<small>附論</small>				
夫下痢其色或青或白或黑者皆冷痢也此因腸胃虛弱寒氣乘之故令人大便秘下黑青若其痢色白食不消者寒中也當診其脉沉則生浮則死其人素有積寒即成久痢冷有膿也					
欽定四庫全書					
普濟方					
方					
建脾丸	療脾滑胃虛弱洩下不禁飲食不消雷鳴絞痛				
附子	<small>一兩</small>	蜀椒	<small>汗一兩</small>	桂心	<small>二兩</small>
<small>炮</small>				黃連	
赤石脂		大麥蘖		陳麴	
當歸	<small>二兩</small>	鍾乳	<small>三兩</small>	石斛	<small>各二兩</small>
<small>研</small>					
右搗羅為末蜜和丸如梧桐子大以酒服十九日三					



稍稍加之忌猪肉生葱醋冷水

豆附丸 出醫方大成 治臟腑以虛下寒泄瀉不止腸滑不禁

日夜無度全不進食一切虛寒泄瀉用之

肉豆蔻 附子 良薑 訶子 乾薑 赤石脂

陽起石 龍骨 桂心 白茯苓 細辛 洗各一兩

白礬 枯各二兩

右為細末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服七十九空

心米湯飲送下

欽定四庫全書

普濟方

地榆丸 治冷痢不消化食已腹中脹痛氣滿

地榆 六兩 赤石脂 龍骨 各一兩三分 厚朴 烏梅肉

乾薑 各一兩兩半 白朮 當歸 艾葉 各一兩一分 甘草 炙一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九米飲下

空心日二服

人參豆蔻散 出直指方 治冷證泄瀉痢通用

木香 厚朴 蒼朮 乾薑 炮各二兩 半夏 麩 陳皮

阿膠 嬰粟殼 各四兩 縮砂 甘草 各二兩半 肉豆蔻 生二兩



右搗每服三錢薑朮煎食前服	十寶湯 治冷痢如魚腦者三服見效甚疾	黃耆 <small>兩四</small> 白茯苓 人參 當歸 白朮 白芍藥	半夏 五味子 熟乾地黄 桂 <small>兩各一</small> 甘草 <small>兩半</small>	右為麤末每服二錢水一盞薑三片烏梅一個煎至七分食前溫服	葶撥散 <small>出聖 息方</small> 治冷痢腹痛不食四肢羸弱	葶撥 <small>三分</small> 乾薑 <small>三分</small> 甘草 <small>兩半</small> 陳橘皮 <small>兩一</small> 肉豆蔻 <small>一兩</small> <small>去殼</small>	欽定四庫全書 普濟方	厚朴 <small>兩一</small> 附子 <small>兩一</small> 當歸 <small>兩半</small> 赤石脂 <small>兩半</small> 吳茱萸 <small>兩半</small>	阿膠 <small>三分</small>	右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢	增損黃連丸 主腹內冷食不消及冷痢兼補	黃連 黃耆 龍骨 <small>各三</small> 當歸 甘草 <small>各五分</small> 乾薑	厚朴 <small>各六分</small> 地榆 白朮 人參 <small>各一分</small>	右搗篩為末蜜丸如梧桐子大飲酒任下服十五丸日再服加至二十九丸忌猪肉冷水桃李雀肉生葱海
--------------	-------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	--	---	---------------	--	----------------------	---------------------	--------------------	--	---	---



藻菘菜	大桃花湯 <small>一名附子湯</small> 治冷白滯痢腹痛 <small>方見本門</small>	萊萸人參丸 治冷痢久不瘥臍腹疔痛下白膿食物不能消化	食茱萸 人參 芎藭 桔梗 枳實 <small>各一兩</small>	甘草 <small>炙剉一兩</small> 乾薑 陳麴 <small>炒各四兩</small> 附子 <small>二兩炮</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子每服三十九丸米飲下空心服	欽定四庫全書 普濟方	馬藺子丸 治積冷痢下白膿	馬藺子 <small>升一兩</small> 附子 <small>二兩</small> 乾薑 甘草 <small>各二兩半</small> 神麴 麥蘖	阿膠 <small>各五兩</small> 蜀椒 <small>五合</small> 黃連 <small>三兩</small>	右為末蜜丸如梧桐子大服二十九丸二次知為度或作散酒調服方寸亦佳	木香散 治冷痢心腹疼痛不欲飲食漸加羸弱	木香 <small>半兩</small> 附子 <small>三分</small> 阿膠 <small>半兩</small> 白朮 <small>三分</small> 赤石脂 <small>三分</small> 桂心 <small>三分</small>	乾薑 <small>炮</small> 厚朴 <small>一兩</small> 草豆蔻 <small>一兩</small>
-----	---	---------------------------	------------------------------------	--	-------------------------	---------------	--------------	---	---	--------------------------------	---------------------	--	--



當歸丸 治冷痢淒清腸鳴不絕腹痛不止手足冷者	右搗羅為末每服二錢米飲調下	黃連散 治冷膿痢腹痛不止	黃連 厚朴 乾薑 甘草 木香 阿膠	陳麴 訶梨勒	右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三十丸	肉豆蔻 附子 厚朴	縮砂丸 治冷痢不瘥漸加羸弱喫食減少	縮砂 當歸 乾薑 青橘皮 吳茱萸	附子丸 治冷痢不瘥四肢不和腹痛不欲飲食	附子 乾薑 當歸 菝葜子 艾葉	青橘皮 白朮 吳茱萸 厚朴	右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三十丸
-----------------------	---------------	--------------	-------------------	--------	----------------------------------	-----------	-------------------	------------------	---------------------	-----------------	---------------	----------------------------------



宜服之	當歸 白芍藥 附子 白朮 乾薑 厚朴
阿膠	<small>各一兩</small> 烏梅 <small>二兩</small>
右為末醋糊丸如梧桐子大每服五十九丸米飲吞下	
空心腹痛甚加桂半兩小便不利加白茯苓一兩方	
用甘草半兩煎服名當歸散	
燒胃丸 治脾胃虛冷疼痛瀉痢	
乾薑 厚朴 附子 茯苓 甘草 陳皮	
欽定四庫全書	普濟方
桂枝 訶子	<small>各等分</small>
右為細末醋糊丸如梧桐子大每服三十九丸米飲下	
附子散 治冷痢四肢不和心腹疼痛少欲飲食漸加	
羸弱	
附子	<small>一兩炮</small> 陳橘皮 <small>一兩</small> 乾薑 <small>半兩炮</small> 白朮 <small>三分</small> 桂心 <small>半兩</small>
當歸	<small>半兩剉</small> 龍骨 <small>三分</small> 厚朴 <small>一兩</small>
右搗羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢	
陳麩丸 治磨積止泄痢心腹冷痛	



白頭翁湯 療寒急下及滯下	白頭翁 乾薑 甘草 當歸 黃連
心溫服日三	
右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓空	
赤石脂	熟艾 附子 黃連 阿膠 甘草 乾薑
熟艾湯 治冷痢洞泄	
服空心日三服	
欽定四庫全書	普濟方
右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓	
附子湯 治冷痢赤白及滯下	附子 黃連 阿膠 甘草 乾薑
厚朴 赤石脂	
右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓	
陳麴 乾薑 官桂 白朮 當歸 厚朴	
人參 甘草	
右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸酒或淡	
醋湯下空心食前日二服發時不時增數	



草半兩 <small>灸</small>	至八分去滓空心溫服日三如腹脹加人參半兩甘	右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半生薑三片煎	厚朴 <small>三分</small>	訶梨勒 高良薑 芍藥 枳殼 白茯苓 <small>各半兩</small>	訶梨勒湯 治冷痢	藥即將出匙抄取及暖吞之日三夜一則止	麵拌丸令着面上厚薄勻調先煮一升湯令極沸下	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	之如小豆大曝乾一服取六七十九微以水濕以乾	右搗篩為末以水一大升煮膠令消煎取半合藥丸	阿膠 <small>兩各二</small> 甘草 <small>兩灸一</small>	麴末 乾薑 <small>兩各六</small> 當歸 <small>錢末三</small> 厚朴 人參	乾薑丸 <small>出肘後方</small> 療冷痢	水猪肉	右切以水八升煮取三升分為四服忌海藻菘菜冷	秦皮 <small>兩各一</small> 石榴皮 <small>一兩熟</small>
-------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	---	----------	-------------------	----------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	---	--	--------------------------------	-----	----------------------	--



右為末搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗二枚煎七分去滓食前溫服	吳茱萸丸 治冷痢下血膿臍腹痛脹滿食不消化兼治脾氣不足驚澹青黑	欽定四庫全書 普濟方	吳茱萸 乾薑 赤石脂 陳麴 當歸 <small>各一兩半 各二兩</small>	厚朴 <small>各四兩</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九米飲下	空心日三服	外灸膏 <small>出仁存方</small> 治一切虛寒下痢赤白或時腹痛腸滑不禁心腹冷極	木香 附子 蛇床子 茱萸 胡椒 川烏	右各等分每藥末三錢用麵二錢生薑自然汁打作
------------------------------	--------------------------------	---------------	---	--------------------------	----------------------	-------	---	--------------------	----------------------

訶梨勒湯 出王氏博濟方 治脾胃虛冷下痢滑泄不思飲食并一切冷氣

訶梨勒 厚朴 甘草 白朮 草豆蔻

陳橘皮 各一兩

右為末搗篩每服三錢水一盞生薑三片棗二枚煎

七分去滓食前溫服

吳茱萸丸 治冷痢下血膿臍腹痛脹滿食不消化兼

治脾氣不足驚澹青黑

欽定四庫全書
普濟方

吳茱萸 乾薑 赤石脂 陳麴 當歸
各一兩半 各二兩

厚朴 各四兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九米飲下

空心日三服

外灸膏 出仁存方 治一切虛寒下痢赤白或時腹痛腸滑不

禁心腹冷極

木香 附子 蛇床子 茱萸 胡椒 川烏

右各等分每藥末三錢用麵二錢生薑自然汁打作



糊貼臍中上下以衣物蓋定熨斗盛火熨之痢止為度	龍骨散 <small>出聖方</small> 治冷痢洞泄腹中疼痛不可忍	龍骨 <small>一兩</small> 赤石脂 <small>三兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 牡蠣 <small>二兩</small> 乾薑 <small>一兩</small> 炮	肉豆蔻 <small>一兩</small>	右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢	枳殼湯 治冷痢	枳殼 <small>一兩</small> 炒 甘草 <small>半兩</small> 厚朴 <small>一兩</small> 半 赤茯苓 乾薑 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服	空心日午二服	黃連散 治冷痢不調水痢不止	黃連 無食子 黃蘗 乾薑 酸石榴皮 <small>各一兩</small>	右為散每服三錢空心日午米飲調服	黃連湯 治冷痢疼痛腸滑不瘥	黃連 <small>半兩</small> 阿膠 鼠尾草 當歸 乾薑 <small>各三分</small>	右粗搗篩每服四錢若冷甚白多以酒一盞半煎至
-----------------------	-------------------------------------	---	-----------------------	---------------------	---------	--	------------	----------------------	--------	---------------	--------------------------------------	-----------------	---------------	--	----------------------



八分去滓空心溫服日午再服熱及痛即去乾薑當
歸用水煎依前服之良

五神散 治大腸積冷下痢不止裏急後重疼痛

附子炮半兩 乾薑 訶梨勒 烏梅半兩 延胡索各一兩

右為粗散和白麵裹慢火內燒令麵熟為度去麵炮

乾搗羅為細末每服一錢空心食前米飲調下

烏頭湯 治脾臟冷滑不止腹痛調和陰氣進食

烏頭 益智三兩 乾薑三兩 青橘皮白焙二兩 藿香子炒一兩

欽定四庫全書

普濟方

右剉如麻豆每服二錢水一盞入鹽少許煎至六分

去滓溫服如小腸氣攻刺急煎一兩服熱服

調中散 療冷痢青白色腹內常鳴其痢行數甚踈出

太多此是冷痢病源云冷痢由腸胃虛弱受于寒氣

腸虛則洩故為冷痢也

龍骨 人參 黃連 阿膠 黃蘗各一兩

右搗篩為散煮米飲服二方寸匕日再服瘥停忌猪

魚冷水蒜炙肉粘食



厚朴飲 治冷痢	厚朴 <small>兩 灸一</small> 肉豆蔻 <small>兩 半</small> 白朮 龍骨 <small>各 三分</small>
右剉如麻豆每服四錢水一大盞入生薑三片同煎至七分去滓空心溫服日三	
甘草湯 治冷痢下色白食不消	<small>方見前冷熱痢門</small>
龍骨湯 治冷白滯痢腹痛	龍骨 <small>半 一兩</small> 當歸 <small>兩 一</small> 厚朴 <small>兩 一</small> 赤石脂 <small>半 一兩</small>
右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓空心溫服日三或熱加白頭翁三分洗晒乾牡蠣一兩燒令赤	欽定四庫全書 普濟方
玉粉散 治冷極洩瀉腸滑不禁不欲飲食	<small>方見熱痢門</small>
乾薑丸 治冷痢久不瘥	乾薑 附子 赤石脂 黃連 <small>各 一兩</small>
右為末麵糊丸如梧桐子大米湯下三十九日三服	
倉米湯 治小腹冷氣積聚結成冷痢日夜三十行	倉粳米 <small>半 升</small> 薤白 <small>一 握</small> 香豉 <small>三 升</small> 羊脂 <small>一 觔 熬</small>



右先以羊脂煎薤白令黃并米內豉汁中煎取四升 旦空腹溫服一升如行十里以更進一升得快利止 若痢不止更服如前利後進粳米豉粥若復作更服 一劑
駐車丸 <small>出千金方</small> 治冷熱不調下痢赤白日夜無度腹痛不 可忍者及治休息痢病膿血腸滑無問新舊易服
黃連 <small>六兩</small> 阿膠 <small>三兩</small> 當歸 <small>焙三兩</small> 乾薑 <small>炮一兩</small>
右為末醋煮米糊丸如梧桐子大每服五十九丸加至
欽定四庫全書 普濟方
七十丸空心米飲下小兒百日者三丸五歲已上五 丸一方煎四物湯服之一方不用醋炙以阿膠膏為
丸
四白散 治冷痢
龍骨 白石脂 胡粉 白礬 <small>各半兩</small>
右為末每服二錢匕米飲調下
溫中湯 療寒下食完出
甘草 <small>炙</small> 乾薑 <small>各三兩</small> 蜀椒 <small>八十枚</small> 附子 <small>一枚</small>



右切以水二升煮取一升分再服若嘔內橘皮半兩 小與老皆取服之良忌海藻松菜猪肉冷水
附子丸 治一切冷痢
附子 乾薑 熟艾 各一兩
右為末以新汲水調麵拌和為丸如彈子大每服二 丸用麵一錢以水一盞半化開煎三五沸空心服之 服後覺熱以飯壓之或患冷病丸如梧桐子大空心 米飲下三十九丸加至五十九丸
欽定四庫全書 普濟方
火輪散 治大腸虛滑冷痢日夜不止及心腹冷痛泄 瀉
附子 一兩 肉豆蔻 半兩 乾薑 一分 炮
右為散每服一錢陳粟米飲調下空心服一方為丸 米飲下
赤石脂湯 治以冷痢食不消化臍腹痛
赤石脂 一分 乾薑 一分 炮 白龍骨 半兩
右搗細羅為末每于食前以粥飲調下二錢



又方 <small>出聖 惠方</small>	川烏頭 <small>半 兩</small> 乾薑 <small>一 兩</small>	右搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢	半夏丸 療水下痢色白食不消者為寒下	半夏 <small>炮</small> 烏頭 <small>洗</small> 甘草 <small>炙各 等分</small>	右搗篩為末蜜丸如梧桐子大米飲服三九日再服忌 猪肉海藻菘菜錫等	薑附散 治青下白下	欽定四庫全書	乾薑 附子 皂莢 <small>炙去 子</small>	右等分搗篩為散飲服方寸匕不過再服即愈亦可 丸服再用生薑椒焙為末共乾薑米等分以醋和麵 作小餠餽子服二十枚以水煮更稀飲中重熟出停 冷吞之以粥飲下空腹一日度作之良	炒麵方 治痢色白不消者為寒下	右用好麵炒搗篩煮米粥內麵方寸匕療法百行師 不救者
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	---	-----------------------------------	-----------	--------	----------------------------------	---	----------------	-----------------------------



海藻方 治虛冷下痢腹中留飲

右用海藻一觔絹袋盛以清酒二升浸春夏二日秋
冬三日一服兩合日三酒盡更合飲之如前滓暴乾
米飲服方寸匕日三不過兩劑皆瘥

艾葉方 治冷痢心腹惡氣及一切冷氣鬼邪毒氣

右用艾葉搗汁飲又搗末和氣乾薑末為丸一服三
十丸以飯壓之日再服赤白痢濃煎汁服之

燻法 出肘後方 治冷痢

欽定四庫全書

普濟方

豎合兩口瓦子火爐上火床下使瓦口正當要冷熱
得所取糞上常稍暖為候一宿必瘥常用極効

治寒痢方 出十便良方

右切乾薑如豆大飲服六七十枚日二夜一服痢色
青色寒白服得效

靈砂丹 出醫方 治冷積痢

硃砂 一分 硃砂 一分
並極細研

右用黃蠟半兩巴豆三七粒去殼皮膜同于銀石器



內重湯煮一伏時候巴豆紫色為度去二七粒與前
二味同再研極勻再鎔蠟匱藥每旋丸菴豆大每服
三丸至五丸水瀉生薑湯白痢艾湯赤白烏梅湯服
時須空腹服畢一時不可喫食卧尤佳次食淡粥一
日瘧疾乳香湯面東服不發日曉間服此藥不動氣
服之瀉者止痢者斷冷者愈有積者內化亦不動臟
腑凡痢有沉積者不先去其積雖暫安後必為害也
療以冷痢

欽定四庫全書

普濟方

用赤石脂搗作末和麵作餅飪空腹一碗以水不過
兩頓瘥老人尤佳體中先熱不可服之

華撥丸 出聖惠方 治以冷痢不止食不消化

華撥 兩一 桂心 兩半 胡椒 兩一 訶梨勒 分三 厚朴 兩半 白朮

分三 龍骨 兩一 乾薑 分三 陳橘皮 兩一 白石脂 兩一 縮砂 分三 當

歸 兩半 剉

右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每
服不計時候以粥飲下三十丸



艾葉散 出聖 惠方 治以冷痢食不消化四肢不和心腹多痛

及小思飲食

艾葉 一兩 白石脂 一兩 白朮 三分 龍骨 一分 當歸 一兩 乾薑

三分 厚朴 一兩 附子 一兩 吳茱萸 一兩 阿膠 三分

右搗細羅為散每服不計時候以熱粥飲調下二錢

吳茱萸丸 出聖 惠方 治以冷下痢腹痛不能飲食

吳茱萸 一兩 黃連 半兩 乾薑 一兩 桂心 半兩 厚朴 一兩 木香

半兩 附子 一兩 青橘皮 一兩 甘草 半兩

欽定四庫全書

普濟方

右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每

服不計時候以粥飲下三十丸

吳茱萸散 出聖 惠方 治以冷痢不止心腹疼痛飲食不消四

肢乏力

吳茱萸 半兩 白朮 三分 白石脂 一兩 木香 半兩 當歸 一兩 黃連

半兩 乾薑 厚朴 一兩 去粗皮

右搗羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

附子丸 出聖 惠方 治以冷痢大腸滑洩喫食不消腹脇疼痛



附子 <small>一兩</small> 炮	龍骨 <small>三</small> 分	當歸 <small>一兩</small> 剉	白朮 <small>一兩</small> 一	乾薑 <small>三</small> 分	桂心
半兩	厚朴 <small>一兩</small> 去皮				
白礬 <small>二兩</small> 去皮					
右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不計時候以粥飲下三十九一方有甘草無附子					
肉豆蔻散 <small>出聖惠方</small>	治久冷痢腹脇脹滿食不消化				
肉豆蔻 <small>一兩</small> 炮	乾薑 <small>半兩</small> 炮	白朮 <small>三分</small>	訶梨勒 <small>一兩</small> 煨	華菱 <small>半兩</small>	
木香 <small>半兩</small>	陳橘皮 <small>一兩</small> 湯浸				
右搗細羅為散每于食前以粥飲調下二錢					
欽定四庫全書					
普濟方					
厚朴散 <small>出聖惠方</small>	治久冷痢食不消化心腹疴痛四肢少力				
厚朴 <small>一兩</small> 去粗皮	肉豆蔻 <small>一兩</small>	當歸 <small>三分</small> 剉	龍骨 <small>一兩</small>	木香 <small>半兩</small>	
阿膠 <small>三分</small>					
右搗篩為散每服三錢以水一盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候稍熱服					
龍骨散 <small>出聖惠方</small>	治久冷痢食不消化日夜三十行漸加困				
篤					
白龍骨 <small>一兩</small>	當歸 <small>一兩</small> 剉	白礬 <small>三兩</small> 燒	白石脂 <small>一兩</small>	附子 <small>一兩</small> 炮	



乾薑 炮三分	右搗細羅為散每服不計時候以粥飲下二錢		
赤石脂丸 一名椒 艾丸	治以冷痢食物不化或青或黃四肢		
沉重起即目眩腿冷轉筋			
硫黃丸 出聖 惠方	治以虛冷痢下不止		
附子 一兩 炮	葶苈子 一兩 乾薑 半兩 炮	硫黃 一兩	
右搗細羅為末以醋煮麵糊和丸如小豆大每於食 前以粥飲下三丸			
欽定四庫全書	普濟方		
硃砂丸	治以冷痢不瘥飲食不化面無顏色行坐乏 力 方見 膈門		
乾薑散 出聖 惠方	治以冷痢食不消化臍腹疼痛		
乾薑 三兩 炮	附子 一兩 半炮	龍骨 三兩	
右搗篩為散不計時候煎烏梅湯調下一錢			
神聖散 出聖 惠方	治瀉寒痢不止		
罌粟穀	烏梅肉 半兩	乾薑 半兩	肉豆蔻 半兩
右為末每服二錢水一盞生薑五片煎至七分溫服			



不拘時

厚朴丸 治積年冷痢但二五行脹悶腹鳴食不消化
身黃漸瘦

厚朴 乾薑 陳橘皮 訶梨勒 蕪荑 阿膠

熟艾 胡粉 白茯苓 黃石脂 烏梅 當歸

蜀椒 炒去汗
各一兩

右除膠艾二味外搗羅為末先以米醋一升半于無

風處煮艾水減約八分絞去艾次下阿膠候消盡乘

欽定四庫全書

普濟方

熱入藥末和勻杵千百下併手丸梧桐子大暴乾每

服空心用藥水下五十九丸日午再服

猪肝丸 治冷勞氣痢久不瘥

猪肝 具一 大蒜 兩二 烏梅肉 兩二 桂 兩二 黃連 兩二 厚朴 兩二 陳

橘皮 兩一 當歸 兩一 訶梨勒 兩一

右除猪肝蒜外搗羅為末將猪肝與蒜細研如麵糊

入藥末和勻搗數百下丸如梧桐子大每服三十九

空心用熟麵湯下日午再服



<p>二香丸 <small>出十便 良方</small> 治冷痢久不瘥諸藥不能治者</p>	<p>肉豆蔻 丁香 木香 乾薑 <small>各等分</small></p>	<p>右件一處用白麵裹定慢火煨令麵熟為度取出麵不用同為末煮麵糊為丸如梧桐子大食前溫米飲</p>	<p>下三十丸</p>	<p>鍾乳石丸 <small>出十便 良方</small> 治臟寒腹痛下痢不禁</p>	<p>成煉鍾乳粉 硫黃 <small>各半兩</small> 陽起石 白礬 <small>各一兩</small></p>	<p>右件為細末煮麵糊丸如小豆大每服十丸粟米飲</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>下空心食前</p>	<p>玉粉丹 <small>出十便 良方</small> 治腸胃虛寒下痢清穀或便純白腸滑</p>	<p>不禁少氣羸困全不思食</p>	<p>飛硫黃 <small>五兩</small> 白龍骨 鍾乳粉 附子 白石脂 <small>各二錢半</small></p>	<p>右件並細研勻湯浸蒸餅丸如梧桐子大空心食前米飲送下五十丸</p>	<p>治冷痢</p>
---	--	---	-------------	---	--	-----------------------------	-------------------	--------------	--	-------------------	---	------------------------------------	------------



用煙煑食之於飯後食之佳與服丹石人相宜天行
病後不可食切忌

治冷痢腹痛不能食

出本
草

治腹內冷脹滿泄痢腸澼溫中補虛

出本
草

用孝文韭食之

治痢色白食不消者為寒下方

用好小麥麵炒搗篩煑米粥內麩方寸匕服

治冷痢

欽定四庫全書

普濟方

用沙牛角腮燒灰粥飲調下二錢

治寒積痢男子小兒婦人皆不同赤白或青痢如水不

後重者寒也經云澄徹清冷皆屬於寒此為虛寒中

有積也宜附子巴豆之類下之見利得愈空心服

猪啞酒 療冷痢久不瘥方云此是脾氣不足暴冷入

脾故舌上生瘡飲食味從喫食下還吐小腹雷鳴時

時心閉乾皮細起膝脛酸痛肉潤兩耳絕聲四肢沉重

日漸瘦劣重成塊氣及婦人血氣不和逆飲憂煩行常



無力四肢不舉丈夫痿痺兩肋虛脹變為水氣服之
皆效驗此法出于傳屍方

取猪脰一具細切青蒿葉相和以無灰酒一大升微
火溫之乘熟內猪脰和蒿葉相共暖使消盡又取桂

心一小兩別搗為末內酒中每日平旦空腹取水一

盞服之午時夜間各再一服甚驗忌熱麵油膩等

治冷滑下痢不禁虛羸

用縮砂蜜熬末以羊子肝薄切以末逐片糝瓦上焙

欽定四庫全書

普濟方

乾為末入乾薑末飯為丸日二服五十九丸溫水送下

食前

止冷痢冷氣

用艾炒麵裹作餛飩三五枚以飲壓之良

治水痢百種

以馬藺子用六月六日麵熬令黃各等分為末空心米

飲服方寸如無六月六日麵用常麵或牛骨灰等分亦得

治冷滑下痢不禁虛羸方



用附子炮乾薑厚朴陳橘皮等分為末飯為丸日二服四十九丸溫水送下空心服

熱痢 論

凡痢色黃色赤並熱也甚則下血汁此由腸虛胃弱邪熱之氣乘虛入客於腸間故其証下痢黃赤或血雜下腹間熱痛小便赤澁身熱煩渴皆謂之熱痢

方

牡蠣湯 治諸熱毒痢下黃汁及如赤爛豆汁如赤帶

欽定四庫全書

普濟方

狀又如魚腦壯熱

牡蠣 白頭翁 當歸 犀角 艾葉 甘草

桑寄生 劉各半兩 升麻 黃蘗 黃連 黃芩 酸石

榴 各三分

右粗搗篩為散每服五錢水一盞半煎至一盞去滓

空心溫服日午再服

龍骨散 治熱痢下赤黃色膿心煩神熱腹內疼痛而

飲食減少



<p>龍骨<small>一兩</small> 黃連<small>三分</small> 犀角屑<small>三分</small> 黃蘗<small>兩半</small> 赤芍藥<small>兩半</small> 黃芩<small>兩半</small></p> <p>兩<small>半</small> 當歸<small>兩半</small> 赤地利<small>三分</small> 黃耆<small>三分</small> 茜根<small>三分</small> 鼠尾草花<small>三分</small></p>	<p>右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢</p>	<p>大阿膠丸 治發熱下痢腹痛甚至肛門痛欲絕者</p>	<p>當歸 阿膠 豆蔻 龍骨 赤石脂 大艾</p>	<p>黃連 木香 乳香<small>各五錢</small> 白礬<small>枯一分</small></p>	<p>右為末用鹽梅肉丸如梧桐子大每服三十九丸陳米</p>	<p>飲下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>苦參丸 治熱毒痢注下赤黃</p>	<p>苦參 陳橘皮 獨活 阿膠 藍青 黃連</p>	<p>黃蘗 甘草</p>	<p>右等分除阿膠外為末以水煮阿膠和餅手丸如梧</p>	<p>桐子大每服二十九丸飲下日三服治痢大良</p>	<p>黃芩散 治熱痢心神煩悶小便赤澀</p>	<p>黃芩<small>三分</small> 赤茯苓<small>兩一</small> 川升麻<small>兩半</small> 吳藍<small>兩半</small> 阿膠<small>三分</small> 鬼白</p>	<p>兩<small>半</small> 黃連<small>兩半</small> 黃蘗<small>三分</small> 甘草<small>兩半</small></p>
--	----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--	------------------------------	-----------	-----------------------	---------------------	---------------------------	--------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------	---	--



枳殼 分三	黃連 分三	木香 兩半	地榆 兩半	當歸 兩半	甘草 兩半	黃耆 分三	犀角屑 分三	木香丸 出聖方 治冷痢腹疼煩悶不食	黃連丸 治熱痢腹內疼痛日夜行氣欲絕 見前冷熱痢門	右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢	屑 兩半	龍骨 分三	地榆 兩半	當歸 分三	黃耆 分三	黃連 兩一	黃蘗 兩半	生乾地黃 分二	黃芩 分二	犀角	黃耆散 出聖方 治熱痢下赤黃膿腹疼心煩	欽定四庫全書 普濟方	療諸症下及卒下悉効忌海藻菘菜等	梧桐子大暴燥以飲服十九日三不知稍加此方以	右搗篩為末用蜜與膠共拌勻和丸併手捻作丸如	藥 甘草 鬼白 分各四	苦參 橘皮 獨活 阿膠 芍藥 乾薑 黃	結腸散 治熱毒不斷不問以新悉療之	計時候溫服	右搗篩為散每服三錢以水一盞煎至六分去滓不
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------	--------------------------------	---------------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	----------	----	---------------------------	---------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------	-------	----------------------



右搗羅為散煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下三十九

犀角散 出聖惠方 治熱痢下赤黃膿血腹痛心煩困悶

犀角屑 一兩 黃連 一兩 木香 三分 當歸 半兩 黃耆 一兩 地榆 一兩

當歸散 出聖惠方 治熱痢下赤黃膿腹痛煩熱

當歸 三分 黃芩 三分 地榆 一兩 黃連 一兩 甘草 半兩 犀角屑 一兩

一兩

右搗篩為散每服三錢以水一盞煎至五分去滓不

欽定四庫全書

普濟方

計時候溫服

犀角煎 療熱毒下血及豆汁

犀角屑 三兩 人參 各三兩 當歸 各三兩 黃連 四兩 蜜 一分

右切以水五升煮取一升去滓內蜜煎三沸分為三

服日三忌猪肉冷水

犀角散 治熱毒痢並痢血

生犀角 二兩 石榴皮 三兩 黃連 三兩 乾薑 二兩 地榆 三兩

右為散以米飲服三寸匕日二服



黃連散 治熱痢煩渴腹痛

黃連一兩 黃芩一兩 當歸一兩 赤石脂一兩

右搗細羅為散每服不計時候以粥飲下調二錢

黃連丸一名羊角 治一切冷痢及休息痢日夜頻并兼治下

血黑如鷄肝色或蠱痢腹中痛有膿血下者

黃連二兩 羚羊角 黃蘗一兩 赤茯苓半兩

右搗羅為末蜜丸如梧桐子大每服二十九丸薑蜜湯

下暑月下痢用之尤驗一方用白茯苓蠟茶送下

欽定四庫全書

普濟方

芍藥蘗皮丸 治一切溫熱惡痢頻并搶痛無問膿血

並宜服之

芍藥 黃蘗各一兩 當歸 黃連各半兩

右為末水丸小豆大溫水下三四十九丸無時兼夜五

六服忌油膩脂肥發熱諸物等拔萃方不用當歸黃

連二味以醋糊為丸

四味阿膠湯 治脅熱下痢其色黃煩燥多渴臍腹疼

小便不利



黃連丸 治一切熱毒血痢大人小兒另丸	黃連 黃蘗 槐花 枯白礬 各一兩
行毒痢良驗 方見本門	
宜服此除熱痢亦作丸子熟水吞下四五十九丸治時	
二黃熟艾湯 出危氏方 治傷寒四五日大下熱痢諸藥不止	
右為粗末每服三錢薑三片同煎吞感應丸	
升麻湯 出直指方 治傷暑下痢纏痛	升麻 白芍藥 甘草 灸各十兩 白乾葛 十五兩
欽定四庫全書 普濟方	
前米飲送下	
痢未斷服熱藥蘊毒伏熱滲成血痢皆治之	烏梅肉 二兩 黃連 四兩 當歸 枳殼 各一兩
烏梅丸 治熱留腸胃下痢純血臍腹疴痛或先經下	
食前米飲送下	
右為細末用醋糊丸如梧桐子大每服五十九丸空心	黃連 四兩 茯苓 二兩 赤芍藥 三兩 阿膠 一兩



木香 兩二 黃連 兩四 生薑 兩四	先服解散藥便先服此	秘傳香連丸 <small>出濟生方</small> 治赤痢大人小兒通用良方痢初作	右同漿水五合煎至四合去滓空心溫分二服	甘草 兩半 生薑 一分 生蜜 一分	甘草湯 治夏月暴下熱痢	右同漿水五合煎至四合去滓空心溫分二服	空心日服空心晚再服	右咬咀如麻豆大水二盞煎至一盞去滓分溫二服	欽定四庫全書 普濟方	生地黄湯 治熱痢不止	生地黄 兩半 甘草 一分 地榆 三分	九空腹米飲下更以意加減	右等分搗羅為末沙糖為丸如梧桐子大每服十五	木香 黃連 甘草 肉豆蔻	香連丸 治熱痢	飲下食前日三服	右為細末軟粟米飲丸如梧桐子大每服三十九丸米
----------------------------------	-----------	--	--------------------	----------------------------------	-------------	--------------------	-----------	----------------------	---------------	------------	-----------------------------------	-------------	----------------------	--------------	---------	---------	-----------------------



右先鋪生薑在鍋底次鋪黃連在薑上次又鋪木香于黃連上用新汲井水三碗煎乾不要攪動候煎乾取去三味焙乾碾為細末以醋調陳倉米飲打糊丸梧桐子大每服七十丸空心米飲湯下
鬱金散 治一切下毒痢下血不止
川鬱金 甘草 <small>炒</small> 槐花
右為細末每服三錢豆豉湯調下食前服
犀角散 治熱毒痢血其痢下數甚數痢出不多腹中
欽定四庫全書 普濟方
刺痛此是熱痢
生犀角 酸石榴皮 枳實 <small>各三兩</small>
右各異搗篩為末米飲服二方寸匕日再瘥停忌熱食物
黃連散 治熱痢無度 <small>方見本門</small>
黃連烏梅丸 <small>出聖意方</small> 治諸熱痢不瘥
烏梅肉 黃連 <small>各四兩</small>
右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九食前



溫米飲下日二服	黃連散 治熱挾痢多 赤膿雜血	黃連 竈突中黑塵 各一兩	右為細末每服二錢溫酒調下空心日再服	粟殼散 治熱痢便血無度	嬰粟殼 一兩 陳皮 半兩	右為細末每服三錢水一盞烏梅一個煎至七分溫服	欽定四庫全書 普濟方	蒲根湯 治熱痢	蒲根 兩 粟米 二合	右用水三盞半去滓分二服空心日午服	鯽魚方 治夏月熱痢	右用鯽魚食之多益冬月則不治也	治熱痢不止方 <small>出聖方</small>	用搗車前葉絞取汁一盞入蜜一合煎溫分二服	治熱毒痢
---------	----------------	--------------	-------------------	-------------	--------------	-----------------------	---------------	---------	------------	------------------	-----------	----------------	---------------------------	---------------------	------



用恭菜研作粥善解熱毒

除煩熱下氣調胃止洩痢治熱毒痢

用陳倉米作飯食之一方以白粳米汁亦主心痛止

渴

龍骨方出肘後方治熱痢病不解而下痢欲死及治休息痢

飲下痢

用龍骨半觔搗研水一斗煮取五升候及冷稍飲得

即愈一方為末米飲和丸服十九

欽定四庫全書

普濟方

治痢下色黃色協熱毒也

出肘後方

梔子

十四枚
去皮

右搗篩為末蜜和丸如梧桐子大每服三丸日再服

治諸熱痢血痢及痛後大腸裏痛方

用蘿蔔截碎研細濾清汁一小盞蜜水相拌一盞同

煎早午食前服日晡以米飲下黃連阿膠丸百粒無

蘿蔔以蘿蔔子代之

治熱痢方



用舊年白梅并好茶蜜水各半煎服冷痢生薑汁蜜水各半煎服仍兼木香生肉豆蔻為佐蜜最治痢
小品梔子湯 <small>出肘後方</small> 療溫熱為毒及腸寒外熱內虛熱攻腸胃下黃赤汁及赤白帶下及如爛肉汁壯熱腹痛并諸熱毒
用梔子十四枚豉一升薤一虎口以水四升煮梔子並薤白菜內豉煮取二升分為三服良
玉粉丸 治脅熱下痢燥渴
欽定四庫全書 普濟方
蛤粉 硫黃 <small>分等</small>
右為細末麵糊丸如梧桐子大每服十五丸用米飲下
禹餘糧丸 <small>出指南方</small>
禹餘糧 赤石脂 乾薑 <small>各一兩</small>
右為末麵糊丸如梧桐子大米飲下三十九丸
敗毒散 治下痢發或口禁
用生薑棗子陳米煎服痢後手足疼痛敗毒散加檳



用赤小豆杵末水調下方寸匕	又方	用羚羊角屑作末研和少蜜服	治熱毒痢及血痢 <small>出本 草</small>	用丹黍米飯食之	治煩熱止洩痢并渴	用紫莧煮服之	治熱痢 <small>出本 草</small>	欽定四庫全書 普濟方	用馬屎搗絞汁服之	治暴熱熱痢止渴 <small>出本 草</small>	旦空心服	用宣連六兩以水七升煮取二升半夜露星月下平	治大熱毒純血痢 <small>出千 金方</small>	用好井水及土石間新出泉水飲之	治熱痢 <small>出本 草</small>	榔木瓜煎服此即所謂痢後風水
--------------	----	--------------	------------------------------------	---------	----------	--------	--------------------------------	-------------------	----------	------------------------------------	------	----------------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------------	---------------



下赤痢白痢

附論

夫赤白痢者由腸胃虛弱冷熱相乘客於腸間變而為痢也蓋熱乘於血流滲腸內則赤冷氣入搏津液凝滯則白其候裏急後重數至圍而不能便冷熱相交故膿白相雜謂之赤白痢者狀其膿涕而雜血之輕者白膿上有赤脉薄血狀如魚脂腦世謂之魚腦痢也

方

赤石脂丸 治赤白痢

欽定四庫全書

普濟方

赤石脂 桑根白皮 桔梗 訶梨勒皮 天雄

龍骨各一兩半 白芷 黃連 地榆 當歸 桂去粗皮

厚朴 木香各一兩 黃芩 乾薑各半兩 肉豆蔻 薏苡仁

右搗羅為末麵糊和丸如梧桐子大每服三十九米

飲下

如聖湯 治下痢赤白甚重者

人參 當歸各三寸 滴乳一塊 罌粟殼一個 甘草二寸 白豆

蔻 縮砂仁 大丁香各二十一個 大北棗七個 烏梅七個



陳生薑 <small>二塊</small>	右為末分三服水一盞半煎七分去滓服不用嬰粟殼亦可	白朮丸 <small>出聖惠方</small> 治赤白痢及水穀冷熱氣痢	白朮 <small>三分</small> 赤石脂 <small>三分</small> 犀角屑 <small>三分</small> 乾薑 <small>兩半</small> 龍骨 <small>三分</small> 厚朴 <small>一分</small>	一兩黃連 當歸 <small>三分</small> 烏梅肉 <small>三分</small> 甘草 <small>兩半</small>	右搗羅為末煉蜜和搗五百杵丸如梧桐子大每於食前粥飲三十丸	欽定四庫全書 普濟方	固腸湯 治腸虛下痢赤白頻併日久無度老幼產婦俱可服之	嬰粟殼 <small>兩三</small> 枳殼 <small>兩三</small> 白芍藥 <small>兩各二</small> 橘紅 <small>兩各</small> 當歸 <small>一兩各</small>	甘草 <small>兩灸一</small> 訶子 木香 人參 白薑 <small>兩各半</small>	右剉為散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前服	阿膠丸 治赤白痢	阿膠 <small>兩半</small> 枳殼 <small>兩半</small> 訶梨勒 甘草 乾薑 黃連
--------------------------	-------------------------	--	---	--	-----------------------------	---------------	---------------------------	--	--	-----------------------	----------	--



黃連散 <small>出聖方</small> 治赤白痢腹中痛口乾或作寒熱	右細剉每服三錢水一盞煎取七分去滓溫服	乾薑 <small>三分</small> 烏梅 <small>三分</small> 赤茯苓 <small>三分</small>	當歸 厚朴 阿膠 芍藥 甘草 <small>半兩</small> 黑豆 <small>一合</small>	當歸湯 治赤白痢疼痛不止	右搗羅為末以米醋二升入藥末一兩同熬成膏丸	地榆 桔梗 <small>各一兩</small> 黃連 <small>炒三兩</small> 木香 <small>半兩</small>	赤地利 阿膠 赤石脂 <small>各二兩</small> 當歸 乾薑 <small>各一兩半</small>	欽定四庫全書 普濟方	赤地利丸 治一切赤白冷熱下痢腹內疼痛	右為細末每服二錢以粥飲調下不計時日二	勒 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 乾薑 <small>一兩</small> 黃連 <small>一兩</small>	赤石脂散 <small>出聖方</small> 治赤白痢日夜不絕	赤石脂 <small>一兩</small> 龍骨 <small>一兩</small> 阿膠 <small>一兩</small> 地榆 <small>一兩</small> 厚朴 <small>半兩</small> 訶梨	米飲下食前服	右為末用陳苦酒和丸如梧桐子大每服二十九以	木香 <small>各一兩</small> 芍藥 地榆 <small>各一兩半</small> 當歸
--	--------------------	---	---	--------------	----------------------	---	---	---------------	--------------------	--------------------	--	--	--	--------	----------------------	--



烏梅散 治赤白痢久不止腹中疼痛及下血脫肛	烏梅肉 樗根皮 赤石脂 當歸 地榆 <small>各 各 各 各 各 兩 兩 兩 兩 兩</small>
烏梅肉 樗根皮 赤石脂 當歸 地榆	<small>各 各 各 各 各 兩 兩 兩 兩 兩</small>
黃連 乾薑 甘草 <small>炮 各 三 分 分 分</small>	<small>炮 各 三 分 分 分</small>
右為散每服三錢溫水飲調下空心食前服	
欽定四庫全書	普濟方
輭紅丸 治赤白痢久不瘥取虛積冷	
丹研 粉霜 砒霜 硫黃 硃砂 硝石 <small>兩 半 錢 一 兩 半 兩 半 兩 半 兩 半 錢 各 一</small>	<small>兩 半 錢 一 兩 半 兩 半 兩 半 兩 半 錢 各 一</small>
輕粉 龍腦 <small>錢 二 錢 研 半</small>	<small>錢 二 錢 研 半</small>
右同研勻入細去皮心膜巴豆半兩研勻用黃蠟半	
兩溶作汁同和旋丸如菉豆大每服三十丸至五十	
丸溫漿水下	
赤石脂丸 治氣虛冷熱不調臍腹疼痛下痢膿血日	
夜頻滑四肢少力裏急後重不進飲食	



香 蛤粉 錢二	丹砂 硫黃 錢各二 白頭翁 錢半 巴豆 半一錢 砒霜 錢半 麝	丹硫丸 出聖 急方 治赤白痢久不瘥 臍腹痛	并米飲調下治腸滑極有效 作丸服亦得	右搗研為散更合研勻每服一錢 小兒半錢或一字	龍骨 兩各半	綠礬 白礬 石灰 鉛丹 赤石脂 縮砂仁	綠白散 治大人小兒赤白痢滑腸不止	欽定四庫全書 普濟方	右呶咀以水七升煎取三升分三服	二甘草 兩一	黃連 黃蘗 乾薑 石榴皮 阿膠 兩各三 當歸	黃連湯 治赤白痢	服二十九至三十九丸温米飲食前服	右研為末再同研勻以粟米飲和丸如梧桐子大每	赤石脂 龍骨 白礬灰 兩各二 胡粉 兩一 蜜陀僧 兩半	阿膠 烏賊魚骨 兩各一
---------------	--	-----------------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	------------------------------------	---------------------	---------------	----------------	-----------	--	-------------	-----------------	----------------------	--	-------------------



乾薑 <small>半</small> 地榆 甘草 <small>二</small> 乾薑 當歸 <small>各一</small> 黑豆	酒痢臟毒全不進食	斗門散 治八積毒痢臟腑撮痛膿血赤白或有五色相雜日夜頻併兼治禁口惡痢裏急後重下血不止	溫服	右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓空心	龍骨 白茯苓 <small>一兩半</small>	馬蘭子 <small>三</small> 合地榆 艾葉 <small>各二</small> 赤石脂 當歸 <small>各四</small>	欽定四庫全書 普濟方	馬蘭子飲 治赤白痢臍腹疼痛及以水瀉白濁如米	下	右搗羅為末煉和丸如梧桐子大每服三十丸米飲	當歸 <small>各半</small>	艾葉 黃連 木香 <small>一</small> 肉豆蔻 <small>各三</small> 地榆 <small>一</small> 阿膠	艾葉丸 治赤白痢血多痛不可忍	右合研為細末同棗肉丸如黍米飲下一丸食前
--	----------	---	----	----------------------	---------------------------	--	---------------	-----------------------	---	----------------------	----------------------	--	----------------	---------------------



錢重丸 錢重丸嬰粟殼治痢腹疾其效如神但姓緊澁多令	三個煎服食前純赤加黑豆二十七粒白加乾薑一	右為粗末分作兩服每服薑五片大棗三枚大烏梅	香錢半	茯苓 白木 甘草 草菓 嬰粟殼 架 兩各一 兩半 一枚 大者十枚	斷下湯 止赤白痢無問久近長幼及休息痢疾	右等分每服四錢水一盞半煎去滓服食前	黃連 大栢皮 地榆 烏梅 甘草 赤芍藥	欽定四庫全書 普濟方	黃連湯 治赤白痢	右搗羅為細散每服二錢粥飲調下不計時候	沒石子 黃連 乾薑 白茯苓 當歸 厚朴 兩半 兩一 兩一 兩半 兩一 兩一	沒石子散 治痢白多赤少	右為細末每服二錢水一盞煎至七分溫服不拘時	候	嬰粟殼 兩各四
-----------------------------	----------------------	----------------------	-----	-------------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------	----------	--------------------	--	-------------	----------------------	---	---------



鉛丹丸 治赤白痢腹痛止	鉛丹 半錢 丹砂 二錢 巴豆 去核 乳香 一錢 杏仁 七枚 砒霜 半錢
右搗羅為散每服二錢陳米飲調下日三服	
龍骨阿膠散 治赤白痢冷熱相攻腹中疴刺疼痛	龍骨 赤石脂 厚朴 獨皮 地榆 阿膠 各等分
食前溫服	
右咬咀每服用棗子一個生薑三片水二盞煎至一盞	
實腸散 治赤白痢	青皮 陳皮 厚朴 蒼朮 訶子 砂仁
更加罌粟與陳皮 赤白瀉痢一齊掃	
治赤白痢 三片生薑三個棗 一個烏梅三寸草	
藥服之無不應手作效	
餘立用白梅煎茶或薑湯嚥下令大便微利仍以煎	
而成此疾始得之未可遽止先以加巴豆感應丸斗	
服之大率痢疾古方謂之滯下多因腸胃素有積滯	
人嘔既用醋製加以烏梅不致為患素嘔吐則不可	



分三	枳殼散 治赤白痢冷熱未調下痢不止	枳殼 分三 甘草 分三 厚朴 分三 梔子根 分三 地榆 分三 紫草
服之	右為剉散都作一服用水二大碗煎至一碗去滓得 一碗稍熱服不計時候分作三服小兒量大小加減	
菜 半一	嬰粟殼 七個 烏梅 三個 甘草 七寸 七小 大棗 七個 生薑 七片 七大 薤	欽定四庫全書 普濟方
妙應湯	治大小赤白痢	
丸米飲	下空心日三服	
右搗羅	為末水浸炊餅為丸如梧桐子大每服二十	
豆蔻	分一	
黃連	龍骨 地榆 訶梨勒 赤石脂 各半 草	
黃連丸	治赤白痢裏急後重	
丸煎乾薑	甘草湯下	
右研令勻	細鎔黃蠟和丸如黃米大每服三丸至五	



右搗細羅為散每服十丸不計時候以粥飲下二錢	秘傳斗門方 治八積毒痢臟腑撮痛膿血赤白或下	瘀血或成片子或有五色相雜日夜頻併兼治禁口	惡痢裏急後重久渴不止全不進食他藥不能治者	立見神効	黑豆 _{十二兩} 乾薑 _{四兩} 罌粟殼 _{炒半} 地榆 甘草 _{各六兩}	白芍藥 _{三兩}	右為細末每服二錢水一盞同煎至七分溫服	欽定四庫全書 普濟方	乾薑湯 療卒大注及赤白滯下困篤欲死腸已滑	乾薑 _{二兩} 黃蘗 石榴皮 _{各一兩} 阿膠 _{二兩} 漬豉 _{一升} 前	胡 _{四兩}	右剉為散以水三升煮取三合去滓內阿膠頓服不	瘥更作服之良	訶梨勒丸 治赤白痢	訶梨勒 訶子 蕪荑 黃連 陳橘皮 _{湯浸}	右等分為末用漿水粟米飯和丸如梧桐子大每服
----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	------	---	-------------------	--------------------	---------------	----------------------	--	-----------------	----------------------	--------	-----------	--------------------------------	----------------------



三十丸空心生薑湯下	甘草湯 治赤白痢疼痛不止	甘草 地榆 當歸 黃連 芍藥 炒各半兩	右細剉每服三錢漿水一盞煎取六分去滓溫服食前	龍骨黃連丸 治赤白痢	龍骨 黃連 白石脂 各一兩半 胡粉 白礬 各兩	右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸米飲下日	欽定四庫全書 普濟方	三	黃連散 治赤白痢	黃連 一兩 木香 一兩 丁香 訶梨勒皮 乾薑 各半兩	右為散每服三錢陳米飲調下再服	甘露丸 治赤白痢腸風臟毒酒積下血便血皆治之	舶上硫黃 一兩 硝石 一兩 白明礬 半兩 滑石 半兩 飛麵 四兩	右為末極細滴水和丸如梧桐子大每服三十丸或	五十丸用新汲水送下腸風臟毒便血一服奏效遠
-----------	--------------	---------------------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------	------------	---	----------	----------------------------	----------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------



年者不過三日除根

厚腸湯 治下痢赤白

嬰粟殼八兩 地榆六兩 白朮 紫蘇葉 木瓜乾各三兩

右為剉散每服四錢水一盞半薑七片棗二個煎七

分去滓空心服

乾香丸 治赤白痢疾

乳香一錢 沒藥一錢 丁香五十粒 胡椒五十粒 巴豆十五粒

右為細末麵糊為丸如菉豆大大人用七丸中人五

欽定四庫全書

普濟方

丸小兒三丸赤痢蜜水下白痢生薑湯下赤白痢生

薑湯蜜水湯下瀉不止米湯下

透紅丹 治赤白痢疾諸般泄瀉

江子去殼 杏仁四十粒 黃丹一兩 信半錢 黃蠟一兩

右為末黃蠟鎔為丸如梧桐子大每服五丸紅者甘

草湯下白者乾薑湯下赤白痢甘草乾薑湯下五色

痢楮葉艾葉丁香煎湯下

鹿茸散 治下青黃赤白黑五色



右用鹿茸炙石榴皮乾薑各二兩棗核中仁七枚赤 薊如三指燒成灰五物下篩先食後服方寸匕日三 夜一下數者可五六服沸湯調下
阿膠散 治赤白痢腹中疴痛時作寒熱
阿膠 <small>兩半</small> 甘草 <small>兩半</small> 附子 <small>兩一</small> 黃連 <small>兩一</small> 當歸 <small>兩半</small>
右搗篩為散每服三錢以水一盞煎至五分去滓不 計時候稍熱服
烏梅散 <small>出聖 惠方</small> 治赤白痢行數不減時或口乾發渴
欽定四庫全書 <small>普濟方</small>
烏梅肉 <small>兩半</small> 黃連 <small>三分</small> 乾薑 <small>兩半</small> 訶梨勒 <small>三分</small> 白礬 <small>兩半</small>
右搗羅為末每服不計時候以粥飲調下二錢
木香湯 治赤白痢不瘥疼痛不可忍者
黃連 木香 乾薑 <small>各一分</small> 乳香 <small>兩半</small>
四神散 治赤白痢後重疼痛
黃連 當歸 黃栢 乾薑 <small>各等分</small>
右為細末每服二大錢烏梅三個煎湯調下空心服 一方為散烏梅煎服水瀉等分赤痢黃白痢加乾薑



後重加黃連腹痛加當歸

治赤白痢腹痛者

取石榴一枚并子搗汁頓服如梅實入建茶

神妙散 治赤白痢疾

大黃 人參 枳殼 大麻子 各等分

右為末麵糊丸如梧桐子大每服三十丸白湯下

麝香丸 治赤白痢諸藥無効

麝香 一分 菘豆粉 一分 硃砂 兩半 巴豆 一分

欽定四庫全書

普濟方

右為細末粟米飯丸如菘豆大食前冷粥飲下二九

當日忌食熱物

內補散 治赤白痢

黃連 兩一分 甘草 兩半 乾薑 兩半 紫筍茶 兩半

右為細末每服二錢粥飲調下不計時候日三

龍骨散 治赤白痢腸胃虛滑

龍骨 兩半 黃連 兩 牡蠣 兩一分 烏梅肉 三分

右為細末每服二錢溫米飲調下食前服



橡實散 治赤白痢	橡實殼 甘草 荔枝殼 石榴皮	右等分細剉每服半兩水一盞半煎至八分去滓溫服	黃連散 治赤白痢膿血	黃連 龍骨 各二兩 赤石脂 半兩 厚朴 兩 人參 三分 乾薑 地榆 黃芩 各一兩	右為散空心粥飲下二錢日再服	欽定四庫全書 普濟方	阿膠丸 治赤白痢痛不止	阿膠 三兩 黃連 二兩 當歸 胡粉 各一兩	右研為末稀糊粉丸如梧桐子大每服三十丸食前米飲下	黃連丸 治赤白痢無問遠近一名茯苓丸 方見前冷熱痢門	萬金茯苓散 治赤白痢	赤茯苓 黃連 阿膠 黃蘗 各等分	右為散每服二錢空心甘草湯下日再以瘥為度如
----------	----------------	-----------------------	------------	--	---------------	---------------	-------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	------------	------------------	----------------------



三歲以下小兒每服半錢五歲至十歲每服一錢	肉豆蔻散 治赤白痢累醫不效	肉豆蔻 <small>五枚</small> 鹿角屑 <small>一兩</small> 胡粉 蜜陀僧 <small>各三分</small>	右為散每服二錢米飲調下	木香散 治赤白痢	木香 肉豆蔻 檳榔 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>半兩</small>	右為散每服二錢半米飲調下	金鳳散 治男子婦人赤白痢疾	欽定四庫全書 普濟方	鳳眼草 <small>三錢</small> 粟殼 <small>二錢</small> 母黑豆 <small>二十丸</small> 公棗兒 <small>三個</small>	右為粗末加蜜一匙水二盞煎至一盞去滓空心溫服此藥後仰睡忌冷水白痢白粟殼赤痢赤粟殼	黃連茱萸湯 主積冷徹白痢下不斷變成黑血汁爛	魚腹脹痛疼枯瘦不能飲食	黃連 <small>四兩</small> 吳茱萸 當歸 <small>各一兩</small> 石榴皮 <small>三兩</small>	右以水三升漬黃連一夕明旦更入三升水煮取三升分為三服
---------------------	---------------	---	-------------	----------	---	--------------	---------------	---------------	---	---	-----------------------	-------------	--	---------------------------



草果湯 主腸胃冷熱不和下痢赤白及腹熱泄瀉臟
毒便血悉皆治之兼主脾胃

草果 甘草 地榆 枳殼

右等分為粗末每服二錢水一盞半煨薑一塊煎至
七分去滓服不拘時候

肉豆蔻散 治脾胃虛滑泄瀉不止下痢赤白無藥可
治者

肉豆蔻 罌粟殼 甘草 乾生薑

欽定四庫全書

普濟方

右等分為末每服六錢如赤加炙黃甘草一寸若白
多加炒生薑一塊同煎用水二盞煎至一盞半通口
服不拘時兩服滓再煎作一服如水瀉每服五錢米
飲調服

地榆散 治赤白痢

地榆 一兩 檮樹白皮 一兩 白朮 三分 當歸 三分

右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓
不拘時候稍熱服



三聖丸 治下痢赤白日夜無度及泄瀉注下	桐子大每服二十九丸溫米飲下食前服	右黃連茯苓阿膠為細末水調阿膠末搜和丸如梧	阿膠 <small>一兩</small> 黃連 <small>三兩</small> 茯苓 <small>二兩</small>	魚腦裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利	黃連阿膠丸 治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白狀如	右為末每服二錢米飲調下	嬰粟殼 <small>二錢半</small> 木香 <small>二錢半</small> 甘草 <small>二錢</small> 地榆 <small>二錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	安和飲子 治赤白痢不問老弱並治之	大每服以冷水下三丸	右件藥並生用同研令細以水浸蒸餅和丸如菉豆	砒霜 <small>半兩</small> 附子 <small>半兩</small> 寒水石 <small>一兩</small> 定粉 <small>一兩</small>	神効方 治赤白痢	右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢	治赤白痢冷熱不攻腹中疼痛	黃連 <small>半兩</small> 蕪荑 <small>半兩</small> 乾薑 <small>半兩</small> 甘草 <small>一分</small>
--------------------	------------------	----------------------	--	--------------------	-----------------------	-------------	--	---------------	------------------	-----------	----------------------	--	----------	---------------------	--------------	---



藥皮 大蒜 罌粟殼 各等分

右搗篩過粗者更搗同淹一宿次日慢火炒香熟亦
旋篩取細者餘更炒不爾則細者焦碾為末粟米飯
糊丸如梧桐子大每服五十九丸米湯下

三黃湯 治赤白痢赤多白少一名黃連丸 方見前冷熱痢門

赤芍藥散 治赤白痢

赤芍藥 香附子 地榆 各等分

右為細末留心認記赤痢用赤芍藥末一錢香附子

欽定四庫全書

普濟方

末半錢地榆末一錢蜜一匕水一盞煎五七沸空心

溫服白痢者附子末一錢芍藥末半錢地榆一錢蜜

一匕水一盞煎七分空心溫服日二服小兒加減與之

百草霜丸 治心腹痛及白痢一名針頭丸

百草霜 半兩 巴豆 一分 杏仁 一分

右用巴豆杏仁二味各于麻油燈焰上燒灰存性同

三味和勻用酒蠟二錢鎔開和成劑旋丸如菉豆大

每服三丸血痢甘草湯下白痢乾薑湯下如要定轉



用棗子七枚衛生家方內不用酒丸如芥子大每服

三丸水瀉井水送下黑痢烏梅湯送下

艾連湯 治痢不問赤白

右法煎令有味溫冷任下數服即愈

奪命丹 治遠年以日赤白一切痢

丁香 四十粒 巴豆 四十粒 杏子 四十粒

右搗為泥用淨黃蠟化開作一塊收之如用時每服

三七丸每丸如梧桐子大赤痢甘草湯下白痢乾薑

欽定四庫全書

普濟方

湯下赤白者甘草薑湯下空心服忌一切葷腥油物

吳茱萸湯 治冷熱赤白痢一名戊巳丸 方見前冷痢門

三神丹 治赤白痢疾

巴豆 七個 烏梅 一個 肉豆蔻 一個

右用黃黍米酒漿浸二宿飯上蒸米熟同藥丸梧桐

子大每服一丸紅痢黑豆湯下赤白痢甘草湯下白

痢米湯下露過一宿面東立服之不過婦人手

橡實散 治赤白痢日夜不止



二霜丸 治赤白痢服藥過度未得全減宜服此方	丸如菘豆大每服以冷水下三十丸	右以水一大盞調攪澄清傾却上面者用底下稠者	黃丹 兩一 白麵 兩半 巴豆 九枝	黃丹丸 治赤白痢	右同研以燒飯和丸如黍米大空心以冷水下三丸	粉霜 錢二 膩粉 錢一 砒霜 錢一	粉霜丸 治赤白痢諸藥不効	欽定四庫全書 普濟方	右細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢	酸石榴皮 兩一 龍骨 兩一 訶梨勒 兩一	石榴皮散 治赤白痢日夜行數不減	右為細末每服二錢陳米飲調下空心日進三服	訶子 個四 木香 錢一 肉豆蔻 個六	肉豆蔻散 治赤白痢	右為細末粥飲調下二錢日三	橡實 兩一 酸石榴皮 兩一 黃牛角腮 兩一
----------------------	----------------	----------------------	-------------------------	----------	----------------------	-------------------------	--------------	---------------	--------------------	----------------------------	-----------------	---------------------	--------------------------	-----------	--------------	-----------------------------



砒霜兩半 粉霜兩半 巴豆一分

右藥同研令細以糯米和丸如粟米大空心冷粥飲
下一丸

猪膏煎 治赤白滯下

清酒三合 煎猪膏三合

右緩火煎汁沸適寒溫頓服之取瘥止

變化丸 治赤白痢腹臍痛日夜無度膿血相雜裏急

及治腸風下血亦量臍氣冷熱用之

欽定四庫全書

普濟方

吳茱萸 黃連等分

右各揀淨共用酒浸透却擇出各自焙乾各自研為
末各自為丸如梧桐子大赤痢用黃連丸甘草湯下
白痢用茱萸丸乾薑湯下每服三十九丸赤白痢相雜
各十五丸用甘草乾薑湯下一方為末米飲調下加
當歸此方浙西何山純老以傳蘇韜光云數十年救
人無數人多求方不敢輕授恐以其藥品之微而忽
之韜光每以救人甚効洪氏方亦有修製湯使少異



治白痢

嬰粟湯

加白朮

兩半

右將白朮分作二分嬰粟湯全貼只作一服煎入白朮一半服畢再將滓加白朮一半甘草三寸木瓜三錢同煎服立効

治心肚痛血刺腹痛下痢赤白

右用生薑和皮切十片好蠟茶二錢水二盞煎至一

盞去滓熱服一方赤痢用蜜同煎食前服名薑茶散

欽定四庫全書

普濟方

粟殼丸 治赤白痢并臟腑等疾減將仕之女復之有

驗

嬰粟殼

右為細末煉蜜丸如小鷄頭大每服十九十五丸赤痢甘草湯白痢乾薑湯瀉米飲下小者丸如粟米大量大小加減服

薑墨丸 治赤白痢下數十行老人病彌佳

右用乾薑好墨各五兩篩以好醋漿和丸如梧桐子



大每服三十九丸加至四十九丸米飲下日夜可六七服
如無醋漿以醋入水解之令其味如醋漿和之七十
病痢垂死服之愈徐云但嚼薑墨一丸瘥
加減薑黃丸 治冷熱赤白痢瀉血

薑黃 黃連

右等分各搗羅為末各用水煮麵糊和丸如梧桐子
大陰乾兩處收貯白痢冷瀉每服乾薑三十九丸黃連
十五丸同用溫米飲下赤痢瀉血黃連三十九丸乾薑

欽定四庫全書

普濟方

十五丸亦用米飲下赤白相雜黃連乾薑各二十九
共服同用米飲下空心食前服未愈加丸數取瘥為
度一方用白酒一升半合煎令可丸服三十九丸一方
治卒中痢用黃連生薑咬咀頓服

妙功散 治赤白痢臍腹疼痛腸滑後重

大黃^{兩半} 莨菪子

右搗羅為散每服一錢米飲調下食前

薑靈湯 治赤白瀉痢腹臍疼痛裏急後重并治疝氣



嬰粟殼 <small>半</small> 甘草 <small>一兩</small>	右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓臨卧空腹溫服	烏金丸 治赤白痢止瀉	巴豆 <small>二十一枚</small> 大棗 <small>二十一枚</small>	右每一枚棗入巴豆一枚燒令煙出絕以器覆之後搗研為細末更入輕粉二錢黃連末三錢燒陳粟米飲和丸如菉豆大每服五丸煎獨蒜湯下	欽定四庫全書 普濟方	礬石丸 治赤白痢	白礬 <small>四兩</small> 硝石 <small>一兩</small>	右為末以米醋半和入罐內磚頭擱起罐底將瓦片蓋口慢火燒熟置冷地上出火毒一夜研細用米醋浸炊餅心丸如梧桐子大每服十九空心米飲下夜起頻鹽酒下	主赤白痢	黃連 <small>二兩</small> 阿膠 <small>四片</small>
---	-------------------------	------------	---	--	---------------	----------	---	---	------	---



<p>右以好酒二大升合黃連煎十五沸漉出滓然後內膠全烱温分三服</p>
<p>薤白散 <small>出附後方</small> 治赤白痢</p>
<p>右用薤白一握切如泥橘皮一兩好乳一升先以少乳薤熟後下餘乳及橘皮末勻攪煎十餘沸空腹分兩服之如啜茶不止更作之</p>
<p>蒲黃湯 治赤白下痢</p>
<p>乾薑 <small>兩半</small> 雀糞 <small>兩半</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>右搗羅為末用軟飯和丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下十丸</p>
<p>治赤白痢</p>
<p>川烏頭 <small>六枝</small> 巴豆 <small>十四枝</small></p>
<p>右以巴豆於熟油內燂黃焦去心皮又烏頭末相和為末用米醋一升於銚子內以慢火煨成膏用寒食麵襯手丸如菉豆大每服以二宜湯下三丸</p>
<p>又方</p>



乾薑散 治赤白痢無問遍數老小並宜服	粥飲下十丸	右為末煑棗肉和丸如梧桐子大每服不計時候以	黃丹 <small>炒一兩</small> 附子 <small>炮一兩</small>	附子丸 治赤白痢所下不多遍多不減	下五丸	右為末以麵糊和丸如麻子大每服煎生薑甘草湯	黃丹 <small>炒一兩</small> 黃連 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	又方	每服以冷水下七丸	右為細末用新汲水和丸如菘豆大硃砂末內滾過	川烏頭末 <small>一兩</small> 黑豆末 <small>一兩</small>	治赤白痢	二丸忌食熱物	右都研如粉以飯和丸如黍米大每服以新汲水下	定粉 <small>一兩</small> 砒霜 <small>一分</small>
-------------------	-------	----------------------	---	------------------	-----	----------------------	--	---------------	----	----------	----------------------	--	------	--------	----------------------	---



乾薑 <small>三兩</small> 梔子仁 <small>十四個</small>
右搗篩為散每服三錢以水一中盞入薤白七莖破半合煎至五分去滓不計時候稍熱服
治赤白痢
右用連翹丸赤痢用黃連湯下白痢用薑湯下
又方
右用水牛黃牛角鯁及在糞土中爛白者燒為黑灰末服亦治冷痢血痢
欽定四庫全書 普濟方
又方
右用蓖麻子一兩炒令香熟為末以蜜漿下一錢不過再服
又方
右用地膚子搗絞取汁苗灰治痢亦善
又方
右用甘草一尺炙擘破以淡漿水煎三二度又以慢火炙之後用生薑去皮半兩二味煎漿水一升半煎



取八合服之立効一方無生薑

治初得痢冷熱赤白霍亂

右用龍牙草春夏採之洗淨揀擇去蘆頭焙乾不計
分內搗羅為末用米飲調服一錢

治心肚痛血刺腹痛

用生搗地黃汁和石蜜服之

治赤白痢

用赤石脂為末以飯飲調下

欽定四庫全書

普濟方

治赤白痢積不瘥一名雲母散

用雲母石為末方寸匕米飲下

又方

用槿花炒煎服

又方

用地錦草為末米飲下

治下痢赤白轉為白膿

用訶子三個二炮一生取皮為末漿水沸熱調服淡



水亦得若水痢加甘草末一錢有膿血加二錢血多
加三錢立效

治痢無問赤白

用老酸石榴皮微炙為末以粟米飯丸如梧桐子大
空心服滑則加附子赤石脂一倍

治赤白久熱痢

取蚯蚓糞土無沙者研末一升炒令煙盡水沃取半
大升漉出細末去麤滓空肚服之

欽定四庫全書

普濟方

治下痢赤白五六年者

右燒大荆如臂取瀝服五六合即得瘥

治赤白痢極効方

用薺根葉燒灰米飲調下

治赤白痢下水穀食不消

用麵粳粟米粥服方寸匕日四五止

茗葉方 治赤白痢及熱毒痢

用茶一觔炙濃煎一二盞喫瘥如久患痢亦宜服之



治赤白痢以下穀道疼痛不可忍

用食鹽湯溫熬熨之又炙枳實熨之妙

治臟毒赤白痢

出肘後方

用香椿淨洗別剝取樗白皮日乾為末米飲下一錢

立効一方用地榆

蜜陀僧方

出聖惠方

治赤白痢所下不多遍數不減

用蜜陀僧三兩燒令黃色研如粉每服醋茶調下一

錢匕日三服

欽定四庫全書

普濟方

治赤白及五臟痔瀉血

用艾葉煎牡狗又方下痢臍下切痛狗肝一具洗細

切米一升稀調煮粥空心點三兩合喫椒葱鹽醬任

性著之

治小兒及大人赤白痢

出肘後方

用新櫛皮細切以水一斗煎去五升去滓再煎如膏

溫酒服立瘥

治赤白痢食不下咽



用雌雞一隻治如常法細研為臙作麵餛飩空心食
之一方以醋煮

治以卒赤白下痢

出肘
後方

用燒馬屎一丸作灰分配酒水隨意服

療赤白痢無問新舊入口即斷方

香豉心

右先取豉燂令香乾搗為末大升豉心為四服別以
酒一大升小升豉心還依劑為四服和之即止下小

欽定四庫全書

普濟方

兒量氣力與之用酒四升煮煎四十文取二升分三

服

又方

出千
金方

用亂頭髮如雞子大燒末水調不過三服

神效散 治赤白痢新舊疾

用霜鹽梅三個用黃泥裹以慢火煨乾研末米飲湯

調下效

治赤白痢腹痛不能食亦治冷痢



<p>用肉豆蔻四五個每一個搗碎不犯銅鐵用濕麵一小塊包豆蔻煨服</p>
<p>治赤白痢下寒冷穀下一日百行療所不療<small>出肘後方</small></p>
<p>真丹附子炮等分蜜和搗五十杵服一九日三夜再多赤倍朱多白加附子老少特加</p>
<p>主赤白痢<small>出肘後方</small></p>
<p>用葱一握切細和米煮粥空心食之</p>
<p>治赤白痢所下不多遍數不減<small>出聖惠方</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>定粉<small>一錢細研</small></p>
<p>用鷄子清和作餅子用糠灰火燒熟研為末空心冷水調下半錢</p>
<p>純陽真人養臟湯 治大人小兒腸胃虛弱冷熱不調</p>
<p>臟腑受寒下痢赤白或便膿血有如魚腦裏急後重</p>
<p>臍腹疼痛日夜胸膈痞悶脅肋脹滿全不思食及治</p>
<p>脫肛墜下酒毒便血諸藥不効者並皆治之</p>
<p>人參 當歸 白朮<small>各六錢</small> 肉桂 甘草<small>各八錢</small> 肉豆</p>



治脾胃有積臟腑不寧冷熱相搏遂成赤白痢疾不思	化為度熱服不計時	右為末煉蜜為丸如鷄子大每服一粒水一盞煎至	御米 <small>四兩以蜜炒</small> 乾蒸餅	不進飲食並宜服之	滿裏急後重煩滿渴逆脅肋脹腹內虛鳴四肢倦乏	弱糟粕不聚便痢赤白或作膿血臍腹疼痛心胸痞	御愛丸 治榮衛氣虛風邪進襲臟腑之間值腸胃虛	欽定四庫全書 普濟方	後服此	用薑棗煎服先用縮砂煎湯下感應丸候其積消然	子四片煎服此藥的有神効不可具述一方無肉豆蔻	魚腥油膩如臟腑滑泄液起以不瘥者可加炮了附	服老人孕婦小兒暴瀉急宜服之止愈忌酒麵生冷	右剉每服二大錢水一盞半煎至八分去滓食前溫	錢六 蔻 <small>半兩</small> 白芍藥 <small>一兩</small> 木香 <small>一兩</small> 訶子 <small>一兩</small> 罌粟殼 <small>三兩</small>
-----------------------	----------	----------------------	-----------------------------	----------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	-----	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---



飲食腹痛不可忍並皆治之

嬰粟殼 當歸^半 赤芍藥 白芍藥 桂 訶子

白堊土 以上各半兩

右為細末每服五錢沸湯點服空心或用生薑二片

棗子二枚同煎至七分空心服尤妙

神効參香散 治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調積在

臟腑作成疾或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀

血或下紫黑或下赤白相雜或成五色裏急後重日

欽定四庫全書

普濟方

夜頻併臍腹絞痛甚不可忍及禁口乾蠱時諸痢無

問新舊並皆治之

白扁豆 人參 木香^{各二兩} 茯苓^{四兩} 陳皮^{二兩} 肉豆

蔻^{四兩} 嬰粟殼^{二兩}

右為末每服三大錢用溫米飲不拘時候立神効

治脾胃有積臟腑不寧冷熱相搏遂成赤白痢疾不思

飲食腹痛不可忍並皆治之 出本方

茱萸 黃連 阿膠 白芍藥^{等分}



右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服三十九丸陳米
飲下小兒十丸

又方 出本
事方

黑豆 粒十五 陳皮 兩半 嬰粟殼 個十四 甘草 寸三

右半生半炒用水一碗藥四錢煎至七分空心溫服
盡此一劑無不効者

治大人小兒小痢赤白及滓並血

嬰粟殼 兩二 烏梅肉 兩半 赤石脂 兩半 黃連 兩半

欽定四庫全書

普濟方

右為細末每服三錢水一盞生薑三片烏梅二十棗
一個同煎至七分

橘皮散 治赤白痢

陳橘皮 兩浸一 冬瓜汁 合一 生薑汁 合一

右勻調每服一匙如赤多增瓜汁白多增薑汁和勻
白湯調下服

巴豆丹砂丸 治赤白等痢

巴豆 粒五 杏仁 粒七 丹砂 錢一



右同研極細少蒸餅為丸菘豆大每服一丸空心陳米飲下

荊芥湯

出危氏方

治白痢血痢或婦人血崩

荊芥 楮樹皮

右等分剉散治血崩每服二錢水一盞煎至七分去

滓放溫服如血痢則為末冷醋調徐徐呷服白痢熱

醋調下神効不可具述

肉豆蔻散

出聖惠方

治赤白痢不止亦治水瀉

欽定四庫全書

普濟方

肉豆蔻

一分訶梨勒二分

右為散每服二錢米飲調下未効再用一兩服一方

用草豆蔻水煎服

單方

出危氏方

治痢無問赤白

用玄胡索不以多少新瓦上炒

鯽魚方 治赤白痢又治野鷄病

用鯽魚作膾食之止暴下痢和蒜食之有少熱和薑

醬食之有少冷



梔子仁湯 治赤白痢並血痢

用山梔子仁四七枚剉以漿水一升煎至五合去滓

空食前分溫一服

治卒腸痛下痢白赤數月不絕

出肘後方

用鷄卵一枝取出黃去白用胡粉令滿殼燒成灰以

酒服一錢効

玉胞肚

出仁存方

治一切虛寒下痢赤白或時腹痛腸滑不

禁心腹冷極

欽定四庫全書

普濟方

針砂

四兩

桂

一兩

右件和勻只作一包冷水調攤在皮紙上貼臍上下

以帛繫之如覺大熱即以紙襯之藥乾再以水濕其

熱如初可用四五次

硫黃熨法

出仁存方

治一切虛寒下痢赤白或時腹痛腸滑

不禁心腹極冷

硫黃

半兩

蓖麻子

七粒

右為末每服二錢填入臍中上下以衣服蓋定熨斗



盛火熨之立止

溫脾湯 出肘後方 治脾胃中冷結實頭痛壯熱若不痢或

冷滯赤白如魚腦脾氣不足虛弱不痢止上下出

人參 乾薑 附子 各二兩 大黃 三兩

右切以水六升煮取一升半為三服忌豬肉冷水一

方有甘草

厚朴湯 治脾胃冷復溫腹瀉不瘥乃服此藥

厚朴 四兩 桂心 二兩 枳實 三兩 生薑 五兩

欽定四庫全書

普濟方

右切以水五升煮取二升分為三服相去五里久不

過五劑忌生葱

駐車丸 治赤白痢腹痛 方見本門

香連丸 治赤白痢 方見本門

治赤白痢三將軍方

甘草 黑豆 一合 米殼 十四個 薑 二塊

右四味同水二升煎至一升溫服去滓再以水一升

煎滓至半升如服盡未効別用煎藥加大棗五個訶



子二個生紙裹煨煎服切忌菘菜魚腥一切毒物食 淡為止	如聖飲子 <small>出千 金方</small> 治陰陽不和冷熱相干腹痛泄瀉米穀 不化榮衛虛弱寒氣內襲下痢赤白後重裏急並宜 服之	茯苓湯 治因胃傷寒氣誤食冷飯水瀉五六日一夜 走十行白痢次日變作赤白痢腹中疼痛減食熱燥 四肢沉困無力	欽定四庫全書 普濟方	豆蔻丸 治脾胃虛弱臟腹頻滑下痢赤白	木香 赤石脂 乾薑 砂仁 厚朴 肉豆蔻 以上各 等分	右為末醋糊為丸如梧桐子大每服六十九丸空心米 湯下	神仙斷下丸 治三色痢	淨黃連 <small>一 觔</small> 楠木香 <small>五 觔</small>	右二味剉用水一斗五升銀石器內煮乾分作三處
-----------------------------	---	---	---------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------	---	----------------------



乳香 硃砂 續隨子 蝮砂 巴	軟紅丸 消虛積治冷熱不調下痢赤白膿血相雜	蓋化開薑一片棗一個煎取七分如小兒分作四服	右二味為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸水一	破故紙 嬰粟殼	治赤白痢及水瀉最効廬州合肥唐主簿錡方	時候服忌油膩之物	煎至七分去滓溫服白痢加白朮赤痢加甘草不拘	欽定四庫全書 普濟方	右為粗末每服三大錢水一盞半生薑三片棗一個	白朮 甘草 嬰粟殼	必効飲子 治以新赤白痢浙東帥趙侍郎子和任子	年施此藥	米飲空心下小兒丸如黍米大加減服	○赤痢用黃連為末神麩打糊丸如梧子大名黃連斷	下丸○白痢用木香為末神麩糊丸名木香斷下丸	○赤白痢木香黃連末神麩糊丸○各件每七十九
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------	--------------------	----------	----------------------	------------	----------------------	-----------	-----------------------	------	-----------------	-----------------------	----------------------	----------------------



許去滓通口服不拘時候禁口如腸潰者只兩服傳	右二豆槌破水一大碗同諸藥煎一盞半入熟蜜少	文紫蘇 <small>三</small> 文燈心 <small>三</small> 文良薑 <small>五</small> 文罌粟殼 <small>二十</small>	黑豆 <small>五</small> 文菘豆 <small>五</small> 文人參 <small>十五</small> 甘草 <small>五</small> 文陳橘皮 <small>五</small> 文糯米	十金散 治赤白痢晝夜無度服之立瘥	送下空心食前	右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九丸溫酒	兩 <small>各二</small> 半夏 <small>一</small> 附子 <small>一</small>	欽定四庫全書 普濟方	高良薑 <small>四</small> 肉桂 <small>兩</small> 當歸 <small>兩</small> 茴香 <small>兩</small> 乾薑 <small>兩</small> 肉豆蔻 <small>兩</small>	內灸丸 治腸滑胃虛裏急後重痢下赤白臍腹疔痛	經以不瘥	萬應丸 治以挾積滯因傷生冷遂作痢疾或赤或白	黃米大每服一丸乳香湯下食前	入餘藥和丸如菘豆大每服二丸乳香湯下小兒如	右為細末於甕器內鎔蠟成汁入麻油半茶脚許後	豆 <small>二十</small> 粉霜 膩粉 黃丹 黃蠟 <small>四味各半兩</small>
----------------------	----------------------	---	--	------------------	--------	-----------------------	---	---------------	---	-----------------------	------	-----------------------	---------------	----------------------	----------------------	--



于臨汀學正賴簡敬仲賴得於趙守兼善兼善得之余
丞相神効難言

百靈湯 治赤白痢

罌粟殼 陳皮 木通 烏梅 甘草 黃連

右六味各等分剉如錄豆大每服三大錢水二盞生薑
三片棗子二個擘破砂礮內慢火煎至八分去滓放
溫如熱水旋吃礮口用濕紙兩重蓋覆不可令灰入
服藥後且忌口溫人鄭元鼎云近日櫻病血痢之間

欽定四庫全書

普濟方

數十次窘不可言有客惠藥兩服而止醫者云全是
木通作効而本草却不云治瀉痢只云通利九竅血
脉關節蓋人患瀉痢只緣水穀不分若水道利則穀
道燥矣其理甚明

三靈散 治赤白雜痢困重

益母草 陳鹽梅

右等分為末每服三錢白痢乾薑湯下赤痢甘草湯

下連服



木瓜散 治赤白痢	木瓜 車前子 嬰粟殼 各等分	右為細末每服二錢米飲調下	延壽飲子 治遠年近日赤白瀉痢	木香 一兩 黃耆 四兩 御米殼 八兩 甘草 二兩 當歸 二兩 青皮 二兩	訶子 四兩	右各為粗末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓忌生冷鷄鴨油膩等物	欽定四庫全書 普濟方	神功飲 治瀉痢赤多白少者	嬰粟殼 十四個 甘草 三寸 生薑 一塊 橘皮 一兩 黑豆 一百二十粒	右用水二碗煎至一碗去滓分作二服空心食前又次日五更將滓以水一碗重煎至七分服	香參散 治榮衛俱虛臟腑不調泄瀉不止痢赤白日無度腹內疼痛飲食不進	陳皮 一兩 木香 一兩 人參 當歸 半兩 訶子皮 烏梅	地榆 香薷 三分 甘草 一分
----------	----------------	--------------	----------------	--------------------------------------	-------	------------------------------	------------	--------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------



阿膠丸 治赤白痢	乾薑 <small>一分</small> 當歸 白芍藥 白茯苓 木香 <small>各半兩</small>	右為細末醋打阿膠糊為丸如梧桐子大每服三十粒濃煎黃連艾葉粳米作湯併服數服立効	至聖保命丹 治血痢晝夜無度	蓖麻 <small>三兩</small> 巴豆 <small>四十粒</small> 黃丹 <small>二兩</small> 黃蠟 <small>四兩</small>	右件先將麻油同巴豆用銀鍋慢火熬成色如桴炭黑色去巴豆不用次黃丹煎數沸再入黃蠟熬令色	欽定四庫全書 普濟方	黑滴入水中成膏為度每服一挺重半錢旋丸如菘	豆大空心赤痢甘草湯下白痢乾薑甘草煎湯下	一聖散 治下痢赤白或小便不利淋瀝痛	罌粟殼 車前子 <small>炒</small>	右件分為細末每服二錢米飲下	乳香散 治一切赤白痢或雜色等疾及水瀉	乳香 <small>二錢</small> 甘草 <small>四錢</small> 草薺子 <small>四個</small> 罌粟殼 <small>三十個</small>	右為研細末將乳香入乳鉢內勻一二味每服二錢
----------	---	---------------------------------------	---------------	--	--	---------------	----------------------	---------------------	-------------------	--------------------------	---------------	--------------------	--	----------------------



水一盞分飯四五十粒煎至六分無時服立有神効	肉果散 治赤白痢	木瓜皮 肉果 木香 陳皮 甘草 <small>各三</small>	右為細末分八服白者米湯赤者白湯下	治下痢赤白心中煩躁潮熱	用小柴胡湯加赤芍藥地榆煎服	治老人痢赤白雜色	服胃風湯取効	欽定四庫全書 普濟方	五苓散 <small>出如</small> 治夏秋得痢病 <small>宜方</small>	澤瀉 <small>三兩</small> 豆蔻 <small>一兩</small> 白朮 猪苓 赤茯苓 <small>各一兩半</small>	右為末熱湯調下吞感應丸積滯緊急加巴豆氣痛	宜蘓感丸要通痢與黃連香薷飲止痢天仙散	治陰陽交滯不問赤白痢 <small>出如</small> <small>宜方</small>	用劉寄奴烏梅白薑水煎赤加烏薑相等分服	又方	黃連生薑同炒各為末赤痢連末茶下白痢薑末烏
----------------------	----------	--------------------------------------	------------------	-------------	---------------	----------	--------	---------------	---	---	----------------------	--------------------	---	--------------------	----	----------------------



<p>梅湯下如痢已服前藥未効宜麻仁散腹痛加乳香煎服次宜豆粟散如痢古云滯下因積滯成之蓋食積欲出而為腹痛裏急氣滯而不與之出故為後重</p>	<p>色有赤白大抵赤則熱白則冷○又云夏傷于暑秋</p>	<p>不癰則痢治法宜去積通其氣解其暑去積感應丸</p>	<p>嚴氏黑丸子通氣蘇合香丸寬中散香連丸解暑五</p>	<p>苓散香薷散○凡治痢藥宜酸苦不宜甘鹹先當知</p>	<p>此蓋痢癰無正方故再述此衛生者幸詳擇焉</p>	<p>欽定四庫全書</p>	<p>普濟方</p>	<p>治赤白痢<small>出本</small></p>	<p>取地楊梅莖子煎服</p>	<p>治赤白久痢<small>出本</small></p>	<p>以芸薹菜煮服之</p>	<p>治赤白痢<small>出本</small></p>	<p>以薤白一握切煮作粥服之</p>	<p>治赤白痢極驗方<small>出本</small></p>	<p>以桃竹蓐洗和薑搗碎煎服</p>
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------	------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	----------------	------------------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------



治服丹石勞熱赤白痢多時不瘥者出本

煮獐肉經宿露中明日空腹醬之食一頓即瘥

治赤白下痢出本

用山豆根搗末蜜丸空心煎水下二十九三服自止

治四肢風痺赤白下痢出本

取鵝鵝嘴燒為黑末服一方寸匕

治赤白痢下多崔元亮海上方

用馬齒莧搗絞汁三大合和鷄子白一枚先溫冷熱

欽定四庫全書

普濟方

及下莧汁微溫取頓服之不過再作則愈不問老稚

孕婦悉可服

治赤白痢出本

用苦茶根煮飲服之

治赤白痢

以石榴皮炙令黃杵末棗肉為丸空腹服

凡痢不應先白後赤後白為腸蠱

牛膝三兩搗碎以酒一升漬經一宿每服一兩盃日



取茄子根莖煮服之	治赤白痢 <small>草 出本</small>	以槐花炒服	治赤白痢 <small>草 出本</small>	以烏梅二十枚打碎水二升煮取一升頓服	治赤白痢下部疼痛 <small>草 出本</small>	以蜂房水煮飲之	治赤白痢 <small>草 出本</small>	欽定四庫全書 普濟方	以酸石榴皮燒赤末服方寸匕	治赤白痢下水穀宿食不消者為寒可療	以艾醋煎作煎服之	治赤白痢 <small>草 出本</small>	絞濾空腹服三合日再服	用地榆一觔水三升煮取一升半去滓再煎如稠錫	治赤白痢下骨立者 <small>草 出本</small>	三服
----------	--------------------------	-------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---------	--------------------------	---------------	--------------	------------------	----------	--------------------------	------------	----------------------	------------------------------	----



治赤白痢 草 出本	以松楊木皮煮汁服之	治赤白痢 草 出本	以李樹根濃煎服之	治赤白痢 草 出本	以蛇含炙食亦燒末服一二錢匕	治赤白痢 草 出本	欽定四庫全書 普濟方	以榼藤剉水煎服出南海諸州根如烏藥	治赤白痢 草 出本	升淋取汁令服冷則酒淋日三有驗	熬豉令小焦杵服一合日三無比又豉熬令焦水一	治赤白痢 草 出本	以狼牙煎服	治赤白痢 草 出本	治洩痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血 草 出本
--------------	-----------	--------------	----------	--------------	---------------	--------------	---------------	------------------	--------------	----------------	----------------------	--------------	-------	--------------	--------------------------



用黃連一升酒五升煮取一升半分再服臍下當小
絞痛即瘥再服

治赤白痢

草 出本

用訶梨勒三枚須擇上好者兩枚炮取皮一枚生取
皮同末之以服漿水一兩合服之淡水亦得若只水
痢加一錢匕甘草末若微有膿血加二錢若血多加
三錢匕 昔劉禹錫傳信方云予曾苦赤白下諸藥
服遍久不瘥者轉為白膿令狐將軍傳此方服甚効

欽定四庫全書

普濟方

治赤白痢無問遠近不服疔痛不可忍出入無常下重

疼悶每發面青手足俱變者

草 出本

用黃連一兩去毛好膠手許大碎蠟如彈子大三味
以水一大升先煎膠令散次冷下蠟又煎令散即下
黃連末攪相和分為三服惟須熱喫冷則難喫神妙
治暴赤白痢如鵝鴨肝者痛不可忍
治赤白痢久不瘥復下膿血者

右以甘草乾薑湯吞雲母膏二十粒如麻子大日一



服不過三服即瘥							欽定四庫全書 普濟方							普濟方卷二百十一
---------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	----------

