

欽定四庫全書

普濟方卷二百十二

明 周王朱橚 撰

泄痢門

白滯痢

夫白滯痢者冷痢之類蓋腸虛受冷留而不去舉津液相搏結滯如膿或如凝脂腹痛而下故為白痢

方

附子湯

出千金方

治冷白滯痢及腹痛

欽定四庫全書

普濟方

附子 半一兩

赤石脂 一兩

乾薑 半一兩

芍藥

甘草 各半

兩

當歸

龍骨 各一兩

白朮 二兩

牡蠣 半一兩

人參 三分

右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至八分去滓空

心溫服日晚再服有膿加厚朴一兩去麤皮薑汁塗

炙紫色若嘔加陳皮一兩湯浸去白焙

龍骨湯

療白滯下夜無復數

龍骨

牡蠣 各三兩

烏梅肉

熟艾

乾薑

白頭

翁

各一兩

女薑

黃連

當歸 各二兩

甘草 六兩



| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|--|--|--------------------|
| 右切以水七升煮取三升二合分服日三服一斷便 | 止忌海藻松菜猪肉冷水 | 豆蔻丸 治白滯痢腹臑痛 | 肉豆蔻 兩一 草豆蔻 兩一 縮砂仁 兩一 母丁香 兩一 木香 兩一 | 沉香 兩各半 墨 兩半 枇杷葉 兩灸一 | 右搗羅為末燒粟米飯為丸櫻桃大每服二丸米飯化下食前服 | 厚朴散 <small>出聖惠方</small> 治白痢四肢不和腹內疔痛 | 欽定四庫全書 普濟方 | 厚朴 兩二 地榆 兩半 當歸 兩一 黃連 兩一 赤芍藥 兩半 赤石脂 兩二 禹餘糧 兩二 乾薑 兩一 吳茱萸 兩半 | 右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢 | 馬藺子散 <small>出聖惠方</small> 治赤白痢腹內疔痛行數極多色白如泔淀不欲飲食 | 馬藺子 兩二 地榆 兩一 厚朴 兩一 艾葉 兩一 赤石脂 兩二 龍骨 兩二 當歸 兩一 肉豆蔻 兩一 白朮 兩一 | 右搗羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢 |
|----------------------|------------|-------------|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---|---------------------|--|--|--------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|-------------------|-----------------|--|-----------------|------------|---------------|----------------------|--|--|-------------------------------|---------------------|--|------------------------------|--|
| 厚朴 一兩 | 人參 龍骨 當歸 乾薑 甘草 白茯苓 半兩 | 人參湯 治白滯痢及小便白 | 右搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢 | 當歸 甘草 各半兩 | 牡蠣 一兩 龍骨 一兩 烏梅肉 兩半 白頭翁 女薑 黃連 | 牡蠣散 治白膿痢晝夜無數 | 計時候以艾湯下三十丸 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右搗羅為末以醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服不 | 脂 二兩 當歸 酸石榴 川烏頭 各一兩 炮製 | 黃連 一兩 乾薑 一兩 厚朴 一兩 神麩 禹餘糧 各一兩 | 黃連散 出聖方 治白痢腹痛不思飲食瘦瘁骨立宜服 | 右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢 | 一兩 枳實 一兩 甘草 半兩 當歸 一兩 | 訶梨勒散 出聖方 治白痢腹痛胸膈痞滿不能飲食 | 訶梨勒 一兩 木香 三兩 附子 一兩 乾薑 一兩 白茯苓 一兩 厚朴 |
|----------|---|-----------------|-------------------|-----------------|--|-----------------|------------|---------------|----------------------|--|--|-------------------------------|---------------------|--|------------------------------|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------|---------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---|
| 右搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓空心服 日晚再如小兒患量大小加減 | 肉豆蔻散 <small>出聖惠方</small> 治白痢心腹脹滿不能飲食 | 肉豆蔻 一兩 厚朴 三兩 乾薑 一兩 甘草 半兩 訶梨勒 半兩 | 陳橘皮 一兩 湯浸 | 右搗細羅為末每服不計時候以粥飲調下二錢 | 龍骨散 <small>出聖惠方</small> 治白痢腹痛不能飲食 | 龍骨 赤石脂 白朮 厚朴 當歸 吳 | 各一兩 各一兩 各二兩 | 欽定四庫全書 普濟方 | 茱萸 湯浸 三分 | 右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢 | 陳麴湯 治白滯痢及腹痛不止 | 陳麴 黃連 厚朴 乾薑 附子 | 各一兩 各一兩 各半兩 炮製 | 右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓 空心服日晚再服 | 白朮湯 治白滯痢及水痢日夜一二十行心中痛 | 白朮 三分 甘草 兩 厚朴 兩 黃栢 兩 龍骨 各半兩 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------|----------|---------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|----------------------|------------|---|---------|-----------------------|------------|---------------|--|---------------|-----------------------|-----------|-------------------|--|----------|----------------------|
| 豆蔻湯 治白滯痢心腹脹滿不下食 | 二十九日午再服 | 右為末鎔蠟為丸如梧桐子大每服空心溫粥飲下 | 當歸丸 治白膿及諸痢 | 當歸 黃連 <small>炒三分</small> 烏梅肉 <small>兩半</small> 阿膠 <small>兩半</small> | 皮湯下日晚再服 | 右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服四十九丸食前橘 | 欽定四庫全書 普濟方 | 黃芩丸 治白痢多膿肚中疴痛 | 黃芩 黃連 黃蘗 <small>各一兩半</small> 吳茱萸 <small>炒一兩</small> 訶梨勒皮 | 黃芩丸 治白痢多膿肚中疴痛 | 右同研極細溫酒和丸如梧桐子大每服三十九丸空 | 心陳米飲下日午再服 | 阿魏丸 治丈夫婦人久患白滯痢如魚腦 | 阿魏 <small>一分</small> 桂 <small>末半兩</small> 木香 <small>兩半</small> 安息香 <small>一分</small> 獨頭蒜 <small>二顆</small> | 滓空心服日晚再服 | 右搗篩每服四錢水一盞半生薑三片煎至八分去 |
|-----------------|---------|----------------------|------------|---|---------|-----------------------|------------|---------------|--|---------------|-----------------------|-----------|-------------------|--|----------|----------------------|



| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|----|-----|----|----|
| 肉豆蔻 | 甘草 | 各半 | 乾薑 | 半兩 | 厚朴 | 一兩 |
| 右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓空心温服日午再服 | | | | | | |
| 薑附散 | 治臟寒下痢白膿心腹疔痛 | | | | | |
| 乾薑 | 附子 | 訶梨勒 | 龍骨 | 各一兩 | | |
| 右為散每服三錢煎烏梅湯空心調下 | | | | | | |
| 烏梅肉丸 | 主冷白膿痢食不消病深為白滯痢者腸虛而氣冷客之搏于腸間津液凝滯成白故為白滯痢 | | | | | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 | | | | | |
| 烏梅肉 | 熟艾 | 黃蘗 | 甘草 | 各一兩 | | |
| 右搗篩為末蜜和丸如梧桐子大粥飲服十五丸三服忌海藻菘菜 | | | | | | |
| 桃花丸 | 出十便良方 | 治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下痢 | | | | |
| 純白或冷熱相搏赤白相雜腸滑不禁日夜無度 | | | | | | |
| 赤石脂 | 乾薑 | 各等分 | | | | |
| 右為末水麪糊丸如梧桐子大每服三十九温米飲 | | | | | | |



| |
|---|
| 下空心日三服若血痢甘草湯下白痢乾薑湯下一方為末飲下蜜丸亦可 |
| 薑粟散 治瀉痢純白者 <small>方見本門</small> |
| 和氣飲子 治大小腑皆通下痢白色宜服此兼進訶梨勒丸 |
| 梨勒丸 |
| 人參 白朮 當歸 肉豆蔻 阿膠 白茯苓 |
| 乾薑 <small>各三分</small> 木香 罌粟殼 香薷 甘草 <small>已上各二錢</small> |
| 蒿豉餅 <small>等分</small> |
| 欽定四庫全書 普濟方 |
| 右為咬咀每服五錢七水一盞半煎七分去滓服無時候 |
| 訶梨勒丸 治白痢 |
| 訶子 <small>半兩</small> 肉豆蔻 <small>一兩</small> 木香 <small>三錢</small> 乾薑 <small>半兩</small> 阿膠 <small>三錢</small> |
| 右為細末糯米粥濃飲為丸如梧桐子大每服五十丸陳粟米飲下前方相間服痢減則減痢止則勿服 |
| ○果州人何伯巽進士及第留意于醫月有所得用藥多奇中近日孫女病此易三醫不効因招其調治 |



得二方不數服而愈

治傷酒後臟腑不調忽時下黃白痢胸膈不快飯食無

味精神少爽宜服此方

黃橘皮 桔梗 桑寄生 蓬莪茂 草豆蔻

甘草 木香 防風 芎藭 各一分

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎兩三沸空心服

實腸散 治白痢

肉豆蔻 一個 訶子 一錢 當歸 一錢 厚朴 一錢 龍骨 一錢 陳皮

欽定四庫全書

普濟方

二錢 甘草 一錢

右並為細末每服二錢陳米湯調下

當歸散 治白痢腹痛不止

當歸 阿膠 乾薑 白朮 赤芍藥 附子 各一

兩 烏梅肉 二兩 甘草 半兩 厚朴 一兩半

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分

去滓不計時候稍熱服

赤痢 附論



夫熱痢之甚者為赤痢本由腸虛為風邪所傷又挾邪
熱血得熱而妄行乘虛必滲入腸中與痢相雜其色純
赤名為赤痢若腸虛入腹則為久痢變成嘔噦疴蠱之
候矣

方

黃連湯 治因冷飲食變成赤痢

黃連 兩 肉豆蔻 一枚 桂皮 去粗皮 地榆 兩 白芷 赤石

脂 兩 訶梨勒皮 半 黃芩 兩 附子 黃耆 兩

欽定四庫全書

普濟方

吳茱萸 當歸 兩 各一

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半生薑五片煎至
一盞去滓溫服日三

伏龍肝丸 治赤痢腹疼四肢羸困

伏龍 艾葉 木香 地榆 阿膠 當歸 黃

連 赤芍藥 黃芩 兩 各一

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九溫
粥飲下不拘時候



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------|-----|---|--------------------|---------------|----------------------|-------------|--|---------------------|--------|---|
| 無食子丸 治赤痢肚心疼痛 無食子 地榆 各半 黃連 一兩 黃蘗 一兩 酸石榴皮 | 不拘時候稍熱服 | 右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓 | 去 鬚 | 當歸 一兩 犀角屑 三分 木香 兩半 黃芩 兩半 地榆 三分 黃連 一兩 | 犀角散 治赤痢腹中疼痛小便澀口乾頓服 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右粗搗篩每服五錢以漿水一盞半煎至八分去滓 | 半兩 陳橘皮 兩 焙一 | 六神湯 治赤痢腹痛或下純血 黃連 車前子 各二兩 地榆 山梔子仁 甘草 各一 | 右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢 | 犀角屑 兩半 | 龍骨散 出聖 治赤痢煩渴腹痛不欲飲食 龍骨 黃連 地榆 當歸 黃芩 阿膠 各一兩 |
|---|---------|----------------------|-----|---|--------------------|---------------|----------------------|-------------|--|---------------------|--------|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|--------|----------------------|----|
| 治赤痢腹痛不可忍 <small>出聖 惠方</small> | 右搗羅為散每服三錢空心粥飲調下日午再服 | 黃連 黃蘗 木香 厚朴 <small>各一兩 去粗皮</small> | 黃連散 治赤痢兼大腸下血 | 米飲下赤白痢加阿膠一兩 | 右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心 | 赤茯苓 當歸 黃連 黃蘗 <small>各一兩</small> | 茯苓丸 治赤白痢及赤痢等疾 | 欽定四庫全書 普濟方 | 日晚再服一方作湯煎服 | 藥末和搗丸如梧桐子大每服三十九空心米飲下 | 右搗羅為末用白蜜三兩煉熟入蠟一兩鎔化入前 | 黃蘗 黃連 熟艾 黃芩 <small>二兩 二兩 半兩 一分</small> | 黃蘗丸 治赤痢下黃赤膿四肢煩皮膚冷者 | 食前溫米飲下 | 右搗羅為末醋煮麪糊丸如梧桐子大每服十五丸 | 一兩 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|--------|----------------------|----|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---|-----------|-------------|----------------------|---|---------------|-----------|---------------------------------|----------|------------------------|---------------------|--------|----------------------|---|
| 秣米 <small>一虎口</small> 把 <small>一</small> 鯽魚鮓 <small>二</small> 合 <small>二</small> 薤白 <small>一</small> 細切 | 療下赤痢方 | 右為細散每服一錢食前溫米飲調下 | 紫參 <small>三錢</small> 肉豆蔻 <small>一兩</small> 烏賊魚骨 <small>二兩</small> | 紫參散 治赤痢腹痛 | 臨卧及二更五更時各一服 | 右就新瓦上以火燒令烟盡取研極細分為八服每 | 枳殼 <small>各七枚</small> 胡桃 <small>七枚</small> 皂筴 | 欽定四庫全書 普濟方 | 枳殼散 治赤痢不止 | 二黃丸 治赤痢並一切痢 <small>方見本門</small> | 用犀角燒成灰服之 | 治赤痢 <small>出本草</small> | 用茱萸一合黑豆湯吞之一方用杵搓磨吞嚥良 | 治赤痢臍下痛 | 右以水三大盞煎取一大盞半去滓食前分溫三服 | 黃連 <small>二兩</small> 當歸 <small>一兩</small> |
|--|-------|-----------------|---|-----------|-------------|----------------------|---|---------------|-----------|---------------------------------|----------|------------------------|---------------------|--------|----------------------|---|



右以合煑如作粥法噉之

黃連丸 治赤痢

黃連四分 陳倉米四分 乾薑四分

右搗篩為末緩火炒令色變以內二顆雞子白中煮熟

和丸如梧桐子大空腹服五十九丸以好無灰酒溫一

盞下之至晚痢赤色當變白明旦即差更服

黃連湯

治暴赤痢如驚肝其痛不可忍

方見本門
血痢類

療赤痢方

欽定四庫全書

普濟方

香淡鼓大半 黃連一大兩

右以水一升半浸鼓一日濾取汁碎黃連薄綿裹鼓

汁中煎服

赤芍藥散 治赤痢多腹痛不可忍澉而便膿者小腸

泄也脉五至之以洪者宜以七宣丸如脉平者立秋

至春分宜香連丸春分至立秋宜芍藥皮丸四季

通用宜加平胃散七宣丸之類後宜服此藥去其餘

邪兼平胃氣



赤芍藥 二兩
黃蘗 二兩

右搗篩為散每服三錢以淡漿水一中盞煎至五分去滓不計時候溫服一方醋糊為丸如梧桐子大每服五七十丸至二百丸食前溫水下

治赤痢腹痛不可忍 出聖惠方

寒水石 一分
砒霜 半分

右細研如粉以軟粟米飯和丸如菘豆大每于食前以冷甘草湯下三十丸

欽定四庫全書

普濟方

治赤痢 出本草

用薤白同黃蘗煮服之即瘥

治三焦壅熱其血流散乘脾之虛滲入大腸而所下之痢盡皆赤色別無白痢相雜並不壯熱亦無心腹疼痛診其脉上部洪大脾脉外鼓而澁先宜吃此方候上焦氣清赤痢消滅或變成白或得稍減後却變為小腹逆脹即便修合後方吃取平安

麻黃 防風 麥門冬 獨活 木香 荊芥穗



| | | |
|--|---------------------------|--|
| 右為細末每服二錢食後熱湯下去滓服候赤痢消減忽變成白忽覺小腹逆脹即修合後方吃也 | 治赤痢喫前方了變成白痢病已稍可忽覺小腹逆脹宜喫此方 | 牡丹皮 蒲黃 前胡 各一分 |
| 防風 甘草 各一兩 木香 三錢 芎 半兩 訶梨勒 火炮 | 右為細末每服一錢半水一盞煎取九分空心和水 | 治赤痢所下之痢渾是鮮血忽有黯黑色隨後多因使性於怒傷損肝心正氣忽因爭打傷損經絡致有斯疾 |
| 欽定四庫全書 普濟方 | 桑寄生 一兩 木香 獨活 甘草 芎 牡丹皮 各一分 | 小柴胡湯 治赤痢急累心煩潮熱 |
| 柴胡 八兩 黃芩 人參 甘草 各三兩 半夏 二兩 | 右為細末水一盞煎取八分非時喫每服二錢 | 右咬咀薑五片棗一枚煎加芍藥地榆又宜黃連二 |



錢重為末鷄子清丸如梧桐子大空心烏梅湯下
治赤痢

取蝮蛇骨燒為黑末飲下三錢匕雜蛇亦得

治赤痢熱日久不止

黃連末鷄子白和為丸飲服十九至三十九即瘥

療重下赤痢者

出本草

取獺黃赤糞下白者取白糞燒末清旦空心服以飲

服一小盞三日飲之即愈

欽定四庫全書

普濟方

治赤痢經年不愈

右用菘豆角蒸熱隨意食之如無菘豆角只蒸好菘

豆羹粥食之當効

血痢 附論

夫血痢者熱毒折於血滲入大腸故也血之隨氣循環
經絡通行臟腑常無停行積毒熱氣乘之大腸虛者血
滲入腸虛則洩故為血痢也身熱者死身寒者生診其
關上脉如芤大便多血暴下血數升脉虛小者生疾數



者難治以不瘥多變嘔噦及為濕蠱也

方

牛角腮散 治下血痢腹痛

牛角腮為末當歸 龍骨 乾薑 熟艾各三兩 附子

黃蘗 赤石脂 芎藭 阿膠 厚朴 甘草

橘皮 石榴皮 芍藥各二兩 大棗二十枚 黃連五合

麻一兩半 蜀椒一兩

右呔咀以水一斗三升煮取四升去滓內牛角腮末

欽定四庫全書

普濟方

阿膠消以綿絞去滓分七服日四夜三

白頭翁湯 治赤滯下血連月不瘥

白頭翁 厚朴 阿膠 黃連 秦皮 附子

赤石脂 黃蘗 茯苓 芍藥 乾薑 當歸

甘草 龍骨各三兩 大棗三十枚 粳米一升

右呔咀以水一斗二升先煮半合熟米內藥煮取三

升分作四服

蒲黃散 治血痢



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----|------------|--------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| 蒲黃 ^三 乾地黃 桑茸 甘草 芒硝 茯苓 | 人參 栝葉 阿膠 艾葉 生薑 禹餘糧 | 黃連 ^{各二} 赤脂 ^{五錢} | 右咬咀以水一斗煮取四升分五服溫服 | 木香烏梅丸 治一切下痢便血并腸風等疾 | 烏梅 ^二 木香 百草霜 絲瓜灰 ^{各二} 黃連 黃 | 藥 黃芩 梔子 ^{各一} 大黃 半夏 ^{各五錢} 枳殼 | 當歸 ^{各一} 陳皮 ^{八錢} | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為細末炒麪四兩入前藥一同杵千餘下爛丸 | 如梧桐子大每服五十九丸空心米飲湯下如硬入梅 | 水和丸 | 龍骨丸 治下血痢腹痛 | 龍骨 龍膽 羚羊角 當歸 附子 乾薑 | 黃連 ^{各三} 赤石脂 礬石 ^{各一} 犀角 甘草 熟 | 艾 ^{各十} 銖 ^八 | 右為末蜜和丸如小豆大先食服十五丸日三加至 |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|---|---|-----------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----|------------|--------------------|---|--------------------------------|----------------------|



二十九

續斷湯 療下焦虛寒損或前便轉後見血比為近血
或痢下或不痢每自勞而發

續斷 當歸 桔梗 阿膠 桂心 熟地黄

乾薑 芎藭 蒲黃 甘草

各四兩 各一升 各二兩

右切以水九升煮八物取三升五合去滓下膠更烱
阿膠取沸下蒲黃分為三服忌猪肉海藻菘菜生葱
蕪荑

欽定四庫全書

普濟方

伏龍肝湯 療下焦寒損或先血後便轉此方遠血或
痢不痢

伏龍肝 甘草 乾地黄 燒髮灰 黃芩

各五兩 各一兩 各五兩 各二兩 各二兩

牛膝 乾薑 生槲律 阿膠

各二兩 各二兩

右切以水七升煮七物取三升去滓下阿膠更煎取
烱乃下髮分作三服忌海藻菘菜蕪荑

阿膠散 治熱毒血痢如片臍下疔痛

阿膠 川升麻 地榆 黃連 黃蘓 當歸

各一兩 各半兩 各一兩 各一兩 各一兩 各一兩



| | |
|--|--|
| 犀角屑 <small>兩半</small> 熟乾地黃 <small>兩一</small> 梔子仁 <small>兩一</small> | 右搗篩為散每服四錢以水一中盞薤白七寸豉一百粒煎至六分去滓不計時候溫服 |
| 黃連湯 治熱毒下黑血五內絞切痛日夜百行氣絕欲死 | 黃連 <small>一兩</small> 龍骨 <small>二兩</small> 白朮 <small>二兩</small> 阿膠 當歸 乾薑 <small>各三兩</small> |
| 赤石脂 <small>兩三</small> 附子 <small>兩一</small> | 右呔咀以水一斗煮取五升分五服○孫真人云予 |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 以貞觀三年染熱毒痢三日命即欲絕此方入口即定 | |
| 當歸和脉血飲 治腸澼下血濕毒下血 <small>出衛生寶鑑</small> | 槐花 青皮 當歸身 升麻 川芎 熟地黃 |
| 白朮 荆芥穗 <small>各等分</small> | 右為細末每服二三錢清米飲湯調下食前忌濕麪酒生冷物 |
| 茜根散 治血痢心神煩熱腹中痛不納飲食 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|---------|---------------------|-----------|--------|----------------------|---------------|------------|--------------------|----|-----------------------|--------|----------------------|--------------|---------------------|
| 犀角丸 治血痢腹中疴痛 | 服 | 右剉為散每服三錢黑豆百粒薑五片白梅一個煎 | 仁 甘草 黃芩 | 白乾葛 枳殼 半夏 茯苓 生乾地黄 杏 | 乾葛散 治酒痢便血 | 不計時候溫服 | 右搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓 | 欽定四庫全書 普濟方 | 黃芩 梔子仁 各等分 | 黃連 龍骨 地榆 阿膠 當歸 赤芍藥 | 欲絕 | 黃連散 治熱毒下痢黑血臟腑疴痛日夜百行氣息 | 白三寸同煎服 | 右搗篩為散每服四錢以水一中盞入豉五十粒薤 | 歸 犀牛角 黃芩 各等分 | 茜根 黃連 梔子仁 地榆 生乾地黄 當 |
|-------------|---|----------------------|---------|---------------------|-----------|--------|----------------------|---------------|------------|--------------------|----|-----------------------|--------|----------------------|--------------|---------------------|



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----|-----|--------|-----|----------------------|-------|------|----|----|
| 芍藥 | 黃連 | 當歸 | 大黃 | 甘草 | 淡味桂 | | | | | | | | |
| 血 | 芍藥黃連湯 | 治大便後下血腹中痛者胃之熱毒下 | 右切以水八升煮取二升分為三服再忌猪肉冷水 | 角 | 茜根 | 黃連 | 地榆 | 梔子 | 薤白 | 香豉 | 犀 | | |
| 角 | 右切以水八升煮取二升分為三服再忌猪肉冷水 | 芍藥黃連湯 | 治大便後下血腹中痛者胃之熱毒下 | 血 | 芍藥 | 黃連 | 當歸 | 大黃 | 甘草 | 淡味桂 | | | |
| 甚者 | 黃連飲 | 治臟毒下血臟腑疴痛日夜五七十行血痢 | 飲送下食前溫服 | 右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九米 | 栢葉 | 各等分 | 犀角 | 鎊 | 地榆 | 黃芩 | 黃蘗 | 甘草 | 茜根 |
| 附子 | 黃連 | 阿膠 | 當歸 | 龍骨 | 赤石脂 | 白朮 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 右咬咀如麻豆大每服五錢水二盞煎一盞去滓服 | 茜根黃連湯 | 療痢鮮血 | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|---|----------------|-------|----------------------|-------|---------------|---|------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----|----------------------|
| 黃連丸 治血痢 | 右搗羅為散每服二錢以米飲調下食前 | 草 二兩 剉 | 地榆 半兩 酸石榴皮 三分 黃芩 半兩 枳殼 三分 赤石脂 半兩 甘 | 地榆散 治熱血痢不定日夜頻滑 | 次早空心服 | 右咬咀水二碗薑三片烏梅二個煎七分露星一夜 | 杏仁 七粒 | 欽定四庫全書 普濟方 | 醋石榴 草果 各一個 青皮 二個 椿根皮 二錢半 甘草 二寸 | 宿露湯 治風痢純清血 | 分去滓忌銅鐵器溫服滓用水二鍾煎至一小鍾服 | 右各等分作一服以水一中盞半於銀器內煎至七 | 烏梅 甘草 丁香 桂心 罌粟殼 縮砂仁 | 六妙湯 治下血或痢不止 | 錢服之 | 右咬咀每服五錢水煎如痛甚者調木香檳榔末一 |
|---------|------------------|-----------|---|----------------|-------|----------------------|-------|---------------|---|------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----|----------------------|



| | | | | | |
|--|--------------------------------------|------|-----|-----|----|
| 黃連 | 龍骨 | 禹餘糧 | 伏龍肝 | 代赭 | 乾 |
| 薑 | 各一兩半 | | 各二兩 | | |
| 右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸米飲下空心食前日二服 | | | | | |
| 犀角散 | 治血痢止腹痛除煩熱口乾 | | | | |
| 犀角屑 | 兩一 | 阿膠 | 分三 | 伏龍肝 | 兩一 |
| 黃連 | 兩一 | 當歸 | 兩半 | 艾葉 | 兩半 |
| 兩半 | | | | | |
| 右搗細羅為散每服不計時候以粥飲下二錢 | | | | | |
| 欽定四庫全書 | | | | | |
| 普濟方 | | | | | |
| 烏梅丸 | 治下痢純血臍腹絞痛脉急大數由腸久虛或先經下血痢未止服熱藥蘊毒服熱滲成血痢 | | | | |
| 烏梅 | 兩二 | 黃連 | 兩三 | 茱萸 | 兩一 |
| 當歸 | 兩一 | 酸石榴皮 | 兩一 | | |
| 右各為細末用醋為丸如梧桐子大每服三十九丸米飲湯下茱萸以意加減一方有阿膠一兩無當歸煉蜜糊丸 | | | | | |
| 茜根散 | 治血痢 | | | | |
| 茜根 | 貫衆 | 槐花 | 椿根 | 甘草 | 剉炙 |



右搗篩為散以飲下之初服一方寸匕日再服稍熱加至一二匕良

乾藍散 治下雜血

乾藍 犀角 地榆 各二兩 蜜 一合

右呔咀以水五升煮取一升去滓下蜜煎取分三服

此治熱毒盡妙

白頭翁湯 治熱痢滯下下血連月不差

白頭翁 二兩 黃連 藥皮 椿皮 各三兩

欽定四庫全書

普濟方

右剉為散每服四大錢水一盞煎七分去滓服

通聖散 治血痢腹中疴刺日夜無度

大棗 烏梅 各七枚 乾薑 三塊 甘草 三寸

右搗篩為散每服一錢匕水一盞生薑半棗大擘破

同煎至六分去滓服

黃蘗散 治血痢日夜不止腹中疴痛心神煩悶

黃蘗 一兩 當歸 一兩 黃連 一兩 地榆 三分

右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢



| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|--|--------|----------------------|---------------|--|----------|---|---------------|--|
| 人參散 治一切血痢腹痛 人參 <small>三</small> 分 肉豆蔻 烏賊魚骨 <small>各二</small> 兩 | 溫服日三服 | 右粗搗篩每服五錢以水一盞煎至七分去滓食前 | 黃蘗湯 治血痢晝夜不止 黃蘗 <small>各二</small> 兩 黃連 <small>各二</small> 兩 木香 <small>一</small> 兩 | 不拘時候溫服 | 右搗篩粗末每服五錢以漿水一盞煎至七分去滓 | 欽定四庫全書 普濟方 | 芍藥湯 治血痢腹痛 赤芍藥 黃蘗 地榆 <small>各一</small> 兩 | 右為末水煎空心服 | 槐花散 治血痢久不止腹中不痛裏急後重 青皮 槐花 荊芥穗 <small>各等</small> 分 | 右咬咀每服五錢水煎食後溫服 | 黃連湯 治大便後下血腹中不痛者謂之濕毒下血 黃連 當歸 <small>各半</small> 兩 甘草 <small>炙二</small> 錢 <small>半</small> |
|---|-------|----------------------|--|--------|----------------------|---------------|--|----------|---|---------------|--|



右搗羅為散每服一錢食前溫米飲調下

酸石榴皮散 治血痢久患

酸石榴皮 一兩 枳殼 一兩 當歸 三分

右搗羅為細末每服二錢粥飲調下

黃連丸 治血痢不止增熱洩瀉

黃連 黃蘗 黃芩 各一兩

右搗羅為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服食前粥

飲下十五丸一方作散煎服腹痛加山梔子小便不

欽定四庫全書

普濟方

利加赤茯苓阿膠煎服

當歸散 治血痢裏急後重腸中疴痛

當歸 三分 黃連 一兩 龍骨 二兩

右搗羅為細末每服二錢粥飲調下不拘時候日二

肉豆蔻丸 治血痢久不差臍腹刺痛

肉豆蔻 一兩 陳皮 半兩 檳子 一兩

右先以二味搗篩為粗散同米拌勻同炒黃色去米

一分單炒一分生用同焙搗為末研粟米飲和搗為



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|----|-------|---------------|--------------------------------|----------|------------------|--------------------|
| 丸如梧桐子大每服五十九丸空心溫陳米飲下二三 百服効 | 地榆散 治腸胃虛熱血痢 | 地榆 酸石榴皮 木賊 各一兩 | 右搗羅為散每服一錢煎訶梨勒湯下食前服 | 地榆湯 治血痢不止及積毒瀉血 | 地榆 樗皮 一兩 酸石榴皮 半兩 | 右搗篩每服三錢漿一盞煎至七分去滓溫服不拘 | 欽定四庫全書 普濟方 | 時候 | 療下痢鮮血 | 乾地黄 犀角 地榆 各二兩 | 右搗篩蜜丸如彈子大每服一丸水一升煎取五合 去滓溫服極効 | 地膚散 療下血痢 | 地膚 五兩 地榆根 黃芩 各一兩 | 右搗篩為散以水服方寸匕日三或粥飲調下 |
|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|----|-------|---------------|--------------------------------|----------|------------------|--------------------|



| | |
|---|---|
| 橡斗子散 治酒痢便血經年不瘥 | 橡斗子 <small>一兩</small> 槐花 <small>一兩</small> 白礬 <small>一分</small> |
| 右為細末每服二錢溫酒調下 | |
| 治血痢百方無効不問遠近宜服 | |
| 黃連 <small>一兩</small> 竈突墨 <small>二兩</small> 木香 <small>半兩</small> | |
| 右搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢 | |
| 治血痢方 | |
| 膩粉 <small>五錢</small> 定粉 <small>三錢</small> | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 右同研勻用水浸蒸餅心少許和為丸如菉豆大每服七丸或十九艾一枝水一盞煎湯下艾湯多亦妙 | |
| 二黃湯 治下血日夜七八十行 | |
| 黃連 黃蘗 各半兩 | |
| 右呖咀用醇醋三升煮取一升半分再服 | |
| 酒蒸黃連丸 治身熱下痢鮮血煩躁多渴或傷熱物過度 | |
| 黃連 <small>一觔</small> 好酒 <small>二升</small> | |



| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| <p>右用酒浸黃連以瓦器盛置甑上蒸至爛取出晒乾 研為末用麪糊丸如梧桐子大每服三十九丸熟水吞 下又療傷酒過多臟毒下血大便泄瀉用米飲下食 前一日兩服一方用香薷湯下即愈</p> | <p>地榆湯 治血痢不止</p> | <p>地榆 二兩 甘草 半兩</p> | <p>右搗羅每服五錢以水一盞煎至七分去滓不拘時 候溫服</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>地榆散 治丈夫婦女下痢</p> | <p>地榆 一兩 礬石 半兩</p> | <p>右搗篩為散用生猪肉二兩批開摻藥一錢在肉上 用炭火炙熟細嚼米飲送下併兩服立効</p> | <p>烏頭丸 治以虛作痛後重下血不止</p> | <p>烏頭 各半 蛤粉 兩</p> | <p>右搗為細末麪糊為丸如梧桐子大用鹽豉湯下十 五丸食前服</p> |
|---|------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|------------|------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|-----------|------------|--------------|
| 葛粉飲 治血痢日夜數十行 | 葛粉 白蜜 各兩 | 右相和新汲水四合調空腹服之 | 犀角地榆湯 治血痢日夜不止腹中疔痛心神煩悶 | 犀角屑 地榆 各半兩 | 右以水二大盞入蜜三合煎至一盞隨大小增減服之 | 又方 出聖惠方 | 欽定四庫全書 普濟方 | 熟地黄 黃芩 各一兩 | 右細剉用水一大盞煎至六分去滓溫二分服 | 治血痢百方無効不問遠近 出聖惠方 | 牛角腮 大麥 各二兩 | 右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢 | 治臟毒酒病便血不止 | 槐花 山梔子 各半兩 | 右為細末每服二錢新水調下 |
|--------------|----------|---------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|------------|------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|-----------|------------|--------------|



治大熱毒純血痢不可瘥者

出千
金方

右用黃連六兩呶咀以水七升煮取二升半夜露著
星月旦起空腹服之卧將息即止不瘥加黃芩二兩
更作服之仍不瘥者以疝痢法治之

海蛤玉粉散 治血痢解臟中積毒熱

右用海蛤不拘多少為末每服二錢入蜜少許冷水
調下不計時候

治下痢純赤及血痢等

欽定四庫全書

普濟方

右煎白梅湯點真蠟茶服

治腸癖

右用鱉甲炙黃訶子皮生薑等分為丸空心服三二
十丸

治血痢

用薄荷葉煎單服

黑參丸

出仁
存方

治血痢

右用苦參不拘多少炒焦為末滴水丸如梧桐子大



每服五六十九米飲下一方治熱痢有血煎服

又方

右煎木賊十二分切以水一升八合取八合去滓空
心溫分三服如行五里再服

又方

出危
氏方

用合成平胃散稱一兩入川續斷末二錢半拌勻每
服二錢水一盞煎至七分服張叔潛秘書之劔州時
其聞下病血痢一醫者用此藥治之而愈紹熙壬子

欽定四庫全書

普濟方

會稽時行痢疾叔潛之子為人說服之亦驗小兒病
親曾服作効

治血痢熱燥

用水研粳米半升取汁令盡以汁置有油甕瓶蠟紙
封口沉井底平旦服之吳內翰家乳媪病服之而愈
葛根方 治熱毒下血或因喫熱物發動

用生葛根二觔搗取汁一觔併藕汁一觔相和服

治血痢神妙方

出尉
後方



用乾薑急於火內燒黑不令成灰瓦碗合放冷為末
每服一錢米飲調下

治瀉血不止

用桑耳一大兩熬令黑以水一大升三合煎取六合
去滓空心分溫服

治血痢十年方

用石灰三升熬令黃以水一斗攪令清澄一服一升
日三服

欽定四庫全書

普濟方

東壁土方 治腹內熱毒絞結痛下血

用取入地乾土以水煮三五沸絞過滓適稀稠及暖
服一二升良

治男子病膿血惡痢不可忍

昔日有人忽見水浸甜瓜心酷喜之連皮食數枚膿
血皆已人言下痢無止法是何言也人止知痢是虛
冷溫之燥之洗之截之此外無術矣豈知風水火溫
燥寒六者皆為痢此水蜜甜瓜所以効也



治下痢純血

用黃蘗蜜炙令杏黃色一兩為末每服三錢空心下

椿皮丸 治下痢青血腹中刺痛

用椿根白皮不拘多少晒乾為末醋麪糊丸如梧桐

子大空心米湯下

治血痢

昔曾魯公痢血百餘日國醫無能療者陳應之言取

水梅除核研一枚合蠟茶加醋湯沃服之一啜而瘥

欽定四庫全書

普濟方

大丞相莊蕭梁公亦痢血應之曰此挾水穀當用三

物散亦數服而愈三物散用胡黃連烏梅肉竈下土

等分為末蠟茶清調下食前服

葵子散 治血痢及婦人產後血痢

右用冬葵子不拘多少搗羅為散每服二錢入蠟茶

一錢以沸湯七分一盞調服併兩三服差

烏金丸 治瀉血血痢

右用烏藥不拘多少炭火燒存性搗羅為末陳米飲



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------------------------------|-------|---|---------------|--|----------------------|----------------------|--------|--|----------------------|----|----|
| 丸如梧桐子大每服三十九 | 蛇含散 治血痢不止 | 用蛇含二枚煨醋淬十數度研如麪每服三錢陳米飲調下兼止腸風瀉血傷等 | 治血痢不止 | 右用地榆淨洗為細末曝乾再細研每服二錢摻在羊血上火炙熟爛嚼米飲下如不喫葷即以捻頭煎湯調下一方用根切煮令似飴糖一服三合 | 欽定四庫全書 普濟方 | 治男子婦人便血流不止者又治血痢不止 <small>出聖惠方</small> | 用木耳炒乾為末每服五錢好酒一盞送下即可一 | 方用井花水調空腹頓服之一方用黑木耳水煮鹽 | 醋食後服其汁 | 治血痢日夜不止腹中疴痛心神煩悶 <small>出聖惠方</small> | 用生地黄汁三合煎取二合下蜜一合攪令勻溫服 | 頻効 | 又方 |
|-------------|-----------|---------------------------------|-------|---|---------------|--|----------------------|----------------------|--------|--|----------------------|----|----|



用薺莖絞取汁二合蜜一合同暖令溫服之

黃連散

出肘後方

治血痢百方無効

用黃連二兩去鬚微炒為末以鷄子白和作餅子如

二分厚搏令乾炒細研為散每服不計時候以粥飲

調下一錢一方剉用無灰酒煎服

又方

用濕白紙二張裹鹽一匙於猛火中燒作灰研細分

為三服食前以粥飲服之

欽定四庫全書

普濟方

又方

右用沒石子一兩細研以軟飲和丸如小豆大每服

於食前以粥飲下十九

又方

右搗馬齒葉汁三合和蜜一匙同暖服之

又方

用乳腐一兩切以漿水一中盞煎至半盞去滓溫服

之



又方

用扁竹汁四合蜜一合和頓服之

又方

用醋石榴一枚和皮搗絞取汁用蜜一合和暖服之

治男子婦人小兒大腹下黑血茶脚色或膿血如淀色

所謂虫痢者治之殊効

一方又能殺五臟虫名柏連散

用側柏葉焙乾為末與川黃連二味同煎為汁服之

欽定四庫全書

普濟方

或每服二錢熟水調亦可

治野鷄病下血不止腸疼痛

用鯉魚一頭如食法作鱠加蒜齏食之

治酒毒便血一名苦散子

用黃連焙乾為末每服二錢溫酒調下

專治腸風酒痢以血不止

用川黃連一觔用無灰酒浸一宿曬乾用枳殼一觔

配合巴豆隨枳殼數每一合用巴豆一粒以線縛之



| | |
|----------------------|---|
| 黃連散 治血痢甚經月不差 | 黃連 黃蘗 梔子仁 地榆 馬藺子 當歸 |
| 至六分去滓不計時候溫服 | |
| 右搗篩為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎 | |
| 犀角散 治以血痢腹內疼痛心神煩熱不思飲食 | 犀角屑 <small>分三</small> 赤芍藥 <small>分三</small> 伏龍肝 <small>分三</small> 川升麻 <small>兩半</small> 地榆 <small>分三</small> |
| 服不拘時候以粥飲下 | 青橘皮 <small>兩半</small> 當歸 <small>分三</small> 黃連 <small>分三</small> 甘草 <small>兩半</small> 木香 <small>兩半</small> |
| 右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每 | 阿膠 <small>分三</small> 地榆 <small>兩半</small> 訶梨勒皮 <small>分三</small> 熟乾地黄 <small>兩一</small> 乾薑 |
| 服不拘時候以粥飲下 | 兩半 赤芍藥 <small>兩半</small> 黃連 <small>兩一</small> 白朮 <small>兩半</small> 艾葉 <small>分三</small> 枳殼 <small>兩半</small> 木香 |
| 服不拘時候以粥飲下 | 兩半 當歸 <small>兩一</small> |
| 服不拘時候以粥飲下 | 右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每 |
| 服不拘時候以粥飲下 | 欽定四庫全書 普濟方 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|--|---------------------|--------------------|--|---------------|---------|----------------------|--|---|-------|----------------------|---------------------------|
| 不計時候溫服 | 右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓 | 桑黃散 治以血痢不止腹痛心煩 桑黃 _{兩一} 黃連 _{分三} 地榆 _{分三} 黃芩 _{兩半} 當歸 _{兩一} 甘草 _{兩半} 灸 _兩 | 右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢 | 酸石榴皮 _{分三} | 當歸散 治以血痢不止腹中疴痛面黃羸瘦 當歸 _{兩一} 樗樹皮 _{兩一} 黃連 _{兩一} 地榆 _{兩一} 艾葉 _{兩一} 阿膠 _{分三} | 欽定四庫全書 普濟方 | 滓不計時候溫服 | 右搗粗羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去 | 分 _二 當歸 _{兩一} 黃連 _{兩一} | 木香散 治以血痢不差四肢黃瘦腹內疼痛 木香 _{兩半} 樗樹皮 _{兩一} 黃根 _{兩一} 地榆 _{兩一} 甘草 _{兩半} 犀角屑 | 計時候溫服 | 右搗篩為散每服五錢水一中盞煎至六分去滓不 | 黃芩 茜根 栝葉 _{已上各一兩} |
|--------|----------------------|--|---------------------|--------------------|--|---------------|---------|----------------------|--|---|-------|----------------------|---------------------------|



| |
|--|
| 艾葉散 治以血痢小腹結痛不可忍 艾葉 <small>一兩</small> 黃芩 <small>一兩</small> 赤芍藥 <small>一兩</small> 地榆 <small>半兩</small> 當歸 <small>一兩</small> |
| 右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓 不計時候溫服 |
| 樗樹皮散 <small>出聖惠方</small> 治以血痢日夜不止宜服 樗樹皮 橡實 地榆 黃連 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩</small> |
| 右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢 |
| 地榆散 治以血痢不差 |
| 欽定四庫全書 普濟方 |
| 地榆 臭椿樹皮 狼牙 黃芩 <small>已上各半兩</small> |
| 右搗篩為散每服半兩以水一大盞煎至七分去滓 不計時候溫服 |
| 治血痢以不効 <small>出聖惠方</small> |
| 構葉 <small>一兩</small> 橡斗子 <small>半兩</small> 縮砂 <small>半兩</small> |
| 右藥都為末搗羅為散每於食前以粥飲調下二錢 |
| 栝葉散 治以血痢小腸結痛不可忍 |
| 栝葉 <small>二兩</small> 地榆 <small>一兩</small> |



右搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓
不計時候溫服

久血痢日夜不止

出聖
惠方

香墨

二
兩木香

半
兩

右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢

治血痢久不効

右用牡蠣二兩燒為粉細研以棗肉和為丸用文火

燒令黃色細研每於食前以粥飲調下二錢

欽定四庫全書

普濟方

又方

出聖
惠方

右以當歸一兩細剉微炒水一大盞入生薑半分去

滓食前稍熱分為二服

赤小豆散 治下痢先見血此為近血宜服此藥

赤小豆

三
升當歸

三
兩

右治下篩每服方寸匕日三如或先見便後見血此

為遠血宜服黃土湯方見仲景傷寒門

防風散 治因食熱物過度風氣方盛銷鑠大腸膏脂



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------------------------|----|-----------------|--------|----------|---------|----------------|-------------|---|---------------------------|----------------|---------|---------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| 竈突中塵 <small>升一</small> 黃連 <small>兩五</small> 地榆 <small>兩三</small> | 又方 | 用草龍膽滿一虎口切以水五升煮取二升半分為五服如不瘥更服 | 又方 | 赤小豆一升搗碎以水三升絞汁飲之 | 治卒中血不止 | 用忍冬籐濃煎服之 | 治熱毒血痢水痢 | 右咬咀以水八升煮取二升分再服 | 麥門冬湯 治凡下血虛極 | 麥門冬 白朮 <small>各四兩</small> 甘草 <small>二兩</small> 牡蠣 <small>三兩</small> 芍藥 阿膠 | 各三兩 大棗 <small>二十枚</small> | 右咬咀以水八升煮取二升分再服 | 治熱毒血痢水痢 | 欽定四庫全書 普濟方 | 以致榮衛之血滲流而下 | 羌活 荆芥 防風 枳殼 殭蠶 薄荷 <small>各等分</small> | 右剉散白水煎空心溫服忌再喫熱物 |
|--|----|-----------------------------|----|-----------------|--------|----------|---------|----------------|-------------|---|---------------------------|----------------|---------|---------------|------------|--------------------------------------|-----------------|



右為散粥飲服方寸七日再服重者夜一
蒲黃散 療卒下血

蒲黃 三合 當歸 二兩 鹿茸 一枚

右為散飲服方寸七日三

黃連 半兩 黃蘗 二兩 梔子 二十枚

右切以酒二升浸一宿去滓煮二沸頓服之忌猪肉

冷水

牛角腮灰散 出聖惠方 治卒下血不問丈夫婦人立効

欽定四庫全書

普濟方

用黃牛角腮一具燒赤色出火即青黑為細散食前
濃煮豉汁和二錢重者日三方用白礬填滿燒為灰
細研食前粥飲調下

胃風湯 治風冷客入腸胃泄下血及腸胃濕毒下如

豆汁或下瘀血

枳殼散 治血痢不止 方見本門 赤痢類

貫衆散 治血痢不止或如鷄鴨肝或如小豆者并能

治之



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------------------------|-------|-----|----------------------|---|----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------|----------------------|--|
| 洗心散 治血痢 | 右為細末每服二錢食前食後溫水調下 | 槐花 白礬 <small>分等</small> | 治酒痢下血 | 有桔梗 | 右為末麪糊丸如桐子大每服十五丸米飲下一方 | 犀角屑 <small>兩半</small> 茜根 青黛 黃連 <small>各一兩</small> | 因素服五石湯元攻傷五臟陰氣將絕如蠱毒之狀 | 欽定四庫全書 普濟方 | 犀角丸 治下痢其色瘀黑或如猪肝五內切痛此或丸濃煎烏梅湯下 | 右為細末以上等醃醋和丸每兩作十五丸每服一丸濃煎烏梅湯下 | 蠟茶 <small>不拘多少</small> | 歛紅丸 治伏熱下血裏急後重 | 飲調下空心服 | 右件同炒令變色地下出火毒研為末每服三錢米 | 貫衆 <small>二錢半</small> 黃連 <small>兩半</small> |
|---------|------------------|----------------------------|-------|-----|----------------------|---|----------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|--------|----------------------|--|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----|-------------------------|----|--|---------|----------------------|--------|
| 洗心 | 右一試官入院偶感血痢間有赤白極危一醫人用此藥數服而愈 | 黃連散 治血痢 | 胡黃連 烏梅肉 竈下土 | 右等分為末蠟茶清調下空心溫服 | 聚珍丸 治血痢酒痢尤妙 | 川百藥煎 兩半 薄荷煎 兩半 陳槐花 兩半 感應丸 一貼 麝香 一貼 | 欽定四庫全書 普濟方 | 許少 | 右件拌勻添蜜為丸男子龍牙草煎湯婦人生地黃煎湯下 | 又方 | 黃連 兩一 白附子 兩半 刺蝟皮 一個 厚朴 三錢 白礬 枳殼 | 五倍子 兩各半 | 右件為細末艾醋湯為丸男子敗櫟灰調酒下女人 | 綿子灰調酒下 |
|----|----------------------------|---------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|----|-------------------------|----|--|---------|----------------------|--------|



| | |
|----------------|--|
| 止血痢 | 用黑豆搗篩和水溫服之 |
| 治血痢 | 用掘藕食之 |
| 治血痢 | 用狼把草二觔搗絞取汁一小升內白麪半鷄子許和之令勻空腹頓服之極重者不過三服若無生者但拔取苗陰乾搗為散患痢者取散一方寸匕和蜜 |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 水半錢服之療丈夫血痢不療婦人 | |
| 治血痢 | 用小薊搗絞取汁溫服 |
| 治血痢 | 用荷葉蒂水煮服之 |
| 治下水止血痢 | |
| 用合明草搗絞汁服 | |
| 治血痢 | |



用赤苧根莖糟藏食之甚美

治瀉血

用罌粟殼煮汁服之瘥

又方

用榼籐子一枚以刀剗內穰熬研為散空腹熱酒調

下二錢不過三日必効

治下血痢如刺者

用豉一升水漬纔令相淹煎一兩沸絞取汁頓服立

欽定四庫全書

普濟方

瘥

治腸風血痢

用鯽魚釀白燒灰服

滯下膿血

論附

夫膿血痢者為春時陽氣主表人運動勞役腠理則開
血氣虛者則傷於風至夏又熱氣乘之血性得熱則流
散其遇大腸虛血滲入焉與腸間津液相搏積熱蘊結
血化為膿腸虛則泄故成膿血痢也所以夏多膿血痢



| | | | |
|-----------------------|-----|-----|-----|
| 欽定四庫全書 | | 普濟方 | |
| 用炒故紙當歸木香乾薑官桂主之嗣是少與震靈丹 | | | |
| 今之白痢全無腥臭面色微黑骨刀羸弱的見腎虛合 | | | |
| 作白痢其氣腥臭已經轉下而且淹延日久無所謂痢 | | | |
| 法當溫腎蓋腎主骨髓白膿者骨髓之異名也要之始 | | | |
| 後變作白膿點滴而下或於糞尾見之為之溫脾不愈 | | | |
| 細虛遲者生數疾大而熱者死大人小兒泄痢無已其 | | | |
| 又脈懸絕則死滑大則生脈微小者生實急者死脈沉 | | | |
| 者由腸胃虛也秋冬診其脾脈微瀦為因瀦多下膿血 | | | |
| 赤石脂湯 治膿血痢後重裏急日夜頻併 | | | |
| 赤石脂 | 白芷 | 天雄 | 龍骨 |
| | | | 各一兩 |
| 豆蔻 | 黃連 | 地榆 | 厚朴 |
| | | | 白朮 |
| | | | 桂 |
| | | | 訶梨 |
| 勒 | 木香 | 人參 | 吳茱萸 |
| | 各一兩 | 半兩 | 一兩 |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|----------------------|-------------------|--------------------|-------|----------------------|---------|------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|
| 黃連丸 治下痢膿血羸瘦 | 飲下不拘時候 | 右搗羅為末煮麪糊丸如梧桐子大每服三十九米 | 赤芍藥 艾葉 黃芩 無食子 肉豆蔻 | 黃連 地榆 赤石脂 龍骨 阿膠 木香 | 滿腸鳴裏急 | 香連丸 治臟氣止便泄下痢膿血臍腹痛虛氣痞 | 方亦主風虛冷痢 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右呶咀以水五升煮取二升分再服不瘥滿三劑此 | 赤石脂 大棗 桂心 芍藥 當歸 梔子仁 甘草 | 茯苓 黃蘗 黃連 龍骨 人參 乾薑 黃 | 垂死老少並宜服 | 茯苓湯 治困下空竭欲死滯下膿血日數十行羸弱 | 分去滓溫服空心食前 | 右剉如麻豆每服五錢水一盞半生薑五片煎至八 |
|-------------|--------|----------------------|-------------------|--------------------|-------|----------------------|---------|------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|-------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------|----------------------|-------------------------------------|---|
| 仁 兩半 白朮 兩一 黃芩 兩一 乾薑 兩一 | 當歸 兩一 地榆 兩一 甘草 兩半 赤石脂 兩二 烏梅肉 兩一 梔子 兩一 | 當歸散 出聖 治膿血痢腹痛心煩口乾不欲飲食 | 右搗羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢 | 一兩 乾薑 兩一 赤石脂 兩二 厚朴 兩一 | 黃連 兩一 黃蘗 兩一 艾葉 兩一 附子 兩一 甘草 兩一 烏梅肉 兩一 | 黃連散 出聖 治膿血痢腹內疝痛行數不常飲食不下 | 加服之亦得 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右搗篩蜜丸空腹以飲服如豆大十五丸日二服漸 | 苦參 分各六 厚朴 分五 黃芩 分五 | 人參 乾薑 枳實 分各四 龍骨 赤石脂 黃連 | 人參丸 治冷熱不調痢膿水 | 心米飲送下 | 右搗羅為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九空 | 甘草 陳麩 兩各半 赤石脂 乾薑 兩各半 | 黃連 龍骨 苦參 厚朴 兩各一 熟艾 白礬 |
|---|--|-----------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|-------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-------|----------------------|-------------------------------------|---|



右搗羅為散每服不拘時候以粥飲調下二錢

赤石脂湯 療下焦熱或痢下膿血

赤石脂兩八 烏梅枚二十 梔子枚十四 白朮兩三 蜀椒兩三 升

麻兩三 乾薑兩二 粟米升一

右切以水二升煮米熟去滓取七升下諸藥煮取七

合服之忌桃李雀肉

豆蔻八味散 治腸癖痢後食稀或稠便即作膿每便

極滑痢有常期

欽定四庫全書

普濟方

豆蔻子 丁香各二兩 細辛 附子 乾薑各四兩 人

參 黃耆各五兩 赤石脂六兩

右搗篩為散以飲下之初服一方寸七日再稍稍加至

二三七忌生葱猪肉冷水

白礬散 治下痢膿血心腹疔痛不止

白礬兩一 黃丹兩一 胡粉兩二 龍骨兩一 當歸兩一 黃連

分甘草一分 訶梨勒兩一

右搗篩為散每服不拘時候以粥飲調下二錢



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----------|---------------------------|---------------|------|--------------------------|-----------|------------|------------------------------------|-------------------------|----|---------------|----------------------|--------|--------------|
| 貫衆散 治伏熱下痢膿血 | 右為細散每服三錢米飲調下不計時候服 | 草 肉豆蔻 各半兩 | 阿膠 龍骨 無食子 各三兩 栝葉 桃葉 各一兩 甘 | 阿膠散 治膿血諸痢及腹刺痛 | 下臨寢服 | 右研勻搗糯米粥和丸如麻子大每服十丸溫熟水下臨寢服 | 錢一 巴豆霜 錢一 | 欽定四庫全書 普濟方 | 丹砂 四錢 青礞石 一錢 砒礪 二錢 黃連 三錢 肉豆蔻 二錢 烏頭 | 丹砂礞石丸 治痢下膿血裏急後重腸中疼痛磨下虛積 | 二錢 | 柿皮散 治膿血不止上充下脫 | 用柿木皮大柿亦可用曝乾更焙羅為末米飲調下 | 去腸中膿水方 | 用白犬膽和通草桂為丸服之 |
|-------------|-------------------|-----------|---------------------------|---------------|------|--------------------------|-----------|------------|------------------------------------|-------------------------|----|---------------|----------------------|--------|--------------|



| |
|---|
| 貫衆 <small>一兩</small> 黃連 板藍根 木香 <small>各半兩</small> 胡黃連 <small>一分</small> 可 |
| 梨勒皮 肉豆蔻 <small>各三分</small> |
| 右搗羅為末煮麪糊丸如梧桐子大每十五丸煎甘草湯下不拘時候 |
| 乾薑丸 治膿血痢日久不瘥 |
| 乾薑 黃連 黃蘗 <small>各一兩</small> 熟艾 附子 烏梅肉 |
| <small>各三分</small> 甘草 <small>炙半兩</small> |
| 右搗篩為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食 |
| 欽定四庫全書 |
| 普濟方 |
| 前米飲下 |
| 解毒金華散 治下痢膿血熱毒 |
| 黃連 黃蘗 <small>各一兩</small> 黃芩 赤茯苓 白朮 赤芍 |
| <small>藥各半兩</small> |
| 右呖咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服無時如腹痛加梔子二枚煎服 |
| 治便膿血 |
| 用烏梅一兩以燒酒浸去核研為末每服二錢米飲 |



調下立効

治暑月膿血痢晝夜頻併不止腹痛不可忍者

用楮實二七枚生用將焰火燒為黑灰淹梅水少許

以水解破調服兼用羊肉裹末納穀道中利出安一

方乾為末

當歸四聖散 治一切下痢膿血頻併臍腹絞痛不可

忍

當歸 芍藥 各二兩
御米殼 四兩
甘草 一兩
茯苓 半兩
黃耆

欽定四庫全書

普濟方

一兩
二錢

右咬咀每服三錢水一盞半煎至六分去滓食前溫

服

當歸導氣湯 治膿血痢無度小便不通腹中痛

當歸 一兩
甘草 一兩
芍藥 一錢
青皮 七錢
槐花 七分
生地黃

一錢
半

右為末水煎溫服食前如後重加木香檳榔各三分澤

瀉半錢如小便利去澤瀉



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|---------------------|------|--------------------------|------------------|---------------|--|--------------|---|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢 | 乾薑 三分 黃連 三分 桂心 三分 木香 兩半 厚朴 一兩半 當歸 三分 | 乾薑散 治膿血痢腹痛不欲飲食 | 右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢 | 骨 一兩 | 木香 白朮 黃連 竈中黃土 當歸 各半 龍 | 木香散 治膿血痢腹內疔痛口乾心煩 | 欽定四庫全書 普濟方 | 阿膠 二兩 當歸 一兩 黃連 一兩 赤芍藥 一兩 乾薑 一兩 赤石脂 一兩 | 阿膠散 治膿血痢遠臍疼痛 | 胡粉丸 治膿血痢腹痛滑洩 <small>方見本門 熱痢類</small> | 食前溫服之 | 右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓 | 黃連湯 治下痢膿血腸胃虛滑米□完出 | 黃連 乾薑 熟艾 附子 阿膠 蜀椒 各半 |
|---------------------|---|----------------|---------------------|------|--------------------------|------------------|---------------|--|--------------|---|-------|----------------------|-------------------|----------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|---|----------|-----------------------|-----|----------------------|---|---------------|-------------|----------------------|--|----------|---------|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| 至二三七 | 右搗篩為末以飲下之初服一方寸匕日再服稍加 | 麩末 <small>一升</small> 乾薑 <small>六兩</small> 丁香 豆蔻子 <small>各四兩</small> 高良薑 <small>五兩</small> | 大便兼膿遇冷而劇 | 神麩五味散 治膿疾之後腹不刺痛食亦不大稀但 | 米飲下 | 右研為末醋煮麩糊丸如梧桐子大每服十九食前 | 吳茱萸 乾薑 訶梨勒皮 <small>半兩</small> 白礬 <small>一兩</small> 胡粉 <small>一兩</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 菜萸丸 治下痢膿血不止 | 右搗篩每服五錢水一盞煎至八分去滓食前溫服 | 吳茱萸 <small>一兩</small> 訶梨勒皮 當歸 <small>各二兩</small> 黃連 <small>二兩</small> 乾薑 <small>半兩</small> | 菜萸湯 治膿血痢 | 米飲下不拘時候 | 右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九用溫 | 栝葉 黃連 阿膠 地榆 當歸 <small>各半兩</small> | 栝葉丸 治膿血久痢腹內疼痛 |
|------|----------------------|---|----------|-----------------------|-----|----------------------|---|---------------|-------------|----------------------|--|----------|---------|----------------------|-----------------------------------|---------------|



耆黃五味散 治膿血相和痢後二物正等食不堪每

出二物與俱

黃耆五兩 赤石脂八兩 厚朴五兩 乾薑 艾葉各三兩

右搗篩為散以飲下初服一方寸日再服稍稍加至

二三七

黃耆散 治膿血痢心煩疼痛

黃蘗一兩 梔子仁一兩 黃連一兩 阿膠一兩 當歸一兩

右搗細篩為散每服不計時候以粥飲調下二錢

欽定四庫全書

普濟方

附子散 治冷熱不和腹痛膿血

附子一兩 陳麴三分 乾薑三分 甘草一分 當歸半兩

右搗細羅為散每服不計時候以粥飲下二錢

黃連丸 治痢下腹血及諸疾

黃連三兩 當歸二兩 烏梅肉二兩 阿膠二兩 厚朴二兩

右搗羅為末以醋煮麪糊丸如梧桐子大每服以粥

飲下三十九日三四服

立應丸 治臟腑泄痢膿血不止腹中疼痛



| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 乾薑 <small>一兩</small> 炮 | 百草霜 <small>一兩</small> | 連皮巴豆 <small>一兩</small> | 杏仁 <small>一兩</small> | 右用黃蠟四兩鎔開蠟次入前四味用鐵器攪勻旋丸桐子大每服甘草湯下白痢乾薑湯下食前若水瀉溫水送下 | | | | |
| 木香散 | 治下痢赤白 | 木香 <small>半兩</small> | 阿膠 <small>一兩</small> | 訶梨勒 | 黃連 <small>各一兩</small> | 右搗羅為散每服二錢空心用冷粥飲調下 | | |
| 女萎丸 | 治膿血下痢不禁 | 女萎 | 半夏 <small>各一兩</small> | 附子 <small>三分</small> | 梨蘆 <small>半兩</small> | 右搗羅為末陳醋煮沸和藥末為丸如梧桐子大每服三十九丸陳米飲下日午再服 | | |
| 烏梅丸 | 治膿血痢食入即注下不安 | 白礬丸 | 治下痢膿血日夜不止食飲不化面無顏色 | 白礬 | 鉛丹 | 礪砂 | 硫黃 <small>各一分</small> | 右先入礬於磁合盛內次入硫黃礪砂鉛丹覆之用瓦片蓋面文武火煨赤傾地上候火氣絕再為末蒸 |



餅丸如梧桐子大每服十九丸溫酒下

通神丸 治膿血痢

治下痢膿血方

赤石脂 一個 烏梅 二十枚 乾薑 粳米 一升

右以水七升煮取令熟藥成服三合日三

乾薑散 療腸澼澹便膿血

乾薑 黃連 桂心 各一分

右搗篩服寸匕每中食日三多膿加桂多忌食猪肉冷

欽定四庫全書

普濟方

水生葱

附子散 療中寒下痢膿血

蜀附子 一枚 麴 乾薑 各三分

右下篩為散先食以酒服方寸匕日二并療婦人漏下

忌如前法

黃連苦參湯 療得病羸劣服藥不愈因作腸滑下痢

膿血日數十行腹中絞痛身熱如火頭痛如破其脉

如瀉



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|-----------------------|---------------------|---|------------|---------------|---|----------------------|----------------------|------|-----------------------|----|----------------------|----------------------|--|
| 右粗搗篩每服五錢水一盞半生薑二片煎至八分 | 黃連 <small>一兩</small> 厚朴 <small>半兩</small> | 者 | 黃連湯 治痢下血赤是腸濕瀉不定水穀痢久不瘥 | 右研細分五服每服用溫米飲調下空心食前服 | 橡實 <small>二枚</small> 訶梨勒皮 <small>為末與前等分</small> | 橡實散 治新舊膿血痢 | 欽定四庫全書 普濟方 | 之 | 小絞痛即瘥再服一方用水煎夜露星月下平旦服 | 右用黃連一升酒五升煮取一升半分再服臍下當 | 兼治下痢 | 黃連方 治痢下赤膿如鷄子白日夜數十行遠臍腹 | 冷水 | 三少少益至半升服湯盡後復合以愈為度忌猪肉 | 右咬咀以水一斗煮取二升去滓適寒溫服二合日 | 黃連 <small>四兩</small> 苦參 <small>二兩</small> 阿膠 <small>二兩</small> |
|----------------------|---|---|-----------------------|---------------------|---|------------|---------------|---|----------------------|----------------------|------|-----------------------|----|----------------------|----------------------|--|



| |
|--|
| 去滓溫服不計時候一方用大棗二枚煎空心溫服 腹痛加當歸三分一方無生薑棗煎名朴連湯 |
| 二宜散 治膿血痢一名變通丸 |
| 借氣散 治膿血痢久患脾瀉一名神聖香薑散 |
| 黃連 生薑 各一兩 |
| 右用銀石器炒焦赤去生薑取黃連為散每服二錢 |
| 七空心食前陳米飲下一方蠟茶清下甚者不過二 服瘥 |
| 欽定四庫全書 普濟方 |
| 木香散 治膿血痢困極 |
| 木香 一兩 黃連 一兩 |
| 右先將木香一塊置銀石器中次下黃連蓋之以水 |
| 二盞同熬水盡去黃連取木香切焙為散分三服第 |
| 一服甘草湯下第二服陳米飲下第三服蠟茶清下 |
| 並食前服大妙其黃連別搗末專治赤痢每服二錢 |
| 陳米飲下一方為細末以鷄子黃為丸空心飯飲下 |
| 一方第二服炙陳橘皮湯調下第三服濃陳米飲調 |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|----------------------|--|---|---------------|-----|-----------------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|-----|----------------------|----------------------|
| 魚鮓湯 治痢下五色膿血或如爛魚腸並無大便腸 | 下日進二服 | 右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼米飲食前 | 薑 <small>一錢五分</small> 御米殼 <small>二兩半</small> | 川當歸 枳殼 黃耆 陳皮 <small>各四錢</small> 甘草 <small>炒三錢</small> 乾 | 神聖丸 治瀉痢膿血腹痛後重 | 寒下痢 | 為度用汁調赤石脂方寸七服一方用桃花湯調治傷 | 欽定四庫全書 普濟方 | 用赤石脂一升半杵為末乾薑一兩米一升煮米熟 | 治下痢不止便膿血方 | 右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢 | 治痢下膿血及諸痢疾 | 兩服愈 | 年不瘥夢觀音傳此方三服而愈自下長沙有疾只 | 日進三服赤痢倍黃連白痢倍木香昔有婦人病經 |
|-----------------------|-------|----------------------|--|---|---------------|-----|-----------------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|-----|----------------------|----------------------|



| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|---------|--|------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|
| 中絞痛不可忍呻吟叫呼聲聞於外 | 輕霜研 輕粉 硃砂 礞砂 白丁香 各一錢 | 香巴豆 半七錢 | 右為末蒸棗肉為丸嬰孩三丸如粟米大二三歲四五歲如麻粒大每用三四丸並旋花煎鮓湯吞下仍間服調胃藥此証緣久積而成故小兒多有之 | 艾薑丸 治濕下痢膿血腹痛婦人下血 | 乾艾葉 四兩 川白薑 一兩 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為末醋煮麪糊丸桐子大每服七十九丸食前溫米飲下 | 烏梅丸 治痢下膿血食不消化 | 烏梅肉 二分 黃連 二兩 艾葉 二兩 乾薑 一兩 甘草 一兩 | 右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以粥飲下三十九日三四服 | 治痢下膿血 | 用薤白於醋中煮令熟飽食即止 |
|----------------|----------------------|---------|--|------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|-------|---------------|



| | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----|----|------|----|----|------|-----|-----|
| 地榆芍藥湯 | 治瀉痢膿血及至脫肛 | | | | | | | | |
| 右等分為末每服二錢空心米飲下 | | | | | | | | | |
| 甘草 | 木香 | 罌粟殼 | 烏梅 | 赤芍藥 | | | | | |
| 戊巳丸 | 治腸胃虛滑下痢無度膿血相雜 | | | | | | | | |
| 一盞煎六分食前食 | | | | | | | | | |
| 右件為細末煉蜜為丸如彈子大每服一粒陳米泔 | | | | | | | | | |
| 木香 | 錢一 | 地榆 | 錢二 | 酸石榴皮 | 錢二 | 罌粟 | 錢一兩半 | | |
| 欽腸丸 | 治下痢膿血 | | | | | | | | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 | | | | | | | | |
| 或十丸忌油膩粘滯等物 | | | | | | | | | |
| 麻子大小兒量大小夜卧温米飲下五七丸見漸大 | | | | | | | | | |
| 弱姪娘產人皆可服之粥飲下五丸或令下一丸如 | | | | | | | | | |
| 大每服三丸至五丸温米飲食前或臨卧及年老虛 | | | | | | | | | |
| 粉定粉三味同一處研如粉面取鷄子清丸如豌豆 | | | | | | | | | |
| 右件先杵石燕子玄胡索為末入乳鉢內共粉霜輕 | | | | | | | | | |
| 膩粉 | 錢三 | 玄胡索 | 錢三 | 粉霜 | 錢三 | 定粉 | 兩半 | 石燕子 | 一個半 |
| 玉粉丹 | 治虛中積止膿血痢撮痛裏急後重 | | | | | | | | |



| |
|---|
| <p>蒼朮<small>八兩</small> 地榆 卷栢 芍藥<small>各三兩</small></p> |
| <p>右咬咀每服一兩水一大盞半煎至一半溫服之病</p> |
| <p>退藥止</p> |
| <p>止膿便</p> |
| <p>用白石脂和厚朴為末用米汁飲止之</p> |
| <p>治下痢膿血<small>出本</small></p> |
| <p>用蠟和松脂杏仁棗肉茯苓等分合成丸食後服五</p> |
| <p>十九丸如梧桐子大</p> |
| <p>欽定四庫全書</p> |
| <p>附論</p> |
| <p>夫以痢不瘥則穀氣日耗腸胃損傷濕氣散溢肌肉浮</p> |
| <p>腫以胃土至虛故也蟲因虛動止蝕於膈則嘔逆煩悶</p> |
| <p>下蝕腸則肛門瘡爛以而不瘥變成疳蠱或下赤汁水</p> |
| <p>血相半腥不可近是謂五臟俱損而五液雜下此為難</p> |
| <p>治</p> |
| <p>方</p> |
| <p>龍骨湯 治新久瀉痢</p> |



| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|
| 龍骨 桑白皮 赤石脂 天雄 厚朴 麻黃 各一兩半 白芷 黃芩 黃連 地榆 桂皮 <small>去粗</small> 當歸 | 木香 白朮 訶梨勒 肉豆蔻 <small>二枚</small> | 右剉如麻豆大每服三錢匕水一盞入生薑一棗大切煎至六分去滓溫服 | 茯苓丸 治久痢不止脾胃虛弱食飲不消化腹鳴疴痛 | 白茯苓 <small>三分</small> 陳麩 <small>兩一</small> 赤石脂 <small>三分</small> 黃連 <small>兩一</small> 人參 <small>兩半</small> 附子 | 欽定四庫全書 普濟方 兩半 黃蘗 乾薑 當歸 龍骨 <small>各三分</small> 甘草 <small>半兩</small> | 右搗羅為末煉蜜和丸如桐子大每服二十九丸以米飲下不拘時候 | 附子湯 治暴下積日不注及久痢 附子 <small>枝一</small> 石榴皮 <small>具一</small> 阿膠 <small>兩二</small> 龍骨 甘草 芍藥 | 乾薑 黃連 <small>各一兩</small> 黃芩 <small>兩半</small> 粳米 <small>三合</small> 右咬咀以水八升煮取三升分三服 | 下痢丸 治數十年痢下氣消穀令人能食夏月長將 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|



| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---------------|-------------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 藥丸 | 烏梅丸 治諸痢以下 | 烏梅 三百枚 乾薑 各十兩 黃連 各十兩 當歸 各四兩 蜀椒 各四兩 細 | 欽定四庫全書 普濟方 | 辛 附子 桂心 人參 黃蘗 各六兩 | 右為末以苦酒漬烏梅一宿去核蒸五升米下別搗如泥盤中攪令勻相得蜜和搗二千杵丸如梧子大食前服十九日三服稍增至二十九米飲下 | 麩藥丸 治下痢數年不止消穀下氣補虛羸 | 桂皮 <small>去粗</small> 附子 黃連 當歸 陳麩 乾薑 麥 | 藥 各一兩 吳茱萸 蜀椒 烏梅肉 各一兩半 | 右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九米 |
|----|-----------|---|---------------|-------------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|

服之不霍亂

大麥藥 法麩各一升 烏梅二升 附子 乾薑 黃

連 黃蘗 桂心各三兩 蜀椒半兩 吳茱萸四兩

右為末和丸如梧子大食後服十九日三加至二十

丸三食三服亦至四十九一方用當歸無黃蘗名麩

藥丸

烏梅丸 治諸痢以下

烏梅 三百枚
乾薑 各十兩
黃連 各十兩
當歸 各四兩
蜀椒 各四兩
細

欽定四庫全書

普濟方

辛 附子 桂心 人參 黃蘗 各六兩

右為末以苦酒漬烏梅一宿去核蒸五升米下別搗

如泥盤中攪令勻相得蜜和搗二千杵丸如梧子大

食前服十九日三服稍增至二十九米飲下

麩藥丸 治下痢數年不止消穀下氣補虛羸

桂皮去粗 附子 黃連 當歸 陳麩 乾薑 麥

藥 各一兩
吳茱萸 蜀椒 烏梅肉 各一兩半

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九米



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|--------|-------------------------------|-------------|---------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------|----|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 羊脂煎 治諸疔瘡不瘥 | 右治下篩漿水服二方寸匕日再小兒一錢匕 | 分二阿膠分三 | 黃連分八 龍骨分二 赤石脂分三 厚朴分二 甘草分一 烏梅肉 | 七味散 治疔瘡日以不瘥 | 右為末蜜丸如梧子大食後服十九日三米飲下 | 歸兩 蜀椒半 | 烏梅肉 黃連 乾薑 吳茱萸 桂心 當 | 欽定四庫全書 普濟方 | 烏梅丸 治疔瘡諸藥不瘥數十年者消穀下氣補虛 | 飲服 | 右搗篩為散一服方寸匕加至四五匕日再夜一白 | 升一龍骨 茯苓分十 當歸分十三 | 馬藺子 地榆根皮 厚朴 熟艾 赤石脂 | 甘澱悉主之極重者不過三四日即瘥 | 馬藺子散 療赤白痢腹內疼痛并以水穀痢色白如 | 飲下加至四十九一方粟米糊丸 |
|------------|--------------------|--------|-------------------------------|-------------|---------------------|--------|--------------------|------------|-----------------------|----|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|----------------------|---|--|-----------|-----|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------|----|----------------------|-----------------------|---|
| 加味四君子湯 治以患痢疾服藥已多而疾不愈治 | 飲下不拘時候 | 右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九米 | 藥 <small>三</small> 分 <small>三</small> 橡實殼 <small>炒半</small> 兩 | 地榆 <small>一</small> 兩 <small>一</small> 龍骨 赤石脂 無食子 熟艾 <small>各半</small> 兩 黃 | 地榆丸 治以痢不止 | 膩之物 | 分去滓食前稍溫服老人小兒加減服之忌生冷油 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右搗粗散每服三錢水一盞薤白一條擘碎煎至八 | 殼 <small>各四</small> 兩 | 當歸 <small>去</small> 蘆 <small>各二</small> 乾薑 <small>各二</small> 兩 黃栢皮 甘草 枳殼 御米 | 利聖散子 治丈夫婦人遠年近日赤白休息等痢 | 十九 | 右內銅器中火上煎之攪可丸如梧桐子大飲服三 | 髮 <small>末一</small> 升 | 羊脂 白蠟 黃連 <small>末一</small> 升 酢 <small>七</small> 合 蜜 <small>七</small> 合 烏梅肉 <small>二</small> 兩 亂 |
|-----------------------|--------|----------------------|---|--|-----------|-----|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------|----|----------------------|-----------------------|---|



痢多是攻擊臟腑之藥轉覺難安宜用輕清和氣之藥即愈

人參 白朮 白茯苓 川芎 黃耆 甘草
嬰粟殼

右各等分剉散每服三錢水一盞半生薑三片棗二枚烏梅一箇煎溫服

厚朴湯 治三十年久痢不止

厚朴 乾薑 阿膠 黃連 艾葉 石榴皮

欽定四庫全書

各三兩

普濟方

右呶咀以水七升煮取二升分再服

御米湯 治久患痢疾或赤或白臍腹疔痛裏急後重

發渴無時日夕無度及下血不已

厚朴 嬰粟殼 白茯苓 甘草 人參 乾

薑 各三分半

右呶咀每服三錢水一盞半生薑三片大淮棗三枚

烏梅一箇煎至一盞去滓空心食前通口服如年老



| |
|---|
| 及七十八十歲每服二大盞小兒每服一錢半為率 量兒加減腹痛加木香赤多加黑豆 |
| 狗頭骨丸 治久患下痢臍腹疔痛所下雜色晝夜不 止或其人久虛頓下腸垢胃之惡痢其脉微弱 |
| 赤石脂 敗龜 乾薑 <small>各半</small> 肉豆蔻 附子 <small>各一兩</small> |
| 狗頭骨 <small>一兩</small> |
| 右為末醋糊丸如梧桐子大每服五七十九丸米飲空 心下一方膿出甚者去附子 |
| 欽定四庫全書 普濟方 |
| 蜜陀僧丸 治久痢 |
| 蜜陀僧 白礬 陽起石 伏火砒 伏龍肝 |
| 赤石脂 <small>各半兩</small> |
| 右搗令細入瓶中鹽泥固濟以文火養三日後煨令 通赤候冷重研極細水浸蒸餅和丸如梧桐子大每 服三丸煨生薑湯下空心日午夜卧服 |
| 治一切冷氣積年氣痢 |
| 葶藶 附子 乾薑 陳橘皮 桂心 厚朴 |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----|-----------------------|---------|----------------------|
| 石脂 兩二 | 無食子 蜀椒 粒三百 烏梅 枚二百 熟艾 升一 乾薑 兩三 赤 | 苦筋轉起上瀕扶陰 | 黃四肢沉重起即眩倒骨肉消瘦兩足逆冷痛中熱 | 椒艾丸 治三十年下痢所食之物皆不消化或青或 | 三不過五六服瘥一方無白朮用棗肉為丸粥飲下 | 右為末以蠟煎熬用丸藥如梧桐子大每服五丸日 | 雲實 合五 龍骨 兩三 附子 兩二 女萎 兩二 白朮 兩二 | 欽定四庫全書 普濟方 | 雲母散 治三十年注痢骨立痿黃腸滑不瘥 | 須大轉瀉者當用此方一方用桂心無甘草 | 右咬咀以水八升煮取二升半分三服臨熟下大黃 | 消積熱 | 溫脾湯 治痢久赤白連年不止及霍亂脾胃冷食不 | 甚溫熱發用解之 | 右各等分為末以白麩糊丸溫湯送下食前藥性氣 |
| 大黃 兩四 人參 甘草 乾薑 兩各二 附子 枚一 | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------------------|-----------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------|----|----------------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 訶梨勒散 治久痢不止沉困怠惰 | 脂 兩半 | 天仙子 鉛丹 各二兩 大棗 三十枚 訶梨勒皮 兩 赤石 | 天仙散 治腸虛久痢 | 煎服名茱萸湯治膿血痢 | 粟米飲下食前服一方有當歸無礬石每服五錢水 | 右搗羅為末醋煮麪糊為丸如梧桐子大每服十九 | 吳茱萸 乾薑 阿梨勒皮 白礬灰 各半兩 | 欽定四庫全書 普濟方 | 四續散 治久下痢赤白不止 | 尤奇 | 右為細末入麝香少許研勻陳米飲下二錢治血痢 | 木香 兩半 黃連 兩半 罌粟殼 兩半 生薑 兩半 甘草 一兩 | 木香散 治隔年痢不止 | 癢加至二十九加黃連一升溫水下 | 合搗二千杵蜜和丸如梧桐子大服十九日三服不 | 右椒薑艾下篩一斗米上蒸令飯熟去核內姜椒末 |
|----------------|------|-----------------------------|-----------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------|----|----------------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|---|
| 用黃連 | 時服不差更作老小亦良羸者稍稍服之一方無黃蘗 | 右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓不拘 | 乾薑 黃蘗 阿膠 酸石榴皮 <small>炒各一兩</small> | 乾薑湯 治積年痢因毒腸極滑醫所難藥 | 右合煮作粥一服令盡即瘥 | 羊脂 阿膠 蠟 黍米 <small>各二兩 二升</small> | 治諸久痢不瘥 | 欽定四庫全書 普濟方 | 服二丸或三丸生薑棗湯送下 | 內碗蓋上焙一宿取出候乾麪糊為丸如小豆大每 | 蓋大深四指烈火煨通赤去灰火去醋紙襯攤藥在 | 右藥同研細以好醋和令勻得所先作一地坑如茶 | 虛積丸 治久痢不瘥將變蠱 | 右搗羅為細散每服三錢匕沸湯調下食前服 | 訶梨勒 木香 黃連 地榆 吳茱萸 <small>各半 兩 炒一分</small> |
|-----|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|---|



| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---|-------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| 秦皮丸 治下赤連年 | 秦皮 鼠尾草 薔薇根 | 右等分咬咀以水潦煎去滓銅器重釜煎成丸如梧 桐子大每服五六丸日二稍增瘥止亦可濃汁服半 升 | 辰砂丹 治冷熱不調赤白毒痢久不瘥者 | 朱辰砂 信明砒 粉霜 各半 兩 | 右研極細鎔蠟七錢油七點為劑油紙裹旋丸如小 欽定四庫全書 普濟方 | 豆大小兒如菉豆大每服一丸甘草水冷下食前 | 金星鱗散 治久痢 | 金星鱗 白礬 鉛丹 各半 兩 | 右搗羅為散每服二錢匕米飲調下食前 | 龍骨丸 治久患滑泄下痢 | 龍骨 一兩 白礬灰 半兩 鉛丹 一分 | 右搗羅為末麪糊丸梧桐子大每服十九丸蠟茶清送 下 |
|-----------|------------|---|-------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|--------------------|----------------------------|



茯苓散 療下痢三十年

茯苓 乾薑 黃連 等分

右搗篩為散蜜和丸如梧桐子大飲服之一日漸增
至百丸苦痢劇者加龍骨附子炮仍令等分一服十
丸漸增之以知為度

當歸湯 療三十年下痢止諸痛方

當歸 一斤 生薑 八兩 大棗 二十枚

右以水四升煮取二升半分三服不瘥復作之

欽定四庫全書

普濟方

治下赤連年方

地榆 鼠尾草 各一兩

右咬咀以水二升煮取一升分二服如不止取屋塵
水清去滓一升分二服療下血二十年若不止重服
即愈一方為末粥飲調下二錢

乾薑散 治一切赤白痢久不瘥

乾薑 榆白皮 各一兩

右搗羅為散每服二錢空心食前溫米飲調下



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------|----------------------|---------------|-----------|---------------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------------|-----------|------------------|---------------|-----------|-------------------|
| 抵聖丸 治諸般痢多年不瘥日夜百十行不止 | 治洩痢久不止 | 生薑 砂糖 各一分 | 右以三重濕紙裹煨五更初都作一服以蠟茶嚼下 | 薑莧方 治久痢不止或赤或白 | 馬齒莧 生薑 二兩 | 右和勻用濕紙裹煨熟不拘多少細嚼米飲嚥下 | 痢止腹痛不可忍者 | 欽定四庫全書 普濟方 | 良薑 芍藥 | 右等分為末薑鹽飲湯調下 | 三靈散 治久痢腸胃俱虛肛門自下 | 龍骨 木賊 各半錢 | 右為末每服半錢乾摻候少時以手托上 | 黑豆湯 治赤白痢服諸藥不瘥 | 黑豆 甘草 各半兩 | 右綿裹以漿水三升煎至一升去滓溫二服 |
|---------------------|--------|-----------|----------------------|---------------|-----------|---------------------|----------|---------------|-------|-------------|-----------------|-----------|------------------|---------------|-----------|-------------------|



治七八十老人患疾痢不斷兼不能飲食

治積久二十年常下痢

用赤松皮切一斗為散麪粥和一升服之日三服即
効服一斗永瘥三十年痢

麪末酒 治久冷痢不純白者由積卧冷處經久病發
遂令脾胃俱冷日夜五六十行大小腹痛不可忍凡
白痢屬冷赤痢屬熱用好麪末五升微熬令香溫清
醇酒冷熱和麪末一升空腹頓服之日三服若至食

欽定四庫全書

普濟方

時搗蒜一升令至熟下薑椒末調和如常食之法惟
須稠勿加鹽以水和麪二升作蒸餅極爛煮之乾漉
熱內蒸蒜蘆白中相和一頓食之少與餘良至飢時
仍准前食麪末酒比至瘥來少食餘食以此法治不
過兩日無有不瘥

治久痢赤白

水楊柳嫩葉

右搗攪取汁一升日二服大効作啖咀煎服亦可



黑神散 治腸滑久痢神妙無比

酸石榴 一枚

右搗為散每服用酸石榴皮一瓣以水一盞煎湯調下

二錢匕久瀉亦治之又療冷熱不調或滯或水赤白

清黃者搗汁服之亦佳

豆蔻散 治脾虛腸鳴久痢不止腹痛不能食

大豆蔻 一枚入乳香三十塊
在內以麪裹煨熟

右為末每服一錢米飲調下

欽定四庫全書

普濟方

草蒿方 治冷熱久痢

右草蒿秋冬用子春夏用苗搗絞汁服

治久赤白痢

用黃雌雞子醋煮熟空腹食之

黃連膏 治久痢累醫不瘥

用黃連一兩為末以鷄子白和為餅炙令如紫肝色

杵為末以漿水三升慢火煎成膏白痢加酒半盞同

煎每服半合溫米飲調下食前服一方治赤痢為丸



每服三十九丸米飲服之

治久痢勞痢

用乾薑荳蔻焦炒見烟麩糊為丸白飲空心下十九

極効

治以下痢經時不止者此休息痢

用牡狗骨炙令黃焦搗飲服方寸日三

治痢久不瘥

用乾棗和丸光粉燒服

欽定四庫全書

普濟方

治久痢及疴痢困重方

用樗白皮不限多少取土際不用見根及風細切搗

如泥捻作餛飩如棗大勿令過熱煮吞七枚重者不過

七服皆空肚忌油膩熟麪等物

神授散 治久痢不瘥

用陳石榴焙乾為細末米湯調下三四錢人患二三

十年或三兩月不等者百藥不効此藥一服便住不

可以草方輕視



| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|---------------|-----------|---------|----------------------|----|------------------------|-----------|
| 殊砂丸 治赤白痢不瘥 | 七分通口服 | 右判散每服二錢水一盞薑三片棗一枚鹽一捻煎 | 陳皮 <small>各三兩</small> 石蓮肉 <small>一兩</small> 厚朴 <small>二兩</small> | 蓬莪茂 益智仁 甘草 京三稜 <small>各六兩</small> 青皮 | 異香散 治憂鬱氣滯不散腹中膨滿刺痛下痢不止 | 右為細末每服三錢食前水煎和滓服 | 乾薑 <small>一兩</small> 地榆 <small>二兩</small> 甘草 <small>一兩</small> 熟黑豆 <small>一兩</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 治諸痢日久者二服効 | 之塗五心并下部 | 用大蛇膽大如豆二枚煮通草汁研膽以意多少飲 | 不下 | 用猪臟熟煮薄切空心喫又調平胃散服之即愈忌熱物 | 治痢疾久病諸藥不効 |
|------------|-------|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--|---------------|-----------|---------|----------------------|----|------------------------|-----------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|-----------------|---------------------|--|--|-----------------|---------------|--------|----------------------|------------------------------------|------------|----------|----------------------|------------------|--|
| 右搗羅為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每 | 沒石子 _{分三} 黃蘗 _{分三} 橡實 _{兩半} | 當歸 _{分三} 芎藭 _{兩半} 龍骨 _{分三} 地榆 _{兩一} 赤石脂 _{分三} 艾葉 _{分三} | 龍骨丸 治久赤白痢不止腹痛不食 | 右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢 | 乾姜 _{兩一} 地榆 _{兩二} 當歸 _{兩一} | 白朮 _{兩一} 附子 _{兩一} 龍骨 _{兩二} 黃連 _{兩一} 阿膠 _{兩二} 赤石脂 _{兩三} | 白朮散 治久赤白痢不止腹中疼痛 | 欽定四庫全書 普濟方 | 丸空心米飲下 | 右研令極細用粟米飲和為丸如梧桐子大每服三 | 白礬 _{兩各二} 鉛丹 _{兩二} | 白礬丸 治赤白痢不止 | 時候以飲下三十九 | 右都細研令勻用煮棗肉和丸如黍米大每服不計 | 砒礪 _{分半} | 硃砂 _{分一} 蛤粉 _{兩半} 巴豆 _{分一} 硫黃 _{分一} 烏頭末 _{分半} 麝香 _{錢半} |
|----------------------|---|--|-----------------|---------------------|--|--|-----------------|---------------|--------|----------------------|------------------------------------|------------|----------|----------------------|------------------|--|



| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------|--------------------|----------------------------|---------------|---|----------------------------|
| 服不計時候以粥飲下二十九 | 烏賊魚骨丸 治以赤白痢日夜無數痛不可忍 | 烏賊魚骨 _{兩三} 樗根皮 _{兩三} 亂髮 _{兩三} 雀兒糞 _{兩一} 代赭 _{兩二} | 龍骨 _{兩二} 白石脂 _{兩二} | 右搗羅為末醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下二十九 | 代赭丸 治以赤白痢日夜無數腹痛不可忍 | 代赭 _{兩一} 黃蘗 _{兩一} 黃耆 _{兩一} 龍骨 _{兩一} 赤石脂 _{兩一} 艾灰 | 欽定四庫全書 普濟方 | 狗頭骨灰 _{兩一} | 右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子每服不計時候以粥飲下二十九 | 木香散 治以赤白痢臍腹疔痛 | 木香 _{分三} 附子 _{半一兩} 黃連 _{兩一} 當歸 _{兩一} 吳茱萸 _{兩半} 厚朴 | 右搗篩為散每服三錢以水一盞煎至五分去滓不計時候稍熱服 |
|--------------|---------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------|--------------------|----------------------------|---------------|---|----------------------------|



| |
|---|
| 附子散 治久赤白痢腹痛不止 附子 <small>一兩</small> 黃連 <small>一兩</small> 訶梨勒 <small>一兩</small> 乾薑 <small>一兩</small> 甘草 <small>一兩</small> 密陀僧 <small>一兩</small> |
| 右搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下三四錢 |
| 厚朴散 治久赤白痢腹內冷痛白多赤少宜服 厚朴 <small>一兩</small> 木香 <small>三分</small> 黃連 <small>一兩</small> 吳茱萸 <small>半兩</small> 乾薑 <small>半兩</small> 當歸 <small>三分</small> |
| 右搗羅為散每服不計時候以粥飲調下二錢 |
| 神効硃砂丸 治久赤白痢不瘥日夜度數無恒 硃砂 定粉 粉霜 巴豆 各 <small>一分</small> |
| 欽定四庫全書 普濟方 |
| 右藥同研如麪用水浸蒸餅和丸如菉豆大空心以冷水調二宜湯下二丸 |
| 抵黃丸 治久患赤白痢 硫黃 <small>半兩</small> 蜜陀僧 <small>一分</small> 白礬灰 <small>半兩</small> 寒水石 <small>二兩</small> |
| 右都研為末以麪糊和丸如菉豆大每服以冷水下五丸 |
| 黃連龍骨丸 治久赤白痢不瘥羸困 黃連 <small>三分</small> 龍骨 <small>三分</small> 白礬 <small>一分</small> 胡粉 <small>三分</small> |



| |
|-----------------------------|
| 右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下二十九 |
| 樗樹皮散 治久赤白痢不止 |
| 樗樹皮 兩一分 甘草 一分 川椒 五十粒 |
| 右以水一盞浸一宿煎去滓中盞內七分食前宜溫服 |
| 薑附丸 治久赤白痢不瘥 |
| 赤烏脚 兩四分 附子 兩一分 乾薑 一分 |
| 欽定四庫全書 普濟方 |
| 右搗羅為末用醋煮麪糊和丸如菉豆大每服以粥飲送下十五丸 |
| 紫筍茶散 治久赤白痢不差 |
| 紫筍茶 兩一分 蠟月狗頭骨 兩一分 |
| 右藥同細研令勻每服不計時候以粥飲調下二錢 |
| 橡實散 治久赤白痢日夜不止 |
| 橡實 兩一分 乾薑 兩一分 |
| 右搗篩羅為散每服不計時候以粥飲下二錢 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|--------|-----------|---|----------------------|----|---------------|--------------------|----------------------|----|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 乾潦丸 治一切痢以醫不瘥 | 爛丸每服五丸米飲下 | 右以黑豆半合入水同煮黑豆熟為度取黑豆同研 | 川烏頭 一枚 | 治以赤白痢及水瀉方 | 錢 | 右用鼠尾草花搗末每服不計時候以粥飲調下一 | 又方 | 欽定四庫全書 普濟方 | 如梧桐子大每服不計時候以粥飲下二十九 | 用黃蘗三兩微炙剉搗羅為末煨獨頭蒜仁熟搗丸 | 又方 | 治冷大治諸虛損勞極有所益以當自知耳 | 和不瘥更作以瘥為度不過三升椒即愈北方不但 | 一升緊拌煮作粥空腹頓服之加豉葱豉鹽任性調 | 用上等新蜀椒三升用醋經宿漬之以麪三升和椒 | 椒麪粥 治以冷痢或痢或不痢間但腰腹患苦冷 |
|--------------|-----------|----------------------|--------|-----------|---|----------------------|----|---------------|--------------------|----------------------|----|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|



| |
|---|
| 乾漆 砒霜 硃砂 <small>已上各一分</small> 麝香 <small>分半</small> 巴豆 <small>十枚</small> |
| 右都研如麪以軟飲和丸如麻子大每服不計時候以新汲水下一丸 |
| 丁香丸 治一切年久下痢立効 |
| 母丁香 <small>分三</small> 麝香 <small>分一</small> 砒霜 <small>分一</small> 巴豆 <small>分四</small> 十枚 |
| 右都研為末以粟米飯和丸如菉豆大空心以冷水下一丸忌食熱物 |
| 又方 |
| 欽定四庫全書 <small>普濟方</small> |
| 雄黃 胡粉 硝石 蜜陀僧 <small>各半兩</small> |
| 右細研如粉以軟飲和丸如梧桐子大每服食前以粥飲下十丸 |
| 治赤痢遠年不瘥 |
| 鼠尾草 秦皮 薔薇根 槲樹皮 <small>已上各一兩</small> |
| 右搗羅為散每服食前以粥飲調下二錢 |
| 黃連丸 治諸痢不瘥 |
| 黃連 <small>一兩</small> 烏梅肉 <small>半兩</small> 亂髮 <small>三兩</small> |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------|---|-----------|-----|----------------------|--|------------|------------------|--------|----------------------|--|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 粟煎散 治久痢不瘥或赤或白瘀血作片後重疼痛 | 去滓食前通口服 | 右件為粗末每服三錢水一盞棗一枚同煎至一盞 | 罌粟殼 _{二兩} 地榆 木香 陳皮 乾薑 甘草 _{各半兩} | 香粟散 治久新痢疾 | 日再服 | 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸杏仁湯下 | 蕪荑 黃連 _{炒二兩} 蚺蛇膽 _{半兩} | 欽定四庫全書 普濟方 | 蕪荑丸 治久痢不瘥有蟲兼下部脫肛 | 丸粥飲食前下 | 右以醋煮二味為膏候可丸如梧桐子大每服二十 | 糞醋 _{二升} 葶苈子 _{一升} 青州棗 _{一升} | 葶苈丸 治痢疾時久不瘥變種種痢兼脫肛 | 一兩煎令蠟化入前藥末於銅器中重湯熬令可丸即 | 丸如梧桐子大每服三十九空心米飲下 | 右搗羅為末用蜜二兩半煉熟入蠟一兩醋二合半脂 |
|-----------------------|---------|----------------------|---|-----------|-----|----------------------|--|------------|------------------|--------|----------------------|--|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|



日夜無度

嬰粟殼

十個
蜜炒

甘草

三寸手擘
破炙黃

右件為粗末每服三錢用水一盞半入粟米一撮同煎至一盞去滓空服

斷下散 治久新血痢日夜無度

乾薑

地黄

當歸

赤芍藥

川芎

嬰粟殼

黃連

槐花

右各等分為粗末每服三錢水一盞半入粟米一撮

欽定四庫全書

普濟方

同煎至一盞去滓溫服

五竒湯 治久患痢疾不問赤白並皆治之

訶子

二箇
生用

木香

一塊

肉豆蔻

二箇

甘草

一寸

草豆蔻

二枚

右五味同搗羅為細末每服二錢米飲調下不拘時候

白朮散 若其人久下痢之後卒然身體足脛面目浮

腫小便反快切其脉而虛此為脾肺虛則不能漸運

諸氣脾虛則肌肉空踈氣無所歸



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|----------|-------|-----|----------------------|-------|-----------|---------------|----------|--------------------|------------|---------------------|---|-----------|------------|---|
| 單用醋林子搗為末酒調下一錢服之甚効 | 治以痢不瘥 | 用淡菜煮食之任意 | 治丈夫以痢 | 瘥若神 | 用葎草乾蔓搗篩量多少管吹穀道中不過三四次 | 治以痢或瘡 | 用女萎切一升燒薰之 | 欽定四庫全書 普濟方 | 治療以痢脫肛不止 | 用烏梅二十個水一盞煎取六分去滓食前服 | 治下痢以不瘥腸垢已出 | 右為細末陳米飲丸每服五十九丸空心米飲下 | 乳香 <small>三錢</small> 鹿茸 <small>半兩</small> 肉豆蔻 <small>一個</small> | 香茸丸 治日以冷瀉 | 右為細末米飲調下三錢 | 橘皮 大腹皮 茯苓 生薑皮 <small>各半兩</small> 白朮 <small>一兩</small> |
|-------------------|-------|----------|-------|-----|----------------------|-------|-----------|---------------|----------|--------------------|------------|---------------------|---|-----------|------------|---|



治从患下部冷从痢腸腹下白膿

用燒磚令温取熨及坐之並瘥但取堅石燒煖用之
非別温石也一方用古磚熱燒之以物裹上坐之入
秋小腹多冷者亦用此

治患痢不問赤白膿血腹痛

用懸鉤根皮濃煮服之

治从痢

用枯蟬燒灰服之

欽定四庫全書

普濟方

治从痢勞痢

用狗頭骨燒灰用乾薑茛菪焦炒見烟麪糊為丸如
梧桐子大白飲空心下數丸極効

治水殼痢从不瘥

用厚朴三兩黃連二兩剉水三升煎取一升空心服

治从痢不瘥腹内常惡者

用薤但多煮食之

治白痢經年不愈者



| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--------|-----|--|--|--|----------|
| 右用爛煮好羊肉入鹽食之或用碎米作糝羹食之亦瘥羊肉不可大肥 | | | | 欽定四庫全書 | 普濟方 | | | | 普濟方卷二百十二 |
|------------------------------|--|--|--|--------|-----|--|--|--|----------|

