

欽定四庫全書

普濟方卷二百四十七 明 周王朱橚 撰

癩疝門

總論

夫腎主納氣人之氣海繫焉腎虛而為風寒所乘而為暑濕所襲為喜怒憂恐所傷而冰結不散又與氣搏是以羣邪聚於其中曰疝曰奔曰小腸氣曰膀胱氣皆是物也其候不特外腎小腹作痛或攻刺于腰脇或遊走

欽定四庫全書

普濟方

于背脊或冷氣搶心心下痛滿或手足厥冷自汗嘔逆痛遶臍膀或脇之左右如盃或臍之上下如臂或腹中累累如桃李或胃脘間覆大如盤有壯熱惡寒者有洒淅寒熱者有不得大小便者有裏急而下泄者自汗出者有不欲食者其於陰間則卵有大小伸縮而上下不常囊有腫脹急痛而發歇無定挾冷觸怒則塊物逼上囊根或攻腹之脇時和心平則塊物自循營系歸入囊中凡此皆謂之腎氣治法綱領風則散之寒則溫之暑



則解其熱濕則滲其水七情所發調其心氣水與氣搏
行其小便其間以主治腎氣之劑參之然總治之法大
要以流行踈利為先毋曰腎虛得病不敢踈泄蓋腎為
邪氣所干若非逐去病何由愈儻或姑息畏虛妄以剛
劑兜住使大小腑秘而不通邪氣入腹衝心危殆必矣
然腎氣發則固以腎虛得之然虛中有冷虛中有熱又
有冷熱不調尤當詳審冷者脇邊及外腎清冷小便清
而多遇寒即發是也熱者內挾暑氣或積毒或服暖藥

欽定四庫全書

普濟方

於前外腎與小腹俱熱肛門間糞後赤熱小便數澁遇
熱則甚是也冷熱不調者小便外腎乍冷乍熱大便小
便或秘或利用藥溫涼當隨証而權度之但所謂流行
踈導常常運轉於其中矣其若大小便流利之後或更
有□刺引疼或氣遊注於肌膚之間此則腎虛血虛氣
不還元當加潤養人參當歸川芎芍藥桑螵蛸葫蘆巴
輩又不可無惟是逆氣長虛中腕停酸燥悶擾甚而至
於嘔吐最為惡候何則天一生水腎實主之中筋系於



陰陰器惟藉陽明以養之今脾土不濟腎水上乘必為酸汁為必涎飲荏苒踰時遂成暴吐醫家執劑之始皆知腎經惡燥如蒼朮白朮良薑之類誠不敢用及其嘔吐大作薑朮輩用之而不顧若猶未也則吳株萸華撥剛燥等劑又加多焉雖附子亦用之而救急矣病勢至此脾土未強腎水已為之涸腎水既涸脾土又為之焦徃徃陰陽不升降榮衛不流行大小二便關隔澀閉而腎汁皆自其口出也如此者大抵不救臨病湏當識病

欽定四庫全書

普濟方

預與病家言之夫心火下降則腎水不患其不溫真陽不行則腎氣不患其不和安有所謂木強者哉惟夫嗜慾內戕腎氣虛憊故陽陰不交水火不相劑而沉寒涸冷凝滯其間脹大作疼頑痺結硬勢所必至矣執劑之法不可純用燥熱當溫利以逐其邪邪氣內消榮衛流轉蓋如寒谷逢春有不戒而速不行而至者矣外此又有一種升高墜下外腎跌傷驚起與敗血交攻亦有木強脹疼之証治法大要則同於中更為之消瘵○大



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 抵諸疝之脉脉當弦緊蓋弦者寒也緊者痛也疝有七 | 証厥疝癥疝寒疝氣疝盤疝附疝狼疝是也何以言之 | 厥疝則心痛足冷食已則吐癥疝腹中氣乍滿滿氣 | 積如臂寒疝因寒飲食卒然脇下腹中痛氣疝腹中 | 乍滿減而痛盤疝腹中痛盤疝腹中痛引臍膀附疝腹 | 痛連臍下有積聚狼疝小腹與陰相引而痛諸疝不愈 | 邪氣留滯及成積聚其脉厥而緊浮而牢皆積聚之脉 | 也但牢強急者生虛弱急者不可治 | <small>儒門事親書云寒疝名水疝律科王</small> | 欽定四庫全書 | <small>普濟方</small> | 敏之病寒疝臍下結聚如黃芩每發遶腰間痛急不能 | 忍戴人先以舟車及猪腎散下四五行覺藥繞病三五 | 次而下其瀉皆水也猪腎散下四五行覺藥繞病三五 | 萬幸萬全但下後忌飲冷水及寒物宜食乾物以寒疝 | 本是水故也即日病減八分食進一倍又數日又服舟 | 丸百餘粒通經散四五錢服之利下俟三四日又服舟 | 車丸七十八粒猪腰散三錢乃行步如常矣又一僧疝 | 病發作冷氣上實齒下貫腎緊若繩挽兩單時腫時冷 | 戴人稱兩手脉細而弱斷之日秋脉也此因金氣在上 | 下伐肝木水畏金木伸故病如是肝氣壅薄而能下榮 | 放罌丸故其寒實非寒木受金制停之胃土胃為陽明 | 故上實齒病非齒之病肝木者心火之母也母既不伸 | 子亦屈伏故下冷而水化乘經曰木鬱則達之土鬱則 | 泄之令涌四次果覺氣和罌丸痒而暖戴人曰氣已入 | 罌中矣以茴香木茂之藥劑以服首尾一月而愈澹療 | 方云治疝氣發作痛不可忍真科五苓散一貼連根葱 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|



白一寸燈心七莖煎湯吞下青鹽木香丸五十粒即效
又法青木香丸二百粒斑貓七枚去頭翅為粗末用瓦
銚於文武火上同炒令木香微香却以磁碟蓋藥銚放
冷處少時去斑貓取木香丸二服空心茴香酒吞下累
試之有
驗也

論云厥陰脉滑則病狐疝少陰脉滑則病肺風疝太

陰脉滑則病脾風疝陽明脉滑則病心風疝也太

陽脉滑則病腎風疝少陽脉滑則病肝風疝靈樞

經云心脉微滑為心疝引臍少腹鳴肝脉滑甚為

癰疝○夫滑脉關已上見者為大熱蓋陽與陽併

欽定四庫全書

普濟方

也故大熱脉滑尺脉見為大寒生癰疝滑脉者命

門胞絡之名也為丙丁熱火併于下蓋丙丁不勝

壬癸從寒水之化也故生癰疝寸口脉弦而緊弦

即衛氣不行衛氣不行即惡寒緊則不欲飲食弦

緊相搏即為寒跗陽脉浮而遲即為寒疝凡瘦人

繞臍痛必為風冷穀氣不行而反下之其氣必衝

心不則否○夫陰癰屬肝係宗筋胃陽明養之世多

不識謂之外腎非特名義差錯亦使內臟不分其可不



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 氣也足太陽膀胱之脉逆上遞手太陽小腸之脉下行 | 累乖此九夏之氣也寒在外熱在內則卵縮此三冬之 | 厥喘瘖其傳為索罽其傳為癩疝夫熱在外寒在內則 | 熱囊垂縮陰陽別証云三陽為病發寒為癰腫不為癩 | 其如卵脹有作熱生膿為癰潰爛者比比有之 | 前陰分大寒大 | 及天色變動逼上囊根腫急作痛過於寒疝得暖則下 | 之有睡卧營系延入脇下者有墜入囊中者或遇疲勞 | 癩病名義不分有如此者凡癩唯腸癩無問貴賤多有 | 因此病以癩病為疝氣不審之甚婦人陰門挺出亦稱 | 易愈又寒疝下注入于癩中名為狐疝亦屬癩病世人 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 便如此者乃宿疾也卵脹腸癩皆難治氣癩水癩治之 | 小上下無常者名曰卵脹亦屬不內外因有小兒生來 | 所病者勞役無節及跨馬坐車致卵核腫脹或偏有大 | 因病者以坐冷濕濕氣下襲致陰腫脹名曰水癩屬外 | 怒兼并隨臟氣下墜陰癩腫脹急痛名曰氣癩屬內所 | 癩中上下無定謂之腸癩不內外因病者以蓄憂思恐 | 如腸癩則因房室過度元臟虛冷腸邊營系不收墜入 | 辨古方四証但曰腸癩氣癩水癩卵脹殊不別其所因 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|



至足厥陰肝之脉不得伸其任脉並厥陰之脉逆則如
巨川之水治陽氣下墜是風寒濕熱下出囊中至兩澤
腫大謂之曰大甚則為癰足厥陰肝之經與太陽膀胱
寒水之脉同至前陰之來傷寒家說足厥陰肝經為痛
滿囊縮急下之宜大承氣湯以瀉大熱靈樞經曰足厥
陰肝經縮脉中以為寒則筋攣卵縮為大寒前說囊為
大熱此說囊縮寒此說囊縮垂下引癰疝脚氣大寒
風濕盛下垂為寒與上二說不同以平康不病人論之
夏暑大熱囊卵累垂冬天大寒急縮上次與三說又大
不同何也是相乖邪不相乖邪荅曰傷寒家囊卵縮大
熱在內宜承氣湯急下之與筋經說囊卵縮大寒在外
亦是在內與傷同故再引平康之人以証之也冬天陽
氣在內陰氣在外人亦應之故寒在外則皮急而囊氣縮
夏月陰氣在內陽氣在外人亦應之故熱在內則皮暖
皮暖則垂囊此癰疝之相也三說
文殊皆亦理也用藥詳而審之

欽定四庫全書

普濟方

諸疝

附論

疝病有七厥逆心痛足寒飲食則吐者名厥疝腹中氣
滿心下盡痛氣積如臂者名堅疝寒飲則脇下腹盡痛
者名寒疝腹中乍滿乍寒而痛者名氣疝腹中痛在臍
膀者名盤疝腹中乍痛在臍下有積聚者名附疝小腹與
陰相引而痛大便難者名狐疝凡此七疝皆寒由血氣
凝澁不得通利冷劇則痛故皆謂之疝難經曰任之為
病其內若結男子為七疝女為瘦聚蓋明此也



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------------------|---------------------------|--|---|---|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|--|-----------|--|
| <p>方</p> | <p>敵金散 <small>指出直</small> 治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出黃水其</p> | <p>痛遶腸寒熱往來</p> | <p>荆三棱 蓬莪茂 木猪苓 白附子 蘿蔔子</p> | <p>赤芍藥 黑牽牛 川棟肉 山茵陳 青木</p> | <p>香 陳橘皮 五靈芝 姜黃 茴香 <small>各一兩</small> 南木</p> | <p>香 <small>半兩</small> 丁香 <small>一分</small> 澤瀉 <small>一兩半已</small> 海藻 <small>酒浸一宿焙乾</small> 海浮石</p> | <p><small>米醋浸火煨紅淬醋又</small> 川山甲 <small>熟火煨</small> 青皮 <small>去白</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p><small>二兩生用一兩截碎以班貓五十箇</small> 香附 <small>杵淨三兩</small></p> | <p><small>頭翅去足同炒黃色去班貓不用</small></p> | <p><small>生用一兩以巴豆五十粒去</small></p> | <p><small>壳同炒色焦去巴豆不用</small></p> | <p>右截碎夾和微炒並為末酒麵稀糊為丸如梧桐子</p> | <p>大每服三十丸溫酒送下此藥泄斟酌用之</p> | <p>又方</p> | <p>川棟散 <small>指出直</small> 治外腎脹大麻木痛硬及奔豚疝氣偏墜</p> | <p>諸証</p> | <p>川棟子 <small>不蛀者四十九箇先切七箇取肉以茴香</small></p> |
|----------|--|----------------|----------------------------|---------------------------|--|---|---|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|--|-----------|--|



| | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| <p>故紙二錢半同炒併留故紙又切七箇以黑牽牛 二錢半同炒併留牽牛又切七箇以鹽一錢同炒 併留鹽又切七箇以班貓十四箇去翅同炒去班 貓不用又切七箇以巴豆肉十四箇作兩斷同炒 去巴豆不用又切七箇蘿蔔子一錢 半同炒去蘿蔔子不用外更別分入 香 各半 桂心 南木香 各二錢 半夾和</p> | <p>右為末酒調麵糊丸如梧桐子大每服三十九丸食前 鹽酒下積日計功打墜瘀血一方加延胡斑牛半兩 畧炒入藥研末調酒下</p> | <p>療疝氣核腫疼 <small>方見本門諸癰類黃著丸</small> 欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>消疝丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治寒在下焦臍腹牽痛膀胱重墜以而 不愈漸至腫大甚者生瘡時有濃汁焮硬赤痛不忍 者</p> | <p>金鈴子 <small>去核炒黃</small> 赤撲兒 <small>焙</small> 茴香 <small>炒稱三味</small> 肉桂 <small>去皮半兩</small> 甜瓜子 <small>微炒一兩</small></p> | <p>右件為細末酒煮麵糊為丸如桐子大每服五十九 至一百丸空心溫酒或鹽湯下忌熱麵生葱大酢粘 食等物</p> |
|--|---|--|---|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|----------------------|--|---|---|-------------------|---|--|----------------------------|----------|--------------------------------------|--|---|--|
| <p>川椒散 <small>出直指方</small> 治疝氣外腎腫痛</p> | <p>川椒 <small>去目并合口者微炒出汗</small> 官桂 <small>各半</small> 白荳仁 甘草 <small>各一兩</small></p> | <p>川芎 當歸 青皮 陳皮 <small>製</small> 枳壳 枳榔 赤</p> | <p>茯苓 青木香 南木香 華澄茄</p> | <p>右為麤散每三錢薑棗煎食前服</p> | <p>蒺藜丸 <small>出三方</small> 治囊核堅大行動難發作牽連偏墜疼痛</p> | <p>白蒺藜 <small>微炒去刺</small> 海藻 <small>浸洗去鹹</small> 澤瀉 <small>各一兩</small> 茴香 <small>炒一兩半</small> 桂心</p> | <p>牛膝 <small>剉酒浸</small> 五味子 木香 <small>煨</small> 枳榔 <small>各二兩</small> 茯神</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>人參 遠志 <small>水浸去心姜汁炒各三兩</small> 川練 <small>去皮核</small> 桃仁 <small>去皮尖炒</small></p> | <p><small>研別</small> 赤芍藥 續斷 山茱萸 菴蓉 <small>酒浸</small> 青皮 <small>各四兩</small></p> | <p>右為末蜜丸梧子大空心食前温酒鹽湯下三五</p> | <p>丸</p> | <p>海蛤丸 <small>出濟生拔萃方</small> 治癩疝</p> | <p>地膽 <small>二十一箇去頭足翅</small> 海蛤 <small>醋淬三遍</small> 當歸 海金沙 膩粉</p> | <p>礪砂 <small>各一錢</small> 海藻 粉霜 <small>各半兩</small> 水蛭 <small>二十箇炒</small> 青黛</p> | <p>滑石 乳香 <small>各一錢</small> 朱砂 <small>二錢為末</small></p> |
|--|--|---|-----------------------|----------------------|--|---|---|-------------------|---|--|----------------------------|----------|--------------------------------------|--|---|--|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------------|----|---|-------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| 右為末鹽湯麵糊為丸如小荳大朱砂為衣每服十丸煎燈草湯空心服之小便下冷濃惡物乃效却以黃連紫河車板藍根各三錢煎湯嗽口以手刷齒一方去板藍根加管仲 | 椒薑丸 治七疝諸寒在臍傍痛上义曾中滿少氣 | 蜀椒 去目及閉口炒 出汗一兩一分 | 乾薑 炮 厚朴 去粗皮塗 生薑汁炙 | 黃芩 | 去黑 心 細辛 去苗 果 芍藥 桂 去皮各 一兩 桔梗 炒半 兩 烏啄 | 炮裂去皮 臍一分 | 柴胡 去 苗 白茯苓 去黑 皮 牡丹皮 各一 分 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為末煉蜜和丸梧桐子大每服二十九丸温酒或米湯飲下日三服 | 聚香飲子 出危 氏方 治七情所傷遂成七疝心腹脹痛腰脇連背不可俛仰 | 檀香 木香 乳香 沉香 合香 各一 兩 玄胡索 | 炒去 皮 片子姜黃 川烏 炮去 皮尖 桔梗 去蘆 剉炒 桂心 不見 火 | 甘草 炙各 半兩 丁香 亦不 見一兩 | 右咬咀每服四錢水一盞半生姜七片棗一枚煎七 |
|--|----------------------|---------------------|-------------------------|----|---|-------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|----------------------|



分去滓溫服不拘時

厚朴丸 治七疝肢體寒臍腹堅痛滿痛

厚朴 去皮生 附子 炮製去 藿香子 炒 白朮 剉炒 桂皮 去

乾姜 炮 枳壳 去瓢 青橘皮 湯浸去 芎藭 炮製去 烏

頭 炮 木香 當歸 切焙各

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下生姜

湯亦得不拘時

海藻丸 治奔豚疝氣膀胱小腸氣頑卵木腎及小兒

欽定四庫全書

普濟方

偏墜一切腎氣等症

海藻 半兩洗 木香 栝榔 川椒 去目 甘遂 各半

川烏 半兩炒小兒去 白牽牛 二兩取 黑牽牛 二兩取末

兩 半 茴香 炒微 猪苓 去 澤瀉 各三 吳茱萸 四錢

右為末滴水丸如梧桐子大每服五十九丸至百丸空

心鹽湯酒任意下黃涎下者驗十五歲以下小兒二

十五至五十九丸此藥不特利大便大能利小便後復

忌甘草相反



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------|---|-------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| <p>烏頭丸 <small>出聖方</small> 治七疝氣臍腹堅痛</p> | <p>川烏頭 <small>炮製去皮臍</small> 蓬莪茂 木香 川大黃 <small>劉碎微炒當</small></p> | <p>歸 芎藭 荆三棱 <small>炮劉</small> 川椒 <small>去目及閉口者炒出汗</small> 桂心</p> | <p>桃仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 乾漆 <small>搗碎炒令烟</small> 肉苳蔻 <small>兩半</small></p> | <p><small>去壳</small></p> | <p>右為末先以醎醋一升入藥末四兩熬令減半又漸入醋一升熬成膏次入餘藥末和搗三百杵丸梧桐子大每服食前生姜湯或煖酒下二十九</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>草苳蔻丸 <small>出聖方</small> 治七疝四肢寒冷臍下妨痛不欲飲食</p> | <p>草苳蔻 <small>去皮</small> 厚朴 <small>去粗皮生薑汁炙令香</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 藿香子</p> | <p><small>微炒</small> 白朮 桂心 乾姜 <small>炮各一兩</small> 青橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 芎藭</p> | <p>川烏頭 <small>炮製去皮臍</small> 木香 吳茱萸 <small>湯浸七遍焙乾微炒各一兩</small></p> | <p>右為末煉蜜為丸和搗三二百杵丸如梧桐子大每服於食前熱酒下二十九</p> | <p>白朮妙功丸 <small>出御藥方</small> 治腎氣以虛上攻下注臍腹以冷腰</p> | <p>背痲痛及膀胱疝氣玄癖氣悶小腸作聲時時下墜</p> |
|--|---|--|---|--------------------------|---|-------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|



| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|---|--|
| <p>白朮 莪朮 澤瀉 當歸<small>去蘆頭</small> 厚朴<small>去皮生薑汁炒</small> 破 故紙<small>炒各半兩</small> 延胡索 木香<small>錢共二</small> 川苦楝 檳榔<small>各三</small></p> | <p>宣胞丸 治膀胱疝氣及豚木腎其大如斗 猪胞 黑牽牛<small>四兩入胞內好醋一升煮至盡焙乾</small> 木香 木猪苓</p> | <p>皮<small>去</small>續隨子 淡豆豉 三棱<small>煨</small> 川棟肉 馬蘭花</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>茴香<small>炒各等分</small> 右為末糊丸如梧桐子大每服五十九丸鹽湯第二服 車前子湯下小便實閉不通加土狗十箇海金沙一兩</p> | <p>蓬莪茂丸 治七疝臍腹堅痛 蓬莪朮<small>剉炮</small> 木香 大黃<small>剉炒</small> 當歸<small>切炒</small> 芎藭 荆三稜</p> | <p>剉<small>炮</small>草薹薹<small>皮去</small> 桂<small>皮去</small> 桃仁<small>炒去皮尖仁</small> 肉薹薹<small>兩炮半</small> 乾 漆<small>炒令烟出一兩</small></p> |
|--|--|--|-------------------|--|---|--|



右為末醋麵糊為丸梧桐子大每服二十九溫酒或
生薑湯不拘時

茴香棟子丸 治諸疝症

川棟子 一兩 小茴香 一兩 吳茱萸 二兩 海藻 一兩 木香

半兩 澤瀉 半兩 青鹽 三錢 蓬朮 七錢半 三楞 七錢 青皮 一兩

黑牽牛 七錢 用一半炒用

右為細末醋糊丸梧桐子大每服五十九空心酒下

前川棟茴香茱萸用酒煎童子小便各浸半兩又用

欽定四庫全書

普濟方

巴豆去皮斑貓去翅足各三五箇以川練茴香青皮

共炒色變去班巴二藥

烏啄丸 治疝諸寒臍膀痛上攻胃中滿悶少氣

烏啄 炮製去皮臍 厚朴 姜製 赤茯苓 栝榔 各半 乾姜 炮

木香 細辛 芍藥 桂心 川椒 去目及閉口者微炒出汗

柴胡 去苗共 一兩

右為末煉蜜和搗三百下丸梧桐子大每服食前溫

酒下十五丸



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|--|--|
| <p>吳茱萸丸 治七疝氣心腹結聚疼痛</p> | <p>吳茱萸 <small>湯浸七次</small> 木香 <small>焙乾微炒</small> 檳榔 訶黎勒 <small>煨用皮</small> 川</p> | <p>大黃 赤茯苓 烏啄 <small>炮去皮臍</small> 當歸 赤芍藥 枳</p> | <p>壳 <small>黃 麸炒</small> 桂心 <small>兩 各一</small></p> | <p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服食前熱酒下二</p> | <p>十九</p> | <p>狼毒丸 治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬疼痛</p> | <p>不已</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>狼毒 <small>炒</small> 芫花 <small>炒</small> 川烏 <small>各一兩</small> 椒紅 <small>炒</small> 乾姜 <small>炮</small> 乾漆 <small>炒烟</small></p> | <p><small>盡</small> 三稜 鱉甲 <small>醋炙</small> 沒藥 <small>各半兩</small> 全蝎 <small>去毒九箇</small></p> | <p>右為末醋糊丸如梧桐子太每服四十九空心酒下</p> | <p>或姜湯甚者炒鹽半斤令熱以故帛包熨痛處</p> | <p>十補丸 治大小腸寒疝膀胱伏梁奔豚瘕氣等疾亦</p> | <p>治婦人育腸氣</p> | <p>附子 <small>一兩用防風一兩剉如黑豆大鹽四兩黑豆一合炒附子製去諸藥只用附子去臍皮</small></p> | <p>葫蘆巴 木香 巴戟 <small>去心</small> 川棟子 <small>炮去肉</small> 官桂 延</p> |
|------------------------|---|---|---|-----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|--|---------------|--|------|----------------------|--------------|--|---------|--|--|
| 胡索 華澄茄 舶上茴香 <small>炒</small> 破故紙 <small>炒已上九味共一兩</small> | 右為末糯米粉酒打糊丸梧桐子大辰砂為衣每服 | 三五十九丸空心酒下婦人醋湯下若入益智子亦得 | 杜夷之苦此歲久醫三年百藥不效後用此數服去 | 根却以獻繼先亦有此疾服之亦安葛司理尊人倅 | 金州以授同官蘇主管亦用此方屢效 | 蠲痛丸 治小腸膀胱氣痛 | 延胡索 <small>煨炒</small> 一兩 川練皮 <small>蒸去核</small> 舶上茴香 <small>炒各半兩</small> 牽牛 <small>炒取末</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 當歸 青皮 <small>去白</small> 木香 <small>各一分</small> 全蝎 <small>七箇焙</small> 天台烏藥 <small>用一</small> | 分 良姜 | 右為末生姜自然汁浸糕為糊丸梧桐子大每服三 | 十九丸燒綿灰存性調酒送下 | 狐陰丸 <small>方見本門陰癩類</small> 療腎虛疝氣腰膝冷疼陰囊腫癢 | 神效丸 治疝氣 | 芫花 <small>醋浸炒</small> 木香 枳榔 三稜 <small>各半兩炒</small> 茯苓 青皮 | 全蝎 附子 <small>炮</small> 礞砂 官桂 <small>各二錢半</small> |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|--|---------------|--|------|----------------------|--------------|--|---------|--|--|



| | |
|--|--|
| 右將礪砂用水浸磁盞內沉去泥土留湯瓶頭頓成 膏子糠醋打糊為丸如菘豆大每服三十九丸空心温 酒下 | |
| 當歸四逆湯 治男子婦人疝氣臍腹冷痛相引腰膝 而疼 | |
| 當歸 <small>七分</small> 附子 <small>炒</small> 官桂 茴香 <small>炒</small> 柴胡 <small>各五分</small> 芍藥 | |
| 玄胡 川楝子 茯苓 <small>各三分</small> 澤瀉 <small>二分</small> | |
| 右為麤末都作一服水煎空心服 | |
| 欽定四庫全書 普濟方 | |
| 桂姜湯 <small>出直指方</small> 治無陽臍冷疝氣兼治濕症 | |
| 吳茱萸 <small>酒醋浸一宿焙乾</small> 川白生姜 辣桂 <small>各半兩</small> 良姜 | |
| 華澄茄 茴香 <small>炒</small> 縮砂仁 益智仁 木香 茯苓 | |
| 苓 甘草 <small>炙各三錢</small> | |
| 右剉每服三錢水煎調蘇合香丸食前服 | |
| 茴香棟實丸 <small>出衛生寶鑑</small> | |
| 川楝子 <small>炒</small> 茴香 <small>炒</small> 山茱萸 食茱萸 吳茱萸 | |
| 青皮 陳皮 芫花 <small>醋炒</small> 馬蘭花 <small>醋炒共一兩</small> | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------------|----------------------------------|--|---|--------------------|--|---------------|----------|----------------------|---|--|-----------------|-------------|-----------------------|
| 治疝氣 | 十九 | 右為煉蜜和丸梧桐子大每食前生姜橘皮湯下二 | 臍 川烏頭 <small>去皮臍炮製各半兩</small> | 桔梗 <small>去蘆頭</small> 細辛 赤芍藥 乾姜 <small>炮製</small> 附子 <small>炮製去皮</small> | 川椒 <small>去目及閉口者</small> 厚朴 <small>去粗皮塗生姜炙令香熟</small> 檳榔 <small>各一兩</small> | 臍下堅痛遇冷即極若小腹虛滿引膀胱裏急 | 川椒丸 <small>出聖惠方</small> 治七疝忽心腹氣逆不得息痛引背脊或 | 欽定四庫全書 普濟方 | 溫酒任下以服除根 | 右為末酒糊為丸如梧桐子大每服四五十丸鹽湯 | 分 末 地龍 <small>去土</small> 牡丹皮 <small>各半兩</small> 沉香 華澄茄 末香 <small>各二</small> | 沙苑蒺藜 <small>酒炒</small> 防風 <small>各一兩</small> 葫蘆巴 <small>酒炒</small> 茴香 <small>炒</small> 金鈴子 | 沉香蒺藜丸 治小腸癰疝偏墜等疾 | 食前量虛實加減以利為度 | 右為末醋糊為丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下 |
|-----|----|----------------------|----------------------------------|--|---|--------------------|--|---------------|----------|----------------------|---|--|-----------------|-------------|-----------------------|



| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|--|---------------|----|--|-------------------------------|--|---|
| 川棟子 <small>二十一箇內七箇用海金沙二錢炒去沙 七箇用班猫虫二錢炒去七箇巴豆二錢</small> | 豆 <small>炒去</small> 舶上茴香 <small>炒</small> 木香 黑牽牛 <small>頭末</small> 破故紙 <small>炒</small> 葫 | 蘆巴 <small>炒</small> 烏藥 <small>去心</small> 玄胡索 <small>各半兩</small> | 右為末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九丸空心鹽湯下 | 丁香練實丸 <small>出醫方大成</small> 治男子七疝痛不可忍婦人瘦聚帶下皆任脉所主陰經也乃腎肝受病故治法同歸于一錦文大黃一兩為細末用醱醋好者半升同煎 | 欽定四庫全書 普濟方 | 成膏 | 當歸 <small>去蘆皮</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 茴香 川棟子 <small>各一兩</small> | 右剉細用好酒三升同煮酒盡為度焙乾作細末每稱藥末一兩入下項藥 | 丁香 木香 玄胡索 <small>五錢</small> 全蝎 <small>十二箇</small> | 右為末入在前項藥內拌勻酒糊為丸梧桐子大每服三十九丸加一百丸空心溫酒送下凡疝腎氣帶下皆由於風全蝎治風之聖藥茴香川棟子皆入小腸 |
|---|--|---|-------------------------|--|---------------|----|--|-------------------------------|--|---|



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------|-------------------|--|--|--|--|----------|--|
| 經當歸玄胡索和血止痛疝氣帶下皆積陰邪入小腸之間故以附子佐之丁香木香引道也 <small>韓提控疝病每發痛</small> | 腎不可忍則于兩末各直其枕往來服之以受如是者三年不已服此藥三劑良愈 | 透經散 <small>出百選</small> 治下部諸疾 | 川棟子 <small>一兩剉炒入巴豆二十粒吳茱萸一兩同炒焦赤色去豆茱萸</small> 茴香 <small>炒</small> 沉 | 香胡椒 全蝎 <small>炒各半兩</small> 縮砂 <small>二兩連皮炒</small> 木香 <small>一兩</small> | <small>不見火</small> 玄胡索 <small>二兩新瓦上炒</small> | 右為末每服二錢食前酒調下 | 欽定四庫全書 普濟方 | 天台烏藥散 <small>出衛生寶鑑</small> 治小腸疝牽引臍腹疼痛 | 烏藥 木香 茴香 <small>炒</small> 良姜 <small>炒共五錢</small> 檳榔 <small>二個</small> 川棟子 | <small>十筒</small> 巴豆 <small>十七筒</small> 青皮 <small>兩半</small> | 右先以巴豆打破同棟子用麸炒俟黑色去巴豆麸不用外為細末每服一錢溫酒調下痛甚炒生姜熱酒下亦得 | 桃仁湯 治療疝氣 | 桃仁 <small>去皮尖及雙仁</small> 吳茱萸 橘皮 海藻 生姜 茯 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------|-------------------|--|--|--|--|----------|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------------------|
| 右為細末每服三錢熱酒調空心服 | 八角茴香 <small>炒共一錢</small> 小茴香 川棟子肉 <small>各二錢</small> | 荔枝核 <small>十四箇新者</small> 沉香 木香 青鹽 食鹽 | 荔枝核 <small>出德生堂</small> 治疝氣陰核腫大痛不可忍 | 冷水生菜方用溫酒送下 | 右為蜜丸如豆大三丸加至七八九日三服忌猪肉 | 子 <small>炮各二分</small> 烏頭 <small>一分</small> | 椒 <small>四兩</small> 桔梗 芍藥 乾姜 厚朴 <small>炙</small> 細辛 附 | 欽定四庫全書 普濟方 | 疝小腹脹滿引膀胱急痛名曰脉疝悉主之 | 時不見名曰盤疝臍下結痛女人月事不時名曰血 | 食輒劇名曰寒疝脇下堅痛大如手痛時見若不痛 | 疝下心堅痛不可手迫名曰石疝臍下堅痛得寒冷 | 七疝丸 主暴心腹厥逆不得氣息痛連背脊名曰尸 | 物 | 右切以水三大升煮取九合分為三服空心服忌酢 | 苓 羌活 蒺藜子 <small>去角各三兩</small> |
|----------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-------------------------------|



| | |
|--|--|
| 益智仁湯 治疝氣痛連小腹攣搐叫呼不已診其脉 沉緊是腎經有積冷所致 | 益智仁 乾姜 甘草 茴香 烏頭皮 <small>各半 兩 各半 炙 炒各二錢 炮去</small> |
| 右呶咀每服四錢水二盞入鹽少許煎七分去滓空 心食前溫服 | 生薑 青皮 <small>各半 兩 去白二錢</small> |
| 立效散 治疝氣 | 川芎 川棟子 青皮 茴香 黑牽牛 桃 <small>去白 者 舶上 炒</small> |
| 仁 各一兩 | 欽定四庫全書 普濟方 |
| 右為末每服二錢無灰酒一盞煎八分溫服 | |
| 葫蘆巴丸 治大人小兒小腸氣蟠腸氣奔豚疝氣 偏墜陰腫小腸如卵上走痛不可忍或後結遶臍故 刺嘔惡悶亂並治之 | |
| 葫蘆巴 吳茱萸 大巴戟 川烏 <small>斤 炒一 湯洗七次 炒十兩 去心 炒</small> | |
| 炮去皮臍 茴香 川棟子 <small>共六兩 洗去土炒 一十二兩 炒一斤</small> | |
| 右為末酒煮麵糊為丸梧桐子大每服十五丸空心 | |



溫酒吞下小兒五丸茴香湯下一方加牽牛

川棟散 治膀胱小腸臍下撮痛上衝心腹下引足膝

夜多旋溺外腎騷癢面色痿黃脚下癢痛四肢倦怠

不思飲食

破故紙

炒

川東子

蒸去皮核

茴香

炒各四兩

葫蘆巴

酒浸炒三兩

乾姜

炮一兩

附子

炮去臍一兩半

右為末每服二錢空心熱酒調下食前

礪砂丸 治諸疝作痛

欽定四庫全書

普濟方

木香 沉香

巴豆肉

全者各一兩

青皮木

去皮二兩

銅青

半兩礪砂二錢半製如前研

右以二香青皮三味細剉同巴豆慢火炒令紫色為

度去巴豆為末入皮砂二味研勻蒸餅和丸梧桐子

大每服七丸至十丸鹽湯吞下空心日進二三服

神聖代針散 治一切厥心痛小腸疝氣痛不可忍及

心驚欲死及小腸氣搐得如弓角膀胱腫硬一切氣

刺虛痛婦人血刺衝心阻一切痛楚服之大有神效



孕婦勿服

蛭蜻 一兩即班貓虫用糯米一兩水洗淨即取出
俟乾用蜻一處微火炒米黃色 蛭蜻將糯米

製去屑 乳香 別研 沒藥 別研 當歸 白芷 川芎 各半

右為極細末和勻每服一字甚者二字藥如小錢一

字上多先點好茶一盞次糝藥末在茶上不得吹攪

立地細細呷之又治胎衣不下難產

消疝丸 治下部

蒼朮 二兩 茴香 鹽炒 玄胡 各一兩 牽牛 半兩 木香 一錢 川東

欽定四庫全書

普濟方

半兩用巴豆二箇不
要碎炒黑不用豆

右為末酒糊為丸一半用酒送下一半病發時酒調

送下丸子

芫花丸 治七疝臍腹堅硬時有疼痛

芫花 醋拌炒 乾姜 炮製剉 川烏頭 炮製去 青橘皮

湯浸去 附子 炮製去皮 巴豆 三七枚去皮心研
如膏紙裏壓去油

右為末入巴豆膏都研令勻醋煮麵糊為丸如菉豆

大每服食前酒下三丸



| | |
|---|---|
| 治疝氣 | 官桂 <small>半兩去粗皮</small> 蛇床子 <small>一兩半</small> 柴胡 細辛 白芷 <small>各二</small> |
| 右咬咀每服五錢大水二升葱白和鬚二莖椒五十 | 粒同煎七分於瓶口上熏令微汗出再暖通手洗婦 |
| 人帶下赤白熏之亦效婦人用可加紫蘓一握 | 又方 |
| 大蒜 <small>二箇</small> 韭菜 <small>一握</small> 薺菜 <small>一握</small> | 欽定四庫全書 |
| 右用大沙瓶內口煎令百沸乘熱熏之俟入得手則 | 普濟方 |
| 洗之如冷則再暖二次立效 | 茴香散 治寒濕氣入小腸疼痛或外腎腫痛 |
| 茴香 <small>一兩</small> 川棟子肉 <small>炒</small> 破故紙 <small>炒</small> 香附子 猴查子 | <small>各半兩</small> 去核 |
| 右為末每服二錢空心溫酒鹽湯任意調下日三服 | 初生小兒皆可服如藥冷將盞盛藥於熱湯內坐熱 |
| 塗母乳與喫男子是小腸氣女兒是盤腸氣 | |



木香棟子散

出瑞竹堂方

治小腸疝氣膀胱偏墜久患藥不

效服此

川棟子

三十箇為末末研前先用綫子炒黃赤色去巴豆不用草薺

半兩石菖蒲

炒一兩

青木香

炒一兩

荔枝核

二十箇炒

右為末每服二錢重入麝香少許空心炒茴香鹽酒

調下神效

安息香丸

一名煉陰丸

治陰氣下墜腫脹卵核偏大堅硬如

石痛不能忍

欽定四庫全書

普濟方

玄胡索

微炒去壳

海藻

洗

昆布

洗

青皮

去皮

茴香

炒

川棟

子

去核

馬蘭花

已上一兩炒

青木香

半兩不見火

大戟

酒浸三宿切片

焙乾共二錢半

右為細末另將礪砂真阿魏安息香三味各二錢半

用酒一盞醋一盞將礪砂阿魏安息淘去砂石用醋

酒各一盞熬成膏子再入麝香一錢沒藥二錢半俱

各別研細入前藥一同和丸如菴豆大每服十九至

十五丸空心用綿子灰調酒送下



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|---|---|---------------|---------------|--|--|--|----------------------|-----------------|---|--|----------------------|
| 牡丹丸 <small>出存 仁方</small> 治風寒疝痛及諸血滯作痛 | 牡丹皮 <small>四兩</small> 桃仁 <small>浸去皮 尖別研</small> 官桂 <small>各五兩</small> 川烏頭 <small>一隻炮 熟去皮</small> | 右為末煉蜜丸梧桐子大每服五十九丸溫酒下血痛 | 醋湯下一方酒糊丸一名消堅丸 | 四聖散 <small>出瑞竹 堂方</small> 治小腸膀胱疝氣痛不可忍者 | 川棟子 <small>炒 黃</small> 胡椒 茴香 <small>炒</small> 全蝎 <small>炒各 半兩</small> | 右為末每服二錢空心熱酒調下 | 欽定四庫全書 普濟方 | 四神丸 <small>出直 指</small> 治腎冷疝氣脹痛不已 | 吳茱萸 <small>揀淨一兩一半用老酒浸一 宿</small> 大香附子 <small>杵 淨</small> | 一兩 華澄茄 青木香 <small>各半兩</small> | 右為末米糊丸梧桐子大每服七十丸空心鹽湯吞 | 下或乳香葱白煎湯下亦可鹽酒尤妙 | 香牛散 <small>一名香壳 散出仁存</small> 治外腎腫痛小腹疝氣 | 茴香 <small>炒一兩</small> 黑牽牛 <small>兩半</small> 玄胡索 枳殼 <small>並炒共 半兩</small> | 右為末酒調二錢空心下一方加吳茱萸葫蘆巴各 |
|---|--|-----------------------|---------------|---|---|---------------|---------------|--|--|--|----------------------|-----------------|---|--|----------------------|



半兩效

四聖散 出仁存方 治小腹疝氣引外腎痛腫

茴香 炒 川山甲 全蝎 南木香

右等分為末以酒調二錢一服便住痛妙甚

沙參丸 治疝氣

沙參 二兩 昆布 洗出 藿香子 炒各兩半

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十九丸空心

食前溫酒下

欽定四庫全書

普濟方

如聖丸 治男子五種疝氣婦人產前產後惡物不行

臍腹撮痛並皆治之

地膽 三十二箇去頭足 斑猫 五十箇去頭翅足 鹽豉 七十箇 輕粉 半錢

為衣

右以上四味用棗肉丸如菉豆大每服五十九丸先飲

好酒三五盞後用溫酒下如重車行五里小腹微覺

痛小腹勿驚無妨取下胞中病如雀腦相似是病

根又治婦人產後臍腹痛惡物不盡服七丸童子小



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|-----|--|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----|--|----------------------|
| 便下立效又治男子婦人絃氣并小腹臍痛每服一 | 丸温酒送下婦人用童子小便下立效又治小腸疝 | 氣及婦人產前產後經絡不來赤白帶下經絡不止 | 忌食雜魚濕麵雞猪馬牛等肉 | 金鈴散 <small>一名川棟茴香</small> 治小腸膀胱腎大外腎腫大下 | 塞不通 | 川棟子 <small>十箇每箇作四</small> 舶上茴香 <small>鹽炒香不用鹽</small> | <small>各等</small> 巴豆 <small>五粒連壳打破用川棟子微</small> 木香 <small>一分</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為末每服二錢用好酒一盞連根葱一寸同煎令 | 葱熟去葱調藥末頓服空心下三服許學士云大抵 | 此疾因虛得之不可以虛而驟補經云邪之所湊其 | 氣必虛留而不去其病則實故必滌所蓄之熱然後 | 補之是以諸方多借巴豆氣者也 | 治疝氣 | 乾姜 <small>炮製</small> 良姜 陳皮 青皮 <small>各三兩</small> | 右碾為末米醋糊丸如梧桐子大每服六七十丸空 |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|-----|--|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----|--|----------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---|-----|---|------------|---------------------------|--------------------------------|---|-----------------|----------------|----------------------------|
| 心酒送鹽湯亦得比吞丸子前嚼小茴香一撮然後 | 送下丸子日進三服空心便服 | 治寒濕氣入小腹疼痛或外腎腫痛 <small>出經方</small> | 高良姜 山梔子 欝金 各半兩 | 右為細末空心葱湯調下服二錢 | 玄附湯 <small>出存仁方</small> 治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大便滑泄 | 便滑泄 | 玄胡索 <small>炒去皮</small> 附子 <small>炮去皮臍</small> 木香 <small>不見火</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 右咬咀每服四錢水一盞半生姜七片煎七分去滓溫服不拘時 | 川棟子丸 治一切下部之疾悉皆治之腫痛縮小雖多年服此藥永去根本 | 川棟子 一斤淨肉四兩用麸炒一合班貓四十九 <small>用麸一合巴豆四兩同麸十九粒同炒麸黃色為度去麸不用巴豆四兩同麸一合巴戟一兩同炒麸黃色為度去麸</small> | 為度去麸已戟用四兩用鹽茴香不用 | 一兩同炒黃色為度去鹽茴香不用 | 火破故紙 <small>一兩炒香為度</small> |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---|-----|---|------------|---------------------------|--------------------------------|---|-----------------|----------------|----------------------------|



右為細末酒糊為丸梧桐子大每服五十九丸鹽湯下
甚者日進三兩服空心食前服

禹功散

黑牽牛頭末四兩茴香炒一兩或加木香一兩

右為末生姜自然汁調三錢卧時服

七疝湯 治男子七種疝氣攻疰小腹急痛牽掇不可
忍者

川烏炮去臍皮半兩全蝎十四箇去毒炒鹽三錢炒

欽定四庫全書

普濟方

右呶咀水一碗姜七片煎七分去滓放溫只作一服

空心食前服一方無姜

凡諸疝氣偏墜舉發者氣實大便閉可用生料五苓散
加茴香吳茱萸炒鹽少許每服五錢重水一盞半燈
草二十根煎七分去渣送下青木香五十九丸通利其
氣虛大便滑泄者可用蟠葱散加吳茱萸小茴香鹽
炒煎一服送下走馬茴香丸或內消丸五十九丸空心
服之予用此藥多驗



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------------|----------------------|---|----------------|--------------|----------------------------|------------|-----|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|--|
| 神應散 治諸疝心腹絞痛不可忍 | 不可多 | 三丸同青木香丸三十粒空心冷鹽酒下三兩一服 | 右為末糕糊丸如梧桐子大用硃砂麝香為衣每服 | 川烏尖 <small>七箇生用</small> 巴豆 <small>七枚去皮只</small> | 去鈴丸 治奔豚疝氣或陰囊腫大 | 右等分為末酒調二錢食前服 | 葫蘆巴 桃仁 <small>去皮尖炒</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 胡桃散 | 和 大豆許與之 | 精等分為五味小兒一刀圭二十日愈嬰兒以乳汁 | 加黃蘗桂心二味等分治氣上下痛腫用桂心鼓鐵 | 右為末食前酒服方寸匕日三服治癩卵偏墜一方 | 防風 <small>去蘆</small> 牡丹皮 <small>去心各等分</small> | 安 | 防風散 <small>一名牡丹散</small> 治疝氣腫硬癩偏大腸不能動坐卧不 |
|----------------|-----|----------------------|----------------------|---|----------------|--------------|----------------------------|------------|-----|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|--|



| | |
|--|------------------------------|
| 玄胡索 胡椒 <small>分等</small> | 右為末每服二大錢酒半錢小盞半煎七分食前溫服一方百沸湯調服 |
| 香沙丸 | |
| 茴香 <small>鹽炒香去不用</small> 新蚕 <small>晒乾各等分</small> | 右為末煉蜜丸如彈子大空心細嚼溫酒送下甚者日進二服 |
| 桃仁膏 <small>方見本門小腸氣類</small> | 治疝氣膀胱小腸氣痛不可忍 |
| 欽定四庫全書 普濟方 | |
| 治大人小兒偏墜 | |
| 防風 官桂 <small>辛辣者</small> | 右等分為末每服二錢溫酒調下如服訖以食壓之又方 |
| 荔枝核 冬橘核 | |
| 右燒存性為細末溫酒調下一錢 | |
| 二物湯 治奔豚疝氣攻刺走痛 | |
| 辣桂 <small>一兩半</small> 牛 <small>一兩炒</small> | |



| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|--|--|----------------|---------------------|------------|---|-----|---|--------------------------|-------------------------------|
| 寸金丸 治奔豚諸疝作痛 | 當歸 延胡索 舶上茴香 <small>炒</small> 葫蘆巴 <small>炒各</small> 桃仁 <small>一兩</small> | 浸去皮焙 桑螵蛸 <small>酒蒸</small> 川五靈芝 <small>研別</small> 白芍藥 川棟肉 | 各半 兩 華澄茄 木香 <small>二錢</small> 全蝎 <small>十箇</small> | 右為末醋打麵糊丸梧桐子大每服五十九丸少鹽入酒送下有熱小便閉車前子赤茯苓煎湯下 | 治丈夫本臟氣傷膀胱連小腸等氣 | 右金鈴子一百個溫湯浸過去皮巴豆二百個搥 | 欽定四庫全書 普濟方 | 微碎麸二升同於銅鍋內炒金鈴子赤熱為度放取出麸核為末每服三錢非時熱酒醋湯調並得其麸巴豆不用也棟實即金鈴子 | 治疝氣 | 炭皮 <small>一兩</small> 茴香 <small>半兩</small> | 右炒為末作二服酒調熱服汗出即愈又香白葱芷末酒調服 | 五苓散 <small>出危氏方</small> 治撮聚疝氣 |
|-------------|---|---|--|--|----------------|---------------------|------------|---|-----|---|--------------------------|-------------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---------------------|------|----------------------|----------------------|---------------|---|---|---|----|---------------------|---|-------------|---------------------|
| 川棟子 <small>去皮核取肉一兩用巴豆七枚去壳同炒令黃色去巴豆</small> | 便多閉血疝 | 金鈴子散 <small>出濟生方</small> 治七疝寒注下焦小腹引外腎疼痛大 | 匕 | 用鷄心栴榔小便濃□半個服或用熱酒調一錢 | 治本臟氣 | 府滑石一錢半同杵細末每服一錢煎葱白酒熱下 | 右一處炒令黃色去巴豆不用再入海金沙一錢桂 | 欽定四庫全書 普濟方 | 茴香 <small>一兩</small> 巴豆 <small>五十個去壳不出油</small> | 川棟子 <small>一兩每個切作四片</small> 青皮 <small>湯浸去白切焙乾稱一兩</small> 木香 <small>二兩</small> 舶上 | 川棟散 <small>出經驗良方</small> 治小腸氣膀胱氣痛不可忍 | 拘時 | 用礪砂仁為細末每服二錢嚼煨葱熱酒調下不 | 又方 <small>出經驗良方</small> 治小腸膀胱痛腎痛外腎腫大 | 子三個去核煎湯調下大効 | 用連根葱白二寸燈心寸莖鹽炒茴香一撮川棟 |
|--|-------|---|---|---------------------|------|----------------------|----------------------|---------------|---|---|---|----|---------------------|---|-------------|---------------------|



| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------|
| 右為細末每服二錢熱鹽酒調服空心食前一方用 川棟七個炮空心酒調下屢效 | 治疝氣小腸偏墜等疾已驗神效 <small>一方五苓散朱端嘗 病疝氣親服神效傳 之數人無 不驗者</small> | 右以先服五苓散用酒半盞燈心棗煎下青木香丸 一二十九次服煨姜鹽煎五積散俟平復再服沉香 及華澄茄散四藥 <small>出百一 選方</small> | 蝎麝散 <small>出直 指方</small> 治膀胱小腸氣痛 欽定四庫全書 <small>普濟方</small> | 右用全蝎緊實而全者不拘多少焙乾為末每逢病 欲發時用蝎末一錢入麝半字分作二服溫酒調下 候如人行十里又進後服神效 | 通治荆芥散 <small>出經驗 良方</small> 治風疝陰腎腫大兼治陰囊腫痛 <small>凌醫云曾以 治人有驗</small> | 右用荆芥穗不俱多少新瓦上焙為末每服二錢以 熱酒下即散 | 治膀胱疝氣 |
|--------------------------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------|-------|



| |
|---|
| 右須以青木香丸每服五十九丸用醇酒入葱白濃煎五苓散送下一方不用酒以葱燈心煎湯下 |
| 治風疽疔氣腫墜凝血及癰瘡除濕風 <small>出本</small> |
| 右用茵草為末和入湯服 |
| 藿香子散 治小腸膀胱疔氣疼痛 |
| 藿香子 <small>炒</small> 荆三棱 <small>煨剉各</small> 姜黃 馬蘭花 <small>醋炒各</small> |
| 沒藥 <small>研</small> 乾姜 <small>炮各</small> 一兩 |
| 右為散每服二錢空心食前熱酒調下 |
| 欽定四庫全書 普濟方 |
| 治偏墜 |
| 右以每日早煎香蘓散入少鹽服之即愈 |
| 治卒得諸疔小腸及陰中相引痛如絞自汗出欲死 |
| 右以搗過沙參末篩薑湯調服方寸匕立瘥 |
| 消腎丸 治腎大小便疼痛 |
| 右用橘皮揀淨二兩巴豆十四粒同一處炒至橘皮及巴豆黑色去巴豆用橘皮炒末二兩又黑牽牛二兩合同一處醋糊為丸梧桐子大每服三四十九漸 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------|---|-------------|---------------------------|--|--|----------------------|----------------------|-----|-----------------------|-------------------------------------|---|
| 漸加五十九丸鹽酒湯下鹽湯亦可食前 | 淋瀝藥方 <small>出百一 選方</small> | 蛇床子 川椒 木通 石茺萸 藁本 陳橘 | 皮 <small>各一 兩</small> | 右為末每用連根葱白七枚水三碗藥二匙煎五七 | 沸先噓俟通手淋洗 | 氣寶丸 <small>出楊氏 家藏</small> 治一切氣滯心胸痞悶及酒食所傷脾 | 胃積滯膀胱疝氣攻注腰脚 | 欽定四庫全書 <small>普濟方</small> | 茴香 <small>炒稱 二兩</small> 陳橘皮 <small>一 兩</small> 木香 <small>一 分</small> 黑牛 <small>二兩以吳茺 萸二兩慢火</small> | <small>同炒俟茺萸焦取出不用 茺萸只用牽牛頭末一兩</small> | 右為細末拌勻煉蜜為丸梧桐子大每服二十九至 | 三十丸生姜湯下更看虛實加減食前服小腸氣痛 | 鹽湯下 | 治寒濕氣小腹疼外腎便大腫痛發時只一兩服立定 | 常服此藥無下部之疾 <small>出百一 選方</small> | 茴香 柿椴子 <small>本草名糖棗惟滁州 者入藥二味共等分</small> |
|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------|---|-------------|---------------------------|--|--|----------------------|----------------------|-----|-----------------------|-------------------------------------|---|



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|------------|-----|--------------------------------|--|--|
| 右為細末每服一錢或二錢鹽湯調空心熱服 | 二神膏 <small>出經驗良方</small> 治腎囊偏墜疝氣 | 牡蠣 <small>二兩</small> 煨 良姜 <small>一兩</small> | 右為細末津唾或水調服大便處須臾如火熱畧痛即平安 | 隻金丹 <small>出危氏方</small> 治男子疝氣小腸虛損 | 小茴香 <small>二兩</small> 濕生虫 <small>陰乾二兩</small> | 右為末酒糊為丸梧桐子大每服三五十九空心茴 | 欽定四庫全書 普濟方 | 香湯下 | 海藻丸 <small>出危氏方</small> 治偏墜小腸氣 | 海藻 海帶 <small>各一兩</small> 班猫 <small>二十八個</small> 去翅足 巴豆 <small>二十八個</small> 去壳完全者 | 右巴豆班猫二味一處生絹袋盛用好醋一碗以瓦盛四味同煮將乾去班猫巴豆不用只將海藻二味細研為末以淡豆豉一百粒以煮藥餘醋畧浸蒸研為膏和末藥為丸如梧桐子大每服用麝香少許硃 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|------------|-----|--------------------------------|--|--|



| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 砂三錢乳鉢內細研至無聲却入麝香再研勻為衣 日乾以新瓦瓶收之每初服七粒二服十粒三服十 五粒若未愈再進三兩服皆用十五粒仍用鹽炒茴 香細嚼酒吞下空心服忌鴨子并酢醬動氣等物以 病三五服效此藥貴新合效速若合下稍以多服為 佳 | 牡丹五等散 療癩疔卵偏大有氣上下脹大行走腫 大服此良驗 | 欽定四庫全書 普濟方 | 牡丹皮 防風 黃蘗 桂心 桃仁 <small>灸 分 共 一分去皮尖研</small> | 右為散以酒服一刀圭二十日愈少小癩疔最良小 兒以乳和如一大豆與之長宿人服方寸匕忌生葱 胡荽 | 金穀散 <small>出楊氏家藏方</small> 治疔疼痛淋流下部 | 穀精草 枇杷葉 鬱金 <small>各兩 半 一兩</small> | 右件吹咀每用一兩半水五升煎數沸乘熱熏之去 滓通手淋洗 |
|---|--------------------------------|---------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|



| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 黑神散 | 出聖德堂方 | 治男子婦人膀胱痲痺七疝下氣五隔 |
| 氣疾產後諸血漏下赤白腹中有塊大如杯椀血瘕 | | |
| 癥癖七疝發時痛不可忍者用之效 | | |
| 乾漆 | 六兩半生用一 半重湯煮半日 | 神麩 炒 小茴香 炒共 木香 |
| 椒紅 | 去白丁香 共半 兩 | 檳榔 四個大者已上除椒餘 藥一半生用一半同炒 |
| 右為細末水糊為丸如彈子大別研茴香末十二兩 | | |
| 鋪陰地蔭乾俟外乾並茴香同丸藥收入甌內盛極 | | |
| 乾去茴香凡腎氣膀胱痲痺七疝下墜五隔血崩產 | | |
| 欽定四庫全書 | | 普濟方 |
| 後諸血漏下赤白者用藥一丸分作四服細嚼酒下 | | |
| 死胎者用一丸燒綿子灰酒調下難產者用冬葵子 | | |
| 四十九粒杵碎煎酒下 | | |
| 應痛丸 | 出三方 | 治敗精惡物不去結在陰囊成疝痛不可 |
| 忍以服去病 | | |
| 阿魏 | 三兩醋和用 厚三指囊阿魏慢火煨熱 | 檳榔 大者二個刮 去瓮子蒲成 |
| 的乳香將 | | |
| 刮取末用 | 蕎麥麵 伴作餅子 慢火煨熟 | |
| 右同研為末入礪砂末一錢赤芍藥一兩同為麵糊 | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|------------|--|------------------|----------------------|--------|---|--|----|----------------------|
| 右剉細每服四錢棗一個用泉水一盞半煎一盞溫 | 茯苓 二兩 甘草 兩 炙半 桂枝 兩 一 | 茯苓桂甘湯 <small>出直指方</small> 治臍下悸動欲作奔豚 | 五十九丸空心鹽酒水任下 | 止去黑牽牛不用餘為末酒糊為丸梧桐子大每服 | 右蒼朮分作四分與四藥合炒外杜仲四兩炒去系 | 戟心 出 黑牽牛 兩 各二 | 蒼朮 一斤 泔水浸春夏 三日 破故紙 鹽炒 八角茴香 鹽炒 巴 | 欽定四庫全書 普濟方 | 茴香蒼朮丸 <small>出德生堂經驗方</small> 治疝氣偏腎核墜不能忍者 | 小腸氣炒茴香酒下血氣炒生姜醋湯下 | 右件為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服一九 | 二枚只用七枚 | 芸薹子 兩 一班貓 <small>去翅足四十九枚二味一處慢火炒深黃色勿令焦揀出班貓四十</small> | 止痛丸 <small>出楊氏家藏</small> 治疝氣小腸並婦人血氣痛不可忍者 | 前服 | 搜和丸如梧桐子大溫酒鹽湯下十九至二十九食 |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|------------|--|------------------|----------------------|--------|---|--|----|----------------------|



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------------|--|---|---------------|---|----------------------------------|--|--|
| 服 | 內消丸 <small>出楊氏家藏</small> 治小腸膀胱疝氣下部等疾 | 木香 茴香 沉香 硫黃 <small>別研</small> 附子 <small>炮去皮臍各半兩</small> 礪 | 砂 <small>二錢別研</small> 全蝎 <small>四十九枚炒</small> | 右件為細末湯浸蒸餅為丸如菘豆大每服七丸綿灰溫酒送下食前 | 必效丸 <small>出楊氏家藏</small> 治偏墜膀胱疝氣小腸氣痛不可忍者 | 桃仁 <small>半斤用菜萸四兩炒桃仁令紫色去菜萸令碾桃仁為細末却入和后諸藥</small> 茴香 | 欽定四庫全書 普濟方 | 破故紙 <small>炒</small> <small>炒香熟二錢</small> 延胡索 穿山甲 <small>用蛤粉炒赤色</small> 地 | 蟾蟲 <small>洗去泥土頭翅足焙乾三味各一兩</small> | 右件為細末麵糊為丸梧桐子大每服五丸空心溫湯送下仍用前件炒藥菜萸炒為細末用津液調敷患處 | 丁香疝氣丸 <small>出詩效方</small> 治臍下撮痛疼並臍已下周身皆急小便頻清其五脉急獨腎按之不急皆虛無力名曰腎疝 |
|---|--|--|--|-----------------------------|--|---|---------------|---|----------------------------------|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------------|----------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
| 心溫酒吞下間服天台烏藥散旬日良愈明年秋王征 | 即不能愈遂制一方名之曰沉香桂附丸每服百丸空 | 男子內結七疝皆積寒於小腸之間所致也非大熱劑 | 物熨之稍緩脉得沉小而急余因思難經有云任之病 | 面色青黃不澤腹臍陣痛擗撮不可忍腰曲不能伸熱 | 以病疝氣復因七月間飢飽勞役過度縱飲所發甚至 | 衛生寶鑑 癸丑歲奉詔至六盤山上命治火赤紐隣 | 熟水送下食前空心服或痛時便服 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 右件為細末煨蒜為丸如菘豆大每服三丸溫酒或 | 應痛丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治疝氣痛甚者 | 胡椒 <small>三百二十粒</small> 巴豆 <small>七枚去壳</small> 班猫頭 <small>二十一枚去翅用</small> | 酒送下鹽湯亦得空心服 | 右件為末酒煮麵糊丸如雞頭仁大每服五十九丸溫 | 川烏頭 <small>半分</small> | 活防己 <small>三分</small> 麻黃根 玄胡 <small>各一分</small> 丁香 <small>半錢</small> 肉桂 <small>一錢</small> | 當歸 茴香 <small>共一錢</small> 甘草 木香 <small>共五分</small> 全蝎 <small>十三個</small> 羌 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------------|----------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|---|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|------------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----|------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 川棟子 <small>一兩 淨</small> | 班貓頭 <small>十四個 足翅</small> | 巴豆 <small>十四個 去壳并 心擘開作兩片</small> | 則欲死諸藥所不治妙方 | 金鈴子散 <small>出朱氏 集驗方</small> | 治膀胱疝氣小腸偏墜小腸撮痛發 | 酒送下常服鹽酒吞下亦可 | 右為細末酒糊丸每三十九丸細嚼胡桃仁三個熱葱 | 紙 葫蘆巴 <small>炒各 二兩</small> | 茴香 川棟子 <small>半兩每個 九粒炒焦為度不用巴豆</small> | 破故 | 金鈴子丸 <small>出朱氏 集驗方</small> | 治膀胱小腸疝氣臍腹苦痛 | 欽定四庫全書 普濟方 | 八十九丸熱米飲湯送下空心食前日二服忌冷物 | 右為細末好醋煮糊丸梧桐子大每服五十九丸至七 | 沉香 附子 <small>炮製去 皮臍</small> | 川烏頭 <small>炮去皮臍 切作小塊</small> | 乾姜 <small>炮</small> | 疝痛引小腹不可忍腰曲不能伸喜熱熨稍緩 | 色不澤手足厥逆便利無度又治下焦陽虛及療七 | 助陽除臟腑積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷鳴面 | 沉香桂附丸 治中氣虛弱脾胃虛寒飲食不美退陰 | 班師即遠迎拜精神如故上大悅輒錄於此 |
|--------------------------------|----------------------------------|---|------------|------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|---|----|------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|



右二味同煉於銀石瓦器內慢火炒令川棟肉帶肉
微黃焦色取去班猫巴豆二藥不用只將川棟子肉
別安之一處外用茴香三錢重和前川棟子肉用鹽
合炒令香并前川棟子研為細末每服三錢空心溫
酒調下若臟腑微利通即愈病久而甚痛者不過三
服病退即止服此方之後仍用安腎丸沉香華澄茄
散吞服以補其虛則其病永不作矣

燒綿丸 出朱氏
家藏方 治疝氣

欽定四庫全書

普濟方

川棟子 去核 馬蘭花 青橘皮 舶上茴香 各一兩

右為細末用漆丸如鷄頭大針穿三孔陰乾用新綿
半兩燒成灰細研以無灰酒調綿灰稀稠得所溫放
下藥一丸正發未時皆可食之藥在伏中不壞如要
取藥時可飲葵湯即下淨洗留之一丸藥可治六七
人神效

天雄沉香煎丸 出王氏
博濟方 治下元虛憊陽事不能成下墜
及小腸氣痛腎臟攻注脾胃不和腰脚重



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|--|
| <p>三茱丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治膀胱疝氣時發痛疼而不除漸至堅</p> | <p>方加川棟破故紙茴香川烏蜜丸酒下</p> | <p>湯下○一方加青皮蓬朮桃仁黑牽牛破故紙○一</p> | <p>右為末酒糊丸如梧桐子大每服十五丸空心酒鹽</p> | <p>葫蘆巴<small>一斤</small>大巴戟<small>六兩</small>并炒</p> | <p>偏墜陰腫小腸有形如卵上下痛不可忍或絞結繞</p> | <p>臍嘔吐悶亂</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>葫蘆巴丸<small>出鮑氏方</small>治大人小兒小腸氣盤腸氣奔豚疝氣</p> | <p>加三十丸久服明目雄氣海駐顏</p> | <p>右為細末煉蜜丸如梧桐子大每日空心下二十九</p> | <p>巴戟<small>二兩</small>去心</p> | <p>羌活 乾姜<small>各一兩</small> 官桂<small>一兩</small> 肉蓯蓉<small>三兩</small> 酒浸<small>去土炙熟</small> 紫</p> | <p>附子<small>四兩</small> 草烏頭<small>四兩</small> 牛漆<small>二兩</small> 天麻<small>二兩</small> 已上<small>八</small></p> | <p>天雄<small>四兩</small> 用研對<small>生</small> 防風<small>二兩</small> 緊黑小豆<small>二兩</small> 淨<small>用</small> 漢椒<small>四兩</small></p> |
|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|--|-------------------------------------|--------------|----------------------|--|--|---------|
| 右件為細末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服三十丸 | 子 <small>去壳</small> 半兩 木猪苓 班猫 <small>用鬚米炒黃去米并頭足翅稱一錢</small> | 猪胞 <small>一枚</small> 煮切酒 甘遂 澤瀉 <small>二錢</small> 炒 黑牽牛 續隨 | 猪胞丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治膀胱疝氣腫大牽引作痛 | 每服三十丸鹽湯或溫酒送下空食前 | 右件同糯米細末木瓜肉四兩猪腰子一對去筋膜 | 同和酒二升熬爛研成膏和前藥末和丸梧桐子大 | 木香 <small>兩半</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 糯米一盞同炒 川棟子 <small>去核</small> 炒 川椒 <small>去目及閉口者各一兩</small> 茴香 <small>二兩</small> 鹽炒 | 地蟾蟲 <small>去頭翅足</small> 斑猫 <small>去頭翅足</small> 紅娘子 <small>去頭翅足</small> 巴豆 <small>四味</small> 等分以 | 木香丸 <small>出楊氏家藏方</small> 治膀胱寒疝腫緩疼痛 | 服三十丸酒或鹽湯送下食前 | 右件為細末酒煮麵糊為丸梧桐子大硃砂為衣每 | 肉桂 <small>去皮</small> 炒 金鈴子 <small>去核</small> 陳皮 <small>去白</small> 木香 <small>各等分</small> | 山茱萸 吳茱萸 <small>湯浸七遍</small> 食茱萸 青橘皮 <small>去白</small> 茴香 | 大此藥可以內消 |
|----------------------|---|---|---------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|--|-------------------------------------|--------------|----------------------|--|--|---------|



嚼茅香酒送下取動小便如米泔是效嘗服五十七丸忌甘草三日食前

澤瀉散 出楊氏家藏方 治膀胱疝氣小腸氣痛

馬蔞花 川棟子肉 炒 茯苓皮 澤瀉 茴香 炒

麥門冬 去心 石燕子 煨紅醋淬七次

右件各等分為細末入麝香少許每服一錢用鹽酒

調下空心臨臥

茴香散 出楊氏家藏方 治一切氣疾臍腹滿膀胱疝氣小腸氣

欽定四庫全書

普濟方

痛

荆三棱 炮切 蓬莪朮 炮切 金鈴子 去核麩炒赤 茴香 炒

青橘皮 去白 甘草 炙二味各半兩 木香 當歸 洗焙二味各一分

右件為細末每服二錢水一盞生姜二片煎至七分

溫服如小腸撮痛炒生姜酒調下如人行五七里再

服一服空心食前

療疝氣 出本草

右以蝟皮燒為灰酒服之



| | | | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|--------|-----|-----------|
| 治疝積腹痛 <small>出本</small> | 右以羚羊角作末服之 | 除疝瘕 <small>出本</small> | 右以雀卵白和天雄兔系子末為丸空心酒下五丸 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 普濟方卷二百四十七 |
|----------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|--------|-----|-----------|

