

欽定四庫全書

普濟方卷二百四十八 明 周王朱橚 撰

癩疝門

心疝 附論

夫疝者痛也由陰陽氣積于內寒氣不散上衝心故使
用痛謂之心疝也其痛也或如錐刀所刺或陰陰而疼
或四肢逆冷或唇口變青皆其候也○內經謂診得心
脉而急疾名心疝少腹當有形也心為牡臟小腸為之

欽定四庫全書

普濟方

使故曰小腹當有形也夫臟病必傳於腑今心不受邪
病傳於腑故小腸受之為疝而痛當有形也世之醫者
以疝為寒濕之疾不知心氣之厥亦能為疝心疝者當
兼心氣以治之

方

牡丹丸 治心疝心痛如錐所刺

牡丹皮 桂皮去芍藥 烏頭炮去細辛 甘草炙

木香 吳茱萸湯浸枳榔各一兩



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------|---|--|---------------|--------------|-----------|----------------------|---|---|------------------------|
| 桃仁丸 <small>出聖 惠方</small> 治心疝心痛四肢逆冷面色青黑 | 右為末每服二錢水一盞煎七分溫服不拘時 | 蓬莪散 治心疝痛肢體虛冷 | 蓬術 <small>煨</small> 枳榔 <small>生剉</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 甘草 <small>剉</small> 桂 <small>去皮</small> 胡椒 | 兩半 芎藭 白朮 <small>各三分</small> | 蓬莪散 治心疝痛肢體虛冷 | 右為散每服二錢沸湯或溫酒調下不拘時 | 青橘皮 <small>湯浸去白皮炒</small> 蓬莪術 <small>煨各一兩</small> | 木香 羌活 <small>去蘆頭</small> 枳榔 <small>生剉</small> 牡丹皮 當歸 <small>切炒</small> 桂 <small>去皮</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 木香散 治心疝心痛不可忍 | 酒下三十九日四五服 | 右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服以熱 | 赤芍藥 <small>出聖 惠方</small> 治心疝心腹中如錐刺疼痛脇下脹滿 | 時 | 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒下不拘 |
| | | | | | | | | | | | | | 赤芍藥 <small>去蘆</small> 桔梗 <small>去蘆頭</small> 細辛 桂心 川椒 <small>去目及閉口微</small> | | |
| | | | | | | | | | | | | | 汗 <small>炒出</small> 乾姜 <small>炮製</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 木香 枳榔 <small>各一兩</small> | | |



| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|-------------------|--|--|---|-----------------------------|
| <p>桃仁<small>湯浸去皮尖雙</small> 沒藥 安息香 乳香 麝香<small>細研</small> 桂心 木香 吳茱萸<small>湯浸七遍焙乾</small></p> | <p>右為末都研令勻用蒸餅和丸如小豆大不拘時以少酒嚼下二十九</p> | <p>治心疝心腹中如錐刀所刺疼痛<small>出聖惠方</small></p> | <p>巴豆 木香 檳榔<small>各半</small> 附子<small>去皮臍</small> 川烏頭<small>去皮</small> <small>臍生用</small> 乾漆<small>搗碎炒</small> 桃仁<small>湯浸去皮尖</small> 蓬莪茂<small>各</small> <small>共一兩</small> 令煙盡 雙仁<small>麩炒黃</small> 三</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>右件藥先以巴豆附子烏頭等三味以水煮一日取出各去皮巴豆去心膜一處搗如泥諸藥別搗羅為末相和巴豆等分入醋麵糊丸菜豆大不拘時醋湯下五丸</p> | <p>芍藥丸 治心疝心脇痛及繞臍痛</p> <p>芍藥 桔梗<small>去蘆</small> 細辛<small>去苗</small> 蜀椒<small>去目閉口</small> 桂心</p> | <p>去皮 乾姜<small>炮共</small> 附子<small>炮製去皮</small></p> | <p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒或鹽</p> |
|---|------------------------------------|---|---|-------------------|--|--|---|-----------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|---|--|------------|---|-------------------------|----------------------|------------|----------|-------------------|---|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 飲不拘時 | 木香散 治心疝心脇痛及繞臍痛 | 芍藥 桔梗 <small>去蘆頭</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 蜀椒 <small>去目閉口</small> 桂皮 <small>去</small> | 乾姜 <small>各五分</small> 附子 <small>炮去皮臍一兩</small> | 牡丹丸 治疝氣心腹痛 | 牡丹 桂心 川烏頭 <small>炮製去皮臍</small> 木香 吳茱萸 <small>浸湯</small> | 七 檳榔 <small>各一兩</small> | 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如菘豆大每服以温 | 欽定四庫全書 普濟方 | 酒服十丸日四五服 | 硃砂丸 治心疝心腹中疔刺疼痛不可忍 | 硃砂 <small>細研半兩</small> 桂心 <small>半兩</small> 桃仁 <small>湯浸去皮尖雙仁麩炒黃半兩</small> 附子 <small>炮製去皮</small> | 臍一兩 麝香 <small>半錢</small> 巴豆 <small>二十一枚去皮心研紙煨去油</small> | 右為末麵糊和丸如梧桐子大每服醋湯下二丸 | 治心疝發作有時激痛難忍者 | 以麝菌吳茱萸等分搗末蜜丸如麻子大每服二 | 丸日三服勿熱食一方以茱萸一升麝菌如彈子 |
|------|----------------|---|--|------------|---|-------------------------|----------------------|------------|----------|-------------------|---|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------|---|--------------|------|----------------------|---------------|---|-------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|--------------|----|---------------------|
| 射干 <small>半兩</small> 吳茱萸 <small>二兩湯浸七次焙乾微炒</small> | 治三十年心疝神效方 | 右為散每服一錢匕熱酒調下不拘時婦人醋湯下 | 附子 <small>炮製去皮臍</small> 蓬莪茂 <small>煨剉各一兩</small> | 三溫散 治心疝冷痛不可忍 | 橘皮湯下 | 右為細末醋煮麵糊和丸如小豆大不拘時以生姜 | 欽定四庫全書 普濟方 | 硃砂 <small>細研水飛過</small> 半夏 <small>湯洗七次去滑共一兩</small> 川烏頭 <small>半兩去皮臍生用</small> | 逆少思飲食 | 治心疝心腹內攻刺疼痛腹脇虛脹宿食不消或時吐 | 姜鹽酒下米飲亦得日三服 | 右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服二十九丸炒生 | 桂 <small>去粗皮半兩</small> 當歸 <small>焙三分</small> 吳茱萸 <small>湯洗焙一兩</small> | 紫桂丸 治陰交攻心疝疼痛 | 即止 | 大服一丸合搗以鷄子白和丸如小豆大服二丸 |
|---|-----------|----------------------|---|--------------|------|----------------------|---------------|---|-------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|--------------|----|---------------------|



右為末煉蜜和丸如菘豆大每服五丸以粥飲下日
三服藥勢欲盡乃可喫熱食良

木香散 治心疝小腹痛悶已絕者

木香 陳皮各一兩 良姜 乾姜 訶子皮 赤芍

藥 枳實各半兩 草豆蔻 川芎 黑牽牛各三錢

右為末每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

厥疝 附論

夫內經謂脉黃之至也大而虛有積氣在腹中有厥氣

欽定四庫全書

普濟方

名曰厥疝女子同法得之疾使四肢汗出當風夫疝臟
疾言隱而難見陰沉而伏也今脾虛風寒客於膜腹之
間不能興通行水穀之氣結而成積使氣道厥而通故
謂之厥疝

方

懷香丸 治厥疝上攻腹痛無時

懷香子炒 吳茱萸酒浸焙 桂皮去粗 胡椒 棟實剉

炒熟 延胡索各半兩 蜜蟲去翅 海蛤 芫花醋炒 礪砂



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--|--|-----------------------------|-----------|-----------------------|--|
| <p>研 木香 兩 共一</p> | <p>右為末酒煮麵糊和丸梧桐子大每服十九鹽酒下 食前</p> | <p>山茱萸丸 治厥疝上搶心腹冷痛</p> | <p>山茱萸 吳茱萸 湯洗 乾 食茱萸 棟實 剉碎 炒 馬蔞</p> | <p>花 藿香子 焙 青橘皮 湯浸去 焙 陳橘皮 湯浸去 焙 乾</p> | <p>姜 炮 荆三棱 炮 各 附子 一枚重兩半者 炮製去皮臍</p> | <p>右為末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服二十九酒</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>或鹽湯下空心服</p> | <p>細辛丸 治厥疝冷逆攻心腹痛</p> | <p>細辛 葉 去苗 芍藥 吳茱萸 湯浸 焙 人參 白朮</p> | <p>桂 皮 去粗 乾姜 炮 甘草 炙 當歸 切 焙 附子 炮製去皮 臍 各一兩</p> | <p>右為末稀麵糊丸梧桐子大空心米飲下三十九日</p> | <p>三服</p> | <p>木香湯 治厥疝逆上攻心腹冷痛</p> | <p>木香 栝榔 剉 生 烏頭 皮 炮製去 臍 細辛 葉 去苗 當歸 切 焙 吳</p> |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--|--|-----------------------------|-----------|-----------------------|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------|-----|----------------------|-----|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|----|------------|---------------|--------------------------------|------------|----------------------|-----|-------|-----------------------|-----------------------|
| 脉盖是少陰腎經與太陽膀胱二經合為表裏卒然感 | 夫卒疝者腎臟虛弱之人形寒飲冷暴受邪氣傳入經 | 卒疝 附論 | 不拘時 | 右咬咀如麻豆每服三錢水一盞煎七分去滓溫服 | 不拘時 | 吳茱萸湯 出宣明論 治厥疝腹中陰冷痛積氣上逆 | 吳茱萸 湯洗焙乾 炒二兩 烏頭 炮製去 臍皮 細辛 去苗葉 各三分 當歸 | 焙切 高良姜 炒剉 乾姜 炮 桂 去粗皮 各一兩 | 右剉如麻豆大每服五錢水三錢煎一盞去滓溫服 | 日三 | 欽定四庫全書 普濟方 | 當歸乾姜湯 治厥疝腹中冷痛 | 當歸 切 乾姜 炮 附子 炮製去 皮臍 人參 甘草 炙 細辛 | 去苗 芍藥 各一 兩 | 右咬咀如麻豆每服三錢水一盞煎七分去滓溫服 | 不拘時 | 卒疝 附論 | 夫卒疝者腎臟虛弱之人形寒飲冷暴受邪氣傳入經 | 脉盖是少陰腎經與太陽膀胱二經合為表裏卒然感 |
|-----------------------|-----------------------|-------|-----|----------------------|-----|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|----|------------|---------------|--------------------------------|------------|----------------------|-----|-------|-----------------------|-----------------------|



寒熱相傳則津脉不得流通氣道結澁而腸滿攻臍腹
牽引於陰暴發疼痛或曰汗出悶絕不省難可堪忍故
卒疝也

方

藿香煮散 治卒疝攻小腸疼痛

藿香子炒 枳壳去瓢 木香 芍藥 厚朴去粗皮

炙 陳皮 桂去粗皮 青橘皮湯浸去白 乾姜炮製 人參

白茯苓去黑皮 荆三棱各半 生地黄焙三分

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服三錢匕水一盞葱白二寸鹽少許煎七

分熱服

木香丸 治卒疝腹痛不可忍

木香 桂去粗皮 栝榔剉 蓬莪朮煨 藿香子炒 桃仁

去皮尖双仁 菜菔子炒 青橘皮湯浸去白 厚朴去粗

研膏共三分 皮生薑汁炙一兩

右將八味搗羅為末入桃仁膏和勻酒煮麵糊丸梧

桐子大每服二十九丸空心溫酒下食前



| | |
|--|---|
| 菜萸湯 治卒疝攻臍腹痛汗出悶絕 | 吳茱萸 <small>湯浸焙乾</small> 細辛 <small>去苗</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 人參 |
| 白茯苓 <small>去黑皮</small> 桂 <small>去粗皮</small> 半夏 <small>生薑汁製乾</small> 當歸 | 右呶咀如麻豆每服三錢水一盞生姜一片大棗二枚擘破煎七分去滓溫服不拘時 |
| 乾姜湯 治卒疝繞臍腹卒暴疼痛 | 乾姜 <small>炮製</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 椒 <small>去目并閉口炒出汗</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 桂 |
| 欽定四庫全書 普濟方 | 芎藭 <small>去粗皮</small> 當歸 <small>乾切</small> 芍藥 <small>兩一</small> |
| 不拘時 | 右呶咀如麻豆每服二錢水一盞煎七分去滓溫服 |
| 蜀椒散 治卒疝心痛如刺繞臍腹中盡痛自汗出氣欲死方出本門寒疝心腹痛類 | |
| 姜朮散 治卒疝少腹中相引疼痛不可忍 | |
| 蒼朮 <small>米泔浸切炒</small> 乾姜 <small>炮製</small> 馬蘭花 芫花 <small>醋炒焦</small> 五靈脂 | |
| 烏頭 <small>去皮臍各一兩</small> | |
| 右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服十九食前溫 | |



酒或鹽湯下

當歸湯 治卒疝心腹痛裏急

當歸 焙 生姜 芍藥 各二兩 羊肉 切去脂膜半斤

右將三味細切先以水五升煮羊肉爛熟去肉以汁

煮藥候熟去滓澄清每服一盞不拘時

走馬湯 出聖惠方 治卒疝無故心煩腹痛陰縮手足厥逆并

治飛尸氣擊有尸痛兼治中惡心痛腹脹大便不通

巴豆 三個去皮炒 杏仁 三個去皮炒

欽定四庫全書

普濟方

右味綿纏搥令碎熟湯二合捻取白汁飲之當下老

少量與服之尤妙療鬼擊有尸痛者當蓄此藥用驗

忌野猪肉蘆笋等物

寒疝

夫寒疝為病陰冷內積胃氣不行結於腹內故遇寒則

發其狀惡寒不欲食手足冷繞臍痛自汗出遇寒則發

其脉弦緊是也○疝之為病隨臟氣虛實感傷外邪寒

泣風散暑鬱濕着絞刺擊搏無有定處倉卒之際痛不



堪忍世人稱為橫弦堅弦膀胱小腸氣賊風入腹等名
義不同症狀則一寒則溫之風則散之暑則利之濕則
燥之各有成法

方

四製茱萸香煉丹 出德生堂方 專治小腸疝氣陽事衰敗下

元虛冷效

吳茱萸 一兩分作四分 一分裝豬尿胞帶尿者 酒浸煮一分醋浸去膜 一分童子小

便浸一分 澤瀉 四兩 川棟子 四十九個巴豆二 枳殼 十個炒黃去巴豆

欽定四庫全書

普濟方

去瓢炒 木香 陳皮 青皮 茴香 鹽炒 石菖蒲 炒 枳

榔 三稜 煨 桃仁 去尖炒 葶藶 蓬朮 煨 官桂 白

茯苓 乳香 共三兩 別研 荔枝核 四十枚

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十九空心

鹽湯或酒下常服辟除邪氣食前空心服治腎經虛

弱寒腫痛諸種疝氣

吳茱萸湯 出聖惠方 治寒疝腰腹痛胸中冷氣上搶心脇支滿

不得卧面目痛風寒悸悼多驚不能飲食已即嘔寒



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <p>熱往來</p> | <p>吳茱萸 <small>湯浸七遍</small> 半夏 <small>浸七次</small> 乾姜 <small>炮裂</small> 人參 <small>去蘆</small></p> | <p><small>頭</small> 當歸 <small>剉碎</small> 赤芍藥 <small>各三</small> 細辛 紫苑 <small>去苗</small> 附子</p> | <p><small>炮裂</small> 熟乾地黄 前胡 <small>去蘆</small> 赤茯苓 白朮 桂</p> | <p>心 木香 <small>各一</small> 甘草 <small>炙微</small> 旋復花 <small>各半</small> 訶黎勒 <small>一</small></p> | <p><small>皮</small> <small>半用</small></p> | <p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大不拘時</p> | <p>生姜湯下二十九</p> | <p>欽定四庫全書 <small>出醫方</small> 普濟方</p> | <p>補腎湯 <small>集成</small> 治寒疝入腹上實下虛小腸疼痛時復</p> | <p>泄瀉胃膈痞滿不進飲食常服溫脾補腎</p> | <p>人參 茯苓 白朮 <small>一兩</small> 黃耆 附子 <small>炮製去皮</small> 沉</p> | <p>香 <small>四錢</small> 木瓜 <small>一兩</small> 羌活 <small>半兩</small> 甘草 <small>炙</small> 芎藭 <small>各一</small> 紫蘓 <small>三錢</small></p> | <p>右為末每服三錢水一盞姜三片棗二枚煎七分去</p> | <p>滓食前服嘔加半夏半兩添水作盞半姜七片煎</p> | <p>治脇下風氣作塊寒疝發則連小腹痛湊心其積名屬</p> | <p>肝在右脇下故病發則右邊手足頭面昏痛不思飲食</p> |
|------------|--|---|---|---|---|-----------------------------|----------------|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|--|------------------|-------------|----------------------|--|-----|
| 搜絞補虛消疝溫養腎經此藥不熱無毒若至心服 | 累經治療不見減瘥服之漸漸內消不動大腸亦不 | 癢疼痛時黃水瘡癢腰腿沉重足脛腫滿行步艱難 | 可忍陰核偏成大膚囊癰腫結硬牽急重大滋長癩 | 寒疝伏留不去臍腹疔痛刺小腸氣奔豚瘕癖痛不 | 菜萸內消丸 <small>出和劑方</small> 治腎與膀胱經虛為邪氣所搏結成 | 右為散每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時 | 藥 當歸 <small>切焙</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 前胡 <small>去蘆頭</small> 青橘皮 <small>湯浸去白焙已上各</small> | 藥 木香 <small>三分</small> 檳榔 <small>剉</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 芍 | 木香湯方 治寒疝攻注胃脇滿痛汗出 | 通口服日三四服有汗避風 | 右為末每服四錢水一盞半姜三片同煎七分去滓 | 乾葛 <small>兩一分</small> 麻黃 <small>三分</small> 側子 <small>一個</small> 川芎 防風 枳實 芍 | 止頭痛 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|--|------------------|-------------|----------------------|--|-----|

欽定四庫全書

普濟方

兩一



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-------------------------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|--------|-----|--|--|----------------------|-----------|--|---|--|-----------------|
| 餌其效如神 | 吳茱萸 <small>湯浸七次焙</small> 陳皮 <small>去白</small> 川棟子 <small>蒸去皮核</small> 肉桂 <small>去粗皮不見火</small> | 馬藺花 <small>醋炙</small> 青皮 <small>去白</small> 山藥 <small>焙</small> 茴香 <small>炒</small> 山茱萸 <small>去核共</small> | 木香 <small>一兩不見火</small> | 右為末酒糊丸梧桐子大每服三十丸至五十丸空 | 心溫酒或鹽湯吞下 | 桂心丸 治寒疝胸脇支滿食飲不化臍腹疔痛及嘔 | 痢風瘧齊項強急不得俛仰 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 桂 <small>去粗皮五分</small> 吳茱萸 <small>湯浸焙乾炒三兩</small> 白薇 <small>一兩</small> 烏頭 防葵 | 蜀椒 <small>去目及閉口者炒</small> 白芷 <small>各三分</small> 乾姜 <small>炮</small> 芎藭 <small>各一兩</small> | 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸溫酒下食前 | 一方忌生葱猪肉冷水 | 茴香丸 <small>出儒門事親書</small> 治冷氣攻刺疝氣疼痛腎虛脚弱 | 茴香 <small>炒八兩</small> 川棟子 <small>炒</small> 川烏 <small>炮去皮臍</small> 葳靈仙 <small>洗去土</small> 防風 | 陳皮 <small>去蘆各三兩</small> 地龍 <small>一兩去土微炒</small> 烏藥 <small>五分</small> 赤小豆 <small>八兩</small> | 右為末酒糊為丸每服三五丸茶酒下 |
|-------|---|---|-------------------------|----------------------|----------|-----------------------|-------------|--------|-----|--|--|----------------------|-----------|--|---|--|-----------------|



蓬莪朮湯 治寒疝四肢冷逆氣弱汗出

蓬莪茂 炮 附子 炮製去皮臍 桂 去粗皮 枳榔 芍藥 各一兩

芎藭 白朮 共三分 乾姜 半兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分去滓溫服

不拘時

人參湯 治寒疝冷痛氣弱汗出不欲食

人參 白茯苓 去黑皮 蜀椒 去目及閉口者炒出汗 乾姜 炮

兩 附子 炮製去皮臍 枳榔 白朮 青皮 湯浸去白焙共一兩

欽定四庫全書

普濟方

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分去滓溫服

三增茴香丸 出危氏方 治腎與膀胱俱虛為邪氣搏結遂成

寒疝伏留不散臍腹痛陰核偏大膚囊癰腫重墜滋

長有妨行步療癢不止時行黃水浸成瘡癢或長怪

肉累治不痊致令腎經閉結陰陽不通外腎腫脹冷

硬如石漸魄大皆由頓服熱藥內攻或因斃取以至

如此此藥溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝暖疝養腎

經能使復元氣應小腸氣寒疝之疾以新不過三料



| | |
|---|---|
| 第一料 | 舶上茴香 <small>用海鹽半兩</small> 川棟子 <small>炮去核</small> 沙參 <small>洗</small> 木香 |
| 洗各一兩 | |
| 右為細末煮米粉稠糊丸如梧桐子大每服二十九 溫酒鹽湯空心日進三服小病此一料可安才盡便 可服第二料 | |
| 第二料 加下項藥 | |
| 華撥 <small>一兩</small> 檳榔 <small>五錢</small> | |
| 欽定四庫全書 普濟方 | |
| 右入前藥共六味重五兩半細末依前法糊丸湯使 丸數服之若病大未愈便服第三料 | |
| 第三料 又加下項藥 | |
| 白茯苓 <small>四兩紫小者去黑皮</small> 黑附子 <small>半兩炮去皮</small> | |
| 右通前藥八味重十兩並依前法糊丸湯使丸數服 之加至三十九丸新从大病不過此三料可愈小腸氣 發頻及三十年者寒疝氣至拷棖大者皆可消散神 | |
| 效 | |



| | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 生料木香勻氣散 | <small>出危氏方</small> | 治寒疝作痛和氣 |
| 丁香 | 檀香 | 木香 |
| | | <small>共一兩</small> |
| | | 甘草 |
| | | <small>燻四兩</small> |
| | | 礞砂 |
| | | <small>去壳二兩</small> |
| | | 白 |
| 荳蔻仁 | 沉香 | <small>共一兩</small> |
| | | 蘓合香 |
| | | <small>去皮土四兩</small> |
| 右剉散每服二錢水一盞半生姜三片紫蘓葉五錢 | | |
| 食鹽少許煎熱服不拘時或為末炒茴香鹽酒調亦 | | |
| 可 | | |
| 茱萸湯 | | 治寒疝來腰腹攻痛 |
| 吳茱萸 | <small>湯浸焙炒三分</small> | 生姜 |
| | | <small>切焙微炒</small> |
| | | 鼓 |
| | | <small>微炒</small> |
| | | 桂 |
| | | <small>去粗皮共半兩</small> |
| 欽定四庫全書 | | 普濟方 |
| 右為散每服三錢水一盞酒少許同煎七分去滓温 | | |
| 服 | | |
| 治虛人老人寒疝作痛不可攻刺 | | <small>出澹療方</small> |
| 右以木香調氣散煎炒茴香鹽酒調下一法咬咀 | | |
| 每服二錢水一大盞生姜紫蘓鹽煎服尤妙立有 | | |
| 效驗 | | |
| 又方 | | 治下部冷及臍下小腹痛不可忍一服效 |
| 赤石脂 | 乾姜 | <small>各十兩</small> |



右為末麵糊為丸如豌豆大每服十九至二十九空
心米飲下日三服

紫蘓子丸 治臟氣疝腹痛

紫蘓子揀淨陳橘皮去白共高良姜 桂 人參共

兩一分木香炮

右為末煉蜜丸如芡實大如丸服細嚼米飲下小兒
白湯化下一丸霍亂吐瀉急服煎藿香湯下尤妙

高良姜湯 治寒卒痛積聚不散上衝心腹與陰相引

欽定四庫全書

普濟方

痛則出汗

高良姜炒 檳榔半大

右和暖灌下部少間即減日一度再灌之即止

大烏頭桂枝湯出濟生方 治風寒疝氣中痛逆冷手足不仁

身體疼痛灸刺諸藥不能療及賊風入腹攻刺五臟拘
急不得轉側作叫呼陰縮悉主之

大烏頭五枚實者去皮尖蜜一大 桂心 芍藥各

錢三 甘草一分



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------|----------------------------|---|
| <p>右剉散每服四大錢水一盞半生姜五片大棗三個 入前煎烏蜜半合同煎七分盞去滓食前服一法用 附子一個不使烏頭為蜜附湯</p> | <p>茴香小佳酒 <small>出直指方</small> 治腎冷疝氣偏墜急痛</p> | <p>舶上茴香 <small>三錢</small> 胡椒 <small>一錢</small> 縮砂仁 辣桂 <small>各二錢</small></p> | <p>右為末以生雀燎毛去腸拭淨洗用三個入藥於其 腹中麻繩繫定濕紙數重裹煨香熟空心嚼食溫酒 送下</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>治寒疝來去每發絞痛 <small>出尉後方</small></p> | <p>附子 <small>一枚</small> 椒 <small>三百粒</small> 半夏 <small>十個</small> 乾姜 <small>十兩</small></p> | <p>右大棗三十枚粳米一升水七升煮米熟去渣一服 一升令盡</p> | <p>牡丹丸 <small>方見本門諸疝類</small> 治寒疝心腹刺痛休作無時及治婦</p> | <p>人月病血刺疼痛</p> | <p>烏頭湯 治寒疝手足逆冷身體疼痛冷汗自出</p> | <p>烏頭 <small>炮製去皮臍二兩</small> 桂 <small>去粗皮一兩</small> 細辛 <small>去苗葉三分</small></p> |
|---|--|--|---|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|----------------|----------------------------|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---|----------------------|---------|----------------|--|----------------------|--------|-----|--------|-----------|--|----------------------|---|---------------------------------|---|
| 右剉如麻豆每服三錢水一盞煎七分去滓溫服 | 牡丹丸 治寒疝來去疼痛冷汗自出 | 牡丹皮 桂 <small>去粗皮</small> 烏頭 <small>炮製去皮</small> 共二兩 臍二枚 | 右為末煉蜜為丸梧桐子大每服二十九溫酒送下 | 空心日午卧時服 | 木香丸 治寒疝繞臍痛結硬不消 | 木香 附子 <small>炮製去皮臍</small> 礪砂 <small>飛研各一兩</small> | 右為細末煮麵糊和丸如梧桐子大每服三十九溫 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 酒下空心食前 | 姜桂丸 治腎冷寒疝 | 良姜 <small>半兩</small> 巴豆肉 <small>二十一粒截斷</small> 同炒焦去巴豆 桂心 <small>半兩</small> | 右為末醋麵糊丸梧桐子大每服三十九溫酒食前 | 服 | 烏頭湯 治寒疝滿逆手足不溫偏身疼痛灸刺諸藥不能治一名烏頭桂枝湯 | 烏頭 <small>實大者三枚</small> 白蜜 <small>一斤</small> 桂 <small>去粗皮二兩</small> |
|---------------------|-----------------|---|----------------------|---------|----------------|--|----------------------|--------|-----|--------|-----------|--|----------------------|---|---------------------------------|---|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------|--|------------|-------------|---------------|--|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 備急方 治臟寒氣疝腹疼 | 右水五升煮取一升半再服 | 牡蠣 甘草 官桂 <small>兩 各二</small> | 又方 <small>出肘後方</small> | 右酒四升煮二升分為二服 | 吳茱萸 <small>三兩</small> 生姜 <small>四兩</small> 豉 <small>二合</small> | 治寒疝來去每發絞痛方 | 右水二升煮取一升分三服 | 欽定四庫全書 普濟方 | 半夏 生姜 <small>各半升</small> 桂 <small>八兩</small> | 治寒疝腹痛飲食下難不覺其流行方 | 方以桂枝湯烏頭煎服 | 一升以桂汁和蜜煎合煎之得一升許服又云范注 | 如醉伏得吐為中病也外臺云以水二升半煮桂取 | 汁共和別煎取二盞許服半盞溫服未知再服其知 | 一處以水三盞煮桂候減半濾出桂將桂汁并煎蜜 | 右先以慢火煎蜜及烏頭候蜜減半濾出烏頭別就 |
|-------------|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------|--|------------|-------------|---------------|--|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|



沉香 木香

右以水磨濃又傾小盞內逐旋磨及一服許煎數沸
即服無不作效

治寒疝腹痛飲食不下喉中噎塞

川椒 去目及閉口者微炒去汗 乾姜 炮製 桂心 各半兩

右為散水三大盞煮取二盞去渣內牽牛子末一兩
又煎一盞三分去滓分溫三服

倉卒散 治寒疝入腹心腹卒痛及小腸膀胱氣疝刺

欽定四庫全書

普濟方

脾腎氣攻攣急極痛不可忍屈伸不能服中冷熏如

石自汗出一名奪命散

山梔子 四十九個 附子 一枚
燒半過

右剉散每服二錢水一盞酒半盞鹽一捻溫服即愈暑

症香薷散加瞿麥木通每服四錢食鹽少許煎服如

外腎痛者用川椒半兩白麵二匙以鹽水和作餅子

裹之仍用絹綿包定乾即再用鹽水搜和再用立效

治寒疝心痛四肢逆冷全不欲食



用桂心二兩去皮搗羅為散不計時熱酒調下一錢

大烏頭湯 治寒疝繞臍苦痛發即自汗手足厥寒其

脉沉弦

用烏頭十五枚熬黑不切水三升煮取一升去滓

內蜜二升煎令水氣盡得二升強人服七合羸人

五合一服未效明日更服

療疝瘕冷氣方

欽定四庫全書

普濟方

用採鼠李子日乾九蒸九曝酒浸服三合日兩服

漸加三服能下血及內積滯物

治寒疝小腹及陰中相引痛自汗出欲死

用丹參一兩杵為散每服熱酒調下二錢七住時

後用沙參

療寒疝不能食

取馬藺子一斤每日取胡桃許以麵拌熟煮吞之

然後依常飯日再服服盡必愈一除腹內一切諸



疾消食肥肌仍時燒磚熱以羖羊毛作毡裹却毡
上熨之日一度尤佳

治寒疝來去每發絞痛

出肘
後方

用宿烏鷄一頭治如食法生地黄七斤合細剉之
着甑篋中蒸同器盛須取汁清旦服日補令盡其
間當下諸寒癖訖作白粥漸食之以疝者下三劑
愈

治寒疝來去每發腹中疔痛

出聖
惠方

欽定四庫全書

普濟方

吳茱萸 半兩湯浸七
次焙乾微炒 桂心 一兩

右為散每服二錢水一鍾煎六分去滓食前溫服

寒疝心腹痛 附論

夫疝者痛也本由寒氣內積陽衰陰盛寒邪不散因
而攻擊或冷氣搶心或腹內疔刺發即俱痛故名寒疝
心腹痛也

寒疝心腹痛者由陰氣積結所生也陰氣不散則寒氣
盛寒氣盛則痛上下無常言冷氣上衝於心故令心痛



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|--|-----------------------|--|-----------|--|----------------------|--|----------|--|-----|--|--------|--|--------|--|----------------------|--|---------|--|-----------------------|--|----|--|----------|--|---------|--|-------|--|--------|--|------|--|---|--|---|--|
| 也 | | 方 | | 吳茱萸丸 治寒疝心腹痛或逆搶心煩滿不得卧惡 | | 風驚惕不食亦發寒熱 | | 吳茱萸 湯洗焙 炒一兩 細辛 去苗 | | 芍藥 柴胡 去苗 | | 旋復花 | | 黃芩 去黑心 | | 紫苑 去苗 | | 人參 | | 白朮 | | 乾姜 炮 | | 白 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 茯苓 去黑皮 | | 桂 去粗皮 | | 附子 炮製去臍 | | 甘草 炙 | | 半夏 浸洗七次 | | 滑當歸 去一兩 | | 切焙共 | | 普濟方 | | 欽定四庫全書 | | 右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十九至三十九溫 | | 酒下不拘時 | | 吳茱萸丸 治寒疝心腹痛面目青黃不下飲食縱食 | | 嘔逆 | | 吳茱萸 湯浸七次 | | 焙乾微炒 | | 赤茯苓 | | 乾姜 炮製 | | 甘草 炙 | | 赤 | | 微 | |
| 兩各半 | | 白朮 | | 前胡 去蘆 | | 桂心 | | 赤芍藥 | | 半夏 湯浸 | | 七次 | | 當歸 剉 | | 微 | | 川椒 去目及開口 | | 陳橘皮 湯浸去 | | 皮 | | 穰 | | 焙 | | 附子 炮製去臍 | | 人參 去蘆 | | 木香 共一兩 | | | | | | | |



右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服
以生姜下二十九日四五服

當歸湯 治寒疝心痛及諸虛冷氣滿悶

當歸剉微炒 乾姜炮製 甘草炙微赤剉 黃耆剉 人參

去蘆 川椒去目及閉口 半夏湯洗七次去滑 青橘皮湯浸去白

穰頭 附子炮裂去皮 厚朴二兩去粗皮塗生 桂心兩

右為散每服三錢水一中盞生姜半分煎六分去滓

不拘時稍熱服

欽定四庫全書

普濟方

瓜子散出聖惠方 治寒疝脅支滿飲食不下寒中心腹痛

及吐痢背項強急不得俛仰

甜瓜子微炒 桂心 白芷 芎藭 川烏頭 木香

當歸剉碎微炒 白薇 川椒去目及閉口 乾姜炮製

剉 吳茱萸湯浸七次 防葵各半

右為細末和搗三二百杵如梧桐子大每服生姜湯

下二十九日四五服

七熬飯後丸 療手足熱腹中寒疝不能飲食數心腹



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------|-------------------|---------------------------------|---|---------------|--|--|----------------------|--------|--|--------|---|--|
| 痛 | 茯苓 <small>五兩</small> 乾姜 <small>六兩</small> 共 <small>十二兩</small> 令焙 大黃 <small>二斤</small> 柴胡 <small>十兩</small> 芎藭 <small>七兩</small> 葶 | 薏子 <small>一升</small> 蜀椒 <small>一兩</small> 炒 芒硝 <small>一升</small> 重 <small>十兩</small> 杏仁 <small>一升</small> 去皮尖雙 | 加桂心 <small>五兩</small> 附子 <small>三兩</small> | 右藥乾姜茯苓不熬餘皆熬搗篩以蜜和丸梧桐子 | 大每服七丸日三忌猪肉冷水醋物生葱等 | 木香散 <small>出聖惠方</small> 治寒疝心痛悶絕 | 木香 <small>一兩</small> 高良姜 <small>一兩</small> 赤芍藥 赤茯苓 乾姜 <small>炮製</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 陳橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 訶黎勒 <small>煨用皮</small> 枳壳 <small>麸炒微黃去穰共半兩</small> 芎 | 薊 草豆蔻 <small>去皮</small> 牽牛子 <small>微炒共三兩</small> | 右為散每服三錢水一中盞生姜半分煎六分去滓 | 不拘時稍熱服 | 白朮丸 <small>出聖惠方</small> 治寒疝心腹痛四肢不和面色青冷不欲 | 飲食氣漸羸弱 | 白朮 <small>一兩</small> 青橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 厚朴 <small>去粗皮塗生姜汁炙令香熟</small> 桂心 | 附子 <small>炮製去皮臍</small> 草豆蔻 <small>去皮共一兩</small> 乾姜 <small>炮製</small> 當歸 |
|---|---|---|--|----------------------|-------------------|---------------------------------|---|---------------|--|--|----------------------|--------|--|--------|---|--|



| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---|
| 芎藭 木香 <small>共半兩</small> 山芋子 <small>三分</small> | 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如桐子大每服不拘時熱酒下三十丸 | 吳茱萸丸 治虛冷痰癖疝食不消心腹痛氣弱欲食虛憊羸瘦 | 吳茱萸 烏頭 <small>炮共十兩</small> 紫苑 白薇 <small>共三分</small> 桂心 <small>六兩</small> 前胡 芍藥 細辛 芎藭 黃芩 <small>共五分</small> | 右為散蜜和酒服如梧子大五丸日三稍加之忌猪肉冷水桃李生葱菜等 | 人參湯 治寒疝心腹痛胸脇支滿不下食汗出嘔逆 | 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 栝榔 <small>剉</small> 木香 芍藥 芎藭 當歸 <small>切</small> 桂皮 <small>去粗皮</small> 青橘皮 <small>湯浸去白焙共一兩</small> | 右為散每服三錢水一鍾煎七分去滓溫服不拘時 | 芎藭丸 <small>出聖惠方</small> 治寒疝心腹疼痛脅支滿飲食不下 芎藭 <small>一兩</small> 川椒 <small>一兩半</small> 口者 <small>微炒出汗</small> 防葵 白薇 桂 心 白朮 吳茱萸 <small>湯浸七次</small> 乾姜 <small>炮製</small> 川烏頭 |
|--|-----------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---|



炮裂去皮
臍共一兩

右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服生
姜橘皮湯下三十九日四五服

柴胡湯 治寒疝心腹痛

柴胡 去苗 大棗 去核焙 黃芩 去心 人參 甘草 炙 半

夏 湯浸去滑 桂 去粗皮 芍藥 共一兩

右為散每服三錢水一盞生姜一片煎七分去滓温

服不拘時

欽定四庫全書

普濟方

木香散 出聖惠方 治寒疝心腹脅支滿不能下食

木香 三分 檳榔 赤茯苓 人參 去蘆頭 當歸 剉碎 桂

心 前胡 去蘆頭 青橘皮 湯浸去白穰各一兩

右為散每服四錢水一鍾生姜半分棗三枚煎六分

去滓不拘時稍熱服

蜀椒湯 主寒疝氣心痛如刺繞臍腹中盡痛自汗出

欲絕夫疝者痛也陰氣積結所生也陰氣不散則寒

氣盛寒氣盛則痛上下無常言冷氣上衝於心故冷



| | |
|--|---|
| 心痛也 | 蜀椒 <small>二百枚 出汗</small> 附子 <small>一枚 炮</small> 乾姜 <small>半兩</small> 半夏 <small>十二枚 洗</small> 大棗 <small>十二</small> |
| 右切以水七升煮取三升澄清熱服一升不瘥更服 | 擘 <small>枚</small> 粳豆 <small>一升</small> 甘草 <small>一兩 炙</small> |
| 一升用以療心腹痛差效困急欲死逐結寒上下痛 | 良忌猪羊肉錫海藻菘菜 |
| 地黄湯 治寒疝心腹痛汗出厥冷 | 生地黄 <small>兩 焙三</small> 甘草 <small>炙</small> 白茯苓 <small>去黑心</small> 人參 當歸 <small>焙切</small> |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 右前五味細剉將羊肉用水二斗煮取一斗去羊肉 | 二兩 羊肉 <small>去脂切</small> |
| 入諸藥煮取七升入葱白一把切棗十四枚擘破再 | 三斤 |
| 煮六升絞去滓每溫服一盞不拘時 | |
| 蜀椒散 <small>出聖方</small> 治寒疝心痛如刺絞臍腹盡痛自汗出氣 | |
| 欲絕方 | |
| 川椒 <small>一分 去目及閉口者微炒去汗</small> 附子 <small>一個 炮製 去皮臍</small> 乾姜 <small>炮製 剉</small> 桂 | |
| 心 <small>共半兩</small> 半夏 <small>湯浸七次去滑</small> 甘草 <small>炙微赤</small> | |



| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|----|--------------------------------------|--|---|---------------|--|-----------------------------------|-----------|
| 白木 青橘皮 穰共一兩 | 川椒 者 <small>去目及開口</small> 微炒出汗 乾姜 共半兩 附子 皮 <small>炮製去</small> 穰 檳榔 | 椒附散 <small>出聖</small> 治寒疝心腹痛如刺不下飲食自汗出氣 | 欲絕 | 右件藥除羊肉外為散以水三大盞合煮取兩大盞 半去滓不拘時稍熱服一小盞 | 當歸 <small>半斤</small> 華芩 <small>兩半</small> | 當歸散 <small>出聖</small> 治寒疝心腹痛不下飲食痛甚引脇肋間 及腹裏急者 | 右為散不拘時以熱酒調下一錢 | 蓬莪茂 附子 皮 <small>炮製去</small> 桂心 共一兩 胡椒 兩半 芎藭 | 治寒疝心痛四肢冷逆不欲食 <small>出聖</small> | 白木 分共二 |
| 欽定四庫全書 | | | | | | | | | | |
| 普濟方 | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------|---------------|-----------|----------------------|----|--|------------|--|----------------------|
| 當歸湯 <small>出金匱方</small> 治寒疝心腹痛裏急 | 右為細末不拘時熱酒送下一錢 | 高良姜 <small>剉</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 桂心 <small>各一兩</small> | 治寒疝心腹痛四肢逆冷不欲食 <small>出聖惠方</small> | 丸及二十九日再服忌生菜熱麵炙肉笋蒜猪魚 | 右為末蜜和丸如梧子大空心酒下十丸漸加十五 | 附子 <small>二兩炮去皮</small> 桃仁 <small>三兩去皮尖雙仁熬</small> 蒺藜子 <small>一升去角尖熬</small> | 附子丸 療寒疝下牽小腹心腹痛 | 欽定四庫全書 普濟方 | 不拘時稍熱服一小盞 | 右件除羊肉外為散水五大盞合煮取兩盞半去滓 | 飲食 | 高良姜 <small>剉</small> 赤芍藥 <small>剉</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 桂心 <small>共一兩</small> 羊肉 <small>一斤</small> <small>半細切</small> | 六分去滓不拘時稍熱服 | 高良姜羊肉湯 <small>出聖惠方</small> 治寒疝心腹痛及脇肋裏急不下 | 右為散每服三錢水一中盞入生姜半分棗三枚煎 |
|--|---------------|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------|---------------|-----------|----------------------|----|--|------------|--|----------------------|



當歸 兩 切三 生姜 兩 切五 羊肉 去脂膜切 作片一斤

右以水一斗煮取五升去滓每服一盞不拘時日三夜二若寒多者加生姜切一斤痛多而嘔者加橘皮二兩白朮一兩加生姜者亦加水五升煮取三升二合服之

治寒疝心腹脇引痛諸藥不可近者 出本草

以烏頭五枚大者去芒角及皮四破以白蜜一升

煎令透潤取出焙乾搗篩又以熟蜜丸冷鹽湯吞

欽定四庫全書

普濟方

下二十九丸如梧子永除又法用煎烏頭蜜汁以桂枝湯五合解之飲三合不知加五合其知者如醉者以為中病

寒疝積聚 附論

夫積聚者由寒氣在內所生也血氣虛弱風邪搏於腑臟寒多則氣澁而生積聚也積者陰氣五臟所生如發不離其部故上下有所窮也聚者陽氣六腑所成也故無根本上下無所留心但諸臟腑受邪初未能為積聚邪



氣留滯不去乃成積聚其為病也或左右脇下如覆杯
或臍上下如臂或胃管間覆大如盤羸瘦少氣或洒淅
寒熱四肢不收飲食不為肌膚或累累如桃李或腹滿
嘔泄寒則痛故云寒疝積聚也其脉駛而緊積聚浮而
牢積聚牢強急者生虛弱急者死也

方

續命散 一名食菜萸圓 治寒疝積聚邪氣往來厥逆搶心痛羸

瘦少氣胸脇滿不嗜食

欽定四庫全書

普濟方

食菜萸 二兩 芍藥 細辛 去苗 前胡 去蘆頭各 乾姜

炮烏頭 炮裂去皮臍 紫苑 去苗 黃芩 去黑心 白朮

白薇 芎藭 人參 生乾地黄 焙各一兩一分方用熟地黄

蜀椒 去目及閉口炒出汗 桂 去粗皮各

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服七丸米飲或温

酒下食前服一方無黃芩有當歸忌生冷油膩滑物

桂心湯 治寒疝積聚心腹疼痛結塊不消

桂 去粗皮 大黃 畧炮 桔梗 剉炒 附子 炒製去皮臍 木香 白



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| <p>木 當歸 <small>切</small> 煨 檳榔 赤芍藥 <small>各一兩</small> 芎藭 高良姜</p> | <p>右咬咀如麻豆每服三錢水一鍾煎七分去滓溫酒服不拘時</p> | <p>芫花丸 <small>出聖惠方</small> 治寒疝積聚動搖大者如鼈小者如杯乍來乍去在於胃管大腸不通風寒則腸鳴心下寒氣</p> | <p>上搶胸脇支滿</p> | <p>芫花 <small>二兩醋拌炒令乾</small> 椒目 川大黃 <small>剉碎</small> 細辛 川烏</p> | <p>頭 <small>炮製去皮臍</small> 赤芍藥 赤茯苓 桂心 木香 <small>各一兩</small></p> | <p>半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 吳茱萸 <small>湯浸七遍焙乾</small></p> | <p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以溫酒下七丸日三服當下如泥其病即愈</p> | <p>鼈甲湯 治寒疝積聚心腹結痛飲食不下</p> |
| <p>剉 枳實 <small>去穰麩炒共半兩</small></p> | <p>木 赤芍藥 木香 枳殼 <small>去瓢炒</small> 訶梨勒 <small>皮炮去</small> 檳榔</p> | <p>剉 枳實 <small>去穰麩炒共半兩</small></p> | <p>木 赤芍藥 木香 枳殼 <small>去瓢炒</small> 訶梨勒 <small>皮炮去</small> 檳榔</p> | <p>木 赤芍藥 木香 枳殼 <small>去瓢炒</small> 訶梨勒 <small>皮炮去</small> 檳榔</p> | <p>木 赤芍藥 木香 枳殼 <small>去瓢炒</small> 訶梨勒 <small>皮炮去</small> 檳榔</p> | <p>木 赤芍藥 木香 枳殼 <small>去瓢炒</small> 訶梨勒 <small>皮炮去</small> 檳榔</p> | <p>木 赤芍藥 木香 枳殼 <small>去瓢炒</small> 訶梨勒 <small>皮炮去</small> 檳榔</p> | <p>木 赤芍藥 木香 枳殼 <small>去瓢炒</small> 訶梨勒 <small>皮炮去</small> 檳榔</p> |



| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|
| <p>右為散每服三錢水一盞生姜三片煎七分去滓温服不拘時候</p> | <p>桔梗丸 治寒疝邪氣往來堅固積聚不散多寒不得臥苦汗出大小便不利</p> | <p>桔梗<small>劉</small> 藜蘆<small>去蘆頭炙</small> 葶蘆子<small>紙上</small> 厚朴<small>去麤皮</small> <small>劉</small> 附子<small>去皮臍炮製</small> 人參 沙參 桂<small>去麤皮</small></p> | <p>杏仁<small>去皮尖雙仁</small> 特生礬石<small>一兩燒</small> <small>炒五十枚</small></p> | <p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸或七丸米飲或温酒下日三</p> | <p>桔梗丸<small>出聖</small> 治心腹牢強寒疝邪氣往來堅固積聚苦寒煩悶不得眠臥夜苦汗出大便堅小便不利食不生肌</p> | <p>桔梗<small>去蘆頭</small> 甜葶蘆<small>微炒</small> 藜蘆<small>去蘆頭</small> 桂心 厚朴</p> | <p><small>去麤皮塗生薑</small> 附子<small>炮製去</small> 當歸<small>劉</small> 鼈甲<small>塗醋</small> <small>汁炙令香熟</small> 皮臍<small>微</small> 炒 微 炙 微</p> | <p>右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於食</p> |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|---|-----------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---|------------|---|------|--------------------------|--|-------------------------|---|
| 前溫酒下十五丸 | 檳榔湯 治寒疝積聚結塊攻注心腹脹滿 | 檳榔 <small>生</small> 芎藭 桔梗 <small>剉</small> 當歸 <small>切</small> 桂皮 <small>去</small> 赤芍藥 | 白朮 木香 <small>各半</small> 大黃 <small>剉碎</small> | 右為散每服二錢七水一盞煎六分去滓溫服不拘時 | 木香湯 治寒疝積聚來去攻擊疼痛不欲飲食 | 木香 訶梨勒皮 <small>炮</small> 檳榔 <small>剉</small> 厚朴 <small>去粗皮</small> 青橘 <small>生薑汁炙</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 皮 <small>湯浸去白</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 白朮 人參 桂 <small>去</small> | 皮各一分 | 右為散每服三錢水一盞生姜三片煎七分去滓溫服不拘時 | 鼈甲丸 <small>出聖</small> 治寒疝積聚固結不通繞臍切痛腹中脹 | 滿風入五臟憂患所積用力不節筋脉勞傷羸瘦不能飲食 | 鼈甲 <small>一兩</small> 塗醋炙 甘草 <small>炙</small> 甜葶藶 <small>微炒</small> 桂心 |
|---------|-------------------|--|--|-----------------------|---------------------|---|------------|---|------|--------------------------|--|-------------------------|---|



| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|-----|---|
| 川烏頭 <small>炮製去皮臍</small> | 川大黃 <small>剉碎</small> | 芎藭 | 赤芍藥 | 枳 | | | |
| 榔 <small>各半</small> | 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服食 | 前生姜橘皮湯下二十九 | 白朮湯 治寒疝凝結積聚不散攻注腹內疼痛不下 | 飲食 | | | |
| 白朮 <small>二兩</small> | 赤茯苓 <small>去黑皮</small> | 枳殼 <small>去瓢</small> | 人參 | 桔梗 <small>剉</small> | 桂 | | |
| 皮 <small>去麤</small> | 荆三稜 <small>炮製</small> | 枳榔 <small>剉各一兩</small> | | | | | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 | | | | | | |
| 右為散每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不拘時 | 枳榔湯 治寒疝積聚胸腹堅急脹滿不飲食 | 枳榔 <small>生剉</small> | 桃仁 <small>去皮尖</small> | 郁李仁 <small>炒去皮</small> | 木香 | 荆三稜 | |
| 炮各一兩 | 桂皮 <small>去麤</small> | 青橘皮 <small>湯浸去白</small> | | | | | |
| 右為散每服三錢水一盞生姜三片煎七分去滓溫 | 服不拘時候 | 附子丸 治寒疝冷心腹積聚繞臍切痛飲食不下 | 附子 <small>炮製去皮臍</small> | 吳茱萸 <small>湯浸七遍</small> | 細辛 | 藁本 | 川 |



| | |
|---|--|
| 烏頭 <small>炮裂去皮臍</small> 檳榔 <small>各一兩</small> | 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服以燒酒下二十九日三四服 |
| 藿香子丸 <small>一名香橘散</small> | 治寒疝積聚臍腹疼痛兩脇脹滿及一切冷氣刺痛皆治 |
| 藿香子 <small>炒</small> 檳榔 <small>炮</small> 荆三稜 <small>炮</small> 青橘皮 <small>湯浸去白鹽炒黃各半兩</small> | 木香 <small>一分</small> |
| 右為散每服二錢入鹽少許沸湯點服不拘時 | 欽定四庫全書 |
| 香豉丸 療積年腹內宿結疝冷氣及諸癖癥等 | 普濟方 |
| 香美爛豉 <small>曝乾微蒸令香即止</small> 小芥子 <small>揀去土石微熬令</small> | 右為末煉蜜丸空腹酒服二十九丸漸加至三十九日二服初服半劑以來腹中微繞痛勿怪之是此藥攻病之候 |
| 陰疝 <small>附論</small> | 黃帝鍼經曰足厥陰之脉環陰器抵小腹是動則病丈夫癰疝即陰疝也嗜慾傷腎水涸竭無以滋榮肝氣故 |



| | |
|---|----------------------------------|
| 留滯內結發為陰疝之病也世俗論陰疝者為腎餘氣 殊不知邪實又本於肝經也治法宜瀉邪氣之實補肝 經之虛 | |
| 方 | |
| 昆布丸 治陰疝腫大偏墜 | 昆布 洗去鹹炙 海藻 洗去鹹炙 蒺藜子 炒去角 蕪荑仁 炒 檳榔 |
| 梨勒 炮去核 各三分 陳橘皮 炒去白 桃仁 去皮尖雙 兔絲子 | 剉各一兩半 枳殼 去瓢炒 大麻仁 研各二兩 木香 黃耆 剉 訶 |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 酒浸一宿別 搗各一兩 | |
| 右為末和勻煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心 食前溫酒或鹽湯下 | |
| 葫蘆巴煮散 治陰疝攻痛 | 葫蘆巴 沉香 馬蘭花 蓬莪茂 煨 麝香子 炒各 |
| 半兩 棟實 取肉 麩炒 木香 姜黃 檳榔 剉 桂 去麤皮 附 | |
| 子 炮製去皮 臍三分 甘草 炙剉 半兩 | |
| 右為散每服三錢水半盞煎七分空心食前和滓溫 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|---|----------------------|-------|--------------|---------------|---|--|--|----------------------|-------|---------------------------------------|--|--|
| 服 | 葫蘆巴丸 治陰疝氣攻疼痛 | 葫蘆巴 補骨脂 白豆蔻 <small>去皮</small> 青橘皮 <small>去白</small> 草薢 | 懷香子 <small>炒</small> 附子 <small>炮製去皮</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸切焙</small> 牛膝 <small>酒浸切焙</small> | 桂 <small>去麤皮</small> 防風 <small>去蘆</small> 兔絲子 <small>酒浸搗各一兩</small> | 右為末酒煮麵糊為丸如菘豆大每服二十九空心 | 生姜鹽湯下 | 桃仁湯 治陰疝牽引小腹痛 | 欽定四庫全書 普濟方 | 桃仁 <small>去皮尖</small> 吳茱萸 <small>湯洗焙乾炒</small> 陳橘皮 <small>去白切焙</small> 桂皮 <small>去麤</small> | 海藻 <small>湯洗去鹹</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 羌活 <small>去蘆頭</small> 蒺藜子 <small>炒</small> | 角各一兩 角各一兩 兩半 檳榔 <small>十枚</small> | 右為散每服五錢水一盞半生姜五片煎八分去滓 | 溫服不拘時 | 川烏頭丸 <small>出聖方</small> 治陰疝積聚繞臍腹痛飲食不下 | 川烏頭 <small>炮製去皮</small> 荆三稜 <small>煨</small> 桂心 木香 郁李仁 | 湯洗去微 <small>剉各一兩</small> 吳茱萸 <small>湯浸七遍</small> 細辛 甘草 <small>炙剉</small> 藁 |
|---|--------------|--|--|---|----------------------|-------|--------------|---------------|---|--|--|----------------------|-------|---------------------------------------|--|--|



| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|----------------------------|--|---|---------------|------------|-----------------------------------|---|---------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 木香丸 治陰疝急脹疼痛卵腫 | 木香 陳橘皮 <small>炒去白</small> 萊菔子 <small>炒</small> 青橘皮 <small>炒去白</small> 桂 <small>去麤</small> | 夜臥溫酒下 | 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸空心日午夜臥溫酒下 | 蜀椒 <small>去目并閉口</small> 附子 <small>炮製去皮臍</small> 桂 <small>去麤皮</small> 巴戟天 <small>去心</small> | 桃仁 <small>去皮尖雙</small> 芎藭 當歸 <small>切炒各半兩</small> | 椒附丸 治陰疝腫痛上攻臍腹 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為散每服二錢水一盞生姜半分煎五分下蜜半合更煎三沸令熱食前和滓溫服 | 川烏頭 <small>十枚炮製去皮臍</small> 桂枝 <small>二兩</small> | 諸藥所不能任者 | 川烏頭散 治陰疝腹腰痛手足逆冷身體疼痛針灸 | 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服二十丸生姜湯下 | 本 <small>各半兩</small> |
|---------------|---|-------|----------------------------|--|---|---------------|------------|-----------------------------------|---|---------|-----------------------|----------------------------|----------------------|



右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九溫酒下以
利為度

二氣丸 治陰疝上而不下臍腹疼痛

石硫黃 研 黑鉛 各一兩

右先以鉛於銚內鎔成汁次下硫黃炒煙焰透移下
候冷取出研為細末糯米糊丸如梧桐子大每服二
十九溫酒下

蒺藜湯 出衛生寶鑑 治陰疝牽引小腹痛諸厥疝即陰疝也

欽定四庫全書

普濟方

嘻欲勞痛不可忍之

蒺藜子 炒去角 附子 炮製去皮臍 山梔子仁 各一兩

右咬咀如麻豆每服五錢水一盞半煎八分去滓食
前溫服控鞏證茴香陳實丸亦治

沙參散 治陰疝牽引疼痛

沙參 一兩半 桂 去麤皮半兩 桃仁 四十九枚去皮尖雙仁炒研

右為散每服二十九溫酒調下不拘時

應痛丸 治陰疝撮痛不可忍者



| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|----------|--------------------|--|-----------------------------|------------------------|--|--|
| <p>韭子<small>炒</small> 芎藭</p> | <p>右等分為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心 溫酒下</p> | <p>陰疝腫縮 <small>附論</small></p> | <p>夫陰疝腫縮者寒邪客於厥陰之經而陽氣不能自溫 故令諸筋拘急陰器緊縮而腫痛也肝者筋之合也筋 者聚於陰器而絡於舌本脉不榮即筋縮急則引卵與 舌故舌卷卵縮者皆厥陰為病也</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>方</p> | <p>礪砂丸 治陰疝腫縮疼痛</p> | <p>礪砂<small>研</small> 木香<small>各半</small> 棟實<small>去核</small> 藿香子<small>炒</small> 荆三稜<small>炮</small> <small>兩一</small></p> | <p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心酒下</p> | <p>消腎丸 治下部腎囊脹腫擊攻疼痛</p> | <p>牽牛<small>半斤取頭末四兩二</small> 香附子<small>淨一兩半兩</small> 破 <small>兩炒熟二兩生用</small></p> | <p>故紙<small>一兩半兩</small> 青木香<small>一兩半兩</small> 川棟子<small>兩半</small> <small>半兩生用炒</small></p> |
|------------------------------|--|-------------------------------|---|------------------------------------|----------|--------------------|--|-----------------------------|------------------------|--|--|



| | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-------------------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|
| 半炒半 生用 | 右為細末用大蒜二十箇半煨半生爛搗三五百下 丸如梧桐子大每服五十九丸空心葱鹽湯下取大便 三二行不利再加如利大減忌濕麵 | 狼毒丸 治陰疔腫縮疼痛氣欲絕 狼毒 <small>灸二兩</small> 防葵 <small>炮</small> 附子 <small>炮製去皮 臍各一兩</small> | 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十丸溫酒下空心 日午臨臥服 | 欽定四庫全書 普濟方 | 黃連丸 治陰疔腫縮 黃連 <small>去鬚熟艾<small>灸</small></small> 杏仁 <small>去皮尖白 研各半兩</small> | 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸用鹽湯下 空心服 | 萬苴熨方 治陰疔腫縮疼痛 萬苴 <small>切半</small> 皂莢 <small>剉碎</small> 蜀椒 <small>去目及閉口者 炒出汗一兩</small> | 右三味少用水煮令相得不可太稀乘熱用布三兩 重裊熨腫處冷即易頻熨自消 |
|-----------|---|---|-------------------------------|---------------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|------------|-------------|----|-------------------------|--------|-----------|------------|------------------|---------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|------|-----------------------|
| 車前子塗方 治陰疝腫縮 | 右為散溫水調塗腫處或以絹帛敷之以瘥為度 | 蔓菁根 不拘多少剉碎 | 蔓菁散塗方 治陰疝腫縮 | 心服 | 右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸溫酒下空心服 | 槐子 炒一兩 | 槐子丸 治陰疝腫縮 | 欽定四庫全書 普濟方 | 以細研為散每服二錢溫酒調下不拘時 | 雞翅 左右俱用不限多少燒灰 | 雞翅灰散 治陰疝腫縮 | 煖洗至冷候汗出瘥 集驗方無礬石只二味 | 右為末每用藥一兩熟湯五升通手洗腫處良久再 | 雄黃 研 甘草 各一兩 礬石 研二兩 | 斗核痛者 | 雄黃洗方 治陰疝腫縮痛人所不能忍及陰腫大如 |
|-------------|---------------------|------------|-------------|----|-------------------------|--------|-----------|------------|------------------|---------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|------|-----------------------|



| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|---------------------|-------|----------|-------------------|-----------|
| 車前子 <small>不拘多少</small> | 右為末湯調塗腫處一方酒調服之 | 狼毒丸 治男子陰以卒縮入腹急痛欲死名陰疝 | 狼毒 <small>四兩</small> 防風 <small>二兩</small> 附子 <small>三兩</small> | 右為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三丸日夜三度 | 治男子陰疝 | 右用槐白皮煎淋浴 | 欽定四庫全書 普濟方 | 普濟方卷二百四十八 |
|-------------------------|----------------|----------------------|--|---------------------|-------|----------|-------------------|-----------|

