

欽定四庫全書									
普濟方卷二百八十三 明 周王朱橚 撰									
癰疽門									
諸癰疽									
黃芩散 治癰疽發背丹癰赤腫惡肉時行熱毒變作 赤色及眼赤腫生障翳病方									
黃芩 白芩 麻黃 <small>去節</small> 漏蘆 <small>真者</small> 白薇 枳殼 <small>去穢炒</small>									
升麻 白芍藥 川當歸 川牛膝 甘草 <small>已上各二</small>									
欽定四庫全書 普濟方									
兩 五 兩									
大黃									
右為粗末每服四錢水一中盞半煎至七分空心熱 服或利一二行如未利再服可加芒硝三錢未成者 散已成者立潰一云癰癰發背等疾服此獲安之後 宜常服四物湯交和黃耆建中湯空心煎服以禦未 來恐後再作									
青露散 治背疽一切惡瘡圍藥不散開									
白芩 白欵 白薇 白芷 白鮮皮 朴硝									



<p>脂 斤二</p>	<p>珍珠<small>研</small> 白欵 白礬<small>研</small> 黃芩<small>去黑尖</small> 蘭茹<small>各一兩</small> 猪</p>	<p>大黃 附子<small>炮裂去皮臍</small> 莽草 芎藭 雄黃<small>研</small> 雌黃</p>	<p>大黃蝕肉膏</p>	<p>成泥傳於患處四圍中間留瘡口</p>	<p>右以木鱉細切擣成泥後將山藥先去泥與之同擣</p>	<p>山藥<small>一尺六</small> 木鱉<small>六</small></p>	<p>治癰疽發背腎癰</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>乘熱安於患處</p>	<p>右和筒煮了收起用時再於沸湯煮令熱以筋夾筒</p>	<p>五倍<small>多用些</small> 白礬<small>少用子</small></p>	<p>吸筒 以慈竹為之削去青</p>	<p>用姜汁潤一方無黃栢</p>	<p>右各等分為細末用生姜自然汁調圍敷如乾時再</p>	<p>龍皮<small>即老松樹皮</small></p>	<p>青黛 黃栢 大黃 天花粉 青露散<small>即芙蓉葉老</small></p>
-----------------	---	--	--------------	----------------------	-----------------------------	--	----------------	-----------------------	---------------	-----------------------------	--	--------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------	---



右除研者并猪脂外剉碎先熬脂令沸下諸藥煎候赤色綿濾過去滓下研者藥攪勻傾出瓷器盛每日塗瘡日三五次以惡肉盡為度
當歸散 治癰疽發背金瘡已壞及未敗火瘡諸癩疥患
當歸 附子 <small>炮</small> 細辛 芎藭 續斷 牛膝 通
草 甘草 <small>炙</small> 白芷 <small>各二兩</small> 蜀椒 <small>三合</small> 芍藥 黃耆 <small>各一兩</small>
右咬咀以猪膏二升煎微火上以白芷色黃藥成絞
欽定四庫全書 普濟方
去滓以傅瘡上日三過忌海藻菘菜猪肉
乳香黃耆散 治一切惡瘡癰疽發背疔瘡疼痛不可忍者或瘡氣入腹神昏不醒嘔吐者或未成者速散之已成者潰敗膿不出刀削其惡肉下打撲傷損筋骨疼痛或婦人產後腹痛惡物不下
黃耆 當歸 <small>去蘆</small> 川芎 陳皮 麻黃 <small>去節</small> 甘草
芍藥 <small>各一兩</small> 人參 <small>五錢</small> 米殼 <small>二兩去根</small> 乳香 沒藥 <small>各五錢</small>
研錢另



右為末每服三錢水一中盞煎至七分去渣溫服如瘡在上食後如瘡在下食前服

內補散 一名木占斯散 治癰疽發背婦人乳癰諸癰未潰者

便消不消者令速潰疾愈

木占斯 人參 乾姜 一作云乾地黃 細辛 桂心

厚朴 敗醬 防風 栝萋根 桔梗 甘草

各一兩

右治下篩酒服方寸匕藥入咽覺流入瘡中若癰疽

欽定四庫全書

普濟方

灸之不能發壞者可服之未壞者去敗醬已發膿者內敗醬服藥日七八服夜二三服病在下當膿血出此為腸癰諸病在裏惟服此藥即覺其力痛者即不痛常服治諸瘡及疽痔瘡已潰愈婦人乳癰宜速服之一方無桂心一名木占斯散主癰腫堅結若已壞者速愈未壞者使不成癰便消一方粥飲調下亦可

狷皮散 治癰疽膿血內漏諸漏壞敗男發背女乳房及五痔方



獬皮 蜂房 <small>各一具</small> 地榆 附子 桂心 當歸 續斷 <small>各五分</small> 乾薑 蜀椒 藁本 <small>各四分</small> 厚朴 <small>六分</small>	右治下篩空腹以酒服方寸匕日三取瘥加斑猫七枚益良外臺秘要有杜仲無乾薑	椒薑散 治癰疽發背	蜀椒 乾薑 黃芩 人參 <small>各二錢</small> 桂心 小荳 <small>合一</small> 白斂 <small>半</small> 甘草 附子 防風 <small>各一兩</small> 芎藭 <small>二兩</small>	右治下篩酒服方寸匕日三夜二	欽定四庫全書 普濟方	秘傳連翹湯	連翹 升麻 朴硝 <small>各一兩另研</small> 玄參 芍藥 白斂 防己 射干 <small>各八分</small> 大黃 <small>一兩三錢</small> 甘草 <small>炙半兩</small> 杏仁 <small>十八</small>	枚 <small>去皮尖</small> 炒 <small>黃另研</small>	右除杏仁朴硝外為粗末却入杏仁朴硝末令勻每服三錢水一鍾二分煎至八分去滓空心服利下惡物為效	神功妙貼散 塗傅癰疽暈內使膿血化水收暈斂毒
--	-----------------------------------	-----------	--	---------------	---------------	-------	--	---	---	-----------------------



<p>腹皮 桑白皮 漢椒 白芷<small>各等分</small> 連根葱白<small>多用</small></p>		<p>莽草 苦參 貝母 射干 木通 蜂房 大</p>		<p>洗瘡方</p>		<p>右末每服二錢麥門冬十四粒煎湯調下</p>		<p>仙<small>各三錢</small> 甘草<small>生半兩</small></p>		<p>梗 苦參 赤小豆 赤芍藥 蔓荊子 葳靈</p>		<p>紅何首烏<small>半兩</small> 遠志<small>水浸取肉</small> 赤茯苓 川芎 北</p>		<p>紅內消散 癰疽內蘊熱外發熱用此</p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>藥以行之凡傳藥須是細末則不痛</p>		<p>藥上然後貼瘡久年蓬仰上竹葉亦得竹葉出水藉</p>		<p>紗攤藥以舊茶籠內白竹葉尾剪兩片如瘡勢先貼</p>		<p>暈邊收入裏留中間如錢大貼膏藥若瘡開大可用</p>		<p>右細末夾和井水入蜜調傅瘡色黯晦姜汁調傅從</p>		<p>花蕊石散<small>錢二貼</small></p>		<p>姜黃 五倍子<small>淡紅</small> 貝母 白芨<small>各三錢</small> 乳香<small>各二</small></p>		<p>南星<small>元白</small> 蓖麻子仁<small>各四錢</small> 半夏<small>生</small> 白芷<small>硝一</small> 沒藥</p>	
---	--	----------------------------	--	------------	--	-------------------------	--	---	--	----------------------------	--	---	--	------------------------	--	-------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------------	--	--	--	---	--



右煎湯密室中淋洗

五香連翹湯 治惡核癰疽惡瘡惡腫等已破未破疼
痛皆可治之

青木香 母丁香 一作鷄舌香 黃熟沉香 當門麝香

乳香 川升麻 桑寄生 川獨活 木通

牛舌大黃 蒸一方用兩半 連翹 各一兩

右剉散每四錢水二盞煮一盞須用銀銚煎如無用
銀一片空心熱服半日以上未利再服以利下惡物

欽定四庫全書

普濟方

為度未生肉前服不妨以宣去毒熱之氣○一方有
射干一味本方有竹瀝芒硝恐泥者不能斟酌故缺
之知者自當量入一方有黃耆藿香無獨活射干名
五香大黃湯○凡惡瘡一寸以下者曰癰以上曰癰
而瘡瘍亦非小疾有腫而冷者有腫而熱者有不腫
而冷者有不腫而熱者有肉色不變而腫者有腫而
不破者有破而無膿血者有破而不生肌肉者有膿
在膏膜之下若有膿在骨間者皆當與五香連翹湯



始發者即消膿成者自破可保全濟也肘後方有紫
葛甘草無通草治惡肉惡脉惡核風結腫氣痛要籍
喻義有黃耆甘草芒硝各六分翼云未瘥中間常服
佳與小兒篇方相重小有異處

加味十寄散 治癰發已成未成服內消三五日不效
或年四十已上氣血衰弱成者速潰未成者速散服
至瘡口合而止能固濟去舊生新是名固壘

當歸酒浸桂心不見火人參 土芎 香白芷 防風

欽定四庫全書

普濟方

去蘆桔梗 厚朴去粗皮甘草五支乳香另研沒藥另研

右前八味各等分同為末每服二盞酒調日三服病
愈而止不飲者麥門冬去心煎湯或木香湯

奪命更生散

乾葛 知母 貝母 荆芥各五錢 防風 細辛

獨蓮 白芷各半兩 青木香 澤蘭 甘草節各半兩

右咬咀每服五錢酒水各一盞薑五片煎至一盞溫
服潮熱皮膚受毒加大黃搗爛柴胡地龍地骨皮麻



黃 <small>節 不去</small> 嘔吐惡心脾胃受毒加母丁香瘡凹不起加	蜜水調蟬退發汗加黃芩山梔子燈心眼花心經受	毒先另服朱砂雄黃麝香為末薑酒下然後服前藥	喘嗽肺經受毒加木瓜黑牽牛麝鹽小腹脹大小便	閉結脾經受毒加苦葶藶枳殼木通通草麝香瘡冷	加當歸肉桂羅參木香用前藥除獨蓮如瘡發痛及	身上有熱再進一服仍服前藥如當日瘡痛身熱次	早又冷加附子一隻去防風如眼大黃色暈黑汗冷	欽定四庫全書 普濟方	汗粘手足冷至膝瘡硬不起者不治	六化丹 庶幾神化其藥而俗子所珍以其能化風化	熱化毒化結化積化膿為水故曰六化丹即痒丸丸	之易名也	犀角 <small>生者</small> 黃芩 大黃 巴豆 <small>半兩 去油</small> 白斂 升麻	一兩 當歸 梔子仁 <small>去皮</small> 防風草 甘草 <small>炙</small> 天南	星 黃耆 <small>半</small>	右為細末以順流新汲早潮水丸如梧桐子大每服
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------	-----------------------	----------------------	------	--	--	-----------------------	----------------------



五丸不拘時候隨證量大小用之

內托散 治一切癰疽毒腫發背發肩發髭發鬢發腦

發手發足附骨等疽應是瘡瘍毒腫未膿者即消散

已膿者即破潰已潰者即收斂消毒順氣托裏定痛

收瘡口散腫毒及腸胃癰皆可用化毒排膿內補

黃耆 當歸 川芎 白茯苓 芍藥 白芷

甘草 人參 厚朴 去粗皮用
生薑汁製 桂心 去皮已上
各等分

右一十味為細末每服三錢至五錢不計時候溫酒

欽定四庫全書

普濟方

調下如不飲酒以木香湯調下

九珍散 治一切癰瘡癰腫毒因氣壅血熱而生者

當歸 川芎 白芷 赤芍藥 生地黄 熟地

黃瓜萋 甘草 大黃 茯苓 各等分

右咬咀每服四錢以水二盞酒一盞煎至二盞去滓

溫服兼治婦人乳癰等瘡

芎歸托裏散 托裏排膿生肌

川芎 當歸 白芍藥 炒 木香 白芷 茯苓 各半



木通	續斷	桑寄生	甘草	<small>微炙各半</small>			
木香	丁香	藿香葉	沉香	乳香	連翹		
<small>各一分</small>							
五香散	治癰疽須要香氣透達經絡						
皮湯淋	只摻若紅腫多汁生地黃研汁調傅仍前苦參桑白						
乳香	<small>二錢半</small>	赤小豆	片姜黃	直殭蠶	貝母	白芨	<small>各四錢</small>
爐甘石	<small>綠者十分細一兩</small>	天南星	半夏	<small>生各半兩</small>	五倍子		
欽定四庫全書	普濟方						
爐峯散	治癰疽腫毒						
右細末井水入蜜調傅紗貼							
沉水膏	癰疽發背排膿斂毒						
天南星	<small>三分</small>	白芨	白芷	赤小豆	半夏	貝母	<small>生</small>
<small>各半兩</small>							
木鱉子仁	<small>去油</small>	乳香	沒藥	<small>各二錢半</small>	雄黃	<small>一錢</small>	
右細末井水入蜜調傅紗貼							
人參	辣桂	丁香	甘草				
<small>兩</small>							
右末每二錢食前米湯調下							



右剉每服三錢井水一碗煎至七分入麝香少許
患在上食後服患在下食前服五發證皆令人頭痛
惡心寒熱氣急拘攣此藥療之如有熱加燈心桑白
皮

千金漏蘆湯 治癰疽發背丹癰惡肉時行熱毒發作

赤腫及眼赤痛生障翳等疾并癩瘡初發吹妳腫痛
一切無名惡瘡雖覺所苦細微不可輕慢急服此藥
並皆內消更不成膿若發背癰已成膿者當排日服

欽定四庫全書

普濟方

之直至膿盡

大黃三兩 蒸 漏蘆 白芨 黃芩 麻黃去節 枳殼炒

升麻 白欽一方用 白薇 芍藥 甘草炙各 二兩

右剉散每四錢水二盞煎七分空心熱服以快利為
度澹寮方云漏蘆湯後說本方有芒硝今去之若見
熱而實者加大黃作五兩或加芒硝服病人更自量
虛損服之

化毒方 一名十全內托 散一名十寄散 治一切癰疽瘡癤未成者速



敗已成者速潰敗膿自出無假手擠惡肉自去不犯
針刀服藥後疼痛頓減此其當用有效也此方得自
於都下異人時有苦背瘍者七十餘日諸藥試遍不
獲痊效衆醫環立如堵出是方示之相目而笑曰是
豈癰背所用藥耶因謂之曰古人用方自有意義觀
其所用藥性平和縱未能已疾必不能壞病服之何
害迺治斯方藥與之以熱酒一升許下藥五六錢少
頃減七分數服後瘡大潰膿血流迸若有物自內托

欽定四庫全書

普濟方

出服半月瘡口遂合若未嘗有所苦者又有苦腸疾
者其痛異常醫者畧曉時意謂此藥大能止痛試與
餌之當日下膿三二椀許痛亦遂止思察之乃腸癰
也又一老人忽曾間發腫根脚甚大毒氣上攻如一
瓢然斜插項右不能轉動遂以此藥與服明日腫毒
既散餘一小瘤如粟米大又明日帖然如故無事又
一人發腦疽疑此藥不能救遂殞於庸醫手次年其子
復苦此疾與父無異病狀一同因懲父之失縱飲酒



淨洗切焙乾	是換芎不用	浸透微火炙酥再剉入衆藥中	洗淨寸截搥碎擘如絲狀以鹽湯	者溫水洗薄切焙乾黃耆者長一二尺不開叉者	尾狀滋潤甜辣香芬	人參用新羅者團結重實滋潤	者先洗淨去蘆薄切焙乾當歸肥大擇如馬	虛弱此大能消風生血	瘡癬未成者速敗已成者速潰凡瘡痒者多是心血	十全之功其可尚也一方排膿內補十宣散治癰疽	血排膿止痛生肌長肉等藥五毒不成而坐收瘍醫	去生遠矣詳味此方其所用藥皆發散風毒調理氣	甚榮衛不調所致治之不早則外壞肌肉內攻臟腑	非氣血凝滯風毒壅結或飲酒食熱物過多房室虛	不可計數姑摭一二以示大畧大抵癰疽之作無定	發腫大如栝椀服此藥皆脫然如失物是藥濟苦者	苦之音皆不忍聞自謂無復生理又有一婦人股間	已去矣又一婦人發乳焮腫疼痛日夜叫聲不絕哀	服此藥而至不覺大醉竟日衮卧地上及至酒醒病
-------	-------	--------------	---------------	---------------------	----------	--------------	-------------------	-----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

欽定四庫全書

普濟方



出者佳去粗皮切
薑汁一宿焙炒 桔梗 以有心味苦者為真無心
味甘者齋芫也切勿誤用
洗淨去頭薄切 甘草 生
焙乾入衆藥

右八味選藥材精者皆取淨曬焙極燥方秤人參當
歸黃耆各二兩餘各一兩除參為細末後入諸藥
勻每服自三錢加至五六錢熱酒調下日夜各數服
以多為妙服至瘡口合更服為佳所以補前損止後
患也不飲酒人濃煎木香湯下然不若酒之勝也或
飲酒多能勉強間用調并木香湯解功效當不減於

欽定四庫全書

普濟方

酒也○括蒼胡權識疽發背三尺童子亦知為膏肓
之疾庸醫既手無措或者又為高論以自神其術世
傳刻涓子方以為得之神仙家而湯劑不一用者惑
之歛丞胡君所藏方簡要而有大功郡酒官蕭世京
病此數日創大已如椀用其方而愈覽者勿以無奇
藥而忽之也○如妳癰腸癰及其它腫毒皆常治愈
○一方作散姜五片煎○一方加白芍藥瓜萋金銀
花等分或乳香服之得汗解○一方加木香檳榔製



枳殼紫蘇天台烏藥名流氣飲甚效陳氏云服在內
消等方之後膿盡乃止

拔毒黃耆散

黃耆 大黃酒浸 羌活去蘆 甘草炙 當歸去蘆 芍藥

白附子炮 黃芩 杏仁去皮 連翹已上各等分

右搗羅為末每服先以黑豆半兩或二合水一大椀
煎至七分去黑豆入藥末再煎至一盞食後一日兩
服候逐出惡物即止其貼瘡斂瘡藥隨宜用之一方

欽定四庫全書

普濟方

無黃耆

犀角散

生犀角屑 玄參去蘆 升麻 生黃耆去蘆切 赤芍藥

麥門冬去心 生粉草 當歸酒浸去蘆 大黃微炒

右為粗末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服

無時候

救苦黃耆散 治諸癰癤惡瘡

黃耆 甘草 當歸 瓜蒌根 芍藥各一兩 懸



萬病解毒丸	治癰疽發背魚臍毒瘡藥草毒挑生毒瘡在下空心服之	蛇毒獸毒蠱毒廢蟲諸惡病
欽定四庫全書	普濟方	
萋 <small>對一熟地黃</small> <small>多不以</small> 金銀花 <small>二</small> 皂角棘針 <small>為引</small>	右咬咀每服五錢無灰好酒一升同引子裝於磁瓦	文蛤 <small>即五倍子</small> 一兩半 山茨菇 <small>即金花燈根</small> 一兩洗焙 全蝎 <small>五枚</small> 紅牙
內將瓶用筍葉封坐於鍋內以大盆覆鍋口盆外用黃土封之毋令出氣煮之外聞藥香為度取出瓶沉定飲清將藥滓再添酒一升依前煮服不飲酒者以水煮服若酒少者酒水各半煮服瘡在上食後臨卧	大戟 <small>洗焙七錢半</small> 大山豆根 續隨子 <small>取仁去細留麝</small> 性各半兩	香 <small>一錢</small> 朱砂 雄黃 <small>各二錢</small>
瘡在下空心服之	右件先以前五味入木白搗羅為細末吹研後四味夾和糯米糊丸分作三十五丸端午七夕重陽臙日淨室修合每服一丸生薑蜜水磨下井水浸研傳患處解毒收瘡救病神妙朱砂雄黃乃瘍醫五毒攻瘍	



中物也一方無山豆根	九珍散 治一切癰疽疔腫毒因氣壅血熱而生者	當歸 川芎 白芷 赤芍藥 生乾地黄 芩	萹 甘草 大黃 北黃芩 <small>各等分</small>	右呶咀每四錢水二盞酒一盞煎至二盞去滓微熱服未成膿即內消已成膿則速潰亦治婦人乳癰	瞿麥散 主排膿止痛利小便	瞿麥 芍藥 當歸 麥門冬 <small>去心各二兩</small> 桂心 芎	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	薊 白欵 赤小豆 <small>半合</small> 黃耆 <small>一兩</small>	右為散先食溫酒服方寸匕日三翼深師同忌生葱陳臭肉食等物	大黃薄貼方 療癰疽發背	大黃 黃芩 寒水石 石膏 赤石脂 黃連	<small>各三兩</small> 白芷 <small>各二兩</small> 黃蘗 <small>各二兩</small> 白欵 <small>五兩</small>	右藥下篩以三合投粉瀝三升中和薄塗貼腫上燥易腫下止不下厚傅忌生冷熱麪大酢一方用漿水
-----------	----------------------	---------------------	--------------------------------	---	--------------	--	---------------------------	---	----------------------------	-------------	---------------------	---	--



調塗

小丹搨方 治癰疽始發浸淫進長

升麻

黃連

大黃

芎藭

黃芩

芒硝

各三

兩當歸

甘草

炙

羚羊角

兩

各一

右杖攪令成膏適令熱貼帛搨腫上數度便隨手消

散

瞿麥散 治癰疽未潰瘡中疼痛膿血不絕

瞿麥

白芷

黃耆

當歸

細辛

芍藥

芎

欽定四庫全書

普濟方

薊 薏苡仁

赤小豆

末各一兩

右先以清酒一升漬小豆出銅器中熬之乾復漬漬

復熬五遍上然後搗諸藥下篩酒服一方寸日三夜

二服三五日後痛者痒肌肉生一法以春酒漬小豆

多痛倍瞿麥痛未開倍白芷多膿倍黃耆薏苡仁芍

藥良○李溫如八行家寶秘療發背藥方不以傳人

其子秉彝客於新吳大姓羅氏一日出遊偶忘封鑰

書篋為諸生竊取其方錄之秉彝歸為之出涕蓋其



父子以此方救人之死甚多深不欲傳也其用藥次第如後

初覺瘡發時先服通關散 治發背肉潰及諸惡毒衝

心嘔逆

以菘豆不拘多少為末每服二錢入乳香一錢并花水調下以利為度未利更入乳香再服

次用藥試發瘡可治不可治

白礬一兩天南星一個

欽定四庫全書

普濟方

右為末以冷水和勻傅腫處留出瘡口仍以筆畫泥瘡暈若藥力勝則腫消皮皺此為易治若腫處皮急暈即難治

次服赤小豆

用赤小豆半升不去皮生為末每用一兩匙以冷水調下連併服盡未退再服半升取口鼻大便出血為度服豆末時不可喫飯

次服四味散



石上薜荔 <small>二兩</small> 地榆 <small>一兩</small> 甘草節 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small>	右為末溫酒調下三錢	次服	膨脝葉 <small>一斤</small> 岡穀刺葉 <small>一斤</small>	右旋採勿令婦人鷄犬見確白內春爛每用一碗許以酒一盞浸去滓溫服仍以藥滓卷瘡	次用歛瘡口生肌散	木香 檳榔 黃連 <small>洗去鬚</small>	欽定四庫全書 普濟方	右等分淨器碾為末時以傅瘡若瘡潰爛傅了更以常用膏藥或雲母膏貼定聽膿水自出若有此藥傅後瘡口未便歛白艾末輕粉各少許勻傅即有速效	麝香蟾酥丸 治一切癰疽發背疔瘡內毒如未破用	針刺破撚藥在內膏藥貼之其瘡即潰	蟾酥 輕粉 乳香 <small>各半錢</small> 明信 雄黃 <small>各一錢</small> 巴豆	十個去皮油 麝香 <small>少許</small> 寒食麪 <small>三錢</small>	右為細末滴水為錠子如小麥大量瘡為度
--	-----------	----	--	-------------------------------------	----------	-----------------------------	---------------	--	-----------------------	-----------------	---	--	-------------------



八味黃耆散 治癰疽發背	黃耆 芎藭 大黃 黃連 芍藥 莽草 黃	芩 梔子仁 <small>各等分</small>	右治下篩鷄子白和如泥塗故帛上隨腫大小傅之 乾則易若已開口封瘡上須開頭令出氣	治癰疽發十指或起膀胱及發背後生惡肉者	猪蹄 <small>一具治如食法</small> 當歸 大黃 芎藭 芍藥 黃芩	獨活 莽草 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀以水三斗煮猪蹄取八升去之內諸藥煮取 四升去滓漬瘡兩食頃洗之拭令乾傅麝香膏	麝香膏 治癰疽及發背諸惡瘡去惡肉	麝香 藺茹 <small>一作真珠</small> 雄黃 礬石 <small>各一兩</small>	右為末以煮膏調如泥塗之惡肉盡止却傅生肉膏	生肉膏 治癰疽發背後生肉	生地黄 <small>一斤</small> 辛夷 <small>一兩</small> 獨活 <small>去蘆頭</small> 當歸 <small>焙</small> 大黃 <small>炒</small> 黃耆	芎藭 白芷 芍藥 黃芩 <small>去黑心</small> 續斷 <small>各一兩</small> 薤
-------------	---------------------	--------------------------	--	--------------------	---	--------------------------	------------	--	------------------	--	----------------------	--------------	---	--



白 兩五	右十二味咬咀以臘月猪脂四升煎取白芷黃下之 去滓傳之立效	參苓順氣散 病癰疽之人進飲食降氣健脾	烏藥 一兩 白茯苓 皮去 真紫蘆子 微炒 人參 去蘆各一分 青	皮 去白 粉草 炙各半兩 白朮 泔浸半日 白芷 不見火 各一兩	右為細末每服二錢水一盞生老薑連皮切三片棗 一枚煎至八分空心溫服煎藥不用薑能發熱動氣	欽定四庫全書 普濟方	茯苓開胃散	白茯苓 去皮一兩 粉草 炙半兩 枳殼 去穰麸炒黃一分	右為細末每服一錢入鹽一捻沸湯點服無時候	龍腦麝香錠子 追毒回瘡止痛生肌	龍腦 三錢 麝香 二錢 輕粉 半錢 粉霜 三錢 雄黃 半錢 乳香 一錢 雌	黃 半錢 巴豆 十四個 去皮尖	右為細末乾飯為丸如小麥大紅在瘡上其瘡腫時 藥敷上用貼治疔瘡研絰在瘡內忌冷水
---------	--------------------------------	--------------------	---	---	--	---------------	-------	----------------------------------	---------------------	-----------------	---	-----------------------	--



消腫膏 治發背癰疽一切惡瘡	生烏麻油 鉛丹 研 黃蠟 各四兩 熊脂 松脂 各一兩	水銀 硫黃 研 芒硝 研 各半兩	右取五月四日早於淨室中用銀石器炭火上微煎至初五日早勿令息火膏成看瘡腫大小以故帛攤貼之未作膿便消合時忌婦人猪犬見臘月臘日合亦良其水銀熊脂於掌中研入諸藥	當歸貼方 療諸癰瘡發背有膿血	欽定四庫全書 普濟方	當歸 一分 蟻螬 一分 丹參 附子 炮 蠟蜜 桂心 膠	各一分 梔子 十枚	右合煎以貼瘡上	琥珀犀角膏 治癰疽不曾宣毒致熱毒衝心經咽喉	口舌生瘡及紅黑菌者	真琥珀 研 生犀角屑 各一兩 辰砂 研 二錢 人參 去蘆 二錢 茯苓	神 去木皮 二錢 真腦子 研 一錢 酸棗仁 去皮 研 二錢	右人參茯苓神犀角為細末入乳鉢內別研藥味和勻
---------------	----------------------------	------------------	--	----------------	------------	-----------------------------	-----------	---------	-----------------------	-----------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------



用煉蜜搜為膏子以瓷餅收貯候其疾作每服一彈	子以麥門冬去心濃煎湯化服一日連進五服取效	追毒散 追毒排膿	五靈散 川烏頭 <small>炮</small> 白乾薑 <small>炮各</small> 井鹽 全蝎 <small>各</small>	<small>兩</small> 釣靈根 <small>三</small> 無心草 <small>二</small>	右為細末每用藥少許津唾調塗患處釣靈根一作常靈根	萬應鐵針丸 治一切腦背疽惡毒大瘡欲死者一粒	欽定四庫全書 普濟方	即愈	麝香 <small>三錢</small> 蟾酥 <small>三錢</small> 血竭 <small>三錢</small> 麝香 <small>三錢</small> 蟾酥 <small>三錢</small> 血竭 <small>三錢</small> 麝香 <small>三錢</small> 蟾酥 <small>三錢</small> 血竭 <small>三錢</small>	粉 <small>三錢</small> 硼砂 <small>三錢</small> 片腦 <small>一錢</small> 蜈蚣 <small>一對</small>	右為極細末煉蜜和為劑如瘡有頭用針挑破微有血出將藥一黍米大放於挑破瘡口內上用紙花周圍唾津濕沾瘡上其藥不過時刻即效如兩三刻見無頭瘡者即是暗疔俗云要瘡是也即將兩手虎口白土紋用針挑破如前藥封蓋忌鷄鵝酒濕麪一切
----------------------	----------------------	----------	---	--	-------------------------	-----------------------	------------	----	--	--	--



發熱之物	清心散 治癰疽有熱證	遠志 ^製 赤茯苓 赤芍藥 生地黃 麥門冬 ^{去心}	知母 甘草 ^{生各半分}	右剉每三錢薑棗煎服小便秘加燈心木通	獨活散 浣洗一切癰疽	獨活 黃芩 莽草 當歸 川芎 大黃 赤芍藥 ^{各一兩}	欽定四庫全書 普濟方	右為散分作兩次先用猪蹄以水二升煮令蹄熟去蹄入藥再煎十餘沸去滓乘熱洗瘡	車螯散 治癰疽初發腫痛或少年熱盛發背等急宜宣毒利下熱退為度大人小兒四季皆可服之	紫背車螯 ^{一雙鹽泥固濟火煨通紅地上出火毒用} 輕粉 甘草 ^{各二錢}	大黃 ^{五錢} 黃芩 漏蘆 ^{去鬚} 瓜根 ^{各半兩}	右為末每服二錢薄荷湯下速利酒亦可	單煮大黃湯 治同上氣血衰者不可用
------	------------	---	-----------------------	-------------------	------------	--------------------------------------	------------	------------------------------------	---	---	--	------------------	------------------



<p>大黃 甘草 <small>各等分</small></p>	<p>右剉散每服三錢水一盞半煎空心服利下熱毒</p>	<p>排膿散 廣濟療癰疽</p>	<p>黃耆 <small>十分膿</small> 青小豆 <small>一分熟</small> 芎藭 <small>三分肉</small> 芍藥 <small>三分</small></p>	<p><small>痛不</small> 白斂 <small>三分有膿</small> 栝蒌 <small>三分若渴</small> 甘草 <small>三分</small></p>	<p>右為散酒服方寸匕日三服不利忌海藻菘菜熱麪</p>	<p>魚蒜</p>	<p>止痛靈寶散</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>鬼繫腰 <small>生竹籬陰濕石岸絡石而生者佳路木者無用其藤柔細兩葉相對形生三角用藤</small></p>	<p><small>葉一兩洗淨</small> 皂角刺 <small>一兩剉新</small> 甘草節 <small>半</small> 瓜蒌 <small>大</small></p>	<p><small>晒乾不見火</small> 明乳香 <small>一錢</small> 沒藥 <small>三錢</small></p>	<p>右除乳香沒藥外為粗末入乳香沒藥和勻每服二</p>	<p>錢水一盞酒半盞慢火煎至一盞去滓通口服無時</p>	<p>壓熱神白膏</p>	<p>大黃 白斂 黃蘗皮 南星 赤小豆 黑蛤</p>	<p>粉</p>
---------------------------------	----------------------------	------------------	--	---	-----------------------------	-----------	--------------	-------------------	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------	----------------------------	----------



積殼丸 治瘡疽熱癰腫瘰癧	積殼 <small>去穢炒</small> 牽牛 <small>頭末炒取</small> 木香 青皮 <small>各一兩</small> 甘草 大
膿不滯好肉易生三因方無乳香	
津貼瘡頭薄處已破膿滯不快則用二粒經瘡內使	
右為細末粳米飯旋丸如麥粒大每用一粒米破用	
沒藥 <small>米</small> 乳香 <small>各一字</small>	
替針丸 治癰疽已潰未破後膿出不快者	白丁香 <small>一字</small> 硼砂 <small>一字</small> 石灰餅 <small>入藥內拌炒</small> 糯米 <small>十四粒一法用煉倉</small>
欽定四庫全書	普濟方
桐子大無時溫熱水吞下四十五丸	
右為細末用菘豆粉四兩生姜自然汁煮糊丸如梧	
香乳香 <small>別研各一兩諸香並不見火</small>	
生黃耆 <small>去蘆焙到八兩</small> 當歸 <small>洗焙三兩</small> 肉桂 <small>去淡者不見火</small> 木香 沉	
不止	
內托黃耆丸 治因用針砭傷其經絡白膿赤汁逗流	
刷濕	
右為細末用芭蕉清汁調塗腫上遇乾時更用蕉汁	



痛消腫	復元通氣散 治諸氣溢耳聾腹癰便癰瘡疽無頭止	證只服萬金不可用聖雙行湯	兩錢重煎鎔熱服得踈轉一兩次即服萬金湯若陰	右為剉散每服四大錢水一盞煎七分去滓入朴硝	各一分	大黃 <small>蒸一兩</small> 木鱉 <small>去殼切</small> 防風 枳殼 桔梗 甘草	肉腐為膿壅結成癰疽隨處發作	欽定四庫全書	普濟方	通聖雙行湯 治傷風寒暑濕或溢或散使氣血滯凝	右咬咀用藥二兩水二升煎十沸稍熱淋搨內消	升麻 黃耆 防風 川芎 生地黄 細辛 <small>等分</small>	升麻搨腫湯	桐子大每服三五丸食後葱茶下日進二服	以好酒煮軟接取汁熬膏調粘和前藥末為丸如梧	右為末用皂角長一尺猪牙三挺約三兩炮焦搥碎	黃
-----	-----------------------	--------------	----------------------	----------------------	-----	---	---------------	--------	-----	-----------------------	---------------------	--------------------------------------	-------	-------------------	----------------------	----------------------	---



<p>青皮 陳皮 <small>各四兩</small> 甘草 <small>三兩生熟各兩半</small> 穿山甲 <small>炮二兩</small> 枳</p> <p>芫根 <small>二兩</small> 金銀花 連翹 <small>各一兩</small></p> <p>右為細末熱酒調下</p>	<p>消腫毒方 專用塗諸瘡疽</p> <p>川烏 蚌粉 草烏 海金沙 赤小豆 天南</p> <p>星 <small>各等分</small></p> <p>右為末用生地黄汁調塗患處佳</p>	<p>越椒散 洗諸癰疽</p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>越椒 <small>一名梔子</small> 黃芩 甘草 當歸 羌活 白芷 <small>各等分</small></p>	<p>右咬咀每用一兩水五椀煎至四椀去滓溫洗</p> <p>當歸連翹散 治腦疽發背諸惡瘡咽頰不利舌腫喉</p> <p>閉鼻衄出血咳嗽痰實</p>	<p>驚絲藤 芍藥 梔子 大黃 當歸 <small>切焙</small> 連翹 <small>各等分</small></p> <p>右為粗末每服三錢酒一盞半煎至六分去滓溫服</p>
--	--	---	---	--



食後日三服量力減加熱實加倍以利之陰證者加 大黃一方生薑五片水煎服之	蠲毒散 治癰疽腫毒未結則散已結則潰去風排膿	天南星 <small>一兩</small> 貝母 <small>三分</small> 白芷 赤小豆 <small>各半</small> 雄黃 <small>二分</small>	直殭蠶 <small>半兩</small> 焙用	右細末初用醋調傅後用蜜水傅	癰疽宣毒方 諸癰疽已破未破通用	瓜萇 <small>一箇</small> 剉細用 皂角刺 甘草 <small>微炙各二錢</small> 乳香 輕	欽定四庫全書 普濟方	粉 <small>各半</small> 紫車螯殼 <small>一箇</small> 黃泥和鹽塗 得煨通紅用二錢	右細末先用老酒二碗煎瓜萇濾清取一碗五更煖 用瓜萇酒調上項藥末空心服大便自下惡物如魚 涎狀	消腫散 癰疽通用	澤蘭皮 天南星 赤小豆 白芷 姜黃 <small>各一分</small>	白芨 <small>半分</small>	右細末酒調傅或蜜水醋同調傅
--------------------------------------	-----------------------	--	--------------------------	---------------	-----------------	---	------------	--	--	----------	--------------------------------------	----------------------	---------------



香 錢五	沒藥 一錢鮮 明者 大黃 一斤 甘草 半斤 牡蠣 四兩 山梔子 二兩 乳	神聖內托散 未成者散已成者膿血自消	或純用草麻子仁入沒藥研細傅貼	右搗研極細成膏撫紙折薄攤藥留眼貼之日二換	麻仁 一兩	乳香 竹葉包 沒藥 各一分 輕粉 一錢 麝香 半錢 黃蠟 二錢 草	乳香膏 治癰疽腫毒惡瘡排膿止痛收縮筋脚	欽定四庫全書 普濟方	右細末蜜醋調傅	貝母 各二錢半	天南星 圓白 半夏 生各半兩 赤小豆 五倍子 白芷	退腫散 癰疽腫毒通用	右細末硬則法醋調傅熱焮則蜜水調傅	烏 連皮尖 等分	木鱉子 去油 天南星 半夏 生 赤小豆 白芷 草	退毒散 癰疽通用
---------	---	----------------------	----------------	----------------------	----------	---	------------------------	---------------	---------	------------	---	---------------	------------------	----------------	---	-------------



右粗末每服五錢水一大盞煎至三五沸去滓入蜜半匙調勻溫服年壯力盛人加至兩水一小盞煎服劑下後宜以十六味流氣飲調理血氣復常	立效散 治疽背賺瘡癰毒	當歸尾 苦參 南星 黃芩 黃栢 草烏尖	各等分	右為末煎茶清調敷患處存瘡破處如不破通生肌散米醋調陽證朴硝陰證加川烏尖	欽定四庫全書 普濟方	搨腫升麻湯 升麻 芒硝 黃芩 漏蘆 梔子仁 蒴	右咬咀每用藥二兩水三升煎十沸帛蘸藥搨潰腫處	薏苡仁散 主令癰自潰長肌肉方 薏苡仁 桂心 乾薑 白欵 當歸 肉蓯蓉	各一兩	右為散先食溫酒服方寸匕日三夜再忌生葱
---	-------------	---------------------	-----	------------------------------------	---------------	----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----	--------------------



神仙追毒丸

一名神授丹又名
神仙解毒萬病丸

解一切毒如被狐狸

鼠莽惡菌河鮪食疫死牛馬肉等毒或蛇犬惡蟲所

傷又治癰疽發背及魚臍瘡人多不識喚作癰疽治

殺人者及治諸風癱瘓赤腫丹瘤等

山茨菰

去皮淨焙
秤二兩重

文蛤

一名五倍子槌碎
先焙淨秤三兩重

麝香

三錢

別研

入 千金子

一名續隨子去殼
研去油取霜一兩

紅牙大戟

去蘆洗
淨焙乾

秤一
兩半

右除千金子麝香外三味為細末後却入研藥令勻

欽定四庫全書

普濟方

用糯米煮濃飲為丸分為四十粒每服一丸研生薑

薄荷汁并華水研服如是乾薄荷濃煎湯冷磨服亦

佳通利一兩行無妨只用溫白粥止住合時宜用端

午七夕重陽日合或遇天德月德日亦佳合時須淨

室焚香至誠修製毋令婦人鷄犬見效驗不可具述

宜珍藏之若游宦嶺表纔覺意思不快便服之即安

二廣山谷間有草曰胡蔓草又名斷腸草若以毒人

急水吞之急死緩水吞之緩死又有殺毒蛇以草覆



上以水灌之數日菌生其上取為末調酒以毒人始
若無患飲酒即毒發立死其俗淫婦人多自配合北
人與之情好多肯逐北人而陰以藥置食中比還即
戒之曰子復來若從其言即復以藥解之若過期不往
則必死以名曰定年藥北人屆彼亦宜誌之若覺中
毒四支不調即宜服之或於鷄豚魚羊鵝鴨等肉內
下藥再食此物即觸發其毒急服此藥一粒或下隨
手便瘥○昔有一女子病勞瘵命在旦夕為血尸蟲

欽定四庫全書

普濟方

所噬磨一粒服之一時間唾下小蟲千餘條大者掙
為兩段後更服蘓合香丸半月遂愈別具湯使于後
菌蕈芥子金石砒毒○喫疫死牛馬肉豚魚毒○時
行瘟疫山嵐瘴氣○急喉閉喉纏喉風脾病黃腫赤
眼瘡癩衝冒寒暑熱毒上攻○自縊溺水打折傷死
但心頭微煖未隔宿者已上並用生薑蜜水磨一粒
灌之須臾復甦○癰疽發背未破魚臍瘡諸般惡瘡
腫毒○湯火所傷○百蟲犬鼠蛇傷○已上並用東



流水磨塗并服一粒良久覺癢立消○打撲擷損傷 折以炒松節酒磨下半粒仍以東流水磨塗○男子 婦人顛邪鬼氣鬼胎以煖酒磨下一丸可以分作兩 服有毒即吞下自止○縊溺死邪鬼死用磨服
聖效散
黃栢 <small>二兩去粗皮細切炒至赤黑色</small> 穿山甲 <small>一兩炒</small> 檳榔 木香
<small>各半兩</small> 雞脛 <small>七箇</small> <small>炒令黃</small> 生用
右為細末每用少許候大膿出盡方可乾摻瘡上
欽定四庫全書 普濟方
立效散 治發背及諸癰癤及癩瘖有效或婦人乳癰
紫色皂角刺 <small>半斤不用枯者</small> 生粉草 <small>二兩</small> 乳香 <small>別研半兩</small>
沒藥 <small>別研半兩</small> 瓜萋 <small>五箇去皮取肉并仁搗碎</small>
右瓜萋炒黃乾者不必炒共為細末每服二錢溫無 灰好酒調下無時候
神驗酒煎散 治癰疽發背諸癰毒定痛
人參 沒藥 當歸 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙一分</small> 瓜萋 <small>生一分半</small>
右咬咀以酒五升煮至二升淨甕瓶貯之每服半盞



浸酒半盞溫服無時候更用滓焙乾加當歸生為末	酒煮麪糊丸如梧桐子大每服五十九丸用此浸藥酒	吞下順氣活血	潰消散 治癰疽諸發可以宣熱拔毒	川當歸 漢防己 赤芍藥 瓜蒌子 木鱉肉	各半 兩 大黃 七錢 木香 甘草 各三錢	右咬咀每服二錢酒水各半煎去滓露一宿空心冷	服若病勢急者凝冷服此藥較之連翹湯又無五香	欽定四庫全書	普濟方	而不利於虛若瘡不痛不大熱不腫高者不可輕用	沉水膏 治癰疽腫熱硬痛不止	白芨 白欬 黃栢 黃連 黃丹 各等分	右為細末新水調塗腫處	護肌膏 收暈斂毒	天南星 二兩 明白礬 七錢 並生用 白欬 白芨 雄黃	右細末每半兩生地黃取汁調傅瘡暈外舊肉上自	外圍而促斂之又驗瘡用新水調筆蘸傅瘡藥力勝
----------------------	-----------------------	--------	-----------------	---------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	--------	-----	----------------------	---------------	--------------------	------------	----------	----------------------------	----------------------	----------------------



則腫消皮皴易療若腫處皮急暈開難療

特異萬靈散 治癰疽發背腫毒

軟石膏

燒通紅碗覆在泥地上一宿

大白南星

赤小豆

各半兩

草烏

連皮半兩 乳香 別研二錢

右細末蜜水調膏從外抹收入留最高處如錢勿傳

如已破切忌藥入瘡口恐痛斂毒排膿不致潰爛屢

效

白芷洗方

欽定四庫全書

普濟方

白芷

一兩 新桑白皮 三分

貝母

半兩 漢椒

三錢 紫蘇

二莖

右剉碎分兩次入連根葱煎以葱蘸湯洗潰爛者猪

蹄煎湯洗或水膠煎湯洗亦好

追毒餅子 治諸般惡瘡因針開了口後又閉合生膿

脹痛不可忍用此藥捻成小錠麥大放入瘡口中永

不閉膿水自出瘡自乾好

極等好信

半錢

雄黃

雌黃

朱砂

各一錢

輕粉

少許

右研細末用糯米糊丸如麥子大如瘡口閉合生膿



却將錠甲許入在瘡口中錠子既入仍將膏藥貼之
一日過丁子自出或不出膿瘡乾好如神效
諸疽瘡膏方

蠟 亂髮 礬石 松脂 各一兩 猪膏 四錢

右先下髮髮消下礬石礬石消下松脂松脂消下蠟
蠟消下猪膏塗瘡上

玄參散 懸癰腫毒不下食

玄參 一兩 升麻 射干 大黃 各半兩 甘草 一分

欽定四庫全書

普濟方

右用水煎作一服含嚥

追毒丹 治疽瘡黑陷者先用狗寶丸治次以烏龍膏
收腫散毒去赤暈乃用針刀開瘡納追毒丹使之潰
然後去敗肉隨膿排證治之癰疽疔瘡附骨疽並治
之

巴豆 七粒 去皮心不去油研如泥 白丁香 一錢 雄黃 黃丹 各二錢

輕粉 一錢

右研和加白麪三錢滴水為丸如麥狀針破瘡納之



上復以乳香膏追出膿血毒物漏瘡四壁死肌不可	治亦以此法追毒去死肌乃養肉便愈矣疾小者用	一粒大者加粒數用之一方加蟾酥丸尤神速	治癰疽發背已潰未潰及諸腫毒	栝萸根 榆白皮 故燕窠 鼠糞土	右各等分為末以女人月經衣水洗取汁和如泥封	腫上乾即易潰者四面封之已覺即封從一日至五	日瘥	欽定四庫全書	普濟方	神功麻仁丸	麻仁 <small>去殼研</small> 川大黃 <small>三兩濕</small> 人參 <small>三分</small> 訶子 <small>煨取</small>	兩	右除麻仁外為細末和麻仁令勻煉蜜丸如梧桐子	大每服三十丸熟水任下食前臨卧服	排膿托裏散 治一切瘡癰癰毒及腸癰背疽或赤腫	而未破者或已破而膿血不散渾身發熱痛疼不可	堪忍者并治婦人妳癰一切毒腫並宜服之
----------------------	----------------------	--------------------	---------------	-----------------	----------------------	----------------------	----	--------	-----	-------	--	---	----------------------	-----------------	-----------------------	----------------------	-------------------



地蜈蚣 赤芍藥 當歸 甘草

右等分為細末每服二錢溫酒調下不拘時

靈寶膏 治發背癰疽宣熱散毒排膿止痛及腦癰妳

癰疼痛不可忍

大瓜萋

三十箇去皮留穰
子炒香取仁細研

乳香

二兩 胡桃

六十箇取
肉去皮同

瓜萋
細研 白蜜 一斤

右以銀石器內慢火熬成膏每服兩大匙溫酒調下

不以時候服一方無胡桃用瓜萋五箇乳香五塊蜜

欽定四庫全書

普濟方

一斤熬成膏每服三二錢日二服○大治發背諸惡

瘡等日進二服無不立效昔嚴州上人一通判忘其

名母病發背祈禱備至夜夢呂真人服青衣告云為

公極孝故來相告更遲一日不可療矣通判公急市

藥治服之即愈楊和玉得此方家中使令凡百瘡腫

等患服之皆效遂合以濟人無不驗者漏瘡惡核普

皆治之

烏龍膏治一切腫毒癰疽色赤暈



木鱉子 <small>去殼</small> 半夏 <small>各一兩</small> 小粉 <small>四兩</small> 草烏 <small>半兩</small>	右令鐵銚內慢火炒令轉焦為細末出火毒再碾細以冷水調傅一日一換	逼毒散 治諸般腫毒癰疽	白芷 <small>半斤</small> 貝母 <small>十二兩</small> 香附子末 <small>六兩</small> 甘草 <small>三兩</small>	右為細末每服二錢用溫酒調下隨病服	內補散 治癰疽已破托膿敗毒	白芷 <small>二兩</small> 官桂 <small>一兩</small> 香附子 <small>三兩</small> 甘草 <small>半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服二錢用酒調下	拔毒散 癰疽腫結通用能散能潰	南星 <small>上等大白者一兩</small> 草烏頭 白芷 <small>各半兩</small> 木鱉子仁 <small>一个</small>	右細末分兩次法醋入蜜調傅紗貼之	穿山甲散 癰疽托毒排膿治五毒附骨在臟腑裏托出毒氣止痛內消	蜂房 <small>一兩</small> 蛇退 穿山甲 油髮 <small>並燒帶生存性各一分</small>	右為末每服二錢入乳香末半錢煖酒調下
---	-------------------------------	-------------	--	------------------	---------------	--	---------------	--------------	----------------	--	-----------------	------------------------------	---	-------------------



皂棘散 托毒排膿	川烏 <small>半兩</small> 甘草 <small>生一兩</small> 乳香 <small>一分</small> 皂莢刺 <small>燒帶生四兩</small>	右為末每二錢溫酒調下	麝香散 癰疽已結而頭不破用此	直雀屎 <small>研一錢</small> 斑猫 <small>去頭足翅一錢半</small> 腦 <small>麝隨意</small>	右細末法醋調少許點在有頭處立破急用煎黃連	湯洗去	當歸酒 治癰疽陰證頭平向內沉黯不疼渾身患處	欽定四庫全書 普濟方	不熱	辣桂 <small>去粗皮半兩</small> 當歸 <small>四錢</small> 木香 白芷 <small>各二分</small>	右細剉每服三錢半醇酒一碗慢火煎七分入乳香末半錢不飢飽溫服以排膿內補散加味千金正氣散為佐以米補猪蹄膂肉為養喬麥麩能發起可煮食之如更不發起用狗寶薑附湯當歸木香炙甘草煎服之更不發起用	又方
----------	--	------------	----------------	---	----------------------	-----	-----------------------	------------	----	---	--	----



穿山甲 <small>頭截片子 醋炒焦</small> 人牙 <small>煨留性 各一分</small>	右為末分作兩服用辣桂當歸去節麻黃煎酒食前 調下患處用生薑汁和麪厚塗或用川烏硫黃人牙 煨並細末酒調傅之	癰疽腹痛方 辣桂 <small>一分</small> 木香 芍藥 北五靈脂 <small>各半</small>	右剉散每服三錢薑棗煎服	癰疽方	欽定四庫全書 普濟方	赤小豆 菘豆 黑豆 川薑黃 <small>各等</small>	右細末未發起薑汁和井華水調傅已發起蜜水調 傅	家寶方柞木湯 <small>一名柞木 欽子</small> 治發背及諸般癰腫	柞木葉 <small>一葉刺在處 有之焙乾</small> 地榆根 <small>刷洗去土 切片煨</small> 萱草根 <small>洗去</small>	土切片 煨乾 乾荷葉 <small>各等</small>	右如急用濕者亦可共為粗剉將大斗瓶一隻入藥 半瓶却灌新水令瓶滿煎拆二分存八分無時溫服
--	--	--	-------------	-----	---------------	---------------------------------	---------------------------	--	---	------------------------------	--



<p>不拘多少飲多為妙如赤腫未結即自大便中下其 狀如碎猪肉勿以為怪如瘡黑赤為候怪證定結成 頭服之兩日黑定變赤其赤處變成紅穿用貼歛藥 得遂得効方用竹葉四兩柞葉四兩餘三味各一兩 外加甘草節一兩剉為散每半兩水二碗煎至一碗 分二服早晚各一服併滓再煎服膿血自乾未成者 自消忌一切飲食毒</p>	<p>追毒散又名四調膏 治一切癰疽瘡癤</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>滑石 寒水石 黃連 大黃 各等分</p>	<p>右為細末用朴硝調傅上瘡腫處</p>	<p>藤花散 治癰疽腫瘡毒內附筋骨裏托內消迴活氣</p>	<p>血</p>	<p>鷲鷲藤 <small>莖葉</small> 黃耆 甘草 <small>生各</small> 栝萋根 <small>兩半</small></p>	<p>右為粗末每服五錢酒二盞煎至一盞紗絹拘濾去</p>	<p>滓溫服日三無時</p>	<p>猪蹄湯</p>
---	-------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------	------------------------------	----------	--	-----------------------------	----------------	------------



<p>升麻 甘草 芍藥 蒴藿<small>各等分</small></p>	<p>右咬咀每服藥四兩水一斗猪蹄一對煮蹄軟取出次下藥再煎汁沸帛蘸淋搨之此藥如毒已破其熱漸退即常服如患初發未破此藥性雖暖大能去熱</p>	<p>毒</p>	<p>化毒排膿內托散 治一切癰疽發背諸般瘡腫未成膿者自散已成膿者速潰貼膿自出至瘡口合止</p>	<p>人參 當歸 川芎 防風<small>各一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右同為細末每服五錢熱酒調下不拘時候 治生癰疽腫毒已未成者</p>	<p>生大黃 山梔子 金銀藤 螞蟻<small>煉過末子</small></p>	<p>右約三錢研和一處酒水為小煎至大半碗病在上食後病在下空心服如生成者用皂角針七八枚將尖頭火內燒作炭敲尖在內如前煎</p>	<p>阿膠飲子 治一切癰疽發背挾瘰疔癰癤毒</p>	<p>明牛膠<small>剉粉炒如珠出炒毒粉</small> 生剉各<small>化橘紅</small> 兩半</p>
--------------------------------------	---	----------	---	--------------------------------------	-----------------------	---	--	---	---------------------------	---



右咬咀分作三分每服以水一碗煎至七分去滓候
溫病在上食後服病在下空腹服試之有效一方有
紫色皂角刺燒存性等分

轉毒散 治發背癰疽不問淺深大小利去病根則免

傳變不動元氣解壅積排膿血一名小車螯散一名

去毒散

車螯

紫背光厚者又名嫦娥以塩泥固
濟煨令通赤候冷淨取末一兩用生甘草一分

輕粉

錢半

欽定四庫全書

普濟方

右細末每服四錢以濃煎栝萋酒調下五更初服轉
下惡物為度未知再用栝萋一箇去皮酒一碗煎至
一盞調一服甚者不過二服要須熱視其勢若大段
聚則急服之效在五香連翹湯之上但稍緩者只服
五香連翹湯急切須急服神仙截法凡發背者自內
出外始名發背其疾實緣熱當心在中隔上下不通
拆以承背上虛處出也先三五日癰疹妨悶在肌膚
中積漸成腫如出皮膚結聚成腫故名發背



麥飯石膏 治發背諸般癰疽神效一名鹿角膏又名

三神膏

白麥飯石

其石顏色黃白類麥飯團者是也如無此石只尋舊麪磨近齒處石不限多少

用炭火煨至紅以好米醋淬之如此煨淬十次方得却穰為末重羅去粗者取細末入乳鉢內用數人更迭研五七日 鹿角 不用自脫者須揀帶腦頂要如麪樣細炒用 骨全者即是生取之角方可用截作二三寸長炭火內燒令煙盡為 白斂 研度碾羅為末再入乳鉢內更迭研令極細 末 細

右用煨成麥飯石細末二兩鹿角灰細末四兩最要

欽定四庫全書

普濟方

研得極細方可效驗若研得不細塗即極痛苦細而嫩則大能止痛收口排膿精粗之效不同者如此和合時量藥末多寡用經年好米醋入銀石器內煎令魚服沸却旋旋入前三味藥末在內用竹篦子不住手攪一二時久令稀稠得所取出傾在甕盆內候冷以紙蓋慎勿令着塵埃每用時先以猪蹄湯洗去瘡上膿至淨以故帛挹乾以鵝翎拂藥膏塗傅四圍凡有赤處盡塗之但留中心一口如錢大以出膿血使熱



毒之氣隨出如未潰能內消如已潰則排膿如湍水
逐日見瘡口收斂如患久肌肉腐爛筋骨出露用舊
布塗藥以貼瘡上但內膜不宄亦能取安洗瘡勿以
手觸動嫩肉仍不可以口氣吹着瘡更忌有腋氣之
人及月經見行婦人或有孕人見合藥亦忌此麥飯
石須好者鹿角須生帶腦骨者燒灰時却不用腦骨
但要辨其生取與自退耳若能精虔選擇修製收功
多矣仍可熬米醋一大盆收甕器內候逐日用藥於

欽定四庫全書

普濟方

瘡上久則其藥乾常用鵝翎點醋拂溫其藥勿令綳
也初須一日一洗一換藥十日後兩日一換○古方
云白麥飯石顏色黃白類麥飯舊作磨者尤佳愚謂
麥飯石不可作磨如斯言則惑人以麥飯石其狀如
飯團生粒點若無此石當以舊麪磨退齒處石代之
以其有麥性故也此石或無賣者只於溪中尋麻石
中有白石粒如米大者即是也但大小不同或如拳
或如鵝卵或如盞大畧如握聚一團麥飯焉

古之呂
西華北



方傳以外舅之親計其不可得裴員外啗之以名利 河南尹魯之以重刑呂寧絕榮望守死不傳君子責 之以存心隘是方 之得不易如此	欽定四庫全書 普濟方	普濟方卷二百八十三
---	---------------	-----------

