

欽定四庫全書

普濟方卷二百九十四 明 周王朱橚 撰

癭瘤門

總論

夫癭瘤者多由喜怒不節憂思過度而成斯病焉大抵人之氣血循環常欲無滯留之患調攝失宜氣凝血滯為癭為瘤為癭者多結於頸項之間瘤者隨氣凝結於皮肉之內忽然腫起狀如桃李子久則滋長醫經所

欽定四庫全書

普濟方

謂癭有五種瘤有六證五癭者石癭肉癭筋癭血癭氣癭是也六瘤者骨瘤脂瘤血瘤石瘤膿瘤肉瘤也法治療之五癭不可決破決破則膿血崩潰多致夭枉六瘤者脂瘤可破去脂粉則愈外五瘤亦不可輕易決潰慎之

諸癭瘤

附論

夫氣血凝滯結為癭瘤癭則憂患所生着於眉項皮寬不急槌槌而垂是也瘤則隨氣瘤住初作桃李之狀皮



嫩而光漸如盃卵是也其肉色不變者謂之肉癭其筋
脉呈露者謂之筋癭其赤脉交絡者謂之血癭隨憂患
而消長者謂之氣癭堅硬而不可移者謂之石癭癭之
名有五者此也一曰骨瘤二曰脂瘤三曰肉瘤四曰膿
瘤五曰血瘤六曰石瘤瘤之名有六者此也癭瘤一者
雖無痛癢最不可決破決破則膿血崩潰滲漏無已必
至殺人其間肉瘤攻療尤所不許若夫脂瘤氣癭隨順
用藥尚庶幾焉

欽定四庫全書

普濟方

海藻丸

海蛤^煨 松蘿^{各七錢半} 當歸 川芎 官桂 白芷

細辛 藿香 白斂 明礬^煨 昆布^{洗晒} 海藻^{洗晒}

右為細末煉蜜丸彈子大每一丸含咽下

穿癭丸 治癭瘤結硬

通草^{二兩} 杏仁^{去皮尖研} 牛蒡^{各一合出油} 五射干 昆布^{去鹹}

呵黎勒 海藻^{去鹹各四兩}

右為末煉蜜為丸如彈子大噙化嚥津下日進三服



海藻散 治癭瘤	海藻 <small>洗去鹹焙各一兩二分</small> 昆布 <small>洗去鹹焙一兩半</small> 白茯苓 <small>去黑皮半兩</small>
右為散非時溫酒下三錢匕夜一服	海蛤 <small>研</small> 木通 <small>剉</small> 桂 <small>去粗皮半兩</small> 羊麋 <small>十枚去脂炙令黃</small>
治癭瘤方	昆布 <small>洗去鹹焙</small> 桂心 逆流水根柳髮 <small>各一兩</small> 海藻 <small>洗去鹹焙</small>
右為末蜜丸小彈子大含一丸咽津無時忌五辛濕	乾薑 <small>各二兩炮製</small> 羊麋 <small>七枚陰乾</small>
麪熟物	欽定四庫全書 普濟方
海蛤散 治癭瘤	海蛤 <small>研</small> 海藻 <small>馬苔者洗去鹹焙</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 半夏
<small>火煮一兩洗去滑切焙各半兩</small>	
右為散每服一錢匕入豬麋子末錢匕甜藤一尺去根五寸取之甘草一寸水五盞同煎取一盞半分三次每次調散二盞匕臨卧服男人四服女人八服次用丸藥宣下	



除毒丸 治癭瘤服海蛤散後宜服此

巴豆 鐵串穿燈上
燒了去心 大黃末 各半
兩

右為末午日粽子丸如菘豆大空心冷茶下三丸良
久熱茶投之下多以冷粥止之

連殼丸 治氣瘤成癭

連殼 微炒 石榴皮 醋 乾薑 炮各 枳殼 麸炒去

右為末更入百草霜一兩射香少許各細研打醋麪
糊為丸如小豆大每日空心用胡椒米飲湯下三十

欽定四庫全書

普濟方

丸至五十丸

豬廩散 治氣癭瘤

豬廩 二七枚
久人 半夏 洗去滑二
十二枚

右為散每服溫酒調一錢匕臨卧垂頭服

海藻酒方 治頸下卒結核漸大欲成癭癭

用海藻法去鹹一觔酒二升漬一宿取三合飲之酒

盡將海藻爆乾搗末酒調一錢匕日三即差如浸用

絹袋盛了漬春夏二日秋冬三日



柳根酒 治癭瘤

用柳根三觔須水所經露出者水一斗煮取五升用
米三升釀之酒成每服飲半升空心日午臨卧各一
服

治癭瘤鬼氣疰

用鉛錫為末和香油傅之

癭 附論

夫癭者由憂患氣結所生亦由飲沙水沙隨氣入於脉

欽定四庫全書

普濟方

搏頸下而成之初作與癭核相似而當頸下也皮寬不
急垂槌槌然是也患氣結成癭者但垂核槌槌然無脉
也飲沙水成癭者有核癭癭然無根浮動在皮中又云
有三種癭有血癭可破也息肉癭可割之有氣癭可具
針之養生方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常
食令人作癭病動氣增患癭病者始作與癭核相似其
癭病喜當頸下當中央不偏兩邊也乃不急槌然則是
癭也中國人息氣結癭者但垂槌槌無核也長安及襄



陽蠻人其飲沙水喜瘦有核瘰癧耳無根浮動在皮中	其地婦人患之腎氣實沙石性合於腎則令腎實故病	瘦也地方婦人飲沙水者其產乳甚難非針不出是	以比家有不救者良由此也凡瘦袋脹悶養生論云兩	山夾水其人多瘦瘡土厚水深其人多瘦地勢使然	也此可服人參化瘦丹自消瘦藥多用海藻海帶味	屬鹹寒儒門事親書云新寨一婦人年四十餘有瘦	三年戴人以鹹令吐三涌三汗三下瘦也半消次服	欽定四庫全書 普濟方	化瘦之藥遂大消去夫病在上者皆宜吐亦自有消息	之法耳	治瘦 <small>名化瘦丹</small>	海藻 海帶 昆布 澤瀉 木通 豬鬃 羊	廩 <small>各三枚</small> 海蛤 連翹	右為細末研廩為丸如鷄頭子大每服一九臨卧噉	化一方無木通	療瘦
-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------------------	-----	------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	--------	----



海藻 八兩去鹹味	海藻散 療瘰	右為末散每服不時計候以溫酒調下二錢	塗酥炙 白欵	木通 剉	木通散 治頸下卒生結囊欲成瘰	核大含稍咽汁日四五度佳	藥力盡當以此酒下藥彌良一方為末蜜合丸如杏	欽定四庫全書 普濟方	右細切好酒五升浸七日量力取數服酒更浸兩遍	昆布 洗	又方 療頸下卒結囊欲成瘰	下瘰處欲至食時即先飲少酒下却丸子然後食禁	右搗篩蜜為丸如梧桐子大每服吞七丸即住在頸	昆布 洗	通草 五分
貝母 兩二			琥珀 各一兩	昆布 各洗去鹹味					海藻 洗各一筋			酢蒜鹽酪臭肉倉米若瘰大者加藥令取差	松蘿	海藻 七分	
土瓜根 二分				松蘿									乾薑	桂心 各四分	
小麥麩 二分				桂心											
				蛤蚧											



右作散酒服方寸匕日三

昆布丸 治一切瘰癧病不問久新

昆布 洗一兩 海藻 洗一兩 小麥 好醋煮乾一兩

右為細末煉蜜為丸如杏核大每服一丸食前嚙嚥

治瘰癧項

蒲黃 三兩如無用寒食代之 豬廩 羊廩 各五兩去脂□焙乾

右為細末用錫糖為丸如彈子大嚙化

療瘰癧方

欽定四庫全書

普濟方

昆布 洗 松蘿 各三分 海藻 洗五分

右搗蜜丸如杏核大含咽津日三夜二佳

治忽生瘰癧病一二年者

用萬州黃藥子三觔須緊重者為上如輕虛即是他

州者力湧須用一倍取無灰酒一斗投藥其中固濟

瓶口以糠火燒一服時停剩待酒冷即令患者時時

飲一盞不令絕酒氣經三五日後常把鏡自照覺銷

即停飲不爾令人頸細也糠火不可多堆燒使酒



氣香出瓶頭有津即止火不可待經宿也已驗如神
忌毒食

療癭方

用淳苦酒一升漬小麥一升含溫瀝出曝燥後不須
使苦酒浸曝麥燥搗篩以海藻五兩別搗以和麥末
令調酒服方寸匕日三禁鹽生魚生菜生肉

又方

用秫米三升依酒法飲取圓葉白楊皮十兩去土蒼

欽定四庫全書

普濟方

者損勿令見風細切五升煮取二升濃汁漬麴末五
兩用前件秫末依酒法釀之熟訖封塞一七日後空
心腹服一大盞日再服三日即效

又方

用小麥三升三年米醋三升漬麥暴乾更浸使醋盡
又暴乾搗篩為散別搗昆布為散每服取麥散二匕
昆布散一匕但飽食訖清酒和服之若不能飲酒者
以水和服亦得服盡即瘥多服彌善無所禁但不用



舉重及悲啼煩惱等事

救急療癭方

用鼠粘草根大一升湯洗細切除皮者一升以水三升煮取一升半分溫三服服相去如人行四五里一服宜頓服六劑病即差又一方削皮細切取三大升搗篩為散蜜和丸如梧桐子大一服一十九日再服之稍稍加至三十丸以無灰酒進之

治癭

欽定四庫全書

普濟方

以杜蘅食之

五癭

附論

石癭泥癭勞癭憂癭氣癭是為五癭石與泥則因山水飲食而得之憂勞氣則本於情情之所感氣則隨之或上而不下或結而不散是也破結散下治五癭堅硬不可移名石癭皮色不硬名肉癭筋絡露結名筋癭赤脉交絡名血癭隨憂愁消長名氣癭五癭皆不可妄決破則膿血崩潰多致天枉服此



<p>五癭丸</p>	<p>葛蒲_二 海蛤_二 白欵 續斷 海藻 松蘿 官</p>	<p>桂心 蜀椒 倒掛草 半夏_{各二} 神麴_三 羊麩_三</p>	<p>枚百</p>	<p>右治下篩以牛羊髓脂為丸如梧桐大日服三丸一</p>	<p>方以醬浸牛羊髓脂為丸</p>	<p>破結散 <small>一名破結散</small> 治五癭等證</p>	<p>海藻_洗 龍膽草 海蛤 通草 昆布_洗 海帶_{各三}</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>礬石_枯 松蘿_{各三} 麥麴_四 半夏_三</p>	<p>右為末每服方寸匕酒調日三服忌豬鷄魚豆辛生</p>	<p>蒙及諸毒物十日知二十日愈一方有貝母無海帶</p>	<p>海藻散 治五癭</p>	<p>海藻_{洗去} 海蛤_{各三} 昆布_{洗去} 半夏_{湯洗七遍} 北</p>	<p>細辛 土瓜根 松蘿_{各一} 木通_剉 白欵 龍膽</p>	<p>右為細末每服一錢匕酒調服日再不得作勞用力</p>
------------	--	--	-----------	-----------------------------	-------------------	---------------------------------------	--	-------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	----------------	--	--	-----------------------------



昆布散 治五癭	昆布 <small>洗去鹹 焙三兩</small> 白斂 木通 <small>剉</small> 海蛤 <small>研</small> 松蘿 <small>各二兩</small>
桂 <small>去粗皮</small> 海藻 <small>洗去鹹 焙各三兩</small>	右為細末每服溫酒調下二錢匕日二服不拘時候
禁生冷醋滑鷄豬肉魚蒜	玉壺散 治三種癭
海藻 海帶 昆布 雷丸 <small>各一兩</small> 青鹽 廣茂 <small>各五錢</small>	錢
欽定四庫全書	普濟方
右為細末陳米飲為丸如榛子大每服一丸含化嚥	津不拘時候常令藥力不斷煉蜜和丸亦可一方無
青鹽廣茂	又方
小麥麪 <small>一斗</small> 海藻 <small>一升</small> 生礬石 <small>十兩</small>	右以三年米醋浸小麥麪曝乾各搗為散合和服一
方可日四五服含極乃嚥之禁薑五辛豬魚生菜忌	吹及讀誦耳語等



又方

取鹿麋以佳酒浸令没汁炙乾內酒中更炙令香含
嚥汁味盡更易盡十具愈

治五癭

右以昆布一两並切如脂大酢漬含嚥汁愈

氣癭 附論

夫癭之初結者由人憂志氣逆蘊蓄之所成也又飲

沙石流水毒氣不散之所致也皆是肺脾壅滯胃膈

欽定四庫全書

普濟方

否澀不得宣通邪氣搏咽頸故令漸漸結聚成癭宜早

療之便當消散也

白前湯 治氣癭初作

白前 昆布 洗去鹹 厚朴 去粗皮生 杏仁 湯浸去

仁 陳橘皮 湯浸去 附子 炮製去 海藻 洗去鹹 半夏

湯洗 甘草 炙剉各 小麥 醋浸一宿

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞半生薑一棗大拍

碎煎至八分去滓食後溫服日三



<p>杏仁丸 治氣結頸項蓄聚不散成癭</p>	<p>杏仁 去皮尖雙仁炒令黃 連殼 各一兩 海藻 洗去鹹焙 一兩一分 訶黎勒</p>	<p>煨去核 昆布 洗去鹹焙 木香 各二兩 蔓荊實 揉去皮 羊麝 各</p>	<p>一兩 檳榔 剉 陳橘皮 去白焙 各半兩</p>	<p>右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九丸空心米飲下仍常含化一丸</p>	<p>因氣成癭</p>	<p>海藻 海帶 昆布 木通 甘草 各一兩 訶子</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>薄荷 各半兩 杏仁 雙仁浸煎</p>	<p>右為細末煉蜜為丸如鷄頭大噙化忌油膩鹹物</p>	<p>必效主氣癭方一名白頭翁丸兼治氣癭</p>	<p>白頭翁 兩半 昆布 洗十分 海藻 洗七分 通草 七分 玄參 連</p>	<p>殼子 各八分 桂心 三分 白斂 六分</p>	<p>右搗篩蜜丸如梧桐子大每服五丸用酒服藥忌蒜麪豬魚生葱</p>	<p>治氣結喉中蓄聚不散成癭</p>
------------------------	--	--	----------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------------------	-------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--	---------------------------	----------------------------------	--------------------



昆布丸 治瘰氣初結喉中壅悶不治即漸腫大宜服	作丸如小棗大一服五丸無禁	右為散羊廩一種別搗為末相和如好將水浸更搗	灸各一分 小麥麩米 二兩 熬	問荆 一兩 出 海島 羯羊廩 五具 去 明灸 白斂 椒目 甘草	治氣瘰	度忌生葱	滓肉猪脂再煎成膏取塗瘰上日二夜一以差為	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀如麻豆大先以水六升煎至二升綿濾過去	皮 湯浸去白 焙一兩 蜀椒 去目并閉口者 炒出汗一分 猪脂 臘月者煎 去滓半觔	紫蘇子 炒 桂 刮去粗皮 大黃 剉 炒 當歸 切 焙 乾薑 炮 各半兩 陳橘	紫蘇膏 治咽喉氣噎塞成氣瘰	不絕	右為末煉蜜丸如杏仁大含化一粒細細嚥津令藥	海藻 洗去鹹 各五兩 桂 皮 去粗 陳橘皮 去白 焙 各一兩	白茯苓 去黑皮 三兩 半夏 湯洗 去滑 生薑 切 焙 各二兩 昆布 洗 去 鹹 焙
-----------------------	--------------	----------------------	----------------	---------------------------------	-----	------	---------------------	------------	----------------------	---	--	---------------	----	----------------------	--------------------------------	---



<p>昆布 <small>洗去鹹味</small> 訶黎勒皮 一兩 檳榔 一兩 松蘿 半兩 乾薑 半兩 炮 兩</p> <p>桂心 兩半 海藻 一兩 <small>洗去鹹味</small> 木通 二兩 對</p> <p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每於食煎後以溫酒下二十九丸</p>	<p>又方</p> <p>昆布 一兩 <small>洗去鹹味</small> 海藻 一兩 <small>洗去鹹味</small> 訶黎勒皮 一兩 枳殼 半兩 麩炒 兩</p> <p>穰 去</p> <p>右為末煉蜜和丸如杏核大常以含一丸嚥津</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>又方</p> <p>琥珀 一兩 大黃 一兩 <small>剉</small> 昆布 半兩 <small>洗去鹹味</small></p> <p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每日空心及晚食後溫酒下二十九丸又名琥珀丸</p>	<p>又方</p> <p>檳榔 三兩 海藻 二兩 <small>洗去鹹味</small> 昆布 三兩 <small>洗去鹹味</small></p> <p>右為末煉蜜和丸如小彈子大每日常含一丸徐徐嚥津一名檳榔丸忌鹽</p>
---	--	--------------------------	---	---



治氣瘰

海藻 海帶 海蝶蛸

右等分為細末酒煮空心服

治氣瘰

用海藻為末露一宿侵晨不須洗面旋汲井花水調面東禮拜面東服每日如此服之至半月如已消滅不可再服則差細矣

針砂方 專治氣瘰

欽定四庫全書

普濟方

用針砂浸於水缸平日飲食皆用此水十日一換針砂服之半年自然消散針砂不能漬也

治氣瘰

用羊靨一具去脂生含汁盡去

療氣瘰方

用平旦手挽瘰令難搖其下眼脉斷愈一日一度搯易愈者七日難愈者三七日

礬蝎散 治項氣又名瘰氣



<p>白礬 <small>一兩生</small> <small>令細</small> 全蝎 <small>兩半</small></p>	<p>右將礬為末用耳鍋一箇將 用麻黃包了線扎定 將礬分作兩處一半在底一半在上全蝎在中心用 瓦片子蓋定再用鹽泥固濟候乾用熱火二觔煨一 伏取出為細末每服一錢入麝香少許將獺猪奄一 箇切入藥在內用濕紙包五七重火煨熟取出臨卧 細嚼只將津液送下</p>	<p>海帶丸 治瘰氣久而不消</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>海帶 南貝母 青皮 陳皮</p>	<p>右各等分為細末煉蜜和丸如彈子大食後噙化一 丸</p>	<p>海藻漬堅丸 治瘰氣盛大久而不消散</p>	<p>海藻 海帶 昆布 <small>各一兩</small> 青鹽 <small>半兩</small> 廣茂 <small>半兩</small></p>	<p>右為細末煉蜜為丸如指尖大每服一丸噙化食服 治一切瘰已結成欲結已潰欲未潰</p>	<p>右用皂角刺四兩牽牛子四兩洗淨掃潤磚石上鋪</p>
---	--	--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------------------	--	--	-----------------------------



定皂角刺摻牽牛子在上拍火燒之成火速以盆椀
合之候冷勿使成灰為末每服一錢半或二錢飯飲
調下

癭病咽喉噎塞 附論

夫癭病咽喉噎塞者由憂患之氣在於膈不能消
散搏於肺脾之故咽門者胃氣之道路喉嚨者肺氣
之往來今二經為邪氣所乘致經絡否澀氣不宣通
結聚成癭在於咽喉下抑鬱滯留則為之出納者噎

欽定四庫全書

普濟方

塞而不通病癭者是以為急也

半夏散 治癭氣咽喉腫塞心曾煩悶

半夏 湯洗七遍去滑 射干 牛蒡子 微炒各一兩 杏仁 湯浸去皮尖雙

人麩炒 羚羊角屑 木通 剉 桔梗 去蘆頭 昆布 櫛

榔 赤茯苓 各三分 枳殼 半兩麩炒微黃去穢 甘草 半兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生姜半分煎至六

分去滓不計時候溫服

桂心散 治癭氣咽喉腫塞



<p>桂皮<small>去相</small> 昆布 海藻<small>洗去鹹味</small> 甘草<small>炙</small> 白麪<small>炙</small> 龍膽</p>	<p>劉海蛤<small>洗去鹹味</small> 土瓜根 半夏<small>為末生薑汁和</small> 吳茱</p>	<p>萸<small>洗湯去涎焙炒</small> 牡蠣<small>燒各一兩半</small></p>	<p>右為散每服二錢匕酸漿水調下食後臨卧</p>	<p>治癭氣咽喉腫塞防悶宜服此方</p>	<p>木通<small>一兩</small> 昆布<small>去鹹味</small> 乾薑<small>製</small> 射干<small>三分</small> 甜葶</p>	<p>麤<small>一兩</small> 羚羊角屑<small>三分</small> 人參<small>半兩</small> 海藻<small>半兩</small></p>	<p>味鹹 檳榔<small>三分</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以温酒下</p>	<p>二十九</p>	<p>治癭氣咽喉中滿悶腫塞</p>	<p>昆布<small>三兩</small> 大黃<small>一兩</small> 木通<small>一兩</small> 海藻<small>一兩</small> 射干<small>一兩</small> 枳殼<small>半兩</small></p>	<p>杏仁<small>二兩</small> 牛蒡子<small>二兩</small> 海蛤<small>一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥</p>	<p>飲湯下二十九</p>	<p>昆布散 治癭氣結腫膈不利宜服</p>
--	--	--	--------------------------	----------------------	---	---	-------------------------------	-------------------	-----------------------------	------------	-------------------	--	---	-----------------------------	---------------	-----------------------



<p>昆布 <small>洗去鹹味</small> 海藻 <small>洗去鹹味</small> 松蘿 細辛 半夏 <small>洗七遍去滑</small></p>	<p>海蛤 <small>研細</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small> 白斂 <small>各一兩</small> 龍膽 <small>去蘆二兩</small> 土瓜根</p>	<p>檳榔 <small>各一兩</small></p>	<p>右為散每於食後以溫酒調下二錢不得用力勞動</p>	<p>療癭結氣方</p>	<p>昆布 <small>十二分洗</small> 馬尾海藻 <small>十分洗</small> 杏仁 <small>去皮尖八分</small> 通草 麥</p>	<p>門冬 <small>去心</small> 連翹 <small>六分</small> 乾薑 陳橘皮 <small>各六分</small> 茯苓 <small>八分</small> 松蘿</p>	<p>三兩</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右蜜丸含之齒微微嚼藥袋子汁出入咽中日夜勿</p>	<p>停看有問荊加四分自忌嗔及勞油膩粘食</p>	<p>二麋散 <small>一名實金散</small> 治癭氣</p>	<p>豬羊麋 <small>各十枚煖水洗去脂膜切焙</small> 海藻 <small>洗去鹹炙乾</small> 海帶 <small>各一兩</small> 丁</p>	<p>香 木香 琥珀 麝香 <small>研各一兩</small> 真珠 <small>半分研</small></p>	<p>右為散每服一錢匕熱酒一盞調下垂頭卧少時若</p>	<p>是去室男女不十服見效男子婦人患者百日見效</p>	<p>婦人有孕不可服</p>
--	---	------------------------------	-----------------------------	--------------	--	--	-----------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	---	-----------------------------	-----------------------------	----------------



<p>治癭腫結漸大宜服此方</p>	<p>海藻<small>洗去鹹味</small> 海帶 海蛤<small>細研</small> 昆布 木香<small>以上各一兩</small> 金箔<small>五十片細研</small> 猪廩<small>七枚炙乾</small> 羊廩<small>七枚炙乾</small></p>	<p>右為散每夜臨卧時以溫酒調下二錢仍不得着枕</p>	<p>卧如是食癭即難治</p>	<p>訶黎勒丸 治年深癭氣噎塞</p>	<p>訶黎<small>枝炒去皮</small> 檳榔 海藻<small>洗去鹹焙</small> 乾薑<small>炮</small> 白茯苓</p>	<p>去黑皮 龍膽 桂<small>去粗皮</small> 昆布<small>洗去鹹焙一兩</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末煉蜜和丸如酸棗大每服一丸含化不拘時</p>	<p>海藻丸 治咽喉中噎悶成癭</p>	<p>海藻<small>洗去鹹炙乾</small> 檳榔<small>剉</small> 昆布<small>洗去鹹炙乾</small> 訶黎勒皮 文蛤<small>研各三兩</small> 海蛤<small>研</small> 半夏<small>湯洗七遍</small> 生薑<small>切焙各一兩</small> 小麥<small>米醋浸三宿爆乾</small></p>	<p>宿爆乾 三合</p>	<p>右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸含化日三</p>	<p>通氣丸 治癭氣咽喉腫塞毒氣壅悶不通</p>	<p>木通<small>剉</small> 射干 杏仁<small>湯浸去皮尖雙入炒</small> 訶黎勒<small>煨去核</small> 海藻</p>
-------------------	--	-----------------------------	-----------------	---------------------	--	---	-------------------	-----------------------------	---------------------	---	---------------	----------------------------	--------------------------	---



<p>洗去 鹹焙黃耆 各一 白茯苓 去黑皮 惡實 微炒 昆布 洗去 味</p>	<p>右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸含化日晚再服</p>	<p>治癭氣曾膈壅塞咽喉漸竈宜服此方</p>	<p>商陸 二兩 洗 昆布 二兩 洗 射干 一兩 木通 一兩 海藻 一兩 去鹹</p>	<p>羚羊屑 一兩 杏仁 一兩 湯浸去皮尖 牛蒡子 一兩 微炒</p>	<p>右為散每服三錢水一盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>羊廔丸 治咽喉不利項頸漸竈將成癭病</p>	<p>羊廔 二七枚 炙黃切人參 一兩 木通 一兩 海蛤 研 昆布 去鹹</p>	<p>右為末蜜煉和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸米飲湯下再服</p>	<p>昆布丸 治咽喉塞冷氣上築搏防悶漸成癭氣</p>	<p>昆布 去鹹 杏仁 去皮尖雙 犀角 人參 二兩 吳茱萸</p>	<p>黃 洗 炒海藻 去鹹 乾姜 炮 葶藶子 紙上炒</p>
---	------------------------------	------------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------	--------------------------	---	------------------------------------	----------------------------	---	--



右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九米飲湯
下日三

連翹丸 治癭病咽喉噎氣塞

連翹 木通 乾姜 羊麩 昆布
剉 炮各 尖七 去鹹焙

杏仁 車前子 半夏
去皮尖雙人 微炒 為末生薑汁

乾一 兩

右為散每服二錢匕米飲調下日二服食後臨卧

治癭氣咽喉腫塞宜服此方

欽定四庫全書

普濟方

松蘿 昆布 海藻 羚羊角屑 木
兩 二兩洗 二兩洗 去鹹味 兩

通 柳根鬚 檳榔
剉一兩 兩 一

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服不計時二十九

粥飲下

茯苓湯

白茯苓 人參 海藻 海蛤 甘草
去黑 枝 兩 洗去 剉 炙

菴藎子 半夏
各一 餅子爆乾一兩

右為麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓温



服	治瘰氣咽喉腫塞妨悶	半夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 海藻 <small>洗去鹹味</small> 龍膽 <small>去淨頭</small> 昆布 <small>洗去鹹味</small> 土瓜	根 射干 小麥麩 <small>各三分</small>	右為散每服不計時候生姜酒調下一錢	治瘰氣神驗方	琥珀 <small>半兩</small> 昆布 <small>一兩洗去鹹</small> 小麥 <small>三分酒煮熟晒乾</small> 烏賊魚骨 <small>二兩</small>	桔梗 <small>半兩去蘆</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜丸如小彈子大綿裹一丸常含嚥津	治瘰氣結腫心曾不利煩滿宜服此方	海藻 <small>一兩去鹹</small> 昆布 <small>一兩去鹹</small> 木通 <small>一兩剉</small> 連翹 <small>一兩</small> 麥門冬	杏仁 <small>二兩湯浸去皮尖</small> 赤苓 <small>一兩</small> 人參 <small>半兩去蘆</small>	陳橘皮 <small>半兩水浸去白焙</small> 牛蒡子 <small>一兩</small> 羊廩 <small>二十枚炙乾</small>	右為末煉蜜和丸如小彈子大綿裹一丸含嚥津日	三四服	蛤蚧丸 治瘰氣腫塞
---	-----------	---	-----------------------------	------------------	--------	---	------------------------	---------------	---------------------	-----------------	--	---	--	----------------------	-----	-----------



蛤蚧 <small>全者醉 炙一對</small> 真珠末 海藻 <small>洗去鹹焙 各一分</small>	麥門冬 治癭腫悶 麥門冬 <small>去心 焙</small> 昆布 <small>洗去鹹焙 各三分</small> 黃耆 <small>焙</small> 大黃 <small>剉一 蒸</small> 陳	橘皮 <small>湯浸去 白焙</small> 杏仁 <small>湯浸去皮 尖雙仁炒</small> 甘草 <small>炙剉各 一兩</small>	右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸含化	治癭氣膈壅塞咽喉漸麤宜服 羊廩 <small>一百枚 去脂炙</small> 大棗 <small>二十枚 去皮核</small>	欽定四庫全書 普濟方	右同杵作丸梧桐子大每服水下七丸	治癭氣令內消方 用黃牛食系三具乾者於瓷瓶中以瓦子蓋頭鹽泥 固濟候乾燒令通赤待冷取出細研為散每於食後 以粥飲調下一錢	海藻酒方 治咽喉噎塞冷氣妨悶結成癭氣 用海藻洗去鹹二兩細剉以清酒四升浸兩宿漉去 滓每服半盞細細含嚥日三不拘時以差為度
--	---	---	-------------------	---	---------------	-----------------	--	--



治癭氣結核癭腫

用昆布一两洗去鹹搗為末每以一錢綿囊於醋中
浸含嚥津藥末盡再含之一方蜜丸含化自消

治癭氣結硬腫大諸藥無效服之百日必得全差方

黃牛食系

五具以猛炭灰火燭為灰研為末
於瓷瓶內放蜜蓋瓶口不得見風

海藻

五兩昆布

五兩以上二味以清水漬五
日旋換清水洗去鹹味暴乾

白殭蚕

五兩
微炒

右為末散入牛食系末研令勻每服以溫酒調下二
錢日三服以差為度

欽定四庫全書

普濟方

治癭氣結腫方

昆布

洗去
鹹味

馬芹子

兩半

茵芋

兩半

蕪荑仁

兩半

蒟醬

兩半

右為末以醋浸蒸餅和丸如小彈子大以綿裹一丸
含化嚥津日四五服以差為度

治癭氣咽喉腫塞心胃煩悶

琥珀

兩半

皂莢子仁

炒微

牛蒡子

右為散每服食前以葱白湯調下二錢

通氣丸 治咽喉氣悶胃膈滿塞項頸漸麤



<p>木通 <small>劉</small> 海藻 <small>洗去鹹味</small> 海蛤 <small>研各一兩</small> 昆布 <small>洗去鹹味</small> 羊鱖 <small>二十枚 炙黃切</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸含化忌生菜熱麪炙肉蒜笋</p>	<p>羚羊角丸 治癭氣曾悶壅塞咽喉漸竈宜服大效</p>	<p>羚羊角屑 <small>一兩</small> 昆布 <small>一兩 洗去鹹味</small> 桂心 <small>一兩</small> 大黃 <small>一兩 剉微炒</small> 木通 <small>一兩 剉</small></p>	<p>右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服不計時以粥飲</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>下二十九丸</p>	<p>治癭氣經久不消神效方</p>	<p>海帶 <small>一兩</small> 海藻 <small>一兩</small> 昆布 <small>各一兩 洗去鹹味</small></p>	<p>右為末煮赤小豆并棗肉同研為丸如小栗子大以綿裹每月如大盡取二十八日夜小盡取二十七日</p>	<p>至月終三夜臨卧時淨灌漱含卧嚙津不語至明別日不得服</p>	<p>松蘿丸 治癭氣結核癭腫腫硬</p>
---	-----------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-------------------	--------------	-------------------	---	---	---------------------------------	----------------------



松蘿

昆布

洗去鹹味

木通

剉

柳根鬚

逆水生者洗焙乾以上各二兩

右為末煉蜜和搗三二杵丸如小彈子大常含一丸

細細嚥津令藥在喉中相接為妙

瘤

附論

瘤之為義留滯而不去也氣血流行不失其常則形體和平無或餘贅及鬱結壅塞則乘虛投隙瘤所以生初為小核浸以長大若盃盂然不痒不痛亦不繼強方劑所治與治癭法同但癭有可鍼割而瘤慎不可破決爾

欽定四庫全書

普濟方

儒門事親書云戴人在西華衆皆訕以為吐瀉一日魏壽之與戴人在食肆中見一夫病一瘤正當目之上納皆色如灰李下垂覆之目暗不能視物戴人謂壽之曰吾不待食熟立取此瘤魏未之信也戴人曰吾與爾取此瘤何如其人曰人皆不敢割戴人曰吾非用力割別有術焉其人從之乃引一小室中令晚卧一床以繩束其眶刺委中人出血先令以手揉其自瘤止亦刺出雀糞立平出戶壽之大驚戴人曰人之有之技可盡觀手



部戴人之鄉有一女子未嫁年十八兩手背皆有瘤一	類鷄距一類角丸腕不能馴向明望之如桃膠然夫家	欲弃之戴人見之曰在手皆為膠瘤在面者為粉瘤此	膠瘤也以銚鍼十字刺破按出黃膠膿三兩匙立平核	更不復作婚事復成非素明不敢用此法耳外臺秘要	時後云皮肉中忽有腫起初如梅李漸長大不痒不痛	又不堅強按之揉軟此血瘤也不療至如盤大則不可	消而非殺人病耳亦慎不可破方乃有大療今如覺但	欽定四庫全書 普濟方	依癭家療療若不消更別有大方	陷腫散 治二三十年瘤及骨瘤肉瘤膿血瘤瘰肉	大如盃盃久不瘥致有癰潰令人骨消肉盡或潰	令人驚惕寢寤不安身體瘳縮愈而復發宜服此	方	烏賊魚骨 半兩 燒灰 硫黃 半兩 細研 白石英 分半 兩 鍾乳 分半 兩	丹參 三兩 分 琥珀末 二兩 附子 一兩 去皮劑 乾薑 一兩 製 剉 大	黃 一兩 川芒硝 二兩
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------	----------------------	---------------------	---------------------	---	--	--	----------------



右為散以囊盛勿泄氣若瘡濕即乾傅之若瘡乾以猪脂和傅之日三四以上效為度若消不盡者至五劑十劑止藥令人之不痛苦若不消加芒硝二兩一方有紫石英

治癭腫悶宜服此

大黃

二兩剉
鹹炒

昆布

一兩洗
去鹹味

海藻

二兩洗
去鹹味

玄參

一兩
枳

殼

一兩麩炒
微黃去穢

芎藭

一兩
杏仁

一兩湯浸
去皮尖

延胡

索

一兩
琥珀

欽定四庫全書

普濟方

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服以木通湯送下

二十九

枯瘤方

砒

研砂

黃丹

雄黃

粉霜

輕粉

以上各一分

班猫

二十箇
生用

硃砂

一錢
乳香

沒藥

一錢

右同研為末粥糊為丸捏作碁子樣曝乾先炙破瘤

頂三炷然後以藥餅蓋上用黃□水末以水調貼上

數日自然乾枯下落



餅金散 治枯瘤子

砒霜一兩 砒黃脚一兩 巴豆半兩 皮出油 木鱉子一兩 研如泥去皮

右同為細末入石腦油和一塊用紙二十四重裹藥

磁合內盛入地二尺埋兩箇月取出陰乾後入

輕粉一錢 雄黃半錢 粉霜二兩 乳香一錢 沒藥二錢 蟾酥一錢

右同前藥研為細末先放瘤子頂上灸三炷唾調塗
之上用紙封三重每日上次先藥休去了

金黃散

欽定四庫全書

普濟方

作定子瘤子破了用此藥任在四邊自落薑酒下早
晚各一丸如小腸氣三丸切生薑三錢炒焦酒下如
傷酒二丸飛白礬生薑自然汁調下婦人心氣痛醋
湯下二丸

紫蘇子膏 治項氣成瘤方

見本門
氣瘰類

生肉膏 治癰瘤潰漏及金瘡百瘡方

當歸 附子 甘草 白芷 芎藭各一兩 薤白

生地黃



右咀咬以猪脂三升半煎白芷黃去滓稍以傅之三 日	蔓荊實丸 治瘡 蔓荊實 去白皮 炒一兩 甘草 炙劉 一兩 羊廐 脂膜別搗 二十枚 白斂 兩半	椒目 分一 小麥麩 微炒 一兩	昆布黃耆湯 一名麥 門冬丸 治瘤腫 方見癭瘤咽 喉噎塞本類	右將五味為末與羊廐末相和以好醬更搗丸如梧 桐子大每服酒下五丸	欽定四庫全書 普濟方	消毒散 治毒氣項下結核成為瘤者 皂角子 五百枚 慢火炒烈 薄荷 乾者 二兩 檳榔 劉半 兩 甘草 炙 劉連	翹 各一 兩	右為散每服二錢匕食後臨卧米飲調下臘茶亦可	深思療瘤脂細瘤方 吳茱萸 一分 礬石 燒 芎藭 當歸 大黃 黃連	芍藥 白斂 黃芩	右合搗下篩和和鷄子塗著細故布上便瘤大小薄
---------------------------	--	--------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------	---	--------	----------------------	--	----------	----------------------



厚貼之燥輒易之著藥當熟作膿貼細細從孔中出
探之知膿血盡著生肉膏若膿血不盡後起故也
繫瘤子自落方

砒黃 砒霜 礪砂 各半 巴豆 五粒去皮心 芫青 去翅足七

枚 班猫 去頭足翅七枚

右研為末先取蜘蛛網及絲共搓為線子水濕塗藥
末於上貼子中常以藥末養遇有患者以線繫之留
線頭如痒即繫之如痛即不用繫其瘤自黑乾如胡

欽定四庫全書

普濟方

桃大者三四日自落如茄子大者半月落更大者不
過二十八日如瓜者不過一月如血瘤繫之血出者
服定血藥燕服藥治之

黃芩散 治諸瘤血出

黃芩 去黑心 黃蘗 去粗皮剉 黃連 去鬚 鬱金 各半兩

右為散入寒食麪五錢匕水調貼之

小黃膏 治瘤

黃蘗 黃芩 大黃 各等分



右為末以水調為糊比枯瘤藥大一遭塗之三日一
易至八九上不取直候可取

治小瘤方

先用甘草煎膏筆蘸粧瘤四傍乾後復粧丸三次以藥

大戟 芫花 甘遂

右等分為末米醋調別筆粧傳其中不得近著甘草
處次日縮小又以甘草膏粧小暈三次中門仍用大
戟芫花甘遂如前自然焦縮凡膏瘤肉瘤膿瘤血瘤

欽定四庫全書

普濟方

石瘤皆不可決惟脂瘤決去其脂粉則愈蓋六種瘤
尤不可治治則殺人

信一兩硫黃一兩井泉石二兩玄精石一兩

右將藥研作小塊入砂鍋內赤石脂并鹽泥固濟勿

令透氣乃入於文武火內燒煙盡取出放在地上冷

定取藥後入

輕粉一錢乳香二錢硼砂二錢沒藥二錢雄黃二錢

右同研為細末用蒸餅心和為小錠子在四邊為效



治瘤贅如破者用藥一餅安破處漸漸腐化去之不破者用針挑動用藥	信 <small>五錢</small> 硫黃 <small>五錢</small> 白丁香 <small>四錢</small> 班貓 <small>十六箇</small> 巴豆 <small>十六</small>
	殼 <small>筒去</small> 雄黃 <small>四錢</small> 輕粉
右為細末用油餅邊和丸如彈子大捏作餅子	
龍膽丸 治氣瘤	
龍膽 <small>去蘆頭</small> 昆布 <small>洗去鹹</small> 海藻 <small>洗去鹹</small> 馬刀 <small>研</small>	
海蛤 <small>研</small> 香草 <small>各半</small> 大黃 <small>剉炒</small>	
欽定四庫全書	普濟方
右為末煉蜜為丸如梧桐子大用破日綿裹一九朝暮含嚥之	
白頭翁丸 治氣瘤 <small>方見本門</small>	
二色丸 治一切腫赤皮膚毒及瘤	
天南星 半夏 甘遂 大戟 <small>各三錢</small> 乾薑 胡椒	
桂 草撥 <small>各三錢</small> 代赭石 <small>一兩</small> 大黃 <small>生用</small>	
右取前四味以漿水一升煮水盡為度晒乾餘六味同搗為末每用一錢巴豆三枚燒得燄起盞合却候	



<p>冷每一錢藥一處研更用醋一盞煎成膏共藥同丸 如菘豆大丸分兩處丹砂為衣一用膩粉為白衣此 兩等顏色白者或捏作餅子亦可用治瘤子每服一 丸生薑湯下</p>
<p>神效散 治項氣瘤結附贅日漸增長</p>
<p>豬羊廩 <small>各三十枚旋入鹽膳肉焦 過今人乾只用鹽亦得</small> 陳皮 <small>去白焙 炒一兩</small></p>
<p>右為散每服二錢匕空心米飲下初結不過數服覺 消不用久服</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>治瘤</p>
<p>雄黃 <small>錢一</small> 人言 <small>一分</small></p>
<p>右研為細末稀粥糊調藥攤在瘡頂兒上用針鍼破 用貼藥紙封</p>
<p>治白瘤方</p>
<p>白礬 硫黃 <small>等分</small></p>
<p>右為末以醋和封止</p>
<p>治候子</p>



獨掃子

本草名
地膚子

白礬

右等分為末煎湯洗不數次即盡去陳郎中親曾用之果然

枯瘤方

用銅碌為細末刺破瘤摻在上以膏藥貼之

南星膏 治皮膚頭面生瘤不可輒有鍼灸大者如拳

小者如粟或軟或硬不疼不痛宜服

用生南星大者一枚去土薄切細研桐粘為膏滴好

欽定四庫全書

普濟方

醋五七滴如無生者以乾者為末投醋研為膏先將

小刺病處令氣透以藥膏攤紙上像瘤大小貼覺痒

三五易瘥

繫瘤法兼去鼠妳痔

用芫花根淨洗帶濕不得犯鐵器於木石器中揭取

汁用線一條浸半日或一宿以線繫定經宿即落未

落再換線不過兩次自落後以龍骨并訶子末傳瘡

口即合依上法繫鼠妳痔累用得效繫瘤法蘇沈良



方亦有用蜘蛛者然費力也不如此徑捷如無根只用花泡濃水浸線亦得昔趙氏嘗用以繫腰間一瘡不半日即落亦不痛

治果報面生贅瘤

用艾圓灸十壯即用醋磨雄黃塗紙上剪如菜螞奄子大貼所灸處更用膏藥重貼二日一換候痒搔出膿如菜豆粉即愈

治瘤方

欽定四庫全書

普濟方

用舊牛皮洗煎凍常食之瘤若破如豆腐極臭

治瘤方

用鹿草鹿二種肉剖如厚脯灸令熱榻掩一日四灸四易痛攪出膿便愈不除更灸新肉用之良

治瘤

用人精一合半亦得青竹筒盛火上燒炮之以器蒸取汁蜜置器中數傳瘤上良

蓖麻子方 治大人小兒項下結核漸成癭瘤



用葶麻子炒黃風中吹乾每服溫湯下一枚不拘時
候日服三五枚服之五日後搗玄參為散食後溫米
飲調下一錢匕與葶麻相間服三日後依前只服葶
麻五日後却與玄參同服三日周而復始

繫瘤方

用稻上花蜘蛛十餘枚置桃李枝上候絲垂下取東
邊者撚為線子繫定子七日候換瘤子自落昔人病
瘤如拳大以此繫之至三換瘤子遂乾一夜忽失所

欽定四庫全書

普濟方

在天明於枕邊得之如一乾粟

又方

用狗屎拌雞子傳之去濃水如前方說傳生肉膏取
瘰

治肉瘤

先將麻布擦令血熱方上藥大者用藥四五次小者
用藥三四次以致根頭不痛有巨暈即止辨瘤數種
於後



軟筋瘤帶經絡垂	番花瘤形如石榴花	米瘤肉如米	粉瘤肉如粉	肉瘤色紅	茄子瘤	氣瘤肉實	骨瘤硬實	欽定四庫全書 普濟方	血瘤色如繫茄	軟自油瘤擦開如牛血	右十般瘤子惟有七般可醫如軟瘤番花瘤并自有破者不可療用藥之際切須審察	贅瘤方	用錦紋大黃醋磨塗瘤上漸消	白瘤方	令先極搔刮以繩縛之即愈又取東向木空中水熟
---------	----------	-------	-------	------	-----	------	------	---------------	--------	-----------	-----------------------------------	-----	--------------	-----	----------------------



刮瘤上洗之丸一日三即愈

治身上生贅肉

用海藻為末傳仍煎海藻酒服之則去

治贅瘤

用茄子咬去蒂於贅瘤上擦千百遍以茄撒於地上

茄若爛瘤平復矣

平復以點贅瘤法

凡剪去薄皮以藥點之疔落即去大者內捻出一肉

欽定四庫全書

普濟方

片子仍須擦令血熱方可用藥

治候子

用濃研好京墨筆抹在候子上候乾更抹以多為妙

數次即失去

又方

用買路紙不令人見揩後密藏撒於路上街磚下紙

爛則疾愈矣

又方



用青柴燒出水搽之

治流腫悶方

羊麋一兩青橘皮一兩湯浸焙燒銀沙鍋一兩

右為末用糯米飲和丸如梧桐子大每於食後以木

通下二十丸

井金散 枯瘤瘰大有神效

土黃二錢雄黃二錢硼砂二錢粉霜一錢輕粉一錢乳香半錢

沒藥半錢

欽定四庫全書

普濟方

右為細末假令瘤子如胡桃許用藥末少許半用津

唾調稀糊得所攤去瘤子項上如小不許唾津濕紙

花兩重蓋之後用黃龍膏蓋之間且度上藥次添藥

徹的周回大菲葉如比之上無徒漸瘤斬之後根銀

自然有動隨後然下來一方入麝香少許

黃龍膏

用黃蘗一味為細末唾調攤去紙上

生肌青龍散



訶子皮 高茶 龍骨

右等分為細末乾摻上

做土法

砒黃 另為末 三兩 木鱉子 用半兩 去殼 巴豆 半兩 不去油 礪砂

另為末
二兩

右砒黃一處為末後用木鱉子同石腦油和成一塊

油紙裹定理於坑內四十九日取出收於磁器盛劈

作小塊

欽定四庫全書

普濟方

枯瘤子藥方

桑柴灰 二椀 膩白石灰 三椀 朽木 三兩 乾桑耳 三兩 草烏頭

半 觔 四 川烏頭 兩

右朽木等四味燒灰作性同煎桑柴灰勻用水一桶

淋汁如法殼火成膏用之

治頭面生瘤子

用蛛絲勒瘤子根三二日自然退落

治宿肉贅瘤



右以 燒為末和臘月猪脂傅之

治癭根瘤贅瘰肉

右用博落迪和百丈青鷄桑灰為末傅之

治繫指并贅瘤方

右以花蜘蛛網絲於黃丹中養之繫指與瘤夜至旦

自下

釘棺木斧聲

去人身上努肉可候有候時專聽其聲聲發之時便

欽定四庫全書

普濟方

下手速捻二七遍已後自得消平也產婦勿用

普濟方卷二百九十四

