

欽定四庫全書

普濟方卷三百二十五

明 周王朱橚 撰

婦人諸疾門

血積氣痛

附論

血積氣痛者惡血久積而成痛也其狀隱隱疔痛或成塊攻築或聚或散或沈或浮蓋氣痛則血行氣澀則血滯若月水不通產後惡露不盡或因他病使血不行皆致氣血凝滯血因氣聚蘊而成積久不去則為痛

欽定四庫全書

普濟方

方

當歸煎丸 治婦人血積血癖臍腹疔痛心膈滿悶四

肢煩疼口苦舌乾飲食減少漸成勞瘦

當歸

切

焙附子

去皮臍生用各半兩

沒藥

研

硃砂

研

血竭

各一兩

禹餘糧

煨赤醋

延胡索

各半兩

以上搗研為末同酒

三升調勻於石器內漫火熬成膏和後藥 苳胡

去苗鱉甲

去裙襖

醋炙黃人參

乾地黄

焙

芍藥

磁石

醋煨

通 滓七

牡丹皮

各一兩

木香

一分

澤蘭

半兩



|   |                          |                              |                                     |   |  |
|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| <p>右將後九味搗為細末入前膏內和丸如豌豆大每服二十九丸淡醋湯下空心食前服</p> <p>聚成塊</p> <p>桃仁散 治婦人因月水不通血積不散氣攻疼痛積</p> <p>桃仁 湯浸去皮尖 雙仁炒二兩 劉寄奴 去根 碎 蓬莪茂 炮細 當歸</p> <p>炙 麝香子 微炒 烏藥 剉 白朮 湯浸去 陳橘皮 白穰 桂 去 皮 木香 乾薑 炮 附子 炮製去 芎藭 桑黃 剉 高 良薑 剉各 一兩</p> | <p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p> | <p>右為細末每服二錢溫酒或醋湯調下空心晚食前服</p> | <p>當歸丸 治婦人血積臍下結塊痛如錐刺或下赤白月水不調腰背痛</p> | <p>當歸 切 芍藥 吳茱萸 湯洗焙 大黃 煨 乾薑 炮 附 子 炮裂去 細辛 去苗 牡丹皮 芎藭 各半 蝨蟲 糲 皮 臍 糯米 炒 各 桂 去皮 厚朴 去皮 桃仁 去皮尖 一兩 炒 各</p> | <p>水蛭 糲米炒 各 七十枚 桂 三分 厚朴 去皮 桃仁 雙仁 麩</p> |
|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|--|



|   |   |  |   |                   |   |  |  |  |
|---|---|--|---|-------------------|---|--|--|--|
| <p>右為末煉蜜和劑搗令勻蜜丸如梧桐子大每服二<br/>                 十丸食前溫酒下加至三十丸</p> | <p>地黄煎丸 治婦人因月水不調血結不通血疾小腹<br/>                 成塊如覆杯</p> | <p>生地黄 <small>肥者細切研爛</small> 生薑 <small>去皮研爛絞汁一斤</small><br/> <small>絞汁一十斤</small> 乾漆 <small>炒令煙出</small> 桂皮 <small>去麤</small> 當歸 <small>切</small> 桃仁 <small>湯浸去皮</small><br/> <small>煎令如稀餲</small></p> | <p>生薑地黃 <small>焙</small> 芍藥 牡丹皮 牛膝 <small>去苗酒浸</small><br/> <small>炒</small> 大黃 <small>兩煨一兩半</small> 水蛭 <small>糯米炒</small> 蝨蟲 <small>去翅足頭</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>右搗羅後一十二味為末入前地黄煎中以微火上<br/>                 煎鞭軟得所衆手丸如梧桐子大每服七丸食前溫<br/>                 酒下</p> | <p>延胡索丸 治婦人血臟久冷虛積氣攻心腹臍下痛<br/>                 嘔逆痰涎不思飲食</p> | <p>延胡索 <small>米醋炙</small> 當歸 <small>切焙</small> 沈香 <small>剉各半兩</small> 木香 白朮<br/>                 芎藭 青橘皮 <small>湯浸去白穰焙</small> 附子 <small>炮製去皮</small> 吳茱萸 <small>湯浸</small><br/> <small>黃三分</small></p> | <p>炒桂皮 <small>去麤</small> 荆三稜 <small>濕紙裏煨別搗</small> 蓬莪茂 <small>剉炒</small><br/> <small>炒</small></p> |
|---|---|--|---|-------------------|---|--|--|--|



右為末以酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十九煎  
生薑醋湯下日進三服不計時候

勝金丸 治婦人血積心腹疼痛氣刺氣脹攻築或經  
候不行肢節煩疼痰逆癖塊

乾漆 炒煙 烏頭 炮裂去 狼毒 京三稜 剉碎炒黃

紫葳 凌霄花 麒麟竭 沒藥 檳榔 各半兩 硃砂 味同為末

砂 巴荳 二十枚去皮 大黃 單搗為 芫花 單搗為

右先以醋二升熬大黃芫花二味末次下巴荳硃砂

欽定四庫全書

普濟方

同熬稠其餘八味同搗細羅為末同熬成膏和劑如  
乾鞭少入煉熟蜜同和劑令得所丸如棗荳大每服  
七丸至十九當歸酒下

桃仁丸 治婦人因月水不利血結成積氣攻疼痛

桃仁 湯浸去皮尖 澤瀉 白茯苓 去黑 芍藥 瞿

麥穗 用 乾薑 炮 生乾地黃 焙 甜葶藶 紙上 當歸 切 甘草

芎藭 各一兩 大黃 剉炒一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九空心食



前溫酒下米飲下亦得

增減四物湯 出蘭室秘藏方 治婦人血積

當歸 川芎 芍藥 熟地黄 廣茂 荆三稜

桂 去皮 乾漆 炒煙盡

右各等分為麤末每服三錢水二大盞煎如常食前

沒藥丸 治婦人腹內血結氣攻疼痛行經

沒藥 研一兩 桂 去麤皮 當歸 切炒 芫花 醋炒半焦 乾漆 炒煙透各半兩

右搗羅為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服二十九

欽定四庫全書

普濟方

溫酒下不拘時

沒藥丸 治婦人血氣血積堅癖血痲發歇攻刺疼痛

嘔逆噎塞迷悶及血蠱脹滿經脈不行

沒藥 研一兩 芫花 一兩用米醋二升煎至一升半濾去滓不用將醋入石器內入礪砂

霜一兩巴荳肉七粒研細入醋內煎成膏入後藥末 附子 生去皮一兩 枳榔 剉一分

木香 肉荳蔻 二枚炮 當歸 剉焙 桂 去麤皮 華撥 各一

斑蝥 三十枚糯米炒令黃去翅足別研細

右搗羅七味為末 沒藥研勻入煎膏內和搗千



|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |                      |   |                  |                              |                             |          |                      |           |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|-----------|
| 百杵丸如梧桐子大初服三丸以醋炒薤白令焦黑 | 以酒浸煎一兩沸吞下漸加五丸七丸為度如急卒 | 血氣攻心脾以酒醋共一盞煎沸吞下血瘕堅癖結 | 塊攻心疼痛悶亂久醫不効者即入禹餘糧一兩火 | 煨醋淬七遍為末和為丸每服五丸蘇木節三兩剉 | 細酒三升煎至七合去滓分作三分每服下丸子三 | 丸併服三服即血瘕隨大小腸遂下其病立瘥人弱 | 者每服只二丸如是丈夫元臟小腸氣脾積氣癥塊 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 等疾即入丹砂一兩細研和停以生薑鹽湯吞下三 | 丸 | 硃砂丸 治婦人血塊攻築疼痛不可忍 | 硃砂 研 沒藥 研各 粉霜 半 乾漆 炒煙 乾薑 炮 京 | 三稜 炮各 桂 去麤 當歸 剉焙各 阿魏 一分 醋化入 | 餅炙 木香 一分 | 右為細末煮醋麵糊和丸如菘荳大每服十五丸淡 | 醋湯下或空心食前服 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|-----------|



薑黃散 治婦人冷癖血塊虛脹月經不調瘦弱不能  
食面無顏色

薑黃 白朮 各八兩 生薑 去皮細切三升 當歸 切十兩 陳麩末

大麥蘖末 各二升 生地黃 細切三升 桃仁 去皮尖 杏仁 去皮

尖雙仁 青橘皮 湯浸去白切三升

右為末白搗如泥水甌中鋪勻以麵封之勿使洩氣

蒸熱并甌置屋下三日取出藥暴乾搗羅為散酒服

方寸匕日二服取利為度十日內忌生冷難消化物

欽定四庫全書

普濟方

過十日百無所忌若煉蜜為丸亦得每服三十九酒

下日再服

大黃丸 治婦人月水不通結堅瘕如塊腹脹血積不

散

大黃 剉炒 硝石 各二兩 蜀椒 去目及閉口炒出汗半兩 代赭 研別

乾漆 炒煙 芎藭 赤茯苓 去黑皮 乾薑 炮 螽蟲 去翅足并

頭炒各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心食前溫酒



下米飲亦得漸加至三十九

芍藥湯 治婦人血積氣攻心刺疼痛不已面黃體瘦

經水不調

芍藥 芎藭 當歸切 防風 桂去麤皮 甘草炙 生

乾地黄焙各一兩 枳殼去穰 白朮各半

右麤搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服經水

久不利煎成取入芒硝半錢食前稍熱服

血竭散出瑞竹堂方 治婦人臍下血積疼痛

欽定四庫全書

普濟方

血竭 乳香 沒藥別研 白芍藥 水蛭鹽炒 當歸

麝香以上各一分 虎骨塗酥炙令黃

右為極細末每服三錢空心調酒下

硝砂丸 治婦人年久血積塊攻刺疼痛不可忍或嘔

吐不盡飲食面黃怠惰

硝砂去夾石者 當歸切 芫花醋炒微焦 蓬莪茂炮半 木

香一分 巴荳三十粒去皮 心膜出油盡

右先研硝砂巴荳沒藥如粉用米醋三升同煎為稀





|           |             |                      |  |     |                       |                    |                      |               |                       |   |    |                       |       |                      |                      |                      |
|-----------|-------------|----------------------|--|-----|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---|----|-----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 狗膽丸 治婦人血氣 | 加至二十九醋湯或溫酒下 | 右為末合研勻用狗膽和丸如梧桐子大每服十丸 | 當歸 <small>焙切</small> 延胡索 <small>各一兩</small> 沒藥 <small>研</small> 麒麟竭 硃砂 <small>研各三分</small> | 築疼痛 | 當歸丸 治婦人虛冷血氣及血積隱隱疔痛血塊攻 | 下不計時候日可三二服如不飲酒醋湯化下 | 熬成煎瓷盒盛勿透氣每服旋取一櫻桃大熱酒化 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 右搗羅三味為末入二研藥銀器內以酒醋各半盞同 | 沒藥 <small>研別</small> 硃砂 <small>研別</small> 木香 當歸 <small>剉焙各半兩</small> 五靈脂 <small>二兩半</small> | 飲食 | 沒藥丸 治婦人血氣積腹脇有堅癖攻築疼痛不思 | 盡酒醋立瘥 | 減用酒醋各半盞同煎數沸通口服不得嚼仍須飲 | 膏後將四味搗羅為細末入在前膏內和成劑瓷合 | 盛用時丸如梧桐子大每服七丸看患虛實臨時加 |
|-----------|-------------|----------------------|--|-----|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---|----|-----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|



|   |                                    |                              |    |
|---|------------------------------------|------------------------------|----|
| 狗膽 <small>一枚入巴莖七粒空</small><br>房後掛三十日乾用  | 木香                                 | 丁香                           | 硃砂 |
| 槐花 <small>各半</small><br>兩   |                                    |                              |    |
| 右為細末煉蜜丸如棗莖大每服二丸血風虛腫氣<br>急煎薄荷酒下兒枕不散疼痛不可忍煎醋湯下產<br>後通身走注疼痛蓮花湯下吐血不止刺薊根入小<br>便送下血塊桂心酒下血逆蓖麻湯下熱疾地黃酒<br>下敗血衝心蒲黃酒下 |                                    |                              |    |
| 青金丸 治婦人血積氣攻衝心腹疔痛吐逆不下食   |                                    |                              |    |
| 欽定四庫全書  | 普濟方                                |                              |    |
| 前發作神思昏悶四肢逆冷   |                                    |                              |    |
| 五靈脂 <small>二兩取細末一兩</small>  | 硝石 <small>一分同研</small>             | 斑蝥 <small>不叫者去翅與糯米同炒</small> |    |
| <small>取一分為末</small>  |                                    |                              |    |
| 右同研令勻滴水丸如豌豆大每服七丸煎生薑醋<br>湯嚼下不計時候服甚者再服愈   |                                    |                              |    |
| 秘傳降香湯 <small>出衛生家寶方</small>   | 治血氣攻刺如鑽針所刺痛不可<br>忍及一切敗血成積無藥可療者服之即愈 |                              |    |
| 真降香 <small>錢一</small>   | 沒藥 <small>錢一</small>               | 麒麟竭 <small>錢一</small>        |    |



|  |                    |                     |                  |   |                 |                       |                       |               |       |  |                    |             |   |                  |
|--|--------------------|---------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------|--|--------------------|-------------|---|------------------|
| 辛 川白薑 厚朴 <small>製各三分</small> 辣桂 <small>三分</small> 桃仁 <small>湯浸二分</small> 半 | 白芷 延胡索 蒲黃 香附子 澤蘭 細 | 川芎 當歸 芍藥 生乾地黄 三稜 蓬朮 | 調榮湯 治瘀血不消臍腹引腰背俱痛 | 方 | 面黃瘦煩渴增寒腰腫重痛久變癥瘕 | 冷所乘不能宣故血瘀也瘀血不去結痼成積則令人 | 瘀血者由經水蓄聚或產後惡露不盡皆本衝任氣風 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 醋膏丸服之 | 治一切血氣 <small>出本</small> 以蚶殼燒以米醋三度淬後埋令壞 | 右件各等分為細末每服二錢溫酒調下食前 | 絕腹腸疼痛寒熱肌肉消瘦 | 穿山甲散 <small>出楊氏家藏方</small> 治婦人血積氣塊往來刺痛經脈欲 | 右為末每服一錢磨真降香溫酒下立止 |
|--|--------------------|---------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------|--|--------------------|-------------|---|------------------|



|                                |                            |  |  |   |   |                             |                  |                   |                               |  |  |   |  |                             |                             |
|--------------------------------|----------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <p>夏製甘草<small>灸各三分</small></p> | <p>勝金丸 治婦人久積瘀血在腹內疼痛不可忍</p> | <p>水銀<small>二分</small> 硫黃<small>一兩</small> 自然銅<small>二味同研</small> 櫻欄皮<small>燒灰</small> 乾漆<small>搗碎</small></p> | <p>煙出<small>炒令</small> 鯉魚鱗<small>燒灰</small> 延胡索<small>半兩</small> 蟲蟲<small>一分</small> 水蛭<small>一分</small></p> | <p>者<small>乾</small> 當歸<small>一兩</small> 延胡索<small>半兩</small> 桂心<small>半兩</small> 亂髮<small>一兩</small> 沒藥<small>半兩</small></p> | <p>微<small>炒令</small> 烏蛇<small>一兩</small> 皮<small>灸</small> 微黃 桂心<small>半兩</small> 亂髮<small>一兩</small> 燒灰 沒藥<small>半兩</small></p> | <p>右為末研令勻以酒煮麵糊丸如梧桐子大每服不</p> | <p>計時候以熱酒下十九</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>麒麟竭丸 治婦人經絡痞塞腹內有瘀血疼痛不可忍</p> | <p>麒麟竭<small>半兩</small> 沒藥<small>半兩</small> 硃砂<small>用狗膽內浸一七日</small> 乾漆<small>搗碎炒</small> 芫</p> | <p>花<small>醋拌炒令乾</small> 延胡索 川烏頭<small>炮去臍</small> 白附子<small>各</small></p> | <p>兩<small>當歸</small> 硃霜<small>半兩</small> 伏龍肝<small>一兩</small> 蟲蟲<small>一兩</small> 皮水</p> | <p>蛭<small>一兩</small> 巴莖<small>一兩</small> 紙<small>裹</small> 壓去油 紅藍花<small>一兩</small></p> | <p>右為末用生鍼銚子內入頭醋一升先下硃砂攪勻</p> | <p>然後下藥末一半用漫火熬如膏後入餘藥末和丸</p> |
|--------------------------------|----------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|-----------------------------|



|   |                      |                          |                   |                   |                      |                           |           |            |                      |         |                               |                                   |                       |    |                 |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------|------------|----------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----|-----------------|
| 服 | 右咬咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓温 | 華陰細辛 麥門冬 甘草 各半<br>生地黃 一兩 | 川當歸 牡丹皮 白芍藥 子芩 木通 | 川當歸散 治榮衛消瘀血出聲音治痰嗽 | 血攻刺疼痛 方見本門癥<br>瘕積聚一塊 | 蟲蟲散 一名桃仁散 治婦人臟腑宿冷經脈不利腹中有瘀 | 空心用熱酒下二十九 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服日 | 赤芍藥 各一兩 | 黃芩 桂心 以上各半兩 蟲蟲 三分炒微黃去翅足 牛膝 去苗 | 當歸 一兩半 劉微炒 鼈甲 半兩塗醋炙 琥珀 半兩 桃仁 一兩去皮 | 當歸丸 治婦人經絡澀滯致有瘀血在臟結聚欲成 | 癥塊 | 如小荳大每服不計時候熱酒下五丸 |
|---|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------|------------|----------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----|-----------------|



|     |                  |                             |                  |               |                      |                      |                        |            |   |                       |                |                        |                    |                                  |
|-----|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------|---|-----------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 兩炒半 | 敗蒲湯 治婦人因血澀內瘀不散疼痛 | 敗蒲 燒灰 當歸 各二兩 牡丹皮 芎藭 赤芍藥 各一兩 | 敗蒲湯 治婦人因血澀內瘀不散疼痛 | 研令細每服空心熱酒調下二錢 | 大火煨令通赤漫漫去火候冷取出入麝香二錢同 | 右藥並入磁餅子內用瓦子蓋以鹽泥固濟候乾以 | 川大黃 一兩 剉碎 礪砂 芫花 牛膝 各半兩 | 欽定四庫全書 普濟方 | 困 | 烏金散 治婦人臟腑風冷宿有瘀血不消令黃瘦羸 | 右為細散每服二錢食前溫酒調下 | 枋木 剉一兩 木香 蒲黃 牡丹 赤芍藥 水蛭 | 地龍散 治婦人血氣不調腹中積瘀血疼痛 | 地龍 一分 微炒 蜩蜥 炒 芎藭 桂心 各一兩 乾薑 炮半兩 蘇 |
| 兩炒半 | 敗蒲湯 治婦人因血澀內瘀不散疼痛 | 敗蒲 燒灰 當歸 各二兩 牡丹皮 芎藭 赤芍藥 各一兩 | 敗蒲湯 治婦人因血澀內瘀不散疼痛 | 研令細每服空心熱酒調下二錢 | 大火煨令通赤漫漫去火候冷取出入麝香二錢同 | 右藥並入磁餅子內用瓦子蓋以鹽泥固濟候乾以 | 川大黃 一兩 剉碎 礪砂 芫花 牛膝 各半兩 | 欽定四庫全書 普濟方 | 困 | 烏金散 治婦人臟腑風冷宿有瘀血不消令黃瘦羸 | 右為細散每服二錢食前溫酒調下 | 枋木 剉一兩 木香 蒲黃 牡丹 赤芍藥 水蛭 | 地龍散 治婦人血氣不調腹中積瘀血疼痛 | 地龍 一分 微炒 蜩蜥 炒 芎藭 桂心 各一兩 乾薑 炮半兩 蘇 |



|                               |                           |  |   |                      |               |            |                              |   |                            |                               |                              |
|-------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------|---------------|------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓入地黃汁一合朴硝一錢溫服 | 硃砂丸 治婦人積瘀血在臟攻心腹時痛四肢黃瘦夜卧心煩 | 硃砂 與硃砂同結<br>硫黃 為砂子細研<br>芫花 醋拌炒<br>沒藥 水 | 兩各半<br>蛭 炒令黃<br>當歸 剉碎<br>川大黃 微炒<br>牡丹 蟲蟲 炒令黃<br>去翅足 | 右為末入砂子研令勻煉蜜搗三二百杵丸如菘荳 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 大每服空心熱酒下五丸 | 桃仁湯 治婦人經水否澀因冷血瘀不通結積臍腹為氣痛面黃體瘦 | 桃仁 生用各<br>大黃 一兩<br>桂 皮 去麤<br>當歸 切焙各<br>甘草 半 | 兩<br>蟲蟲 去頭<br>水蛭 炒焦各<br>十枚 | 右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓下芒硝半錢勻空心日晚再服 | 芫花散 出聖<br>息方 治婦人腹中宿有瘀血結聚不散疼痛 |
|-------------------------------|---------------------------|--|---|----------------------|---------------|------------|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|



|                       |   |
|-----------------------|---|
| 芎藭湯 治婦人經水不利血瘀不消       | 芎藭 大黃 荷葉 桂 菴藺子<br><small>生用各一兩 燒灰三枚 去麤皮</small> |
| 右為細散每服食前用熱酒調下半錢       |   |
| 芎藭湯 治婦人經水不利血瘀不消       |   |
| 芎藭 大黃 荷葉 桂 菴藺子        | <small>生用各一兩 燒灰三枚 去麤皮</small>                   |
| 右為細散每服食前用熱酒調下半錢       |   |
| 錢去滓空心溫服               |   |
| 右麤搗篩每服三錢水一盞半煎至一盞入朴硝一  |   |
| 錢去滓空心溫服               |   |
| 欽定四庫全書                | 普濟方   |
| 大黃湯 治婦人血瘀不消及撲損瘀血      |   |
| 大黃 桃仁 桂 生乾地黄          | <small>生用 湯浸去尖皮 雙仁各一兩 去麤皮 焙</small>             |
| 大黃 桃仁 桂 生乾地黄          | <small>生用 湯浸去尖皮 雙仁各一兩 去麤皮 焙</small>             |
| 右麤搗篩每服三錢水酒各半盞同煎至七分去滓  |   |
| 溫服                    |   |
| 治婦人臟腑瘀血氣脹頭疼咽乾胸中妨悶食即嘔逆 |   |
| 臍下滿疼四肢無力萎黃瘦弱宜服此       | <small>出聖方</small>                              |
| 亂髮 釜下土 桂心 神麩 麝香       | <small>微炒以上 各一兩</small>                         |





|            |               |                      |                                     |   |                      |                      |   |                           |                       |                      |                      |  |  |      |  |                 |
|------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|------|--|-----------------|
| 治破腹中惡血兼能殺蟲 | 調下即用青麻布包熨能逐瘀血 | 右以新布數重包裹白鹽一合燒灰存性研細溫酒 | 燒鹽酒 <small>出直指方</small> 治血閉腹痛產後瘀血腹痛 | 候 | 至七分入地黃汁二合再煎數沸去滓溫服不拘時 | 右除地黃汁外二味和勻每服二錢水酒各半盞煎 | 琥珀 <small>半兩</small> 沒藥 <small>半兩</small> 生地黃 <small>半斤</small> | 欽定四庫全書 <small>普濟方</small> | 琥珀散 治婦人經絡否澀腹內有瘀血疼痛不可忍 | 酒下十五丸一方有當歸無大黃每服十粒米飲下 | 右為末煉蜜和搗百餘杵丸如梧桐子大每服以熱 | 水蛭 <small>四十枚</small> 微炒 <small>又方用糯米炒</small> | 桃仁 <small>二兩</small> 雙仁 <small>麩炒微黃</small> 燕蟲 <small>四十枚</small> 翅足 <small>微炒</small> 川大黃 <small>二兩</small> | 心腹滿急 | 桃仁丸 <small>出聖惠方</small> 治婦人腹內有瘀血月水不利或斷或來 | 右為細散每服空心以熱酒調下二錢 |
|------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|------|--|-----------------|



|  |   |  |     |   |  |  |   |               |   |               |                      |                      |  |               |                      |
|--|---|--|-----|---|--|--|---|---------------|---|---------------|----------------------|----------------------|--|---------------|----------------------|
| 破宿血<br><small>草 出本</small><br>用紫荊木濃煮服之 | 破宿血<br><small>草 出本</small><br>用磨石燒赤熱投酒中飲之 | 除腹中宿血<br><small>草 出本</small><br>以乾柿多食瘥 | 之即瘥 | 治瘵血不散變成癰<br><small>草 出本</small><br>搗生菴藺蒿取汁一升服 | 療瘵血<br><small>草 出本</small><br>以琥珀刮屑水服之 | 消瘵血不散<br><small>草 出本</small><br>以生藕汁飲之 | 治婦人敗血甚佳<br><small>草 出本</small><br>以馬藍焙搗下篩酒服一錢 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 消瘵血<br><small>草 出本</small><br>以生地黃搗傅心腹上 | 此用王克明翰林調治三服而止 | 塊煎至八分去滓服空心食前余內子在吳興忽苦 | 右各等分為麤末每服二錢米泔一盞半沙糖一小 | 地榆散<br><small>出家藏<br/>經驗方</small><br>治敗血 | 何首烏 肉桂 地榆 香白芷 | 右用馬鞭草生搗水煎去滓復煎如飴空心酒服一 |
|--|---|--|-----|---|--|--|---|---------------|---|---------------|----------------------|----------------------|--|---------------|----------------------|



痲癖  
附論

夫婦人痲癖者本因邪氣積聚而生也痲者在腹內近  
臍左右各有一條筋脈急痛大者如臂次者如指因氣  
滯弦之狀多者痲氣也癖者為僻側在兩肋之間有時  
而痛故曰癖也夫痲之與癖皆陰陽不和經絡否隔飲  
食停滯不得宣流邪冷之氣搏結不散得冷則作疼痛  
故曰痲癖也

方

欽定四庫全書

普濟方

昆布丸 出千 治婦人胸中伏氣方

昆布 海藻 芍藥 桂心 白石英 欸冬花

桑白皮 人參 各二 栝子仁 茯苓 鍾乳 紫

苑 甘草 炙 乾薑 一兩 吳茱萸 五味子 細辛

各一 杏仁 百 橘皮 蘇子 各五

右為末蜜和丸如梧桐子大酒服二十九加至四十

丸

四等丸 出聖 治婦人痲癖氣心腹疼痛飲食不消宜服



|   |  |                              |  |                                 |                              |                   |   |                                  |  |                  |  |   |  |
|---|--|------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|--|------------------|--|---|--|
| <p>川大黃 <small>一兩到</small> 碎微炒 訶梨勒皮 檳榔 木香 <small>以上各一兩</small></p> | <p>右為細末以酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服食前生薑橘皮湯下十五丸溫酒亦得</p> | <p>又方 <small>出聖方</small></p> | <p>附子 <small>一兩</small> 炮裂 桃仁 <small>一兩</small> 湯浸去皮尖 雙仁 麸炒黃色 芫花 <small>醋拌炒</small> 令乾</p> | <p>右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每日食前以生薑湯下十丸</p> | <p>又方 <small>出聖方</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>鼈甲 <small>一兩</small> 塗醋炙 令黃去裙襴 川大黃 <small>一兩</small> 到 微炒 京三稜 <small>一兩</small> 炮裂</p> | <p>右為末以醋煮麵糊丸如梧桐子大每服食前以生薑湯下十丸</p> | <p>木香 礞砂丸 <small>出濟生</small> 拔萃方 治婦人痰癖積聚血塊刺痛脾胃</p> | <p>虛寒宿食不消久不瘥</p> | <p>丁香 礞砂 <small>研</small> 木香 官桂 附子 <small>炮</small> 乾漆 <small>炒煙</small> 盡</p> | <p>細墨 大黃 <small>剉炒</small> 為末 乳香 <small>研</small> 廣茂 青皮 京三稜</p> | <p>巴荳霜 <small>減</small> 沒藥 <small>研</small> 猪牙皂莢 乾薑 <small>炮各</small> 等分</p> |
|---|--|------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|--|------------------|--|---|--|



|                          |  |                                       |   |            |                      |                      |                                     |  |  |   |                   |                      |                      |                      |
|--------------------------|--|---------------------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 仁 琥珀 桂心 麝香<br>各三分<br>研以上 | 當歸 芍藥 桃仁 牛李<br>炒 對微 各三<br>仁 兩 去皮尖雙<br>微黃 | 木香 檳榔 蓬莪茂 京三稜 延胡索<br>分三 兩 各半 三分<br>炮對 | 木香散 <small>出聖 惠方</small> 治婦人痿痺心腹痛不欲飲食宜服 | 酒下三十九桃仁湯亦得 | 搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前熱 | 右為末以乾漆三兩為末用醋二升熬成膏和末藥 | 去苗 赤芍藥 琥珀 阿魏 煨熟為度<br>三分 三分 一兩 一分 麵裹 | 雙仁 欬炒 青橘皮 檳榔 麝香 牛膝<br>三分 去皮尖 三分 湯 一兩<br>浸去白 兩 麝香 一分<br>雙仁 欬炒 | 躋 川大黃 葳靈仙 京三稜 桃仁<br>碎微炒 三分 微炒 一兩 微<br>炒 兩 微 炮對 兩 微<br>三兩 一分 半生用 一兩 兩 三分 炮<br>裂去皮 | 牛李子丸 <small>出聖 惠方</small> 治婦人痿痺氣每發攻心脇疼不能食 | 後溫水送下加至大便利為度一方溫酒下 | 將前藥末與膏子為丸如麻子大每服三五十丸食 | 砂去子滓銀器中慢火熬次下巴荳霜大黃熬成膏 | 右除硃砂乳香沒藥外同為末以好醋一升化開硃 |
|--------------------------|--|---------------------------------------|---|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|



|                     |                                     |                                      |  |                                       |                          |  |            |     |  |  |                                       |  |  |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|------------|-----|--|--|---------------------------------------|--|--|
| 右搗細羅為散每服不計時候以熱酒調下一錢 | 治婦人無故憂患胸中迫塞氣不下方 <small>出千金方</small> | 芍藥 滑石 黃連 石膏 山茱萸 前胡 <small>各一</small> | <small>兩六</small> 大黃 麥門冬 細辛 生薑 <small>各一</small> 半夏 <small>八</small> | <small>銖</small> 桂心 <small>兩半</small> | 右為末煉蜜丸如梧桐子大酒服二十九加至三十丸日三服 | 麝香丸 <small>一名大麝香丸</small> 出聖惠方 治婦人疝瘕冷氣兼疰氣心腹痛 | 欽定四庫全書 普濟方 | 不可忍 | 麝香 <small>半兩</small> 別研 阿魏 <small>一分</small> 麩 <small>一分</small> 麩 <small>一分</small> 五靈脂 桃仁 三稜 | 各三 芫花 <small>醋炒</small> 枳榔 <small>各一</small> 蓬莪茂 桂心 沒藥 木香 當歸 <small>各半</small> | 右為末入麝香令勻用粳米軟飯為丸如梧桐子大每服十九丸無時淡醋湯下一方淡薑湯下 | 桃仁散 <small>出聖惠方</small> 治婦人疝瘕氣令人羸瘦寒熱食少 | 桃仁 <small>半兩</small> 湯浸去皮尖 柴胡 <small>一兩</small> 去苗 枳榔 <small>三分</small> 厚朴 <small>三分</small> |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|------------|-----|--|--|---------------------------------------|--|--|



|  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| <p>去麤皮塗生薑<br/>                 汁炙黃香熟<br/>                 鼈甲 一兩塗醋炙<br/>                 枳殼 三分微黃去穢炒</p> | <p>烏梅肉 三分炒<br/>                 赤芍藥 三分<br/>                 白朮 三分<br/>                 甘草 半兩炙<br/>                 川大黃 一兩對</p> | <p>右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞入生薑<br/>                 半分煎至六分去滓每於食前稍熱服</p> | <p>大黃丸 出聖<br/>                 治婦人瘕癖氣多疼痛</p> | <p>川大黃 一兩對<br/>                 麝香 一分細研<br/>                 硃砂 三分細研<br/>                 京三稜 一兩醋拌<br/>                 微炒巴豆 一分去皮心研<br/>                 紙裹壓去油<br/>                 川烏頭 三分去皮<br/>                 桂心 三分<br/>                 當歸 三分</p> | <p>欽定四庫全書<br/>                 普濟方</p> | <p>歸 三分<br/>                 微炒木香 三分<br/>                 枳榔 三分<br/>                 乾薑 三分裂對</p> | <p>右件藥搗羅為散煉蜜和搗三二百杵丸如小豆大<br/>                 空心及晚食前以粥飲下五丸以利為度</p> | <p>京三稜丸 出聖<br/>                 治婦人瘕癖氣攻腹脇妨痛面黃羸瘦<br/>                 少力不飲食</p> | <p>京三稜 三分<br/>                 炮裂鼈甲 三分塗醋炙<br/>                 木香 三分<br/>                 桂心 半兩</p> | <p>川大黃 一兩對<br/>                 微炒枳榔 三分<br/>                 訶梨勒 三分<br/>                 用皮煨<br/>                 當歸 半兩對</p> | <p>炒芎藭 半兩<br/>                 郁李仁 三分湯浸<br/>                 微炒</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|



右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大食前粥  
飲下三十丸

鼈甲丸 出聖方 治婦人痲痺及血氣不調或時臍腹撮痛

鼈甲 一兩 塗醋炙令微黃去裙襴 川大黃 一兩 剉碎微炒 別搗為末 京三稜

一兩 炮 附子 一兩 炮 木香 一兩 乾漆 一兩 剉微炒 別為末 當歸 一兩

琥珀 沒藥 各一兩 枳殼 一兩 麩炒 微黃去穢

右為末以陳頭醋二升先煎鼈甲大黃末成膏入諸

藥末和搗三二百杵丸如梧桐子大每服不計時候

欽定四庫全書

普濟方

熱酒下二十九

當歸散 出聖方 治婦人痲痺氣攻心腹痛飲食不思

當歸 三分 剉 木香 半兩 京三稜 一兩 剉 檳榔 三分 桂心 半兩

陳皮 半兩 郁李仁 一兩 吳茱萸 一兩 湯浸去皮尖 雙仁 麩炒 桃仁 一兩

右件搗麩羅為散每服三錢水一中盞煎至六分去

滓不計時候稍熱服

枳殼煎丸 出聖方 治婦人痲痺氣嘔吐酸水腹痛面色

色





|                      |               |   |                   |       |                      |                      |  |               |   |       |   |                |                      |   |  |        |
|----------------------|---------------|---|-------------------|-------|----------------------|----------------------|--|---------------|---|-------|---|----------------|----------------------|---|--|--------|
| 右拌勻以水和作碁子用精羊肉四兩切炒令乾下 | 口者炒出汗<br>各一錢半 | 小麥麵 <small>四兩</small> 肉荳蔻 <small>去殼為末</small> 華撥 <small>為末</small> 胡椒 <small>末</small> 蜀椒 <small>去目并閉</small> | 麵碁子 治婦人血氣癖積臟腑疼痛泄瀉 | 酒下二十九 | 右為末醋煮麵糊丸如梧桐子大每服不計時候熱 | 麝香 <small>一分</small> | 麵 <small>一兩</small> 炮 <small>微黃</small> 木香 <small>兩半</small> 麥蘖 <small>一兩</small> 炒 <small>微黃</small> 鼈甲 <small>一兩</small> 塗 <small>醋炙</small> | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 蓬莪茂 <small>三分</small> 草薺 <small>兩半</small> 芫花 <small>一兩</small> 醋 <small>拌炒</small> 令乾 京三稜 <small>三分</small> 炮 <small>神</small> | 欲飲食宜服 | 蓬莪茂丸 <small>出聖方</small> 治婦人痰癖氣兩脇妨脹或時疼痛不 | 前生薑湯下十五丸漸加至二十九 | 右為細末入前煎中和鎔為丸如梧桐子大每服食 | 微炒 <small>蓬莪茂</small> 一兩 訶梨勒皮 <small>一兩</small> 當歸 <small>一兩</small> 木香 <small>一兩</small> | 枳殼 <small>三兩</small> 麩炒 <small>微黃</small> 去穰搗羅 五靈脂 <small>一兩</small> 川大黃 | 萎黃不能飲食 |
|----------------------|---------------|---|-------------------|-------|----------------------|----------------------|--|---------------|---|-------|---|----------------|----------------------|---|--|--------|



水五升入葱薤白各五莖細切依常法煮肉以鹽醋

調和候熟濾去肉將汁煮碁子空服熱食

半夏厚朴湯 出千金方 治婦人胸滿心下堅咽中熱如炙有

肉嚙吐之不出咽之不下

半夏 一升 厚朴 三兩 茯苓 四兩 生薑 五兩 蘇葉 二兩

右咬咀以水五升煮取四升分四服日三夜一不瘥

頓服一方無蘇葉生薑

沒藥散

欽定四庫全書

普濟方

沒藥 一兩 芎藭 一兩 鼈甲 二兩 醋炙令黃去裙襴

右為細末每服不計時候以熱葱酒調下一錢

白朮猪肚粥 治婦人腹脇血癖氣痛衝頭面燿燿嘔

吐酸水四肢煩熱腹脹

白朮 二兩 栝榔 一枚 生薑 切炒一兩半

右麤搗篩以猪肚一枚治如食法去滑內藥於肚中

縫口以水七升煮肚令熟取汁入粳米及五味同煮

粥空腹食之



半夏不飢方 治婦人瘰癧血氣口吐酸水

大麥麵四兩半夏湯浸去滑盡桂去麤皮一錢為末

右同以生薑汁并米醋少許和切作不飢熟煮如常

法空心食之

治婦人患瘰癧按時如三五筒而作水聲殊不得寢食常

心悶出千金方

右用牽牛三升治下篩飲服一方寸匕日一服三十

服後可服好硫黃一兩

欽定四庫全書

普濟方

治婦人氣痛方出千金方

右取烏牛尿一服止

神効方出大全良方 治婦人瘰癧及血氣等

右以獾猪肝一具可及十兩者用巴荳五十枚去尖

皮劄在肝內用醞醋三碗慢火熬令乾爛熟入砂鉢

內研令及爛入京三稜末和稠得所丸如梧桐子大

每服五丸食前熱酒下

夫瘰癧瘰癧血氣塊硬發渴刺痛甚則欲死究而言之皆



血之所為僕嘗治一婦人血氣刺痛極不可忍甚而死  
一二日方醒醫巫并治數年不愈僕以葱白散烏雞丸  
遂安又嘗治一婦人血氣作苦如一小盤樣走注刺痛  
要一人伏定方少止亦用此二藥而愈尋常婦人血氣  
用此二藥亦有奇効故錄於後

小烏雞煎丸 出大全良方 治瘰癧瘰氣血塊硬發血刺痛

甚則欲死或塊如小盤每作痛要人伏定方少止數  
年不愈者與葱白散間服神効方見婦人諸疾門雜

欽定四庫全書

普濟方

病類

葱白散 出大全良方 專治一切冷氣不和及本臟膀胱氣攻

衝疼亦治婦人產前後痛胎不安或腹刺痛者兼能  
治血臟宿冷百節倦疼肌膚怯弱勞傷帶癖久服盡  
除但婦人一切疾病最宜服之

川芎 當歸 枳殼 厚朴 桂心 乾薑 芍

藥 舶上茴香 青皮 苦楝子 木香 熟地

麥芽 三稜 蓬朮 茯苓 神麩 人參 各等分



右為細末每服三錢以水一盞連根葱白二寸拍破  
塩半錢煎至七分溫服加大黃訶子宜相度病狀如  
大便不利入大黃同煎却不入鹽如大便自利入訶  
子煎朱先生云此藥大治心氣脾疼用之見効僕嘗  
以此藥治浮腫立効陳宜人病血氣作楚痛不可忍  
服諸藥無効召僕診之兩關脈弱為肝脈沉差緊此  
血氣漸成痿痺也只以此二藥安愈四明馬朝奉後  
院亦病此用二藥愈

欽定四庫全書

普濟方

治血運血結或聚於胸內或偏於小腹或運於脇  
出保命集

方

右用四物湯四兩焙當歸川芎鬼箭紅花玄胡各一  
兩同為麤末如四物湯茶清調服

沒藥散 出保命集方

燕蟲 一錢去翅微炒 水蛭 三錢炒 麝香 少許 沒藥 一錢

右為細末前藥調服血下痛止只服前藥

治女子血氣破痿痺冷氣心痛  
出本草



以蓬莪茂用酒醋磨服效

乳癰  
附論

足陽明之脈自缺盆下於乳又衝脈者起於氣衝並足陽明之經夾臍上行至膻中而散蓋婦人以衝任為本若失於將理衝任不和陽明經熱或為風邪所客則氣壅不散結聚乳間或鞭或腫疼痛有核皮膚焮赤寒熱往來謂之乳癰然風多則腫鞭色白熱多則腫焮色赤若不即治血不流通氣為留滯與乳內津液相搏腐化

欽定四庫全書

普濟方

為膿○大凡婦人乳癰此非小病蓋婦人肺在前近乳故也懷娠發乳癰此却無害蓋由血氣凝滿而成纔產後便可愈又有產後發乳癰者此乳道蓄積不去因氣逆而結成宜常令擠乳汁令通便可愈也又有產後為小兒睡中呵吹以致腫結而痛名曰吹奶宜速下其乳汁導其壅滯有輔奶又名石奶初結如桃核漸次浸長至如拳如椀堅硬如石數年不愈將來潰破則如開石槽之狀又反轉外皮名審花奶年四十以下間有可治



者五十以上有此決死如未破以前不如不治以聽其  
終天年不可不知於其右手關上脉沉而為陰虛者則  
病癰乳久不瘥將變為漏男子以腎為重婦人以乳為  
重上下不同而性之根一也坐草以後風邪襲虛榮衛  
為之凝滯與夫嬰兒未能吮乳或乳為兒輩所吹飲而  
澀或斷乳之時汗出不盡皆令乳汁停蓄其間與血氣  
搏結而腫痛繼而結硬至於手不能近前乳癰之患成  
矣乳癰一名妬乳惡寒發熱煩躁大渴是其證也甚則

欽定四庫全書

普濟方

嘔吐無已咽膈窒礙何耶蓋胃屬足陽明經實通乎乳  
血熱入胃嘔吐何疑或者昧於溫散妄以寒涼疎轉之  
劑行之即便癰毒自外入裏嘔吐尤甚其咽膈妨礙者  
毒氣上衝所致也生薑甘桔湯最為咽間要藥乳粉托  
裏散最能返出毒氣一香散加瓜萋根止嘔止渴兩得  
其便也更以萬金醉膏佐之能事畢矣雖然渴而過飲  
水入腸胃必至下利醫理失節久而不瘥必成漏瘡又  
不可不防其變○產後不自飲兒并失兒無飲乳乳蓄



常結癰不飲兒令乳上腫者以雞子白和小荳散傅乳  
房令消結也若飲兒不泄者數捻去之亦可令大孩含  
水口中使啣之取滯乳汁吐之不含水啣去熱能令乳  
頭作瘡乳孔塞也○產後宜啣去乳汁不宜蓄積不出  
惡汁內引於熱則結硬堅腫牽急疼痛或渴思飲其奶  
手近不得若成膿者名妬乳乃結成癰宜服連翹湯利  
下熱毒外以赤小荳末水調塗之便愈或數捏去乳汁  
或以小兒手摩動之或大人含水啣之得汁吐之其汁  
狀如膿若產後不曾乳兒蓄積乳汁亦結成癰○凡婦  
人乳癰發痛者亦生子心也俗呼吹奶是也吹者風也  
風熱結聚於乳房之間血脈凝注久而不散潰腐為膿  
宜用益元散生薑湯調下冷服或新汲水時時呷勿輟  
晝夜可三五十次自解矣或煎解毒湯頓服之

方

治乳癰方

出千  
金方

麥門冬

一升

黃芩

芍藥

茯苓

各二兩

桑寄生

欽定四庫全書

普濟方





|   |                                      |   |                    |                    |                       |               |                 |                     |  |  |   |  |                                       |
|---|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|
| 人參 黃耆 防風 甘草 <small>各一兩</small> 飴糖 <small>八兩</small> 大棗 <small>五枚</small><br>右咬咀以水一斗煮取三升去滓內糖一沸分作四服 | 又方先服前件湯五日後服此丸即愈矣 <small>出千金方</small> | 天門冬 <small>五兩</small> 澤蘭 <small>五分</small> 大黃 <small>十分</small> 升麻 <small>六分</small> 羌活 桑寄生 | 防風 人參 黃耆 乾地黄 白芷 通草 | 黃芩 枳實 五味子 茯苓 天雄 芎藭 | 當歸 <small>各一兩</small> | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 右為末蜜丸酒服二十九加至四十九 | 麥門冬丸 治乳癰先用諸湯藥塗傳癰後服此 | 麥門冬 <small>去心二兩</small> 木通 人參 五味子 黃耆 羌 | 活頭 <small>去蘆</small> 防風 <small>去苗</small> 生乾地黄 <small>焙</small> 黃芩 <small>去心</small> 桑寄生 | 茯苓 <small>去木</small> 天雄 <small>炮裂去皮臍</small> 升麻 澤蘭 <small>各半兩</small> 枳殼 <small>去穰炒</small> | 大黃 <small>各三分</small> 當歸 <small>一分</small> | 右搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服空心溫酒下<br>二十九漸加至三十九以瘥為度 |
|---|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------|---------------------|--|--|---|--|---------------------------------------|



|                                       |  |                            |              |   |  |               |          |  |   |  |   |                                   |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---|--|---------------|----------|--|---|--|---|-----------------------------------|
| 托裏散<br><small>出衛生家寶方</small><br>治乳癰極妙 | 甘草<br><small>生一兩</small><br>當歸<br><small>一兩</small><br>天蘿<br><small>一箇炒絲瓜是也</small><br>瓜萋<br><small>一箇炒紫色</small><br>皂 | 角刺<br><small>四十九箇炒</small> | 右件為細末每服二錢酒調下 | 治奶結硬<br><small>出朱氏集驗方</small><br>凡未成瘡纔覺腫硬作痛 | 右以葱熱熨之其法用中樣磁瓶須瓶口寬者以炭火入瓶內上以熱灰填滿平瓶口以葱葉及葱白搥損令覆瓶口以手帕子裹定煮熱將瓶口葱向腫處 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 任意輕輕熨之有驗 | 芎藭丸<br><small>出聖惠方</small><br>治婦人乳癰穿穴膿水不住年月遠深蝕肉傷筋或時碎骨瘡中自出肉冷難生疼痛不可忍 | 芎藭<br><small>二兩</small><br>當歸<br><small>半兩</small><br>桂心<br><small>兩</small><br>黃耆<br><small>兩</small><br>沉香<br><small>各一</small><br>安息香<br><small>各一</small> | 附子<br><small>半兩去皮臍</small><br>白芷<br><small>兩</small><br>麒麟竭<br><small>兩</small><br>丁香<br><small>各半</small><br>木香<br><small>兩</small> | 枳殼<br><small>一兩</small><br>羌活<br><small>兩</small><br>赤芍藥<br><small>各半</small> | 右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心午晚食前以甘草酒下二十九 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------|---|--|---------------|----------|--|---|--|---|-----------------------------------|



|                                      |  |  |                             |            |   |  |   |                   |                                 |                            |                              |          |   |   |             |                             |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|------------|---|--|---|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------|---|---|-------------|-----------------------------|
| <p>排膿散 <small>出千方</small> 治乳癰除惡肉</p> | <p>芙蓉 <small>微炙</small> 鐵精 桂心 <small>去皮</small> 細辛 <small>去苗</small> 黃芩 <small>去心</small> 人參</p> | <p>防己 <small>一作防風</small> 乾薑 芎藭 當歸 <small>各三分</small> 甘草 <small>五分</small></p> | <p>右治下篩酒服方寸匕日三夜一服藥十日膿血出</p> | <p>多勿怪</p> | <p>葶藶散 <small>出聖惠方</small> 治婦人乳癰瘡腫焮熱疼痛宜用散毒氣</p> | <p>甜葶藶 <small>一兩</small> 赤芍藥 <small>三分</small> 白芷 <small>一兩</small> 丁香 <small>三分</small> 黃耆 <small>一兩</small> 羊桃</p> | <p>皮 <small>一兩</small> 硝石 <small>三分</small> 半夏 <small>一兩</small> 湯浸 <small>七遍</small> 去滑 白斂 <small>一兩</small> 莽草 <small>半兩</small> 木香</p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>一兩 木鱉子 <small>去殼</small></p> | <p>右為細散用酸漿水調和令勻攤於故帛上貼之</p> | <p>麥門冬湯 治乳癰初有異於常則先用此藥散化毒</p> | <p>氣</p> | <p>麥門冬 <small>去心</small> 二兩 黃芩 <small>去黑心</small> 一兩 桑寄生 <small>剉下</small> 兩半 甘草 <small>炙</small> 令</p> | <p>木通 防風 赤茯苓 <small>去皮</small> 芍藥 <small>炒</small> 黃耆 <small>各一兩</small> 人參</p> | <p>半 一兩</p> | <p>右麤搗篩每服三錢匕水一盞入乳糖一分棗三枚</p> |
|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|------------|---|--|---|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------|---|---|-------------|-----------------------------|



擘破同煎至七分去滓溫服三日早晨午時至晚各一方無木通

治乳癰黃耆白芷膏塗方

黃耆 白芷 大黃 當歸 續斷 薤白  
各一兩 二兩

切 松脂 乳香 蠟 猪脂 生地黃汁  
二兩 半兩 一兩 二斤 三合

右取前五味剉碎以地黃汁拌勻先熬脂令沸下諸藥煎白芷赤黑色漉出下薤白松脂香蠟煎候鎔盡以綿布絞去滓瓷盒內盛取塗傅乳上旦四度即瘥

欽定四庫全書

普濟方

一方無乳香

大黃散 出聖惠方 治婦人乳癰經年腫破如石不消宜貼

川大黃 當歸 微炒 赤芍藥 黃香 芎藭 防風

去苗 黃連 去鬚 莽草 梔子仁 以上各一兩 膩粉 一兩 乳香 半兩

右為散細入粉和勻以雞子白并蜜調令勻塗帛上

貼乾即易

當歸散 出聖惠方 治乳癰堅硬如石腫痛

當歸 芍藥 人參 枳殼 去穢炒 黃耆 炒 蒺藜



|  |                                |         |                                       |   |   |                             |                               |                       |                             |        |          |
|--|--------------------------------|---------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|----------|
| 子 <small>去角</small> 附子 <small>去皮</small> 雞骨 <small>各一兩</small> 薏苡仁 <small>半兩</small> 桂 <small>去麤皮一兩半</small> | 右搗羅為散服二錢匕以溫酒調下日三早晨午時至晚各一服一方用枳實 | 地黄湯 治乳癰 | 生地黄汁 <small>合一</small> 射干 升麻 黃連 芒硝 白欬 | 梔子 大黃 <small>各半兩</small> 甘草 當歸 <small>各一兩</small> | 右九味剉碎以水五升煎至三升去滓下地黄汁更煎三五沸以故帛二片浸藥汁更互搗腫上日一二十度再煖用即瘥 | 治婦人乳腫不消 <small>出聖惠方</small> | 川大黃 莽草 伏龍肝 <small>各三分</small> | 右為細散入生薑汁半合入少醋和塗乳上乾即再塗 | 治乳癰初作腫痛 <small>出直指方</small> | 貝母 天花粉 | 右等分為末酒調服 |
|--|--------------------------------|---------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------|----------|



|   |   |
|---|---|
| 木通散 <small>出聖方</small> 治婦人乳癰成瘡腫膿水疼痛不可忍                      | 木通 <small>一兩半</small> 黃耆 <small>二兩</small> 玄參 <small>一兩</small> 沉香 <small>三分</small> 赤芍藥 <small>二兩</small> 子芩 |
| 一兩 敗醬 一兩 露蜂房 一兩 防己 <small>一兩半</small> 川朴硝 <small>二兩</small> | 右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計時候  |
| 溫服  | 又療乳癰初覺有異 <small>出大全良方</small>   |
| 黃芩 甘草 防風 赤芍藥 黃耆 <small>各五兩</small> 通草                       | 分 <small>十</small> 桑寄生 麥門冬 <small>各六分</small> 大棗 <small>五枝</small>  |
| 欽定四庫全書  | 普濟方   |
| 右細切以水一升煮取九合去滓入乳糖六分分為  | 四服  |
| 枳殼散 治乳癰堅硬   | 枳殼 <small>去穰</small> 芍藥 人參 <small>各一兩半</small> 黃耆 雞骨 <small>炙</small> 木通                                      |
| 當歸 桂 <small>去白皮</small> 蒺藜子 <small>炒去刺</small>              | 右搗羅為散每服二錢溫酒調下日三   |
| 療乳癰 <small>出大全良方</small>                                    | 用黃丹一分細研末以雞子白調停塗之乾則易立  |



|   |                                  |                      |    |                                      |                      |     |                                 |                  |                   |           |                               |                                  |    |                              |                              |    |                                |                      |                    |     |                               |                               |
|---|----------------------------------|----------------------|----|--------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------|----------------------|--------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|
| 愈 | 治乳腫<br><small>出大全<br/>良方</small> | 用馬溺塗之立止又黃柏末雞子青調搽一方用白 | 馬溺 | 又方未成腫痛者<br><small>出百一<br/>選方</small> | 用水粉炒令黃色以紙攤在地上出火毒了碾作細 | 末傳之 | 熨火湯<br><small>出聖<br/>惠方</small> | 治乳癰風毒腫久不消未成服先用湯淋 | 欽定四庫全書<br><br>普濟方 | 熨令四面惡物消散方 | 赤小荳<br><small>五<br/>合</small> | 葱<br><small>一十莖并<br/>根細切</small> | 白礬 | 甘草<br><small>一<br/>兩</small> | 乳香<br><small>半<br/>兩</small> | 芥子 | 桑根白皮<br><small>二<br/>合</small> | 右用青布裹於鍋內以水三升煮藥令熟乘熱熨腫 | 處冷則再煖熨之一日可四五度熨則令內消 | 治奶癰 | 乾山藥<br>苧根<br>芙蓉葉<br>五倍子<br>葱管 | 白蜜<br><small>各等<br/>分</small> |
|---|----------------------------------|----------------------|----|--------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|----|------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------|----------------------|--------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|



|  |                   |                           |   |                                       |       |                      |                      |               |    |  |                                |                  |        |                 |
|--|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------|----|--|--------------------------------|------------------|--------|-----------------|
| 治乳癰疼痛宜熏方<br><small>出聖</small><br>兼治乳汁不出內結成膿腫 | 右為細散每服一錢温酒調下日服汗出瘥 | 蒲公英<br><small>兩各一</small> | 川大黃<br><small>剉碎</small><br>川棟子<br>赤芍藥<br>馬蹄<br><small>燒灰</small><br>玄參 | 大黃散<br><small>出聖</small><br>治婦人乳癰焮腫疼痛 | 化為大小便 | 塗患處用白紙蓋上面如乾用水外面濕之膿血皆 | 右為細末不要見火用雞子清調作二服用鐵篋挑 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 錢二 | 乳香<br>沒藥<br>草烏<br>南星<br>牡蠣<br><small>以上各一錢</small><br>白芨 | 治奶癰<br><small>出大</small><br>全方 | 右搗羅為散用漿水調為膏貼之乾即易 | 治乳癰貼散方 | 右為末用米醋調敷在患處留頭立效 |
|--|-------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------|----|--|--------------------------------|------------------|--------|-----------------|





名妬乳方

用露蜂房半斤以醋五升煮令熟相和傾於瓶中熱  
熏乳上三五度即瘥冷則再煎用之一方燒灰研每  
服二錢水一盞煎六分溫服

治乳癰方

出千  
金方

大黃 莽草 生薑 各二分 伏龍肝 十二分

右搗為末以醋和塗乳痛即止有效劉涓子不用生  
薑用金背鯽魚立效

欽定四庫全書

普濟方

治乳癰始作其乳癰大堅赤紫色衣不得近痛不可忍

者 出千  
金方

大黃 棟實 芍藥 馬蹄

右各等分治下篩飲服方寸匕取汁出瘥一方酒服  
覆取汗當睡著覺後腫處散不痛經宿乃消

治乳癰黃明膠傳散

黃明膠 炙令燥 大黃 炒 莽草 細辛 去苗各半錢

右搗羅為散以雞子白調芍藥勻塗紙上貼腫處頻



易即瘡仍割穿如小錢大露腫頭

治乳癰腫未破痛不可忍薰陸香塗傅方

出聖  
惠方

薰陸香

一分  
為末

百合

半  
兩

雄雀屎

二十  
枚

鹽

半  
兩

右細研令勻以醋調如糊塗傅患上乾即再傅以瘡

為度一方鼠糞醋調塗

生魚膏主乳癰

生鯉魚

長五  
寸

大黃

莽草

竈中黃土

各六  
兩

右別搗魚如膏三物下篩更搗令調以生地黄汁和

欽定四庫全書

普濟方

傅腫上日五六夜二三即愈

治乳癰及一切無名腫毒

瓜蒌

貝母

去  
心

乳香

天花粉

右等分咬咀水酒煎以疾上下分食前後服未成速散

已成速潰惡毒從大便中出如膠神驗

治諸般腫毒并瘰毒奶癰

白朮

猪苓

赤茯苓

澤瀉

右各等分兩瓜蒌子酒一半水煎一盞露天一宿臨



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 治乳癰堅方<br><small>出肘後方</small>         | 黃芩 白斂 芍藥<br><small>各等分</small>          |
| 單用地黃傳之                               |   |
| 右合搗傳熱即易之取瘥止一切癰腫皆用之一方                 |   |
| 治乳癰除惡肉<br><small>出千金方</small>        | 生地黄 芒硝 豉<br><small>三升 一升</small>        |
| 右為細散入雞子白調如稀糊塗乳腫處乾即更塗之                |   |
| 欽定四庫全書<br>普濟方                        |   |
| 治婦人乳癰焮腫赤硬疼痛不止<br><small>出聖惠方</small> | 赤小豆 白芷 白斂 雞子<br><small>炒 一枚 用白</small>  |
| 服滓再煎                                 |   |
| 右吹咀每服四錢水一盞酒半盞煎八分去滓臨卧                 |   |
| 癰急宜連進數服立効                            | 金銀花 黃耆 當歸 甘草<br><small>各三兩半 各二兩</small> |
| 湧泉神應散<br><small>出德生堂方</small>        |   |
| 睡卧用黑豈一升米醋煮乾就炒燥研末傳之                   |   |



|                      |                     |  |   |                             |  |               |     |                             |   |                                |                           |  |                     |
|----------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|---------------|-----|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------|
| 右為末將乳飲服半錢日三若左乳汁結者即取用 | 右乳汁若右乳汁結者可將去左乳汁服散消根 | 丹參膏 <small>出大金良方</small> 療婦人乳癰乳腫毒氣焮作赤熱漸成<br>攻刺疼痛及治乳核結硬不消能通順經絡利導癰 | 滯 | 丹參 白芷 芍藥 <small>各一兩</small> | 右咬咀以苦酒淹經宿以猪脂半斤微火煎至白芷<br>黃為度膏成去滓傅之一方入黃蠟一兩每少許時 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 時塗之 | 黃鼠膏 <small>出尉後方</small> 治乳癰 | 大黃 鼠屎 <small>新者各一兩</small> 黃連 <small>二分</small> | 右各搗為末以黍米粥和傅乳四邊痛止即愈無黍<br>米用粳米並得 | 治乳癰初發 <small>出危氏方</small> | 草烏 <small>七箇</small> 赤小豆 <small>七粒</small> 拒霜葉 <small>一兩陰乾</small> | 右為末井花水調塗乳四畔黃頂用前敷藥亦妙 |
|----------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|--|---------------|-----|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|--|---------------------|



|              |  |                       |      |  |                       |            |  |  |                         |                                |  |                 |
|--------------|--|-----------------------|------|--|-----------------------|------------|--|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------|
| 車螯散 治乳癰及一切腫毒 | 車螯殼 <small>燒灰</small> 十兩 黃連 <small>去鬚</small> 一兩 蜆殼 <small>多年白爛者炙</small> 黃泥裹燒五兩 | 右搗羅為散每服二錢空心用甘草酒調下日晚再服 | 治乳癰方 | 乳香 <small>一兩</small> 丹砂 <small>一兩</small> 葱白 <small>三兩</small><br><small>為末</small> <small>為末</small> <small>切</small> | 右先研葱令細入二味再研令勻塗傅乳上乾即易之 | 欽定四庫全書 普濟方 | 治婦人乳汁不下肉結成腫名為乳毒乃毒成癰也宜服此 <small>出聖</small> 惠方 | 川大黃 <small>一兩</small> 黃連 <small>三兩</small> 牛蒡子 <small>一兩</small><br><small>炒</small> <small>兩</small> <small>兩</small> | 右為散每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服 | 治乳癰腫成瘡疼痛方 <small>出聖</small> 惠方 | 防風 <small>一兩</small> 牽牛子 <small>二兩</small> 牛蒡子 <small>一兩</small><br><small>去蘆</small> <small>微炒</small> <small>兩</small> | 右為細散不計時候以溫水調下二錢 |
|--------------|--|-----------------------|------|--|-----------------------|------------|--|--|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------|



|                                |   |                  |                                      |        |               |  |               |   |   |   |                              |  |
|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------|---------------|--|---------------|---|---|---|------------------------------|--|
| 又方<br><small>出聖<br/>患方</small> | 蔓荊子<br><small>一兩<br/>二十寸一半<br/>生一半熟</small><br>乾薄荷<br><small>兩半</small> | 右為細末每服二錢用煖酒調下日三服 | 又療乳癰初得令消<br><small>出聖<br/>患方</small> | 赤小荳 甘草 | 右等分各為細末苦酒和傅之愈 | 鹿角散<br><small>出聖<br/>患方</small><br>療乳癰或瘡久不瘥膿汁出痛欲死不可<br>忍亦治妬乳 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 鹿角<br><small>二兩<br/>兩半</small><br>甘草<br><small>兩半</small> | 右為細末用雞子白和於銅器中煖溫敷患處日五六易即愈一方用鹿角石上磨取濃汁塗之一方用鹿角燒灰酒調傅 | 金黃散<br><small>出大金<br/>良方</small><br>治奶癰 | 川大黃 粉草<br><small>各一兩</small> | 右為細末以好酒熬成膏傾在盞中放冷攤紙上貼痛處仰面卧至五更瘥貼時先用溫酒調一大匙就 |
|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------|---------------|--|---------------|---|---|---|------------------------------|--|



|   |                                  |                          |   |  |  |                       |   |  |                                  |                            |                   |   |
|---|----------------------------------|--------------------------|---|--|--|-----------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|---|
| <p>患處洗明日取下惡物相度強弱用藥羸弱不宜服<br/>治乳癰初作腫痛便服久患乳癰戒不可用針若悞針</p> | <p>着乳房立死 <small>出存仁方</small></p> | <p>右以栝樓子忍冬葉各一兩濃煎汁飲即消</p> | <p>皂蟾散 <small>出拔萃方</small> 治婦人因露風邪氣外客於乳內結為吹</p> | <p>奶積久不消以為奶癰此藥導其汗散其風邪出其<br/>病自然痊愈矣</p> | <p>皂角 <small>不蛀者燒存性</small> 真蛤粉 <small>各等分一方用皂角刺</small></p> | <p>欽定四庫全書<br/>普濟方</p> | <p>右為細末每服二錢溫酒下不拘時候詩曰婦人吹<br/>奶藥婁羅皂角燒灰蛤粉和熱酒一盞調八匙雙手<br/>操散笑呵呵加乳香少許尤佳</p> | <p>瓜萋散 <small>出危氏方</small> 如不愈者並前方治之</p> | <p>瓜萋 明乳香 <small>各等分</small></p> | <p>右為末每服二錢溫酒調下熱者加石膏末少許</p> | <p>蔓荊實散 治乳癰疼痛</p> | <p>蔓荊實 <small>炒一兩</small> 甘草 <small>生半兩</small></p> |
|---|----------------------------------|--------------------------|---|--|--|-----------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------|---|



|                   |  |                                 |   |                      |               |  |                     |  |          |
|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------|---------------|--|---------------------|--|----------|
| 右搗羅為散每服二錢以溫酒調下日再服 | 防風散 治乳癰<br>防風 <small>去叉</small> 二兩 牽牛子 <small>炒令香</small> 二兩 | 右搗羅為末每服二錢空心用沸湯調下取微利為度未利再服漸減服之即瘥 | 鮫鯉甲散 治乳癰疼痛結硬不可忍<br>鮫鯉甲 <small>燒灰</small> 一兩 栝萋 <small>一枚</small> 燒灰 | 右研和為散每服二錢空心用葱酒調下至晚再服 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 乳初腫方 <small>出直指方</small><br>右用甘草生二錢炙二錢為麤末分二次新水煎服令人吮乳即瘥 | 又方 治奶疼<br>右用芭蕉根槌碎盪之 | 治乳癰腫疼宜熲貼方 <small>出聖息方</small><br>藍草根 生蒟頭 <small>各半</small> 兩 | 右搗如泥貼之立効 |
|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------|---------------|--|---------------------|--|----------|





|                               |                                |               |               |  |          |      |                              |                   |                  |    |   |                       |                |         |                                     |                |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--|----------|------|------------------------------|-------------------|------------------|----|---|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------|
| 治乳癰方 <small>出聖<br/>惠方</small> | 赤小荳 蛇脫皮 <small>燒<br/>灰</small> | 右以雞子白和之傅上少乾即易 | 一字散 治婦人乳結痛不忍者 | 麝香 <small>半<br/>錢</small> 螃蠏殼 <small>不<br/>拘<br/>多<br/>少</small> | 右為灰入麝香調下 | 治乳癰瘡 | 鼠糞 米粉 <small>炒<br/>黑</small> | 欽定四庫全書<br><br>普濟方 | 右各等分勻加麝香少許好酒二盞送下 | 秘方 | 山藥 <small>半<br/>斤<br/>為<br/>末</small> 官桂 <small>二<br/>兩<br/>為<br/>末</small> | 右用籼米粉打糊為圓每服一百五十九丸用無灰好 | 酒送下不拘時服次用膏藥貼痛處 | 貝母散 治乳癰 | 貝母 金銀花 <small>各<br/>二<br/>兩</small> | 右為細末每服三錢好酒調食後服 |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|--|----------|------|------------------------------|-------------------|------------------|----|---|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------|



|                  |   |                     |                            |  |                      |           |   |                       |                             |            |           |  |               |           |  |                |
|------------------|---|---------------------|----------------------------|--|----------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------|--|---------------|-----------|--|----------------|
| <p>治婦人乳癰毒氣不散</p> | <p>冬瓜皮 <small>研取</small><br/>當歸 <small>末 半兩</small></p> | <p>右以冬瓜汁調塗之以瘥為度</p> | <p>附子散 治婦人乳疽及妬乳作寒熱疼痛宜服</p> | <p>附子 <small>一兩去</small><br/>皮臍 藜蘆 <small>半兩去</small><br/>蘆頭</p> | <p>右為末用醋調傅之乾即再傅之</p> | <p>又方</p> | <p>米粉 <small>一合炒</small><br/>令黑 雞子白 <small>三枚</small></p> | <p>欽定四庫全書<br/>普濟方</p> | <p>右藥相和塗帛上以貼疽上開一小孔以洩毒氣燥</p> | <p>即易之</p> | <p>又方</p> | <p>釜底土 <small>一兩</small><br/>雞子白 <small>三枚</small></p> | <p>右搗相和塗之</p> | <p>又方</p> | <p>半夏末 <small>一兩</small><br/>雞子白 <small>三枚</small></p> | <p>右藥和塗之極効</p> |
|------------------|---|---------------------|----------------------------|--|----------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------|--|---------------|-----------|--|----------------|



|            |  |            |                                   |                           |                |                           |                      |               |                      |                          |                                 |  |                               |
|------------|--|------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| 治婦人乳頭裂痛欲成瘡 | 鱧脂 <small>三分</small> 蚌蛤粉 <small>一分</small> | 右藥研細塗乳裂處神効 | 治婦人乳中結塞腫硬如石成癰 <small>出聖惠方</small> | 玄參 白檀香 <small>各半兩</small> | 右為細散用醋調塗腫結處乾更塗 | 治乳癰堅方 <small>出千金方</small> | 以水罐中盛醋澄清燒石令熱內中沸止更燒如前 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 少熱納乳漬之及冷更燒石內漬不過三度燒石愈 | 治乳癰方 <small>出千金方</small> | 鹿角治下篩以猪脂上清汁服方寸匕不過再服效<br>不可以醋漿水服 | 治乳癰二三百日衆療不瘥但堅紫色青柳根熨方 <small>出千金方</small> | 柳根削取上皮擣令熟熬令溫盛著練囊中熨乳上<br>乾則易之愈 |
|------------|--|------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|



治乳癰痛不可忍出 氏方用鯤鈍草酒浸服以滓傳縛

治乳癰出 惠方用鹿角屑一兩為細末以猪膽汁調下一

錢不過再服神驗以醋醬水服之亦得集驗方以猪

領下清汁一方鹿角炒微黃用

橘香散一名 橘皮 出 拔萃方治乳癰未結即散已結即潰極痛不

可忍者藥下即不疼因小兒吹姝變成斯疾者並治

之

陳皮湯浸去白晾乾麵炒微黃為細末麝香研酒調

欽定四庫全書

普濟方

二錢初發覺赤腫疼痛一服見効每服有効一方用

青皮焙乾為末熱酒調下

一醉膏出 十便 良方治姝癰

石膏不以多少煨通赤取於地上椀覆出火毒細研

每服三錢溫酒下添酒盡醉睡覺再進一服療乳無

汁以水煮服

治療婦人乳癰已穿未穿出膿大止痛斂瘡口出 大 良方

以芙蓉花爛研如泥若無花只取根上皮先用竹刀



|  |           |
|--|-----------|
| 刮去麤皮但用內一層嫩白皮研如泥却入蜜少許<br>調停看瘡大小如未穿即畱中孔如已穿即塞其孔<br>其膿根自然淋出盡不倦頻頻更換此方大治一切<br>癰疽發背立見神効膿出盡却用後藥傅 |           |
| 乾膿散  | 出大全<br>良方 |
| 治斂瘡口   |           |
| 烏賊骨  | 黃丹        |
| 天竺黃  | 錢各一       |
| 輕粉   | 錢二        |
| 麝香   | 分一        |
| 老  |           |
| 降真香  | 錢三        |
| 右研細末乾糝瘡口不數日乾   |           |
| 欽定四庫全書   |           |
| 普濟方  |           |
| 又方   | 出大全<br>良方 |
| 降真節  | 錢二        |
| 天竺黃  | 錢各一       |
| 露蜂房  | 錢各一       |
| 麝香   | 錢各一       |
| 輕粉   | 少各        |
| 許  |           |
| 右為末乾糝之   |           |
| 又方   | 出大全<br>良方 |
| 乳香   | 沒藥        |
| 黃丹   | 錢各一       |
| 龍骨   | 錢二        |
| 真樺皮  | 錢二        |
| 血竭   | 錢二        |
| 半  | 錢         |
| 麝香   | 字一        |
| 降真節  | 錢一        |
| 右為末乾糝之   |           |



|                                      |        |                      |                     |                                     |                                   |                      |     |               |  |  |    |                               |                      |          |                                 |                      |
|--------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----|---------------|--|--|----|-------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|
| 治乳癰初作腫痛 <small>出仁存方</small> 用萱根自然汁調傅 | 一方 治乳癰 | 牛皮膠不拘多少鎔開用紙花攤貼妳上次以舊齒 | 刷子一箇燒灰存性研為細末酒調服甚有功效 | 又方 <small>出百一選方</small> 用苔脯中泥調塗妳上甚妙 | 治婦人妳癰 <small>出危氏方</small> 用仙人掌草一握 | 一處搗爛入桂末少許炒酒服滓菴腫處便止痛更 | 不成瘡 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 又方 <small>出危氏方</small> 用山礬菜為末食後溫酒或熱湯調下 | 治婦人乳癰 <small>出聖惠方</small> 以人牙齒燒灰研令細以醋調塗貼 | 攤上 | 乳癰方 <small>出直指方</small> 乳癰疽初發 | 用貝母為末每服二錢溫酒調下即以兩手覆按乳 | 掉上垂乳良久自通 | 麵塗方 <small>出肘後方</small> 主婦人癰疽不消 | 用白麵半斤炒令黃色用醋煮為糊塗於乳即消或 |
|--------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----|---------------|--|--|----|-------------------------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|



|  |
|--|
| 以蔓荊根葉淨擇去土不用洗以鹽搗傅乳上熱即換不過三五度冬無葉即用根須避風      |
| 荒蔚子 <small>出聖惠方</small> 治婦人勒乳痛成癰         |
| 用益母草搗羅為末新汲水調塗乳上一宿自瘥生者搗爛用                 |
| 治乳癰痛不可忍 <small>出鮑氏方</small>              |
| 右搗橘葉極細攤傅縛之                               |
| 治乳癰腫如椀大痛甚                                |
| 欽定四庫全書<br>普濟方                            |
| 取白殭蠶搗末一二斤用雞子白和如飴傅腫上乾易之此方頻試驗如雞子不便榆白皮和搗傅即瘥 |
| 乳癰月蝕瘡遶耳根以烏骨雞膽汁傅之日三                       |
| 治婦人姝癰未成結者用管仲一味為細末外用敷腫上內亦可服之              |
| 牡蠣散治乳癰初發腫痛結硬欲成膿令一服瘥                      |
| 牡蠣 <small>取腦頭厚處生用</small>                |
| 右細研為散每服二錢更研澱花冷酒調下如癰盛                     |



已潰者以藥末傅之仍更服藥一日三服

樺皮散 治乳癰初發腫痛結硬欲成膿令一服瘥

以北來真樺皮燒灰酒服方寸匕就病乳處卧及覺已瘥

治乳癰結硬疼痛方

右用泥芥菜半斤剉碎以水四升煮取三升傾於瓷瓶熏乳腫處日三五度即瘥

治乳癰結硬疼痛

欽定四庫全書

普濟方

右和泥葱半斤細剉以水四升煮十數沸於瓷瓶子內盛熏乳腫處日三五度即瘥冷即再煖以瘥為度一方搗葱白搏之絞汁一升頓服

治乳癰疼痛方

右車前子一兩搗羅為散每服二錢匕溫酒服調下

治乳癰腫疼痛方

右打雞子一枚熱酒調為一服

治乳癰初發 用皂角針四十九枚燒灰存性瓜萋根





酒服立潰

姝癰瘡 用黃瓜萐一二箇連皮穰子剉碎用無灰常酒一二升於砂瓶內煑存一升去滓時溫服酒盡再煑滓服如初覺時便服此藥即時痛止便不成瘡如已成瘡服之其瘡自穿而痛自止

治乳癰痛不可忍

右用地龍一二條入生薑於乳鉢內研如泥塗四傍紙花貼之

欽定四庫全書

普濟方

治乳癰 用夏枯草酒搗服仍用滓敷即日乳下三日愈

又方 用猪膽汁蜜搗葱貼乳上妙

無比散

出傳信  
適用方

治婦人姝癰痛甚

用蛇蛻皮燒灰一錢炒甘草末半錢同和煑酒下如破用生油調塗

治姝癰 用蒺藜子煎湯洗一方用枇杷葉煎湯洗若無則用棠梨葉



|                                      |      |                      |   |                   |                                  |          |                      |                              |   |          |                      |   |                 |   |   |                    |
|--------------------------------------|------|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------|----------------------|------------------------------|---|----------|----------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|
| 治婦人乳癰及妬乳作寒熱疼痛<br><small>出時效方</small> | 調下二錢 | 右嫩皂莢刺二兩黃色者微炒搗羅為細散以溫酒 | 又方 <small>出聖</small><br><small>患方</small> 治婦人乳癰不消立効 | 右青牛腹下毛燒作灰細研水和服之立効 | 治婦人乳癰熱毒腫痛<br><small>出聖患方</small> | 每服熱酒調下二錢 | 日收陰乾者以罐子盛燒令赤候冷取出細研為散 | 欽定四庫全書<br><small>普濟方</small> | 治婦人乳癰并吹姝疼痛不止<br><small>出聖患方</small> 蝦蟇一枚五月五 | 為散每服調下二錢 | 根搗絞取汁半合酒和服之如無新者用乾搗細羅 | 治婦人乳癰身體壯熱疼痛不可忍<br><small>出聖患方</small> 取蒲公英并 | 灰細研以醋調塗緋帛上貼日二換之 | 治乳癰疼痛寒熱至甚宜服此<br><small>出聖患方</small> 用鑿下馬蹄燒為 | 又方 <small>出肘</small><br><small>後方</small> 用屎或馬屎敷並佳此消去 | 又方 用搗生地黄汁傳之熱則易小豈亦佳 |
|--------------------------------------|------|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------|----------------------|------------------------------|---|----------|----------------------|---|-----------------|---|---|--------------------|



以醋和吳茱萸末或搗生薑或小蒜和傅之並良  
治乳癰宜薰

耶屈律藤蔓 斤 切一

右水二升煮取一升半瀉於小口瓷瓶中薰患處良

蒺藜丸 出千 治婦人乳癰瘡腫疼痛除熱

蒺藜 白者微 炒去刺 大黃 炒各 一兩 敗醬 一 兩 桂心 人參 去蘆

薏苡仁 附子 炮去 皮 臍 黃連 去 鬚 黃耆 去 蘆 當歸 微 炒 枳實

芍藥 炒 各 通草 分 各三

欽定四庫全書

普濟方

右為末蜜丸如梧桐子大未食飲服三丸不知益至

五丸日三無所忌一方無大黃敗醬黃連通草為散

酒服方寸匕

升麻散 治婦人乳初覺腫房疼痛及欲成癰結

川升麻 赤芍藥 甘草 川大黃 各一 兩 玄參 一 兩

半 白芷 三 分 馬蹄 三 分 川朴硝 二 兩 桑根白皮 三 兩

右件藥搗麤末羅為散每服四錢以水一中盞煎至

六分去滓食前溫服



|                              |   |                              |                      |     |                                       |  |  |                           |                 |   |             |                              |   |      |                       |
|------------------------------|---|------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|---|-------------|------------------------------|---|------|-----------------------|
| 傅乳方 <small>出聖<br/>惠方</small> | 天南星 半夏生皂莢刺 <small>燒帶生<br/>各二兩</small> 白芷 草烏 | 真殭蠶 <small>焙各<br/>一兩</small> | 右為細末多用葱白研取汁入蜜調傅若瘡口破用 | 膏藥貼 | 治婦人乳腫妨痛日夜不可忍 <small>出聖<br/>惠方</small> | 鍛爐底土 <small>一兩</small> 露蜂房 <small>半兩</small> 赤小荳 <small>一合</small> 川大黃 <small>一兩</small> 木 | 香 <small>一兩</small> 桂心 <small>一兩</small> | 欽定四庫全書 <small>普濟方</small> | 右為細末以真麻油調塗上經宿神効 | 治赤腫欲作癰者 <small>出百一<br/>選方</small> 用天南星為末生薑自然汁 | 調塗初發便用以鵝翎塗之 | 又方 <small>出百一<br/>選方</small> | 右用缺盆草糯米香草又名趙侯鬚其葉小却如蒲<br>苟有刺不拘多少連皮生薑一塊同研爛罨即瘥 | 治姦疼方 | 真蛤粉 <small>五錢</small> |
|------------------------------|---|------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|---|-------------|------------------------------|---|------|-----------------------|



右用皂莢刺四五箇煎湯調服加好酒一呷服後又  
用後藥

皂莢 防風 大黃 當歸 各等分

右煎湯洗可止用手大揉揉久之後用口飲妳汁出  
方可

治乳腫 出聖惠方

桂心 甘草 烏頭 一分炮

右為末和苦酒塗覆之膿為水即神効

欽定四庫全書

普濟方

治婦人乳腫痛慮作癰毒宜服此

甘草 半兩一半生用一半微炒 栝萋 一枚去皮穰子細剉令爛

右以酒一大盞煎甘草取六分入栝萋酒後宜更用

藥淋熨腫痛上

柳白皮 松枝 二握剉

右以水五升煎至三升及稍熱并滓熏乳腫處以通  
手即淋熨乳上當日即退

菩薩散 治妳癰腫痛時發寒熱狀如傷寒不可忍已



結未並治文經

霜杜荊子

今作杖子者是去皮十月正月二月採之

酵頭

用作炊餅者微炒勿

焦令

右二件各搗為細末以淨盤子擊之於佛前焚香誦南無藥王菩薩南無觀音菩薩聖號各一百八遍等分拌勻至心禱告畢炒三錢匕以葱酒調下食後稍空進之服藥頃間度藥力到患處即令人以手揉摩之更令人吮出乳汁尤佳飲酒多人多飲之令有力

欽定四庫全書

普濟方

不飲酒者以葱湯衝酒借氣可也得熟寐即釋然脫去矣已結未成膿者立潰並免痛楚重者不過兩服○故人何伯選高曾以來久施此藥其効如神秘而不傳近日漕司李運幹家有一婦患此病懇而得方一投而愈

治乳癰不可忍

右用古蛀竹籤將朽者研極細羅過溫酒服先用復元通氣散佳



|   |
|---|
| <p>又方 用竈間倒掛塵多年者羅細末二錢以乳汁調勻溫酒調下仍以手頻按腫處即消</p>                                    |
| <p>又方 用桑蟲糞曬乾為末酒下去風毒也</p>  |
| <p>治婦人乳腫不消</p>  |
| <p>右取魚枕擣末唾調塗之</p>   |
| <p>治乳腫痛甚者</p>   |
| <p>野松 <small>半斤不用洗</small></p>  |
| <p>右和鹽擣爛厚塗腫上乾即換之</p>  |
| <p>欽定四庫全書<br/>普濟方</p>   |
| <p>治乳頭裂破</p>  |
| <p>右用苧麻根擣傅之</p>   |
| <p>治姦頭裂</p>   |
| <p>右用秋後冷露茄兒花裂開者陰乾燒存性灰水調傅之如未秋時但是裂開者亦可用</p>                                     |
| <p>療乳癰及發背四肢虛熱大渴</p>   |
| <p>生地黄 <small>六兩</small> 黃芩 芍藥 人參 知母 甘草 <small>各二</small></p>                 |
| <p><small>兩</small> 升麻 黃耆 麥門冬 栝萋 <small>各三分</small> 大棗 <small>十二枝</small></p> |



右以竹葉切三升以水一斗二升煮取九升去竹葉  
內藥煮取三升渴則飲之

連翹湯 治妬乳乳癰

連翹 芒硝各二兩 芍藥 射干 升麻 防己

杏仁 黃芩 大黃 柴胡 甘草各三兩

右㕮咀以水九升煮取二升五合分三服

療婦人發乳丈夫發背爛生膿血氣虛成疾

黃耆 麥門冬 地黃 人參 升麻 茯苓各三

欽定四庫全書

普濟方

兩 當歸 芍藥 遠志 甘草各一兩 大棗十枚

右水二升煮取一升温分三服若有是症蜀中排膿

內補十宣散妙

神効瓜萋散 治婦人乳疽姦勞

瓜萋一箇去皮焙研為末如急用只爛研子多者有力 當歸酒浸去蘆半兩 乳香

錢一 生粉草半兩 通明沒藥一分二味別研

右用無灰酒三升同於銀石器中慢火熬取一升清

汁分作三服食後良久服如有姦勞便服此藥可杜





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 絕病根如毒氣已成能化膿而黃水毒未成即於大<br>小便中通利疾甚再合服以退為妙婦人乳癰方甚<br>多獨此一方神効無比百不失一矣癸亥年僕處五<br>羊趙經略廳判閩夫人年七十一歲隔一二年左乳<br>房上有塊如鵝卵大今忽然作楚召余醫僕云據孫<br>真人云婦人年五十歲以上乳房不宜見癰見則不<br>可治矣幸而未破恐是氣瘤謾以五香連翹湯去大<br>黃煎服服稍減則已過六七年每遇再有腫脹再合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欽定四庫全書   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普濟方  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服消   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立効散 <small>出直</small> 指方 治發背及諸癰疔并瘰癧有効或婦人乳  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 癰與前方間服妙  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紫色皂莢 <small>半斤不用枯者細</small> 剉炒耐久炒赤色 生粉草 <small>二兩</small> 乳香 <small>半兩</small>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沒藥 <small>半兩</small> 瓜萋 <small>五箇去皮取肉并</small> 仁搗碎炒煑乾  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 右為細末每服二錢温無灰酒調下無時候煎服直   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指方名五物湯   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竹皮大丸 <small>出全</small> 匱方 治婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|   |
|---|
| 生竹茹 <small>三分</small> 石膏 <small>二分</small> 桂枝 <small>一分</small> 甘草 <small>七分</small> 白薇 <small>一分</small> |
| 右五味棗肉和丸彈子大以飲服一九日三夜二服  |
| 有熱者倍白薇煩喘者加栝實一分  |
| 治婦人乳癰 <small>出危氏方</small>   |
| 火撤草 皂莢刺 穿山甲 黃蜂窠   |
| 右以上件各燒存性為末入輕粉生麻油調傅瘡上  |
| 療乳癰諸般癰癤疽 <small>出大全良方</small>   |
| 橘紅 <small>半兩</small> 阿膠 <small>粉炒</small> 粉草 <small>灸各二兩</small>  |
| 欽定四庫全書<br>普濟方   |
| 右呶咀為二服每服用泉水一碗半煎至減半去滓  |
| 溫服  |
| 治妬乳乳癰方 <small>出千金方</small>  |
| 右取研米槌二枚炙令熱以絮及故帛揄乳上以槌  |
| 更易熨之瘥止已腫立効  |
| 療疥癬并無名癰癤 <small>出大全良方</small>   |
| 右用鼠糞不拘多少燒存性二分入輕粉二十分研勻   |
| 麻油調塗如有頭即潰無頭即消又療火瘡   |



|                                 |                                     |                            |                             |  |                     |               |                                   |                   |                                  |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 治姦勞姦癰等疾<br><small>出危 氏方</small> | 右用赤小荳三升酒研爛去滓溫酒服以滓傅患處<br>一方赤小荳為末水調塗愈 | 又方<br><small>出危 氏方</small> | 右用蔓荊子無子用嫩葉或花搗爛炒酒服之用滓<br>貼患處 | 伏龍肝<br><small>出肘 後方</small> 療姦發諸癰疽發背及乳 | 右以釜下土搗取末雞子中黃和塗之加少鹽良 | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 治妬乳乳癰乳頭裂破<br><small>出肘 後方</small> | 右取丁香擣末水調方寸匕服傅患處亦佳 | 治姦發痛不可忍<br><small>出大全 良方</small> | 右水楊柳根新採者一握搥碎以好酒同甘草烏梅<br>燂至七分去滓時時溫服 | 治婦人乳勞癰爛見心者<br><small>出危 氏方</small> | 右用貓兒腹下毛耳鍋煨存性為細末乾傅或油調<br>入輕粉少許 |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|



|                                  |  |          |   |  |                                       |       |                               |                             |                              |   |                 |
|----------------------------------|--|----------|---|--|---------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------|
| 青桑膏<br><small>出危氏方</small> 治乳硬作痛 | 右用嫩桑葉左手採細研細末調攤紙花貼病處此<br>症四十以下可治五十以上不可治之任死不治則<br>自得終其年矣 | 連翹湯治吹乳乳癰 | 連翹 瞿麥穗 <small>各一兩</small> 升麻 玄參 生乾地黄 <small>焙</small> | 芍藥 <small>各三分</small> 甘草 <small>炙一分</small> 射干 <small>一分</small> | 右細剉如麻荳大每服五錢水一盞半煎至八分去<br>欽定四庫全書<br>普濟方 | 滓食後溫服 | 治婦人乳結硬疼痛方 <small>出聖惠方</small> | 右取鱣魚皮燒灰搗細羅為散空心以煖酒調下二<br>錢服之 | 治乳赤腫欲成癰者 <small>出鮑氏方</small> | 白芷 芙蓉葉 赤芍藥 紫金藤 黃柏 當<br>歸 <small>各等分</small> | 右為末入雄黃研少許拌勻蜜水調下 |
|----------------------------------|--|----------|---|--|---------------------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------------|



治姦癰腫痛

右用瓜萋根為末入炙甘草末少許用薄荷酒調下

治乳癰惡痛者 用菟蔚子搗傅及取汁服効

治乳腫 用栝萋黃色老大者一枚熟搗以白酒一斗

煮取四升去滓溫服一升日三服若無大者小者二

枚黃熟為上

妬乳 附論

氣血流行則上為汁下為月水上下通達不失常度是

欽定四庫全書

普濟方

謂平人宜通而塞則為痛熱氣復乘之則為腫向之流  
行者壅遏矣儻失調治則結鞭成核身體壯熱甚則憎  
風遂為乳癰世傳氣結乳閉亦為妬乳者此也○婦人  
女子乳頭生小淺熱瘡癢搔之黃汁出浸淫漸長百種  
治不瘥者動經年月名為妬乳婦人飲兒者乳皆欲斷  
世謂苟抄乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之傅二  
物飛鳥膏及飛鳥散佳若始作者可傅黃芩漏蘆散及  
黃連胡粉散並佳○吹姦妬乳乳癰其實則一只分輕



重而已輕則為吹姪妬乳重為癰

方

升麻托裏湯

一名肉桂升麻湯  
出濟生拔萃方

治婦人兩乳間出黑頭

瘡瘡頂塌下作黑眼子其脈弦洪按之細小

升麻 葛根

連翹

各一錢半

肉桂

黃栢

各三錢

當歸

身 黃耆

炙甘草

各一錢

黍粘子

半錢

右吹咀都作一服水酒同煎去滓稍熱服

治妬乳生瘡方

出千金方

欽定四庫全書

普濟方

蜂房

猪甲中土

車轍中土

各等分

右三味為末苦酒和傅之

黃連胡粉膏

出千金方

黃連

二兩

胡粉

十分

水銀

一兩

同研令消散

右三味擣黃連為末三物相和合皮裏熟按之自和

合也縱不能無迹然得水銀細散入粉中也以傅乳

瘡諸濕痒黃爛肥瘡若着甲煎為膏亦可

漏蘆散

治乳汁不時洩蓄積於內遂成癰名妬乳



|                      |  |                          |          |                      |                      |                      |                           |               |   |                      |                      |                              |                 |                          |                 |  |
|----------------------|--|--------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--|
| 燒粉皆以絹篩了以甲煎和勻令如脂以傅乳瘡日 | 右用燒硃砂作水銀上黑煙 <small>名排彩者三兩熱令焦燥</small> 礬石三兩 | 飛鳥膏 <small>出大全良方</small> | 洗畢傅膏散千金同 | 尾花亦洗浸淫黃爛熱瘡痒疽濕陰蝕瘡小兒頭瘡 | 洗乳以殺痒也此草葉如麻葉冬生夏着花赤如鼠 | 右用天麻草五升切水一斗半煎取一斗隨寒温分 | 天麻草湯 <small>出大全良方</small> | 欽定四庫全書<br>普濟方 | 同 | 之分以洗乳亦洗諸毒敗爛久瘡洗畢傅膏散千金 | 右以檨皮切三升水一斗煮五升春夏冷用秋冬温 | 赤龍皮湯 <small>出大全方</small> 治乳瘡 | 右燒自死蛇為灰和以猪膏塗之大妙 | 治妬乳方 <small>出千金方</small> | 右三味搗為細散小調如膏塗於乳上 | 漏蘆 <small>一兩去</small> 黃芩 <small>一兩去</small> 黑心米粉 <small>兩半</small> |
|----------------------|--|--------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--|



|                             |                             |                        |                              |                                   |                             |                             |              |                       |   |                             |               |                   |                               |                             |                        |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <p>三作熱者不須和有汗自着可用散亦傳諸熱瘡黃</p> | <p>爛浸淫汁瘡蜜瘡丈夫陰蝕痒濕諸小兒頭瘡疔蝕</p> | <p>口邊肥瘡蝸瘡等並以此傳之千金同</p> | <p>兵部手集療妬乳硬欲結膿令消及發乳房初起微赤</p> | <p>不急治之即殺人<small>出肘後方</small></p> | <p>右以鹿角於石上磨取白汁塗之乾又塗不得近手</p> | <p>并以人啣却黃水一日許即散一方燒灰酒調抹一</p> | <p>方苦酒和塗</p> | <p>欽定四庫全書<br/>普濟方</p> | <p>一方<small>出便產須知</small>治妬乳便產須知云產婦乳汁不宜積蓄</p> | <p>惡汁不出內為熱結腫痛煩渴手不可近成膿者名</p> | <p>妬乳乃甚於癰</p> | <p>右用連翹湯利下惡熱毒</p> | <p>一方<small>出大全良方</small></p> | <p>右用生地黃汁塗之熱即易瘥又吮汁吐去若不吮</p> | <p>吐汁必蓄積決然作癰醞醋調塗亦可</p> | <p>治妬乳<small>出肘後方</small></p> |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|





|               |        |                      |              |  |                      |   |   |                   |                |  |  |  |  |  |  |  |           |
|---------------|--------|----------------------|--------------|--|----------------------|---|---|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 右用梁上塵醋和塗之亦治陰腫 | 治女子妬乳腫 | 右取蔓荊根生搗後和鹽醋醬水煮取汁洗之五六 | 度瘡又搗和雞子白封之亦妙 | 治妬乳及癰 <small>出本</small> 以研朱石槌煮令熱熨乳上取二槌 | 更易用之以手覆乳上合熱徹內數十徧取瘡為度 | 也 | 治婦人妬乳乳癰 <small>出本</small> 以車脂熬令熱塗之亦和熱酒服 | 欽定四庫全書<br><br>普濟方 | 治妬乳 用榆木葉生服一兩頓佳 |  |  |  |  |  |  |  | 普濟方卷三百二十五 |
|---------------|--------|----------------------|--------------|--|----------------------|---|---|-------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

