

欽定四庫全書

普濟方卷三百二十九 明 周王朱橚 撰

婦人諸疾門

崩中漏下 附論

夫婦人崩中漏下者由勞傷血氣衝任之脈虛損故也
衝脈為經脈之海皆起於胞內而手太陽小腸之經也
手少陰心之經上為乳汁下為月水婦人經脈調適則
月水依時若勞傷衝任氣虛不能制其經脈血非時而

欽定四庫全書

普濟方

下淋瀝而不斷謂之漏下也 蓋肝為血之府庫恚怒
勞役一或傷之肝不能藏血於宮宮不能傳血於海所
以崩中漏下漏下者淋瀝不斷是也崩中者忽然暴下
乃漏證之甚者也其狀或如豚肝或成五色與血俱下
又或如泔涕如爛瓜如豆汁如藍靛是也至有純黑如
墨水與血相雜亦有純下瘀血者此皆衝任虛損恚怒
勞役之過致傷於肝而然也久久不止頭暈眼花加之
怔忡驚惕恐怖面肌瘦虛煩口乾臍腹冷痛吐逆不食



四肢虛困甚則為脹為腫診其脈寸口脈弦則為減大	則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏其脈為革主半	產漏下又尺寸脈虛者漏血漏血脈浮者不可治治之	之法調暢衝任鎮住血海溫和歸於有用內養百脈外	為月事自無崩中漏下之患矣	五臟皆稟血氣血虛淋瀝漏下致五臟傷損五	臟之色隨血同下若五臟皆虛損者則其色亦各隨血下診其尺脈急而弦大風邪入少陰之經女子漏下赤白不止脈小虛滑者生脈小緊實者都近死也	又漏血下赤白或下血數升脈急疾者死遲者生也至於崩中五色隨崩俱下其狀白崩形如涕赤崩如紅藍汁黃崩形如爛瓜青崩形如藍靛黑崩形如豆汁與敗血	欽定四庫全書	普濟方	相難而下也婦人白崩者是勞傷胞絡而氣極所為肺主氣氣極則肺虛冷也肺臟之色白虛冷勞極其色與胞絡之間穢液相挾	崩傷而下為白崩也	任脈血氣俱虛故也衝任之脈為經脈之海血氣之行	外循經絡內榮臟腑若無傷損則陰陽和平而氣血調	適經下依時若勞動過多致臟腑俱傷而衝任之氣虛	不能約制其經血故忽然暴下謂之崩中暴下診其寸	口脈微遲尺脈微絃寸口脈微寒在上焦但吐爾今尺	脈微絃如此即小復痛引腰脊痛者必下血也夫漏下
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	---	---	--------	--------------------	---	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



者血寒之極所致若謂以血熱致崩而用涼藥誤矣每用歲丹作効始進三五粒而未愈再進十粒尤未愈服至四五十粒差愈服至百粒方乃作効此歲丹之力也然歲丹之性全恃火力如水寒成冰血寒成塊血得溫則流散四肢冰得日則烘消成水血凝得丹而流暢火力也大抵醫者意也以意醫之所以作効儻或凝而未散即用先進陽起石丸服之二日未効却進歲丹庶無可疑者也又有室女二七天癸當至而未至近十

欽定四庫全書

普濟方

八九左右方行者有卒然暴下漸至淋瀝不止有若崩漏者却又不宜服前藥也惟當以四物湯加香附子煎血色鮮而不止者挾熱也宜去熟地黃加生地黃煎臨病之際又在乎審處之下部出血不止謂之崩中穢液常流謂之帶下崩中失血多因衝任虛損榮道受傷得之冷帶雜下多因下焦不固內挾風冷得之崩中者投以當歸川芎香附諸黑藥之屬血暫止而終不止帶下者投以熟艾餘糧牡蠣海螵蛸之類帶暫歇而終不歇



者經曰衛氣者所以溫肌肉充皮膚肥腠理司開闔衛
氣若虛則肌肉不溫皮膚不充腠理不肥而開闔失其
司耳况胃為血海水液會焉胃者中央之土又所以主
肌肉而約血水也衛氣與胃氣俱虛則肌弱而膚空血
之與水不能約制是涓涓漏卮休作無時而不暫停矣
然則調之止之不可不加意於固衛厚脾之劑此桂枝
附子湯以之固衛而人參白朮茯苓草朮木香以之厚
脾二者俱不可闕也病人耆好炙燂亦有協熱而下血

欽定四庫全書

普濟方

者此則黃連丸輩所不可無肺絡脈微亦主帶下此則
草朮白朮雖可燥水仍須以阿膠佐之若夫帶之為患
出於風冷停宿官桂乾姜細辛白芷先與散其寒邪然
後為之封固所貴擇之精而用之審云一應婦人大小
產及諸下血新差未得經久遽觸房事皆作崩中漏下
二帶之疾又有月事久閉纔得一通下部為風邪所搏
致使敗瘀出而未盡亦作崩中漏下黃水或粉紅滲漏
無時其崩中下血不止者震靈丹三粒陳米并香附煎



湯食前送下又方人參白朮炮乾薑炒甘草製半夏縮	砂香附木香等分薑棗煎服又方圓半夏剉碎以薑汁	和麪捏餅包裹炙令香熟去麪取半夏末之糯米稀糊	丸麻子大每服五十丸芎歸湯沉香降氣湯各半食空	送下此皆止血之勝藥	致然內經曰悲哀太甚則心系急心火降而上	而不愈則面黃肌熱瘦弱慎不可以熱治之蓋血得熱	而散故禁之宜以當歸等藥治之凡婦人年五十以上	內經所謂火主暴崩亦因暴喜暴怒憂愁驚恐致然慎	欽定四庫全書	勿作冷痛治之如下峻熱藥治之必死止宜黃連解毒	湯以清上更用連殼棕毛以滲其下然後用四物湯玄	胡索散涼血和經之藥仁齋直方論云素問陰虛陽	搏謂之崩此即血得熱則宣流之意也四物可以助陰	生津枳殼散可以抑陽其間更以茯苓二陳湯和之使	陰陽兩得其平血自循於經絡矣若夫衝任不固下元	久虛以致血無關鎖則用參湯加當歸木香嚙下震靈	丹為妙治漏血不止新傷胎及產後餘血不消作堅使	胞門不閉淋瀝惡血經踰日月不止者未可以諸斷血	湯宜且與牡丹丸散等待血涼堅凝後所患淋瀝便自	止亦漸消少也此後有餘湯斟酌煎服此乃可作諸主	治耳婦人產後去血多傷胎去血多崩中去血多金瘡	去血多拔牙齒去血多未止心中懸虛心悶眩日月角	重目暗耳聾舉頭便沉問欲倒宜且煮大當歸芎藭各	三兩以水四升煮取二升去滓分	二服即定展轉續次合諸湯治之
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------



方		地榆散 出聖方 治婦人崩中漏下不止		地榆 一兩 剉	伏龍肝 一兩 半	白茯苓 一兩	柏葉 一兩 微炒	蒲黃 一兩	白芍藥 一兩	甘草 半兩 炙	鹿角膠 一兩	搗碎炒 三十分 剉	當歸 三十分 剉	桂心 半兩	芎藭 三分	乾薑 三分	令黃燥 微炒	漏蘆 一兩	蟹爪 二兩 微	裂剉 半兩 炮	右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞入竹茹一分煎至六分去滓每於食前溫服		欽定四庫全書	普濟方	柏葉散 出大金良方 治婦人崩中漏下不問年月遠近漸加黃瘦四肢無力腹內疼痛不思飲食	柏葉 續斷 川芎 當歸 生乾	地黃 龜甲 一作鱉甲各一兩半 禹餘糧 二兩 半 阿膠 赤石脂 牡蠣	地榆 艾葉 鹿茸 各一兩	右為末每服二錢食前粥飲調下一方有丹參如鹿茸數煉蜜丸如桐子大每服三四十丸空心溫
---	--	----------------------------------	--	------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	------------------------	------------------------------------	--	--------	-----	--	-------------------------------	--	-----------------------------	--



酒吞下或沸湯下		禹餘糧散 出聖惠方 治婦人崩中漏下不止漸加羸瘦四肢		煩痛	
禹餘糧 二兩燒醋洗十七遍		甘草 三分炙微赤剉		赤石脂 二兩	
骨 二兩		芎藭 三分		白芍藥 三分	
熟乾地黄 一兩		乾姜 半兩炮裂剉		當歸 一兩炮微炒	
右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢		附子 一兩炮裂去皮臍		桂心 半兩	
黑金散 出醫方大成 治婦人血氣虛損經服不調崩中漏下		鯉魚皮		乾薑 炮	
欽定四庫全書		破故紙		黃牛角	
普濟方		椶櫚皮		亂髮 各一兩	
乾地黄		當歸 洗焙		木賊 各半兩	
右剉碎拌勻入在瓷瓶內鹽泥固濟候乾以炭火		烏賊魚骨		熟	
五斤煨令通赤煙盡取於土內埋令冷取出研細		每服三錢入射香少許米飲空心下		斷下湯 出楊氏家藏方 治衝任氣虛崩中漏下經脈不調每遇	
月候將行臍腹腰脚先痛漸減飲食四肢乏力及帶下					



三十六疾悉能療之									
人參 去頭 烏賊魚骨 燒灰 當歸 洗三味各二兩 熟乾地									
黃 燒焙一兩 艾葉 醋炒一兩 阿膠 蛤粉炒成珠子七錢半 乾姜 半兩炮									
右呖咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服									
食前									
補宮丸 出楊氏家藏方 治婦人諸虛不足久不妊娠骨熱形羸									
崩中帶下並不宜服之									
鹿角霜 白茯苓 香白芷 白朮									
欽定四庫全書 普濟方									
烏賊魚骨 白薇 白芍藥 牡蠣 煨									
山藥 各等分									
右為末麪糊丸桐子大每服五十九米飲空心送									
下									
鹿茸散 出聖惠方 治婦人崩中漏下不止虛損羸瘦									
鹿茸 二兩去毛酥炙微黃 鱉甲 一兩塗醋炙令黃去裙襴 烏賊魚骨									
炙黃 白龍骨 一兩 續斷 一兩 熟乾地黃 一兩 肉									
茯苓 一兩半酒浸一宿刮去皺皮炙乾 白芍藥 一兩 白石脂 一兩									



右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢 治婦人崩中漏下不止羸乏宜服此方 出聖惠方	烏賊魚骨 一兩 燒炭 芎藭 三分 熟乾地黄 一兩 乾薑 一兩 半兩 炮 當歸 二兩 剉 阿膠 三分 搗碎 艾葉 一兩 微炒 裂剉	右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓入酒一合更煎一兩沸每於食前溫服	治崩漏 出危氏方	右用四物湯一兩人參二錢茱萸一錢每服半兩	欽定四庫全書 普濟方	棗煎服食前五六服寒熱腹痛皆退崩漏未止續服後熟附丸	當歸 一兩 川芎 一兩 赤石脂 半兩 煨 木賊 去節 半兩 熟	附子 半兩 龍骨 半兩 煨	右為末醋糊丸如梧子大每服六十丸或五十丸米飲吞下曾記一婦人年五十已上經斷七年忽然經行遂成崩漏發熱腹痛兩月不差余診其脈虛細疾數余令服此數劑而愈
---	--	---	--------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------	--	--	--



阿茄陀丸 出大全良方	胡椒 紫檀 鬱金 茜根 小蘗	皮 乃山石榴皮也	右等分為細末滴水丸如桐子大阿膠湯化下二 丸方論云若經候過多遂至崩漏色淡如水但得 溫則煩甚者至於昏悶其脈數小者為順洪大者 為逆此由陰衰為邪熱所搏致傷衝任血得熱則 流散譬如天氣暑熱則河水沸溢陽傷於陰令人	欽定四庫全書 普濟方	下血當補其陰宜服阿茄陀丸小蘗湯	小蘗湯 出大全良方 治陽傷於陰令人下血前所謂天暑地	熱經水沸溢當用此藥	小蘗葉 洗切研取汁一盞 生地黄汁 一盞 白朮 半兩剉	右入水一盞煎至一半去滓溫服或用小蘗莖葉	黑金散治婦人血氣虛損經事不調多因氣滯不散月	水過多崩中漏下不止	香附子 一兩 香白芷 三錢 蓮蓬殼 十個 糊刷 二個
------------------------------	----------------------------	----------------------------	---	---------------	-----------------	---	-----------	--	---------------------	-----------------------	-----------	--



敗棕 亦可	右為細末每服二錢用米飲調下或霹靂酒亦得 不拘時候右四味通要炒焦黑留性	滋榮丸 ^{出危氏方} 治勞傷過度致傷臟腑衝任氣虛不能約	制或暴下崩中或下鮮血或瘀血連日不止淋瀝不斷 形羸氣劣倦怠困乏並皆治之	赤石脂 海螵蛸 側柏	右為末醋糊丸梧桐子大每服三十丸飯飲送下	欽定四庫全書 普濟方	空心日三服神効一方為細末每服二錢用熟飯 飲調下日三服名滋血湯	治婦人崩中漏下久不差宜服方 ^{出聖惠方}	白芍藥 槲葉 烏賊魚骨	右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲下一錢	生地黃湯 ^{出聖惠方} 治崩中漏下日去數升	生地黃 細辛 ^{等分}	右呔咀以水一斗煮取六升服七合久服佳
----------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	------------	---------------------	---------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------	--------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------



治崩漏下血	用益智去皮炒過為細末食前米飲調下二錢立	止一方用鹽米飲調下一方用益智子末酒調皆愈	加減四物湯 出濟生方 治室女二七天癸至亦有當時未至	而後至者有卒然暴下淋瀝不止有若崩漏者失血過	多變生諸證悉宜服之	川當歸 川芎 熟地黃 白芍藥	香附子 等分	欽定四庫全書 普濟方	右呶咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分	去滓食前溫服如血色鮮而不止者去熟地黃加	生地黃煎	延齡護寶丹 出保慶集 治婦人血臟虛損經候過多每行時	暴下不可禁止因成崩中連日不斷致五臟空虛失色	黃瘦崩竭暫止日少復發不耐動搖小勞輒劇此藥但	澄心服必有大効	禹餘糧石 二兩燒醋洗十七遍 人參 桂 赤石
-------	---------------------	----------------------	--	-----------------------	-----------	-------------------------	-----------------------	---------------	---------------------	---------------------	------	--	-----------------------	-----------------------	---------	--



欽定四庫全書		普濟方		增損禹餘糧丸		十丸溫粥飲下空心食前		右同為細末煉白沙密和丸如桐子大每服四五		葉		茯苓		黃		脂	
各一兩		炒已上		出千		金方		治女人勞損因成崩中狀如月經		各一兩		去皮		續斷		紫石瑛	
阿膠		炒		遠志		桑寄生		杜仲		牡蠣		燒		吳白芷		劉炒	
五味子		艾		金釵石斛		去心		去粗皮		熟乾地		黃		芎		熟乾地	
遠志		澤瀉		當歸		石斛		禹餘糧		龍骨		人參		桂心		紫石	
各二		各二		各二		各二		各二		各二		各二		各二		各二	
蜀椒		牡蠣		甘草		遠志		烏頭		寄生		杜仲		五味子		遠志	
乾薑		乾薑		乾薑		乾薑		乾薑		乾薑		乾薑		乾薑		乾薑	
與此方		宜與此丸也發時服湯減退即與此丸若是疾久可長		暫止少日復發不耐動搖小勞輒極治法且宜與湯未		來去多不可禁止積日不斷五臟空虛失色黃瘦崩竭		與此方		與此方		與此方		與此方		與此方	



各一 兩		右為末密丸桐子大空心酒下十丸漸加至二十		丸日三服一方無乾薑		涼血地黄湯 出臍生 治婦人血崩不止腎水陰虛不能		鎮守包絡相火故血走而崩也		生地黃 半錢 當歸尾 半錢 黃連黃蘗		知母藁本川芎升麻 各二分 柴胡		川羌活防風 各三分 黃芩炙甘草		欽定四庫全書 普濟方		二分 細辛荊芥穗蔓荊子 各一分 紅花		少許		右呶咀都作一服水三盞煎至一盞去滓稍熱服		空心食前		牛角鰓散治婦人崩中下血不止		牛角鰓 二兩 白礬 二兩 燒 二兩 橡實 一兩 木賊 一兩		芎藭 一兩		右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒下二錢	
---------	--	---------------------	--	-----------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--	---------------	--	--------------------------------------	--	----	--	---------------------	--	------	--	---------------	--	--	--	----------------------	--	--------------------	--



治室女血崩不以冷熱皆可服	荊芥	蓮房殼	等分各燒作灰
右為細末每服二錢空心米飲調下			
治崩中泄血無度經年淋瀝并黃瘦骨立	白芷	牡蠣	龍骨
	芍藥	赤石	
脂	阿膠	當歸	川芎
鱉甲			
烏賊骨	人參	各六分	艾葉
	乾地黄	八分	
訶子	四分	乾薑	黃耆
		各五分	
欽定四庫全書	普濟方		
右為細末空心酒調服方寸匕			
大牛角中仁散治積冷崩中去血不止腰皆痛四肢沉重虛極			
牛角	一枚	續斷	乾地黄
			桑耳
白朮	赤石脂	礬石	乾薑
			附
子	龍骨	當歸	各三兩
		人參	一兩
	蒲黃		
防風	禹餘糧	各二兩	
右治篩以溫酒未食服方寸匕日三不知稍加			



治崩中下血出血一日即斷或月經來過多及過期不來者服之亦佳方	吳茱萸	當歸	各三兩	芍藥	人參	芍
藥	牡丹	桂心	阿膠	生薑		
甘草	各二分	半夏	八兩	麥門冬	一升	
右呶咀以水一斗煮取三升分為三服						
治崩中泄血無度經年淋瀝并黃瘦骨立	芍藥	白芍	黃耆	龜甲	川芎	
欽定四庫全書						
烏賊骨	各八分	生乾地黄	牡蠣			
五色龍骨	乾薑	各十分	桂心	六分	附子	五個
右為細末空心酒調方寸匕						
婦人崩中無問近久悉皆治之	伏龍肝	一斤	小薊根	桑寄生	續斷	
地榆	艾葉	各三分	阿膠	當歸	赤石脂	
厚朴	各二兩	生薑	五兩			
右切以水一斗煮取三升絞去滓分作三服忌如						



常法		白芍藥散治婦人崩中下血不斷淋瀝連年不絕黃瘦	
白芍藥		一兩	
牡蠣粉		一兩	
熟乾地黄		一兩	
白朮		一兩	
麒麟竭		三分	
柏子仁		三分	
烏賊魚骨		一兩	
炙黃		一兩	
附子		一兩	
去皮臍		一兩	
桂心		一兩	
黃耆		一兩	
剉		一兩	
龍骨		一兩	
右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢			
治婦人忽暴崩中下血不斷或如鷄鴨肝者方			
小薊根		六兩	
當歸			
阿膠			
續斷			
青			
竹茹			
芎藭			
生地黄		八兩	
地榆			
釜			
月下土		各四兩	
絹裏			
馬通		一升	
赤帶用赤			
白帶用白馬			
右叟咀以水八升和馬通汁煮取三升分三服不			
止頻服三四劑未全止續服後續斷丸			
續斷			
甘草			
地榆			
鹿茸			
小薊			
根			
丹參		各三	
十銖			
乾地黄		三兩	
芎藭			
赤石			
脂			
阿膠			
當歸		各一	
兩半			
柏子仁		一兩	
作柏葉			
龜			
甲			
秦牛角鰓		各三兩	
剉			
炒令黑			

欽定四庫全書

普濟方



右為末蜜丸桐子大空心以酒服十九日二後加至三十丸	十灰丸治崩中下血不止	錦灰 黃絹灰 馬尾灰 艾葉灰	藕節灰 蓮蓬灰 油髮灰 赤松皮	灰 棕櫚灰 蒲黃灰	右等分為細末用醋煮糯米糊為丸如桐子大每服七十九加至一百丸空心米飲送下	欽定四庫全書 普濟方	十灰散治下血不止	錦片 木賊 棕櫚 柏葉 艾葉	乾漆 鯽鱗 鯉鱗 血餘	當歸	右逐味火化存性各等分為末和合入射香少許	溫酒調服	柏子仁湯 出齊生方 治婦女憂思過度勞傷心經心主於血	心虛不能維持諸經之血亦能致崩中下血之患
--------------------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	------------------	---	-----------------------	-----------------	-----------------------	--------------------	-----------	----------------------------	-------------	---	----------------------------



當歸去蘆酒浸 芎藭 茯神去木 小草 阿膠	剉蛤粉炒成珠 鹿茸燎去毛酒蒸焙 柏子仁炒各一兩 香附子炒去毛二	兩炙半 甘草兩 川續斷酒浸一兩半	右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去	滓空心食前溫服	金華散出大全良方 治婦人血室有熱崩下不止服溫劑不	効者	延胡索 瞿麥穗 當歸 乾葛	欽定四庫全書 普濟方	牡丹皮各一兩 石膏二兩 桂心別為末三分 蒲黃半兩	葳靈仙三分一方加薑二片煎	右為細末每服二錢煎至六分空心溫服日二服	一方用蔓荊子生薑各半兩搗爛炒小酒煎服凡	血崩之疾亦有陰陽冷熱之不同不可一槩用藥	僕常療一婦人崩漏暴下諸醫投薑桂附子等藥	服之愈甚召余診之六脈緊數遂用此藥兼局方	就雞蘇丸數服即安本事單用黃芩者亦此意也
---	--	--	----------------------------	----------------	--	-----------	----------------------	-------------------	---	------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------



鹿茸丸 出醫方大成 治經候過多其色瘀黑甚者崩下吸吸	少氣臍腹冷極則汗出如雨尺脈微小由衝任虛衰為	風冷客乘胞中氣不能固可灸關元柏壯在臍下正中	三寸	鹿茸 燎去毛 赤石脂 禹餘糧 製各一兩 艾葉 方一	無艾 柏葉 附子 炮各半兩 熟地黃 洗焙 當歸	續斷 各二兩	右為細末酒糊為丸如桐子大空心溫酒下三十	欽定四庫全書 普濟方	丸一法用蜜丸亦可	伏龍肝散 出大全良方 治忽崩中血不止結作血片如雞肝	色碎爛	芎藭 十二分 阿膠 青竹茹 各八分 續斷	榆 小薊根 各十分 當歸 六分 生地黃 伏	龍肝 各十分	右用水九升煮取三升去滓分作三服先服此藥後	服補藥丸子
---	------------------------------	------------------------------	-----------	---	---	------------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------	---	------------	---	--	------------------------------	-----------------------------	--------------



阿膠 鱉甲 川芎 當歸 赤石	脂 丹參 各六分 甘草 鹿茸 各五分 龍骨 十分	龜甲 十分 續斷 地榆 四分 烏賊骨 八分	右為末煉蜜丸如桐子大空心酒下二十九日二	服常煮小薊汁服之尤佳一方阿膠丸用鼈甲芎	翦續斷鹿茸各五分龍骨一兩半地膽四分烏魚	骨八錢丹參六錢龜甲十分右為末醋麪糊為丸	如桐子大每服三十丸艾湯下日進三四服	欽定四庫全書 普濟方	伏龍肝散 出聖惠方 治婦人崩中下血不止遶臍攪撮疼痛	或時心煩	伏龍肝 一兩細研 麒麟竭 半兩 地榆 一兩剉 椶櫚 二兩燒灰	龍骨 一兩 當歸 一兩剉 白芍藥 二兩 熟乾地黄	一兩禹餘糧 二兩燒醋洗十七遍	右件藥搗細羅為散不計時候以溫酒調下二錢	伏龍肝散治婦人血崩不止或作片者	芎藭 一錢 地榆 薊根 伏龍肝 各七錢 青竹
----------------------------	---	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------	--	------	--	---	-------------------------------	---------------------	-----------------	--



茹	八錢
右為細末每服三錢水二盞半煎至一盞溫服不拘時再服前阿膠丸	
艾煎丸	出拔萃方 治崩傷淋瀝小腸滿痛常服補榮衛固經
脈	方見本門月水不調類
琥珀散	出大全良方 治崩暴下血
赤芍藥	大者 荷葉 枯 男子髮 皂莢
香附子	大者
水	洗當歸 去蘆頭鬚洗淨 焙乾
棕櫚	炒焦存性 烏紗帽 是漆
欽定四庫全書	
沙頭巾取陽氣衝上故也	
普濟方	
右等分除棕外其餘並切粗片新瓦上煨成黑炭存性三分為細末每服三五錢空心童子小便調下如人行十里再進一服即止如產後血去多加米醋京墨麝少許大率治血崩先用此譬如治病有積不先去之徒服斷下藥一時暫止久則毒氣愈深甚至危殆血崩乃經脈錯亂不循故道淖溢妄行一二日不止使有積瘀之血凝成窠白更以	



藥渣任轉見增劇宜先以五積散加醋煎一二服
次服靈脂散及順氣藥去故生新自能平治

五靈脂散

出大全
良方

治婦人血山崩及治犬夫脾積氣

右用好五靈脂炒令煙盡為末每服一錢溫酒調
下此藥兼能解藥毒及蛇蠍蜈蚣咬塗傷處立愈
每一服三錢水酒童子便各半盞煎至八分通服
各抽刁散治產後有病服三服散惡血或心腹脇
肋脹痛不可忍或只用童子小便尤佳或中風

欽定四庫全書

普濟方

即入草烏頭半錢重同煎亦治腸風下血如不能
飲酒者煎烏梅柏葉湯調下怒煩口乾渴者加蒲
黃炒減半用一方燒存性霹靂酒調下然此藥氣
惡難喫燒之存性極妙一方治婦人經血不止加
當歸兩片酒一鍾與藥末同煎服昔親戚黃守正
卿為和劑局日內子凌夫人忽苦此疾危殆百藥
不動偶得此方旋即安愈

奇効四物湯治有熱久患血崩



當歸頭尾用 熟乾地黄洗焙 白芍藥 大川芎		半兩 大艾葉 阿膠蛤粉炒 黃芩出爛者		右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎空心溫服		有一醫療血崩咬咀藥鋪市藥其方則四物湯加阿膠大艾也就鋪分作八服又向鋪索黃芩半兩加在藥內鋪家問醫者曰此藥何為加黃芩醫曰非汝所知吾與此藥正以黃芩為主夫心主血血得熱則行得寒則止病者一服而愈服盡八服至今無恙兩見數婦血崩症亦類此醫乃以黃連解毒湯加大艾治之不効是又當量其虛實用之		阿膠散治婦人崩中下血經七八日不定或作血片或		欽定四庫全書 普濟方		如豆汁腹內疴刺疼痛		阿膠一兩搗碎 訶梨勒皮一兩 乾薑三分炮裂 密陀僧半兩 附子三分炮裂 櫻欄二兩 補骨脂三分		微炒		右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調下二錢		千金散治婦人血崩不止		熟地黄一兩 生地黄 乾刺薊 蒲黃各半		芍藥 當歸 川芎各一兩	
---	--	---	--	----------------------------	--	---	--	------------------------------	--	-------------------	--	------------------	--	--	--	-----------	--	----------------------------	--	-------------------	--	---	--	-----------------------------------	--



右為粗末每服四錢酒一盞半煎至七分去滓溫服食前日進三服	密陀僧散治婦人血山崩下過多不止黃瘦臍腹痛痞	阿膠碎炒一兩破故紙炒七錢乾薑炮七錢密陀僧一兩	棕皮燒灰二兩訶子皮一兩二錢	右為末每服三錢五錢熱酒調下濃煎艾湯亦得	當歸 芎藭 黃芩 芍藥 甘草	欽定四庫全書 各二兩生竹茹二升 普濟方	右呖咀以水一斗煮竹茹取六升去滓內諸藥煎取三升半分三服忌勞動嗔怒禁百日房事	丹參酒治崩中去血及產後餘疾方	丹參 艾葉 地黃 忍冬 地榆 各五斤	右剉先洗白以水浸三宿出滓煮汁黍米一斛炊飲釀酒酒熟酢之初服四合後稍添之
-----------------------------------	------------------------------	---	--	----------------------------	-----------------------	---	---	-----------------------	---	---



狼牙散治婦人崩中下血不止心胃虛悶	狼牙草 三兩 訶梨勒皮 三分 白芍藥 三分 白朮	三分 黃耆 三分 劉	右件藥搗粗羅為散每服三錢以水一中盞煎至	六分去滓不計時候溫服	治崩中去血積時不止起死方	肥羊肉 三斤 乾薑 當歸 各三兩 生地黄 二升	右咬咀以水二斗煮羊肉取一斗三升下地黄汁	欽定四庫全書 普濟方	及諸藥煮取三升分四服即斷尤宜羸瘦人服之	當歸散治婦人血崩不止者四十歲已上亦可服	當歸 一兩 龍骨 一兩 香附子 一兩 棕毛灰 半兩	右為末每服四錢空心酒飲湯下忌油膩雞猪魚	兔等物	半夏丸治吐血下血崩中帶下喘急痰嘔中滿虛腫亦	消宿瘀百病通用用圓白半夏刮淨槌扁以生薑汁調	和飛白麪作軟餅包拚半夏慢火炙令色黃去麪取半
------------------	---	--	---------------------	------------	--------------	--	---------------------	------------	---------------------	---------------------	---	---------------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------



夏為末米糊丸如菴豆大用三四十丸溫熱水下		治女子血崩及產後血不止月經來多取細椿木棍一		大握東引者洗之以水一大升煮分再服便斷亦止帶		下		白崩以芎歸湯加南木香下震靈丹		治婦人血海敗以佛尼降真二兩剉碎每服水一大碗		煎至半碗空心連進二服		四仙丸治崩中夫崩中者由勞傷過度使臟氣俱傷衝		欽定四庫全書		普濟方		任俱虛不能攝養致思慮過度而為之崩產後血為經		血經血既傷臟氣既損不能將養不慎勞役早則生虛		體不任遠使經血暴下謂之崩凡崩中帶下而別無所		若宜與鶴頂丸主之苦小腹急滿痛者難治內有瘀血		也故切勿止之止則復滿愈加不可治宜先與四仙丸		後與鶴頂丸既崩而淋瀝不斷血弦於內也以四仙丸		去其血然後鶴頂丸治之		桃仁 去皮 當歸 大黃 醋浸 水蛭 石灰炒	
---------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	---	--	----------------	--	-----------------------	--	------------	--	-----------------------	--	--------	--	-----	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	------------	--	--	--



右為末醋糊為丸梧子大每服三十丸空心醋湯下

二氣丸治漏下者因氣損耗故衝任之脈因此虛矣以致經不得依時淋瀝不絕為之崩及產後諸疾俱由是也鶴頂丸俱宜服之妊娠漏下血者名曰胎漏月經忽行蓋血養胎非時而行皆氣衰而不能納在經也如使來有如經或因傷動而漏下乃服二氣丸鶴頂丸止之不止則胞乾子損矣

欽定四庫全書

普濟方

艾葉

一兩醋浸一宿煮乾為度阿膠半兩剉炒令沸

右為細末醋糊為丸梧桐子大每服五十丸空心

粟米湯下

鶴頂丸治帶下之證有三未嫁之女月經初來尚未曾止或浴之以冷或熱而扇或當風此室女病帶下之由有家之婦陰陽過多即傷胞絡風邪乘虛而入胞經觸冷遂使穢液與血水相連此婦人帶下之由產後帶下由亡血失氣傷動胞絡門開而外風襲肌體虛冷風入冷風兼熱



氣相連故成液而下冷則多白而熱則多赤冷熱相交		赤白俱下鶴頂丸治之		艾葉 一兩 醋半盞 煮乾為末 牡蠣 一兩 三錢 鹽泥煨 赤石脂 一兩 半醋		淬七 吳茱萸 湯淋泡 乾薑 一兩 半 炮裂 龍骨 一兩 鹽 次		當歸 七錢 半 酒浸 附子 半兩 炮 去皮		右為細末醋糊丸梧桐子大以赤石脂為衣每取		五十丸用艾葉鹽湯烏梅煎服空心下		治婦人血崩屢効方 出大全 良方		欽定四庫全書 普濟方		當歸 白芍藥 乾薑 棕櫚 各等分		右各煨存性碾為細末稱過醋湯調以有節朱筋		在四十九轉食前服之仍與炒黑香附子丸		當歸散治血崩		當歸 白芍藥 香附 炒 棕毛灰 五錢		右各等分為末米飲湯調下食前一 方無棕毛灰		當歸湯治婦人下血不止腹痛		當歸 焙半 柏葉 一兩 薤白 六錢 禹餘糧 三分 醋淬三	
-----------------------	--	-----------	--	---------------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------	--	---------------------	--	-----------------	--	-----------------	--	------------	--	------------------	--	---------------------	--	-------------------	--	--------	--	--------------------	--	----------------------	--	--------------	--	------------------------------	--



遍研末	右先將三味咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分下餘糧細末一錢煎沸去滓空心溫服	治婦人血山崩	百草霜 血餘灰 棕櫚燒灰 蓮蓬	燒灰用碗合	右各等分用無根水一盞送下每服五錢空心服	棕櫚散治婦人崩中下血數升氣欲絕宜服	欽定四庫全書 普濟方	棕櫚三兩 紫參一兩 麝香二錢 伏龍肝一兩 燒灰 細研 細研 細研	右件藥搗細羅為散入麝香研令勻不計時候以	熱酒調下二錢	瓷藥散出聖惠方 治婦人崩中下血不止	白瓷藥一兩 柏葉一兩 柏樹細皮一兩 茜根一兩 細研 微炙 炒黃 剉	剉	右件藥搗細羅為散不計時候以熱酒調下二錢	桑耳散出聖惠方 治婦人崩中下血不止漸加虛困黃瘦
------------	---	---------------	------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------	--	----------------------------	---------------	---	---	----------	----------------------------	---



桑耳 二兩 微多 阿膠 一兩 炒令黃燥 茜根 一兩 熟乾 地黃	右件藥搗細羅為散不計時候以粥飲調下二錢	通神散 出聖惠方 治婦人崩中下血不止	菝葜 一兩 蛇床子 一兩 木賊 一兩 桑蛾 一兩 微炙	右件藥搗細羅為散每服不計時候以粥飲調下	二錢	治婦人崩中連日不止 出大全良方	欽定四庫全書 普濟方	熟艾 如鷄子大 阿膠 半兩 乾薑 一錢	右為粗末用水五盞先煮艾薑入膠消烱溫服分	二服空心服一日服盡	又方 出大全良方	牛角鯁 烏賊骨 各一分 麝香 一錢	右為細末入麝香令停酒調下一錢一日二三服	備金散 出拔萃方 治婦人血崩不止	香附子 四兩 當歸尾 一兩 五靈脂 一兩 炒
---	----------------------------	--	--	----------------------------	-----------	---------------------------------------	-------------------	---	----------------------------	------------------	--------------------------------	--	----------------------------	--	--



右細末每服秤五錢醋調空心服立効	黃葉湯 出危氏方 治血崩	黃連 三錢 黃蘗 各一錢 黃芩 各一錢	右用水四盞煎取二盞去滓入炒阿膠末半錢再煎分作三次空心溫服如腹痛加梔子同煎	治血崩 出經驗良方	棕毛 垢膩髮 千里馬 即草鞋後半截	右各燒存性為細末勿令病者見合此藥酒調服	欽定四庫全書 普濟方	蒲黃散治婦人血山崩累驗秘方	破故紙 炒黃 蒲黃 炒 千年石灰 炒黃	右各等分為細末每服三錢空心用熱酒調服立止	蓮殼散治血崩	棕毛 燒灰 蓮殼 燒灰存性 香附子 二兩	右為末米飲調三四錢食前調下服之	治婦人血山崩
------------------------	------------------------------------	---	---	---------------------------------	---	----------------------------	-------------------	----------------------	---	-----------------------------	---------------	--	------------------------	---------------



青箱子 夏蚕繭灰 棕皮灰	右為末用霹靂酒調下二錢空心服	治婦人血崩血敗	頭髮灰 陳棕灰 綿燒灰	右各等分每服三錢用米飲湯送下立效	治婦人崩中下血不止慚加虛困黃瘦	棕櫚皮 二兩 燒灰 晚蚕沙 二分 微炒 麝香 一錢 細研	右件藥細研為散不計時候以熱酒調下二錢	欽定四庫全書 普濟方	又方	寒食麪 一匙 炒 雀兒糞 一兩 細研 乾薑 半兩 炮裂 剉搗末	右件藥用醋一大盞熬下二味如膏入炒麪和丸	如小豆大每服不計時候以溫酒下十丸	治婦人崩中下血不止方	側柏葉 一兩 微炒 芫花 一分 醋拌 炒令乾 大麻莖 十莖	右件藥搗粗篩為散每服三錢以水一中盞煎至	六分去滓不計時候溫服
---------------------	-----------------------	----------------	--------------------	-------------------------	------------------------	--	---------------------------	-------------------	-----------	---	----------------------------	-------------------------	-------------------	---	----------------------------	-------------------



治暴崩中去血不止方	牡蠣	兔骨	各二兩 半炙	右治下篩酒服方寸匕日三服	如神散治婦人血崩不止赤白帶下	香附子	赤芍藥	各等分	右為細末每服三錢鹽一捻水一盞煎至七分溫服無時候日二服十服見效	芍藥湯治崩中下血不止小腹痛	欽定四庫全書	普濟方	芍藥	一兩半 炒黃	柏葉	六兩 微炒	右水一升煎六合入酒五合再煎取七合空心分為兩服一方為細末酒調二錢一方有鹿角膠等分炒燥為細末酒調服方寸匕治白帶臍腹疼痛面黃瘦悴	治崩中晝夜不止醫不能治	一名芎藭酒	芎藭	一兩	生地黃汁	二合	右先用酒五升煮芎藭一升去滓下地黃汁再煎
-----------	----	----	-----------	--------------	----------------	-----	-----	-----	--------------------------------	---------------	--------	-----	----	-----------	----	----------	---	-------------	-------	----	----	------	----	---------------------



三二沸分為一二服不耐者漸進一方無地黃汁	不飲酒者水煮亦得	治崩中去血不止	白茅根 三斤 小薊根 五斤	右細切用酒五斤煮取四升去滓分溫四服一方	無白茅根一方無小薊根	治婦人血山崩不止	婦人油頭髮 半兩 燒灰 千里草灰 半兩	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服三錢淋用煨秤錘酒調服	治婦人血崩過多不止	槐花 一兩 棕毛灰 五錢	右為散水一盞少許煎至七分去滓溫服	如聖無比散治血山崩不止 一名綠云散	晚蚕沙 一兩 伏龍肝 半兩	右同為細末酒調二錢	治血崩
---------------------	----------	---------	---	---------------------	------------	----------	---	------------	------------------	-----------	--	------------------	----------------------------------	---	-----------	-----



棕櫚 不以多少燒存性研 牡蠣 火煨研如粉	右每服抄棕櫚灰一錢牡蠣半錢入麝香少許拌勻空心米飲調下又方用四物湯加側柏葉阿膠	大艾煎服	治血崩	椒目 焙為末 綿子 燒灰各等分	右每服三錢空心用鹽酒調下	治婦人經年血崩 出經驗良方	欽定四庫全書 普濟方	香附子 二兩炒赤 蓮殼 五箇燒存性	右為細末陳米飯飲調送震靈丹一十九一日三五服	烏龍丸治婦人血崩	百草霜 細糕	右為丸麝香作衣每服五十丸空心鹽湯送下	陽起石丸 出濟生方 治衝任不交虛寒之極崩中不止變生	他證
---	---	-------------	------------	--	---------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--	------------------------------	-----------------	------------------------------	---------------------------	---	-----------



陽起石 火煨紅別研 令極細二兩 鹿茸 去毛醋炙一兩	右為細末醋煎艾汁打糯米糊為丸如梧子大每	服百丸空心食前米飲送下	狗膽煎治婦人經血不止崩暴下血	狗膽 一枚 用汁 鑄墨 二錢 鍋底 面上煤是	右一處按拌分作兩服煎當歸酒調下	烏金散 出經效 濟世方 治婦人血山崩累日不止	桑螵蛸 去桑枝子秤 黃明膠 槌碎	欽定四庫全書 普濟方	右等分拌勻於新方磚中焙乾為末溫酒下一錢	烏金散 出經 驗方 治血崩不止	棕毛 燒灰存性一兩 真龍骨	右為細末和勻每服三錢好酒調下空心二服後	即止	治婦人崩下血不絕小腹痛方 出聖惠方	牡蠣 二兩半 燒為粉 狗頭骨 二兩半 炙令黃	右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢
--	----------------------------	--------------------	-----------------------	---	------------------------	--	---	---------------------------------------	----------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------	-----------	---	---	----------------------------



治婦人崩中下血晝夜不止方 出聖惠方	阿膠 一兩搗碎炒令黃燥 蛇床子 三分	右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下	一錢	治婦人崩中下血不止頭目暈悶心神煩熱宜服此方	出聖惠方	晚蚕沙 一兩微炒 白堊 一兩	右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下	欽定四庫全書 普濟方	一錢	又方 出聖惠方	棕櫚 五兩燒灰 麝香 二錢	右件藥同細研為散每服不計時候以溫酒調下	二錢	獨聖散 出諸氏集驗方 治婦人血崩不止	用防風去叉蘆不以多少為細末酒煮白麪清調	下二錢空心食前日二服更以麪糊作為丸酒投
---	---	----------------------------	-----------	------------------------------	----------------------------	---	----------------------------	-----------------------	-----------	-------------------------------	--	----------------------------	-----------	--	----------------------------	----------------------------



之極驗	荊芥散 出醫方大成 治婦人崩中連日不止	用荊芥穗於燈盞多着燈心好麻油點燈就燈上	燒荊芥焦色為細末每服三錢童便調下	治血崩不止 出大全良方	用五靈脂十兩為末水五大盞煎至三盞去滓澄	清再煎成膏入神麴二兩為末和丸如梧桐子大	每服二三十丸溫酒送下空心服便止兼服四君	欽定四庫全書 普濟方	子湯加肉豆蔻并和氣藥本草五靈脂行血有功	大能生補肝藏血入肝尤速	神應散 出大全良方 治婦人血崩不止	用桂心不以多少瓦鍋內煨微存性為末每服一	二錢米飲調下	一方 出大全良方 治婦人血崩不止赤白帶下	用香附子去毛炒焦為細末用熱酒調下二錢放	溫服不過兩服立愈昏迷甚者三錢如血崩不止
-----	------------------------------------	---------------------	------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	---------------------	-------------	----------------------------------	---------------------	--------	-------------------------------------	---------------------	---------------------



血崩出鮑氏方	治婦人崩中不止一用赤石脂為末酒調下	差其魚多在衣書中俗名蠹魚也	以衣中白魚殭蚕等分為末井花水服之日三服	治婦人崩中下血不止	蛾	用槐耳燒作灰為末以酒服之方寸匕一方作槐	療崩中不止不問年月遠近出聖惠方	欽定四庫全書 普濟方	酒或米飲下食前	以枯蓮蓬燒灰空心用淡醋湯下二錢一方以溫	治婦人血崩過多不止一名笑藥散出十便良方	服一方用丁香百顆酒煎服	以丁香二兩為細末用酒三升煮取一升空心頓	治崩中晝夜不止醫不能治出大全良方	或五色崩漏當服滋血調氣是婦人仙藥也	者亦能解之米飲調亦可許學士云治下血不止
------------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------------	------------------	----------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------	----------------------------	---	--------------------	----------------------------	--	--------------------------	----------------------------



右用側柏將鹽炒淨瓦上燒槐花并五倍子為末	童子小便調服	治崩中晝夜十數行衆醫所不能瘥者方 出千金方	用芎藭八兩咬咀以酒五升煮取三升分三服不	飲酒水煮亦得一方為末每服五錢水酒各一盞	同煎服	治崩中 出千金方	用桑耳燒令黑為末酒服方寸匕日二服亦治帶	欽定四庫全書 普濟方	下鼓酒亦佳	又方 出千金方	用羊脰一具以酢煮去血服之即忌猪魚酢滑物	犯之便死亦可治帶下	一方治崩中下血 出大全良方 崩中藥多是用止血藥及補	血惟此方治陽乘陰所謂天暑地熱經水沸溢者	用黃芩不以多少為細末每服一錢霹靂酒調下	一方荊芥煎湯下近朝有王御醫值夜忽有一官
---------------------	--------	---	---------------------	---------------------	-----	----------------------------	---------------------	-------------------	-------	---------------------------	---------------------	-----------	---	---------------------	---------------------	---------------------



女血如山崩其時暑月藥籠中只有大順散兩貼	用冷水調服旋即奏效以此知醫要權變金華散	亦妙	一方治婦人血崩 出大全良方	用烏梅燒灰為末烏梅湯調下一方酒調皆愈	一方 出大全良方 用棕櫚白礬煨為末酒調下二錢服	綿砂散 出大全良方 治血崩	用新縮砂仁不以多少於新瓦上炒香為細末米	欽定四庫全書 普濟方	飲調下三錢一方溫酒調服	治血崩方 出大全良方	用夏枯草為細末每服二錢米飲調下無時候	治血崩 出神效方	用蚕沙不以多少為末每服三錢五錢熱酒調下	服之	獨聖散 出仁存方 治婦人血崩臍下冷痛	用良薑為末每服三錢濃煎艾湯調下空心食前
---------------------	---------------------	----	------------------------------	--------------------	--	------------------------------	---------------------	---------------	-------------	---------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------	----	-----------------------------------	---------------------



老婦人加大椒一兩臍下冷痛加五靈脂二兩作	丸子服	治血崩 出經驗良方	用陳蘿蔔子炒赤細研一大錢陳皮飲下中年人	弱者用四物湯加茱萸生薑肉桂	治婦人不問年老少經血妄行如崩 出經驗良方	取川椒目微炒去汗盡放地上出毒為細末用陳	米一勺烏梅半箇煎湯服可安	欽定四庫全書 普濟方	梅飲子 出經驗良方 治婦人血崩	以鹽白梅七箇燒灰為末米飲作一服空心	治婦人積年血崩 出經驗良方	用草血竭嫩者蒸油鹽薑淹喫小酒嚥下或收為	末薑酒調服血竭草生於磚縫井頭少在地上	一笑散治婦人血崩	用新綿一團燒灰研為細末用酒調服立止	治婦人血崩壯陽日過倍大補益主赤白下補精敗面
---------------------	-----	-----------------------------	---------------------	---------------	--	---------------------	--------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	----------	-------------------	-----------------------



黑勞傷

出本
草

用蓯蓉四兩水煮爛切細研精羊肉分四度五味

米煮粥空心服

治崩中血凝症者

出本
草

取生胡麻一升搗內熱湯中絞取半升服立愈

治崩中血安胎止腹痛用艾葉醋煎服

治崩中及女子月候傷過

出千
金方

取小薊根搗汁半升服之亦可酒煮服

欽定四庫全書

普濟方

治婦人血崩心痛甚者名殺血心痛小產血過多而心

痛甚者亦然此方治之

出大
全良方

用炒烏賊魚腹內墨醋湯調下此魚腹中有墨汁

若見人過必叱其墨以蔽其身一方用烏賊魚

腹內墨以醋摩令濃服之如甚者炒墨醋調服之

治婦人血崩

以烏梅肥大者半斤用酸醋浸一宿取出去核研

為膏加百草霜羅過共烏梅膏為丸如梧桐子大



每服三四十丸空心淡醋湯送下用進二服
一方治血崩
出神效方
以管仲去須剉碎用酒醋煎三錢煎至七分去滓
溫服一服立止
治婦人血山崩
用駱駝毛燒灰為末每服二錢鹽酒調下神效
治崩中帶下
出本草 以鹿血和酒服之良
白堊丸
一名牡蠣丸 出千金方 治女人三十六疾胞中病漏下不
絕
欽定四庫全書
普濟方
邯鄲白堊
禹餘糧
白芷
白石脂
乾薑
龍骨
桂心
藿麥
大黃
石韋
白欬
細辛
芍藥
甘草
黃連
附子
當歸
茯苓
鍾乳
蜀椒
黃芩
各半兩 牡蠣
烏賊骨
各一十錢
右為末蜜丸梧子大空心酒服五丸日再服不知
加至十丸一方無蜀椒每服溫酒下三十丸

生乾地黄散治婦人血傷不止腰脚痠腫倦怠無力心煩渴燥面目虛浮					
生乾地黄		焙	陳橘皮		去白
甘草		多剉	白芷		
醋石榴皮			牛角鰓灰		
續斷			人參		
地榆		剉炙各一兩	右為散每服二錢米飲調下食前日二服以止為度		
伏龍肝散					
出聖方		治婦人漏下或差或劇身體羸瘦飲食減少四肢無力			
欽定四庫全書					
普濟方					
伏龍肝		一兩	赤石脂		一兩
龍骨		一兩	牡蠣		一兩
烏賊魚骨		粉一兩	餘糧		一兩
燒灰			滓七遍		醋
桂心		一兩			
白朮		一兩	黃牛角鰓		一兩
燒灰					
右件藥搗羅為散每於食前以溫酒調下二錢					
代赭散					
出聖方		治婦人漏下久虛乏弱			
代赭		一兩	附子		三分
滓三遍			裂炮		
赤石脂		一兩	蒲		
黃		半兩	鹿茸		二兩
酥炙微黃			去毛塗		
當歸		一兩	剉		
乾薑		三分			

欽定四庫全書

普濟方



炮裂 芎藭 三分 熟乾地黄 一兩	右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢	艾葉散治婦人漏下血淋瀝不斷身體黃瘦不思飲食	艾葉 炒 阿膠 炒令 赤石脂 龍骨 各一 縮	砂仁 半兩 附子 炮裂去 當歸 切焙 硫黃 各研 三分熟	乾地黄 焙一兩 吳茱萸 湯浸焙乾 炒半兩	右為散每服二錢米飲調下不拘時一方有芎藭	三分	欽定四庫全書 普濟方	赤石脂散 出聖 治婦人漏下不止腹內冷痛	赤石脂 一兩 艾葉 三分 乾薑 三分 炮 慎火草 一	當歸 一兩 剉 鹿茸 二兩 去毛塗 龍骨 一兩 阿	膠 二兩 搗碎 炒令黃燥	右件藥搗細羅為散每於食前以溫酒調下二錢	螵蛸散 出經驗 治婦人漏下臍腹痛久而不止	以烏賊魚骨燒存性研為細末每服二錢煎木賊	湯下不拘時候
-------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------



治漏下神方 出千金方 取槐子燒末酒服方寸匕日三立瘥食前服一	方用槐花	膠艾湯 出和劑方 治勞傷血氣月水過多淋瀝漏下連日不	斷臍腹痛經血淋瀝不斷及妊娠將攝失宜胎動不	安腹痛下墜或勞傷胞絡淋瀝漏血腰痛悶亂或因損	動胎上搶心奔衝短氣及因產乳衝任氣虛不能約制	延引日月漸或羸瘦	欽定四庫全書	熟乾地黄 各三兩 白芍藥 各四兩 當歸 去蘆頭 艾葉 微炒	阿膠 搗碎炒 芎藭 炙各二兩 甘草 炙各二兩	右為粗末每服三錢水一盞酒六分煎至八分去	滓熱服空心食前日三服病甚者連夜併服	烏金散治婦人血崩日久不止或經脈不斷或暴下血	不止	烏賊魚骨 去甲 棕櫚 羊角尖 蠶退	新編 各一兩 白礬 半兩 乾薑 一分
--	-------------	---	-----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------	--	--	----------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------	---	--



右都入一瓶內用泥固濟候乾以大火煨通赤放 冷取出細研入麝香一錢再研勻每服二錢溫酒 調下空心食前服		龍骨散 出千 金方 治婦人漏下不止或少或多遂致常漏身 體虛瘦飲食減少困怠無力	龍骨 竈中黃土 赤石脂 牡蠣 燒	研 桂 去粗 烏賊魚骨 去甲 禹餘糧 煨醋淬五七 皮 適各一兩	右為散每服二錢溫酒或米飲調下空心日午臨	欽定四庫全書 普濟方	卧	馬通湯 出千 金方 治漏下血積不止	赤馬通汗 一升取新馬屎絞取 汁乾者水浸絞取汁 生艾葉 阿	膠 各三 當歸 乾薑 各二 好墨 半圓 兩	右呔咀以水八升酒二升煮取三升去滓內馬通 汁及膠微火煎取一升分再服相去如人行十里 久	蒲黃阿膠湯 一名蒲黃散 出聖惠方 治婦人血漏非時而下淋瀝
--	--	---	--	---	----------------------------	--	----------	---	--	---	--	--



不斷五色	
蒲黃	微炒 二兩
鹿茸	酒浸炙 去毛
當歸	切焙各 二兩
阿膠	炙令 燥
烏賊魚骨	去甲各 二兩
生地黃	汁一碗 一方用 生乾地黃一兩
右除地黃外粗搗篩每服二錢水一盞地黃汁半	
盞同煎取一盞去滓溫服空心日午臨卧一方為	
細散溫酒調下二錢	
慎火草散	出千 金散
治漏下	
慎火草	十兩 熬 令黃
當歸	
鹿茸	
阿膠	各四 兩
欽定四庫全書	
普濟方	
龍骨	半兩
右治下篩先食酒服方寸匕日三	
鹿茸散	出千 金方
治婦人漏下不止	
鹿茸	酒浸炙 去毛
阿膠	炙燥
烏賊魚骨	去甲各 一兩
當歸	
蒲黃	切焙 微炒各 一兩
右為散每服二錢溫酒或米飲調下二錢	
菴藺飲治婦人卒漏下先多後少日久不斷	
菴藺子	微炒
熟乾地黃	焙
蒲黃	微炒
當歸	切焙



各二 兩	右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服	空心日午臨卧	蒲黃散 一名鹿茸散 出千金方 治漏下不止	蒲黃 半斤 鹿茸 各二兩 當歸 各二兩	右治下篩酒服五錢匕日三不知稍加方寸匕	蒲黃丸治婦人月候過多血傷漏下	蒲黃 三兩 微炒 龍骨 二兩 艾葉 一兩	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜和丸梧子大每服二十九煎米飲下	煎艾湯下亦得日再	赤石脂散 出聖惠方 治婦人漏下數年不差	赤石脂 一兩 燒赤 側柏 一兩 微炙 烏賊魚骨 一兩 燒灰	右件藥搗細羅為散每於食前以粥飲調下二錢	治婦人血崩 出本草	以舊敗蒲席燒灰酒調下二錢	治婦人崩中吐痢血不止 出本草
-----------------	----------------------------	---------------	--	---	---------------------------	-----------------------	---	------------------------------------	----------------------------	-----------------	---	---	----------------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------------------------



取敗船茹乾煮之亦燒作屑服之													
欽定四庫全書													
普濟方													
普濟方卷三百二十九													

