

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十七 明 周王朱櫛 撰

妊娠諸疾門

養胎胎教 附論

夫至精絕化一氣方凝始受胎胞漸成形質子在腹中
雖無聽聞自妊娠之後則須行坐端嚴性情和悅常處
淨室多聽美言令人讀誦詩書陳說禮樂耳不聞非言目
不視惡事如此則生男女福壽敦厚忠孝賢明不然則

欽定四庫全書

普濟方

男女既生率多鄙賤不壽而遇災此所謂因外象而內
感也昔太姒妊娠文王目不視惡色耳不聽惡聲口不
談惡言世傳胎教之道蓋謂此也前論亦畧叙之矣若
夫婦人有終身無子者何也按巢氏病源云婦人無子
者蓋有三焉一者墳墓不嗣二者婦人年命相尅三者
夫疹婦病皆令無子若夫疹婦病可以服藥之後能有
子相尅則難遑今觀是說亦未盡善有人以婦人無子
問西京常器之者答曰女人自少多病服燥藥無節用



使天癸耗動早傷故終身無子又有襄陽宋大亨者亦云然若婦人妊娠有兩胎者何也余按古今方書並無論及此者惟巢氏論云陽施陰化精氣有餘故生二胎且謂成一胎之後則精有幾今觀婦人有兩胎者其精神氣宇畧無小異至於數有兩胎或間兩胎者有俱男俱女者有一男一女者道藏經論云有求子法云婦人月信初止一日後三日五日值男女旺相日陽日陽時交合有子多男若男女稟受皆壯則多子一有怯弱則

欽定四庫全書

普濟方

少子以此推之理可槩見焉又婦人妊娠男女之別何也按顛顛經陽盛發陰當孕成男六腑諸經皆舉其陽陰盛發陽當孕成女六腑諸經皆舉其陰巢氏病源云三陽所會則生男三陰所會則生女葛洪肘後方云男從父氣女從母氣聖濟經云天之德地之德稟陰陽之至和用為流轉於一體因氣左動則屬陽陽資之成男因氣右動則屬陰陰資之成女大易所稱乾道成男坤道成女此男女之別也凡妊娠有疾投以湯藥有傷破



血者忌之何也內經云婦人重身毒之奈何岐伯答曰有
故無殞衰其大半而已也蓋妊娠有疾不可不投藥也必
有醫者審度疾勢輕重量度藥性高下處以中庸不必
多品視其疾勢已衰藥宜便止則病去母安子亦無損復
何懼於攻治哉 凡婦人妊娠十月其說見於古書有不
同者多矣按巢氏病源婦人妊娠一月名始胚足厥陰脈
養之二月名始膏足少陽脈養之三月名始胎當此之時
血不流行形象始化未有定儀見物而變欲子端正莊嚴

欽定四庫全書

普濟方

常令見貴人不可見狀貌醜惡人也欲生男宜操弓矢乘
牡馬欲生女宜施珥璫環珮欲子美好玩白璧觀孔雀欲
子賢能宜看詩書習雅務手心脈養之四月始受水精以
成血脈手少陽脈養之五月始受火之精以成其氣足太
陰脈養之六月始受金精以成其筋足陽明脈養之七月
始受木精以成其骨手太陽脈養之八月始受土精以
成其膚革手陽明脈養之九月始受石精以成其毛髮足
少陰脈養之十月五臟六腑關節人神皆備此其大備也



又五臟論有稱耆姿者論一月如珠露二月如桃花三月
男女分四月形象具五月筋骨成六月毛髮生七月遊其
魂而能動左手八月遊其魄而能動右手九月三轉身十
月受其氣足更有稱張仲景者亦然又顛顛經云一月為
胎胞精血凝也二月為胎形成胚也三月陽神為三魂四
月陰靈為七魄五月五行分五臟也六月六律定六腑也
七月精光竅通光明也八月元神具降真靈也九月宮室
羅布以定生人也十月受氣足萬象成也今推究數說之

欽定四庫全書

普濟方

理如五臟論者類皆淺陋不經徃徃妄託其名至於三藏
佛書且語涉怪誕謾不可考今按顛顛經三卷云中古巫
方所撰隋人巢氏方亦嘗序之今巢氏論婦人妊娠乃不
見言之聖濟經原化篇亦獨取顛顛經更不言巢氏論
者何哉嬰童寶鑑集云小兒方論起自巫方黃帝云吾
不能療小兒賴國有巫方能知小兒之壽夭也所相傳
者有小方中古今巫方畧小兒則取於顛顛經則是未
盡其理故不言之焉及觀巢氏論小兒候亦云若聖濟



經者但取其文句下若巢氏之論其間有胎教之法為
可取所以巢氏論妊娠至三月始胎之時欲令見貴人
莊嚴若操弓矢施環珮觀孔雀讀書之類豈非胎教之
理乎嘗試推巢氏所論妊娠脈養之若足厥陰肝脈也
一臟腑之經餘如此且四時之令始於木故十二經之
養胎於肝也所以一月二月手心主心胞絡脈也手少
陽三焦脈也屬火而憂旺所以養胎三月四月也屬手
少陰心手少陽小腸者以君主之官無為而尊也足太

欽定四庫全書

普濟方

陰脾脈也足陽明胃脈也屬土而旺長夏所以養胎而
五月六月手太陰肺脈矣手陽明大腸脈也屬金而旺
秋所以在養胎七月八月足少陰腎脈也屬水而旺冬
所以養胎九月又况母之腎臟繫於胎氣脈以養然後
待時而生此論之奧微而又有至理餘書所論皆不能
及也觀此巢氏之論世更有明之者亦未有過於巢氏
之論矣余因主其說 又曰王氏脈經云產育人倫莫
不愛重今世希見論者且謂凡夫婦配合陰陽竒耦乾



道成男坤道成女天元既已妊娠自可將護胎息無犯
禁忌生子必賢明壽考今人嗜慾為樂輕棄性命反又
房勞不自節之亦有時因房勞絡脈滿而經脈虛運動
之間胎氣亦隨經絡所積腹傷胎墮子皆從此損雖間
有降生必逆惡早夭則患胎經變生諸病救療豈不晚
哉 又曰凡妊娠臟腑經脈關節壅塞切忌晝寢不可
等閑服藥針灸思憂悲慮驚恐胎孕時須要頻頻行步
寬緩日三千步用溫酒濯足不可澡浴以防水氣衝胎

欽定四庫全書

普濟方

難保無難八九月食葵菜臨產宜軟粥飯或爛煮雌鷄
取汁煮粥溫酒飽食則氣順必能易分娩自然無病飢
渴氣乏大冷大熱勿食 又云孫真人云凡妊娠唯在
抑陽助陰素問陰搏陽則謂之胎蓋關前為陽關後為
陰尺中之脈按之搏手而不絕者妊子也婦人平居陽氣
微盛無害及其妊子則方閉經隧養胎氣若陽盛搏之
則經血旺行胎乃不固素問陰虛陽搏謂之崩其抑陽
助陰之方甚多然胎前唯惡羣隊若陰陽調勻有益



交雜別生他病惟內補丸服之使陽不至強陰不至弱
陰陽調勻有益胎嗣此前人未嘗論及二味熟地四兩
酒浸當歸二兩酒浸將息以全人命更得名醫喻諸人
幸莫大焉 氣質生長具天地之性集萬物之靈陰陽
平均氣質完備其理應爾然而奇耦異數有盈有耗剛
柔異用或強或羸血榮氣充不能逃於消息盈虛之理
則稟受之初詎可一槩論是以附贅垂疣駢拇枝指侏
儒跛足形氣所賦有如此者瘡瘍癰腫聾盲瘖啞瘦瘠

欽定四庫全書

普濟方

疲瘵氣形之病有如此者然則胚胎造化之始精遺氣
變之後保衛輔翼固有道矣天有五氣各有所湊地有
五味各有所入所湊有節適所入有度量凡所畏忌悉
知戒慎資物為養者理固然也寢興以時出處以節可
以高明可以周密使霧露風邪不得乘其間而入因時
為養者理宜然也以至調喜怒寡嗜欲作勞有節而氣
血從之皆所以保攝妊娠使諸邪不得干焉苟不然方
授受之時一失調養則內不足以為中之守外不足以



為身之強氣形弗充而病因之若食兔缺唇食犬無聲
食雜魚而瘡癬之屬皆以食物不戒故也心氣大驚而
癩疾腎氣不足而解顛脾胃不和而羸瘦心氣虛乏而
神不足之屬皆以血氣不調之過也誠能食飲知所戒
推而達之五味無所傷誠能於氣血知所調推而達之
邪氣無所乘茲乃生育相待而成者故曰天下人不困
妊娠之人有宿挾疴瘵而後有孕時節適乖以致生疾
病並有腑臟衰損氣力虛羸令胎不長故須服藥去其

欽定四庫全書

普濟方

疾病令有血氣以養扶胎者也 妊娠將理無方脾胃
不足飲食減退不行榮衛化精微養衝任令胎臟內弱
子氣不足故巢氏病源方調母療母則胎安是也若使
脾胃和而能飲食穀水化而運氣血則何慮胎氣不長
也 又云人由受氣至於有生十二經脈迭相滋養猶
之物也得寒溫之正土地之宜無物不長凡胎處胞中
或有萎燥者蓋由妊婦所稟怯弱不足自周陰陽血氣
偏係非冷即熱胞失於滋所以萎燥而不長也日月雖



過不能生育亦有損墮胎孕者惟宜資母血氣脾陰陽
調通本末相應則胎安而有養矣 又云妊娠一月謂
之始形二月謂之始稟三月謂之始胎當是之時血氣
不流形象始化男女分形當其形未分緣感而孕所以
孕婦欲令見榮貴端正之人不欲見偃僂侏儒之輩及
猿猴犬馬怪禽異獸仍夜卧宜息心靜氣慎勿亂思恐
形異夢而不祥也妊娠所以擇食者蓋孕假五氣五味
生成五臟氣味各隨所喜而歸之陰陽相應論曰酸生

欽定四庫全書

普濟方

肝苦生心甘生脾辛生肺鹹生腎假五味以生也六節
藏象傳曰燥氣湊肝焦氣湊心香氣湊脾腥氣湊肺腐
氣湊腎此五臟假五氣以成形也若形藏未備則隨其
不足而孕婦必欲其氣味食之蓋陽為氣陰為精氣化
則精生味化則形長誠以人之生也氣本於天形本於
地內經謂天食人以五氣地食人以五味正此之謂若夫
天地既分質不完者皆孕婦擇食之時不得其氣味故
視斜覷短偏瞽雙盲手攣足跛腰偃背僂此肝形之不



備也言遲語吃或瘖或癩神氣昏塞此心形之不備也
胸背凸凹舌短唇缺此脾形之不備也毫毛踈薄髮鬢
禿落或毫毛通白皮膚偏赤此肺形之不備也毛髮焦
黃形體小黑五鞭五輓歲不長此腎之形不備也由是孕
婦擇食假其氣味生成五臟一有不備病輒隨之譬猶
陶冶成器若或苦窳是水火之利不齊也

方

烏鷓雞湯 治妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御

欽定四庫全書

普濟方

宜食大麥毋食腥辛是謂始正 妊娠一月足厥陰脈
養不可針灸其經厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之
時血行否澁不為力事寢必安靜令無恐懼 妊娠一
月陰陽新合為胚寒多為痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿
胎胞急卒有所下當預安之宜服

烏鷓雞

一隻治
如食法

茯苓

阿膠

各二
兩

甘草

生薑

各
一

兩

吳茱萸

一
升

麥門冬

五
合

人參

芍藥

白朮

各三
兩

右咬咀以水一斗二升煮雞取汁六升去雞下藥煎



之用三升內酒三升并膠烱盡取三升放溫每服一
升日三服

補胎湯 大 全 良 方 若曾傷一月胎者當預服此方

細辛 一 兩 防風 二 兩 乾地黄 二 兩 白朮 各 三 兩 生薑 四 兩 吳茱

萸 各 五 升 大麥冬 各 五 升 烏豆 一 升

右呶咀以水七升煮取二升半分三服先食服寒多
者倍細辛茱萸熱多者去之加稻萋根二兩若有所
思去大麥加栝子仁三合一方有人參一兩忌生菜

欽定四庫全書

普濟方

燕薨桃李雀肉等物

艾葉湯 一 名 雞 艾 湯 出 千 金 方 治妊娠二月名始藁無食辛燥

居必靜處萬事勿勞百節皆通是為胎始結 妊娠

二月足少陽脈養不可針灸其經足少陽內屬於膽

主精二月之時兒精成於胞裏當慎護驚動也妊娠

二月始陰陽踞經有寒多慄不成有熱即萎悴中風

寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所下乍

寒乍熱



艾葉	丹參	當歸	麻黃	各二兩	人參	阿膠	各三兩
甘草	生薑	大棗	十二枚				
右呶咀以酒三升水一斗煮減半去滓內膠煎取三升分三服一方用鷓鴣雞半隻宿肥者治如食法割頭去血內三升酒中相和次以水一斗二升先煮取汁去雞肉內藥煎取三升內血酒并膠煎取三升分三服忌海藻菘菜							
黃連湯	出千方	若曾傷二月胎者當預服此					
欽定四庫全書	普濟方						
黃連	人參	各一兩	吳茱萸	生地黄	各五兩	阿膠	一兩
右呶咀以酢漿七升生薑三兩煮取三升分四服日三夜一每十日一修合若頗覺不安加烏梅一升煮不用直用水一方用當歸五錢忌諸冷水蕪荑							
雄雞湯	出千方	治妊娠三月名始胎當此之時未有定儀見物而化欲生男者操弓矢欲女者弄珠璣欲子美玩璧玉欲子賢宜端坐清虛是為外動內感者也					
妊娠三月手心主脈養不可針灸其經手心主內屬							



於心無悲哀思慮驚動 妊娠三月為定形寒大便 青熱小便難不赤即黃卒嗔恐憂思嗔怒喜頓什動 於經脈腹繞臍苦痛或腰背若有所下	雄雞 <small>一隻治 如食法</small> 黃芩 白朮 生薑 <small>各一 兩</small> 麥門冬 <small>五 合</small>	芍藥 <small>四 兩</small> 大棗 <small>十二 枚</small> 甘草 人參 茯苓 阿膠 <small>各 二兩</small>	右呶咀以水一斗五升煮雞減半出雞內藥煮半內 清酒三升并膠煎取三升分三服一日令盡當溫卧	欽定四庫全書 普濟方	一方用當歸芎藭各二兩不用黃芩生薑忌海藻菘 菜鮮物桃李雀肉等	茯苓湯 <small>出千 金方</small> 若曾傷三月胎者當預服此	茯苓 丹參 龍骨 <small>各一 兩</small> 阿膠 當歸 甘草	人參 <small>各二 兩</small> 大棗 <small>十二 枚</small> 赤小豆 <small>二十 一粒</small>	右呶咀酢漿一斗煮取三升分四服先食服七日後 服一劑腰痛者加桑寄生二兩一方有薤白二兩麻 子一升忌同前一方用水煎服
---	---	--	--	---------------	----------------------------------	--	---	--	--



<p>白木 柴胡<small>兩各三</small> 續斷 芎藭 甘草<small>兩各一</small> 當歸</p>		<p>白芍藥 生薑<small>兩各四</small> 厚朴 生李根白皮 枳實</p>		<p>調中湯<small>出千金方</small> 若曾傷四月胎者預服此</p>		<p>方用烏雌鷄一隻煮水煎藥忌羊肉海藻菘菜錫等</p>		<p>三升分三服溫卧當汗以粉撲之護風寒四五日一</p>		<p>右呔咀以水八升煮減半內清酒三升并阿膠煎取</p>		<p>當歸<small>兩各二</small> 麻黃<small>去節</small> 阿膠<small>兩各三</small> 半夏<small>兩四</small> 生薑<small>兩五</small></p>		<p>欽定四庫全書 普濟方</p>		<p>菊花<small>雞子大一枚</small> 麥門冬<small>升一</small> 大棗<small>枚十二</small> 人參<small>五錢</small> 甘草</p>		<p>不得安卒有所下</p>		<p>熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上追胸心煩</p>		<p>小便苦數如淋狀臍下苦急卒中風寒脛項強痛寒</p>		<p>飲食妊娠四月寒心下愠愠欲嘔胸膈滿不欲有熱</p>		<p>輸三焦四月之時而六腑順成當靜形體和心志節</p>		<p>絡妊娠四月手少陽脈養不可針灸其經手少陽內</p>		<p>脈食宜稻粳羹魚雁節飲食養血氣通耳目而行經</p>		<p>治妊娠四月受水精以成血</p>		<p>菊花湯<small>一名麻黃雌雞湯出聖惠方</small></p>	
--	--	---	--	--	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	----------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------	--	--------------------------------------	--



<p>二 烏藥 一 升</p>	<p>右呔咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一八日 之後復一劑一方有半夏二兩忌海藻菘菜桃李雀 肉</p>	<p>阿膠湯 <small>一名旋復丸</small> <small>湯出千金方</small> 治妊娠五月始受火精以成其 氣卧必晏起沐浴換衣深其居處厚其衣服朝吸天 光以避天寒時殃其食稻麥其羹牛羊和以茱萸 調以五味是為氣養以定五臟 又云妊娠五月是</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>太陰脈養不可針灸其經足太陰內輸於脾五月之 時兒四肢皆成無令大飢無甚飽無食乾燥無自灸 熱無大勞倦 妊娠五月毛髮初生有熱苦頭眩心 亂嘔吐有寒苦腹滿小便數卒有恐怖疼痛寒熱胎 動無常處腹痛悶煩欲卧若有所下</p>	<p>旋復花 <small>二合</small> 人參 <small>一兩</small> 生薑 <small>二錢</small> 當歸 芍藥 甘草 黃芩 <small>各二兩</small> 吳茱萸 <small>七合</small> 阿膠 <small>四兩</small> 麥門冬 <small>一升</small></p>	<p>右呔咀以水九升煮藥減半內清酒三升并膠微火</p>
-----------------------------	--	---	------------------------------------	---	---	-----------------------------



煎取三升半分四服日三夜一先食服便愈不瘥再服一方用烏雞一隻割取咽血內酒中以水煮雞藥減半內酒并膠煎取三升半分四服忌海藻菘菜	
安中湯	<small>出千金方</small> 曾傷五月胎者預服此
黃芩	<small>一兩</small> 當歸 芎藭 乾地黄 人參 <small>各二兩</small> 甘草
芍藥	<small>各二兩</small> 生薑 <small>六兩</small> 麥門冬 <small>一升</small> 五味子 大麻黃 <small>各五兩</small>
升	大棗 <small>十二枚</small>
右咬咀以水七升清酒五升煮取三升分四服日三	
欽定四庫全書 普濟方	
夜一七日期服一劑忌如前	
麥門冬湯	<small>一名人參雌雞湯出千金方</small> 治妊娠六月始受金精以
成其筋身欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬及視走馬宜食鷲鳥猛獸之肉是謂變腠理鈕經以養其力以堅背脊 妊娠六月足陽明脈養不可針灸其筋足陽明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美無太飽 妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫驚怖忽有所下腹	



痛如欲產手足煩疼	麥門冬 <small>升一</small> 人參 甘草 黃芩 <small>各二</small> 乾地黄 阿
右呶咀以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三	膠 <small>四</small> 生薑 <small>六</small> 棗 <small>十五</small>
升分三服每如人行三四里中間進糜粥一方用烏	
雌雞一隻煮水以煎藥忌海藻菘菜蕪荑	
柴胡湯 <small>出千</small> 若曾傷六月胎者當預服此	柴胡 <small>四</small> 茯苓 <small>一</small> 白朮 芍藥 <small>一作</small> 甘草 麥門冬
欽定四庫全書	普濟方
芎藭 <small>各二</small> 生薑 <small>六</small> 乾地黄 <small>五</small> 大棗 <small>三十</small>	
右呶咀以水一斗煮取三升分四服日三夜一中間	
進糜粥勿食生冷及堅硬之物七日更服一劑大全	
方黃芩二兩忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等	
葱白湯 <small>出千</small> 治妊娠七月始受木精以成其骨勞身	
搖肢無使定止動作屈伸以遲血氣居處必燥飲食	
避寒常食稻粳以密腠理是養骨而堅固齒 妊娠	
七月手太陰脈養不可針灸其經太陰內屬肺主皮	



右咬咀以水八升煮取三升半分四服日三夜一中	冬 <small>去心</small> 吳茱萸 <small>一升</small> 粳米 <small>五合</small> 五味子 <small>三合</small>	杏仁湯 <small>出千金方</small> 若曾傷七月胎者當預服此	杏仁 甘草 紫苑 <small>各一兩</small> 鍾乳 乾薑 <small>各三兩</small> 麥門	方忌羊肉錫海藻及菘菜等	雞一隻割咽血取血內酒中煮雞取汁以煎藥大全	黃二兩煮服如前法若秋後勿強出汗一方以黃雌	升每服一升日三夜一溫服常汗出若不出者加麻	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀以水八升煮減半內清酒三升及膠煎取四	薑 <small>八兩</small>	葱白 <small>長三四寸 十四根</small> 半夏 麥門冬 旋復花 黃芩	一人參 <small>一兩</small> 甘草 當歸 黃耆 <small>各三兩</small> 阿膠 <small>四兩</small> 生	腰背強常宜服	下手足厥冷脈如傷寒煩熱腹滿短氣常若頸項及	洗浴無寒飲 妊娠七月忽驚恐搖動腹痛足有所	毛七月之時其皮毛已成無大言無號哭無薄衣無
----------------------	--	-------------------------------------	---	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	----------------------	---------------------	--	--	--------	----------------------	----------------------	----------------------



間進食七日服一劑一方用白雞一隻煮汁黃雌雞亦可
亦可用酒二升煎藥大千方忌海藻菘菜

芍藥湯 出大金良方

治妊娠八月始受土精以成膚革和

心靜息無使氣急是謂密腠理而光澤顏色 妊娠

八月始手陽明脈養不可針灸陽明內屬於太陽主

九竅八月之時兒九竅皆成母調護尤宜謹慎無食

燥物無輒失食無忍大飢 妊娠八月中風寒有犯

觸身體盡痛乍寒乍熱胎動不安常苦頭眩痛繞臍

欽定四庫全書

普濟方

下寒時小便白如米汁或青或黃使寒燥腰背苦冷

而痛目眈眈

右呔咀以水五升清酒四升合煎取三升分三服日

二夜一一方用雌雞煮汁煎藥大千方忌海藻菘菜

桃李雀肉等

葵子湯 出千金方

若曾傷八月胎者當預服此

葵子 升二 甘草 厚朴 各二 白朮 柴胡 各三 芍藥

四生薑 兩六 大棗 枝二十



右咬咀以水九升煮取三升分三服日二夜一凡十日一劑一方用烏雌雞一隻煮水煎藥大全方忌海藻菘菜桃李雀肉等	
半夏湯	<small>出千金方</small> 治妊娠九月始受石精以成皮毛六腑
百節莫不畢脩體佚食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮致才力妊娠九月足少陰脈養不可針灸其經足少陰內屬於腎腎主續縷皆成無處濕冷灸衣	
妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心疼痛不可轉側短氣	
乾薑	<small>一兩 十二枚</small>
右咬咀以水九升煮取三升去滓白蜜八合微火上溫分四服痢即止一方雌雞一隻煮汁煎藥大全方忌血錫物等	
猪腎湯	<small>出千金方</small> 若曾傷九月胎者當預服此
猪腎	<small>一具</small> 茯苓 桑寄生 乾薑 乾地黄 芎藭
白朮	<small>各三兩</small> 附子 <small>中者一枚</small> 大豆 <small>三合</small> 麥門冬 <small>一升</small>



右咬咀以水一斗煮腎令熟去內藥煎取三升半分 四服日三夜一十日更服一劑大全方忌猪肉蕪荑 桃李雀肉酢等物一方有人參無附子大豆
丹參膏 <small>出千金方一名</small> 滑胎丹參膏 治養臨月服令滑而易產
妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故 使關節人神皆備但候時而生妊娠一月始胚二月 始膏三月始胞四月形體成五月能動六月筋骨立 七月毛髮生八月臟肺具九月穀氣入胃十月諸神備
欽定四庫全書 普濟方
日滿即產矣宜服滑胎藥入月即服此藥
丹參 <small>半</small> 芎藭 <small>半</small> 當歸 <small>各二</small> 蜀椒 <small>五合有熱以大</small> <small>勳 兩 兩 麻仁八合代</small>
右咬咀以清酒漉溫停一宿煎成膏以猪脂四升微 火煎膏色赤如血膏成新布絞去滓每日取如棗許 納酒中服之不可逆服至臨月乃可服舊有常驗
甘草散 <small>出千金方</small> 令易生母無疾病未生一月內預服過 三十日行步動作如故兒生墮地皆不覺
甘草 <small>一</small> 黃芩 <small>一</small> 乾薑 <small>一</small> 吳茱萸 <small>一</small> 大豆黃卷 <small>一</small> <small>兩 兩 兩 兩 兩</small>



右細剉和勻每服五錢以水一大盞入棗三枚煎至	兩一	生苧根 兩二 甘草 赤剉 黃芩 白芍藥 當歸 剉各	苧根飲子 出聖 治妊娠二三月胎動	去滓食先溫服如覺大便不安加烏梅一兩	右為散每服四錢以水一盞入生薑半分煎至五分	菜萸 一分湯浸七 遍焙乾微炒	黃芩 人參 去蘆 阿膠 搗碎炒黃 各一兩 當歸 五錢剉 吳	欽定四庫全書 普濟方	黃芩散 出聖 治若曾傷二月胎者當預服此	去滓食前溫服	右為末每服四錢以水一大盞入葱一兩煎至五分	枳殼 炒微黃去 穰各三兩	麥門冬 去心 大腹皮 剉各 一兩 知母 人參 去蘆 頭 黃芩	麥門冬散 出聖 治妊娠一兩月惡食手足煩悶	右搗篩酒服方寸七日三煖水服亦得	蘇子仁 桂心 大麥蘖 各三兩一 方用粳米
----------------------	----	--	------------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---	---------------	---------------------------	--------	----------------------	--------------------	---	----------------------------	-----------------	----------------------------------



五分去滓食前溫服	竹茹散 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠三四月胎動不安手足煩熱面色萎黃	色萎黃	竹茹 麥門冬 白茯苓 梔子仁 黃芩 <small>各一兩</small>	甘草 <small>五錢 炙 微赤 剉</small> 石膏 <small>二兩</small>	右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓食前溫服	柴胡 <small>去蘆頭 各一兩</small> 人參 <small>去蘆頭 各一兩</small> 甘草 <small>炙 微赤 剉</small> 紫蘇根葉 大腹	皮 陳皮 <small>湯浸去白皮 微炒 各五錢</small> 木通 <small>三分 剉</small>	右為散每服四錢以水一大盞煎至五分去滓食前溫服	赤茯苓散 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠四五月頭重耳鳴時時腹痛	赤茯苓 桑寄生 蔓荊子 <small>各一兩</small> 人參 <small>五錢 去蘆頭</small> 防	風 <small>去蘆頭 刺薊 各三分</small>	右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓食前溫服	人參散 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠四五月胎不安或有所下
----------	---	-----	--------------------------------------	--	-----------------------	--	---	------------------------	--	---	-----------------------------	----------------------	--



<p>人參<small>去蘆頭</small> 當歸<small>剉微</small> 芎藭 黃芩 艾葉<small>微</small> 桑寄</p>	<p>生 乾熟地黃<small>以上各二兩</small> 阿膠<small>二兩搗碎微炒令黃色</small> 甘草<small>微</small></p>	<p><small>赤五錢</small> 吳茱萸<small>湯浸七遍焙炒五錢</small></p>	<p>右為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓食前</p>	<p>溫服</p>	<p>乾地黃散<small>出聖惠方</small> 治曾傷五月損胎預服</p>	<p>熟地黃 甘草 麥門冬<small>去心</small> 五味子 黃芩 桑</p>	<p>寄生<small>各五錢</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右為末每服三錢以水一大盞煎入生薑半分棗三</p>	<p>枚煎至三分去滓每於食前溫服</p>	<p>桑寄生散<small>出聖惠方</small> 治妊娠五月胎不安腹內疝刺痛日</p>	<p>夜不止不欲言語四肢昏沉宜服安胎</p>	<p>桑寄生 木通<small>剉</small> 赤茯苓 當歸<small>剉微</small> 知母<small>各一兩</small></p>	<p>甘草<small>炙微赤</small> 白芷 遠志<small>去心</small> 陳橘皮<small>湯浸去白皮焙各五錢</small> 熟</p>	<p>乾地黃<small>二兩</small></p>	<p>右為散每服四錢以水一盞煎至五分去滓不拘時</p>
---	---	--	-----------------------------	-----------	--	---	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	----------------------	---	------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------



溫服	敗蒲散 <small>出聖 患方</small> 治妊娠五六月或患腹內疴痛兼有惡血下日夜不止	敗蒲 白朮 訶梨勒皮 <small>煨去</small> 枳殼 <small>麸炒微黃去穰</small> 當歸 <small>剉微炒</small>	厚朴 <small>去麤皮塗生薑汁炙</small> 阿膠 <small>二兩搗碎炒令黃燥</small> 白芷	赤芍藥 艾葉 <small>微炒各五錢</small>	右為散每服四錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不拘時候溫服	欽定四庫全書 普濟方	桑寄生飲子 <small>出聖 患方</small> 治妊娠五六月患心腹脹滿口乾腹中疴刺疼痛不止	桑寄生 木通 生乾地黄 訶梨勒皮 白朮	赤茯苓 當歸 <small>剉微炒</small>	右細剉和勻每服五錢以水一大盞入葱白七寸豉五十粒煎至五分去滓不拘時候溫服	柴胡散 治曾傷六月胎者預服此	柴胡 紫苑 <small>即紫葳</small> 白朮 麥門冬 <small>去心</small> 熟乾地黄
----	--	---	--	-----------------------------	-------------------------------	------------	--	---------------------	---------------------------	-------------------------------------	----------------	--



芍藥	肉蓯蓉	酒浸一宿刮去麤皮炙令乾各一兩	甘草	五錢炙微赤
右為散每服四錢以水一大盞入棗三枚煎至五分去滓於食前溫服				
茯苓散	治妊娠六七月忽覺四肢煩疼心悶口乾頭痛			
茯苓	黃芩	麥門冬	石膏	梔子仁
草	秦艽	去苗各五錢	去心	各一兩
右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓入竹瀝				
欽定四庫全書				
普濟方				
半合更煎三兩沸不拘時放溫服之				
紫苑飲子	出聖惠方	治妊娠六七月傷寒咳嗽氣急		
紫苑	洗去毛土	桑根白皮	乾棗	燈心
一兩		各五錢	七枚	二十寸
陳橘皮	焙			生薑
右細剉和勻以水三大盞煎至一盞半去滓食後分為四服日三服夜一服				
葱白雌雞丸	出聖惠方	治妊娠七月忽驚恐動搖腹痛卒有所下足厥冷苦傷寒煩熱腹滿短氣常若頸項及		



腰背強悉主之	葱白 <small>十四根</small> 半夏 <small>湯浸七</small> 黃芪 黃芩 人參 <small>去蘆</small>	一兩 生薑 阿膠 <small>搗碎炒令</small> 甘草 <small>炙微</small> 旋覆花 <small>各五錢</small>	右細剉先取黃雌雞一隻治如食法以水一斗煮雞	取汁五升去雞下藥煎至三升入酒二升更煎四升	去滓每於食前溫服一小盞	半夏飲子 <small>出聖</small> 治妊娠七八月或因驚恐或是傷寒	煩熱肚腹滿脹氣促腫重	欽定四庫全書	普濟方	半夏 <small>湯浸七</small> 黃芪 人參 <small>炙微</small> 麥門冬 黃芩	甘草 <small>各五錢</small>	右細剉和勻每服五錢水一大盞入生薑半分葱白	七寸煎至五分去滓不拘時候溫服	當歸散 <small>出聖</small> 治妊娠八九月因悞損胎不安腹內疴	痛下血不止胎死活未知但妊娠腹內疴痛或漏胎	胞	當歸 <small>剉微</small> 芎藭 桑寄生 艾葉 <small>微</small> 阿膠 <small>二兩</small>
--------	--	--	----------------------	----------------------	-------------	---------------------------------------	------------	--------	-----	--	-----------------------	----------------------	----------------	---------------------------------------	----------------------	---	--



養胎	地黃芩薊丸 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠氣血虛弱令胎不長和氣	右為散每服食前以煖酒調下二錢入月不時取服	白茯苓 吳茱萸 <small>湯浸七遍焙乾 微炒各五錢</small>	甘草 黑豆 <small>熟炒</small> 糯米 大麻子 <small>各一兩</small> 乾薑 <small>炮製</small>	甘草湯 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠十月滿足入月預服	拘時候溫服	右為散每服三錢酒水各半中盞煎至六分去滓不	欽定四庫全書 普濟方	茸 <small>去毛塗酥 炙令黃</small> 熟地黃 厚朴 <small>去麤皮塗生薑汁炙 令黃香熟各二兩</small>	寄生 <small>各五錢</small> 地龍 <small>一分</small> 艾葉 <small>三分</small> 鍾乳粉 芎藭 鹿	赤石脂 白朮 當歸 <small>剉微炒</small> 乾薑 <small>炮製</small> 蘆根 桑	疔刺疼痛	赤石脂散 <small>出聖 惠方</small> 治妊娠八九月胎動時有所下腹內	一合更煎三兩沸不拘時候放溫服之	右為散每服四錢以水一大盞煎至五分去滓入酒	搗碎炒 令黃燥
----	--	----------------------	--	---	--	-------	----------------------	---------------	--	---	--	------	--	-----------------	----------------------	------------



<p>熟乾地黄 厚朴<small>去麤皮生薑汁灸各一兩</small> 芎藭 當歸<small>焙切龍</small></p> <p>骨 阿膠 白石脂<small>各三分</small> 白茯苓<small>去黑皮</small> 柴胡<small>炒刺</small></p> <p>薊 桑寄生<small>焙乾</small> 黃芪<small>剉各五錢</small> 甘草<small>炙剉一分</small> 人參<small>三分</small></p> <p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸不拘時候溫服粥飲下日三服</p> <p>人參丸<small>出聖惠方</small> 治妊娠胎不長宜服養胎</p> <p>人參 白茯苓<small>去黑皮</small> 當歸<small>切焙</small> 柴胡<small>去苗各一兩</small> 枳殼<small>三分</small></p> <p>厚朴 刺薊 桑寄生<small>各一兩</small> 甘草<small>五錢</small></p> <p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸不拘時候食前溫水吞下一方加阿膠一兩</p> <p>熟地黄湯 治妊娠胎萎燥羸瘦不長</p> <p>熟乾地黄<small>焙</small> 甘草<small>剉灸</small> 白朮 白茯苓<small>去黑皮各三分</small> 阿膠</p> <p>炙木香<small>各一兩</small> 細辛<small>去苗葉</small> 人參 防風 白芷<small>各五錢</small></p> <p>右咬咀每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服日三服</p> <p>蒸大黃<small>出千金方</small> 治妊娠養胎令易產</p>



<p>大黃 <small>三十銖</small> 蒸枳實 芎藭 白朮 杏仁 <small>各十銖</small> 芍藥</p> <p>乾薑 厚朴 <small>各十銖</small> 吳茱萸 <small>一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心酒下二丸 日二不知稍加之</p>	<p>黃芪湯 <small>出聖惠方</small> 治妊娠胎不長安胎和氣思飲食利四肢</p>	<p>黃芪 <small>剉</small> 白朮 人參 麥門冬 <small>去心焙</small> 芎藭 甘草</p> <p>草 <small>灸剉各五錢</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白皮焙</small> 前胡 <small>去蘆各三分</small> 白茯苓 <small>去黑</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p>皮一分</p> <p>右咬咀每服三錢以水一盞入生薑三片棗三枚同煎至六分去滓食前溫服</p>	<p>白朮湯 治妊娠胎萎漸覺羸劣面色黃黑腹臍虛冷</p> <p>白朮 <small>炒二兩</small> 芎藭 芍藥 厚朴 <small>去麤皮生薑汁炙</small> 當歸 <small>切焙</small></p>	<p>人參 甘草 <small>剉</small> 阿梨勒 <small>泡去核各五錢</small></p> <p>右咬咀每服三錢以水一盞入生薑一分煎至七分去滓溫服日三</p>
---	--	---	---	--	--	---



乾地黃湯 治妊娠氣血虛冷不足胎不長	熟地黃 <small>焙</small> 阿膠 <small>炒米</small> 芎藭 當歸 <small>各二兩</small> 赤芍藥 甘
草 <small>灸</small> 人參 <small>各五錢</small>	右呶咀每服三錢以水一盞入粳米少許同煎至七分去滓溫服日三服
白朮散 治妊娠胎不長養	白朮 <small>三兩</small> 芎藭 芍藥 人參 阿膠 <small>灸令燥各一兩</small> 甘草
欽定四庫全書 普濟方	右為末每服三錢以葱粥飲調下日三服一方如腹痛加芍藥心下毒氣痛倍加芎藭吐唾不能飲食加細辛一兩半大棗二十枚煎服之更以醋漿水服之若嘔亦以醋漿水服
白朮當歸湯 治妊娠胎萎燥胎漏腹痛不可忍	白朮 當歸 <small>焙切</small> 芎藭 人參 阿膠 <small>灸燥各二兩</small> 艾葉
一 <small>焙乾</small> 兩	右呶咀每服五錢以水一盞酒半盞入棗三枚拍碎



同煎至一盞去滓分二服空心一服午食前一服	橘皮湯 治妊娠虛冷胎萎燥不長	陳橘皮 <small>湯浸去白皮焙</small> 厚朴 <small>去麤皮薑汁炙各三分</small> 當歸 <small>切</small> 人參	阿膠 <small>炙燥各五錢</small> 白朮 <small>二兩</small>	右呶咀每服三錢以水一盞入生薑切一分棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服	熟乾地黄 治妊娠胎萎燥過時未產滋氣血益胞臟	熟乾地黄 <small>炒</small> 當歸 <small>切</small> 熟艾 <small>炒</small> 芎藭 <small>各一兩</small> 阿膠 <small>炙燥</small>	欽定四庫全書 普濟方	甘草 <small>炙剉焙各五錢</small>	右呶咀每服三錢以水一盞煎至七分去滓溫服	艾葉湯 治妊娠胎中虛冷致胎燥萎不長	艾葉 <small>炒</small> 芎藭 當歸 <small>炙剉</small> 乾薑 <small>炮</small> 白朮 <small>各一兩</small>	右呶咀每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服	三一方有甘草無乾薑	桑寄生湯 治妊娠胎萎燥不動心中急痛	桑寄生 <small>剉</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 萎蕤 <small>各一兩</small> 白朮 <small>二兩</small>
---------------------	----------------	--	--	---------------------------------	-----------------------	--	------------	--------------------------	---------------------	-------------------	---	---------------------	-----------	-------------------	---



右咬咀每服三錢匕以水一盞入粳米半合生薑一分切同煎至七分去滓溫服日三

當歸散 治妊娠胞中虛胎不長致令萎燥

當歸切 甘草炙 乾薑炮 芎藭各一兩 白朮二兩

右咬咀每服三錢匕以水一盞入大棗三枚擘破同煎至七分去滓空心溫服

白朮散 調補衝任扶養胎氣治妊娠宿有風冷胎痿

不長或失于將理動傷胎氣以致損墮懷孕長服壯

欽定四庫全書

普濟方

氣益血護胎臟

白朮 川芎各四兩 川椒炒出汗三分 牡蠣煨二分

右為末酒調一錢日三夜一如苦痛加芍藥心下毒痛倍加川芎吐唾不能飲食加細辛半夏各一兩大棗二十枚服之腹有漿水服之若嘔亦以醋漿水服之復不解者小麥汁服之以後其人若渴者大麥粥服之病雖愈盡服之勿置忌雀肉桃李

當歸飲 治妊娠胎萎燥



當歸 <small>切焙</small> 一兩 芎藭 阿膠 <small>灸剉各</small> 三分 白朮 <small>半</small> 兩	右為麤末每服三錢匕以水一盞煎至七分去滓溫服 日三	阿膠湯 治妊娠胎痿燥全不轉動 阿膠 <small>灸燥一</small> 兩半 當歸 <small>切焙</small> 一兩 甘草 白朮 <small>二</small> 兩	右麤搗篩每服三錢匕以水一盞煎至九分去滓溫服 日三	枳殼散 常服養胎益氣安和子臟治胎中一切惡疾 日三	欽定四庫全書 普濟方	見方在滑胎類	地黄丸 治婦人血衰不足經脈候滯澁至子宮不榮 妊娠多病胎不長成用熟乾地黄不拘多少切焙為 末蜜煉和丸如彈子大每服一丸空心煎當歸酒嚼 下溫酒下亦可	治婦人懷胎不長 用鯉魚長一尺去腸肚以水漬沒納鹽及棗煮令熟 取汁稍飲之當胎所腹上有汗出如牛鼻狀甚者雖
--	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	---------------	--------	---	---



有所見胎須不安者十餘日輒一服此令胎長大平安

轉女為男

夫天地者形之大也陰陽者氣之大也惟形與氣相資而立未始偏廢男女媾精萬物化生天地陰陽之形氣寓焉語七八之數者七少陽也八少陰也相感而流通女子二七天癸至男子二八天癸至則以陰陽相合而兆始故也語九十之數者九老陽也十老陰也相包而

欽定四庫全書

普濟方

踐形故陰窮於十男能圍之陽窮於九女能圍之則以陰陽相生而成終故也元氣孕毓皆始於子推之男左旋積歲三十而至己巳女右旋積二十四而至己巳為正陽陰實從之自己懷妊推之男左旋十月而生於寅女右旋十月而生於申申為三陰寅為三陽而生育之時著矣其稟賦也體有剛柔脈有強弱氣有多寡血有盛衰皆一定而不易也以至分野異域則所產有多寡之宜吉事有祥則所夢兆有各應之類是故揚豫薄壤多



女雍冀厚壤多男熊羆為男子之祥蛇虺為女子之祥是	皆理之可推也胎化之法有所謂轉女為男亦皆理之	自然如食牡雞取陽精之全於天產者帶雄黃取陽精	之全於地產者操弓矢持斧斤取剛物之見於人事	者氣類潛通造化密移必於三月兆形之先蓋方儀則	未具陽可以勝陰變女為男理固然也 又云張華博	物志曰妊娠必謹所感感於善者生子必善感於惡者	生子必惡故不可見惡物異禽毒獸切忌食驢馬犬兔	欽定四庫全書 普濟方	龜鱉鵝鴨無鱗魚粘膩難消化諸物葱薑乳餅等屬用	醬和藿食損胎難產惟務簡靜動止有節三箇月之後	聽誦讀經典諷詠詩書靜處養心目不視惡色耳不聽	惡聲如此生子必賢明端正忠孝壽考也	方	丹參丸 <small>出千金方</small> 治婦人始覺有孕養胎并轉女為男	丹參 續斷 芍藥 白膠 白朮 栝子仁	甘草 <small>各二兩</small> 人參 芎藭 乾薑 <small>各三兩</small> 吳茱萸 橘
------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	---	--	--------------------	---



長壽忠孝仁義聰明無疾蓋須十月內常見好景象毋	凡受胎三月逐物變化故古人立胎教能令生子良善	處	此雖未試亦不可不知者一法覺三月尿雄雞糞	令待雞抱卵依此置窩下一窩盡出雄雞神效如	以斧置姙娠床下繫刃向下勿令人知恐不信者	三月間服藥方轉令生男也	始成胎血脈不流象形而變是男女未定故令於未滿	欽定四庫全書	普濟方	女子但懷娠二月名曰始藏精成為胞至於三月謂之	轉女為男者蓋陽施陰化所以有娠遇三陰所會多生	用蠶一枚以井花水服之日三服	又方	出千	金方	二十九	右為末蜜和丸如梧桐子大酒服十九日再稍加至	皮	當歸	各一	白芷	冠纓	燒灰各	乾地黄	一兩	五錢	兩	燕萸	十八	犬卵	乾一具	東門上雄雞頭	一枚
-----------------------	-----------------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	---------------	----	----	----	-----	----------------------	---	----	----	----	----	-----	-----	----	----	---	----	----	----	-----	--------	----



近邪僻真良教也如有觸忤傷胎各有治法初覺有娠	時可轉女成男	<small>出千 金方</small>
取弓努弦縛婦人腰下滿百日去之一法絳囊盛	帶左臂	
紫宮玉女秘法		
取雄雞尾尖上長毛三莖潛安婦人卧蓆下勿令	知之驗	
又法 取夫髮及手足甲潛安卧蓆下勿令人知		
欽定四庫全書		
普濟方		
妊娠纔滿三月要男法	<small>出千 金方</small>	
以雄黃半兩衣中帶之要女者以雌黃帶之一方		
絳囊盛帶之		
惡阻	<small>附論</small>	
夫妊娠阻病者謂之子病巢氏病源謂之惡阻若稟受		
怯弱有風氣或有痰飲既妊娠便有是病有其狀顏色		
如故脈息和順但覺肢體沉重頭目昏眩擇食惡聞食		
氣好食酸醎甚者或作寒熱心中憤悶嘔吐痰水胸膈		



煩滿恍惚不能支持初妊皆然但疾有輕重耳輕者不
服藥亦不妨重者須以藥療之宜服半夏茯苓丸二方
專治阻病然此二藥比來少有服者半夏有動胎之性
蓋胎初結慮其易致寒熱發作不可不謹也張仲景傷
寒論云婦人傷風續得寒熱發作有時此為熱入血室
有用黃龍湯小柴胡湯去半夏此蓋為妊婦而設也宜
以白朮散或人參丁香散人參橘皮飲子試之亦效皆
不用半夏動胎等藥服者知之 水飲倚積結聚為痰

欽定四庫全書

普濟方

人皆有之少者不能為害多者成病必且妨害飲食乃
至嘔逆妊娠之病若嘔甚者傷胎也原病之由皆謂氣
不調或風寒乘之冷入於胃故成斯病也亦惡阻之一
也 又曰婦人所食穀味化為血氣下為月水凡妊娠
之初月水乍聚一月為朞二月為胚三月為胎胎成則
男女分食於母之血焉則朞胚之時血氣未用五味不
化中氣壅塞所以脾胃不思穀味聞見於物故惡心有
所阻也其病心中憤悶頭重目眩四肢怠惰惡聞食氣



是矣 妊娠之初經隨內閉以氣養血當是之時腸胃
茹雜散入焦膈若素有痰飲輒飲與血搏食則嘔吐頭
目旋暈憎聞食氣喜啖酸醎四肢倦怠不勝支持多卧
少起厭厭懶墮名曰惡阻已產之後胞外餘血敗瘀流
利名曰惡露蓋惡者不善不淨之義阻者阻截之義血
搏痰飲伏於胞絡難除也當漸消之內裹於胞臟隨胎
而至不可遲也當亟逐之故胎前惡阻病者心中憤悶
頭重脹眩四肢沉重懈惰不欲執作惡聞食氣欲噉酸

欽定四庫全書

普濟方

醎多睡少起世云惡食是也乃至滿三月四月日已上
大劇者不能勝舉也此由婦人本體虛羸血氣不足骨
力又弱兼當風受冷太過心下有痰水挾之而有妊娠
既已痰水漬於臟氣不宣故心煩憤氣逆則嘔吐血既
不通經絡痞澁則四肢沉重被風則頭眩故有胎而病
惡阻也所謂欲有胎者其人月水尚未來而顏色皮肉
如常但加沉重憤悶不欲飲食不知患所在脈理順緒
四時平和即是欲有胎也



方

半夏茯苓湯

出千
金方

治妊娠阻病心中憤悶空煩吐逆

惡聞食氣頭眩體重四肢百節疼痛沉重多卧少起

惡寒汗出漸極黃瘦

半夏

生薑

各三
十銖

乾地黄

茯苓

各三
十銖

橘皮

旋

復花

細辛

人參

芍藥

芎藭

桔梗

甘

草

各十
二銖

右咬咀以水一斗煮取三升分三服若病阻積月日

欽定四庫全書

普濟方

不得治及藥服冷熱失候病變客熱煩渴口生瘡者

去橘皮細辛加前胡知母各十二銖若變冷下痢者

去乾地黄入桂心十二銖若食少胃中虛生熱大便

閉塞小便少者加大黃十八銖黃芩六銖餘依方服

一劑得下後消息者氣力冷熱增減方調定更服一

劑湯便急服茯苓湯丸令能食有力便強健也忌生

冷酸滑油膩菘菜海藻一方加棗二枚名半夏湯衛

生寶鑑無細辛三因方無旋復花有紫蘓葉



右為末煉蜜和丸塗酥為劑搗令勻熟如梧桐子大	炮半夏 去濕水洗 枳實 各二兩	陳橘皮 炒白 白茯苓 去黑皮 各一兩 白朮 甘草 乾薑	湯兩劑後次服此	嘔吐悶亂顛倒四肢怠惰不自勝舉先服半夏茯苓	陳橘皮丸 治妊娠阻病心中煩悶頭眩惡聞食氣常	羊肉錫糖桃李雀肉鮓	只五味又云妊娠忌桂一方有麥門冬忌海藻菘菜	欽定四庫全書 普濟方	三十九日三服肘後方無乾薑半夏橘皮白朮葛根	右為末蜜和丸如梧桐子大米飲服二十九丸漸加至	皮各一 白朮 葛根 甘草 枳實 兩 各三	茯苓 皮去 人參 蘆桂心 熬 乾薑 炮 半夏 一方洗七 次炒黃 橘	消痰水令能食強力養胎	即效要先服半夏茯苓湯兩劑後可服此常服此藥	飲食氣便嘔吐悶煩顛倒四肢垂弱不自勝持服之	茯苓散 出千 金方 治妊娠阻病患心中煩悶頭眩重增聞
----------------------	--------------------------	--	---------	----------------------	-----------------------	-----------	----------------------	---------------	----------------------	-----------------------	----------------------------	---	------------	----------------------	----------------------	------------------------------------



每服二十九生薑湯下食前服	治妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥不效者 用此藥理血歸原則愈 <small>出大金良方</small>	人參 甘草 川芎 當歸 赤芍藥 丁香 <small>各五</small>	錢 白茯苓 白朮 陳皮 <small>各一兩</small> 苦梗 <small>炒</small> 枳殼 <small>去穢炒各</small>	分 半夏 <small>泡洗七遍切炒黃一兩</small>	右呶咀每服三錢加生薑五片棗一枚煎	麥門冬 <small>出聖惠方</small> 治妊娠心煩憤悶虛燥吐逆惡聞食氣	欽定四庫全書 普濟方	頭眩四肢沉重百節疼痛多卧少起	麥門冬 子芩 赤茯苓 <small>一兩</small> 柴胡 赤芍藥 陳	皮 人參 苦梗 桑寄生 甘草 旋復花 <small>各五</small>	錢 生地黃 <small>二兩</small>	右為麤末每服四錢水一盞薑半分煎至六分去滓	無時溫服	安胎飲 <small>出永類鈴方</small> 治懷三月四月至九月胎惡阻病心	中憤悶頭眩目昏四肢沉重懈怠不欲執作惡聞食
--------------	---	--------------------------------------	--	-------------------------------	------------------	---	------------	----------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------	------	---	----------------------



氣欲啖鹹酸多卧少起嘔逆不食或胎動不安非時
不能轉動腰腹疼痛或不時下血及妊娠一切疾病
並皆治之

甘草

茯苓

去皮

當歸

去蘆

熟地黄

酒蒸

芎藭

白朮

黃芪

去苗

白芍藥

半夏

泡洗七次切炒

阿膠

切粉炒

地榆

分

右咬咀每服三錢水一盞半生薑四片煎至八分去
滓溫服無時候如或惡食但以所思之物任意與之

欽定四庫全書

普濟方

必愈按妊娠禁忌食物雞鴨鯉魚膾兔犬驢驪山羊
肉魚鱉雉雞雀桑椹又按胎教論云令母常居靜室
多聽美言聽人講論詩書陳說禮樂耳不聽非言目
不視惡事心不起邪念能令生子敦厚福壽忠孝仁
義聰明無疾斯乃聖人所留胎教也

一方無半夏地榆有人參桑寄生一方無白朮黃耆
半夏地榆有艾葉又名膠艾湯加白茯苓

枳殼丸 治妊娠阻病心中煩悶頭眩聞食氣即嘔吐



<p>逆四肢無力不自勝舉</p>	<p>枳殼<small>麩炒微黃去穰</small> 人參<small>去蘆</small> 肉桂<small>去麩皮</small> 半夏<small>湯洗七遍去滑</small> 白朮</p>	<p>葛根<small>剉</small> 白茯苓<small>各一兩</small> 麥門冬<small>一兩五錢去心焙</small> 乾薑<small>炮</small> 甘</p>	<p>草<small>炒赤各三兩</small> 陳橘皮<small>湯浸去白皮焙一兩</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服不拘時候以生薑粥飲下三十丸</p>	<p>茯苓湯 治妊娠惡阻嘔逆惡心四肢疼痛惡聞食氣</p>	<p>怔冲煩悶多損墮宜安胎調勻血脈</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白茯苓<small>去皮</small> 旋復花<small>各二兩</small> 陳橘皮<small>一兩五錢</small> 芎藭 人參</p>	<p>桔梗<small>去蘆頭炒</small> 甘草<small>炒令赤色</small> 芍藥<small>各一兩五錢</small> 生乾地黄<small>二兩</small></p>	<p>細辛<small>去苗一兩</small></p>	<p>右麩搗篩每服三錢匕水一盞同煎至六分去滓溫服不拘時候</p>	<p>旋復半夏湯 治妊娠阻病心下憤悶嘔逆不食惡聞</p>	<p>食氣頭暈四肢百節煩悶多卧少起</p>	<p>旋復花<small>去枝</small> 芎藭 細辛 人參 甘草<small>炙以上各五錢</small></p>
------------------	--	--	---	---	------------------------------	-----------------------	--	--	---	------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	--



右 呶 咀 每 服 三 錢 水 一 盞 入 生 薑 五 片 同 煎 至 七 分	黃 一 分 <small>焙一兩</small>	桔 梗 赤 芍 藥 陳 橘 皮 <small>炒去白</small> 甘 草 <small>炙各五錢</small> 熟 乾 地	半 夏 <small>湯洗去滑</small> 生 薑 汁 製 白 茯 苓 <small>去黑皮</small> 各 三 分 細 辛 <small>去苗</small> 旋 復 花	百 節 疼 痛 多 汗 黃 瘦	半 夏 飲 治 妊 娠 惡 阻 心 中 憤 悶 聞 食 氣 即 吐 逆 四 肢	分 去 滓 溫 食 後 日 二 服	右 呶 咀 每 服 五 錢 以 水 一 盞 半 生 薑 五 片 同 煎 至 六	欽 定 四 庫 全 書 普 濟 方	人 參 甘 草 芍 藥 <small>各一兩</small> 熟 乾 地 黃 <small>微炒三兩</small>	桔 梗 <small>剉</small> 半 夏 <small>湯洗七遍去滑</small> 白 茯 苓 <small>去黑皮</small> 細 辛 <small>去苗</small> 芎 藭	頭 眩 體 重 四 肢 疼 痛 煩 熱 多 卧 少 起 惡 寒 汗 出 羸 瘦	桔 梗 湯 治 妊 娠 阻 病 心 中 憤 悶 虛 煩 吐 逆 惡 聞 食 氣	溫 服 不 拘 時 候	右 呶 咀 每 服 四 錢 水 一 盞 半 薑 五 片 煎 至 七 分 去 滓	半 夏 <small>湯泡七次</small> 赤 茯 苓 <small>去皮</small> 當 歸 <small>去蘆頭</small> 乾 生 薑 陳 皮
--	-----------------------------------	--	---	--------------------------------------	--	---	--	---	---	---	--	--	----------------------------	--	--



去滓空心食前溫服

茯苓湯 治憂怒并氣攻血溢停留胃脘惡聞血腥嘔

吐食飲不下妊娠中脘宿冷冷血侵皮惡聞食氣病

名惡阻

半夏 一兩湯洗七遍 茯苓 熟地黄 各二兩 橘皮 細辛

人參 芍藥 川芎 各一兩二錢

右剉散每服四錢水二盞薑七片煎至七分去滓空

腹服有客熱煩渴口瘡者去橘皮細辛加前胡知母

欽定四庫全書

普濟方

腹冷下痢者去地黄入桂心炒胃中虛熱大便秘小

便澁去地黄加大黃一兩八錢黃芩六錢

人參散 治妊娠一兩月惡聞食氣手足悶煩

人參 去蘆頭 知母 枳殼 麸炒微黃去穰各三分 陳橘皮 一兩湯浸

去白 甘草 炙微赤剉 麥門冬 去心 黃芩 大腹皮 剉以上各五錢

右為末每服三錢以水一中盞入生薑一分煎至六

分去滓不拘時候溫服

白朮散 治妊娠阻病心中憤悶頭昏目眩四肢沉重



<p>惡聞食氣好喫酸鹹菓食多卧少起三月四月皆多 嘔逆百節酸痛不得自舉</p>	<p>白朮 厚朴 <small>去麤皮塗生薑汁炙各一兩</small> 白茯苓 <small>一兩</small> 葛根 <small>五錢</small></p>	<p>甘草 <small>五錢</small> 麥門冬 人參 陳橘皮 <small>各一兩</small></p> <p>右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不拘時候溫服</p>	<p>厚朴丸 治妊娠阻病頭疼胸煩悶徃徃氣脹不飲食</p> <p>厚朴 <small>去麤皮塗生薑汁炙赤令香</small> 白朮 陳橘皮 <small>湯浸去白瓢焙</small> 前胡</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p> <p><small>去蘆各一兩</small> 赤茯苓 <small>一兩</small> 麥門冬 <small>去心</small> 人參 半夏 <small>湯洗七遍</small></p> <p><small>去滑各三分</small></p>	<p>右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服以生薑粥飲下二十丸不拘時服</p>	<p>陳橘皮丸 治妊娠阻病心胸氣滿腹脹脇疔痛腰重</p> <p>陳橘皮 <small>湯浸去白瓢焙</small> 當歸 <small>剉微炒</small> 乾薑 <small>炮裂</small> 艾葉 <small>微炒</small></p>	<p><small>錢</small> 赤芍藥 <small>五錢</small> 芎藭 <small>三分</small> 甘草 <small>赤剉</small> 吳茱萸 <small>湯浸七遍焙乾微炒</small></p>	<p>各一分</p>
---	--	--	---	---	---	---	---	------------



右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大不拘時
候以粥飲下二十九

人參橘皮湯 治阻病嘔吐痰水妊娠三月以來惡阻

逆或初妊娠擇食頭痛寒熱間作四肢不和心虛者

服之一名八味淡竹茹湯

人參去蘆 陳橘紅 白朮 麥門冬去心各一兩 甘草三錢

厚朴 白茯苓去皮各五錢用赤茯苓亦可

右為麤末每服四錢水一盞半淡竹茹一塊彈子大

欽定四庫全書

普濟方

生薑三片煎至七分去滓澄清溫服空心食前一方

無茯苓門冬一名甘草橘皮湯

柴胡散 治妊娠心煩頭目昏重心胸煩悶不思飲食

或嘔吐

柴胡一兩五錢 赤茯苓 麥門冬各一兩 枇杷葉去毛 人參

橘紅 甘草各五錢

右咬咀每服四錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫服

柴胡飲出聖惠方 治妊娠阻病頭疼四肢羸弱不思飲食



唯思睡眠	柴胡 <small>去苗</small> 赤芍藥 麥門冬 <small>去心</small> 人參 黃耆 <small>對微炒</small>
甘草 <small>炙各五錢</small> 生地黄 <small>一兩五錢研絞取汁</small>	右為麤末每服三錢以水一盞入地黄汁一分同煎
六分去滓溫服日再服一方無生地黄用生薑煎服	人參飲 <small>出大全良方</small> 治妊娠阻病心中煩悶嘔噦吐逆惡
聞食氣頭眩重四肢百節疼痛嗜卧汗出面色極黃	人參 麥門冬 <small>去心</small> 白茯苓 <small>去黑皮</small> 生薑 <small>各三兩</small> 陳橘皮
欽定四庫全書	普濟方
湯浸去白焙 甘草 <small>一兩</small> 大棗 <small>五枚</small>	右剉如麻豆大分為二劑每劑以水五盞煎取二盞
去滓食前分三服如人行三五里再服一方凡妊娠	惡食者以所思食任意食之必愈忌菘菜醋等物
桑寄生飲 <small>出聖惠方</small> 治妊娠惡阻頭旋嘔吐腰腹疴痛胎	動不安
桑寄生 阿膠 <small>炒</small> 柴胡 <small>各一兩</small> 郁李仁 <small>去皮炒</small> 麥門	冬 <small>去心</small> 人參 刺薊 <small>各一兩</small>



犀角屑 錢五		麥門冬 兩各二	苧根 兩各二	黃芩 兩各一	茯神 兩各一	甘草 分灸一	氣頭眩四肢沉重百節疼痛多卧少起	犀角散 出聖 惠方	治妊娠心煩憤悶虛燥吐逆惡聞米穀	溫服無時或為末調服亦可	右咬咀每服三錢水一盞半薑五片煎至七分去滓	各五錢	人參 分各一	甘草 分各一	白朮	香附子	烏藥	橘紅	香煎服	切勿作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加薑丁	聞食氣或但是一物或大吐或時吐清水此名惡阻	者脈滑大六部俱勻乃是孕婦之脈也精神如故惡	保生湯 出大全 良方	治婦人經候不行身無病而似有病	胎動不安無柴胡用生薑煎服	時候一方治妊娠阻病氣攻肩背兩脇肋腰臍下痛	右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘
-----------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	-----	-----------	-----------	----	-----	----	----	-----	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	----------------	--------------	----------------------	----------------------



右咬咀每服四錢水一盞生地黃一分淡竹葉二七片煎至六分去滓溫服

參朮飲 出便產須知 專治阻病

橘紅 四錢去白 藿香葉 三錢 浙朮 一人 參 五錢 丁香 二錢五分去花

右為末每服二錢水一盞生薑五片煎至七分去滓

溫服惡心加乾薑胃膈悶加枳實又云千金半夏茯苓湯內有半夏妊娠不可服宜服此藥甚妙

人參飲 治妊娠阻病心中憤悶頭目眩四肢沉重懈

欽定四庫全書 普濟方

急惡聞食氣好飲酸醎菓食多卧少起三月四月皆

多嘔吐百節不能自舉者

人參 三兩 白茯苓 去黑皮 厚朴 去麤皮塗生薑汁炙七遍 白朮 各一兩半

陳橘皮 湯浸去白焙 葛根 剉各一兩

右咬咀每服四錢以水一盞生薑五片同煎至六分

去滓溫服日再服

白朮丸 治妊娠阻病頭肩背煩悶氣脹不思飲食

白朮 厚朴 去麤皮塗生薑汁炙七次 當歸 微炒 陳橘皮 湯浸去白各一兩

白朮 厚朴 去麤皮塗生薑汁炙七次 當歸 微炒 陳橘皮 湯浸去白各一兩

白朮 厚朴 去麤皮塗生薑汁炙七次 當歸 微炒 陳橘皮 湯浸去白各一兩



丸不拘時候煎淡竹茹湯下	右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服二十	刺薊 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙微赤剉五錢</small>	麥門冬 <small>去心焙</small> 柴胡 <small>去苗</small> 枳殼 <small>麸炒微黃去瓢</small> 桑寄生	弱多卧少起	麥門冬丸 <small>出聖惠方</small> 治妊娠阻病頭重不思飲食四肢羸	煎至六分去滓不拘時候溫服	右為散每服三錢以水一盞入薑半分淡竹茹一分	欽定四庫全書	甘草 <small>五錢炙</small> 人參 <small>三分去蘆</small>	橘皮 <small>湯浸去白焙</small> 白茯苓 半夏 <small>湯洗七次去滑</small> 麥門冬 <small>去心</small> 各一兩	陳橘皮散 <small>出聖惠方</small> 治妊娠二月三月惡阻病嘔不能食	食氣聞便嘔吐四肢垂不自持 <small>方見本方子煩類</small>	茯苓飲 <small>一名茯苓湯</small> 治妊娠阻病心中煩悶頭眩重憎聞	每日空心米飲下二十九丸早晨日晚各一服	右為末煉蜜搗和酥塗為劑令勻熟丸如梧桐子大	白茯苓 <small>去黑皮</small> 熟乾地黄 <small>微炒各一兩五錢</small>
-------------	----------------------	--	--	-------	---	--------------	----------------------	--------	--	--	---	-------------------------------------	---	--------------------	----------------------	--



煎至七分食前溫服如嘔逆甚者加青竹茹一彈子	右咬咀每服四錢水二盞薑十片棗一枚烏梅半箇	草 _{兩四}	半夏 _{泡洗七次炒黃} 陳皮 _{各二兩} 白茯苓 _{二兩} 礞砂仁 _{一兩} 甘	半夏茯苓湯 _{出大全良方} 治妊娠惡阻嘔吐不食	加地骨皮	一服一方無麥門冬用小麥三合體熱四肢煩熱者	右細切以水一大升煮取半升分為二服去滓食前	欽定四庫全書	普濟方	青竹茹 麥門冬 _{各三兩} 前胡 _{二兩} 橘皮 _{一兩} 蘆根 _{一握} 白嫩	療妊娠惡食心中煩悶憤熱嘔吐 _{出大全方}	右切以水六升煮取三升分三服不拘時候	人參 _{兩四} 厚朴 生薑 枳殼 甘草 _{各二兩}	人參散 _{出大全方} 療初妊娠惡食嘔逆	右為細末每服二錢熱湯送下無時	人參 丁香 柿蒂 _{各一兩} 甘草 良薑 _{各五錢}	治妊娠惡阻胃寒嘔逆煩悶吐食及心腹刺痛 _{出大全良方}
----------------------	----------------------	-----------------	--	----------------------------------	------	----------------------	----------------------	--------	-----	--	-------------------------------	-------------------	---	------------------------------	----------------	--	-------------------------------------



大同熬空心進

療婦人妊娠惡阻嘔吐不下飲食

出大金良方

青竹茹 橘皮 生薑 茯苓 半夏

各四兩 五兩

右細切以水六升煮取二升半去滓分三服不瘥頻

服忌羊肉酢飴等物

加味二陳湯

出危氏方

治受胎一月或兩月嘔吐擇食緣

中脘宿有痰飲經水止煖氣滯所作名曰惡阻

陳皮 白茯苓 半夏 白朮 粉草

各一兩 五錢 一兩 七錢 三分 三錢

欽定四庫全書

普濟方

右剉散每服四錢生薑三片烏梅一箇煎服未效加

生薑汁

小紫蘇飲

出危氏方

紫蘇 厚朴 白茯苓 半夏 甘草

各一兩 五錢 一兩 各三兩

右剉散每服三錢水一盞生薑五棗棗二枚煎溫服

客熱煩渴口生瘡者加知母前胡腹冷下痢加桂心

炒胃中虛熱大小便秘加黃芩頭疼加細辛川芎

麥門冬湯 治妊娠惡阻病心中憤悶見食嘔吐惡聞



麥門冬飲 <small>出聖 息方</small> 治妊娠阻病胎不安寒熱嘔逆氣滿	分去滓溫服不拘時日二服一方加人參	右為麤末每服二錢水一盞生薑一分切同煎至六	皮塗生薑汁炙煙 出七次各五錢	前胡 <small>去蘆 頭</small> 細辛 <small>去苗 葉</small> 白茯苓 <small>去黑 皮</small> 甘草 <small>炙</small> 厚朴 <small>去 麤</small>	前胡飲 治初妊惡阻食即吐逆頭痛顛倒寒熱	去滓溫服食後日二服	右咬咀每服三錢以水一盞生薑半分切煎至七分	欽定四庫全書 普濟方	并皮子 用剉碎	人參 知母 <small>焙</small> 枳殼 <small>麸炒去 瓢令黃</small> 黃芩 <small>去黑皮</small> 大腹 <small>一 枚</small>	人參湯 治妊娠一兩月惡食心胸煩亂	枚煎至六分去滓食前溫服	右麤搗篩每服三錢以水一盞入薑一分拍破棗二	食氣肢節煩疼身體沉重多卧黃瘦
--	------------------	----------------------	-------------------	---	---------------------	-----------	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-------------	----------------------	----------------



不思飲食	麥門冬 <small>去心</small> 人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 阿膠 <small>炙令燥</small> 甘草
灸剉三分	
右為麤末每服三錢匕以水一盞入生薑一分拍碎棗	
二枚同煎至六分去滓食後溫服日二服一方加陳皮	
薑橘湯 治妊娠惡阻嘔吐涎痰不能食	
生薑母 <small>一兩一分</small> 陳橘皮 <small>去白焙</small> 青竹茹 <small>各五錢</small> 前胡 <small>去苗三分</small>	
檳榔 <small>剉二枚</small>	
欽定四庫全書 普濟方	
右剉如麻苳每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服	
不拘時候	
茯苓丸 <small>出肘後方</small> 療妊娠惡阻吐顛倒垂死不自勝持服	
之即效	
茯苓 人參 <small>各三兩</small> 肉桂 <small>熬</small> 甘草 <small>炙</small> 枳殼 <small>炙各五錢</small>	
右搗篩蜜和丸每服二十九加至三十九日三服古	
今療胎病方有數十首不問虛冷熱胎死者活此方	
緣妊娠忌桂所以熬	



白朮散 <small>出十便良方</small> 治惡阻吐清水甚害十餘日粥漿不入者	白朮 人參 丁香 甘草 <small>五錢 二錢 五分 一錢</small>	右為細末每服二錢水一盞薑五片煎至七分溫服	醒脾散 <small>出永類鈐方</small> 治妊娠婦阻病嘔逆不食甚者滿口中無味或作寒熱	草荳蔻 <small>以濕紙裹灰火中煨令紙乾取出皮用</small> 厚朴 乾薑 甘草 <small>製各五錢 三分</small>	草 一分 兩	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服二錢水一大鍾棗二枚生薑三片煎至八分去滓呷服病輕者尺寸脈和便能食舊有橘紅二兩治寒熱瘧痢不食後人去橘皮以乾生薑代乾薑治老人氣虛大便秘少津液引代有奇效一方用乾薑去橘皮一名醒脾飲子治阻病極為神效	四七湯 <small>出如宜方</small> 治妊娠三月惡阻為病氣鬱生痰	半夏 白茯苓 厚朴 <small>五兩 七次 四兩 三兩 薑汁製</small>	右呔咀每服四錢用水一盞半薑三片棗一枚煎至
---	---	----------------------	--	--	--------	---------------	---	---	---	----------------------



七分去滓不拘時候服	人參丁香散 <small>出大全良方</small> 治妊娠惡阻胃寒嘔逆翻胃吐食及心腹刺痛	人參 <small>五錢</small> 丁香 藿香葉 <small>各一分</small>	右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服無時	人參半夏丸 <small>出聖惠方</small> 治妊娠惡阻病醋心胸中冷腹痛吐逆不喜飲食	半夏 <small>湯泡七次</small> 人參 乾生薑 <small>各五錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末以生地黄汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服四十九丸米飲送下不拘時候	小地黄丸 <small>出保慶集方</small> 治妊娠吐清水酸心腹痛不能食	人參 乾薑 <small>炮各等分</small>	右為末用生地黄汁丸如梧桐子大每服五十九丸米湯下食前服之濟生方加製半夏等分	治妊娠忽下黃汗如出豆汁 <small>出大全方</small>	芎根 <small>切二升去黑皮</small>
-----------	---	--	----------------------	---	--	------------	----------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------



人參調中湯 <small>出楊氏家藏方</small> 調脾肺養氣治胸膈滿煩悶四	熱服不拘時	右叟咀每服三錢水一盞半生薑三片煎一盞去滓	花 甘草 <small>炙二味各五錢</small>	一兩 白朮 川芎 人參 <small>去蘆</small> 赤芍藥 <small>各三分</small> 旋復	赤茯苓散 <small>出楊氏家藏方</small> 治妊娠惡阻心胸煩悶頭暈惡心	四肢昏倦嘔吐痰水惡聞食氣	赤茯苓 <small>去皮</small> 半夏 <small>湯浸七遍</small> 陳橘皮 <small>去白</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 乾熟地黃	欽定四庫全書 普濟方	分去滓溫服	右叟咀每服四錢水一盞姜七片竹茹少許煎至七分去滓溫服	灸各五錢	赤茯苓 橘皮 <small>去白</small> 麥門冬 <small>去心</small> 白朮 厚朴 <small>姜製</small> 甘草	人參半夏丸 <small>出聖惠方</small>	治阻病 <small>出存仁方</small> 用香附子末熟湯調服	煎藥取一升分作二服	右為末以水九升煎取四升每服入酒二升或一升
--	-------	----------------------	----------------------------	---	---	--------------	--	---------------	-------	---------------------------	------	---	---------------------------	--------------------------------------	-----------	----------------------



肢煩熱及妊娠阻病心胸煩悶嘔逆不思飲食	人參 <small>去蘆</small> 甘草 <small>炙各五錢</small> 枳殼 <small>麸炒去瓢</small> 厚朴 <small>薑汁製</small> 白朮 <small>白</small>	茯苓 <small>去白皮一兩</small> 柴胡 <small>去苗細辛去葉土</small> 藿香葉 <small>去土</small> 陳橘皮 <small>去白皮各三分</small>	右叻咀每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓食前溫服	李氏傳快氣湯 <small>出產經</small> 自初妊娠後惡阻便可服此寬	中快氣益陽輔陰入月滑胎易產	欽定四庫全書 普濟方	枳殼 <small>兩五</small> 縮砂 香附子 甘草 <small>各三兩</small>	右各淨稱同炒為末湯調服	溫真人方 <small>出產經</small>	枳殼 川當歸 木香 甘草 <small>各一兩</small>	右為末湯調服	膠艾湯 <small>出指南方</small> 治妊娠惡阻	阿膠 川芎 甘草 艾葉 <small>各二兩</small> 當歸 <small>三兩</small>	右為麤末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服覺
--------------------	--	---	---------------------------	--	---------------	---------------	---	-------------	-------------------------	---------------------------------	--------	-------------------------------	---	----------------------



普濟方卷三百三十七								欽定四庫全書								冷痛加乾薑二兩
								普濟方								

