

欽定四庫全書

普濟方卷三百四十 明 周王朱橚 撰

妊娠諸疾門

熱病 附論

夫冬時嚴寒觸胃傷之藏于肌骨夏至乃發壯熱又為暑病即熱病也此寒氣蘊積發即為病若妊娠遇之多致墮胎非節之氣傷於妊婦熱毒之氣侵損胞胎遂有墜胎漏氣俱害子母之命也

欽定四庫全書

普濟方

方

催生湯 妊娠熱病六七日極熱損胎或兒死身冷不能自出須用暖胎藥用黑神散不若用催生湯

蒼朮 桔梗 橘紅 白芷 桂心 粉草 當

歸 乾姜 製朴 芍藥 半夏 川芎 枳殼

各四兩 南木香 真杏仁

右每服三錢水一盞半姜棗煎大半盞服

柴胡散 治妊娠熱病骨節煩痛頭疼壯熱若不止則



損胎	柴胡 家葛根 知母 梔子仁 甘草 <small>各半</small> 石
膏 大青 黃芩 升麻 <small>各三兩</small>	右咬咀每服四錢水一盞葱白三寸煎至六分去滓 不拘時溫服
人參散 治妊娠熱氣乘于心脾津液枯少煩躁壅熱 口舌乾渴	人參 麥門冬 赤茯苓 地骨皮 家葛根
欽定四庫全書 普濟方	黃芩 犀角屑 <small>各三兩</small> 甘草 <small>半兩</small>
右咬咀每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服	人參黃耆散 治妊娠身熱煩躁口乾食少
人參 黃耆 家葛根 秦艽 麥門冬 <small>各二兩</small> 知	母 <small>二分</small> 甘草 <small>兩半</small> 赤茯苓 <small>兩一</small>
右咬咀每服四錢水一盞姜三片淡竹葉十四片煎 至六分去滓溫服	大黃飲子 治妊娠熱病六七日熱入腹中大小便秘



澁煩熱

川大黃 石膏 知母 前胡 赤茯苓各三分 梔

子仁 甘草 黃芩各七兩

右㕮咀每服半兩水一大盞生地黃一分煎至六分

去滓無時溫服

黑神散一名烏金散 一名肉桂散 治熱病胎死腹中此病因母患熱

病至六七日以後臟腑極熱熏煮其胎是以致死緣

兒死身冷不能自出但服黑神散暖其胎須臾胎即

欽定四庫全書

普濟方

自出何以知其胎之已死但看產母舌青者是其候

也及治敗血不散乍寒乍熱

桂心 當歸 芍藥 甘草 乾姜 生乾地黃

各一兩 黑豆炒去皮 附子半兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下一方無附子用

蒲黃 夫妊娠謂之重身二命係焉將理失宜皆能

損胎或熱病熏蒸所致或因頓仆驚恐出入觸及

素有癥瘕積聚壞胎最多候其舌青即知子死養胎



論曰面青舌赤母死子生唇青吐涎子母俱斃又有 雙懷二胎或一死一活其候尤難知非臨時審視未 易預逆不可不備學也然以黑神散溫胎不若補助 產母使其氣正免致虛虛之困頓胎自下矣催生湯 殊勝黑神散
葛根散 治妊娠數月脅膈煩躁唇口乾渴四肢壯熱 少食
葛根 黃芩 人參 萎蕤 黃耆 麥門冬
欽定四庫全書 普濟方
甘草 各等分
右咬咀每服四錢水一盞竹茹一塊如錢大煎至七 分去滓溫服無時
知母散 治妊娠煩躁悶亂口乾及胎臟熱
知母 麥門冬 甘草 各半 黃芩 子芩 赤茯苓 各三分
右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓入竹瀝一 合更煎二沸溫服一方用竹茹一塊無竹瀝



人參飲子 治妊娠熱病壯熱頭痛嘔吐不止不食心 曾煩悶經云熱病與中暑相似但熱病者脉盛中暑 者脉虛
人參 竹茹 家葛根 各一兩 蘆根 二兩 麥門冬 一兩半
知母 三分
右咬咀每服四錢水一盞入連根葱白三寸煎至七 分去滓溫服
梔子仁飲子 治妊娠熱病斑出黑色小便如血氣急
欽定四庫全書 普濟方
欲絕胎欲落
梔子仁 升麻 石膏 生乾地黄 各二兩 黃芩 大青 各一兩
右咬咀每服半兩葱白七寸豉四十九粒水一盞煎 至五分去滓溫服救急有杏仁無地黃石膏一方加 青黛無大青又方以陳皮如雞子大酒煮服
治妊娠熱病六七日熱入腹大小便秘澀煩熱
右以牛糞中水調塗腹上勿令乾
縮脾飲 解伏熱除煩渴消暑毒止吐痢霍亂之後服



熱藥太多致煩躁者宜沉令水冷頓服	草薺仁 <small>兩四</small> 烏梅肉 <small>兩三</small> 甘草 <small>兩二</small>	右咬咀每服半兩水一碗生姜十片煎至八分浸以熱水溫冷任意	柴胡石膏湯 治妊娠傷暑頭痛惡寒身熱躁悶四肢疼痛項背拘急口舌乾燥	柴胡 <small>兩四</small> 甘草 <small>兩二</small> 石膏 <small>兩八</small>	右咬咀每服二錢水一盞姜五片煎至六分去滓溫	欽定四庫全書 普濟方	服若氣虛體冷加人參四兩	治妊娠熱病	葱白 <small>兩五</small> 豆豉 <small>兩一</small>	右以水六升煮取二升分二服取汗	葵子湯 療妊娠得病六七日以上身熱入臟大小便不利安胎除熱	葵子仁 <small>兩二</small> 滑石 <small>兩四</small>	右以水五升煮取一升去滓取服當下便愈
-----------------	--	----------------------------	---------------------------------	--	----------------------	---------------	-------------	-------	---	----------------	-----------------------------	--	-------------------



葱白飲 <small>出聖惠方</small> 治妊娠熱病煩躁口乾小便澁赤
治妊娠熱病方 以車轄脂酒服半匕一方用水調服半匙
又方 以青羊屎水調塗腹上勿令乾
又方 以水服伏龍肝一鷄子大亦可調為泥塗臍下
治大熱煩悶方
欽定四庫全書 普濟方
用葛根汁二升分三服如人行五里以進一服一方水煮葛根服勿用野葛根傷胎
又方 以燒大棗七枚為末酒和服
又方 <small>出千金方</small> 用槐實燒灰取方寸匕酒和服
治妊娠熱病胎死腹中下之 用烏鷄一隻去毛細剉以水三升煮取二升去鷄



<p>通手用衣帛蘸摩臍下胎自出</p>	<p>鹿角湯 治妊娠熱病胎死腹中下之</p>	<p>用鹿角屑一兩水一碗葱白五莖豆豉半合同煎</p>	<p>至六分去滓溫分二服良效一名鹿角散</p>	<p>治妊娠得病應服湯藥者</p>	<p>先搗小豆一升細篩鷄子黃和如鷺子大為二餅</p>	<p>熟炙先令噉盡食頃乃服餘藥不爾多傷胎</p>	<p>治妊娠熱病</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>用水底泥泥心下三寸立愈</p>	<p>治妊娠三四月後常時熱躁忽煩悶不識人大腑熱然</p>	<p>後喫此方</p>	<p>鈎藤 桔梗 桑寄生 麥門冬 茯苓 知母</p>	<p>防風 各等分</p>	<p>右細搗羅為末每服五錢水一碗煎取八分食後去</p>	<p>滓喫連喫一盞亦無妨但大腑熱即可連喫也</p>
---------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------	----------------------------	--------------------------	--------------	-----------------------	--------------------	------------------------------	-------------	----------------------------	---------------	-----------------------------	---------------------------

時氣
附論



夫四時之間忽有非節之氣如春應暖而反寒夏應熱而反冷秋應涼而反熱冬應寒而反暖非其節而有其氣而一氣之至無人不傷長少雖殊病皆相似者多夾應毒表也言其時普行此氣故云此時氣也妊娠遇之重者致傷胎也

方

麥門冬散 治妊娠五月至十月足患時氣五六日不得汗口乾多喫冷水熱氣上衝喘及悶亂

欽定四庫全書

普濟方

麥門冬 知母 茅根各一兩 石膏三兩 葛根 玄參

川升麻 甘草 赤芍藥 麻黃 川大黃

子芩 人參 赤茯苓 遠志各半兩

右搗粗羅為散每服四錢水一盞入淡竹茹一分生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

秦艽散 治妊婦時氣五六日不得汗口乾多喫冷水

狂語嘔逆

秦艽 柴胡各一兩 赤茯苓 前胡 甘草 犀角



分濾去滓不計時候溫服	右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分煎至六分	升麻 <small>各一兩</small> 石膏 <small>二兩</small>	遠志 甘草 麻黃 <small>各半兩</small> 麥門冬 薯蕷 葛根	鬼神喫食不得	遠志散 治姙娠時氣五六日未得汗口乾狂語亂見	去滓不計時候溫服	右搗篩為散每服四錢水一盞生薑半分煎至六分	欽定四庫全書 普濟方	麥門冬 <small>各一兩</small> 柴胡 <small>半兩</small>	麻黃 石膏 赤芍藥 甘草 葛根 黃芩	心躁頭痛四體煩疼不得安臥	麻黃散 治姙娠五月或七八月卒患時氣煩熱口乾	葛根湯皆可用之	六分去滓無時溫服一方加人參又方敗毒散升麻	右呶咀每服四錢水一盞姜半分淡竹茹一分煎至	屑 家葛根 川升麻 黃芩 <small>各半兩</small> 石膏 <small>二兩</small>
------------	-----------------------	--	---------------------------------------	--------	-----------------------	----------	----------------------	---------------	---	--------------------	--------------	-----------------------	---------	----------------------	----------------------	--



葛根飲子 治妊婦時氣煩熱口乾頭痛	家葛根 麻黃 石膏 白米 梔子仁	六七 各半 一 一 半	枚 葱白 莖	右細切以水二大盞煎至一盞三分去滓無時溫服以汗出為效	治妊娠時氣頭痛腰背強壯熱	升麻 青黛 前胡 梔子仁 黃芩 石膏	八 三 兩 各二	分 家葛根 兩	欽定四庫全書 普濟方	右呔咀以水五升煎取二升半去滓分為三服	浮萍方 治妊娠時氣大熱令子不落護胎	浮萍 川朴硝 蛤粉 藍根 大黃	各等 分 微 炒	右為末水調傅臍上安胎解煩熱極妙一名護胎救生散	十全方 治妊娠患時氣	黃芩 鬱金 白朮	各一 兩 分	右為末每服一大錢拔藍根少許水一中盞煎至七
------------------	------------------	-------------	--------	---------------------------	--------------	--------------------	----------	---------	------------	--------------------	-------------------	-----------------	----------	------------------------	------------	----------	--------	----------------------



分服一方地黄水下汗出效未得汗再服即瘥又妊婦患時疾用鷄卵墜井至泥隔宿取出吞之必無虞矣一方無白朮
消熱飲子 治妊婦時氣六七日熱甚大小便不利宜服此
川芒硝 <small>一兩</small> 葵子 <small>三兩</small>
右以水二大盞煎至一盞三分去滓不計時候分溫三服以利為效
欽定四庫全書
普濟方
治妊娠而得時病令胎不傷
右以黃芩三兩搗末取鷄子白三枚水和煮攪之吹去沫取三升去滓令分再服不解更作佳
伏龍肝方 治妊娠時氣身大熱令子不落護胎方
用伏龍肝研令極細水調塗臍下二寸乾則易差即止亦可清泔水調服或酒調服一方取井水泥塗心下三寸乾則易
竹瀝方 治妊娠時氣未能服藥且單用



右取淡竹瀝一大盞不拘時候分為三服汗出當解
治妊娠得時氣令胎不傷方

右取鷄子以絹袋盛投井中浸令極冷敲破吞之服
六七枚至佳

治妊娠六七月感時氣煩熱口乾煩躁頭痛麻黃散主
之

麻黃錢一 赤芍藥 柴胡各半 甘草三分

計二錢三分半剉作二服姜三片水一盞煎八分温

欽定四庫全書

普濟方

服

煩渴 附論

夫足太陰脾之經也其氣通于口手少陰心之經也其
氣通于舌若妊娠之人臟腑氣虛榮衛不理陰陽隔絕
熱氣乘於心脾津液枯少故令心煩而口乾也妊娠面
赤口苦舌乾心煩腹脹者何蓋緣恣情飲酒因食桃李
李羊鷄麪魚羶腥毒物至今百節酸痛大小便結澁可
歸涼節命散



方	羚羊角散 治妊娠煩躁體熱口乾肢節疼痛少思飲食
食	羚羊角屑 黃芩 麥門冬 人參 赤芍藥
	木通 <small>已上各三分</small> 柴胡 <small>一兩</small> 黃耆 甘草 <small>各半兩</small>
	右搗篩為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓不拘時候溫服
	升麻散 治妊娠煩躁熱口乾四肢疼痛喫食減少
	欽定四庫全書 普濟方
	川升麻 柴胡 <small>各一兩</small> 知母 <small>三分</small> 梔子仁 黃耆 甘
	草 黃芩 麥門冬 枳殼 <small>各半兩</small>
	右搗篩為散每服三錢水一盞入竹茹一分煎至六分去滓不計時候溫服
	赤茯苓散 治妊娠心膈氣壅滯煩躁口乾食少
	赤茯苓 黃耆 柴胡 <small>各一兩</small> 紫蘘葉 人參 陳
	橘皮 大腹皮 甘草 <small>各半兩</small> 前胡 <small>三分</small>
	右搗為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓不計



時候溫服	地骨皮散 治妊娠煩躁體熱疼痛口乾食少	地骨皮 黃芩 人參 黃耆 葳蕤 麥門冬	甘草 赤芍藥 柴胡	右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分淡竹葉二七片煎至六分去滓不計時候溫服	歸涼節命散 治妊娠恣情飲酒因食桃李果魚羊鷄麵腥膻毒物致令百節痠疼大小便結澁面赤口苦	欽定四庫全書 普濟方	舌乾心煩腹脹	川芎 苧根 白芍藥 麥門冬 當歸 白朮	各一兩 糯米 各半兩 甘草 兩半	右咬咀每服四錢水一盞半煎至一盞去滓溫服不拘時候一方有荊芥無麥門冬	黃連散 治妊娠心熱煩躁口乾舌澁多渴	黃連 瓜蒌根 地骨皮 葳蕤 犀角屑 黃芩 川升麻 甘草	各一兩 各一兩
------	--------------------	---------------------	-----------	-------------------------------------	---	------------	--------	---------------------	------------------	----------------------------------	-------------------	-----------------------------	---------



右搗篩為末每服三錢以水一盞煎至六分去滓不	右搗篩為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不計	時候溫服	時候溫服	治妊娠體熱煩躁口乾喫食減少宜服此方	人參 葛根 黃耆 秦艽 麥門冬 赤茯苓	已上各 知母 甘草	右搗篩為散每服四錢水一盞入生姜半分淡竹葉	二七片煎至六分去滓不計時候溫服	知母飲 治妊娠口乾煩渴上焦壅熱	欽定四庫全書	普濟方	草 桑白皮	赤茯苓 黃芩 黃耆 麥門冬 知母 甘草	右呶咀每服四錢水一盞半竹瀝一合同煎不計時	候服	治妊娠心熱煩躁口乾舌澁多渴	梔子仁 麥門冬 黃耆 生乾地黄 秦艽	一兩 甘草	右搗篩為末每服三錢以水一盞煎至六分去滓不
----------------------	----------------------	------	------	-------------------	---------------------	-----------	----------------------	-----------------	-----------------	--------	-----	-------	---------------------	----------------------	----	---------------	--------------------	-------	----------------------



計時候溫服	瓜蒌子散 治妊娠心煩躁熱口乾頭目不利	瓜蒌子 黃耆 枳殼 人參 甘草 石	膏 二兩 各一兩 各半兩	右搗篩為散每服三錢水一盞入竹葉二七片同煎至六分去滓不計時候溫服	治妊娠口乾煩渴上焦壅熱	黃耆 知母 地骨皮 犀角屑 嫩葛 錢 各二	欽定四庫全書 普濟方	右呶咀每服四錢水一盞半竹瀝一合同煎不計時候服之	治妊娠心熱煩躁口乾舌澁多渴	青竹茹 一兩 麥門冬 半兩 甘草 一錢	右件藥以水一大盞煎至七分去滓不計時候分溫二服	霍亂吐瀉 附論	夫陰陽清濁之氣相干亂於腸胃則為霍亂也但飲食
-------	--------------------	-------------------	--------------	---------------------------------	-------------	-----------------------	------------	-------------------------	---------------	---------------------	------------------------	---------	-----------------------



過度觸胃風冷使陰陽不和致清濁相干腸胃虛者受
之故霍亂也霍亂者先吐利心腹冷痛則吐利並發有
頭體疼痛熱而吐利者亦為霍亂所以然者挾風而有
實故也風折乾氣皮膚緻密故血氣不得宣通致令壯
熱風邪乘其經脈氣上衝頭則頭痛風氣入于腸胃則
洩利胃逆則吐逆故為吐利也吐利甚者則多煩臟腑
虛故也又手足逆冷陽氣暴竭謂之四逆也妊娠之病
吐利甚者則傷胎也

欽定四庫全書

普濟方

方

白朮散 治妊娠霍亂吐瀉過多傷冷胎藏不安

白朮 白茯苓 豆蔻 陳橘皮 厚朴 芎

藟 當歸 人參 乾姜

各三

分

各半

兩

各半

右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不拘

時溫服

人參散 治妊娠霍亂吐瀉心煩腹痛

人參 厚朴 橘紅 當歸 乾姜 甘草

各一

兩

各半

兩

各半

兩

各半



香茂葉	香茂粥	服一方有茴香一分甘草一錢茱萸半兩加紫蘇煎	右細剉水二盞煎至一盞三分去滓分三服無時熱	吳茱萸	木瓜煎	煎至六分去滓不計時候稍熱服	右細剉和勻每服一錢水一盞薤白七寸生姜半分	欽定四庫全書	蘆根飲子	溫服	右為散每服三錢用水一盞半煎至六分去滓無時	白木散	右為散每服四錢水一盞棗三箇煎至六分溫服
生薑	治妊娠霍亂吐瀉心煩多渴			生薑	治妊娠霍亂吐瀉轉筋入腹則悶絕			普濟方	治妊娠霍亂吐瀉心煩			治妊娠霍亂腹痛吐逆不止	
人參				切各一分					蘆根			白木	
各半				木瓜					二人			益智仁	
				兩切一分					兩			枳殼	
									兩			橘紅	
									兩			各三分	
									兩			草豆寇	
									兩			良	
									兩				



右件藥以水二大盞煎取一盞三分去滓研入白米
一合煮稀粥食之

丁香散 治妊娠霍亂吐瀉煩悶

丁香 人參 各半 陳橘皮 三分
兩 湯浸

右搗粗羅為散以水二大盞生姜半分棗五枚煎至
一盞二分去滓分溫三服

止渴飲 治妊娠霍亂吐瀉心悶亂作渴不止

用糯米一合淘令淨細研以水一大盞研濾取汁

欽定四庫全書

普濟方

入蜜一合生姜汁半合相和渴即頓服立止

治妊娠霍亂吐瀉轉筋不止方

用鹽三合以水三大盞煮取二盞以青布浸拭轉
筋上效

又方

右用木瓜二枚切以水五大盞煮取三盞以青布
浸搗於轉筋上即定如無木瓜煎桂枝五兩亦佳

下痢 附論



夫妊娠之人胞血既閉臟氣不理脾胃易傷或恣食腥
肥生冷脾胃停滯不能尅化冷熱相搏以致心腹攪刺
疼痛膿血赤白雜下古書所謂滯下是也原疾之由皆
因冷熱不調大腸虛冷熱客於腸間熱氣乘之則赤冷
氣乘之則白冷熱相交則赤白相雜而連滯不止名為
滯痢也其狀白膿如涕而有血雜亦有血少者如白膿
涕而有赤脉如魚腦此名魚腦痢又有血痢者乘血入
於大腸為血痢也血之隨象外行經絡內通臟腑常無

欽定四庫全書

普濟方

滯積若觸胃勞動生熱熱乘血散滲入大腸腸虛相化
故成血痢也凡有此證藥之苟緩恐致傷胎不可不慎
凡妊娠泄瀉冷熱不同水瀉青白或黃白或水穀不
化腹痛腸鳴其脉沉而緊此內傷冷也謂之洞泄寒中
若泄注如水深黃色及有完穀小便赤腹脇脹滿煩躁
喜飲時時嘔逆或下痢清水或小便不利得熱則極脉
虛大而數用乘虛熱入于胃湊滲下焦津液不分并於
大腸謂之協熱痢先以五苓散利小便次以黃連阿膠



丸或三黃熟艾湯丸泄瀉色黃而有沫腸鳴腹脹滿微痛其脉沉緊而小數胃之冷熱不調宜戊己丸和之凡暴下或青或白或水穀不化腹脇或脹或不脹或痛或不痛但觸生熟氣全不思食其脉內虛外實右關脉沉緊者謂之飧泄先去沉積宜感應丸後調和之又治瀉先須理中焦如理中湯丸是也次則分利水穀如五苓散是也治中不效然後斷下即用禹餘糧赤石脂是也

方

欽定四庫全書

普濟方

木香散 治妊娠下痢和調脾胃保護胎氣

木香 肉豆寇去殼 密陀僧煨 陳橘皮去白炒 沒藥研

龍骨各一分 訶梨勒 當歸 赤石脂 甘草 胡

椒 乾姜

右搗篩為散每服二錢米飲調下日三

訶梨勒湯 治妊娠下痢冷熱相攻赤白相雜日夜不

止

訶梨勒 蒼朮 肉豆寇 赤石脂 乾姜 阿



右為細末每服二錢以稀粥飲調下不計時候	艾葉方 治妊娠下痢	艾葉 白芷 阿膠 白朮 厚朴 黃蓮 茯苓	神 地榆皮 赤石脂 黃芩 肉豆寇	右粗搗篩每服五錢水一盞半生姜五片煎至八分去滓溫服	治婦人欲痢輒先心痛腹脹滿日夜五六十行方	欽定四庫全書 普濟方	石榴皮 麴 各八錢 黃梨 烏梅 黃連 艾 各一兩	防己 二兩 阿膠 乾姜 各三兩 附子 五兩	右為末蜜和丸如梧桐子大每服二十九日三漸加厚朴散 治妊娠臟腑氣素弱頻併下痢時時腹痛漸覺羸瘦面色萎黃不美飲食	厚朴 白朮 川芎 白芍藥 當歸 熟地黃	乾姜 人參 訶子 甘草	右咬咀每服四錢水一盞棗三枚煎至六分溫服
--------------------	-----------	----------------------	------------------	--------------------------	---------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------	--	---------------------	-------------	---------------------



赤石脂散 治妊娠腹痛下痢赤白日夜不止 赤石脂 阿膠 艾葉 白朮 陳橘皮 訶梨	時候稍熱服	右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計	芍藥 各三 分 阿膠 當歸 各一 兩	木香 地榆 黃連 艾葉 各半 兩 乾姜 白朮	木香散 治妊娠下痢赤白腰腹痛胎不安	右為細散每服三錢匕粥飲調下不計時候	欽定四庫全書 普濟方	人參 阿膠 當歸 各一 兩	白朮 黃芩 各一 兩 赤石脂 二 兩 乾姜 半 兩 芍藥 三 分 艾葉	白朮散 治妊娠下痢赤白腹痛日夜不止	時候稍熱服	右為散每服四錢匕以水一盞煎至六分去滓不計	芎藭 乾姜 甘草	黃蘗散 治妊娠下痢赤白腹中疴痛腰疼或如欲產 黃蘗 桑寄生 當歸 阿膠 赤芍藥 艾葉
---	-------	----------------------	--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------------	---	-------------------	-------	----------------------	----------	--



勒 <small>各一兩</small> 乾姜 龍骨 <small>各半兩</small> 甘草 <small>一錢</small>	
右搗篩為散每服不計時候以粥飲調下二錢	
蒙姜黃連丸治妊娠下痢赤白不等因冷物傷脾辛酸損胃冷熱不調胎氣不安氣血凝滯下痢頻頻時有時無或赤或白腸鳴後重谷道疼痛急服蒙姜黃連丸不問冷熱二證皆可服之 若緩變成洞泄脫肛下血連臍刺痛日久死矣	
乾姜 黃連 縮砂仁 芎藭 阿膠 白朮 <small>各一</small>	欽定四庫全書 普濟方
兩 乳香 <small>三錢</small> 枳殼 <small>兩半</small>	
右為細末用鹽梅三個取肉入少醋糊同杵勻和如梧子大每服四十九丸白痢乾姜湯下赤痢甘草湯下赤白痢乾姜甘草湯下並不拘時候一方有訶子一兩龍骨半兩無砂仁阿膠枳殼	
黃連湯 <small>大全良方</small> 療妊娠腹痛下痢膿血不止	
黃連 <small>八分</small> 厚朴 阿膠 當歸 <small>各六分</small> 艾葉 黃蘗 <small>各四分</small>	分 乾姜 <small>五分</small>



右為細末空心米飲下方寸匕日三服	健脾湯 治妊娠下痢臍腹撮痛益胃氣進飲食	厚朴 蒼朮 陳橘皮 大棗 白茯苓 <small>各四兩 三兩 一升 二兩</small>	半人參 甘草 <small>二兩 三兩</small>	右粗搗篩每服三錢匕水一盞入生姜三片棗三枚 劈碎同煎至六分去滓溫服此藥能進食調脾胃	乾姜散 治妊娠下痢	乾姜 細辛 桂 附子 椒目 猪苓 <small>各一兩 各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	小麥麩 <small>一兩</small>	右為末散每服方寸匕溫酒調下	姜連散 治胎前下痢	訶梨勒 龍骨 乳香 乾姜 芎藭 白朮	鹽梅 <small>各等分</small>	右為細末入梅肉攪勻如膏漸漸丸梧桐子大每服 五七丸白痢白姜湯下五丸赤痢甘草湯下赤白痢 白姜甘草湯下忌生冷毒物一方有黃連
-----------------	---------------------	---	--------------------------------	---	-----------	--	---------------	--------------------------	---------------	-----------	--------------------	--------------------------	--



厚朴散 治妊娠下痢日夜頻併臍腹撮痛	厚朴 _{三兩} 吳茱萸 _{三兩} 甘草 藿香子 乾姜 陳橘
皮 _{各一兩}	
右為細散每服二錢匕煎紫木瓜湯調下食前服	
白豆寇湯 治妊娠下血腹痛腸鳴	白豆寇 陳橘皮 桂 _{去粗皮} 訶梨勒 當歸 _{各二兩}
枳殼 _{半觔}	
右粗搗篩每服三錢水一盞生姜五片棗二枚劈同	
煎至七分去滓稍熱服如要丸用好棗漿水煮去皮	
核細研和丸如梧桐子大以生姜拍碎炒黑色入水	
煎湯下十五丸	
石榴皮散 治妊娠下痢赤白疔利腹痛不可忍	酸石榴皮 _{三分} 阿膠 _{一兩} 地榆皮 黃蘗 _{一兩} 芎藭 _{三分} 當歸 _{一兩}
右為細散每服三錢匕薤白粥飲調下不計時候一	
方用葱白粥調服	



厚朴散 治妊娠水穀痢	厚朴 白茯苓 訶梨勒 黃連 乾姜 木香 各半
右搗篩為散每服四錢水一盞入棗三枚煎至六分去滓不計時候稍熱服	
治妊娠下痢	人參 黃芩 酸石榴皮 檮皮 粳米 各三兩 四兩 三合
右㕮咀以水七升煮取二升半分三服	
欽定四庫全書 普濟方	
治妊娠患膿血赤滯魚腦白滯臍腹絞痛不可忍者	薤白 酸石榴皮 黃蘗 阿膠 地榆 升切一兩 各三兩 二兩 四兩
右㕮咀以水七升煮取二升半分三服不瘥更作一方無薤白	
療妊娠下痢赤白腹痛不可忍	黃連 石榴皮 當歸 阿膠 熟艾 各三兩 二錢 半兩
右用水六升煮取二升溫分三服忌生冷肥膩	
薤白飲子 療妊娠下痢赤白腹痛不食	



黃蘗 乾姜 赤石脂 <small>各二兩</small> 酸石榴皮 <small>二枝</small>	療妊娠下痢不止	時候稍熱服	右搗篩為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計	阿膠 當歸 <small>各一兩</small> 白朮 <small>三分</small> 艾葉 酸石榴皮 <small>各半兩</small>	阿膠散 治妊娠下痢赤白腹痛不止	右為末煉蜜丸如赤小豆大水飲下十五丸食前服	欽定四庫全書 分	普濟方	阿膠 酸石榴皮 <small>各半兩</small> 黃連 <small>一兩</small> 當歸 肉豆寇 <small>各三</small>	阿膠丸 治妊娠下痢日夜頻併安胎氣止腹痛	右為細散每服二錢匕米飲調下食前服	肉豆寇散 治妊娠下痢不可療者及丈夫脾虛滯瀉	肉豆寇 <small>十枚</small> <small>十枚大者去殼用白麵作餅子裹文武火煨</small> 木香 <small>一兩</small> 草豆寇 <small>十枚</small>	薤白 <small>切一合</small> 當歸 地榆 <small>各一兩</small> 甘草 <small>半兩</small> 糯米 <small>一合</small>	右為散以水七升煮取二升去滓溫分三服
--	---------	-------	----------------------	--	-----------------	----------------------	-------------	-----	--	---------------------	------------------	-----------------------	--	--	-------------------



右細切以水八升煮取二升分三服	阿膠丸 治妊娠下痢膿血不止腹中疝痛 阿膠 _{二兩} 白朮 _{五兩} 黃連 肉豆寇仁 _{各一兩}	右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸食前溫 米飲下	治妊娠及產已寒熱下痢 黃連 _{一升} 黃蘗 _{一升} 梔子 _{二十枚}	右咬咀以水五升漬宿煮三沸服一升一日一夜令 欽定四庫全書 普濟方	盡嘔者加橘皮一兩生姜二兩亦治丈夫常痢一方 治中暑挾熱下痢無梔子仁用姜羊脂煎服	療妊娠白膿痢腹中冷痛 乾姜 _{四兩} 赤石脂 粳米	右用水七升煮取二升分溫三服忌生冷肥膩 療妊娠痢黃水不絕	厚朴 黃連 肉豆寇	右用水二升煮取一升頓服忌如前
----------------	---	------------------------------	---	------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------	-----------	----------------



療妊娠下痢赤白心腹痛小便澀

糯米 當歸 黃耆

右細切和調以水二盞煮取二分去滓溫分四服

大寧散 治妊娠下痢赤白及泄瀉疼痛垂死者

黑豆 甘草 米殼

右為粗末都作一服入生姜三片同煎食前服

治妊婦下痢膿血及咳嗽膿血名白朮湯

白朮 黃芩 當歸

欽定四庫全書

普濟方

右為末每服三錢水煎去滓食前服加桑白皮止嗽

玉粉丹 治妊娠下痢赤白裏急後重努嚙脫肛腸解

膿血魚腦或因傷寒後餘毒滲入腸間撮痛絞痛

石燕 真輕粉 玄胡索

右為細末以鷄子為丸如梧桐子大米飲下三丸若

不服藥日深子母俱殞其產後并年高氣血虛極老

人皆可服如小兒只一丸效

神捷散 治妊娠下痢及水瀉不止米穀不消化者



葛蒲 赤石脂 各一兩 乾姜 半兩	右搗羅為散空心米飲調下二錢匕日三	黃連湯 治妊娠下痢頻併後重裏急	黃連 黃蘗 各三兩 白朮 四兩	右粗篩每服五錢匕水一盞半生姜三片煎至八分去滓溫服日三	黃連散 治妊娠熱痢腹痛煩悶	黃連 梔子仁 當歸	欽定四庫全書 普濟方	右細剉分為三服每服水一盞煎至六分去滓不計時候分溫三服	療妊娠臍下刺痛大便血晝夜三五十行	根黃 大蒜	右以根黃為末研蒜作膏為丸如梧桐子大空心粥飲下三十丸日三服一方不用根黃用當歸以芍藥煎湯吞下	鷄黃散 出三方 療妊娠下痢赤白絞刺疼痛
------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------------	---------------	-----------	------------	----------------------------	------------------	-------	--	---------------------



<p>烏鷄子 <small>一枚就頭上開一穴傾去清只留黃</small> 黃丹 <small>二錢用鷄子殼內打令勻裹以黃泥</small></p>	<p><small>固濟煨取 乾為細末</small> 右每服二錢米飲調下一服愈者是男二服愈者是女胎前後冷熱痢方無毒者皆可擇用</p>	<p>厚朴丸 <small>出大金良方</small> 治妊娠洞泄寒中</p>	<p>乾姜 厚朴 <small>去粗皮 細剉</small> 右等分先杵令爛水拌同炒令乾再為末水煑麵糊為丸如桐子大每服五十九食前米飲下</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方 治妊娠下痢 <small>肘後方</small></p>	<p>用白楊皮一觔咬咀以水一大斗煑取二升分三服</p>	<p>又方 用燒中衣帶三寸為末服之</p>	<p>又方 右羊脂如碁子大十枚溫酒一升投中頓服三日</p>	<p>治妊娠臨產下痢</p>
---	---	---	---	--	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------



以梔子不拘多少燒存性為細末每服一大杯空
心熱水調服甚者連進四五服即止

狐灰散 治妊娠下痢極甚者不過三五服見效

用野狐腸連心肺須臘月收於罐子內以文武火
燒取黑灰不得令過火候有青烟出便塞卻竅子
勿令透氣候冷取為細末每服二錢米飲調下極
甚者一日三服大效三日內頓安如是尋常痢或
疼痛立愈

欽定四庫全書

普濟方

治妊娠下痢日夜不止方

用烏梅二兩軟者竹串慢火炙令乾焦為細散食
前陳米飲調下二錢匕如瀉血加黃連一兩為末
治妊娠下痢方

用敗龜一枚用米醋炙搗羅為散米飲調下二錢
食前服

縮胎散 治妊娠下痢赤白心腹疔痛小便澀方

枳殼 二錢
香附子 二兩
甘草 一兩半



右為末孕婦未產前日常服如茶點之能縮胎生產
絕易須百沸湯點服

鷲粟湯 治婦人妊娠痢疾裏急後重百藥不效

鷲粟殼 甘草 烏梅

右等分呔咀白水煎服立效

療妊娠血痢

以阿膠二兩以酒一升半煮取一升頓服

大小便秘澁 附論

欽定四庫全書

普濟方

夫妊娠大小便不通者由臟腑氣實而生於熱熱者隨
停之處則成病也若熱結於大腸則大便不通結於小
腸則小便不通若大小腸為熱所結故煩滿而大小便
皆不通也又云小腸有熱熱入於內脬熱結甚者令小
便不通則心脇小腹氣澁而喘急也陳無則云胎滿逼
脬多致小便不利者或心腎氣不足不能使脬冷清濁
相干為諸淋病致小便不通名曰轉胞又胎滿尿出不
時名曰遺尿治之各有方



方	
檳榔散 治妊娠大小便不通心腹脹滿妨悶不欲飲 食手足煩熱	檳榔 赤茯苓 大腹皮 木通 郁李仁 北
五味子	五味 各一兩 桑寄生 甘草 苦桔梗 各一兩
右為粗末每服三錢水一盞煎至六分溫服一方無	
歸涼節命散 治妊娠恣情飲酒或食生果魚羊鷄麵	
欽定四庫全書	普濟方
毒物致令百節痠疼大小腑秘澁面赤口苦心煩腹	
脹 方見本門 煩渴類	
梔子湯 治妊娠大小便不通臍腹脹痛	
梔子仁 一兩 石膏 四兩 黃芩 一兩 澤瀉 二兩 苳胡 一兩	
赤芍藥 二兩 萎蕤 一兩 車前草 切半	
右粗搗篩每服四錢匕水一盞半淡竹葉十片同煎	
至八分去滓食前服	
苳胡通塞湯 治妊娠大小便不通下焦熱結	



右為細末每服二錢濃煎葱白湯下不拘時候	枳殼 大腹皮 甘草 赤茯苓	大腹皮散 治妊娠大小便秘澁浮腫	前溫服	右粗搗篩每服四錢匕水一盞半煎至八分去滓食	車前子 <small>五兩</small> 木通 <small>四兩</small> 黃芩 <small>二兩</small> 郁李仁 <small>二兩</small> 大黃 <small>二兩</small>	車前子湯 治妊娠大小便俱不通	下二錢不拘時候	欽定四庫全書 普濟方	右為末以童子小便一盞葱白二寸同煎至六分調	勒 <small>四個半</small> 生半煨	大黃 木通 檳榔 <small>各一兩</small> 枳殼 <small>三錢</small> 大腹皮 <small>二枚</small> 訶梨	治妊娠大小便不通熱閉心膈腹脇妨悶妨害飲食	豉半分炒同煎至七分去滓食前溫服	右粗搗篩每服四錢匕水一盞入生地黃一分拍破	子仁 <small>一兩</small> 石膏 <small>一兩</small> 大黃 <small>劉炒一兩</small>	芫胡 黃芩 陳橘皮 澤瀉 羚羊角 <small>各三錢</small> 梔
--------------------	---------------	-----------------	-----	----------------------	--	----------------	---------	---------------	----------------------	-----------------------------	---	----------------------	-----------------	----------------------	--	---------------------------------------



冬葵根湯 治妊娠大小便不通七八日以上腹脹 悶	冬葵根 車前草 木通 大黃
右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓食前 溫服	
茅根湯 治妊娠大小便不通結悶氣急脹滿欲死	茅根 滑石 車前子 大黃
右粗搗篩每服四錢水一盞半煎至八分去滓食前 溫服	
木通湯 治妊娠大小便不通下部脹滿坐臥不安	木通 滑石 大麻仁 大黃
右粗搗篩每服四錢水一盞半煎至七分去滓空心 溫服	
白榆皮湯 治妊娠大小便不通	白榆皮 桂 甘草 滑石
右粗搗篩每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前	



溫服	冬葵子湯 治妊娠大小便不通
冬葵子 大黃	右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食前溫服
冬葵根汁方 治妊娠大小便不通	生冬葵根 生姜 <small>各搗汁</small>
右和令勻分三服空心日一服未利再服又未利盡	三服
欽定四庫全書	普濟方
治妊娠小便不通臍下妨悶虛羸大便秘	車前子 大黃
右為細末每服三錢空心蜜調下	葵子湯 治妊娠得病六七日以上身熱入臟大小便不利安胎除熱
治婦人雙身大小便不利	用八正散大作劑料去滑石加葵菜子煎服經曰



<p>膀胱不利為癰者小便閉而不通也如八正散加木香取效更捷經曰膀胱氣化則能出焉然後五苓散三五服則愈也</p>
<p>治妊娠大小便不通</p>
<p>用猪脂如半鷄子大碎切以酒半升煖令沸投猪膏內更煎一兩沸分三服食前溫服未通再服</p>
<p>治妊娠大小便不利方</p>
<p>用甘遂煨令黃搗細羅為散每服不計時候以水</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>調下</p>
<p>治大小便赤澀</p>
<p>大腹皮 枳殼 甘草 各一錢 赤茯苓 三錢</p>
<p>剉作三服水一盞半煎一盞將郁李仁二錢半去皮尖同煎五七沸空心連服通為度如不通必是大腑</p>
<p>熱秘宜服後方</p>
<p>枳殼 一錢 大黃 二錢 甘草 一錢</p>
<p>三味為細末作三服濃煎葱白湯調下雖通小便復</p>



澁脹煩熱不得睡臥而反倚息心胞絲戾不得溺者
病名轉胞可服八味丸

治妊娠大腑秘熱非時腰痛行履不得方

杏仁 桔梗 升麻 枳殼 前胡 各一分 大腹皮

一兩

右為細末每服二錢水一盞二分煎三四沸食後臨

臥徐徐去滓服

治妊娠小便不利大腑熱小便時水道中疼痛不可勝

欽定四庫全書

普濟方

忍方

葶藶子 麥門冬 知母 柴胡 茯苓 川芎

升麻 枳殼 杏仁 各一分 冬葵子 三銖

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎取九分食後臨

臥去滓吃大腑熱服後方

麥門冬 升麻 大黃 杏仁 各一分 大腹皮 一兩

右細杵羅為末每服三錢水一盞二分煎取一盞食

後臨臥徐徐去滓吃



<p>治妊娠通身搔痒漸次面目渾身四肢俱腫心躁不安 大小腑秘熱宜服此方吃此藥了小便通盡平復如 故更不須吃後面方若上餘分數小便未通即吃後 面通小腸方</p>	<p>黃芩 山梔 杏仁 前胡 升麻 知母 桔 梗 大黃 枳殼 葶藶 <small>各等分</small></p>	<p>右細杵羅為末每十錢水一盞葱白三枝同煎四五 沸瀉出去滓溫食後喫</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>普濟方卷三百四十</p>
--	--	---	-----------------------	-----------------

