

欽定四庫全書

普濟方卷三百八十六 明 周王朱橚 撰

嬰孩諸熱痘腫門

熱渴

夫小兒血氣本自盛實腑臟之間易於生熱氣熏蒸液  
津乾枯故令兒渴而引飲

方

天麻人參煎 治小兒上焦風熱熱渴引飲不止

欽定四庫全書

普濟方

天麻 人參 白茯苓 各去黑皮一分 天竺黃 甘草

生用 鉛霜白 龍腦 丹砂

右將先四味為細末再入研了四味和勻煉蜜煎為

膏每服一大豆許用金銀薄荷湯化下

枇杷葉湯 一名香冬散 治小兒上焦虛熱飲水不止

枇杷葉 去毛炙 葛根 胡黃連 甘草 炙 玄參 麥

門冬 去心焙各等分

右粗搗篩每服一錢水一盞生姜一片煎至六分後



入蜜少許再煎至五分去滓放溫二服食後服之	芡蓼飲 治小兒熱渴或虛熱吐下除熱止渴	芡蓼 <small>三分</small> 黃芩 <small>一分</small> 知母 <small>焙</small> 小麥 粟米 <small>各半</small>	右除粟米小麥外餘為粗末每二歲水一小盞入小麥粟米各一撮同煎至六分去渣分作三服一日喫	盡量兒大小以意加減	麥門冬散 治小兒夏天服藥大下後胃中虛熱渴唯	飲水	欽定四庫全書	普濟方	麥門冬 <small>焙</small> 龍胆 <small>各一兩</small> 甘草 <small>炙</small> 黃芩 <small>去黑皮</small> 葛根 <small>各三分</small>	<small>劉一兩半</small>	右粗搗篩每服一錢用水七分煎至四分去滓溫服	量兒大小以意臨時加減	黃連飲 治小兒多渴	黃連 <small>去鬚</small> 冬瓜瓢 <small>一分</small>	右細剉水一盞半同煎至八分去渣分溫三服量兒	大小臨時加減
---------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------	-----------------------	----	--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------	------------	-----------	--------------------------------------------	----------------------	--------



蓮實湯 治小兒熱渴不止	蓮實 <small>三十枚炒</small> 浮萍 <small>一分</small>
右用水一盞生姜少許煎至五分去渣分溫三服量 兒大小以意加減	黃蘆散 治小兒熱渴不止
黃連 <small>去鬚炒</small> 蘆根	右細剉水一盞半煎至五分去滓旋與服
治小兒熱氣熏蒸臟腑煩躁津液枯渴欲引飲方	欽定四庫全書
右取桑枝一握細剉水一盞半煎至八分去渣分作 三服加熱水與飲	普濟方
治小兒熱渴不止	右用葛根半兩細剉水一鍾煎六分去渣頻溫服
治小兒渴不止	蘆籜 扁豆藤 <small>各半兩</small> 人參 <small>一分</small> 去蘆
右細剉分為六服以水一小盞煎至五分去渣不拘 時候量兒大小加減稍服	



治小兒煩熱渴

以方諸向月取水飲之

葛根湯 治小兒體熱煩渴者尤宜服之

葛根 人參各一兩 麥門冬 白茯苓 甘草 澤

瀉各半

右為細末每服一錢水八分入生姜二片薄荷三葉

煎至六分去渣服

寒熱往來羸瘦 附論

欽定四庫全書

普濟方

夫小兒風邪客於皮膚痰飲積於臟腑使血氣不和陰

陽交爭故發寒熱往來也胃氣挾熱則消穀消穀則引飲

食陰陽氣血不和不能充養身體故寒熱雖能食不生

肌肉也

方

鼈甲散 治小兒寒熱往來腹脹漸瘦不能飲食服之

有效

鼈甲 一兩塗醋炙 柴胡 去苗 訶梨勒皮 陳橘皮 去白



錢各三 檳榔 <small>三枚</small> 赤茯苓 子苓 赤芍藥 當歸 <small>炒</small>	川大黃 甘草 <small>炙各半兩</small>	右為散每服一錢水一小盞入生姜少許煎至五分不拘時溫服量兒大小加減三服為度	柴胡散 治小兒寒熱往來乳食不下四肢無力心腹脹滿上焦痰壅漸羸瘦	柴胡 <small>去苗</small> 鱉甲 <small>塗醋炙黃去裙襴各一兩</small> 人參 <small>去蘆</small> 赤芍藥 桔梗	蘆 <small>去</small> 訶梨勒皮 地骨皮 杏仁 <small>湯浸去皮尖麩炒黃</small> 前胡 <small>去蘆</small>	欽定四庫全書 普濟方	陳橘皮 <small>去白</small> 甘草 <small>炙剉各半兩</small>	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去渣不拘時候溫服量兒大小加減	五味子散 治小兒寒熱往來不欲乳食羸瘦心腹脹	甘草 <small>炙半錢</small> 麥門冬 <small>半兩去心焙</small> 五味子 當歸 <small>炒</small> 人參	蘆 <small>去</small> 白朮 赤茯苓 桔梗 前胡 黃芩 <small>各一分</small>	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去渣服日三服更量兒大小以意加減
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------



人參散 治小兒寒熱往來食少羸瘦	人參 <small>去蘆</small> 黃耆 柴胡 <small>去苗</small> 白茯苓 鼈甲 <small>塗醋炙去裙</small> 木
香 <small>錢各半</small> 訶梨勒皮 <small>二分</small> 白木 <small>錢一分</small> 杏仁 <small>一分</small> 麩 <small>炒微黃</small>	甘草 <small>一分</small>
右為末不計時以粥飲調下半錢量大小加減服之	馬通粟丸 治小兒脇下有氣腹痛喘逆氣息難為往來寒熱羸瘦不食
馬通內粟 細辛 紫苑 <small>洗去土苗</small> 杏仁 <small>浸去皮尖麩炒各三分</small>	欽定四庫全書 普濟方
五味子 石膏 秦艽 <small>去苗</small> 白茯苓 半夏 <small>湯浸七遍</small>	各一分
右為末煉蜜和丸如麻子大每服以粥飲下五丸日三服量兒大小以意加減	香甲散 治小兒寒熱往來肌瘦
木香 鼈甲 <small>醋炙黃去裙</small> 檳榔 <small>三枝</small> 川大黃 陳皮	白柴胡 <small>去</small> 知母 甘草 當歸 <small>洗焙各半兩</small>
右咬咀每服一錢水一小盞生姜二片煎至六分去	



橘皮 <small>浸去白</small>	訶黎勒皮 <small>各半兩</small>	檳榔 <small>去蘆各一分</small>	丁香	桂心	人參	川大黃 <small>剉</small>	陳	時復嘔吐不欲乳食漸至羸瘦宜服	檳榔丸 治小兒乳食不節傷於脾胃致成往來寒熱	五丸日三服量兒大小以意加減	右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時候以薄荷湯下	大黃 <small>剉各半兩</small>	陳皮 <small>半兩湯浸去白皮焙</small>	柴胡 <small>去苗三分</small>	訶黎勒皮	木香	人參 <small>去蘆</small>	赤茯苓	桂心	川	欽定四庫全書 普濟方	訶黎丸 治小兒寒熱往來頭痛嘔吐及乳癖	日三服量大小加減服之	右為細末煉蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下五丸	草 <small>灸各一分</small>	柴胡 <small>去苗</small>	鼈甲 <small>灸去裙襴各半兩</small>	黃耆	麥門冬 <small>焙去心</small>	赤茯苓	白朮	黃芩	甘	乳食四肢羸瘦	黃耆丸 治小兒往來寒熱多汗心煩小便赤黃不欲	滓溫服量大小加減
--------------------------	----------------------------	----------------------------	----	----	----	-------------------------	---	----------------	--------------------------	---------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------	------	----	-------------------------	-----	----	---	---------------	-----------------------	------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------	----	---------------------------	-----	----	----	---	--------	--------------------------	----------



丸 合一	莽草 丹參 <small>各一兩</small> 菖蒲 蛇牀子 桂心 <small>各半錢</small> 雷	乃愈	莽草湯 治小兒寒熱往來不休不能乳食浴時避風	三服更量兒大小以意加減	右為末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服日	山 <small>各一分</small>	柴胡 <small>去苗半兩</small> 石膏 <small>一兩</small> 川大黃 <small>炒</small> 麻黃 <small>去節</small> 秦艽 <small>去苗</small> 恒	欽定四庫全書 普濟方	柴胡散 治小兒寒熱往來面色萎黃	分去滓不計時候溫服量大小加減	右為散每服一錢水一小盞入生地黄半錢煎至五	心 <small>一兩</small>	芍藥散 治小兒寒熱往來啼呼腹痛宜服	赤芍藥 寒水石 黃芩 當歸 <small>炒</small> 甘草 <small>炙劉半兩</small> 桂	湯研下五丸看兒大小加減	右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時候以薄荷生姜
---------	------------------------------------------------------------------------	----	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------	----------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------------------------------------------	-------------	----------------------





右都劉以水五升煮至三升去渣適寒溫以浴兒宜避風冷	芍藥湯 治小兒寒熱往來	赤芍藥 <small>一分</small> 黃芩 <small>一分</small> 當歸 <small>一分</small> 柴胡 <small>一分</small> 甘草 <small>一分</small>	右咬咀每服一錢水八分生姜二片棗子一枚煎至五分去滓溫服量大小加減	秦艽湯 治寒熱往來	秦艽 鱉甲 <small>醋炙微黃</small> 川大黃 <small>微炒</small> 麻黃 <small>剉各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	竹茹 甘草 <small>各一兩</small>	右咬咀每服水一盞葱白二寸煎五分去渣服量大小加減	草菓飲 治小兒寒熱盜汗不思飲食面黃腹急	草菓 <small>一兩</small> 厚朴 <small>二兩</small> 甘草 棗子 <small>各半兩</small> 生姜 <small>四兩</small> <small>皮同杵淹</small>	焙 <small>一宿</small>	右咬咀三歲一錢水半盞煎至三分去滓一方治五瘧夜明砂為末冷水調下半錢即效
-------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------	------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------



至四分去滓溫服不拘時候	右件咬咀每服二錢水六分生姜一片棗一枚同煎	兩味半	當歸 <small>焙洗</small> 陳橘皮 甘草 半夏麩 桔梗 <small>去蘆頭七</small>	人參 <small>去蘆</small> 白朮 白茯苓 <small>去皮三味</small> 前胡 地骨皮	思飲食	地骨皮散 治小兒寒熱更作急體羸瘦煩渴引飲不思飲食	合一方七味有芍藥寒水石黃芩當歸甘草各半兩	欽定四庫全書 普濟方	右以水三升煮取一升週歲以下服二合以上服三	生地黄 桂心 <small>各等分</small>	生地黄散 治小兒寒熱往來啼呼腹痛	意加減	去滓入麝香豆大煎一沸溫服日三更量兒大小以	右為散每服一錢水一小盞入葱白二寸煎至五分	鼈甲 <small>三分塗醋炙黃</small> 淡竹茹 川大黃 <small>炒各一錢</small> 恒山 <small>一杏仁許大</small>	鼈甲散 治小兒寒熱往來四肢羸瘦
-------------	----------------------	-----	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----	--------------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------------------	------------------	-----	----------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------



寒熱結實

附論

夫小兒寒熱結實者此由風邪客於皮膚而內有痰飲積於臟腑使氣血不和陰陽交爭則發熱臟腑本實復為熱所乘則積氣在內使人胸脇心腹煩熱而滿大便難小便澀是謂寒熱結實也

方

柴胡丸 治小兒寒熱結實或熱攻衝心肺氣急盡晝夜有汗日漸羸瘦不喫乳食

欽定四庫全書

普濟方

柴胡半兩 赤茯苓一分 人參一分 木香一分 桂心一分 川

大黃半兩 枳殼一分 甘草一分 鼈甲半兩 塗醋炙微黃 去裙襴

右搗羅為末煉蜜丸如麻子大每服溫水下五丸日三服量兒大小加減服之

大黃丸 治小兒增寒壯熱發渴不定腹中結實不能

乳食

川大黃半兩 柴胡 赤茯苓一分 木香一分 桂心一分 枳

殼一分 炒桃仁一分 湯浸去 檳榔半兩 人參一分 蘆頭一分 去



芒硝丸	治小兒宿食痰癖寒熱臟腑結宜服之	川芒硝 <small>兩半</small> 川大黃 <small>兩半</small> 炒 <small>半兩</small> 甘遂 <small>一分</small> 半夏 <small>一分</small> 湯洗 <small>七次</small> 巴豆 <small>二七枚</small> 去皮心 杏仁 <small>二七枚</small> 去皮尖別研 <small>代赭兩半</small> 膜紙裹壓去油
右為末與巴豆仁膏一處研勻煉蜜和搗二三百杵		
丸如菘豆大五六歲兒空腹以溫水下一丸利為度		
鼈甲散	治小兒寒熱結實脇下妨悶不欲乳食	欽定四庫全書 普濟方
鼈甲 <small>半兩</small> 塗醋炙黃 赤茯苓 <small>兩半</small> 川大黃 <small>兩</small> 炒 <small>一兩</small> 枳殼 <small>二十粒</small> 麩炒		
川朴硝 <small>一分</small>		
右為散每服一錢以水一盞煎五分去渣溫服不計時量大小加減		
五靈脂丸	治小兒腹有積滯致生寒熱腑臟結實心腹氣脹食多少力	
五靈脂 <small>兩半</small> 陳橘皮 <small>三片</small> 湯浸去白 木香 <small>兩半</small> 川大黃 <small>一分</small> 炒 巴豆霜 <small>一分</small>		



右為末入巴豆霜同研令勻用軟飯和丸如黍米大  
每服以粥飲下兩丸小兒一丸

爽神湯 治小兒清寒壅爽精神

白朮

人參

去蘆

白茯苓

各一兩

桔梗

瓜根

甘草

各半兩  
辛細

一錢

右㕮咀每服一錢水八分入荊芥薄荷各少許煎至  
五分去滓溫服

冷熱不調

附論

欽定四庫全書

普濟方

夫小兒冷熱不調者蓋為乳食乖度寒溫失節或陰陽  
相爭氣血不調致令冷歸下焦熱衝上膈若風冷入於  
腹胃則瀉痢不定或腹中氣滿或時嘔逆不能乳哺故  
謂之冷熱不調也

方

犀角湯 療小兒冷上熱下熱上冷下難將息方

犀角末

甘草

生地黃

芍藥

白朮

茯苓

梔子

各三分

柴胡

人參

大黃

生姜

各四兩

黃



芩	分二	桂心	分一	右呶咀水三升煮服一升分溫服之	木香散	治小兒冷氣不調胃氣壅滯少思飲食	木香	分一	大腹皮	分一	人參	赤茯苓	青橘皮	去白	訶	梨勒皮	桂心	前胡	半夏	丁香	甘草	分一	各	分	右為散每服一錢水一小盞入生姜半片大棗一枚煎至五分去滓放溫量兒大小以意加減	欽定四庫全書	普濟方	犀角散	治小兒冷熱不調或時下痢腹痛不能飲食	犀角屑	桂心	甘草	炙	當歸	炒	黃連	陳皮	去浸	白	人參	乾姜	炮各	半兩	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去渣日三服量兒大小加減	訶黎勒散	治小兒冷熱不調大便或壅或通不欲乳食	訶黎勒皮	半兩	人參	一分	去蘆	檳榔	一分	木香	一分	川大黃	半兩
---	----	----	----	----------------	-----	-----------------	----	----	-----	----	----	-----	-----	----	---	-----	----	----	----	----	----	----	---	---	--------------------------------------	--------	-----	-----	-------------------	-----	----	----	---	----	---	----	----	----	---	----	----	----	----	----------------------------	------	-------------------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----



乳食	當歸丸 治小兒冷熱不調大便青黃心腹多痛不欲	候量兒大小加減服之	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去渣不計時	白木散 治小兒冷熱不調腹內疼痛發渴不定	白木 兩半 當歸 兩半 芎藭 兩半 乾姜 一分 青橘皮 一分 浸去皮	甘草 一分 炙	白木散 治小兒冷熱不調腹內疼痛發渴不定	欽定四庫全書 普濟方	右為末煉蜜丸桐子大二歲以上粥飲化破三九日 三服如四歲以上至七歲七丸以粥飲下	赤芍藥丸 治小兒冷熱不調不思飲食積不消	赤芍藥 三分 桂心 一分 柴胡 半兩 川大黃 三分 炒 赤茯苓	去滓不計時候大小加減溫服	右為散每服一錢水一小盞入生姜少許煎至五分	炒 桂心 一分 川芎 一分
當歸 炒 人參 去 蘆 去 白芍藥 芎藭 甘草 炙 白木 各半														



兩	右為末麪糊和丸如麻子大每服以粥飲下五丸日 三服三歲已上加丸數服之	香連散 治小兒冷熱不調腹痛下痢	木香 當歸 <small>微炒</small> 乾姜 <small>炮各一分</small> 黃連 <small>去鬚</small> 阿膠 <small>炒黃各半兩</small>	右為散每服以粥飲調下半錢量兒大小加減頻服	木香丸 治小兒冷熱不調腹痛不可忍或時寒熱下 痢膿血	欽定四庫全書 普濟方	木香 <small>一分</small> 芫薺 當歸 <small>剉炒</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 黃芩 <small>各半兩</small>	右為末煉蜜和丸如桐子大不計時候以溫生姜湯 研破二丸服之量兒大小以意加減	赤茯苓丸 治小兒冷熱不調腹胃滯結壯熱時作兩 肋刺痛	赤茯苓 川大黃 <small>剉微炒</small> 鼈甲 <small>塗醋炙令黃去裙襴各三分</small> 當歸	川芎 <small>各一分</small>	右為末煉蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下五丸日
---	-------------------------------------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------





三服量兒大小以意加減

調氣散 治小兒四五歲腹內冷熱不調不能飲食

白朮

人參

去蘆

甘草

炙各三分

厚朴

一兩

去粗皮姜製

右為散每服一錢水一盞入生姜少許煎至五分去

滓服量兒大小以意加減

黃疸病

附論

夫黃疸以身皮皆黃者病也身痛體背強大小便澀一  
面目指爪盡黃小便如屋漏色看物皆黃渴者難治

欽定四庫全書

普濟方

此黃疸也此證多得於大病後身微黃者胃熱也大人  
亦同又有面黃腹大食吐渴者脾疸也又有自生身黃  
者胎疸也古書云諸疸皆熱色深黃者是也若淡黃兼  
白者胃怯胃不和也 黃疸者由脾氣實外有溫氣乘  
之與胃合候變生熱蓋脾色主黃胃為水穀之海熱搏  
水穀氣蘊積成黃薰發於外身疼轉背強大小便澀皮  
膚面目齒爪皆黃此或傷寒或溫病皆由熱不時解而  
入於胃也宣利者易治澀者難治宜服五苓散加茵陳



煎湯點又宜服導赤散加茵陳煎或身熱宜服小柴胡湯甚者承氣湯效 陽明病無汗小便不利心中熱壅必發黃凡發黃其寸口無脉鼻氣冷並不可治 凡發黃而下痢心腹滿者必死診其脉沉細者亦死又有百日半歲小兒非傷寒溫病而身微黃者亦是脾胃熱忌不可灸也灸之則熱甚此是將息過度所為微薄其衣數與除熱粉散之自歇不得妄語湯藥服及灸

方

欽定四庫全書

普濟方

犀角散 治小兒黃疸一身盡黃者

犀角一兩 茵陳 瓜蒌根 升麻 龍胆草 甘草

生地黄各半兩 寒水石三分

右白水煎服一方治小兒忽發黃面目皮肉須盡黃

瓜根汁和蜜服

茵陳散 治小兒黃病身如橘色

茵陳 川芒硝各一兩 梔子仁 川大黃炒 黃芩

犀角屑 木通剉 寒水石各半兩



右為散每服一錢水一小盞煎五分去渣不計時候  
溫服量大小加減

瀉黃散 一名加減黃連散 治小兒體熱胸膈煩滿皮膚如潰橘

之黃白睛亦然濕熱所致也并治痿獨取於陽明證  
也加減瀉黃散主之

黃連 茵陳 各五分 黃蘗 黃芩 各四分 梔子 茯苓

澤瀉 各三分

內經曰土位之主其瀉以苦又云脾苦濕急食苦以燥

欽定四庫全書

普濟方

之以黃連茵陳之苦寒除濕熱為君腎欲堅急食苦以  
堅之故以黃蘗之苦辛寒強筋骨為臣濕熱成煩以苦  
瀉之故以黃芩梔子之苦寒止煩除滿為佐濕淫于內  
以淡滲之以澤瀉茯苓之甘淡利小便道濕熱為使也  
右咬咀都作一服水一大盞煎至六分去滓稍熱食  
前一服減半時五日再服而愈

升麻丸 治小兒熱毒攻脾胃遍身俱黃小便赤澀大



便難心神疎熱兩目亦黃	川升麻 龍胆 梔子仁 黃芩 川大黃 <small>炒</small> 秦	芫 甘草 <small>炙劉各半兩</small>	右為末煉蜜和丸如梧桐子大不計時候以新汲水研下三丸三歲以上加丸數服	三黃丸 治諸黃兼治瘟疸最治衄血大便脫肛	黃連 <small>去鬚一分</small> 黃芩 <small>去心半兩</small> 大黃 <small>去皮濕紙裏煨</small>	右同細末麪糊丸如菉豆大或麻子大每服五七丸	欽定四庫全書 普濟方	至十五丸二十九丸食後米飲送下一方用煉蜜為丸如衄血膿塩水下大便血荆芥薄荷湯送下一名三黃散治黃病每服一錢水一盞煎五分去渣溫服食後	白朮散 治小兒結熱於內口乾而渴身黃體重者	人參 白朮 白茯苓 甘草 <small>炒</small> 藿香 <small>各一兩</small> 葛根	右為粗末每服一錢至二錢水煎服	土瓜根汁方 治小兒黃病
------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------	----------------------------------------------------------------	----------------------	--------------------------------------------------------	----------------	-------------



土瓜根汁

右一二歲兒取半鷄子殼分二服三四歲取一鷄子殼分二服早晨晚後各一服一方用蜜半匙相和漸漸服之

茵陳丸 治小兒脾胃熱毒致肌肉變黃小便變赤少心中煩懊

茵陳 梔子仁 川大黃炒 秦艽去苗 甘草炙各一分 川

朴硝兩半

欽定四庫全書

普濟方

右為末煉蜜和丸如菉豆大不計時候溫水下五丸量兒大小加減服之一方有郁李仁無甘草

瀉黃散 治小兒身涼身黃睛黃疳熱口臭唇焦瀉黃沫脾熱口甜胃熱口苦不吮乳

藿香七錢 山梔子一錢 石膏兩半 甘草三錢 防風四兩

右細剉同酒蜜微炒香為末每服半錢水半盞煎三分去滓服清汁亦治弄舌一方每服一錢溫熱水調下不拘時候服之



子芩散 治黃病每服一錢水八分煎五分去渣溫服	黃芩 瓜蘇根 茯神 <small>各一兩</small> 甘草 胡黃連 <small>各半兩</small>
蘆根湯 治黃病	蘆根 <small>兩</small> 茵陳 山梔子 黃芩 甘草 <small>各半兩</small>
右搗羅為細末每服一錢水八分入薄荷三葉煎五分去渣服	
大黃散 治小兒諸黃	川大黃 <small>炒</small> 黃連 蘇蘇根 黃芩 梔子仁 <small>各半兩</small>
欽定四庫全書	普濟方
右為散每服一錢水一盞煎至五分去滓不計時候溫服量大小以意加減	
黃瓜蒂散 治小兒諸黃三歲忽發心滿堅硬脚心手熱則變為黃病不急治殺人	
瓜蒂 <small>一十枚</small> 小豆 <small>二十粒</small> 糯米 <small>四十粒</small>	
右搗羅為散吹少許入鼻中令黃水出殘藥末淨水調服之得吐黃水即瘥一方瓜蒂一兩赤小豆四兩為末每一錢溫水調服藥下便卧即當有吐以吐為	



度出青黃汁為妙若小病不除者次日如前法更服 可再三不令虛也藥力過時不吐即服熱湯一盞以 助藥力若服藥過多者飲冷水解之又方瓜蒂炒 赤小豆各等分為末三歲半錢濃豉汁調下溫服不 吐少加得吐而止虛人不可用
茵陳湯 治小兒黃疸身體目睛小便並黃
山茵陳 <small>一分</small> 大黃 <small>劉炒</small> 山梔子 <small>五枚</small> <small>半兩</small> 用仁
右粗搗篩五六歲每服一錢水七分煎四分入朴硝
欽定四庫全書 普濟方
半錢更煎一兩沸去滓分溫日三服量大小加減
大黃丸 治小兒諸黃心胸壅悶宜服
川大黃 <small>劉炒</small> 茵陳 葶藶 <small>隔紙焙令紫</small> <small>色各半兩</small>
右為末煉蜜和丸梧桐子大不計時候以新汲水研 下三丸量大小增減服之
青麥汁方 治小兒黃病
青麥自然汁
右二歲兒取半鷄子殼分二服三四歲兒取一鷄子



穀分二服早晨午後各一服

葶藶丸 治小兒黃疸大小便難喘粗氣急

甜葶藶 一兩 炒 一兩 大黃 一兩 炒 一兩

右為末煉蜜丸如小豆大每服十九丸米湯送下

秦艽湯 治小兒身目俱黃

秦艽 三分

右粗搗篩每服一錢牛乳一合同煎至五分去滓分

溫日三服量兒大小加減

欽定四庫全書

普濟方

苦參丸 治小兒穀疸其候食必頭眩怫鬱不安而發黃

皆由失飢太飽攻衝脾胃腹滿氣粗煩渴

苦參 一兩 龍胆 半兩

右為末牛胆汁和丸搗三百下丸如菉豆大每服二

十九丸米湯下不拘時

雙連丹 名黃瓜丸 治小兒痘病渾身及面色俱黃

川黃連 去鬚 胡黃連 各一兩

右為細末用黃瓜一枚去瓢留一小盖子入藥末內





後以蓋子蓋定麪裹火燒令麪焦去麪搗熟丸如棗  
豆大每服七粒至十粒溫水下大小加減

寒水石散 治小兒胃熱身體黃除熱粉之

方見本門  
諸熱類

逐黃散 治小兒黃疸脾熱眼黃

右以瓜萋青者焙為末每服一錢水半盞煎七分去

滓服立效五更初瀉下黃極妙

萋根汁方 治小兒黃病

萋根汁

味溫無毒洗淨去泥不計多  
少於石器搗爛灑取自然汁

欽定四庫全書

普濟方

右滴少許入鼻中出黃水即瘥

諸腫

附論

夫腫病腎熱傳於膀胱盛逆於脾胃虛而不能制腎水

反尅土脾隨水脹脾主四肢故流走而身面皆腫也若夫

喘者重也何以然腎水勝而尅退脾土上勝心火心又

勝肺為心尅故喘或問曰心勝肺肺本見虛今何喘曰

此有二者肺大喘此五臟逆二者腎水氣上行傍侵於

肺故大喘此皆難治 腫者疝腫風腫氣腫積腫虛腫



<p>五者大同小異疔腫者肌體浮腫通身明亮狀如熟李 寶鑑云若見皮膚如熟李此名疔水定無疑是也又 有陰囊腫似琉璃疔水也或因疔食傷脾變為疔水風</p>	<p>腫者面目浮腫色帶紫赤時常多痒 忽時有發牽牛散主之或有如痛癢有成片腫者搔之 隨手而起此風疹也素問云風邪客於肌中肌膚虛</p>	<p>真氣逆散寒搏於皮膚入腠理濕氣行之則為腫痒也 又云面腫曰風癩雖氣血尚虛而熱未盡從皮膚與氣</p>	<p>相搏致令氣不宣泄故停留成腫也 治之先益黃散補後牽牛散利之</p>	<p>氣腫者目胞浮腫 以嗽為之粗有痰 嗽食公曰目上臉先腫次面背腫者以</p>	<p>腫者脾積為之曰水腫素問云目下微腫如卧蚕起 之狀曰水腫熱論曰水者陰目下亦陰也腹者至陰之</p>	<p>所居也故水在腹中者必使目下腫也又曰經腫也又 曰脰腫曰水腫千金云有人患氣急以不瘥遂成水病</p>	<p>麻黃甘草 湯主之積腫者遍身浮腫因食悞脾以瘧亦爾 子有</p>	<p>云人从患寒熱不退必變浮腫因脾積氣所作也寶鑑 云因宿痰欬成塊散後遍身浮腫喘竈或因不便食即</p>	<p>飲水悞必 虛腫者四肢浮腫以痢為之多渴少食 凡痢</p>	<p>退虛腫少食瀉以不退虛腫煩渴大抵痢以則脾土虛 虛則不能制腎水反剋土故腐腫於肌肉也其病十死</p>	<p>八九若用涼藥立死治之宜用益黃散及五苓散 脾氣實則腫自消十愈五六凡瀉久能變虛腫也</p>	<p>由不忌生冷恣食甘酸脾腎不調之所致也然取水之 法諸有水人微腫見於目下水者陰也腹者至陰之所</p>
---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

欽定四庫全書

普濟方



癥積脹鎖肚脹急膈脹中腕脹食腸臃脹蛔蟲脹脾氣	榮衛俱虛腫凡脹有疝極脹疝積脹氣積痞氣脹癖氣脹	傷寒虛氣入腫腹氣虛腫瀉痢虛氣入腹脹腫血虛腫	正其標得無恙矣凡腫有受濕 <small>脚手面</small> 毒氣腫 <small>腹肚堅</small>	多喘隨虛實按輕重察勝衰審表裏主治先固其本後	腫脹二證此由虛中有積以患失治漸傳作證候傳化	虛病實之今二子證候虛實不等若水寶女麪服之交 互二病俱亡小者止用益黃散服之十日脾實平安	陰陰病治陽大抵退熱以寒藥退寒以熱藥實病虛之	效也蓋大者因食傷脾小者因痢損脾素問云陽病治	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	以療病如將之用兵料敵當其虛實隨其機變必獲勝	散立效何不投之一服荅曰服之即死是謂醫之用藥	苓散日二服三日服藥尚未見效主人曰大者服水寶	除八九分後商陸散二服平愈小者益黃散女麪散五	招愚視之大者水寶散瀉十餘行五苓散二服翌日病	小者五歲自七月內瀉痢四十餘日二子後來俱發腫	日即服補腎行水氣之藥 <small>全嬰方云丁氏二子大者七</small>	分又隔三日一取減去八九分又隔四五日取其不取	初隔一日一取候減三二分又兩日再一取候退六七	夫取水法不可頓收盡必當再發則難治如病甚治者	居故水在腹必使目下腫而不得卧卧則驚驚則咳甚
-----------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



脹冷積脹虛積脹以上腫脹虛積並當下之用藥各有  
法度凡受濕腫傷寒虛氣入腹食毒氣腫瀉痢虛氣入  
腹腫此四腫所患病不相同皆因虛盛而得之受濕謂  
脾胃受濕冷以不尅化氣浮四肢頭面皆腫食毒氣由  
脾胃傷之冷積毒氣停留胃脘致虛入腹作腫傷寒由  
下之太早乘虛入腹作腫瀉痢之入脾氣亦虛是以致  
腫以上宜平調胃氣補臟充實方可去腫先服四味理  
中丸減半乾姜加白朮桑白皮同煎傷寒虛腫加枳實

欽定四庫全書

普濟方

作喘加淡豆豉利虛腫服正氣調胃胃氣既壯以致生  
丹利之其腫即退再調補臟腑用觀音散良益固平復  
矣又有氣虛腫亦名氣毒榮衛俱虛亦名血蟲凡小兒所患腫  
脹一門最為要急前人少有究竟然腫脹已作皆由榮  
衛不順臟腑怯弱壅滯三焦流注百脉表裏俱虛邪正  
相亂所以致受四大浮盛腹肚□滿多由食毒得之飲  
冷得之癥傷得之飲飽得之積以不化諸虛所入故成  
斯病病由虛得或忘亂通下因虛致虛根不能去



盛是謂壞證智者怯而辭謝庸者暴以攻擊二醫不同  
誠屬難治再與智者商之謂商量斟酌輕重良者審之  
雖曰良工猶宜審其可否之意疑者謂之疑其病盛不  
可利只宜與塌其氣也啟其靈明酌定良方起死回生  
謹遵其理始可調治用藥至真對證剋效即無恙矣以  
上先與服榮衛飲子次服分氣飲子小兒臟腑嬌嫩乳  
食過傷脾胃虛冷不能消化乳食停滯腹間脾受積傷  
脾土衰弱不能制水故溢漬於皮膚腫有三證疝水積

欽定四庫全書

普濟方

水驚水也蓋疝水者其候心中虛脚腫不可取宜用藥  
消之若積水者五積在於腹結化為水其候或冷或熱  
四肢頭面俱浮作虛積治之宜補而後取此是積在腹  
結後化為水其病難治而不可作虛中積治也驚水者  
前後重疊受驚致令心火躁渴飲水過多停積於脾其  
候四肢腫身上熱若其脉大者生小者死叔和曰水氣  
浮大得延生沉細當應是死別尺脉如絲或浮洪按之  
無根乃絕脉楊氏曰賈洛陽以腫為疝疾則知病之危



惡非他疾比也夫人全性命者水穀而已水則腎主之  
土穀則脾主之惟腎虛不能行水脾虛不能制水胃與  
脾合氣胃為水穀之海又因虛而能傳化故腎水泛溢  
侵脾土於是三焦停滯經絡壅塞水滲於皮膚注於肌  
肉而發腫矣其候目胞上下微腫四肢重着咳嗽喘怔  
忡股間清冷小便澀黃皮薄而光手按成窟舉手即滿  
治法楊氏曰身有熱者水氣在表可汗身無熱者水氣  
在裏可下次則通利小便順氣和脾不可緩也然證雖

欽定四庫全書

普濟方

可下當審虛實權輕重不可通用芫花甘遂大戟猛烈之  
劑用之太過吾恐峻決者易因閉者難水氣復來何以  
治之也凡虛腫先起於腹而散於四肢者可活先自四  
肢而後歸腹者不可治蠱脹肚上有筋腹滿大便滑泄  
从癰而轉作虛浮及唇黑傷肝缺盆平傷心臍突傷脾  
足平傷肺背平傷肺或男從足腫上女從身腫而下或  
肉硬或手掌平皆不治凡小兒通身浮腫是風水腫也  
小便不通者利之則愈內經曰三焦閉益水道不行水



滿皮膚身體痞腫是風乘之故可用長流水加燈心煎  
五苓枝時時呷之更於不透風處浴之汗出則腫消一  
汗減半再汗減七八三汗消盡內外俱行也治水之法  
當利小便得其要妙之理則愈矣 小兒浮腫有飲食  
所傷有濕傷皮膚有氣化為水治法當腰以上腫宜汗  
腰以下腫宜利小便然後調理脾胃也

方

榮衛飲子 調治嬰孩氣血俱虛榮衛不順四肢頭面

欽定四庫全書

普濟方

手足俱浮腫以至喘急者並宜服此

川當歸 熟乾地黄洗淨 白茯苓 川芎 白朮

甘草炙 白芍藥 枳殼去瓢炒 黃耆蜜炙 陳皮

右等分咬咀每服二錢水一小盞煎半盞去渣通口

不拘時服

榮者氣溫流血於脉衛者氣順調和於絡是故榮衛脉行陰陽相實循環無止自幼以至

長不唯呼吸無少滯礙其脉方調其氣方順呼吸之間脉不應息氣有違滯流注經絡隱伏臟腑虛實熱則發癰疽背節實熱則患瘡疾癢况其榮與衛陰及陽偏枯有作易感寒邪亦易致虛百病皆由茲始此方最良雖兒幼小並可與服以杜其根使血榮氣衛順且和矣疇寒臟虛溫且壯也盈虧自然而平怯



弱自然而正陰陽  
均調氣脉充實

分氣飲 調理小兒腫脹作喘氣短促急坐卧不任四

體浮腫飲食嘔逆神困喜睡宜服之

五味子 桔梗 白茯苓 甘草 陳橘皮 桑

白皮 草果 大腹皮 白朮 枳殼 川當

歸 紫蘇 蘇子 半夏

右等分每服二錢水一小盞生姜二片棗子半箇煎

半盞去滓通口服不拘時兼八味理中丸煎服以上

欽定四庫全書

普濟方

宜用救生丹通利 清濁無混邪正不干上焦得之清

降血虛則多泄瀉雖是乳子呼吸一急其脉有志徐

徐應指不違其數者亦同大人流行但通小大辨其

短淺而已若留滯其脉遲數其間太過不及者作病

善主療治鬱則分之逆則順之停則利之滯則降之

調理之先宜通順其氣大抵嬰孩氣順即易治脉壯

亦易理證候稍傳鬱逆停滯當先祛治不待傳入而

究竟此方分氣預宜進與  
分水穀之治者為用不同  
大效神功勅生丹 治小兒氣虛喘息四肢浮腫腹肚  
脹急衝滿脇肋乍寒乍熱或瀉或秘皆由久停虛積  
榮衛不順宜用此方去其毒惡之氣





雄黃別研 硃砂另研各一分 巴豆二十粒去殼 乾姜二錢

右用米醋一盞以巴豆姜就煮令乾去姜不用將巴

豆出油和雄硃研勻雪糕搜丸如麻子大每一歲三

丸並用酒浸赤芍藥少許送下夫幼兒受疾其來發端無過驚風痰熱疳

積吐痢而已前賢衆多迷論證候遍看方藥究竟推詳各有確實奧見其有無辜疳積異作證候著于篇

集或有罕見其證未詳其理者盡難測知龜胸決肋飲漿是也又復有壞証惡候自服諸家丸散輕重相

投愈之不得全功聽之加為他害肝脾風之類是也悠悠既以方法何宜學醫之士遇此等証未審術窮

而屈若能此等觸類調理雖則未效猶尚庶幾多是肆意免強而為稍或得失利害甚重今議勅生丹方

欽定四庫全書

普濟方

載譚氏所療無辜積證效驗至良晚進後生聞而知之且驚且喜蓋渠未嘗知用若叅究而又意到即細切以副全功然後知醫學無窮神妙難言世俗醫工於此等證候須當至誠施議起死回生十治十全百發百中矣

療小兒身體滿氣急卧不得方

右用郁李仁一合搗末和麪搜作餅子如常法與兒

喫微利即瘥一方為末六分水七合和調去滓煮粥

與兒喫之

寬腹丸 治小兒疳氣腹脹不思飲食或面腫者



麝香 <small>湯三銖別研</small> 大黃 <small>兩四</small> 甘遂 石膏 <small>各三分</small> 黃芩	大黃湯 治小兒咳腫壯熱有實方	右味煎樟柳木通燈心湯調下	檳榔 <small>錢各三</small> 白豆蔻 <small>錢一</small> 礞砂仁 <small>錢五</small>	猪苓 赤茯苓 白朮 澤瀉 <small>兩各一</small> 木香 沉香	便秘不利	加味五苓散 治腫滿因積而得既取積而腫再作小	去渣食前溫服	欽定四庫全書 普濟方	右每服二錢水一小盞生姜三片棗一枚同煎七分	子 <small>炮</small> 肉桂 <small>皮去</small> 白芍藥 山藥 <small>各等分</small>	黃耆 <small>炙蜜</small> 茯苓 <small>末去</small> 天南星 <small>炮</small> 白扁豆 <small>炒黃</small> 防風 <small>去蘆</small> 白附	唇口青白噦逆昏睡全不思飲食身體微腫	黃耆茯苓散 治小兒榮衛氣虛精神不爽面無顏色	右為末糊丸小豆大三歲三十九紫蘇木瓜湯下	紫蘇子 木瓜 <small>兩半</small> 巴豆 <small>炒七粒</small>	牽牛 蘿蔔子 陳皮 青皮 木香 <small>炮各一兩</small> 檳榔
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------	--------------------------	--------	---------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------



史君子丸 治小兒面黃大小便赤徧身浮腫此脾疴食	蠡魚鯉魚二物皆能腫	右等分為末一錢水半盞煎三分去滓食前不宜喫	白朮 秦艽 椒目 甘草 香薷 通草	椒目飲 治小兒痢後虛腫并頭面浮腫或身熱	止腫消 <small>方見大脚 氣腫門</small>	治男子婦人小兒積年脚氣腫痛及腹肚蠱腫服之痛	以杏仁杵加脂內體中相和傅臍腫上	治小兒臍赤腫	右為末飯湯下或薑棗湯下治疴用燈心湯下	赤小豆 陳皮 <small>去白</small> 蘿蔔子 白朮 <small>炒</small> 茴香 <small>炒各五錢</small> 木	香 <small>二錢</small> 甘草 <small>一錢</small> 青皮 <small>五錢</small> 加以巴豆二錢 <small>去殼炒去巴豆不用</small>	右為末飯湯下或薑棗湯下治疴用燈心湯下	塌氣散 治腫滿因積而得既積而腫再作小便不利	三服	右為粗末水七升煮一升九合每服三合日四服夜	甘草 青木香 <small>各三分</small> 前胡 <small>四分</small>
------------------------	-----------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------	--------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-----------------------	----	----------------------	------------------------------------------------



積氣滯而成	史君子 <small>一分麵裹</small> 黑牽牛 <small>兩</small> 五靈脂 <small>半兩</small> 黃連 <small>兩</small> 陳	皮 <small>一分</small> 江子 <small>七粒同陳皮黃連炒江子不用</small>	右為末粟米糊為丸如菘豆大每服五七丸生姜橘	皮湯下	神助散 治小兒頭面手足浮腫	澤瀉 <small>去黑皮</small> 猪苓 <small>各二兩</small> 黑牽牛 <small>炒取末</small> 葶藶 <small>炒香</small>	研 <small>別</small> 椒目 <small>兩</small> 木香 <small>兩</small>	欽定四庫全書	普濟方	右為細末每服以葱白三莖將水一盞煎至半盞調	藥三錢絕早面向東服如人行十里以漿水葱白煮	稀粥至葱爛入酒五合熱啜量人啜多少須啜一升	許不得喫塩并麪自早至午當利小便三升四升或	大便利喘定腫減七分隔日再服	五皮散 治小兒諸般浮腫氣急不食	桑白皮 大腹皮 茯苓皮 薑皮 陳橘皮 <small>等各</small>	分
-------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------	-----	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------	-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------------	--------------------------------------	---



右咬咀三歲一錢紫蘇皮葉三五片水半盞煎三分  
去渣不拘時服

澤苓散 治小兒遍身浮腫氣急不食

木通一兩 澤瀉 苦蒲子各半 木猪苓 漢防己

各一兩

右咬咀一錢水酒共半盞葱白三寸煎三分去滓小  
便通利即瘥

內消丸 治小兒頭面手足虛浮

欽定四庫全書

普濟方

木香一錢 防己一錢 丁香二十粒 青皮五錢

粒去殼同炒候黃色去巴豆不用

右為末丸麻子大每服三二歲五丸四五歲七丸或  
十歲小兒陳皮湯下女兒艾葉湯下一日三服又方  
實脾散消積飲能補脾消積進食五苓散通利水道  
藥合和用蘿蔔子木通薏苡仁車前子草赤小

豆冬瓜仁糯米湯調入燒塩盖脾土固實去水腫消  
一方五味同炒黃色去巴豆麪糊為丸小豆大三歲



三十丸橘皮湯下	紅粉散 治小兒渾身虛腫氣喘不思飲食	硃砂 <small>錢一</small> 栝榔 <small>錢一</small> 輕粉 <small>錢半</small>	右為末每服一字及半錢薄荷湯調下喫一服則取 下仍用前觀音散人參散神朮散調其胃氣忌生冷 粗硬等物	檳榔丸 治小兒遍身浮腫	黑牽牛 <small>炒三兩</small> 青木香 青皮 防風 檳榔 <small>各一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為末麪糊為丸如芥子大每服二十九丸桑白皮湯 下	香橘丸 治小兒四肢腫滿	杏仁 <small>枚十四</small> 巴豆 <small>枚十四</small> 青皮 陳皮 <small>各半兩</small> 麩 <small>半升</small>	右一處炒為細末醋糊為丸如菉豆大每服十九丸至 二十九丸冷姜湯下	宣氣散 治小兒腹急氣粗并治風腫氣腫通身腫及 瘡痘盛出身熱煩渴腹脹喘促大小便澀面青悶亂
---------	-------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------	--------------------------------------------------------	---------------	----------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------



又治以瀉不退脾虛生氣止與一服後補之	木香 <small>一分</small> 檳榔 橘皮 甘草 <small>各半兩</small> 黑牽牛 <small>四兩半</small>
用炒	
右咬咀一錢水半盞煎三分去滓服三歲一錢	
香櫝散 治小兒疳食氣腹大氣粗一應浮腫並療	木香 檳榔 黑牽牛 青皮 <small>各半兩</small> 商陸 <small>一兩</small>
右為末三歲一錢煎木通湯調下或為糊丸小豆大	
三十九米湯下肚大常服自消	
欽定四庫全書	普濟方
分氣飲 治腫脹作喘氣短而急	
北梗 赤茯苓 陳皮 桑白皮 <small>炒</small> 大腹皮 枳	
殼 <small>製</small> 半夏麩 真蘇子 <small>微炒</small> 紫蘇 甘草 <small>各二錢</small> 草薺	
仁 <small>一錢</small>	
右剉散每服一錢半水一盞薑三片棗子一箇煎服	
若心臍起掌心平缺盆平背心平不治大喘氣粗不	
食乃腎水盈溢上行傍浸於肺亦不治	
葶藶煎 治小兒腫滿服藥不退	



<p>葶藶 <small>紙上炒</small> 三分                  防己 <small>一兩</small> 半                  澤瀉 <small>三兩</small>                  澤漆葉 <small>一兩</small>                  赤茯苓</p>	<p>苓 <small>去黑皮</small> 三分                  郁李仁 <small>去皮尖炒</small> 一兩一分                  柴胡 <small>去苗</small> 二兩                  杏仁 <small>湯浸去皮</small></p>	<p><small>尖雙仁炒研如膏</small> 三兩</p>	<p>右七味粗搗篩水一斗煎三升半去滓入杏仁膏又</p>	<p>白蜜一斤慢火煎如稀飴每半錢溫水調下漸加之</p>	<p>更量大小加減</p>	<p>甘遂丸 治小兒腫滿結實諸治不瘥</p>	<p>甘遂 <small>炒</small> 葶藶 <small>紙上炒</small> 車前子 猪苓 <small>去黑皮</small> 杏仁 <small>湯浸去皮</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p><small>尖雙仁炒研</small> 芍藥 <small>各三分</small> 澤漆葉 黃芩 <small>去黑皮</small> 鼈甲 <small>去裙襖</small></p>	<p><small>灸各半兩</small></p>	<p>右搗研為末煉蜜和丸如菉豆大五六歲兒每服五</p>	<p>丸竹葉湯下以利為度量兒大小加減</p>	<p>塌氣散 退腫治積水驚水或飲水過多停積於脾故</p>	<p>四肢腫而身熱宜用內消之其腫自退</p>	<p>赤小豆 陳皮 蘿蔔子 甘草 <small>各半兩</small> 木香 <small>一分</small></p>	<p>右為末薑棗煎量大小加減通口服</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------





牽牛丸 治小兒疳氣頭面及四肢腫	黑牽牛 白牽牛 青皮 陳皮	右等分為末糊丸如小豆大三歲三十九丸米湯下小 腫常服自消	塌氣丸 治小兒疳腹脹喘急并面浮腫	丁香 胡椒 <small>炒一分</small> 蘿蔔子 <small>炒</small> 白牽牛 <small>生各一兩</small>	右為末麪糊為丸小豆大三歲三十九丸米湯下	治小兒身腫并手足腫兼癰癤	欽定四庫全書 普濟方	用巴豆五十枚去皮心水二升煎取一升用帛於湯 中隨手拭之	治小兒毒氣攻腮腫赤可畏者	皂角 <small>二兩</small> 天南星 <small>二錢</small> 糯米 <small>一合</small> <small>去核 生用 為末</small>	右為細末姜汁調塗立效	郁李丸 治小兒疳食氣急腫滿	郁李仁 <small>湯泡去皮炒</small> 檳榔 <small>各半兩</small> 牽牛 <small>一分炒</small>	右等分為末糊丸小豆大三歲三十九丸葱白湯下不
-----------------	---------------	--------------------------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------	--------------	---------------	-------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------	----------------------------------------------------------------------	-----------------------



拘時量兒大小加減	塌氣散 治小兒腹脹氣粗并疳食攻面目浮腫 木香 <small>一分</small> 青皮 <small>兩半</small> 巴豆 <small>三十粒同炒</small> 黃色去巴豆	右為末三歲半錢米湯調下食前連進即效量兒大小以意加減	治小兒浮腫	蒲種殼 天羅 燈草 <small>各等分</small>	右用葱濃煎湯服之又煎洗之尤妙即愈	欽定四庫全書 普濟方	郁李仁湯 治小兒通體腫滿腹脹氣喘 郁李仁 <small>湯浸去皮尖炒搗研用</small> 大黃 <small>煨</small> 柴胡 <small>去苗各一兩半</small> 芍藥	猪苓 <small>去黑心</small> 澤瀉 <small>各一兩</small> 赤茯苓 <small>去黑皮</small> 麻黃 <small>去根節一分</small> 升	麻 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙仁炒</small> 鼈甲 <small>去裙襴醋炙各三錢</small> 黃芩 <small>去黑心各一兩</small>	右粗搗篩每用二錢水一盞煎至五分去渣分溫二服日再以利為度量兒大小加減	商陸散 治小兒浮腫腹滿氣急利小便	澤瀉 商陸 <small>各等分</small>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------	------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------------	--------------------------



<p>右為末三歲一錢煎桑白皮湯調下商陸醋炒為末 調塗腫毒妙醋調并治咽喉腫</p>
<p>治小兒臍腫</p>
<p>右取桂心炙令熱熨之日可四五度</p>
<p>治小兒熱腫</p>
<p>右用鯉魚胆塗之</p>
<p>甘遂丸 治小兒腫滿結實諸治無益者 <small>一名澤漆丸 方見本門水</small></p>
<p>腫類</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>二牛丸 治小兒腫病大小便不利</p>
<p>黑牽牛 白牽牛 <small>各四兩 炒</small></p>
<p>右為末井花水為丸如菘豆大每服二十九丸蘿蔔子 煎湯下</p>
<p>沉附湯 治腫面滿因積而得既取積而腫再作小便 不利若再用利小便藥性寒而小便愈不通到此則 束手矣蓋中下焦不升降為風寒痞隔故水凝而不 通宜服沉附湯則小便自通喘滿自愈大小便通用</p>



以服無碍

附子 一隻生去皮  
臍切成片子

右用生姜十片水三盞煎八分次用沉香一錢磨水  
入藥再煎三沸空心服

胃苓丸 治腫滿因積而得既取積而種作小便不利

平胃散 五苓散

右等分和合蒸蒜丸木通湯下

又方 治腫滿因積而得既取積而腫再作小便不利

欽定四庫全書

普濟方

平胃散 二錢

右煮蘿蔔子一碗取青汁一盞入藥用姜棗再入蘿  
蔔子同煎服

附豆丸 治脾虛受濕虛腫

附子 一隻生去皮  
切作四片 赤小豆 一盞

右用水浸慢火煮候豆熟附子透軟取附子焙乾為  
末以薏苡仁煮糊丸空心蘿蔔子煎湯吞下仍以燒  
鹽和所煮赤小豆空心食之



緊皮散 治一切腫經取已消脾胃虛弱

白朮炮 赤茯苓 木香 澤蘭 厚朴姜製 續斷

肉桂 檳榔 陳皮去白 麥芽炒 神麩 青皮 椒

目 木通 扁豆各等分

右咬咀每服加薑棗子蘇葉同煎空心溫服之

海蛤散 治小兒腫病大小便不利一名猪苓湯方見本門水腫類

水腫 附論

夫小兒水氣腫滿者由將養不調腎脾二臟俱虛故也

欽定四庫全書

普濟方

腎主水其氣不通於陰脾主土候於肌肉而剋水腎虛不能傳其水液脾虛不能剋制於水故水氣流溢於皮膚故令腫也其水腫者則皮薄如熟李之狀若皮膚虛受風風搏於氣致腫者但虛腫如吹此風氣腫也

方

檳榔散 治小兒水氣腫滿喘促坐卧不安

檳榔煨熟炒 大黃剉炒各三分 葶藶紙上炒 牽牛子炒各半兩

右搗羅為散三四歲每服半錢熟水調下以利為效



量兒大小加減	葶藶散 治小兒水腫氣粗	葶藶 <small>炒</small> 防己 甘遂 大戟	右等分為末三歲一錢桑白皮湯調下食前服	澤漆丸 治小兒水腫腹大諸藥不瘥	澤漆葉 葶藶 <small>紙上炒</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 甘遂 <small>炒</small> 郁李仁	湯浸去皮 尖炒研 芍藥 猪苓 <small>去黑皮</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖</small> 車	前子 <small>各三分</small> 鼈甲 <small>去裙炙</small> 茈胡 <small>去苗各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右搗羅為末煉蜜和搗三五百杵為丸如菉豆大五六歲兒每服五丸溫水下更看兒大小增減一方用竹葉湯煎下	大戟丸 治小兒水氣浮腫	大戟 葶藶 <small>炒各一錢</small> 青皮 <small>三錢</small> 江子 <small>半錢</small>	右為末飯為丸每五丸茶湯下瀉後用人參白朮散補之	葶藶散 治小兒水腫
--------	-------------	------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------	-----------



大便秘難 <small>一名猪苓湯 一名海蛤湯</small>	桑根白皮散 治小兒水氣腫滿上氣喘促小便赤澀	更量兒大小增減	右呶咀每服一錢水七分煎至四分去渣溫服日再	構木白皮 <small>切五合即 構樹也</small> 赤小豆 <small>四合</small> 赤茯苓 <small>去黑皮 一兩半</small>	右呶咀三歲一錢水半盞煎三分去滓服	構皮湯 治小兒腫滿	麻黃 <small>去節 四兩</small> 甘草 <small>一兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	從腰上腫此湯發汗悉愈	二物湯 有患氣積急積久不瘥遂成水病攻面目身	人參杏仁湯下如痢後腫先服益黃散次與之	用葶藶丸下痢松樹皮湯小便赤澀燈心湯喘急咳嗽	脇痛并下痢膿血小便赤澀又理肺氣喘急咳嗽	聖丸子 治小兒水腫腹腫霍亂嘔逆腹冷食不下兩	右為末生姜蜜湯調下	葶藶 <small>隔紙妙 一錢</small> 牽牛 <small>炒</small> 桑白皮 <small>炒</small> 檳榔 <small>分等</small>
----------------------------------------	--------------------------	---------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	-----------	--------------------------------------------------------	---------------	------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------



桑白皮散 治小兒水氣偏身腫滿喘促小便不利	桑根白皮 <small>半兩</small> 射干 赤茯苓 黃芩 木通 <small>剉</small>
桑白皮 <small>剉</small> 海蛤 <small>一分</small> 漢防己 <small>一分</small> 赤茯苓 白朮	
甜葶藶 <small>隔紙炒</small> 猪苓 <small>去黑皮</small> 川朴 <small>硝</small> 兩	
右搗粗羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓	
溫服更量兒大小加減服之	
右搗細末為散每服以煮赤小豆湯調下半錢每日	
欽定四庫全書	普濟方
三四服看兒大小加減服之	
牡蠣散 治大病瘥後腰以下有水氣者宜服之	牡蠣 <small>煨</small> 澤瀉 蜀漆 <small>洗</small> 商陸 葶藶 海藻 菘
蘇根 <small>各等分</small>	
右為末三歲一錢燈心湯下小便利止	
赤茯苓散 治水氣腫滿咳嗽喘不止	
赤茯苓 桑根白皮 <small>剉</small> 貝母 <small>煨令黃</small> 川升麻 甜	
葶藶 <small>隔紙炒</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 桔梗 <small>去蘆各</small>	





右搗羅為末都研令勻用棗穰和丸如菘豆大每服	豆 <small>十粒去皮心研 紙裹壓去油</small> 膩粉 <small>一錢研入</small>	甜葶藶 <small>隔紙炒 令紫色</small> 牽牛子 <small>微炒</small> 雄雀糞 <small>各半兩</small> 大戟 <small>一分</small>	安	甜葶藶丸 治小兒水氣通身腫滿心腹妨悶坐卧不安	湯下十九日三服五歲以下減丸服之	右搗羅為散煉蜜和丸如菘豆大每服煎桑根白皮	防己 紫蘇子 <small>炒</small> 甜葶藶 <small>隔紙炒令 紫色半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	赤茯苓 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙 仁麩炒微黃</small> 陳橘皮 <small>浸去白 瓢焙</small> 漢	茯苓丸 治小兒水氣面目腫小便澀腹脹滿	右為末飯飲調下	白木散 治小兒水氣腫	白木 木香 <small>炮</small> 甘草 <small>炙</small> 茴香 <small>炒</small> 青皮 <small>浸去皮切 各半兩</small> 巴	豆 <small>三十粒去皮膜同青皮一處 炒好了仍去巴豆不要用</small>	溫服日三四服看兒大小加減服之	右搗粗羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去渣
----------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------	-----------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------	----------------------



以溫水下一丸日二服五歲已上加丸服之

甘遂散 治小兒水氣遍身腫滿大小便難喘促不得

睡卧

甘遂炒 大黃剉炒 牽牛子炒各三分 葶藶紙上一分炒 檳榔剉炒

右為散每服一字熟水調下以利為度量大小加減

水寶散 治小兒疳水氣息通身虛腫狀如熟李者服

之以利為度

童子青橘皮 珠子甘遂微炒

欽定四庫全書

普濟方

右等分為末三歲一錢用麥蘖煎湯點臘茶清調下

食前通利為效忌鹹酸食三五日凡治腫下氣虛只

與五苓散補

甘遂檳榔散 治積水疳水並宜服之

甘遂 青皮去白 檳榔取生用 陳皮去白各一錢

右末紫蘇木瓜湯點下忌服甘草藥積水疳水皆宜

服之此候以而不痊必連陰腫脾腎俱壞之然如此

已是危證不可取下只用利水道固脾土當用之五



豆 <small>各半 兩</small>	山豆根 車前子 桑根白皮 <small>各半 兩</small> 葵子 赤小	山豆根湯 治小兒氣腫滿小便澀	調下或煎大流氣飲研青木香丸灌下	右為末每服半錢水半盞生薑三片蜜半匙煎湯	大黃 <small>各等 分</small>	甜葶藶 <small>隔紙 炒</small> 紫牽牛 <small>畧炒 取仁</small> 白桑皮 <small>炒</small> 鷄心檳榔	葶藶散 治小兒水氣腫滿	欽定四庫全書 普濟方	右為末三歲一錢酒調下連進二服小便利即效	澤瀉 海蛤 防己 <small>各一 分</small> 苦蒲子 <small>三十 粒</small>	海蛤散 治小兒疳水腫滿氣急	末大小以意加減煎湯調下	右用益黃散去丁香加木香去訶子加蘿蔔子為細	又方 治小兒積水	心蘿蔔子湯下脚腫木瓜湯下	苓散和平胃散加麥門冬姜棗煎服一方無陳皮燈
------------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------	-----------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------	---------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------	-------------	----------------------	-------------	--------------	----------------------



右細剉和勻每服取一分水一小盞煎至五分去渣 分為二服每日三四服隨兒大小以意加減	猪苓散 治小兒水氣腫滿小便不利臍腹妨悶喘促	猪苓 <small>去黑心</small> 桑根皮 <small>剉</small> 赤茯苓 海蛤 甜葶藶 <small>隔紙</small>	<small>炒紫色</small> 各一分	右搗粗羅為散每一錢水一小盞煎至五分去渣 溫服日三四服量兒大小加減	木香散 治小兒水氣四肢浮腫腹脇妨悶	欽定四庫全書 普濟方	木香 赤茯苓 <small>各一分</small> 鼈甲 <small>塗醋炙令黃去裙襴</small> 川大黃 <small>剉碎</small>	<small>各一兩</small> 牽牛子 <small>微炒</small>	右搗細末為散每服以溫水調下半錢以利為度隨 兒大小加減	檳榔餅子 治小兒水氣四肢浮腫脹脇妨悶	檳榔 <small>一分</small> 郁李仁 <small>半兩湯浸去皮微炒用</small>	右搗羅為末以大麥麩一兩和作餅子糖灰內煨熟 量兒大小與喫即得通利氣下也
-------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------



冬瓜圓 治種種水氣

大冬瓜一枚先於頭邊切一盖子取去中間瓢以赤小豆水淘淨填滿冬瓜中間再用盖子合了用竹簽定以麻線繫紙筋黃泥通身固濟窰乾用糯米穀舂取糠片兩大籬埋冬瓜在內以火着糠內煨之候火盡取出刮去泥將冬瓜薄切作片子并豆一處焙乾

右為細末以煮麪糊為丸如桐子大每服五十九煎

欽定四庫全書

普濟方

冬瓜子湯送下不拘時候小便利為驗

普濟方卷三百八十六

