

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十 明 周王朱橚 撰

嬰孩心腹痛等疾門

心腹痛 附論

夫小兒心腹疼者證候多端不可概舉有蟲動作疼面
變五色口吐清水或涎沫或合眼哭叫仰身撲手心神
悶亂沉沉嘿嘿者是也宜先喫史君子次服官局化蟲
丸 小兒飲食不節或食冷硬肥膩甘甜過度傷飽不

欽定四庫全書

普濟方

能尅化停積於臟或因冷氣所觸故作疼痛診其脉沉
細者乃積也輕則荆三稜莪朮橘皮縮砂重則取利非
巴豆硃砂乾漆不可止也又有氣痛或因怒而得或傷
風冷之氣或因體虛臟寒而作疼診其脉弦緊者是也
當用木香紫蘇沉香青橘皮之屬大人小兒皆可服四
磨飲子沉香木香檳榔烏藥又有一般心疼大人小兒
多患凡有此疾無藥可療急用艾灸足大拇指節中男
左女右無問大人小兒又有一種勞瘵尸蟲作痛食不



| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|------|-----|-----------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 魏 | 各炒 | 高良薑 | 沉香 | 沉香煎丸 | 者乃至面黑唇口爪甲皆青是也 | 熱四肢煩手足心熱是也冷而痛者面色或青或白甚 | 於經絡故發心痛也 | 不病夫心痛者厥氣上逆痞而不散或傷寒氣冷邪搏 | 心者皆在於心包絡脉包絡脉者心之別脉也故少陰 | 干干之即傷心傷心即神去神去即死矣故諸邪在於 | 心也五臟六腑之所主精神之所舍其臟堅固邪不能 | 兒心痛者不起於心乃邪氣客於心主之脉夫少陰者 | 知飽人形羸瘦五心煩熱或骨蒸潮熱宜服金露丸小 |
| 醋浸研澄去砂和麪 | 一兩 | 檳榔 | 丁香 | 治小兒嘔逆心腹疼痛化水穀消積聚 | | | 小兒腹痛者多由冷熱不調冷 | 散或傷寒氣冷邪搏 | 心之別脉也故少陰 | 故諸邪在於 | 其所舍其臟堅固邪不能 | 心主之脉夫少陰者 | 金露丸小 |
| 餅子炙焦各半兩 | 青橘皮 | 麪裏煨熟 | 木香 | | | | 熱痛者則面赤或壯 | 傷寒氣冷邪搏 | 心之別脉也故少陰 | 故諸邪在於 | 其所舍其臟堅固邪不能 | 心主之脉夫少陰者 | 金露丸小 |
| 巴豆 | 縮砂仁 | 硫黃 | 胡椒 | | | | 熱痛者則面赤或壯 | 傷寒氣冷邪搏 | 心之別脉也故少陰 | 故諸邪在於 | 其所舍其臟堅固邪不能 | 心主之脉夫少陰者 | 金露丸小 |
| 去油盡一分 | 皮去 | 飛研水 | 沒藥 | | | | 熱痛者則面赤或壯 | 傷寒氣冷邪搏 | 心之別脉也故少陰 | 故諸邪在於 | 其所舍其臟堅固邪不能 | 心主之脉夫少陰者 | 金露丸小 |
| | 吳茱萸 | 硃砂 | 丹砂 | | | | 熱痛者則面赤或壯 | 傷寒氣冷邪搏 | 心之別脉也故少陰 | 故諸邪在於 | 其所舍其臟堅固邪不能 | 心主之脉夫少陰者 | 金露丸小 |
| | 湯浸 | 飛慢火 | 飛研水 | | | | 熱痛者則面赤或壯 | 傷寒氣冷邪搏 | 心之別脉也故少陰 | 故諸邪在於 | 其所舍其臟堅固邪不能 | 心主之脉夫少陰者 | 金露丸小 |
| | 阿 | | | | | | 熱痛者則面赤或壯 | 傷寒氣冷邪搏 | 心之別脉也故少陰 | 故諸邪在於 | 其所舍其臟堅固邪不能 | 心主之脉夫少陰者 | 金露丸小 |

欽定四庫全書

普濟方



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--|--------------------|------------|----------------------|----------------------------|---|---------------|-----------------|--------------|-----|---------------------------------------|-----------------|-----|----------------------|---------------------|
| 治小兒心腹痛 | 右為末酒糊丸如小豆大一歲五丸米湯下 | 乳香 木香 石菖蒲 人參 良薑 <small>炒各等分</small> | 參香丸 治小兒心腹痛并腸冷便青腹急痛 | 湯下量兒大小加減服之 | 右羅為細末白麪糊和丸如黍米大每服十粒生薑 | 牽牛 <small>一分</small> 炒黃 | 蓬莪茂 <small>炮</small> 當歸 <small>洗各一兩</small> 木香 人參 桂心 <small>各半兩</small> 黑 | 欽定四庫全書 普濟方 | 蓬莪茂丹 治小兒心腹疼痛不可忍 | 右為細末每服半錢溫酒調下 | 各一分 | 高良薑 木香 <small>各半兩</small> 丁香 桔梗 青皮 甘草 | 寬中湯 治小兒心腹疼痛不可忍者 | 小加減 | 封每服十丸食前臨卧服生薑橘皮湯下量虛實大 | 右搗各研為末和勻煉蜜丸如菉豆大以瓷合收 |
|--------|-------------------|--|--------------------|------------|----------------------|----------------------------|---|---------------|-----------------|--------------|-----|---------------------------------------|-----------------|-----|----------------------|---------------------|



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------|--|---|--|------------|--------------------------|--|-------------------|--|---|------------------------|
| 用三月三日桃花取曬乾杵末以水服半錢 | 治小兒卒心痛腹脹堅如石滿氣喘息 | 用好鹽如雞子大漿水三升煮取三沸攪消分為三服 | 紫沉消積丸 治小兒心痛 | 沉香 <small>剉</small> 硃砂 <small>各四兩</small> 阿魏 巴豆霜 <small>各一兩以上研別為末用蜜一</small> | <small>勸酒化</small> 丹砂 <small>研</small> 丁香 乾薑 <small>炮各二兩</small> 硫黃 <small>研</small> 青橘皮 <small>熬成膏</small> | <small>湯浸去</small> 高良薑 檳榔 <small>剉</small> 木香 人參 胡椒 白焙 | 欽定四庫全書 普濟方 | 桂 <small>去粗皮</small> 各四兩 | 右除前膏外一十一味搗研為細末入前膏和搗丸如菉豆大以瓷合收密封每服二丸食前橘皮湯下量兒加減 | 桃仁湯 治小兒冷邪氣攻心痛不欲飲食 | 桃仁 <small>三七枚浸去皮尖雙仁炒黃</small> 厚朴 <small>去粗皮薑汁炙一兩</small> 人參 麥蘖 | 炒各半兩 陳橘皮 <small>去白焙</small> 檳榔 <small>兩半</small> 附子 <small>炮裂去皮臍</small> 桂皮 <small>去粗</small> | 當歸 <small>焙各一兩</small> |
|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------|--|---|--|------------|--------------------------|--|-------------------|--|---|------------------------|



| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---|---|----|---|---------------|------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| 右麤搗篩三歲每服半錢水半盞煎至三分去滓不計時候溫服更量兒大小加減 | 硃砂丸 治小兒積氣冷氣心痛 | 硃砂 <small>二錢</small> 乾漆 <small>微炒</small> 五靈脂 胡椒 桂 <small>去粗皮</small> 荆三稜 | 炮蓬莪茂 <small>各一兩</small> 斑猫 <small>二十一枚</small> 巴豆 <small>二十一枚</small> 心皮膜煮出 | 油研 | 右為末研令勻醋煮麪糊和丸如黃米大一二歲每服五丸三四歲每服七丸橘皮湯下餘以意加減 | 欽定四庫全書 普濟方 | 治小兒未滿百日患腹痛 | 豚子卵 <small>一枚</small> 當歸 <small>一分</small> | 右用水三升煮取七合塗乳頭上令小兒飲以意加減 | 獨聖散 治小兒頭疼心疼 | 用當歸近尾半節為末酒調服半錢亦治大人如嬰兒夜啼乳汁調下少許即瘥 | 蓬莪茂散 治小兒心痛發渴不定 |
|----------------------------------|---------------|---|---|----|---|---------------|------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------|----------------|



| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------------------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|--------------|---|------------------------------|---------------------|-----|
| 欽定四庫全書 | 普濟方 | 右為散每服一錢以水一盞煎至五分去滓不計時候量大小分減溫服 | 檳榔散 治小兒冷氣心痛不可忍不能飲食 | 檳榔 三分 當歸 一兩 蓬莪茂 三分 木香 二分 吳茱萸 一分 | 洗 阿魏 一分 麩 煨 熟為度 | 右為散二歲每服半錢溫酒調下不計時候 | 華撥散 治小兒心疼不可忍 | 華撥 兩 胡椒 一分 桂 一分 木香 半兩 當歸 三分 桃仁 皮 | | | |
| 蓬莪茂 | 人參 | 桂心 | 黃芩 | 生乾地黄 | 木香 | 甘草 一分 | 香 一分 | 右為散每服不計時候以橘皮湯調下半錢量兒大小以意加減 | 芍藥散 治小兒心痛但覺兒將手數摩心腹即啼是心痛不可忍宜服 | 赤芍藥 人參 白朮 黃芩 川大黃 當歸 | 各一分 |



| | |
|----------------------|---|
| 尖半 兩炒 | 右為細散一二歲每服半錢溫酒調下不計時候 |
| 麝香丸 | 治小兒心痛面色青黃不欲飲食 |
| 麝香 | <small>細研一分</small> 檳榔 陳橘皮 <small>去白焙</small> 白豆蔻 <small>去殼</small> 吳茱萸 |
| 洗木香 | <small>焙</small> 各一兩 |
| 右將吳茱萸米醋煮一二十沸後掘地坑可安茱萸 | |
| 以炭半秤燒坑令通赤以醋半盞及茱萸入坑內用 | |
| 瓷碗蓋之四面以炭擁勿令泄氣候冷取出與前藥 | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 一處搗羅為末入麝香和勻醋煮麪糊丸如黃米大 | |
| 一二歲每服五丸四歲七丸溫酒調下不計時候 | |
| 桃仁湯 | 治小兒心痛不可忍 |
| 桃仁 | <small>去皮麩炒研</small> 赤芍藥 桔梗 <small>炒</small> 桂皮 <small>去</small> 甘草 <small>炙各半兩</small> |
| 右為末與桃仁同研每服一錢水一盞煎至半盞去 | |
| 滓溫服量大小加減不拘時服 | |
| 木香湯 | 治小兒心痛亦治手足不和 |
| 木香 | 良薑 <small>各一分炒</small> 白朮 <small>半兩</small> 桔梗 <small>半兩炒</small> 白茯苓 <small>去皮半兩</small> |



| | |
|---|--|
| 用 一 赤 方 | 右粗搗篩一二歲每服一二錢水一盞煎至五分去滓溫服發時併喫量大小加減 |
| 胡椒丸 治小兒心痛 | 胡椒 <small>四十粒</small> 檳榔 <small>一枚</small> 斑猫 <small>去翅足七箇</small> |
| 右為細末燒粟米飯為丸如黃米大一二歲每服三丸三歲已上五丸煎菖蒲湯下 | |
| 青橘皮散 治小兒傷冷腹痛 | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 青橘皮 <small>湯浸去白</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 赤芍藥 <small>各半兩</small> | |
| 右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候量大小加減溫服 | |
| 桂心散 治小兒心痛不止 | 桂心 <small>半錢</small> 當歸 <small>半兩</small> 梔子仁 <small>半分</small> |
| 右為散每服不計時候以橘皮湯下半錢量兒大小以意加減 | |
| 薑黃散 治小兒心痛 | |



薑黃 檳榔

劉

右等分搗羅為散溫酒調下一二歲每服半錢已下
餘以意加減

鼈甲丸 治小兒腹痛不可忍

鼈甲

醋炙黃
去裙襴

防葵

訶梨勒

煨用
皮

川大黃

炒

人參

去
蘆

郁李仁

湯浸去皮
尖研炒

當歸

微炒各
半兩

右為末煉蜜和丸如菉豆大以粥飲下五丸得微利
瘥不計時候量大小以意加減

欽定四庫全書

普濟方

溫胃丹 治小兒腹痛啼哭不止

人參

白朮

木香

各一
兩

高良薑

當歸

五味

子 各半
兩

右為末麪糊丸如黍米大每服十粒米飲下

橘皮散 治證同前

青皮 炒

木香

吳茱萸

當歸

各一
兩

乾薑

丁香

各半
兩

右為細末每服一錢水八分生薑二片煎五分去滓



| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|--|--------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| 溫服食前服 | 人參散 治小兒卒吐下腹痛不止 | 人參 半兩 去蘆 當歸 半兩 炒 甘草 一分 炙 乾薑 炮一分 黃耆 | 細辛 各一分 | 右為末每服一錢以水一小盞煎至五分去滓稍熱服量兒大小以意加減頻服 | 治小兒傷冷腹痛 | 木香 高良薑 白朮 人參 去蘆各一分 厚朴 半兩 去粗 | 欽定四庫全書 普濟方 | 皮薑汁 炙熟 | 右為散不計時候以粥飲調下半錢量大小以意加減 | 當歸散 治小兒冷熱不調腹內多痛 | 當歸 炒 枳殼 炒 去穰 赤芍藥 川大黃 炒各半兩 | 右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫服量大小加減凡脾家疼痛者皆因胃虛不究病源多用和養等劑以致掩蔽邪氣蓋腹痛多因邪正交 |
|-------|----------------|--|--------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--|



爭與臟氣相擊而作也受證非一夾熱痛者壯熱面赤或四肢煩手足心熱藥宜四順飲加青皮枳殼夾冷痛者面白或青甚者面黑唇口爪甲皆青藥宜五積散重者理中湯冷熱不調邪正交爭宜枳殼湯加青皮陳皮木香官桂當歸有積傷脾則面黃腹脹夜熱晝涼宜服紫雙丸去其積風冷入脾則脾胃積冷中滿疼痛荏苒歲月不可測識宜和劑抽刀散以伐其根脾間蛔痛則乍作吐嘔清沫宜檳榔丸主之

欽定四庫全書

普濟方

三稜散

益智殼 炒去 三稜 莪朮 青皮炒 香附子 青木

香 砂仁兩 各半 甘草半 二錢

右咬咀薑煎服次與保童丸之類微利取效也

治小兒心腹脅煩悶欲死

用燒雞子殼末酒服方寸匕

瘧疾 附論

夫時氣者是四時間或有非節之氣如春或寒夏或冷



秋或熱冬或溫其氣傷人為病亦頭疼壯熱與傷寒相
似其面黃者熱搏於胃脾胃停滯則發黃也治法亦如
傷寒重用解肌湯表之輕用七寶散而又有時氣兼瘧
者是日數未滿體常壯熱而邪不退此方失表故也或
乘於陰或乘於陽其乘於陽陽爭則熱其乘於陰陰爭
則寒陰陽之氣互相乘加故發熱成瘧也又謂曰瘧病
是邪成陰陽各鬪爭早期風府會晏發脊俞停行速連
朝發來遲間日迎小兒還有此不用問神明風寒暑濕

欽定四庫全書

普濟方

邪自外來飲食居處邪自內作湯氏曰是蓋外因感受
邪氣客於皮膚達於經絡內因停積飲食痰飲會於臟
腑此瘧疾之胚胎也楊氏曰豈特夏傷於暑秋必為瘧
哉蓋古人以暑受病最多言之耳夫瘧者始而呵欠繼
而足冷面色青黃身體俱急寒慄鼓顫腰脊俱疼寒去
未幾內外皆熱頭痛而渴但欲冷嘔惡煩悶而不嗜食
或內伏寒痰寒從背起冷如掌大瘧之寒熱豈非陰陽
二氣互相勝負而作哉邪併於陰則寒邪併於陽則熱



陰盛則寒多陽盛則熱熾其寒也湯火不能溫其熱也
冰雪不能寒衛氣與邪氣交爭病以作邪氣與衛氣相
離故汗出乃解而病以休衛氣晝行陽夜行陰得陽而
外出故發於日間得陰而內搏故發於暮夜或隔日或
兩日三日一發乃衛氣行疾行遲耳若內外失守真邪
不分陰陽迭勝寒熱互起則休作無定時矣聖惠曰凡瘧
疾欲解則有汗出汗出多則津液減耗又熱乘於臟則
虛躁故渴而欲冷張秘教曰若病瘧無汗非也夏傷於

欽定四庫全書

普濟方

暑秋或瘧瘧小兒血氣壅勝內挾實熱因犯暑邪客於
皮膚分肉之間至秋為風冷所折陽盛於外陰長於內
陰陽相搏發而成瘧先寒後熱者寒瘧也先熱後寒者
溫瘧也熱而不寒者瘴瘧也若汗出過多亡陽而渴當
節其飲多飲而小便澀則變為飲癖矣楊氏曰其脉弦
數者多熱熱則涼之弦遲者多寒寒則溫之浮弦浮緊
浮數其邪在表宜汗弦實沉實數實其邪在裏宜下大
抵瘧之初得一二日間如火燎原不可向邇波濤洶湧



未易迴瀾當俟其稍定而圖之所謂盛者待其衰也瘧
方來與正發及將解不可投藥耗其真氣藥病相忤當
於未發已前兩時之內或遇發日凌晨服之瘧有數種
治法不同寒熱似瘧此傷寒二証非瘧也必肝脉脹盛
頭痛惡風宜小柴胡湯加青皮紫蘇主之嘔者多用生
薑渴者加烏梅若兼之傷暑小柴胡加香薷入生薑烏
梅煎但寒熱之間非通利不能除根也當以四順飲加
常山神保丸治乃先解後攻之意吐汗下三者治瘧總

欽定四庫全書

普濟方

要不過汗吐下當下而不盡腹中餘疼或一利之後不
復再泄時時點滴而出者須以常山大黃再下之當汗
而汗不匝者或頭汗至脅而手足無者宜青皮佐紫蘇
汗之令周浹一身也當吐宜常山須出盡水飲瘧利用
常山罌粟常山治瘧每每作效蓋瘧家多蓄黃水以常
山能攻其癖下其水也罌粟治痢蓋已經取積日久下
痢腹中無痛腸胃滑泄以罌粟能澀腸也用常山須用
大黃為佐大便點滴似泄不泄須用大黃佐之收效如



發癰嘔者及嬰孩中年人虛者勿用常山吐之凡癰證
寒熱不歇有根又癰宜別風寒暑濕治之汗下吐法古
今不可違活人書格法治之久不愈者有根在也根者
何曰痰飲曰水飲曰敗血曰積癰惟癰為癰之母惟敗
血為暑熱之毒惟水惟飲皆生寒熱故暑之脉沉積癰
之脉弦結聚則脇腹必痛蓋巴豆功能下積常山能吐
利痰水大黃能蕩滌血熱隨證用之癰瘡再病愈已後
飲食失節恚怒傷中解脫傷風乳哺過飽又再發者熱

欽定四庫全書

普濟方

多二陳湯加青皮甘草熱少二陳湯加青皮草菓堅守
胃氣並用生薑烏梅煎空心服之更用巴豆丸子疎利
大便以泄毒氣何病之有或服巴豆過多滑痢腹痛煎
甘草生薑湯解之 巢氏病源夫風邪所傷客於皮膚
而痰飲積於臟腑致令血氣不和陰陽交爭若真氣勝
則邪氣退邪氣未盡故發癰也邪氣雖退氣血尚虛邪
氣干於真氣臟腑壅痞熱氣未散故餘熱往來也癰後
熱渴引飲者蓋臟未和津液未復故也若寒熱往來而



| | | | | | | | |
|--|---------------|--|---|------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 腹痛者蓋臟虛本挾宿寒邪入於臟為寒相搏而擊於臟氣故也諺曰瘧後因何渴皆因臟腑虛熱令多飲水結塊腹中居又諺曰邪入皮膚裏還從臟腑巡陰陽多競鬪寒熱往來頻腹內元因冷仍為痛所因實加邪熱盛脇滿少精神大小便應澁痞結病尤沉先有脾家冷聞食不開唇肌肉因茲瘦血氣不榮身若問如此病莫遣久沉淪仙人水鑑治嬰兒瘧諺瘧是邪風寒熱攻宜須速治免成空常山刻作人形狀丁釘孩兒生氣宮朱 | 欽定四庫全書 普濟方 | 氏集驗方凡瘧疾多是痰實痞塞不通脾氣虛弱蓋熱上停膈不能入於臟腑凡用五更令服蓋使藥下達於脾胃消痰實降虛熱 | 方 | 露星散飲 治久瘧成勞 | 秦艽 柴胡 白朮 白茯苓 檳榔 恒山 | 黃芩 甘草 半夏麴 官桂 | 右等分咬咀每服三錢酒醋各一半煎露星月一宿 |
|--|---------------|--|---|------------|--------------------|--------------|----------------------|



| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--|---|--|---------------|-----|-----------|--------------------|--|---|--------------|
| 次日早服再溫去滓大人小兒皆可服陳舍人令嗣 久瘧服驗一方用薑三片 | 通神餅 治截瘧有功 | 甘草末 <small>錢三</small> 菘豆末 敗荷葉 <small>各三錢</small> 砒霜 <small>半分</small> 硃砂 | <small>一錢</small> 定粉 <small>半錢</small> 腦子 麝香 <small>各少許</small> 金銀箔 <small>十片</small> | 右煉蜜丸如梧桐子大作餅子用一歲半丸或一丸 大者二丸而止一日只一服不可過多時用井花水 或柳桃枝煎水磨化服服後忌煎燒熱食亦可繫於 | 欽定四庫全書 普濟方 | 候脉處 | 恒山飲 治一切瘧疾 | 恒山 人參 白茯苓 草菓 知母 貝母 | 甘草 <small>炙</small> 半夏 <small>麩</small> 厚朴 <small>薑汁浸一宿取出炒黃已上各等分</small> | 右咬咀每服二錢水大半盞生薑三片棗子一枚同 煎至二分去滓空心服忌雞羊牛肉生冷等物一方 有前胡無貝母脾虛氣弱常山作吐須審之 | 牡蠣散 治小兒痰瘧發無時 |
|------------------------------------|-----------|--|---|--|---------------|-----|-----------|--------------------|--|---|--------------|



| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|----------------------|--|--|-----------------------|--|------------------|---|---|---------------------|
| <p>牡蠣粉<small>兩半</small> 知母<small>一分</small> 恒山<small>兩半</small> 烏梅肉<small>炒半兩</small> 人參<small>去蘆半兩</small></p> <p>鼈甲<small>三分去裙襖</small> 升麻<small>一分</small> 甘草<small>一分</small> 豉心 桃仁<small>各一</small></p> <p><small>皮炒</small></p> | <p>右為散每服以溫酒調下半錢日二服量大小以意</p> | <p>加減</p> | <p>升麻湯 治小兒瘧疾發後煩熱</p> | <p>升麻 常山 大黃<small>炒</small> 蜀漆 萎蕤 黃芩<small>去黑心</small></p> | <p>桂<small>去皮各一兩</small> 芒硝<small>一兩</small></p> | <p>欽定四庫全書 普濟方</p> | <p>右粗漚篩五六歲每服半錢水半盞煎至三分去滓發時溫服吐利為效量大小加減</p> | <p>知母丹 治發熱甚者</p> | <p>知母<small>炒</small> 鼈甲<small>炙酥</small> 大黃<small>炒</small> 赤茯苓<small>各一兩</small> 芒硝 升麻</p> <p><small>各半</small> 硃砂<small>另研一兩</small> 龍腦<small>一錢</small></p> | <p>右為細末煉蜜和丸如黍米大每服五粒至七粒生薑湯下大便利下即愈量大小加減</p> | <p>犀角散 治小兒熱瘴氣為瘧</p> |
|---|-----------------------------|-----------|----------------------|--|--|-----------------------|--|------------------|---|---|---------------------|



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------------|---|--|--------------------------------|---------------|------------------|--|---|----------------------------|-------------|--|
| 犀角屑 <small>半兩</small> 鱉甲 <small>去裙襴 炙</small> 柴胡 <small>去苗 三分</small> 甘草 | 炙各 <small>半兩</small> 川大黃 <small>炒 半兩</small> 恒山 <small>三分</small> | 右為散每服以水一小盞煎至五分去滓溫服日三四服量大小以意加減 | 桃仁散 治小兒瘧疾發渴寒熱小便赤黃宜服 | 桃仁 <small>三分 浸 去皮尖</small> 知母 <small>半兩</small> 鱉甲 <small>一兩 酥炙 去裙襴</small> 柴胡 赤苓 | 三 <small>分</small> 川升麻 <small>半兩</small> 黃芩 <small>半兩</small> 甘草 <small>一分</small> | 右藥為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓溫服日三四服量大小加減 | 欽定四庫全書 普濟方 | 蜀漆丸 治小兒久瘧不斷曾脇下痞堅 | 蜀漆 <small>一分 去皮</small> 杏仁 <small>一分 炒</small> 黃連 <small>一分</small> 桂心 <small>一分</small> 甜葶藶 <small>一分</small> | 川芒硝 <small>半兩</small> 川大黃 <small>炒 半兩</small> | 右為末煉蜜丸如麻子大每服以粥飲下五丸日三服量大小加減 | 鎮心化痰丸 治瘧疾痰多 | 南星 半夏 白礬 白附子 杏仁 <small>去皮 炒</small> 鐵孕 |
|--|---|-------------------------------|---------------------|---|--|--------------------------------|---------------|------------------|--|---|----------------------------|-------------|--|



| | |
|----------------------|--|
| 當歸湯 治小兒瘧疾身體壯熱增寒發作有時 | 當歸 焙 赤芍藥 柴胡 去苗 鼈甲 醋炙去裙 大黃 炒 甘 |
| 三服更量大小以意加減 | |
| 右粗搗篩每服半錢水半盞煎至三分去滓溫服日 | |
| 大青湯 治小兒諸瘧 | 當歸 焙一分 赤芍藥 兩半 大青 鼈甲 醋炙去裙 茵陳 |
| 方加薑棗 | 葛 麻黃 去節煎去沫 猪苓 去黑皮 |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 右修淨剉水煎服楊氏治寒瘧加白薑一處同煎一 | |
| 草菓飲 | 甘草 炙等分 |
| 利積為妙 | 草菓 白芷 良薑 青皮 川芎 紫蘇葉 |
| 粉 巴豆 去心殼 鈎白霜 | |
| 右皆生用成末爛飯為丸如菘豆大硃砂為衣每服 | |
| 三二十丸葱白薄荷湯下一二服必利間以進食丸 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|------------|----|
| 桃仁湯 治瘧疾 | 方無木香有恒山 | 水下一二丸每一歲加一粒十歲以上者止十粒一 | 右都一處研細煉蜜和丸如黍米大每於未發前新 | 相思子 二枚另 搗羅為細末 | 阿魏 一錢麪裏慢火 煨麪熟為度 | 真砒霜 一錢醋半盞慢 火熬醋盡為度 | 巴豆 七枚去皮心膜 紙裏壓去油 | 硃砂 一分研已上 細研勻次用 | 丁香 木香 各半 | 柴胡湯 治小兒瘧發寒熱腹脹下痢嘔逆黃瘦 | 柴胡 去苗 一分枳殼 去穰殼 炒二枚黃芩 去黑心 一兩訶梨勒 大者 一兩 | 甘草 炙 芍藥 兩知母 焙各 半兩 | 右粗搗篩每服一錢水七分煎至四分去滓溫服 | 萬金丹 一名砒霜丸 治痰盛挾積寒熱往來瘧久不瘥累發 | 欽定四庫全書 普濟方 | 不定 |
|---------|---------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|------------|----|



| | |
|---|--|
| 防葵散 治小兒瘡發後肚脹兼頭面浮腫宜服 | 防葵 兩半 柴胡 去苗 桑根白皮 川大黃 炒各半兩 甘草 炙一 |
| 右為散每服一錢水一小盞入小麥三十粒煎至五分去滓放溫發前服量大小加減 | |
| 乾漆散 治小兒七八歲患瘡疾發歇寒熱心煩或渴 | 乾漆 一分炒 煙出 川大黃 炒一分 恒山 兩半 石膏 研一兩 甘草 |
| 小加減 | |
| 烏梅丹 治發寒甚者 | 烏梅 兩焙一 母丁香 桂心 當歸 乾漆 微炒各半兩 |
| 麝香 一分另研 | |
| 右拌勻煉蜜和丸如黍米大每服十粒粥飲下量大 | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 桃仁 去皮尖炒黃 鼈甲 酥炙微黃各一兩 桂心 黃芩 各半兩 升 | |
| 麻 赤茯苓 各半兩 | |
| 右為粗末每服一錢水一盞煎五分去滓溫服大小加減 | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|---|--|-------------|---------------|--|-----------------------------|----------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| 分 | 右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服日 三服量大小加減 | 茅先生鬼哭飲 治小兒瘧疾久不愈者 | 常山 大腹皮 白茯苓 鼈甲 <small>醋炙</small> 甘草 <small>炙</small> | 右等分除甘草鼈甲炙外三件不得見火為末用桃 柳枝各一七寸同煎臨發服畧吐涎不妨 | 知母散 治小兒痰熱發瘧 | 欽定四庫全書 普濟方 | 知母 鼈甲 <small>醋炙去裙</small> 牡蠣粉 恒山 <small>各半</small> | 右搗細羅為散每服以粥飲調下半錢日三服量大 小加減 | 黃丹丸 治小兒瘧寒熱發歇不定 | 黃丹 <small>炒</small> 人參 <small>炒</small> 鼈甲 <small>醋炙去裙</small> 恒山 <small>各半</small> | 右為末煉蜜丸如菉豆大每服於未發前以冷水下 一九三歲已上三丸 | 恒山丸 治小兒瘧疾發時壯熱增寒面色青黃飲食 |
|---|---------------------------------|------------------|---|--|-------------|---------------|--|-----------------------------|----------------|---|----------------------------------|-----------------------|



| | | | | | | | | | |
|----|---|------------------------------------|---|---------------|--|--------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------|
| 不下 | 恒山 川大黃 <small>炒</small> 甘草 <small>炙</small> 麝香 <small>細研各半兩</small> | 右為末入麝香令勻煉蜜丸如梧桐子大每臨發前以煖水下二丸三歲已下即服一丸 | 朱氏四聖散 治小兒患瘧疾才發十數次不可妄用截藥乃因諸毒入於脾胃生冷傷於中脘或先寒後熱或先熱後寒或一日或兩日寒則肢體顫掉熱則滿身如火頭疼惡心煩渴引飲口苦咽乾背脊酸疼 | 欽定四庫全書 普濟方 | 曾膈停痰腹鳴腹痛裏急後重欲作痢疾陰陽不分宜服此藥消導暑氣表解陰陽化痰涎除寒熱服之累效乃撫州蕭世榮刻印施傳之方 | 生料五苓散 不換金正氣散 小柴胡湯 <small>加桂枝</small> | 養胃湯 | 右合和大小加減薑棗煎空心熱服滓再忌生冷毒物及飢飽勞役風寒露雨 | 松蘿散 治小兒瘧曾膈間痰涎發歇寒熱宜服 |
|----|---|------------------------------------|---|---------------|--|--------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------|



| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|----------------------|---|----|----------------------|--|--|----------------|----------------------|--|
| 右粗搗篩每服一錢水一盞入竹葉五片小麥三十 | 烏梅湯 治小兒瘧發作不定多煩心躁 烏梅肉 <small>炒</small> 常山 <small>各半</small> 甘草 <small>分三</small> | 歲已下可服一丸 | 右同研煉蜜丸如桐子大每未發前溫水下二丸五 | 黃丹丸 治小兒瘧疾發歇寒熱體顫 黃丹 <small>半兩</small> 恒山末 <small>半兩</small> 虎睛 <small>一雙</small> 酒 <small>黃</small> | 溫服 | 麻子大每服以粥飲下五丸當吐即瘧量大小加減 | 右敲雞子去黃用清與恒山末拌和令勻於瓷椀中 鎔蠟都拌和以綿幕椀口坐甌中蒸三遍取出丸如 | 恒山丸 治小兒瘧疾 恒山末 <small>一兩</small> 白蠟 <small>半兩</small> 雞子 <small>一枚</small> | 大小以意加減以吐為度不吐再服 | 右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服量 | 松蘿 <small>三分</small> 恒山 <small>一兩</small> 甘草 <small>三分</small> |
|----------------------|--|---------|----------------------|---|----|----------------------|--|--|----------------|----------------------|--|



| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---|--|---------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|---|--|
| 粒同煎四分去滓溫服量大小加減不拘時候 | 恒山湯 治小兒溫瘧 | 恒山 <small>一兩</small> 切 小麥 <small>二合</small> 淡竹葉 <small>一升</small> 切 | 右以水一升半煮取五合三日至五日兒一合為三服八日至十日兒一合半為三服十六日至二十日兒二合為三服四十日至六十日兒六合為三服六十日至百日兒一服二合半百日至二百日兒一服三合 | 欽定四庫全書 普濟方 | 牛黃丸 治小兒瘧疾煩熱 | 牛黃 杏仁 <small>湯浸去皮尖麩炒黃各一分</small> | 右同研如膏煉蜜丸如麻子大每服以溫水下三丸日三服量大小加減 | 大蒜丸 治小兒瘧疾必效 | 獨顆蒜 <small>一枚</small> 去心 巴豆 <small>一枚</small> 去皮 | 右取巴豆內蒜中用濕紙裹煨令熟搗如膏如麻子大每服以醋湯下一丸以吐利為度量大小加減五 |
|--------------------|-----------|---|--|---------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------|---|--|



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|----|----------------------|
| 月五日修合更佳 | 南斗散 | 當山 白芷 南星 <small>生用各等分</small> | 右咬咀每服二錢酒半盞煎至一半去滓發日五更服 | 又方 | 上等臘茶 硫黃 <small>別研末</small> | 右各頓一處寒多倍硫黃熱多倍蠟茶發日五更米 | 欽定四庫全書 普濟方 | 飲調一錢或引飲宜服五苓散 | 治小兒瘡 | 取牝驢皮覆患瘡人良 | 蛇蛻散 治小兒諸瘡久不瘥 <small>一名榻聖散</small> | 用蛇蛻皮燒灰研細每服半錢或一錢冷水調下未發前服之量大小加減 | 又方 | 用鹿角鎊一兩粗搗篩每服一錢未發時水半盞煎 |
|---------|-----|----------------------------------|-----------------------|----|-------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|----|----------------------|



至三分去滓溫服更量大小加減一方以乳調服
治小兒溫瘧

燒鼈甲灰以酒服一錢至發時服三並以火灸身

又方

燒雞肫胫中黃皮為末和乳與服男雄女雌

風瘧

因感風而得惡風自汗煩躁頭疼轉而為瘧風陽氣也

故先熱後寒可與解散風邪宜川芎白芷青皮紫蘇之

欽定四庫全書

普濟方

類細辛檳榔佐之溫瘧先熱後寒此乃傷寒壞病與風

瘧大略相同熱多寒少小柴胡湯熱少寒多小柴胡湯

加桂

小柴胡湯倍加人參地骨皮溫瘧加桂

寒瘧

自感寒而得無汗惡寒攣痛面慘轉而為瘧寒陰也先

寒後熱可與發散寒邪

右局方五積散或養胃湯加桂良薑白薑草菓之類



甚者薑附湯理中湯養胃湯寒瘧加桂生薑烏梅煎服

張氏草菓飲 治寒多熱少手足逆冷遍身浮腫腹肚疼痛

厚朴 薑汁炒 青皮 去白 藿香 甘草 炙 丁香皮

神麴 炒 良薑 半夏麴 各等分

右咬咀每服二錢水大半盞薑三片棗一枚煎至二分去滓空心服一方加檳榔紫蘇

欽定四庫全書

普濟方

生熟飲 治脾寒發瘧及寒多熱少久病胃衰

草菓 二枚 肉豆蔻 各一枚 生薑 二塊 厚朴 二片

生一片薑 製紙包煨 甘草 二寸一炙

右棗二箇烏梅一箇煎空心服一方不用棗烏梅散分二劑煎八分發日五更連進

七棗湯 治久瘧寒瘧

用大川烏一箇火炮鹽水浸七次去皮作二服薑七片棗七枚葱三寸水煎先喫棗後服藥一方用小附



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------|--------|-----|--|----------------------|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|------------|
| 子一枚如前製服烏附皆能溫脾如寒多用附子夾 | 風用川烏 | 暑瘧 <small>一名瘧</small> | 暑勝熱多得之陰氣獨虧陽氣獨發但熱不寒裏實不 | 泄煩渴且嘔肌肉消鑠宜小柴胡湯香薷散五苓散嘔 | 者縮脾飲下消暑丸熱多躁盛少與竹葉湯加常山柴 | 胡 | 香薷飲 治暑瘧 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 香薷 <small>四兩</small> 厚朴 <small>製</small> 扁豆 <small>薑製各二兩</small> | 右剉烏梅煎臨熟入薑汁溫服或五苓散去桂加羌 | 活一方燈心車前子同煎 | 又方 治夏月寒暑飲水過多停冷於脾至秋成瘧 | 用青州白丸子金液丹各三十九丸臘茶清下小兒研 | 末熱多臘茶清調寒多用米飲調亦治吐瀉後成慢 | 驚 | 又方 大人小兒皆可服 |
|----------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------|--------|-----|--|----------------------|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|------------|



用巴豆去殼大蒜筋頭扎一竅入巴豆一粒大者入
二粒濕紙裹煨令熟取出巴豆不用將大蒜去外一
重皮了細研大蒜五箇入辰砂末一錢宿蒸餅丸如
梧桐子大端午日製若十歲已下如麻子大當發日
空心井水下一丸忌生冷油膩三日合時忌猫犬婦
人見

濕癰

由胃襲雨濕汗出澡浴得之身體痛重肢節煩疼嘔逆

欽定四庫全書

普濟方

脹滿宜五苓散除濕湯加蒼朮茯苓或朮附湯加官桂

茯苓最驗

食癰 一名胃癰

飲水無節飢飽所傷食啖生冷醎酸肥膩中脘生痰皆
為食癰其狀苦飢而不能食食則中滿吐逆腹疼宜青
皮陳皮草菓半夏縮砂白豆蔻下巴豆取積或四獸飲
下紅丸子

四獸湯 治食癰諸癰和胃消痰



| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---|------------|---|----|--|
| 半夏 <small>製薑</small> 人參 茯苓 白朮 橘紅 草菓 生薑 烏梅 大棗 <small>各等分</small> 甘草 <small>炙減半</small> | 右呔咀以鹽少許淹食頃濕紙厚包慢火煨香熟每服四錢煎發前併二三服小兒量與水煎溫服楊氏曰治食癰食積用此或二陳湯下紅丸子 | 蕩脾丸 治化痰消積進食駐顏及治氣喘疴積 | 杏仁 <small>一兩去皮尖用</small> 半夏 <small>一兩生薑自然汁浸一宿次日焙</small> 巴豆 <small>五粒去殼并心</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為末用大好北棗七枚入燈心蒸去皮核取肉為丸每服五丸常服燈心棗子煎湯下注顏檳榔煎湯下消宿食陳米湯空心臨卧服化痰烏梅湯下治癰蒜湯或薤水下治痞癖大效 | 瘴癘 | 受嵐瘴溪峒蒸毒之氣如嶺南苦炎燥濕不常人多瘴癘其狀血乘上焦病欲來時令人迷困甚則發躁狂妄亦有啞不能言者由敗血瘀心毒痰聚脾坡仙指為脾胃 |
|---|--|---------------------|---|------------|---|----|--|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----------------|------------------|--------|-----|-------|----------------------|----------------------|---|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 實者巴豆大黃又瘧家多蓄黃水常山能破癖下水也 | 而愈 治法之外蓋諸瘧皆有根在當隨輕重利導之 | 充宜瘧丹磨沉香下雄黃解毒丸取下黑血如泥極臭 | 癖其證未可直攻宜烏頭七棗湯以扶其裏俟內氣已 | 乃彌年閱月經汗吐下榮衛虧損邪氣伏藏脇間結癥 | 瘧母 | 楊氏地龍飲 治瘧瘧諸瘧大熱煩躁 | 用生地龍三條研細入生薑汁生蜜調服 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 白衣人授之 | 即換紙每服五丸臨卧冷水下此方舟人於海角遇 | 右為末薑麩糊丸如麻子大上下以厚紙蓋貼有油 | 半夏 <small>生</small> 烏梅肉 母丁香 巴豆 <small>不去油每件各十枚晒</small> | 觀音丸 取下暑毒瘧毒 | 經久不瘥真氣已耗邪氣猶存有所謂勞瘧瘧母焉 | 柴胡湯加大黃及木香丸觀音丸 仁濟曰如前數證 | 實熱所致又有甚於暑瘧治法宜涼膈疎利大腸宜小 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|-----------------|------------------|--------|-----|-------|----------------------|----------------------|---|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|



| | |
|--|---|
| 消癖丸 | 治瘧母停水結癖腹脇堅痛忌服甘草 |
| 芫花 | <small>炒</small> 硃砂 <small>研</small> |
| 右等分蜜丸如小豆大棗湯下去癖須用芫花大戟去水之劑下後服養胃湯 | |
| 甘草湯 | 治小兒瘧癖實壯熱頭痛欲吐 |
| 甘草 | <small>炙</small> 常山 <small>各一兩</small> |
| 右粗搗篩三四歲每服半錢水半盞入竹葉十片同煎三分去滓溫服更量兒大小加減得吐即止 | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 痰癘 | |
| 二陳湯 | 治痰癘 |
| 陳皮 | 半夏 <small>炮各五兩</small> 茯苓 <small>三兩</small> 甘草 <small>炙一兩</small> |
| 右劉生薑烏梅煎服寒多加草菓楊氏熱多加前胡青皮檳榔縮砂白豆蔻隨意增用 | |
| 常山散 | 治小兒發瘧痰壅煩悶 |
| 川常山 | <small>半兩</small> 川大黃 <small>半兩</small> 桂心 <small>一分</small> 甘草 <small>炙用半分</small> 烏梅肉 <small>各一</small> |



| | |
|---|--|
| 右剉細每服一錢井水一小盞煎至半候冷未發前 與之一方無烏梅肉三四歲每服半盞煎三分未發 前溫服吐利效量大小加減 | |
| 勞瘧 | |
| 乃表裏俱虛真元未復疾雖暫止小勞復來法當調養 血氣宜用川芎當歸官桂芍藥 | |
| 牝瘧 | |
| 由久受寒邪陽虛不能制陰所以寒多不熱氣虛而泄 | |
| 欽定四庫全書 | |
| 普濟方 | |
| 宜用 | |
| 柴胡薑桂湯 治牝瘧但寒或寒多熱少 | |
| 柴胡 二兩 桂 七錢 天花粉 一兩 白薑 炮一兩 | |
| 右剉用水煎服 | |
| 熱瘧 | |
| 爭功散 治熱瘧多效 | |
| 知母 貝母 柴胡 去苗 常山 甘草 山梔子 | |
| 檳榔 各五錢 蟬蛻 十箇 地骨皮 去骨五錢 | |



右剉散每服五錢用桃柳枝各五寸煎未效用過路
葛藤五寸煎服

刪繁常山酒煎 療小兒瘧或自能飲或不能飲母含
藥與之

常山 二兩 桂心 一兩 甘草 半兩

右三味切以酒一升煎取七合去滓分服取吐瘧
又方 治瘧瘧但熱不寒

黃丹

欽定四庫全書

普濟方

右用黃丹煨過臨發蜜湯調下稍大能飲酒可用酒
調一方不煨用蜜水調一法專服小柴胡湯次服人
參前胡湯

廣濟療小兒瘧方

取驢軸下垢膩刮取和麪作燒餅與喫以瘧止

草菓飲 治痰瘧寒熱往來脾胃虛弱

草菓 陳皮 知母 三稜 良薑 烏梅 莪

朮 蘇葉 人參 川芎 白芷 甘草



右為末加薑同煎如脾胃虛弱用平胃散加草菓烏梅煎服

人參退熱散 治瘧疾寒熱胃膈多痰破結先用丁香脾積丸

下痰去積莫遲遲烏梅草菓與陳皮消熱可用青皮代寒熱人參知母宜莪朮白芷并甘草川芎蘇葉倍加之十味和同成呶咀何憂久瘧向安遲

六和湯 治瘧疾寒多熱少食積疴熱

欽定四庫全書

普濟方

陳皮一兩 青皮去白 柴胡 淨香附 蘇葉各三兩 甘

草一兩半

右呶咀白水煎服

神效截藥方

川常山末 飛羅麪

右等分和勻用好酒調九蒸九晒擣丸如菘豆大每服二三十丸臨發日五更桃柳湯下

生料平胃散 治瘧疾後脾胃虛弱顏色憔悴不進飲



| | |
|---|--|
| 食面目浮腫並皆治之 | 蒼朮 陳皮 厚朴 草菓 半夏 白芷 烏 |
| 梅 藿香 前胡 草豆蔻 甘草 | 右咬咀每服一錢薑棗煎服 |
| 正氣散 治瘧疾後脾胃虛弱手足浮腫 | 陳皮 厚朴 蒼朮 檳榔 肉豆蔻 大腹皮 |
| 麥芽 香附子 草豆蔻 秦艽 甘草 | 右咬咀薑一錢蘇葉煎喫 |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 草菓建中湯 治諸瘧爭勝人多用之 | 人參 草菓 桂 <small>各半</small> 白芍藥 <small>一兩</small> 甘草 <small>三分</small> |
| 右為散大銚水煎日進多服神效 | 全嬰驅瘧飲 治一切瘧 |
| 紫蘇 白芷 檳榔 <small>各半</small> 草菓 <small>淨</small> 製半夏 <small>各一兩</small> 陳 | 皮 甘草 白茯苓 前胡 <small>各半</small> |
| 右咬咀薑棗烏梅煎甚效 | 治小兒溫瘧身積熱不解 |



以葛蒲作湯浴之

渴疾

附論

夫渴者有大渴熱渴痲渴三者大同小異大渴起於吐瀉之後脾胃因虛而生邪熱脾受邪熱涎液內涸唇乾舌燥故成大渴也熱渴起於血氣盛實臟腑生熱或胃暑毒因熱臟燥津液不生唇焦舌乾故成熱渴也巢氏云熱渴而飲不止小便澁者則成痲痲渴者起於腎與膀胱好食肥膩恣食甘酸骨熱溢汗黃瘦腹脹口臭唇

欽定四庫全書

普濟方

乾故成痲渴飲水多小便無度其病久則多癰疽或變腫病其證內熱則小便利小便利則津液竭津液竭則經絡澁經絡澁則榮衛不行榮衛不行則血氣流溢故成疽也其渴久則脾土虛脾土虛則腎水盛腎水盛則水反尅土致脾生風濕脾既風濕則生虛熱濕熱相搏發於皮膚遍身腫滿也 小兒渴證唇紅如丹三五分者即發三五分渴若七分紅者即七八分作渴其有發渴唇紅焦黑者即久渴虛甚疾加傳極證候危篤故也



凡小兒有疳渴引飲不歇心肺虛熱唇焦舌裂有瀉渴者肌體羸弱神困力乏有利渴者虛熱積臟眉皺肚痛有傷寒候發渴者有痞癖虛煩引飲不歇俱因三焦不順五臟蘊熱煩躁昏悸神情不樂

方

止渴湯

人參 甘草 麥門冬去心 茯苓去皮 桔梗 天花粉

乾葛 澤瀉 乾木瓜 百藥煎 猪苓各等分

欽定四庫全書

普濟方

縮砂仁加倍

右用薑棗煎服

黃連散 治小兒心肺積熱渴不止咽喉乾痛

黃連去鬚 射干 川升麻 赤茯苓 麥門冬去心焙

元參 甘草炙 桑白皮 黃芩已上各半兩

右為散每服一錢水一小盞入青竹葉七片煎至五

分去滓入蜜半合更煎一兩沸放溫時時與兒呷之

白朮散 治小兒吐瀉失亡津液身涼煩渴不食困倦



| | |
|--|-----------------------|
| 少力多服尤妙滋養津液助氣補虛亦治虛熱 | |
| 白朮 <small>一兩</small> | 人參 |
| 白茯苓 | 白扁豆 |
| 山藥 | 甘草 |
| 炙粉葛 | 糯米 <small>各半兩</small> |
| 右為末三歲半錢水半盞煎三分服 | |
| 人參麥門冬散 治發熱煩渴 | |
| 麥門冬 <small>去心一兩</small> | 人參 <small>去蘆</small> |
| 甘草 <small>炙</small> | 陳皮 |
| 白朮 | 厚朴 |
| 薑製各半兩 | |
| 右咬咀每服二錢水一盞煎六分溫服不拘時 | |
| 欽定四庫全書 | |
| 普濟方 | |
| 枇杷葉散 治小兒氣壅煩熱不止少欲乳食 | |
| 枇杷葉 <small>拭去毛</small> | 葛根 |
| 胡黃連 | 甘草 <small>炙</small> |
| 元參 <small>各一</small> | |
| 分麥門冬 <small>半兩去心焙</small> | |
| 右為散每服一錢水一小盞生薑少許煎至五分去滓入蜜半兩更煎一兩沸放溫時時與兒呷之 | |
| 麥門冬散 治小兒心肺熱壅悶煩渴不止 | |
| 麥門冬 <small>去心焙</small> | 梔子仁 |
| 犀角屑 | 知母 |
| 甘草 <small>炙</small> | |
| 黃芩 <small>各半兩</small> | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------------|---|--------------|---------------------|--|-------------|--------|-----|----|----------------------|----------------------|-----|-----|---|--------------|------------------|----------------------|
| 小以意加減 | 靈更煎至七合去滓每服半合不計時候溫服量大 | 右以水三升入銀石三味煎至一升去銀石次下蛹 | 銀 _五 石膏 _二 寒水石 蠶蛹 _{各二} | 煎銀飲子 治小兒熱渴不止 | 右為末煉蜜丸如小豆大三歲三十丸烏梅湯下 | 草龍膽 定粉 _炒 黃連 烏梅肉 _{各等} | 龍粉丸 治小兒疳熱煩渴 | 欽定四庫全書 | 普濟方 | 加減 | 一百粒煎至五分去滓不計時候溫服量大小以意 | 右搗為散每服一錢以水一小盞入竹葉七片粟米 | 各半兩 | 炙已上 | 蘆根 人參 _去 黃耆 知母 麥門冬 _{去心} 甘草 | 蘆根散 治小兒壯熱渴不止 | 分去滓不計時候量大小以意加減溫服 | 右為散每服一錢以水一小盞入竹葉七片煎至五 |
|-------|----------------------|----------------------|---|--------------|---------------------|--|-------------|--------|-----|----|----------------------|----------------------|-----|-----|---|--------------|------------------|----------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------|---|-------------|--------------------|---------------------------|----|---------------|------|----------------------|----|--|----|----------------------|----|--|----|----------------------|----|--|
| 石蓮散 治小兒熱渴久不止 | 水調下一字量大小以意加減 | 右將皂莢搗羅為末入膩粉同研令勻不計時候溫 | 膩粉 <small>分</small> 皂莢 <small>一枚不艸可長七八寸者去黑皮塗酥炙令香熟</small> | 膩粉散 治小兒熱渴不止 | 右藥汁相和令勻不計時候服半合大小加減 | 生葛汁 竹瀝 <small>各二合</small> | 又方 | 欽定四庫全書 普濟方 | 加減溫服 | 右都剉以水二盞煎至一盞去滓不計時候量大小 | 又方 | 右為散每服一錢水一小盞入小麥粟米各一百粒煎至五分去滓不計時候溫服大小以意加減 | 又方 | 右都剉以水二盞煎至一盞去滓不計時候量大小 | 又方 | 右為散每服一錢水一小盞入小麥粟米各一百粒煎至五分去滓不計時候溫服大小以意加減 | 又方 | 右都剉以水二盞煎至一盞去滓不計時候量大小 | 又方 | 右為散每服一錢水一小盞入小麥粟米各一百粒煎至五分去滓不計時候溫服大小以意加減 |
|--------------|--------------|----------------------|---|-------------|--------------------|---------------------------|----|---------------|------|----------------------|----|--|----|----------------------|----|--|----|----------------------|----|--|



石蓮心

二十枚
炒黃

浮萍

一分

右藥都以水一中盞入生薑少許煎至六分去滓每服半合徐徐服之量大小以意加減

藕漿散 治小兒大渴不止飲水無度煩渴不食并瘡

豆燥渴心躁

粉霜 一兩 黃丹 半錢

右為末二歲一字用藕汁調下大渴一服立效

治小兒熱渴久不止

欽定四庫全書

普濟方

用葛根半兩細研以水一中盞煎至六分去滓不計時候分減溫服

楊氏備急方

取熟桑椹任意食用生蘿蔔汁和生蜜飲之

魚涎散 治小兒多渴飲水不休心躁

用瓜萋根為末取鮎魚身上涎搜作餅子日乾或用

蛤粉搜之尤妙三歲半大錢候兒大渴時用井桶口

索頭泡湯調下立定或用田螺浸水一夕調下一方



用淡竹去節中間着火自然竹瀝出也一味飲之治渴甚驗亦治瘡豆煩渴身熱多躁竹瀝磨犀角汁飲之

龍涎散 治小兒大渴不止亡失津液

取湯瓶中澗或古浴鑊中鏽澗為末三歲半錢井桶索頭泡湯調下食前遇大渴服立效 一方瓦花是古屋上瓦生青花為末依前湯調下 一方青魚魷為末蜒蚰浸水調並有效千金云取七家井索近桶

欽定四庫全書

普濟方

疾 口結燒灰井花水調下不過三劑竹根煎汁亦治渴

治小兒三焦虛煩作渴引飲不歇

用三黃丸加朴硝少許重作小丸子煎麥門冬湯下

治小兒傷寒候發渴唇口焦乾強燥盛者

用竹葉石膏湯主之

治小兒痞癖作渴不止

用艾灰餅子主之



治小兒熱瀉作渴

用五苓散加乾葛主之煩熱香薷飲加黃連治之小便
澀閉不通煎車前湯主之用車前末甘草炙二味煎
湯

治小兒疳渴

用蚘子麝香丸主之

盜汗 附論

夫汗者血之異名陽主氣氣為衛陰主血血為榮人之

欽定四庫全書

普濟方

一身負陰抱陽平則寧偏則病陰虛陽必湊故發熱汗

出如水熱而湧陽虛陰必乘故發厥汗出如水溢而

流汗者表虛而津液為之發泄也人以衛氣固其表所

以溫肌肉充皮膚肥腠理

明理論曰津液腠泄之所
為腠文理縫會之中為理司

開闔衛氣一虛則肌肉不溫皮膚不充腠理不肥開闔

失守也明理曰自汗者謂不因發散或昏睡自然而出

盜汗者睡困則出醒則復收頭汗者邪搏諸陽津液上

腠出頭上手足汗出胃主四肢陽明之証也無汗者寒



中榮則無汗謂腠理閉也楊氏曰治法表虛者與之黃
耆官桂之劑邪氣相干與之微微解散之劑至若風暑
濕之邪為自汗之証傷寒在表無汗若陰病水飲及亡
陽亦皆無汗治各有條若熱病脉躁盛與麻黃湯數劑
不得汗者此陽亢也不治設或小便不利如內外關格
頭汗則為陽脫及濕家誤下額汗而喘或小便不利大
便自利亦為陽脫或汗出而至髮潤或汗出如珠如油
凝而不流汗出如水他病如之皆不可救喜汗厚衣卧

欽定四庫全書

普濟方

而額汗出止汗散主之盜汗睡而自汗出肌肉虛也止
汗散主之遍身汗香薷丸主之六陽虛汗上至頭下至

項不過至腦不須治之

張氏三子病汗大者遍身次者上至項下至臍小者但額有汗

衆醫以參煎散治不愈錢氏曰大者與香薷丸次者與益脾散小者與石膏湯各五日而愈盜汗者

心之液也小兒血氣嫩弱膚腠未密若厚衣溫暖薰蒸

臟腑臟腑生熱熱搏於心心為邪所勝故液不能內臟

腑薰出肌肉則為盜汗也又或傷於冷傷於熱冷熱交

爭陰陽不順津液洩越亦睡中汗自出其間有虛實之



証虛者為諸病後或大汗後血氣尚弱液溢自汗實者
 或潮熱或寒熱發過之後身涼自汗二者日久令黃瘦
 失治則變為骨蒸疔勞也

方

柴胡秦芫湯 治小兒盜汗

柴胡去苗 秦芫去苗 常山去苗 貝母去心 甘草炙 烏梅肉焙乾

山梔子仁 鼈甲去裙襴 黃芩去黑心 生薑切 大

黃炒各半兩 桃枝剉 柳枝剉 葱白切 薤白切各一握 糯米半合

欽定四庫全書

普濟方

右粗搗篩每服一錢水半盞酒二分同煎至四分去
 滓溫服早晨日午臨卧各一五歲以下分作二服二
 歲以下分作三服

柴胡煎丸 治小兒骨蒸肌瘦盜汗

鼈甲九肋者一枚去裙襴 柴胡去苗二兩 甘草炙 當歸切 杏仁焙

湯浸去皮 桔梗炒各一兩 胡黃連一分 地骨皮 赤芍藥

尖雙仁研 木香半兩 黃連一分 桂去粗皮 人參一兩 麝香許少

研 酥 蜜 各三兩



| | |
|--|--|
| 香朮丸 | 治小兒疳黃盜汗骨蒸潮熱腹大肌瘦 |
| 胡黃連 | 大黃瓜 <small>黃色者</small> 柴胡 |
| 川大黃 | <small>濕紙裹煨至底</small> |
| 分 | 焦 <small>鱉甲</small> 醋 <small>炙</small> 黃柏 <small>去粗皮</small> 黃連蘆會青橘皮 <small>等各</small> |
| 效 | 右並生剉如麻豆大每二錢水一盞煎至六分去滓分溫二服食後臨卧與前鱉甲柴胡前丸相間服速 |
| 根白皮 | 甘草 <small>各一兩</small> |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 柴胡人參湯 | 治小兒骨熱盜汗肌瘦減食 |
| 柴胡 | <small>去苗</small> 人參白茯苓 <small>去黑皮</small> 當歸桔梗青橘 |
| 皮 | <small>去白</small> 芍藥芎藭麥門冬 <small>去心</small> 白朮升麻桑 |
| 右除酥蜜外搗研為末用青蒿一觔剉小便五升好酒一升熬蒿至二升去蒿入酥蜜再熬成煎候冷入藥末和丸如菉豆大每服十九米飲下日二服如秋冬合時更入桃柳心各七枚宜與後方柴胡人參湯相間服之 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|--|-------------------|--------------------|----|---|------------|---|----|-----------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 減服之 | 右為散不計時候煎竹葉湯調下半錢量兒大小加 | 川大黃 <small>炒</small> 甘草 <small>微</small> 天竺黃 牡蠣粉 <small>已上各一分</small> | 黃耆 硃砂 <small>各半兩</small> 龍腦 <small>一錢</small> 人參 <small>去蘆</small> 川升麻 | 黃耆散 治小兒體熱盜汗心煩不欲乳食 | 右為末三歲半錢水半盞小麥三七粒煎三分 | 兩半 | 乾漆 <small>炒</small> 白茯苓 人參 乾葛 大川烏 <small>炮去皮各</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 鼈甲 <small>一兩</small> 酒醋炙三五次取淨好醋再炙黃 柴胡 <small>去苗</small> 玄參 秦艽 <small>各一</small> | 面黃 | 麥煎散 治小兒榮衛不調夜多盜汗四肢倦怠消瘦 | 湯下 | 水下大者五七丸至十九丸一方加木香麝香少許米 | 用麪糊丸如菘豆大每服三二丸食後冷漿水或新 | 滿却蓋口用杖子插定慢火內煨熟將黃瓜及藥同 | 右除黃瓜外同為細末將黃瓜割去頭項入諸藥至 |
|-----|----------------------|---|--|-------------------|--------------------|----|---|------------|---|----|-----------------------|----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|



龍骨散 治小兒夜常有盜汗黃瘦

白龍骨 牡蠣粉 黃耆 人參去蘆 麻黃根 熟

地黄 甘草炙各半兩 麥門冬一兩去心焙

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計

時候量兒大小以意加減

犀角散 治小兒盜汗肌瘦

犀角 鼈甲酥炙 柴胡各半兩 知母半兩 地骨皮 胡黃

連各一兩 大黃 桃仁各半兩

欽定四庫全書

普濟方

右咬咀每服三歲兒一錢水半盞煎至三分去滓溫

服不拘時候大小以意加減

猪肚丸 治小兒骨蒸盜汗乳食減少

鼈甲去裙襴醋炙 柴胡去苗 木香 生乾地黄焙各一兩 青蒿

葱黃連去鬚炒 青橘皮去白焙

右為末用一枚嫩小猪肚淨洗入藥末在內繫定蒸

令極爛研和藥末丸如菉豆大每服十九溫水下食

前日午臨卧日三服大小加減



| | |
|---|---|
| 地骨皮湯 治小兒骨蒸壯熱肌肉減瘦多困少力夜多盜汗 | 地骨皮 秦艽 <small>去苗土</small> 柴胡 <small>去苗</small> 枳殼 <small>去穢炒</small> 知母 <small>焙</small> 當歸 <small>切焙</small> 鼈甲 <small>去裙襖醋炙</small> |
| 黃耆散 治小兒榮衛不和肌瘦盜汗骨熱多渴不思食 | 黃耆 <small>炙</small> 人參 當歸 赤芍藥 <small>各一兩</small> 木香 |
| 乳食腹滿洩瀉氣虛少力 | 沉香 黃耆 <small>炙</small> 人參 當歸 赤芍藥 <small>各一兩</small> 木香 |
| 右咬咀每服一錢生薑三片棗子半箇水半盞煎三分去滓溫服 | 桂心 <small>各半兩</small> |
| 香甲丸 治小兒潮熱盜汗消瘦面黃煩渴不 | 香甲丸 <small>一名沉香鼈甲丹</small> |
| 沉香 龍膽草 鼈甲 <small>童子小便浸一宿炙</small> 當歸 黃耆 <small>蜜炙</small> | |



| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 犀角散 治小兒盜汗體熱咽乾 | 犀角屑 茯神 麥門冬 黃耆 人參 | 兩 一分 炙已上 各半 | 甘草 | 右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服量兒大小加減 | 青蒿煎丸 治小兒盜汗肌熱 | 青蒿 甘草 杏仁 柴胡 | 為末各一 勩切一 末 炙為 仁湯浸去皮尖雙 炒研各一兩 苗去 | 白蜜 鼈甲 | 為末各二 分 去裙襴醋炙 為末一兩半 |
| 麻黃根散 治小兒盜汗不止咽喉多乾心神煩熱 | 麻黃根 敗蒲灰 麥門冬 黃耆 龍骨 | 炙已上 各半兩 | 甘草 | 右為散每服一錢水一小盞煎至五分不計時候量大小以意加減 | 麻黃根 敗蒲灰 麥門冬 黃耆 龍骨 | 炙已上 各半兩 | 甘草 | 右為散每服一錢水一小盞煎至五分不計時候量大小以意加減 | 麻黃根 敗蒲灰 麥門冬 黃耆 龍骨 |
| 大黃 黃連 | 各一兩 炒 各半兩 | 甘草 | 右為末麵糊丸如小豆大每服三十九米飲送下方用蜜和丸麥門冬去心煎湯送下大小加減 | 麻黃根散 治小兒盜汗不止咽喉多乾心神煩熱 | 麻黃根 敗蒲灰 麥門冬 黃耆 龍骨 | 炙已上 各半兩 | 甘草 | 右為散每服一錢水一小盞煎至五分不計時候量大小以意加減 | 麻黃根 敗蒲灰 麥門冬 黃耆 龍骨 |



| | |
|-----------------------|---|
| 升麻湯 治小兒肌熱盜汗日漸消瘦不食多渴 | 升麻 綿黃耆 <small>炙</small> 人參 <small>各一兩</small> 熟乾地黄 天竺黃 |
| 右六味搗羅為散以粉兒身及頭甚驗 | |
| 麻黃根散 治小兒盜汗 | 麻黃根 雷丸 牡蠣 <small>煨各一兩半</small> 甘草 <small>炙一兩</small> 乾薑 <small>炮半兩</small> |
| 右等分為末三歲一錢水半盞生薑棗子煎三分服 | |
| 麻黃散 治小兒盜汗日久口乾煩渴消瘦少力 | 人參 茯苓 黃耆 <small>炙</small> 龍骨 牡蠣 <small>煨</small> 麻黃根 |
| 右為末用生綿絹包藥撲有盜汗出處一方無麝香 | |
| 粉汗散 治小兒睡中遍身盜汗 | 牡蠣 <small>煨二兩</small> 麻黃根 <small>炒</small> 赤石脂 糯米 <small>各一兩</small> 龍腦 <small>一錢</small> |
| 每服十五丸至二十九丸空心熟水下量兒大小加減 | |
| 如稀錫入酥少許及諸藥末等熬成煎丸如菘豆大 | |
| 右用童子小便五升先煎青蒿取一升去滓更煎令 | |
| 麝香 <small>少許</small> | |

欽定四庫全書

普濟方



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--|--------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---|-----|-----------------------|-----------|--------------------------|
| 粉汗散 治小兒睡中遍身盜汗 | 服 | 右為末煉蜜丸如小豆大三歲三十九米湯下食前 | 烏 <small>各半兩</small> | 鼈甲 <small>醋炙</small> 肉蓯蓉 <small>酒浸一宿炙</small> 當歸 黃耆 <small>蜜炙</small> 何首 | 骨蒸煩渴日漸消瘦情意不悅 | 鼈甲丸 <small>一名蓯蓉丹</small> 治小兒久病盜汗血少氣虛面色萎黃 | 二服食後臨卧服之量大小加減一方有龍齒一兩 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右粗搗篩每二錢以水一小盞煎至五分去滓分溫 | 犀角屑 <small>三分</small> 茯神 <small>去木</small> 麥門冬 <small>去心焙</small> 白朮 <small>一分</small> 甘草 | 熱所致 | 犀角湯 治小兒盜汗睡中驚啼體熱瘦瘁此由心臟 | 一方竹葉少許水煎服 | 牡蠣 <small>各半兩</small> 煨研 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--|--------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---|-----|-----------------------|-----------|--------------------------|



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-------------|--|-------------------|-------------|---------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|---|
| 右為細末入麝香半錢取獺猪膽和藥在膽內用漿 | 黃連 黃蘗 青皮 甘草 <small>各半</small> | 熱肥孩兒大有神效 | 金疔丸 治小兒肌熱盜汗瘦弱飲食不進常服退肌 | 右為末每服一錢米飲調下 | 蒼朮 <small>米泔浸一宿去黑皮炒一兩</small> 白朮 <small>半兩</small> 防風 <small>去蘆一兩</small> 龍膽 <small>一兩</small> | 牡蠣散 治小兒汗者血虛亦能自汗作熱 | 溫熱服無時一方無麻黃根 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右咬咀每服一錢水半盞小麥二十粒煎三分去滓 | 牡蠣 <small>煨二兩</small> 黃耆 乾地黄 <small>生</small> 麻黃根 <small>各一兩</small> | 病後血少虛弱消瘦潮熱煩渴腠理不密盜汗不止 | 久而不止羸瘠枯瘦短氣煩倦亦治虛熱盜汗或因 | 又治小兒病後暴虛津液不固體常自汗夜卧愈甚 | 牡蠣散 <small>一名黃香散</small> 治小兒盜汗汗者血也血虛亦能自汗 | 右為細末用生綿絹包藥撲有盜汗處 | 黃連 <small>生</small> 牡蠣 <small>煨</small> 貝母 <small>各七錢</small> 糯米 <small>三兩一作粉</small> |
|----------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-------------|--|-------------------|-------------|---------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|---|



| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------------|-------------|---|---------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------|--------|--|--------------------|
| 水煮十餘沸取出東房山頭掛一夜第二日丸如菘 豆大每服十丸加至二十丸溫米飲下不拘時候 | 衛生方 治疳熱肌瘦盜汗 | 地骨皮 <small>兩</small> <small>洗四</small> 生乾地黄 <small>兩</small> <small>三</small> 白芍藥 <small>兩</small> <small>一</small> 甘草 <small>兩</small> <small>炙半</small> | 右咬咀每服二錢水一盞小麥三十粒煎至七分去 滓不拘時候 | 芎藭湯 治小兒心熱盜汗 | 芎藭 大黃 <small>煨</small> 羌活 <small>去蘆</small> 甘草 <small>炙各</small> <small>一兩</small> | 欽定四庫全書 普濟方 | 右咬咀每二錢水一中盞入薄荷數葉同煎至六分 去滓分溫二服量大小加減 | 治小兒盜汗不止宜用粉身 | 麻黃根 雷丸 <small>各二</small> 乾薑 <small>一</small> 梁米 <small>二</small> <small>兩</small> | 右為末日三四度以粉其身汗即自止 | 治盜汗外腎濕 | 人參 <small>一</small> 苦參 麻黃根 <small>各三</small> <small>錢</small> | 右為末蜜丸梧桐子大炒麥麩煎湯下二十九 |
|---|-------------|---|-------------------------------|-------------|---|---------------|-------------------------------------|-------------|--|-----------------|--------|--|--------------------|



| | |
|--|------------------------------|
| 治睡中汗出 | 酸棗仁 人參 茯苓 <small>各等分</small> |
| 右為細末半盞米飲下 | |
| 團參湯 治盜汗取斂心血 | |
| 人參 <small>一兩</small> 黃耆 <small>三兩</small> 甘草 <small>半兩</small> | |
| 右等分呶咀薑三片加麥麩煎服 | |
| 又方 治證同前 | |
| 羅參 白朮 白茯苓 黃耆 當歸 甘草 | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 右呶咀各等分薑三片加麥麩煎服 | |
| 二物茯苓粉散 治小兒頭汗兼治盜汗不止宜用粉身 | |
| 茯苓 牡蠣 <small>各四兩</small> | |
| 右下篩以粉八兩各搗為散有熱輒取粉汗即自止 | |
| 故扇散 治小兒盜汗 | |
| 故扇 <small>燒灰一分</small> 麻黃 <small>取根節三分</small> | |
| 右羅為散每服半錢乳食調下大小加減 | |



| | |
|--|--|
| 丹砂散 治小兒肌熱盜汗 | 丹砂 <small>研一兩</small> 白礬 <small>熬乾枯研二分</small> |
| 右再同研勻細每服半錢薄荷自然汁調下 | |
| 重湯丸 治小兒盜汗潮熱往來 | |
| 胡黃連 柴胡 <small>去苗等分</small> | |
| 右為末煉蜜丸如雞實每服二丸至三丸銀器內用酒少許化開入水五分重湯上煮十二三沸放溫食後服量兒大小加減 | |
| 欽定四庫全書 | 普濟方 |
| 治自汗方 | |
| 白朮 <small>一分</small> 小麥 <small>一分</small> | |
| 右用同煮去麥用白朮為末煎黃耆湯服之以愈為度 | |
| 止汗散 治小兒喜汗厚衣睡而額上汗出及遍身自汗肌肉虛也 | |
| 右用故蒲扇燒灰如無扇只將故蒲燒灰細服三錢溫酒調下無時 | |



| |
|----------------------|
| 麥麩散 治小兒盜汗不止日漸消瘦 |
| 右用麩皮炒黃為末三歲半錢煎猪脊髓湯調下 |
| 治盜汗 |
| 右用鬱金為末水調塗兩乳下 |
| 又方 |
| 用白朮剉碎用水濃煎時時與飲以知為度 |
| 治盜汗不止 |
| 用防風為末浮麥煎湯調服而愈 |
| 欽定四庫全書 |
| 普濟方 |
| 又方 |
| 用麻黃根節甘草節二味粗末水煎服 |
| 虎杖散 治實熱盜汗 |
| 用虎杖剉水煎服量多少與之無時一方為末三歲 |
| 半錢水半盞煎服 |
| 香粉散 治盜汗不止 |
| 藁本 牡蠣粉 川芎 白芷 蚌粉 麻黃根 |
| 分 各等 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----|--|---------------|----------------------|---------------------|--------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----|----------|
| 右為末週身傅之 | 建中湯減桂加人參 <small>傅氏活</small> 治盜汗補虛和陰陽治傷 | 寒自汗 | 黃耆 <small>一兩</small> 白芍藥 <small>三兩</small> 人參 <small>半兩</small> 熟地黄 甘草 <small>炙各半兩</small> | 右呶咀每服二錢大麥同煎服之 | 又方 治小兒虛汗心驚恍惚而汗頻流體熱心煩 | 硃砂 黃耆 人參 升麻 天竺黃 牡蠣粉 | 龍膽草 甘草 | 欽定四庫全書 普濟方 | 右為末每服半錢淡竹葉煎湯調下 | 牡蠣散 治小兒盜汗不止宜用粉身 | 牡蠣粉 麻黃根 赤石脂 <small>各一兩</small> | 右藥搗細羅為散入米粉二合拌令勻每日及夜間 | 常撲之 | 普濟方卷三百九十 |
|---------|--|-----|--|---------------|----------------------|---------------------|--------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----|----------|

