

欽定四庫全書

普濟方卷三百九十四 明 周王朱橚 撰

嬰孩吐瀉門

總論

夫小兒吐瀉因傷風冷或傷暑熱或兒啼未定氣息未調以乳乳之逆於上則停胸膈致令嘔吐氣逆於下則傷腸胃致令泄瀉上下氣逆吐瀉俱作若只吐不瀉者逆其吐必有痰發驚者十無一生若只瀉不吐或吐瀉

欽定四庫全書

普濟方

俱發者日久不退亦變陰痢治之當斷其乳輕者週時重者三日須與稀粥服藥速効十全八九或者不信是言小兒以乳妳為本慮其嗔煎不肯暫斷殊不知因乳所傷致令此病若以所傷乳乳之如抱薪救火藥何功之有不然則誠難以安痊其間不斷乳服藥得安者蓋輕患也亦有因輕致重天橫者多矣 凡小兒初吐發驚者尚可救治以玉散子青金丹不退珍珠丸急下之次與神寶丹若唇紅焦者琥珀散蓋內熱故也不退必



死又云吐妳不止大便不通面黑氣喘必死不治凡權
斷乳候吐瀉定捨去乳少少與之使不再作凡吐瀉服
藥須要令飢如服了不得便喫物喫乳則引吐再為害
也凡小兒暑月吐瀉冷熱輕重各有治法不可槩用如
吐瀉身熱煩渴心燥大便黃沫小便赤少暑瀉也黃龍
丸甘露散白虎湯香薷湯五苓散杏仁丸有傷食者必
吐瀉酸臭妙丸子下之次益黃散二者不退如小便通
利大便白色腸鳴吐瀉多渴少食附香丸參朮附散朮

欽定四庫全書

普濟方

附膏半硫丸神寶丹防驚其間有糞白腥臭油膩便成
疳瀉有以成疳瀉者亦有治法 小兒泄瀉傷積而作
瀉者初以補藥治不止之時須當下去其積積下其瀉
自止下之宜與小沉香煎丸理虛中積甚良多與服之
或以小塌氣丸又不下更與三稜煎服切不可意轉
藥恐成滌蕩矣積滯已下與服調胃溫脾藥及既濟丹
此乃理積止瀉夏月暴瀉由其臟寒虛滑利泄速與契聖
丹如滑不禁進滯腸散次與契聖既濟丹若洞利其瀉



實	之	亦	虛	白	以	青	安	木	水	爾	榮	胃	則	降	扶	有	不	其	不
脾	也	虛	傷	餅	益	白	去	散	穀	爾	衛	怯	醫	關	育	自	榮	候	常
肺	何	補	食	子	脾	乳	黃	加	生	自	不	弱	工	竅	身	利	虛	必	發
下	不	脾	初	微	散	物	承	以	其	利	順	自	何	不	體	亦	於	更	作
之	先	肺	不	下	三	不	務	車	胃	者	自	臟	以	開	血	自	表	療	駭
則	下	病	與	之	服	消	子	前	平	與	已	腑	良	通	既	利	也	瀉	人
不	後	退	大	又	補	身	二	瞿	調	順	上	不	餌	經	不	無	可	之	速
虛	補	即	下	與	肺	涼	歲	麥	陰	胃	自	和	性	絡	榮	汗	相	理	與
脾	曰	身	惜	益	散	加	病	薑	陽	平	利	冷	命	不	衛	者	待	豈	帶
更	便	溫	置	脾	三	噎	瀉	棗	制	調	皆	熱	何	適	裏	由	夫	可	腸
後	青	不	十	散	服	氣	衆	同	其	榮	由	相	以	榮	外	氣	夫	相	未
補	為	噎	日	三	三	昏	醫	煎	冷	衛	氣	保	持	不	不	不	自	待	了
之	下	氣	上	日	日	睡	止	更	熱	不	虛	持	夫	循	相	衛	汗	夫	次
也	臟	足	實	服	身	醫	轉	量	和	循	得	水	夫	環	裏	於	不	自	與
又	冷	也	下	止	而	謂	瀉	虛	其	臟	之	穀	水	臟	裏	裏	利	汗	術
云	先	有	虛	何	不	病	十	實	初	分	初	不	穀	腑	也	也	者	不	附
小	下	所	脾	以	噎	困	餘	加	生	其	生	分	分	不	參	其	由	利	湯
兒	必	傷	氣	然	氣	篤	日	減	小	陰	小	自	自	上	上	或	血	者	稍
傷	太	食	弱	利	後	錢	其	錢	兒	陽	兒	利	利	下	下	其	不	與	與
於	虛	仍	引	本	以	氏	証	氏	忽	不	忽	腸	腸	不	不	或	利	遲	遲
風	先	下	肺	脾	先	先	便	論											緩

欽定四庫全書

普濟方



此	中	過	召	子	除	必	人	六	進	少	雖	烏	藥	食	答	欽	不	哭	六	餘	歲	然	益	曰	宣	令	雖	使	不	能	不	冷												
子	出	遂	余	年	所	虛	問	服	三	補	多	獲	可	進	曰	定	分	而	神	日	七	後	黃	錢	風	脾	用	君	聚	解	已	吐												
脾	余	問	視	四	畜	補	曰	連	日	瀉	亦	挾	主	退	素	四	兼	丸	召	月	敢	散	氏	散	胃	有	丸	而	至	謂	瀉													
虛	曰	莫	之	歲	之	其	久	進	即	不	奚	萬	笑	者	問	庫	畏	益	醫	中	觀	者	經	去	氣	理	補	為	十	本	瀉													
之	食	先	見	六	物	虛	瀉	三	微	知	以	矢	曰	有	云	全	食	黃	或	瀉	之	譬	用	脾	其	其	胃	瀉	餘	傷	脾													
甚	廩	食	兒	月	然	而	之	日	食	輕	為	以	積	積	脾	書	受	散	作	食	為	曰	宣	後	然	錢	然	日	傷	風														
余	不	肉	食	中	後	後	病	喜	與	重	蓋	妄	矣	又	胃	濕	濕	并	食	物	防	彭	風	神	錢	錢	未	証	風	亂	以													
自	藏	否	田	瀉	再	其	何	食	紫	所	前	射	答	問	受	則	化	雜	或	不	其	祖	其	實	氏	周	脾	多	攻	溫	補													
歷	是	曰	雞	泄	補	病	再	瀉	子	以	醫	不	曰	何	濕	水	視	藥	作	化	虛	觀	理	丹	氏	間	睡	之	因	脾	不													
醫	門	近	肉	米	之	除	瀉	止	瀉	無	用	如	譬	治	也	穀	曰	攻	水	水	而	井	若	使	用	風	露	之	已	後	用													
未	戶	日	少	穀	主	也	也	尚	三	今	藥	一	如	也	不	分	渴	之	瀉	穀	無	自	何	君	此	風	晴	脾	氣	積	虛	內												
嘗	不	食	頃	不	人	今	答	有	五	用	知	逢	聚	益	孫	益	脾	無	疔	不	失	大	答	九	病	散	身	溫	在	脾	不	藥												
見	守	物	所	化	曰	病	曰	渴	次	益	次	蒙	千	黃	氏	黃	積	效	瀉	多	趙	仍	多	治	先	去	風	宣	風	胃	能	冷	治											
有	也	不	食	數	善	因	經	以	再	黃	序	大	夫	散	曰	積	主	在	用	少	不	以	矣	此	益	脾	宣	風	散	主	之	後	散	外	不									
經	得	化	肉	醫	國	食	云	參	益	散	連	舉	重	紫	脾	人	後	五	食	進	犀	車	余	法	藥	風	散	君	丸	補	胃	故	大	便	又									
過	守	并	即	止	學	積	邪	木	益	補	序	不	如	丸	虛	曰	見	苓	退	食	鈴	輪	所	多	先	補	三	服	補	胃	之	後	散	外	不									
之	者	藥	從	轉	劉	留	所	散	黃	一	服	得	一	子	者	曰	食	散	退	進	鈴	輪	以	愈	補	三	服	補	胃	之	後	散	外	不	又									
食	乃	失	隨	大	便	先	補	次	氣	主	日	安	主	二	畏	普	積	胃	受	濕	則	水	穀	不	分	兼	畏	食	而	物	不	化	是	脾	虛	中	有	積	主	人	曰	何	知	也



人	瀉	子	不	子	時	日	四	附	小	乳	曰	譬	已	更	當	欽	服	三	以	千	不	修	上	土	之	前	日	與	丸	當	派	之
曰	糞	大	可	余	與	依	更	子	兒	吐	還	猶	後	驚	斷	定	三	日	感	金	化	孫	治	附	法	後	冷	米	以	以	病	
受	酸	者	不	答	少	前	又	林	霍	瀉	舞	渴	時	疼	乳	四	日	應	丸	又	男	法	子	須	共	進	湯	還	病			
病	臭	五	投	云	妳	一	進	從	亂	則	為	而	素	氣	非	庫	瀉	丸	有	三	出	訶	揣	治	六	下	流	也				
不	召	歲	蓋	譬	調	服	二	以	須	精	戲	掘	問	急	附	全	甚	五	黃	歲	何	子	本	十	服	一	燈	宜				
同	余	腹	攻	賊	理	相	服	附	暫	神	則	井	曰	唇	子	書	召	苓	水	六	書	接	日	安	日	日	燭	用				
何	視	疼	其	害	五	間	病	子	斷	昏	宮	闕	夫	口	不	余	散	小	月	余	助	脾	末	愈	六	六	將	附				
用	之	陣	外	良	日	神	少	末	乳	憤	室	而	病	手	能	曰	即	中	中	曰	氣	沂	主	日	服	殘	子					
藥	並	陣	邪	民	全	室	減	半	今	何	皆	借	以	足	起	理	效	瀉	利	若	問	流	人	四	連	假	主					
同	用	嘔	客	兵	安	丹	五	錢	當	不	動	兵	成	俱	生	當	林	不	知	執	曰	而	服	進	他	人						
答	紫	吐	氣	又	林	後	更	薑	斷	止	何	不	而	冷	林	下	惜	傷	傷	古	藥	而	病	三	油	曰						
曰	丸	酸	烏	不	問	參	與	棗	乳	其	不	亦	後	煩	大	食	不	熱	視	法	何	而	退	日	而	莫						
大	子	臭	能	可	曰	術	神	煎	三	乳	止	晚	藥	渴	不	斷	肯	乳	之	守	株	源	米	即	再	太						
者	下	次	傷	不	純	散	室	水	日	則	其	乎	之	大	信	自	斷	也	見	株	冷	心	大	用	焯	余						
腸	之	者	其	用	陽	千	丹	中	頻	吐	舞	林	亂	乃	至	將	服	當	瀉	待	服	土	便	附	此	江						
疼	益	三	本	病	小	金	二	頓	與	瀉	則	漸	已	急	長	白	藥	斷	糞	兔	所	由	參	子	蓋	河						
吐	黃	歲	哉	勢	兒	九	服	冷	稀	自	宮	請	成	召	桿	木	三	乳	酸	也	蓋	木	散	心	陰	之						
酸	散	食	陳	既	何	三	退	服	粥	止	室	試	而	余	而	散	一	也	臭	脾	脾	散	食	土	之	欲						
因	補	物	氏	成	敢	日	七	半	隨	巢	自	救	後	曰	退	日	病	日	臭	服	屬	六	尚	訶	至	竭						
食	之	不	二	毒	用	病	分	盞	証	氏	定	之	治	病	至	病	增	服	臭	也	土	神	未	子	極	引						
傷	主	化		藥	附	除	來	至	服	云	傷	之	之	三	三	欲	服	片	服	編	益	病	一	為	須	別						



胃即大吐瀉也醫又行溫藥即上焦亦熱故喘而飲三	言所以然者言六月熱甚伏入腹中而令引飲熱傷脾	後至日不可服此三日內必服滿身熱飲水吐逆如所	化當補脾何以用涼藥王信衆醫又用丁香散二服前	也吐石膏湯三服并服之衆醫皆曰吐瀉多而米穀不	喘吐不定錢曰當以涼藥治之所以然者謂傷熱在內	不化衆醫用補藥薑汁調服六月中服溫藥一日而加	瀉爭工廣親北宅四大王宮五太尉病吐瀉不止米穀	乾噦瀉青褐水當補脾益黃散主之不可下也又云吐	玉露散八月十五日以後吐瀉只冷無陽也不能食乳	睛唇白多噦欲大便不渴食前多服益黃散食後少服	分熱七分冷也不消乳多似睡悶多噎氣長出氣睡露	黃散食後多服玉露散七月七日以後吐瀉身溫涼三	冷熱不消瀉黃白色似渴或食乳或不食乳前少服益	十五日以後瀉身溫似熱臟腑六分熱四分冷也嘔吐	或因傷熱乳食吐乳不止瀉深黃色玉露散主之六月	欽定四庫全書	普濟方	已後吐瀉身壯熱此熱也小兒臟腑十分中九分熱也	此上証多病於秋夏也又云秋夏吐瀉五月二十五日	欠頓心腎主不語畏明當瀉兒黃藏補脾益黃散主之	主睡露睛喘氣心主驚悸飲水脾主困倦多睡肝主呵	便青白色乳食不消此上實下虛也若史兼見肺証	兒初生三日已上至十日吐瀉身溫涼不思飲食大	也後和胃下用白餅子和胃用益黃散主人又云小	瀉壯熱不思乳食大便不消或白色當下之是傷食	理有瘡脾閉命沉沉錢氏論云小兒初生三日內吐	如針心悶氣粗而脇動口生白沫命難存來生此候須早	惡心乾吐霍亂汗相侵舌出唇緋雙眼閉搖頭髮直一	補即補隨其虛實而用也仁存孫氏曰吐瀉繞生便	難除二子瀉補俱安凡有積聚當下即下凡有虛損當	秘方云食瀉重當瀉脾虛用補虛再傷宜再取何患病	得瀉補自然安小者泄瀉酸臭亦傷食也法當溫之虛	也宜下之孫氏云腹內疼成陣來時嘔吐酸如因傷食
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



身熱吐瀉腹滿不進飲食可急與牛黃通膈丸過四五	至危亦於死中救生十得八九	羗活膏溫白丸鈎藤飲子之類調理至安仍頻與躬雖	加上服以意詳之漸減金液丹加白丸子兼用異功散	調灌之惟多乃效胃氣已生手足漸暖陰退陽回然猶	生其胃氣宜附子理中丸并金液丹研末煎生薑米飲	兼以異功散等溫藥調理之往往便愈若以虛損當速	余每用理中丸以溫其中以五苓散導其逆連與數服	胃至虛冷極故也錢至而愈又凡小兒吐瀉當溫補之	錢曰脾虛而不能食津少即效逆曰何瀉青褐水曰腸	即緩錢又用溫胃益脾藥止之醫者李生曰何食而呃	醫妄治之至於虛損下之即死當只補脾若使君子丸	下而一分補八月內十分補而無一分下此是脾瀉也	二物末之生薑水調下一字錢曰凡吐瀉五月內九分	與使君子丸補脾石膏湯退熱次日又以水銀錢硫黃	欽定四庫全書	或無不渴衆醫作驚治疑故睡也錢曰先補脾後退熱	其証全不食而昏睡睡覺而悶亂哽氣乾嘔大便或有	無不效者又云廣親宮七太尉七歲病吐瀉是時七月	成癖也實在內乃可下之下畢補脾必愈若隨其虛實	但以消積丸磨之為微有食也如傷食甚則下不下則	下之虛入肺則嗽入心則驚入脾則瀉入腎則益虛此	如婦人之失血也今吐痢不食壯熱者傷食也不可下	可縱酒慾若不保養不過壯年面上常無精神光澤者	縱長成必飢膚不壯不奈寒暑易入脾胃亦更怯虛不	色眊白神甚也黑睛腎也睛屬水本怯虛而故多病也	氏曰目中黑睛少而白睛多面色眊白此子必多病面	化下熱退而安云馮承務子五歲吐瀉壯熱不思食錢	芩腦子牛黃天竺黃茯苓以朱砂為衣與五丸竹葉湯	與白虎湯各二服四日用石膏湯一服旋合麥門冬黃	湯三服更以白餅子下之一日減藥二分二日三日又	日當死衆醫不能治復召錢至宮中見有熱証次白虎
-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



者	是	發	肺	青	飄	不	胃	却	所	先	以	不	食	皮	之	欽	冷	服	有	則	紙	方	水	多	者	九	時	又	膈	水	燥	行
脾	傷	熱	氣	風	張	定	主	後	至	生	錢	宜	藥	有	此	定	至	黃	治	聞	上	三	洗	或	大	欲	撮	久	通	調	藥	則
能	脾	宜	逆	傷	頭	故	四	其	則	家	氏	補	或	吐	地	四	令	連	法	見	之	年	石	生	便	飲	瀉	瀉	下	非	自	
生	須	下	而	為	項	變	肢	風	其	寶	加	再	紫	切	古	水	等	妙	頗	語	而	恨	既	下	黃	米	乳	聖	二	愈	矣	
涎	夾	傷	之	也	強	驚	胃	無	吐	小	減	傷	霜	可	人	穀	藥	多	不	可	無	不	傷	而	下	不	止	三	錢	蓋		
故	痰	寒	也	身	舉	風	痰	止	可	兒	益	丸	取	服	以	不	化	而	如	全	病	識	溫	赤	三	化	八	錢	瀉	乳		
衝	也	藥	也	上	雖	也	涎	處	也	吐	黃	其	其	又	此	泄	能	此	方	憑	可	証	蘊	或	日	九	月	頻	食	便		
胃	唇	後	發	各	多	故	閉	更	也	妳	散	積	積	傷	藥	瀉	別	有	一	治	故	熱	醫	有	愈	用	者	不	拘	屬		
而	是	平	熱	藥	服	止	却	入	吐	說	一	盡	瀉	瀉	為	若	其	通	則	悟	不	辨	者	乃	益	勿	時	五	水			
吐	脾	胃	肺	亦	也	主	即	外	妳	云	服	然	者	者	補	依	寒	透	得	其	冷	明	藏	黃	輕	若	甚	則				
妳	之	氣	主	能	驚	吐	驚	則	更	小	可	後	又	名	今	錢	溫	之	理	二	藥	但	中	散	非	深	於	造	化	者		
食	外	耳	身	救	風	發	神	潮	夾	兒	止	可	補	聚	人	氏	虛	理	不	則	然	用	有	湯	秋	深	冷	痢	泄	濕		
又	應	又	小	又	手	足	被	心	痰	妳	此	食	又	腹	所	當	實	然	尺	求	咫	訶	積	氏	米	大	每	服	二	元		
小	食	小	兒	小	足	小	外	胃	繞	有	切	取	日	不	稟	以	又	安	則	師	求	子	成	云	小	服	三	十	散	以		
兒	所	兒	吐	兒	小	兒	邪	管	吐	數	要	下	此	宜	同	益	冷	得	其	千	里	豆	因	產	母	飲	酒	者	未	易	語	
吐	故	妳	唇	邪	液	問	所	後	却	般	治	積	難	即	內	黃	乃	其	理	也	雖	蔻	產	母	飲	酒	者	清	白	此	者	
妳	黑	身	黑	所	問	煩	干	變	即	或	法	令	止	補	青	散	脾	哉	也	雖	三	等	藥	如	酒	者	清	白	此	者	屬	
身	其	熱	多	傷	燥	鼻	即	驚	風	是	漢	東	王	亦	用	主	虛	宜	也	雖	三	乎	讀	如	酒	者	清	白	此	者	屬	
熱	其	痰	多	故	故	鼻	驚	風	若	疾	王	亦	亦	用	青	受	宜	也	雖	三	乎	讀	如	酒	者	清	白	此	者	屬	火	
其	痰	多	故	故	鼻	鼻	驚	風	若	疾	王	亦	亦	用	青	受	宜	也	雖	三	乎	讀	如	酒	者	清	白	此	者	屬	火	涼
其	痰	多	故	故	鼻	鼻	驚	風	若	疾	王	亦	亦	用	青	受	宜	也	雖	三	乎	讀	如	酒	者	清	白	此	者	屬	火	涼
其	痰	多	故	故	鼻	鼻	驚	風	若	疾	王	亦	亦	用	青	受	宜	也	雖	三	乎	讀	如	酒	者	清	白	此	者	屬	火	涼



信乎吐之為害甚也	二子皆三歲更不可救	數醫因驚而卒別一子只吐神昏又一女只一吐聲	形氣已失知不從生也主人曰醫人之好利如此後易	還乃辭曰萬靈之要所全者形一身之先所存者氣今	欲發驚急以青金丹壽星丸射香餅琥珀散各二服不	食愚曰雖食而目鮮唇紅廢拭面目微腫虛氣不悅必	散去脾間風再利糞令稀仍困不醒睡散二服困退喜	日不通內以四順欽外以蜜導法得通不甚多以宣風	皆熱証也故先治食後以涼藥今吐雖定大便首尾五	作吐法當溫藥蓋兒大便三日不通唇紅頰赤小便赤	用慢驚藥防之而用涼藥答日本欲生急驚為傷乳食	面黑氣粗秘死急以珍珠丸下痰食主人曰既吐何不通	面黑氣粗是形氣相失靈秘下方云吐妳不止大便不通	乳而復昏困愚曰不可再吐又時時虛氣大便亦不通	大便未通主人以為無事更不服藥因與乳多再吐痰	欽定四庫全書	普濟方	丸召余曰是本傷食吐逆不合昏困唇紅此疾大逆以妙	子三歲口吐不瀉自吐數次昏困連日不消大便堅實	下証慎不可下也此乃脾肺受寒不能如食也王氏	當煎入藏君臣藥先大青膏後益黃散如先曾下減無	大便黃白色吐嘔乳食不消時咳嗽更有五臟兼見証	木瓜丸主之又曰傷風吐瀉身溫乍涼乍熱睡多氣粗	項藥調理如果不退却用羌活膏治之錢氏論云生	乳入腹與胃氣相逆則腹脹氣逆肚疼或為瀉亦依前	物冷氣入乳則腹變環又不捻除之仍以此乳食生冷	但生胃氣藥皆可以意與文之又乳母不忌口食生冷	証須進塌氣丸二三服不却曾膈却進觀音散二三服	唇白是也宜煖胃止之又小兒乳食不化腹急氣逆病	多渴面黃是也若吐不化夫青水是胃冷其人必面青	妳成片子者是胃有熱積久則生風也其人四肢生瘡
----------	-----------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------	-----	------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



吐
覘
附
論

夫小兒吐覘者由乳哺冷熱不調故也兒乳哺不調則
停積胃膈因更飲乳哺前後相觸氣不得宣流故吐覘
出診其脉浮無苦也又云覘乳與嘔逆不同宜細詳之
覘乳飽後覘出者是又云小兒生下有中吐覘妳形候
妳不穩而從口角頭流出身微熱口鼻微冷面目青黃
眼慢此候因乳母房室淫泆兒子叫更將乳與喫而陰
陽不順兒子胸膈不快喫乳停滯在於胃不消化而冷

欽定四庫全書

普濟方

致此所治者先以睡驚沉飲子夾丁香散與服夾活脾

散調理即愈

歌曰乳母寒溫不節量致令壅滯在胸堂
更加新乳相投觸不得通宣入胃腸此名

覘妳須調理診得輕浮尚不妨口眼時動不停吐中
時覺乳生腥眼渾青碧生白膜汗出津津脚似冰氣細元
因傷胃冷氣粗却是欲生驚是風從脾宜醫治暖胃和
脾氣乃平此候寒熱相勝使然也氣急則是胃實當涼
則愈若顛門陷下氣細當生胃氣若渾身熱甚者氣出
喘粗若不急治必作又云此候是驚妳衝胃或氣交妳
衝脾或是氣妳或是病妳致吐遠聞腥氣與蚘蝨九氣
細脉沉與調胃散

方

當歸湯治小兒吐覘



右為末每服半錢米飲調下	肉桂 <small>不見火</small> 各一錢	陳皮 <small>半錢</small> 去白	肉豆蔻 <small>麵裹炮赤熟</small> 去麪為末	草菓 <small>炮去皮</small> 各一兩	硝砂 <small>去</small> 皮	甘草 <small>炙</small>	荳蔻散治吐妳	右為末每服半錢嬰粟飲溫調下陳皮煎米飲亦得	匾豆 <small>各半</small> 錢	藿香 <small>一錢</small> 半	丁香	人參	白朮	茯苓	神麩	藿香散治小兒吐衄嘔逆身熱面青不進乳食	欽定四庫全書	普濟方	右粗搗節每服一錢水七分盞煎至四分去滓分溫二服早晚各一量兒大小加減	黃耆 <small>兩</small> 細辛 <small>去苗葉</small> 一分	人參 <small>各三</small> 分	當歸 <small>切</small> 芍藥	甘草 <small>炙</small> 芎藭 <small>各</small> 一	黃耆湯治小兒吐衄胸中冷氣停結	右切以水二升煮取八合服半合日三溫服	乾姜 <small>各二</small> 分半	當歸	黃芩	甘草	芎藭	黃連 <small>各一</small> 分	細辛
-------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------	--------	----------------------	------------------------	------------------------	----	----	----	----	----	--------------------	--------	-----	----------------------------------	--	------------------------	------------------------	---	----------------	-------------------	-------------------------	----	----	----	----	------------------------	----



麝香湯治小兒吐衄胸膈痞滿乳飲停積	麝香 ^研 木香 人參 沉香 ^剉 赤茯苓 ^{去黑皮} 各一分 丁香 ^半
右粗搗篩每服半錢水半盞煎數沸去滓分溫二服	
藿香散治吐衄	藿香 ^{兩半} 何首烏 白扁豆 甘草 ^炙 糯 ^{各等分}
右為細末半錢用水一小盞入淡竹茹煎至七分臨	
卧空心服	
欽定四庫全書	普濟方
治吐衄腹脹方	代赭石 麝香 巴豆 ^{各一分} 赤石脂 杏仁 ^{各半兩}
右為細末蜜圓如桐子大米飲下日三小一丸百日	
一歲二丸	
橘皮湯治小兒吐衄膈上冷	<small>方見本門 嘔吐類</small>
消乳丹治小兒飲乳過多胸膈不快或多吐衄大便燥	
瓣不消亦宜令乳後常服	
木香 丁香 青橘皮 ^炒 肉豆蔻 ^{各半兩} 牽牛子 ^炒	



錢一	右為末滴水丸如針頭大每服三粒至五粒粘在 妳頭上令兒吮之	鹽黃散治小兒初生吐不止	鹽 <small>兩黃</small> 牛黃 <small>兩粟米</small> 人參 白茯苓 <small>各一小</small> 甘草 <small>兩小豆</small>	右搗研四味為末丸以乳半合煎三五沸入牛黃末 攪勻分減服之	欽定四庫全書 普濟方	小兒嘔乳方此證嘔嘔吐下狀如霍亂	甘草 <small>炙</small> 人參 當歸 乾薑 <small>各一分</small>	右為末水一升煮取五分服三日內麝香半分尤佳	菖蒲丸治小兒吐乳喘促	菖蒲 人參 <small>去蘆</small> 赤茯苓 <small>各半</small>	右為末煉蜜和丸麻子大每服三丸以生薑湯化下 量兒大小以意加減	人參散治小兒吐乳令乳每服
----	--------------------------------	-------------	--	--------------------------------	---------------	-----------------	---	----------------------	------------	---	----------------------------------	--------------



人參 <small>一兩去蘆頭</small> 生薑 <small>切焙</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白瓢焙各半兩</small>	右為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓分溫二服令兒以飲稍乳效一方有蘇葉
治小兒吐奶方	雄黃 馬牙硝 <small>各一分</small> 壁魚兒 <small>五枚</small>
右藥入磁碗內研如泥以乳汁半合調之使藥注子內灌少許把兒頭項擡吐出黑血即定	治小兒咬奶吐下方
欽定四庫全書	普濟方
豆蔻 母丁香 宣連 <small>各一兩</small>	右為散空心米飲調下半錢
玉真散治小兒吐乳	白朮 <small>半兩</small> 半夏 <small>七個</small> 椒目 <small>半分</small> 去汗
右為末每服半字水一呷調下大者一字	青皮散治嘔奶
青皮 滑石 硫黃 <small>研各一錢</small>	右為末每服半錢藿香湯調下



麝香丸

麝香 一錢 研 丁香 搗末 杏仁 去皮尖雙仁 炒研各一分

右為末以粟米飲圓如麻子大每服五丸人參湯量

兒大小研下傅氏活嬰內有麻黃無丁香棗肉為丸

丁香丸治小兒乳後吐嘔不止 方見本門痢 類一作散

治小兒傷食吐乳方

丁香 石連肉 枇杷葉 薑汁塗炙 熟各等分

右為末每服一錢半飲調下

欽定四庫全書

普濟方

玉露散治小兒吐妳面色赤熱煩燥

不灰木 煨 滑石 等分

右為細末每服半錢或一字生油并水調下

治吐妳方

母丁香 三七粒 殭蠶 七個洗淨 去粉炒

右焙乾為末每服一字煎棗湯調

治小兒吐妳方

生薑 橘皮 等分



右煎湯與乳母服乳兒效

枇杷葉散治小兒吐乳不定

枇杷葉 拭去毛微炙黃色 母丁香 各一分一方只用丁香

右為散令乳母乳頭上塗一字與兒吮之兒大煎棗

湯調下不拘時

又方

生地黄 汁 人參 各一合

右粗和煎三五沸徐令兒服之

欽定四庫全書

普濟方

鹽豉丸治小兒嘔乳不止宜服此立效兼小沉香煎丸

鹹豉 七粒口內含去皮 膩粉 一錢七

右研圓如麻子大每服三丸至五丸藿香湯下乳頭

吻亦得

莎草根散治小兒吐乳

莎草根 炒去毛 甘草 炙剉各半兩

右為散每服一錢水七分盞煎至分去滓分溫二服

早晚各一量兒大小加減



人參湯治小兒吐乳母服

方見本門
嘔逆類

妙功散治小兒吐乳不止

用藜蘆焙洗為末以少許吹入鼻中噴三兩次立止

治小兒吐乳四肢皆軟謂之中人
用桂心三兩水二升煮取一升半分三服又以濃滓
塗五心常令溫暖

暖胃正氣湯治小兒吐乳及治霍亂吐瀉用核木皮以
水煎服生廣南如桑株

欽定四庫全書

普濟方

治小兒吐乳方

取田中地龍糞一兩研末空心粥飲調下半錢不過
三二服愈又方以葶根汁滴缸大入口中差

治小兒吐乳黃色方

以驢乳喫令大腸稍稍得利即毒氣便散

又方

取新熱馬屎一塊絞汗半合灌之效

小兒百日内積痰在胸膈吐乳方



取書中白魚七枚燒灰細研以乳調一字服之

又方

取故壁下鼠蝨七枚炙令焦細研以乳汁調半字服

又方保安散治小兒胃氣虛損因成吐妳

五倍子

一個生用
濕紙裹煨

右為細末每服一錢米泔水調下不拘時候若稟受

怯弱用湯畋盪過

平江所刊李侍郎朝正編類集本草方中余長子小孫服之皆効

異功散治吐乳胃虛

欽定四庫全書

普濟方

人參 白朮 茯苓 陳皮 肉豆蔻 木香

藿香葉

甘草

各等分

右為末每服一錢冬瓜仁湯下欲止吐住瀉陳皮米

飲調下

觀音散治身冷吐乳加全蝎慢驚陰癇

人參 白朮 白茯苓 陳皮 扁豆 蓮肉

藿葉

薏苡仁

丁香

甘草

各等分

右為末每服一錢木瓜蘇塩湯下如風痰在胸停積



而吐則與小紅丸

治小兒吐乳

母丁香

不拘
多少

右為末飯丸如芥子大每服五七丸鉛白霜湯下作散子煎亦得

吐乳不止恐成痺方

靈砂

一粒

青州白丸子

右同研為末米飲調下量兒大小與之吐久虛者對

欽定四庫全書

普濟方

用靈砂親試有效

治小兒吐乳大人吐食

用仙人杖水煮服

治小兒吐乳補虛羸止渴

以牛乳入生薑葱白煎量服

噦逆

附論

夫小兒氣弱不能勝乳致乳滿胃中氣既不得傳導復過呼吸風冷則使胃氣上逆故令噦又胃中虛冷其人



不能食者飲水即噦能節其乳食仍溜氣則噦自愈矣

方

木香丸治小兒脾胃虛寒噦逆不止

木香 草豆蔻去皮 青橘皮去白 檳榔剉 陳橘皮

肉豆蔻去殼 京三稜炮剉

右為末麪糊和丸如綠豆大每服五丸溫生薑湯下

或棗湯下量大小加減

人參丸治小兒胃寒多噦

欽定四庫全書

普濟方

人參 白茯苓去黑皮 陳橘皮去白 白朮 半夏湯洗

去滑各半分 甘草炙剉 乾薑炮各一分

右為末麪糊和丸如黃米大每服十丸或五丸煎蘘

香湯下量兒大小加減

肉豆蔻丸治小兒胃虛不思乳食噦逆膈悶

肉豆蔻去皮 生薑切焙乾 木香一錢 青橘皮浸去白

人參一分 白朮一分

右為末白麪糊丸如棗豆大每服五丸米飲下不拘



時	訶藜勒散治小兒吐噦不止	訶藜勒皮 <small>一分</small> 人參 檳榔 <small>剉</small> 甘草 <small>炙</small> 陳橘皮 <small>湯浸去白</small>
	藥湯調下	切沉香 <small>剉各半兩</small>
	右為散每服一字或錢半至一錢七量兒大小煎麥	
	人參丸治小兒胃寒多噦不入乳倉	
	人參 白茯苓 <small>去黑皮</small> 白朮 木香 山羊 丁	
	香	各一分
	右為細末白麪糊丸如綠豆大每服七丸乳前生薑	普濟方
	湯下量兒大小加減	
	丁香補胃丸治小兒胃氣虛噦逆	
	丁香 <small>一錢</small> 藿香葉 <small>一分</small> 附子 <small>炮裂去皮</small> 定粉 <small>炒研</small> 檳榔 <small>剉各</small>	
	分一	
	右為末滴水丸如桐子大每服一九至二九米飲下	
	不拘時量兒大小加減	



丁香散治小兒嘔不止

丁香 藿香

白茅根

剉各一分

人參

半兩去蘆頭

花葉桑

一兩微治吐逆不定方各一分

右為散三四歲兒每服一錢以水一小盞入生薑少

許煎至五分去滓不拘時熱服量兒大小加減治乳

生薑不用

人參散治小兒嘔逆不止心神煩悶

人參

去蘆頭

白朮

白茯苓

各半兩

甘草

炙微赤剉碎

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓不拘

時稍熱服量兒大小以意加減

麥門冬散治小兒多嘔心胸煩悶

麥門冬

一兩去心焙

甘草

一分炙微赤剉

人參

去蘆頭

陳橘皮

湯浸

去白厚朴

去粗皮薑汁塗炙

令香熟各半兩

右為散三四歲兒每服一錢水一小盞煎至四分去

滓稍熱頻服量兒大小加減

枇杷葉散治小兒胃氣虛冷嘔逆不止



枇杷葉 <small>炙去毛</small> 丁香 <small>各一錢</small> 白茅根 人參 <small>各一分</small>	右為細散每服半錢或一錢煎馬齒莧湯調下不拘時量兒大小以意加減	遂愈散治小兒嘔逆不止不進乳食及吐瀉霍亂不安煩燥不得睡腹脹小便赤澁煩渴悶乳傷寒霍病皆	効	滑石末 <small>一錢</small> 丁香 <small>二七粒</small> 藿香末 <small>半錢</small>	右同研勻細每服一字或半錢生油調下量兒大小	加減	草豆蔻散治小兒嘔不進乳食	草豆蔻 <small>三枚</small> 甘草 <small>一分</small> 人參 <small>半兩</small>	麝沉散治小兒嘔逆	麝香 <small>研</small> 沉香 <small>判各一兩</small>
--	-------------------------------	---	---	---	----------------------	----	--------------	---	----------	--



小加減

消乳進食治小兒噦逆腹脹

陳橘皮 浸去白 生薑 去皮切一味同炒黃色各一兩

右為末水浸炊餅心和丸如麻子大一二歲兒橘皮湯下七丸量兒大小以意加減

治小兒噦方

鹿角粉 大豆 等分

右為末相和乳調塗妳上飲兒

欽定四庫全書

普濟方

又方

生薑汁 牛乳 各五合

右剪取五合粉為二服聖惠方同以牛乳二合薑汁一合銀器中煎一沸一歲兒飲半合

人參散治小兒噦乳母服之

人參 三分去蘆頭 陳橘皮 一兩湯浸去白瓢炮焙

右為散每服三錢水一鍾入生薑半分煎至六分去滓熱服至夜三四服乳母服訖即乳兒效一方用乾



生薑

治小兒噦方

取牛乳一升煎取五合分五服無牛乳代煎三二沸服佳

黃耆茯苓散治小兒榮衛氣虛精神不爽面無顏色唇

口青白噦逆昏睡全不思食

黃耆蜜炙 茯苓去木 甘草炙 天南星炮 白扁豆 防風

白附子炮 肉桂去皮 山藥 白芍藥已上十味各等分

欽定四庫全書

普濟方

右件吮咀每服二錢水六分蓋生薑三片棗一枚煎至三分去滓溫服乳食前

嘔吐 附論

夫小兒嘔吐者脾胃不和也或啼呼未定而遽飲乳或因乳中傷冷令兒飲之皆致嘔吐蓋兒啼未息氣息未調遽令飲乳其氣尚逆乳不得下停滯胸膈胸滿氣急故令嘔吐乳母乘涼冷氣入乳乳變壞不捨除之因以飲兒壞乳入胃則令腹脹氣逆故變嘔吐又有小兒沐



<p>浴不避風冷風冷與血氣相搏胃生熱蘊為嘔吐當審其形証冷熱法治之又嘔者有聲吐者出其物也是皆出於胃氣不和足陽明之經胃之脉絡陽明之氣常行則順今逆而上故為嘔吐盖有胃寒胃熱痰水宿食攻之証又有傷乳氣妳之証非一故治法不同也楊氏曰吐嘔每大便秘上下壅遏氣不流行當思所以利導之明理曰嘔而脉弱微熱手足厥大小便自利乃虛寒之極是為難治千金方論云生薑乃嘔家聖藥為能散其</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>逆氣也金匱要略云半夏吐家良劑為能下痰飲也楊氏曰凡吐不問冷熱久吐不止胃虛生風必傳慢候若胃氣將絕不食厥當投虛砂兼以生胃回陽熱劑研服<small>歌曰風冷吹雙乳壞氣須凝乳兒成嘔吐氣喘腹膨</small> <small>皆成嘔逆病</small> <small>醫者貴調停</small> 又云吐証又有風壅吐即痰吐之氣吐即類胃寒吐理之驚吐即類熱吐積滯吐即類冷吐氣逆吐即類食吐療</p>	<p>方</p>
---	-----------------------	---	----------



十珍餅子治小兒兼大人嘔吐痰涎粥食難停無問新
久者並宜

丁香 沉香 木香 桂皮去 藿香 肉豆蔻 吳

茱萸 洗焙乾 半夏 湯洗適曝乾一 水銀 結砂 舶上

硫黃 各七錢半

右為細末同和勻煉蜜九如小豆大捻作餅子每服

十餅生薑湯下或化服亦可量病加減不拘時

調中正胃散治小兒中腕不和胃氣不正胃冷傷熱吐

欽定四庫全書

普濟方

逆煩悶神困力乏飲食不美虛弱思睡睡不安穩

香名木香散

藿香葉 白朮 人參 白茯苓 甘草 炙 陳皮

山藥 白扁豆 半夏麪 川白薑 炮各等分

右為末每服一錢水一小盞生薑二片棗半個煎三

二沸服

正氣丸治小兒食傷癥冷逆不升降嘔吐不已胸膈留

停積滯不化宜服塌氣丸或一向只作乾嘔噦聲頻



右為末每服一錢水五分薑棗同煎三分去滓服一	葉 <small>去毛炙</small> 黃耆 <small>炙</small> 乾木瓜人參 <small>各半</small>	白豆蔻肉豆蔻甘草芎藭陳皮 <small>去白</small> 枇杷	乳食並宜服此 <small>豆蔻散</small>	肉豆蔻散治小兒脾胃不和憎寒壯熱腹痛嘔吐不納	化下	豆大三二歲如龍眼核大五七歲如龍眼大薄荷湯	右末入水銀硫黃煉蜜為膏每服旋劑嬰孩如黑	欽定四庫全書 普濟方	桂 <small>去粗皮不見火</small> 全蝎 <small>炒</small> 水銀 <small>各一分</small> 硫黃 <small>三錢同上</small>	羗活獨活 <small>各去蘆</small> 人參白茯苓防風 <small>蚕頭者</small> 肉	羗活膏治小兒吐逆不止	與服	右為末煉蜜丸如指大每服一丸生薑棗子湯化開	茯苓甘草 <small>炙二錢</small> 乾薑 <small>一錢</small> 三稜 <small>炮二錢</small>	藿香葉厚朴 <small>生薑製</small> 陳皮半夏麩 <small>炙</small> 白朮白	作並宜 <small>一名香朴丸</small>
----------------------	--	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------	----	----------------------	---------------------	---------------	--	--	------------	----	----------------------	--	---	--------------------------



方無肉豆蔻

參香散消寒痰治嘔吐

人參去蘆 藿香葉 舶上丁香皮 丁香 白茯苓

各一兩 青橘皮去白 木香 甘草炙各半兩

右為細末每服一錢水一盞入生薑二片煎至五分

去滓放溫時時服

銀液乳香丸治小兒久吐不定

紅牙大戟 半夏二味用漿水煮 粉霜各一分 朱砂

欽定四庫全書

普濟方

膩粉各一錢 水銀砂子一皂子大

右為細末研勻用黃蠟鎔和丸如綠豆大每服一歲

二丸二歲三丸以上量大小加減類研大麻仁水下

砂仁散治小兒乳哺過飽嘔吐

砂仁方一分 白豆蔻 橘紅一錢 木香方一分 神

麪方一分 炒一錢 麥蘖炒一錢 甘草炙一錢

右為末每服半錢紫蘇湯泡飮飲調下

豆蔻散治小兒虛吐飲食之間便作嘔逆蓋由脾寒或



<p>覘無時吐後暈悶胸堂鬱結上下氣逆宜服香朴丸</p> <p>肉豆蔻 <small>一箇煨</small> 一錢</p> <p>藿香葉 <small>一錢</small></p> <p>木香</p> <p>丁香</p> <p>白朮</p>	<p>白茯苓</p> <p>甘草 <small>炙各一錢</small></p>	<p>右為末煎藿香棗子湯調下一錢半生薑湯亦得</p>	<p>丁香湯治小兒吐逆</p>	<p>丁香 <small>半</small> 桂 <small>去粗皮一分</small> 人參 <small>兩半</small> 甘草 <small>炙半兩</small> 藿香葉 <small>一分乾</small></p> <p>薑 <small>炮製半兩</small> 白茯苓 <small>去黑皮一分</small></p>	<p>右粗搗篩每服半錢水五分盞同煎至三分去滓温</p>	<p>欽定四庫全書</p> <p>普濟方</p>	<p>服入棗煎更佳</p>	<p>益胃散快膈益脾止嘔逆</p>	<p>木香 丁香 藿香 陳皮 縮砂 白豆蔻 <small>各一分</small></p> <p>甘草 <small>炙一錢</small></p>	<p>右為細末每服三字煎薑棗湯乘熱調下或加茯苓</p> <p>尤加</p>	<p>勻氣湯寬中止嘔吐</p>	<p>白朮 <small>三分</small> 人參 丁香 厚朴 <small>薑製炒</small> 甘草 青鹽 <small>各半</small></p>
---	--	----------------------------	-----------------	---	-----------------------------	--------------------------	---------------	-------------------	---	---------------------------------------	-----------------	---



兩	右慢火炒香熱碾為末每服半錢至一錢沸湯點服				
治小兒吐累醫不瘥方	水精 <small>一分</small> 當門子 <small>三枚</small> 胡黃連 <small>三分</small> 乾蝎 <small>一枚</small> 火燒 <small>勿色</small> 代赭				
石	金箔 <small>各二分</small> 黃鹽 <small>四分</small> 陶隱居云鹽革粒 <small>粗用作魚鮮及醃</small>				
右同研令細勻於中夜取蟾酥為丸如黍米大一丸	至二丸熱水吞下瘥				
靈苑黑丸子主退熱定吐逆兼食傷方大人小兒俱治	欽定四庫全書				
山茵陳	蜀升麻	常山 <small>各半</small>	芒消 <small>半</small>	麻黃 <small>去節</small>	
兩	官桂 <small>去粗皮</small>	附子 <small>一箇燒黑留心</small>			
右同為極細末旋炒一大錢入杏仁二粒去皮尖燈	燒黑存性巴豆粒壓去油寒食麪糊為丸如麻子大	每服五丸吐不止茺根竹葉湯下熱攻瀉血蜜炒生	薑湯下若吐血眼皆出血者生油冷酒下傷寒手脚	心冷冷茶清下失音竹瀝酒下並每服五丸大人丸	如綠豆大



王子湯治小兒吐不止	赤石脂 <small>九</small> 黃連 甘草 <small>炙</small> 乾薑 <small>片</small> 黃芩 <small>二錢</small> 膠 <small>一</small>
如指 大黃蠟 <small>一彈子</small>	
右水三升煮取一升內蠟并膠令洋盡為三服或四五服以意加減	
丁香膏治小兒吐逆兼治大人	
丁香 藿香 <small>各一分</small> 硫黃 <small>二分</small> 柿蒂 <small>十個</small> 水銀 木香 <small>各一分</small>	
槐花 蠟茶 <small>各半兩</small>	
欽定四庫全書	普濟方
右先研水銀硫黃令勻入在衆藥末內煉蜜和成膏以蠟裹大人一杏核大煎桑葉湯甚者三服小兒量大小加減一皂子大薄荷湯下	
半夏湯治小兒大吐下心結堅食飲不下嘔逆欲死並霍亂後吐不止短氣煩滿	
半夏 <small>四錢</small> 黃芩 甘草 乾薑 橘皮 當歸 人參 <small>各三分</small>	
右以水四升煮一升半二百日見服三合若腹痛加	



當歸三分嘔逆甚加橘皮三分	人參散調中和氣止嘔逆除煩渴昏困多睡乳食減少	兼傷寒時氣胃氣不順吐痢止後躁渴不解	乾葛 <small>二兩</small> 人參 <small>一兩</small> 白茯苓 <small>去皮各一兩</small> 木香 甘草 <small>炙</small> 藿	香葉 <small>各一分</small>	右為末每服一錢水一中盞煎七分去滓溫服不拘	時	定吐紫金核治小兒一切嘔吐不止	欽定四庫全書 普濟方	半夏 <small>湯洗七次</small> 人參 白朮 木香 丁香 藿香	各二錢半	右為極細末稀麪糊丸如李核大後用沉香一錢為末硃砂一錢水飛二味同研勻為衣蔭乾每服一丸	用小棗一枚去核細藥在內濕紙裹燒熟嚼與小兒服後以米飯壓之	丁香溫胃丸治小兒胃氣虛弱多痰吐逆乳食雜停	丁香 <small>二錢</small> 水銀 黑鉛 <small>半分與水銀結成砂子</small> 白豆蔻 <small>去皮一分</small> 天
--------------	-----------------------	-------------------	---	-----------------------	----------------------	---	----------------	---------------	---------------------------------------	------	--	-----------------------------	----------------------	---



服	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不拘時	分一 陳橘皮 一分去 白煨	人參 一分 訶藜勒 半兩煨 存性 丁香 一分 草豆蔻 一分 去皮 甘草	溫膈散治小兒胸中有寒氣嘔吐不下乳食	右為末稀麪糊丸麻子大每服五丸米飲下日二服	蓮 各等分	丁香 木香 青皮 生肉豆蔻 京三稜 蓬	欽定四庫全書 普濟方	消乳丹治乳哺不化停滯中腕或作嘔惡	分去滓溫日二三服	右為細末每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎至七分去滓溫日二三服	白木散治小兒吐嘔脈遲細有寒稟氣弱	或三四丸丁香湯下	右為末用黃蠟一兩鎔和成丸如綠豆大每服二丸	南星 一分漿水煮透軟 切作片子焙令乾
---	----------------------	---------------------	---	-------------------	----------------------	-------	---------------------	---------------	------------------	----------	------------------------------	------------------	----------	----------------------	-----------------------



肉豆蔻丸治小兒脾胃氣逆嘔吐不止	服量兒大小以意加減	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓稍熱頻	陳橘皮 <small>湯浸去白</small>	丁香 人參 <small>去蘆</small> 茺菀根 麥門冬 <small>去心焙</small> 甘草 <small>炙微赤剉</small>	丁香散治小兒嘔心煩不納乳食	兒大小加減	右為末入麝同研勻不拘時以生薑湯調下半錢量	欽定四庫全書	普濟方	劉 <small>赤</small> 枇杷葉 <small>拭去毛微炙</small> 麝 <small>半分細研</small>	丁香 人參 <small>去蘆</small> 白茯苓 木香 葛根 甘草 <small>炙微</small>	丁香散治小兒嘔吐不定	右為末麪糊和丸如麻子大每服十粒溫湯下	分 各一	人參 丁香 乾薑 半夏 <small>洗七遍各半兩</small> 白朮 陳皮	痰涎	治小兒乳哺飲食溫冷過多傷於脾胃腸脇脹滿多吐
-----------------	-----------	----------------------	-------------------------	---	---------------	-------	----------------------	--------	-----	---	--	------------	--------------------	------	---	----	-----------------------



<p>肉豆蔻<small>去殼</small> 木香<small>細研</small> 訶藜勒皮 硃砂<small>細研各一分</small> 人參</p>	<p>右為末同研勻麪糊和丸如麻子大三四歲兒不拘時粥飲下量小大加減</p>	<p>人參散治小兒嘔逆</p>	<p>人參<small>去蘆</small> 白朮<small>炮製</small> 半夏<small>湯洗七遍</small> 桑根白皮 陳橘<small>湯浸去白瓢</small></p>	<p>右為散每服一錢水一小盞生薑少許棗一枚煎至五分去滓溫服量大小加減</p>	<p>養中湯養脾胃治嘔吐</p>	<p>大附子<small>炮製去皮</small> 沉香 木香<small>各半</small> 人參<small>去蘆</small> 官桂</p>	<p>半夏<small>湯浸七遍焙乾各一兩</small></p> <p>右為細末每服一錢水一小盞生薑三片煎至五分去滓溫時服</p>	<p>良溫膈湯勻氣治嘔逆</p>	<p>丁香 草豆<small>去皮</small> 人參<small>去蘆各半兩</small> 青橘皮 檳榔 甘</p>
--	--------------------------------------	-----------------	--	--	------------------	---	--	------------------	---

欽定四庫全書

普濟方



草 <small>灸各一分</small>	右為末每服半錢入生薑自然汁少許溫湯下
真珠丸治小兒吐諸藥不效者	水銀 <small>砂子</small> 輕粉 <small>各一錢</small> 丁香 <small>一分</small> 紅牙大戟 <small>一兩半</small> 乳香
五靈脂 <small>末各半兩</small>	右為細末用黃蠟九錢鎔入藥末攪勻和丸如粟大每服五丸煎馬齒莧湯下
香葛半夏散治痰逆嘔吐胸膈痞滯煩渴冒瞀壯熱頭痛	欽定四庫全書 普濟方
藿香葉 乾葛 牙硝 滑石 <small>各三分</small> 半夏 <small>半兩</small> 甘草	右為細末每服一錢水八分盞入生薑三片木瓜少許同煎四分去滓溫服不拘時
朱沉煎治小兒嘔吐不止	硃砂 <small>二錢</small> 沉香 <small>二錢</small> 藿香葉 <small>三錢</small> 滑石 <small>半兩</small> 丁香 <small>十四箇</small>
右為細末每服半錢用新汲水一盞芝麻油點成花	



子抄藥在上須臾墜濾去水却用別水送下空心	訶梨勒丸治小兒脾胃不和吐逆不止	訶梨勒皮 <small>二枚煨</small> 丁香 <small>一錢</small> 陳橘 <small>湯浸去白</small> 半夏 <small>湯洗</small>	<small>去滑炮</small> 人參 <small>一分</small>	右為末以生薑自然汁煮麪糊丸如綠豆大每服七	丸薑湯下乳食前	麥門冬散治小兒嘔吐脉類有熱	麥門冬 <small>去心</small> 半夏麪 人參 茯苓 <small>各二錢</small> 甘草 <small>一錢</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服二錢水一盞薑三片煎五分去滓温	日二三服	藿香散治小兒生十日至半月嘔逆不止	藿香 <small>一分洗</small> 紫苑 <small>一分洗</small> 甘草 <small>半兩炙</small> 麥門冬 <small>三分去心焙</small>	桂心 <small>半分</small>	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓温以綿	點取滴口中一日次第取盡	葛根散治小兒嘔煩渴
---------------------	-----------------	--	---	----------------------	---------	---------------	---	---------------	----------------------	------	------------------	--	----------------------	----------------------	-------------	-----------



萬安丹治胃虛久吐	九五歲以下五丸生薑桃葉湯下	服如霍亂吐逆煎桃葉湯下小兒吐逆不定三歲二	每服五丸至一七溫生薑湯下橘皮湯亦得食乳後	右為細末入巴豆令勻麪糊和令得所丸如黍米大	百一十箇 去皮去油二	丁香 三兩 肉豆蔻 三十個 木香 半兩 五靈脂 二兩 巴豆	欽定四庫全書 普濟方	霍亂嘔吐	痞塞不通此藥主消積滯生冷留宿食止痰逆惡心	丁香丸治小兒吐逆兼大人腹脹滿脇肋刺痛胸膈	丁香散治小兒吐逆不定 <small>方見本門 嘔逆類</small>	五分去滓放溫量兒大小加減服	右為散每服一錢以水一小盞入生薑半片大棗煎	葛根 剉 人參 去蘆 桑根白皮 剉 白朮 陳橘皮 湯浸去瓢	焙各半兩 半夏 一分 湯浸七遍去滑
半夏 湯洗七遍焙乾為細末	硫黃 末	白朮 炮為末	硃砂 半兩 細研												



水飛 附子 一枚炮製去皮 臍搗為末	右同拌勻生薑汁和丸如黍米大每服十粒米飲下	葛蒲散和心胃治嘔吐	葛蒲 一兩寸 九節者 丁香 人參 去蘆 木香 檀香 各半	右為細末每服半錢至一錢入生薑自然汁少許同	白湯調放溫冷下量兒大小加減	藿香散治小兒脾胃不和吐逆	藿香葉 半 兩 人參 丁香 葛蒲 一寸九 節者 半夏 薑汁 製各	欽定四庫全書 普濟方	分等	右為細末每服一錢水一盞生薑二片煎至四分去滓服	白朮散治嘔吐滋津液	白朮 一兩 兩 陳橘皮 湯浸去 白焙乾 人參 去蘆 桑根白皮 剉半	夏 湯浸七遍焙乾 已上各半兩	右為細末每服一錢水一小盞入生薑三片煎至五分去滓溫服
-------------------------	----------------------	-----------	---------------------------------	----------------------	---------------	--------------	---	---------------	----	------------------------	-----------	---	-------------------	---------------------------



香葛湯治嘔吐後渴其津液燥少	藿香葉 白茯苓 甘草 <small>炙各半兩</small> 丁香 乾葛根 <small>剉</small>	人參 <small>去蘆各一兩</small>	右為細末每服一錢或半錢入麝香少許以生薑湯調下溫服量兒大小加減以意	枇杷葉散治小兒嘔吐煩渴	枇杷葉 <small>去毛炙黃一兩</small> 白茯苓 甘草 <small>炙各半兩</small> 人參 <small>去蘆頭</small> 丁香 <small>各半兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	右為細末每服半錢紫蘆湯下量兒大小以意加減與服	丁香散治小兒胃虛氣嘔吐不定精神羸困霍亂吐乳一名參散	丁香 藿香 <small>出枝梗各一分</small> 人參 <small>半兩去蘆頭</small>	右為散每服一錢水半盞煎至五七沸入乳汁少許去滓稍熱時服不拘一方入乳香少許一方煉蜜為丸綠豆大每服三丸粥飲下亦治孩子霍亂吐瀉
---------------	--	-------------------------	----------------------------------	-------------	--	---------------	------------------------	---------------------------	---	---



面色青冷汗或四肢冷

治小兒吐逆兼吐痢不止

丁香 藿香 木香 硫 滑石
各一分 半兩別研 研如粉 令極細

右為末每服一錢或半錢米飲下量大小加減如瀉
用附子一枚重半兩者炮去皮臍為末以薑汁搗成
餅子將白麪裹之慢火煨麪熟去麪只將附子切焙
再為細末每吐及瀉入末如藥三之一量虛實以米

欽定四庫全書

普濟方

飲下吐如激水者亦宜服

益中湯治嘔吐兼泄痢

人參 青橘皮 丁香 訶黎勒皮
去蘆頭 各半兩 一分

右加桂心一分草豆蔻三枚去炒同為末每服半錢
米飲下

治翻胃嘔逆方

硃砂 礞砂 礞砂 巴豆 柏子仁
各半錢 十粒 去油 七粒

右為末用酸醋浸蒸餅糊為膏油紙裹旋丸如綠豆



大米飲下一丸常服薑湯下

治小兒吐藥方

川當歸

洗

甘草

灸各一分

桂心

不見火

枳殼

湯浸去瓢切

黃芩

炒

黃比

五味子

揀淨各半兩

右為細末每服一錢水七分盞煎至五分溫服大人

亦可加藥末三錢水一盞煎七分服

雞舌香丸治吐

雞舌香

二箇

母丁香

七箇

附子

炮去皮臍

硫黃

水銀錫砂

欽定四庫全書

普濟方

子各二錢

右為末糯米粥為丸如梧桐子大米飲化下一丸不

拘時

大戟丸治小兒大人吐

大戟

水略煮過焙乾為末

丁香

各半兩

膩粉

一錢研

水銀砂子

硃砂

各一錢半

右為末黃蠟半兩乳香皂子大用蠟同化為汁和藥

為膏旋丸如綠豆大每服三五丸小兒如黃米大二



三九熱吐研芝麻油水下冷吐煎丁香湯下驚吐煎
馬齒莧湯下

沉香降氣湯治氣逆嘔吐蓋因乳母憂悶愁慮或有
忿怒之氣乳兒隨氣而上不能剋化故也當先解乳
母去忿怒服五膈寬中散訖捨去敗乳服罷即仰卧
一霎時令藥行入乳脉然後令兒服此藥乳母亦宜
服

香附子 二兩 半炒 沉香 二錢 半 甘草 半兩 炙 砂仁 半兩

欽定四庫全書

普濟方

右為末鹽湯點下量兒大小以意加減

水銀丸治小兒一切吐逆不止 一名香銀丸

水銀 結砂子半錢 一方用半兩 丁香 葛根 各一兩 半夏 湯浸七遍焙一

右搗為末生薑汁和麪糊為丸如黃豆大每服三丸
煎金銀湯下更量兒大小加減服

乳香丸治小兒吐逆不定

乳香 研 丹砂 研 麝香 研 半夏 各半兩 湯浸七次 生薑汁炒令黃



右搗研為末麪糊為丸如綠豆大每服五丸米飲下 量兒大小加減	治嘔吐不止	蓮心 <small>二十箇</small> 香附子 <small>三箇</small> 吳茱萸 <small>七箇</small> 丁香 <small>七箇</small>	右一處瓦上炒黃研為末以乳汁調塗乳頭上令兒 吮食	半夏散治暑伏熱生痰嘔吐中痞	半夏 <small>五錢</small> 赤茯苓 <small>去皮</small> 甘草 <small>生各二錢</small> 陳粳米 <small>五十粒</small>	欽定四庫全書 普濟方	右剉焙加生薑煎服不止調薑茹服	竹茹湯治胃熱嘔苦汁	青竹茹 <small>如指</small> 半夏 <small>七枚</small> 粳米 <small>四十粒</small> 乾葛 <small>三片</small>	右剉薑煎大小以意加減	益胃湯治小兒胃虛身熱嘔吐不止	丁香 人參 桂心 阿膠 <small>各等分</small>	右為細末每服一錢水六分盞生薑三片同煎至四 分溫服
--------------------------------	-------	--	----------------------------	---------------	--	---------------	----------------	-----------	---	------------	----------------	--------------------------------	-----------------------------



藿香散治小兒嘔吐不定

藿香 丁香 代赭 甘草
炙微赤剉 各半兩

右為散不計時以溫水調下半錢量兒大小以意加減

治小兒吐下後內虛氣奔上飲食而煩方

厚朴 六分 桂心 四分 枳實 三分 生薑 二分

右切以水二升煎至一升一合為三服

塌氣丸治嬰孩乳食不化腹急氣逆吐不止

欽定四庫全書

普濟方

巴豆 十片是 胡椒 十粒 丁香 十筒 青橘 十筒湯浸一宿

入豆半筒椒一粒 丁香一筒綿纏定

右用礬米醋一碗煮青橘候乾了醋為度取出細切

青橘同諸藥焙乾為末粟米糊為丸粟米大每服三

歲五丸七丸七歲十丸米飲下日三服

香朴散治嘔吐調冷熱

丁香 麥門冬 去心各半兩 厚朴 去粗皮塗生薑汁炙令香熟為度

參 去蘆頭各一兩



右為末每服一錢水一盞入生薑二片棗一枚同煎至五分去滓溫服
人參散治小兒吐逆
人參 <small>末二分</small> 丁香 <small>末一分</small> 藿香 <small>末</small> 甘草 <small>炙各半兩</small>
右和勻每服一字半錢飯飲下
輒紅丸治小兒兼大人吐逆
朱砂 信砒 <small>各半兩強</small> 胭脂 <small>一錢</small> 巴豆 <small>七箇取霜</small>
右鎔蠟少許油三兩滴和藥為劑以油單裹之大人
欽定四庫全書
普濟方
如綠豆大小兒如芥子大大濃煎槐花耳草湯溫下一丸忌熱食半時
白餅子治小兒逆吐
白滑石 黃鷹條 <small>各一錢</small> 半夏 <small>一枚炮製</small> 蛤粉 <small>半錢</small>
右為細末薄麪糊丸如豆蔻大捻為餅子每服三餅丁香湯下新生兒湯內研灌半餅
天台烏藥丸治翻胃吐逆腹內虛鳴
天台烏藥 <small>醋炙或炒</small> 半夏 <small>各半兩</small> 白薑 <small>一分</small> 羊屎 <small>十粒羊腹內者</small>



右用文武火炒為末，鎔蠟為丸，如綠豆大，每服五丸，至七丸，紅酒下。
玉靈丸治小兒久吐逆。
半夏 白麪 各一兩 天麻 半兩 天南星 大者一箇
右為末，薑汁化柳膠為丸，如黃米大，每服十丸，至十五丸， 水煎四沸以煮，水下如無水，以柳枝三兩煮之，亦妙。後服太醫局丁香散。
硫黃半夏丸治小兒吐逆不定，虛困生風。
欽定四庫全書 普濟方
硫黃 半夏 各半兩，湯浸洗七次。 蝎稍 白附子 各一分
右為細末，麪糊丸，如綠豆大，生薑米飲下。
治嬰孩吐逆方。
丁香 胡椒 半夏 乾葛 各一錢
右為末，每服一錢，生薑二片，水一半，盞煎至六分去滓，溫服，量兒大小加減。
定生丸治小兒吐逆不定，久必生風，化痰和胃氣。
半夏 一兩 胡椒 半兩，同炒。 蝎尾 半錢 乾薑 二錢



右為末薑汁糊丸如小豆大三歲三十九薑湯送下
食乳前

治傷食吐不止方

丁香二十粒 巴豆一箇去皮 烏梅二箇 縮砂仁五箇

右搗和得所丸如粟米大每服二三丸煎藿香湯下
乳後服

長生丸治小兒吐胃冷清上實下補脾去痰

木香兩半 枳殼一兩去瓢 全蝎二十箇 半夏二錢薑湯炮七

欽定四庫全書

普濟方

次 檳榔三兩不見火

右為末加入豆蔻縮砂丁香末各三錢再同上項藥
末研令勻以飲和丸粟米大每服五十九空心乳汁
飲湯下候半時方進乳食日三服吐乳食者胃中有
冷也乳食不消化脾虛也大便秘酸臭氣者飽傷也此
三項並宜多服長生丸妙量兒大小加減

枳殼桔梗湯治邪正交爭冷熱不調作為腹痛嘔吐

桔梗去蘆 枳殼去瓢 青皮去瓢 陳皮去白各五錢



右加木香三錢當歸粉草各五錢同為散每服二錢
水一盞薑二片煎溫服

治小兒嘔乳方

蓮子心七箇丁香三箇人參三寸

右為細末以綿裹妳指蘸妳汁付藥末在上令兒呷
之

厚朴湯治小兒嘔吐不止

一名人參飲子

厚朴去粗皮生薑汁製人參各一分粟米炒一合

欽定四庫全書

普濟方

右搗篩每服一錢水七分薑二片同煎至四分去滓分溫二服早晚各一更看兒大小以意加減
一方用粗倉米煮絞汁與服百日半合一歲三服

丁香散治小兒吐逆不定

方見本門嘔逆類一名丁香湯

麥門冬散治小兒吐逆

麥門冬去心炮石膏生用甘草一分炮

右為散每服半錢量兒大小加減煎茆香根生薑湯

調下



丁香湯治小兒胃氣寒嘔吐不止不下乳食

丁香錢一胡椒錢一檳榔一枚

右粗搗篩每服半錢水一盞入白荪根少許同煎至

三分去滓溫服不拘時量兒大小以意加減

掌中丸治小兒乳食即吐下不能水乳者

白豆蔻十四箇甘草半兩半縮砂十四箇

右為末逐旋安掌中令兒乾噉兒小乾糝口中

平胃丸治小兒吐主養氣實胃

欽定四庫全書

普濟方

馬芹子生白殭蠶直丁香各等分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服一丸陳皮湯化

下凡諸疾覺胃氣稍怯即服之

人參散治小兒胃中有寒多吐清水不能乳食

人參半兩去厚朴半兩刮陳橘皮塗生當

歸一分剉丁香一分白朮半兩

右拌藥搗羅為末每服一錢以水一小盞入生薑少

許同煎至五分去滓不計時候量兒大小以意加減



服一方無人參厚朴陳皮

參半丸治小兒久新吐

半夏三錢 人參三錢 藿香三錢 甘草半錢 丁香十四箇 訶

子一箇煨
去核

右為細末陳米作薄糊丸如麻子大每服百睥者十
丸至十五丸半年一歲者可服三十丸

人參散治小兒嘔吐不止心神煩悶惡食氣

人參去蘆 丁香 菖蒲各一分

欽定四庫全書

普濟方

右為散每服一錢水一小盞入生薑少許煎至五分
去滓放溫量兒大小漸漸與服

不換金散治小兒吐逆

片子薑黃 草龍膽各一兩 乾葛一兩

右為細末五歲以下小兒每服半錢用重帛裹藥
在內以線扎定放入甜水半盞中慢火煎存三分溫

服

藿香散治小兒吐逆



藿香	赤麴	各二錢	半夏	一錢	薑汁製	
右為末每服半錢南木香湯下木瓜湯亦得三服立止次用調中湯						
調中湯						
枳殼	二錢	陳皮	半夏	人參	各一錢	
右為末每服一錢水一盞薑棗煎六分服						
治小兒吐逆不定方						
丁香	四十	葛根	末一錢	半夏	七粒湯浸洗七次	
欽定四庫全書 普濟方						
右為細末用溫湯浸蒸餅為丸如黃米大每服十九煎葛根湯下不拘時候						
油珠散治小兒吐						
滑石	丁香	各末	猪牙皂角	去皮用蜜炙	黃色各一錢	
右為末每服半錢用漿水半盞滴好油一點在漿下抄藥在油星上候沉下調灌之不拘時候						
藿香散治脾胃虛有熱面赤嘔噦涎嗽及轉過度者						
麥門冬	去心焙	乾秤	半夏	炒	石膏	半兩



右加入甘草半兩藿香葉一錢同為末每服半錢水
一盞煎至七分食乳前溫服

平胃散治吐逆頻併手足心熱不進乳食

紅麴 三錢半
年久者 甘草 錢 炙一 白朮 一錢半
麩炒

右為末每服半錢煎棗子米飲

煨附丸治小兒積滯吐胸堂鬱結中脘痞悶氣不舒暢

聞噦嘔逆即吐宜服煨附丸溫中丸

黑附子 二錢
末 丁香 五箇

欽定四庫全書

普濟方

右以水和附末裹丁香再用麪劑包於塘灰中煨熟

去麪為末生薑自然汁丸如麻子大每服三十九

煎薑棗湯下

半丁丸治小兒痰吐風壅所致或因感風痰盛咳嗽作

熱煩悶神不安穩睡眠不寧可進飲食或因欲食飲

食之即嘔蓋由風痰在膈飲食不下宜服此丸

半夏 半服者半兩湯
浸洗七次為末 丁香 一錢
研碎

右將半夏末水搜作劑包丁香再以麪劑裹煨令



白滑石 <small>錢二</small> 黑魚膽 <small>乾者 五枚</small>	滑石散治小兒吐逆	粥飲化一丸	右以膽中汁和木香末丸如大豆大每服二歲以下	木香丸治小兒吐逆 <small>木香 末 各一分 黑犬膽 各一分</small>	小加減服	右各半兩切作片子水一盞煎至五分去滓量大	欽定四庫全書 普濟方	木瓜湯治小兒吐逆不止 <small>木瓜 生 不去皮</small>	無竹葉	右研細為散竹葉糯米湯調下一字止一方用生薑	石膏脂散治小兒吐逆不止及霍亂吐瀉 <small>石膏 一分一方 脂 一分一方 白滑石 二錢一方 用三錢</small>	丸淡薑湯下昔李正字 [□] 傳以治療多效	熟去麩為末生薑自然汁丸麻子大每服三二十
---	----------	-------	----------------------	---	------	---------------------	---------------	---------------------------------------	-----	----------------------	--	-------------------------------	---------------------



右搗研為散每服半字倒流水調下
麝香湯治小兒吐逆不止

麝香一錢
研一錢
五靈脂一兩
為末

右拌勻每服一錢水酒各半盞煎至半盞去滓溫分
二服量兒大小加減

硃砂丸治小兒乾嘔惡嘔吐不定

丁香 白朮 天南星生薑汁製
白茯苓去皮 人參

去蘆頭
各一錢

欽定四庫全書

普濟方

右伴為細末蒸餅和丸如黍米大硃砂為衣每服二

十九煎生薑湯乳食前服

枳殼半夏湯治小兒嘔逆

枳殼一兩去穰炒 半夏一兩湯炮七次

右剉水一盞薑五片煎服

治小兒吐不定方

五倍子二箇一熟 甘草一握濕紙裹炮過

右同為末每服半錢米泔湯下



爛大梔子 <small>三箇</small> 草烏頭 <small>一箇</small>	草金散治小兒吐逆	右同為細末米飲調下一錢	藿香 白附子 <small>各等分</small>	藿香散治小兒嘔吐不定虛風喘急	此湯加蝎以所煎湯作熟水飲之	服三五丸濃煎藿香柿葉湯下若大人加丸數亦用	右為末煮白麪糊為丸如芥子大量兒大小加減每	服三五丸濃煎藿香柿葉湯下若大人加丸數亦用	欽定四庫全書 普濟方	肉豆蔻 <small>度</small> 麪 <small>裹煨令香熟為度去麪不用半兩</small> 丁香 <small>一錢</small>	肉豆蔻丸治嘔不止諸藥不效者	右研勻每服半錢熱米飲調下量兒大小加減	人參 <small>一兩</small> 丹砂 <small>半兩</small>	人參散治小兒嘔吐不止	右剉研薑汁入水煎服	半夏 <small>薑製五錢</small> 茯苓 <small>去皮三錢</small>	小半夏湯治嘔吐及風痰水飲
--	----------	-------------	---------------------------	----------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	--	---------------	--------------------	---	------------	-----------	---	--------------



右同藏於小瓶內用泥固濟燒烟盡取出研細每服一字生薑汁下

醒脾散治小兒脾胃滯吐食并一切慢驚風大能醒脾

如危困多睡飢飲調下一字至半錢止吐瀉亦效

大天南星

一箇重二錢以上者

硃砂一塊

如黃豆大

右以天南星熱湯浸七次開臍入硃砂用淨薄紙

濕裹開地穴深四寸方圍八寸藥仰安穴內地以上

黃泥餅蓋用泥固臍以炭火於地上燒候火盡冷後

欽定四庫全書

普濟方

取研為細末入腦麝少許煎金銀薄荷湯下一字至

半錢

治小兒吐逆方

薄荷

茴香

炒各等分

右為末生薑自然汁煮麪糊為丸如綠豆大每服十

丸至十五丸用薑湯下不拘時

醒脾散治小兒因吐胃虛生風胃氣欲脫

人參

天南星

各等分研



右為末旋抄每服二味各半錢冬瓜子三七粒水一
盞半煎兩茶脚許不拘時通口服以胃氣生為度大
人亦治之

腦香散治小兒

沒藥錢一 樟腦字一

右為末以藥點其舌上

靈砂散治五種吐不問冷熱久而不止胃虛生風諸藥
俱試不效者

欽定四庫全書

普濟方

以靈砂研作細末米飲調下立效

治小兒飲乳後吐逆入腹即出方

用蘆節中蟲二枚煮汁飲之狀如小蚕凡小兒嘔逆
與覘乳不同覘乳者飽後覘出者是也宜細詳之

藿香散治小兒吐

神麴 藿香各半 丁香一分 肉豆蔻一箇

右為細末每服大者一錢小者半錢煎香楠木湯定
驚止吐神效



治小兒嘔吐逆方

取壁錢蟲上錢幕二枚煮汁飲之狀似蜘蛛其幕如
錢在閣壁間或呼為壁繭

紫朴散治小兒吐逆下膈和胃

取厚朴去粗皮以生薑汁炙令香熟為末每服一字
或半錢米飲調下溫服

治小兒吐不定方

用乾薑炭火燒及八方研如粉每服一字至半錢以

欽定四庫全書

普濟方

蜜湯放冷調下立效

紫粉丸治小兒吐兼大人

用針沙醋浸一夜辟去醋便帶醒炒候并銚子紅色
無烟乃止候冷細研更用醋團火燒通赤取冷再研
極細以麪糊圓如梧桐子大量兒大小與服粥飲下
服訖更啜蓋許粥如未定再服大人四十九一服小
兒隨大小為丸此藥極神異然吐有多端良方中有
數法皆累驗者可參用之



治小兒吐止方

以香白芷為末每服一字煎茺根湯下淡甘草湯亦得

治小兒吐逆方

取舊舂上石灰不拘多少為末每服一字先油滴一點在漿內調藥灌下大人每服半錢

玉散子治小兒止吐不瀉腹中疾

以爛寒水石火煨為末三歲兒半錢薑水調下

欽定四庫全書

普濟方

大人參丸和脾止吐嘔治瀉青黃止腹痛多啼進乳食

方

丁香 木香 白朮 各半兩 藿香 一兩半 人參 二兩

右為末煉蜜丸如雞頭子大每服一丸粟飲下

籛條散治小兒初生吐不止

故籛條篋 兩半 鹽一 牛黃一 黑豆 乳汁一

右將乳汁煎二味三兩沸去滓調入牛黃服效

茯苓散治胃寒嘔吐



出烟 鐵粉 木香 錢各一	青礞石 水銀 硫黃 各三錢 細研同 乾漆 二錢 炒青	土馬駿丸治小兒脾胃挾傷大吐不止	同煎至三分去滓溫服乳食前	右件呔咀每服二錢淡漿水七分白扁豆五粒搥碎	去火 毒用	人參 去蘆頭 白朮 冬瓜子 各半 天南星 一兩 炮製 入地坑內	觀音散治小兒脾胃氣弱嘔吐不痢困不省	欽定四庫全書 普濟方	小以意加減	右件藥搗細羅為散每服以粥飲調下半錢量兒大小以意加減	瓠湯浸焙 人參 半兩 去蘆頭	丁香 一分 訶藜勒皮 兩半 草豆蔻 三枚 去皮 桂心 一分 陳橘皮	溫中散治小兒腹脇虛脹嘔吐不納飲食	右為末每服一錢藿香葉三片葱白一寸同煎服	陳皮 各等分	藿香 甘草 人參 半夏 白茯苓 丁香
-----------------------	---	-----------------	--------------	----------------------	----------	---	-------------------	---------------	-------	---------------------------	-------------------------	--	------------------	---------------------	-----------	-----------------------------------



和丸如黃米大每服一歲兒一丸研生麻油馬齒莧	右件為細末鎔黃蠟一分別研二兩入麻油數滴熬	腦 <small>一分</small> 粉霜 <small>三分</small> 水銀 <small>一兩</small> 黑鉛 <small>一兩</small> 沙 <small>二錢</small>	黃蘗 輕粉 乳香 大戟 <small>一兩</small> 丁香 <small>半兩</small> 龍	噦逆不定大吐不時	救命丸治小兒心膈伏熱停乳食涎霍亂煩燥身體多	丸生薑棗煎湯化下乳食前	右件為細末煉蜜和為丸每一兩作四十九丸每服一	欽定四庫全書	普濟方	煨 <small>麩</small> 草豆蔻仁 <small>七枚</small> 肉桂 <small>半兩</small>	杷葉 <small>生薑</small> 水銀 <small>各一分</small> 硫黃 <small>各分</small> 肉豆蔻 <small>五枚</small>	附子 <small>炮去皮</small> 丁香 木香 藿香葉 <small>去</small> 沉香 枇	不定腹脹短氣中滿痞悶	丁香平胃散治小兒胃氣虛寒逆上行胸膈不快大吐	空	每服五丸煎土馬駿湯令沸入醋滴放溫送下乳食	右件為末鎔黃蠟一兩半入麻油少許丸如麻子大
----------------------	----------------------	--	--	----------	-----------------------	-------------	-----------------------	--------	-----	--	---	---	------------	-----------------------	---	----------------------	----------------------



水送下吐逆煎馬齒莧丁香湯下乳食前	溫胃丸治小兒胃虛氣逆乾噦惡心胸膈痞悶嘔吐乳食	丁香 <small>二錢</small> 肉豆蔻 <small>二錢</small> 木香 人參 <small>去蘆</small> 蓮子心	薏苡米 <small>炒黃各一錢半</small>	右件為細末煮神麩糊為丸如黍米大每服二十九 溫熱水送下乳食前	二香丸治小兒胃冷停痰嘔吐不止	欽定四庫全書 普濟方	半夏 <small>一錢</small> 硫黃 <small>細研</small> 丁香 木香 滑石 <small>各錢</small>	右件為細末生薑汁煮麩糊為丸如黍子米大每服 二十九溫米飲送下乳食空	丁香餅子治小兒胃氣虛寒心腹脹滿噦逆嘔吐昏困 少力及泄瀉無度	丁香 <small>六十枚</small> 龍骨 <small>一分</small> 附子 <small>一枚</small> 藿香葉 <small>去土一分</small>	右件為末滴水為丸每一兩作五十九粒餅子每服 一餅子煎杉木湯化下不拘時候
------------------	------------------------	--	---------------------------	----------------------------------	----------------	---------------	--	-------------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------



山薊湯治小兒胃氣怯弱乾噦嘔吐精神昏困乳食全減	人參 <small>去蘆</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 白朮 甘草 <small>炙</small> 藿香葉 <small>去土各錢半</small>
丁香 <small>錢一</small> 糯米 <small>炒令黃</small> 白扁豆 <small>粒三十</small>	右件為細末每服一錢煎生薑湯調下乳食前空
紫神湯治小兒陰陽不和中脘痞悶涎盛嘔逆吐驚不定	藿香藥 <small>去土一錢</small> 水銀 <small>錢一</small> 硫黃 <small>銀二錢同水</small> 丁香 <small>錢二</small> 滑石
欽定四庫全書 普濟方	錢一 紅麴 錢二
右件為細末每半錢乳食前用壁土湯調下	養胃散養胃氣快胸膈定噦逆止嘔吐美進飲食
丁香 藿香 <small>去土</small> 陳橘皮 <small>去白</small> 白豆蔻仁 縮砂仁 <small>等各分</small>	右件並為細末每服半錢煎生薑棗湯調下乳食
空	三神散治小兒痰乳停積煩渴喜飲嘔吐不定



乾葛 <small>一兩</small> 甘草 <small>三錢</small> 半夏 <small>湯浸七次去滑一兩</small>
右件為呔咀每服一錢水六分盞生薑三片青竹茹少許同煎至二分去滓放溫服乳食空
和胃膏治小兒虛嘔吐氣不升降胸膈噎寒漸成驚風
人參 <small>去蘆頭</small> 藿香葉 白茯苓 甘草 <small>炙</small> 肉豆蔻 <small>麩</small>
<small>煨</small> 枇杷葉 <small>去毛薑汁</small> 舶上硫黃 <small>細研入鉄銚將水</small>
<small>熟</small> 枇杷葉 <small>蘸炙香</small> 舶上硫黃 <small>銀一處研勻下以</small>
<small>微火溫之不住手研攤沾</small> 水銀 <small>同硫黃製度</small>
<small>在銚上去火候冷取下</small> 水銀 <small>已上各一兩</small>
右將前六味同為細末將硫黃水銀砂子先於乳鉢
欽定四庫全書
普濟方
內研細入諸藥同研勻煉蜜和成膏每一歲兒服一
丸如梧桐子大薑棗湯下
白朮散治小兒嘔吐兼治冷痢常服此藥調理三焦大
進飲食
白朮 丁香 肉豆蔻 <small>麩</small> 陳皮 甘草
右等分為末白湯調下慢驚沉困冬瓜子煎湯下若
見水即吐進藥不得吐止用棗子點藥乾喫
凡嬰兒百晬內或嘔吐乳或大便糞青者胃寒脾弱也



其證最為難治右用年少婦人乳汁一盞入丁香十枚 去穰陳皮一錢磁器內煮十數沸去丁香陳皮稍熱與 兒乳食前服嘔吐必止	欽定四庫全書 普濟方	普濟方卷三百九十四
---	---------------	-----------

