

欽定四庫全書

普濟方卷四百一 明 周王朱橚 撰

嬰兒雜病門

客忤 附論

少小所以有客忤病是外來氣息忤之一名中人是為客忤也雖是家人或別房異戶雖是乳母及父母或從外還衣服襟履鬼神粗氣暴氣或牛馬氣者為忤也勢作喘息乳氣未足者皆為客忤其乳母遇醉及勞喘後

欽定四庫全書

普濟方

乳兒最劇能殺兒也不可不慎凡諸乘馬行得馬汗氣臭未盥洗易衣裝便向兒邊及兒卒見馬來及聞馬鳴驚皆令小兒中馬客忤慎護之持重凡小兒衣布帛綿中不得有頭髮履中亦爾白衣青帶青衣白帶皆令中忤凡非常人及諸物從外來亦能驚小兒治病豫防之法諸有從外來人及有異物入戶當將兒避之勿令見也若不避者燒牛屎令常有煙氣置戶前則善 小兒中客為病者無時不有此病也而秋初一切小兒皆病



者豈是小兒一切悉中客邪夫小兒所以春冬少病秋
夏多病者秋夏小兒陽氣在外血脉嫩弱秋初夏末晨
夕時有暴冷小兒嫩弱其外則易傷暴冷拆其陽則壯
熱胃冷則下痢是故夏末秋初小兒多壯熱而下痢也
未必皆是中客及魘也慎不可先下之皆先殺毒後下
之耳 凡中客忤之為病類皆吐下青黃色水穀解離
腹痛妖札面色變易其候似癰但眼不上插耳其脉急
數者是也宜與龍膽湯下之加人參當歸各等分多少

欽定四庫全書

普濟方

亦宜蘇合香丸真珠散 小兒中客急視其口中懸癰
左右當有青黑腫脉核如麻豆大或赤或白或青如此
便當用針速刺瀆去之亦可爪摘決之并以綿纏釵頭
拭去血也

方

蘇合香丸

出楊氏
寶書

治傳尸鬼注客忤卒驚及治骨蒸殮

殮肺痿氣卒心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴癘赤白暴
痢瘀血月閉瘰癧疔腫驚癇小兒吐乳大人猢猻等



<p>病</p>	<p>蘇合香油 <small>一兩入安息香膏內和</small> 白朮 丁香 青木香</p>	<p>白檀香 薰陸香 <small>研別</small> 沉香 硃砂 <small>飛水</small> 香附子 <small>二兩</small></p>	<p>烏犀角 <small>剉屑</small> 安息香 <small>已上各二兩用無灰酒熬膏和蘇合油</small> 華撥</p>	<p><small>二兩</small> 訶子 龍腦 <small>一兩</small> 麝香 <small>二兩</small></p>	<p>右為末研勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如菉豆大空心井花水下四五丸老人小兒三丸溫酒化亦得並用早朝用蠟紙裹一丸如彈子大絳紗袋</p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>盛當心帶之能辟一切邪祟故治客忤中惡中鬼也又方研雄黃麝香煎降真香湯下</p>	<p>真珠散 <small>出醫方集成</small> 治客忤驚風鬼注驚邪痰熱心舍不寧</p>	<p>精神不定心常怔忡睡卧驚跳時或咬牙五心煩熱有汗煎啼面赤舌白呵發煩渴小便赤色或吐痢黃沫常服辟驚邪順經安神舍</p>	<p>真珠末 <small>二分</small> 海螵蛸 滑石 <small>各一錢</small> 茯苓 人參 白</p>	<p>附子 <small>各二分</small> 甘草 <small>炙半錢</small> 全蝎 <small>五分</small> 犀角 <small>一錢</small> 腦子 <small>半錢</small></p>
----------	--	--	--	---	--	---------------------------------------	--	---	--	--	---



麝香 <small>半錢</small> 別入金銀箔 <small>金三片</small> 銀三片	右為末每服半錢煎燈心麥門冬湯入蜜調下日午 臨卧服之	人參湯 治小兒客忤腹滿痛大便不通	人參 龍腦 鈞藤 茈胡 <small>去苗</small> 黃芩 <small>去心</small> 桔梗 <small>炒</small>	赤芍藥 茯神 <small>去木</small> 當歸 <small>切焙各半兩</small> 大黃 <small>剉炒</small> 虵娘 <small>去足</small>	灸二枚	右粗搗篩每服一錢水一盞煎至五分去滓分溫二	欽定四庫全書 普濟方	服量兒大小加減	雄黃丸 <small>出聖惠方</small> 辟小兒諸般驚叫顫癎癡初養不便與服乳 母帶辟諸驚忤之氣	雄黃 <small>二兩</small> 虎頭骨 <small>三分</small> 麝香 <small>一分</small> 獬頭骨 <small>三分</small> 白龍	腦 <small>一分</small> 大蛇頭 <small>一枚</small> 乳香 <small>一分</small> 降真香 <small>末一兩</small> 煎香 <small>一兩</small> 白	膠香 <small>一兩</small> 鬼白 <small>一兩</small> 毛 <small>為末</small>	右都研令細用熟棗肉和丸如彈子大初生兒當先 燒一九次用綠絹袋帶一九於身上辟一切驚忤之
---	------------------------------	------------------	--	--	-----	----------------------	---------------	---------	---	--	--	---	--



白鮮皮湯 <small>出千金方</small> 治小兒客魅挾實	以母衣覆兒身以厭之即愈	右為末每服半錢以金銀煎湯調下薄荷湯亦可仍	錢 <small>研一</small> 雄黃 <small>半</small> 麝香 <small>少</small>	天麻 犀角 麥門冬 鈎藤 <small>各一錢</small> 鐵粉 <small>半錢</small> 朱砂	犀角散 <small>出危氏方</small> 治客忤驚啼壯熱	以上加減服之以乳汁下米飲亦得	十月日服一丸四十日至百日服二丸一歲至三歲	欽定四庫全書 普濟方	右為末都研令勻煉蜜和丸如黍米大兒生一月至	賊魚骨 <small>半兩</small> 巴豆 <small>三十枚</small> 赤頭蜈蚣 <small>一條</small>	子 <small>半兩</small> 炮製 <small>去皮臍</small> 雄黃 <small>半兩</small> 丹砂 <small>半兩</small> 水飛過 <small>細研</small> 桂心 <small>半兩</small> 烏	麝香 牛黃 <small>各半兩</small> 黃連 <small>一兩</small> 特生礬石 <small>半兩</small> 附	瘦及三歲不行	風反踈口出舌并吐逆面青目戴上視腹滿或癩羸	麝香丸 <small>出聖惠方</small> 治小兒新生中客忤發熱乳哺不消及中	氣
-------------------------------------	-------------	----------------------	---	---	------------------------------------	----------------	----------------------	---------------	----------------------	--	--	--	--------	----------------------	---	---



右粗搗篩一二歲兒每一錢水七分煎至四分去滓	兩半	麝香湯 治小兒客忤卒痛及滿氣常腹痛	半夏 湯浸十遍 生薑汁炙 黃耆 各一兩 甘草 炙 乾薑 炮 桂 皮 各	下	右為末研桃仁膏為丸如麻子大每服三丸紫蘇湯	分	生犀末 人參 茯苓 菖蒲 硃砂 雄黃 各	欽定四庫全書 普濟方	安神丸 出直 指方 治客忤驚啼客熱	右為末每服半錢煎金銀湯調下不計時候	犀角 鎊 鈎藤 丹砂 研各一分 牛黃 研半分 麝香 研三大豆許	犀角散 出聖 惠方 治小兒客忤驚啼壯熱	右呶咀以水二升煮取九合分三服	桂心 各十銖 八銖	白鮮皮 大黃 甘草 各一兩 芍藥 茯苓 細辛
----------------------	----	-------------------	-------------------------------------	---	----------------------	---	----------------------	------------	-------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------	----------------	-----------	------------------------



內麝香少許分溫二服不拘時候更量兒大小加減	安神犀角丸 治小兒客忤驚邪鬼魅	犀角 <small>鎊</small> 車前子 白茯苓 <small>去黑皮</small> 人參 <small>各半</small> 雄黃 <small>研</small>	兩	右為末取柳白皮十兩桃仁十兩水二升煎一升去滓煎成膏和前藥丸如菘豆大每服三丸桃柳枝湯下	白石脂湯 治小兒客忤吐痢	欽定四庫全書	普濟方	白石脂 <small>兩</small> 蜀漆 <small>兩</small> 牡蠣 <small>煨</small> 附子 <small>炮製去皮</small>	右剉如麻豆一二歲兒每一錢水七分煎至四分去滓溫服分為二空心一午後一量兒大小加減	伏龍肝膏 <small>出千金方</small> 治小兒卒中客忤驚啼大叫	伏龍肝 <small>兩</small> 研二 鷄子 <small>去殼</small> 地龍糞 <small>兩</small> 研一	右研勻或乾更入少許水調如膏先用桃柳湯浴兒後將藥塗兒五心及頂門上	母衣髮乳 <small>出千金方</small> 治中客忤
----------------------	-----------------	---	---	---	--------------	--------	-----	---	--	--------------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------



用燒母衣帶三寸併髮合乳汁服之

雄黃散 出聖
惠方 治客忤腹痛危急

雄黃 錢一 明乳香 半錢 生麝 一字

右為末每一字刺鷄冠血調灌之一方無乳香

還魂湯 救卒死客忤死

麻黃 三兩 杏仁 去皮尖 甘草 一兩

右水八升煮取三升去滓分令咽之通治諸感忤

韭菜根散 治證同前

欽定四庫全書

普濟方

韭根 一把 烏梅 二七 吳茱萸 半升

右水一斗煮之以病人櫛內中三沸櫛浮者生沉者

死煮取三升去滓分飲之

龍骨散 治小兒中客忤體熱

白龍骨 一分 牛黃 半分 葛根 一分

右為散每服以溫水調下半錢日三四服

治小兒客忤病 出千
金方

右用豉數合水拌令濕搗熟丸如鷄子大以摩兒顛



腹中痛	桂參湯 <small>出十便良方</small> 治小兒中客忤吐青白沫及食飲皆出	汁下空心午後服量兒大小加減	右為末煉蜜丸如麻子大五十日兒每服一丸以妳	雀屎丸 <small>出聖惠方</small> 治小兒卒忤軀啼腹堅滿	雀屎 <small>一兩一分</small> 當歸 <small>半兩切焙</small>	右相和漸漸滴兒口中一方竹瀝一字	牛黃乳 <small>出聖惠方</small> 治小兒客忤驚啼	牛黃 <small>一字</small> 猪乳 <small>一粟殼許</small>	欽定四庫全書 普濟方	用水二升煮篇蓄冬瓜各四兩取浴之	又方	細末和乳飲兒即便安愈	三物燒髮散 <small>出千金方</small> 治少小見人來卒不佳腹中作聲者	上手足心各五六遍畢以摩兒心及臍上下行轉摩	之食頃破視其中當有細毛即擲丸道中痛即止
-----	--	---------------	----------------------	--	--	-----------------	---------------------------------------	--	---------------	-----------------	----	------------	--	----------------------	---------------------



麝香飲 治客忤口噤項強欲死	後更量兒大小加減或濃煎去滓塗兒五心	半錢匕以水半盞煎至三分去滓分溫三服空心午	右用桂一味去粗皮一兩粗搗篩一二百日兒每服	痛氣欲絕	桂枝湯 治小兒中客忤吐青白沫及飲食皆出腹中	艾各為丸鷄子大摩小兒五心良久擘開毛出差	右用水一斗煮錢十四枚以浴之又取水和粉及熟	欽定四庫全書	普濟方	治小兒客忤中人吐下黃水	用細辛桂心等分內口中	又方	右燒桔梗二兩為末米飲服仍吞麝香如大豆許佳	治卒客忤停屍不能言者	分去滓分溫三服兒大以意增之	右粗搗篩一二百日兒每服半錢匕水半盞煎至二	桂 去粗皮 一兩 人參 一分
---------------	-------------------	----------------------	----------------------	------	-----------------------	---------------------	----------------------	--------	-----	-------------	------------	----	----------------------	------------	---------------	----------------------	----------------



右用麝香少許研細乳汁調塗口中仍以母衣覆其身即愈一方醋調服一方吞麝香大豆許立愈

一物猪通浴湯 治小兒中人忤軀啼面目青腹強者

右猴猪通二升以熱湯灌之適寒溫浴之

治少小中客忤項強欲死

右取衣中白魚十枚為末以傅乳頭上令兒飲之入咽立愈一方二枚著兒母手掩兒臍中兒吐下愈亦以摩兒頂及脊強處一方書中白魚亦可一方治少

欽定四庫全書

普濟方

小犯客忤發作有時用母月衣覆兒身良一方治卒中忤剪取驢前膊脾上旋毛大如彈子以乳汁煎之令毛消藥成著乳頭飲之下喉即愈又方取牛口沫傅乳頭飲之一方取牛鼻津服之

治少小卒中客忤不知人者

右取熱馬屎一丸絞取汁飲兒下咽便愈亦治客忤而軀啼面青腹強者一方以馬通三升燒令烟絕以酒一斗煮三沸浴兒名馬通浴湯



治小兒驚悸客忤催生瀝瘍白癩風

右用蛇蛻皮煎汁傳入藥並灸用

治客忤者中惡之類也多於道間門外得之令人心腹

絞痛脹滿氣衝心胸不即治亦殺人

右用鉛丹一方寸匕蜜二合和服之口噤者折齒灌

之一方用墨水和服一錢匕一方治小兒卒中客忤

用銅照子鼻燒令赤着少許酒中淬過少與兒服之

即愈

欽定四庫全書

普濟方

治小兒客忤蠱毒

用烏雌鷄糞燒服之又方治小兒驚癇客忤用家桑

東行根煖無毒研汁服大驗

治小兒客忤欲狼狽方

抱兒於廁前取屎草燒灰為末水調服少許即愈

伏龍肝方

竈中黃土和醋搗丸如毬子大摩兒頭及五心

客忤夜啼



竈心土 蚯蚓糞 <small>各等分</small>	右研水傅頭上五心	伏龍肝散 治客忤驚啼不止	伏龍肝 硃砂 山藥 麝香 <small>各等分</small>	右為末薄荷湯調服或煉蜜丸如菘豆大燈心湯下	睡驚丸 治小兒客忤驚熱夜啼煩躁搐搦口噤上視 或冷或熱痰涎壅甚	青黛 硼砂 腦子 麝香 山藥 茯苓 甘	欽定四庫全書 普濟方	草 金箔 <small>各等分</small>	右為末煉蜜為丸如皂角子大硃砂為衣薄荷湯臨 眠化下	治客忤驚啼不止 <small>出傳氏活嬰方</small>	栝子仁 白茯苓 甘草 <small>各等分</small>	右為末每服一錢麝香湯調下	龍齒散 <small>出傳氏活嬰方</small> 治客忤夜啼驚悸	石膏 人參 龍齒 硃砂 麝香 甘草 <small>各等分</small>
-------------------------------	----------	--------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------	--------------------------------------	---



藥塗五心及頂門上	右件藥相和入少許水調先以桃柳湯浴兒後將此	竈中黃土 <small>二兩</small> 研 鷄子 <small>一枚</small> 去殼	治小兒客忤驚啼叫方	右研勻塗乳上令吮之	硃砂 麝香 雄黃 <small>各等分</small>	治客忤狂啼腹痛 <small>出傅氏活嬰方</small>	右為末乳汁調下	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	川芎 當歸 <small>等分</small>	治客忤軀啼晝夜不止思忖間忽然而啼 <small>出傅氏方</small>	效	右為末每服一字初生兒腹有血惡而成血病者有	當歸 赤芍藥 白朮 甘草 桂皮 <small>等分</small>	唇青口紫	當歸飲 <small>出傅氏活嬰方</small> 治客忤腹內有惡血夜啼如鬼祟腹痛	右為末每服一錢金銀薄荷湯點服
----------	----------------------	--	-----------	-----------	-----------------------------	-------------------------------	---------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---	----------------------	-----------------------------------	------	---	----------------



<p>治小兒客忤吐妳不乳頭面青黃色脉結急浴法 <small>出聖方</small></p>	<p>青銅錢 <small>一百二十文</small></p>	<p>右水一斗煮取五升適寒溫以浴兒立効</p>	<p>治小兒客忤壯熱浴方 <small>出聖方</small></p>	<p>白芷根苗 苦參</p>	<p>右件藥等分粗搗為散用清漿水煎入鹽少許以浴 了用粉摩佳</p>	<p>治小兒客忤消食及冷氣方 <small>本草方</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>以鉄屑煎汁服之</p>	<p>治小兒客忤</p>	<p>以熊骨煮湯浴之</p>	<p>又方</p>	<p>用墨搗篩和水溫服之</p>	<p>又方 <small>俱出本草</small></p>	<p>以殭蠶七枚為末用酒調下量服之</p>	<p>中馬毒 <small>附論</small></p>
---	---------------------------------	-------------------------	---	----------------	---------------------------------------	---	-----------------------	----------------	--------------	----------------	-----------	------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------------



凡人乘馬到人家身有馬汗不暇湯浴則須換衣服不暇換衣服即食頃間歇定方得親近小兒若不如此則小兒中馬毒客忤或初卸馬馬氣未歇將鞍轡等物逼近小兒聞馬嘶便驚皆因中馬毒客忤其肚腹痛吐下青黃色水穀解離甚者致大患也

方

治小兒中馬毒汗氣臭忤馬嘶驚忤宜服此方

出聖
惠方

右取馬尾於小兒前燒令小兒咽氣及每日燒之差

欽定四庫全書

普濟方

為度

又方

取馬口角沫塗兒口中効

卒死 附論

夫小兒卒死者是三虛遇賊風病倉卒而死也三虛者乘年之衰一也逢月之空二也失時之和三也有此三虛復為賊風所傷便陰氣偏竭於內陽氣阻隔於外胸間陰陽不通故暴絕如死若臟腑未竭良久而蘇亦有



挾鬼神氣者皆須邪退乃生宜以藥療之也
方
治小兒卒死方 <small>出聖 惠方</small>
右取女青末半錢用牛乳汁調服之
又方 <small>前同</small>
取牛糞絞汁內少許口中差
又方 <small>前同</small>
右燒獺猪糞水解取汁服
欽定四庫全書 普濟方
又方 <small>前同</small>
右以苦參醋煮取汁少許內口中即蘇水煮亦得
又方 <small>出聖 惠方</small>
用爛棺木板酒煮取汁服少許効
又方 <small>前同</small>
右煎鹽湯令極鹽以物開口灌之令入腹即活
又方 <small>前同</small>
右以熱湯和灰厚擁身上逡巡即蘇



破棺散

一名半夏丸
朱氏集驗方

治魔死縊死溺死卒死惡死五絕

心頭暖者宜服此方

用生半夏末量大小或一字或半錢吹鼻中一方以

水調塞鼻中一方用皂角末吹鼻中並差一方用雄

黃末桃枝湯灌之愈

治小兒卒死而吐利不知是何病者

出肘
後方

用馬屎一丸絞取汁以吞之無濕者水煮取汁

救小兒卒死而吐利不知是何病者

出金
匱方

欽定四庫全書

普濟方

用狗屎一丸絞取汁以灌之無濕者水煮乾者取汁

一方狗齒燒灰服之

治氣閉不通死絕方但尸厥脈動者可治

用菖蒲末納鼻兩孔中吹之又以桂着舌下又剔取

左角髮方寸燒末酒和入喉立愈

卒腹皮青黑

附論

夫小兒因汗腠理則開而為風冷所乘冷搏於血隨肌

肉虛處停之則血氣沉澀不能榮其皮膚而風冷客於



腹皮故青黑也

方

七氣湯

出危氏方

治挾冷作痛面色或白或青四肢冷甚

青皮 陳皮 桔梗 蓬莪朮煨 辣桂 藿香

益智仁各一兩 香附子一兩 半夏湯洗三分 甘草炙三分

右剉散每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎三分服

不拘時候

治小兒卒然腹皮青黑若不急治須臾即死

出聖惠方

欽定四庫全書

普濟方

右用酒和胡粉塗其腹乾再塗又灸臍下上左右去

臍各半寸并鳩尾骨下一寸凡五處各灸三壯

治小兒卒腹皮青黑赤不能喘息及吐利卒死

出聖惠方

右用女青末內口中酒服之亦治大人

又方出聖惠方

以苦參一兩搗羅為散不計時以醋湯調下半錢更

量兒大小加減

又方出聖惠方



取爛棺木半兩以醋一中盞煎至六分去滓溫服半
合量兒大小加減

又方 出聖
惠方

右取荊子搗入少水絞取汁暖服半合量兒大小以
意加減

五硬五軟

湯氏五硬五軟集歌云仰頭取氣動搖難氣壅疼連胸
膈間脚手心如冰樣冷硬頭直頸未能灣 肚大青筋

欽定四庫全書

普濟方

急不寬 急亦
作硬冷風積氣病難安面青心腹還多硬性命

當時已自拚 五疳 喜怒無常度看人不轉睛眼乾

啼少淚此候實堪驚 此乃肝疳也 搭口搖頭熱呼漿

上膈乾脾間津液竭多睡不堪看 此脾臟疳也

乾熱大腸結啞啼汗似珠便時多泄氣性命在須臾

此肺疳極候 熱極腎肝病瘡癢發不安便時乾澀痛

體熱四肢寒 此腎疳也 憔悴更喉乾多啼睡不安

皮膚無色澤骨立不堪看 此心疳也 五軟 天柱骨
倒軟



無故如何不舉頭都緣項頸軟難收腎乾熱病今雖減	難保他年發不休 懷抱何緣脚手垂四肢無力懶揚	眉若還受食聲音響脾裏風寒漸可醫 喫食如何不	長肌皮寬肉少痛支離莫教瀉痢當時作靈藥難醫命	即危 五歲孩兒不解行脚虛軟弱痛難名若將榮衛	多培植長大應教肉自生 <small>參耆等藥可榮氣亦可服錢氏地黄丸</small> 唏噓舌	軟却無妨陽盛陰虛着意防此證不須先治膈唇青氣	喘命須亡 雖然天柱倒難醫此証原來不在脾患後	欽定四庫全書	普濟方	也須曾吐瀉本非久病與疳羸 亦有傷寒無汗脉應須	妙藥辨幾微無事卒然成此疾人形不瘦四肢肥 項軟	還知頭似石面紅唇赤臉如緋此病只因肝膽熱致令	筋軟不相隨 肝受熱風天柱倒祛風退熱速為之項軟	更貼強筋藥立見安和請勿疑 <small>全嬰方云高伸承務女三歲七月間洩瀉一醫</small>	治之月餘不効其證大渴不止羸瘦不食手足漸冷召	予視之曰氣已將脫急以木附膏四服手足微溫但一	時辰內可三十餘次飲水與魚涎散一服立止再木附	膏二服并麝沉膏沒石膏六甲丸參朮散等服五日減	半愚曰此病虛中有積當以黃土丸瀉三五行再煎藥	補之主人曰首因瀉今乃漸退何再瀉也答曰譬之不
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------	--------	-----	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



<p>去稂莠則禾稼不實不去奸猾則良民不寧主人曰何治也答曰補不足瀉有餘也補者補其以瀉脾虛不足之氣瀉者瀉其以滯腸中有餘之積主人曰此理出何書答曰素問云實瀉虛補此所謂順天之道損有餘補不足蓋醫合陰陽藥合天道主人聽用黃土丸瀉五行再前藥相間進五日疾除八分一日忽天柱骨倒主人其驚愚曰無慮瀉以則傷脾脾引於肝風肝受賊風故頭垂而頸筋軟也所幸者瀉已退遂用金靈散一服生筋散貼項一日如舊後更前藥二服安全</p>	<p>方</p>	<p>小鹿茸丸 <small>出醫方</small> 治胎中受熱遍身筋軟</p>	<p>鹿茸 川牛膝 菴蓉 木瓜 杜仲 兔絲子</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>當歸 熟地黄 天麻 青鹽 <small>各等分</small></p>	<p>右為末用蜜丸鹽湯溫酒化下皆可</p>	<p>羚羊角散 <small>出醫方</small> 治面紅唇白腸熱項軟</p>	<p>熟地黄 <small>酒浸</small> 白茯苓 羚羊角 酸棗仁 <small>炒</small> 虎脛骨</p>	<p><small>酒炙</small> 肉桂 防風 甘草 <small>各等分</small></p>	<p>右為末溫酒鹽湯化下皆可</p>	<p>貼項方 <small>出醫方</small> 治肝膽停熱致令筋軟用此藥貼項</p>	<p>附子 <small>生去</small> 南星 <small>各等分</small></p>
---	----------	--	----------------------------	-------------------	--	-----------------------	--	---	--	--------------------	--	---



丸	右為末生薑自然汁調攤貼患處次服防風丸并瀉青
五加皮散	<small>出仁 存方</small> 治小兒頸軟
用五加皮為末酒浸調塗傅頸上	
健骨散	<small>出仁 存方</small> 治小兒久病疴疾體虛不實飲食不進及
諸病後天柱骨倒醫者不識謂之五軟	
用白殭蠶為末三歲兒半錢薄荷酒調下後用生筋	
散貼上	
欽定四庫全書	普濟方
生筋散	<small>出鮑 氏方</small> 治如前
木鱉子	<small>六箇 去殼</small> 葶麻子 <small>六十箇 去殼</small>
右研細先抱起顛摩頂上令熱津唾調貼之二方全	
愈	
天柱丸	<small>出仁 存方</small> 治風氣頸起軟頭不得正或去前或去後
蛇含石	<small>一大塊 用醋淬七次</small> 川欒金末 <small>少 許</small>
右碾細又入鉢內研極細和前藥末入麝香少許和勻	
用雪白大米飯丸如龍眼大每服一丸荆芥湯化下或	



又入生薑汁一二滴或用金銀薄荷湯早晨不拘時 下風熱項軟合用涼肝丸	手拳不展 <small>附論</small>	夫小兒手拳者由在胞之時其母臟腑氣虛為風冷所 乘兒生之後肝氣不足致筋脉攣縮不得伸展故令拳 不展也	方	薏苡仁散 <small>出聖</small> 治小兒手拳不展是肝氣不足內傷風	欽定四庫全書 普濟方	邪	薏苡仁 <small>三分</small> 當歸 <small>一分</small> 秦艽 <small>半兩</small> 防風 <small>半兩</small> 桂心 <small>半兩</small>	甘草 <small>一分</small> 酸棗仁 <small>半兩</small>	右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒大 小分減不計時	羚羊角散 <small>出聖</small> 治小兒手拳不展是風邪滯氣所客令	榮衛不通	羚羊角屑 羌活 五加皮 白鮮皮 桂心 <small>上已</small>
------------------------------------	------------------------	---	---	---	---------------	---	---	---	--------------------------------	---	------	--



夫小兒脚拳者由在胞之時其母臟腑內有冷積為風	脚拳不展 <small>附論</small>	麝香荆芥湯化下不拘時候	右件搗羅為末蜜和如鷄頭實大每服一粒至二粒	酸棗仁 <small>一兩</small> 羌活 <small>一兩</small>	薏苡仁 <small>一兩湯浸去皮細研</small> 當歸 <small>一兩洗焙乾</small> 秦艽 <small>一兩去苗</small> 防風 <small>一兩</small>	縮或伸展無力	薏苡丹 <small>出醫方妙選</small> 治手拳不展所受肝氣怯弱致兩脉攣	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	量兒大小加減分增溫服	右為散每服一錢水一鍾煎至五分去滓不計時服	草 <small>灸微赤剉已上各一分</small>	麻黃 <small>半兩去根節</small> 桂心 赤芍藥 羌活 細辛 甘	又方	右為散每服一錢水一鍾煎至八分去滓量兒大小加減不時溫服	各一分 麻黃 <small>半兩去根節</small> 甘草 <small>半分灸微炒</small>
-----------------------	---------------------------	-------------	----------------------	--	---	--------	--	------------------------------	------------	----------------------	----------------------------	--	----	----------------------------	---



邪所乘兒生之後腎氣不足血氣未榮故令脚指拳縮不展也

方

當歸散 治小兒脚不展指拳縮

當歸劉微炒 麻黃去根節 羌活 酸棗仁炒 人參去蘆

杜仲去粗皮 桂心已上各一分

右為散每服一錢水一小盞入生薑少許煎至五分去滓量兒大小乳食前分減服

欽定四庫全書

普濟方

山茱萸散 治小兒脚拳不展筋急乾細

山茱萸 羌活 薏苡仁 桂心 羚羊角屑

當歸劉微炒 甘草炙微赤 黑豆炒熟 白茯苓 防風去蘆已

生乾地黄上各一分 麻黃半兩去根節

右為散每服一錢水一盞煎至五分去滓於乳食前量兒大小分減溫服

生乾地黄丸 治小兒脚指拳縮

生乾地黄半兩 郁李仁半兩湯浸去皮尖微炒 牛膝去苗 防風去蘆



<p>頭 桂心 海桐皮 羌活 白茯苓 薏苡仁 上巴 分 各一</p>	<p>右為末煉蜜丸如菉豆大每於乳食前以溫酒下七 丸量兒大小加減</p>	<p>行遲 附論</p>	<p>凡兒生週歲三百六十日膝骨成乃能行近世小兒多 因父母氣血弱故令胎氣不強骨氣軟弱筋脉無力不 能行步又有所受肝氣怯弱致筋脉攣縮兩手伸展無</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>力又緣稟受腎氣不足者血氣未榮脚指拳縮無力不 能伸展此皆不能依常期以致此疾 治法當以錢氏 補腎地黄丸再加鹿茸五加皮麝香髓生而骨強自然 行矣外甥黃知錄之子還僧三歲不行遂處此方服之 有驗</p>	<p>方</p>	<p>羚羊角丸 治小兒五六歲不能行者骨氣虛筋脉弱 宜服益肝腎二臟</p>
--	---	--------------	--	-----------------------	---	----------	--



欽定四庫全書		普濟方	
麝茸丹 治數歲不能行者曾經大効		麝香 別研 茄茸 酥炙 生乾地黄 當歸 洗焙 黃耆 剉 虎	
脛骨 塗醋炙黃		右為末用羊骨髓四兩煮爛和成膏如黍米大每服十粒磨沉香下食前日三服	
虎骨丸 治小兒五六歲不能行者骨氣虛筋脉弱宜服益肝腎二臟		破五丸服之漸漸即行也	
虎脛骨 赤酒炙 生乾地黄 酸棗仁 皮酒浸去香 白茯苓		五加皮散 治小兒三歲不能行者由受氣不足體力虛怯腰脊脚膝筋骨軟故不能行	
		用五加皮為末粥引調下用酒少許調每服一錢日進三次	
		右件搗羅為末煉蜜為丸如菉豆大食前以温酒研	
		乾地黄 兩各半 黃耆 桂心 防風 去蘆頭 當歸 炒各一錢	
		羚羊角屑 白茯苓 虎脛骨 炙醋塗黃 酸棗仁 炒生	



辣桂 防風 當歸 川芎 牛膝 <small>分等</small>	右為末煉蜜和丸麻子大每服五丸酒吞下或木瓜湯下夫骨者髓之所養小兒氣血不充則髓不滿骨故軟弱不能行抑亦肝腎俱虛得之肝主筋弱而不能束之一方有黃耆無牛膝	海桐皮散 治稟受腎氣不足血氣未榮脚指拳縮無力不能伸展	海桐皮 牡丹皮 當歸 <small>焙</small> 熟地黄 牛膝 <small>各一兩酒</small>	欽定四庫全書 普濟方 浸 山茱萸 補骨脂 <small>各等分</small>	右為末每服一錢水八分葱白二寸煎食前服	生乾地黄丸 治小兒十歲已來血脉不流筋脉緩弱脚膝無力不能行步	生乾地黄 當歸 <small>剉微炒</small> 防風 <small>去蘆頭</small> 酸棗仁 <small>微炒</small> 赤茯苓 苓 黃耆 <small>剉</small> 芎藭 羚羊角屑 羌活 甘草 <small>炙微</small>	赤 桂心 <small>已上各等分</small>	右為末煉蜜丸如菉豆大食前以温酒下十九更量
----------------------------------	---	----------------------------	--	---	--------------------	-------------------------------	--	---------------------------	----------------------



兒大小加減服之

五加皮散 出直指方 治十二歲不能行者

真五加皮 一分 牛膝 一分 酸木瓜乾 各半分

右為末每服一錢半粥飲調次入好酒兩點再調食

前服二劑

八味丸 出如宜方 治稟氣虛骨弱七八歲不能行立

牡丹皮 各三兩 茯苓 各三兩 澤瀉 各三兩 山茱萸 各四兩 山藥 各四兩

附子 製 桂 各二兩 熟地黄 八兩

欽定四庫全書

普濟方

右為末蜜丸梧子大每服十二三丸至二十五丸温

酒空心日二服服一料自愈功在澤瀉耳

治小兒數歲不能行方 出千金方

用喪家未開戶時盜食以哺之日三便行起

鶴節 附論

夫小兒鶴節者由稟賦不足血氣不榮肌肉瘦脊則骨

節背露如鶴之足皆腎虛不生骨髓之故夫腎者神精

之所舍原氣之所繫若其氣強則骨髓滿溢肌體盛充



若氣不足者臟腑勞傷真氣不守邪氣所侵腎氣虛弱 骨髓枯竭而不榮故令骨痿而羸瘦也治法當補腎宜 服錢氏地黄丸本方加鹿茸醋炙川牛膝各二錢修合 餌服一週三歲以下與十九三歲以上與十五丸
方
錢氏地黄丸 <small>出錢氏方</small> 治小兒鶴節數歲不能行又治頭顛 不合體瘦露皆由稟受血氣不足則髓不滿骨故軟 弱腎虛故以此藥補之疾自愈
欽定四庫全書
普濟方
熟乾地黄 <small>八錢</small> 山茱萸 乾山藥 <small>各四錢</small> 澤瀉 <small>二錢</small> 牡丹
皮 白茯苓 <small>各三錢</small> 加鹿茸 <small>炙</small> 牛膝 <small>各四錢</small>
右為末煉蜜丸如麻子大空心溫水送下三歲以下 十九以上倍之
龜背龜胸 <small>附論</small>
夫嬰兒生後一百八十日始髑骨成方能獨坐若強令 小兒坐之太早即客風寒吹著兒背及背脊至骨傳入 於髓使背高如龜之狀乃曰龜背又乳母乳兒當捏其



宿乳夏常洗乳捏去熱乳若兒感餘熱即傷肺氣胸膈
脹滿令兒胸高如龜乃名龜胸又稟受血氣不足不能
榮於髮故頭髮不生呼為疔病非也及稟受腎氣不足
者則髓不強骨不堅蓋骨之所絡而為髓髓不足不能
充於齒故不生且心之聲為言若兒稍長合語而遲語
由妊娠時母因有驚怖內動於兒藏邪氣乘於心使心
氣不足舌本無力故語遲也

方

欽定四庫全書

普濟方

松蘿丹

出危氏方

治龜胸龜背嬰兒生下不能護背客風吹

脊入骨髓致之又或坐太早亦致偃僂背高如龜多
成痼疾 凡兒生至周歲三百六十日膝骨成始能
行近世小兒多因父母氣血虛弱故令胎氣軟弱筋
脉攣縮兩手伸展無力又緣稟受腎氣不足者氣血
未榮脚指拳縮無力不能伸展此皆不依常期並集
經用得効方治之

松花

焙

枳殼

炒

防風

去蘆

獨活

各一兩

麻黃

去根

川大黃



麻黃丸 治小兒龜胸	丸量兒大小臨時加減	右羅為末煉蜜丸如菘豆大許不時以溫水研下五	又方 <small>出聖 惠方</small>	甜葶藶 <small>隔紙炒 令紫色</small> 杏仁 <small>湯浸去皮尖雙</small> 麻黃 <small>去節</small> 川	大黃 <small>剉微炙已</small> 桂心 <small>一分</small>	右羅為末煉蜜丸如菘豆大每服五丸食後卧熟水化	川大黃 <small>三分 焙</small> 天門冬 <small>去心 焙</small> 杏仁 <small>去皮 尖炒</small> 百合 木通	桑白皮 <small>炒</small> 甜葶藶 <small>紙上 炒</small> 爛石膏 <small>各半 兩</small>	欽定四庫全書 普濟方	下一方有朴硝無爛石膏名大黃丸三歲已上化二	丸	右為末煉蜜丸如黍米大每服十粒粥飲下量兒加減	前胡 桂心 <small>各半 兩</small>	百合丹 <small>出聖 惠方</small> 治龜胸龜背胸高脹滿其狀如龜此肺經	受熱所致也乳母酒麵無度或夏月熱煩熱乳與兒	得之或乳母多食五辛兒亦成此疾
-----------	-----------	----------------------	-------------------------	--	---	-----------------------	---	--	------------	----------------------	---	-----------------------	---------------------------	---	----------------------	----------------



麻黃 <small>三分去根節</small> 桂心 獨活 防風 <small>去蘆頭</small> 赤芍藥	川大黃 <small>炒對</small> 枳殼 <small>去穰麩炒微黃</small> 松花 <small>已上各半兩</small>	右羅為末煉蜜丸如棗豆大每服以粥飲下五丸日三服量兒大小加減	又方	檳榔 <small>半兩</small> 川大黃 <small>半兩剉微炒</small> 桂心 前胡 防風 赤	芍藥 獨活 訶梨勒皮 枳殼 <small>炒微黃去穰</small> 麻黃 <small>去根</small>	節已上 各一兩	欽定四庫全書 普濟方	右羅為末煉蜜丸如麻子大每服以粥飲下五丸日三服量兒大小加減	治小兒龜背	右龜尿摩背上點背上骨節癢 取龜尿之法放龜	於荷葉上候龜頭四顧急用鏡子照之其尿自出	百合丹 治龜胸病	百合 <small>一兩</small> 川朴硝 <small>半兩</small> 杏仁 <small>半兩湯浸去皮尖</small> 桑根白皮 <small>半兩</small> 木	通 <small>半兩</small> 天門冬 <small>半兩</small> 川大黃 <small>半兩</small>
---	--	------------------------------	----	--	---	---------	------------	------------------------------	-------	----------------------	---------------------	----------	---	---



右件搗羅為細末煉蜜和丸如黍米大每服十粒米
飲下量大小加減

龜背散

大黃三分炒 天門冬焙去心 百合 杏仁去皮炒 木通

桑白皮蜜炙 甜葶藶隔紙炒 朴硝 製枳殼各等分

右為末蜜丸食後溫湯化下

誤吞諸物 附論

夫小兒多以珠璣釵釵之類為玩弄之具或藏放口中

欽定四庫全書

普濟方

因驚或啼遂誤吞咽倉卒不得出為害亦大當隨物所

宜以方術治之

方

治誤吞錢在喉中不下

用麩炭研為末以指彈少許入喉中少頃自吐出

治誤吞針

用磁石一塊小彈子大吸鐵緊者入口內吸令針出

或絲繫定送咽喉引出或如棗核大磨令光鑽作孔



絲穿令含亦得

治誤吞鈎繩

凡吞鈎繩猶在手者莫伸引但以珠璫若穿了惹苙子之類就其繩穿稍稍推去至鈎畔即急推前入纜鈎離刺處復緩緩引出

治誤吞珠璫方

燒銅弩牙令赤淬水一碗旋引其物即出

治誤吞銀環及釵方

欽定四庫全書

普濟方

以飴糖隨兒大小多少食之若能多食飲釵環即隨出

治誤吞金銀及錢在腹內不下

孫用和方

石灰一杏核大硫黃一皂角子大用研為末酒調下

不計時候服

治誤吞髮

用木梳燒灰細研粥飲調下半錢匕不下再服

治誤吞梅李核



治誤吞鈎方	若是桃枝竹釵哽但數數多食白糖即自消	又方	飲之効	取常思草頭一把以水一大盞搗絞取汁分三四遍	治誤吞鈎繩方	効再服	取鷲毛半兩燒灰細研如粉以粥飲調半錢服之末	欽定四庫全書	普濟方	治誤吞鑲若指彊方	取獾齒骨燒灰細研如粉每服以磨刀水調下一錢	又方	用艾蒿一把剉以水五升煮取一升半服之即下	又方	用南燭根燒細研熟水調一盞服之	治誤吞銅鐵在咽喉內不下	以溫水旋從小兒頭淋下却接其水與兒飲之
-------	-------------------	----	-----	----------------------	--------	-----	----------------------	--------	-----	----------	----------------------	----	---------------------	----	----------------	-------------	--------------------



<p>以琥珀珠穿貫著鈎繩上推令前入至鈎所又復推以牽引出</p>	<p>療小兒桃李髓</p>	<p>用狗頭煮湯磨頭上瘡</p>	<p>治誤吞錢入腹</p>	<p>用羊脛骨燒成灰研為末每服二錢用溫水調下或米飲下薺萇取汁呷之自化</p>	<p>又方 <small>出海上名方</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>用蛀粟子燒灰存性為末每服半錢米飲調下</p>	<p>治小兒誤吞銅錢等物不出 <small>出聖惠方</small></p>	<p>煮葵菜多食之即下如神一方用冬葵子根煮汁飲之即出</p>	<p>治誤吞銅鐵物 <small>出經驗良方</small></p>	<p>細研硬炭為末飯飲調下於大便瀉下如烏梅狀方用炭燒通紅急搗為末米飲調下亦治誤吞針釘等物連數服乃驗</p>
---------------------------------	---------------	------------------	---------------	--	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------	--	--------------------------------	------------------------------------	---



又方 經驗良方

用葶薺不拘多少研爛水嚥喫即下非時收下乾為末冷水調灌

治骨鯁方 楊氏寶書

用筒子極硬白炭碾為末濃米飲調下無効再喫神驗

治小兒大人一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下 出肘後方

於臘月中取鰕魚膽懸北簷下令乾每有魚鯁取一

欽定四庫全書

普濟方

皂角子許以酒煎化溫服若得吐其骨即隨涎出若未吐更飲溫酒但以吐為度酒隨量飲之若不便出再煎一塊無有不出者若鯁在臟腑中日以黃瘦甚者服之亦得出於倉卒不得鰕魚或蠶魚鮫魚鯽魚俱可皆以臘月收之為佳

治小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出者 同前

煮白梅肉研爛後調象牙末厚傅骨刺處自軟一方無象牙末用沙糖含須臾自下



誤吞錢 <small>出傳言 適用方</small>	濃煎艾湯一二盞入錫頓服半斤	通氣散 <small>出醫方 妙選</small> 治誤吞銅錢鐵物及鈎繩之類在咽喉	不下	驚毛 <small>一錢 燒灰</small> 磁石 <small>一皂角子 大燒灰</small> 象牙末 <small>一錢 燒存性</small>	右件搗細末每服半錢新水調下	食治諸病 <small>附論</small>	夫生民之道莫不自小至大若無其小卒不成大故易	欽定四庫全書 普濟方	曰積小成高大也凡小兒之病狀證甚多造次之間徧	載不盡其諸藥方備在諸經今聊舉食治單方以救倉	卒之要爾	方	四味梁米湯 治小兒泄注	梁米 稻米 黍米 <small>各三 合</small> 蠟 <small>如半 彈丸大</small>	右以東流水二升煮梁米三沸絞去滓以汁煮稻米	三沸去滓用汁煮黍米三沸絞去滓置蠟於汁中候
-----------------------------------	---------------	---	----	---	---------------	---------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	------	---	----------------	---	----------------------	----------------------



消每服半合空心午後各一隨兒大小加減

牡丹粥方 治小兒癩瘕病

牡丹葉 漏蘆去蘆頭 決明各一兩半 雄豬肝去筋膜切碎二兩

右水三升煎牡丹葉等三味去滓取一升半入豬肝

及純粳米二合煮如常粥空腹食之隨兒大小加減

人參粥方出聖方 治小兒冷傷脾胃嘔逆及痢驚癇

人參半兩去蘆頭 白茯苓三分 粟米半兩 麥門冬一兩去心

右細剉每服半兩以水一大盞煎諸藥至七分去滓

欽定四庫全書

普濟方

下米作粥食

鷄子餅 治小兒秋夏中暴冷忽下痢腹脹乍寒乍熱

渴甚食之

鷄子二枚去殼 胡粉半兩炒 黃蠟一棗大

右先下蠟於鉢內微火上鎔次下鷄子黃及胡粉調

和候冷作餅與兒空心午後食之量大小加減

淡竹葉粥方出聖方 治小兒心臟風熱精神恍惚

淡竹葉一握 粳米一合 茵陳半兩



右水二大盞煎二味取汁一盞去滓後投米作粥食之	郁李仁粥方 <small>出聖 惠方</small> 治小兒水氣腹肚虛脹頭面浮腫小便不利	郁李仁 <small>一兩湯浸去皮尖微炒</small> 桑根白皮 <small>一兩剉</small> 粟米 <small>一合</small>	右搗碎每服半兩以水一大盞煎至七分去滓下米作粥入少生薑汁任意食之	黍米粥方 <small>出聖 惠方</small> 治小兒下痢日夜數十行漸至困弱	欽定四庫全書 普濟方	黍米 <small>一合</small> 鷄子 <small>一枚</small> 黃蠟 <small>兩半</small>	右煮粥臨熟下鷄子蠟攪令勻空腹服之	馬齒菜汁粥方 <small>出聖 惠方</small> 治小兒血痢不差	馬齒菜汁 <small>一合</small> 蜜 <small>半合</small> 粟米 <small>一合</small>	右以水一大盞煮作粥後入二味和調食前服之	扁豆粥方 治小兒霍亂母食	扁豆莖 <small>切焙 一升</small> 人參 <small>二兩</small>	右以水三升煮扁豆莖全熟下人參煎至二升去滓
-----------------------	---	--	---------------------------------	---	---------------	---	------------------	--	--	---------------------	-----------------	---	----------------------



取汁煮粟三合為粥與乳母食臨乳兒時先授去少許冷乳汁然後乳兒母常食此粥佳
牛乳飲 治小兒嘔吐
牛乳 一合 生薑汁 半合
右於銀器中慢火同煎約至六七沸一歲兒飲半合仍量兒大小以意加減
牛蒡粥方 <small>出聖</small> 治小兒心臟積熱煩躁恍惚
牛蒡根汁 一合 粳米 一合
欽定四庫全書 普濟方
右以水一大盞煮粥臨熟投牛蒡汁攪勻空腹溫溫服之
鷄子粥方 <small>出聖</small> 治小兒下痢不止瘦弱
鷄子 一枚 糯米 一合
右煮粥臨熟破鷄子相和令食之
梨湯粥方 <small>出聖</small> 治小兒心臟風熱昏憤躁悶不能下食
梨 三枚 粳米 一合
右以水二升煮梨取汁一盞去滓投米煮粥食之



葛根粥方 <small>出聖 惠方</small> 治小兒風熱嘔吐頭痛驚啼	葛根 <small>一兩 剉</small> 粳米 <small>一合</small>	右以水二盞煎至一盞去滓下米作粥入生薑蜜各少許食之
蘆根粥方 <small>出聖 惠方</small> 治小兒嘔吐心煩熱渴	生蘆根 <small>二兩 剉</small> 粟米 <small>一合</small>	右以水二大盞煎至一盞去滓投米作粥入生薑蜜汁少許食之
欽定四庫全書	普濟方	
漿水葱白粥方 <small>出聖 惠方</small> 治小兒小便不通肚痛	粟米 <small>二合</small> 葱白 <small>三七莖去鬚細切</small>	右以漿水煮作稀粥臨熟投葱白攪勻溫溫食之
治小兒驚風方		用白羊頭一箇丁香一兩同熬至軟同乳母空心盡食之
猪子肝 治小兒疳痢		用猪子肝一具切片炙熟空心食之



落床損瘀

附論

夫人血之在身隨氣而行常無停積凡小兒若因墮落傷損則血行失度隨傷損之處則停積若流入腹內亦積聚不散皆成瘀血在內顏色痿黃氣息微喘嗚嗚小寒翕翕微熱或時刺痛也

方

地黄散

出聖
惠方

治小兒落床傷於肢節青瘀疼痛

生乾地黄 甜瓜子 蒲黃 桂心 赤芍藥

欽定四庫全書

普濟方

川大黃

剉微
炒

當歸

剉微
炒

桃仁

浸去皮尖雙仁
炒黃各一分

右為細散每服不計時候用酒半合生地黄汁半合相和煖令酒勻調下半錢量兒大小加減服之

蒲黃湯

出聖
惠方

治小兒落床墮地如有瘀血腹中陰陰寒

熱不肯乳哺但啼哭叫喚者

蒲黃 麥門冬

大黃

黃芩

各十
銖

甘草

八
銖

芒硝

七
銖 黃連

十二
銖

右呶咀以水二升煮取一升去滓內芒硝分三服消息



視兒羸瘦半之大小便血即愈忌冷食

茯神散 治小兒落床體熱驚悸

茯神半 龍膽兩 犀角屑去蘆頭 子芩 麥門冬去心

人參去蘆頭 甘草炙微赤剉已 上各一分

右為麤散每服一錢以水一盞煎至五分去滓不拘

時候量兒大小加減溫服

蒲黃湯出醫方 治打撲或落床墮地至損血氣羸瘦痿

黃或時刺痛遊走不定

欽定四庫全書

普濟方

蒲黃 當歸洗 生地黄各一兩 琥珀 赤芍藥 桂

心各半兩

右為細末每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服

大小加減服之又一方川大黃剉微炒

茯神丹出醫方 治證同前

茯神 當歸 麥門冬去心各一兩 人參 黃芩 草

龍膽 桃仁湯浸去皮炒各半兩

右為細末拌勻煉蜜和如黍米大每服十粒生地黄



汁少許同酒下大小加減	犀角散 治小兒落床體熱疼痛	犀角屑 赤芍藥 芎藭 當歸 甘草	已上各一分 川大黃 半兩剉 微炒	右為麤散每服以水一小盞煎至五分去滓不計時候溫服量兒大小加減服之	治癩撲傷損 出楊氏寶書	用蘿蔔切細片研碎以罈之用紗帛裹患處過宿臭	欽定四庫全書 普濟方	甚即愈如覺骨損絞生藕汁和酒飲之即効一方用	蘿蔔子湯	又方 出楊氏寶書	用半兩錢不拘多少煨通紅醋淬令酥脆研令細麩香酒調下如癩撲折損立見接續微響其効如神	接骨丹 出微生家寶 治小兒癩撲傷折筋骨通神	大礬 六箇 臘月猪脂 去膜淨 黃蠟 秤 蜜陀僧 研 別	秤 自然銅 如荔枝皮 黃丹 細研 四兩 血竭 別研 沒
------------	---------------	------------------	------------------	---------------------------------	-------------	----------------------	------------	----------------------	------	----------	---	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------



藥 別研 秤 別研 滴乳香 各半兩 別研細秤	右研各製精細先將猪脂再熬成汁次下蠟攪勻次下蜜陀僧及大礬等六味皆逐旋下只留乳香末下用微火不得住手攪火纔猛即藥無力矣將欲成膏取下一茶少頃候藥不至大熱投乳香攪勻衆手乘溫熱急丸如彈子大以新磁罐子收之須厚蓋扎之每一大丸治兩人大人可治一人或作小丸乳香酒下空心服但不可多喫恐生骨耳	欽定四庫全書	普濟方
普濟方卷四百一			

