

欽定四庫全書

普濟方卷四百三

明 周王朱橚 撰

嬰孩痘疹門

一切痘疹

附論

夫嬰孩患疹痘瘡子者皆是積熱在於臟腑蒸鬱熱毒散於四肢小兒皮膚內嫩弱多成此疾凡食乳嬰孩湯藥不可與童兒同療用藥過劑必有損也蓋由輕啜乳在於臟腑熱極方成此疾腑熱生於細疹臟熱生

欽定四庫全書

普濟方

於痘瘡若用湯藥宜療於乳母也又絕乳嬰孩患者多由積熱伏在於脾肺之間而不早以湯藥療其病源則毒熱行於四肢榮衛之中漸透於肌膚之表疹痘乃隨邪熱而出也嬰兒之性自然陽盛而陰微臟腑陰陽氣逆大小便多秘不通纔覺是此疾即可便與疎利即輕患也若已出即不可疎轉若出定却宜利大小腸按扁鵲及倉公論云療於嬰孩服以湯散性有可餌之者不可餌之者宜先和節陰陽調治榮



衛方利臟腑即熱氣漸解也○凡絕乳嬰孩生於疹痘
或未出已前是此疾候按扁鵲論云可先以油劑服之
行解四肢熱極或疹痘已出不可以油可服平和湯藥
療於肝臟解於敗熱慮熱毒攻肝後衝於眼目生障翳
今觀時醫及疾患之家疹痘未出已前多是誤認疾候
皆以他藥解之其間或餌以躁藥或餌以冷藥不無失
傷時醫用藥直候瘡疹子出病家方覺患者住餌醫者
拱手已患之後俗多禁餌致大小便不通不能調於湯

欽定四庫全書

普濟方

藥和於臟腑遂停敗熱在於臟腑之間攻於肝臟疹痘
纔愈致令衝於眼目成於障翳不遇醫治瞳人遂損因
茲無所見也○凡斷乳嬰孩童子患疹痘疾候初覺多
似傷寒面色與四肢俱赤壯熱頭疼腰背疼足多厥冷
眼睛黃色脉息但多洪數纔大不定小便赤少大便多
秘纔覺四肢色候及脉息雖是疹痘疹未攻皮毛穴出
者便可以服餌勻和臟腑疎洩逐下若疹痘已結右皮
毛穴處微似出即不可疎洩也或疹出大盛竇穴膿水



者却可踈利也或未與踈利轉即且急服紫草飲子方
辯小兒痘証

呵欠 嚏噴 睡中發驚 或耳尖冷 眼澁

辯復食

口熱 或口中醋氣 妳辯不消 或腹中疼痛

如斑證少具其斑未發乃與升麻湯三五錢帶熱服
之待身表溫和斑瘡已顯服藥乃止如其身涼其斑
未出辨得斑証無問服數直候身表溫和斑瘡顯後

欽定四庫全書

普濟方

乃止只時時與桔梗湯寬利胸膈快咽喉

方

宣風散 治小兒瘡豆盛出身體熱煩渴腹脹氣喘大
小便澁面赤悶乳及氣腫水腫并一逐脾間風又治
風腫積腫又治熱筋脉攣縮作痛及豆瘡二三日瘡
病不佳欲死者一服効蓋熱氣蒸於皮膚故瘡痂不
得焦也宜服此導一二行後服生犀磨水解之瘡痂
即焦其効如神



檳榔	陳皮	甘草	各半	牽牛	用四兩半
右為細末三二歲蜜湯下半錢三歲以下一錢食前	易老加防風海藏云與通膈丸相上下氣血也一方	用一錢水半盞食前服風熱蜜湯調下			
牛蒡子	炒五錢	白殭蚕	去絲一分		
右為末每服一大錢水六分盞紫草二七寸煎四分	連三服量見大小加減				
欽定四庫全書		普濟方			
薄荷散					
家薄荷葉	一兩	麻黃	去節	甘草	炙各五錢
右為末入姜棗煎服量見大小為劑					
荆芥湯					
荆芥穗	薄荷葉	牛蒡子	炒	甘草	炙各等分
右咬咀白朮煎量見大小為劑					
安班散	調理瘡疹已發未發皆可服之				
川升麻	赤茯苓	白者亦用	黃耆	羌活	各一人參
					去蘆



<p>枳殼<small>去穰炒</small> 桔梗 甘草<small>各五錢</small></p>	<p>右咬咀每服二錢水半盞紫草少許薄荷一葉煎至五分去滓通口服之或加木通糯米同煎量兒大小為劑</p>	<p>余記治一小兒瘡豆毒氣入心心煩強躁適無討腦子處極是束手無措余自處一方應手而愈用菘豆粉一錢硃砂五分研極細麥門冬濃煎候溫調五分服隨即心神定自此而愈此乃解圍活法耳</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>余記一婦人年十八九歲出豆正出後忽平伏低陷適遇經脈行其家甚慌余曰証雖危然豆疹低伏乃是血動或苦無害遂用四物湯加人參黃芪四服痘子光壯後只是四物湯此病危甚而愈</p>	<p>當歸丸 當歸<small>五錢</small> 甘草<small>一錢</small> 黃連 大黃<small>各二錢半</small></p>	<p>右先將當歸熬膏子入藥末三味為丸漸加服之以利為度</p>	<p>消毒救苦散 治班疹悉具消化令不出如已出稀者</p>
---	---	--	-----------------------	--	---	--------------------------------	------------------------------



再不生斑仲冬立此方隨四時加減通造化明藥性者能此

麻黃 羌活 防風 各五分 川芎 藁本

葛根 蒼朮 黃芩 酒炒 生黃芩 柴胡 各二分

細辛 紅花 蘇木 橘皮 白朮 各一分

升麻 生地黄 酒黃栢 各五分 生甘草 一分

黃連 當歸身 各三分 連翹 五分 吳茱萸 半分

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去滓熱

欽定四庫全書

普濟方

服空心食前夫斑瘡出者皆因內傷必出斑營氣逆

故也大禁牽牛巴豆食藥宜用半夏枳朮大黃益智

之類去其青瀉止其吐若耳尖冷呵欠睡中驚噫噴

眼澁必出斑也○諸大膿胞水小斑癰疹三色皆營

氣逆而寒復其表宜以四味升麻湯中加當歸連翹

此定法也○如肺或膿斑先顯喘咳或氣高而喘促

加人參黃芩以瀉壯火而補元氣○如心出小紅斑

必先見血溢驚身熱肌肉腫脉弦洪少加黃連○如



命門出癰疹先必骨疼痛不敢動搖少加生地黃黃 栝○諸斑疹皆為陰証瘡瀕因傷於乳食脾胃不足 營氣逆行雖火勢內熾陰覆其外故錢仲陽製四物 升麻湯發之如有傳變証依加減服之
紫草飲子 治小兒痘瘡出被風吹復不見入皮膚內
紫草 人參 芍藥 蟬蛻 甘草 川山甲 <small>上等拌</small>
<small>炒各等分</small>
右為末每服一錢水一盞煎七分作三四次溫服
欽定四庫全書 普濟方
平和飲子 治小兒瘡疹
人參 白朮 茯苓 甘草 升麻 <small>各等分</small>
右為細末每服一二錢水煎去滓溫細細飲之量歲 大小虛實以意詳之此藥治諸瘡疼痛煩渴不寧者 皆可服之惟小兒瘡疹尤佳
連翹散 治一切熱兼治瘡疹有神
連翹 防風 梔子 甘草 <small>各等分</small>
右為末水煎服海葢云治熱在外而不厥此少陽藥



也

木香散 藥性溫平能和表裏通行津液清上實下救
陰助陽治小兒腹脹瀉渴其効如神○瘡始出五六
七日之間身熱或腹脹足指冷或瀉渴或身熱驚悸
腹脹或瀉頻津液內耗血氣不勻瘡雖起而不靨如
身溫腹脹咬牙喘渴難治緣水穀去多津液枯竭飲
水不止蕩散真氣故多死者急與木香散異功散救
之若欲靨已靨忽不能靨腹脹煩渴及瘡已靨其痂

欽定四庫全書

普濟方

欲落不落煩渴不止不可與水密西瓜红柿食之轉
生焦渴或頭溫足冷或瀉咬牙難治急宜服之○如
腹脹瀉渴足指冷渴驚悸渴身溫渴面色眊白渴寒戰
渴氣急咬牙渴水轉渴不已已上九證非熱也脾胃
虛津液衰少也宜木香散不愈加丁香攻裏官桂發
表表裏俱實其証不致痒塌喘喝而死

木香 大腹皮沉 人參蘆 桂心 赤茯苓去皮

丁香 前胡蘆 訶子肉 青皮去穰 半夏



姜製 甘草 各三分		右剉每服二錢姜三片煎溫服空心量兒大小以意 加減	異攻散 能除風寒濕痺調和陰陽滋養氣血使痘瘡 易出易靨不致痒塌○痘瘡欲靨已靨忽不能靨頭 溫足指冷或腹脹瀉渴氣促速宜服此○瘡痘十日 至十一日當靨不靨身不壯熱悶亂不寧不則硬氣 煩渴咬牙急宜服此加木香官桂以救陰陽表裏	欽定四庫全書 普濟方	木香 官桂 去皮 人參 去蘆 赤茯苓 去皮 當歸	丁香 厚朴 姜製 陳皮 去白 肉豆蔻 各二錢半 白朮	一錢五分 半夏 一錢半 附子 炮一錢半 有熟去之	右麤末每服三錢水一盞生薑三片棗五枚煎七分 去滓空心稍熱服三歲兒作三度服五歲兒作兩度 服一週兩歲兒作三五度與服病有大小以意加減 此藥家傳五世累經効驗此藥專理瘡痘泄瀉寒戰 咬牙氣急痘不光澤一方無陳皮半夏
--------------	--	----------------------------	--	---------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---



人參羌活散加麻黃

用薄荷葱白煎服湯氏曰汗後尚熱宜服此去麻黃加紫草如已見三五點加紫草陳草皮赤芍藥使熱退瘡出亦輕更調辰砂末半錢以制胎毒瘡出亦輕

胡荽酒 治瘡疹令速出

一名胡荽散

用胡荽三两切先以好酒三盞煎至數沸入胡荽再煎使用器蓋定不令氣出候冷去滓微微從項已下以噴兒背腹及兩足不可噴頭面仍噴房內床帳常

欽定四庫全書

普濟方

掛胡荽以群穢惡楊氏曰以胡荽酒噴身使瘡出快也若兒虛弱及天氣陰寒則可用之若春夏晴熱陽氣登越之時及兒壯實加以酒麴助虛以大益大胃中熱熾毒血蓄聚變成黑陷急煎紫草湯入猪尾血

和龍腦服之

一方胡荽法令乳母飲酒為佳

人參羌活散 治小兒疹痘因服熱藥多發而不透身

體頭面兩目皆腫連日風搖奮身硬直以荆芥薄荷煎湯服一方用天麻防風丸煎紫草湯同羌活散調



服	方見本門痘瘡未見乃可表發類
消風散	治痘瘡或發或未發忽面青暴吼為風邪所傷用此主之痘證以痘冷尻冷足下冷及耳後有紅縷之然須見心曾間細點如粟起則真是
人參	川芎 羌活 白茯苓 <small>去皮</small> 僵蚕 <small>炒</small>
防風	藿香 蟬退 荆苓穗 甘草 <small>炙</small>
厚朴	<small>製</small> 陳皮 <small>各二錢</small>
右為末	荆苓湯下紫草生葱湯常服亦得
欽定四庫全書	普濟方
紫背荷殭蚕散	
紫背荷葉	<small>霜後貼水者住</small> 真殭蚕 <small>炒去絲</small> 牛蒡子 <small>炒各等分</small>
右細末	研胡荽汁和酒服一錢米飲亦可
五積散	<small>方見風寒暑濕門中寒類</small>
凡遇冬	春天寒恐被風寒侵襲去麻黃加肉桂當歸
川芎	紫草 薑葱煎一方加木香砂仁薑棗煎服
辟穢丹	熏解穢惡
蒼朮	甘松 川芎 乳香 降香 北細辛



<p>右末水丸烈火焚之</p>	<p>瀉膀胱法</p>	<p>先用桂枝芍藥大戟等分為末服一錢，<small>湯調次服</small></p>	<p>加味宣風散 <small>方見瘡疹到醫類</small></p>	<p>大功散 治痘瘡未發正發及未受證者</p>	<p>蒼朮 <small>五錢 米泔浸一宿</small> 陳皮 <small>五錢 去白</small> 防風 <small>去蘆</small> 荊芥穢 <small>各三錢</small></p>	<p>赤芍藥 <small>五錢</small> 厚朴 <small>薑製炒</small> 柴胡 <small>去蘆</small> 縮砂仁 <small>各二錢</small></p>	<p>牛蒡子 <small>炒二錢</small> 當歸 <small>酒浸二錢</small> 紫草 <small>三錢</small> 川芎 <small>五分</small></p>	<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>	<p>黃芩 <small>二錢</small> 乾葛 <small>二錢</small> 甘草 <small>炙一錢</small></p>	<p>右晒乾為末每家用田螺靨七箇桃柳枝各七寸菴</p>	<p>豆浸透取皮半盞淨先司命鍋入井水煎熟出滓取</p>	<p>清汁再研雄黃末一錢同入鍋內攪勻用節子捧在</p>	<p>中庭自東方起南西北中各倒一盞將藥與已出及</p>	<p>方發熱及未受證者服</p>	<p>聖功散 治豆瘡已出未收服此解熱消毒勻氣活血</p>	<p>調脾斂瘡神効</p>
-----------------	-------------	--	-------------------------------------	-------------------------	---	--	--	---------------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	---------------



防風 蒼朮 <small>米泔浸</small> 荆芥穗 陳皮 <small>去白</small> 牛蒡子 <small>炒</small>	木通 人參 <small>去蘆</small> 川白芷 厚朴 <small>薑製</small> 黃耆 <small>鹽水炙</small>	黃芩 當歸 <small>酒浸</small> 赤芍藥 柴胡 <small>去蘆</small> 肉桂 <small>去皮</small>	木香 枳殼 <small>煨</small> 赤茯苓 甘草 <small>炙</small> 礞砂仁	蟬蛻 川芎 紫草 桔梗 <small>各等分</small>	右除製外餘藥不見火晒為細末先用米泔水溫調一服次淡煮獷猪肉或鯁魚田螺泥鯁櫓藥與患者空心食之無熱者酒調肉櫓有熱者米泔汁調藥櫓	欽定四庫全書 普濟方	肉食之如痘不起脹用常酒鉚藥與藥末等分酒調肉櫓食之瘡起脹便去酒藥如前櫓食如大便秘結加四順飲櫓食微利即去四順飲如前櫓食空心櫓食聖功散仍食後服神功散以解熱毒	天花散 治痘失音	天花粉 桔梗 白茯苓 <small>去皮</small> 訶子肉	石菖蒲 甘草 <small>炙</small>	右末水調在椀內用小竹七莖縛作一束點火在椀
--	--	---	--	--------------------------------	--	---------------	---	----------	----------------------------------	-------------------------	----------------------



內煎臨卧服

茯苓湯 治豆瘡痰盛

白茯苓 去皮 桔梗 去蘆 天花粉 半夏 湯泡 甘草

右剉生薑夾門冬煎服

蟬蛻一物散 治瘡疹漸作身熱似傷寒候只耳尖脚

稍或腹痛者是瘡疹

用蟬蛻二十一箇洗去泥土為末用水一盞慢火煎

至七分去滓量大小溫服如覺疹已出更依前三五

欽定四庫全書

普濟方

次若冷服即有瘡痕苦不是瘡疹候誤服無害

三豆飲 治天行疹痘活血解毒或覺鄉井有此證預

防之則不染

赤小豆 菘豆 黑豆 各一升 甘草 五錢

右搗淨豆甘草以水煮熟逐日空心任性食豆飲汁

已染者輕解未染服之七日不發如冬月常服可消

臟腑中蘊熱

惺惺散 治小兒風熱及傷寒時氣瘡疹發熱咳嗽不



已恐生疹子 桔梗 <small>去葉</small> 細辛 <small>去葉</small> 苈葶根 甘草 <small>炙</small>	白朮 人參 <small>去蘆</small> 白茯苓 <small>去皮</small> 川芎 <small>各等分</small>	右為末每服一錢小一小盞薄荷三葉同煎四分溫服如要和氣入生薑煎服不拘時一方無川芎	白虎加人參湯 石膏 知母 <small>一兩</small> 甘草 <small>炙 五錢</small> 粳米 <small>一合</small> 人參 <small>五錢</small>	右剉水煎米熟為度溫服 欽定四庫全書 普濟方	天麻散 天麻 川芎 升麻 防風 羌活	半夏 <small>薑製各等分</small> 細辛 蟬蛻 <small>去嘴</small> 荆芥 甘草 <small>炙各二分</small>	右剉薑棗煎夾寒加桂夾暑加柴胡黃芩夾濕加茯苓蒼朮	枳殼桔梗湯 治胸腹脹滿 枳殼 <small>銹炒去穰各一兩</small>	右剉散每服二錢水二鍾煎至一盞分二服
---	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------	--	-------------------



小兒麻豆方

用荊苓少許爛研以新井水將布帛裂過入一滴許
麻油打勻令飯之便不悶亂麻已出用黃蠟煎青膠

水即安

青膠乃守皮膠是也

紫草湯 治絕乳嬰孩并童兒患疹豆疾候初覺多似

傷寒面色與肢俱赤壯熱頭疼腰脊疼足多厥冷眼
青黃色脉息多浮洪至數大不定小便赤少大便多
祕纔覺四肢色候及脉息雖是疹豆疾未攻以毛穴

欽定四庫全書

普濟方

出者便可以服餌勻和臟腑疎泄逐下藥按倉公論
云可服油劑不可用燥藥不可用冷藥若疹已結在
皮毛穴處微微出即不可疎泄也或疹出大盛竇穴
膿水者却可疎利也或未與疎轉急且即服此藥
紫草二兩新者細剉先以百沸湯浸好便以物合定
勿令紫草氣出放入人體凡五十日至一百日嬰孩
服藥注子一百五十日至二百日嬰孩服一注子一
歲至二歲兒服半合三歲至四歲兒服一合並宜於



食前午後服此湯疹痘雖出勢亦輕耳常服無妨
治小兒未滿百日患痘瘡槐白皮湯浴方

槐白皮 一兩
益母草 五兩

右以水五升煎至三升去滓浴兒了更取蕓薹菜濃
汁煎再浴作蕓薹菜與乳母亦佳

浮萍丸 治小兒瘡子不出煩悶驚悸

浮萍草 陰乾
晚蚕沙 白薄荷葉 各一分

右為末用薄荷自然汁煮麵糊和為丸如鷄頭大每

欽定四庫全書

普濟方

服一丸薄荷湯化下不拘時

龍腦散 治小兒出瘡子不透旋出旋焦

龍腦 牛黃 丹砂 地龍 麝香 乳香
去土 取末

木猴梨 五十枚
雄黃 各一錢
鱈魚甲 五片
紫草 五錢
切焙

甘草 生剉 二兩

右為散用猪尾上血拌勻入在竹筒子內用油單封

裹綿纏定於深坑子內調稀猪糞浸二七日出淨洗

每服一皂子大龍腦水化下併三服見効



定命散	治小兒瘡疹毒氣不出或出後乾黑色服此藥發出毒氣瘡子細紅而出一名定命硃砂散
丹砂	研五錢
龍腦	研
乳香	研
馬牙消	研
甘草	為末各二錢
右同研均用十二月新獐猪血半升同研勻用青竹筒長二尺留兩頭節開一頭作竅注藥在內黃臘塞定以油絹緊裹封勿令透氣埋地坑中至一日五日取出水洗掛風中四十九日劈開取藥研為細散每服五分新水調下	
欽定四庫全書	普濟方
人參丸	治小兒瘡子黑色
用人參一分為末用牛李子汁瓷器內熬成膏和為丸如豌豆大每服一丸杏膠湯化下不拘時	
中和散	治小兒斑痘瘡退熱解躁
一名敗毒散	
白藥子	炙各一分
甘草	一分
雄黃	一錢
醋	淬
右為散每服五分量兒大小加減密湯調下	
南朱散	治小兒斑毒不退
此方見瘡疹後解餘毒類一名槐花散	
解熱丸	治小兒出瘡



甘草 <small>生剉</small>	鐵粉	青黛 <small>研各五錢</small>
右為末再研勻煉密和丸如鷄頭大每服一丸熟水化下	敗草散 治小兒痘瘡抓搔成膏膿血淋漓肌肉敗壞緣血氣衰肌內故也	用屋爛草乃蓋屋多年爛草或蓋墻頭草不以多少或曬焙為末用乾貼無時若渾身瘡破膿水不絕粘摻衣服難以坐卧可用三二升攤於席上令兒坐卧
甚効神妙無時候以其草經霜雪雨露感天地陰陽之氣善解毒奇功不可盡述	又方 用蕎麥粉或荔枝核燒灰摻瘡上亦好	斑爛作膿痛甚者 用細研黃土傅上或研芒硝末猪膽汁塗不能睡者 麥麩或芭蕉葉襯之
綿繭散 治小兒痘瘡後身體及肢節上生疔蝕瘡		

欽定四庫全書

普濟方



膿水不絕用出蛾綿繭不以多用白礬槌碎塞入繭
以灰火燒候白礬汁盡取出研細每用乾貼痘瘡口
內若不早治則潰筋骨以致難為醫治

瘡爛成片方

用黃牛糞乾傅膿多痛甚者乾淨黃土為末傅之瘡
遍口中痛不能食者五福化毒丹或生蜜浸漬黃栢
取汁啖之為愈凡瘡欲成痂頻以面油酥清蜜潤之
可搗血出無害若乾硬已久必成癍痕如茶醋如猪

欽定四庫全書

普濟方

肝猪血之屬每與食之則以脫之迹必為之黯慘然
而瘡痂已脫肌肉猶嫩不可盥洗大早亦不可以手
加之胡荽酒能避惡左右所不可無或蒼朮降真用
之亦可曰聖瘡七日熱而發七日泡而乾又七日則
平復如瘡舊矣大抵調順血氣溫和脾胃均平冷熱
則瘡出為甚易若實實虛虛損不足而益有餘則瘡
出為甚難調解之法無以逾此或豆豉燒存性作末
傅之



麥湯散 治小兒斑毒傷寒熱咳水痘毒狀如蚊咬變	成赤生黑不治一名北骨皮散	甜葶藶 一分用 隔紙炒 麻黃 一分 去節 甘草 灸半 分 人參 一两	大黃 一分濕紙 煨乾 滑石 半分 知母 各一 羌活 分	地骨皮 五錢 炒	右為末每服半錢水一小盞入小粒同煎至十數沸	服	摻方 治水泡豆瘡	欽定四庫全書 普濟方	苦參 滑石 蚌粉 輕粉 川白芷 各等 分	右為末乾摻之立効	治黧豆等瘡	用山豆根水研服少許	治小兒豌豆瘡衆醫不瘥服者神妙	天麻 甘草 各一寸 髮灰 黃丹 各一分 馬牙硝 三分	五色豆 各七 粒 黃塩 一分	右為散空心取一錢令水調服利下瘡隙瘡
-----------------------	--------------	---	--------------------------------------	-------------	----------------------	---	----------	---------------	-------------------------	----------	-------	-----------	----------------	----------------------------------	-------------------	-------------------



<p>治小兒豌豆瘡方 用臘月兔肉作醬食</p>	<p>又方 用臘月兔毛煎湯洗豌豆瘡及以毛傅甚良</p>	<p>又方 用肉爛煮取汁洗之乾脯亦得馬肉脯亦可</p>	<p>治小兒發豌豆瘡 用猪膽和朴消塗之</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>治豌豆瘡 取東壁土一塊許為細末傅之</p>	<p>又方 用馬齒草燒末傅瘡上其根須臾逐藥出若不出更</p>	<p>服良 青黛散 治小兒斑痘豌豆瘡</p>	<p>青黛 研如粉 半兩 鐵精漿 一升 右將青黛為散臨時斟酌鐵漿調之一百日兒至二</p>
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--



鼠粘湯 治小兒瘡豆已出未能得透皮膚或出未能	用狗螢五七箇空心淡酒送下即可救之	治小兒豌豆瘡入肚者	以小兒着取月水汁和水浴之	治發豌豆瘡方	錢得利三兩行其瘡自除神効	右同研細空心冷漿水調下半錢以吐為度再服一	乾漆 人中白 瓦松灰 牙硝 一分	許各少	普濟方	欽定四庫全書	治豌豆瘡	加減	用頭髮一两燒灰為末湯調服兩字隨兒大小以意	又方	取熟煮大豆汁服之佳	治小兒斑瘡豌豆瘡方	前午後各一服隨兒大小以意加減	百日兒服一字七乳前服一歲兒至二歲半錢在食
-----------------------	------------------	-----------	--------------	--------	--------------	----------------------	------------------	-----	-----	--------	------	----	----------------------	----	-----------	-----------	----------------	----------------------



週遍熱攻咽喉涎盛咳嗽赤眼心煩并消瘡癬癩如 瘡豆後毒氣攻眼成翳障腫痛各以藥時時服之翳 自消	
鼠粘子 <small>四兩</small> <small>炒</small>	荆芥穗 <small>二兩</small>
甘草 <small>一兩</small>	防風 <small>五錢</small>
右為粗末三歲一錢水半盞煎三分去滓溫服不拘 時臨卧逐日三服大利咽隔化痰涎止咳若春冬間 常服免生瘡癬老幼皆宜服海藏云大陽小陽藥也 首論溫平者此也一方沸湯點服	
欽定四庫全書 普濟方	
一方 治時氣發豌豆瘡	
用川大黃微炒水煎去滓服	
治小兒瘡豆方	
宜房室中用時時燒大黃蒼朮以辟惡穢之氣不宜 燒沉檀降真腦麝滴乳白膠等香	
加減異功散	
人參	白朮
白朮	白茯苓
京芍藥	黃耆
當歸	桔梗
厚朴	紫草
粉草	<small>各三錢</small>



右各咬咀初加南木香二錢煨加肉豆蔻煨再加附子炮隨輕重旋加用水煎服之	豆蔻丸	肉蔻 <small>三兩</small>	木香	縮砂 <small>三錢</small>	白朮	訶子 <small>二錢</small>	右為末米糊丸湯飲下量與	玄參升麻湯 治小兒觸胃必傳疹瘡未發之前並宜服之	玄參 <small>去</small>	升麻	葛根	芍藥	甘草 <small>炙各等分</small>	欽定四庫全書	普濟方	右咬咀每服五錢水一大盞同煎至七分去滓熱服	乳母多宜服	升麻湯 治發豆出後一向作熱	山梔子	柴胡	黃芩	升麻	甘草	赤芍藥	乾葛 <small>等分</small>	右咬咀薄荷湯同煎	人參散 治癰疽	甘草 <small>一錢</small>	麻黃 <small>二錢</small>	芍藥	荆芥	白茯苓
----------------------------------	-----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	-------------	-------------------------	---------------------	----	----	----	------------------------	--------	-----	----------------------	-------	---------------	-----	----	----	----	----	-----	----------------------	----------	---------	----------------------	----------------------	----	----	-----



人參

右為末每服半錢薄荷湯下

括樓散 治欲出豆癩

括樓

貝母

荆芥 各等分

右為末用紫草同煎連三服

治瘡癩不透畜伏危困者

右用人牙五箇炙令黃研末乳香湯下嚙鼻亦妙

香葛發斑湯 治小兒四時感冒發熱皆可服惟療小

欽定四庫全書

普濟方

兒痘瘡尚未出過者身發熱頭疼或手心冷耳冷即

痘瘡之苗也宜連進此藥數服痘瘡縱出則必少十

分穩當此方一大都夏真人家傳方云其家數代子

孫痘斑雖有比他人自然稀少因得此方本堂屢用

屢効真衛生之良劑也

紫蘇 一兩
五錢 香附子 一兩
五錢 升麻 一兩
五錢 乾葛 二兩

陳皮 一兩
赤芍藥 一兩
甘草 一兩
紫草 二兩

右咬咀每服四錢重水一大盞姜三片葱白一根同



<p>煎七分去滓溫服滓再煎服不拘時痘瘡出則不必服如痘瘡已出者不加紫草上服前藥</p>
<p>黃耆六一湯 治疹已出葛根湯痘出光壯地紅活色</p>
<p>黃耆 <small>密浸 一兩</small> 甘草 <small>一兩</small></p>
<p>右咬咀入棗水煎服</p>
<p>治卒發癩秘驗方</p>
<p>以石灰隨多少和醋漿水調塗隨手即減</p>
<p>治一切癩</p>
<p>欽定四庫全書 <small>普濟方</small></p>
<p>以水煮枳殼為煎塗之乾即又塗之</p>
<p>治瘡疹</p>
<p>用苦參五觔切以好酒三斗漬三十日每飲一合日</p>
<p>三常服不絕若覺痺即差取根皮末服之亦良</p>
<p>治一切癩</p>
<p>以水煮芒消塗之</p>
<p>治□疹</p>
<p>以苦楝皮濃煎服</p>



瘡疹已出未出

附論

夫瘡疹已出未出之間有類傷寒之狀其瘡之證自然增寒壯熱身體疼痛大便黃稠此乃正病若無他疾不宜服藥但當平調之如已出未出之間或瀉渴或腹脹或氣促裏虛也十一味木香散主之已出未出之間其瘡不光澤不起發窠不紅表虛也十二味異功散主之已出未出之間其瘡不光澤不起發根窠不紅而又腹脹瀉渴或氣促者表裏俱虛也宜與十二味異功散送下七味肉豆蔻丸

欽定四庫全書

普濟方

方

如聖湯 治小兒身熱頭痛頰赤面紅呵欠清涕瘡疹

已出未出

川升麻

赤芍藥

甘草

各二錢五分

紫草

五錢

白朮

二錢

陳皮

一錢五分

右咬咀每服三錢水一盞煎至六分溫服無時一方

入薑二片葱白二根山楂子根三寸同煎熱服壯熱

心煩加人參赤茯苓石膏麥門冬去心一方有全蝎



木通無白朮陳皮

四妙湯 治小兒麻豆瘡欲出渾身壯熱情緒不樂不

思飲食此可以內消仍令瘡無癍痕

紫草茸 川升麻 糯米 各五錢 甘草 二錢五分

右為粗末每服三錢水一大盞煎七分去滓溫服或

有數點黑陷毒攻內者如鄉村無藥便得紫草三二

酒煎灌之即發出紅活

二寶散 治豆瘡未發服之內消已出服之解毒不致

欽定四庫全書

普濟方

大盛 一名玳瑁散

生玳瑁

生犀角 經湯酒泡
炙者不用

右二味磨水二合攪勻服一方每服半合微溫服日

四五服為佳

紅子湯 平調瘡疹及治瘡泡已出色不紅潤身熱喘

急神志昏困 一名紫草散

紅花子 紫草茸 各一兩 麻黃 去根節 川升麻 各半兩

右為細末每服五分煎薄荷湯入酒一滴同調下



快班散 平和瘡疹	貫衆 <small>陳淨洗</small> 赤芍藥 甘草 <small>炮</small> 川升麻
枳殼 <small>麸炒去滓 各五錢</small>	右為細末每服一錢水一盞入竹葉七片煎至五分
去滓溫服量兒大小加減	調中散
白茯苓 人參 紫河車 甘草 <small>炙各等分</small>	右為細末每服二錢水一盞姜三片棗二枚煎六分
欽定四庫全書 普濟方	溫作三兩次服
竹葉湯	石膏 <small>四兩</small> 知母 <small>二兩</small> 麥門冬 <small>去心</small> 甘草 <small>炙各一兩</small>
右為粗末每服五錢水二盞竹葉一握煎至七分去	滓溫服
犀角飲子	犀角 甘草 <small>炙各五錢</small> 防風 <small>二兩</small> 黃芩 <small>一兩</small>
右為粗末每服五錢水二盞煎至一盞溫服	



抱龍丸 治小兒一切風熱中暑驚悸瘡疹欲出多睡咳嗽延盛面赤手足冷發溫壯睡中驚搐搦不寧	脉洪數頭痛嘔吐小便赤黃	天南星 <small>剉開裏白者生為末臘月內取黃牛膽汁和為劑却入膽內陰再為末半斤</small>	天竺黃 朱砂 <small>二錢研水飛</small> 雄黃 <small>五錢水飛</small> 麝香 <small>好者一錢</small>	牛黃 <small>一字</small>	右同研極細滴水丸雞頭大每服二歲兒竹葉或薄荷湯化下一丸不拘時候	欽定四庫全書 普濟方	一出控心散 治小兒班瘡	全蝎 <small>二十箇</small> 雄黃 麻黃 <small>去節各一分</small>	右為細末用芫荽以酒煎令溫調下	羗活散 治小兒風壅作瘡子解熱散毒	羗活 獨活 川芎 桔梗 蟬殼 地骨皮	前胡 甘草 <small>炙</small> 柴胡 天麻 荆芥 蘇蘇根	防風 <small>以上淨洗等分</small>	右為細末每服一錢水三分薄荷二葉盞內煎二分
--	-------------	--	---	----------------------	--------------------------------	---------------	-------------	--	----------------	------------------	--------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------



通口服大小加減藥水	奪命散 治小兒瘡麻已發未發並宜服之	升麻 糯米 紫草 甘草 <small>各半</small> 木通 <small>二錢五分</small>	右為剉散每服一大錢水七分去滓溫服六歲五歲以上量大小加減服之	黃耆散 治小兒熱退瘡疹	黃耆 柴胡 乾葛 甘草 <small>炙各一錢五分</small>	右為末每服一錢薄荷三葉水五分煎至三分均三	欽定四庫全書 普濟方	呷空心	治小兒麻痘已出未出便服此藥即稀	牛蒡子 <small>一兩同麸炒</small> 甘草 <small>一錢</small> <small>令黃色去麸炮</small>	右為末每服一字或二字用芫荽煎湯下	四聖湯 治身熱如火頭痛頰赤面紅呵欠鼻瘡瘡疹已出未出時服宜服	白芍藥 升麻 <small>各一兩</small> 甘草 紫草 <small>各五錢</small> 乾葛 <small>一兩</small>	木通 <small>五錢去皮節</small>
-----------	-------------------	--	-------------------------------	-------------	-----------------------------------	----------------------	------------	-----	-----------------	---	------------------	-------------------------------	---	-------------------------



右剉散每服二錢水一中盞入生姜二片葱白二根	山楂子根三寸同煎熱服壯熱心煩加人參赤茯苓	石膏麥門冬 <small>去心</small>	紫草飲 治豆瘡欲發未發或未透者	紫草 白芍藥 <small>去蘆</small> 麻黃 <small>去節</small> 當歸 甘草 <small>各等分</small>	右剉散每服二錢水一盞煎不拘時服	活血散 治豆瘡已出未出煩躁大人同	右用北白芍藥不以多少為末白湯調下大能活血	欽定四庫全書 普濟方	止豆瘡脹痛屢用屢効一方酒調海藏云張和之治	四肢出不快加防風大効此止的大陰藥也一方剉	碎水六分煎四分去粗分二服	蟬蛻膏 禦風邪辟惡氣透肌肉發痘瘡	蟬蛻 <small>去土</small> 當歸 防風 甘草 <small>炙</small> 川芎 升麻	荆芥穗 陳皮 紫草 赤芍藥 <small>各等分</small>	右為末煉密為膏每一兩作四十九木香湯下一方	無陳皮紫草芍藥煎荆芥湯下
----------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	---	-----------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	--------------	------------------	--	-------------------------------------	----------------------	--------------



<p>消毒散 治小兒瘡疹已出未能勻透及毒氣溢過雖出不快壯熱狂躁咽膈室一寒睡卧不安大便秘澁及治大人小兒上膈攻熱咽喉腫痛曾膈不利並宜服之瘡疹初出最不宜服宣利藥恐內虛毒入於裏如五七日不大便只服消毒散微得利便即止服若別無他證不宜服藥一方并壓後餘毒未除</p>
<p>牛蒡子 六兩 甘草 炙二兩 荆芥穗 一兩</p>
<p>右為粗末每服二錢用水一盞煎至七分去滓溫服</p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>食後小兒量力少少與之如治瘡疼若大便利者不宜服</p>
<p>人參湯 治小兒瘡痘將出</p>
<p>人參 一錢 葡萄苗 一分 林檎 一枚 木猴梨 七枚</p>
<p>右剉碎以水二盞煎至一盞去滓放冷時時令喫治大人小兒瘡疹已出而復隱其勢危甚諸藥不効者</p>
<p>治之萬不失一</p>
<p>紫背何葉 霜後貼水 白殭蠶 直者炙</p>



治天行瘡子不出 以紅藍花子吞數顆	服亦妙	荆芥穗水一盞同煎至七分放溫服如瘡疹已出更	治瘡泡將出 以牛蒡子炒令熟杵為末每服一錢入	右為末每服五分金銀薄荷湯調下	甘草 <small>各一分</small> 升麻 <small>一分</small> 硃砂 <small>研五分</small> 麝香 <small>少許</small>	當歸 蟬退 薄荷 羌活 茯苓 白附子	防風 川芎 全蝎 荆芥 紅花 麻黃 <small>去節</small>	欽定四庫全書 普濟方	表解散 治天行水疹腥臊未出潮熱麻子等証	右為末燈心同煎服之	甘草 <small>各等分</small>	升麻 白芍藥 乾葛 山梔子 藍葉	小便難澀	梔子升麻湯 治天行麻痘疹子未出潮熱如火譫語	下米飲亦得	右等分為末細每服一錢小兒半錢研胡荽汁和酒
------------------	-----	----------------------	-----------------------	----------------	---	--------------------	-------------------------------------	------------	---------------------	-----------	-----------------------	------------------	------	-----------------------	-------	----------------------



治時氣發瘡疹不出者以葡萄研酒飲之甚効

痘瘡未見乃可速利

附論

嘗考聖思論瘡痘臟腑氣逆大小便多秘才覺似此即疾可使與踈利而輕患也今觀時醫以疾患之家疹痘未出已前多是悞認疾候皆以片藥治之其間或以燥藥或餌冷藥不無失傷痘瘡初覺多似傷寒證如疹痘未攻皮毛宛出者便可服餌調和臟腑踈洩遂下而活人書及云瘡痘與傷寒相類疑似之間只與升麻湯治

欽定四庫全書

普濟方

瘡子已發皆可服不可踈轉痘瘡已定却宜利大小腸此為大戒傷寒身熱固不可下瘡疹發熱尤不可轉世人乃云初覺以藥利之宣其毒氣悞矣如小兒傷寒頭痛潮熱咳嗽氣粗煩渴心躁小便多赤大便不通熱盛於心精神恍惚即發驚搐涎盛悶亂瘡痘未分大證小兒若執前說只與升麻湯不可踈轉其病可乎統言已發未發不可踈轉疹痘發熱在表尤不可轉論中使洗心散治瘡痘用大黃服之能動臟腑莫有妨害乎又云



痘瘡已出不可轉踈出得已定或膿血大盛却用踈利者亦非大抵瘡痘首尾皆不可下小兒身熱耳冷咳嗽輒用利藥即毒氣入裏殺人論中洗心散治身熱咳嗽皴瘡疹痘此藥性寒能利目又如何既言瘡痘首尾皆不可下只此論中無此散內使硃砂腦射膩粉水銀等服取如爛魚腸豈不是下藥也二說俱未定董氏論瘡痘未出往往疑為傷寒即以麻黃等藥重發其汗遂使表虛裏實或稱欲出多以熱藥活人書云易流必散內

欽定四庫全書

普濟方

用大黃麻黃治皴瘡痘疹并麻黃黃芩湯用黃芩休枚治瘡痘不快或出不快或出尚熱皆能發汗可不謂之無冷熱藥乎又云若為陰癘治之用溫驚藥則熱愈盛至三四日證候已定方用瘡痘藥所失多矣按諸書云陰癘者出於吐瀉之後大病之餘身體不熱而瘦癥者謂之陰癘不熱可得三四日證候已定方用痘藥諸書中表嘗見說有不身熱出瘡痘者不可不辨也張氏論云才覺是瘡痘便早踈利熱輕易療又云應瘡痘早出



若才出皆不可轉利既言才覺是瘡痘即是先證也又
云早出不可疎利於此自作兩說使後人不能無疑惑
也又錢氏論瘡痘惟用溫涼藥不可妄吐下及攻發又
云寒顫噤牙身黃紫腫以百祥丸下之又身熱煩渴腹
滿而喘大小便澀面赤悶亂大吐當利小便不差宣風
散下之嬰童寶鑑云疹痘是臟腑俱熱發皮膚為之熱
在腑為疹熱在臟為痘未發同一治未出可不解熱而
退既出忌忽下及冷藥逼之其病不出在裏害人今考

欽定四庫全書

普濟方

諸經方論有言之未盡者雖云痘瘡首尾皆不可下或
云未出宜疎利出定宜疎利出盛宜疎利分證不明互
說差殊驗之平日所治大抵瘡痘之病首尾証平下之
者誤首尾有實熱證不下者誤切不可用巴豆去下之
此藥乃攻食積爾首尾有虛寒證不補者誤痘瘡出透
澤肥紅證平者不須服藥寶鑑之說誠為可信錢氏之
用必勝膏治五太尉而愈活人書用無比散治四惡候
出不快及黑瘡子內使硃砂腦射牛黃輕粉水銀等服



之取下如爛魚腸推之藥惟難用而寶鑑云未發同一
治以此觀之但隨證用藥真明驗也醫官論云刑分輕
重患別淺深刑法二罪俱發從重者論醫書云二病俱
發從重者治誠良活法也蓋瘡痘多是冬溫所變若冬
有非時之氣瘡毒未發之前常宜服溫藥令大便稀薄四
順飲服令溫微劉大黃甘草下之則濕毒內消又有時
時行者大小傳染乘瘡毒未發之前亦可服餌兼飲油
劑以預防之設有痘瘡必輕易療若身疼壯熱頭疼心

欽定四庫全書

普濟方

煩頰赤氣粗不與小汗何由消散麻黃黃芩湯或洗心
散薄荷散湯如臟腑以秘毒攻腰腸心腹脹滿不與微
利何由解釋四聖飲大柴胡湯或調胃承氣湯然汗下
之法不可造次今熱之藥用何詳審活人書云疑似之
間只與升麻湯凡療瘡子已發未發皆不可踈轉或云
不可汗下寒熱之藥只可紫草湯一味飲之然此二說
甚善若執其兩端止治輕疾而以當治大病拱手待斃
若當遇或汗或下之證而疑惑不決荏苒經時以致夭



傷者多矣調瑟者必先移柱用藥者必先審證不可執一也

方

油劑法 治小兒臟腑伏熱毒疹痘未盛四肢微覺有熱食物似減頭髮乾燥或熱進退

右以生麻油一小盞溫和熱水一小盞旋旋傾熱水入油盞內不住手以杖子打攪直候熱水盡更打令劑如蜜即止夜卧時三歲半小盞一歲內外者每服

欽定四庫全書

普濟方

二蜆殼量大小加減直候大小便微利熱退瘡痘不生也○萬全方云可先以油劑服之行解四肢熱極或瘡痘已出不可以油可服平和湯藥療於肝蕨解於敗熱虛熱毒大盛

扁鵲油劑 治預解胎毒如已出及見紅點者不可服又以生甘草末或煎湯入清油用桃柳枝攪如密量大小增減與兒服微利為度

又方



右以手蘸清油摩兒背脊中間亦驗

化毒湯 治小兒麻痘瘡欲出一名紫茸散

紫草茸

升麻

少用

陳皮

等分

右剉入糯米五十粒溫服劉氏家傳方云服此一盞
即內消只二服有效

黃連散 治小兒熱毒盛發疹痘瘡初發早覺者宜服

此方

右用黃連一兩去鬚搗篩為散每服一錢以水一小

欽定四庫全書

普濟方

盞煎至五分去滓不許時候量兒大小分減溫服

清黛散 治小兒斑瘡及疹痘心神煩躁眠卧不安

右用波斯青黛如棗核大以水調服之疹痘論用磨

刀水調下

當歸散

川當歸

一兩

甘草

一分

右為細末每服二錢水一中盞豆豉十粒同煎至六
分去滓量兒大小服以利動為度逐日冷喫甘草汁



三歲以下一歲以上加減服

治瘡候未作膿心膈躁睡不安者

右用黑豆煮汁徐徐服亦解

油劑方 治小兒方一二歲發熱恐成瘡豆以此止之

生麻油

童子小便 各半

右逐旋夾和以柳枝頻攪令如蜜每服二蜆殼許服
畢令睡少時但三四服大小便利身體熱退即不成
瘡痘之證若行迹以露不可服

欽定四庫全書

普濟方

化毒散 治小兒瘡痘始出纔有白泡忽陷入於肉漸

漸作紫色無膿日夜啼哭煩燥 一名敗毒散

麝香

甘草 一分

右用水半碗令水乾去甘草將麝香切作片子令乾
為末入生腦子半錢研令均用生猪血研成稀膏子
煎薄荷湯化下一錢不過二服其毒氣從手足心出
如癰狀乃差此五死一生之疾候若便血瘡壞無膿
者十死不治一法可用蟬蛻末半錢好腦子一皂子



大猪心血三皂子大和作膏子用熱酒浸紫草令溫
下化服多時身上發大熱瘡毒頓出然後可依證調
治之

瘡疹出不快 附論

夫痘瘡出不快皆言毒氣壅盛妄謂其熱以藥宣利解
散致令臟腑受冷榮衛澁滯則血氣不能充實皮膚肌
肉其瘡不起發不充滿不結實不成痂煩多痒塌煩躁
喘渴死皆因宣利解散之過也關人氏云出不快者數

欽定四庫全書

普濟方

証不回下可不辨者自紅斑出齊之後當滴成血泡血
泡成膿膿泡成痂疔而愈若結斑已見三四日而不愈
者乃毒氣內陷其證危矣切不可妄發及妄下發之則
為斑爛下之則為虛脫凡小兒蘊毒在內遇冬溫或春
夏暄熱腠理蒸鬱遂出為瘡痘若正發之際忽天氣大
寒毒氣交伏而不出則精神昏冒面青發熱或纔言妄
語當此令用解肌表而出之如紫草蟬蛻發散兼溫養
如或血散之類或寒證畢脩者凡和解散之劑皆可斟



量用之又有紅班方出或內虛或因犯胃氣臟腑自利
虛弱不食遂陷而不出者亦用溫裏之藥甚者雖硫黃
薑朮靈礬伏火丹砂等亦可用或將成血泡之際一半
尚是紅斑點者此毒氣發越未透也宜半溫裏半助養
之劑或內虛甚而生寒大便利者宜理中薑附輩以溫
之裏溫則氣不消不陷伏也內實者皮厚肉密毒氣難
於發越至服大黃梔子乾葛石膏之類而得乎順者或
有通一當炎月觸暑者邪煩躁喘急大渴昏迷而發不

欽定四庫全書

普濟方

映用白虎石膏湯抱龍五苓之類而得安靜者此皆臨
病識證隨時審辨不可執一也凡瘡疹或成膿泡一半
尚是紅點此毒氣發越未透必不能乳食大便如常者
宜半溫裏半助養之劑理中湯四聖散紫草木香湯若
內實之人皮膚厚肉理密熱毒難以發泄至服大黃梔
子乾葛之類不得平順者宜服犀角消毒飲

方

藍根散 治小兒瘡疹出不快及倒靨



<p>板藍根 一兩 甘草 劉炒 三錢</p>	<p>右為細末每服半錢或一錢取雄鷄冠血三兩點同 溫酒少許食後調服下無證勿服</p>	<p>四物湯 治小兒時行疹痘熱已出未出不快又消瘡 斑余毒大瘡痘不透者為血滯故也此藥能活血調 順瘡痘無如此藥活人書用一味白芍藥為末治瘡</p>	<p>痘不快以此如四物湯誠瘡痘之仙藥也一方加甘 草尤妙</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>白芍藥 川芎 熟地黄 當歸 各等分</p>	<p>右為麤末三歲一錢水半鍾煎三分去滓此本是婦 人藥治血利痢入嬰粟殼同煎甚妙</p>	<p>化毒散 治小兒瘡痘未定或出不快</p>	<p>紫草茸 升麻 甘草 各等分</p>	<p>右咬咀三歲一錢水半盞糯米五十粒同煎三分去 滓不拘時劉氏傳云豨豆欲出渾身壯熱不思飲食</p>	<p>若服此一盞即內消已有一兩顆出即解其半若全</p>
----------------------------	---	--	-------------------------------------	-----------------------	--------------------------	--	------------------------	----------------------	--	-----------------------------



出即當日頭焦只三服消毒消飲同服妙	紅花湯 治小兒瘡痘不出	紅花子 紫草茸 各五錢 蟬蛻 一分	右咬咀酒水中半煎去滓溫服大小加減	驅毒散 治小兒瘡疹痘不快	白花蛇 酒浸一宿炙黃去骨為末 麝香 少許	右為末三歲一字酒調下蟬蛻湯亦得良以便出	無比散 治小兒瘡疹出不快及黑瘡子應一切惡候	欽定四庫全書 普濟方	及治痘毒灌咽喉聲啞涎喘	硃砂 一兩 麝香 腦子 膩粉 各一分	右為末一歲一字水銀少許用猪血尾三兩滴新汲	水調服寧穩得睡然後取下如爛魚腸葡萄穗之類	涎臭亞物便安乳汁調尤妙一方無水銀大人半錢	如聖紫草湯 治瘡痘出不快 或喫乳嬰兒與乳母兼服之四五歲已外只令	服兒	紫草 二兩 陳橘皮 一兩
------------------	-------------	-------------------	------------------	--------------	----------------------	---------------------	-----------------------	------------	-------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	----	--------------



右咬咀白水煎服 一方為末每服一錢水盞入葱白
三寸煎至六分去滓溫服量兒大

麝香膏 治瘡疹不透

右旋取猪心血調麝香少許塗兩手心并口唇上

無價散 治斑瘡發出不快 經驗名化毒散預取等分
黃土窖五日砂鍋盛鹽泥

固濟日乾至臘日燒末入
麝少許各健效化毒散

人猫猪狗臘晨燒 少許微將蜜水調

百者救生無一死 萬錠黃金也可銷

欽定四庫全書

普濟方

右將前四物於臘日早晨日未出盛貯於銷一錠銀

鍋子內用木炭火籠煨令烟盡白色為度但有發瘡

以覺有瘡或發不快倒推黑麝一切惡瘡並皆治之

每遇小童但覺瘡証每用藥一字用蜜調服萬無一

失據此藥工効無名可揚故以無價散呼之上項用

人猫猪狗四 口 乾糞依上法治用

救生散 治小兒斑疹出不快倒陷欲死者

右用真蒲黃五月上旬丙丁子日采以銀器內慢火



炒令深紫色細研每藥一兩入真麝香一字研勻每服一字至半錢入薄荷汁五點溫酒調下斑疹黑陷昏潰喘滿欲死者二三服神效

萬金散 治瘡疹已出未能勻遍色不紅潤

防風 三錢 人參 蟬蛻 各二錢

右為細末煎葡萄湯調下如無蜜葡萄亦可煎湯服了急用芥子末白湯調如膏塗兒脚心乾即再傳其毒漸復出瘡疹依前紅活

欽定四庫全書

普濟方

神效散 治小兒瘡泡欲出不出雖出不快倒靨者

右用鷄抱子殼內白皮不以多少以木炭火燒為灰出火毒細研以新汲水調下每服半錢日三服
加味四聖散 治瘡出不快及變黑陷倒靨

紫草茸 木通 黃耆 炒 川芎 各等分 甘草 炙減半

右剉白水煎服大便秘加枳殼大便如常加糯米百粒或曰糯米能解毒發瘡一方加南木香同等分
絲瓜湯發瘡疹最妙



或云瘡痘已出欲出熱盛服三四服消毒發瘡神效	右為末煎紫草糯米園荈子湯調食後臨睡日三服	犀角解毒飲 治小兒內壅邪熱瘡不出快	惡實 <small>四兩炒即 牛蒡子</small> 甘草 <small>一兩 炙</small> 防風 <small>五錢</small> 荊芥穗 <small>二兩</small>	後瘡徧勻四肢住後服	右剉加糯米百粒煎三歲以上服三錢以下一錢服	甘草 <small>三錢 炙</small>	紫草茸 <small>五錢</small> 陳皮 <small>二錢</small> 黃耆 <small>三錢</small> 赤芍藥 <small>五錢</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	快斑散	通糯米煎	右剉紫草薄荷煎溫服熱而實者加升麻或加白木	紫草 枳殼 <small>炒各 五錢</small>	黃耆 赤茯苓 <small>去皮</small> 羌活 人參 <small>去蘆</small> 桔梗 <small>去蘆</small>	安斑散	最妙或加甘草紫草	右用絲瓜連皮燒存性為末湯調服楊氏曰發痘瘡
----------------------	----------------------	-------------------	--	-----------	----------------------	----------------------------	---	---------------------------	-----	------	----------------------	--------------------------------	---	-----	----------	----------------------



一方為散水煎服大便實加大黃

猪苓湯 治暑天胃熱渴昏迷瘡出不快

猪苓 去皮 一兩 澤瀉 二兩 白朮 一兩 五錢 赤茯苓 二兩

右末加辰砂末煎車前子草生地黃麥門冬下

小柴胡湯

右加生地黃紫草木通車前草同煎服 方見瘡疹 大盛類

快毒丹 治疹痘瘡氣勻則出快蓋血隨氣行若內有

邪熱使氣不勻宜服之

欽定四庫全書

普濟方

黑牽牛 一方用 南木香 各一分 肉豆蔻 一方用 半兩

青皮 各等分 半生半炒 一方用 一兩 五錢

右末滴水丸黍米大每服七粒至十粒量大小加減

丸散紫草葱湯下前賢處方有玄妙木香勻氣豆蔻

青皮補脾又以牽牛瀉腎膀胱之腑也

托裏散 小兒痘瘡毒根在裏或氣血虛弱或風邪穢

毒冲觸使瘡毒內陷伏而不出出不勻者快此藥活

血氣調胃補虛內托瘡毒使之盡易收易靨



湯調下 一名玉 漿散	右為末每服一錢半鷄子清酒少許調下一方燈心	滑石 甘草 灸各 半兩	滑石散 右研勻煉密和丸如鷄頭大每服一粒人參湯下	硃砂 水細研 飛天竺黃 末各 一兩	龍腦 一錢 細研 南星 臘日釀牛膽中白日 內陰乾者取末一兩 坯子染胭脂	紅粉丹 治腑熱瘡疹不勻	欽定四庫全書 普濟方	右用白水煎服	又托裏散 補虛活血氣發瘡通行血氣位加	黃耆 木香 赤芍藥 蟬退 肉桂 各等 分	紫草調下一名內托散	右當歸人參黃耆各二兩餘各一兩為末拌勻木香	當歸 酒浸 肉桂 去皮取末 二錢五分 川白芷 不見 火 黃耆 寸截 鹽水	人參 去蘆 川芎 防風 苦桔梗 去頭 尾 甘草 生的	蒸 厚朴 姜汁浸 一夕晒
------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------	---	----------------	---------------	--------	-----------------------	--	-----------	----------------------	--	--	-----------------------



脫齒散 治瘡疹不出百藥不中者服此即出	右以人牙齒脫落者不拘多少於瓷內固濟大火煨令通赤候冷取出為末用薄荷酒調下半錢良以脉平和毒氣散瘡如粟米一方燒存性熱水調服	紫金散 療小兒瘡疹不快倒靨	紫草 蛇退皮 <small>炒焦</small> 牛李子 <small>炒各五錢</small>	右為麤末每服一錢水七分煎至四分去滓溫服	如聖散 療小兒斑瘡不快倒靨	欽定四庫全書 普濟方	右用赤芍藥不以多少杵為細末每服半錢煎葡萄酒冷調下白湯服亦可不拘時候	鷄蜂方 治小兒斑瘡出不快	右用開花蘿蔔煎汁時時與飲之	玉訣酒調散 治發瘡疹不出	牛蒡子 <small>五錢炒</small> 紫草 麻黃 <small>去節各半錢</small> 當門子 <small>五粒末一字</small>	臭椿子 <small>去皮為末一錢</small>	右以溫酒調下一字或半錢
--------------------	--	---------------	--	---------------------	---------------	------------	-----------------------------------	--------------	---------------	--------------	--	---------------------------	-------------



紫草湯 治三十六種內瘡子候	麻黃 <small>去節</small>	人參 <small>各一分</small>	杏仁 <small>七粒 去皮</small>
右麤末用水二盞煎至一盞去滓却分為三四服溫下分作二日服未可用諸藥	乾野人糞 <small>炭火煨為灰</small>	腦子	麝香 <small>各少許</small>
治小兒痘瘡出不快并傷寒不語	右為末每服一二錢新蜜水調下	治小兒發斑瘡	
欽定四庫全書			
普濟方			
大蟬蛻 <small>三十一個 去足洗</small>	甘草 <small>一錢半</small>	右用水半椀煎至一盞旋與服盡效已用驗	治小兒斑瘡不發
右以乳香研細用猪心血為丸櫻桃大水磨下一丸	至聖末星飲子	治小兒瘡子不出及不快	
硃砂 <small>一分</small>	麝金 <small>半兩</small>	右為細末每用一字或二字量兒大小入龍腦少許	以新汲水茶脚少許用調勻然後刺獷猪尾血滴三



點子入藥汁中令服不過一二時辰瘡子出便紅活
兒無他病神效

紫草膏 治麻豆不快

殭蚕 炒二 麻黃 去節 甘草 炙各 全蝎 十個 紫草

白附子 各一錢

右為末用蜜一兩酒半盞入紫草煎數沸後令旋旋
同和煎藥丸如皂角子大每服一粒用紫草湯化下
續用黃耆散調之

欽定四庫全書

普濟方

治瘡子未透黑靨者

右用蟬蛻不以多少洗淨為末一錢熟水調下立見
出透食乳者乳母亦服一錢神效

紫草木通湯 治瘡疹出不快

紫草 人參 木通 茯苓 糯米 各等分

甘草 減半

右剉散煎二錢溫服內虛大便利者可入南木香去
紫草一方無糯米用粳米



加味四聖散 治瘡痘出不快及變陷倒靨小便赤澁 餘熱不除一切候或被風吹復不見入皮膚內者	紫草茸 木通 <small>去皮</small> 南木香 黃耆 <small>炒</small> 川芎	甘草 人參 <small>各等分</small> 蟬蛻 <small>去足翼</small>	右剉散每服二錢水一盞煎不拘時候溫服大便秘 加枳殼少許大便如常加糯米百粒性解毒能驤而 發之	快斑散 治痘瘡出不快	欽定四庫全書 普濟方	紫草 蟬退 <small>去足翼</small> 人參 白芍藥 <small>各一分</small> 木通 <small>一錢</small>	甘草 <small>炙半錢</small>	右剉散每二錢水一盞溫服	神驗散 治小兒瘡子黑色及出不快	鮫鯉甲 <small>火炮黃色全老二十片</small> 地龍 <small>去土炒二十枚</small> 紫草 <small>五枚</small>	右為細末每服半錢溫酒調下後用衣蓋紅色即出	四君子湯 痘疹論云胃主飢肉調脾進食活血勻氣 其瘡不致痒塌倍加
--	---	--	--	------------	------------	---	-----------------------	-------------	-----------------	--	----------------------	-----------------------------------



川芎	當歸	赤芍藥	木香	紫草	縮砂仁
陳皮	枳殼	各等分			
右為末糯米湯調服					
玳瑁散	治小兒瘡疹熱毒內攻紫黑色出不快				
右用生玳瑁水磨濃汁取一合獷猪心一箇取中血					
一皂子大同研以紫草濃煎湯調都作一服					
殊聖奪命膏	治小兒瘡疹毒氣不散出不快及觸犯				
黑色甲盛熟牛李子七日八日採於盆內研汁生絹					
欽定四庫全書	普濟方				
裂去滓用銀器盛慢火熬成膏瓷器內收常令透風					
每服皂子大煎杏膠湯化下如人行二十里更進一					
服其瘡疹自然紅色毒氣慢一切瘡疹出不快並可					
服一名牛李膏至秋結實黑圓成穗或無生者市肆					
中買乾者為末水熬代用薰汲治小兒瘡疹豆泡惡					
候於皮膚下不出或出而不長及黑紫內陷亦用此					
藥仍云汲小年病此危惡殆極父母不認視過錢乙					
下此藥得安因懇求得其方遂傳於世惟於收時不					



知早晚故無全効今并收時載之九月後取研濾成膏每膏二兩研入好麝香半錢收貯不津器中九箭衛生方同但用桃膠半兩牛李子一兩炒為粗末每服一錢水七分煎至四分去滓溫服治療亦同一云牛李膏專治小兒瘡痘紫黑色陷寒顫噤牙憂齒身黃紫腫三服不愈即死
紫草回斑散 治小兒癩疹出不快或倒靨毒氣入服
紫草茸 黃耆 桑白皮 木通 枳殼
欽定四庫全書 普濟方
白朮 各等分
右為粗末每服三錢水酒各半盞麝香少許同煎
四聖散 治痘瘡出不快倒靨或小便赤澁餘熱不除一切惡候或被風吹復不見入皮膚內
紫草 木通 甘草 枳殼 各等分
右咬咀每服二錢水半盞煎三分溫服一方治伏暑胃經暴發痘瘡欲作黑陷心腹脹滿一切危証於本方中加黃耆等分名紫草散簡易云傷寒者表實而



<p>裏虛瘡疹者表虛裏實傷寒之邪始干於皮膚漸次傳於臟腑瘡疹之毒始蓄於臟腑而漸次泄於皮膚理傷寒之法宜先解表然後解飢切不宜轉瀉使毒氣轉深變為斑瘡或為倒靨其候危矣此疾亦多因傷寒失於汗下邪毒內蓄或天疫癘長幼相似當隨証以施治焉</p>
<p>四味散 治小兒瘡疹欲出不快</p>
<p>大鰕<small>乾者為末</small> 獐猪乾血 惡實 甘草<small>炙各等分</small></p>
<p>欽定四庫全書 普濟方</p>
<p>右為散三歲以下半錢七五歲以上一錢七煎赤芍藥酒調下不拘時候日夜各一服</p>
<p>發毒散 治小兒瘡疹出遲</p>
<p>地龍<small>去土</small> 防風<small>去叉各等分</small></p>
<p>右為細末每服一字用酒水各少許調下不拘時候一方 治時疾發豌豆瘡子未透心煩狂躁氣喘妄語或見神鬼或已發而陷伏</p>
<p>龍腦<small>生一錢</small></p>



右研細旋滴猪心血和丸如鷄頭大每服一九心煩
躁者同紫草湯化下若瘡子陷伏溫酒化下少時心
神便定得睡瘡子發透已發而不甚快或變惡候
紫草湯 治瘡疹熱盛而發不透者

紫草茸 紫蘇葉 升麻 甘草
灸各等分半兩

右剉散水二盞糯米五十粒同煎一盞溫分兩服

黃耆散 治雪天瘡疹難出皮膚溫壯頭燒脚冷呵欠

困悶無時驚悸

欽定四庫全書

普濟方

嫩黃芪 嫩柴胡 蘇木 紫草
各等分

右咬咀白水煎服大抵疹痘如見服表藥出更宜詳
細審察若其色淡白根窠不紅經日不起發以倪溫
中木香散主之如此後黑陷十救一二以文中異功
散主之

痘瘡未見乃可發表 附論

夫小兒纔覺傷風身熱未明是與不是痘疹便宜發散
可服四味升麻葛根湯如瘡疹始出一日至五七日之



間雖身熱腹脹足稍冷者不宜服也或身熱瀉渴及驚
懼腹脹汗出者皆不宜服而以十一味木香散治之古
人立升麻湯蓋治痘瘡之常不治其變也未有斑點之
前均發熱者常也已結痂疔之後均有餘熱弗鬱而飢
表未清涼者一變也是亦升麻湯方狀云瘡疹已發未
發謂未見斑點及作痂疔之後也若斑點既見痂疔未
結其候萬變在隨証滲泄曾非一定可拘若傷寒之變
患不一也豈可執一以應無窮之變或且升麻湯不過

欽定四庫全書

普濟方

涼肌解表而已未見斑點已結痂疔則可用之曷可用
之於瘡疹正作之時乎若不究此令兒飢寒表弱陷伏
而危殆矣○小兒壯熱昏睡傷風風熱瘡疹傷寒食相
似未能變認間服升麻湯葛根湯惺惺散小柴胡湯甚
驗蓋此數藥通治之不致悞也惟傷食則大便歐臭不
消化畏食或吐宜以藥下之○海藏云傷食宜以藥下
之者當詳其所傷何物生硬寒熱不等者不可用巴豆
之類大毒之藥下之升麻葛根湯太陽陽明惺惺散風



熱咽不和脾不和少陽渴小便不利也小柴胡湯往來 寒熱脅微痛少陽也然欲知其經當以脉別之○小	兒耳冷手足乍暖乍涼面赤時嗽時嚏驚悸此瘡疹欲 發也未能辨認間服升麻湯消毒散已發未發皆宜服	仍用胡荽酒黃栢膏暑月煩躁食後與白虎湯玉露散 熱盛與紫雪咽喉或生瘡與甘桔湯甘露散餘依前說	大人小兒同治法惟劑小大不同耳○消毒散太陽藥 白虎湯治身熱目痛鼻乾不得卧陽明藥也正為泄暑	欽定四庫全書 普濟方	之劑甘露飲子肺腎藥也甘桔湯少陽藥也紫雪天門 冬麥門冬黃芩地黃為血劑玉露散肺腎藥石膏寒水 石為氣劑	方	惺惺散 治小兒風熱瘡疹時氣頭痛壯熱目澁多睡 咳嗽喘竈	桔梗 真細辛 去葉 人參 去 白茯苓 去皮	甘草 炙 白朮 各一兩 真川芎 一兩
---	--	--	--	---------------	--	---	-------------------------------	-----------------------	--------------------



麻黃湯 治瘡疹煩渴甚者用之及痘正出煩喘渴躁	拘時	右為末三歲一錢水半盞煎三分大小加減服之不	前胡 桔梗 <small>炒</small> 防風 <small>各五錢</small>	人參 甘草 枳殼 <small>炒各一兩</small> 天麻 地骨皮	羌活 獨活 柴胡 川芎 細辛 白茯苓	心煩躁渴氣粗	羌活散 治小兒寒邪時氣瘡痘變蒸潮熱涎盛頭疼	欽定四庫全書 普濟方	無時大小以意加減一方加紫草	右為粗散每服三錢水一大盞煎至六分去滓溫服	白芍藥 <small>一方作赤芍藥</small> 川升麻 <small>一兩</small> 甘草 葛根 <small>一兩半</small>	七之間或已發或未發但身熱肢體痛者先宜服之	四味升麻湯葛根湯 治小兒熱欲作疹痘一日至五	服	同煎至六分濾去滓溫服不計時候量兒大小加減	右為麤散每服三錢水一大盞薄荷五葉生薑三片
-----------------------	----	----------------------	--	-------------------------------------	--------------------	--------	-----------------------	------------	---------------	----------------------	--	----------------------	-----------------------	---	----------------------	----------------------



紅綿散 治傷風傷寒麻豆身熱發搐疑是痘証	能表汗催出豆加木香	右剉姜棗煎微熱服一方加青皮或白青皮紫蘇亦	錢各五	茯苓 去皮各三錢 枳殼 去穰炒 陳皮 去白 甘草 桔梗 去蘆	前胡 去蘆 人參 去蘆 紫蘇葉 乾葛 半夏	先與此藥和解之	參蘇湯 治小兒凡覺身熱証似傷寒但未經瘡痘者	欽定四庫全書 普濟方	右剉葱白薄荷湯煎乳後服一方止用水煎	無汗 加麻黃 自汗 加桂皮	赤芍藥 石膏 火煨 乾葛 甘草 炙各五錢 黃芩 五錢	葛根湯 治天時炎熱欲發豆瘡服此解肌發表	咳嗽加射干一分 一名香甘湯	竹瀝一半和水煎或咽喉痛并嗽入麝香少許煩喘	右瀝咀白水煎量兒大小為劑若肺數有熱未退入	麻黃 去節 杏仁 去皮尖 桑白皮 微炒 甘草 炙各等分
---------------------	-----------	----------------------	-----	--	-----------------------------------	---------	-----------------------	---------------	-------------------	------------------	-------------------------------------	---------------------	---------------	----------------------	----------------------	--------------------------------------



<p>天麻<small>炮</small> 荆芥穗<small>各三錢</small> 甘草<small>炙</small> 麻黃<small>去節各二分</small> 全蝎</p>	<p>右末薄荷三葉紫草三寸入酒三五滴同水煎熱服如痘未出再進一服如二服不出即非痘証</p>	<p>調解散 治痘瘡外為風寒所折榮衛不和內為乳食所傷內氣壅遏以致冷硬</p>	<p>青皮 陳皮 桔梗 枳殼<small>製</small> 川芎 半夏<small>姜製</small></p>	<p>木通 乾葛 柴胡 紫蘇 紫草 甘草<small>炙等分</small></p>	<p>人參<small>炙半</small></p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>右剉散每二錢姜二片棗一枚水一盞煎服未効加楂根三寸一方無柴胡紫草一方無柴胡有當歸</p>	<p>不換金正氣散 治痘瘡外為風寒所折榮衛不和內為乳食所傷內氣壅遏以致冷硬</p>	<p>蒼朮 橘紅 半夏橘 厚朴<small>姜製</small> 甘草<small>炙</small></p>	<p>藿香葉<small>各一兩</small></p>	<p>右剉用川芎姜朮煎惡寒加肉桂紫蘓</p>	<p>人參羌活散 治小兒寒邪溫時疫瘡疹頭痛體痛壯</p>
--	--	--	---	--	----------------------------	-----------------------	--	---	---	------------------------------	------------------------	------------------------------



熱多睡亦治潮熱煩渴痰實咳嗽 <small>一名惺惺散</small>	羌活 獨活 柴胡 人參 芎藭 枳殼 <small>麸炒</small>	甘草 <small>炙各二兩</small> 前胡 桔梗 天麻 <small>酒浸</small>	地骨皮 <small>各半</small> 白茯苓 <small>去皮二兩</small>	右為散每服二錢水一盞入薄荷少許同煎去滓溫	服不拘時候全嬰方加防風德生方如嗽加桑白皮	八寶散 治小兒瘡疹已發未發在疑擬之間	白芍藥 羌活 升麻 乾葛 甘草 防風	欽定四庫全書 普濟方	撫芎 山茱子 <small>各等分</small>	右咬咀每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服	五積散 <small>方見傷暑濕門中寒類</small>	右加紫草木香縮砂仁姜朮煎後服去麻黃陳氏木	香散異功散通用	瘡疹壯熱煩渴 <small>附論</small>	夫痘瘡出而身熱大渴者七味人參白朮散治之如不 愈只服十一味木香散如腹脹者或瀉而渴或足指冷
---------------------------------------	--	---	---	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------------------	--------------------	------------------------------	----------------------	---------	--------------------------	--



而渴或驚悸而渴或人溫而渴身熱面眇白色而渴寒戰而渴或氣喘咬牙而渴或飲水轉渴不已皆非熱乃脾胃虛而津液少也宜服十一味木香散如不愈更加丁香官桂攻發其表裏不致痺榻喘渴而死也○出大盛而面黃大便黑煩躁喘渴或腹脹者此為有瘀血在裏宜犀角地黄湯及治瘡疹中衄血吐血毒氣彌盛若不鮮利其害尤速如抱龍丸至寶丹生犀磨汁紫雪之類皆可選而用之若大便不秘實小便不赤黃恐外熱而內寒又當別求治法也

欽定四庫全書

普濟方

方

葛根麥門冬散 治小兒熱毒斑痘頭痛壯熱心神煩悶

葛根 麥門冬 各三錢 去心 各
人參 二錢 去蘆
石膏 五錢

甘草 川升麻 各三錢
茯苓 三錢
赤芍藥 一錢

右為粗末每服三錢水一大盞煎至六分去滓溫服不拘時候量兒大小增減服



生地黄散 治小兒斑駁疹癰身熱口乾咳嗽心煩	生地黄 <small>半兩 去土</small> 麥門冬 <small>七錢 去心</small> 杏子 <small>炒微黃 去皮尖核</small> 欵冬花	陳皮 <small>各三錢</small> 甘草 <small>二錢 半炙</small>	右為粗散每服三錢水一大盞煎至六分去滓溫服 不計時候量兒大小加減服	人參清膈散 治瘡豆靨後熱毒不解涕唾稠黏鼻乾 身熱咳嗽痰喘潮熱煩渴咽膈不利大便如常小便 黃赤	欽定四庫全書 普濟方	人參 <small>去蘆</small> 柴胡 <small>去蘆</small> 當歸 芍藥 地骨皮	桑白皮 <small>炒</small> 茯苓 <small>去皮</small> 白朮 黃耆 知母 紫苑	甘草 <small>炙</small> 桔梗 <small>各一兩</small> 黃芩 <small>半兩</small> 石膏 滑石 <small>各一兩 五錢</small>	右為粗末每服三錢水一盞生姜三片同煎至六分 去滓溫服不拘時候量兒大小加減服	前胡枳殼湯 治痘瘡靨後痰實壯熱胸中煩悶卧則 喘滿大便堅實	前胡 <small>一兩</small> 枳殼 赤茯苓 大黃 甘草 <small>各半兩</small>
----------------------	--	---	-------------------------------------	---	---------------	---	---	--	---	---------------------------------	--



犀角飲	治小兒疹痘瘡其赤瘡子正盛令不入眼	一名
調肝散		
右咬咀每服入竹葉淡豉煎量兒大小為劑		
枳殼	麸皮炒黃	各半兩
梔子仁		一分
赤茯苓		
甘草	炙微	
赤劉		
大青		
升麻		
赤茯苓散	治疹痘瘡出後欬逆脇痛吃食不下	
香散治之		
不計時候如腹脹滿瀉渴足指冷者只服十一味木		
欽定四庫全書		
普濟方		
右為粗散每服三錢水一大盞煎至六分去滓溫服		
白茯苓	六味各	一兩
乾葛		二兩
人參		
白朮		
藿香葉		
木香		
甘草		
生津除煩止渴	一名白	朮散
人參白朮散	治小兒痘瘡已靨身熱不退此藥清神	
服		
不拘時候量兒大小加減如身溫脈微并瀉者不可		
右為粗散每服三錢水一大盞煎至六分去滓溫服		



<p>鈎藤 <small>鈎子</small> 川大黃 甘草 犀角屑 桑白皮 麻黃 <small>去根節</small> 龍膽草 <small>分半</small> 石膏 瓜蒌根 黃芪 <small>各半</small></p>	<p>分</p>	<p>右呔咀白水煎量兒大小為劑錢氏方名調肝散治 瘡疹大盛令不入目也一方瘡子退後用犀角濃磨 塗之更良</p>	<p>山梔子湯 治疔疹及斑毒狀如蚊蚤所嚙若毒盛色 黑者宜服宣毒膏</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>山梔子仁 白鮮皮 赤芍藥 升麻 <small>各一兩</small> 寒水石 甘草 <small>各半兩</small></p>	<p>右為末入紫草薄荷各少許煎服量兒大小為劑 牛黃丹</p>	<p>牛黃 川大黃 <small>各一兩</small> 粉霜 硃砂 <small>各一分</small> 右為末同研勻煉密丸如黍米大煎人參湯下量兒 大小為劑</p>	<p>通關散 治斑瘡水痘心躁發渴及小便赤色口舌生</p>
--	----------	---	---	--	--	---	---	------------------------------



瘡通心經	車前子 木通 甘草 瞿麥 山梔子仁
赤茯苓 人參 滑石	<small>各一分</small> 大黃 <small>一錢</small> 篇蓄 <small>半兩取嫩枝葉</small>
右為末灯心草畧煎四五沸服量兒大小為劑	
黃芪散 退熱調養	
黃芪 柴胡 乾葛 甘草 人參	<small>各等分</small>
右咬咀白水煎量兒大小為劑一方無人參用薄荷葉三葉煎	
欽定四庫全書	普濟方
黃芩甘草湯 治痘瘡閉熱不出煩燥不得服	
黃芩 <small>七錢半</small> 赤芍藥 甘草 <small>各五錢</small>	
右咬咀每服三錢水一盞若胃中虛冷其人能食飲水即噦脉浮發熱口鼻中躁能食者必衄加大棗三枚同煎若嘔者加半夏少許生姜三片同煎若食少者加參朮煎量兒大小各去滓加減服	
大青四物湯 治熱病汗下後身熱不除斑出如綿紋煩躁不得卧	



神功散 治痘瘡大熱發狂譫語此藥清心涼肌退熱	同煎五分食後溫服不用甘草用黃芩	右等分水煎服一方為末每服三錢水一盞入竹葉	生地黃 <small>焙乾</small>	甘草 <small>炙</small>	導赤散	地黄煎服	右倍加甘草生枳殼糯米煎服一方加紫草黃芩生	楊氏方敗毒散 <small>方見傷寒門傷寒類</small>	欽定四庫全書 <small>普濟方</small>	盛更加春夏秋寒有証亦服但加棗煎小兒減半	右剉糯米煎米熟為度子母同服但加生姜棗煎渴	石膏 <small>四兩</small> 知母 <small>一兩半</small> 人參 <small>四兩</small> 甘草 <small>炙二兩</small>	瘡赤黑出不快及疹毒餘熱	白虎湯 治溫熱及中暑煩渴并治小兒豆泡麸疹斑	至七分後入阿膠再煎令沸量兒大小加減服	右咬咀每服五錢水一盞半先將大青甘草豆豉煎	大青 阿膠 甘草 豆豉 <small>各一兩</small>
-----------------------	-----------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----	------	----------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------------	----------------------	---	-------------	-----------------------	--------------------	----------------------	--------------------------------



消毒服此藥鮮利及熱毒已攻頭目咽喉	黃芩 柴胡 <small>去蘆</small> 桔梗 <small>去蘆</small> 防風 <small>去蘆</small> 荊芥穗	木通 陳皮 <small>去白</small> 枳殼 <small>煨去油</small> 牛蒡子 <small>炒</small> 赤芍藥	紫草 赤茯苓 甘草 <small>各等分</small>	右剉灯心白附子麥門冬煎大便秘大熱加煨大黃 糯米煎微利即止後服大熱加竹茹大熱加北薄荷 山梔子仁天花粉	甘草散 治瘡痘畧出煩渴不止	欽定四庫全書 普濟方	粉草 <small>微炙</small> 括萎根 <small>等分</small>	右為末煎服一錢甘草通血脉發瘡痘	烏梅湯 治瘡痘熱渴	小黑豆 菘豆 <small>各一合</small> 烏梅 <small>二箇</small>	右咬咀新汲水一盞煎至清汁旋服	又方	用羗活散消風散消毒飲合和竹葉生地黃土朱煎	服
------------------	---	--	------------------------------	---	---------------	---------------	--	-----------------	-----------	--	----------------	----	----------------------	---



人參麥門冬散 治發渴煩熱及瘡痘身熱 麥門冬 一兩 去心 人參 去 甘草 炙 陳皮 白朮
厚朴 姜製各半兩
右為粗散每服三錢水一大盞煎至六分濾去滓溫服不計時候量兒大小加減與服
捻金散 治小兒麻痘瘡疹欲出渾身壯熱情緒不樂 飲食不思服此可以內消仍令瘡無癍痕 <small>方見本門瘡疹已出</small>
未出類一名四砂湯
欽定四庫全書 普濟方
透飢散 治臟腑蘊熱毒氣蒸薰瘡出不快煩喘昏悶 <small>方見本門瘡疹出不快類一名化毒散</small>
消毒飲子 治毒氣壅遏壯熱心煩痘疹難出未能透 <small>方見本門瘡疹攻咽喉類一名鼠粘子湯</small>
紅花升麻散 治小兒疹痘麻子潮熱焦啼煩渴寒凝
難出者
升麻 芍藥 乾葛 紅花 蘇木 麻黃 去節
黃芩 甘草 各等分



右為散白水煎服

瘡疹大盛 附論

瘡痘有可下証者以其出得大盛當結膿泡痂疔而不結者此是毒氣內外貫注若不速解之毒氣內入攻心為害極大治法宜猪尾膏其有不結膿疱痂疔反能食而喘腹脹譫語不大便者當以承氣湯下之如甚而渴面赤悶亂大小便澁或大吐者合利其小便通關散主之或瘡疹已出定膿汁不乾而大便不通者宜牛黃丹

欽定四庫全書

普濟方

方

鼠粘子湯 如斑子已出稠密身表熱急與此藥以防

已後青乾黑陷

粘子 炒香 當歸身 酒浸 甘草 炙各一錢 柴胡 一分



連翹	黃芪	黃芩	各一錢半	地骨皮	二錢
右為粗末每服二錢水煎去滓溫服空心藥畢且休與乳食					
一證出大盛而面黃大便色黑煩躁喘渴或腹脹此有瘀血在裏宜與服小柴胡湯犀角地黄湯昔王子亨					
指迷方曰痘瘡半在表半在裏反熱毒大盛服此佐以快毒丹使氣調勻則出快不致倒靨及秋冬之間痘瘡發而不起由腎氣強盛胃氣稍弱瘡又黑陷加減用之					
欽定四庫全書					
普濟方					
小柴胡湯					
柴胡	去蘆	人參	去蘆	黃芩	甘草
				各一兩	半夏
				湯泡	二兩
右剉姜三片棗一枚服冬春腎強脾弱黑陷如嗽加五味子二兩					
柴胡	三錢	性寒	治肝	甘草	一錢
				調脾	
				生姜	二錢
				胃氣	正
右加減煎服咳嗽加五味子					
犀角地黄湯 治瘡疱壅盛喘急浸淫成片及治傷寒					
溫病應發汗而不發汗內有瘀血者及鼻衄吐血不					



盡內有餘瘀血面黃大便黑者此方消化瘀血并小兒體氣實熱瘡疹出得大盛此方解之如體衰熱弱	不宜用一名解毒散	犀角 <small>一兩如無以升麻代之</small> 生地黄 <small>半筋</small> 赤芍藥 <small>七錢半</small>	牡丹皮 <small>一兩</small>	右剉每服五錢水一盞半煎取一盞溫服有熱旋加黃芩二兩其水脉大來遲不滑者是為無熱更不用黃芩也	欽定四庫全書 普濟方	一證毒氣彌盛瘡中吐衄出大盛之時不能解利其害尤速宜抱龍丸生犀汁小柴胡湯	生犀方	生犀角 <small>不用盛湯酒者</small>	右用新水磨汁食後服	消毒散	右紫草生地黄煎下	抱龍丸
--	----------	--	-----------------------	---	---------------	------------------------------------	-----	---------------------------	-----------	-----	----------	-----



天竺黃 <small>一兩木草云乃</small> 雄黃 <small>一錢</small> 辰砂 <small>五錢</small>
麝香 <small>一錢</small> 牛膽臘月釀南星 <small>四兩如無生南星炒用</small>
右為細末甘草水丸皂角子大用溫湯化下
疹痘論甘草散 若瘡未出及雖出燥渴者宜服
右用大甘草不拘多少炙過為細末每服一錢或二
錢水一盞煎至六分去滓不計時候呷之以少鮮利
熱毒即止若瘡出遲當服紫草飲子大人當鍼兩腕
蝼子骨間男左女右取或更灸一壯亦助發出疹
欽定四庫全書
普濟方
痘毒氣已發不必用之
治小兒麻豆瘡子已出大盛發潰膿水黏衣着席不能
轉動疼痛濕潤傳之便更不成癩痕
用牛糞不拘多少曬乾火煨成灰取心中白者研令
極細如用蛤粉相似用綿撲撲於有瘡處不拘時候
瘡乾以陳酥潤之一方用烏牛糞一方用臘月黃牛
糞日乾燒灰瘡疹潰爛者膿汁沾衣衾卧睡不得用
灰鋪一寸許在床上令睡之或瘡大而成片無皮或



普濟方卷四百三	右為末每服二錢水煎食後溫服微利効	栝樓	去皮	甘草	炒各二錢
		大黃	二錢	麻黃	去節一錢
		石膏	半兩	鈎藤子	一錢
		生犀	半二錢	龍膽	一錢
		黃耆	半兩	桑白皮	半兩炒黃
		欽定四庫全書		普濟方	
		調肝散	治瘡疹大盛宜服令瘡不入眼		
		濕處神効			
		爛痛不可忍者極好生葛不拘多少搗爛用絹袋子盛擺水中隨擺隨接澄取粉攤紙上焙乾為末摻瘡			
		子與之睡為妙			
		尤佳一方麩麥亦如前用如嬰孩有此証用絹綑床			
		成豆癰皆用黃牛糞糝之一方用菖蒲作末如前用			
		治小兒因患瘡疹其間有瘡大成片或有成豆癰成膿			

