

欽定四庫全書

普濟方卷四百六

明 周王朱橚 撰

嬰孩諸瘡腫毒門

五色丹毒 附論

夫丹之為候由熱毒之氣搏於榮血而風乘之所以赤乳肌肉而為之走注也外因乳母食啖熱毒物藥及烘衣不候冷便與兒服而得之其證或發於手足或生於頭面曾脇令兒煩悶腹脹其熱如火痛不可言赤腫遊

欽定四庫全書

普濟方

赤徧體也湯氏所為丹有十五種又有赤遊風及燥瘡本事方以十種治之然丹不特色赤或青或黃或白或黑是血熱風毒有盛有衰挾冷挾熱故其色變易又不同焉要之諸瘡皆屬於心心為血之主血為熱之媒古人以丹命名蓋謂心應火色尚赤揣本揆元大槩心家血熱所致風以動之於是遊赤而徧體也蔓衍而不歇則爛肌自四肢而入腹入腎則殺人惟初生於曾腹然後流散於四肢者易愈 夫小兒五色丹者由丹發而



變改無常或青黃白黑赤此是風毒之熱有盛有衰或
冷或熱故發為五色丹也赤丹者由風毒之重故使赤
也初發疹起大如連錢小者如麻豆肉上生粟色如鷄
冠故謂之赤丹亦名茱萸丹也白丹者由夾風冷之氣
故使色白也初發痒痛微虛腫如吹妳起不痛不赤而
白也黑丹者由風冷傷於肌肉故令色黑也初發痒痛
或燥腫起微黑色者是也丹發於肉中有赤如丹色大
者如手劇者遍身赤痒故號天火丹丹發於兩脇及腋

欽定四庫全書

普濟方

下此謂之殃火丹也丹發兩膀上過一日便赤謂之神
火丹也丹發赤斑如梅子遍背腹謂之野火丹也丹初
發着兩頰兩腋下兩膀上謂之家火丹也丹發如灼在
脇下正赤初從頭起而多痛謂之螢火丹也朱田火丹
由丹發於背漸至遍身一日一夜而成瘡謂之朱田火
丹者是也丹發兩膀裏尻間正赤流至陰頭赤腫血出
謂之天竈火丹也丹發從足趺起正赤謂之廢竈火丹
也丹發膝上從兩股起及臍間走入陰頭謂之尿竈火



丹也有肌肉虛者為風毒熱氣所乘熱毒搏於血氣則皮膚赤而腫起其風隨氣行遊不定故名赤遊腫也

凡患諸丹癰腫毒必須先服升麻飲之類導氣藥以散

其毒方可用藥調塗不然恐毒氣入腹則殺人也 凡

小兒丹瘤乳腫毒赤走引遍身者乃邪熱之毒在表以

磁片撒出紫血其病立愈如不愈者後用涼膈散加大

黃芒硝利三五行為效次用拔毒散掃三五度必愈矣經

曰丹煉赤瘤火之色也相火主之 凡小兒有赤瘤暴

欽定四庫全書

普濟方

腫可用牛黃通膈丸瀉之後用陽起石散傅之則腫毒

自消如不消可用銚針砭刺血出而愈矣銚風熱發丹

古方謂小兒得之最忌以其氣血未定肌膚柔脆無以

勝悍毒故也是以諸丹不同其發無定處俗又謂之溜

流走經絡散發肌表如塗丹之赤有法可鎌洩去毒氣

不爾則毒入腹近心則死但初發於心頭者不可鎌爾

方

藍青散 治丹毒大赤腫身壯熱百治不差



寒水石 銖十六 石膏 銖十三 藍青 用十二銖冬 犀角 銖八 柴	胡 銖八 知母 銖十 羚羊角 銖六 杏仁 銖八 芍藥 黃芩 銖各七	梔子 銖二 竹瀝 升一 生葛汁 四合 蜜 升二	右呶咀以水五升并竹瀝煮取三升三合去滓內杏 仁脂合蜜汁微火煎取二升一二歲兒服二合大者 量加之米飲化下	搨湯 治小兒數種丹方	大黃 甘草 當歸 芎藭 白芷 獨活 黃	欽定四庫全書 普濟方	芩 芍藥 升麻 沉香 青木香 木蘭皮 各一 兩 芒硝	右呶咀以水一斗二升煮取四升去滓內芒硝以綿 搨揚中適寒溫搨之乾則易取差止	藍葉散 治諸丹發熱赤腫	白芷 柴胡 知母 杏仁 去皮 川芎 赤芍藥	生地黃 川升麻 生甘草 各一分 乾葛 一分 爛石膏	梔子仁 各半 藍葉 日乾一分
---	--	----------------------------------	---	------------	---------------------	---------------	-------------------------------	--	-------------	-----------------------	------------------------------	-------------------



右剉細每一錢半新水煎服熱甚加黃芩玄參煎服	藍青散 治一切丹毒赤腫身熱如火已服諸藥不退	由風熱毒氣在於腠理熱毒搏血蒸發於外其皮上	熱而赤如丹塗之狀故謂之丹若不治則肌肉壞	爛若毒氣入腹則殺人也今以一方同療之	藍青 知母 甘草 梔子 <small>各半</small> 黃芩 <small>一兩</small> 杏仁 <small>去皮</small>	<small>尖用</small> 升麻 <small>半兩</small> 柴胡 寒水石 石膏 <small>各一兩</small> 赤芍藥	<small>錢四</small> 羚羊角	欽定四庫全書 普濟方	右咬咀每服三錢水一盞煎六分三次溫服	升麻膏 治小兒一切丹發無常處體熱如火燒	川升麻 川大黃 景天草 蛇銜 梔子仁	寒水石 川芒硝 藍葉 生地黄 芭蕉根	羚羊角屑 梧桐皮 <small>各半兩</small>	右細剉以竹瀝浸一宿明日漉出却入鐺中用臘月	猪脂一斤於慢火上熬一食以承熱以綿濾去滓候	冷成膏以瓷合盛旋取摩之兼以膏如枣核大以竹
----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---	---	-----------------------	------------	-------------------	---------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------



瀝調服之	升麻膏 治小兒赤毒腫	川升麻 白欵 漏蘆 川芒硝 各一兩 黃芩 枳	殼 連翹 蛇御 各一兩 梔子仁 二兩 蒴藿 二兩	右細剉以猪脂一斤入於鐺中以慢火煎諸藥令赤 色去滓放冷以甕合盛旋取塗之	麻黃湯 治小兒丹毒風腫及風疹	麻黃 半兩 獨活 射干 甘草 桂心 青木香	欽定四庫全書 普濟方	石膏 黃芩 各一兩	右咬咀以水四升煮取一升三歲兒分為四服日再	升麻黃芩湯 治小兒月內發丹一名藍葉散	升麻 黃芩 去黑心 犀角 鎊 大黃 剉 柴胡 去苗 山梔子	仁 各半兩 石膏 三分 甘草 一分 藍葉 合切二	右搗篩每服二錢匕水一盞煎至半盞去滓食後分	溫二服更量大小加減外臺秘要用竹瀝四合同煎	治小兒惡毒丹及風疹
------	------------	------------------------	--------------------------	---------------------------------------	----------------	-----------------------	------------	-----------	----------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------	----------------------	-----------



淋洗方	右各一兩生為末蜜和冷水調以鵝毛上患處	連	鬱金 黃芩 甘草 山梔 大黃 糯米 黃	金花散 治一切丹毒	右為末每服二錢茄蒂煎湯調下或生地黃亦可	各半 麝香 半錢	紅肉消 當歸 茄片 甘草節 羌活 黃芩	欽定四庫全書 普濟方	內托散 以生銀水磨服功勝紫雪忌生血	治小兒衝惡熱毒煩悶及諸熱丹毒	取郎耶根莖煮服之	治小兒大腹痞滿丹毒寒熱	右呶咀以水三升煮取一升三歲兒分三服日三	麻黃 升麻 葛根 射干 鷄舌香 甘草 各半 石膏 半兩
-----	--------------------	---	---------------------	-----------	---------------------	-------------	---------------------	---------------	----------------------	----------------	----------	-------------	---------------------	-----------------------------------



升麻飲 治一切丹遍身壯熱煩渴赤流初發甚者一	加減服之一方加川芎蜜煎	右咬咀每服半錢水一盞加竹葉煎去滓大小以意	錢各半	漢防己 <small>兩半</small> 朴硝 犀角 黃芩 黃耆 川升麻	人也	故赤腫及遊走遍體者又名赤遊風入腹入腎則殺	防己散 治丹腫候熱毒之氣極與血相搏而風乘之	欽定四庫全書	普濟方	溫不計時候量兒大小分減服之	右搗羅為散每服一錢以水一盞煎至五分去滓放	川大黃 <small>半兩剉</small> 防風 <small>半兩</small> 川升麻 <small>一分</small> 黃芩 <small>一分</small> 麻黃 <small>一分</small>	大黃散 治小兒一切丹遍身赤痛	右剉煎水避風浴之	防風 桑白皮 黃菊花 丹參 莽草 荊芥	棗木根 <small>分等</small>
-----------------------	-------------	----------------------	-----	---------------------------------------	----	----------------------	-----------------------	--------	-----	---------------	----------------------	---	----------------	----------	---------------------	-----------------------



升麻膏 治小兒赤丹初發肉色如硃色如鷄冠又名	加減	右搗羅為末每服一錢煎五分去滓溫服量兒大小	草 各半 兩	桑寄生 獨活 川大黃 犀角 朴硝 甘	寄生散 治毒腫甚者	匕去滓空心分溫二服晚再服更量兒大小加減	右搗篩每一錢匕水七分煎至四分下朴硝末半錢	欽定四庫全書 普濟方	防風 去蘆各 半兩	黃芩 去黑 心 麻黃 去根 節 秦艽 去苗 土 升麻 各一 兩 大黃 剉 炒	黃芩湯 治小兒丹毒徧身	兒大小加減	右為細末和勻熟水調下半錢一方煎服無葛根量	錢 各三 研	升麻 黃芩 大黃 麥門冬 葛根 朴硝	名消毒散
-----------------------	----	----------------------	-----------	--------------------	-----------	---------------------	----------------------	------------	--------------	---	-------------	-------	----------------------	-----------	--------------------	------



菜萸丹	川升麻 白欵 漏蘆 川芒硝 各一兩 連翹 梔	子 各半兩	右剉細以猪脂半斤入鑊中用慢火煎諸藥令赤色去滓放冷以磁合盛旋取每用少許塗患處	升麻湯 治小兒黑丹以此藥搨之	升麻散 二兩 漏蘆 二兩 川芒硝 二兩 黃芩 三兩 梔子仁 一兩 蒴	藿 半兩	欵定四庫全書 普濟方	右細剉和勻每用三兩以水五升煎至三升去滓微温以軟帛旋蘸搨病上以消為度	牛黃散 退丹毒	鬱金 甘草 炙 桔梗 天花粉 葛粉	右等分為細末每服一錢薄荷湯入蜜調下	淋洗方	防風 桑白皮 黃菊花 丹參 莽草	右等分加荆芥煎湯浴患處
-----	------------------------	-------	---------------------------------------	----------------	------------------------------------	------	------------	-----------------------------------	---------	-------------------	-------------------	-----	------------------	-------------



黃耆湯 治小兒丹毒	黃耆 <small>剉</small> 蒺藜子 <small>炒去角</small> 黃芩 <small>去黑心</small> 大黃 <small>剉</small> 甘草 <small>炙剉</small>
分	
右搗篩每一錢匕水七分煎至四分下朴硝末半錢	
匕去滓食前分溫二服更量兒大小加減	
吳藍湯搗方 治小兒發丹毒熱痛	
吳藍 大黃 槐白皮 商陸 榆皮 <small>各二兩</small>	
右細剉每用二兩以水五升煎至四升去滓入朴硝	
欽定四庫全書	普濟方
半兩攪勻以綿二片浸於湯中更旋搗丹上日三五	
度即差	
祛毒膏 治小兒丹黑色痒痛腫起一名祛毒散	
川升麻 漏蘆 芒硝 <small>各二兩</small> 黃芩 <small>一兩</small> 梔子 <small>一兩</small>	
右為麤末每用兩匙頭以水三盞煎至二盞去滓微	
熱以軟帛旋蘸搗瘡上以消為度	
治小兒五色丹	
川大黃 黃芩 川芒硝 梔子仁 乾藍葉	



商陸 <small>各一兩</small>	右羅為散以水調塗之立効	治小兒天竈火丹 齊葉 <small>三分</small> 赤小豆 <small>一分</small> 合 <small>一</small> 鍛鑪門上灰 <small>一兩</small> 青羊脂 <small>兩三</small> 葱白 <small>兩三</small> <small>切二莖</small>	右相和搗如膏摩之燥再摩之	拔毒散 治小兒丹毒肉色變異或着四肢或在胷背 遊走不定焮熱疼痛拔毒消腫散熱痛	欽定四庫全書 普濟方	石膏 <small>三兩</small> 甘草 黃蘗 <small>各一兩</small> 寒水石 <small>七兩</small>	右為細末每用水調服時以鷄翎刷掃以芭蕉汁調 尤妙	朱黛散 治解丹熱諸毒	青黛 土硃 <small>各一分</small> 軟滑石 荆芥穗 <small>各半分</small>	右為末每一錢半蜜水調下兼與撲身	寒水石散 治角瘳遊走不定焮然赤腫疼痛用藥角 歸手足上為妙
--------------------------	-------------	---	--------------	--	---------------	---	----------------------------	------------	---	-----------------	---------------------------------



寒水石 石膏 黃連 黃栢 <small>各一兩</small>
右為末水調刷
治小兒野竈丹從膝起薺葉塗方
乾薺葉 <small>末</small> 香薺 <small>末</small> 赤小豆 <small>末各半兩</small> 生蒴藿葉莖 <small>一握細剉</small>
右細研蒴藿入諸藥末和調如糊塗乾即易之以差為度
治小兒天竈火丹發尻間正赤流陰頭赤腫血出葱薺
薺 <small>五莖和須切碎</small> 薺 <small>五莖生者和梗切研</small> 赤小豆 <small>末</small> 竈門上灰 <small>各研</small>
合
右合研勻細以青羊脂三兩調勻塗之以差為度
治小兒天火丹發徧身赤如絳色痒痛甚者
桑根白皮 <small>二兩</small> 丹參 <small>二兩</small> 甘菊 <small>半兩</small> 莽草 <small>一兩</small>
右細剉和勻每二兩以水三升煎至二升去滓令煖
避風浴兒
棗根湯 治小兒五色丹徧身宜用洗浴丹發而變改



又方	右為末獐猪膽汁調塗頭心及貼脚心	三黃散 貼一切丹腫毒	大黃 黃蘗 宣連 各等分	一	右搗羅為散每服半錢匕并花水調下空心日晚各	麻黃散 治小兒丹若入腹及下部陰卵百藥不差	麻黃 <small>去根節</small> 升麻 <small>各半兩</small> 硝石 <small>研一兩</small>	欽定四庫全書	普濟方	右研令勻并水調以鷄毛刷立効	黃丹 <small>一錢</small> 朴硝 <small>一錢</small> 赤小豆 <small>兩頭尖者為末半合</small>	毒飲次用傅之	丹毒至効散 治小兒一切丹毒及龍帶發作先服消	五升去滓	右細剉煎湯避風冷處浴之次敷藥每用二兩以水	無常	棗木根 <small>四兩</small> 丹參 <small>三兩</small> 乾菊花 <small>二兩半</small>
----	-----------------	------------	--------------	---	----------------------	----------------------	---	--------	-----	---------------	---	--------	-----------------------	------	----------------------	----	---



用硝石白麪等分研勻井水調稀睡時塗脚心効 硝石散 治小兒丹發如灼其初從額起至脇下大痛 者名螢火丹	硝石 ^{兩半} 寒水石 ^{分一} 赤小豆 ^{合一}	右搗羅為細末每用半錢以冷水調塗患處一方用 猪脂	莽草散 治小兒丹發從足趺起色正赤乃名癩竈火 丹	欽定四庫全書 普濟方 莽草 寒水石 硝石 ^{兩各半}	右搗羅為散每用以新汲水調塗患處一方每服半 錢一日三服量兒大小加減服之	慎火草散 治小兒一切丹通用 慎火草 ^{兩半} 紫葛 ^{兩半} 硝石 ^{兩半}	右搗羅為散用冷水調塗之乾即再塗以差為度 治小兒黑丹	菟蔚子 蛇啣草 慎火草 ^{兩各二}
---	--	----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------------	--	------------------------------	----------------------------



右搗令爛以鷄子白調塗之

治小兒天竈火丹

細辛一兩糯米一合景天草三兩

右搗如泥塗丹上差

白玉散 治赤遊丹毒

白玉一兩寒水石二兩

右為末米醋調傅貼患處或腫至外腎有破處只用

水調亦可

欽定四庫全書

普濟方

保嬰方

無白玉用白土如乾上用水鷄翎掃之

治小兒天竈火丹病從髀間起其小兒未滿百日犯行

路竈君若熱流下令陰頭赤腫血出方

鯽魚肉五合赤小豆末三合

右二味同搗少水和傅之良

姜礬散 治小兒火丹并一切風疹赤腫

生姜五兩切白礬二兩半研同上調少時自乾不見火



鯽魚塗方 治小兒丹毒徧身絳色	右和勻空心溫服一合日晚再服以差為度	青藍汁 治小兒丹毒 青藍汁 一合 竹瀝 二合	七服日再服	右先取油麻去皮研細絞取汁一合調甘草末半錢	甘草 炙剉一分 油麻 半斤	甘草散 治小兒丹毒防入腹	欽定四庫全書 普濟方	右以水三斗煮浴日三四遍浸洗妙看冷熱避風	苧麻根 三斤 赤小豆 四升 連葉	備急治白丹	右調勻貼於瘤上	綿羊腦子 生用 朴硝	治小兒丹瘤	蜜水調下食後大便利是効	右為末生姜自然汁調鵝毛拂之又方牽牛末薄荷
----------------	-------------------	---------------------------	-------	----------------------	---------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	-------	---------	------------	-------	-------------	----------------------



戎鹽 <small>分一 附子 枚一</small>	面上起	戎鹽塗方 治小兒鬼火丹發兩臂赤起如李子及從	度	右和研勻細以新水調如糊塗丹乾即易之以差為	廢竈磚 <small>末 屋四角茅 一兩 燒灰各</small>	癩磚塗方 治小兒地竈丹從陰下起入踝骨上	右和調如糊塗之以差為度	欽定四庫全書 普濟方	猪槽下泥 <small>合一 生麻油 兩一</small>	猪槽泥塗方 治小兒烟火丹從身起	右燒灰研末以鷄子白調如糊塗之以差為度	梓木白皮 蓼葉 <small>分各 一</small>	着兩脇傍兩頰上	梓木灰塗方 治小兒家火丹發如大指日長一寸偏	右搗魚令細入油研勻塗丹上日三五度即差	生鯽魚 <small>一頭 三兩 麻油 兩二</small>
---------------------------------------	-----	--------------------------	---	----------------------	---	------------------------	-------------	---------------	--	--------------------	--------------------	---------------------------------------	---------	--------------------------	--------------------	---



山梔膏	治丹發生於兩脅及腋下乃名殃火丹
右羅為末每用半錢好醋調塗患處	
川朴硝	一兩
梔子仁	一兩
拔毒散	治小兒發丹生於兩脅及腋下乃名殃火丹
右和調如糊塗之以差為度	
茅草	屋四角者
取燒研灰	雞子白
茅灰塗方	治小兒火丹從踝及脛起
右調和如糊塗之以差為度	
欽定四庫全書	普濟方
猪通灰塗方	治小兒白丹
猪屎灰	雞子白
雄黃無雌黃	
右以鷄子白調塗丹上日三五次以差為度一方有	
雌黃	戎鹽
研各	一兩
雄黃塗方	治小兒野火丹發徧身斑如梅李狀
度一方用雄黃半兩	
右燒過研細用雄鷄血調塗丹上日三五徧以差為	



山梔子 <small>兩^四</small> 生鯽魚 <small>斤^半</small>	右藥同搗如泥每用少許看丹發處以醋化塗患處	竹葉散 治小兒丹發斑斑如梅子徧背腹乃名野火	丹	青竹葉 <small>二兩</small> 燒灰 竈中黃土 <small>一兩</small>	右細研為散看丹發處每用少許以鷄子白調塗患處	赤豆散 治小兒丹發於兩膀裏尻間正赤流至陰處	欽定四庫全書 普濟方	乃名天灶火丹	赤小豆 <small>一分</small> 研 伏龍肝 <small>一分</small> 研	右再同研勻每用一錢以鷄子白調塗患處	二根湯 治小兒丹發膝上從兩股至臍間走入陰處	乃名尿灶火丹	桑根白皮 李子根 <small>各四兩</small>	右細剉每用三匙頭以水兩碗煎至一碗去滓看冷	熱避風處淋患處
---	----------------------	--------------------------	---	--	-----------------------	--------------------------	---------------	--------	--	-------------------	--------------------------	--------	-----------------------------------	----------------------	---------



治小兒鬼火丹	右研為膏塗之即差	虎脂 _{二兩} 黃丹 _{一兩}	治小兒天火丹發徧身赤如絳色	右細研為散以鷄子白調塗之日三五度効	風花石灰 _{二兩} 屋四角茅草 _{三兩} 燒灰	治小兒黑丹	右搗絞取汁塗之	欽定四庫全書 普濟方	酸母草 五葉草 _{各五兩}	治小兒白丹方	右細研為散以調塗之	又方	右細研為散以鷄子白調塗之	硝石 _{一兩} 乳香 _{一分}	硝石散 治小兒一切丹徧身體熱
--------	----------	-----------------------------------	---------------	-------------------	---	-------	---------	---------------	---------------------------	--------	-----------	----	--------------	-----------------------------------	----------------



景天草 <small>五兩</small> 蛇啣草	右搗如泥以鷄血調塗之	治小兒野火丹 白殭蚕 <small>二七枚</small> 慎花草 <small>一兩</small>	右搗令爛塗之	治小兒螢火丹 竈中黃土 <small>一合</small> 生油 <small>二合</small>	右調如泥時用塗之以差為度若痛至陰不治即殺	欽定四庫全書 普濟方	人	治小兒癩竈火丹 赤小豆 <small>末一兩</small> 牛角 <small>二兩</small> 燒灰	右細研為散用鷄子白調如泥塗之	治赤遊毒腫 用花蕊石散生姜薄荷自然汁調鵝毛刷上患處此方尤妙於前白玉散行在潘術幹傳尤妙於前方只一晝夜消盡
------------------------------	------------	--	--------	---	----------------------	---------------	---	---	----------------	--



又方	用唾和胡粉從外向內傅之一方粉熬過
治小兒赤丹斑駁者方	
末用鷄子白和塗	
用薔薇葉搗取汁服三合滓傅上良千金翼以薔薇	
治小兒赤丹方	
服黃龍湯二合并傅患處佳	
又方	
欽定四庫全書	普濟方
用豬槽下爛泥傅之乾則易	
治小兒五色丹方	
用臘月豬脂和釜下土傅乾則易	
又方	
用煎大豆汁塗之良差後亦無癍痕	
又方	
用搗馬齒莧一握取汁飲之以滓傅其上亦可	
治小兒丹毒及火丹熱如火燒腰者	



用鍛鐵屎以猪脂和傅之
又方
用屋塵以臘月猪脂和傅之
治小兒火丹赤如朱走皮中方
用醋和豉研傅之
又方
用鯉魚血傅之良
又方
欽定四庫全書
普濟方
用荏子搗傅之良亦治天火丹
又方
用猪米水和絞取汁溫服少許良
治小兒天火毒肉中有赤如丹色大者如手甚者遍身
或痛或痒腫方
用赤小豆二升為末鷄子白和如薄泥傅之乾則易
便差一切並用此方皆瘥一方用五合水和取汁飲
一合取滓塗五心一方水調鵝毛拂上大妙又有鷄



冠丹大者如豆粒肉上生粟一名菜萸火療同前天
火法

治小兒骨火毒其瘡見骨方

用搗大小蒜厚封之着足踝者是也

治小兒殃火丹毒着兩脇及腋下者方

用伏龍肝為末油和傅之乾則易若入腹及陰以慎

火草取汁服之

治小兒尿竈丹從兩股起及臍間走入陰頭皆色赤

欽定四庫全書

普濟方

用切桑白皮二升以水二升煮取汁浴之良

又方

用燒李根為灰以田中流水和之良一方半斤

治小兒朱田火丹病一日一夜即成瘡先從背起漸至

徧身如豆棗大正赤色者亦治菜萸丹五色丹

用濃煮棗根汁洗之已成瘡者赤小豆末傅之未成

瘡者鷄子白和小豆末以傅之凡方中用鷄子者皆

取先破者用之完者無力



治小兒癩竈火丹初從足趺起正赤色者

用棗根煮汁沐浴五六度

治小兒丹毒

用白豆末水和傅之勿令乾

黃皮散 治小兒徧身火丹并赤遊

用黃皮山梔子等分為細末雪水調塗即差又方棗

豆大黃為末薄荷蜜水調塗又方藍澱塗之并藍青

汁飲之

欽定四庫全書

普濟方

獨効散 治小兒諸丹毒并赤遊腫

用栢枝研細塗立効又塗白礬汁頻刷之即消又方

以芒硝泡湯拭之亦効

治小兒丹毒腫痛如火

用土蜂窠為末入麝香少許蜜調塗之水調與喫尤

妙

治小兒丹毒入腹即殺人

用水苔生地黃生菘菜豆葉葫蘆浮萍護火草五葉



<p>籐苦硝海藻菜蕓薹大黃梔子黃芩但得一味研末水 調傅之良</p>	<p>治小兒熱丹瘡成片及治大人 用系茅草葉破即愈</p>	<p>治小兒丹瘤 用草麻子五箇去皮研如麪以水一匙調塗之甚妙</p>	<p>又方 用木鱉子新者去殼研如泥淡醋調傅之一日三五</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>次便効 治急救丹毒方 用白扁豆末水和塗若入心腹者以慎火草取汁一 盞服乾即末之水調服</p>	<p>本事方 治小兒十種丹瘤腫毒所起形候 一飛竈丹從頂起腫光用葱白研自然汁塗 二吉竈丹從頭上紅腫痛用赤小豆末鷄子清調</p>	<p>塗</p>
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------	--	--	----------



三鬼火丹從面上起赤腫用竈心土末鷄子清調塗

四天火丹從背起赤點丹桑白皮末羊脂塗

五天竈丹從兩臂赤腫黃色用柳木燒灰水調塗

六水丹從兩脇虛腫用生鐵末猪糞調塗

七胡吹丹從臍上起黃腫用檳榔末米醋塗

八野火丹從兩脚赤腫用乳香末羊脂調塗

九烟火丹從兩角有赤白點猪槽下土清油調塗

欽定四庫全書

普濟方

十胡漏丹從陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調塗

右此十種丹毒變易非輕治之或緩終不能救余不

惜是方逐一子細辨認依方法治之萬不失一如經

三日不治攻入臟腑則終不可救治之也

治丹瘤方

用大黃朴硝大土蜂窠三味為末篋箠子箠定真赤

處將刀子刺破令出惡血然後用井水調塗赤處効

又方



用茅屋上經年青苔焙乾為末醋調塗赤腫處消
治小兒瘤初發

用麻子搗為漿井水調下

治小兒丹瘤

服托裏散消毒飲外用白芨白斂研為細末搽無病
肉上而截之令不得過却用紫浮萍爛研傅瘤上萬
不失一

治大人小兒纏蛇丹初發便用

欽定四庫全書

普濟方

用蚯蚓糞連皮生姜研爛傅即愈亦治火丹以水和
泥傅之米醋調亦可

又方

用大黃為末搗爛馬齒莧取汁調塗已成丹亦治

又方

用蓼葉燒灰鷄子清和數數塗之

又方

用桃仁湯浸去皮爛搗塗之又清油調白礬末亦妙



治小兒風丹疹	用蜜調赤土硃入酒一二滴服之亦研塗疹上
治諸丹	用人參羌活散惺惺散夾和用竹葉煎湯調下熱證 加黃芩玄參冷證加黃耆白芷
踈風解毒散	治丹毒傳方
又方	用紫浮萍一碗活地龍中等者七條同研細傳之
欽定四庫全書	普濟方
用水藻搗傳	
又方	用芭蕉根用汁傳之
又方	用蚕沙一升井水煎溫和密室洗之亦治天□火丹
治青白丹毒痒痛虛腫如吹	
用竈中黃土一分豉半分為末麻油調傳患處	
蜚針法	



用水琪數條以青苔蓋覆或溫紙亦可去血即消未
消再用瘡毒滿身徧黑入腹入陰難治

平血飲 治風熱積毒聚成發於頭面手足熱者如胭
脂色其熱如火輕輕着手痛不可忍

右加紫草與犀角消毒飲相間煎服赤瘡丹火瘡紫
萍瘡並治壯熱煩渴甚加黃芩麥門冬去心朴硝各
半錢一方與敗毒散和生姜薄荷蟬蛻去足翼防風
去蘆細切煎渴加天花粉少許

欽定四庫全書

普濟方

治角瘡

用青黛土硃為末井水調入蜜敷角亦可

又方

用黃丹不拘多少磨刀水調刷

治丹毒腫如火

用大黃朴硝為末調塗腫處立効水苔生地黃菘菜
浮萍梔子皆可研爛水調傅

洗方



用防風醋車前赤豆竈心土煎水洗
又方

洗角後用小驚丸壓邪大驚丸鎮驚

治丹發疼痛

用搗篇竹汁服一日一兩服立差若未差再服之

治赤白遊疹及癰腫毒腫

用水蛭十餘枚令啗病處取皮皺肉白無不差也冬

月無蛭虫地中掘取暖水中養之令動洗去人皮醜

欽定四庫全書

普濟方

以竹筒盛蛭綴之須臾便咬血滿自脫更用飢者崔
知悌令兩京預養之以防緩急收乾蛭當展其身令
長腹中有子者去之此物難死雖加火炙亦如魚子
烟薰三年得水猶活也

治小兒赤遊行於體上下至心即死方

用芒硝內湯中取濃汁以拭上又方以水調塗之治

一切丹毒流腫

治小兒丹毒破作瘡黃水出亦治惡瘡



用敗蒲席燒灰和鷄子白傅之	治五色丹俗名遊腫若犯多致死不可輕之	用梔子和水調傅之一方用醋和塗之亦治神火丹	治火丹毒	用故麻鞋草鞋和人亂髮燒作灰醋和傅之	治小兒熱毒遊腫	用摩蘿草搗絞取汁或搗傅上隨手消	治丹火毒偏身睡不可忍亦治赤流	欽定四庫全書	普濟方	用蜜和乾薑末傅之良	治丹者惡毒之瘡五色無常	用番黃米粉鷄子白和傅之	治小兒赤丹不止	度	用柳葉一斤水一斗煮三升去滓搗洗赤處日七八	治小兒丹毒	用豉炒令烟絕為末油調傅之
--------------	-------------------	----------------------	------	-------------------	---------	-----------------	----------------	--------	-----	-----------	-------------	-------------	---------	---	----------------------	-------	--------------



治小兒赤遊行於體上下至心即死

用水中苔搗末傅上良

治暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結

用搗積雪草絞汁服之

治小兒丹毒皮膚熱赤

用寒水石半兩白土等分搗羅為末用米醋調傅之

愈

治白丹

欽定四庫全書

普濟方

用取白薺末猪脂和傅之

治小兒丹毒從臍起方

用伏龍肝是年深竈下黃土研為末用屋漏水和如糊

傅患處乾即易以差為度用新汲水調亦得一方用

鷄子白相和塗良

治天竈火丹風熱赤遊腫

用猪脂塗

治小兒赤遊行於體上下至心即死



用蒴藿煎汁洗之一方搗葉傅之治丹毒五色者

治小兒油丹赤腫

用蕎麥麪醋和傅之良

療螢火丹從頭起

用慎火草搗和苦酒塗之

療煙火丹發從背起或兩脅及兩足赤如火

用景天草即慎火草真珠末一兩搗和如泥塗之

治小兒赤遊行於體上下至心即死

欽定四庫全書

普濟方

用慎火草生一握搗絞汁以拭之搨上日十遍夜三

四遍

治小兒赤丹不止

用胡荽汁傅之差

療竈丹從兩脚赤如火燒

用五加葉根燒灰五兩取鍛鐵家槽中水和塗之

五色丹名油腫不可輕

用牛屎傅之乾則易



治赤丹 用研粟米傅之	治熱遊毒赤腫 用栝樓末二大兩醞醋調塗之	治小兒丹毒 用青黛和水服之又以汁傅之熱則易	治小兒遊瘤丹毒諸惡瘡腫 用爛搗剪刀草莖葉如泥傅之又以此草膏化如糊	欽定四庫全書 普濟方	以鷄翎掃上腫便消殊効根煮熟未甚乾時人作果 子常食無毒	治小兒丹毒熱 用旋覆花根苗搗絞汁服之	治小兒風熱丹毒瘡 用水甘草同煎飲服之	又方 用杵菘菜傅之
---------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------



治小兒火焰丹消赤腫	用老鴉眼睛草根與木通胡菜煎湯服通利小便	治小兒丹	用杵黃芩末水調傅之	香藥皮散 治諸腫丹毒發於四肢腹背頭面或赤或白或痒或痛或寒或熱	用香藥皮一兩水一大碗同煎取半碗以翎毛刷患處効	欽定四庫全書	普濟方	蟻螬散 治丹走行皮中浸廣者入腹殺人用蟻螬乾者碾末油調塗之以差為度	泥醋塗方 治小兒胡吹竈丹從陰下起	用磨刀水棚下泥和醋調膏塗之乾即更塗以差為度	鐵槽水洗方 治小兒飛竈丹從項起	用浸槽中水日三五度又方飲一合治熱毒遊腫	犬骨灰塗方 治小兒神火丹從項起
-----------	---------------------	------	-----------	--------------------------------	------------------------	--------	-----	----------------------------------	------------------	-----------------------	-----------------	---------------------	-----------------



<p>用犬枯骨為末以青羊脂調如糊塗之日三五次</p>	<p>治白丹鐵挑方</p>	<p>右於兒男左女右大脰脂面螺文上以鐵挑有筋斷之差</p>	<p>羊脂塗方 治小兒殃火丹從兩脅下起青黑色</p>	<p>用鍛鐵下槽中鐵屎搗研為末半兩羊脂二兩猪糞燒灰一兩同研如糊塗之以差為度</p>	<p>治小兒患赤白遊疹</p>	<p>欽定四庫全書 普濟方</p>	<p>用蝦蟇搗碎傅之煮熟色正赤小兒及鷄狗食之脚屈不行</p>	<p>治一切丹毒</p>	<p>用梔子大黃蜜水搗傅</p>	<p>治小兒一切丹徧身體熱</p>	<p>用浮萍草研如泥傅之</p>	<p>又方</p>	<p>用韭畦中土以水調塗之</p>
----------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------------	---	-----------------	-----------------------	--------------------------------	--------------	------------------	-------------------	------------------	-----------	-------------------



又方	用粟米水煮濃汁洗之
又方	用地龍煮以水研如泥塗之
治小兒一切丹及諸腫毒	
用鼠粘子根洗去苗搗絞取汁每半合量兒大小分減服之	
治小兒一切丹	
欽定四庫全書	普濟方
用水苔搗爛頻頻傅之	
又方	
用景天草爛搗傅之一方取汁先微揩丹上後塗以差為度	
治小兒丹發惡毒五色無常	
用青粟毬有刺者搗碎以水煮洗之	
治小兒五色丹徧身熱如火燒遶腰即損人	
用蕓薹子一兩以酒一小盞細研取汁塗之	



治小兒黑丹	用葛勒蔓輕磨破以醋研訶梨勒塗之妙	治小兒赤丹	煉了猪膏五兩和令勻傅之	用殺羊角屑八兩以水五升煎至一升絹濾去滓入	用鹿角燒灰細研猪脂和塗之	治小兒面身卒得赤丹或痒或腫起不速療之即殺人	用樑上塵以醋和塗之	又方	用蓼葉搗爛塗之	又方	用蘭香葉搗爛塗之	治小兒白丹	用老鴉眼睛草葉入醋細研傅	治小兒火焰丹消赤腫
欽定四庫全書														
普濟方														



用青羊脂熟摩日三五度用之	又方	用喂猪杓子炙令熱熨之	治小兒天火丹發偏身赤如絳色	用鬼木搗絞汁塗赤處	又方	用小兒埋胞衣瓶子中水二合時時與兒服及塗身	上有毒處効	欽定四庫全書	普濟方	治小兒殃火丹生於脇腋下	用川朴硝細研為散每服以竹瀝調下半錢量兒大小加減服	又方	用伏龍肝細研以生油調塗之一方鷄子白和傅	又方	用浮萍草絞取汁時時與兒服之	治小兒神火丹
--------------	----	------------	---------------	-----------	----	----------------------	-------	--------	-----	-------------	--------------------------	----	---------------------	----	---------------	--------



用鯽魚半斤赤小豆屑三合搗如泥塗丹上唯數塗
為良

治小兒朱田火丹

用鷄子白塗之

治小兒天竈火丹

用車前子末水調塗之

又方

用鐵落末以錫和如膏塗之

欽定四庫全書

普濟方

治小兒尿竈火丹

用屋四角茅燒灰細研為散以鷄子白調塗之

澤蘭湯

治丹入腹

方見本門風
瘙癢疹類

治天行煩毒小兒寒熱丹毒

用藍或青布水漬取汁飲之

拔毒膏 治小兒赤毒腫及腮頰腫痛

黃栢一兩 寒水石一兩 石膏半兩 甘草二錢 黃芩半兩

右為細末醋調成膏貼赤腫處或用新水調搽亦可



人參散 治赤遊丹	人參 三錢 蟬退 十五個 去足 羌活 二錢 防風 三錢 當歸 二錢 粉草
服如發熱氣壅宜先用虎睛丸麥煎散	
右咬咀每服半錢桃柳條各七寸水六分盞同煎溫	
升麻 二錢	
赤芍藥 二錢半	
甘草 二錢	
乾葛 一錢	
麻黃 去節 一錢	
黃芩 一錢	
川	
解肌散 治火丹	
右二味相合新水調攪勻用鷄毛蘸時時塗掃	
欽定四庫全書	普濟方
土硝 一兩	細末
大黃 一錢	
毒汁次用此藥	
土黃散 治赤流丹毒可用一小釵刀踈去赤暈惡血	
時候量兒大小增減	
右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘	
白木 一錢	
木香 半錢	
芍藥 一錢	
枳殼 一錢	半去
甘草	
茯苓 三錢	去皮
葛根 三錢	



赤小豆 赤芍藥 分等	又方	右為末用生地黄汁塗角調傅患處	牡礪 青黛 豆粉 分等	治丹毒未見面目或不當處不可角退	散	右為末用生赤芍藥地黄藕節雪草搗汁塗患處即	皮拍寒水石等	欽定四庫全書 普濟方	赤小豆 白藥子 天花粉 槐花 滑石 黃	塗角藥	右為末每服一錢薄荷葉同煎	錢一 桂皮 錢一 甘草 錢二	赤芍藥 當歸 地黃 紫草 麻黃 去節 羗活	錢二 錢一 錢一 錢二 錢一	當歸散 治一切風丹火疹	右咬咀每服用燈心薄荷生地黄同煎	錢二 全蝎 去毒 錢三 茯苓 錢三 紅花 錢三
------------------	----	----------------	----------------------	-----------------	---	----------------------	--------	---------------	------------------------------------	-----	--------------	----------------------	---	----------------------------	-------------	-----------------	-------------------------------------



右為末用鷄子清生地黃藕汁調塗傳患處	治小兒赤遊行體上下至心即死	以生景天草搗傳瘡上	治白遊赤遊	以死蠶塗之白遊用白死蠶塗赤遊用赤死蠶塗	欽定四庫全書 普濟方	普濟方卷四百六
-------------------	---------------	-----------	-------	---------------------	---------------	---------

